



Theodore
Besterman

391





VNIVERSALIS
Plantarum
HISTORIAE
Tomus II.

UNIVERSALIS

PLACITUM

HISTORIAE

Tomus II.

SOL AD ASPPECTUM NUNCIAT DE GLORIOSO DEO,
 INSTRUMENTUM EST ADMIRABILE, OPUS ALTISSIMI. Eccl. xlii.



HISTORIA
 PLANTARUM
 UNIVERSALIS

Tomus II.
 Auctoribus

JOHANNES BAUHINO,
 Archiatro.

JOH. HENRICO CHERLERO,

Doctore:
 Basiliensibus

Quam recensuit et auxit
 DOMINICUS CHABRAUS,
 D. Genevensis

Jusis vero publici fecit,
 FR. LUD. AGRAFFENRIED,

Dñs in Gertzensee etc.

EBRODUNI.

MDC LI. *D. H. p. p. l. s.*

Dominus creavit e terra pharmaca, vir prudens non gravabitur
 illis. Eccl. xxxix. 4.



NEOCOMUNE.

Conr. Meyer fecit.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

HISTORIA
PLANTARVM
VNIVERSALIS, NOVA
ET ABSOLVTISSIMA
CVM CONSENSV ET DISSENSV
CIRCA EAS.

Auctoribus

IOH. BAVHINO ILL. CELS. VVIRT.
ARCHIATRO

ET

IOH. HEN. CHERLERO PHILOS. ET MED. DOCT.
BASILIENSIBVS.

Quam recensuit & auxit

DOMINICVS CHABRÆVS MED. DOCT.
GENEVENSIS.

Iuris verò publici fecit

FRANCISCVS LVD. A GRAFFENRIED.
Dominus in Gertzenfee &c.

Continens

DESCRIPTIONES STIRPIVM EXACTAS, FIGVRAS NOVAS, EX IP SO
Prototypo maxima ex parte depictas: earumdem Satum, Culcum, Mangonia: item Vires omnige-
nas: Preparaciones, Extractions, ac Distillationes præcipuas: Exotarum Orien-
tis atque Occidentis, aliarumque ante nostrum seculum incognitarum,
supra mille Historias novas: Synonyma: Aequiuoca: Succe-
danca: & præcipuarum Linguarum appellationes.

In primis verò

PLACITA VETERVM GRAECORVM, ARABVM, LATINORVM.
& posterioris seculi Scriptorum:

INTERPRETATIONES AC CORRECTIONES SENTENTIARVM
obscurarum & deprauatarum.

Notantur ERRORES eorum qui de Plantis scripserunt: Ac continentur
plæraque omnia, quæ

THEOLOGI, IURISCOVLTIVM, MEDICIVM, PHILOSOPHI, HISTORICI, POETAE
Grammatici, Geoponici, Architecti, alique de Plantis promulgarunt.

Vt meritò omnium Herbariorum vicem supplere queat.

TOMVS II.

EBRODVNI

CIO. IO. CLI.

A MAGNIFIQUE ET PUISSANT SEIGNEUR

FRANCOIS LOVYS DE GRAFFENRIED
SEIGNEUR DE GERTZENZEE, DV GRAND ET SOUVERAIN

Senat de la ville de Berne, Baillif d'Yuerdon, Sur l'Impression de son Herbie.

QUATRAINS

SEigneur Agent infiny, ce Puissant Oeconomie
C'est qui a basti d'un ric tout ce grand Vniuers,
Aux herbes a donné des offices diuers,
Et des Proprietez pour la santé de l'homme.
Le scauant Esculape a esté le premier,
La Princeesse Ciré a esté la seconde,
Et Hermes le troisieme qui ont laissé au monde
Les Vertus des herboges ra au siecle premier.
Dés lors les plus grands Rois ont repyé à gloire
De s'attirer du n m de quelq' herbe nouvelle
Gentin de Gontane, & Prunel de Prinelle,
Artemise d'Armysse, Eupator d'Eupatoire.
Alors on appella les enfans du S. leil
Les Diktes qui auoyent des herbes la norice.
Comment n'numera-t-on qui d'un artifice
Admirable produit, cet Herbie n'impereil
Si d'une seule plante aduente au Catalogue
Des autres, ils ont fait tant d'estime & de cas,
Qu'est-ce que nous dirons? Ains ne dirons nous pas
Que nous deus chanter de GRAFFENRIED l'Eloge?
De GRAFFENRIED qui est un Seigneur Magnifique,
Vn Baillif d'honnaires, amateur de Iustice,
Faucneur de l'Annoeime, & puiisseur du vice
Grand Pilster au Cant n de BERNE l'Heroique.
Qui non pour son esgard, ou profit, ou trafic,
Estale en ce Volume mille plantes inconnues,
Au grand Dioscoride, les raisons qui l'ont meues
A ce noble dessein, C'est le bien du public.
Tume diras que Cherler, que Chabrey, que Baubin,
Y ont contribué de leur peine beaucoup,
Il est vray, mais c'est luy qui a fait ce beau coup
D'auoir heureusement mis cet oeuvre a sa fin.
Oeuure qui prendra fin, seulement quand ce rout
Sera reduit en seu. Mais tandis que la fleur
Verdira au printemps, la memoire & l'honneur
De ce DE GRAFFENRIED ne verra point de bout.
De tous vous Medecins, commenez les premiers
A louer ce Chef d'oeuvre, qui vous fournit la source
De pouuoir à l'honneur bien remplir vostre bourse.
Et couronner vos chefs de verd, dans l'auriers.
Vous humains qui auez icy un repertoire,
De remedes certains pour soulager vos maux
Exaltez ce Seigneur, benissez ses travaux
Et en rendez à DIEU l'ouage, honneur, & gloire.

G. BULET Sieur de Grand

DOMINVS A GRAFFENRIED ANAGRAMMA

DIGNVS ODE FERRI MANA

EVOLVTIO.

SINT Mecœnates, non deerunt, Flacce, Marones,
Ritè Poëta canit, quisquis & ille fiet.
Hoc, liber ille docet, cuius monumenta laboris
Magnorum crexit dextera gnara Virum.
Quid sit Amaltheæ cornu qui nôsse laborat
Huius præstabit lectio lecta libri.
Quid Chiron, Pæon, Podalyrius, atque Machaon,
Quid medicus Lucas, præstite, irque Philon.
Clusius, atque Tragus, Gesnerus, quid Lonicerus
Gesseri, hoc præiens continet o nne Liber.
Plantigraphorum alii stipata volumina voluant,
Sed tibi præ reliquis hic liber vnus erit.
Acriter heic dum tres desudauère Marones,
En! nec Mecœnas defuit altis ope.
His grauis altis erat mox Grafenriedius Heros,
Gentis qui & mentis nobilitate valet.
Promouet hic operas, argenti & prodigus auri,
Inuità perà nec remoratur opus.
Eius magnifico sumptu bene seruit incus,
Contuleret magnis vt liber iste Viris.
Non fiet hic dignus Mecœnas ferriæ ode?
Staret inoblitus non sibi semper honos?
Vespasiane vale qui spurca lucella matellis
Exigis, hinc putet fordida fama tibi.
Sed Grafenriedi, saluèque, vigèque, virèque,
Lilia dum violam & florea rura dabunt.
Non luera putida amas, sed comoda totius orbis,
Publica priuatis anteferendo lucris.
DIGNVS es ergo vehi nostra Venerabilis ODE,
MANA fama Viro huic inclyta, yua mane.
Claudam oden voto: Grafenriedi, viue Galeni
Lultra senex, à te cætera nãmque petes.

Ereosichon per phalacin.

est IesVs MeDICVs IVVans probat Vs
ægrils Vera panax, & Vnlsânans.

Observantiz E.F.

L. M. Q.

Hen. Ernius H.F. Tigur.
Ecclesiæ Capellanæ D.

CLARISSIMO Dⁿ. DOCTORI CHABRAEO.
 MEDICO PERITISSIMO, HISTORIÆ PLANTARVM
 instauratori diligentissimo.



R T I S Apollinez quamuis cernantur in arte,
 Censores multi, Medicas qui spernere Musas
 Coniitit tenrant, illas & dente maligno
 Rodere non cessant: Medici non tollere possunt
 Nodosos morbos, dicentes, & mala tristis
 Dura lepre, tum vastantis contagia pestis:
 Insuper in campis crescit non herbula contra

Vim mortis rigidæ. Tua sed mens dedita Phæbo,
 Scommata committit furiosis flaribus ista.
 Nam sapiens clarum parcat contemnere Phæbum.
 Hinc bene, gentis Apollinez Propagator & Auctor,
 Herbarum virtutes, radiceque potentes,
 Et folia, & flores, caules, & semina, fructus
 Diuersos, pisces varios, mineralia plura,
 Narcissos, ceras flauas imitantia pruna,
 Ac pyra cum cerasis, Thisbæi mora cruoris,
 Castaneæque, nuces. & mespila, dulcia poma,
 Tum dulces Bacchi succos, ratione propomis.
 Hic liber iste tuus se nobilitate tuetur:
 Nam sensus dubios, pugnantiâ scripta virotum
 Doctrinâ Medicâ clarorum, soluere præsstat.
 Succurrit sanis, illis bona seculi præbet,
 Omnibus inferui: e solet mortalibus ægris
 Nam morbus cerebrum magnus si corripit ipsam,
 Actio si cordis vitalis læsa veneno,
 Actio si jecoris turbatur bile funestâ,
 Actio si stomachi læsa est, si tussis acerbat
 Pulmones molles, renes quando dolor viger,
 Si lacerat dentes, oculos, & membra fatigat.
 Tum truculenta rabes corpus eum conficit omne,
 Si rabie canis, & si læsit aranea valde,
 Si nocuit serpens, si vipera dente momordit,
 Tunc adfert Medicas herbas, & vincere morbos,
 Corporis ac vires directas reddere, tentat.
 Singula quis numeret: restant perplura canendi,
 Sed, peto, cognoscas animo mea scripta benigno,
 Nestoris ac superes Musis comitantibus annos.

Observantiæ & amicitie E. F. L. M. Q.
 Fridericus Striberus Medicinæ Doctor.



SERENISSIMO
PRINCIPI AC DOMINO,
DOMINO

HENRICO D'ORLEANS

LONGOVILLÆ NEC NON ESTOVTEVILLÆ DVCI:
GALLIÆ PARI:

Nouicastro & Vallangini SVPREMO PRINCIPI:

COMITI in Dunois, S. Paul, Chaumont, Gournay, & Tancarville:

DYNASTÆ in Colummiers en Brie:

BARONI in Vouant, Veruant, Montreuilbellay, Humbic, Bricquebec &c.

Nortmanniæ CONNESTABILI HÆREDITARIO:

Ejusdémque Prouinciæ, Christianissimæ Majestatis nomine ADMINISTRATORI & PROREGI:

Regiorúmque Galliæ Ordinuni EQVITI.



VEM nuper SERENISSIME
PRINCEPS, obuiis exceptit vlnis
Medicorum turba, denuò prodit
Naturæ Genius. Et qui duodecim
antehac promulgatis Libris Arbo-
rum & Fruticum Historiam absol-
uit: totidem jam ad aliorum, non
minùs cognitu necessariorum, gra-

phicam Enarrationem accingitur.

Hic enim Suffrutices: hic Rosæ: hic scandentes Plantæ: hic
Dionysio sacra: hic Legumina: hic Cereales Fruges: hic Gra-
mina: hic Iunci: hic Arundines: hic Florès hortorum decus: hic
Rapunculi & Campanulæ: hic Nasturtia: hic Culinariæ her-
bæ: hic Mollientes & Oleraceæ: hic Lactucæ & reliquæ Pappo-
sæ recensentur, delineantur, pinguntur.

Hic tandem Veterum & Recentiorum circa eas Placita
obscura reteguntur, alia illustrantur, Nodi soluuntur, Dissi-
dia componuntur, notantur Lapsus.

Nec deerit in quo miretur Mundus se tot cęcutiuisse sęculis: atque adeò Poëtę factus sit locus Epiphonemati

Lucretius
Val. Flaccus. *O miseræ hominum mentes, ô pectora cęca!*
Qualibus in tenebris vita, quantisq; periculis
Degitur hoc cui quodcumque est?

Et ut EN ΟΛΙΓΟΙΣ ΠΟΛΛΑ, hic non Aęgypti ΑΒΑΣΕΙΣ, sed bifera Alcinoi Viridaria: Horti Adonidis: Insula Tilos, palmarum, vinearum & margaritarum ferax: atque quicquid in physicarum rerum adytis & penetralibus aperiendis potuerunt celeberrimorum Philosophorum ac Medicorum solertia, sedulitas, & candor.

Prodit igitur alius nostri ΙΟΗ. ΒΑΥΗΝΙ foetus: nec redimere volentibus longiores trahere datum moras. Diphilo in suis producendis sint alii tardiores: Aęstę expectent alii Lunam: Nobis humano generi prodesse animus.

Qui autem Primogenito Prępotentes inuenimus Patronos, à quibus scilicet inter alia & Cunas habuerat: Eandem & huic optamus sortem, sub cuius auspiciis cum nomine & splendore publici fiat juris. Minimè enim nos latet quibus hæc sine ridica vitis & Coeli & animalium exponatur iniuriis: Quàm fastidiosa sit hujus æui peruersitas: Quàm magnus sit labor cani lectum sternere: Quàm crescere aliquid ægrè ferat Inuidia: Quàm graues sint Zoilorum morsus: Præsertim verò quam aduersus ejusmodi malè feriatos homines præstet tutelam Principum virorum patrocinium.

Nec diu deliberandum fuit, PRINCEPS SERENISSIME, cujas clientelæ hoc committeretur OPVS. Ad te enim trahebant ejus cum tuis harum regionum amplis Ditio- nibus loci natalitij vicinitas, ac SERENISSIMAE CELSITVDINIS TVAE erga omnes humanitas, in literas & literatos pronus animus: maximè verò innatum GRAFFENRIEDANI GENERIS illi quam facimus parti de SVPREMIS Nouicastroensium DYNASTIS bene merendi studium. Cujus sicut & foelicia & grata ab Auo & à Parente piæ memoriæ e- dita fuere specimina; sic & NOBIS in eadem humili deuotione pergendi animus, & ejusdem spes gratiæ quæ à CEL-
SIS-

SISSIMIS PRINCIPIBUS Majorum nostrorum accessit
rebus.

Eqquem porrò Noftris hifce & incomparabilis illius BAV-
HINI lucubrationibus præcellentiorem fautorem · Mæcena-
témve præfeciffemus, quàm Principem cujus Stemma vene-
ratur Gallia : cujus in Rempublicam Christianam merita cele-
brat Orbis: Principem pace bellóque, fago togáque, Arte &
Marte, apud omnes Gentes celeberrimum. Principem præpo-
tentem, clementiffimum, munificentiffimum. Principem cui
labor in negotiis, fortitudo in periculis, industria in agendo, ce-
leritas in conficiendo, & confilium in prouidendo, tanta in vno
funt, quanta in multis aliis etiã in fignibus vix reperiantur.
Principem quem numerosiffimos exercitus cum fuffimo impe-
rio foeliciffimè ducentem vidit Germania, vidit Italia, viderunt
Iberia, Burgundia, & Lotharingia, femper & vbique vincentē.
Principem Monafterienfis PACIS inter CAESAREAM,
CHRISTIANIFFIMAM, & SVECICAM MAIEST.
aliásque nonnullas Europæi Orbis primarias POTESTA-
TES, nuper in ita præcipuum ARBITRVM. Atque adeò
Principem quem meritò dixeris omnibus reddidiffe omnia,
fingula fingulis: prostratosque reftituffe Magiftratus & ficcas
effeciffeficas. Principem tandem, vt in his encomiorum fuffiti-
bus parci fimus, quem vnum rerum Natura videtur edidiffe, vt
oftenderet quid in fuffima Fortuna fuffima poffet Virtus.

Talem nos eligimus Patronum, PRINCEPS SERE-
NISSIME, Vniuerfalis Plantarum Hiftorię SECVNDAM hanc
PARTEM, quã par eft humili fubmiffione, SERENIFFIMAE
CELSITVDINI TVAE offerentes & confecrantes.

Auiculæ, cùm nihil poffent opulentiùs, plumas ad magni-
ficentiffimum Delphici Apollinis templum vltro feruntur
detuliffe: Apes ceras. Sic nos ad tuas aras quod opis eft noftræ:
nec dedignaberis Munus quod ftudio fuo dignum plurimi cen-
fũere Reges, quodq; Maufoleis prætulit Cariæ regina, quæ poff
tot annorum myriades adhuc per Artemiffiam viuut. GLORIAM
fic TVAM tradent Poffteris, & in huius Vniuerfi extremis claratam
conferuabunt, omnia ea quæ in hominis & pecudum efcam, in

aruo-

aruorum & hortorum decus cedunt, quibus hic, quanta quanta nostra sunt, eminentissimo LONGOVILLAEI NOMINI litamus.

Superest, PRINCEPS SERENISSIME, ut obsequij hoc anathema, humillimæ obseruantix monumentum, et quaecunq; beneficiorum redhostimentum, quod Sacratio tuo appendere annitimur, quo soles omnia, benigno & sereno suscipias vultu. Superest tandem, ut ab illustrissimo & Splendidissimo Nomine Tuo huic abiturienti tuarum laudum Preconi nitorem & commendationem accedere lubens patiari: nosque tibi in omnem seruitutem deditissimos semper in posterum studio & fauore tuo prosequi digneris.

Sic, ô Nate in exemplum virorum Principum, Nestoreos quam foelicissimè viue annos. Sic impleat lehoua petitiones tuas. In his desinunt votis

PRINCEPS SERENISSIME,

SERENISSIMÆ TVÆ CELSITVDINIS

Cientes Humillimi,

FRANCISCVS LVDOVICVS à GRAFFENRIED
D. in Gertzenzee, Ebrodunensis Bernensium Ditionis pro tempore Praefectus:

&

DOMINICVS CHABRÆVS M. D.
Illustriss. Celsit. Vvirtemb. à Consiliis Medicis,
Vrbisq; Ebrodunensis Medicus ordinariuꝝ.

Ebroduni Heluetiorum Calendis Iun.
Anno salutis M. DC. LI.



HISTORIÆ

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XIII.

699

FRVTICES ET SVFRVTICES FLORE ROSEO HISQVE AFFINES.

PROXIMUM nunc locum dabimus iis fruticibus ac suffruticibus, quos roseo quodam flore, veluti ornamento præcipuo naturæ donavit: contentioni fortè sit locus, si separaremus, quæ simul ad umbros & amicicia illa quasi ressera ab eadem sunt unitæ.

DE CISTO VETERVM SENTENTIÆ.

C A P. I.

Theophr.

Error mul-
torum.

Cisti duo
genera.

Flor.

Cistum mas-
culum & fœmina.

Diosc.
Cistharat
& Cistha-
ros.



VNT, autore Theophrasto, eorum [quibus aculeus des-
est] genera complura, sum-
misque differentis discretæ,
ut *mas* [Gaza, *mas* Hederæ
verit, ut in Theophr. legitur,
quem Plinius, Ruellius & olim
etiam Clusius sequutus est, sed
malè: legendum enim *mas*, Ci-
sti, ut post etiam Clusius] cuius duo genera traduntur,
mas & fœmina. Quoniam altera majus, durius, pin-
giusque folium [vix videtur in quibusdam Theophr. e-
ditiõibus malè desideratur] habeat, florémque ad purpu-
ram inclinatam: ambabus tamen flores Rosi [in Al-
dino codice malè omittitur vox *pluribus*] sylvestribus proxi-
mi, verùm minores & fine odore.

Plinius non animadvertens distinctionem inter
mas & *mas*, Theophr inemendatam lectionem se-
quitur, ita scribens: Hederæ [legendum Cisti] duo ge-
nera prima, mas & fœmina: major traditur mas, cor-
pore & folio duriore etiam ac pinguiore & flore ad
purpuram accedente. Vtriusque autem flos similis
Rosæ sylvestri, nisi quoddam crearet odore. Utuntur [ad
coronas] & Hederæ [leg. Cisti] flore purpureo. Est & in
alio genere, earum sylvestribus Rosi similis. Et in iis
quoque color tantum delectat, odor autem abest.
Græci vicino vocabulo Cisthon appellant fruticem
majorem Thymo, foliis Ocèni. Duo ejus genera.
Flos masculo rosaceus fœmine albus. Plinium autem
de Dioscoridis Cisto dicere, ambiguum non est, teste
Cornario, etiam si ex toto non omnia ita respon-
deant, & hoc sanè loco Hederæ nomen [Cistum] Cisto
vicinum dicit. Theophrasti porò Græcum exemplar
multis hircæ faculis mendosum fuisse testatur Clusius
& alij. *mas* igitur pro *mas*, locis citatis apud Plini-
um legendum esse constat. Cistus [zissos] quem ali-
qui Cisthaton aut Cistaron [zissos] vocant, frutex est iuxta
Dioscoridem in petrosi locis nas-
cens, multis ramis præditus, foliosus, non altus, folia

habens rotunda, acerba, hirsuta: flores velut Mali
punicæ [punicæ] sed in fœmina albi.

Alit quòd Plinius rectiùs, quàm Dioscorides, ma-
rem descripserit, rosam florem habere dicens, res
ipsa, inquit Marantha, ostendit: nam sive hanc floribus
similitudinem ad colorem referat Dioscorides, sive
ad figuram (quamvis ad figuram potius referre vi-
deatur, quod ostendit ex hoc, quod de fœmina sub-
dit, ei florem albescere) minus apta comparatio est.
Etenim Punicorum floribus phœnicæ color in-
est, quem vix in alio reperias, si Theophrasto credi-
mus, lib. c. 21. quanquam hoc de arboribus folis in-
telligere voluisse credendum sit. Est & alterum, per-
git Dioscorides, Cisti genus, quod ab aliquibus Ledon
appellatur. Ex his itaque constat Cisti duo pri-
ma genera facere Veteres, *mas* & fœminam: Dio-
scoridem verò tertium addere, Ledon dictum. Ve-
rum de hoc & alio nos plura trademus, sed potissi-
mum de iis, quorum icones exhibemus.

Frutex *zissos*, *zissos* aut *zissos* Græcis dictus, Lati-
nis ut Scribon. Largo, quoque Cistus appellatur, & lingua.
Rosa silvatica, seu canina. Arab. *Kamer*. *Althou* sive
Lhâie althou, inquit Matth. Germ. Cistensdün. Gall.
Rose canine. Ital. *Cisto*. Cast. & Cat. *Estepa*. Portug.
Cergacos. *Cergacos*. Angl. *Lissus* / *Cistibus* / *edex* / *Cist*
sage / *With sage*.

Cistus, inquit Dioscorides, vim habet adstringen-
tem, unde flores triti in vino austero, bis in die poti,
dysentericis commodant: ipsi verò per se illi, si non
depascentes cohibent. Cum cerato verò, ambulta &
vetera ulcera sanant.

Hæc paulò aliter ita Plinius. Cisti genera ambo
profunt dysentericis & solutionibus ventris, in vino
austero ternis digitis flore capto, & similiter bis die
poto. Ulceribus veteribus & ambultis cum cera: &
per se oris ulceribus.

Cisthus aut Cisthanus, autore Galeno frutex est
gustu adstringens, omnibùsque particulatim operi-
bus. Atta nent folia & parva germina trita aded de-

Marantha
Diosc.

Cistria
genera
Diosc.

Nomina
& lingua.

Pires
Dysenteria
Nomen
Ambulla
Ulcer.

Solutio
Genera.

HISTORIAE PLANTARVM

2

ficant, adfringuntque, ut [p. 100] ulcera glutinate valent. At flores magis sunt efficaces, aded, ut cum vino poti dysenterias, ventris imbecillitates, fluxusque achumiditates sanent. Cataplasmatis ritu illita ulcerum putredinosa iuvant. Est enim facultas eorum non in strenuè desiccans, serèque secundi excessis à temperatis absoluti. Aded verò frutex hic frigidus est, ut tepidi caloris sit particeps.

Imbecillitates.
Humiditate.

Temperamentum.

CISTVS MAS, MAIOR, FOLIO rotundiore. CAP. II.

Generatua summa.

Mas cur dictus.

Maris speciei quinque.

Cistus mas Bononiensis.

Apulensis.

IN Cisti tractatione Dioscoridis vestigiis insistendum, tria summa genera constituenda, deinde singula in eas species, quas tum nos, tum alij observarunt, dividenda, initium à mare facturis. Marem verò cum Clusio appellamus, qui flore quidem ut reliqua Cisti genera sylvestrem Rosam æmulatur, sed colorem rubrum, nunc saturatiorem, nunc diluatiorem habet: cujus quaque species foliorum forma, aut colore inter se differentes numerantur.



Deser. Clus.

Romali.

Folia.

Flos.

Capitula.

Semen.

An Anguil.

Esja marina.

na.

Matth. notatur.

Turn. la.

p. 100.

Synon.

Clusius sic de scribit: Humanà altitudine plerumque atollitur, ut reliqui Cisti, fruticosus: ramulis aliquantulum incanis: folia reliquis majora & quasi orbiculata, hirsuta nonnihil & rugosa: flos reliquis forma similis paulò major & colore saturatiùs rubente: capitula hirsuta, dura, pentagona, dicendis majora, in quibus semen rufum, majus, quam aliorum continetur.

An Anguil Cistus mas, Rosa marina & Rosole in Lanzana quam ait Hypocistidem & Ladanum ferre? An Cordo in sylv. Obs. Cistus frutex ex folio oblongo & tamen subrotundo Salviæ aliquo modo simili, maiori, hirsuto cavoque, semine in pericarpis miruto, Papaveri simili?

Matthiolus olim Cistum marem pinxit folio admodum rotundo, & floribus integris, Campanulam exprimentibus (quum tamen Rosarum instar folia separata habeat) qualem plantam nunquam vidimus, eam igitur iconem in post. commen. meritò, ut falsam rejecit, in com. Lat. & Ital. com. mag. fig. & in hist. Germ. aliam reponens meliorem.

Turnerus malam Matthioli figuram habet nomine Cisti maris, quem dicit se vidisse in Italia. Dodonæi Cistum existimalem lib. de flor. cap. 29. nisi aliò videretur reduci similis figura à Clusio: uniceam enim Cisti figuram ponit, relicta priore, quæ Cisti formæ erat, ut arbitror.

Lacuna dicitur Cistus Mas Matthioli. Cistus masculus Lonic. Clus. Hist. & Hist. Cistus quartus

mas sine figura. Lob. Obs. Cistus mas quartus Clusij.


Hist. Lugd. præter meliorem figuram Cisti maris Matthioli, habet etiam duas priores falsas sub his titulis: Cistus mas folio rotundiore Matthioli, & Cistus cum Hypocistide Matthioli. Ponit præterea descriptionem ex Clusio Cisti quarti.

Camer. in Matth. Hist. germ. ponit figuram cui inscriptio, Cistus femina cum Hypocistide. Eandem etiam ponit in ejusdem Epit. sub hoc titulo Hypocistis. Videtur autem mihi facta eius icon ad ramum quendam à me Bononiæ collectum anno 1563. & Gesnero missum. Erat tamen sine Hypocistide, & sine floribus. Gesnerus autem ad meam plantam quam adhuc habeo, annotarat, esse Ladanum foliis rotundis, Hypocistidem Matthioli.

C. Bauh. apud Matth. exhibet pro Cisto mare, si C. Bauh. figuram malam. Est enim eadem cum priore falsa Hist. Lugdunensis. Falsam autem eam esse ipsemet fateatur, ita enim scribit: Matthiolus in suis editionibus diversas proponit icones: inter magnas enim figuras habet Cistum, cuius folia ex rotunditate oblonga sunt: inter minores verò eam proponit foliis rotundis, proculdubio imitari volens Dioscoridis descriptionem, qui talia in Cisto requirit folia. Cum verò talibus foliis marem hæcenus non viderimus, sed oblongis, adposuimus figuram talem sub Hypocistide. Ait præterea C. Bauh. in animadv. in Hist. Lug. Historiæ Cistum marem Matthioli, & Cistum marem primum Clusij: esse duas figuras unius Cisti. Sed & hoc imaginarium. Sunt enim diuersarum plantarum figuræ, ut notum est utramque noscensibus. Est Cistus mas 1. Clusij, Cistus mas Monspeliensis, folio oblongo albo. Sed cur hoc loco tam sicco pede transit impudentissimum illud Matthioli figmentum, Cistum marem folio rotundiore cum Campanæ effigie floribus, ex mera descriptione excogitatis (nihil enim tale unquam visum in natura) quem bis depingit, non sine sæda, ambitionisque plena impostura. C. Bauh. pin. Cistus mas 1. sive folio rotundo hirsutissimo.

Clusij Cistus quartus mas invenitur in regno Valentino & Aragonum in Italia etiam frequens est.

CISTVS MAS II. FOLIO longiore.



Adem altitudine, que, quam primus Clusij [Cistus mas Monsp. folio obl. n. g. 1. albo] assurgit, interdum etiam majore, non minus fruticoso stipite, neque minore ramorum frequentia: minus tamen candidat. Folia præterea eodem ordine disposita, molliora, longiora, angustiora, & magis acuminata sunt: Flos superiori similis, incarnatus: capitulis etiam & semine parum differt. Dubium non est, quin

Hypocistis sub hoc genere crescat, nullam tamen observavit Clusius, qui Cistum marem secundum nominat.

Lob. Obs. & Ic. & Ger. Cistus mas angustifolia. Tab. Icon. & Hist. Cistus mas angustifolus. Synonyma cum nominibus ling. cyplicum.

röflein. Lugd. Cistus mas 2. Clusij. C. Bauh. pin. Cistus mas 3. sive angustifolius. Belg. Sijus mannefen met smale blaeders. Angl. The male holly Nose.

Nascitur in Hispania, & diutius reliquis maris generibus floret illius item ramuli teneriores sub Autumno, & rotulentum quiddam pingue & odorum contrahunt.

Locus & tempus


CISTVS MAS III. FOLIIS dilutius virentibus.

PRiori brevior est, non minus tamen fruticosus, sed tenuioribus ramis: folia ejus jam dicto breviora & dilutius virentia, magis rugosa, pinguis, & odorata; flos alius similis, dilute rubens & aliquantulum odoratus, quam notam in reliquis Cisti maris generibus non deprehendit Clusius: hujus capitula superioribus paullo miriora sunt, & suis involucribus, quæ florum calycis sunt, diutius occultantur, semen in capitulis æquale.

Hunc Cistum marem tertium (cujus autor rullam ponti figuram) in Lusitania solum sponte nascentem supra Vlyssiponem in itinere Conimbricensi, atque etiam in maritimis observabat. Nos Patavij vidimus Cistum, quam feminam vocabant, diversam non nihil à Monspeliulana, folio multo majori, rugosiore, densiore, hirsuto, formæ serè ejusdem: ramis nigris, & minimum toto mento, quales etiam sunt Monspeliulana: fortassis id fecit cultura. Si flore fuerit rubente, considerandum, an sit eadem cum Cisto Clusij mare tertio. Lob. Obler. Cistus mas tertius Clusij. C. Bauh. pin. Cistus mas 4. sive folio brevior.

Cistus femina Pat.

CISTVS MAS IV. MONSP. FOLIO oblongo, albido.



Frutex est, quam femina robustior, albidiore, bicubitalis, hirsutus, Clusio autore, humana altitudine, plerumque fruticosus, ligno satis fragili, & candicante cortice toto, frequentibus ramis alternatis semper ex adverso respondentibus. Folia sibi invicem opposita, & teste Clusio, molliora & longiora in novellis plantis, in adultis vero, contra hiora, duriora & aspera, adstringentis gustus: utrinque incana, hirsuta, longiora, quam latiora, infernè rugosa, angustiora, spissioraque, quam femina: non rotunda, ut in Cisto à Matthiolo olim exhibitio. Flos coloris rose incarnate apices luteos in medio contentos ambit, magnus, in folia quinque divisus, ut in Cytiro & Campanula, integer, ut pingebat Matthiolus, deciduus, nec singularis, hinc inde per ramos sparsus, ut ipse icon habebat, sed confertus, agminatim stipatus, numerosior in ramulorum extremis, ex brevibus, robustis pediculis, non debilibus oblongis & singularibus, ut in Cisto femina, quibus decidentibus, succedunt capitula longè etiam majora & duriora, hirsuta, trifariam secta, perennia, foliis tribus mucronatis, hirsuta obsepta; pentagona, ut refert

Lignum. Cortex. Rami. Folia.

Matthiolo notatur. Flos.

Capitula.

Clusius, in quibus exiguum semen, ex rubro nigricans, feminis Hyoscia nit, aut Papaveris magnitudine. Ad huius radices, quæ summis cepitibus diffunduntur & coherent, Hypocistidem ille observavit copiosè nascentem, elegantissimam omnium, quas unquam viderit, primo vere, cùm Clusius jam ad florendum se parat: Etenim quando primum ex terra emergit, nupteum n sive kernesum in fricuum esse dices, deinde paulatim assurgens, & sese explicans, multum de pristini coloris elegantia remittit, cùm in Cytinos suos profert, qui candicantes sunt, turgidique, & lento succo pleni: qui à pericis pharmacopœis in Hypocistidis succum denfatur.

Semen.

Hypocistis.

Clus. Hist. & Hist. post. Cistus mas pri mus, ab Hispanis, ceu & 2. & 3. & quartus Estepa vocatus.

Lob. Adv. Cistus mas. Obf. & Ic. Cistus mas cum Synonyma. Hypocistide. Lusitanis Cergaco, Italici Cisto.

An Rauhvolff. Cistus flore purpureo: An Cæsalp. hunc intelligit his verbis: Alterum genus Cisti, in arenosis maritimis nascitur; folio majusculo & candidiore, flores puniceos fert, latiores: fructum similem, [Cistus femina] sed conceptaculis quatuor distinctum: sub hoc nunquam Hypocistidem repetita fecit: Diof. hunc marem vocat, ut & Plinius flore rosaceo, foliis Osmi.

Castori, Tabern. Eicon. & Hist. Cistus mas latifolius. Cam. apud Matth. Germ. reliqua Matthioli figuram aliam posuit sub titulo Cisti maris. Figura autem ea facta est ad plantam Monspeliulanam, quam Gesnero miseram, quamque adhuc habeo. Eandem figuram ponit etiam in eiusdem Epit. nomine Cisti. An præterea eidem in horto, dicitur Cistus mas:

Hist. Lugdun. Cistus mas primus Clusij. An inadverit & hic C. Bauh. Hist. Lugdun. sem duas figuras ponere, quod est falsum, ut ab solutiore Botanice notum est. Est enim Cistus cum Hypocistide Matthioli à Cisto mare primo Clusij diversissimus, & non alius, quam Cistus mas folio rotundiore Matthioli cum falsis floribus Campanulan exprimentibus. Sed posterior figura Clusij sustinebat, inquit. Vnde miror quo modo vir integer subicere potuerit figuram Matthioli esse falsam, fictam & imaginariam.

Ger. Ang. The male holly Nose with his. C. Bauh. apud Matth. Cistus 3. cui Hypocistis id dicitur, quod ex ipsius Cisti & Ledi radicis medio pullulac. Limodori genus vocat Dodoneus. Reperitur rubra flava, pallida. Eid. in pin. Cistus mas 2. sive folio oblongo incano. Provenit in itinere versis Frontignanum inter faxa, sequeimiliari Gallico à Monspelio, item in monte Setho, florens mense Aprilis & Maio. Clusio frequens est hic Cistus cùm in Hispania, præsertim Bætica, tum Lusitania & Gallia Narbonenli.

C. Bauh.

Locus & tempus.

CISTVS MAS V. FOLIIS CRISPIS & quodammodo sinuosis.

Humilis est, & supinus ut plurimum, pedalis: ramis, aut paulo amplioribus, multis ex eadem radice prodeuntibus: folia crispa sunt & quodammodo sinuosa, candicantia & hirsuta, gustus acerbi & adstringentis: flores ramulorum summitatibus aequali altitudine & quasi umbellatim nascuntur, superioribus paulo miriores, sed elegantis ex rubro purpurascens coloris intensioris, quam in quarto, capitula reliquis miriora, suis involucribus plerumque tecta, semè cõtinet reliquis simile, sed magis atrum.

Deser. Folia.

Flores.

Capitula.

C. Bauh. pin. Cistus mas 3, sive, foliis Chamædryis Cistus mas 3. Clusij, Lob. Ic. & Lug. Cistus mas supinus fimbriatis & sinuatis foliis Lob. Cistus mas 3, Tabern.

Cistum marem quintum Clusius, in Lusitania tantùm nascentem videbat, solo admodum arenofo, nec æquam frequentiore, quam apud Mona-

Locus & tempus.



sterium Petalogas dictum, quinto supra. Vissiponem miliari, femine maturo onustum, in nonnullis plantis, flore etiam Novembrii conspecto. Semen in Belgium reuersus, aliquot amicis communicabat: sed nemini natus est hic frutex, preterquam uni Petro Coudebourgo pharmacopæo doctissimo, quem tamen diu conservare non potuit: nam subsequens hiems satis rigida abstulit. Florent prædicti Cisti

sti mense Aprilis, aliquando etiam maturus, nonnunquam seriùs, pro regionum & locorum natura & temperamento: semen Augusto, Septembri, & Octobri maturefit: Cisti hoc genus peculiariter Lusitanis Rosella vocatur.

Nomina. Ger. Cistus mas dentatus: Belg. Cistus mannes Fen platter æerden ligghende. Angl. Teds hedor snept male Cistua.

CISTVS FOEMINA MONSPELIANA flore albo, & Hispanica luteo. CAP. III.

Cisti feminae varietas.



Cistus femina etiam in suas species distribuenda. Nam aut elatior est, & rectis virgis fruticæ, sicut mas: aut supinus & humi sparsum, ut Erica vulgaris. Deinde utrumque genus, teste Clusio, in colore variat, qui maxima ex parte candidus est, & quandoque luteus. Cistus igitur femina Monspeliana flore albo, & Hispanica luteo, frutex est, cui folia circinata serè rotunditatis

Delc. Folia.

Flores.

Trifer. Clus. in var. Fucum.

Flos.

vix cedunt ejus foliis, quem Bononia supra observasse nos retulimus, magis viridia, molliora & latiora, quam in mare Monspelienis: flores in longis pediculis, ut Rosæ, sed albi, luteos apices in medio coëcent, non miores, quam maris, multò majores, quam Ledis, inodori, gustu grato ut Ledis, qui exsiccati lutei sunt non minus quam maris.

Clusius sic describit: Est Cistus femina, frutex ramosus, cubitum interdum altus, nonnunquam humi stratus: gracilibus, nigricantibusque ramis, folio non mir ore, quam in maris quarto genere, circinate serè rotunditatis, rudi & aspero, vindi tamen: saporis adstringentis & acerbi: Florem habet paulò minore, quam mas, quinti generis flori penè similem, album, nonnunquam etiam flavum, luteis filis, ut in Rosæ sylvestris, medium florem occupan-

tibus: capitula minora sunt, maris capitalis, nigriora, non mucronata, sed nonnihil compressa superiore parte, semen paulò nigrius & satis magnum continentia.

Math. in Diosc. Cistum femina proponit sine descriptione, floribus & fructu, que accedit ad hanc nostram: in post. com. Ital. & hist. Germ. addidit flores, qui an benè appicti sint, aliorum esto judiciorum: eam ait vocari à rusticis patavinis Salviam salvaticam. Anguill. Cisto femine, rusticis Salvia filbega vocata, subnasci refert Hypocistidem & Ladanum. Turn. Cistum femina à Matthiolo depictam habet, quam ait se vidisse in Angliam in orto à Sion denominato.

An Bellon. Obs. lib. 1. c. 7. de hac ait: Ladanum non fit in Creta ex Ledo, sed ex Cistu, cujus Cisti species provenit similis in ea parte Gallie, que dicitur Laude d'Osè in Ducatu Mainio, præcipue verò ad Castrum Fouletourte, juxta Soulliere.

Cord. Hist. Lob. Camer. hort. & Cast. dicitur Cistus femina. Dodon. in fol. Cistum femina videtur appellare, eadem repetens, que in flor. hist. dixerat: in hist. Gall. pingit pro Cisto non Ladanifera, ubi marem & femina colore florum tantùm distinguit. Clus. Hispan. & post. Hist. ait Cistum femina Hispania Xara-eltea: & à Narbonensibus Gallie incolis, qui circa Monspelium vicinisque locis habitant, Mouges vernacula lingua dici. Raulvolf. est Cistus flore albo: Casalp. Cistus flore candido, alicubi Hypocistidem gignens, & Cistus femina Dioscoridis.

Camer. apud Matth. Germ. & Epit. mutavit figuram, aliamque reposuit, quam Gesnerus curarat pingendam ad ramum Monspelij collectum, quem ei miseram, quemque adhuc habeo: in qua figura pili non placent. Lugd. cum Tabern. et hunc imitato Gerardo, pro Cisto femina, præter bonam Clusij figuram, si ultra ponunt Matthioli malam. Ethanc quoque C. Bauh. apud Matth. exhibet pro Cisto femina. Ipse tamen non veritus fuit Lugdunen semide carpere. Cistus femina Matthioli (inquit in suis animadv. in Lugd.) & Cistus femina Clusij: posterior figura servanda erat. Ergo altera rejicienda. Sed quare: cur silentio involuit? quia patrocinium ejus assumpsit. Eid. pin. Cistus femina, sive folio Salvia: Cistus femina, Gesn. hort. Lac. Est elatior & rectis virgis: est & supirus humi sparsum: in utroque: flos candidus, quandoque tamen luteus.

Florentem vidimus Aprilis & Maio in sylva Agremont propè Monspelium & in monte Sethi, in Italia juxta Florentiam: in Sabaudia peres Rodanum. Patavij observatur in montibus Euganeis inter Balneum Aponense & Arqua, ibi aiunt nasci Hypocistium. Bononia spontè à Florentia al jugo florebat Aprilis. Ejus qui albo est flore, cum recti, tum supini magna est copia in Hispaniis, Lusitania, Gallia, Narbonensi & Aquitanica: qui verò luteum profert, nonnullis duntaxat Hispanie locis, & extrema Aquitania Car tabris finitima circa Bayonam se vidisse meminit Clusius.

CISTI SPECIES QUÆDAM HISPANICA flore albo.

Liquot præterea Cisti genera observantur, quæ ad femina veluti ad primarium genus, Clusij judicio, potius referenda, quam ad marem, aut Ledon: quæ quidem nullo pingui, lentoque liquore sunt obstita, & cæcescunt, sive purpureum florem habent. Lugdeni demonstrabat nobis Barocuidam Geimar us ex Hispaniis reuersus Cistum aliam quandam speciem, fruticem, ut ex plantæ portione conji-

Capitula. Cistis nonnib. Mattheo. tatur. S. Xara-eltea. Salvia filbega. Cista. Hypocistis Ladanum.

Ladanum.

Cistus non Ladanifera.

Xara-eltea. pa.

Hypocistis.

Error plurimum.

C. Bauh.

Lacus et temp. 100.

Hypocistis.

Flore luteo.

Cisti species nonn.

Folia.



Flor.

mucronati, lanugine alba, densaque hirsuti ambiebant totos. An à quoquam sit descripta hæc planta, non potuimus animadvertere.

conjicere licebat, parvum, foliis multis stipatum, non parùm minoribus, quàm in Cisto femina Monspelienfium, oblongis, hirsutis, minus rugosis, gustu adstringentibus. Flores non singuli ex ramulis, sed plures simul, ut in Ledo Monspelienfium, pediculis satis longis, hirsutis, incanis infidebant, albidis, Ledo Monspelienfium floribus penè similes, quos nondum explicatos alabastriculi

CISTVS FOLIO HALIMI
flore luteo.

Dis.



Cistus folio Halimi prior (sic etenim appelladus videtur, inquit Clusius, propter foliorum similitudinem) cubitales aut ampliores profert ramos, graciles, satis fruticosos, in quibus folia Portulacæ marinae similia, sed omninò incana, ut Halimi, mucrone obtusiore, subacidi & adstringentis gustus: summis ramis multi inhaerent flores, quinque foliis constantes flavi coloris: minores, quàm in superioribus, illi

Cisti generi, quod nonnulli Helianthemum vocant, similes, suas fibras in medio continentes: his succedunt longiuscula & triangula capitula, exiguum subrufum semen continenta. Ad hujus radicem Hypocistis nascentem observaham luteam omninò, sive ochrae colore, ipsius plantæ florem colore referentem, quam pueros & pastores manducare intellexi.

Capitula.

Hypocistis.

Locus.

Synon.

Cistus hic frequens est in Lusitania solo arenoso, & aura marina afflato, inter Ericas, non procul Olyssipone, nec usquam alibi Clusio conspectus. Lobel. Observ. & Icon. plant. Cistus femina folio Portulacæ marinae, Cistus primus folio Halimi Clusij. Tabern. Icon. & Hist. Cistus folio Halimi [primus Clusij, addit Hist. Lugd.] sicut & Ger. qui Angl. Cistus with leanes life sca purstane vocat. Belg. Cistus wyssfen met de bladers van zec Porceleeyne.

CISTVS FOLIO HALIMI LONGIORE INCANO.



Cistus folio Halimi alter Clusij. Hisp. & post. his. proterior est precedente, ramis firmitioribus, incanis ut præcedens: Folia etiam habet Halimi, paulò tamen longiora, angustiora, magis mucronata, & dorso clatiore, incana tamen rota & sicca, subacidi etiam & adstringentis saporis. Illius neque florem, neque semen visum. Provenit ubi præcedens.

Lobel. Obser. & Synon. Icon. plant. & Lugd.

Cistus folio Halimi secundus Clusij: Tabern. Icon. & Hist. Cistus folio Halimi secundus. Gerard. Cistus folio Lavendulae, Angl. Lavander leafed Cistus. Belg. Cistus mer bladers van Lavender.

CISTVS FOLIO LAVENDULÆ
Clusio, sortè idem cum Helianthemum recto.



Cistus folio Lavendulae (eundem vel similem fruticem denominavimus Helianthemum sive Helianthemum rectum, repertum à socio nostro) plerumque cubitali est altitudine, admodum ramosus, sed brevibus ramis & foliis confertim nascentibus, angustis, incanis, sapore adstringente: flores parvi, non multum à superiore differentes, albo colore: semen non observavit Clusius. Est hic frutex ad eam Lavendulae similis, ut nisi odor & sapor prohiberent, pro Lavendula sumi posset, & certè quas plantas sine flore primùm conspexit, pro Lavendula habuit, ideo quæ negligebat, donec floribus, quos in plantis aliis conspicebat, admonitus, diligentius observaret.

Solummodò Valentino regno invenit aridis & petrosis locis, quarto à Valentia miliari, mensis Aprilis initio. Repertus à socio fidelissimo Domino Leonhardo Rauyvolff. in provincia montibus, qui unicanlis erat, rectus, cubitalis: flores in eacumine similes forma Helianthemum lutei & vulgaris coloris: folia autem per caulem multa, longa, similia foliis Lavendulae. Florebat autem mense Maio.

Lobel. Obs. & Icon. plant. Cistus folio Lavendulae Clusij & Valerandi. Tabern. Icon. & Hist. Cistus Ci

Gen. Köflein / eajus titulus hic simplex non placet. Lugd. Cistus Lavendulae folio Clusij. Gerard. Cistus mas tenuifolius. Ang. Thin leafed Cistus. Belg. Cistus met bladers van Lavender.

CISTVS FOLIO SAMPVCI CLVS. cui macula in flore.

Def. R. m.



Epist.

Flor.

Capitula

Flor.

Yuss.

Tabern no. 1000.

Cistus, inquit Clusius Hisp. & Hist. post. folio Sampuci, planta fruticosa est, ramosos graciles ramulos proferens, in quibus folia parva, quasi circinata, incana, Sampucho similia, paulo minora, & dorso eminente, contrariis inter se pediculis, ut in ceteris Cisti generibus, nascuntur, & adstrictionem habentem quadam aciditate & sulfidine conjunctam. Flos in summis ramis copiosus, quinque albis foliis consistit, quorum medullium macula ex purpura nigricans inficit, villis & itaminibus luteis, medullam florem occupantibus. Capitula deinde Lini ferè exigua, trigona, in quibus semen minutum Hyosciamini, ex nigro candicans, sive cinereum continetur: totus verò oblongus ille ramulus, qui florem & capitula sustinet, semine maturo arcescit, ut in singulis Cisti generibus.

Primum hic inventus in Castellae veteri, supra S. Martin del Castañal: deinde copiosus in castellana nova, circa Carraicejo, & toto Bætico agro inter Tagum & Anam flumina.

Hispani Quiruela aut Quirivela appellant, communi sermè cum n. Ericae minoris vulgarioris vocabulo, quia fortassis inter Ericas numerant.

Lobelio, qui in scribit in Obs. & Ico. pl. Cistum folio Sampuci Clusij, videtur eadem, quae Helianthes Allobrogum & Gallorum Delphinatis flore albo. Clusij autem figuram habet, verum Cistus Clusij maculas habet ex purpura nigricantes, ergo diversa. Hist. Lugd. Cistus folio Sampuci Clusij.

Tabern. Icon. & Hist. Sonnenblum / Helianthemum Sabaudicum vocat, & tamen sibi ait incognitum. Quare non placet nonnihil mutata figura & titulus in planta incognita. Gerard. Helianthemum Sabaudicum: Ang. the darste Cistus of Savoie. Belg. Cistus met bladers van Mariolene / ende schynt te wesen Helianthon van Savoye / ende Deifine / met witte bloemen.

CISTVS FOLIO THYMI CLVSII, cum maculis in flore.

Def. R. m.

Flor.

Flor.

Cistus folio Thymi, ut annotat Clusius sæpè dicto loco, pedali fruticat altitudine, ramulis ex purpura nigricantibus, duris, lignosis, qui magna ex parte sine foliis conspiciuntur, præterquam circa eorum summities, in quibus confertim nascuntur, etiam admodum, viridia, Thymi æmula, gustu adstringente. Florem fert summis ramis, Cisto folio Sampuci similem, minore, neque maculis insignitum. Semen non observavit.



Solidum autem est conspectus in extrema Bræce parte, qua Castellam & Lusitaniam spectat.

Lobel. Obser. & Icon. Lugd. Cistus folio Thymi Clusij. Tabern. Icon. & Hist. sicut & Gerardo Cistus folio Thymi.

Angl. Cistus with the leaves of Thyme. Belg. Cistus met de bladers van Thymmea. Hispan. Perdugeta.

Synon.

DE LEDO ET LADANO. CAP. IV.

EST alterum Cisti genus, inquit Dioscorides, Equod ab aliquibus Ledon appellatur, frutex simili modo, ut Cistus, nascens, sed longiora & nigriora folia habet, quæ in vere pinguedines quadam contrahunt. Hujus foliorum vis adstringens est, faciens ad quæ etiam Cistus. Fit autem ex ipso id, quod Ladarum appellatur. Nam capræ & hirci, folia ipsius depascentes, pinguedinem palam barbibus excipiunt, quæ etiam in se notibus adhæret, eoque quod sit viscosa: hanc oblatam excolant, & in massas effornatam reponunt. Quidam etiam stuniculos per frutices trahunt & adhæret tem ipsi pinguedinem ite derasam, effornant. Optimum est Ladarum, quod odoratum est, subviride, facile mollescens, pingue, non partem æreæ, nec friabile, sed resinosum. Tale autem est id quod in Cypro nascitur. Nam & Arabicum & Libycum vilius est.

Ledon. Dio.

Foliorum Sa.

Dele. Dio.

Lad. arab. d. Cypr. Arabicum. Libycum.

Arabia etiam cum Ladano gloriatur, ut habetur apud Plinium: forte casu hoc, & in iuria fieri odoris, plures tradidit. Capras maleficum aliis frondibus animal, odoratorum verò fructum appetentius, tanquam intelligant præcia, carpere geminum caules prædulci liquore turgentis, distillantemque ab his casu mixturæ succum improbo barbarum villo abstergere. Hunc glomerari pulvere, incoqui sole. Et idem in Ladano caprarum pilos esse. Sed hoc non alibi fieri, quàm in Nabathæis, qui sunt ex Arabia contermini Syriæ. Recentiores ex Autoribus Strobilum hoc vocant, traduntque silvas Arabum pastui caprarum infringi, atque ita succum villis inhaerescere: verum autem Ladarum Cypri insula esse: ut obiter quoque genera odorum dicatur, quamvis non terrarum ordinem. Similiter hoc & ibi sic tradunt, & esse Ocyrum hircorum barbibus genibus: ut villosis inhaerens, sed Ederæ [Cisti debet scribere] flore deroso, pastibus matutinis, cum est rotulenta Cypros. Deinde nebula Sole discussa, pulverem madentibus villis adhærescere, atque ita Ladarum depedit. Sunt qui herbam in Cypro, ex qua id fiat, Ledam appellant: etenim illi Ledanum vocant. Hujus pingue insidit: itaque attractis stuniculis herbam eam convolvit, atque ita offas ferit. Ergo in utraque gente bina genera, terrarum & fructuum. Id, quod terrenum, est friabile: fructuum, lenum. Necnon & fructum esse dicunt in Carmania, & super Ægyptum per Ptolonizos translatis plantis: aut ut alij generante per generari & id in insula, ut Thym.

Dele. Dio.

Lad. arab. d. Cypr. Arabicum. Libycum.

Strobil.

Plinij loco rescriptus

Leda herba. Ledanum.

Ledani duo genera.

In Carmania ex summa per dery piam.

ut Thuris arborem. Dal. generatibz & ibidem cum Thuris arb. vrbibus Sicid Thuris arbore: colligit; ut gummi; in-
Cohigendi cisco cortice, & capris pellicibus excipit. Precia sunt
ratis. laudatissimo in libra asses xl. *xxx. alii. z.* Adulteratur
Adulte Myrti bacis, & aliis animalium fordidibus. Synceri
vium. odor debet esse ferus, & quodammodo soliditatem
 redolens: ipsum vitu aridum, ta tu statim mollesce-
 re, accensus fulgere, odore jucundo gratum. Myr-
 tata deprehenduntur, et petant que in igne. Præter-
 ea à syncero calculi potius è rupibus inhaerent,
 quam pulvis. Et Ladanum (inquit alibi Plin.) fititur
Ladon. se- alvus, utroque, quod in segetibus nascitur, contuso
getium. & cribrato: bibitur ex aqua mulsa: item nobili è vi-
 no. Lada appellatur herba, ex qua Ladanum fit in
Ladaber- Cypro, barbis caprarum adherens, nobiliss in
ba. Arabia. Fit jam & in Syria, atque Africa, quod To-
Toxicou. xicon vocant. Nervos enim in arcu circumdatos
 lanis trahunt, adhærescente rosida lanugine. Hoc
Delectus. gravissimum odore est, durissimumque tactu. Pluri-
 mum enim terete colligit, cum probeur maximè pu-
 rum, odoratum, molle, viride, resinofum.
Ladanum Ladanum Officinarum laudabile, viscidum est
reccitio- succus, in magnas offas coactus, easque graves, ex
rum & of- purpura fuscis, odore valido, sed suavi, præsertim si
ficinarum. calorem senserit, cuius etiam beneficio mollescit,
 veluti & mansum, sapore imprimens adtingen-
 tem: hoc Ladanum existimamus esse idem, cum ve-
 terum Ladanum. Hujus autem colligendi rationem
Cohigendi miram quandam Bellonius describit, quam ipse in
quidus. Creta observavit: Græci, inquit, colligendo Lada-
 no peculiariter instrumentum parant, vernaculo sermo-
 ne illis Ergastri dictum. Est verò id instrumen-
 tum rastro dentium experti simile: huic affixa sunt
 multæ ligulæ five Zonzæ, corio rudi, nec præparato
 confectæ. Eas leniter adfricant Ladaniferis frutici-
 bus, ut in hæreat liquidus ille humor circa folia, con-
 cretus, qui deinde à ligulis per fumos ardore So-
 lis cultris est abradendus. Itaque Ladanum colligi-
 gendum, inid intolerabilis est labor, cum to-
 tos dies ardentissimo capicula estu in montibus he-
 rere necesse sit: neque facile quisquam alius ad id
 colligendum operam sumit præter Calohieros, hoc
 est, Monachos Græcos. Nufquam autem majore cop-
 ia per totam insulam cogitur, quam ad montis Ida
 radices, pago Cigalunus nuncupato, & apud Milo-
 potamo. Hæc tenus Bellonius. Siquis tamen in Hi-
 spaniis hinc colligendo operam navare vellet, mul-
 to minore (ut Clusio videtur) negotio, magnam e-
 jus longè purissimi, resinofis, & odorati copiam col-
 ligere possit, cum integræ aliquando silvæ inven-
 iantur omnium pinguisissimi illius Ledi, quod Ci-
 stus Ledon flore macula nigricante notato inscribitur:
 neque illo ex Africa invecio, magna ex parte
 impuro, opus esset.
 Ladanum, autore Dioscoride, vim habet adstringen-
 gentem, calefacientem, mollientem, aperientem.
 Sistit de fluos capillos, amixtum vino, Myrtiæ, &
 oleo myrteo. Cicatrices decentiores efficit cum vi-
 no illicum. Aurium doloribus, cum aqua mulsa, aut
 rosafacco insulum medetur. Sulfur etiam secundas
 ejicit. Et durities in utero pessis amixtum curat:
 compositionibus item, quæ dolore & tussim, eximunt,
 & malagmatis utiliter ammiscetur. Alvum
 quoque sistit cum vino veteri potum, ciet etiam
 unam.
 Cistus, aut Ladanum in calidioribus regionibus
 proveniens, tamen si haud alius sit genere, quam qui
 apud nos nascitur, inquit Galenus, eximiam tamen
 à regione, ac peculiarem digerentemque calidita-
 tem hæc est: atque utroque à nosrate differt: tum
 quia frigiditate depositum, cum quia calorem assump-
 sit. Itaque cætera quidem hujus Cisthi illis quæ in
 gogstrate videntur, similia sunt. E vero Ladanum, quod

vocant, provenit medicamentum, primo, excessu
 jam quodammodo completè calidum, ut vi & se-
 cundum attingat, habens etiam adstrictionis pau-
 lulum. Ad hæc substantia tenui ac proinde emol-
 liens, sive malacticum moderatè pariterque dige-
 rens, ac videlicet etiam *capillorum* fluxu, hoc est, conco-
 quens. Itaque mirandum non est, si peculiariter ad
 viciã conveniat, quando quidem ad dicta paul-
 lum quidem adstrictionis obinet. Quocirca de-
 fluentes capillos retinet. Nam quicquid, ad radi-
 ces eorum, pravi humoris fuderit, id omne absumit:
 tum meatus quibus infixi sunt contrahit, & con-
 stringit adstrictione. Ceterum, alopecias & ophthal-
 mias sive lippitudines sanare non potest, ut pote
 magis discolorias vires, quam quæ Ladanum insunt,
 poscentes.

Plin. de facultate Ladani sparsim ita scribit. Natura
 ei, molliendi, siccandi, concoquendi, somnum
 alliciendi. Capillum fluentem cohibet, nigritiam in-
 cunctodit: auribus cum hydromelite, aut rosafacco in-
 funditur. Furfures cutis & manantia ulcera sale ad-
 dito sanat. Tussim veterem cum Syracecum sumptam.
 Efficacissimum ad ructus. Cicatrices cum elegantia
 ad colorem reducit: sulfure corrigat vulvas; dolori
 earum exulceratisque imponitur. Denique, si silu-
 le in quacunque parte serpant, Medicorum vitio
 malè factis corporibus, auxilio est Ladanum cum
 castorio. Lad. Cyprum potum interaneorum vitium
 occurrit. Ladanum verò segetum contusum febres
 tertianas leviores facit. Hæc ille, qui confusè satis
 & ignoranter, ut de aliis, indistinctè hic recitata
 collegit.

DE HYPOCISTIDE.
 C A P. V.

CISTI radicibus adnascitur quoddam Mali pu-
 nicæ Cytino simile, quod Hypocistis [Cistis] dicitur
 à nonnullis verò Robethrum [Cistis] Sar. *Hypocistis.*
Robethrum.
Orobethrum.
Cytinus.
 ibi dicitur, Ald. Orobethron, Orobethrum Pal.] aut Cytin-
 us [Cistis] appellatur. Est ex ipso quoddam sul-
 cum, quoddam viride, quoddam album: ex quo
 succus exprimitur, velut ex Acacia. Quidam verò
 resiccatum ipsum & contusum madescunt ac co-
 quant, & reliqua velut in Lycio faciunt, teste Dio-
 scoride. Sub his [Cistis] maximè nascitur Hypo-
 cistis, quam inter Hederas diximus, inquit Plinius:
 Cissos erythranos ab istdem appellatur, similis He-
 deræ. Manifestus hæc sit Plinij lapsus confundentis
 Cistum cum Cisso Hedera, de quo errore plura an-
 te. Quia verò (Cornario) Mali punici flori simili-
 lis est, ided etiam ipsa Hypocistis appellatur Cytin-
 us: Plinius Orobathion habet, sed in manuscripto
 exemplari Oboorothron legitur, omnibus ex æquo
 obscuris appellationibus: idem Malo granato im-
 maturo similem dicit, & sub Cisso nasci, unde ha-
 beat nomen, nostris officinis ut Cistum, ita etiam
 Hypocistis ignota est: Hypocistidis tamen succum
 aliunde importatum habent, & re, & usu omnibus
 notum: an verò genuinus sit, & ex vera Hypocisti-
 de, non temerè ambigi putat Cornarius.
 Hipp. de nat. mul. Hypocistim ex vino bibitam,
 secundas & mensis detrahete posse ait, cui non a-
 sentior hoc medicamentum purgari uterum; sed sus-
 pitor multa confusè scripta per transcriptores.
 Vin enim ut Diosc. prodidit, habet eandem quam
 Acacia, sed magis adstringentem & siccantem, quæ
 facit ad cæliacos, dyntericos, sanguinem per spu-
 tum rejicientes, fluxum muliebrem, sive bibatur, si-
 ve per clysterem infundatur.
 Plinio autore. Cissos erythranos coxendicibus
 utilis est è vino potus; item lumbis, & tantamq; vim

Tempus.
Locus.
Ladanum
infusum
capitulum.
Vires &
usus.
Capilli.
Cicatrices.
Aures.
Secunda.
Uterus.
Tussis.
Alvi fluxus.
Vernacul.
Cistus Ga-
leni.
Tempera-
mentum.

Substantia.
Vfus.
Vterus.
Capillorum
fluxus.
Ophthal-
mias non
sanat.
Somnus.
Furfures.
Tussis.
Cicatrices.
Cistis Erj-
thanos.
Plinius non
tatur.
Orobathion.
Oboorothron.
Hypocistis
officim.
Vires.
Alvi fluxus
Sanguinis
fluxum.
Fluxus
muliebres.
Plinij er-
ror.

HISTORIAE PLANTARVM

accipiunt, ut sanguinem urina detrahant. Plinius cor fundens Hederam cum Cisto malè tribuit Hypocistidi vires ex eo nunc dictas.

Hypocistis.

Hypocistis, quam vocant apud Gal. 7. simpli. multo est magis adstrictoria, quam folia [Cisti.] Admodum efficax remedium ad omnes fluxionum affectus, puta sanguinis rejections, profluvia muliebria, caeliacos, dysentericosque affectus. Quin si quam partem roborare consilium sit, quæ videlicet plusculò humore exoluta fuerit, robur ac firmitatem illi non instrenuè addit. Sic sanè stomachicis Epithematis, hepaticisque commiscetur, & ex viperis confectio Antidoto inditur, nimirum quò corpora consistmet ac roboret.

Roborat.

Hypocistida plantae. Cistus mas. Nonnulli flore rubente carneo.

Caterum Hypocistis in variis provenire plantis creditur, ut in Cisto mare Monspel. flore rubente carneo, uti ex Clusio annotavimus antehac, & ejus descriptionem posuimus.

Calalpinus vocatur.

Calalpinus meminit Cisti puniceo flore, sub qua ait nunquam Hypocistidem repertam se scire: an eundem Cistum intelligat nescimus. Nobis tamen nimirum securè affirmare videtur Hypocistidem non ferre, ille non potuit ubique fuisse. In Gallia Narbonensi quidem nos non observamus in hac planta Hypocistum rubram: Clusius autem observavit & ex eo succum denari ait.

Cistus mas maior folio rotundiore.

Considerandum etiam an Cistus mas major folio rotundiore à nobis dictus, idem sit, cum Cisto mare, quem ait Calalpinus vocari Rosam marinam & ferre Hypocistidem.

Cistus sam. Nonnulli flore albo.

Cistus quidem femina Monspeulana, flore albo, fertur ferre Hypocistidem.

Cistus folio. Prallus flore luteo.

Sub Cisto folio Halimi, flore Luteo, Clusius observavit Hypocistidem.

Cistus Ledum. Ladanifera.

Utrum præterea Cistus Ledum latifolium idem sit cum Cisto mare Anguillari, quod Ladanum in Cypro & Italia profert, & quocidem, quoque perpendendum.

Cistus Ledum. Thymifolius.

Nos in Cisto ladanifera angustifolio Monspeulensi Hypocistidem observavimus, ut suo ostenditur loco.

Cistus Ledum. Thymifolius.

Cistus porò Ledum Thymifolius Clusij, fert ipsomet illo aureo Tubera, quæ Hispanis Turma appellantur, vel potius ut existimat Hypocistis.

HYPOCISTIS OFFICINARVM & ejus substituta.

Deser.

Secum ex Hypocistide excoctum, qualis ad nos addfertur, & à nobis observatur, in orbiculatos pares concretus, splendido nitore Asphalti nigricans, sed consistentia cerea, ductili, mollis: Sapore acidulo cum adstrictione, eo ferè, qui in Myrobalaris Indis observatur, non negaverimus eundem cum veterum Hypocistide.

Vires. Tunc multibris.

Insignis Medicus Frisimelica in suis in Diosc. le Fiorit us meminit, se in calidis fluxionibus, præsertim seminarum, non sine magna utilitate & efficacia Hypocistide usum, ex viro, si nihil veter, propiari. Monet etiam usurpandam Hypocistidem, quæ ad Orientem sit rata. Caterum cum ex Italia non sit difficile succum hunc germanum nancisci, imprudenter faciunt, qui ei succum prunorum silvestrium, præsertim verò in theraea substituant.

Succus prunorum non substituitur. Antheris Hypocistis. Tunc multorum accedens.

Caterum Hypocistim, qua passim utuntur officina, ex hirci barbæ radicibus impostores conficiunt, sive cum inde experimentes, ac ut concreseat, insolantes. Errat diac simul imposturam faciendi causam dederunt Arabes, quòd Cistum Hirci barbæ appellent. Quòd factum, ut ij omnino aberraverint, qui officinis Hypocistidem parant, sibi persuadentes Hirci barbæ, quam Græci ἡραπομύρα vocant, illam esse stirpem, de qua Arabes intelligunt. Quo

errore ducti non modò scipios decipiunt, sed etiam alios, qui passim adulterina Hypocistide utuntur. Potest, si dedit Hypocistis, assumi ejus loco floribus a-gressis Punicea fucis, quippe qui eadem præstet, qua Hypocistis, autore Dioscoride.

Substituta. Cistis. Cistis. Cistis.

CISTVS LEDON LATIORE folio. CAP. VI.

L Edum. latifolium (inquit Clusius, & ex eo Lob. Obs.) superata Calpe, littore marino, qua Malacam iter est, latiore nascitur folio, quasi ad Lauri angustifoliae foliorum formam & amplitudinem accedente: non minus tamen pingui, lentoque illo humore abundat, quam id, quod angustiore est folio. Ladanum latifolium primum, sive Cisti Ledi primi species altera, Hispanis quoque Xara dicitur.

Folium.

CISTVS LEDON FLORE MACVLA nigricante notato.



L Egi genus, cuius exhibitia Icon. Lug. sicum nobis Lugduni demonstrabat Germanus quidam Baro, ex Hispaniis reversus: ex cujus ramo apparerat fructum esse fatis insignem, ramuli rubentes, multis abundabant foliis, sibi invicem, oppositis, palmatis, Ledi Monspeulani multò longioribus, crassioribus, nigrioribus, minus rugosis: Latitudine tamen parè, superè virentibus, inferè incanis, gustu admodum adstringente: in ramulorum extremitate folia longa, cæteris similia, non ita tamen crebra, ut habet icon Lugdunensis, à pictore minus accuratè representata. Nec non flores singul-ros, magni, Rosis silvestribus albis similes, in quorum singulis foliis est macula pulchra, nigra, fatis magna: totius floris medium obtinent oblonga, utrinque hirsuta.

Deser.

Ramus.

Folia.

Flores.

Lugd. non posuit nostram descriptionem, idèd porit florem luteum, nec meminit macule insignis, quæ in Icone apparet. Sed animus est hoc in loco in tegram historiam ex Chisio recensere Cistus Ledon angustifolium omnium vulgatissimum & pinguisimum, per Hispaniam nascens, fruticat ad hominis altitudinem, quam etiam interdum superat, ramis frequentibus, lignosis, duris, nigris: folia, quemadmodum & rami, ex adverso sita sunt, oblonga, transversum digium quandoque lata, nonnunquam etiam latiora, supernè ex viridi nigricantia, inferè candicantia, qua cum tenellis ramulis pingui quodam odorato, calido & transparente liquore adeò copioso aspersa sunt, ut procul etiam ex splendore conspici & agnosci possit, odor autem octava militarij germanici parte nabis percipi. flore luteo est inter reliqua Cisti genera & pulcherrimo & amplexissimo, magna Rosa instar, simplici quinque foliorum textura, omninò interdum albo, sed cujus singula

Lugd. nota.

sur.

Deser. Clar.

su.

Ramus.

Folia.

Liquor.

Odor.

flor.

lingula folia circa unguem ex purpura nigricante macula, rhomboide nunc majore, modo minore, & anguliosiore, ut plerum in infesta sunt, floris u. n. bilico multis croceis fibris pleno, ut in aliis Cisti generibus: Capitula in longis pediculis, foliisque suis denudatis, omnium maxima, rotunda ferè & plana, non mucronata, & sepe unguem decagona, dura, interius flavescencia, quibus dehiscenibus, semen decidit copiosum, subrufum, omnium minutissimum.

Capitula.

Semen.

Duratio.

Locus.

Synon.


Ledum & Ladum.

Tota planta dum resiccata est, quandam candorem contrahit, pinguem attamen illum suum leuorem & suavem odorem non amittit, sed eum retinet ad multos etiam annos.

Crescit multis Hispania & Lusitanis locis frequentissimè, nusquam tamen magis copiosè, quam in collibus declivis inter Tagum & Anon flumina & toto ferè monte Sierra morena nuncupato. Hispani Xara, Lusitani Estepa vocant.

Lobel. Obs. & Gerard. dicitur Cistus Ledon primus. Dodonæus in fol. figuram habet Clusij, & describit sub Cisto Ledo, & *Nidus id. Nidus* ipsum fruticem dicit & Cisti spurium affirmat. Tabern. vocat Ledum Clusij primum. Lugd. Ledi speciem Bauhinij in Gallia Narbonensi. Sed non est Gallia Narbonensis. Figura etiam mala: meliorem habet nomine Cisti ledi 1. Clusij. C. Bauh. pin. Cistus ledon 2. sive Cistus ladanifera Hispanica incana. Belg. *Esse Cistus ledon van Clusius.* Angl. *The surri Cistus bringung.*

CISTVS LEDON, POPVLI NIGRÆ folijs Clusij, major & minor.



Stalones.

Rami. Folia.



Flor.

Capitula.

Semen.

re silem & magis tenaci prægnantes esse visa sunt.

Hujus generis alia species invenitur, per omnia ferè similis, sed humilior, neque cubitum excedens; cujus folia etiam minorata sunt: aliis neque facie, neque flore, neque semine, neque sapore dissimilis.

Minor.

Vtriusque nasci in Mariano monte vulgè Sierra morena) qui superandus est iis, qui Vlyssipone Hæspalim faciunt iter. Invenitur etiam collibus quibusdam Granata vicinis. Primum speciem incolæ Xara-xarguna & Xaron-vocabant. Granatenfes Xara-estepa, eodem, quo Castellani Cistum feminam, nomine. Altera species incolis Xaguarco dicitur.

Locus.

Nomina.

Lobel. Observ. & Ic. cum Lugd. Tabern. (qui non bene capitibus separat.) & Gerard. dicitur Ledon secundus, & Cistus Ledon populæa fronde alter, cultu ferè duntaxat, differens. C. Bauh. pin. Cistus ledon 4. sive folijs Populi nigrae major: Ledon 2. Clus. hisp., Lugd. Tab. Ledon latifolium 2. majus, Clus. hist. Cistus ledon Clusij, Lob. Ger. Fid. Cistus ledon 5. sive Populi nigrae minor: Cisti ledi 2. altera species, Clus. hisp. & Lugd. Ledon 2. latifolium minus, Clus. hist. Cistus ledon populæa fronde alter, Lob. Cistus ledon 3. populæa fronde Lugd. Tab. & Ger.

CISTVS LEDON LATIFOLIUM ereticum.



Ledi genus viscidum, folio

majorè, quàm Cisti feminae Monspessulanae, minus rotundo, mucronato, infernè candicante, tribus secundum longitudinem decurrentibus nervis plantagineis, supernè nigriore, minus rugoso, quàm Cisti maris majoris: folia verò juniora & extremorum ramorum longa, angusta, latiora tamen multò quàm Monspessulani Ledi. In extremis ramorum

Descr. Fo- lum.

Flor.

veluti ex longo pediculo, aliquot flores sunt [tres observ. vimus] ex pediculis unciam circiter longis: calyces hirsuti cum brevibus pilis.

Hujus fructus Ledi Ladaniferi nomine missus sic se habet: Capitula vel vascula sunt Cictris circiter magnitudine, Olivæ ferè, sive oblonga figurâ, hirsuta cum quinque angulis, membranis distincta, plena seminibus minutis, papaverinis, sulcis, angulosis.

Capitula.

Clusius sic describit: Ledon tertium, semine ex Italia misso, Cyprij Ledi nomine, nobis & plerisque natum est, cubitali interdum majori altitudine, fruticosum, nigricantibus ramis, carnosis foliis, & præfigurata viriditate nigricantibus, mediæ inter primi & secundi generis [Ledi angustifolij & latifolij] folia magnitudinis, brevioribus tamen, & rhomboidis quodammodo figurâ, quæ cum novellis ramis lentè & rosido humore obsita sunt, non adeò tamen abundanti & densè, neque etiam adeò odorato, ut in primo genere: Flos albus est, secundo generi similis, semen etiam exile, nigricans in rotundis capitulis. Lugd. etiam eundem, vel valdè similem sic delineat: A floribus specie dicitur Cistus frutes hie, in maritimis proveniens, cubitalis, non nunquam altior, densè, numerosèque radicibus, caulibus multis, sarculosis, cortice ex rubro rubente, folijs longis,

Semen. Ledi Cypria Clusij descripta.

Flor.

Descr.

Cistus cur. Radix. Cor. ex. Fo- lio.

longis, in ambitu laciniatis, acuminatis, supernè ob-
scuris virentibus, infernè candicantibus, & parùm
lanuginosis, flore Cisti, Rosæ silvestris, albo, vel
ex albo purpurascente.

Ladanum.

Hypocistis.

Lob. error.

Error in
scon plant.

Ledon Cy-
prii. m
Tab nota-
tur

An Anguill. Cistus mas, produens liquorem di-
ctum Ladanum in Cypro & Italia &c. proferens q̄
etiam Hypocistidem: An Bel. Obs Cistus, ex quo La-
danum fit in Creta, de quo sub Cisto fœmina ante.
Lobel. & Penæ Adv. est Cistus Ledon latifolium:
rarior species quadam Ladanifera, foliis multò cras-
sioribus, longioribus, Sumachij Plinij, aut Rusci
modo fruticans, &c. apud quos tamen figura pessima
& inepta: proque Rusci legendum Rhois. Icon.
plar. Cistus Ledon Rusci aut Myrti folio. Sed & hic
figura Adversariorum mala: Titulus falsus & deteri-
or falsus ad figuram malam. Melioricon ex Clusio
in obs. Lobelij ante, hac inscriptione: Cistus Ledon
tertius, Ledon Cyprium in Italia. Tab. Icon. &
hist. Cistus Ledon myrtifolium. Mala n figuram as-
sumpsit Taber. cum falso titulo, & falsam proponit
descriptionem.

An Casalp. Cisti Ledi sive Ladani species quæ-
dam latiore folio?

Camer. ad hist. Germ. Matb. ejsdèmq̄ Epit.
ponit ramum sub Ladano, quem ex meis plantis de-
pinxerat Gesnerus notatum litera O.

Ladanum.

An Alpin. de hac ait. plantam, ex qua Lada-
num Cretenfes colligunt, planè differentem ab ea,
quam hæcenus serè omnes prodidère, inspexi: hæc
siquidem Cisto fœminæ perimilis est, foliis tamen
Cisti longioribus prædita, Salviæque proximis: flo-
rèque fert silvestribus Rosis omninò similes, qui
rosæo etiam colore, quippe communis in Rosarum,
suffusi spectantur: quæ planta à Cisto fœmina flo-
rum tantùm magnitudine differte videtur: dece-
ptusque fuit Matthioli, Diosc. dicente, Ladanum
esse Cisti genus longioribus foliis nigrioribusq̄; re-
fertur: quæ nota in Cisto, ex quo Cretenfes Lada-
num colligunt, omnes observantur, quando hæc
planta omninò Cisto fœminæ sit similis, cum nullo
foliis, floribusque, et si majoribus.

Matthioli
error.

Lugd. Cistus Ledon alud latifolium Penæ: Item,
Cistus marinus. Hunc suspicamur pictum ad plan-
tam siccam, ac etiam descriptum. Non additur præ-
terea locus particularis ubi proveniat: eo loci per-
quiri possèt, si annotatus fuisset. Florum etiam di-
spositio alia est, quam solet esse in Cistis Ledis,
non ex extremitate ramulorum, sed ex alis. In ficcis
præterea plantis folia quadam apparent laciniata,
ubi ambitus eorum se contahit. Nos portionem e-
jus figuræ proponimus ex planta nostra sicca.

Gerardus no-
tatur.

Gerardus, cui Cistus Ledon myrtifolium, imita-
tur Compilatorem, Taber. figuram non bonam pro-
ponens, cum falso titulo, & falsa descriptione.

C. Bauh. pin. Cistus Ledum 4. sive Cretense: An Ci-
stus mas Matth. in mag. fig. & Lugd. Ledon 3. Clus.
Hist. Lob. Lugd. Ledon 3. Cyprium, Clus. hist.

CISTVS LEDON IV. CLVS.
flore candido.

Deser. Ka-
mi.
folia.

Flos.
Capitula.
Semina.

Ligna;

Multis ramis fruticat, cubito longioribus, lentis
& flexilibus, hirsutis, albicantibus: folia reli-
quis Ledi generibus molliora, ad Cisti fœminæ so-
lia accedunt, verùm paulò longiora, angustiora, bir-
suta, nigriora & lentè pinguedine conspersa, non
modò verno tempore, sed etiam per totam ætatem
conspiciuntur: flos albus est, Cisti fœminæ flore non
miror, nec ei ab similibus: capitula exigua membra-
nceis quibusdam & laxis involucribus teclata: semen con-
tinet omnium inter Cisti genera maximum, ni-
grum. In scela Castellæ veteri hoc genus observabat



autor, vicinis pago
S. Martini del Ca-
stannal locis, ubi
ab incolis Ardivieja
runcupatur, aded
frequens, ut vulgare
sit istuc p-
verbium.

Quen al monte
puede, y mas non
puede, Alomenos
ardivieja coge:
hoc est, quicumque
montem accedit,
potius quàm in-
anis redeat, vel
Ardivieja (plantam
vilissimam) colligat.
Apud nostros
Belgas latum scilicet
provenit.

An Dod. de flor.
hunc pinxerit pro Cisto, dubito: sive tamen exhibeat
suâ figurâ pro mare aut fœmina, olim aliam habuit.
Lob. Obs. & Icon. eandem cum Clusio figuram
habet, Ledi quarti nomine. Taber. Ic. & Hist. est Le-
dum Clusij: Gerard. & Lugd. Cistus Ledon quartum
Clusij. C. Bauh. pin. Cistus Ledum 8. sive histreum.

CISTVS LADANIFERA, SIVE LE-
DUM Monsp. angusto folio, nigricans.



Ledum hoc Mō. Deser.
Lspeffulanū, cu-
jus figuram dedit
Matthioli, & ex
eo Lonicerus, fru-
tex est bicubitalis,
odoratus, in ramos,
plures brachiatos,
coracæ nigro ob-
ductus, foliis ses-
quinciamp longis,
angustis, nigris, ru-
gosis, ex brevibus
intervallis mutud
oppositis, angustio-
ribus, quàm præfe-
rat Matthioli figu-
ra, quam fortè ex
fativa depinxit: flo-
res albi, parvis Ro-
sis sylvestribus affi-
miles, majores,

quàm exprimat Matthioli figura, in quorum medio
apices lutei succedunt pericarpia hispida, & femina
minora, quàm in Cisto mare Monspess.

Ad hæc observavi Hypocistin seu rediis Hypo-
ledon, copiosè proveniens Maio. Nascitur autem
ad Ledi radicem cui adherat ut Fungi, & Agaricus
arboribus, eque verò est de substantia ipsius fruti-
cis propriè. Itaque non videtur nisi reprehensione
dignus Fuchsius, qui tãtquam Fungum esse dixerit.
Sed ut redeam, ad vnius plantæ radicem multa sub-
nascitur Hypoleda, palmari longitudine, ex sequam-
nis multis intricatim compacta, quibus sui sunt in
summo Cytiri, luteo oli, sub quibus capitula rotun-
da, mediocriter magna, sicco viscido & lento plena.

Dourez annotat se Mosspelij verno tempore, ex
aqua calida, in qua Ledum hoc elucrat, ad spissitu-
dinem decoctâ, optimum Ladanum confectissè.

Nos evissimam idem esse Ledon quintum à
Clusio his verbis tradidimus; eadem quâ quartum al-
latur.


Ledum 5.
Clusij.

CISTVS LEDON VI. MINORIBVS angustioribusque foliis Clusij.



Valentino quoque regno observatum à Clusio *Locus.* circa Xativa, ubi ab incolis Xaguarco dicitur.

CISTVS LEDON FOLII colore cinereo.



Valentino regno, *Locus. eius.* Cisti Ledi genus septimum Clusio Hispan. & *Synon.* Hist. duntaxat observatum, circa Xativa, ubi ab incolis quoque Xaguarco dicitur. Lob. Obs. & Icon. Ledi genus septimum. Tab. Lugd. ac Ger. Ledon Clusij septimum. C. Bauh. pin. Cistus Ledon ii. sive foliis Rorismarini hirsutis.

CISTVS LEDON FOLII ROSMARINI coronaria Clusij, flore luteo.

Eadem, quâ superius magnitudine crescit, rami *Descrip.* tamen magis expansi sunt, folia tenuiora, supernâ *Rami.* parte ex fusco viridia, infernâ verò candidantia, ut Rorismarini coronariae folia videantur, gustu tamen adstringentia, licet lento quodam & pingui *Culpa.* humore sint, cum tenellis ramis oblita: flores numerosi secundum ramorum longitudinem, quinque *Flores.* foliis constantes, exigui, lutei, semen in exiguis capitellis ex cinereo nigricans. *Semen.*

Inve-

furgit altitudine, verim ramis duris, lignosis, nigricantibus, oblongis, Oleæ foliis angustioribus, fuscis, pinguibus, lento humore conspersis, quemadmodum & novelli ramuli; flos albus, omnium serè minimus: longa & angulosa capitula, in quibus semen ex ruffo nigricans, exiguum. Ad hujus radices genus illud *adversus*, sive Cynomorij, Hypocistis nuncupatum, adnatum inveniebatur Clusius, multis veluti squamis, ut quod in aliorum Cisti generum radicibus crescit compactum, pallefcens coloris, quibusdam tamen lir eis purpurascens & non nihil virefcens distincti, Cytinos suos in summo proferens, lentosq; & glutinoso succo totum pragnans.

Matthiolus in Diosc. notat Plinium, ait que vocabulorum vicinitate eum deceptum, ex Cisto (Hedera) Ladanum colligi dicerent, non autem ex Cisto, arbuticula: Græc. *Asdro*, Lat. *Ledum*, Arab. *Chafus* vocari. In post. comm. Ital. ait Rob. Constantinum cernere in annot. ad enarrat. Amati, excusantem Plinium. Habet autem is Ledum figuram cum foliis latioribus, quam sint in nostro, fortè ad cultas plantas factam: vidi sanè Ledum valde simile nostro, si non sit idem, folio longiore & triplo latiore: in cæteris nescimus an sit discrimen, nec etiam ullius discriminis ejus video mentionem factam à Clusio.

Turn. pro Cysto ladanifera, figuram habet que non placet. Lob. in Adv. Cistus Ledon, cui frequenter Hypocistis adnascitur: Eid. Obs. Ledon 5. Icon. Ledum Narbonense cum Hypocisto, Ledum 5. Clusij.

Clus. Ledum quintum, sub quo ait se invenisse Limodori, sive Orobanthes speciem, quod Hypocista appellant. Notandum apud Clusium figuram angulissimis foliis esse positam in Hispaniis sub titulo quinti: pertinere autem ad sextum: folia enim tenuiora, in postrema hist. meritò mutatum esse titulum, & positam pro sexto: quoniam autem loco, novam iconem introductam quæ responderet Monspelienfi.

Cæsalp. & Camer. ad Matth. germ. Ladanum vulgè appellatum frutex, odoramentum ferens eodem nomine. Eid. in Epit. Ledum.

Lugd. Cisti Ladaniferi genus, *Asdro*, sic fortè dicitur, quia folia ejus neque levia, neque ritida sunt, sed scabra & pannosa: *Asdro* enim est vestis ex panno raro & detricto: Ledum Matthioli, item Ledum 5. Clusij.

Tabern. Icon. & hist. Cistus Ledon Narbonense cum Hypocistide: item Ledum Clusij romum. Mira Tabern. circa rem herbariam ignorantia manifestatur, ut à quo passim in suis iconibus ultra centum & quinquaginta superflue proponantur, quemadmodum videre est hoc in loco, ubi eandem Ledi plantam, duobus diversis & titulis & figuris exprimendam curavit.

Ger. Cistus Ledon quintus Clusij, Cistus octavus Ledon, cum Hypocistide Lobelij: Cistus decimus tertius, Ledum Matthioli. Gerardus separat per genas figuras. Anguill. dicitur Ladanum ferens Hypocistidem. C. Bauh. pin. Cistus Ledon sive foliis Oleæ, sed angustioribus: Cistus Ledon Lobelij, Ger. Cistus flore albo. Eyst. Hunc similem vel Cisto adulterino pingunt, Tab. & Ger.

Ledum abundat Monspelij in silva Egremont, ubi quis diceret datâ operâ fatum, florens Aprilis & Maio: ferens Hypocistidem, sed partum liquoris sive Ladani continens conficitur in monte S. Iuliani in Abbruzzo in Apuleia & Provincia: nihil isto Ledi genere vulgatus toto regno Valentino, & Gallia Narbonensi, ubi aliud Leon non observatum à Clusio, sed in plerisque aliis Hispaniæ & Lusitaniae locis etiam invenitur.

Rami.
Folia.
Flor.
Capitula.
Semen.
Hæmorrhoidum.
Coloris.
Cytini.
Plinij error.
Chafus.
Rob. Constantini.
Icon Matth.
Tur. icon.
mele.
Limodorum.
Icon Clusij.
Ledon unde dicitur.
Tabern. ignorantia.
Ger. notatur.
Locus & Tempus.

Descrip.
Folia.
Flor.
Synon.
Rami.
Folia.
Flos.
Flos.
Flore.
Semen.

Cistus

Locus.

Rosmarinus.

Tuber. ex
C. Bauh. pin.

Cistus Ledon 12. sive foliis Rosmarinari subtus incanis.

Invenitur Cisti Ledi genus octavum Clusij frequens in nonnullis locis intra Tagum supra Vlyssiponem & nonnullis Bætica, ubi ab incolis Romero appellatur, id est Rosmarinus. Rauh. Ladanum Clusij folio Rosmarini, flore luteo. Lob. Obs. & Ic. ut & Lugd. Ledi 8. genus. Tab. Ledum Clusij quintum p octavo. Ger. Cistus Ledon sextus Clusij. Cur sextum facit, cum sit octavus. C. Bauh. pin.



C. Bauh. pin. Cistus Ledon 14. sive foliis Thymi.

vel potius, ut existimabat autor, Hypocistis, quæ illis tubercis fortasse loco observata est, narrantur: Tuber enim Hispani Turmas vocant.

Lob. Obs. & Ic. Synop.

Ledi decimum genus. Tab. Ledum Clusij octavum pro decimo. Lugd. Ledum decimum Clusij. In icone nostra observata proportione ad figuram Clusij, oportebat minora esse folia. Ger. Cistus Ledon decimus Clusij.

CISTVS LEDON IX. CLVSIO.

Deser.
Folia.

Ramuli.

Capitula.

Synop.

Locus.



guaco nuncupatum.

Lob. Obs. & Ic. ut & Lugd. Ledi nonum genus. Tab. Ledum Clusij sextum pro nono. C. Bauh. pin. Cistus Ledon 13. sive foliis Rosmarinari, sed non incanis.

Minus est superiore, folia paulo majora, neque subtilis incana, ut in octavo, sed rariora & magis glutinosa sunt: ramulos, quibus flos inhaerit, tenues, & exsuccos planæque retortidos: aliquot capitula inania, omnino hiantia, jam excusso semine, sustinere deprehendebat Clusius.

Nascitur Ledi nonum genus Clusij in extrema Bætica parte, qua Castellam novam spectat, ab incolis Xar-

CISTVS LEDON THYMI
foliis Clusij.Deser.
Ramuli.

Folia.

Capitula.

Locus.

Tumeruc-
la Hist.

Pedali duntaxat est altitudine, ramulis exilibus, lignosis, satis tamen fragilibus, nigricantibus, pinguioribus, & lento quodam humore madentibus: folia longè minorâ, quàm in nono, non multùm à Thymi foliis dissidentia: flores non observavit Clusius, quem admodum nec in superiore, sed in oblongis ramulis quasi umbellam procedentia capitula, exigua, & superiore parte aperta, jam inania & cum suis ramulis arida.

Nascitur Cisti Ledi decimum genus Clusij in extrema Bætica parte, qua Castellam novam spectat, ab incolis Xaguarco nuncupatum: quidam etiam Tumerucula appellant, quòd sub eo fortè tubera,

TVBERARIA NOSTRAS.

CAP. VII.



CAnlis pede al-
tior, teres, alio-
qui glaber imà dū-
taxat parte candi-
cante tomento ob-
situs, interlucente
leviculâ quâdam
rubeidine, folia cir-
ca infimum caulis
crebra, plantagi-
nea, ex rotundo
oblonga, latitudine
femunciali, longi-
tudine serè unciali,
supra, subtusq; in-
cana lanugine, pu-
bescentia, nervis
tribus, Plantaginis
in môrem dispositis,
distincta. Per reli-
quum caulem ex
longis intervallis

Deser.

Folia.

Capitulum.

Flores.

Tuberaaria

maior My-

coni.

Locus.

bina folia adverso situ veluti ex geniculo nascuntur, (aut alterum altero paulo inferius) angustiora, longiora, acutiora que, quàm infima, glabra, nervosa, superum caulis fastigium in binos longiusculos pediculos dividitur, quorum unus in tres alios breviores facessit. Singulis autem inhaeret capitulum tuberculatum, plurium foliolorum voluminibus contextum, cujus basim sulciunt foliola perpusilla acuminata: flores interdum longè plures. Duodecim siquidem gerebat ea, quam siccan apud D. Rentzium vidi. Ego eandem cum Tuberaaria majore Myconi suspicor, de qua mox.

Raram hanc nec uspiam nobis visam alibi plantam communicavit D. Rentzium collectam in monte Divi Iohannis propè Pias, inter plantas Stachadis arabicæ.

TVBERARIA MAIOR MYCONI.

Tuberaaria maior Myconi, à Mycono dicta, ut Erym. refert. Lugd. quòd foliorum & florum figurâ, hirsutie & facultate miri ori jam dicendæ sit similis, magnitudine tantùm distans, foliis multis, Plantagini

Deser.

Folia.

Caulis.

Flores.

Radix.

Sapor.

Locus.



tagini similibus, minoribus tamen hirsutis, humi jacentibus, & vix à terra sese attolentibus: hæc caules multos fundit, subhirsutos, rotundos, in quibus folia sunt per intervalla, caulem amplectentia, minorais, quæ humi repunt. In caulium summitate flores visuntur lutei: deinde semen folliculo inclusum. Radix lignosa per summa cespitum spargitur. Tota herba aliquantulum pilosa est, ejusque sapor adstringens, majoris, quam minor efficacis. Nascitur in locis siccis.

Hanc cum sequenti C. Bauh. refert ad Cistum fecundam vocatque secundum, sive folio Plantagini.

TUBERARIA MINOR MYCONI.

Deser.

Folia.

Caulis.

Flores.

Semen.

Radix.

Sapor.

Yca Sa Turmerica.

Hydnophillum.

Locus.



Tuberaria minor Myconi, formâ & facultate cum superiore, affinis est Pilosella, folia habet Plantagini similia, sed multò minorâ, humi repentia, villosa: caules didrantes, rotundos, inanes, hirsutos, in quibus per intervalla folia sunt bina, exigua, caulem ambientia, minorâ, quæ circa radices humi jacet: in caulium vertice flores luteos, in quorû medio purpureum quiddam est, in nigrum vergens, semen in exiguo folliculo, (dilapso flore) statim conspicitur: radix admodum parva est, tenuis, nonnihil fibrata. Tota herba hirsuta est: totius etiam sapor adstringens est cum siccitate.

Castellani eam *Terra Turmerica* vocant, id est, Herbam Tuberiam: quoniam ubi illa crescit, tubera frequentissimè reperiantur. Hanc, si veteres cognoverint, eam esse suspicatur Myconus, quam apud Athenæum Pamphilus Hydnophillum vocat, quia sepius tubera demonstrat: unde nomen Tuberie ei, à Castellani inditum.

Passim in pratis reperitur, locis pinguibus, terrenis. Ambas has plantas Myconus ex Hispania misit.

CISTVS ANNVVS I. CLVSIO, folio rotundiore. CAP. VIII.

Deser.

Radix.

Cauliculi.

In horto meo Genevensi ad cubiti altitudinem acetian majorem excrevit: ab una radice lignosâ & nigra, modò coliculis uno, modò pluribus, quinque Tom. II.



ac etiam sex, medio erectiori, omnibus hirsutis, teretibus: foliis veluti pergenicula binis, Majoranz similibus, longioribus, potissimum circa medios caules: inferiora enim rotundiora sunt, superiora angustiora verò, pilosa: ad latera singulorum, geniculorum, ad unum quodque folium, duo parva foliola: in extremis ramis duo, tres, quatuorve flores, unusquisque in geniculo ex brevi pediculo, hirsuto u-

no folio longo & duobus parvis constans. Floribus succedunt vascula, triquetra, brevia, magna, Ciceri ferè equalia, quæ matura in tres dehiscunt veluti cotylas latas, corticofas, rufas, quas cingunt foliolaria, hirsuta, costas habentia: intus membranula tenuis, lucida, cui adherent multa semina, minus ruffa, papaverinis minorâ, inæqualia, matura Augusto.

Icon nostra ex Clusio potuisset fortè melius ex-primi, quod folia attinet superiora, & capsulas, nisi abfuisse, cum pingere tur.

Clus. suam sic describit: longiusculis, hirsutis, rectis & raris est virgulis, foliis autem amplioribus, quam in Chamacisto primo, magisque viridibus, adstringentis gustus: flos Chamacisti primi flori similis, pallidus aut alhicans est, semen minutum rubescens in trigonis capitulis, duplo quam Chamacisti primi majoribus continetur.

Castellani, Cistum annum hunc Clusij primum Turmerica vocant, quia forsitan, ubi hæc nascitur, turmerica, quæ illis turmas dicuntur, crescant, Granatenfes *yerva del quadrillo*. An Hydnophillum herba est, ait Clusius, quam Pamphilus in glossis, teste Athenæo l. 2. Deipnosoph. tradit supernascentem tuberibus, cujus judicio subesse tubera cognoscunt: Meo judicio quidem Chamacisto est congener.

Ejus alia species invenitur longioribus alicuantulum virgibus, non tamen minus hirsutis, angustioribus etiam foliis, cujus flos minor, pallidus, valde altera caducus: capitula & semen similia.

Lob. Obs. Cistus humilis annuus, folio Salicis humilis: item (ut & Lugd.) Cistus annuus primus Clusij. Ic. Cistus annuus folio Salicis. Cam. hort. Cistus annuus flore luteo Clusij in Hisp. Tab. & Ger. Cistus annuus. C. Bauh. pin. Cistus foemina ro. sive Cistus folio Salicis.

Belg. *Zaerliet sbe cleyne leache* Cistus met bla ders van cleyne wilehe.

Genevæ habui semine maturo, Augusto. Argentinæ vidi cum vasculis, sive capsulis triquetris Julio messe, in horro D. Obrecht. In vinetorum apud Salamanticenses marginibus, & Granatenfi regio a Clusio observatus.

Cisti anni semen, annotante eodem, maximè commendatur ad nephriticos dolores, præter alios usus, à doctissimo viro Simone de Tovar, Hispanen. si Medico.

CISTVS ANNVVS II. CLVSIO, FLORE pallido, maculâ punicante insignito.

Cistum annum secundum Clusius inveniebat in sylva Madritiana, secundo ab urbe Luceiâ

Cauliculi.

Folia.

Flos.

Capitula.

Semen.

Tempus.

miliati, ad Cisti genus referendum, pedali altitudine, exilibus cauliculis, rectis, tenellis, non admodum ramosis, foliis oblongis, angustis, hirsutis, virecentibus, quæ cum ramulis per Cauliculæ ætus humore quodam pingui, & lento sunt obfita: flos pusillus, quinque foliis constans, ut Helianthemi, pallido colore, & maculâ punicea insignitis: capitula tenella admodum, triquetra, semen pusillum & cinereum continentia. Maio mensis floret.

C. Bauh. pin. hunc Cistum cum sequenti eundem facit, statuens varietatem esse in flore maculoso, & non maculoso. Vocat autem Cistum feminam n. Cistum flore pallido punicea maculâ insignito: Cistum annum 2. Clus. hisp. & hist. Lugd. Cistum annum gutrato flore, Pona: Helianthemum flore maculoso, Colum.

Variat: est enim flore maculoso, macula ex nigro rufescente, sive puniceo: vel non maculoso. Ceterum, mirati subit C. Bauhinum, quomodo in phyt. Cistum silentio præterierit, nec ejus mentionem aliquam fecerit.

CISTVS ANNVVS FLORE guttato.

Descriptio.

Sursulium.

Folij.

Radicis.



Asturgit (attestante Pona) recto furculo, tripalmati, quadrato, hirsuto, virecentis, cui prope tertiam folia multa Oleæ effigie, deinde per intervalla ad opposita latera alternato situ bina, ad medium usque, deinde per aliquos ordines ternâ spectantur, duobus tamen ex his angustioribus, è quibus flores multî, colore & formâ Helianthemi. Sed hoc amplius in singulis foliis guttulam sanguineâ fortiti, ad instar Pyropi, auro summa arte excepti, tum summitati, tum pediculo longiusculo & capillari calycibus affixi hærent, horum tamen aliqui sine foliis unicum florem in suprema parte obtinentes plantam finiunt. quæ radice unica, exili, lignosa, ac parùm fibratâ alitur. Floret initio Julij: tapor & femina, ut in aliis Chamæcistis. Proverit in plano Agro altero, sed frequenter in oppido Ciani.

Si quis consideret, quæ scribuntur de Tuberaria Myconi, de Cisto Clusij annuo secundo, & de Cisto hoc annuo Pona: judicabit fortè de una eademque planta scribi. Verùm quum quotidie experientia nos doceat, multas plantas ex descriptionibus videri easdem, quæ tamen non parùm differant, malimus nos hic omnes tres proponere, quàm temerè asserere, eandem plantam cum reliquis duabus unam esse. Hoc autem idèd potissimum, quodd collatis descriptionibus & iconibus non ratò nota quædam obseventur, quæ differentias manifestò facere videntur. Qui igitur fuerit in locis aut ibunt, ubi illæ proveniunt, statuant quid sentiendum, & nos moneant, libenter sententiam mutabimus, utpote qui veritatis sumus studiosi.

Radicis. Locum, & tempus.

CISTVS ANNVVS FOLIO LEDI, flore luteo.



Narbonensis Ledi annui rara species, viâ, quæ ducit Monspelio ad Rondeletij prædium vulgò Tertal, inter Sterro-cavallo & Cristas galinaceas herbulas fructicat, foliis Ledi angustifolij, hirsutis, juxta summum pedalem & sesquipedalem caulem: semen exile angulosum, rubrum, pulchellum in pericarpio nitido triquetro Selaginis Pliniana dictæ, levo-re glandis Ilicis & magnitudine ferè

patis: flos luteus. Lob. in icone, quàm hîc posui. Fl. R. inus, caules sunt crassiores, quàm proportionaliter esse oporteat.

Lob. Obs. & Ic. Cistus annuus-folio Ledi. Tab. Cistus annuus Ledi folio Lobelij. Lugd. Cistus annuus alter Lobelij, quæ eundem facit cum Clusij annuo secundo, contra sententiam Lobelij septantis. Considerandum an ejusdem plantæ figura & descriptio à Lugd. non ponatur pro Alyllo trigono Dalechampi: perpendendum etiam an Tuberaria Myconialiquid commune habeat cum hoc Cisto.

Ger. Cistus annuus longifolius Lobelij. Belg. Cistus met bladera van Ledum: Ang. Lang leafed yeerely Cistus. C. Bau. pin. Cistus femina 2. sive Cistus Ledi folio; Cistus annuus alter Lobelij, & Alyllo trigonum, Lugd.

Pona annotat in monte Baldo provenire Cistum Lacus; annum alterum Lobelij.

CISTVS MINIMVS FOLIO subrotundo.



Exhibuit Heidelbergæ anno 1595. Sprengerus Cistiter u folio Candia nomine plantulam semipalmatam, radice tenui, lignosâ, reliqua plantâ longiore: foliis parvis, subrotundis, latiusculis, binis ex adverso respondentibus, cinereis, in coliculis singulari, tenui, tereti, cujus summum occupant capellæ Helianthemum canâ lanugine pubescentes. Colebatur in sicili Junio mensis; pereret. Perexia,

nem dictabat, de quo tamen dubitamus.

CISTI

CISTI SPECIES ANNUA,
angustifolia.



Cisti nomine at-
tulit. frater C.
Bauh. plantam à se
Monspelij inventâ,
florentem mensè
Maio, in via Perou
versus, annuâ meo
judicio. Est dodran-
nalis, vel etiam ma-
jor ac cubitalis: ra-
dix unica leviter fi-
brosa, factis tenuis,
recta: caulis unicus,
teres, hirsutus, grac-
cilis, quatuor aut
quinque gemiculis
distinctus, ad quor-
um vrumquodq;
folia bina duabus
uncis longiora, an-
gusta, hirsuta, ad
Ledi Monspellula-

ni accedentia, ad radicem breviora: subdidit ut in
aliquot ramulos inæqualiter non ex adverso sitos,
quod observaverimus, quatuor aut quinque uncias
longos, capitulis multis (ad quicquid eorum nu-
meravimus) parvis, triquetris, Ledi Monspellulani
similibus, minoribus tamen, ex pediculis scilicet unci-
alibus, in unam partem, inftar jubæ, vergeretibus,
quaterna foliola hirsuta circumplectuntur. Florem
quidem non vidimus, verum Gener Cherlerus at-
tulit Monspelio, adscriptis his verbis: circulum in me-
dio nigrum habet, cujus interiora alba, punctulis
nigris aspersa, aliquando etiam striis intercurstanti-
bus nigris, folia flava. In planta sicca nullum ani-
madvertimus saporem manifestum, præter adstri-
ctionem aliquam. Considerandum an aliquod com-
mune habeat, cum Cisti annui prioris, alia specie
Clusij. Quod ad vascula & folia sibi mutuò oppo-
sita, affine quid habeat, cum Ledo nono ejusdem.

Tragus, Hyssopum sylvestrem seu campestrem
nominat: Cord. in hist. Helianthemum. Ibidem ait
Gesnerus: est hæc, nisi fallor, in merid. Hyssopum syl-
vestris dicta à Trago: & additur post: Consolidam
auream quibusdam dici Chirurgis. Anguill. auro-
re, Panaces Chironium folio Sampfuchi appellant
quidam plantam, quam Plinius dixit Helianthe-
mon, id est, *Flos Solis*.

Non desunt qui pro Chironio Panace ostendunt
plantam, quæ folium habet oblongum, Hyssopi se-
re modo, sed non video, inquit Matth. quomodo in-
genue possint eorum sententia subscribere. Idem
in post. com. Ital. dicit, Panaces Chironium nondum
potui invenire, quamvis non desint Neoterici, qui
pro Panace Chironio demonstrent, quam quidam
Florem Solis vocant, ego tamen Panaces esse crede-
re non possim: mihi potius Symplicii species vide-
tur. Ita in hist. Germ. Sonnenblum, Pseudo-Panax
Chironium, sive Flos Solis latioribus foliis. Apud
Gesner. hort. dicitur Gratia Dei Coldenbergio, qua
si libeat, Vulneraria Hyssopoides vocari possit.

Videtur Dodonæo gall. Selago Plinij. At de flor.
& hist. Lat. in fol. Florem Solis appellat, Cisto ac Le-
do similem, sed minore stirpem, de qua ait: Pleri-
que latine Gratiam Dei vocant: est tamen & alia
herba. Gratiola à recentioribus dicta: Plinius He-
lianthen tradit Helicalliden nominari: que an ea-
dem cum nostro Solis flore sit, an diversa, neque facile
in tanta Plinij brevitate explicaverit: Matth. He-
lianthemum sive Solis florem, à quibusdam Pana-
ces Chironium existimare refert: verum cum eo si-
militudinis habet nihil.


Lob. Adv. Helianthos sive Flos Solis, an Panax
Chironium & Helenium 1. Dioscoridis. Monspeli-
enses Cisti parvi speciem faciebant: sed crevit hic
in Anglia & aliis locis passim, ubi nulla Cistus: Ad-
stringendi siccatique vi pollet: acrimoniam rari-
tam producit: eoque minus Chironij opinionem fuit:
sed facit fortasse magis Certareum luteum [pro-
f. l. a. l. u. e. de qua suo loco] effigie cum sit & viribus
haud procul recedentibus. Idem Obs. Helianthes, si-
ve Flos Solis. Cisti species Monspellensium, an He-
lianthe Plinij: Helianthes Fuchsi. In Ic. sub titulo
Helianthemum Panacis Chironij posuit Lob. Clusij
figuram, quamvis Clusius separet à vulgari, quæ ait,
quod inter Ericas nascatur, & foliis Hyssopum emu-
letur, Beyden Bissop. & ob flores aureos Corfoli-
dam auream Herbariorum Germanicæ vulgus nunc-
cupare: esse, qui Plinij Helianthen esse vult: alios,
qui Panacem Chironium Dioscoridis, cui folium A-
maraco simile, florem aureum, radicem parvam, nec
altè demissam, tribuat. Is interea ad Cisti feminæ
tertiam classem reducendam esse cer fet.

Lonic. Hyssopus montanus, sive sylv. Beyden
oder Berg Bissop / odoris peregrini; pingit Helian-
themum in quo odorem non animadvertimus.

Lugd. Helianthemum, sive Flos Solis: Hyssopus
nemorosus Dodonæi. Cam. hort. Flos Solis, aliis
Panax Chironium, quamvis radix sit expers odoris
& saporis. Thal. Helianthemum Cordi. Tab. He-
lianthemum germanicum Sonnenbunzel. Ger.
Helianthemum Anglicum album; cur mutatit titu-
lum Tabernomontani, nescio. Vocat enim Helian-
themum Germanicum Tabernom. quamvis non si-
ne insigni lapsu, meo quidem judicio. C. B. pin. Cha-
macistus 1. sive vulgaris flore luteo: Flos Solis Dod.
(cui & Cisti & Ledi quædam species) Cast. Cam. He-
lianthemum vulgo dictum, Clus. hisp. Helianthemum
Plinij, Eid. pan. In hist. verò (ubi ad Cisti feminæ ter-
tiam classem reducit) Chamaecistus 1. Chironia, Cæs.

Subnectam hic, quæ aliquando de Helianthemo
flore luteo scripti ad Gesnerum: Vir quidam doctus
existimat esse Helianthen, de qua Plin. li. 24. c. 17. ait. Plinij.

HELIANTHEMVM VVLGARE,
flore luteo. CAP. IX.



Lignosa, albâ,
lentâque radice
rititur: ramulos
emittens rubentes,
lignosos, hirsutos:
in quibus folia op-
posita, Hyssopi la-
tiora multò, un-
ciam longa, modicè
in acumè destina-
ta, hirsuta, sapore
præter siccitatem
nullo excellente, glu-
tinoso: flores longo
thyrsu dispositi, qui
cum apicibus lutei,
quinque foliis const-
tant, Cisti positi,
hirsutis, tripartitis
folliculis circumse-
pti, quibus pericar-
pia succedunt lini,

longiora, trifida, in quibus semen.
Figura ex Plantino nobi. absentibus desumpta &
pro vulgari posita, non multùm placet, licet ean-
dem animaverit Clusius.
Tom. II.

Helianthen vocant in Themiscyra regione & Cilicæ montibus maritimis, folio Myrti: hæc cum adipe leonino decocta, addito croco & palmeo vino, perungi Magos & Persarum Reges, ut fiat corpus aspectu jucundum, idè Helioallidem eandem nominari &c. Hæc sanè conuenient prædictæ herba, tum nominis etymologia, tum figura descriptio, quamvis brevis, tum effectus: cum enim viscosa sit planta, non absurdè in fucos recipi potest, tum etiam natales, qui sunt in montibus. Quamvis nihil repugnet, non ausim tamen asserere eam esse. Alius quidam doctus asserit esse Helenium Ægyptium Cratææ, cui an assentiendum, dubito, licet non male conueniat descriptioni. Veruntamen licet mihi dicere cum Cordo, quandoquidem ipsi Dioscoridi ignotum fuit, difficilè quis iudicare poterit, tanquam nobis peregrinum & calidis maritimisque Ægypti locis familiare. Est, quòd mirer Plinium idem Helenium describere, quod Cratææ, & tribuere (lib. 21. cap. 10.) folio, quæ Dioscorides ramulis. Rob. Constan. in Lexico existimat esse Chrythomen, quod quidem non refuto: Sed *ἡλιανθη* ἡ ἡλιανθη, requiro: item *ἡλιανθη* ἡ ἡλιανθη, ὡς ἐπὶ λέοντος *ἡλιανθη* ἡ *ἡλιανθη* ἡ *ἡλιανθη* ἡ *ἡλιανθη*. Item *ἡλιανθη* ἡ *ἡλιανθη*. Hoc est, requiro fruticem exiguum, radicem densam, tenuem, ut Elebori nigri, gustu haud aspero Cypero simili, sed ex dulci subaustero. Item vim calefacientem: Acrem præterea qualitatem, quam habere dicit Galenus. Postremò, ut habeat quod requiritur à Plinio lib. 21. c. 8. comantes fulgore auri corymbos.

Helianthemum Lugduni abundat flores Maio, ac etiam Monspefuli, Tiguri, Tubingæ & Montbelgardii. Basilææ vicinis locis floret mense Septembri & Octobri, itinere versis Moutez & Krenzæc. Genææ viret mensis Februarij principio, ubi aiunt sagas vocatæ *Herbe d'or*: Galli tamen *Hysope des garriques* appellant.

In usum utiliter, Tab. asserente, vocari potest in sanguinis sputo cum plantagine & lymphito in vino rubro bibendo, decoctum. Potest etiam usurpari in alvi profluvio, dyfenteria etiam hepatica. Vulneraria habetur planta: recentia enim vulneri si imponatur, labra corstringit, sanguinem manantem sistit: quo nomine Chirurgis vehementer expetitur: in vino rubro cum pauillo alumine coctum, prodest ad oris & pudendorum tumores, si decocto partes affectæ colluantur. Sagminibus suis Hysopum Sylvestrem mulierculæ ad jungere solent, apud Tragum, creduntque tumoribus ac paralyfi membrorum, si in balneis quis utatur, vel imponat, utilissimum: Nobis non placet. Si quis penitenti contempletur (inquit Cam.) in Symphytorum seu Consolidarum classem accensenda est Helianthe: experientia enim docet, vulnera impostu Helianthes coalescere, eadem sanguinem sistit, ad uvulam quoque prodest: ad ulcera oris, & genitalium, si herba in vino decoquatur rubro, addito momento alumini, decoctio neque os coluatur, aut ulcera partium jam dictarum: ut numero dicam, auxilio est omnibus affectibus quibus fluor nimius conjunctus est, omninoque Symphiti magni aliarumque Consolidarum more usurpari potest.

HELIANTHEMVM FOLII
majoribus flore albo.

Apuđ Fridericum Meier Argentina Octobri mense Helianthen vidi florentem albo flore in hypogæo, cui folia urticis duabus longiora, satis lata: similem postea ohservavi Spiræ in horto D. Teragnagi, florentem Junio: huic respondet figura

Locus & Tempus. Descrip. Folia.



Plantini. Videntur utrumq; cultura non matetur angustifolia sita in hæc foliis longioribus & latioribus, quamvis etiam spontanea talis reperitur. Lob. ic. & Eysf. *Synon.* Helianthemum albis floribus. Tab. Helianthemum album germanicum weyß Soñen gunzel. Ait tantum colore differe à luteo, quare non erat necesse propter colorem solum ponere duas figuras.

Tab. usque tur.

Cam. hort. Flos Solis Matthioli Helianthemum Plinij, flore albo: Chamæciti species, folio latiore, quàm vulgò nascentis ex Italia missa, & postea circa Bapebergam inventa. Ger. Helianthemum luteum germanicum. Cur mutat titulum Tabernontani? Is enim figuram posuerat pro Helianthemo albo germanico: sed parum interest, quum dicat Tabern. solo colore differe à luteo de quo ante. C. Bau. pin. Chamæcitus 2. sive vulgaris flore albo majore: Chironia flore candido, Cæf. Heleni minus Dioscoridis, Lug. A. priore differt floribus colore albo, ejusque magnitudine, Ladani specie.

Flos Solis Chamæciti species, & flus.

CISTVS HVMI LIS CLVSIO, SIVE
Helianthemum omnino candidum, flore nunc albo, nunc pallido.



Exigua est planta, tenuibus virgulis, lignosis, & humi sparsis predicta, foliis Helianthemum vulgò dicto similibus, minoribus tamè, omnino candidantibus, gustu adstringentibus: flores extrinsecis ramis insident, quinque foliis confantes, coloris intertendum albi, ut plurimum pallidi, staminibus medium forem occupantibus. Semen in capitulis triangulis lino paribus inest exiguum, rufum. Radix lignosa & fibrosa.

Frequens est hic Chamæcitus, sive Cistus humilis Clusij primus, hisp. alt. quartus in hist. quoad descriptionem: quintus verò quoad iconem } Salmanticensi agro, ubi *Perdiguera* ab incolis appellatur, quia pedices circa eam frequenter se volutant & pulverant.

Descrip. Virgulae Folia.

Gustus Flores.

Semen Radix.

Perdiguera r.

Lob. Obsponit figuram Clusij sub titulo Helianthemum Cordi & Tragi: vocando Cistum humilem primum Clusij: item Helianthon sive florem Solis descriptum in Adv. p. 186. Clusius tamen Helianthen ab hac separat. Quare melius vocat in Icon. Cistum parvum Clusij.

Locus. Helianthar.

Tab. nota. Tab. Helianthemum i. factum, sam Sonnenblumlein. Compilerator in hist. male ponit figuram, quæ iterum ponitur pro Helianthemo peregrino angustifolio. Ger. Helianthemum Anglicum luteum, Englisch yellow diwarre Cistus. C.B. pin. Chamæcistus 4. five foliis minoribus & incanis: flos folis, Lob. Dod. utrique quoad iconem. Chironia aliud genus, Cæf.

Locus. Monspelij spontaneam vidi, & quidem florentem in monte propè Castellneuf, & montibus propè Gigan, quæ itur Narbonam, mense Martio & Aprilis; Lugduni prope ædes, quæ erant Darutorum ad ripam Rhodani, inter Lugdunum & Montuel, florentem Maio.

HELIANTHEMVM FLORE ALBO, folio angusto, hirsuto.



Plantula sesqui-palmatis, dodrantalibusve ramis donata, interdum paulò minoribus, Monspelij verò & Lugduni nūquam ferè cubitalibus, partim erectis, partim repandis: folia mediocriter magna, semicium longa, angusta, pilosa, incana, ut Lavendula, insipida, nonnihil vitæosa: flores ex longa serie plures, quales Helianthes vulgaris, nisi quòd albi, fibris luteis medi-

um occupantibus, calyces hirsuti, vasculis quoque consimilia, in quibus semen. Quæ Monspelij provenit, radicem habet crassiusculam, lignosam, & in frequentes abit propagines.

Hanc fortè Clusus in Hisp. pro Cisto humili secundo; & Hist. pro Chamæcisto quinto sic describit. Non differt magnitudine & ramulorum tenuitate: flores item similes, semina similia: sed folia angusta omnino & tenuia, Cisto folis Thymi respondentia, incana etiam, & eisdem temperamenti. Radix perinde dura, & fibrosa, atque præcedens, flores aperit Maio, frequens plantula Salmanticensi agro, ubi Perdiguera appellatur. Apud Clusium verò in hist. icon hujus posita est sub titulo quarti Chamæcisti, incuriã Typographi.

Lob. Obl. dicitur Cistus humilis angustifolius, Cortis Monspelienfis foliis, Selago Montpel. Cistus 5. Aflatij & Erica Chrysanthemis minima Adv. Ego contra Ericam Chrysanthemum diversam puto à Cisto humili secundo Clusij, (ut in Icon. inscribitur) quam ob causam, quæ Lobel. dixit de Erica Chrysanthemum ad aliam plantam refero.

Tab. nota. Tab. Helianthemum peregrinum, angustifolium, Klein fremdb. Sonnenguzel: item Helianthemum germanicum tertium, Sonnenguzel. Quæ qua in re à peregrino differat nondum animadverto: Compilerator nulla utitur diligeãtia in distinguendis Cistis. Ger. Helianthemum album germanicum: item Helianthemum angustifolium. Diximus qua in re differant hæc duæ figure, nos nondum videre, unam plantam tantum exprimere videntur.

C.B. pin. Chamæcistus 5. five foliis Thymi incanis: Ranax chironium minus, Cam. ep.

Tom. II.

CHAMÆCISTVS SERPILLI FOLIO, nigricante & hirsuto, flore aureo odorato.



Mltos promit ex eadem radice ramulos, tenues, oblongos, summâ tellure sparsos, subrubentes, in quibus exigua folia, ordine quodam & duplici serie, quæ admodum in reliquis Cisti generibus disposita, Serpillo ferè similia, nigricantia, & hirsuta crassaque: sub floribus autem parum, in novellis ramulis longiora & candidiora: flores in extremis ramulis iisdem novellis terni, aut quaterni, ob-

longis & hirsutis pedicellis inherentes, quinque foliis, ut superiores flores constantes, illisque magnitudine pares, sed aurei planè coloris, & odorati: semen observare non licuit: Radix multifida, aliquot fibris latè sparsis capillata.

Nusquam nisi in summis Austria & Stiria alpinis invenit Clusus Chamæcistum hunc: Hist. semel mense Augusto florentem. In hortum verò translatus, Maio ipsi floruit: sed flores cum suis pedicellis nimium caduci, omnem observandi seminis occasionem planè ademerunt.

Tab. & Ger. Cistus humilis, Serpilli folio. C.B. pin. Chamæcistus 11. five repens Serpillifolia lutea. Germ. Klein Eisenröflein. Ang. Low Cistus with leanes like wilde Thyrne.

CISTVS HELIANTHEMOS, flore parvo, luteo.

Almo longiores fundit virgulas, molli lanugine munitis, pilosis, ex quorum alis ramuli propagantur. Flores virgularum extremis multi, saturatè crocei, triplo minores, quàm nostratis Helianthemis. Calyces eorum hirsuti. Gener. Cherlerus collegit Nemausi, & Cistum Helianthemum parvo, luteo denominavit. Considerandum an conveniat cum Chamæcisto Clusij Serpilli folio.

CHAMÆCISTVS ANGVSTIFOLIUS, flore luteo Clusij.

Ramulos habet humi sutos, dodrantales, aut majores, multis, oblongis, angustisque foliis, nullo ut plurimum certo, sed confuso ordine dispositis septos, præter vulgarem in omnibus Cisti generibus foliorum situm, saporis primum veluti gummosi, deinde amaricantis: extremos ramulos binii aut terni occupant flores, quinque foliolis constantes, lutei cum suis in medio staminibus coloris: quibus succedunt trigona capitula, satis magna, majusculum & inæquale semen continencia: Radix lignosa, dura, vivax, foris nigro cortice obducta, & in aliquot ramos sparsa.

Locus
et
tempus.



Cistus hujus
modi.

Ang. Low Cistus with narrow leanes.

Rarior est Chamæcistus i. angustifolius Clusij in pan. 6. in hist. nec nisi in monte Badensibus Thermis imminenti, quarto à Vienna Austria miliaribus; atq; in Hamburgensi duobus à Pofonio Vngaræ urbe miliaribus, pauculas plantas, inueniebat autor, florentes Junio, quo tempor, aut paulò post semen etiam perficit.

Tab. & Ger. Cistus humilis angustifolius. C. Bauh. pin. Chamæcistus 3. five angustifolia.

CHAMÆCISTVS FOLII MYRTI

Tarentinæ, canis vel cineris.

Deser.
Rarissimi.



Folia.

Cistus.

Flores.

Locus.

Capitula.
Semen.
Radix.

Locus.

Tempus.
Sed et
vixt. Sicut.

Icon Tab.

les, quos pictor male expressit, & sculptor corrumpit, lutei coloris: his succedunt trigona parua capitula, semine in æquali, minuto, rufo, plena: radix lignosa, dura, vivax. Ramuli, flores sustinentes, maturo & deciduo semine exsiccati & confringi plerumque solent.

Maxima abundantia nascitur Chamæcistus 2. Clusij pann. 2. hist. in omnibus illis montibus, qui à Calenberg Darubio imminenti, ad Alpes Austriacas continua quadam serie procurrunt, tum etiam in Hamburgensi, Pannoniæ monte aliisque ejusdem provincie locis, sublimioribus præsertim, siccisque, gramine tamen teñtis agris. Floret Maio, semen maturum est Junio. Austriaci Seylader welt Baur vocatur à præfenti videlicet juvenidorum vulverum facultate. Tabern. qui mutavit flores, qui non respondent descriptioni Clusij, quia, ut ait, à sculptore corrupti, & Gerard. Cistus humilis larifolius. C. Bauh. pin. Chamæcistus 7. five foliis Myrti minoris canis.

Germ. Klein Cisten Köstlein: Ang. Low Cistus with broad leanes.

HELIANTHEMVM TENVI-
folium glabrum luteo flore.



quàm Thymi-folium sequens. Flores multò minores, quàm in vulgari, aurei, caduci, quibus succedunt vascula, majuscula, lucida, quæ semine maturo, in tres vel uti scutellas triquetras dehiscunt, ea autem vascula ambiunt tres tunica. Semen copiosum, ferrugineum, triquetrum.

Lugd. Erica quinta Chrysanthemus. Lob. Adv. Cistus quintus opinatus Affatio: item, Chrysanthemis Erica minima foliis Tamarisci, floscellis luteis. Dalechampius vocabat Ericam Chrysanthemum: Reb. Conf. Chryfocomen faciebat: Frater C. Bauh. attulit ex Italia nomine Coris Dioscoridis, Guilan.

Per Ericam minimam Chrysanthemum Lobelium in alexis eandem, quam Dalechampium, non dubitamus, id indicante ipso nomine: is enim Dalechampij & nostras opiniones pleraque habuit, licet rariò meminerit, id quæ operâ Valerandi Doureux affinis nostri, qui ei omnia nostra communicavit, cum Lugduni Lugdunensem in cepissem Historiam conscribere generalem, in qua multum laborabat Dalechampius. Quæ tandem ob tumultum bellicos interrupta, consecrata est per stirpium ignarum, qui confudit ac miscuit nostras & Dalechampij doctas observationes cum aliis. Vidit etiam Lobelius nostras stirpes cum suis nominibus, descriptiones etiam plantarum habuit. C. B. pin. Chamæcistus 12. five Erica folio luteus: Cori similis frutex in maritimis, Czf. Hujus duæ species, altera brevioribus foliis & humilior, altera quadruplo longioribus & elatior. Genevæ observavi locis siccis circa Champe & Monspelij. Cherlerus attulit collectum Nemusi. Vidi Basileæ in hortis, semine maturo Septembri. Degustata nobis nullum manifestum saporem præbuit. Chrysanthemis, Erica minima, inquit Lobelius, nacta est natales sibiuleta maritima Veneta: eandem studiosiores videant Monspelij fecus patibulum Castri novi. Erica Chrysanthemum in sabulosis æditorum collium locis apricis & perfatis gigni, florere Julio observavit Dalechampius.

HELIANTHEMVM ALPINVM FO-
lio Pilosellæ minoris Fuchsj.

Herba hæc collecta in montium locis siccis circa Genevam, ut Saleve, & in hortum translata floruit Junio. Eam sic descripsi ante triginta annos: Fructuosa

Zohia.

Flos.



Fruticosa herba, cui folia oblonga, Pilselle minoris Fuchij similia, inferiori parte magis candidantia, superiori viridia & pilosa; sed minus, quam in inferiore: flos luteus, qualis Helianthemum vulgari, unde hac vocaveram Helianthemum alpirum. Est mihi sicca (an verò una sit ex his, quae Genevæ erant collectæ, dubito:) non tamen integra, foliis quibusdam uncialibus serè, aut minoribus, oblongis, in acumen desinentibus, ad Polium montanum vulgare accedentibus, cinereis & serè albis: radice crassa, lignosa, cum capitulis multis onusta.



foli perpusilli, luteo que capitameto donati, quorum exteriore parte foliola extima, pilis obstita canescunt, interiore parte lutea.

Ceterum, fieri potest, ut vel natura Soli tantum naturalis varietatem in tribus præcedentibus plantis ludat: Vel, si non, ut eadem, aut earum aliquæ à Clusio in hist. de Chamæcisto, & potissimum sub Cisto humili altero tradantur. Hæc diligentius posteri examinent.

An hæc eni duabus præcedentibus eadem?

An Chæmæcistis v. Clusij?

HELIANTHEMVM FOLIO
Thymi incano.

CISTVS HELIANTHEMOS
folio Polij montani.

Cist. Helianthem.

Varietas flos.



Eadem, aut planè similes, nobis data est Argentinae ex plantis D. Agerij, cui nomen feceram, Cistum Helianthemum folio Polij montani vulgaris. Albicantes in ea erant cauliculi, unciarum quatuor, vel quinque, ramosi, qui desinebant in tenues pediculos, parvos flores profertentes, luteos, tres vel quatuor: Folia albicantia Polij vulgaris montani.

Nec dissimilem ab hac Cherlerus attulit stirpem, collectam in rupetis prope Agdes Gallia Narbonensis, quæ folio est candidiore, quantum iudicare possum ex reliquiis quibusdam: allata sanè fuerant plures plantæ integræ, sed reddita sunt nobis invisibiles, remanente tantum portiuncula.



Virgulæ plures, tenues, incanae, quæ in alios repandos tox dividuntur ramulos: foliola Thymi durioris, minuta, brevia, hirsuta, cinerea, terna, quaterna, interdum plura ex eodem geniculo enata.

Flos & Capsellæ in tres carinas dehiscentes, cum involucris hirsutis, ut in Helianthemum vulgari. Radix crassa, sinuata, contorta, lignosa, multifida, multorum capitum.

Fortè hanc miset & intelligit Lobel. cum Helianthemum tenuissimum glabro: similes sunt plantæ, differentes tamen, diligentius consideranti.

Monspelij observavi florens adhuc mense Septembri & in montibus propè Castellneuf & juxta patibulum Maio. Mense quoque Aprili, in monte Seti: Cherlerus attulit collectum in vineis & collibus Nemauso vicinis.

Helianthemum tenuissimum.

Locus et tempus.

CISTVS PVSILLVS FOLIO
candido, flore luteo.

Descri.

Ramuli.

Cistus pusillus folio candido, flore luteo, palmum longiorem, duram, lignosam, foris rubentem, intus albam, gracilem demittit radicem, quæ terram versus crassescit, inque numerosa capita dividitur: è quorum singulis ramuli prodeunt, alij uncialis, alij duplo longiores, hirsuti, foliis numerosis, in fernâ parte candidante densâ lanugine obfistis, supernè viridantibus, pilorum non expertibus, acuminatis, semuncialibus, culmis latis onustis: extremis ramulis binis suis singuli pedicellis insident flo-

CISTVS PVMILVS MONTIS
Baldi, fortè Austriacus myrtifolius.

Complusculis, sesuncialibus & quadrantalibus, lignosis adolescit virgulis, tenuibus & hirsutis: folia virentia, crebra satis, similia Myrto Tarentina, vel Lentis foliis paria, nec ita dissimili circumscriptioe, ortu & positu diversissimo, quippe bina, incondita tamen, fortuitis pilis, supra subtusque donata, per margines copiosioribus, ut in Nerio alpino: flores extremis ramulis unice, satis magni, cum multitis staminibus. Siccam hanc accepimus à Jacobo Zvingero, & fratre C. Bauhino, delatam è Monte Baldo. Eadem fortè est, cum Chamæcisto 8. in hist. seu 4. in pann. Clusij, proveniente in Austria, quam

Descri.

Folia.

Flores.

Descrip. Cist.
Ramuli.

fic descriptus. Palmaris aut paulo amplior est, superioribus Chamaecistis tamen firmior, multique ramulis, lignosis, retis & nigricantibus præditus, quos numerosa & admodum conferta ambiunt folia, ut quaternis versibus digesta videantur. Myrti minoris foliis non dissimilia, minora quidem & hirsuta, licet atra viriditate supernè splendcant, quorum gustus adstrictionis participis est: flos unicuique, interdum & alter extremis ramulis exit, satis crasso pediculo subnixus, unico constans folio, quinque profundis crenis, iisdemque veluti circinatis, diviso, ita ut quinque folia babere videatur, eiusdem cum primo genere penè magnitudinis, coloris ex albo purpurascentis, & quasi carni dilutionis, decem staminibus extrema parte nigris, & stylo oblongo purpurascens, medium florem occupantibus. Floribus excussis apparent pentagona capitula, qualia in nonnullis Cisti generibus videre est, obtusè mucronata, quæ maturitate aperta, semen continere deprehenduntur exile admodum, flavi coloris.

Folia.

Gustus.

Flos.



Color.

Capitula.

Semen.

Locus.

Rarissimum suum fruticem duntaxat in Senealben iugi scopulis nascentem observabat Clusius, unde florentem sub mensis Iunii finem eruit; semine verò prægnantem Augusto in Veyzalben summo supercilio, duobus supra Neuburg miliaribus. Eam cicurare voluit in horto suo semel atque iterum ex his iugis cum suo cespite desumptum, sed mitescere noluit.

Si Clusij Chamaecistus hic eadem est, cum nostra, sanè in Ico Æ, quam proponimus, caules nimis crasse picti, & folia sunt, eiusdem magnitudinis cum figura: Idem mihi evenire videtur ipsi Clusij figure, quod animadvertere poterit Lector conferens descriptionem cum iconè.

Tab. & Ger. Cistus humilis Austriaca Klein Cistiflorò Klein. C. Bau. pin. Chamaecistus sive hirsuta.

HELIANTHEMVM, SIVE CISTVS humilis, folio Sampfuchi, capitulis valdè hirsutis.

Deser.

Radix.

Caules.

Folia.

Floræ.



ut quaternis versibus digesta videantur. Myrti minoris foliis non dissimilia, minora quidem & hirsuta, licet atra viriditate supernè splendcant, quorum gustus adstrictionis participis est: flos unicuique, interdum & alter extremis ramulis exit, satis crasso pediculo subnixus, unico constans folio, quinque profundis crenis, iisdemque veluti circinatis, diviso, ita ut quinque folia babere videatur, eiusdem cum primo genere penè magnitudinis, coloris ex albo purpurascentis, & quasi carni dilutionis, decem staminibus extrema parte nigris, & stylo oblongo purpurascens, medium florem occupantibus. Floribus excussis apparent pentagona capitula, qualia in nonnullis Cisti generibus videre est, obtusè mucronata, quæ maturitate aperta, semen continere deprehenduntur exile admodum, flavi coloris.

to, villosè obvallati. Hanc Cherlerus attulit Moris. Cistus folio Sampfuchi. spelio ac nominavit Cistum folio Sampfuchi.

HELIANTHEMVM AD NUMMULARIAM accedens.



Perplacet nobis planta à D. Richnero Basileæ anno 1588. data, nomine Cisti, foliis Sampfuchi, dolemus non integram fuisse, sed tantum ramos cubitales, quos putamus supra terram excludosuisse. Rami magnis pilis hirsuti, folia bina in ordine disposita, ad Nummulariam accedentia, minora tamen & cum pediculis longiusculis, quales Alfine vulgari, tales pediculos in consimilibus Helianthemis, vel Cistis minoribus non observavi: folia breves habent pilos, minus conspicuos: ad alas foliorum sunt tenuia sobola.

HELIANTHES SPECIES RARA, comae inflexa, ut in Heliotropio.



Radix. Adix crassitudine digitali, longitudine scisqui palmari, lignosa, fibris paucis, sed validis donata, foris buxæ, intus alba, ramos sex, octo, aut plures per terram spargit palmares & spithameos, teteres, tenues, quibus folia rullo insigni sapore prædita, crebra, alieno situ utrinque adnascuntur Majoranz, glabra, & ex viridiluteola, unico nervo per longitudinem decurrente, at priora folia, & quæ proximè terram, non parum abiis, quæ per ramos viluntur, differunt, utpote longiuscula: flores in extremis ramulis perquam conserti & Scorpioidis re flexi, quibus foliis albis constant, apicibus luteolis, quinque viridantibus extrinsecus obvallati: capitula sequuntur triquetra, fusca, semine exiguo, papaverino pariatro, cavitatem impreffam altera parte habenti, altera gibbo resecta amaro.

Lob. Adv. tribuit huic flores aureos, cum sint albi: verùm eam describit ex sicca planta, non ex vivente, in quibus non rarò mutantur colores. Vocat autem Helianthes speciem rarà, figurà leguminosà, Helianthes floribus aureis: In Ic. Cistum folio Majoranz, deflectis floribus: ejus autem icon non placet, idè abam curavimus pingendam. Aliquando misit nobis Hortu.

Telephium. Hortulanus Ducis Florentiæ cum hac inscriptione, an Telephium Candia? Cherlerus attulit cum frequentibus nominibus, Telephium quorundam & Helenium Cratevæ, dictum à Pona. Imper. Telephium Dioscoridis quibusdam, Helenium Cratevæ.

Telephium. Cam. hort. ait calorem, quem in Telephio Imperati requirant veteres, à radice potissimà n gustantibus deprehendi.

C. Bauh. C. Bau. phyt. meminit hujus Telephij: sed præ et mentem Camerarij, ut suo capite diuina, idem faciens cum Aizoo peregrino ejusdem Camerarij: Ego Telephium Dioscoridis non existimarem, descriptio liquidem non convenit, ut apparet conferenti. Eid. pin. Cistus femina s. si ve folio Majoranæ: Helianthes species Penæ. Lugd.

Ex Gallo-provincia bis misit Jacobus Reynaudet, primum nomine plantæ repentis, ut Numularia fecundò stirpis Veronicæ modo repentis. Ex semine mili millò provenit floruitque lupio & Julio: etiam non reposita duravit aliquot annis. Basilea observavi in hortis, & Luteciæ Augusto cum suis capitulis. Cameratio perit hyeme postquam plurimos annos duravit, semine tamen spontè excidente, plurimum rursus propagavit. Lob. misit Raymundo è jugis arduis montis D. Bonaventuræ non procul Aquitænsis erutum.



succum, quali Ledi genera madent) effundere videtur. Clusio hæc planta revocat in memoriam fruticem Gagel, qui etiam fruticem odoratus, de quo nos suo loco.

Clus. Pan. & hist. Myrto - Cistus Balearica, & (ut Ger. & C. Bau. pin. cui etiam Cistus Ledum 17.) Myrto - Cistus Pennæi. Tab. Myrto - Cistus Clusij.

Londini in Anglia siccam ostendit Clusio, Penæus Londinensis Medicus, quam ille ex Balearium insularum majore, vulgò Majorica nuncupata erutam, Myrtoideis appellavit.

NERIVM ALPINVM QVIBVSDAM, aliis Ledum glabrum, & hirsutum. CAP. X.

CISTI FOLIO ARBOR EXOTICA, capitulis lanosis Platani.



Cisti folio atheris extrema virgula lignosa sunt, Cisto concoloria & similia: folia item rugosa, oblonga, Salviæ aut Menthe, sed in summis ramulis villosos, exatè sphericos floccos ostentant, si ve lanosa capitula Platani.

Lob. Adv. & Ic. Arbor exotica Cisti folio. Tab. Cisti folio exotica arbor.

Lugd. Cisti, vel Ledi Arbor peregrina Penæ. Ger. Cistus exotica Lobeij. C. B. pin. Cistus

femina r, si ve Cisti folio arbor exotica. Belg. Weilschen boom met bladera van Cistus: Ang. stränge Cistua.



Truncus Nerium Alpinum, tum facies, tum naturales conjunxere. Frutex est prius cubitalis, ramis contortis ac lignosis, digitali crassitie, cortice vestitis, extimo quidem cineraceo, interiore autem nigricante, at minimi ramuli subinde etiam rubente cortice teguntur, per quos folia, circa fastigium conferta, glabra, brevibus hærent pediculis Leticæ foliis parva, nec forma disti nli, nisi quòd crassiora, nervosiora, Clusio autore, minime in ambitu hirsuta: superiore parte virent, inferiore ferruginei sùt coloris, saporis adstringentis, & quodammodo resinosi: Inter quæ in extremis ramulorù flores.



Inter quæ in extremis ramulorù flores, Sapor. Flores.

MYRTO CISTVS PENNÆI, floribus luteis oblongis.

Myrto - Cistus tricubitalis interdum frutex est, scabro admodum cortice, & velut quibusdam tuberculis oblite, qui in vetustis ramulis facillè abscedit & sponte decidit: foliis Myrti ferè, dorso non minus scabro, quàm ramuli, superne autem laevibus, conjugatim ut reliquis Cisti generibus circa ramulos nascentibus: flores summis virgis insident, luteis quinque oblongis foliis constantes, & multis intus longiusculis staminibus præditi: his succedit oblongiusculum & pentagonum capitulum, semine plenum. Tota stirps odorata est, & gummi si ve resinam (lentorem potius & pinguem quandam

dein,

Capitula. dem, medium pistillum stipant, quibus decedenti-
bus relinquantur capitula rubentia, in quinque carin-
culas dichotoma, in quibus pulvifculas, veluti sem-
ina ferrugineum. Radix oblonga, lignosa, dura,
Radix. subnigro cortice tecta. Hujus porro surculorum
summitatibus capitula quaedam crescunt, squamis
foliaceis congesta, oblonga, & genitae majores
speciem exhibentia. Colore subrufo foris, intus flave-
scente. Foliis vero (Clusio referente) ramisque
Tubercula. adnata aliquando reperiuntur Tubercula, nunc
Nucis ponticae, modò Pisti magnitudine, inaequa-
lia, foris ruilante aut pallescente nonnunquam
colore, intus fungosa, alba, gustique adstringente,
pulpâ plena, quae gallarum venis praestare possint.

Nerium II. Alterum Nerij Alpini genus, multis etiam stolo-
nibus, duris, ac lignosis, cubitalibus, aut paulò lon-
gioribus, vix unquam surrectis fructuat. Folia pos-
simum per ramorum extrema conspiciuntur, & illic
quidem conferta, breviora, quam praecedentis, &
obtusiora, utrinque virentia, sed virore saturato,
per ambitum pilis seu per ciliorum tarsus, longis &
conspicuis obliquis, saporis non ingrati, aromatici, &
non nihil resinosi, cum astringitione quadam. Flores
praecedenti consimiliter acervatim in ramorum ex-
tremis nascuntur, sed pediculis hirsutis inhi-
rentes, nec adò diluti, & in capitula, quinque cellulis con-
stantia, desinentia. Clusio capitula viridia, suo odo-
re capitis grati edinem quodam modo inducunt. Ra-
dix dura, lignosa, oblonga, sed & rami per terram
sparsi, interdum fibras agunt.

Gesner in epist. ad Aretium, scribit se Berg-Rosen/
in multis montibus invenisse, & Sabaudica, Italicae
que nomina diversa audivisse, quorum nullum La-
tinam, Graecamve originem praefert. Idem de
Lunariis agens (intellige de Arthritica) ait eam vo-
cari Glablanke & fruticem esse odoratum, cujus li-
gno pro Xylobalsamo, & semine pro Carpobalsa-
mo Bergomenis quidam perpetua utatur. Ad
haec eodem libro in delect. Montis fracti, inquit: Ro-
sam alpinam, pastores nominare, Alroandum vero
Nerion Alpinum: sed potius, Ledum Alpinum esse
denominandum. Item in sine hist. Cordi. refert, vir-
rum quendam Italum seu Chamenerium quod-
dam, Nerium Alpinum vocare, naturam tamen totâ
discrepare: Demum in epist. ad me I. Bauhinum: in
monte Gotthardo Laurum Alpinum virentem (ut
scribis) invenisti ascendendo, quo nomine Balsa-
mum ab aliis dictum [sive Alpe-Rosen / Berg-Ro-
sen] accipere te conjecto.

Lob. Adv. Montana Allobrogum Lentiscifolia,
Chamaelefolia, vel Oleastrifolia, minus odora, Cha-
merhododendrum. Chamaedaphnes, sive pusilla Lau-
rus, an Germanicum Mezereum, an num potius no-
strum Chamarrhododendrum? Et paulò ante: Alpigena
Chamarrhododendros, odora; Alpina Italico-Germani-
ca, Alpe-Rosen/bacculas Asparagi, vel Taxi pares &
concolores, Septembri edens. Haccille. Ego facili-
tè equidem crederem, eam duarum istarum spec-
ierum, quae latiora & rotundiora habet folia, esse
Nerij nostri Alpini speciem, si baccas non ferret. no-
strum enim Nerium his desinitur. Videndum itaque
an inter scribendum illa verba bacularum,
non sint transposita apud Lobelium in Adv. & forte
tè pertineant, ad alteram plantam, quam paulò post
describit. In Obs. habet figuram sub titulo Balsam
alpini, de quo ait, Alpigenae Chamarrhododendri odo-
râ varietas. Balsamum Alpinum Gesneri & Rosa al-
pina, vel Evonymos Theophrasti, Dalechampij &
Herbariorum. Idem ponit aliam figuram cum Bac-
cis, cui haec adscribit. Alpigena Chamarrhododen-
dros odora Adv. 154. Balsamum Italicum vulgare, sive
Rhododaphne parva rustica, Terionarcha Plinij pu-
tata ex Guilandino. Lidum alibi, Genuina uva Vrsi

Galenus apud Clusium, eadem videtur cum Alpigena
Chamarrhododendro exhibitâ Obs. p. 199. & Adv. 145.
Videtur autem Lob. in Obs. ubi etiam in Adv. minus
benè agnovisse Nerium Alpinum, sed miserè cum
eo Vium Ideam secundam miscuisse. Aliquando
fortè habuit ramulum Ledum, sive Nerij Alpini sine
floribus & fructu, cum nominibus praedictis, qualia
inveni inter chartas Valerandi adscripta: inde puta-
vit baccas ferre.

Clusius in Pann. & hist. Cistoledo non ineptè sub-
jungit Ledum Alpinum, de quo ait, Nerion alpi-
num Aldroandus appellat: Alpini pastores Alpe-
rosen & Bergrosen/quidam etiam Bärenblüsi [Vrsi
flore dixeris] nonnullos Gannerlaub/[sive gal-
linaceum] vocant. Primum genus intelligi existi-
marem à Lobelio in Adv. sub Alpigenae Chamarrho-
dodendri odora nomine, nisi baculas Asparagi vel
Taxi pares illi tribueret; quas in nostro non repe-
rias; sed pentagona tantum capitula, ut ex ejus de-
scriptione liquet. Alterum plurimum convenit, cum
ejus Montana Chamaleafolia, sive Lentiscifolia,
Chamarrhododendro minus odorata: in Obs. prioris
iconem exhibet Lobelius, Balsami alpini nomine: Figura
Lob. falsâ
piciorum tamen flores non fideliter expressit, quos in
quinque crenas, non in quatuor divisos esse com-
pessit, si ramos suis floribus onustos à me anno
1574. amicis Machliniam missos (è quibus illam iconem
expressit) diligenter consideratae: licet non
negem interdum fieri posse, ut qui totum tantum cren-
is dividantur, sic nonnunquam ludente in flori-
bus natura: at omnes in eodem ramo tales natos ef-
ferecibile non est. Et hie et frutex qui à nonnullis
Evonymos dicitur, nescio qua ratione ductus:
Nam in hoc ubi fructus Sefamo proximus, in quo
acinus in quaternos versus digestus, qualem Theo-
phrastus, sive granum quadrangulâ figurâ, quod
Plinius, illi tribuit. Sed ex ipsa sanè historia satis li-
quet ne minimè quidem notâ ad Evonymum Theo-
phrastii & Plinij referri posse. Itaque cum Gesnero
Ledi potius esse genus, quam Nerion aut Evony-
mum arbitror, multum me impellente, ut ita cen-
sam, huius stirpis odore & temperamento. Rustici
& pastores eorum montium, in quibus observavi,
utrumque genus Rausch appellat.

Myrtus Alpina dicitur Rob. Constant. In Rhætia
Porcellana Dourez annotat ad ramum plantae
nostrae esse Evonymum Theophr. veram Dalecham-
pio, Laurum tamen Plinij, Rhododaphnen rusti-
cam Gesnero & Chamapeucen Bellonio. Gesne-
rus autem subjunxerat nihil habere commune cum
Lauro.

Tah. (ubi decimum facit) Ledum Alpinum: Item
Balsamum Apinum Alpe-Balsam: Ad haec, Chama-
rhopodendros alpina latifolia, Balsamum Italicum,
Alpe-Rosen-Demum, Chamarrhododendros alpina an-
gustifolia, Alpe-Rosen/montana Allobrogum, Len-
tiscifolia, Chamaleafolia, aut Oleastrifolia. Ceterum,
quam Tabern. ponit sub titulo Alpe-Rosen/
Chamarrhododendros alpinae latifoliae, cui baccas tri-
buit, videtur mihi Vitis Ideae species, quam consun-
dit cum Ledo Alpino. Cui vero titulus est, Alpe-Ro-
sen/Chamarrhododendros Alpina angustifolia, est
Ledum sive Nerium Alpinum glabrum, sed figura
non placet. Illa autem quae inscripta est, Alpe-Bal-
sam/Balsamum Alpinum, est Ledum Alpinum hirsu-
tum. Tandem cum nomine Ledi decimi Alpini est
in hist. eadem est cum Balsamo Alpino Tabern. vel
Ledo Alpino, hirsutis.

Lugd. Evonymus Theophr. l. c. 18. qui eo autho-
re tum alibi, tum in Ordynno, Lesbi monte nasci-
tur (sic enim ex Plinio legimus, non è quibus sed uno
pluribus con-
spicitur, ut Theophrasti exemplaria habent magni-
tudine & folio; Puniceae, pariter molli, majore, quam
Chamae-


Lob. notat

199.

Figura
Lob. falsâEvonymos
non est.
Nerium
non est.Rhodod.
phne.
Chamae-
peuce.Vitis Ideae
species.Evonymos
Theophr.

ROSMARINVS SYLVESTRIS quorundam. CAP. XI.

CVitalibus interdum est virgis, firmis, lignosis, cortice cinereo obductis, quarum extrema in plures alias tenuiores & quodammodo purpurascens, easque etiam nudas dividuntur; illa vicissim in alios dodrantales ramulos, virentes quidem, sed tomento quodam rubiginis coloris obfitos, quos nulla serie digesta, sed confusa ambiunt folia, Libanotidis coronariae foliis, ferè similia, sed longiora, supinè parte viridia, ad eoque in pronam partem reflexa & convoluta, ut ejus nihil conspici possit, præter nervum, secundum longitudinem, excurrentem simili tomento cum pediculo, cui inhaeret, pubescentem, grati & suavis odoris, acriter scilicet tamen saporis: summis istis ramis insident capita, ex multis, brevibus quasi squamis ferrugineis compacta, è quibus deinde se explicat, corymbacea quaedam multorum florum coma, oblongis, tenellis atque virentibus, non nihil tamen laruginis pedicellis inhaerentium; grato odore naris ferientium, quinis foliis albis constantium, nõ subluteorum (ut temerè quidam qui siccum cum flore ramum dumtaxat conspexit, asserere non est veritus) decem candidis staminibus cum stylo medium florem occupantibus: his demum succedunt, oblongiuscula capitula, pentagona, officulis fructibus Corni, aliquando magnitudine non cedentia, quæ, dum adhuc viridia sunt, argenteis punctis distincta esse videntur, sed maturitatem adæpta, rubiginis coloris, semenque continent oblongum, flavescens, ad eoque exile, ut scobis, è ligno à vernibus eroso sponte decidentis, instar sit. Verim peculiare est in istis capitulis, ut maturo deorsum in flectantur, terramque mucrone spectent, magnà Naturæ providentia, ne semen temerè effluat; nam præter reliquorum consuetudinem, à pediculo, non ab extrema cuspe, apertini & dehiscente solent: maturo semine, terni aut quaterni, alij ramuli, rubiginis tomento obducti cum suis foliis, in coma lateribus nascuntur, spem florum in sequentem annum pollicentes: radix lignosa est, & brevibus fibris donata. Tota planta odorata, præsertim cum floribus onusta est, & aromaticum quiddam spirat.



Monuit Clusium Achilles Cramerus, ad montium radices, se aliquas plantas in venisse, quæ flores sex foliis constantes, duodenis que staminibus præditos profertent: in super addidit, qui illi dux via fuisset, Venatorem ad hunc similem plantam, in summis montium jugis conspexisse, jam suis floribus ornatam, quæ digitalem longitudinem non excederet; nominatam autem ab eo Seydisföy binz Fruyt; hoc est peregrinam Apariam, quod apes ejus videlicet floribus delectentur.

Cord. in Diosc. Chamæpeuce, à Germanis Zeitzheyde appellata, quam ait quosdam pharmacopolas Chamaputin vocare, sed errare: quædam exemplaria pro

Tempus. Chamadaphnes. Circa Septembrem germinare incipit, floret vere, floris color, qualis Leucæo, odore gravi, & qualis sentitur truncato cadavere in totum putrescente, ut quasi casum animal referat (sic enim vertenda videntur, sed non rectè) fructu cum suo putamine & loculo ve Sela ni siliquis non ab simili, intus folido, sed in quatuor versus distincto. Esu lethalis est arbor, tam fructu, quam foliis peccori, & ovium gregibus, sed præcipuè capris, nisi purgentur. Purgantur autem in edia & cibi abstinentia. Quæ postrema sic fidelis opinor, traducta sunt, quàm à Theodoro. Nusquam legi quid sit avicenna. Quare ab eo legi potest. Alij ab eo interpretantur vomitionem, ut Dodonaus, Matth. in Diosc. Cneoron vocat. Hanc & capras & oves refugere opiliones asserunt. Dalecha nupius quidem in matentiis contemplantur caprarum greges, vicina fruteta depascens, nullam vidit, quæ hanc attingeret, atque ad eam decerpam obijceret, averfari deprehendit. Allobroges vocant des ortles Quo loco Theoph. Chamadaphnes legitur, verum in tubefle Asteriscus indicat, & Gaza Clematidem legisse videtur, qui Virgam pervincam vertent non ab eo, si mille n lego, sed a Diosc. præsertim puniceo. Floris tam grave n & detestandum odorem non potest significare a-

Tempus. Chamadaphnes. Circa Septembrem germinare incipit, floret vere, floris color, qualis Leucæo, odore gravi, & qualis sentitur truncato cadavere in totum putrescente, ut quasi casum animal referat (sic enim vertenda videntur, sed non rectè) fructu cum suo putamine & loculo ve Sela ni siliquis non ab simili, intus folido, sed in quatuor versus distincto. Esu lethalis est arbor, tam fructu, quam foliis peccori, & ovium gregibus, sed præcipuè capris, nisi purgentur. Purgantur autem in edia & cibi abstinentia. Quæ postrema sic fidelis opinor, traducta sunt, quàm à Theodoro. Nusquam legi quid sit avicenna. Quare ab eo legi potest. Alij ab eo interpretantur vomitionem, ut Dodonaus, Matth. in Diosc. Cneoron vocat. Hanc & capras & oves refugere opiliones asserunt. Dalecha nupius quidem in matentiis contemplantur caprarum greges, vicina fruteta depascens, nullam vidit, quæ hanc attingeret, atque ad eam decerpam obijceret, averfari deprehendit. Allobroges vocant des ortles Quo loco Theoph. Chamadaphnes legitur, verum in tubefle Asteriscus indicat, & Gaza Clematidem legisse videtur, qui Virgam pervincam vertent non ab eo, si mille n lego, sed a Diosc. præsertim puniceo. Floris tam grave n & detestandum odorem non potest significare a-

Tempus. Chamadaphnes. Circa Septembrem germinare incipit, floret vere, floris color, qualis Leucæo, odore gravi, & qualis sentitur truncato cadavere in totum putrescente, ut quasi casum animal referat (sic enim vertenda videntur, sed non rectè) fructu cum suo putamine & loculo ve Sela ni siliquis non ab simili, intus folido, sed in quatuor versus distincto. Esu lethalis est arbor, tam fructu, quam foliis peccori, & ovium gregibus, sed præcipuè capris, nisi purgentur. Purgantur autem in edia & cibi abstinentia. Quæ postrema sic fidelis opinor, traducta sunt, quàm à Theodoro. Nusquam legi quid sit avicenna. Quare ab eo legi potest. Alij ab eo interpretantur vomitionem, ut Dodonaus, Matth. in Diosc. Cneoron vocat. Hanc & capras & oves refugere opiliones asserunt. Dalecha nupius quidem in matentiis contemplantur caprarum greges, vicina fruteta depascens, nullam vidit, quæ hanc attingeret, atque ad eam decerpam obijceret, averfari deprehendit. Allobroges vocant des ortles Quo loco Theoph. Chamadaphnes legitur, verum in tubefle Asteriscus indicat, & Gaza Clematidem legisse videtur, qui Virgam pervincam vertent non ab eo, si mille n lego, sed a Diosc. præsertim puniceo. Floris tam grave n & detestandum odorem non potest significare a-

Tempus. Chamadaphnes. Circa Septembrem germinare incipit, floret vere, floris color, qualis Leucæo, odore gravi, & qualis sentitur truncato cadavere in totum putrescente, ut quasi casum animal referat (sic enim vertenda videntur, sed non rectè) fructu cum suo putamine & loculo ve Sela ni siliquis non ab simili, intus folido, sed in quatuor versus distincto. Esu lethalis est arbor, tam fructu, quam foliis peccori, & ovium gregibus, sed præcipuè capris, nisi purgentur. Purgantur autem in edia & cibi abstinentia. Quæ postrema sic fidelis opinor, traducta sunt, quàm à Theodoro. Nusquam legi quid sit avicenna. Quare ab eo legi potest. Alij ab eo interpretantur vomitionem, ut Dodonaus, Matth. in Diosc. Cneoron vocat. Hanc & capras & oves refugere opiliones asserunt. Dalecha nupius quidem in matentiis contemplantur caprarum greges, vicina fruteta depascens, nullam vidit, quæ hanc attingeret, atque ad eam decerpam obijceret, averfari deprehendit. Allobroges vocant des ortles Quo loco Theoph. Chamadaphnes legitur, verum in tubefle Asteriscus indicat, & Gaza Clematidem legisse videtur, qui Virgam pervincam vertent non ab eo, si mille n lego, sed a Diosc. præsertim puniceo. Floris tam grave n & detestandum odorem non potest significare a-

Tempus. Chamadaphnes. Circa Septembrem germinare incipit, floret vere, floris color, qualis Leucæo, odore gravi, & qualis sentitur truncato cadavere in totum putrescente, ut quasi casum animal referat (sic enim vertenda videntur, sed non rectè) fructu cum suo putamine & loculo ve Sela ni siliquis non ab simili, intus folido, sed in quatuor versus distincto. Esu lethalis est arbor, tam fructu, quam foliis peccori, & ovium gregibus, sed præcipuè capris, nisi purgentur. Purgantur autem in edia & cibi abstinentia. Quæ postrema sic fidelis opinor, traducta sunt, quàm à Theodoro. Nusquam legi quid sit avicenna. Quare ab eo legi potest. Alij ab eo interpretantur vomitionem, ut Dodonaus, Matth. in Diosc. Cneoron vocat. Hanc & capras & oves refugere opiliones asserunt. Dalecha nupius quidem in matentiis contemplantur caprarum greges, vicina fruteta depascens, nullam vidit, quæ hanc attingeret, atque ad eam decerpam obijceret, averfari deprehendit. Allobroges vocant des ortles Quo loco Theoph. Chamadaphnes legitur, verum in tubefle Asteriscus indicat, & Gaza Clematidem legisse videtur, qui Virgam pervincam vertent non ab eo, si mille n lego, sed a Diosc. præsertim puniceo. Floris tam grave n & detestandum odorem non potest significare a-

Tempus. Chamadaphnes. Circa Septembrem germinare incipit, floret vere, floris color, qualis Leucæo, odore gravi, & qualis sentitur truncato cadavere in totum putrescente, ut quasi casum animal referat (sic enim vertenda videntur, sed non rectè) fructu cum suo putamine & loculo ve Sela ni siliquis non ab simili, intus folido, sed in quatuor versus distincto. Esu lethalis est arbor, tam fructu, quam foliis peccori, & ovium gregibus, sed præcipuè capris, nisi purgentur. Purgantur autem in edia & cibi abstinentia. Quæ postrema sic fidelis opinor, traducta sunt, quàm à Theodoro. Nusquam legi quid sit avicenna. Quare ab eo legi potest. Alij ab eo interpretantur vomitionem, ut Dodonaus, Matth. in Diosc. Cneoron vocat. Hanc & capras & oves refugere opiliones asserunt. Dalecha nupius quidem in matentiis contemplantur caprarum greges, vicina fruteta depascens, nullam vidit, quæ hanc attingeret, atque ad eam decerpam obijceret, averfari deprehendit. Allobroges vocant des ortles Quo loco Theoph. Chamadaphnes legitur, verum in tubefle Asteriscus indicat, & Gaza Clematidem legisse videtur, qui Virgam pervincam vertent non ab eo, si mille n lego, sed a Diosc. præsertim puniceo. Floris tam grave n & detestandum odorem non potest significare a-

Tempus. Chamadaphnes. Circa Septembrem germinare incipit, floret vere, floris color, qualis Leucæo, odore gravi, & qualis sentitur truncato cadavere in totum putrescente, ut quasi casum animal referat (sic enim vertenda videntur, sed non rectè) fructu cum suo putamine & loculo ve Sela ni siliquis non ab simili, intus folido, sed in quatuor versus distincto. Esu lethalis est arbor, tam fructu, quam foliis peccori, & ovium gregibus, sed præcipuè capris, nisi purgentur. Purgantur autem in edia & cibi abstinentia. Quæ postrema sic fidelis opinor, traducta sunt, quàm à Theodoro. Nusquam legi quid sit avicenna. Quare ab eo legi potest. Alij ab eo interpretantur vomitionem, ut Dodonaus, Matth. in Diosc. Cneoron vocat. Hanc & capras & oves refugere opiliones asserunt. Dalecha nupius quidem in matentiis contemplantur caprarum greges, vicina fruteta depascens, nullam vidit, quæ hanc attingeret, atque ad eam decerpam obijceret, averfari deprehendit. Allobroges vocant des ortles Quo loco Theoph. Chamadaphnes legitur, verum in tubefle Asteriscus indicat, & Gaza Clematidem legisse videtur, qui Virgam pervincam vertent non ab eo, si mille n lego, sed a Diosc. præsertim puniceo. Floris tam grave n & detestandum odorem non potest significare a-

Tempus. Chamadaphnes. Circa Septembrem germinare incipit, floret vere, floris color, qualis Leucæo, odore gravi, & qualis sentitur truncato cadavere in totum putrescente, ut quasi casum animal referat (sic enim vertenda videntur, sed non rectè) fructu cum suo putamine & loculo ve Sela ni siliquis non ab simili, intus folido, sed in quatuor versus distincto. Esu lethalis est arbor, tam fructu, quam foliis peccori, & ovium gregibus, sed præcipuè capris, nisi purgentur. Purgantur autem in edia & cibi abstinentia. Quæ postrema sic fidelis opinor, traducta sunt, quàm à Theodoro. Nusquam legi quid sit avicenna. Quare ab eo legi potest. Alij ab eo interpretantur vomitionem, ut Dodonaus, Matth. in Diosc. Cneoron vocat. Hanc & capras & oves refugere opiliones asserunt. Dalecha nupius quidem in matentiis contemplantur caprarum greges, vicina fruteta depascens, nullam vidit, quæ hanc attingeret, atque ad eam decerpam obijceret, averfari deprehendit. Allobroges vocant des ortles Quo loco Theoph. Chamadaphnes legitur, verum in tubefle Asteriscus indicat, & Gaza Clematidem legisse videtur, qui Virgam pervincam vertent non ab eo, si mille n lego, sed a Diosc. præsertim puniceo. Floris tam grave n & detestandum odorem non potest significare a-

Tempus. Chamadaphnes. Circa Septembrem germinare incipit, floret vere, floris color, qualis Leucæo, odore gravi, & qualis sentitur truncato cadavere in totum putrescente, ut quasi casum animal referat (sic enim vertenda videntur, sed non rectè) fructu cum suo putamine & loculo ve Sela ni siliquis non ab simili, intus folido, sed in quatuor versus distincto. Esu lethalis est arbor, tam fructu, quam foliis peccori, & ovium gregibus, sed præcipuè capris, nisi purgentur. Purgantur autem in edia & cibi abstinentia. Quæ postrema sic fidelis opinor, traducta sunt, quàm à Theodoro. Nusquam legi quid sit avicenna. Quare ab eo legi potest. Alij ab eo interpretantur vomitionem, ut Dodonaus, Matth. in Diosc. Cneoron vocat. Hanc & capras & oves refugere opiliones asserunt. Dalecha nupius quidem in matentiis contemplantur caprarum greges, vicina fruteta depascens, nullam vidit, quæ hanc attingeret, atque ad eam decerpam obijceret, averfari deprehendit. Allobroges vocant des ortles Quo loco Theoph. Chamadaphnes legitur, verum in tubefle Asteriscus indicat, & Gaza Clematidem legisse videtur, qui Virgam pervincam vertent non ab eo, si mille n lego, sed a Diosc. præsertim puniceo. Floris tam grave n & detestandum odorem non potest significare a-

in pro *quodam* *Syn*, *quodam* *Syn*, habere, sed malè. Chamæpeuce Dioscoridi & Plinio, Germanis *Schwamm* / *Gichttraumen* & *Zeitheyde* appellari. Hæc illè, qui in hist. ea copiosè describit.

Erica. Falli eos ait Matth. qui velint esse *Ericam* Dioscoridis: is vocat *Wilden Rosmarin*, *Rosmarinum sylvestre*. Bohem. *Koyowruet*. Lob. Obs. & Ic. Ledum foliis Rosmarini alterum.

Videtur *Clusio* pann. & hist. *Cisti Ledi* generibus adnumerari posse hunc fruticem, *Rosmarinum* *sylvestre*. vocatum à *Matthiolo* & *Castore*, idèoque *Ledum Silesiacum* nuncupavit.

Cam. hort. Chamæpeuce Cordi: Eid. ad Germ. Matth. eisdemque Epit. *Rosmarinum sylvestre*.

Tab. & Ge. rar. notum. Taber. *Ledum Rosmarini folio*: Item *Ledum Silesiacum*. Si compilator intellexisset, vel diligenter considerasset, quæ scriberet, non separasset à capite *Rosmarini sylvestris* *Matthioli Cistum adulterinam*: nec ejus imitator *Gerardus*, cui dicitur *Cistus Ledum Silesiacum*, the *Polonian Cistus*: item, *Cistus Ledon Rosmarini folio*.

H. Lugd. p. 967. *Rosmarinum sylvestre* sive *Bohemicum Matthioli*. *Schvvenckf. Ledum Silesiacum majus*: *Melissa solitudinum*: *Schabenfraut* / *Boysden Wienfraut* / *Hart Beyde* / *Wiang* / *Schwgranz* / *ge Monticolis*, quali dicatur suum grandio, per methatesin literarum. C.B. pin. *Cistus ledon* 15. sive foliis *Rosmarini ferrugineis*: *Rosmarinus sylvest. Dod. belg.*

Locum & Tempus. Floret sub finem Junij, & Julio plurimis udis & desertis montium locis: se. men Augusto & Septembri est maturum: in hærentque interdum in sequentibusque annum capitula, sic ut recenti flore, & fructu superioris anni vacuo, nonnunquam & tertij anni fructus pedicellis, onusti rami conspici possint.

Vires & usus. Excalescit, attenuat, aperit, roborat, concoquit, resolvit, incidit, & digerit. Quin ad ea omnia efficacè est, ad quæ *Coronarius Rosmarinus*, præterquam ad ciborum condimenta. Non dubium est tamen, quin si quis periculum faceret, ad pleraque magis usus futurus sit hic frutex. *Sileij*, teite *Cromero*, adversus articulorum contractiones felicissimum jus usum compererunt, totius plantæ decoctio in solium infuso, cui ægri insideant & subinde id repetant. Hujus *Oleum stillaticium* vitreis organis extrahitur quod cum fragrans admodum sit, & stirpis florisque nativum odorem retineat, magnas procul dubio facultates etiam obtinebit. Non dum tamen quisquam periculum fecit, sed non desuturo arbitramur, qui aliquando experientur. Totâ planta odorata est, & aspectu jucundo (inquit *Schvvenckf.*) præsertim cum floribus onusta est.

Articulo. rum comp. radio. Articulus roborat: prodest sciatica, & aquosis pedum tumoribus. Additur in seffibus ad mensis mulierum eliciendos, aliisque uteri morbos. Lixivio ad inveteratos capitis dolores. Cum *Scrofularia* in balneis scabie sanant. *Cymas cere visæ* nonnulli incoquant ad inebriandum. Totam plantam in cistas, vestimenta à tineis & blattis ut vindicet, reponit vulgus. Rustici instabulis substernunt jumentis & porcis, adversus eorum scabiem & grandinem. Foliis apianj alvearia perficere solent ob odorem apibus gratum & amicum.

Oleum. Hujus *Oleum stillaticium* vitreis organis extrahitur quod cum fragrans admodum sit, & stirpis florisque nativum odorem retineat, magnas procul dubio facultates etiam obtinebit. Non dum tamen quisquam periculum fecit, sed non desuturo arbitramur, qui aliquando experientur. Totâ planta odorata est, & aspectu jucundo (inquit *Schvvenckf.*) præsertim cum floribus onusta est.

Scatica. Articulus roborat: prodest sciatica, & aquosis pedum tumoribus. Additur in seffibus ad mensis mulierum eliciendos, aliisque uteri morbos. Lixivio ad inveteratos capitis dolores. Cum *Scrofularia* in balneis scabie sanant. *Cymas cere visæ* nonnulli incoquant ad inebriandum. Totam plantam in cistas, vestimenta à tineis & blattis ut vindicet, reponit vulgus. Rustici instabulis substernunt jumentis & porcis, adversus eorum scabiem & grandinem. Foliis apianj alvearia perficere solent ob odorem apibus gratum & amicum.

Veterinarij. Capitis morbis. Scabies. *Cerevisia* incoquantur. *Tineas* fugant. *Decorum* scabies. *Apis gratia.*

Scatica. Articulus roborat: prodest sciatica, & aquosis pedum tumoribus. Additur in seffibus ad mensis mulierum eliciendos, aliisque uteri morbos. Lixivio ad inveteratos capitis dolores. Cum *Scrofularia* in balneis scabie sanant. *Cymas cere visæ* nonnulli incoquant ad inebriandum. Totam plantam in cistas, vestimenta à tineis & blattis ut vindicet, reponit vulgus. Rustici instabulis substernunt jumentis & porcis, adversus eorum scabiem & grandinem. Foliis apianj alvearia perficere solent ob odorem apibus gratum & amicum.

Veterinarij. Capitis morbis. Scabies. *Cerevisia* incoquantur. *Tineas* fugant. *Decorum* scabies. *Apis gratia.*

Veterinarij. Capitis morbis. Scabies. *Cerevisia* incoquantur. *Tineas* fugant. *Decorum* scabies. *Apis gratia.*

Veterinarij. Capitis morbis. Scabies. *Cerevisia* incoquantur. *Tineas* fugant. *Decorum* scabies. *Apis gratia.*

Veterinarij. Capitis morbis. Scabies. *Cerevisia* incoquantur. *Tineas* fugant. *Decorum* scabies. *Apis gratia.*

Veterinarij. Capitis morbis. Scabies. *Cerevisia* incoquantur. *Tineas* fugant. *Decorum* scabies. *Apis gratia.*

Veterinarij. Capitis morbis. Scabies. *Cerevisia* incoquantur. *Tineas* fugant. *Decorum* scabies. *Apis gratia.*

Veterinarij. Capitis morbis. Scabies. *Cerevisia* incoquantur. *Tineas* fugant. *Decorum* scabies. *Apis gratia.*

Veterinarij. Capitis morbis. Scabies. *Cerevisia* incoquantur. *Tineas* fugant. *Decorum* scabies. *Apis gratia.*


Veterinarij. Capitis morbis. Scabies. *Cerevisia* incoquantur. *Tineas* fugant. *Decorum* scabies. *Apis gratia.*

Veterinarij. Capitis morbis. Scabies. *Cerevisia* incoquantur. *Tineas* fugant. *Decorum* scabies. *Apis gratia.*

Veterinarij. Capitis morbis. Scabies. *Cerevisia* incoquantur. *Tineas* fugant. *Decorum* scabies. *Apis gratia.*

Veterinarij. Capitis morbis. Scabies. *Cerevisia* incoquantur. *Tineas* fugant. *Decorum* scabies. *Apis gratia.*

Veterinarij. Capitis morbis. Scabies. *Cerevisia* incoquantur. *Tineas* fugant. *Decorum* scabies. *Apis gratia.*



liis, temerè & con. Folia suo ordine eos vestientibus onustos, superius viricibus, inferne verd canescentibus, & Salicis pumilæ angustifoliae foliis admodum similibus, gustu valdè exsiccante, & nullo grato odore: summis etiam ramis insident capitula, ex multis, brevibus squamis compacta, cachrysos modo, è quibus sepe explicat aliquot flosculi, tenuibus, flosculi oblongisque pedicellis inhaerentes, quinq; foliolis constantes, ut superioris, sed diversi coloris, nimirum rubri dilutioris, sive quodammodo carnei, quibus excussis pentagona conspiciuntur capitula, brevibus & obtuso mucrone, exili & pallefcente semine plena. E Silesia ad Clusium mittebat *Frid. Sebittius*, in descriptione *Rosmarini sylvestris* aequod. Tab. Ci. *Rosmar. sylvest. Tab. notum.*

stantes, ut superioris, sed diversi coloris, nimirum rubri dilutioris, sive quodammodo carnei, quibus excussis pentagona conspiciuntur capitula, brevibus & obtuso mucrone, exili & pallefcente semine plena. E Silesia ad Clusium mittebat *Frid. Sebittius*, in descriptione *Rosmarini sylvestris* aequod. Tab. Ci. *Rosmar. sylvest. Tab. notum.* Considerare esse effigiem, *Clusij* figuræ valdè similem, & ponere propè *Rosmarinum sylvestrem Matthioli*. Ger. *Cistus adulterina*, *Contrefeßt Cistus*: item, *Rosmarinus sylvestris*, *Wilder Rosmarin*. Cur *Gerardus* duas facit *Cistum adulterinam* ex *Tab. & Rosmarinum sylvestrem* ex *Clusio*, diversas plantas? Cur non ponit c. 5, juxta *Cistum Ledum Rosmarini folio*?

C.B. pin. *Cistus ledon* 16. sive foliis *Salicis angustifoliae*. *Chamærhododendron montana* *Allobrogum lentisifolia*, *Lob. Adv. & Ic.* *Chamærhododendron alpina angustifolia*, *Tab.* *Chamærhododendron montana*, *Ger.* *Rosmarinum sylv. minus*, *Cam. ep.* Hic doctiores judicent, an ego fratre *C. Bauhino* melius *Chamærhododendron* hanc montanam, *Lob. Tab. & Gerardi*, ad *Nerium alpinum*: Vel ille me rectius, ad *Cistum Silesiacum Clusij*, sive *Rosmarinum sylvestre* referat?

Hoc tamen moneo, me suspicari *Clusij* *Rosmarini* iconem factam ad plantam in horto cultam, & fortè non differre nisi culturâ, à sequenti *Camerarij* *Rosmarino sylvestri* minore, ut statuerè etiam videtur *Schvvenckfeldius*.

ROSMARINVS SYLVESTRIS minor Camerarij.

Mltò minor, & tenerior est priore, lignosis at- *Defec.* que tenuibus virgis, ultra palmi altitudinem paululum assurgens: vel ad plurimum dodrantem æquans: folia acuminatiora sunt, & inferiore parte *Folia* crèta. In furculorum summitatibus flosculi pro- *Flosculi.* deunt rubelli, è quibus semen, prioris plantæ *Rosmarini sylv. quorundam* semini simile. *Odoripisius Oeder.* vix percipi potest.

Nascitur *Rosmarinum sylv. minus*, *Cam. in Epit. Loc. ut.* sive (ut in hist. Germ.) *Rosmarinus sylvest. minor*, *Wilder Flemer Rosmarin* in Borussia, in silvis umbrosis, uliginoso solo propè priorem, quæ ibi humanam staturam pænè superat.

Rosmarinum hoc *Camerarij* mihi persuadeo *Synon.* idem cum *Clusiano* inodorato, antè tradito, quamvis icones multùm differre videntur: fortè à *Clusio* culta

ROSMARINVS SYLVESTRIS, Clusio. CAP. XII.

Rutex quidam, inquit *Clusius*, pedalis altitudinis raro amplior, tenuibus, subrubentibus, virgibus præditus, quæ deinde in tenuiores candicantesque ramulos, dividuntur, angustis, oblongisque fo-

Defec. Virge.



Tempus.

Vires.

culta depicta.
Schvvenckf. Ledd
Sileiacum minus:
Rosmarinum silve-
stre minus Mat-
thioli: Rosmar. sil-
vestre. Clusij: Hlein
Gianze.
Ruridus occurrit
iisdem natalitius,
flore Maio & Junio
conspicuis, conca-
vo, quo ab altero
diversius, suaviter
rubente.
Folia Rosmarini
litora, pulchre vi-
rentia, inodora, ex-
siccantis & adstrin-
gentis facultatis.
Neglecti usus.

LIBANOTIDIS SPECIES RON-
deletij. CAP. XIII.



Deser.

Radix.

Stolonis.

Folia.

Ignofus est fru-
tex, bipalmaris
(à Cherlero bicubi-
talis observatus) ra-
dice subrufa, robu-
sta: stolonibus rigi-
dis: Rotif. manri
textura, alioqui gla-
bris, sed minoribus
ramis, hirsutis, per
quos folia, Hysopi
Arabum foliis pa-
ria, alia Thymi Cre-
tici capituli folio-
rum modo, latiora,
hirsuta, aspera, du-
ra, ex eodem pun-
cto saepe numero
plura, quorum u-
num reliquis lon-
gus multo, uncia-
lem tamen longi-
tudinem non assequitur, nervo unico, per singula se-
cunda in longitudinem decurrente: nullo seu odore,
seu sapore: flores extremis haerent ramulis, ex
oblongo tubulo in calathiscum quinquepartitum,
ad Primule veris imitationem, explicati, colore pur-
pureo, semina cum Echij feminibus non nihil ha-
bent commune, aut potius Buglossi, satis magna,
colore cinereo.

Flores.

Semina.

Synon.

Tragoriga-
num notii

C. Bauh.

Tucus cum
tempore.

Lugd. figuram & descriptionem habet sub titulo,
Tragorigani notii Dalechampij. C.B. phyt. Tragori-
giganum angustifolium 3. sive, Tragoriganum no-
thum Dalech. Eid. in Animadv. in Hist. Lugd.
Tragoriganum nothum Dalechampij: Anchusa li-
gnohor Penae. Vtrobique describitur. Non postquam
ego cum fratre Tragoriganum Dalech. & Anchusa
Lobelij eandem facere plantam, quamvis ad-
huc in pin. ejusdem sit opinioris. Vna enim futex
est: altera non item. Vni flores spinosi, purpurei:
alteri pusilli, caerulei.
Menfibus Martio, Aprili & Maio floret Mons-
pelij in monte Castelnuc.

ROSMARINVS CORONARIVS
fruticosus. CAP. XIV.

Deser. Rosmarinus frutex jucundissimi odoris Thus
redolentis (unde & nomen ipsi *λινάριον* dandi.
Tom. II.

tum) vel imprimis utilitatis commendatione notifi-
catus, & quia corollis petiuis, Coronarij nomen
adeptus, bicubitalis est, & altior, virgultis tenuibus, *Virgulta*



cinereo colore pa-
ditis, in quibus fo-
lia aliquot sinul,
ex intervallis o-
riuntur, rigidula,
Lavendulae angu-
stioribus, brevioribus,
pronà parte
candidis, supinà
semper virentibus:
flores ex foliorum
alis, ex caeruleo al-
bicantes, Salviae
florum effugie, mi-
niores, labello coty-
lye instar conca-
vo, guttato: fibra
incurva: longa, ex
rectu sub supremo
folio promicant.
Duplicem magno-
scimus Rosmari-
num vulgarem, seu Coronarium Libanotidum, cuius *Libanotis*
modi etiam meminit Cordus & ex eo Ges. de hortis. *Auplex.*
Vnam nobiliorem angustiore folio, quam Cordus *Minor tenuifolia.*
in Hist. Rosmarinum minorem seu tenuifolium ap-
pellat, quique apud nos in hortis colitur, quem qui-
dam putant veram Libanotidem Diosc. & veterum
Medicorum, sed apud nos degenerare verum hito-
to calo aberrant, diversissima sunt planta. Alteram *Major fistigobliorem.*
à Cordo silvestrem seu majorem vo-
catam, cui Plin. falsò semen negare tradit, quam *Plinij Lep-
sus.*
que nasci in Narbonensi Gallia scribit.

Munsterus. Cosm. lib. 2. de Narbona, Rosmarini *Minor.*
ineptam figuram proponit. Quin & Crescentius *cum Cresce-
notatur.*
pro Rosmarino aliquid Myrti simile pingit.
Mizald. ait rura & officinas Rosem maritimum ap-
pellare quod aliis Libanotis dici solet. Sed Mizald. *Mizald. error.*
dus non distinguens inter Libanotidem, quae Cachry fert herbam: & Libanotidem coronariam fru-
ticem, huic tribuit, quae ei conveniunt, ut infra lice-
bit videre de vmbus ex eo recitatis. Eundem plane
errorem ac plures alios Car. Steph. in hort. com-
mittit, talia dicens: Rosmarinum, sive, ut quibusdam
placet Rosmarinus, adhuc hodie vulgus appellat *du*
R. smarini. Eum autem fruticem Plinius Libanotida *Libanotis*
vocat *l. 19. c. 12. &c.* Sunt autem, ne quis fallatur, mul-
tae Libanotidis species, quarum una tantum mihi
est cognita. Est enim Libanotis ferax, quae duplex, *Libanotis*
mas & femina: folia habet Rosmarino similia, sed *ferax.*
umbellam gerit, quemadmodum Anethum, in qua
est Cachry, cuiusmodi in canina Rosa apparere so-
let, atque in ipso Cachry semen complexum est. Cae-
teram haec duae Libanotidis species mihi sunt igno-
tissima. Est & alia Libanotis, quae sterilis appellatur, *Libanotis*
eaque simplex est, ramos scissiles habens, ac folia no- *sterilis.*
stro Rosmarino similia, sed neque florem, neque
femina gerit, passimque audio reperiri apud Mon-
spesularum: item etiam in quibusdam Hispaniae a-
gris, quos ea herba sponte nascenti plerisque acreter-
fertes audivi. Est in super alia Libanotis species nobis
cognitissima, atque haec à Gal. l. 1. simpl. Coronaria *Liban. Gu-*
vocatur. Quae haecenus scribit Steph. de Libanoti-
de coronaria, scatenet citioribus. In primis malè Ros-
marinum coronarium, eadem facit cum Libano-
tide Plinij. Quis dixit Stephano Libanotidem ferax *Car. Steph.*
cem habere folia Rosmarini: Diosc. dixit Marathi. *errores plu-
res.*
Quid sibi vult cum Cachry in rosa canina? Quae enim
est Monspesularum & Hispanica? Cur non dicit Ga-
leni eadem cum Rosmarino, primo loco ab eo tra-

ditam: Cur non statim eam subjunxit? Verba que de viribus ad lucit radices, nullo modo competunt nostro Rosmarino. Sed & Francisc. Venetus in sua Harmon. mundi confundit cum Libanotide, sive Rosmarino coronaria, umbelliferâ sive ferulaceâ.

Zea. Dendrolibanus. Trago Libanotis dicitur etiam Zea, ite Dendrolibanus & Capspanema, ab Italis Corona montana. In Serapione hæc leguntur nomina Xaieralmerien, Arbor Maria, Alpinalpbach, Cachola. Avic. facit Buchornaten, quod negat Serapio. Orpheus vocat Solis Thymiana teste Agrippa occult. philosoph. Anguillara est Rosmarinus coronaria Cneorum nigrum Theophr. Calia Hygini & Virgilij. Sed erant Anguillara, ceu & alij recentiores quidam, existimantes Rosmarinum coronarium esse Cneorum Theophrasti.

Synon. C. B. C. B. pin. Rosmarinus 1. sive hortensis angustiore folio. Rosmarinus, Brunfels. Trag. Fuch. Turn, & Lon. Rosmarinum coronarium, Matth, Ang. (cui & Cneorum Theophr. & Calia Latinorum) Dod. gall. Lac. Lob. Lugd. Cam. & Eyst. Libanotis coronaria, Cord. in Diosc. & Gesn. hor. cui & Rosmarinus minor sive tenuifolius. Calia nigra Theophrasti, Dal. in Plin. Hyslopus Hebræorum quibusdam. Floribus est communiter subcæuleis, rariùs alhis.

2. Eid. pin. Rosmarinus 2. sive spontaneus latiore folio: Rosmarinus silv. seu major, Cord. hist. Rosmarinus alterignobilior, Gesn. hort. Rosmarinum silv. Cal.

Coronar. eur. dist. R. Caterùm, Coronariam hanc, & Lihanotidem & Rosmarinum cognominamus ad differentiam aliarum Libanotidum & Rosmarinorum, partim scilicet hoc libro dictorum, partim verò dicendorum lib. 27. inter Umbelliferas.

Nomina linguar. *Libanotis*: Diosc. *Libanotis* *σερανοματιν* recentioribus, Rosmarinus aut Libanotis coronaria, Arab. *El-tal-gcher*: Germ. *Rosmarin*: Belg. *Rosmarin*: Gall. *Rosmarin*: It. *Rosmarin*, *Rosmarino* *coronario*: Hisp. *Romer*: Ang. *Rosemari*: & *Gardcu* *Rosmarinen*: Boh. *Rosmarin*.

Locus cum tempore. Qui emanatur, & latiora & rugosiora habet folia, non facile fr. rhyemem. Alter folio angustiori, vulgatiore, fuculis facile propagatur: Ex semine an hic proveriãt ignoto. Rosmarinum sponte provenientem observavi in Gallia Narbonensi, ubi tantus ejus proventus, ut haud temerè aliud incolæ lignum urant, eòq; Monspelij & locis vicinis pro ignis vomite utantur. Floret mense Martio, Aprili, Autumno ac toto serè anno. Vvatvillæ in Alstia me docuit Sacerdos, Rosmarino ut citius proveniat decerpens esse summos ramulos, idque scipiùs, ut lignum durum evadat ac frigori magis resistat: adhæc si in transplantatione, simus addatur, corrumpi. Seritur, inquit Plinius, quoniam illi semen non est [*falsò illi negat semen*] propagine & avulsione. Tradunt sæpe vini, aut è parietibus latere usò, mirè ali. Rosmarinus certò tempore in novella Junipero insita, ut Cam. observavit, eò faciliùs hiemem non reconditus perferit.

Vires & usus. Libanotis. Diosc. Rosmarino vim tribuit calefacientem: sanante morbum regium, si quis ipsam in aqua coctam ante exercitationem exhibeat bibendam: deinde exercitatum lavet, & vinum ipsi hibendum det; miseret etiam acopis & unguentis de glaucino. Vfus ejus si Plinio credimus, stomacho post annum saluberrimus. Datur contra serpentes ex vino, vel aceto. Pulices etiam contrita, & cum aqua sparfa necat. Rosmarinus coronaria, ut Serapio testatur, calefacit, exsiccatque: & ex autoritate Abin Mesue, confert, aut idem, Corizæ frigida cerebri. Mizaldus varias ei adscribit vires, de quibus ager dum. Rosmarinus inquit, frutex est topiarius, nec non coronarius,

cujus odor, resina aut Thus, ut inquit præ se fert: tam suavi ac jucundo spiraculo, ut quos animus defecerit, ilicò recreare possit. Suffitu distillationes ac cullum continet, regiumque morbum suo curat decocto. Et quod illi de multis nobile est ac insigne, solo nidore in pestilentia tutam reddit domum, diluendo & expurgando improban aëris pernitiem suffitu ac vapore salutari. Flores caput ac cerebrum maximè roborant; ex quo illorum vius ad modum efficax esse solet contra capitis affectiones. Sunt qui Saccharo eos condiant, & sibi ac amicis eam in rem diligenter custodiant. Totus frutex utilis est, omnibus frigidis agritudinibus, membra ac nervos egregiè roborans & calefaciens. Sed paulò particulariùs hic nobis est medicè philosophandum in expetis & probatis Rosimarini auxiliis. Itaque succus radicum & foliorum ejus defæcatus, & cum melle despumato in modum collyrij concinnatus, plurimum valet ad defluxiones pituitæ in oculos. Quæ si calidè fuerint, licebit addere ovi albumen, cum succo Pomii generosi, & aqua rosacea confusum ac diu agitatum. Semen cum Pipere & vino haustum singularè adfert prædium contra icterum, hepatis obstructiones & in flationes. Radix siccata, pulverata, & cum vino bibita, ventris dolores, etiam si cohi fuerint, perbellè castigat & demulcet. Quis non exhiberet Mizaldum? Quis unquam observata Rosimarini radice præscribit ex ea succum de facatum, vel credet lignosam & inspidam radicem efficere posse perbelle, quæ ille pollicetur? si medicè philosophatus fuisset, & expertus, quod præstat, animadversisset se confundere in eò admodum Libanotidum umbelliferam, Cachryn ferentem, quæ herba est, cum Libanotide coronaria, quæ frutex arboreus est. Credant lætores istis Medicis non Botanicis, fabulas scribentibus pro veris. Dodonæo calidum & siccatum Coronarium Rosmarinum secundo est ordine, & simul adstringentis facultatis particeps; utpote ex terrestris quadam essentia copiosius admixta, compositum. Proinde & omnes uteri diuturnos fluxus sistit & sanguinis profluvia supprimit. Convenit etiam, & præsertim flores, omnibus capitis ac cerebri ex frigidâ humiditate causa malis: cerebrum etenim desiccant, sensus & memoria acurrit, nervosâs partes confortant. Matth. Rosmarinus non tantùm ad corollas expetitur, sed & culinas & pharmacopæorum officinas: oblonis enim quibuslibet & potibus gratiam conciliat, & ad multos morbos vim salutarem habet. Ejus decoctum super fluos humores cõsumit, veneno resistit, hepatis & lienis obstructiones aperit roboratque. Rosmarinus cerebro robur addit & sensibus omnibus, frigidis defluxionibus quibuscunq; utilis, epilepsiaz, lethargi, paralyti, caro, contractionibus, tremori, stupori: albos fluores mulierum potu & infestu curat. Siccat pulvis cum tosto pane, aut ex vino Cretico assumptus ventriculo cibum non retinenti confert. Rosimarini cum Ruta in vino decoctum addito Piperis momento bibitum, auxilio est epilepticis. Conserva florum Rosimarini idem præstat. Quibus anima sætet, aut visus imbecillior, pdest comediisse omnimatuino tenella folia & flores cum pane & auxilio sale. Suffitu naribus & ore hians exceptus valet ad tussim & catarrhû. Collutio oris ex Rosemarino in aceto & vino acido decocto dentibus & gingivis salutaris. Ex aqua decoctis vulnera putrida & ulcera extergit inperso simul pulvere. In lixivio capitali utiliter maceratur. Stillatiuus liquor efficax est ad epilepsiam manè bibitus: cõfert ventriculo & cordi: prodest capiti vertiginoso & anhelitu fastido. Oleû ad prædicta efficacius. artus atrophici laborantes reficit. cervix & tẽpora eo inuncta applexiam prævat.



HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM LIBER XIV.

(699)

QVI EST ROSARVM. ET HIS AFFINIVM
SPINOSARVM NONNVLLARVM, VT
RUBORVM, CAPPARVM.

NUNC amenam illam Rosam celebremus, florum reginam, sed quae undique rigidis spinarum telis armata sit: unde Rosa Plinio nascitur spinâ verius, quam frutice. Quamquam & nos absque spinis nascentes observaverimus, uti constat in progressu. Sed quid vel spinarum minas metuamus, tam r. seu colore, tam pulchrâ florû facie, tam suave spirante odore lecti? Adeamus & florum vniuersissimam decerpentes contemplerur.

DE ROSA. CAP. I.

Duo summa suffragia.

Descr. uniuersalis.

Virga.

Folia.

Flores.

Alabastr.

Stamina.

Semen.

Rosa partes.

Cortex.

Cortex.



NOTISSIMA Rosarum stirps tam hortenſis, quam silueſtris, tamen ſi frumcoſa & ſpinoſa ſit, conſentaneum tamen & decens magis eſt, eam ſeorſim hic tradere, quam aliis ſpinoſis fruticibus jungere. Eſt igitur in genere frutex infirmus, Caſ.

& citò ſeneſcens, niſi recidatur, ut cum ſuffruticibus ambigere videatur: ramis aut potiùs virgis duris, lignoſis, & ut plurimum, hiſpidis, mordacibusque aculeis horrentibus, non rediis, ſed modicè recuruis, frequentibus: foliis ſubrotundis, aſperis, per ambitum ſertatis, quinque & ſeptem ex uno nervo, ſive pediculo coherentibus, ſibi inuicem oppoſitis, ſupremo ſingulari: floribus (quibus Roſa nomen ſui fruticis, quiſque proprie *ῥόδον* Græcis, ob odoris ſuauitatem dicti) primùm herbaceo incluſis calyce, qui tumefcentes in virides alabaſtros, ſaſtigiuntur, quibus dehiſcentibus flores panduntur, vel ſimplices, vel multiplices, in calycis ſui medio ſtamina quædam capillacea, luteis apicibus donata, completi: ſemine in oblongis capitulis, quæ calycibus & floribus ſubſunt, Dod. per maturitatem rubentibus, duro, lanugine involuto: radicibus duris, lignoſis, in diuerſa tendentibus.

Porro, Roſæ partes Medici numerant octo, quas ob medicam materiam noſſe proderit, viribus ſiquidem diſferunt. Pediculus igitur, qui florem ſuſtinet terminatur in caput ſolidum, lanugine quadam reſertum, foliis & floribus ſubſtratum, ceu baſis totam roſam ſuſtens, calyx [quo nomine tamen globululum totis foliis nondum apertum cognominatur] vocatus. Hunc ambit cortex apertè roſâ in quinque pinulas ſeu lacinias diuiſus. Tertia pars eſt, floris medium illud croceum, quod capillamentis inſidet,

à recentioribus & Officinis Antheta vocata, deductum ab eo, quod eſt *ἀνθη* ἴδιον, id eſt, ſlos roſæ. Quarta, ipſum capillamentum ſubtile, veluti filum floris, ſeu crocei illius ſulcerum & ſuſtentaculum. Quinta ſolium, cujus ima pars candida, unguis appellatus, ſextam conſtituit. His addunt ſeptimam, quæ eſt lana in capite contenta. Semen, quod eſt octava pars Roſæ, ne putes inquit Palladius, medicos hoſculos eſſe, aurei coloris, ſed baccas Pyri breviffimâ ſimilitudine, ſeminibus plenas, poſt videntiam maturas, quarum quidem maturitas tum ex colore ruſſo, tum ex mollitie eſtimatur. Et hæc ſerè ſunt, quæ omnibus Roſis ſunt communia: de his pluribus agetur infra.

Theophrastus Roſam modò inter frutices, modò *Theoph. ag.* inter ſuffrutices numerat, ejuſque diſſerentias his verbis aſſignat. Roſarum diſſerentia multa, foliorum multitudine, paucitate, aſperitate, læuitate, colore, odore. Quippe plurimis quina [in flore] folia *A. foliis.* ſunt, quibusdam duodena, vicièaque, aliis longè plura: ſunt enim quas Centioſias vocant, quæ circa Philippoſ plurimè proveniunt, quas incolæ ex Pangeo tranſferentes ſerunt: illic enim multæ & juſtmodi ſunt. Sed folia interna [in harum flore] parva admodum ſunt, ita enim oriuntur, ut alia intus, alia extra emicent, non tamen jucundi odoris, nec amplæ magnitudinis ſunt. Odoratiores inter amplas, quibus pars ima ſcabra. Ad ſummam (ut dictum eſt) & odoris & coloris præſtantia, loci ratione contingit: & quæ eadem in diuerſa tellure proveniunt, à ſe diſſerunt, quod jucundum vel nullum ſpirent odorem. Et hunc locum Gaza ſic eſt male interpretatum: *Gaza le- & que in eadem tellure proveniunt, diverſitatem bonæ & malæ.* exiſſe odentia, nullam offendunt. Odoratiſſimæ quæ apud Cyrenam gignuntur. Sylveſtris aſperioribus *Cyrenica.* tum virgis, tum foliis conſtat, & florem minis odoratum, minùſque coloratum, nec tam magnam fert.

Tom. II.

C

Genera Plin. Paulū curiosū de his Plinius prodidit. Genera
Prænestina ejus nostri fecere celeberrima, Prænestinam & Cam-
Campensia panam: addidit alij Miletiam, cujus sit ardentissim-
Asiatica us colos, non excedentis [excedens] duodena folia.
Trachinica Proximam & Trachiniam minis rubentem: mox
Alabandica Alabandicam, viliozem, albicanribus foliis. Vtilissi-
Spinea mam [alij vtilissimam] verò plurimis, sed minutissimis
 Spincolam. Differunt enim multitudine foliorum,
 asperitate, lavore, colore, odore. Paucissima qui-
 na folia ac deinde numerosiora, cum sit genus ejus
 quam Centifoliam vocant, quæ est in Campania Ita-
 lia, Græcia verò circa Philippo, sed ibi non sua ter-
 ra proventu. Pangæus mons in vicinio fert, nume-
 rosus foliis ac parvis, unde accolæ transferentes con-
 ferunt, ipsaque plantatione profertur. Non autem
 talis odoratissima est, nec cui latissimum maximum-
 que folium. Brevitèrque indicium est odoris, sca-
 britia corticis. Cepio Tiberij Cæsaris principatu,
 negavit Centifoliam in coronas addi, præterquam
 extremos velut ad cardines utpote nec odore, nec
 specie probabilem. Est & quæ Græca appellatur à
 nostris, à Græcis Lychnis, non nisi in humidis locis
 proventis, nec unquam excedens quinque folia,
 Viola magnitudine, odore nullo. Est & alia Græcu-
 la appellata, convolutis foliorum panniculis, nec
 dehiscens nisi manu coacta, semperque nascenti si-
 milis, latissimis foliis. Alia funditur è caule malva-
 ceo, folia Oleæ habente, Moscuton vocant. Atque
 inter has media magnitudine Autumnalis, quam
 Coroneolam vocant. Omnes sine odore præter
 Coroneolam, & in Rubo natam: tunc modis adultera-
 tur. Hactenus Plinius, qui & Pallidæ & Quinque-
 foliæ meminit, de quibus infra, ubi de loco & tem-
 pore sermo habetur, agetur.

Rosa coloris In Rosis communiter color quadruplex invenitur:
 est enim alius rubeus, candidus alius, alius candor in-
 est rubore asperlus, qui color propriè roseus & car-
 neus dicitur, & hoc genus vulgò incarnatum vocant
 talis pallidus.

Fabula de Rosam verò non nisi candidam per initia fuisse,
Rosa colore Rosa colore comminiscuntur, & Turce & Poëta. Illi non ut Poë-
 ta Rosam ex sanguine Deæ alicuius tinctam esse
 credunt, sed (id referente Generoso D. Augerio
 Busbekio) ex sudore Mahumetis rubedinem illam
 ortam esse sibi persuadent: ac propterea hujus folia
 humi jacerè non patiuntur. Græci contra sangui-
 ne Cupidinis, ut Aufonius, admirandam illam colom
 pulchritudinem odorisque suavitate à Vene-
 re contributam fingunt. Alij vulnerato Venereis pe-
 de eam adrubuisse fabulantur hoc modo. Deam Vene-
 rem Adonidis amore captam Mars Zelotypus
 deperire laborans, Adonidis morte incitum consue-
 tudinem solutum in sperat, Adonium interfecit. Ven-
 nus relictus gestum facinus, omni studio diligen-
 tiæque propter subdidum ferre volens, in Rosæ fru-
 tices iruit, pedem nullo munitum Sandalio ejus
 spinis transigit: unde Rosæ pristinum candorem,
 in profusi cruoris memoriam, in ruborem conver-
 tit. Quare Claudianus:
 — Sic facta cruoris Carpit signa sui.
 Alij aliter: Ferunt enim Cupidinem cum in Deo-
 rum convivio lascivis soltationibus indulgeret pate-
 ram nectaris plenam, alæ concursu subvertisse, nec-
 tar inde fufum Roseæ Rubicundum reddidisse.
 Philostratus flos fruticem Cupidini dicat,
 quem tota facie videtur æmulari. Semper illa recens
 juvenisque, nec non mollis ut Cupido. Aureis co-
 matur capillis, spinas pro jaculis gestans, pro faci-
 bus fulgorem. Folia pro alis Rosæ data sunt: neque
 Cupido, neque Rosæ tempus norant. Idem lumi-
 na tetra, veris comas, amoris igniculos, terræ sul-
 gur appellat. Quod vero Philostratus Rosæ hanc
 assignet attributa, nemini mirum videbitur, si Ana-

creontem Tejum Poëtam græcum vetustissimum
 quem Henricus Stephanus præquam eleganti car-
 mine lauro reddidit, canentem audiverit:
 Rosa hinc decusque florum,
 Rosa citra, amorque Verus,
 Rosa cælitus est voluptus,
 Rosæ puer Cyberes
 Caput implicat coronis,
 Charitum choras frequentans.

Apud Achillem Taciū l. 2. de Leucippe & Clito-
 phonte, invenitur sequens encomium Rosæ. Si flo-
 ribus vellet Iupiter imponere Regem, Rosa inter
 flores regnum obtineret. Tetra est ornamentum,
 plantarum decus, oculus florum, prati rubor, pul-
 chritudo corulans. Amorem spirat, Veneris est
 conciliatrix, formosis foliis comata est, nobilibus
 frondibus luxuriat: Calix Zephiro ridet.

Rosa etiam Veneri sacra est. Virgilius in Rosa:
 Sideris & floris est anima una Veneri.

Hac autem ratione Veneri Rosam dicarunt anti-
 qui, ut quemadmodum brevi hac tempore duret, &
 ocyssimè marcescat, sic forma & voluptas vene-
 ritè pereant. Quod Hieronymus Angerianus a-
 pud Curtium festivo hoc disticho notavit:
 Pulchra brevi duras Rosa tempore, forma brevi que
 Tempore sic forme par Rosa tempus habes.

Rosam porò brevi temporis spatio durare, in finit
 elegantissimus hic Theocriti versus:
 Καὶ τὸ βραχὺ χρόνον ἔχει, καὶ ἡρόδιον ἄνθος ἔχει.
 Et Rosa formosa est, sed tempore marcescit & areet.

In quam sententiam elegantè distichon extat Ioan-
 Majoris Poëtæ celebris.
 Vt Rosa manè viget, tamen è mox vesperè languet,
 Sic mūdō qui sumus, cras levis umbra sumus.

Et alterum ejusdem:
 Vidi egredere Rosam Solū cum lumine nasci,
 Et vidi rursūm Sole cadente mori.

Huc facit & illud:
 Πόθεν τὰς ῥόδους, ὅμοιον ἔστιν ἄλλοθεν.
 Ne queere rursūm præterit am semel rosam. i.e. Adagia.
 Ne te maceres desiderio rerum, quæ revocari resti-
 tuque non queunt, velut exatæ juvenæ, formæ,
 virium, fortunæ. Nam ut nihil est Rosa gratius, ita
 nihil minis diuturnum. In eodem sensum dixit in
 Odis Horatius,
 Mitte scitari Rosam, quod locorum Sera moritur.
 Habent enim Rosæ suum tempus, sed perbreve. At
 exquisitius delicatè etiam alieno tempore Rosam
 querunt. Vnde quadrabit in eos qui jam
 voluptates scctantur: veluti si Nucibus ludat vir,
 aut a nec, potitè venen ex Rubet præterea, pungit-
 que. Nam & libido ipsa vercundie opprobrio eru-
 bescit, pererratique aculeo stimulat. Græcorum
 tamen nonnulli Palladi Rosam attribuant, propter
 Myrsinē Atheniensem puellam. Huc etiam refer-
 tur distichon hoc Virgilij:
 Cæle virgo Rosas, diu flos norus, & nova pubes:
 Et memur esse eum sic properare eum.

Ovidij illud de arte amandi:
 Forma bonum fragile est, quantūque accedit ad
 annos,
 Fit minor & spacio carpitur ipsa suo.

Nec semper Viola nec semper Lilia florent:
 Et riget amissa spina relicta Rosa.

Olympij Nemesciani in Bucolico ludico:
 Non hac semper eras, perdant & gramina flores:
 Perdit spina Rosas, nec semper Lilia cadent.
 Nec Longem tenet Vna comas, nec Populus umbras.
 Dum forma brevis est, nec se tibi committat annis.

Priscis, sicut & recentioribus, Rosam in honore ma-
 ximo fuisse, satis superque compertum est, eorum
 etiam monumentis. Quod vel imprimis hoc a-
 dagio Græco comprobatur: ἡ ῥοδὸς ἡμῶν ἐν παλαιῶν
 id est,

Indicium odori.

Græca, Lychnis.

Græcula.

Moscuton.

Rosa coloris.

Fabula de Rosa colore.

Cupidinis sanguis.

Veneris sanguis.

Nectar Deorum.

Cupidinis sacra.

Encomium Rosæ.

Florum re-

gina.

Veneri di-

cat. a.

Brevi tem-

pore durat.

Adagia.

1.

Palladi ad-

scripser.

Adagia.

id est,

Rosam eam id est, *Rosam cum Anemona confers.* Vbi quis im-
anemona paria inter se componit. Est autem Anemone, Pa-
confers paveris genus, cuius flos, specie Rosam imitatur, ex-
 ter in nulla odoris gratia. Est & aliud, *Rosam loquax*,
Rosam loquax id est, verba gratissima, & Rosarum instar amabilia.
 Et Persius ait:

3. *Quicquid calcaverit hinc, Rosa fit.*
 Quod adhuc vulgus in homines gloriosos profert.
 4. Adde & hoc quod Cræti philosopho adscribitur,
Sus per Rocas [& *Rosæ b. d. d.*] Est autem Rosæ odor huic
 animali naturâ contrarius. Consule hac de re Ca-
 merarij cent. 2. p. 8.

Virentis in- Inter Philologica, quæ de Rosâ sese offerunt, im-
dicium. primis placet illud quod apud Claudianum legitur:
Armatissima Rosas: id est, nihil absque labore iucun-
 dum. Lege Camerarij cent. 1. p. 58. Rosæ itaq; indi-
 cante allegoricè animum heroicæ virtutis præditum,
 consilia & facta singularia, non à quovis prælitata.

Veterum Sed relictis Poëtis, missis Græcorum fabulis, reci-
Rosâ nostris tatis Adagijs, investigemus quænam sint illa Plinij
accommo- Rosarum genera, & utrum eorum quædam ad nos
dentur. usque pervenerint. Cæsalp. sua veteribus accom-
 modare studet, sic: Quæ roseo colore est, nascitur in
 frutice valdè hispido, quætern cubita excedente,
 primò floret inter cæteras: Campanam videtur ap-
 pellare Plinius, quæ præcox est, & Trachiniam mi-
 litudis rubentem. Apud nos in Italia præter Car-
 neam Rosam, quædam rubens est multifolia, odore
 jucundo, sed exili: hæc Plinius Miliariam vocat, colore
 ardentissimo, non excedentem duodecim folia.

Rosâ vulgo Alia apud nos huic similis inter peregrinas videtur,
incarnata colore magis diluto, accedente ad carnæam, latissimis
 folijs, pluribusque in se convolutis, ut explicari
 nequeat, odoratior tubente: Eius frutex parvus est,
 & folus spinis caret: hæc Græculam videtur Plinius
 appellasse. Quarta candida, maxime omnium nu-
 merofo folio constat, sed parva, & odore valdè exili.
 Plinius hæc Alahandicam vocat, viliorem albican-
 tibus folijs: & Spernoniam plurimis folijs, sed mi-
 nutissimis, utilissimam, non multò odoratam. Quæ
 ex translatione in Campania, & circa Philippos a-
 ded profecit, ut latissima, & maxima folia provenerint,
 non tamen odoratissima quam Centifoliam vocant,
 Muscatula apud nos appellatur, ob odoris
 excellentiam, sed quæ opere Topiario colitur: caudice
 cæteris crassiore: ramis longissimis: aculeis rari-
 oribus. Rosa parva ex quinque folijs constans
 candidis, multis intus floccis, pulvificulum luteum
 fundentibus, amarior hæc & majorem vim purgan-
 di habet: tardissimè floret, & perdurat usque in au-
 tumnum: In hoc genere quædam reperitur multi-
 folia, fortè Prænestina apud Plinium, quæ celebra-
 tissima, novissimè definit. Sylvestris in sepibus spon-
 tè nascitur, virgis prælongis, Rubo similibus; in
 quibus sæpè spongiolæ villosæ visuntur: fert par-
 vam Rosam, non excedentem quinque folia, colore
 albo, aut subrubente, exili odore: alioes virgæ, &
 spinosiores sunt, quibus subrubentes Rosæ, humi-
 liores quibus alba: Dioscorides eandem Cynosbaton
 appellat, quasi Rubum caninum: Theophrastus
 inter Rubos tertium genus describit: Theodorus a-
 liquândo Caninam sentem vertit: Plinius modo Cy-
 norodon, modo Cynosbaton vocat, videturque
 diversas intelligere: nam Cynorodon, radicem
 sylvestris Rosæ facit; Cynosbaton verò Rubi
 genus, Rosæ similitudine. Quin & Capparis quo-
 quæ Cynosbatus vocari traditur ab eodem. Sunt
 & Rosæ luteæ quinque folijs constantes, ut sylvestres,
 latioribus tamen: odore ingrato: frutex, & folia si-
 milia sylvestri. Phirius alteram Græculam vocat, Pal-
 lidam, spinosam, longissimis virgibus quinque foliam.
 Addit autem Plinius alia genera, ut Græcam, quæ
 Lychnis vocatur à Græcis & Moscuton, sed ex

Rubiola aquivoce potius Rosæ appellata sunt; alio loco ex-
 plicanda.
 Athenæus Rosarum differentias ex Theophr. po-
 nit, nec plures. Ex recentioribus Hermolai præter
 ea, quæ ex Plinio transcrit sit ipso innominato, de
 suo nihil adiecit, quàm quòd apud Plinium in mauli-
 legi Spermioniam, quàm Spinolam aut Spinofamita
 enim, sive quòd minutissimo folio, sive quòd vilissi-
 ma sit oranium, rectissimè ipsi videtur appellata, at
 tamen esse quosdam qui Sycioniam legendum pu-
 tent. Nec probat quod nonnulli Musceton legant,
 quandoquidem Aceton & Moscuton melius red-
 datur à propagine, viviradicève, quam Græci Mo-
 scheuma dicant. Cæterum, ambigit Coronæola sitne
 Cynolathi, an Cynorrhodiflos: quanquam Cyno-
 bathi magis putet. Cynorrhoda porro silvestres esse
 Rosas dicit, licèt Aristoteles eam videatur appellas-
 se Cynacanthem, hoc est, Caninam sentem.
 Curtius particula in ex sua observatione Præsta-
 nam celebrat, à Præto Calabria oppido, passim in
 autore commendabilem, quotannis bis germinat-
 tem. An autem ea sit, quæ nunc Damascena dicitur,
 ignorat. Parva enim hæc, inquit, candidi & rubei
 coloris, egregij odoris. Plures autem ab uno geni-
 culo exeunt. Ultima autem hæc germinata est, ve-
 rum continuè & hieme etiam tepidioribus locis flo-
 ret. Est & Provincialis in Gallia ab oppido sic cogno-
 minata, colore inter album & rubrum medio, quem
 incarnatum vulgus vocat. Ethrusia has Anconitanas
 vocat. Odoratissima non sunt quibus folium maxi-
 mum & latissimum. Odoratiorès, quo rubicundio-
 res. Indicum autem odoris corticis scabritia. Qua-
 rit in probl. Arist. Cur suavius Rosæ oleant, quibus
 asper, quàm lævis umbilicus sit. Quod magis secun-
 dum suam naturam constitutæ sint. Naturâ enim
 sua, Rosa spinosa est.

Rubiola Differentiæ Rosarum quas Ruellius in longum
 recenset, alia non sunt, quàm Theophrasti & Plinij,
 quamvis pro suis venditet.
 Tragus Rosæ hortensis hæc ponit differentiam, *Tragi diff.*
 ut alia candida sit, alia ex purpura albicans, quædam
 rubra. Et rursus in hoc genere ura simplici: altera
 multiplici foliorum ordine. Rosæ verò sylvestris
 quatuor fatigia constituit. Cujus primus genus,
 ejus quidem judicio, Cynorrhodor Barbari fuerit,
 nobis Rosâ silv. folio glabro: secundum, Spiræ Ma-
 ritæ nominatum, est nobis Rosâ Eglerina, sive so-
 lis odoratis: tertium, Rosam cinnamominam flore
 subtubente conjectamur; ceu ultimum, cum priori
 Rosâ canestri dicta, Rosam sylvest. folio glabro,
 flore planè albo. Et ita Tragus distinguit, satis ofci-
 tanter.

Rubiola Matthioli de Rosis Italicis, pauca hæc habet.
 Multa quidem sunt Rosarum genera, quæ in usum
 medicum veniunt. At vulgarissima in Italia sunt, al-
 bicantes, puniceæ, & quæ ex albo rufescunt, quas
 vulgò appellant incarnatas. Quædam etiam aureo
 colore fulgent, odore admodum ingrato ac insuavi.
 Rosæ hortenses alba (inquit Gesn.) multiplici
 folio, passim apud Tigurense in hortis abundat,
 frutice prociore, quàm rubrarum, quæ tum sim-
 plici, tum multiplici folio constat. Vidi & Rosam
 dimidiâ parte candidissimam, alterâ purpuream.
 Rosæ Alexandrinæ, vel Persicæ, vel Damascenæ,
 vulgò Incarnata dictæ nunc nobis satis frequentes.
 Damascenas autem vocant, quoniam ex Damasco
 Syriæ urbe advectæ creduntur. Rosæ citrinæ, seu
 luteæ. Rosæ moschum fragrantès luteæ. Rosa
 lutea in odora, vulpina cognominata. Rosa mu-
 scata alia à præcedenti simplex & multiplex. Rosa
 muscata vel Damascena parvæ, simplices, albæ, flor-
 rentes in Italia toto ferè anno. Alia nobiles, den-
 si folio, flore parvo, purpurei coloris dilu. Ad hæc purpur.

Albo-citrina.
Marina.

Rosæ alix albx ad citrinum tendentes, parvæ, tria, quatuorve folia habentes (quales hæ Rosæ sunt, nos late) per totum annum in arbore ferè vidèda, Muscata ab odore, vel Alexandrinæ vulgò appellatæ, ab aliquibus Damascenæ. Hæ verò odore caput tentant: & potentissimè alvum subducunt, non minus auctore Manardo, ac Scammionio: ita ut si sex, vel octo folia acetario miscueris, totum purgatorium teddas, qua de causa ab illis tanquam pernicioso medicamento, naturæ vim inferenti, abstinendum censet. In Hispania rarò videntur & ab aliquibus cum incarnatis confunduntur. Audio easdem Marinas à nonnullis vocari.

Sylvestris.
Cynorhoda.

Monachi Rosam Damascenam *Moschete* vulgò dictam, è silvestrium genere esse putant, sicut & incarnatam, vel trentaphyllam, à foliis triginta, & albam Centifoliam dictam. Rosæ sylv. Cynosbati, vel Cynorhodi veteribus dictæ, passim sepes vivas replent. Rosæ sylv. alia humilior in collibus siccis & apricis toto frutice suavissimè odorato. Rosæ sylv. à Maio mensis denominata *Mayenrösle* spontanea in Albio monte, fuerit Rosæ campestris Tragi, rosà colore magis rubro tinctâ. Hujus altera species, rosâ prorsus candidâ.

Clusii diff.
Centifolia.
Batavica.

Insignis Botanicus Clusius prodidit nobis Rosas Batavicas, Austriacæque, ita scribens: an, quæ apud Batavos Centifolia nomine dicitur Rosa, non nunquam euan centenis vicenis foliis, ea sit, cuius Theophr. & Plin. mentionem faciunt, hæc. Istius stirpis altera, alho flore, mediè inter illam & proximè sequentem magnitudinis, alba major Provincialis appellata, ut superior major Prænestina. Sed & rarius Centifoliae genus, priore aliquanto minus, colore alioqui, odore & forma conveniens. Non desunt, qui Prænestinam albi coloris inveniri asserant, quæ nisi nondum videre contigit, nisi ea sit, qua n. V Vilh. Oltterra. Francofurt. unicam in horto suo alit, flore multò dulciore Prænestinâ, & sefè albicanate. Illi congenere esse videtur Rosa versicolor, Ioannis Resseau Colonienfis. Accipio etiam Rosas flavas multiplici foliorum ferie præditas existare. Cæterum, ad eas, quæ præter vulgares à me observatæ sunt, redeam. Illarum autem varix sunt species. Prior Prænestinæ, Provincialis vocatæ, valdè similis, flore saturatius nonnihil rubente, & eadem albo, Centifolia alba vocata Batavis. Rosa 2. sive sine spinis, ejuisque varietas flore albo. Rosa sine spinis altera. Rosa cinnamomea pleno fore. Rosa humilis flore albo, Græcula Plinij fortè. Rosa campestris odora. Rosa pumila sive Chamærhodon. Herodotus in Vrania, sive l.b.%. Rosas in Mida: Gordio geniti hortis sua spontè nasci refert. Scaxegenum foliorum, fragrantiore odore, quàm cæteras.

Prænestina.
Arva.

Tabern. has agnoscit differentias. 1. Rosam albam. 2. Rosam rubram, quam vocari ait Milefiam, purpuream & puniceam. 3. Rosam provinciam majorem, Persicam, incarnatam & purpuream dictam, ut 4. Provinciam minorem. 5. Rosam sine spinis. 6. Rosam muscatam albam. 7. Muscatam albam multiplicem. 8. Rosam luteam Ægyptiam & Vulpinam dictam. 9. Rosam Eglienterianam, Dunesem & Pampinulam cognominatam. 10. Rosam silvestrem. 11. Rosam arvinam.

Versicolor.
Flava plena.

Lacura Rosam domesticam triplicem facit, albam, rubram, & incarnatam, additque quartam vulgariter Mosquetam, vel Damascenam dictam. Rosam silvestrem ait Cynorhodon Græcis vocari, Plinijque ac Hermolaum eam cum Cynosbato confundere, quàm verè judicent alij.

Centifolia alba.
Rosa 2. sine spinis.
Humilis.
Campestris.

Foliorum 60.
Tab. diff.

Milefia.
Persica.
Sine spinis.
Muscata.
Ægyptia.
Eglienteria.

Sylvestris.
Lacura diff.
Domestica triplex.

Hermol. & Plin. notat.
Lab. Asser.
Rubra.

Cantiana.

Lob. in Adv. Rosas Angliæ, Belgij, & Northmanniæ vadit: Triplex est vulgarioris è colore differentia: nam aut purpura sanguinea saturatè punicea: vel aspectu niveo micant: aut candore & rubore

confusis, flammæ rutilant, virgineis genis concolores, quas plebecula pallidas vocat. Silvestris nativæ varietates notatæ dignæ: Cinnamomea præferim florum foliis miris. Moschatæ silvestrum exuerunt animum & hortenses duplè factæ. Pares & illis luteæ Gallicæ inquilinæ factæ. Eit & jamiu caruleas videre. Est species vulgò *Eglenime*, ou *Ef. gienier* dicta foliis odoratis. Est alia pomifera, morifera, aut baccifera Quenon Rosæ dicta.

In tradendis Rosarum differentis diligentior paululum Lobelio Dodonæus est. In factivum Rosarum numero prima, inquit is, Rosa alba, Plinij Spineola esse potest, si modo Campana non sit. Altera, quam Incarnatam Italia nuncupat, Alahandica similis est. Tertia, Provincialis Gallis dicitur: hæc Milefiam esse, non temerè suspicari licet. Quartam Rosas Franchas Gallæ, Plinius Trachiniam fortè, aut Prænestinam dixerit. Quinta Moschata ab odore dicitur: Damascenam autem & hanc nonnulli appellant. Sexta Rosa sylv. propriissimè, hirsutis sylv. pilulis, spongiosis dictis. Septima Cinnamomea appellatur. Octava à colore nomen accepit, Lutea dicta. Nonam, Dunesem nominant, ab ipsis in marino littore arenosis tumulis, quos vulgò *Quynen* nominant: Sunt qui Pampinulam nuncupant. Decima Cynorhodon, sive carina Rosa odorata, Gallis Englienterium, teste Ruellio, nominata, quæ & hanc Cynosbati, sive Caribulum esse suspicatur. Lugd. vult Campanas Plinij, esse Rosas nostras albas: Damascenas foliis densissimis, Alahandicas, Spineolas & Centifolias: Rosas verò Prænestinas, rubras, & in iis Milefias, quas Galli *Roses de provins* appellant. Trachinias minus rubentes, quas *Roses maritimes*. Græca rubra etiam est, ut ille equidem sentit, quomvis Plinius colorem non expellerit, eaque multorum sententiâ, quæ Damascena rubra nominatur, *Rose de Damas rouge*. Græcula etiam multorum judicio, Rosa Damascenæ genus est, flore ex albo ad puniceum nonnihil vergente, *Rose de Incarnate. Damas incarnate*: Moscheutos Rosâ Plinio quæ sit ambigitur. Sunt qui inter Damascenas numerent, alij inter Rosas sylvestres passim nascentes in dumis. Damascenorum cortex malvacei corticis modo lætius quidè vires, quàm cæterarum n, sed que foliis sit Oleæ nullam adhuc compent Dalechampsii, quamquam in quibusdam exemplaribus folia lævia legantur, non Oleæ. Cæterum, Moscheuton Rosam dictam putat, non quòd Moschum oleat (ut vult Dodon.) antiquis incognitum n, sed quòd *uboris*, id est, stolonibus multis fructificet, vel quòd *uboris*, id est, malleolis scilicet paragarit Vitis modo, non folium vivi-radice. Coronocolam à coronis nominant, sive seram, sive Autumnalem, Damascenam esse ferè omnes autumant, tum quod Autumnò proveniat, tum quod odore suavi prædita sit, Galli *Rose Musquée Muscadelle* vocant. Ea duplex est, Quinque folia una, & altera densa. His addenda Lutea veteribus indicta. Cynorhodon universè quidem Rosam omnem silvestrem Plinius appellat. Hujus autem generis duo observarunt Herbarij, sylv. Rosam vulgarem, & Cynorhodon Polyacanthon, forma Rosæ sativæ.

Camæ. in horto memorat primò albam simplicem & plenam, quam Campanam præcocem Plinij dicit. 2. Laeticolam, Centifoliam eandem putat. 3. Rubricandam non omnino debiscentem, ut Plinius Rubicunam. 4. Incarnatam, Norimbergæ Vilmensem à loco vocatam, veterum Prænestinam existimat. 5. Intensè rubentem simplicem, vel plenam à pharmacopœis Finam appellatam, Plinij Milefiam facit. 6. Rosa purpurea, à priore parum discrepans, videtur ipsi Trachinia Plinij. 7. Damascenam sive Moschatam nominat, eamque simplicem facit, plenam,

Pallida.
Cinnamomea.
Moschata.
Lutea.
Carulea.
Eglenime.
Pomifera.
Dodon. diff.
Alba.
Incarnata.
Prænestina.
Quarta Francha.
Moschata.
Cinnam.
Lutea.
Dunesem.
Cynorhodon odorata.
Lugd. diff.
Rosa alba.
Damascen.
Roses de provins.
Roses maritimes.
Rose de Damas rouge.
Rose de Incarnate.
Moscheutos unde.
Dodon. notatur.
Coroncola.
Damascen.
Rose musquée.
Muscadelle.
Lutea.
Cynorhodon vulg.
Polyacanthon.
Cam. diff.

Intensè rubens, sive Fin.
Rubicuna.
Incarnata.
Dam. yce.
na sive Moschata.

plenam, quam Coroneolæ Plinij accomodat. simplicem verò Nefrin, vel Nefrin Serap. & Avic. vocat. 8. Rosam cinnamomeam simplicem, pro Lychnide Plinij Gesnerum habere tradit. 9. Venetam, quam alij Provinciales vocant, Spermoniam Plinij credit. Idem celebrat Rosam absque spinis, ea npe stretem odoratam Clusij, sive Pomiferam, ut existit nat Lob. quamvis hic sine spinis pingat, cum tamen sit spinosissima: Luteam Apennini in Italia inquilnam; & herbacei coloris Rosam. Ait tandem Rosam caninam, *ωρίσπον*, etiam duplicato in veniri flores, quæ pro Alabandica Plinij haberi queat.

Cinnamomea simplicem. Absque spinis.

Lutea.

Cynorrhodon plenum.

C.B. differ. Purpurea. Alba.

Rubra saturata. Non ita saturata. Mojchata.

Carent spinis. Syl duplex. Pimpinula.

Elegantiora. Pomifera. Rotundifolia.

C.B. apud Match. dividit Rosam in sativam & silvestrem. Sativam purpuream. In carnatam Italorum, Trachiniam Plinij credit. Alban mavult ejusdem Campanam dicere, quam Spineolam cum Dodonaos, nisi sit Alabandica. Rubra saturati coloris, videtur ipsi Milefia: flore simplici & multiplici: flore non ita saturate rubente, fortè Prænestina Plinij: & hæc vel simplici, vel multiplici flore. Moschata ab odore, Nefrin Serapioni: alia simplici, & quidem vel majore, vel minore flore: alia pleno flore. Spinis carens major & minor. Sylvestris vulg. cui B. de-guar adnascitur, flore simplici & pleno, ut & illa, quæ Cinnamomea dicitur. Lutea veteribus indicta, flore simplici, rarissime pleno. Pimpinula, à similitudine foliorum Pimpinellæ. Odoratis foliis, Efelanterium vulgè & Spina Mariae. Campestris humilis, vel avenacea flore albo & rubello. Pomifera. Rotundifolia.

Idem in pin. sequentes assignat Rosarum differentias: sativam, & 1. rubram Milefiam Plinij, simplicem & multiplicem, colore magis minusque rubro: ad hanc refert Milefiam rubram plenam vulgo Rosam finam, Milefiam simplicem, Rosam ex rubro nigricantem plenam; & rubicundam Saccharinam dictam, Græculam Plinij, Camerario. 2. Rubram pallidiorum. 3. Saturatius rubentem. 4. Purpuream, Trachyniam Plinij. 5. Verficolorum. 6. Maximam multiplicem. 7. Mediam multiplicem. 8. Majorem Prænestinam. 9. Albam vulgarem majorem, Campanam Plinij. 10. Albam minorem. 11. Moschata simplicis flore. 12. Moschata plenam flore pleno, Coroneolam Plinij. 13. Moschata semper virentem. 14. Spinis carentem flore majore. 15. Spinis carentem flore minore. 16. Subviridem. 17. Rosam folio subrotundo & cuspido. Sylvestrem, & 1. Vulgarem flore odorato incarnato. 2. Sylv. flore majore & rubente. 3. Sylv. flore pleno. 4. Sylv. foliis odoratis. 5. Sylv. odoratissimo rubro flore. 6. Sylv. odoratam albo flore. 7. Rosam odore Cinnamomi simplicem. 8. Rosam odore Cinnamomi flore pleno. 9. Rubram præcœm simplicem. 10. Minorem rubellam, vulgo Majalem. 11. Luteam simplicem. 12. Luteam multiplicem. 13. Campestre spinosissimam, albam, odoram. 14. Sylv. pumilam rubentem. 15. Sylv. pomiferam majorem. 16. Sylv. pomiferam minorem. 17. Arvensem candidam. 18. Campestre repentem albam. 19. Campestre spinis carentem, bifloram.

Et hæc ferè sicut Rosarum propnè dictarum differentia, quas ordine paulò post recensentes describimus: hic verò breviter annotabimus alias plantarum species, quæ Rosæ nomen obtinuerunt. Non igitur est institutum nostrum agere hoc in loco de Rosa illa, quam apud Io. Agricolam Io. Pollio Oenipontanus quidam Medicus sibi in Suevorum Brigioia monstratam prædicat quam incolæ Rosam & Liliam inter spinas appellant. Ea enim nostro judicio Peridymentum fuerit, de quo lib. 15. Nec agimus de Rosa menapia, Sambuci aquatilis specie Dodon. quæ Sambucus rosca est, de qua lib. 5. Nihil dicimus de Rosa canina, ex qua Luminare

Acquis voca.

Perichlimum. Sambucus rosca.

majus hypocistide n fieri scribit. Ea enim Cistus est: Cistus de hæc lege lib. 3.

Nec hic nobis sermo est de Rosa marina & Rosæ Cistus mas slein Lanzana, quæ dicitur Cistus mas major lib. 13.

Tacemus Rosam Persicam Avicennæ in Jencia-bi n, quæ Anat. ad stipulante, non est genus ali-quod Rosarum, sed flores Persicæ. Hæc tamen opinio refellitur à Matthiolo. Separamus à Rosis propriè dictis Rosam montanam sive alpinam, Berg Rosen Ar. tij, quam quidam Nerium alpinum vocant li. 13.

Silemus Rosæ Alpinae speciem alteram foliolis minimis Gesneri, quæ fortè Anonymos 2. Clusij fuerit, de qua lib. 5. sub Ericaë baciferæ affini.

Præterimus Rosam Hiericonteam de qua lib. 15. Rosæ hierici. Missam facimus Rosam Hiericontis Fragosi, quæ Herba maxima nobis Herba maxima l. 25.

Omittimus Rosam transmarinam vulgi Ruellio. Hæc enim Malva rosca est, lib. 25.

Non tradimus Rosam Zaveni, quæ Althea est, Althea trader da lib. 25.

Non statuimus dicere de Rosa Græca, quam quidam Baptuseculam volunt, malè. Cyarus est lib. 26.

De Rosa Indica Gesner hort. hic non loquimur, sed lib. 25. sub Tageti Indico.

Sic & de Rosa mariana sexta Tragi, sub Pseudo-melanthio.

Et de Rosa mariana quinta, sub Been albo.

De Rosa mariana sylv. flore rubro, sub Ocymoi-de rubro.

De Rosa mariana sylv. flore albo, sub Ocymoi-de albo.

De Rosa Junonis vel Junonia, quod Lilium est, scribimus lib. 19.

Rosam Solis, vide Rosam solis lib. 17.

Rosæ nomen attribuit Rhodiæ radici, quam tradimus lib. 35.

Rosæ arbor est Nerium, de quo lib. 15.

Rosæ nanna Cæsalpini describitur lib. 39. cap. de Eschara.

Rosa de qua hic agimus, Græcis *ῥόδον* dicitur quasi *ῥοδον* pro *ῥοδον*, & Ety nologico: At ex mente Plutarchi 3. symp. *ῥοδον* *ῥοδον* *ῥοδον* *ῥοδον*, quod largum odoris effluviu emittat. Ab Arab. vocatur *Nard, Naron* seu *Nard*. It. *R. s.* Germ. *Rosen*: & Angl. *Belg. Roose*: Hisp. *Rosas*: Gall. *Rose*: Boh. *Rosa*. Stirpis ipsa, quæ græcè *ῥοδον* dicitur, apud Latinos cum flore nomen idem retinet: Germ. *Rosenstauden*: Gall. *R. s.* Virgas stirpis Rosarum, Strabus poëta Gallus Viburna nominat.

Deburnam Viburna Rosa præensa met allo.

Notandum apud Galenum per *ῥοδον*, Rosam, intelligi totum florem; per *ῥοδον*, verò solum, sive partem, & non ipsius stirpis. Eadem enim est flora-sis Germanica cum Græcis, quando dicunt *Rosen-bletter* de flore. Sed & hic observandum, an quod Gal. dicit in Philoxeni remedio ad fluxum & dolorem; Item in Diarhodo, *ῥοδον ἀμαλῶν ῥοδον*, quod vertit Cornarius recentium, sit legendum mollium aut tenerorum, ut intelligat quod idem dicit in Diarhodo, *ῥοδον ἀνθηρῶν ῥοδον*. Ipsemet præterea Cornarius apud Diosc. *ῥοδον* vertit tenera: ita ut ea sint teneræ partes, quæ separantur ab unguibus, qui duriores sunt. Manardus ait, Partes eas candidas, quæ capiti de proximo hærent, præcidi à Seplassariis, Rhodomeli vel Rhodofaccharum reliquo paraturis. Ethinc Rosas tales exungulatas appellari: un-guem verò, qui calycibus inferitur & græcè *ῥοδον* dicitur, à Galeno tum alibi, tum lib. 4. *ῥοδον* vocari, id est, extremitatem. *ῥοδον* verò *ῥοδον*, quod (ut Diosc. dicit) in medio Rosarum reperitur, flos Plinio dicitur, id luteum scil, quod foliis circum-quaque ambitur, separatum in capillum, id est, in tenuia quædam fila, & in semen quod sub his filiis

Cistus.

Rosæ mas major.

Persicæ arbor.

Nerium alpinum quatuorundam.

Anonymos 2. Clusij.

Rosæ hierici.

Herba maxima.

Malva rosca.

Cyanus.

Taget Indica.

Pseudomelanthium.

Beenalbium.

Ocymoides rubrum.

Ocymoides album.

Lilium.

Ros Solis.

Rhodiæ radix.

Nerium.

Eschara.

Nanina linguarum.

Rhodonia de fruce.

Viburna.

Rosarum silis.

Rosæ exungulata.

ῥοδον.

ῥοδον.

ῥοδον.

ῥοδον.

ῥοδον.

ῥοδον.

ῥοδον.

ῥοδον.

lanugine quadam opertum cortice continetur: in
 Officinis tamen, ut dicit Dodonæus, & ab Arabibus
 Medicis, Anthera nominatur. Minardus contra flores,
 Antheræ nomine recentiores significasse continet.
 Quod & nomen ipsum manifestat, cum ab eo, quod est
 ἄνθος, id est, flos Rosæ deductum videatur, voce tamen
 (ut fieri vulgè solet) paulisper decurtata. Est & Anthera
 compositio nomen, quarum Plinius 24. Celsus 6. Dioscori Galenus
 de compositione secundum genera, Paulus & plerique in suis
 libris meminere. Ceterum, Dodonæus & Manardus non
 distinguunt ἄνθος à capillamentis, id quod facit Tragus:
 qui Anthos vocat puncta lutea in Rosis. Capillamenta
 autem vocat fila illa quibus insident puncta. Nunc
 ἄνθος ad ἄνθος, id est, flos Rosæ, dicitur, Dioscori, dicta,
 id est, Capita Rosarum Plinio, in quibus semen gignitur,
 dicit Manardus esse solidum illud, quod foliis & floribus,
 seu basis sub sternitur: cujus superior pars, ex qua
 flos & folia prodeunt propriè caput, reliquum calyx
 nominetur. Tragus calicem aut esse superiorem partem
 Rosæ non duntaxat. Dodonæo Calix vocatur, qui stamina
 & floris foliola complectitur & continet. Alabastri
 etiam sunt calycis partes laciniolæ, conum floris priusquam
 panditur, completentes: quæ quinque sunt, duæ
 barbutulæ, duæ imberbes, & quinta partim barbata;
 partim minime, quæ cortices Rosarum à plerisque
 appellantur. Per nodum Rosarum non intelligit auctor
 apud Monachos (scilicet Mesues) pomellum, sive
 pyrum in quo femina Rosarum concreverunt & ser-
 vantur ad maturitatem, quodque de fluxu foliis re-
 stat in planta & tempore maturationis fit rubrum:
 sed Calycem, folia florum Rosarum continentem,
 qui vulgariter Bolto dicitur. Fructum autem, ut in-
 quit Tragus, Rosæ maturum & rubrum, Germani
 Büttel, Bütteln, Arzßbütteln nominant. Semina de-
 nique sunt lapilli illi duri, qui in capite Rosæ in-
 cluduntur, ex quo novæ plantulæ proveniunt, sed tar-
 dè. Qui itaque Rosarum semen Antheram vocant,
 decipiuntur. Laræ tandem sunt capilli, in quibus
 lapideæ semina continentur.

Nascitur, auctore Theophr. Rosæ etiam ex semine,
 quod flos flore in malo inclusum habet, lanugine
 Cnici modo, aut Echini Carduorum obductum, omnia
 semina proxime ambiente: $\alpha\kappa\alpha\theta\omicron\upsilon\delta\epsilon\sigma\iota\varsigma\ \eta\ \alpha\lambda\alpha\upsilon\omega\delta\iota\sigma\iota\varsigma\ \eta\ \epsilon\gamma\gamma\eta\gamma\eta\sigma\iota\varsigma\ \eta\ \epsilon\gamma\gamma\eta\gamma\eta\sigma\iota\varsigma\ \eta\ \epsilon\gamma\gamma\eta\gamma\eta\sigma\iota\varsigma$. Sic enim
 nendiari debet filia hæc Gazæ lectio, $\epsilon\gamma\gamma\eta\gamma\eta\sigma\iota\varsigma\ \eta\ \epsilon\gamma\gamma\eta\gamma\eta\sigma\iota\varsigma\ \eta\ \epsilon\gamma\gamma\eta\gamma\eta\sigma\iota\varsigma\ \eta\ \epsilon\gamma\gamma\eta\gamma\eta\sigma\iota\varsigma$. Sic enim
 nendiari debet filia hæc Gazæ lectio, $\epsilon\gamma\gamma\eta\gamma\eta\sigma\iota\varsigma\ \eta\ \epsilon\gamma\gamma\eta\gamma\eta\sigma\iota\varsigma\ \eta\ \epsilon\gamma\gamma\eta\gamma\eta\sigma\iota\varsigma\ \eta\ \epsilon\gamma\gamma\eta\gamma\eta\sigma\iota\varsigma$.

Gazæ o-
 mendatur. $\alpha\kappa\alpha\theta\omicron\upsilon\delta\epsilon\sigma\iota\varsigma\ \eta\ \alpha\lambda\alpha\upsilon\omega\delta\iota\sigma\iota\varsigma\ \eta\ \epsilon\gamma\gamma\eta\gamma\eta\sigma\iota\varsigma\ \eta\ \epsilon\gamma\gamma\eta\gamma\eta\sigma\iota\varsigma$

Satis
 Cultus

Tempus.

Vita.

Ran. sp.
 na verius,
 quam sp.
 tex.
 Cortex
 alabastri.

Cyrenensis

est, idèque ibi unguentum pulcherrimum. Cartha-
 gine Hispaniæ hyeme tota præcox. Refert & cali-
 temperies. Quibusdam enim annis minis odorata
 provenit. Præterea locis omnibus siccis, quàm hu-
 midis odorator. Seri nec pinguis vult, nec argillo-
 sis locis, nec riguis, contenta raris: propinque ru-
 deratum agrum amat. Præcox Campana, sera Mile-
 sia. Novissimè tamen definit Prænestina. Fodiuntur
 altiùs, quàm fruges, leviùs, quàm Vites. Tardissimè
 proveniunt femine, quod in ipso cortice est sub ipso
 flore opertum lanugine, ob id potius caule conciso
 inseruntur. Et oculis radicis, ut Harundo, unum ge-
 nus inseritur pallidæ spinosæ, longissimis virgis
 quinquefoliæ, quæ & Græcis altera est. Omnis au-
 tem recisione atque ustione proficit: translatione
 quoque ut Vitis optime ocyssimèque provenit, sur-
 culis quaternum digitorum longitudine, aut am-
 pliore, post Virgiliarum occasum sata: dein per Fa-
 vonium translata pedalis intervallis, crebreque
 circumfossa. Qui præcoem faciunt pedali circa ra-
 dicem serbo æquam calidam infundunt, germinare
 incipientem calyce. Rosæ & quinqueannium profert,
 nec recisa, nec adulta. Illo enim modo juvenescit.
 Diximus & terram referre plurimum. Nam & in Æ-
 gypto sine odore hæc omnia: tantumque Myrtis o-
 dor præcipuus. Alicubi etiam binis mensibus ante-
 cedit germinatio omnium. Rosaria à Favonio fossa
 oportet esse, iterumque solstitio. Et id agendum, ut
 intra id tempus purgata ac pura sint. Rosæ recens
 longinquo olet, sicca propius. Omnis autem verno
 tempore acrior, & maturis: quicquid ad meridia-
 nas horas diei vergit, hebetatur. Novella quoque
 vetustis minis odorata. Acerrius tamen odor omni-
 um ætate media. Rosæ & Crocum odoratiora,
 cum serenis diebus leguntur: & omnia in calidis,
 quàm in frigidis.

Februario mense Rosaria conferenda, inquit Pal-
 ladius, sulco brevissimo, aut serobicibus ponenda
 sub virgulis, vel etiam mense. Si qua etiam
 sunt antiqua rosaria, hoc tempore circumfodiuntur
 sarculis, vel dolabris, & ariditas universa reciditur.
 Nunc & quæ rara sunt, possunt ductæ virgarum
 propagine reparari. Si Rosam temperiùs habere
 volueris, duobus palmis ab ea in gyrum fodies, &
 aqua calidâ bis rigabis in die. Rosas nondum pate-
 factas Maio mense serabis, si incana viridi stante
 illa, recludas ita, ut siliuram coire patiaris, & eo tem-
 pore cannam recidas, quo Rosas virides habere vo-
 lueris. Aliqui olla rudi conditas, ac benè munitas
 sub dño obruunt, ac reservant. Odoratiores fieri Ro-
 sas Didymus affirmat, quibus Allia propè fuerint
 confecta. Si velis sine temporibus intercapedine rosis
 frui, singulis mensibus loco stercoreato pangis, sem-
 per Rosas habiturus. Serendi ratio variat. Aliqui in-
 tegras plantas cum suis radicibus transferunt: alij
 in palmare taleolas cum suis radicibus in sabbolis
 modum cubitali intervallo deponunt, & crebris ir-
 rigationibus & stercore juvant. Nonnulli ut ma-
 jorem odoris fragrantiam adficerent, intertextatis
 coronas simul adobruunt. Majorem odoris gratiam
 habent quæ siccanis enascuntur. Vita, vigorque
 manet Rosis, quæ in amurca, si mergantur ut bumor
 extet. Alij ut diu serventur, hordeum dum in herba
 est, cum radicibus evulsam, in ficile non picatum
 demittit, Rosamque prius quàm dehiscens se pan-
 dat, operiri præcipiunt. Alij virentem hordei se-
 tem pavito loco stercunt, & rosas ipsas recondunt.
 Democritus fruticem bis die rigatum, Ianuario
 mense Rosas adere promittit. Florentius est au-
 thor, flos Rosæ in calculationis modo cortici mali
 infusam, eodem quo in malum tempore partus suos ex-
 cludere. Sunt qui recentes hac ratione custodiant:
 Alabastros turgentisque calyces in ventre adole-
 scentium

Lacus
 Satis.

Temperies
 Cultus.

Inseritio

Præcox ut
 faciendâ.

Durissimè
 In Acropoli
 inodora.

Rosaria
 quæ tempo-
 re colenda.
 Rosæ ubiq;
 quando o-
 odoratur.

Rosaria
 tum col-
 enda.

Vi præcox
 fuit.

Vi in can-
 na inseren-
 da.

Vi odor-
 atior fuit.

Serendi
 ratio.

Rosæ a-
 murca sic
 ta.

Recentium
 asseratio.

Icenis arundinis facta tirma claudunt, & papyro vel charta, molli ter fissuram obstrungunt, qua possit aura vel vapor expirari. Rosa protinus candore n contrahit, quæ suffutis nidore suffiatur, cum dehiscens in folia cæpit evolveri. Si plantaru n indigus volueris ex paucis virgulis habere copiosa, quaternu n digitorum paulove longiorum gemnantes surculos cum suis facmentulis debebis excidere, & in modum propaginis sternere, stercoratu rigationibusq; tueri: ubi annicula ætatem compleverint, pedis spatio inter se disjunctu transferre, luxuriante n materiam omnem adimere, crebris defossionibus exilbarare. Nicander apud Athenæu n.

Propagatio.

In Anglia bifera, & triflora.

Tempus.

Præterea Rosa spinis armata ex ipsa gemina Terra cum nuda infige, ad duos palmos aperta via: Operisque principio precibus Themidem Olemam venerare:

Alemdas deinde Rosas celestibus dimitte plurivis: Semper illa angefcet solum circum circa comã rbu:

Orbis delicia, inquit Lobel. florum princeps & honorosa, Angliæ florentissimi Sceptri, perinde aspicatissima, ac meritisissima testera, ut in quo regno hunc fructum, non modò ipsa bruma virentem, & interdum penè perpetuo folium, sed etiam mirè feracem, bisferum sæpè, quandoque triflorum videas. Florent Rosæ, quædam citius, aliæ sentis; omnes Maio aut initio Junij mensis. Præcoces Cinnamonine, & aliæ quadam sylvestres feriores lativæ sunt. Moschettæ mense Augusto & Septembri florent. Theophrastus, si Autumnus prolixior fuerit, Rosas etiam denudè erumpere posse testatur.

talis extat descriptio. Cynosbatos (ῥοζοῦλαζοζον. Cani Rubus. Gaza vertit) fructum edit subrubetū, Ro. Theoph. v. l. se [nè p̄sius lego, ut n̄ p̄as M. l. s. punctis, ut passim v. s. v. u. v. exemplaria habent] fructu similem: est inter fruticeam atque arborem Rosæ [nè p̄sius mensuram est, legendum eni m Rose r̄ū p̄d̄q;] similis, folioque æmulatur vestigium hominis [Exemplar n. s. r̄um v̄p̄nd̄s habet: v. r̄um Athenæus ex Theophrast. rectius v̄p̄nd̄s, splendent; Theophr. d̄s Hormil. v̄p̄nd̄s: M. l. r̄us v̄p̄nd̄s: Plinius rectè legisse ixyōdes putat Dalech.] & ita Gaza ex Plinio. Fructum flatu averfo colligendum censent, alioqui periculum oculis imminere. Aliàs non flatu accipere jubent.

Plinius de Cynosbato sibi minus constat. Rubi Rubus Pl. alud genus est (inquit L. c. 17.) Rose similitudine, m. qui vocatur Cynosbato. Et L. 21. c. 4. inter Rosas ait, Rosa nascitur spina vertis, qua n fructu in Rubo [Cynobato Dal.] quoque proveniens, illic etiam jucundi odoris, qua nvis angusti [late se non sp̄geniū, Dalech.] Item L. 2. c. 14. Cynosbaton, alij Cynospaston, alij Neurospaston vocant, solum habet vegetigio hominis simile. Fert [adde inquit Dalech. Chamæ Neurospabatos] & uvam nigram, in cujus acino nervum habet, [nervus habetur. alij] unde Neurospasto dicitur. Alia est à Cappari, quam Medici Cynospaston [Cappari non est. Plinius illud Neurospaston] que appellaverunt. Hujus Thyrsus ad remedia splenis & inflammationes conditus ex aceto manditur. Nervus ejus cum mastiche & Chia commanducatur, os purgat. Ruborum Rosa Alopecias cum auxungia cui merdat. Et ita Plinius qui Cynospasti historiam, cui fructus subrubet est, solumque ixyodes, miscet ac confundit cum Chamabato, quod uvam nigram fert, sive Morum Vve simile, ejus Rubi modò, quem erectum, ac procerum v̄p̄nd̄s vocat Theophrastus. Plinio ergo parit uvam nigram Cynosbatos, quod Plin. error. nemo præter eum, quod Ruellius sciat, confirmat. Error autem inde natus est, quoniam Smilax aspera Labruscæ modo ferens Vvas, Cynobatos à quibusdam teste Diosc. vocari solet. Rubus certè qui si nilitudinem Rosæ fert, Cynobatos à Plinio dicta est. Hoc Rubo nata mulis creditur Coronæola jucundo odore, sed exili. Aliqui Cynorhodon à Cynorhobato non flore roseo, quem fert utrumque, sed spongiosis distinguunt, quas Cynorhodon habet, Cynobatos non habet.

CYNORRHODON VETERIBVS.

Videtur Plinius per Cynorhodon aliam quam Cynobatum intelligere: nam de Cynorhodon inquit L. 3. c. 14. A morfu ad m r̄um alij unicum remedium oraculo quodam nuper reperitū nuper invenitū reperitū T. L. Iradix silvestris Rosæ, que Cynorhodon appellatur. In sanabilis ad hoc ænanos fuit rabidi canis morfus, pavorem aquæ potitq; omnis afficiens odium. Nuper cujusdam militantis in pratorio mater vidit in quiete, ut radicem sylvestris Rosæ, quam Cynorhodon vocant, blanditum sibi aspectu pridie in fructu, mitteret filio bibendam: in Lacetania res gerebatur. Hispania proxima parte: casuque accidit, ut milite à morfu canis incipiente aquas expavescere, superveniret epistola oramus ut pareret religioni, servatq; est ex insperato, & postea quisquis auxilium simile tentavit. Aliàs apud autores Cynorhodi una medicina erat, spongiosa, quæ in medijs ejus spinis nascitur, cinere cum melle alopecias capitis expleti. Et hæc de Cynorhodon Plinius.

Rosa fist. Cynorhodon.

Historia de videro remedio ad canis morsum.

Cynorhodi spongiosa.

Cynorhodon de Rosa fist. Rosa vibetula simplex, minor non spinosa. Rosa spinosa rubens.

Elium.

Dioscorides Cynosbaton bis verbis descripsit: Rubus canis Rubus caninus (ῥοζοῦλαζοζον) quem & ipsum alij Rubus Diosc. Oxyacanthiam vocant, sicut est Rubo (βότα) longè Oxyacanthia major, justa arboris magnitudine [βασὶ πόδας]. Folia fert multò latiora, quam Myrtus: spinas circum ramos robustas: florem album: fructum oblongum, Olive nucleo similem [ἐίδωρον] dum maturescit solum, in terna parte lanuginosum. Fructus siccatus sistit alvum, absque interno illo lanuginoso: hoc enim arteriam lædit, si in vino fervecit bibatur. Sic quondam verit Cornarius melids, inquit Lug. quam Ruellius, mendosos codices secutus: fructus rur. ex emptis interioribus floccis arefactus, alvum sistit: servecti enim in vino, mox poti arteriam infestant. Integer codex teste Lacuna habet: ῥοζον v̄p̄nd̄s n̄ v̄p̄nd̄s ῥοζον, ὅπερ τοῦ ἐν αὐτῷ ἀρτηρίας (καυδίας) ῥοζον ἄρτηρίας ῥοζον ἀπὸ τῆς ῥοζον, & m̄l̄id̄u ῥοζον.

Serapio historia: Diosc. quam tranferipit, ad jecit radicem fructu calidiorem esse, tusa & in emplastro ad motam, spinas & infixæ corpori extrahere: Folia quoque trita & imposita phlegmonas impedire ac prohibere: quæ cum in nostris Dioscoridis exemplaribus desiderentur, non sine ratione; ea manca hîc esse suspicari licet.

Galeno Cynosbati fructus fructus non segniter Cynobatos adstrictior est, folia verò mediocriter. Itaque particularis usus haud ignotus est. Cavendum ab eo, quod in fructu ejus lanæ speciem habet, cum arteriam vitians.

CYNOSBATVS VETERIBVS.

NE verò eorum aliqua omitantur, quæ ad perfectiore Rosarum cognitionem facere videtur, de Cynobato in præsent lacoricam in situmus historiam. Hujus itaque apud Theophrastum

Cynobatos Theophr.

Aquifol. Nunc verò, Cynosbati, sive Rubi canini æquivo-
 cationem paucis prosequemur. Ac primum quidem
Rosa foliis Cynosbato sive Cynospastos, pro Rosa foliis o-
odoratis. doratis Eglientina dicta, à quibusdam accipiuntur.
Capparis. A Medicis quoque Cynosbato, sive ut ipsi no-
 vimus, Capparis non raro dicitur.
Smilax a. Smilacem etiam asperam nonnulli vocant Cy-
spira. nosbato.
Chamaba- Plinius verò, autore Dalecampio, confundit
ros. Cynosbati historiam, cum Chamabato. Cynosba-
Veterum tus adhuc, vel ut alij Cynospastos, quem Plinius
Cynosbati describit, alius est à Theophrasti, & à Diosc. Cynos-
varius. bato differt.
Spina alba. Vltimò spinam albam voluerunt aliqui esse Dio-
 scoridis Cynosbato, ut facit Cornarius.

ROSA RUBRA, FLORE VALDE pleno, & femi-pleno, & simplici ferè.

Descri.

Virgæ.
Spina.

Folia.

Flores.



Rose rubræ frut-
 tex minor est
 quàm albæ aut ru-
 bellæ: virgæ non ita
 crassæ: spinæ multò
 rariore, nec ita
 mordaces, aliqui ra-
 mi etiam sine spi-
 nis: folia ex longi-
 culo pediculo, cui
 in principio veluti
 auricula: foliola sùt
 terna, vel quina, ut-
 trinque glabra, su-
 pernè magis virentia,
 subtunda: flores
 sive Rosæ, rubræ,
 magnæ, quædam plenæ ad-
 modum, coloris inten-
 sè rubri, sive pur-
 purei: quædam pau-
 cifolia: odoratæ omnes, & potissimum sicæ: flores
 sequuntur fructus sive capita sublonga, rubra ubi
 matura.

Fructus. Dod. sic describit: Tertia, similis in carnatis ramis
 & foliis est, sed subindè brevior, flore verò odora-
 tissimo, pulcherrimoque, saturato, & quodammodo
 puniceo rubore nitente. Rosarum omnium præstan-
 tissima, & ad medicamenta omnis ferè generis uti-
 lissima. Quarta, modò dicta brevior est, virgis cu-
 bitalibus, aut altioribus, flore eleganter rubente,
 sed minùs, quàm jam dicta, & quandoque simplici,
 quinque tantummodo foliorum, aliàs plurium: ali-
 quando etiam multiplici, odore grato & perquam
 jucundo.
Spina. De Rosis rubris scripsisse Dioscoridem, in de col-
 ligere licet, quia meminit unguis, quod est in folio
 album. Sed & Cord. in Diosc. hunc de Rosis ruben-
 tibus, quæ à Medicis receptæ sint, agere scribit.
Rosa fina Cam. h. Rosà intensè rubens, simplex, vel plena,
 vulgò Pharmacopæis Fina vocata, cujus foliis ex-
 siccatis, quoniam colorem & odorem diutius ter-
 vant, utuntur: Hanc Miletiam fuisse olim dictam,
Miletia. ex Plinio conjicitur. Rosa purpurea sive in rubro
 nigricans, & ceu violacei aliquid diluti admixtum
 habens, priore major, ab aliquibus *Bolrosen* appella-
Trachina ta, videtur Trachinia Plinij. Rosa rubicunda, non
 omnindè dehiscentis, ut Plinij Græcula, folio quoque,
 quàm in cæteris, latiore, odorata tamen. Ex quibus
Rosa Sa- Saccharum Rosaceum conficitur, unde apud nos
charima. *Süchser rosen* dicitur.
Spina. Dod. gall. Rosà altera culta, Rosa purpurea, &

Rosa rubra. Sub hoc genere continentur Rosæ Tra-
 chinia Plinio, cui in rubro magis nigricantes, sunt
 Rosæ Mileticæ: Rosæ fativæ quantum genus, & Rosa
 Miletia Plinij. Eidem de flor. & lust. Rosa fativa ter-
 tia, Provincialis Gallis dicta: hanc Miletiam esse non
 temerè suspicari licet. Rosæ fativæ quartæ, Rosa Fran-
 cha Gallis: Plinio Trachinia fortè aut Prænestina
 dicta.

Lob. Adv. Rosa purpurea sanguinea: ic. Rosa ho-
 losferica. Tab. Rosa rubra: item simplices & flore
 pleno, Rosæ Mileticæ, Rosæ purpureæ & Puniceæ.
 Cur hanc ita spinosam pinxit, an figura transposita
 per Compilatorem aut Typographum? Lugd. Ro-
 las Prænestinas existimat rubras & in iis Miletias, Miletia
 quas Galli *Roses de provins* appellant: item, Græca *Græca*
 Plinij [à Græcis *Lychnis*] rubra etiam est, ut Lugd. e-
 quidem sentit, quamvis Plinius colorem non ex-
 presserit, eaque, multorum sententia, quæ Damascè-
 na rubra nominatur, *Rose de Damas rouge*. Figura for-
 tè Rosæ rubræ convenit, cui in Hist. Lugd. titulus
 simpliciter Rosa. Considerandum an Græca Plinij,
 sive Lychnis, non sit potius herba? An porrò benè
 ad rubras Rosas referat Lugdun. Damascenam ru-
 bram, dubitamus.

Gesl. Rosæ rubræ urbanae simplices vulgares,
 quarum præstantissimæ, quæ puniceo colore rubent.
 Eid. coll. & Cardano de rer. var. Rosæ rubræ. Cæf.
 Rosæ rubens multifolia in brevi frutice, vix cubitum
 excedente, aculeis firmioribus, calyce scabro, odore
 jucundo, sed exili: Miletia Plinij. Ger. Rosæ 2. ru-
 bra, *The red Rosen*. Figuram Tabern. habet spinos-
 sis virgulis, cur non mutavit, e jusque loco eam po-
 nit, quæ est nomine Provincialis. Eid. Rosæ 3. sive
 Holoserica, *The velner Rose*. Germ. *Not Rosen*/
Blütern Rosen: Gall. *Rose rouge*, *Rose de Damas rouge*:
 Belg. *Prounsch Rosen*.

C. B. pin. Rosæ fativa 1. sive rubra, Miletia Plinij: *Rosa fati-*
va 1.
 Rosæ fativa multiplex, Brunf. Domestica punicea,
 Matth. Hortensis rubra multiplex, Tragi. Rosa
 bortenfis, Fuchl. Rosæ, Tur. Lac. Lon. rubra, Cord.
 in Diosc. Lugd. Adv. Tab. Ger. Rosæ rubra urbana,
 Gesl. h. Sativa rubra, Ang. Cast. Sativa 3, quæ Pro-
 vincialis. Dod. Rosa Damascena, Lob. Rosæ rubi-
 cunda, Cam. Rosæ 3, Cæf. Rosæ intensè rubens, Cam.
 Est simplex & multiplex, colore magis minùsque ru-
 bro: huc refertur, 1. Rosæ Miletia fl. rubro pleno,
 vulgò Rosæ fina. 2. Miletia fl. simplici rubro. 3. Ro-
 sæ ex rubro nigricante fl. pleno. 4. Rosæ rubicunda
 Saccharina dicta, Græcula Plinij, Camer. Eid. Bau.
 Rosæ fativa 2. sive rubra pallidior: Sativa 4. sive Fran-
 cha Gallorum, Dod. Rosa holoserica, Lob. ic. Rosa
 rubicunda, Cam. Rosæ 3, Cæf. Rosa Damascena ru-
 bra, Lug. Aliis Trachinia, Prænestina aliis, aliis Græ-
 cula Plinij: hæc priore minùs rubet, & flore simplici
 plerumque est, & foliis latissimis, cujus frutex spi-
 nis communiter caret. Eid. B. Rosæ fativa 3. sive fa-
 turatùs rubens: Rosa 1. Prænestina similis, Clus.
 hist. Rosa purpurea, sive in rubro nigricans, Cam.
 Foliis est quadragenis amplioribus, saturatùs ru-
 bentibus, ad nigredinem vergentibus, & alabastrò
 crassiore.

Genevæ, Lugduni, Montbelgardi, & Basileæ flo-
 re observavi intensè rubente; in urbe *Provins Gal-*
 liæ vidi Rosam valdè plenam & rubram, quæ in va-
 rias Galliar partes explicata distribuitur, quia valdè
 odorata. Ex hac Conserva sicca ubique paratur. Et
 hæc est, ni fallor, quam observavi anno 1609. medio
 Maij mensis, in orto D. Joh. Heitzmanni, cui flos
 detur assinis særcus foliis, multò minoribus, quàm in
 vulgari rubra, odorator etiam, quàm illi: calyx spi-
 nulius horret: folia sunt ordinum, duo semper sibi
 ex adverso opposita sunt, quintum verò in summi-
 tate, medium inter ordines locum occupat: omnia
 in cir-

in circuitu serrata, glabra, supernè virentia, infernè canescentia.

ROSA ACANTHOS, FLORE pleno, coloris rubelli.

Deser.

Ramis

Folia.



IN plurimis hæc variat à reliquis Rosarum speciebus. Est quidem ea ramis & frondibus Rosæ intensè rubeſcentis vulgaris altitudine, figurâ & effigie, lævibus & sine spinis, viridantibus magis atq; flexuosis: quarum tamen summi propter floris calycem & folia fureculi horridiſculi ſunt, ex denſiſſima apicularum nigrarum & aſperuſcularum congerie: foliola, quæ ſumma occupant ramorû, com-

muniter quina ſunt, rariùs terna, interdum ſena, lata, oppoſita, impari ſeriem claudente: ſupernè quidem atro virentia, infernè ſubcinerea, tria nonnunquam unciatum longa: roſa ſpecioſa, nec minore foliorum ſtipitatu, quàm pallide ſive incarnata, ſuavis odoris, coloris rubelli ſaturatiore tinctura, quam ornat varia vagaque venularum purpuraſcentium delineatio: ſubtus verò folia ex incarnato candicant omnia. Huius ſuccedit fructus orbicularis, majoris Avellanæ, colore obſcurè rubente, denſiſſimo lapſillorum villoſorum agmine ſarcto. Radix repens, lignoſa, duraque.

Fructus.

Deser. Cluſ. ſu. Vngar.

Folia.

Flores.

Fructus. Semen.

Radix.

Synon.

Locus & Tempus.

Cluſ. ſic deſcribit: Multis ſtatim à radice aſurgit virgis, humanam altitudinem interdum æquantibus, ſi fertili ſolo & umbroſo loco pangatur, ut plurimum verò longè infra eam magnitudinem, & cubitalibus duntaxat, vel ſeſquicubitalibus, lævibus & ſine ſpinis, viridibus, in varios ramos deductis: folia habet alata, hoc eſt ternis aut quinis uni coſtæ (quæ ſubſæpera eſt) in hærentibus, binis ſemper inter ſe oppoſitis, extremo impari ſatis amplo, conſtantia, ſuſcâ viriditate ſupernè nitentia, infernè canescentia: extremis ramis inſident flores, oblongis hirtuſque pediculis in hærentes, multiplici foliorum numero conſtantes, Præneſtina majores, mediocres inter illas & rubras coloris, jucundi odoris: fructus brevis, craſſus, penè orbicularis, maturitate rubens, in æquale ſemen, & ut rectè Theophrastus notat, *αμυγδαλες*, ut omnia Roſarum genera, lanugine involutum continet: radix dura, lignoſa plerumque, aliarum inſtar, ſub terra propagines in lateribus ſpargit.

Cluſ. pann. Roſa Auſtriæ 1. ſive ſine ſpinis. Eid. hiſt. Roſa non vulgaris 2. ſive ſine ſpinis. Cam. h. Roſa abſque ſpinis purpuraſcens, plenis majoribus floribus. Cæſ. Roſa rubens multiſolia colore magis diluto, Græcula Plinij. Tab. Roſa ſine ſpinis. Ger. Roſa 5. ſive ſine ſpinis. Ang. *The Roſe without Prickles*. C. B. pin. Roſa fativa 14. ſive ſpinis carens, flore majore.

Friderici Meier munere provenit mihi in horto Ill. E. C. Montbelgardi florens Junio: Octobri cum fructu in prædicti horto Argentina obſervata, cui ex Cluſij horto Vienna primò delata. Cluſius au-

tem hujus cognitionem acceptam fert C. V. D. Ioanni Schrötero ſeniori, Ieneniſis Academiae in Thuringia Medico. Non deſunt qui flore albo ſe conſpexiſſe affirmant.

ROSA SINE SPINIS, COLORE penè tecum vini rubri.

Aliud genus Roſæ ſine ſpinis invenitur, non valdè diſſimilibus virgis, Viennæ Auſtriæ etiam ante Cluſij in eam urbem adventum, in quibusdam hortis cultum, quod minores & rariore foliorum textura conſtantes flores profert, colore penè ſecum vini rubri.

Cluſ. pann. & hiſt. Roſa ſine ſpinis altera. C. B. pin. Roſa fativa 15. ſive ſine ſpinis flore minore.

Locm.

Synon.

ROSA PVMILA PANNONICA, flore rubello.

Pedales, inquit Cluſius, atque aliquando cubitales etiam ex eadem radice proferunt virgas, virides, lentas, infernè paucis, ſupernè multis ſpinis rigentes: foliorum alas rubræ ſimillimas, quinque aut ſeptem foliis ſupernè viridibus, infernè candidantibus conſtantes, ſummis virgis & ramulis innaſcantur ſatis, magni calyces ſive alabaſtri, hirti, barbatiq; , quales in Roſis rubris ſimplici foliorum ordine conſtantibus, ex quibus deinde ſefe expliçant magnæ, non omninò odoris expertes Roſæ, quinque foliis prædita, initio rubræ, diuè paulatim remittente & quaſi evaneſcente rubedine, carnei ſerè coloris, multis luteis ſtaminibus, floris umbilicum, quem admodum in aliis Roſis, occupantibus: fructus ruber, rotundus, omnium maximus & Pyri in modum turbinatus, fulveſcente pulpa, inæqualia alba ſemina continet.

Deser. Virga.

Folia.

Calyces.

Rosa.

Fructus.

Non ineptè meo quidem iudicio *γαιακόδορος* græcè dicitur hoc 4. Roſæ genus, Latinis Roſa pumila: Auſtriaci *Erdroſen* vnd *Heydroſen* / Vngari verò *Parragi Roſa* appellant. C. B. pin. Roſa ſylv. 14. ſive pumila rubens: Roſa 4. Cluſ. pann. at in hiſt. 6. & pumila.

Naſcitur paſſim in cædis ſylvis, aliarum ſylvarum marginibus, ſublimioribus & deſertis agris per Auſtriam inferiorem & univerſam Pannoniam. Floret Junio: fructus matureſcit Auguſto, & plerumque tota Hieme ipſi ſtirpi inhæret.

ROSA SYLVESTRIS RVBELLA, parvo, frutice.

Roſa rubella ſylveſtris frutex parvus eſt, cubitalis ut plurimum, formâ ſimilis Roſæ intensè rubræ, curvis nonnunquam ſpinis, ſed raris: foliis ut in illa quinque partiis, rariùs in ſeptem foliola diſtributis, ſerratis, glabris, ſupernè parte obſcuris virentibus: denique ejuſdem ſerè & coloris & formæ, ſed rotundioribus & minoribus: flore non parvo, coloris rubelli, ſive incarnati, ut vocant, quinqueſolio, jucundiſſimi odoris, cui ſuccedit capitulum cum pediculo hiſpido.

Deser.

Folia.

Flores.

Fructus.

Capitulum.

An Trago tertium ſylveſtris Roſæ genus, magnitudine foliorum, eam, quæ odorato ſolo anteccedens, tamen ſpinas gerens, non perinde minaces, & frondem proſus inodoram: Roſâ quoque aliquanto majore, colore magis rubro, & elegantiore tinctâ, odoris, ejus quidem iudicio, ante omnia ſuaviſſimi, tactu pinguiore & magis lentâ, luxurians plerumque in humectis, ac minimè fertilibus avenaceis agris, aliſque nonnullis dumetis, rarè ſupra altitudinem trium cubitorum, ſefe attollens, & intra humum hinc inde ſerpentibus radicibus ſubinde juveneſcens. Hæc Roſa campeſtris facile & nullo negotio plantari poteſt.

An 14 Roſa genus Trago.



Rosa pumila
la Cann.

Locus &
Tempus.

Primum observavi Ger eva circa Castellum l'Abbatie florentem Junio, postea inter Belgavam & Trenci: deinde in Ducatu VVirttembergico non longè à Sutzgardia secus viam cum contenderem Pfingen, florentem Junio, & in sylva non longè ab urbe Marbach.

ROSA RVBELLO FLORE MAIORE
multiplicato sive pleno, incarnata vulgo.



Deser.

Rami
Spinæ.

Folia.

Flores.

An Tragus hanc suam Rosam noverit nondum nobis certò constar. Multa communia habere videtur cum Rosa pumila Panonica Clusij, eandem tamen asserere non audeamus, de qua ante.

Ad Rose fylv. 7. genus Tragi refert C.B. in pin. Rosam fylv. Gesn. h. dubitatur an sit Cynosbatus 4. Cordi in Diosc. Vocat autem Rosam fylv. 5. sive odoratissimo rubro flore.

Rosa hæc fruticis sunt præalti, ut alba, spinosioris tamen iis multò. Ejus rami abundant spiris adurcis, & mordacibus: folia non virent, ut in rubra, nec polita sunt, ut in alba, terrea, quina ac etiam septena, penè rotunda: flores multi simul ex longis pediculis hispidis, calice etiam hispido, magni, pleni, rubelli, sive incarnati, odoratiores, cum virent, rubris & albis.

Dod.gall. Rose fativa, & genus in Belgio Proxunsch Rosen: Germ. Leibfarb Rosen; quæ fortè Plinio Alabandica. Eidem de flor. & hist. Rosa altera fativa dilute & pallide rubens, incarnata ab Italis vocata, Alabandica similis. Videtur Dod. hujus figuram in hist. exhibere sub titulo Rose fativa.

Gesn. h. Rose ex purpureo albicantes, folio multiplici. Rose Alexadrina, vel Persica, vel Damascena, vulgò incarnata dicitur. Harum Rosaria (inquit Morard.) nostris majora & viridiora sunt, foliis amplioribus: aculeis plurimis & acutioribus: florum numerò copiam fundunt, quæ foliis quinis, aut senis constant, medio inter album & rubrum colore. Ruderatum amat locum. Seruntur, inciduntur, cremantur, transferuntur, sicuti nostra. Harum Rosarum apud Italos, Gallos, Germanos, diversasque gentes nunc frequens est usus, quas Damascenas vocant, quoniam ex Damasco Sy-

Alabandica
Plinio.

Alexadrina
Persica.
Damascena.

ria Urbe creduntur advecta. Apud nos verò triginta sunt anni, ex quo earum notitia in attingimus, ex his Rosis medica nentum (syrupum ex multiplici earum infusione) vel in Rosaceum foliatum parare solent: hæc ille. Sed videt Gesnerus Damascenas, vel Alexandanas Rosas diversas esse, ut differentie causa hæc Persicas tantum non minare censuerit. Proxima laus à Punicis, iis quæ in rubrum candicant, incarnata vulgò dicitur. Monachus in Mesuim incarnata vel trentaphilla. Item de coll. Rose purpureæ vel incarnate. Ego Rosas has nunquam vidi solitum cu n quinis aut senis foliis, ut apud Gesn. hoc loco Monardo placet sed semper multò pluribus.

Ryff. Rosa flore incarnato Gallorum; Et, Roseo colore insignes incarnata dicitur. Matth. Rose ex albo rufescentes, vulgò incarnata vocata. Lob. Adv. Rose pallide plebecula. Obs. & Ic. Rosa Damascena. Et Rosam Damascenam sive Provinciale vulgi odoratissimo niveis omnino floribus, vel tantillo candore & rubore confusis, maximo provenit albat Gardani D. Adrianus van der Waerbr. Quantum judicare possum ex huta Lob. liij, cui folones sunt spinosi, Rosam rubro flore intelligit. Rosas alioqui minus diligenter tractidile videtur.

H. Lugd. Rose. Primo Trachinia minus rubentes, Rosea major vocatur. Tab. groß Proxunsch Rosen; Rosa Provincialis major: Item, Rosarum 3. genus, Rose majores, & 2. genus minorum dicitur Rosa provincialis, Rose Persica, incarnata, purpurea. Pingit Tab. frutice nunc spinis, cum soleat esse valde spinosius: errat fortè Compilerator, vel Typographus, qui transposuit. Gerard. Rosa 3. Provincialis sive Damascena, Angl. The Proxunsch Rose & Damascene Rose. Miror sequutum in Tabern. postulare hujusmodi rosei, non spinosius, cum maxime ut spinosius.

Cam. h. Rosam incarnatam, vel leviter purpureascentem Nori. aberge Vlmensem nominatam, veterum ille prænestinam existimat: incarnatam tamen Lugd. Trachiniam esse putat. Nos suspicamur Theophrasto esse Rosas, quas recenset inter amplas, quibus pars inferior scabra. Cas. Rosa roseo colore, & ascensum frutice valde hispido, quaterna cubita excedente; nunc florens inter ceteras: Campana fortè Plinij, & Trachinia minus rubens.

C.B. pin. Rosa fativa sive purpurea; Trachinia Plinij: Rosa hortensis ex purpurea albicans, Tragi. Gesn. h. Rosa domestica caris colore referens, Matth. Rosa incarnata, Ang. Cam. Rosa rubra, sive carne coloris, Bellon. Rosa pallida, Adv. Rosa fativa purpurea, Cam. Rosa minus rubens, Lugd. Rosa provincialis incarnato pleno, Eyff. Rosa Zebedera Pharnaco perorum, Joann. in tract. de pilulis.

De Rosa hæc, Clusio Prænestina dicitur, alias vulgò Provincialis, puto loquutum Thomam Morum in Epigr. ubi, quomodo utraque in una coaluerit, ostendit his verbis:

Purpurea vicina fuit Rosa candida, utramque
Utraque amantem, qui prior utraque primum.
Utraque sed florem Rosarum ealecit in unum,
Quoque potest in us cadere illa modo.
Nunc Rosa nurgit in melle la una. Sed omnino
Una habet hæc dotes, quas habuere duæ.
Sulluet hinc unis species, decur atque venissus,
Et color & virtus est, utriusque Rosa.
Alteram ergo Rosam vel (Lam quisquis amavit.
Hanc ut quæ nunc est, quicquid amavit amet.
At quæ tunc est, non emoret, ille timebit.
Nempe etiam spinas suas habet iste suas.

Tenior hæc ad frigus quam alba & rubra: Passi-lex floret tem vidi Maio & Junio; Monspelij Martio, Aprilis & Junio; Ger eva copiosè Octobri & Novembri ac etiam Decembri: quæ tandem florent.

Persica.

Incarnata.

Rosa alba.

Trachinia Plinio.

Proxunschalis major.

Persica.

Trachinia Plinio.

Synon. B.

Prænest.

Clus.

Locus & Tempus.

juet.

frondissimi sunt odoris, nec ita cito flaccescunt. Et licet nimio frigore impatiens satis, nisi ab eo muniat, quandoque pereat, tamen altero anno à radice rursus repullulat.

ROSA FOLIO CRISPO, FLORE rubello sive incarnato.



Portzhemia anno 1595. idibus Julij observavi in horto D. Grienningeri Rosa fruticem folio subrotundo & crispo, flore rubello sive incarnato, à precedenti in ceteris nõ differentem. Plantata in horto Montbelg. feliciter provenit.

C.B. pin. Rosa fativa 17. sive Rosa folio subrotundo & crispo.

Iconi nostræ appinimus separatim Rosã domesticam, sed minori proportione.

ROSÆ RVBELLÆ SIVE INCARNATÆ SIMILIS.

Prænestina, quam vulgus Provinciale vocat, valde similis est Rosa prior vel prima Clusii præ, ex vulgares nec illã minõs altè asurgit: in solo flore specimen est, qui circiter quadragenis aut pluribus foliis, paulò amplioribus, & saturatius nonnihil rubentibus constat, multis staminibus flavis umbilicis occupantibus, alabastrisq; multo crassiore & brevior, quam ob causam Tuppel Rose vulgò appellatur: odor minus suavis, & alba ferè proximus. Hujus genus album florem ferens, apud Batavos invenitur, Centifoliaq; alba illis dicitur, de qua mox.

C.B. pin. Rosa fativa 8. sive Rosa major Prænestina Clus. hist. Rosa Prænestina variegata, Eyst.

Valde frequens Viennensis est hortis, & tota Austria, nullius tamen apud illos usus, quam ad eliciendam stillatitiam aquam. Francofurti ad Mœnum quadam ejus stirpes Prænestinis mixtae aluntur. Floret cum cæteris Junio, interdum etiam Maio.

ROSA PRÆNESTINA ALBA & verticolor.

Non desunt, inquit Clusius, qui Prænestinam albi coloris inveniri asserant: mihi certè nondum videre contigit, nisi fortè ea sit quam honestus vir Wilhelmus Osterrat Francofurtensis civis unicum in culto suo horto alit. Illius flos multò dilutior Prænestinã, & ferè albicans, perinde tamen magnus & plenus, in quo nonnulla etiam folia observavi, media ex parte candicantis, alterã purpurascens, vel similis coloris venis aspersa. Anno etiam 1593. florem mihi protulicea, quam ad me Hoghelandus miserat planta.

illi congener esse videtur elegans illa Rosa, de qua honestus vir Ioannes Reiteau, civis Colonien-

Tom. II.

sis, superioribus Autumnalibus mundiciis apud me verba fecit: se videlicet Colonia in suo horto alere Rosam Prænestinã similem formã & magnitudines, quæ ut plurimum dimidia ex parte folia candida haberet, reliquã rubra, aut tertia duntaxat ex parte alba, vel nunc integrã alba, modò integrã rubra inter se commixta conspiciantur. Ejus prolem sequente Octobri ad me mittebat, quæ prævaluit quidem, sed nondum florem ullum dederat, quum Francofurti excessi.

C.B. pin. Rosa fativa 5. sive verticolor: Rosa prænestina verticolor, Clusij hist.

ROSA HOLLANDICA RVBELLÆ plena, quibusdam Centifolia spinosa frutice.



Gerardo est Rosa 6. sive Hollandica, aut Batava.

Angl. The great Holland Rose, vulgò The great Province Rose / dicta, quæ Pfortzhemia anno 1595. Julij 5. mihi adhuc florens demonstrata est, in horto D. Grienningeri, quam D. Höchster denominavit Rosam Hollandicam, quæque dicebatur ex urbe Delphis allatam & magno pretio emptã. Cæterum, folia ejus videtur majora quam in rubella sive incarnata, cui similis frutex spinosus: flos etiam similis, major, plenior, florum folia minor paulò.

De hac Clus. Rosa centifolia Batavica prima an ea sit, cujus Theophr. Plinius & Athenæus mentionem faciunt, hæreo. Nam illi Centifoliam, in odorem esse, & pusilla habere folia, scribunt. Quæ autem apud Batavos alicur, non modò referente N. V. Ioab Hoghelande (qui binas ejus plantas sub anni 1598. iniium mihi misit, quas cum prævaluisse putarem, corruptas esse deprehendi, præter unius radice si agnertum) prænestinis majorem, & perinde ferè odoratam intellexi: sed etiam Francofurti ad Mœnum apud Baltharem & Carolum Hoycke Belgas fratresque germanos illo ipso anno conspexi: ita quæte verò, ex neglecto illo, & veluti abjecto fragmento nata est mihi stirps, quæ altero anno nempe 9. circiter quadragenos flores tulit, non omnes tamen ejusdem amplitudinis, sed in nonnullis numeravi centena vicena folia, extrinsecus majora, intrinsecus pusilla, staminum locum expletia, & in ipsum calycem reflexa, odorem autem deprehendi prænestinæ, ad albam nonnihil accedentem, colorem Prænestinæ non dissimilem.

Illius etiam stirpem unam quæ album florem ferat, habere se ait idem Hoghelandus, media inter illam & proximè sequentem magnitudinis, quam albam majorem Provinciale appellari ait, ut superiorem, majorem Prænestinam.

C.B. pin. Rosa fativa 6. sive maxima multiplex: Centifolia Batavica rubra, Clus. hist. Eyst. Haberi & alba, quæ, Rosa alba major provincialis, & Centifolia Batavica alba, Clus. hist. Rosa provincialis flore albo, Eyst.

An Centifolia antiqum?

Folior. can.

Centif. Batavica alba

ROSA CENTIFOLIA BATAVICA altera.

Centif. Batavica. Clus. Sed & rarius Centifoliae genus apud Batavos inveniri ad Clusium scriptum ille ipse Hoghelandus, priore aliquanto minus, hoc est, media inter Centifolia & Praenestina vulgarem magnitudinis, alioque colore, odore, & forma convenire: quod verum esse ex eius planta ab illo missa, sequenti anno apprehendit Clusius. C.B. pin. Rosa fativa 7. five multiplex media.

ROSA POMO SPINOSO, folio hirsuto.

Locus. Descrip.

Folium.

Caput.

Spina.



Herlerus attulit Rose genus ex monte Calcari, & horti Dei declivibus, foliis palmu ferè longis, quinquepartitis, ad rubellam plenam penè accedentibus, minus rotundis, longioribus, ferratis, subtè hirsutie quadam lenibus tactu, & penè cinereis: capitibus five fructibus spinosis, magnitudinis Avellanae rotunda, ex pediculis brevib. spinosis: per ramulos sunt spine rariores.

Hanc existimamus esse Rosam sylvestrem 15. C. Bauh. in pin. five Rosam sylv. pomiferam majorem, Rosâ sylv. pomiferâ Lobelij altiorem, ramosioram, paucissimis aculeis, foliis majoribus, pallidè virentibus, Basileae locis humidis in Alnetis provenientem.

An Thal. Cynorhodos seu Rosa canina, virgis, fructu ac foliis auleatis, spingiolas proferens, weyß Dorn/vel Nießende Dorn.

ROSA POMIFERA VENETIIS Sprengeri folio hirsuto.

Locus. Descrip.

Folia.

Flor.

Collegi Heidelbergæ 1595. in horto Sprengeri Rose genus, ubi non observatum, foliis accedentibus Rose nostræ pomo spinoso, subtè lenibus ad tactum, & albicanibus, hirsutisque: differt autem quòd tres conjugationes foliorum minorum habeat, & postremo unicum ut ceteræ Rosæ: in extremis ramis rarae spinæ: florem non vidi, ex ramo sicco describo.

Anno 1609. Maio vidi, ni fallor, hoc idem genus Rose, Basileæ in horto Heitzmanni, foliis similibus, trum conjugationum: postremo solo: ea autè majora sicut ungue parvi digiti: quales ferat flores & ubi ramis, ex quo describo, fuerit collectus, me lætet.

ROSA SPINOSISSIMA HIRSVTA.

Spina. Folia

ES 7 & minui Rose ramus, abundans spinis aduncis, cujus folia sunt hirsuta, subtè ad tactum lenia, conjugationum trum, postremo solo: ea autè majora sicut ungue parvi digiti: quales ferat flores & ubi ramis, ex quo describo, fuerit collectus, me lætet.

ROSA MINOR RUBELLO MULTIPlicato flore, asperis spinis armata.



Frutex est asperis duris spinis armatus, in altitudinem satis magnam multis virgibus rubentibus valdè excrefcens: Rose huic parvæ ex brevibus pediculis plenæ, admodum odorata.

De hoc frutice Descrip. Clus. Clusius: Rosâ Cinnamomeam flore pleno rarè duorum cubitorum altitudinem superantè Viennæ observavi, frequentibus & brevibus ramis donatam, purpurascens, qui raris & brevibus spinis armata.

sunt: foliorum alæ illis similes quæ in Rosâ, vulgò Canelle nomen adepta, sunt, h.c. ex quinis aut septem foliis æquali inter se spatio distantibus consistant, uno hinc, altero inde, geniculatum conjugatumque semper adherente, unòque in cacumen ex eunte, coloris supernâ parte viridis, infernâ candidantis: flores vulgari Cinnamomeæ similes, sed majores & multiplices pusillorum foliorum glomeratione constante, quemadmodum alba & prænestina: odor ferè qualis in alba vulgari plena: fructum nondum videre licuit, tamen si multis annis aluerim, ejus. Radix latè admodum serpit, & vivax est, novæ virgæ subinde producens.

Can. h. Rosâ Cinnamomea altera, vulgò Veneta, aliis Provincialis, Spermonia Plinij, Barbari, & non Spineola, aut Spinoia, Sycionia quorundam.

Geßl. Rosæ nobiles densi-folio flore, parvo, purpurei coloris diluti. An Lugd. Gracula, quæ multo rariorem etiam judicio Rosæ Damascenæ genus est, flore ex albo ad puniceum non nihil vergente, Rose de Damas incarnate? An Eid. Gracula Rosa flore suaviter olente, quem sub ætatis initium paulò feridus quàm Damascena cardida promit & per ætatem ferè totam perseverat, foliis Damascenæ alba latioribus scè non explicatibus, nisi quis manu deducat, sed veluti conglobatæ & convolutis, ut Plin. scribit: Cinnamomum olere hanc vulgus ait. Intiridis perquirendum, & ad trutinam veræ contemplationis revocandum, an Plin. scribens de Rosa Gracula, non miscuerit herbas: præcedens enim, quæ Græcis Lychnis, herba videtur, uti & sequens, quæ Mocheton & quamvis veræ Rose genus traderet: tamen non videtur competere nostræ minori rubellæ: quæ foliis non est laevissimis. Proponimus etiam examinandum an nostra non possit esse Theophrasti Rosa ex Pangao, de qua etiam Plinius. Sed & hoc observandum quod scribitur à Lugdunensi velicet Græculam sub ætatis initium ferere, quandè quidem nostrâ Rosâ, de qua hic agimus, primo Veræ flore.

Tab. Rosa Provincialis minor: Item, Rosarum generis Provinciales magnæ & parvæ, coloris auræ, jucundi odoris: Rose perficæ, incarnate, purpureæ. Figura T. herb. posita pro Rosa provincialis minore, commo dè feris exprimit Rosam, de qua hic agimus.

Ger.

Ger. Rosa 4. five Provincialis minor, Angl. The lesfer Damascete Rose: item, Rosa Cinnamomea pleno flore, The double Cinnamome Rose. Peccat in excessu Ger. duas proponendo figuras, quæ videntur eandem plantam denotare, prior est Tab. altera verò Clusij in Pan non.

C.B. pin. Rosa silv. 8. five Rosa odore Cinnamomi flore pleno: Rosa cinamomea pleno flore, Clus. pan. & hist. Eyflett.

In horto E. C. tempore primo vere floret, ex Burgundia delata. Vnde primùm Viennam allata sic plerique dubitant, nonnulli tamen ex Tyrolensi Comitatu originem ducere existimant, alijs Gallia Moschatæ pleno rubro flore, nomine missam. Tunc in omnibus Cæsareis hortis, & aliorum qui herbaria rei studio oblectantur, alebantur: sed omnium frequentissimam Castellis in cultissimo Ill. Principis VVilhelmi Landtgravij Hassiæ horto, supra humanam altitudinem sese attolentem, interduca etiam Autumno rursus florentem, quæ tamen florem minus plenû superiore, quæ Viennæ est, habere Clusio vîsa est, & stolones atque ramos minus rubentes.

ROSA CINNAMOMEA FLORIBVS subrubentibus, spinosa.



Od. gall. Rosa faciva 5. genus, flore simplici, fortè Rosa Prænestina Plinij, folijs minoribus, quàm albarum, rubrarum & rubellarum, ramis tenuibus, spinosis, subrubentibus: floribus parvis, simplicibus, odoratis, rubellis. Eid. de flor. & hist. Rosa 7. five sylvestris 2 à quibusdam Cinnamomina dicta, id est, Cannel Rooffene, Rose canina vulgò dictæ similis, veruntamen aliquan-

culam minor, cujus virgæ subrubente cortice vestiuntur; flores pallidè rubent, non in totum absque odore: plerique in hortis habent, præcox est. Notandum Dodon. olim scripsisse spinosam, quod nunc non repetit. In postremis etiam spinarum nullam facit mentionem, quoniam ante dixerit omnes has Rosas mordacibus aculeis hortere.

Lob. Adv. Rosa silv. quam Boreales Cannel roose/ five Cinnamomeam appellant: He foliolis sunt omnium florum minima: Francia, Belgio, Angliæ, ruri spontè crebræ, ipso odore potissima. Eid. Ic. Rose de Canelle. Miror autem Lobelium (& ex eo Lugdunensem, qui eadem recitat) Rosam hanc non describere, nec in Obs. se explicare: coloris florum non meminit, nec etiam tradit an spinosa, vel non spinosa: is quidem titulo Rose de Canelle ponit figuram Rose simplicis flore cum spinosis virgis: sed considerandum an intelligat rubellam flore pleno.

Clus. in pan. & hist. Canelle rose vulgaris nec colorem tradit, nec eam describit, neque docet an sit spinosa aut non spinosa. Thal. Cynorrhodon five Rosa silv. suaviter fragrantibus foliolis, videtur esse Cinnamomina Dodonæi, quam etiam flore candido, non ita frequentem tamen inveniri ait. Sed an hæc eadem sit cum Cinnamomina, vel cum aliqua Tom. II.

ROSA RUBELLO FLORE, PARVO, simplici, non spinosa.



Mitior hæc, nullis horret spinis, pediculo duntaxat floribus nonnullis asperis: foliorum autem glabrorum conjugationes præter extremum impar, tres sunt, vel quatuor, serratorum; superius vitentium, inferius albicantium, glabrorum: rosa sunt paræ quinquemfolia, odorata, coloris rubelli: fructus rotundus, parvo Mespilo paullo minor, per maturitatem rubescens, grana tomento involuta continet: in hortis sæpè altitudinem hominis excedit.

Ges. h. Rosa silv. vulgò Tigrinis Meyenroßley ubi à quibusdam colitur in hortis; crecit verò spontè ad radicem Albij montis, & est minor, o Jorator & pretiosior Cynorrhodo, inque hortis sicillimè durat. Hæc eadem fuerit Rosa campestris Tragi, quam Germ. vocat Hanrosen/ Feldrosen/ Habera Tragi. rosen: Item coll. Rosa à Maio deno. minata Meyenroßley/ Rosa Maij sine spina, montis Albij prope Tigrurum. An Rosa Maij Gesneri eadem sit cum Tragi Rosa campestris, vel 4. nobis dubium est, quia cu prior spinas geuit, secunda autem flore proflus est candido.

Lugd. Rosa Græca [Plinio] à Græcis à Lyone dicta, nascens spontè in sepibus, valdè humilis, spinis carens, (quod huic tantum generi Rosarum proprium est) flore languidius rubro, Vere & Autumno prodeunte: quod etiam huic Rose cum Coronæola & Græcula commune est, quæ in hortis nostris colitur, & in quibusdam montibus luxuriat, odoris est expers: At huic jacerem & valdè humilem foliis tam exiguis, ut vix Rosa esse videtur, flore suavissimi odoris in Cemenereo montium jugo altissimo Lugduno propinquo, quod montem Pilati vocant, Dalechampsii collegit: Contra in Carthusianorum Cenobio primario, Gratianopoli vicino profus in odora est, ut verissimum esse conperitur quod scripsit Theophr. de his ipsis Rosis tractans odoris præstantiam loci ratione contingere, & quæ eadem in tellure proveniunt à sese differre, quod jucundum, vel nullum odorem spirant. Eum locum Gaza (ut id obiter etiam hic dicatur) non rectè est interpretatus: Hanc si quis Rosam Græcam esse Plinij negaverit, Rose genus, Cynorrhodon leve esse Dalech. jurè concesserit: Sunt Cinnamomeæ foliolis omnium florum minima. Inter silvestres etiam non possent venustatis, inquit Pena, sed in odora pomodoro atæ. Hæc Lugd. separans Cinnamomeam à pomifera Lobelii unitatis, nec in dicit an ambe dixerit: verè sint ab ea, quæ Lychnidè vocat, figura hæc ex Lobelio quæ ponit titulo Rose silvestris Pomifera,

conuenit cum eius Lychnide descripta: le flore è hac perpendant.

Cam.h. Rosa Cinnamomea simplex, pro Lychnide habita à Gesnero, & in Albio monte maior & minor nascitradita. Quaternas in colliis singulis foliorum lyzygiae habet plerumque maior, praeter summum singulare, quod domesticæ nallæ, nisi rarissiluestres quædam, sed non omnes solent: Minor, quam pro mare habet, ut priorem pro scæmina, minoriores gerens spinas; floris pericarpium gerit spinolum modicè, superioris leuè. Distinctionem hanc à Camer. assignatam nondum inueni in libris impressis Gesneri: fortè Camer. inter manuscrip tas annotationes repetit, & non separat Rosam non spinosam à Cinnamomea, de qua ante, quæ Dodon. & Lob. spinosa est. rem ultetius considerasse debebat.

C. B. pin. Rosa sylv. 10. siue minor rubello flore, vulgè à mense Maio, Majalis dicta: Cinnamomea altera, Cam. Provincialis minor, Tab. Ger. Malè quoque frater Rosam hanc Majalem, quæ sine spinis est, eandem facit cum spinosa & Provinciali minore Taber. & Ger. ad quam etiam Cinnamomeam 2. Camer. referimus.

In hortis nonnullis florentem observavi mense Iulio: Genevæ ubi vocant *petits Damis rouge*, Maij principio. Reperi spontaneam in monte Thuri copiosè, & etiam in pago Colonge: in monte Balon Lotharingiam attingente: item, in montibus Burgundiæ propè Malcon cum flore Maij principio.

ROSA SYLVESTRIS POMIFERA Lobelio, flore rubello, sine spinis, pumila, eadem fortè cum procedenti.



Inter silvestres Rosas (inquit Lob. in Adv. *Sonnen Rosen* / pomifera, mortifera, bacifera, non postrema venustatis, Angliæ perquam familiaris, & Eglen tinque cognatio, fructuat pumila, bicubito non altior, sed inodora: folio minore, & perelegant: Mespilo Atoniæ non dispari pomo donata, minore multè, colore viridiorè, rubello, subpunicèo, per Augustum maturè: Ros Rosæ sylvestris est. Eid. Obs. & Ic. Rosa sylvestris pomifera. Miror Lobelium non tradere qua in re hæc differat à Cinnamomea, nec coloris meminisse, nec indicasse an sit spinosa: figura spinis destituta non malè conuenit nostræ Rosæ paruo flore rubello, quæ spontè provenit, quam an intellexerit Lobelius dubito. Camerarius aliam intelligit nempe Rosam campestris odoratam Clusij, quamvis illa sit spinosissima ut ipsemet Camer. fateatur, & flos albus qui Lobel. rubellus: nos igitur Camer. non asseritur, eandem Lobel. & Clusij esse hac in parte plantam. Lugd. Rosam sylvestrem pomiferam Penæ separat à nostra procedenti Rosa, non spinosa: nos tan è iudicamus hanc eadem esse cum nostra, sed spontaneam, id quod sarpium petiti investigent.

C. B. pin. Rosa sylv. 10. siue pomifera minor: Rosa sylv. pomifera, Lob. & Lugdun. Cynorrhodi species, Thal. Rosa arvina, Tab. Rosa pimpinella, Ger. Hanc Lob. spinis carentem, at Tab. spinosam pingit. Ego contra fratrem Cynorrhodi speciem Thalij, non puro referendam ad hanc silvestrem pomiferam Lobelij, sed ad pumilam spinosissimam folio Pimpinelle. Præterea Rosæ arvinam Taber. aliam existimo, ob rationes paulò pòst dicendas.

ROSA PYMILA SPINOSISSIMA, folijs Pimpinellæ, glabris, flore albo.



Haud impunè Descri. Nulla sui parte contactat se patitur pumila hæc scilicet quicubitalis Rosa, tam denso horret minacium spinarum urdiq; agmine, tam per caudicem quam ramum, quos in conditos multos habet, per quos folia conjugationum quatuor, alata, glabra, vix quadrantem equant unguis digiti minimi, circumcirca crenata, subrotunda: flosculi simplici constant, foliorum texturæ candidi, crebri, luteis capillamentis medium obidentibus. aliostriculis parvis: radix repit & plurimas virgas emittit.

Cor hederandum an eadem sit, quam Clusius in par. n. pro Rosa, in Hist. pro 5. sic describit: Rosa campestris odorata, cubitalibus aliquot, aut ad summam, sed rarèssimè, bicubitalibus aliurgit virgibus, firmis, duris, lignosis, rubescentibus, densissimo spinarum vallo munitis, ex quibus frequentes confuso ordine oriuntur spinosi ramuli, virides, singulisum florem sustinentes, album odoratum, quinque foliis constantem, Luteæ, aut Canellæ Rosæ vulgaris (quæ alij hæc sit Clusian. ostendit) æqualem, capillaceis quibusdam staminibus cum suis apicibus luteis med. um floris umbilicum occupantibus: fructus rotundus, brevis, initio viridis, deinde plenam maturitate in adeptus niger, crassa, angulosa, candida, dura semina continet: folia sunt inter eam quæ luteos simplices fert flores, & illam quæ ab aggeribus, in quibus spontè provenit, quæ quæ à Pimpinelle foliorum similitudine nomen apud Belgas accepit (*Sonnen Rosen* & *Pimpernelle Rosen*) enim appellantur ferè media, per ambitum serrata, & nullius splendoris: radix dura, lignosa, in diversa tendit. Invenitur multis circa Viennam locis, præsertim editioribus & montosis. Floret Maio, quo tempore rusticæ mulieres plurimos eju salsiciculos, ob odoris gratiam, vales in forum deferunt. Fructus Augusto maturefcit.

Dodon. gall. Rosærum silvestrium genus, cujus Rosæ sylv. virgæ spinis acutis abundant: flores parvi, simplices, albi, suavissimi odoris: hamilis Rosa, inter Rosas domesticas & sylvestres minor: Videtur Græcorum *rubolæris*, Latinorum Canthi: Cynorrhodibus, & Phirio Rosæ spineola. Eidem de fl. *spineola* & in histor. Rosa 9. parva humillima, & virgæ spinosæ.

spinosissimis, foliis nymis, rosis perquam exiguis, candidis, & suaviter odoratis: fructe hujus nigro, aliorum ruber. Rosa minima à nostris *Quyn roosfens*. h. e. *Dunenensis* Rosa dicta in marino litore, arenosis tumulis, quos vulgè *Quynen* nominant: sunt tamen qui *Pimpernelle Rosfens* nuncupant. Rosam *Pampinulam* dixeris à similitudine nempe hujus fruticosiorum, cum foliis minoris *Pampinule* quæ alio nomine *Sanguisorba* & *Pimpinella* vocatur. Minima spinosissima & asperissima, locis gignitur maritimis, frequens in Morinorum finibus, juxta Icium portum, in arenosis juxta mare tumulis. Observandum hoc in loco *Dodonæum* in histore. *Dunenensis* Rosa fructum nigum dicere, *Clusium* autem id tribuere sive *Campestris*, quam videntur separare à *Dunensi* sive ea, quæ *Pimpinellæ* folio.

Thal. *Cynorrhodi* species in *Broccenbergo* nascens, rarior inventu, fructu nigro, non oblongo, sed rotundo. Cetera magnitudine, continente semina pauciora quam reliquæ species, duplo tamen grandiora, ac forme quodammodo granorum *Vitis*. *Camer.* apud *Thalium* & in horto ait Rosam pomiferam *Lobelij*, vel *campestris* odoratam in *pann. Clusij*, Belgis à foliorum figura *Pimpernelum Rosfens* vocari: quamvis ille sine spinis depingat, cum revera sit spinosissima. Ego non adtipulor *Camerario*: Rosa siquidem *Clusij*, albo flore est; *Lobelij* autem rubella: Hoc præterea observandum, videri *Clusium* Rosam *Campestris* distinguere ab ea, quæ folio *Pimpinellæ*, ut jam distum.

Tab. error: *Tabernam*. Rosarum 9. genus, Rosa *Eglentaria* dicta, fructe humili, virgulis spinosis, foliis parvis, floribus sive rosis pusillis, albis odoratis: fructu nigro: Rosa *Dunenensis*, aut *Pampinula*. Sed apud *Tabern.* confunduntur Rosarum genera duo: Icon repræsentat quidem *Eglentariam*, sed non descriptio, ut apparet ex ea & nomenclaturis.

C.B. in. Rosa *sylv.* sive Rosa *campestris* spinosissima fl. albo odore: Rosa *campestris* odora & 3. *Cluspan.* & *hist.* & *Cam.* *Cynorrhodon polyacanthos*, *Lugd.* Rosa *Dunenensis*, *Dod.* Rosa præcox spinosa fl. albo, *Eyfl.* Hac opinio non placet: patet verò nostra ex dictis, & mox subdendis.

In hortis non parùm se multiplicat serpendo, idèoque haud multùm in altum sese attollit. In castello *Bermont*, unde mihi missa, copiosè provenit in rupibus.

C.B. opinio non placet.
Locus.

ROSA SPINOSISSIMA PVMLA flore rubro.

L Vgd. Icon est sub titulo *Cynorrhodi Polyacanthi*, quæ non malè exprimit nostram Rosam spinosissimam flore albo jam dictam. *Cynorrhodi* autem hoc genus à spinarum densissima multitudine quibus caulis, surculi, ramuli, folia rigent, *Polyacanthon* nominavit *Dalechampius*. Id pedis altitudinem nunquam excedit. Flore est rubro exiguo: Reperitur in *Gramuntio* nemore propè *Montspelim*: hac *Lugd.* Ego inter Rosæ secas plantas invenio ramulum spinosissimum foliis minimis, præcedenti similibus, sed minoribus multò, cui titulum fecit *Dourez* *Cynosbati odorati*. *Gesnerus*, qui hunc habuit, ascripserat esse fortè vel Rosæ *Damascenæ* cognatam, vel *Nerlin Serapionis*.

Hæc nos suspicamus esse collectam *Montselij*: fecissimus eandem cum præcedenti, nisi invenissimus *Dalechampium* tradere *Cynorrhodon Polyacanthon* flore esse rubro, circa *Montspelim*. *Cherlerus* retulit ramis spinosiss. cum minimis foliis, modò dictis similibus, passim provenire in rupetis & frutetis collium *Narbonensis Galliæ*, ac ibi florere *Maio*: verùm quo colore non indicabat.

Tom. II.

C. Bauh. hanc spinosissimam eandem statuit cum *pumila spinosissima*, foliis *Pimpinellæ*. Sed huic flos albus, illi ruber. Hac pedis altitudinem nunquam excedit, illa verò sesquicubitalis est.

ROSA ARVINA TABERN. SPINOSA



A Pud *Tabern.* in *Tab. 1c.* & *hist. hu. præb.* *Arvinæ*, sive *Arvinæ*, sive *Rosæ* n. sive *Arvinæ*, sive *Rosæ* nihil prætericonera & nomen extat, quæ ut ait, adè vulgaris sit omnibus locis, ut non egeat descriptione. Sed *Compilator* satis demonstrat se parùm verbum in Rosarum discriminibus: Icon quam proponit, accedit ad Iconè *Rosæ pomiferæ Lobelij*. Quare ejusdem plantæ existimare nisi spinosa pingetur, rationibus tamen spinis & non

crebris, quales sunt in Rosa nostra spinosissima: Considerandum an sit Rosa *Majj* minor *Gesneri* *Camerario*, cujus descriptionem posuimus antea, sub Rosa rubello flore non spinosa.

Ame aliquando reperta est Rosa *syly.* in monte *S. Lucæ*. *Hippeliti*, urbi *Burgundiæ* vicino, fructe parvo spinis robustis, rarioribus, ut in iconè *Tabern.* foliolis novem ac etiam undecim, glabris, qualia in Rosa spinosissima alba. *Ger.* qui figuram *Tab.* exhibet, Rosa *pimpinellæ*, *Angl.* *The pampernel Rose*, & Rosa pomifera.

C. Bauh. eandem facit Rosam arvinam *Tab.* cum *C. Bauh.* *syly.* pomifera *Lob.* & *Cynorrhodi* specie *Thalij*: sed etiadhuc assentiri non possum.

ROSA MINIMA.



R Osam vix triū *Defcr.* *unciam* am, collecta in horto *Dei* detulit gener, cui folia unciam circi *Folia,* ter longa, quinquepartita, glabra: flos *Flos.* p proportionem plātula magnus, quinquefolius, albus, in ea spinas non animadverto: considerandum an sit tantum variatio aliqua alicujus præcedentis generis: nolimus nos ut videamur plures plantas ceteris nosse multiplicare species: studemus quidè opera *Dei* in *Botanicis* demonstrare quātum pro nostro captu fieri poterit.

ROSA FOLIIS ODORATIS

Eglentina dicta.

R Os silvestrib. ante dictis similis, aculeatis virgibus, *Trago* magis exigua Rosa silvestri vulgaris, *D 3*

Virga

Folia



Flores

Alba & rubens

Spongia

Cynosbatos

Cynorhodon

dos

Englandi

na

Sylv. humilior

Cynosbati

genus

Rubus caninus

Cynorhodon

dos

Græca

Canina

species

Cynosbator

Oxyacanthus

tha

Cynosbatos

Plinij

non est

Redeguar

Lob. notatur

Rubi Rosa

Plinio

Cynosbator

sed spinis & foliis asperioribus Dod. proceritate sylvestres omnes sepe superans, virgas habet duras, crassas, & lignosas: nos plerumque observavimus minorem & virgis minis crassis: foliis subtrotundis, quibusdam panè rotundis, plerumque septenis, Dod. splendens & pulchrè virentibus, Trago cineraceis, nobis potius virètibz odore gratissimo ac suavissimo,

maximè vento flante, teste eodem Trago: flores exigui, quinquefolij, albi, & valdè odorati, (vidimus & rubentes,) Trago ex purpura saturatè candicantes & odore jucundiore ac vehementiore prædit; Dodongo verò, frequentissimè albicantes, rarò purpureascentes, exigui aut nullius odoris: fructus oblongus, coloris subrubentis. Reperiuntur etiam circa hujus tenues virgas spongiolæ hirsutæ, quales circa Caninæ Rosæ spinas nascuntur.

Cord. in Diosc. *κυνόβατος* sive Cynorhodos altera, hirsutioribus foliis, cujus frutex totus suavissimum odorem spirat, Englandia vulgo appellata. Trago Rosæ silv. genus 2. German. nonnullorum Weinrosen/ Frauen Dorn/ Marien Dorn. Gesl. h. Rosa silv. humilior, Tigurenribus Weinrôse hirs. Rosa ros. sive sylv. quadam, foliis odoratioribus: Cynorhodi sive Caninæ Rosæ odorata species, quam Galli Eglentierum Ruellio teste nominant, qui & hanc sylvestrem Rosam Cynosbatum sive Caninum Rubum suspicatur, de quo Diosc. *κυνόβατος* *οξυακάνθη*: Extat & Cynosbati apud Theophr. descriptio, quam habet corectiorem Athenæus: Cum harum descriptionum utraq; non malè canina Rosa odorata convenire videtur. Est verò & alius Cynosbatus, quem Plin. l. 24. describit: sed hinc Cynosbato, sylvestris odorata (si modo legitima & nō corrupta est descriptio) nec quicquam similis est, veluti neque Cappari, neq; Smilaci asperæ, quarum utraq; etiam Cynosbatos à nonnullis appellatur.

Turn. Rubus canis, *κυνόβατος* Gr., Angl. Eglentier. In hac communiter spongia nascitur, ut scribit Plinius. Ego hanc nihil aliud quàm suaveolentem Cynosbati speciem existimo. Idem habet de Cynosbato. Dod. Gall. Rosæ 9. genus, Plinio Græcè *κύνος*, Lat. Rosa Græca, Gal. & Bel. *Eglentier*. Idem de flo. & hist. Rosa ros. sive sylv. quadam, foliis odoratioribus: Cynorhodi sive Caninæ Rosæ odorata species, quam Galli Eglentierum Ruellio teste nominant, qui & hanc sylvestrem Rosam Cynosbatum sive Caninum Rubum suspicatur, de quo Diosc. *κυνόβατος* *οξυακάνθη*: Extat & Cynosbati apud Theophr. descriptio, quam habet corectiorem Athenæus: Cum harum descriptionum utraq; non malè canina Rosa odorata convenire videtur. Est verò & alius Cynosbatus, quem Plin. l. 24. describit: sed hinc Cynosbato, sylvestris odorata (si modo legitima & nō corrupta est descriptio) nec quicquam similis est, veluti neque Cappari, neq; Smilaci asperæ, quarum utraq; etiam Cynosbatos à nonnullis appellatur.

Lib. Adv. Rosæ species altera, vulgò *Eglentier* aut *Eglentier*: in hujus potissimum ramis Bedegar vocatum provenit. Idem Obs. & Ic. Sylv. Rosa & Canina Rosa odorata, Angl. *Werbuschke* or *Heptree* sive *Frere* etc. Germ. *Wildrosen* & *Heckrosen*. Bel. *Wilde Rose*. Gall. *Eglentier*. Hisp. *Rosa salvage*. It. *Rosa canina*, *Rosa salvatica* & *canine*. An Lob. benè distinxerit Rosas sylvestres examinent lectores.

Lugd. Rubi genus aliud in quo Rosa nascitur, inquit Plinius, Dioleoridis *κυνόβατος*, qui in sepibus cum aliis Rubis gignitur. Latine Rubus caninus is appellatur, aut Caninabus, Arabicè Sent. Fruticem eum esse putant nonnulli, quem Galli *Eglentier* & *Eglentier* vocant, id quod notæ à Diosc. postea re-

stantur. Et licet in Dioscoridis historia nihil sit quod non sententiæ Herbariorum de hac planta ad stipuletur, dubitant tamen adhuc de ea rē quadam, alij aperte refringantur, in primis verò Matthiolus: cui respondent alterius sententiæ authores. Hoc primum, quod Matthiolus vehementer probat, & adversus Marcellum contendit, Cynosbaton à Cynorhodo sive Rosa sylvestri differre caulium robore, proceritate, crassitudine, aculeorum multitudine & rigiditate, folio jucundi odoris, ut inquit Plinius, sed angustij, nec latè de diffundentis (quod in Rosa sylvestri profus odoris est expers) in acutum delinente, eum Rose sylvestris folium summè laciunculam sit & majoribus incisuris divisum, quæ cum tanto perè inter se dissideant, Cynosbaton neque cum Rosa sylvestri, neque cum sativa à Dioscoride conferri oportuit. Nullo verò pacto adversat Plinij autoritas, Rosam sylvestrem Cynorhodon non Cynosbaton appellantis: qui præterea non scribit, veteribus Cynorhodon nihil aliud fuisse, quàm spongiolam illam, quæ medijs sylvestrium Rosarum ramis oboritur, ut citra illius mentem ait Matthiolus. Per-

spicere verò ex hac historia licet Cynosbati folium Myrto præsertim sylvestri simillimum esse, verùm latius in ambitu serratum, paulò minis acuminatum. Eiusdem fructum nucleo Olivæ, *κύνος* ut scribit Diosc. id est, similem, non *κύνος* id est, magnitudine parem: quoniam nec ejus magnitudo ea it ut Olivas superet Hulsanicas aut Narbonenses. Quod in Theophr. legitur de Cynosbato *κύνος* *κύνος* *κύνος* mendosum est, scribendum *κύνος* *κύνος*. Et postea pro *κύνος* scribendum *κύνος* & pro *κύνος* legendum *κύνος*: nam & Plinius folium hominis veligij simile est interpretatus. Hominis vestigium si consideres, principio non nihil latum, medio latius, in angustum & acutum, summo cacumine desinit, quale à calceatis arenæ, lutò ve imprimitur, tali præsertim calceo, qualem veteribus in usū fuisse ex antiquis statuis apparet. Ea figura imaginem foliorum Cynosbati representat. At quod scribit Plinius Cynosbaton uvam nigram ferre, Cynosbaton sanè cum Chamæbato confundit. Tam in Cynosbato quàm in Cynorhodo excrementum quoddam gignitur, globosum, hirsutum, & asperum, quod in Cynosbato pilulam Castaneæ similem Plinius appellat, in Cynorhodo spongiolam. Et hæc Lugd. quæ cap. sequenti Rosa sylv. alteram appellat vulgò *Eglentier*. Nos quidem non negamus Rosam Eglentiam esse: Cynosbaton, non invenimus tamen quod Lugd. scribit Plinium dicere folium jucundi odoris esse Cynosbato: nec discrimina quæ ponit multum facimus, nec demonstrat quatinus tanto perè dissideant, ut Diosc. Cynosbaton, neque cum Rosa sylvestri, neque cum sativa oportuerit conferre: An non Eglantina Rosa verè Rosæ genus est?

Turn. Eglentiam diversam existimat à Cynosbato, censuitque esse veterum Cynorhodon seu Rosam caninam.

Compiler Tabern. confundit in hist. cum nona Rosa, quæ est Eglentia, Rosam Dunensem sive Pampinulam. Cur Ger. pro Rosa silv. odorata, Angl. *Gerard's the Eglantine* or *Schneere* *Frer* dicta, figuram Tabern. Rosæ sylvestris posuerit, rationem non video: An Cam. h. Rosa canina *κύνος* *κύνος* *κύνος* vivis sepibus idonea?

C. B. pin. Rosa silv. 4. sive foliis odoratis: Engl. *Ant. Ruell.* Rosa silv. altera, Trag. Gesl. h. Rubus canis, Eglentierum, Turn. Cynosbatos, Lac. Rosa 10. Cynorhodi, vel caninæ Rosæ odorata species, Dod. Rosa silv. species altera, Lugd. Rosa Eglentaria, Lob. Adv. Tab. & Eysl. Rosa canina, Ger.

Provenit sponte Montbelgardi ad collem, quem vocant Condemine & alibi, ut Basileæ, Genevæ & Lugduni,

Matth. ve. Cynosbator differt à Cynorhodo.

Matth. re. Cynorhodon.

Lugd. nota.

Eglantina.

Cynorhodon.

Synon. C. B.

Locus & Tempus.

Lugduni, mense Junio, nunc Augusto, nunc Septembri, etiam cum spongia. Dodonæo hortensis est, nec usquam in Gallia aut Belgio sponte vivit. Angliæ & Flandriæ hortis ad odoris gratiam colitur, sponte oritur in Bithonia Angliæ, proximis collibus non procul ab ædibus D. Laurentij Huyde, Lob. Hanc cum aliquando Gesnerus in hortuli sui loco umbroso plantasset, odorem amisit: tamen civis quidam alius partim in ipso muro hortuli sui, partim juxta, loco aprico, valde proceram, & suavissimi odoris, quem nectareum dixeris, annis quamplurimis illic vivam habuit.

ROSA EGLENTINA FLORE pleno.

Locus.

Eglentina.

Syls flore multiplici.

Cynorrh. duplex.



Vesuntin in stirpium cultissimo horto Dom. à Bellofontaine vidi fruticem cum foliis odoratis, sed majoribus quam in spon-tanea. Et hinc Lob. in Obl. ait Rosam Eglentinam flore duplici in hortis variare: hanc in Ic. inscribit, Rosâ sylvestrem odoratam, flore duplici.

Cam. h. xxiij. dupl. duplicato flore, que pro Alabandica Plinij haberi queat. Hanc ego cum Camerario Alabandicam non centesimam: ea siquidem vilior Plinio albicantibus foliis.

C.B. pin. Rosa sylv. sive flore pleno: Rosa canina duplicato flore, Cam.

ROSA SYLVESTRIS, FOLIO Eglantinæ virescente, albo flore & rubello.

Alba.

IN Alsatia & circa Montbelgardum, in sepibus cum reliquis Rosis sylvestribus, genus quoddam provenit magnum, foliis quinque plerumque, ex virore nigricantibus, similibus Eglentinis rugis & colore, non tamen utillarum odoratis, præterea majoribus: rosæ sunt albæ: spinæ hinc inde per ramos adunæ. Hujus viram observavimus florentem Maio in Ducatu V. Ritembergico inter Stutzgardiam & Esslingam, flore rubello.

Rubella.

ROSA SYLVESTRIS ALBA CVM rubore, folio glabro.

Deser.

Folia.

Flores.

Capita.

Rosa canina vulgo Dod.

Rosa nostra sylvestris, folio glabro, in magnos excrescit frutices, magnis armatis spinis: folia sunt satis magna, utrinque glabra: flores simplices, quinquefolij, albi, cum aliquo rubore, in medio stamina lutea: succedunt capita longa, primum viridia, deinde Coralli modo rubra, quæ ubi planè matura, mollia redduntur, supidi gustus, cum aliqua aciditate: à pilis, quibus semina in voluta sunt, inter edendum, cavendum.

Dodon. se describit: Ea quæ canina Rosa vulgo dicitur, Belgio familiaris, aculeatis virgis, & asperis



foliis, satis similis est; singulis tamen minoribus: flos simplex, quinque folia non excedens, albicans, aut ex albo colore purpurascens. Adnascitur hujus virgis aliquando pilula quædam hirsuta, echino Castaneæ quasi similis, at mollis, quam spongiolam Rosæ nuncupant.

Spongiolæ de pila Rosæ sylv.

Lugd. sic, Rosâ sylv. quæ n. Cynorrhodon Plinius appellat, foliis est asperis, aculeatis: rami furculicæ, ut in sativa spinis hor-

Cynorrh. Plinij.

rent, sed graciliores sunt, foliaque multo minoræ: rosæ ipsæ simplices, albæ, aut in albo purpureæ, in odora: quibus tandem succedunt capita rotunda, ut in sativa, rubra cum matura sunt, in quibus semen lanâ opertum. In mediis ramis nascitur pilula quedam, hirsuta, à Plinio spongiola nominata. Hanc Septasarij quidam Bedeguar appellant, non sine errore, cum Bedeguar Cardus genus sit. Sed nec Dodonæus, nec Compiler Lugd. videntur cognovisse discrimina Rosarum sylvestrium. Icon nostra etiam Camer. valde placet.

Bedeguar de pila Rosæ sive perperam offic.

Dod. Lugd. notantur.

Est hæc illa planta quam Theophr. & Diosc. Canirubum Gazam vocant, & alij apud eundem Oxyacantham, male meo quidem judicio: Meliis alij apud Plinium Cynosbaton, Cynospaston: alij autem Neurospaston cognominant: existimo tamen eum duas plantas miscere.

Cynosbaton. Oxyacantham male. Plin. notat.

Cord. in Diosc. ait Canirubum Gazam apud Theophr. reddere, sed eundem fruticem alio nomine Cynorrhodon, Canis rosam, vocari: Esse autem nihil aliud, quam syl. & aculeatam hamatis spinis Rubum: esseque tres, aut quatuor ejus differentias, & ex omnibus hanc esse prociorem: Plinium Cynosbatum cum vulgari Rubo confundere, quosdam etiam hunc fruticem Arbutum esse credere, sed malè.

Canis rubus. Cynorrhodon.

Rubus sylv. Plin. error.

Arbutum male.

Tragi judicio Rosa syl. prior ex purpura dilute albicans, sive vulgare sylvestris Rosæ r. genus, quod Germani Wildbeetrosen/ Hanbütel/ & Büttelrosen/ & spongiolas quæ huic adnascuntur, Schlaßfungz appellant, Cynorrhodon Barbari fuerit.

Cynorrhodon. Barbari.

Dodon. g. Rosa r. xxiij. dupl. Rosa canina & Rosa sylv. Eid. hist. & de flor. Rosa 6. silv. canina vulgo vocata, nonnullis etiam Canina sentis, flore albicante, aut ex albo colore purpurascente, olim inodoro.

Canina sentis.

Holler. morb. int. Cynosbaton: Eid. de compof. medic. Cynosbati fructus de tracta interiori lanugine Senella vocata. At Senella solet dici de Oxyacantha Matthioli, quæ commendatur ad calculum: quare videndum an neab Hollerio duæ confundantur planta?

Holler. notantur.

Nescio, inquit Lob. in Adv. quâ fiducia invitum me nihil scire docere vult Matth. qui jam diu non novit, ne quidem postremo monitus agnovit Cynosbaton, cujus duo fructus, ut nomenclaturæ sic effigiaturæ ex antiqua descriptione persimiles, certum me faciunt, aut saltem ea non carere nos hodie: Est autem frequentissimus Cynosbati Rubi persimilis, promens florem & fruticem Rosæ sylvestris. An autem Rosæ sylvestris fuerint ritè perceptæ Lo-

Matth. reprob.

Rubus caninus.
Cynomorus.
Heliodoron.
Cynorrhod.
Cynorrhod. de spongia.

Cynorrhod. a Cynobato differens.

Rubus non est.

C. B. Synon.

Locus, cum tempore.

belio, valde ambigimus, videant le flores.

Anquill. vocat Rubum caninum. Rosas albas sylvestris Galeos lib. comp. med. fec. loc. Cynomoron, & Orisasti Heliodoron: Plinium ait tradere in hac inventi planta spongiolam, vocatam Cynorrhodon. Hanc Lob. spongiam Bedeguaris vocat. Tab. Rosam silv. *Heterose* non describit, ita ut nesciam hanc vel sequentem intelligat. Gesl. h. Rosa sylvestris Cynobati vel Cynorrhodi nomine veteribus dicta. Eid. cat. Cynorrhodon, Rosa canina. Hanc aliquos à Cynobato distinguere scribit non flore roseo, quem fert utraque, sed spongiolis quas Cynorrhodo attribuit, & Cynobato negat. Turn. eos errare scribit, qui Rubum canis & Canirubum, Rubum esse putent. Ger. vocat Rosam caninam in odoram, ejusque figuram assumpsit ex Tab. quae postea fuerat pro Rosa Eglentaria, cui mutavit nescio. Haec tandem est cujus turpis figura extat apud Lonice. nomine *Hagenbutten* & *Hanrosen*, & Cynobati Dioscoridis.

C. B. pin. Rosa sylv. live flore odorato, incarnato; Cynorrhodos Plinij & Barbari: Sentis canis & Cynobatos, Brunf. Rosa sylv. Math. Dod. odora, Ger. Cynorrhodos [*an n. n. hac Rosa pomis spinosis, folio hirsuto?*] seu Rosa canina, Thal. Rosa sylv. vulgaris, Lugd. Cam. ep. Rosa canina odorata & sylv. Lob. Rosa sylv. altior & spinosior, Cels. Rosa canina. Camer. Cynobatos & Rubertium genus, Lugd. Rosa sylv. odorata incarnato flore, Eyst. Huic, ut & tertia [*Rose Eglentaria plena*] spongiola adnascitur, quam Plinius in Cynobato, pilulam Castaneae similem: in Cynorrhodo spongiolam vocat.

Passi in circa scrobes, fossas & margines agrorum & pratorum locis humidis provenire tradit Dodonaeus. Ego diversis in locis diverso tempore florere observavi, ut Junio, Julio, Augusto, Septembri, Octobri & Novembri, ac etiam Spongiam ferentem.

ROSA SYLVESTRIS, FOLIO glabro, flore planè albo.

Deser.



Folia.

Locus.

Tempus.

alba cum rubore, folio glabro, sed multum serpens, ramosa quibusdam parvis spinosis: Eadem passim in silvis & fructus provenit & circa itinera inter Montbelgardum, & Borongne, aliisque in locis plerumque cum firgularibus floribus, modo cum pluribus ut ante dicitur: floret Junio & Julio, tardius paulo quam caetera sylvestres. Haec demum forte sunt Rosae albae odoratissimae quas reperi florentes mensè Septembri inter VVallenburg & Liechthal Basiliensium.

An Cordo in Diose. Cynobatos live Cynorrhodos, aut Rosa sylv. 3. omnium minima, nec multum à terra elata, ac propterea *Heterose*, quasi Chamarrhosos appellata. Cum nostra hac Rosa sylvestris non male videtur convenire Rosa sylvestris Tragi 4. species, Rosa 4. genus, *Cyauosen* / *Saberosen* / *Feldrosen* / live Rosa campestris, de qua ait: Rosas profert prorsus candidas, odoris non tam jucundi ut tertij generis, silvestrium omnium Rosatum vilissima. In sicca agrorum, sive limitibus juxtaque itinera Junio & Julio mensibus in flore suo apparet. An Gesl. h. Rosa campestris Tragi species altera, rosas prorsus candidas proferens. An Lugd. Cynorrhodon, sive silv. vulgaris Rosa passim in dumetis reperta ab Herbariis?

C. Bin pin. Rosa sylv. 4. speciem Tragi, facit Rosam silv. 17. live arvensem candidam: Cynobaton verò tertiam Cordi, Rosam silv. 18. sive campestrum repentem.

ROSA SYLVESTRIS ALBA, CVM aliquo rubore, folio hirsuto.



Deser.
Rosa sylvestris *Deser.*
genus hoc magnum ramosum, spinis hinc inde aduncis, robustis, cuius foliola quina, vel septena, subrotunda, rugosa, albicanata, hirsuta, nonnihil odorata, minus tamen quam Eglentariae: flores quinquefolij, albi, cum aliquo rubore quorum pediculi spinulis asperi, circa Montbelgardum in scipibus & dumetis cum caeteris frequens est. Hujus alia species *Varieta.* quaedam à me reperta est mensè Septembri in monte VVirtemberg, ubi sita arx Teck. spinis non curvis, sed rectis: foliola huic quidem etiam hirsuta, sed tenuiora, minus rugosa, angustiora, septena; in pediculi dorso rarae quaedam spinulae.

Cord. in Diose. Rosa canis, Cynobatos quarta, majora, quam tertia omnium minima, & lanuginosiora [*forte longiora & lanuginosa ut in margine (vixi-prum)*] & incana habens folia, & rosas in candido suaviter rubescentes. An Thal. Hircyn. Cynorrhodos alia flore paulo minore ex candido tenuiter rubescente.

Cynobatos quarta Cordi.

ROSA CANDIDA PLENA ET femiplena.

Deser.
Rosa alba assurgit virgibus longis, lignosis, fungo-
sis, in quibus spinulae acutae, aduncae, rarae; cortex
alioqui politus & levis: foliola quinque vel septena,
crenata, glabra, sublonga, quaedam parva rotunda,
pediculi dorso spinoso interdum: extremitas ramis calices plures, ex pediculis spinulis non minacibus in-
harent, quibus apertis apparent rosae pulchrae, odoriferae, albae, multorum foliorum (interdum cum
negliguntur pauca producant solia, nisi aliud genus sit) quorum interiora minorae, exteriora verò
majorae & ampliorae, in medio apices luteos includentia:



dentia: succedunt fructus rotundi, rubri, ubi maturi, in quibus grana dura, lana involuta. Hic feutex quia procerior, ideo melius frigus tolerat, quam rubellæ: ideo putandi quod tannis ramuli qui flores tulere. Nota Icon ex emptiis non placet.

Dod. g. Rosæ. genus, Rosa Damascena Italia, Rosa alba Gallie, Campana Plinij. Eid. fl. & hist. Rosa fativa vulgò Rosa alba, Rosa spinosa Plinij, si modo ejus Campana non sit.

Lob. Ad. Rosa fativa candida. Gesl. Rosa alba hortenses multiplici folio: Rosa vilissima, albicantes: Monachorum alba Rosa, que & Centifolia. Eid. coll. Matth. & Apollinari Rosa alba. Trago, Rosa hortensis multiplex alba. Tab. Ger. Anguill. & Lugd. Rosa alba. Cam. h. Rosa alba, candida simplex & plena. Ryff. in Diosc. Rosa flore albo. Caf. Rosa parva quinqué foliis constans candidis: & eadem multifolia, fortè Prænestina Plinij, quæ celebratissima, novissimè definit.

Rosa albas Campanas esse existimat Lugd. eafque omnium vilissimas tradit, de nuptis Damascenis. Addit quædam esse foliis densissimis, ut antiquorum Alabandica: has Spineolas fuisse arbitrat & Centifolias.

Syn. C. B. C. B. pin. Rosa fativa sive alba vulgaris major, Campana Plinij: fativa alba, Brunf. Rosa domestica alba, Matth. Rosa a. candida, Caf. [*hee nobis est lacteola, de qua m. x.*] Hujus flores foliorum numero variant: hinc Rosa flore albo pleno & simplici, Eyslett.

Ling. nomi. n. Getm. Weisse Rosen/ Weiss garten Rosen. Belg. Witte Roosen. Gall. Roses blanches. It. Rosa bianche. Ang. The white Rose.

Locus & Tempus. In variis locis vario tempore floret, ut Maio & Junio, Octobri & Novembri. Castardissimè floret, & perdurat usque in Autumnum. Amarior hæc & majorem vim purgandi habet.

ROSA LACTEOLA.

Rosa lacteola, elegans, non magna, foliis multatis, dense stipatis: quæ singula, si evelluntur, candida sunt, cum verò simul calyci inhaerent, in flore integro videtur quidam dilutus rubor emicare.

Locus. Vratilavia copiosè in hortis coli dicitur, unde etiam ad nos proveniunt. Hæc Centifolia Plinij videtur, numerosis foliis & parvis. Nec tamen est talis odoratissima, quam vis r. liquis odoris præstantia parum cedit. Extremos veluti margines in coronis aptè ornat, quod exigua sit, Cam.

C. B. pin. Rosa fativa sive alba minor.

Et hæc, me judice, jilla est, quam Cafalpinus quarto loco tradit, maximè omnium numeroso folio constantem, sed parvo, odore valde exili, quam Plinium Alabandicam vocare scribit, vilioerem albicanibus foliis: & Spermoniam plurimis foliis sed minutissimis, vilissimam, non multo odoratam.

ROSA HUMILIS, FLORE albo Clusij.

Rosa s. Clusij humilis est & fruticosa, foliis illi Desfer. quæ album florem fert, persimilis: sed ejus flores, licet albi, longè minores, neque unquam planè sese explicantes, ejusdem cum alba vulgari odoris & coloris, qui tamen plus carni admissum habet. Paulò serius illa floret. Hanc primùm observabat autor in cultiss. D. Ioan. Aicholtzj orto, unde illam adquisivisset, ignorantis: Deinde Francofurti ad Maximum, in quorundam Patriciorum hortis. Plurimum autem accedere videtur ad Græculam Plinij. C. B. pin. Rosa sylv. sive odorata albo flore: Rosa sylv. humilior, Caf.

ROSA MOSCHATA MAIOR.



Rosa Moschata Desfer. floribus maioribus, albis, frutex est robustus, resus, spinosus, ut Moschata minor: in ramorum summitatibus, ex pediculo raris aliquibus spiris aculeato Rose enaescuntur, plerumque quinque aut septem foliis constantes, magna, albe cum aliquo rubore, qui potissimè detegitur cum exciscentur: Odore suavissimo floret Junio. Geneva in hortis, non facillè ladicur à frigore.

Hanc florentem Maio observavi, etiam Clavevalla in oppido Burgundia, unde transiit Montbelgardum in hortum, ubi quotannis ferè partes superiores gelu absumuntur.

Lob. Ic. Rosa moschata major species. An de hac loquitur Caf. Rosa candida, quæ ex translatione in Campania & circa Philippos adeò profecit, ut latissima & maxima folia provenerint, non tamen odoratissima, quam Centifoliam vocant; Muscatula a pup nos appellatur ob odoris excellentiam: sed quæ opere topiatio colitur, caudice cæteris crassiore: ramis longissimis aculeis rarioribus.

ROSA MOSCHATA MINOR flore simplici.

Hæc jam olim à me sic descripta: Rosa Moschata magnos habet stolonos, rectos, crassos, statim à radice prodeuntes, in quibus spina rare, interdum à trunco rubrae ac robusta: rami tactu essent laeves, nisi interdum spinæ intervenirent, in quo quiddam habent commune cum Rosis albis fativis, ac differunt ab Incarnatis vulgò dictis, quorum rami undique valde spinosi. Folia satis rara quæ non multum differunt à Rosis albis & incarnatis, nisi quod minus rugosa, & magis acuta, glabra superne cum viriditate, infere è albidiora cum pilis vix apparentibus, in circuitu serrata, quæ ut plurimum habent septem foliola, interdum novem, majori ex parte sibi invicem opposita, in scilicet pediculis parte infima

Nerfi.



Vingues.

Apices:

Odor.

Nesrin A. Siam.

Muscataella Nesrin.

Damascena.

Spineola Plinio.

Alexandrina.

Damascena.

Nesrin Bellin.

Nesrin Al. h. v. l. ann. enis. P. p. n. acit. Nesrin. Monach.

spinæ valdè adun-
ca. Rami extremi
divisi in alios mi-
nores, qui quadam
quali lanugine ob-
ducitur & rubent,
pauci habent folia,
abundantque mul-
tis floribus simul
coherentibus qui
priusquam se ex-
pandant longa appa-
rèt capitula, mol-
lia & hirsuta. Ape-
rta rose vix diem
durant, & medio-
cres sunt magni-
tudinis, alba, habent
nonnunquam un-
gues rubentes, qui
lutei sunt prius-
quam expandun-
tur, constantes singulæ quinque foliolis: apices lu-
tei foliolis decidentibus nigrescunt: relicto in me-
dio uno magno, hirsuto, clavam aliquatenus exprime-
nte. Odor cum suavitate insignis, moschum ut
benè ait Dodon. proximè referens, sapor amarus,
astringentis non magnè particeps, aliquam acrimo-
niam in faucibus relinquens.

Auctores sunt Morachi in Mesopotamiam cap. de Nesrin, vel Nesrin, sive Neferin, loqui de Rosa hac parva sylvestri alba, vulgò dicta Damascena, seu Damachina, & à nonnullis Rosa muscata. Ang. Nesrin serapionis, *M. fihette* Rose simplicis. Sylv. & Ryff. Rosa moschata. Matth. Rosa Hetruscorum Damascena, *Moschette* vulgò dicta, de quibus ut ipse credit, non est intelligendus Mesue, quòd eas illi facile incognitas fuisse existimet. Has enim veteribus cognitatas fuisse existimet. Memoriae prodit nemo: ni forte esse eas credamus, quæ Plinio Spineola appellantur, quæ cæteras excellunt odore. Lob. Adv. & Obs. Rose Moschata. Eid. Ic. Rosa Moschata flore simplici. Dodg. Rose fativa 6. genus, Plinio Rosa Coroneola, N. otericis Rosa feta & Rosa Autumnalis, Belgis *Musset* rooskens. Eid. de flor. & hist. Rosa fativa 5. Hetruscorum Rose *Moschette*, ubi Coroneola Plinij esse posse tradit, eamque Damascenam nonnullos appellare, flore ut plurimum simplici. Gef. h. Rosa moschum fragrans: Rosa muscata simplex: Moschata vel Alexandrina vulgò, & ab aliquibus Damascena appellata. Is se audivisse scribit eadem marinas à nonnullis vocari, colique jam in hortis circa Verbanum lacum, sed fortè genus diversum esse: Monachos interpretes Mesuei Nesrin vel Nesrin Arabicè hunc fruticem vocare, aliàs Rosam putare. Item in app. ex Anguill. Rosam Moschatam, vel Damascenam, Alexandrinamve Nesrin Serapionis vocat. Idem tamen lib. de Quadrup. Rosam Moschatam esse Nesrin Avicennæ negat, his verbis. Rosa Damascena seu Muscataella vulgò dicta inter sylvestres annuerari potest: quam Avicenna Canone 2. c. 514. Nesrin vel Nesrin, vel Neferin nominat, ut Bellunenſis interpretatur, cujus hæc sunt verba: Nesrin est Rosa odoris acuti, quæ vulgò in Hispania & Barbaria Rosa Muscata dicitur. Damasci est Rosa Nesrin vel Nesrin, & est species Rose sylvestris. Simon Ianuensis etiam & Pandeclarus, Neferin vel Nesrin, auctoritate Albavi dicunt esse Rosam sylvestrem & albam, quam frutice spinoso ut fativa nascatur. Serapio Nesrin vocat, & ab aliquibus Rosam sylvestrem & Rosa n. Serp. nominari scribit. Monachi in Mesuem albi etiam Nesrin Rosam parvam, sylvestrem al-

bam interpretantur: cui Avicenna & Serapio eandem facultatem attribuant, quæ præditum est Zambacum vel Iseminum, sed infirmiore. ut in penuria Olei Zambacini, oleo de Nesrin id est, Rosæ Damascenis uti liceat. Nesrin, inquit Avicenna, calidus & sicus est ordine tertio. Omnis species (pars) ejus vim habet abstergendi & attenuandi, sed flos præcipuè. Nervis frigidis prodest. Vermes aurium occidit: & tinnitum earum tollit. Dentium dolorem mitigat. Sylvestris in hoc genere fronti in capitis dolore illinitur. Prodest gutturi & tonsillarum abscessibus. Drachma quatuor inde potæ, de sylvestri præcipuè, vomitum & linguatum sunt. Hæc Avicenna de Nesrin. Sed cum planta sit calida & sicca in tertio, & eadem serè quæ Zambacum efficiat, Rosæ eam adnumerare non possumus: neque enim ulla nobis Rosarum species sive fativa, sive sylvestris cognita est, quæ tertio gradu calfaciat, & illa præter, quæ plantam Nesrin præstat ex Avicenna nunc recitavi. Quamobrem aliam esse oportet Rosam Damascenam sive muscatam vulgò in Italia dictam: cuius Matthioli etiam meminit, perquam odoriferam esse scribens, colore albo, & ventri movendo cæteris efficaciotem. Ego loco Nesrin Iseminum vulgò dictum, aut Leucoia potius quam ullum Rosarum genus usurpare malim. Nesrin id est Zambacum sylvestre calidum est & siccum. & calidi temperamenti, caput lædit (& vel sanguinem è naribus aliquid suo odore elicit) Ralis. Idem apud Serapionem, vidi, inquit, in Coracem qui dabant soliorum ejus duas aut tres ad summum drachmas unde venter admodum movebatur. Nesrin est sicut Narcissus, Avicenna & Aben Mesuai: ego Narcissum hic falsò legi video, sive authorum, sive interpretum aut librorum hæc culpa sit: nam neque forma, cum sit frutex Rose similis, aut saltè magnitudine par: neque vires cum Narcisso conveniunt. Fieri quidem potest ut ea vox corrupta sit pro Isemino. Quamquam rursus in Narcisso etiam apud Serapionem scribitur, Narcissum ea e efficere quæ Iseminum. Sed legendum est Nesrin, non Narces (sic enim Narcissum vocant) ea præstare quæ Iseminum, ut Avicenna & Mesargie docent. Serapio quidem, vel citatus ab eo author vocum affinatem facile falli potuit. Est autem Zambacum sive Iseminum frutex floribus odoratis, quem Galli & Itali etiamnum Iseminum appellant, docti quidam Iseminum, & Vnguentum ejusdem nominis, Dioscoridi descriptum, ex floribus ejus confici arbitrantur. Ego eundem fruticem Vergilij Cassian esse puto, apibus gratam, ut pluribus in apium historia docebo. Quòd si Nesrin Iseminum sylvestre est, ut Ralis scribit, non rectè Avicenna hujus plantæ genus sylvestre privatum nominaret, fativum etiam genus ejus alterum esse intelligendum relinquens. Cum de Sambaco id est Iasinin (sic enim Bellunenſis hæc vocabula scribit) seorsim agat. Scribit autem Sambacum calidum & siccum esse ordine tertio, & oleum ejus prodesse nervis frigidis, in senibus præsertim, sed odore suo, caput lædere, quod Dioscorides etiam de Iasinino tradidit unguento. Sed sive Sambacum sylvestre hæc planta est, sive similis ei, fat fuerit intelligere eandem utriusque facultatem esse: Sambaci tamen efficacior paulò: & nullum pro eo Rosarum genus substituendum. Rose quidem nomen (vocant enim Nesrin aliqui Rosam agrestem, & Rosam seni, ut apud Serapionem legitimus) non satis est ad probandum propriè dictæ Rose hæc speciem esse: ut neque Viola propriè dictæ generata sunt, quæ vocantur Leucoia Dioscoridis, & Leucoion Theophrasti. Oleum de Nesrin utile est adversus pleuræsin ex atra bile, & uten dolores, Aben Mesuai. Hæc Gefn. cujus argumentum mihi non

Zambacum Iseminum.

Nesrin Avicenna duplex.

Vires.

Non est Ralis species.

Damascena. Matth.

Leucoia. Zambacum sive Rasi.

Nesrin est sicut Narcissus.

Narces.

Gefnot. non

non facisfacit, quo negat Rosam moschatam esse Nefin Avicennæ, quod desumptum est à viribus. Rose enim muschatæ sunt calidæ, & prætare posse videntur que Avicenna attribuit Nefrin. Sylvio Rosarum calidissimæ sunt, ex odoris gravitate insigni: sapore quoque amaro, cum acrimonia & adstrictione non pauca. Sylvestre etiam Nefrin si est Rosa nostra sylvestris, optimè respondet viribus ei attributis ab Avicenna, que contraria in quibusdam facultatibus & viribus Rose Moschatæ. Ieseminum quod Gesnerus loco Nefrin sumere mavult, nobis non videtur calidius Rosa Moschatæ vires à Rhafi adscriptæ non repugnant: odor ejus non minor quàm Iesemini, cerebrum valenter feriens, & caput tentans, Amato. Quod Serapio scribit de purgandi vi, optimè convenit Rose Moschatæ, quæ violentè purgare annotavit enim Amatus purgare non minùs quàm Scammonium, ac idèdè abluendum ab eis suadet: historiam recitat mulieris, quæ ex gustato condito harum rosarum, faucium & lingue excoariorum cum stomachi rosione contraxerit. De Iesemino id non constat. rosa mosch. simplex flore est satis simili Narcissi flori, qui roseus. Odor etiam vehemens, nec vires tantùm differre putamus, quantum putat Gesnerus: perpendantur vires Narcissi à Dioscor. tradita.



no, Coronæola Plinij quoridam, quod inde coronæ odoratissimi necessestatur & autumnno nascitur. Quamvis forsitan posterioribus sæculis prinum Italia innotuerint. Quid enim mirum, quamvis multa Theoph. & Plinio Rosarum generia numerentur, alia etiam extitisse nostra ætate. Tan tope enim diversis locis per se & humano opere coacta variat natura suas opes.

C. B. pin. Rosa fativa: sive moschata fl. pleno, *Synon. C. B.* Coronæola Plinij: Rosa muscatula multifolia, *Cast.* Rosa alba Damascena fl. pleno, *Cast. Eyst.* Rosa Coronæola altera, *Lugd.* Prænestina Plinij, aliorum.

Ger. Weiss gefülte Muscat Rosen Belg. *Debe Ling. nominu.* bel Muscens Roose. Ang. The double Muske Rose.

Rosa Moschatæ duplè conduntur & estantur passim in Italia, Venetiis præsertim alvum jucundius, *Lob. sed vehementius* cicut, & animi deliquia, stomachi cordisque lancinationes accerfunt. Sed quàm jucundè cicut alvum, si tam prava symptomata excitant evacuando, videant lectores. *Lob. rax. tur.*

ROSA SVCCCHARINA PLENA.

ANNO 1608. Maio mense in horto fontis & balneis. *Deser.* Ancè admirabilis, occurrit Rosa hæc alibi non visa, spinis multis, ut Incarnata, horrida, cui & folia serè similia, utrinque pilosa, quinque vel sex foliolis constantia, ad pediculi originem lata, veluti duræ auricula, crispiora, quàm incarnata: capitula hispida, brevia, crassa: floris color ruber. Aiebat hortulanus vix in totum explicari eam Rosam Idibus Junij.

ROSA LVTEA.



Ranor & speciosa est Rosa lutea, spinosis virgib, foliolis glabris quinis vel septenis, vix tantulum horridis: floribus luteis simplicibus, cum gravitate odoratis: pomobreviore, ventrisco flore: repit & multùm se propagat. Hanc ita delineat *Lugd. Rosa lutea veteribus in dicta, aurea dicta, quod luteo aureo ve colore fulgeat, à cæteris Rosarum generibus foliis, flore, odore, & pan:*

Nam parva ejus folia sunt, rotunda, obtuse viridita.

ROSA MOSCHATA MINOR, flore pleno.

ROSA Moschata flore pleno similis est simplici, habens in floresfoliola exteriora majora, interiora minor: Videtur Lobelio sylvestrem exuisse animi obitorum arte & mangonio, & hortensis duplè facta.

Lugd. Rosa Damascena, sive Autumnalis altera, densi foliorum congerie, & eximia odoris suavitate delectans. Ges. h. & Ger. Rosa muscata multiplex. Dod. Rose fativa: species rarior multiplex. Lob. Adv. & Ic. Rosa moscata. Tab. Rosa muscata alba multiplex. Cam. h. Rose Damascenæ flore ple-

Synon. cum nominib. linguar.

Damascena biflora.

Deser.

Synon. Damascena sive Autumnalis.

Rosa alba multiplex.

Rosa aurea Scieribus in dicta.

viriditatis, valdè infecta, incisurarum cretis propemodum rigentibus, caulibus valdè spinosis, flore aureo sive luteo, cætera aliis simili, sed simplici & quinque tantùm in foliis constante, odore gravi atque ingrato accusanda natura quæ floribus egregio suavem odorem, id est, roscum invidit, quo si non caret, haud postremum locum inter flores excellentes obtineret; de lapsò flore poma succedunt ad eò Sorbis familia colore, figurâ, & interdù magnitudine, ut imperitus ac in exercitatus, ea vix a Sorbis discernat.

Synon. Bellon. Rosæ Alexandria, & totius Ægypti, flore luteo sine odore. Card. ter. var. Rosa crocea malè olens. Gein. h. Rosæ citrinæ seu luteæ, quam Augustæ ali in odorem audio (& vulpinas cognominari) fructice tamen odorato : Eid. Rosæ Indicæ magnæ, coloris aurei, V Veisela. Sed quid si forte VVeifelus intelligebat florem majorem Africanum Lob. Adv. & Ic. Angl. Can. h. Tab. Ger. Cast. & Cæs. Rosa lutea. Dod. fl. & hist. Rosa s. sive Rosa sylv. a. lutea dista. Match. Rosa quædam Italiæ aureo colore fulgens, sed odore admodum ingrato atque infuavi.

Rosa lutea C. B. pin. Rosa sylv. n. sive lutea simplex: Rosa lutea, fl. simplicis, Eysl.

Locus. Luteam Rosam Ægypti & Africae plerique in hortis nunc habent, florentem Maio & Junio. Rosas luteas cũ n aliàs sepè vidit, inquit Lob. Argieria Africae, ex Numidia Gallia in quibus factas; tam in Anglia consimiles, solerti manu in Genistæ scapum inlitas, unde colorem viridisque mutatur novas. Si Lobel. vidit cur non demorstrat discrimen inter naturales & inlitione mutatas: certum est Rosas luteas omnes, quas hæctenus conspexi non solùm colore, sed etiam formâ florum, foliorum & stolonum, posse distingui vires expertus cut non indicat ubi & quomodo. Scribunt aliqui Rosæ albæ furculum factò sotamine per Genistæ scapum tractuctum, luteos flores producere.

Lob. notat. C. B. pin. Rosa fativa 16. sive Rosæ subviridis, C. Bauh. pin. Est & jam diu videre, ut refert Lob. & ex hoc Lug. *Rosa Caru.* Ceruleas Rosas in hortis Italicis. Sed optatum ego *hæc.* scire hortos, si extant, ubi proveniant, & qua in re differant à cæteris Rosis.

ROSA SEMPER VIRENS, Clusio.

Mittebat ad me, inquit Clus. Patavio Joachimus *Locus.* Mungermannus anno Christi 1592. cu jusdam Rosæ semen, cujus schedæ in scriptum *Rosa semper virens:* ex eo Francofurti terræ commisso nata sunt planta, quæ mirificè quidem luxuriarunt, sed nulla florem protulit, præter eam quæ translata in Academico Lugduni Batavorum orto alebatur, cujus *Tempus.* flos demum anno 1605. conspessus est Julio mense, magnâ sanè meâ lætitiâ: valde enim metuebam ne ad eò adulta nullum florem proferens, soli mutatione sterilis evasisset. Multis porò hæc Rosa stam à radice luxuriat færmētis flexibilibus & caducis, nisi quis palo sustineat, aut ad parietem applicet: nam non valde crassa sunt, sed lenta, viridia, spinis rubescentibus, hami instar aduncis & mucrone versis terram converso obstita, ut pleraque serè omnia Rosarum genera, eaque alternatim ambiuntur à foliorum alis, septem interdum, sed quinque ut plurimum, foliis præditis, ex adverso se se spectantibus: horum duo quæ latiori alæ sed, quæ tantum amplectitur, proxima, minora sunt, bina alia quæ succedunt illis duplo præter majora, quantum extimam alam occupans, & imparcem numerum faciens, omnium maximum: singula autem à nervo medium folium occupante aliquot venas habent ad folij oras excurrentes, in ambitu sunt serrata, & præ viriditate splendent, nec desunt ut in aliis Rosis, sed etiam hieme permanent: eam ob causam Rosæ semper virentis nomen illi inditum. Novo verè ex flagellis illis sive færmētis è foliorum alis multi oriuntur *Nominis ratio.* velli rami, iiritio quidem cum foliis non nihil purpurascētes, deinde verò colorem viridem contrahentes: quorum nonnulli summo fastigio ternos aut quaternos gerunt flores unicuique gracilibus petiolis subnixos, quinque foliis penè unicuique constantes protulit nivei candoris, è quorum medio plura staminula prodeunt candida, flavis apicibus insignita, & inter illa capitellum hirsutum albicans. Floris odor suavis est, & ad Rosæ moschatae simplicem quinque foliorum seriem habentis odorem valde accedit; sed nec ipsius floris forma valde dissimilis.

C. B. pin. Rosæ fativa 13. sive Rosæ moschatae semper virens fl. albo, Clus. hist. app. alt. auct.

DE ROSARVM COLLECTIONE, delectu, repositione, & substitutione.

Debent igitur Rosæ tempestivè colligi, antequam penitus apertiantur, & cum adhuc clausæ, conifiguratam mutantur & in umbra siccatæ; sepiusque, ne situm contrahant, versæ ad suos usus reponi. Hæc Cordus eadem serè Fuchs. de compos. medicam. Sunt, inquit Sylvius, præstantissima quæ longè omnium suavissima sunt, & alis rubicundiores, quales ex mortanis, non autem consalibus leguntur: siccatæ loco sublimi meridiano, quo solis radij penetrent, rosas tamen non tangant. Nam alba *Delectu.* bina incat. *Vbi et quomodo siccatæ.*

ROSA LVTEA FLORE PLENO.

Locus. **I**amdudè Clusius flavas Rosas, multiplici foliorum serie præditas, extare accepit: Viëna enim Austriae ad ipsi scribebat nobilis Matrona, ejus ipsi factam esse spem. Et certè paucis post annis intelligebat non modò Matronam illam similem plâtam adquisivisse, sed etiam Pragæ in Cæsareo orto alitum in quibusdam Germanicæ locis reperit apud eos qui in colendis peregrinis & elegantibus plantis operam collocant. Inter illos Frid. Majerus Argentinensis, anno 1601. digitalis longitudinis ramulum binis foliis præditum & florem sustinentem flavum multiplici foliorum serie constantem, ad eum mittebat, sed prorsus aridum: sed & anno insequente ab eodem accipiebat similis Rosæ furculum sine radice, spinis armatum, perinde ac hi qui florem flavum simplici quinque foliorum texturâ constantem ferunt, atque foliis illius prorsus similibus.

Syn. C. B. C. B. pin. Rosæ sylv. 12. sive lutea multiplex: Rosæ flava plena, Clus. hist. & ap. 2. & cur. post. Rosæ lutea maxima flore pleno, Eysl. Hæc duplex, altera florem totum expandit: altera verò semiclauso flore permanet. Germ. Guel Rosen. Gall. *Rose jaunes.* Angl. The yellow Rose.

ROSA SUBVIRIDIS ET cerulea.

Si in teneras Agrifolij arbusculas Rosæ inserantur, virides flores producere scribunt aliqui apud Cametarium. Quamvis interdum anni constitutio-

ba, incarnata, moschata, quamvis recentes odoratissimi na sunt, tamen siccate sunt in odore: rubra contra recentes parum odoris reddunt, siccate jucundissimum & diuturnissimum jaculantur. Ex agro montoso petroso Pruni urbis, unius diei itinere à Parafis distite in universam propè Galliam omnium præstantissimæ convehuntur, in territorio tamen Parisino non insuaves præsertim vico cui Fons Najaduni nomen etiam vulgò est, larga manu luxuriant sabulosis vineis, quæ urbi toti satis esse possunt, ut Pestanas & alias præficus celebratas rosas, non desideremus. Rubras admodum foliis paucis & planis præditas præfert Mesfes. Rosæ tardiùs colle-

Colle. tio.

Propos. sio.

Rosæ absq. sive rubra.

Rosæ recent. res.

De subst. tie.

Succo pro Rosis. Sc. rontibus.

Dicitur ex Matth.

Matth. no. tatur.

Cardano casis di. Sc. rontibus. odorum.

Rep. sio. Curd.

pone, claudere os cera & sepeli. Sed longè melius Palladij experimentum, decerptos enim botros arundini virenti & plantata discisso nodo impones, & nodi partes coite patietis, abscessa arundine cum opus fuerit botros excipe & aqua tepida fove. Nos accipimus folia Vitis, & modico sale aspergimus, rosarumque boltros interponimus ad modum strati superstitati, ac simul omnia ad usum cum aceto in vase vitreo foliis Vitis superpositis benè obturato natantia conservamus.

ROSARVM VIRES ET
usus.

Dioscoridem potissimum de rosis rubris scribere, ex sequentibus ejus verbis satis constare arbitror. Rosâ, inquit, frugescat & adstringit. Sed sicca [Znèd, Marcell. sup. recens.] magis adstringit. Succum autem exprimere oportet & teneris, forfice defecto eo quod unguem vocant; reliquum autem exprimere, & in mortario terere in umbra, ita ut assidue ventantur, ne situ corrumpantur. Facit id quod aridis rosis in vino coctis exprimitur, ad dolorem capitis, oculorum, aurium, gingivarum, sedis [Sunt. in. u. vulg. exempl. Sunt. in. u.] intestini recti, & uteri, penquillitum & affusum. Ipse verò citra expressionem contusa & imposita, ad præcordiorum inflammationes facit, & ad ignes sacros. Sicca verò trita femota [Sunt. in. u. unguentis, femina vertit Ruell. & Sarracenus: in quibusdam exemplaribus errore fortè Typographi legitur sicca femina consperguntur] asperguntur, & compositionibus antheris dictis, & vulnerariis antidotis ammiscentur. Utuntur etiam ad medicamenta ornandis palpebris commoda. At qui in medijs Rosis reperitur flos, is siccus aspersus ad gingivarum fluxiones facit. Capita verò pota, alvum fluentem, & sanguinis rejectionem cohibent. De Rosis ita passim Galenus: In Rosâ natura aliud gustantibus acerbum est, quod terreum ut sit & crassum frigidumque necesse est: aliud verò amarum, quod tenue est & calidum, & tertium in his aqueum, necessario quidem frigidum, sed in tenuitatis crassitudinisque oppositione quadantenus summorum medium, cujus mixtura neque ipsum illud acerbum, neque ipsum amarum summè est tale, quale dicitur: qualitates enim omnes exoluit aequi admixtio. Ipsum itaque hoc aqueum elaboratum, extenuatumque, atque excalescens quodammodo videtur, ac perinde facillè in vaporem solvi, & hac ratione rosam cum odoratam esse, tum celerimè resiccari. Atque hæc omnia de eo ex gustu conjicias. Rosarum flos magis etiam ipsis rosis adstringit, ac proinde sanè etiam excicatorius est. Quin rosas experiri cuidam suasi, sensitque in nocturnis veneris imaginationibus ex his substratis levamen citra ullam renem noxam. Liceat reperiantur Medicorum plerique qui experientia posthabita, an rubra sit rosa, an benè olens, considerant, negligentes ubi caput ipsi exaltuat, coronis ex Rosâ contextis, capitique impositis, aut succo ejus, aut oleo rosaceo, sic vel ipsa experientia, id quod res est, discernere. Nam si excalescant, magis etiam calida fuerit: si refrigerentur, frigida: quod perinde est, atque refrigeranda humanæ naturæ facultate pollere, &c. Et profecto experientia quidem ratio tam facilis est, cum in rosis, cum in cæteris medicamentis omnibus. Nam Rosis aut coronari liceat, aut eis contritis hominis æstuantis os ventriculi illinere, aut succum earum expressum objicere, aut oleo aquæve mistis aliquam corporis partem coëficcare. Sed quid

Siccaram.

Alvus salu-

Temper. ex Galeno.

Imagin. stiones Venereæ.

hæc multus commemorato, cum nonnulli miltum Opobalsamo, rosarum succum sub canis ardoribus refrigerari causa corporibus inungant, usua videlicet ipso docti, cum hoc fecerint abunde refrigerant, &c. Verum rosa illis nequaquam his in rebus propinqua est: tamen si quod ad caloris tepiditatem & essentia tenuitatem atinet, perquam sanè & ipsa inflammationibus in hypochondriis consistentibus utilis esse possit, nisi adstrictio (quæ una quoque illi inest) multatiam læderet, quæ maximè iis obest, in quibus Chamamelum præcellit, nempe condensata corpora rarefaciens, indurata molliens, tensa relaxans. Nam iis omnibus inimica adstrictio est. Attamen ad ascensus augmentaque inflammationum, ac potissimum earum quæ in exterioribus membris extant, Chamemelo rosaceum præferat: quippe cum hæc tepida caliditate cum leui adstrictione indigeant. Eademque ratione eadem caput ab odore rosarum iuvari consentaneum est, cum à solis evulsionē laborat. Apud Plinium de rosæ sequentia comperimus. Excalcatoria & rosâ [Corn. tun. us. cum resina imponitur ex calcatoria. At rosâ adstringit &c. primum scabulum ad superiorem refer] uteros astringit, refrigerat. Vitis ejus dividitur in folia & flores. Folium siccatur, aut tribus modis exprimitur. Per se, cum unguis non detraxerit: ibi enim humoris plurimum. Aut cum detractis unguibus reliqua pars aut oleo, aut vino maceratur, in sole vas vitreus. Quidam & silem admiscet & Anchusam nonnulli, aut Apalathum, aut Juncum odoratum, quia talis maximè prodest vulvæ ac dysentericis. Exprimuntur eadem folia detractis unguibus, trita, per leuicum spillum in æreum vas, lenique igni succus coquitur, donec fiat crassitudo mellis. Ad hoc eligi oportet odoratissima quæque folia. Vitis succi ad aures, otis ulcera, gingivas, tonsillas, gargarizatus, stomachum, vulvas, sedis vitia, capitis dolores. In febre per se, vel cum aceto ad somnos, nauas. Folia utuntur ad callibepharam. Et succi femina [sem. a forte melis] asperguntur. Epiphoras quoque aridalesniunt. Flos somnum facit. Inhibet fluxiones mulierum, maximè albas, in posca potus, & sanguinis excretionis. Stomachi quoque dolores, quantum [ran. tum ver.] in vini cyathis tribus. Semen his optimum crocinum, nec aniculo vetulius: & in uabra siccatur. Nigrum inutile. Dentium dolori illinitur. Vrinam det. Stomacho imponitur. Item igni sacro non veteri. Naribus subductum caput purgat. Capita pota sanguinem & ventrem sicut. Ungues rose epiphoras salubres sunt. Hæc enim oculorum: rosa sordescunt, præterquam in initis epiphora, ita ut arida cum pane imponatur. Folia quidem in initis stomachi roborantibus & vitis ventris, & intestinorum & præcordis utilissima vel illita. Cibo quoque lapathi modo condiuntur. Caverdus in his suis eleriter insidens. Et aridis & expressis aliquis usus. Diapasmata inde fiunt ad sudores coëcendos, ut à balneis inarescant, corpori, dein frigida abluantur. Sylvestris cum adipe urino alopecias mitificè emendat. Vitis rose in coronis propè minibus est [put. am. legendum, ut videtur ex vet. legisse Ruellius junius] Oleo maceratur, idque jam à Troiani temporibus, Homero teste. Emplastris atque collyriis insertitur mordaci subtilitate. Mensuram etiam delictis inungendis minimè noxia. Rosa ut complacet Mesue, est frigida primo gradu, sicca secundo, ex substantiis diversis etiam separabilibus compocita: aquea quidem mediocri & terrea adstringente, materiam ei multam præbente: ætra verò dulci & aromatica: ignea denique tenui à qua est amaritudo, robur, perfectio & forma. Ignea tamen substantia vis, quæ ruborem & speciem impressit,

valentior fuit quàm quæ amaritudinem. Ob id hæc sola siccatione perditur, illis adhuc permanentibus: quæ si perierit, non magis rosa fuerit, quàm homo mortuus est homo: recentes tamen sunt amaræ magis: quàm adstringentes. Ob eamque amaritudinem rose recentes, succo præferunt purgant: siccata verò resoluta caliditate amaritudinem excitant, substantiam stypticam & constantem ostendunt. Succus autem rosarum calidus est, prope ad primum gradum, quia est à substantia terrestris & frigida secretus: purgat, resolvit, aperit, terget. Sicca verò rosa est frigidior, & magis styptica & ea magis, quæ non fuit perfecta, & alba magis, quàm rubra. rosa præterea resolvit, intemperies calidas extinguit: partes cogendo & consolidando roborat: id autem feruine & pitis in calycis medio in ventis maximè. Cùm autem u. rose sint rubra, & alba, & alba foliorum miltorum, vel paucorum: crisporum, vel planorum: in utroque genere est præstantior, cui color genium est perfectior, & folia ad sunt pauca & plana. Alba nihil aut minimum purgant, potentius tamen adstringunt & roborant quàm rubra. Succus completarum est melior, idemque & aqua, in quæ recentes & perfectæ sunt macerata: purgat bile flava sanguinem venarum & arteriarum: Confert utero, quia obstruiones ventriculi & hepatis aperit & expurgat. Cor, ventriculum, hepato roborat, cordis tremorem sanat, vacuita ejus causa. Febribus biliosis confert. Eadem partes roborat: oleum rosatum & aqua sublimando ex rosis educta. Corrigendo substantiam ipsarum laxam, facultatem retentivam roborant, inflammationem omnem extingunt, & ab ea dolorem sedant, somnum conciliant: coryza tamen & sternutationem excitant, catarrhis obstruunt u. nstringunt, & guttur, & roborant ea, crapulam auferunt. Rosa eam sit medicamentum benignum, sed ad purgandum in hecillum, admixtus quibusdam egret, ut sero lactis, melle: succi enim rosarum uncia una cum sero lactis uncia duabus, aut tribus, & pauca Speca, commode vacuat: foliorum quoque in sero lactis infusorum, cum pauco melle expressum sine molestia purgat. Syrupus quoque ex loco rosarum, & rosis ipsis est elementis purgatorius. Oleum verò Rosatum, valentium medicamentorum, ut Scammonij, Euphorbij, acrimonia potu obtundit, & noxam à siccitate Myrobalarum corrigit: ut oleum violarum, Amygdalarum dulcium, Sesaminum, Omphacium. Rosa melle condita terget, purgat, roborant: saccharo autem minus terget, magis roborant, & adstringunt. Aqua cui infusa sunt rosas mur dum facit, terget, purgat: per sublimationem verò facta, multum roborat, non purgat: quia sublimatio ejus caliditas igni est dissoluta. Acetum Rosatum inflammationes omnes sedat, incidit, purgat: Rosa præferunt recentes, coctionem nullam sustinent, facultas enim earum tergens & purgatoria, mox igni resolvitur, remanet adstringens jam manifestior. Succus autem earum medioeriter coquendo sit tenuior, & potentius terget. Oleum præferunt Omphacium cum rosis imperfectis insolutum, valentius refrigerat & adstringit. Oleum verò dulce, ex maturis olivis expressum, vel Sesaminum cum rosis perfectis insolutum, potentius resolvit. Datur Rosarum succus ab uncia una ad uncias duas: Syrupus autem cum succo earum factus, ab uncia duabus, ad uncias quinque.

Non video (inquit Monardus) à Grecis, neque ab Averrill. inter purgatoria medicamenta reponi rosam, experientia tamen ipsa, colloca inter ea debere ostendit: cui etiam Diosc. consentire videtur. Rosaceum unguentum vires habere dicens, ad solvendam alvum conducentes. Quod dicitur Rosam

Inflammatione.

Vitis ex Plinio.

Plin. carri. gatur.

Succi infus.

Pulsis.

Seminis usus.

Vimameli.

Caput purgat.

In cibot conduntur.

Diapasmata.

Temperamentum Mes. etc.

Purgant recentes.

Succus calidus.

Quæ rosarum frigidior.

Quæ præstantior.

Infusio speciosa purgat.

Roborat.

Oleum rosatum.

Inflammatione. Noxa.

Crapula. Rosas infusa.

Oleum.

Mel rosaceum.

Aqua ex infusione sublimatione.

Acetum. Rosa collata. non non sustinent.

Succus esentia. Omphacium.

Succi Symplicis. etc.

Rosæ purgat.

Mel rosaceum.

Rosam

Rosam deperditā rubedine non plus esse Rosam, quam homo mortuus. Hoc dictum valdē est ambiguum: neque ex rubore speciem habet rosa: alioquin alba rosa, rosa non esset: colore etiam deperdit, seruari odorem adhuc visum esse & adstringendū vim. Sed respondetur Manardo Mefuem non habere rationem coloris quatenus ruber, sed quatenus, ut Sylv. dicit, Rubor lignum inseparabile est formæ manentis in rosa. Addit Manardus in doctrina Mefues (quod dixerit, peralbas non fieri solutionem aliquam) apertum errorem deprehendi: albas enim de Semi vocatas, & vulgò Damascenas, cum albissima sint ceteras in purgando excellere. Et autem respondet Matthiolus, ut infra apparebit. De succi præterea temperamento ad verius eundem hæc scribit. In arabica scientia unum pro ceteris maximum, graviterque vitandum invenio. Mefues namque, cui universa Medicorum caterva Evangelista nomen imponit, rosarum succum calidum esse scribit, quod ita animis quorundam infidet, ac si una rataque in arte sit veritas. Atque frigidum potius esse ex Græcorum voluminibus excepi, quod quidem ratione, atque complurium Medicorum auctoritatibus ita comprobo. Fiunt ex Rosis Oleum, quod virtutem habet refrigerandi ac medendi calidis morbis: Vnguentum, quod in inflammationes placat: Syrupus, qui calorem febrium atret: Saccharum rosaceum, quod stomachum & cor calidum firmat: Aqua, quæ per sublimatorium extrahitur, mirum in modum frigescit, & in inflammationes repellit: Diversa antidota, quibus rosæ sunt basis & fundamentum totius; compositi, velut Diarhodon, utrumque Aromaticum, Rosata novella, & Pastilli, quæ etiam Rosarum sibi vendicant nomen: aut quia maiorem partem constituunt compositi, aut quia ipsi vigentur, vel ad temperamentum & correctionem commiscentur. Velut Mefues pro rectificatione Scamonij succo Rosarum utitur, in quamplurimis locis. Quod sciatitavit Avicenna lib. 3. quo syrupum rosaceum laxativum ex Scamonio & succo rosarum, cum saccharo condidit. Et hæc omnia medicamenta, quæ ex rosis fiunt (si attentè prospicias) tam apud Græcos, quam Arabes ad nihil aliud videntur proficere, quam ad inflammationes & calidos morbos expellendos. De aliis rosæ partibus, quas Plinius dividit, non memini me legisse illas ad aliud proficere, quam ad refrigerandum, comprimendumque. Et nullam earum partem calefacere adhuc in monumentis Medicorum invenio. Porro, quod Rosarum succus gradum caliditatis attingat, nec gustus, nec experimentum hoc mihi demonstrant, nec ratio hoc convincit: maximè cum rosa ipsa, ut vel Mefues testatur, infrigidet in primo ordine, & omnes ejus partes hunc ordinem servant. Succus vero, qui per expressionem subducitur, manifestissimè virtute frigida pollere videtur: cum partes aqueæ sine, quæ per expressionem subtrahuntur, ex unguibus & foliis ipsius Rosæ. Quoniam Aristotele teste, Omne quod divitur simile est illi à quo derivatur. Et licet in parte superiore Rosæ inhereat aliqua caliditas, ad eò tamen exigua est, ut in extractione succi ferme tota evanescat: & si quæ permaneat, ob magnam aquositate deperdat. Unde si rosa sit in primo ordine infrigidantium, hæc ratione succus remanet in secundo, quoniam illæ partes calide, quæ erant in rosa, deperditæ fuerunt in succi expressione, quod ex gustu, naturæ medicinarum iudice cognoscet: si enim vel paucillum ex eo biberis, saporem acerbum atque austerum in eo senties, qui constrictivam virtutem manifestè demonstrat. Non est tandem quod per odorem iudicet calidam temperaturam rosam habere: nam ut Gal. affinnat, ex odore sensibilium temperaturam non cognoscitur, ut ex gustu. Quod si cavillator arguat, quod partes rosæ superiores Rosæ, sunt ea, quæ calorem ministrant ipsi succo, hoc potius esset attribuendum infusioni rosarum, in quam permeant partes illæ subtiles rosæ, quæ dant ei amaritudinem & ruborem. Quapropter potius dijudicarem infusionem habere vim solutivam, quam succum. Mefues autem non ad aliud infusionem saccharo confectam comprobat, quam ad morbos calidos, febrium adfusions, pectorisque calorem. Sed nec ex colore succi rosarum, quoniam rubeus sit, calidam temperiem possidere dixeris. Neque enim calcem (inquit Gal. lib. de Ther. ad Pisonem) quod candida sit, visu duntaxat frigidam judicare, satis esse certemus: neque rosam quod rubea sit, idèd illam calefacere, statim pro certo habemus: sed una cum visu sensum quoque tactus adhibentes, calidam quidem illam, ad eò ut urat, certò invenimus: Hanc verò quod frigiditatem e contrario in ea tactu percipimus, ex refrigerantium numero esse, firmiter habemus persuasum. Patet enim ex eodem Galeno lib. simpl. per colorem temperaturam medicinarum non esse dijudicandam. Ac tunc quoque sub primo infirigidandi ordine, Oleum rosaceum, ipsamque ad eò rosam collocat, & sub secundo ejusdem rosæ succum. Præterea Galenus 5. & 10. m. m. succum rosarum esse intentæ frigiditatis nos docet. Quibus clarius sole demonstratur, Mefuem hallucinari in cognoscenda temperatura succi rosarum. Sed & ipsi semet sibi repugnat, multis in locis (ut in lib. suo de rectificatione medicinarum acutarum, præsertim ubi de rosæ, & scammonio loquitur) demonstrans, succum rosarum frigidam potius temperaturam quam calidam possidere: quoniam tum ad medicinas valde calidas, tanquam frigidum rectificans adhibet: & tum ad morbos calidos biliososque, ut febres cholericas, & inflammationes extinguendas medicinis commiscet: & ad repellendum, comprimendumque veluti in angina, pro ultima infirigidatione, succum rosarum utitur. Et hæc potissimum sunt rationes, propter quas nullam aliam in succo rosarum constituo temperaturam, quam frigidam. Neque omnino in hoc est culpandus Mefues, sed interpretes, qui hunc locum vitavit, qui pro frigido, calidum esse succum interpretatus est. Hactenus Manardus, qui complures alias rationes de temperatura succi rosarum frigidam in medium adducit, quas brevitate gratia misissimus facimus, quas si ulterius cognoscere cupis, leges ejusdem tractatum de Rosa, ejusque succi temperamento.

Sylvio rosa omnis amara est atque astringens, præcipue rubra, à qua substantia refrigerat, licet: Ros autem ejus astringit magis, proinde etiam licet valentius: præstantissima est, quæ longè omnino suavissima, & alii rubicundior. Succus essentia est tenuissima, nam celeriter acescit, & lentore caret, & unguentorum omnium odores exolvit & obscurat. Ex rosis calidissima videntur Moschata, post hæc roseo colore insignes, Incarnata dictæ, quæ & cerebrum valenter feriunt, paulò minus alba. Folia decem recentia, alvum cuidam decies duxerunt, ut a-pud Tagaultium, refert Rasis. Siccæ autem folia, quia ab eis recedit amaror, laxativa non sunt, sed styptica, & adstringentia. Decoquit Tragus, manipulum foliorum rosæ andorum, in dimidia mensura vini albi & exhibet his, qui fluxionibus alvi laborant, aliquoties per diem bibendum. Quod si morbo producto, calor conjunctus fuerit, cum aqua rosæ confectionem instituit. Semina dura, quæ capitibus Rosarum insunt in pulverem redacta, ac è vino pota, calculum apud eundem polere traduntur. Easdem facultates nonnulli spongiosis (gem. Schlastungen vocatis) quæ silvestribus adna-

Manardus notatur ex Mefues de-fensur.

Rosarum succus frigidus, eon- tra Me- sium.

Ratio.

Medica- menta è rosis facta, frigida si- dentur.

Rosa e- jus partiu tempera- mentum frigidum.

Ex odore Rosæ tem- peraturam non inve- stiganda.

Tempera- turæ rosæ ex colore non dicitur dicanda.

Mefues sibi repugnat.

Mefues ex- chatur.

Temperam- ti. Flor.

Calidiss- moschata.

Folia 10. purgant. Siccæ, ad fluxorem alvi.

seuntur rosis, si in pulverem redactæ aut in vino decoctæ calidæ fumanur, tribuunt. Sucus è fructu rubeo, maturo, totaq; sua substantia tuso expressus, posteaque siccatus, demumque in pulverem redactus, gonorrhææ, & tam rubris quàm albis mulierum mensibus singulari experimento medetur. Rubra illa capita, antequam maturitate mollescant, integra conservantur & siccantur, & ad prædictas affectiones vino decoquuntur & potantur, quod etiam medicamentum & dysenteriz & cæcæ intestinis excretionibus unicè prodesse experientia non semel docuit. Omnia rosarum tam sylvestrium quàm domesticarum genera refrigerantis sunt & adstringentis naturæ, præsertim verò rosæ sylvestres arida. Sylvestrium rosarum maximè earum quæ Haberrosen appellantur aquam distillatam nonnulli majoris faciunt, & efficaciorè credunt, quàm domesticarum. Ea namque quibusvis calidis affectionibus prodest, refrigerat namque & reprimat omnes cholericas & acres exhalationes, & cor in deliquio animi confortat. Ad confectiones quas vocant, Manus Christi, & Zulapium rosatum, primo loco eas quas vocant Haberrosen: secundo quas Frauentrosen: tertio rubras domesticas eligit Tragus. Aqua ex rosis nunc commemoratis distillata, doloribus capitis in linteolis impressa, neque non fronti pari ritu applicata epiphoris oculorum unicè prodest. Virtus, inquit Langius, rosarum laxativa, & odorifera, in supernis ejus partibus consistit, at astringentia & roborisatrix in internis delitescit. Fuchsius ex Simeone Sethi has adscribit rosas facultates. Odorata calidis capitis prodest, humida verò offendit, eaque distillatione obnoxia reddit. Sumpta verò febres ex flava bile procreatas juvat, & roborat stomachum & jecur. Proprietate autem quadam testes lædit, prohibetque acres exhalationes nec in caput ferantur. Spongiolæ ac fractus Cynorrhodi mitificè valent contra calculum, & Urinæ difficultates si lavigatæ in pulverem exhibeantur. Nos contra Fuchsi non nihil scimus ad calculum & urinæ difficultatem nec femina, nec spongiolas, ob eorum astringentem & siccantem, nisi fortè profint per accidens eo modo quo scribit Dodonæus, cujus verba postea ponemus.

Succus ut placet Matthiolo, medicamentis componendis expetitur, præstantior è puniceis elicitor, item ex subtilis, verùm huic inferior facultas. Diluunt Græcis ἀραιώσις, è quo rhodopharmacum alvum innoxie depiciens conficiunt, plerumque ex subrubescerentium maceratis aqua solis paratur: etsi hæc in re iis Damascenæ Hetruscis vocatè longè præferant: quippe ex earum vicinis devoratis solis facilè quidem, & citra noxam subducitur alvus. Albicantes deinde rosæ (Damascenas tamen exceptas vult Matth.) non alium sibi in Medicina vendicant usum, quàm ut ex se aquam stillent: siquidem iis dejectoria vis, qua pollent puniceæ, ac subtiliæ, multò inferior inest. Quamobrem videtur Manardus immeritò id Mesui vitio verisille. Nam albæ, quas Damascenas appellant, etsi majore deiectionis vi cæteris præstant: credendum tamen est de iis non intellexisse Mesuem, quòd eas illi facilè incognitas fuisse existimet: verùm de iis albis tantum, quibus passim rosæta florent, cujus rei illud maximo argumento esse potest, quòd Damascenæ Hetruscis vocatè nuper in Italia florere cæperunt, quòdque eas veteribus cognitas fuisse (quòd sciat) memoriz prodiderit nemo: ni fortasse eas credamus esse, quæ Plinio spincolæ appellantur. Sylvestres majore adstringendi facultate sunt prædita quam luvæ, sed minori fragrantia redolent, atque deiectionis alvi ne tantillum quidem facultatis retinent. Idem in lusu. Germ. Pueris ex calcâtis

& extoriat ab urina circa pendenda aspergendus pulvis Rosatum. Ex calcibus distillatur optima aqua adversus omnia profluvia, utilis illa cramentis oculis. Vermes in spongiolis dicuntur potentiores esse ad calculum, ipsis spongiolis. In apolo, adversus Amathum, nihil, inquit, ad me atineret de illa, quam adducit, muliercula Amathus: Primum sepius implemet id sumpsi medicamentum aliisque frequenter dedi sine ullo profus incommodo, adeò ut quandoque pueris felicissimè propinaverim. Præterea mansa hæc rosa nullam penitens gustui relinquit acredinem, sed tantùm se ostendit tum adstringentem, tum etiam subamaram. Id quod manifestè indicat, ut nulla faucium, aut linguæ erosio, in inflammatione hinc degustantibus accedere possit. Mihi enim hæc rosa sæpè mandenti, ut quandoque adstrictam excitarem alvum, nihil erosionis, in inflammationisque accessit. Quòd sicut quis rectè opinari possit delusum esse Lusitanum, ut potè qui hujuscæ medicamenti facultatis penitens ignarus, symptomatis illius causam in illud perperam rejecerit. Cùm potius credendum sit id ab acrum falsiorumq; succorum de fluxu provenisse, qui fortè fortuna eo tempore, quo rosaceum illud saccharum mulier illa sumpsit, à capite in eas partes labi cepit. Atque magis sanè demiror, quòd tam acriter diminaverit has Damascenas rosas odore perquam suavi fragrantis, è quibus clementissimum illud paratur medicamentum nullo penitens incommodo alvum ducens. Præter id, eo ignoranter pervenisse constat, ut cerèd sibi persuaserit Ieneliabin è Persicis rosis paratum, de quo pluries in febrium curatione & ventriculi dolore meminit Avicenna, ex Persici arboris floribus parari debere: sed quæ falsà teneatur opinio ipsa ostendit medicamentum nomenclatio, quippe Ieneliabin Mauritanis omnium præclarissimorum Medicorum consensu nihil aliud designat quàm Mel rosaceum. Constât enim per rosas Persicas nihil aliud voluisse Avicennam, quàm Puniceas. Siquidem lib. 5. ubi de medic. compos. omnium egit, de quibus in universo meminit volumine, Ieneliabin ad febres, & ventriculi dolores parari jubet è rubris rosis, non autem ex Persici arboris floribus. Id quòd manifestè indicat, nil aliud Persicas rosas Avicennæ designare, quàm Puniceas, Persicas illi fortasse vocatas, quòd à Persis in suas venerint regiones. Nam & nos Damascenas vocamus eas, de quibus diximus, quòd è Damasco Syriæ primò ad nos pervenerint. Et hæc tenet Matth. qui videtur causam rubedinis in rosis tribuere calori: statuerq; è rosis rubras subrubetibus esse calidiores: dicit enim, ab aëro cerè & subdulcem, & odoratissimam saporem assumunt. Ex his demum, quæ ignis naturam sequuntur amarorem concipiunt, ac etiam colorem rubedinem, que sicut res bitumida siccantur. Quo fit, ut plus insit calorum puniceis quàm subrubetibus. Sed hoc Matthioli argumentum infirmum esse, constat superius ex Manardo. Quàm potè utiliter lotionibus, & clysteribus, ad inhibendas fluxiones ungues, qui ab autoribus nullam propriam receperunt dotem, inserrantur, judicet alij. Plinius dicit ungues epiphoris salubres esse.

Sunt Amato in Diosc. quædam Rosæ rubra, crassa, slyptica, ex quibus Zuccharum rosaceum parari debet, nam slyptica sunt & constringentes: proinde rectè quoque syrupus rosaceus, pro fluxu sistendè, ex ipsiis scicis conficitur, quæ quoque siccant pro lavacris servantur. Sunt quoque alia albæ, ex quibus cætera parantur, quarum tamen loco Ferraria incarratis, id est, colore inter album & rubrum habentibus, utitur, quæ dubio procul, Ferraria velut Ar coræ & Neapoli, aliisve variæ Italia è locis, solative sunt, & maximè purgant, præci-

Excortiatia infantum ab urina.
Calculus.
Rosæ Dædamascenæ non infalibres contra Amatum.
Persica Rosæ non sime flores Persicæ ut Guile Amatus.
Persica Rosæ sunt Puniceæ. Ieneliabin è rosis rubris.
Amato ex quibus rosæ Zuccharum rosaceum sicut Symplic.

Gonorrhæa

Dysenteria

Temper. Trago.

Rosa sylv.

Aqua stillatitia.

Dolores capitis.

Langius.

Fuchsius.

Testes lædit Fuchsi opinio de spongiolis in calculo.

Delectum rosæ pro composicionibus.

Manardus reprobat.

Sylvestres rosæ adstringentes.

præcipue si ex illis mel rosaceum foliatum fiat: nam uncia hujus mellis rosacei, & cum steptum, & lvi turbatione levi, purgare in corpore mediocri, ter & quater facit, ut millies expertus est Amatus, illud pro laxante medicamento ægrotantibus propinans. Nec enim dicendum vult, ut multi medicamenti hujus vires ignorantes contendunt, conditum hoc mellis ratione tantum purgare, quum mel coctum parum aut nihil purget, imò mel crudum citius vim habeat, quam in coctione amittit, ut Hippocrates testatur lib. de morbis qui extra, & Galenus lib. 3. de alimentis cap. 33. non minus Paulus Ægineta lib. sue medicinæ cap. 96. hoc ut solet approbat, inquit; mel coctum valentius nutrit quam subducit alvum, non coctum è contrario. cui ad stipulatur Alex. Aphrodisius *lib. 2. problem. 66.* dicens, mel incoctum tergit & purgat, coctum alere tantum potest. Ex quibus liquido constat, rosis iis vim laxandi & subducendi insitam & naturalem esse: non verò ex melle acquisitam.

Ex iis igitur rosis, syrupus rosatus solutivus multarum infusio dicitur nobile & securum purgatorium medicamentum parari debet, prout in universa Italia magno ægrotantium juvamento paratur, qui Amati sententia effacior & nobilior evadit si aqua leuca cum rore è cælo super ipsi cadente paratur, vel saltè in super caulibus ex quibus rosis vel pruinæ magna copia haberi potest. Sunt præterea, inquit, alia rosæ alba ad citrinum tendentes, parvæ, pauca folia habentes, quæ ferè per totum annum in arbore videntur, quas Moschatas, quia Moschi odorem referunt, vel Alexandrinas vulgus appellat. Hæ verò, odore caput tentant, & potentissimè alvum subducunt, non minùs ac Scamonium, ita ut si sex vel octo acetario folia miscueris, totum acetarium purgatorium reddas, & ea de causa ab illis, tanquam pernicioso medicamento, naturæ vim inferente, abstinendum fideo. Nam non ita pridem Venetiis nobilissima Beatrix à Lima, mulier opulentissima, in morbum quandam incidit pro quo juvando, Medicus quidam Venetus, ex prædictis rosis & saccharo conditum parare fecit, ut eo tanquam præstantissimo, & secuto purgatorio medicamento intertedum uteretur: at quum primùm præclara illa domina, conditum gustare cepit, faucium & linguæ excoriationem cum stomachi rosione contraxit: sed illa dubitans, num symptomata ea ex morbo, aut condito orta essent, nullam in medicamentum culpam rejecit. Ego verò noscens medicamentum potentissimum & fetè venenum esse, eam monui, ut ab illo abstineret, nec eo amplius uteretur, putaverat enim hæc domina conditum illud ex rosis incarnatis à nobis dictis paratum esse, quo alias Antuerpiæ sæpè usæ erat. Hæ verò rosæ moschate in Hispania rarè videntur: sunt enim albæ, subcitrinæ, similes, ut paucis dicam, rosis caninis inter spinas nascentibus, quæ ad summum tria quatuorve folia habent. Non mirum igitur est si Hispani iis Rosis moschatis carentes, dubitent, num incarnatæ à nobis dicæ, quæ ut solutivæ sunt, & apud ipsos reperuntur, Moschate vel Alexandrinæ dicantur. Sunt enim longè differentes: rosæ autem hæc moschate, Alexandrina sive Damascena dicta, & alba ad citrinum inclinas, est omnino fugienda: Incarnata verò rosæ, quæ inter rubram & albam media est, rubricatæ, longè alia est, quæ ut præstantissima & nobili solvente medicamento uti fuaderem: Quia enim in maxima copia habetur per universam Italiam Rosæ hæc, ideo ex ea syrupus rosatus solutivus, sive novem infusorum, mirus paratur, aded ut illius unice ites

absque noxa ulla malos è corpore humores pellant. An verò Ieneliabin de rosis Persicis, apud Avicennam multis in locis citatum ex aliqua rosarum dictarum paratur? Respondeo quod non, quia Avicenna ex floribus Persicæ arboris, mel rosatum, sive Ieneliabin, confici suadet: vocat enim flores istos interpres Rosas: proinde ornate nonnullæ officinæ, ex illis syrupum paratum habent, morbis pituitosis admodum convenientem. Sicut enim flores isti, naturæ purgatorii, pituitam & lentes humores, ac crassam bilem depellent.

Rosarum foliola, inquit Dodon. quia ex diversis partibus constant, dissimiles etiam facultates obtinent; quæ tamen in singulis non similiter se habent. In uno siquidem genere: terrestres & adstringentes: in alio humida & aquæ: & in alio spirituose & aëreæ partes excellunt. Prædominantem autem omnes frigidam habent temperiem, proxima tamen temperiei mediæ, ex primo videlicet ordine refrigerantium. Superant quidem humida, aëreæ & spirituose partes in candidis, dilutè rubentibus, nec non in Damascenis sive Moschatis. Ex tribus his liquor, ea de causa, elicitor gratissimè ac suavissimi odoris, qui ferè ex aliis rosis inodorus est. Vtilis autem Rosarum hæc stillatitia aqua, cum ad cordis roborationem & spirituum reparationem, tum etiam ad omnia quæ elementer refrigerari possulant: tragematis, placentis, condimentis & aliis, quæ voluptatis excitandæ gratia conficiuntur multis, eadem admixta, sapotis gratiam conciliat: oculorum calidos dolores mitigat: somnum inducit, quem & ipsæ virentes rosæ odore suo suavi provocant. Succus harum rosarum etiam candidarum, alvum lenit & subducit: efficacissimus earum quas Damascenas vocant: proximus dilutè rubentium, quarum frequentior usus. Idem præstat earundem dilutum, & quod ex eo coquitur Drosatum sive Serapium; Officina syrupum rosatum solutivum nuncupant, quod ex infuso sive diluto apparari debet, in quo pluries rosarum virentium folia multa macerata sunt. Ad leniendam autem sive subducendam alvum utile, quando expurgatione aliâ potentiori, aut opus non est, aut uti non expedit. Nam præter ea quæ in intestinis hærent excrementa, aut in proximis & primis venis cruda, pituitosa & subinde biliosa, alia non educit; si non aliis quibusdam potentioribus medicamentis permisceatur. Humectat porro & refrigerat Serapium istud, ideo etiam febrium ardentium calores nimios sedat, & viscerum inflammationes mitigat; sitim extinguat: debili autem & humido ventriculo partim utile, nam cum laxiore debilioremque relinquit. Simile possunt & folia harum rosarum saccharo condita, præsertim si manibus tantummodo contrita, ac diligenter cum saccharo permixta, igni admota incalcescant, potius quàm decoquantur. In rubentibus, quæ passim sunt vulgares, & aliis saturatæ purpuræ, quas Provinciales appellant, plus est terrea substantia, & resiccantis adstringentisque facultatis, non tamen absque humido quodam permixto; quod quidem ipsi adhuc virentibus ir est: in resiccatis verò deperditum est. Succus hæc de causa, & dilutæ earum, ad alvum subducendam quoque facit, minùs tamen quàm aliarum prædictarum. Resiccata autem hæc Rosæ humiditate jam absumptâ, adstringunt & resiccant; refrigerant quoque, sed minùs quàm virentes: robur cordi conciliant, ac tremori & palpitationi ejus succurrunt: hepatis, renes, & alia viscera debilia confirmant: ventriculum flaccidum, debilem & humidum ficeant & corroborant: fluorem muliebrem & superfluum menstruorum purgationem compescant;

Ieneliabin Avicenna ex Persicæ floribus

Candidæ, dilutè rubentis, & Moschate. Aqua.

Succus.

Drosatum. Serapium ex pluribus rosæ.

Rubres vulg. & Provinciales.

Virentes Resiccata.

at eorum

Syrupus rosatus solutivus.

Moschatis abstinendum.

Sex folia purgant.

Faucium excoriatio ex condito ex Rosis Moschatis.

Forè Senarium.

Rosæ moschate in Hispania rarè videntur.

Damascena fugienda incarnata usurpanda.

Syrupus rosatus solutivus.

sanguinis undequaque eruptiones sistunt: sudores reprimunt: alvum nimio fluore laxam constingunt: antidotis omnibus utiliter admiscentur, & aliis quoque medicamentis, sive foris adhibendis, sive intra corpus assumendis, quibus ut adstringens ac corroboreans aliquid vtiliter accedit. Quod ex ipsis fit Rhodomeli, vulneribus, ulceribus, eruptionibus, ac in uniuersum omnibus, quæ abstergi & resiccari postulant, longè utilissimum est. Oleum calores omnes sedat, & in inflammationes prohibet, aut jam incipientes mitigat. Flores rosarum, lutea videbet stamina & apices, resiccant similiter & adstringunt, & potentiùs quidem, quàm ipsarum rosarum siliola. Idem postulat calyces & alabastrum: sed cum his omnibus odor desit, minùs utilia sunt, humanæ quæ natura minùs amica. Fuchsius, spongiolas & capitula sylvestris Rosæ contra calculum & urinæ difficultates valere affirmat: si in puluerem trita exhibeantur. Prodesse autem possunt non ut diuretica, ac calculum atterentia: sed veluti aliæ quædam adstringentia, debiles renes confirmantia: quæ calculosis non rarè utiliora sunt, quàm multa, præsertim potenter diuretica. Nam talium diureticorum frequentiori aut nimio usu, & renes multùm debilitari, & sæpè supercalefieri contingit: & calculos non modò non comminuit, atterit, aut expelli, sed copiosiores & duriores frequentè generari. Quod etenim in sanguine tenue, aqueum & serosum est, segregant, quod verò crassius, coeunt, ac indurari diuretica fortiora faciunt: & similiter etiam alia minùs potentia, frequentiore usu: ut Gal. & simpl. scribit.

Contra Dodonæus. Cur autem rosarum syrupus, ut ipse vult, debili & humido ventriculo parum sit utilis, & laxiorem & debiliorem relinquat, animadvertere non possùm: quandoquidem rosæ præter vim purgantem etiam adstrictionem habent, ut Rhubarb. & Myrobolanis: quæ occaso ut in dysenteria & aliis alvi fluxibus lubenter eo utamur cum Myrobolanis & Rhubarbaro ac Rhapontico vero, si haberi possit. Excipimus tamen lypurum è rosis moschatum, sicubi præparetur.

Saccharum purgans Arabis.

Menses ad dentes et gingivæ

Ferulum Athenæum & Cæsaliæ.

Saccharum ros. purgans vide (inquit Cam. bort.) apud Card. de tuenda vite, quod non contemnendum. Interior rosæ rubæ flos pulverizatus, cum aqua Cydoniorum destillata datur utiliter in nimio mensum fluxu. Ad dentes à corruptione servandos & gingivas roborandas sumitur acetum Scyll. & aqua è calycibus rosarum destillate æqua portio & eo sæpè os colluitur, ar notante Monardo Hispanensi de rebus Indicis. In spongiolæ Cyrorrhodi cavitate interiore tinea interdum ocluduntur, quibus pulverizatis ad expellendos vermes intestinorum multi feliciter utuntur. Ferulum ut ipse dicit suavisimum docet parare Athenæus ex rosæ lib. 9.

Ex Rosæ carneæ, auctore Cæsaliæ, colligitur aqua per distillationem odoratissima: Medici quoque oleo infundentes rosaceum componunt: succus exiisdem, & infusus ad purgationes paratur. Rubens, multifolia minimè amara, idèd sine vi purgandi: conditur saccharo ad adstringendum, roborandumque. Parva quinque foliis candidis amarior, majoræ vim purgandi habet. E rosis rubeis succus perfectè rubens extrahitur, ubi paululum ex calefacta in sartagine rosâ, expresseris succum leviter. et linquitur rosæ substantia alba. Ergo si exquisitè expresseris ac diligentius, color corrumpetur: atque ita de aliis. Profruit interdum ut in exhibendis medicamentis etiam delicatior locum habeant præsertim apud morosos & delicatos. Ad alvum igitur ducendum parabitur Saccharum rosarum tale. Libram unam Sacchari cum libra una rosæ dissolvit: purga, ut solet, cum ovi candido inde unciam unam rosarum Perficitur immittit, cum jam fervet Saccharum, &

ubi paululum coxeris extrabe, aliamque unciam simili modo indito aque ita usque ad duodecimam unciam. Præstat autem rosas cum rore esse collectas. demum coquito ad perfectam rationem: additò que uncias quatuor rosarum rubearum, & in sole exponito. Hoc non differt ab alio Saccharo, & jucundè purgat & cum voluptate devoratur. In ulceribus penis & pudendorum in quibus alia remedia frustra adhibita, Cento. Empiricus pilos spongiolæ rosæ silv. in tenuissimum pulverem reducit, inspergit, & probatum remedium extollit.

Institutum nostri ratio postulare videtur, ut aliquas Rosarum compositiones, quatum bodiè in medicina factitanda magnus est usus, in medium profertamus. Equis enim ignorat vel solas has tum intus sumptas, tum extra ad motas in maximis de pellendis contra naturam affectibus; vim obtinere summam? Exorditur de circo Martioli, ubi obis que de distillandi ratione opinionem suam recludit. Ex rosis, vi ignis fit aqua pluribus ac diversis instrumentis: verum tamen ea cæteris præstantior, ac odore fragrantior habetur, que per balneum calentis aquæ vitreæ organæ elicitur, cuiusmodi & aliæ sunt, quæ eodem modo ad uniuersum medicaræ usum confici solent. Quandoquidem inter has quæ plumbis instrumentis, liquorum, vel carbonum igne extrahuntur, tanta reprehenditur differentia, quanta inter plumbum & æger tum deprehendi potest. Quippe quæ sunt in balneo calentis aquæ vitreæ rostratis organæ, ab herbis & floribus, à quibus manant, nec sapore, nec odore dissentiant, adeò ut non solum proprias plantarum qualitates seculum referant, sed ne etiam tantillum quidem tum fumum, tum rei admittant respiciant. Quod quidem in his non invenias, quæ vulgè plumbis, & ardeis instrumentis eliciuntur: has enim nunquam, vel rarissimè gustaveris, quæ tibi fidum virus, & idorè quæ, non reddant. Que res non modo agris ingentem molestiam afferunt, & nauseam plerumque movent, sed & plurimum noxæ pectori, ventriculo, jectiori, visceribusque omnibus inferunt: quòd à metallicis organis, à quibus distillant, in aliam eorum qualitatem libi vendicent. Quæ re hac ætate perfectè, doctissimi, ac peritissimi medici veteres secuti, decoctis, ac dilutis tantùm uti ceperunt. Quæ tamen viribus aquas qualescumque sublimatas (ita enim stillatias vocant) præcellant: ea tamen, que calentis aquæ fervore (ut supra diximus) sunt, eam proprios tum odores tum sapores herbarum ac florum, à quibus extrahuntur, seculum trahant jure quidem decoctis non modò ipsas aquas polle, sed etiam prestare crediderim, non tamen, quòd viribus præcellere dixerim, sed quòd gustu tuaviore, & visu jucur diores habeantur: quòd non parum solati egrotantibus affert. Nos quidem aliis aquis non utimur, quàm his, ad quæ eliciendas nobis organarum affabè parati fecimus, cuius ope hæc distillatias, ac præstantissimas aquas suo tempore conficimus. Quarum odoræ sapore constant amaro, alia verò de. his austero, alia acido, alia denique insipido præstantissimum medicamentorum qualitatibus, à quibus eliciuntur. Quapropter Septuaginta, & Medici, quos magis decet humanam charitatem colere, quàm aurum & argentum, dent operam, ut jam plumbea, & ærea organa aboleantur, & balnea, de quibus diximus, in eorum locum succedant, quippe in hoc etiam (quamvis plus laboris, minùs verò emolumentis suscipiant) & Deo, & hominibus simul rem gratam facere poterunt. Ceterùm Fuchsius in lib. de compos. medic. unicè cavendum præcipit in stillis stillatias eliciendis, nec ejus vasculi fundum, in quo stirpes continentur, aquam in cacabo bullierem attingat, sed flos vapore ab ea elevato incalcescat. Quam re secutus ponis vide-

Aqua Rosarum stillata.

Balneo Maria.

Plumbea & a reprobatum.

Aqua sublimata.

Admonitio.

Fuchsi cau. in nimio resingosa.

ur fuisse Manardum, quam rei experimentum. Verum non possum ipse omnino eorum sententię subseribere, ut qui iudicem non esse semper eā exquisitā ratione procedendum in herbis distillandis, quod certo sciam nihil referre, quando etiam vasculi in herbas recipiens in aquam in maiore vase bullientem immergatur. Nam etsi aquę, quas illi volunt ex herbis vapore tantum ab aqua bulliente elevato extrahi, ceteris præstantiores habeantur, tamen que ex herbis eliciuntur vasculo impositis, quod aqua bulliens circumluit, parum certę, aut ferę nihil illis bonitate cedunt, quod mihi compertum est in iis aquis, quas sapissimę libuit utroque modo elicere & experiri. Attamen aliquis illud discrimen esse dicit, quod illo modo aquę ex herbis extrahantur, quę tenuiores partes retinent, quod vaporis illius caliditas imbecillior sit, quam ut possit totam herbę substantiam conficere: hoc autem modo aquę eliciantur, quę omnes herbarum partes secum referant. Hęc sanę differentia quę facile concedi potest, non est (meo iudicio) tanti momenti, ut illa regula perpetuó sit observanda, hęc veró evitanda: quin potius, ut hęc mihi videatur probanda, illa veró reijcienda tanquam cautio ni nisi religiosa. Sed quandoquidem in Aquarum distillandarum mentionem incidimus, non gravabimur illarum aliquot modos adscribere, quos quidem in præsentia licuit, multum celebratos invenire. Alij itaque sumunt rosarum quantum volunt, idque triduum, in balneo digestum, vapore aquę calidę distillant. Alij absque digestionē præcedente, aquam ex rosis in alembico cum confectis, eliciunt. Alij per cineres distillant: ubi tamen maximā opus est cautioe & circumspicione, ne empyreumate liquor stillativus inficiatur. Alij lucro magis, quam valitudini hominum intenti, eas integras, ut decrepæ sunt: cum magna aquę copia, per vesicam æneam distillant, ac ex triginta rosarum libris scentum odoratę aquę venalis extrahunt. Alij flores tuos, absque menstruo, aut eo saltem tam paucó, ut ad irrigationem sufficiat, modico balnei calore distillant: & ad vim refrigerantem, tanto expeditius evocandam una distillatione, quam præcedit irrigatio, ex aqua communi, vel rosacea veteri, aut ad virtutem constantem & fragrantem proleandam, pluribus in distillata aqua infusionibus utuntur. Io. Beguinus in Tyrocinio chymico, ita eam parandam ducit: distinguendo inter rosas albas & incarnatas. Ex illis enim ut plurimum vis refrigerans petitur, ac propterea paucę aquę pluviali irroratę in mortario marmoreo contundendę sunt: de torculari succus exprimendus & distillandus. Incarnatę absque irrigatione contusę, reponuntur in magno vase vitreo, in cellam: post triduum succus exprimitur, qui per balneum distillatur. Hęc aqua est fragrantissima, quęque vel multos annos, odoris sui fragrantiam conservat. Nonnulli recetementis ejus aquam puram superfundunt, & ita per octiduum maceratam, vel balneo, vel vesica distillant, quę communi venali viribus & efficacia non cedit. Sed & ultra progredi, ac certam facillimę, ac aquas vitę ex plantis, floribus, seminibusque, cujuscumque generis sint, concinnā brevitate, veram & legitimam extrahendi methodum tradere est animus, & quidem per digestionis, fermentationis quę viam, ut quarum ope solę, ex omnibus rebus, ac iis potissimum, quę in alimentum veniunt; imò etiam & ex rosis quę frigidę existimantur, aquę vitę odoratissima elici potest, quę de natura celestis æthereæ participet, flammamque, non secus ac ea, quę ex vino elicitur, concipiat. Rosas igitur sume celo sereno, cum torido madore destituantur, collectas: eas tere accuratissimę, & in cucurbitam vitream, quę postea benę clausa, in cel-

lam reponatur, ut ibi fiat earum fermentatio, immittite: Cüm jam acidum quiddam redolere videntur: sume de floribus tritis, quantum vis, & per balneum distilla: aquam inde extractam superaffunde parti rosarum restanti, & rursus distilla, similem in modum pergendo, donec omnis rosarum fermentatarum quantitas per alembicum transierit; fecibus, quę in fundo remanere solent, semper segregatis. Tandem omnem aquam ex rosis elicitam, per balneum distilla, & duodecimam partem aut circiter abstrahę, eamque si vis, rectificata. Sic aquam habebis gratissimam, adeoque excellentem, ut unica ejus gutta, ingenti satis aquę copię odorem suum communicare, eamque utilissimam & jucundissimam reddere possit. Non abs re visum fuit paucula hęc absolutioris doctrinę ergo proponere, quo modi quidam, distillandi aquas, non infirmi sicut & hujus aquę rosarum, ut & simplicium cæterorum omnium, lectori manifestentur.

Non erit hic recitanda tinctura rosarum, ob summum levamen quod percipiunt agri, in summo ferbri vigore, in siti in exhausta, in inquietudine, in dysentericis passionibus, aliisque affectibus ab humore bilioso, acri & mordaci genitis, pro potu ordinario, ubi pitana palato agrotantium non spirititalis igitur est modus brevissimus. 2℥. pro lb. aquę fontanę, simplicissima, gelidissima, Rosarum rubrarum, exsiccatarum m. b. hordei p. j. decoquantur leviter, addendo ʒ. j. sacch. filtra vel cola, addendo sp. vitriol. gutt. vi. postquam refrigerata erit, zger hanc fumet cum voluptate, liberalius bibet, sed ad vitiumque fitis. Ne autem iterum transgredi vi deamur, omitendo eorum aliqua, quę ad hanc rosarum tractationem spectare videntur, Syrupus quoque enumerandus venit. Est autem simplex, qui ex solo rosarum decocto vel succo fit, & 2℥. Rosarum rubrarum recentium, partes sex, quę infunduntur in vase terreo vitrato, stricte oris benę operculato, horis octo in prædictis quę recalescunt partibus: tandem additur ad singulas ʒ. partes infusi colati partes 4. sacch. chari, per albumen ovorum clarificati, & f. syr. Compositus qui ex infusionibus & aliarum rerum decoctionibus conficitur: 2℥. Rosis vernalis partes sex, & indantur rosarum completarum recentium rubrarum partes tres, ac horis octo immorentur: Deinde renovatio & reinfusio florum fiat usque septies inclusivę absque fraude, & singulis vicibus diligenter exprimantur: post adde sacchari albi partem mediam, & ad syr. formam coquito. Fit quoque syr. de rosis siccis, qui 2℥. lesquiunciam rosarum rubrarum siccarum (nam libra una mensuralis referta rosis siccis, & moderatę coacta ponderat, drachmas 12. plus minus) quę infunditur horis octo siccis.

Tinctura Rosarum vino rubello similis.

Syrupus Rosarum simplex.

Compositus Syrupus Rosarum solutivus.

Syr. de rosis siccis.

Syrupus Rosarum.

Conserva Rosarum.

Obiectio.

Solutio.

Modi aliquot aquarum distillandarum.

Varia modorum varietas in Rosis.

Aqua vitę cum succo quę plantę.

Modus.

conſuevit) & deinde faccharum roſarum, & demum ambo ſimul. Poſt contuſionem autem & commixtionem ſicchari cum floribus roſarum, conſerva aliquoties ſoli exponatur, moveaturque ſubinde ſarſum & deorſum. Relinquat̄ autem ſpatium vaſis inane propter fermentationem. Triplicem modum parandi mel roſatum docet nos Meſue, quodum primus eſt, ex ſolis roſarum & melle. Secundum verò, ſine ſolis, ex ſucco ipſorum ſolorum tantum & melle. Et hic ſecundus modus poteſt connumerari inter ſyrupos ſimplices. Tertius autem ex ſolis & ſucco ſimul & melle, qui tertius modus recipit ſolorum partem unam, ſucci partem unam ſemis, mellis partes tres. Accipitur mel optimum, ſerveſcit, & inde tepere ſinitur, ſpumaque auferitur: deinde adduntur roſe contuſe cum ſucco, & ad inſolationem ponuntur diebus viginti, vaſe diligenter operculato. Poſtmodum ſupra ignem duplo vaſe incalcſcunt, & effervent: mox fit fortiſſima expreſſio & colatura. Rurſus coquuntur leniter ad conſiſtentiam melleam, id eſt, mellis fluxilis. Paſtillos roſeos, Rhodides appellatos hoc modo præparari auſtor eſt Dioſcorides. Roſarum viridium non madentium ſiccatarum ꝓ. xl. Nardi Indicæ ꝓ. x. myrtæ ꝓ. vj. Trita hæc efformantur in paſtillos triobolares, & in umbra ſiccantur, & reponuntur in vaſe ſictili non picato probè obturato. Quidam adiciunt etiam Coſti ꝓ. ij. Indis Illyricæ tantundem, ammiſcentes etiam vinum Chium cum melle. Cæterùm, paſtillos roſei de roſis quas recipiunt nomen habent. Præparabantur autem graveolentiæ à ſudotibus oborients gratia, & à ſemnis collo circumdati mobilis vice geſtabantur, ut exhalantem de corpore ſudoris graveolentiam ſuo odore retunderent, ex aromatum illorum ammixtione. Officinæ præſcriptas habent aliquot paſtillorum ſive trochiſcorum ex roſis compoſitiones, ſed nulla ex his ad hunc uſum ſpectat. Alter etiam horum paſtillorum uſus erat in diapaſmatas quæ corpori inſperguntur, & in unguentis poſt balneum, ad coercendos videlicet ſudores, & jucundum corpori odorem inducendum. Sed Plinius etiam ſolas roſas aridas & expreſſas in hunc uſum committere dat. Sic enim lib. 23. cap. 10. ait: Et aridis & expreſſis aliquis uſus: diapaſmata inde ſunt ad ſudores coercendos, ita ut à balneis inareſcant corpori, deinde frigida abluantur. Ex quo loco ſerè cognoſcendum datur, de quibus Roſis accipiendum ſit, quod Dioſc. *ῥοσῶν χυμὸν ἀβρῶρον ἡμῶν ἡμετέροις* dixit, nimirum de his quæ virides quidem & recentes adhuc ſunt, non tamen humidæ & madentes, ſed ſiccæ, id quod ipſis una die contur gere poteſt, ut humor omnis ab eis deſiccetur, velut Galen. lib. 1. cap. 5. in fine *ῥοσῶν ἡμῶν* docet. Quid autem ſint diapaſmata, idem Plin. 13. cap. 2. exponit. Sicis, inquit, odoribus conſtant quæ diapaſmata vocantur. Nam feces unguenti magmata appellant. Aromaticum roſatum eſt conſectio ſuavis & ſaluberrima, in qua miſcetur utile dulci, & ob ejuſ bonitatem & excellentiam cæteris præponenda eſt, confortat ſtomachum, cor, cerebrum, & epaſtatos & claros ſpiritus gignit, excitat appetitivam, munit digeſtivam, nutritivam, & virtutes omnes naturales corroborat, reſolvit aquoſam humiditatem ſtomachi, & emendat malas qualitates, quæ generant malos humores & putredinem, & convaleſcentibus & debilibus integras vires, & præſtinam ſanitatem reſtituit. 2. Roſ. ʒ. i. ꝓ. vij. Liqumque raſe ꝓ. vij. Cinnamomi ꝓ. v. Ligni aloës, ſantalini citrini, ꝓ. ꝓ. ij. Gummi Arabici, Dragacuti ꝓ. ij. ꝓ. ij. Macis, Garyoph. ꝓ. ij. ꝓ. ij. Spicæ ꝓ. ij. Nucis muſc. Cardamomi, Galangæ ꝓ. ij. Anilbræ ꝓ. ij. Muſci ꝓ. ij. Sacchar. ꝓ. vj. ſat conſectio cum aqua Roſ.

uſel Roſatum conſectio triplex.

paſtillorum roſeorum conſectio triplex.

uſus.

Erym.

Subſt. uſum.

Diapaſma.

Aromaticum Roſatum uſus. Appetit. uſus. natur. etc.

Conſectio triplex aromati.

Conſectio ex roſis aromatica caleſcit & confortat ſtomachum, jecur & præcordia omnia, frigida-

te repellit, phlegma prohibet & ejuſ ægritudines, ventoliſitates & inſiſtentes diſcutit, naſeum acidum ruitus tollit, & omnem ſtomachi crudelitatem emendat, guſtu nunc vocat, renes caleſcit, coitum excitat, & facit pulchrum colorem, & odorem anhelitus & ſudoris. 2. Roſarum, ligni aloës ꝓ. an. ꝓ. ij. Calami aromatici ꝓ. j. ꝓ. j. Gallie muſ. macis, piperis longi, Nucis muſcate, Mentæ ſiccæ, Caſſiæ lignæ, multiſchis, Aſari, Cinnamomi, Garyophyllorum, ꝓ. an. ꝓ. j. Croci, Catdamomi, trium Santalorum, Rheubarbari, Spicæ, Coſti, Cubebæ, Zingiberis, Feniculi, Aniſi, Libiſtici ꝓ. ꝓ. ij. Sacchari ꝓ. ij. ſat conſectio cum aqua roſata. Electuarium ſucci roſarum exploratum eſt contra guttam calidam, & malos tumores calidos & ſuſoſos, forſiter purgat, ſanat tertianas ſimplices & duplas, & reliquis malorum humorum, in convaleſcentibus exquiſitè evacuat, potenter ſolvit, & eſt calcæ aliarum medicinarum. 2. Succo roſarum, Sacchari ꝓ. ꝓ. j. ꝓ. ij. ſat ſyrupus, cui adde diagridij ꝓ. j. ſ. Santalorum omnium ꝓ. an. ꝓ. vj. Spodij ꝓ. ij. Camphoræ ꝓ. j. ſat electuarium. Equum eſt ut vini etiam, liquorum omnium poſt aquas communiffimi, quod humanæ in primis inſervit nutritioni, ſymphyrumque corporis noſtri calorem inſtaurat roboratque, tractationem aggrediamur brevem. Quinq̄ libras agitur in fundito (inquit Pallad. li. 6. quem inſcribit Magium c. 13. roſe prædicte purgatæ, in vini veteris ꝓ. ſextarios, & poſt 10. dies, ꝓ. deſpumati mellis libras adſiccat, & uteris. Et Roſatum ſine Roſa facies ſic. Folia citri viridia ſporta palma miſſa in muſti nondum ferventis vaſe depones, & claudes, & exemptis quadraginta diebus melle addito, ad modum Roſati, cum placebit, uteris. Meritò vinum ſubſequitur acetum, quod 2. Roſarum rubrarum mediæ maturitatis, præſectis & abjectis unguibus, in umbra extra ſolem ad triduum aut quadriduum expanſarum & reſecatarum, ꝓ. j. aceti ſextarios octo, hoc eſt, quartas Coloniennes quatuor. Inſolentur diebus quadraginta: Deinde reponantur, vel (quod melius eſt) abjectis ſolis corruptis, acetum coletur ac reponatur. Quidam ſæpiùs mutant folia roſarum, nec ita diu itare in ſole ſunt (verbi gratia ad dies triginta vel pauciores) ut elegantius colore aſpectuque, & ſapore odorque validius fiat acetum. Singulariter prodeſt animi deliquis, ſi olivæ faciatur aut nates oblinantur, prodeſt etiam membris calidis hocce oblinitiſ: ſi duplicatum linteolum in aceto roſaceo humectetur, ſtomachove applicetur, maximè prodeſt optimè que calorem attemperat. Oleum roſatum quamvis pluribus fiat modis, melius tamen, teſte Clem. de materia medica cap. 10. ſic fit. Collige Roſas priuſquam complicita ſolia penitùs expandantur, & ponantur in umbra ſex vel octo dies, quouſque ſiant modicum paſſæ, & evellantur ſolia roſarum à ſuis tiriſ, & contundantur, poſtea habeas oleum ex Olivis immaturis quod dicitur Omphacirum, quod cum aqua fontium frigida ſæpiùs lavetur & in qualibet ejuſ libra pone Roſarum ꝓ. vij. in vaſe vitreo obuſo ore, & ſoli quotidie in hebdomada exponatur, deinde in balneo Mariæ tres horas bulliat ad ſummum. Prædictas ergo roſas ſic coctas exprime, & expreſſas abijce, & cum oleo alias roſas commiſce, & ſoli ſeptem aliis diebus expone, & poſteaterrum coque in balneo Mariæ, & pennuta iterum Roſas, & adde inſuſioris Roſarum ꝓ. ij. & quàm benè cooperiatur oriſicium vaſis, & exponatur ſoli quadraginta diebus. Deinde oleum extractis roſis quotidie ad ſolis radios ponatur. Perlicoe ſi faciatur in qualibet libra olei ſæpiùs loti ponunt roſarum recentium contuſarum ꝓ. vij. & coquunt in balneo Mariæ ad conſumptionem duarum partium & cum torculari expri-

Electuarium deſecto Roſarum.

Roſatum Vinum.

Sine Roſa.

Acetum Roſaceum.

Uſus.

Oleum Roſatum.

primi.

de Rosis tractato, hucusque sufficiat: Temporibus nunc ratio postulat, ut vela contrahamus, ne forte longiori mora in verticibus inexticabiles abrepti, benigno lectori molestiam creare videamur.

RUBVS MAIOR, FRVCTV nigro. CAP. II.



Nihil vulgatius norunt dumtaxat Rubo, qui ex radice nodosa, impotuna seracitate se propagans, longè lateque senticosis & mordacibus famentis, angulosis rubentibus vagatur. Si vicinis succiat, in alia crustiores emittit virgas, quæ tamen ipsæ gracilitate & proceritate nimia in terram retractæ, ac curvate defixis in ea capitibus radicantur. Virgæ spinis aduncis & pungentibus aculeis vestuntur. Folia terna, serrata, aspera, dorso aculeato, inferiore parte candicante, superiore nigricantia, sicco adstringentique sapore prædita: hycem vix decidentia, nisi altera succrescant: flores albi, vel ex candido rosei, rosulae instar, apicibus concoloribus: mora rubra per maturitatem nigrescunt, arillis quibusdam asperiuscula, acinis parvis, gustu quibusdam, ut nobis, grato, dulci, paululum amaro, Trago.

Theophrasto Rubi genera tria sunt, maximè inter se distantia. Quoddam enim erectum excellensque quod dicitur, quæ Rubus hic major est, fructu nigro. Quoddam propè à terra protinus deorsum vergens, terrefque conjunctum, rursus radicem agens, quem Rubum minorem, fructu caruleo. Nec est quod Humirubum cum Casalpino inter plantas humilioris naturæ recenseamus, & Fragariam appellemus. Tertium nudo Calos dicitur, de quo in Rosaliqui sumus. Caterùm Theophr. in hist. Rubum fructum spinosum tradit non solùm caule & ramis, sed & foliis cunctis, quæ in extremo & læteribus sinuata concidunt.

Dioscorides duo generatradit, Rubum hunc vulgaris notitia, qui simpliciter ipsi dicitur, & ab aliis eodem annotante; Cynosbatos, ab aliis Scelinorion, ab aliis Atyntrophos, ab aliis Titani sanguis [hæc appellatio à Dioscoride Lactuca agraria attribuitur, & potest fieri ut Rubus propterea communica a fuerit, quod mora illius sanguineum compressa succum reddant.] ab aliis Ibidis sanguis, à Romanis Rubus, ab aliis Sentes, à quibusdam Mora baucana, à Dacis Mantia, Ægyptiis Hæmos, aliis Ametros appellatur: Sæpionem autè Tragus Buleich sive Haleich nominare tradit, & Hebræos Sene. Alterum, Ideum cognominat. de quo paullo post. Plinio lib. 16. cap. 17. Rubi mora ferunt: & alio genere similitudinem rosæ, qui vocatur Cynosbatos: tertium genus Idæum vocant Græci à loco. Sic 124. cap. 3. duorum priorum meminit. & cap. seq. Cynofbati, Rubi Idæi, & Rhamnum inter Rubi genera recensit.

D. ser.
Radix.
Sarmentis
Virga.
Spina.
Folia.
Sapor.
Flores.
Mora.
Humirub.
non est fragaria.

Vires.

Diathodon descriptione communi.

Dosis.

Diathodon Abbatis.

Trochisci.

Rosata novella.

Vnguentum Rosaceum.

Vires.

Apothema.

Febri ardens.

Opium.

Somnum.
Vnguentum seminis rosarum.

i

primitur. Confortat membra debilia, digestivam facultatem & calorem naturalem, & refrigerat calorem accidentalem, febrilem & acuitatem cholera: stipitac lubrica intestina, & corroboret retentivam, & in principio repellit malos humores, qui concurrunt ad apostemandum, & mitigat dolores capitis, & prohibet phrenesin. Plura de Oleo rosato tradere supervacaneum ducimus, quod ea passim apud autores videre liceat.

Restat ut Diathodon describamus duplex. Commune quod ʒ. foliorum rosarum rubrarum ʒ. xx. Trochiscorum diathodon. & de spodio, liquiritiæ ana ʒ. iij. Cinamomi [quædam eximpl non habent] Garyophyllorū, Gallia mulcata an. ʒ. iij. Spodij, Croci, Mastichis, Berberis [quædam omittit] ligni aloës an. ʒ. ij. Trium santalorum, an. ʒ. iij. Afari, Spicæ Indæ, Masticis, Cardamomi, seminis Portulacæ, Laſuce, Scariole, Citrulli, Melonis, Cucu neris, Cucurbitæ, albarum margaritarum, Ocyimi Garyophyllati [ʒ. iij. seminis] rasuræ eboris, Tragaacarthis, gummi Arabici, an. ʒ. j. Camphoræ ʒ. ʒ. Mulci ʒ. ʒ. Conſice cum syrupo de rosis, ex aqua rosarum. Dosis est ʒ. ʒ. Ventriculum & hepar roborat, coctionem obid juvat, & dolorem horum à calenti & acri, ac mordente bile mitigat. Diathodon Abbatis ʒ. Santalorum alborum & rubrorum, an. ʒ. ij. ʒ. Tragaacanthæ, Gummi Arabici, Spodij an. ʒ. ij. Afari, Spicæ, Nardi, Mastichis, Cardamomi, Croci, Xylloës, Garyophyllorum, Gallia Moschata, Anisi, Fœniculi, Cinamomi, Succu liquiritiæ, Rhabarbari, seminum basilicon. Berberorum, i.e. acinorum n. ejus, sem. Scariole, Portulacæ, Papaveris albi, Citrulli, Melonum, Cucumeris, & Cucurbitæ, an. ʒ. j. Oſis ex corde cervi, Margaritarum, an. ʒ. ʒ. Sacchari candi, rosarum an. ʒ. j. ʒ. Fiat omnium pulvis. Camphoran & Moschum studiosè omittimus, quæ, ut & ambra, in aliis etiam compositionibus omitti debent, nisi specialiter exprimitur, aut Medicus jubeat. Trochisci à Mese sic describuntur. ʒ. Foliorum rosarum rubrarum unguularum modicè siccarum, aureos ʒ. Spicæ aromatae, ligni aloës, an. aureos 2. Glycithizæ aureos ʒ. Spodij aureum l. Croci aureum dimidium, Mastichis ʒ. ij. Cum vino albo fac trochiscos drachmæ unius pondere. Rosata novella, autore Nicolao Alexandrino, recipit rosarum, Glycerth. sacchar. ana. ʒ. iij. Cinnam. ʒ. vj. Garyoph. Nardi, Galangæ, Zingib. Nuc. mosch. Zedoar. Syrac. Cardam. veri, Apij ana. ʒ. j. Mellis desp. q. s. Si in pulvere quis asservare voluerit, Zacharum omittat, donec in formam solidam redigere velit. Vnguentum Rosaceum, Clementis. hoc modo describitur, ʒ. Rosarum rub. recentium ʒ. i. & tantundem axungia porcina recentis cum aqua calida novies, & toties cum aqua frigida optimè lotæ, & simul cotundantur, & septem alios dies dimitantur: postea adde succi ros. ʒ. ʒ. olei amygd. dulciū ʒ. ij. ʒ. coquantur ad succi cōsumptionem, & conferveatur. Plurimum valet in principio apostematum, repercutit erim materiam, sedat dolores eorum, & capitis febricitantis, & inquietudinem, refrigerat febres ardentes, epar & stomachum calefactum. Si verò addatur Opij cum aqua rosata diloluti ʒ. ʒ. Croci ʒ. ij. sedabit quoscunque acerrimos dolores, & provocabit somnum. Vnguentum seminis, ʒ. seminis rosarum, cupularum glandium an. ʒ. v. j. sumac. acatæ an. ʒ. ʒ. Carabæ, seminis plantaginis, mastichis, balauftiatum, corticum Granatorum, Gallarum, nucis Cypressi, ros. rub. gummi arab. Myrti, Myrti, Draganti, terræ sigillatæ, Coriandrorum præparatorum, boli ar. neri, santalorum rub. an. ʒ. ʒ. ʒ. sanguinis draconis, thuris, hypocistidos an. ʒ. ʒ. ʒ. bdellij, spodij, coral, rub. an. ʒ. ij. camphoræ ʒ. j. olei rosat. ʒ. ʒ. olei citioniorum, myrtini, mastichini, an. ʒ. ʒ. ceræ quod sufficit, fiat unguentum. Sed hæc

An Rubum majorem fructu nigro intelligunt facit paginæ Exod. cap. 3. Aparuitque ei Dominus [in] ignis Domini, [Tigur.] in flamma ignis de medio Rubi, & videbat, quod Rubus arderet, & non combureretur. Dixit ergo Moyses: vadam & videbo visionem hanc magnam, quare non comburatur Rubus.

Anguill. Morus aut Rubus. Tiag. Rubus grandis & secundus. Thal. & Gesf. h. Rubus vulgaris: Eid. coll. Rubus major. Turn. Rubus sentis, baccâ semper nigra ubi maturerit. Lob. Adv. Rubus, Batis vulgatilimus, cujus mora ad diamorum confectiōnem officinis usitatissima.

Lugd. Rubus, Rubus magnus & Sentis. Dod. Rubus & Rubus vulgaris fructu nigro, Vepres dictus apud Ovid. metamorph. 5.

Fepres O. Sudy.

Aut Lepori, que Vepre latens hystilia cernit Ora canon.

Cordin. Diosc. & Tabern. (quoad descriptionem) Rubus Arvensis, figura autem quam habet sub dicto titulo cōpetit potius Rubo minori, fructu caruleo, cujus non meminit compiler. C. Bau. apud Matth. & Get. pro Rubo non bene ponunt figuram Taber. quæ est Rubi Idæi. Ille tamen pro Rubo Idæo meliorem quoque habet. Schvv. Rubus batus, & Rubus sentis. Corn. Brunf. Fuch. Matth. Ryff. (cujus figura minus placet) Cresc. Cam. apud Matth. germ. & Epit. Lac. Lon. Lob. Obs. & Ic. Cast. & Caf. Rubus. Dorth. qui neptam Ryffij figuram habet, Mora baccæ: Rubi genus grandius fungosum. C. B. pin. Rubus. sive vulgaris, Rubus fructu nigro.

C. Bauh. or Garar lus notantur.

Nomina linguarum.

Idæi. Græcis dicitur. Rubus & Sentis, Lat. Germ. Brombeer. Strauden/ Bremen / & ut Cornario placet, Crazbeer/ ab ipsius Rubi pungentibus aculeis, Belg. Braemen & Bremen/ Braembesjen hagh: Gall. Romé, à runcatione, quæ dumotum tantum est. Ital. Rosso: Anguill. More campagnie. Hispan. Carca: Anglic. Bramblebusche / aut Blackberrybusche: Hung. Chyphé sz, & sdy Szedor. Boh. Wofiruzina. Fructum Græci *vici tibi batur, vici batur*, & *hatur* quemadmodum & Mora & Sycamina appellant, Galeno teste. Morum Rubi & Vaticanum Schvv. nominant, ac ut Fuchsius sentit Vacinium vel Vacciniū n, quod tamen nec nobis, nec aliis probatur. Offic. Mora Bati, & quæ barbariores sunt, inquit Dodon. Mora Bassi, Germ. Brombeer. Belg. Braembesjen / & haghbesjen. It. More di Rosso. Hisp. Carca moras: Boh. Wofiruziny.

Descu.

Pet dumos reptit & in sylvis inter cæteras sentes, neque non ad sepes & agrorum limites reperit. Plantatur autem plantulis suis, ubi capita in terram demittunt, quia ibi statim radices agunt. Rubi namque (tradente Plinio) curvati gracilitate & simul proceritate nimia, dehinc rursus in terram capita, iterumque nascuntur ex se, & replentur omnia, nisi resistat cultura. Plantatur & in sylvis inter cæteras sentes, neque non ad sepes & agrorum limites reperit. Plantatur autem plantulis suis, ubi capita in terram demittunt, quia ibi statim radices agunt. Rubi namque (tradente Plinio) curvati gracilitate & simul proceritate nimia, dehinc rursus in terram capita, iterumque nascuntur ex se, & replentur omnia, nisi resistat cultura. Plantatur & in sylvis inter cæteras sentes, neque non ad sepes & agrorum limites reperit. Plantatur autem plantulis suis, ubi capita in terram demittunt, quia ibi statim radices agunt. Rubi namque (tradente Plinio) curvati gracilitate & simul proceritate nimia, dehinc rursus in terram capita, iterumque nascuntur ex se, & replentur omnia, nisi resistat cultura.

Tempus.

Vires.

Fluxus.

Flora.

Rubus, auctore Dioscoride, adstringit & siccit, capillisque tingit. Summorum autem ipsius tamarum decoctum potum alvum sistit, fluxumque muliebrem cohibet, nec non & contra presteris morsum valet. Firmant & gingivas, orisque ulcera sanant, & commanducata folia. Imposita verò herpetas cohibent, ulcibusque in capite manantibus, oculis prociatibus, eordylomatibus, item & hemorrhoidibus remediū sunt. Eodem cardiatis quoque & stomaculicis tuta convenienter imponuntur. Ca-

terum confusis caulibus ac foliis expressis succus sole coactus, ad antedicta vitia efficacior est. At fructus perfectam maturitatem assecuti succus, stomachicis, h. e. oris medicamentis accommodatur. Sifit & alvum subcrudus fructus in cibo sumptus, atque ac flos in vino potus. Galeno Rubi folia, gemina, flos, fructus, & radix qualitate adstringere participant, eaque non obscura. Sed hoc inter se differunt, quod folia ac præcipuè mollia & recens nata plurimim in se habeant substantiæ aqueæ, parum verò adstrictionis: eadem ratione & gemina, itaque si mandantur, aphthas, & alia oris ulcera sanant. Quin & alia vulnera glutinare valent. Est enim eorum temperies & ex terra frigida essentia, & aquea tepida. At fructus, si quidem maturus fuerit, non parum habet succi calidi temperati, qui dulcis est. Itaque ob hoc, & ob modicam adstringentem elui non infamis est. At immaturus & frigida substantia terrea vincitur, ac proinde acetus est & valde excicatorius. Et sanè uterque siccatus reconditur, validi quàm recens delicatus. Sed & flos eandem vim (sui iunimaturus possidet: utraque ad dyfenterias, & ventris profluviū, & atonias, i. e. imbecillitates *rubur exolutum*) & sanguinis expulsiōnem fundidonea temedia. Porò radix præter adstringentem, non paucam habet substantiam in se tenentem, per quam & lapides tenui comminuit. Idem Aliment. 2. Ruborum fructum *ruburum* appellant. Sunt autem *ruburum*, quàm Mora, magis adstringentia: & si quis largius iis vescatur, capitis dolorem sentit; alij stomacho angentur. Proinde fructum hunc abluamus, oportet, pius quàm mandere ipsum aggrediamur, quod maxime in Sycaminis quoque est faciendum. Non tamen ventrem subducunt, sed potius cohibent: & si quis immaturus ipsa prius siccata teposuerit, multò etiam magis cohibebunt: Omnia tamen medicamenta, quæ ex Mororum succo parantur, si facta ex iis quoque fuerint, scilicet habent efficaciorē rem. Idem de comp. med. fec. loc. Innocentius est pharmacum Rubi mororum succus voratus, veluti & ipsorum Mororum: sed succus Rubi Mororum habet quid quod stomachum roborat: quod ipsum Mororum cremor non habet: Rubi mororum succus post nucum succum plurimo melle opus habet.

Ex Galeno

Aphthæ.

Vulnera.

Datina.

Nova

Correctio.

Erafistratus Rubi cremore ad oris inflammationes usus, se ipsum curavit. Nec Rubus, inquit Plinius, ad maleficia tantum genuit natura, ideòque ex eis mora vel hominibus cibos dedit. Vim habent siccandi, adstringendi que, gingivis, tonillis, genitalibus accommodatissimum. Adversantur serpentium sceleratissimis hæmorhoidi & presteri, flos aut mora. Scorpiorum vulnera sine collectionum periculo in unguentis utramque. Caulis eorum tunduntur terenti, exprimiturque succus, qui sole contra mala oris, oculorumque, sanguinem excreant. *Or. Oculis, Angina.*

Virescentium.

Fluxus.

Siccitas.

[in: elingitur siccus] Oris quidem vitis etiam folia commanducata profert: & ulceribus manantibus, vel sic per se imponuntur à marima sinistra: item flos, aut quibuscunque in capite illitur. Sanat condylomata machi dolentibus, oculisque prociatibus. Infillatur succus eorum & auribus. Sanat condylomata cum rosacco cerato. Cauliculorum ex vino decoctum, vel præter taricum remediū est. Idem per se in cibo sumptus cythane modo, aut decocti in vino austero, labantes dentes firmant. Alvum sistunt, profluvia sanguinis dysentericis profert. Siccat ter in umbra, ut ciris crematorium nam teprimat. Folia quoque arefacta & cor tusa, juneri totum ulcibus utilis traduntur. Mora, que in his nascuntur, vel eum est. caciorem stomachicam præberit, quàm saliva Morus. Eadèque compositione vel cum hy-

possibi-

Cholerā. pocifide tandem & melle bibuntur in cholera, & à cardiacis, & contra araneos. Inter medicamenta, quæ styptica vocant, nihil efficacius Rubi mora ferentis radice decocta in vino ad tertias partes, ut collantur eo oris ulcera, & sedis foveantur: tantâque vis est, ut spongia ipse lapidescant. Tragus addit à merulis avibusque cæteris expecti fructus, & in cibos quoque venire pauperum: Galenum scribere frequentem fructus Rubi usum dolorem capitis inducere, se autem id necdum experiri esse: Verum se testari posse, quod nora illa vehementer refrigerent, ita quidem ut si quis aquam superbibat, eum in horrores febiles continuè obstruere posse. Si verum est quod Tragus scribit, dehortari pauperes debet ab eorum usu, qui nil nisi aquam superbibunt. Ego Ruborum mora sapius & comedi copiose, nec nocimentum sensi, quamvis frigidum & humidum ac pituitosum habeam ventriculum.

nat: verum ei non novum omnia confundere. Ger. malè ponit pro Rubo Iuxta figuram Tab. quæ nobis potius Rubi minoris seu in caruleo videtur. Schvv. Rubus arvensis, & Humi-Rubus. Cat. Rubi differentia altera, Rubus humilior. C.B. pin. Rubus x. five repens fructu casto.

Rapis fluviorum gaudet nec non humectis nonnullis & matris & incaltis agris. Flores Maio mensè erumpunt: Mora flore excusso subsequuntur.

Locum & Tempus.

Tragus & alii.

RUBVS IDEVS SPINOSVS FRVCTU rubro & albo. CAP. III.



Rubus Idæus *Desfer.* vulgari illo fenticoso minor & nitior, brevibus, & ferè innoxius spinulis horridus, interdum is omni indarens, potissimum inquit Tragus in virgis primo anno profilitentibus, latum mentis tenuioribus, teretibus & plerumque rectis, trivitalibus & altioribus, folia terra aut quina in ale modum disposita, pediculo festunciam aut uncias duas longo, levi, annexa, Rubi

RUBVS MINOR, FRVCTV caruleo.



Contractior hic Rubus proximè ja n dicto minor parùm, aut nihil, interdum humo se tollit, reptatu gaudens, sarmentis longè latèque diffusis, Trago, huius serpenticus tenuissimis & aculeatis flagellis nunquam se attollens, sed protinus dorsum vergens: & foliis minoribus minusque fenticosis, & Trago auctore, Lupulopendè respondentibus, nisi quòdam magis nigricent, spinisque asperioribus

Desfer.
Sarmenta.
Folia.
Flores.
Fructus.
Radix.

horrent, flores similes, Trago ex candido rosei, stellati: at fructus, qui minor, primo exortu viridis, paulò post rubro, per maturitatem cævio vel caruleo colore tingitur, pilosus aut Rubi præcedentis mora, gustu pari, non injucunda, qualia arboris Moritradice podola.

vulgaris foliis similia, sed tenera & mollia, superius atrovirentia: inferius incana, ut farina aspersa videantur inquit Tragus, sapore austero: flores albidos excipiunt mora per maturitatem cana, rubentia sunt & alba, inter acinos pilis donata, dulci, virosoque carnei coloris succo ebrina: Tragus ait, odorem uti ferè Violam Martiam spirare. Radix est longa, per terram latè se spargens, quotannis succulolos produgens, qui secundo anno flores fructuque proferunt.

Est Dioscorid. *Idæus*, copiosè in Ida proveniens, multo tenerior Rubo, exiguis spinis præditus. Plinio, Rubi: genus, Idæum Græcis vocatum, tenuius, quàm Rubus & Cynosbatus, minoribusque spinis minus adentis. Et rursum, Idæus Rubus appellatus, quoniam in Ida non aliàs nascitur. Est autem tenerior ac minor, rarioribus calamis [*banis Dalech.*] innocentioribusque, sub arborum umbra nascens.

Galenus, & Paulus, & Aëtius Rubi Idæi non meminerunt, velut sub Rubo comprehensè, cui viribus respondet. Non aliàs Plinius nasci dixit quàm in Ida: Dioscorides tamèn non negat etiam alibi provenire. Et certè communi ferè peritorum consensu, multus etiam passim per Germaniæ sylvas nascitur, & is esse iudicatur, cuius fructum *Wunderbeer*, i.e. Vvam cervæ appellant. Et profectò non alius fructus esse mihi videtur (inquit Corn.) quem lib. 7. cap. 4. *Wunderbeer* Alcibiades in pharmaco Artabiani Vvam urfi appellavit. De qua Galerius sic ait. Que Vrsi vva appellatur & in Ponto nascitur, planta est humilis & fruticosa, folio memæcyli, fructum ferens rubrum, & rotundum, gustu austerum, quem Vrsi Vvam appellant. Huc accedit, quòd ab urfi hunc fructum expecti, hodièque notum est.

Rubi tertium genus hoc licèt recentiores vocent Cynosbàton, vel Tragi tamen iudicò rectè Dioscoridis

Est hic Chamæbatus Theophrasti, Humirubus Gaza, Rubus humilis & i. Tragi. Turn. Rubi species à baccis rubris: Is fortè maturum non observavit, sed immaturum duntaxat: mihi enim tantùm baccis aut cævis, vel caruleis, aut nigris notus Chamæbatus. Quare merito scripsit Matth. in errore versari Monachos, quum Rhamnum existimarent Rubum quandam, qui mora caruleo colore profert. Gesl. h. alia Rubi species: In cat. Rubi ger us humile: de coll. Rubus humilis, Chamæbatus. Debel. Adv. Rubus aliter reptans. Dod. Rubus minor & alius tenetior.

Turn notatur.
Monach. error.
Rubus humilis Belgicus, Clus.
Locus.

Cluspar. & hist. Rubus humilis proximè ad Chamæbàton accedens, qui plerumque Belgicè locis nascitur, facinis modo nigris, modo caruleis, palato admodum gatis. Occupat etiam illo multos Austria & Pannoniæ agros, Hungaris Szedòry dicitur.

Lugd. Rubi genus alterum, *Wunderbeer* aut *Wunderbeere* Theophrasti. An Tab. Rubus arvensis, Bronbeeten. Figura enim Tabern. & titulus videntur convenire Rubo minori caruleo, quamvis Compilator non distinguat à majori & pro eo po-

Plin. uogæ.
Vva cervæ.
Vva urfi.

HISTORIAE PLANTARUM

86

icoridis *h. d. d. d.* hoc est, Rubus Idæus nuncupatur, seu Nicandri Rubus Polybataea, à copia mororum sic nominata. Hancille describit. ejsusque figura n ni fallor capite sequenti exhibet pro Chamebatu. Poirò monet Tragus quosdam Fraga per Rubum Idæum intelligere, sed arroganter nimis. Sunt è recentioribus (inquit Matth.) qui Rubi quoddam genus, quod in montibus Tridentinis, præsertimque Ananienibus nascitur, quodque rura mora, Fragis non dissimilia, nullis in usibus officulis, quæ ab incolis vulgò vocantur *Amp. mele*, gustui non injucunda profert, pro certo credant Rubum Idæum esse. Sed equidem non video quomodo illorum sententia prorsus rectè probati possit, &c. Nam in Ida provenit. Idem post. com. lat. & ital. Idæus Rubus etiam ab Ida monte denominari cepit, quòd ibi copiosissimus fortasse habeatur, nascitur tamen in aliis etiam montibus. Nam in Boëmia non solum habetur in montibus, ubi spontè copiosissimus, sed & in hortos transfertur.

Meminit ergo Matthiolus, ut ait Turn. Rubi cujusdam bacis rubris suavis, sine acinis, quam Neotericorum aliqui Rubum Idæum nominarint, autem se non videre, quæ ratione hæc sententia probati possit. Cùm enim dicat Diosc. Rubum Idæum ab Ida nomen adeptum, inde colligi posse putat, non alibi Rubum Idæum, quàm in Ida crescere, &c. Sed hoc argumenti genus, quo frequenter utitur Matthiolus, in veritate evertenda nihil planè concludit, non magis quàm hoc, Stoechas in Stoechadibus in suis nascitur Dioscoridi, Ergo quæ in Arabia, Hispania & Italia nascitur, Stachas non est. Non enim ait Diosc. Rubum Idæum solummodò in Ida provenire, sed ibi copiosissimam esse: interim non negat quin alibi possit nasci. Et sanè Bellon. in Ida monte Rubum Idæum invenire non potuit.

Tab. Rubus hircinus Boëthæ / quem Compilator non rectè describit & distinguit à Rubis: titulus etiam non convenit figuræ, quæ est Rubi Idæi. Nec melius Ger. ponit figuram Tabet. Rubi Arvensis, quæ mihi potius videtur Rubi minoris fructu ceruleo.

Rubus Idæus Cord. in Diosc. Ryff. Lon. (horum duorum figura non commendanda. Lon. quidem meliorem posuit pro Boëthæ:) Cam. Ep. & hist. Lac. (qui Fragariam exhibet) Lob. Adv. Obs. & Ic. Ang. Dod. Gesn. h. coll. & cat. Cast. & Schvvenckf. cui etiam Rubus cervinus & Cervirubus. Cæterus Rubus 3. montibus proprius, fructu in maturitate solum rubefcente, non nigrescente, sapore acido, gustui grato, quem in Alpibus Ampomelas vocant. Lugdun. Rubus Idæus spinosus. Clus. hist. Rubus Idæus Placæ, quoad iconem, Rubus Idæus vulgaris, quoad descr. rubro & albo fructu. Vtrorumque meminit Thalius: rubicundo fructu communem passim tradit; candido rariorem.

C. B. apud Matth. amhos conjungit, eos tamen in pin. separat: & hinc Rubus 3. sive Idæus spinosus; & Rubus 4. sive Idæus fructu albo. Hic est Camerh. Rubus Idæus leucocarpus, i. e. fructu albicante, odoratissimo.

Idæus Græcis, Lat. Rubus Idæus. Ger. *Symbeec / Horbeer / & Humberstaenden*: Tragus ait & *Humberbeer* vocari, sed hæc vox magis propriè Cynosbaton denotat. Belg. *Sunnebesien & Sunnebræmen*. Gall. *Framb. isier* [*Frambesiam*] quæ Fragariam ligneam aut illyosam. Ital. *Ribus & Ribus Idæus*, in Baldo *Amp. mele*: Hisp. *Carça Ideas*: Angl. *Nasspibus / & Framboise bushes*. Fructus sive mora Idæi Rubi nominatur propriè, Ger. *Humberbeer*: Gal. *Fr. mboises*: Allob. *ampes*: Angl. *S. amboise / & Humberbery*.

Flores Maio, Junio & Julio mensibus abeunt in mota, quæ diu subsistere nequeunt: intra paucos

enim dies vermiculi in iis nascuntur, & tunc non prolixius pereunt. Viginosis & umbrosis silvis, locisque minimè apricis, neque non rorulentis & arenosis faxis gaudet. Porenti, ubi *Ambre* vocant, sicut & Montebelgardi, ex eo succum condunt more Citoniatum jucundissimi saporis.

Eadem præstat, autore Diosc. quæ Rubus. Cæterum flos cum melle oculorum collectionibus commodissimè illinitur, & ignem factum extinguit. Sto-machicis que ex aqua hibendus datur. Eadem Plin. duobus in locis repetit. Ad quasvis non solum ardentes febres, aquæ Rubi Idæi motis distillata utilis est, sed & jucunda & grata ægris cum non propter manifestam refrigerandi facultatem, tum propter suavisimum quem exhalat odorem violaceum. Decoctio tenellarum spondium foris, inque in inflammationibus convenienter in linetolis imponetur, nam sedandi illas, & restinguendi vi pollere id medicamentum certa experientia docuit. Qui cibos in ventriculo continere nequeunt, & frequentibus vomitionibus infestantur, iis fructus devoratus, & sola recentia tusa, ac foris stomacho imposta, mirè profunt. Folia Rubi lixivio decocta, si illo caput aliquoties ablus, capillos denigrant. Recentia trita & inflammationibus epatis & stomachi foris imposta, calorem remouent, deliquiumque animi & vires ægrotis addunt, quæ omnia aqua distillata efficacius præstat, potu & illitu, quem admodum supra quoque Tragus meminit. Idibus Serpentium milita folia addito oleo & vino veneno aduertantur. Ex Rubi Idæi fructus succo expresso, Gesn. syrupum parare solet, quem vel Sapphicis & Smaragdinis ad cor roborandum, antefere non dubitari. Is enim summo pere oblectat, tum aspectu floridissimi & pellucidi ruboris, tum odore gratissimo tum sapore inter dulcem & acidum suavisimo, idque expertus in seipso & aliis. Ex moris Rubi Idæi exprimi possit vinum in usus multos, ad ventriculi imbecillam, alvi fluxum, variòsque gingivarum, dentium, uvulæ, palati, aliarumque partium affectus. Calculosis utile est aqua stillantia forum Rubi cochlear. i. mane & vesperat assumptum cum quatuor cochlearibus vini,

RUBUS IDÆUS NON SPINOSUS.

Ignitur frequens (inquit Lugdun.) in Allobro-gum monte Gratianopoli vicino, quem vocant la Motte, caulibus multis sequepedalibus, ut Idæus Chamæbatus jure nominari possit, solosis, sine spinis ullis, folio Rubo Idæo simili, averfa parte candido & lanuginoso: fructu rubro, sed non ut in superiore rotundo & dulci, verum ex granis sic coagmenato, ut in meta modum fastigiatus, acido sapore etiam cum maturuit, fragi magnitudine. Incolæ vocant *des Amies*, & ab Idæi Rubi fructu probè distinguunt quem vocant *des Ampes*. Tragus Chamæbati speciem esse existimat, nec malè Rubo Idæo conjungi & in hortum translatum in Rubum Idæum mutari, omniaque quæ de Rubo dicta sunt, huic fructi rectè attribui posse scribit. Hæc Lugdunus descriptio multum videtur differre à descriptione Tragi, quæ paulò post proponer da ad historiam Rubi alpini humilis. Non placet præterea ex Trago desumpta icon, quæ non alia videtur, quàm Rubi Idæi spinosi: sunt enim in ipsa iconè spinæ, & fructus minime fastigiatus in meta modum, sed ternis, aut quateris acris solum constans.

C. B. apud Matth. Rubus Idæus non spinosus. Eid. pin. Rubus 4. sive Rubus Idæus leviter Chamæbatus sive Rubus Idæus alter, Trag. Rubus 3. Cord. in Diosc. Rubi alia species, Gesn. h. Boëthæ / i. e. bacca hircinæ, Lon. Rubus hircinus, Tab.

Rubus

Non est
ragaria
Rubus I-
deus.
Locus.

Non Ru-
bus Idæus.
Matth.

Matth. re-
futatur.

In Ida non
provenit.

Tab. not.

Ger. lapsus.

Synon.

Ampom-
elas.
Rub Idæus
duplex.

Nomen
linguar.

Tempus.

Locus.

Vires.

Ignis / acer.

Aqua ad
febres.

Inflammatione.

Vomitus.

Syncope.

Syrupus.

Vinum.

Agri fori.

Locus.

Chamæbatus Tragi.

Rubus Idæus non spinosus, Lugd. Rubus Idæus Placæ, Clusii hist. def. Rubus, Ger. ic. C. Bauhini sententia de hoc Rubo aliena est à nostra opinione. Et præsertim Rubi alia species Gefn. h. est nobis Rubus minor, &c. Rubus, Ger. ic. & Boëßbeer Lon. itémque Rubus hircinus Tab. ic. est Rubus Idæus spinosus. An porro Rubus Placæ, de quo mox agendum, idem sit eum præfenti, judicent alij. Demùm, Chamabatus Tragi, quoad descriptionem videtur Rubus alpinus humilis; quoad iconem verò Rubus Idæus.

RUBVS SINE SPINIS
Valentinus.

Idæi Rubi genus Clusio ostendebat Io. Placain monasterio D. Virginis, cui cognomen de I E S U, primo ab urbe Valentia militari, sine spinis, foliis Rubi mollioribus, longis samentis per terram sparfis, cujus fructum dicebat Rubo vulgari minorem, aliàs illi admodum similem. Caterùm Placæ hanc plantam Rubum Idæum censuit, sortè quòd Dioscoridis latinus codex cap. de Rubo Idæo, hæc verba, *quæquam sine spinis invenitur*, addita haberet, præter græci codicis fidem. C. B. pin. cum præcedenti Rubo eundem facit.

RUBVS ALPINVS HV-
milis.

CAP. IV.



Rubi genus hoc, quod *des Chevrottes* vocant Burgundi, planta est admodum humilis, palmaris ut plurimum, aut paulò major, mollis, sine spinis: folia terna ut in Rubo Idæo vulgari, mollia, vitidia, non ut illa subtus alba: mora punicea ex longo pediculo in ramorum extremitate plura, capitulo ceu Ruborum, sæpè uno acino vel duobus constant, interdum tribus, rariùs quatuor, sapore grato, acido: granum unum singulis acinis mediocriter durum, sublongum, rugosum, majus, quam semina Rubi Idæi.

Clusius sic fusiùs describit: Pedalem non superat altitudinem, teretibus, subrubentibus, & hispidis viticulis, in quibus bina aut terna folia, Rubo Idæo à plerisque nuncupati penè similia, h. e. terra simul ex eodem pediculo nascuntia, rugosa, non hirsuta tamen, nullisque spinis horrentia, valdè exsiccantis & adstringentis gustus, deinde amariusculi: in summis viticulis & supremis earum alis flores quidem fert (sed cujus formæ aut coloris, ignoro, verisimile est Rubo Idæo aut humili pares) deinde fructum Rubo vulgari aut Idæo minorem, h. e. minore acinorum numero constantem: etenim binos tantùm, ternos, quaternos, aut ad summum quatuordecim, acinos habet, longè tamen majores quam in ullo alio Rubi genere, omninò rubentes, & admodum succi plenos, ut quodammodo transpareant, acidi & palato gratissimi saporis: continent singuli isti acini singula grana alba rugosa & inæqualia, adstringentis gustu, radix longè, latèque serpit, & longas interdum viticulas humi spargit, quæ subinde radices agunt.

Tom. II.

Chamabatus, seu Rubus Idæus alter, inquit Tragus, non ubique locorum in umbrosis arbutis provenit, virgis tenuissimis humi sparfis, quæ non aliter atque Fragariæ, aut Rubi vulgaris coliculi, se-
le ipsæ propagant; folia gerit Rubo adsimilia, sed magis exigua nullis spinis horrentia; fructum edit Augusto mense, sed non copiosum: Atque is nihil aliud est quam Morum rubrum magnitudine fraga non excedens, ternis aut quaternis acinis contentans, fructui Rubi exiguo similis, gustu vinum referente, sed pergrato præditus; radix gustum obtinet asperum & ad amaritudinem quandam vergentem. Ea quotannis novos emittit & teneros coliculos. Hæc Mora in VVasgoia nostra & apud Mediomatrices Boëßbeer vocant. Ego existimo Chamabati speciem esse, aut certè non male Rubo Idæo conjungi posse. Nam in altissimis montibus gignitur, nec alihi unquam illum me reperisse fructicem memini. Caterùm cum in hortulos meos illum transfulissem in Rubum Idæum mutatus est. Quæcumque de Rubo dixi ea puto huic quoque fructi attribui rectè posse. Hactenus ille. Ego jam antea monui me dissentire à Lugdunensi existimante suum Rubum Idæum non spinosum eandem plantam cum hæc Tragi, quæ occasio ut hîc integram descriptionem ex eo posuerim, licèt eandem plantam existimem cum hac quam hîc propono, cujusque descriptionem ex Clusio pono: nihil enim invenio quod reclamet præter iconem, quæ est potius Rubi Idæi, ut in qua appareant spinæ & mora multorum acinorum: responder etiam tota descriptio Tragi. Quare nullus mihi persuadebit eam mutari in Rubum Idæum ut ipse ait se observasse: quanta esset in fructu, foliis & caulibus differentia à Rubo Idæo ab ipsemet descripto? suspicor deceptum Tragam in sua mutatione quam se perhibet observasse: Quandoquidem Rubus Idæus & Chamærubus in iisdem montibus proveniunt, nempe VVasgoviz ut ipse testatur: facilis fuit Trago unam radicem pro altera absumpsisse, quam tantam metaphoram quasi poeticam evenisse.

Notus Gesnero haud dubiè fuit humilis hic Rubus, eumque de Lunar. Rubum Idæum; & de hort. verò Rubum alpinum humilem appellavit. Cluspan. & hist. Rubus saxatilis, sive petraeus alpinus, quia folis saxosis & petrosis locis invenitur. Ad quæmodum rustici mortari Steinsbeer [petraeus bacca] quoque vocant. Chamæhatos Theophrasti non ineptè ejus judicio etiam dici potest, quem Gaza Humi-Rubum interpretatus est. Rubus saxatilis alpinus, Simlero. Camh. Rubus parvus saxatilis Clusij.

Lugd. meminit Rubi Idæi non spinosi Allobrogum, quem ait vocari de *Asnes*, putatque eundem cum Chamabato Tragi. Præterea ejusdem iconem assumit, quæ est Rubi Idæi vulgaris, non Chamabati, ut antea dictum. Conferentis descriptionem Rubi Idæi non spinosi Allobrogum cum Tragi Chamahato facilè apparebit insignis differentia. Tabern. Rubus hircinus; Boëßbeer. Nomina, quæ Compilerator ex Trago mutuatus est, conveniunt Rubo alpino humili, sed non icon, quam hoc titulo exhibet, est enim Rubi Idæi vulgaris. Sed consuetæ existat

Morum rubrum.

Chamæbat. inc. Rubus Idæus.

Rubus Idæus. Gesn.

Rubus saxatilis sive petraeus Clusij. Baccæpe. frax.

Rubus hircinus Tab. saxa. tur.

F.

eum ignorantia: discrimina Ruborum non novit. Gerard. Rubus Saxatilis, *Steneblact* / *Berrye tree*. Schvv. Rubus alpinus; Item Rubus hibernicus. Ecurr uni planta duplicem fecit inscriptionem: Thal. Rubus minimus. C.B. pin. Chamærubus spinis carens sive faxatilis.

Rubus alpinus.
Rubus minimus.

Locus.

Abundè provenit in saxosis collibus Neuberger monasterio imminetibus, sub celissimo ejusdem nominis monte, cujus summum jugum perpetua nive oblitum. Crescit & in aliis scopulis qui circa celissimum montium radices sunt, non in ipsis montium jugis. Augusto mense colligebat Cluſius maturo suo fructu onustum. Ego proveniente observavi in Burgundia montanis prope Marhe, ubi comedunt. Vidi aliàs in Sabaudia montibus.

RUBO IDÆO MINORI AF-
finis Chamæmorus.

CAP. V.

De/3



Inter mites Rubos etiam censenda est hæc elegans planta cujus iconem & historiam Cluſio communicabat Thomas Pénæus, Londinensis Medicus. Dodrantibus autem prædita est viticulis, in quibus alternatim tria, quatuor, rariùs quinque folia, scabra, Malus, vel potius Mori [novella videlicet & primùm nata. maxillæ tamen Cluſ. cum Rubus vulgaris solis conferre] foliis non valdè dissimilia, in quinque præcipuas partes divisa, & per ambitum serrata, longis pediculis in nixa, qui ex binis alis sive apophysibus cauliculum amplectentibus exeunt. Summum caulem exorant flos unicus quinque foliolis ex nigro purpurascens constans. Fructus mori fructui [Rubus vulgaris verus] similis (urde nomen) sed paulò minor, primùm albicans, & acerbus, postea ruber, ex acerbo dulcis: radix utcumque nodosa, ex singulis r. odis paucas fibras spargens, mirè se propagans, & quàm longissimè serpens, aded ut brevi tempore maximum spatum occupet.

Angli *Bnotherrics* appellant, h. e. rodosam bacam, à fructu nodis simili. Cluſ. pan. & hist. itemq; Ger. Chamæmorus dicitur. C.B. pin. Chamærubus spinis carens: sive solis Ribes Arglica.

Locus & Tempus.

Nivosa & aperta loca amat, summòque montes, & magnà copiam inter Ericas provenit monte Engleborov totius Angliæ cellissimo, duodecim miliaribus à Lancastria. Floret Junio & Julij initio: fructus Augusto maturus est.

CHAMÆMORVS NORVVA-
gica.

Chamæmorus Norvvegicus, Cluſ.

Chamæmoros superiori valdè affinem in Norvvgia & finitimis regionibus nasci ex Henrici

Hoieri epistolâ intelligebam, ait Cluſius, qui & ejus fructum conditum sub extremum annum 1593. mirtebat, & in sequentis anni Junio virgulas, cum foliis & flore inter chartulas repositas. Erant autem hæc virgæ terpes, digitalis longitudinis, fuscæ coloris cortice obdura, quibus inhærebant uncialibus petiolis folia, vulgaris Ribes foliis non valdè dissimilia, sed paulò magis orbiculata, in breves aliquot lacinias divisa, tribusque eminentioribus nervis aversâ parte prædita, è quibus multa ventæ ad circumferentiam sparguntur, in ambitu dentata: è summis virgis exeunt oblongiores tenuioresque petioli sustinentes singularem caliculum, è quo flos emergit candidus, nunc quaternis, modò quinis foliolis constans, umbilicum occupantibus multis exilibus stamiribus albis cum flavis apicibus: flori fructus succedit, fragi magnitudine, rubens aut pallidus, cujus interior pulpa mollis, humida, mucilaginosâ exilium acinulorum plena, gustu non insuavis.

Paludosis & humidis locis gaudet, & maturitatem acquirit fructus, mensibus Junio, Quintili, Sextili: ab incolis verdè *Nofreberen* appellatur.

C.B. pin. Chamærubus spinis carens 2. sive foliis Ribes.

Ceterùm, quæ conservandi hujus fructus ratio, quàm admirabiles ejus facultates, cum ex ipsius Hoieri epistolâ, tum ex his quæ ipse anno 1595. præfens mihi Lugduni confirmabat, sub jicere libuit. Ex ipso fructu, inquit, Electuarium rudi minervâ conficiunt quotannis Norvvgij, atque Fin marchij, in hunc fermè modum. Bacas in fistilâ aut hæno per se ad mediocrem consistentiam coquant, nullo alio addito liquore: eùm enim succi plenæ sint & molles alio humore irrigari non expetunt. Quanquam in delicatioribus sunt nonnulli, qui melicrati Fionensis (quo summè delectantur Septentrionales isti) aliquid affundant. Hanc confessionem idoneis vasibus exceptam, & ne corrumpatur ab ambiente aère, butyro dissoluto obductam usui studiosissimè reservant: nobile sanè, & probatissimum illis adversus scorbutum remedium. Et enim non facile credas, quod miracula ista gens, solâ hac medicinâ faciat quotidie: ut omnino fatendum sit, nihil ad hæc esse vel Cochleariam illam tot encomiis hæcterus celebratam, vel Beaburgiam, vel Silymbrium Cardaninem, & id genus alia, quibus Germani sese effertunt. Et meritò admiranda singularis Dei benignitatis, quod Nordlandiæ longius ad Septentrionem remotæ, & scædissimis morbi obcasi, solique inclementiam miserabiliter scædenti, indigenis remediis prospicere voluerit: enim verò morborum crudorum, putridorum, melancholiorum, mira hic ubique seges. Idcirco necessitas miferos rusticanos varia auxilia edocuit, ut nunc vel in gravissimis casibus pauperulus aliquis accommodatè sibi suisque mederi sciat. Ita nonnulli scorbuticos, quamvis ridiculè, tamen benè atque utiliter hunc in modum curant. In vicinam aliquam insulam moris abundantem exponunt, ibidemque solos reliquos, domum non transferunt, priusquam sanitati sint restituti. Tum enim illi, quasi ab omni humanitate exclusi, vitam tamen (quod credibile est) cupidi, moris istis vesci coguntur, sive ut extremo remedio promissam sanitatem recuperare tentent, sive ut sitim, quâ ut plurimum torquentur, extinguant. Dumque hoc ad satietatem agunt, sine dubio intra paucos dies oppidò convalescunt. Hic me verò quando id non hæc, electuario suo non minus feliciter utuntur, sine certâ dosi, aut custodiâ. Aliqui toto curationis tempore, nullo alio alimento utuntur. Ita

Conditura fructus.
Facilitate.

Genus Hoierus.

CHAMÆ-

CHAMÆMORVS ALTERA
Norvegica.

*Chamæmorvs bacca-
fers.*
DEM Hoierus, aliam quandam Chamæmoru n
bacciferam, similibus penè prædictæ foliis obser-
uavit, cuius historiolum Clusio anno 1576. com-
municavit. Fruticosa autem quædam stirps erat, quæ
Ribesium foliis & fructu pro sua proportione
admodò æmulabatur, ut non dubitavit Clusius ter-
tiam Ribesij speciem appellare. Dodrantalis por-
tò erat, cortice petiolorum nigricante, foliis latis,
dilatatis, Vitis foliorum modo: baccis in cuiusque
pediculi apice quamplurimis conjunctis tanquam
in umbella, non, ut in vulgari Ribesio è multis ob-
longis racemulis pendentibus, rubentibus, acidi-
lis, saporis valde ingrati; Incolis Tetricæren nun-
cupatis.

*Defr.
Bacca*

*Folies
baccen.*

C. B. pin. Chamærubus spinis carens 4. sive foliis
Vitis. Chamæmorvs altera Norvegica Clusij.

RUBI FACIE SENTICOSA PLAN-
ta Lobelio. C. A. P. VI.



Alterius illic
(in India) na-
tæ arboris truncum
aut bacillum expri-
mendum curavi-
mus, qualem cum
aliis accepimus.
Carpi crassitie est,
longam hastam æ-
quans, & cortice
nigro, denso vesti-
tus: tuberculis cras-
sis, lenticosis, cre-
berrimis, in clava
modum muricato,
solido & gravi præ-
duro ligno.

Lob. Adv. & Ic.
Rubi facie sentico-
sa planta.

C. B. pin. Rubus
sive exoticus: Ar-
boris truncus spinosus, Lugd. defr. at figura sub ti-
tulo Nerij facie secundo loco habetur.

CAPPARIS SPINOSA ET NON
spinosa. C. A. P. VII.

Impertinens nihil Capparum luxuriatibus lon-
gè, latèque radicibus veteres prodidère. Ipse
autem frutex multis etiam stolonibus præditus
est, quos aduncæ spinæ deorsum spectantes Ru-
borum in morem amant, quanquam & spinarum
expers mitisque invenitur: folia alterno positu
nascuntur, circumatæ rotunditatis, aliàs modicè
acuminata, uncias duas circiter lata, paulùm
variante longitudine, saporis perquam amari: ex
horum supra pediculi singulares exeunt longi, qui-
bus capitula insident viridantia, quæ explicata flo-
rem exhibent candidum, Rosæ parvulæ æmulum,
medium obtinentibus infinitis fibrarum cirris: se-
men pericarpio oblongo clauditur, multum, par-
vum.

Cortices autem, quæ in officinis prostant, parietes
habent crassos, duros, solidos, albicantes, nec fractu
faciles, acerbò sapore, quem obvescit alius ru-
gosus & rimosus. Tales reperiuntur interdum qui
Tom. II.



CAPPARIS OFFICINARVM
cortex.



duos pollices cras-
situdine æquent,
quod si è radice de-
tracta sint, simpli-
ces existunt, colo-
remque habet ob-
soletum.

Theoph. non so-
lùm caule & ramis
aculeatis constat
Capparis, sed & fo-
lio hispido, quæ
cultura deterior
redditur, ut natura
sylvestrem dixeris.

Diofc. Capparis
frutex est aculeatus
[exav. d. d. n. e.] per ter-
ram in orbem stratus,
spinis ut Rubus [d. d. n. e.] habens
in hami modum
aduncas: folia Mali
Cotonæ [santa v. v. d. n. e.] rotunda: fru-
ctum verò Olivæ
[santa v. v. d. n. e.] similitar: qui
cum desiccatus pan-
ditur florem pro-
mit candidum. Hoc
autem delapso nõ-
nihil glandis ob-
longæ figura inve-
nitur, quod aper-
tura grana tãquam
Punicæ mali [Balau-
stis Serap.] exigua
rubentiaque intra
se ostendit. Radice-
ces lignosæ sunt,
grandes ac nume-
mosæ. Cæteram,
Capparis inter e-
jusdem Nothæ a-
liis Cynobatus di-
nisi nothæ.

*Theoph. &
Diofc. acu-
leatam de-
scribant.*

citur, aliis Capria, aliis Malum corvi. Alij Ophio-
scorodon vocant, alij Phyllostaphylon, alij Thal-
lian, alij Petream, alij Holophyton, alij Lorit-
tem, alij Ohgochloron. Sunt qui Aconiton [A-
contion Trag.] qui Hippomanes, qui Trichomanes.
Propheta Poteram, alij Peuteron [Peutheron Trag.]
alij Cor lupi, alij Haloscorodon [H. scorod. n. Trag.]
alij Lilium [Crim. Trag.] alij Thlaspin: Romani Si-
napi Persicum, alij Inturim, Aphri Herbitæ thû, co-
grominant. Differte autè tradit Lybicam quæ apud Genera
Marmaridas nascitur, eam quæ in Apulia provenit, Diofc.
cecu & ea, quæ de Rubro mari & Lybia affertur. Qua
de re susus inter Vires Quod autem Capparum Cy-
nosbatum, quidam dixerint, factum esse scribit Cor-
narius, quod quædam comuria cum Cynosbato ha-
beat. Ast quæ illa sint, non demonstret. Est Ophio-
staphyles appellatio apud Plinium, i. e. Vvæ v. peri-
na: pro qua in supposititis Phyllostaphylon habetur.
In Ægypto, inquit is, & Capparis firmioris ligni
frutex feminis quæ & cibi vulgati, caule quoque unâ
plerumque decerpto. Cavenda ejus generâ pere-
grina. Siquidem Arabicum pestilens, Africum gin-
givis inimicum, Marmaricum vulvis & omnium in-
flationibus, Apulum vomitus facit, stomachum
& alvum movet. Quidam cum Cynosbatum
vocant, alij Ophæostaphylen. Et postea: Inno-
centius Italicum est. Marmaricum itaque dicit
Plinius, id quod apud Marmaridas nascitur,

ut Dioscorides ait. Palladius Cappar vocat. Serapio Capparus.

Cynosbato. M. Virg. herba Cappar, Cynosbato [Cassius] *ribus* Job hamatos quos habet aculeos dicta. Phyllophylon, quod inter folia fructum quasi uam habeat. Petraea herba à natalibus. Cur Sinapi Perlicum à Ro nanis appelletur, incertum.

Dod. hist. iconem exhibet priorem Plantini: descriptio verò conuenit Cappar retuso folio; ait enim folia habere rotundiora, quàm Malus Cotonea. Turn. in plurali numero Cappares vocat, & tamen tradit tantum spinosam. Gaza, H. Iun. & Gesfr. cat. Inturis. Matth. sicut iconi addit spinas, an ex ipsa planta, vel ex lectione Dioscoridis, ambigo: eo modo dispositas. ut ipse pingit, non vidi. C. in. Epit. & hist. aliam posuit figuram, in qua vix spinæ apparent & folia rotunda ut erant Matthiolo, qui ait se vidisse Cappares frutice non spinoso hortenses, Ferrariae. Lonic. figuram habet Cappar non spinosa, licet in descriptione spinosam tradat, nec faciat mentionem non spinosæ. Ryff. Dioscoridis descriptioni addidit Cappar figuram non spinosam, cum tamen Diosc. aculeatam tradat.

Loh. Adv. Cappares: Obf. & Ic. sicut & Tab. Cappar folio acuto, & Cappar retuso folio: figuræ dux. Easdem etiam exhibet Lugdun. dicitque folio tantam differre. Et hinc cum Lob. & Compilatore pingit utramque spinosam. Certè si nulla differentia alia est, folium non meretur alteram figuram.

C. Bauh. apud Matth. eandem proponit, dicens. Quæ rotundo folio est, Matthiolus expr. sicut I. Cappar, Tragi, Matth. Cordin Diosc. Dod. Gall. Gesfr. h. Lon. Lac. Cast. Lugd. Cappar retuso folio, Lob. Cappar Italica, Cæsalp. Cappar 2. Tabern. II. Cappar Dod. hist. Cappar folio acuto, Loh. Lugd. Ger. Cappar aliud genus, Cæf. Cappar prima Tab. Idem pin. Cappar 1. siue spinosa fructu minore, folio rotundo Cappar, Tragi, & Ang. Lugd. & Rauv. qui & sylvestrium meminit. Cappar spinosa, Bellon. Cappar rotundior folio, Ger. Item, Cappar 2. siue folio acuto. Et, Cappar 1. siue non spinosa fructu maiore: Cappar non spinosa, Bellon. In Arabia arbore scit & hyeme folia retinet, Cappares Alexandriae maiores esse, quàm alibi, quos Cappar appellant, Alpini author est. Hæc ille, cuius multiplex error, studiosum in tedio consumere posset. Pingit plantam folio retuso, scribens interim esse rotundam, quasi inter rotundam & retusam nihil inter sit. Matthiolus eam non expressit. Spinæ malè pictæ sunt, quod seuerus censor Lugd. non animaduertit. Surtam enim spectant, & plures simul coniunguntur, cum deorsum inclinent, hamate sint, & simplices. Nec folia retusa sunt, sed ex rotundo acuminata. Nec prima eius Cappar, Tragi est, sicut nec Dod. gall. Lacuna, aur H. Lugdunensis, quæ eandem cum Matthiolo exhibent, excepto Trago, cuius figura neque ad plantam videntem, neque ad siccam picta videtur. Cordus etiam in Diosc. & Gesfr. h. (cui Cappar & Rurpe d. us dicitur) non concluditur, quam intelligat, imò & cæli h. acuti aut rotundi ibidem meminerunt. Mirum ergo ur de colligat, esse e jus primam Cappar. Loniceri quoque figura esse non potest, spiris enim caret. Cæsalpini tandem Cappar Italica esse recurrit, quæ virgas simplices profert, sine spiris. Quod idem comprobant sequentia eius verba. Aliud genus spirosis ramis constat peregrinum. Dioscorides describit illud genus, quod aculeis constat. Cam. h. Cappar vera. Schvven. Cappar major & minor.

Nomen Nomen apud Græcos idem, quod apud Latinos tum ipsa planta, tum fructus obtinet: *lat. innot.* siquidem dicitur, nonnullis tamen Lat. Inturis. Arab. Cappar & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non conuenit, quomodo illud Ecclesiasticis cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit propriè explicandum. Aliis enim appetitus est decia par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Cappers: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Capparis sacrarum pignarum

Locus & Tempus

Satis

Cappares Alexan. Apula

Matth. la-plu.

Vires & Temperamentum

tim inducit. At cocta Capparis in citho accepta, commoda magis est stomacho quam cruda. Fructus

Ad splenem itaque ejus splenem liquat, si duarum drachmarum pondere cum vino bibatur ad dies quadraginta.

Purgat Ducit etiam urinam & alvi excrementum cicutum. Coxendicum quoque morbo & resolutioni opiculatur fructus si bibatur, ruptis item ac convulsis. Ducit & menses, & pituitam de capite detrahit. Dentium item dolorem sedat fructus cum aceto coctus & collatus. Ceterum radice cortex aridus, tum ad prædicta commodus est, tum omne diuturnum & sordidum ac callosum ulcus repurgat.

Vlcus. Imponitur etiam in splenicis, cum cruda hordeacea farina: si verò radix manducetur, dolenti denti auxiliatur. Vitilignes etiam albas exterit cum aceto tuta. At verò folia & radix trita, duritias & strumas discutunt. Succus autem auribus infusus, vermes in ipsis occidit. Porro Lybica Capparis, quæ apud Marmaridas appellatur nascitur, vehementer inflat, quæ in Apulia provenit, vomitus concitat, quæ verò de Rubro mari & Lybia affertur, acerrima est, pustulas in ore excitans, & gingivas ambedens usque ad denudationem. Unde ad eum inepta est. Ferunt eos, inquit Plinius, qui quotidie Capparin Italiam edunt, paralyti non periclitari, nec lenis doloribus. Radix ejus vitilignes albas tollit, si trita in sole siccetur. Spleneticis prodest in vino potus radice cortex ʒij. dempto balnearum usu. Feruntque 35. diebus per urinam & alvum totum lienem emitti. Bibitur in lumborum doloribus, ac paralyti. Dentium dolores sedat tritum semen, ex aceto decoctum, vel manducata radix: infunditur & aurium dolori decoctum semel in oleo. Phagadænas folia & radix recens cum melle sanant. Sic & strumas discutit radix: parotidas vermiculose cocta in aqua. Iocinoris quoque malis medetur. Dant & ad tinea in aceto & melle. Oris exulcerationes in aceto decocta tollit. Stomacho in utile esse inter auctores convenit. Capparis facultas, ut prodit Gal. lib. de alim. est satis tenuium partium, & idem minimum alimentum exhibet corporibus ac vescentibus. Fructu verò ejus magis ut medicamento, quam ut alimento utimur. Idem 7. simpl. Capparis radice cortex vincentem habet qualitatem amaram, proxima amarem, deinde acerbam. Ex quo liquet, quod diversis pugnandibus constat facultatibus: quibus abstergere, purgare, incidere potest amaritudine: extalsfacere, incidere, digerere acrimonia: porro contrahere, densare, consstringere acerbitate. Itaque lienes in durasos si quid aliud hoc medicamentum juvare valet, tum foris idoneis, illinendis remediis admistum, tum intra corpus assumptum, sive decoctum in aceto aut oxymelice, & id genus sive aridum contusum illisque permistum: quippe cum aperte crassos, lentosque humores hoc pacto sumptum evacuet, nec eos tantum per urinas, sed & per ventrem, sæpe etiam sanguinolentos deferat, unde & lienes adjuvi sunt, & coxarum dolores.

Aurium Quin etiam menses promovet, & ex capite purgat, detrahitque, quod *amara* vocant, auxiliaturque ruptis atque convulsis. Porro radice ejus cortex ulcibus malignis cataplasmatim modo impositus, non malum est remedium: ut qui illa extergere valent, nec segniter desiccare. Præterea dentium labores prædicarum qualitatum ratione adjuvat, interim cum aceto coctus, interim cum vino, sæpe etiam solus dentibus manibus ac morfus. Ex dictis ergo clarum est, in cunctis quandam ei facultatem inesse itaque extergendi, digerendi, contrahendi. Vitilignes siquidem cum aceto detrahit, & cheraidas & duros tumores digerit, idoneis ad ea medicamentis mistis. Radice cortici, fructus proportionem vitium respiciet, nisi quod ad omnia im-

Dentium becillior. Imò & folia & caules ejus similem vim obtinent, memini quæ me foliis quandoque paucis diebus duritiem choeradis naturam referentem discussisse. Sed admiscemus scilicet illis quippiam, quod eorum vehementiam obiundit. Nec mirum est, quòd aurium vermes amaritate occidant sua. Porro capparis quæ in admodum calidis ferventibus regionibus provenit, ut quam fert Arabia, multò est nostrate acrior, adeò ut plurimum etiam habeat facultatis adurentis. Serapio Clysteres ad sciaticam (ut loquuntur barbari) è succo Capparorum, Rasim magna olim experientia factuisse scribit. Capparin asserit Simeon Sethi calidam & siccam esse gradu secundo. Contra Fern. m. m. Capparin, cuius florem ac radice cortex usurpant, calidam & siccamque esse tertio recessu statuit. Capparis affertur ad nos, inquit Corn. sale conspersa, eò quod sola recondita putrescat. Sale itaque condita etiam hodie in muria ad nos affertur. Ex qua exempta & leniter servescita, aceto ac oleo affuso, in cibi utrum venit, intinctus ferè loco ad carnes & pisces assatos adhibita. Majores & minores Capparis autem Advers. Empoicis variis vaneunt, sed minores in prima sunt commendatione, lætisque pluris enuntur quam majores: vulgò namque habentur meliores parvæ. Sic palati studium fallit ingenium, valetudinis dispendio: nam qui sapor illis percipitur, asstitus est à muria, vel à aceto: alioqui utraque acerrimi ac terreni gustus est, seu vitidis, seu matura, proindeque minor perpanca carnis & succi, facilius & penitus inhiuitur conditura, quam major, quæ melioris succi & aptioris alendæ carni est. Culina proinde error est, minores majoribus præferre. Sed hic confectus inolevit mos, nam, ut scitè dicebat Philosophus, nihil magis advertatur valetudini aut Medico, quam bonus coctus. Itaque voluptati coquus emat minores magno precio: fugi æconomus emet (si nos audiat) majores minoris multò, bonæ tuendæ valetudini. Radices esse adulterinas quidam imperiti Medici ridiculè quiritantur: nam hac radice nihil vulgariis aut vilibus etiam in Hispania. Vomitiones Capparis haudquaquam tere, ut inquit Diosc. existimat Matth. Nisi fortasse hac facultate sint prædita, dum recentes ac virides comeduntur, antequam muriam experiantur, & inde elixentur. Sed infirmat Matth. opinionem, quod fortè non eandem Capparin, sc. Apuleam, cum Diosc. intelligat. Capparis virides acteneros furculos apud Amatun, nõ aliter quam Terebinthi mandunt in aceto simul & muria aut solo aceto condientes. In suis consulationibus teadit Montanus radicem Capparam masticatam multam pituitam tradere. Cappares mense adhibet contra lumbricos Gesnerus. Bayrus, recipit radices Capparorum & illas coquit in lacte asina migrans, usque ad tertiam partem & ungit capillos dimitendo per noctem, hos enim peccendo nigricat.

Dentium *Ad splenem* *Purgat* *Vlcus.* *Aurium* *Serues.* *Capp. Lybica.* *Apulia.*

Ad splenem *Purgat* *Vlcus.* *Aurium* *Serues.* *Capp. Lybica.* *Apulia.*

Ad splenem *Purgat* *Vlcus.* *Aurium* *Serues.* *Capp. Lybica.* *Apulia.*

Ad splenem *Purgat* *Vlcus.* *Aurium* *Serues.* *Capp. Lybica.* *Apulia.*

Ad splenem *Purgat* *Vlcus.* *Aurium* *Serues.* *Capp. Lybica.* *Apulia.*

Ad splenem *Purgat* *Vlcus.* *Aurium* *Serues.* *Capp. Lybica.* *Apulia.*

Ad splenem *Purgat* *Vlcus.* *Aurium* *Serues.* *Capp. Lybica.* *Apulia.*

Ad splenem *Purgat* *Vlcus.* *Aurium* *Serues.* *Capp. Lybica.* *Apulia.*

Ad splenem *Purgat* *Vlcus.* *Aurium* *Serues.* *Capp. Lybica.* *Apulia.*

Ad splenem *Purgat* *Vlcus.* *Aurium* *Serues.* *Capp. Lybica.* *Apulia.*

Ad splenem *Purgat* *Vlcus.* *Aurium* *Serues.* *Capp. Lybica.* *Apulia.*

becillior. Imò & folia & caules ejus similem vim obtinent, memini quæ me foliis quandoque paucis diebus duritiem choeradis naturam referentem discussisse. Sed admiscemus scilicet illis quippiam, quod eorum vehementiam obiundit. Nec mirum est, quòd aurium vermes amaritate occidant sua. Porro capparis quæ in admodum calidis ferventibus regionibus provenit, ut quam fert Arabia, multò est nostrate acrior, adeò ut plurimum etiam habeat facultatis adurentis. Serapio Clysteres ad sciaticam (ut loquuntur barbari) è succo Capparorum, Rasim magna olim experientia factuisse scribit. Capparin asserit Simeon Sethi calidam & siccam esse gradu secundo. Contra Fern. m. m. Capparin, cuius florem ac radice cortex usurpant, calidam & siccamque esse tertio recessu statuit. Capparis affertur ad nos, inquit Corn. sale conspersa, eò quod sola recondita putrescat. Sale itaque condita etiam hodie in muria ad nos affertur. Ex qua exempta & leniter servescita, aceto ac oleo affuso, in cibi utrum venit, intinctus ferè loco ad carnes & pisces assatos adhibita. Majores & minores Capparis autem Advers. Empoicis variis vaneunt, sed minores in prima sunt commendatione, lætisque pluris enuntur quam majores: vulgò namque habentur meliores parvæ. Sic palati studium fallit ingenium, valetudinis dispendio: nam qui sapor illis percipitur, asstitus est à muria, vel à aceto: alioqui utraque acerrimi ac terreni gustus est, seu vitidis, seu matura, proindeque minor perpanca carnis & succi, facilius & penitus inhiuitur conditura, quam major, quæ melioris succi & aptioris alendæ carni est. Culina proinde error est, minores majoribus præferre. Sed hic confectus inolevit mos, nam, ut scitè dicebat Philosophus, nihil magis advertatur valetudini aut Medico, quam bonus coctus. Itaque voluptati coquus emat minores magno precio: fugi æconomus emet (si nos audiat) majores minoris multò, bonæ tuendæ valetudini. Radices esse adulterinas quidam imperiti Medici ridiculè quiritantur: nam hac radice nihil vulgariis aut vilibus etiam in Hispania. Vomitiones Capparis haudquaquam tere, ut inquit Diosc. existimat Matth. Nisi fortasse hac facultate sint prædita, dum recentes ac virides comeduntur, antequam muriam experiantur, & inde elixentur. Sed infirmat Matth. opinionem, quod fortè non eandem Capparin, sc. Apuleam, cum Diosc. intelligat. Capparis virides acteneros furculos apud Amatun, nõ aliter quam Terebinthi mandunt in aceto simul & muria aut solo aceto condientes. In suis consulationibus teadit Montanus radicem Capparam masticatam multam pituitam tradere. Cappares mense adhibet contra lumbricos Gesnerus. Bayrus, recipit radices Capparorum & illas coquit in lacte asina migrans, usque ad tertiam partem & ungit capillos dimitendo per noctem, hos enim peccendo nigricat.

Tempus *Sethi.* *Sale conspersa.*

Tempus *Sethi.* *Sale conspersa.*

Capparis *maior* *minor.*

Capparis *maior* *minor.*

Capparis *maior* *minor.*

Capparis *maior* *minor.*

Capparis *maior* *minor.*

Capparis *maior* *minor.*

Capparis *maior* *minor.*

Capparis *maior* *minor.*

Capparis *maior* *minor.*

Capparis *maior* *minor.*

Capparis *maior* *minor.*

Capparis *maior* *minor.*

CAPPARES ARBORESCENTES

Cappares in Arabia invenimus, pumilatum fixum altitudinem æquantes, ut nobis conciliendæ fuerint, ad earum fructus colligendos, ovi gallinæ magnitudine, & semina intus continentes, piperis instat calida: ipsæ Cappares Juglandibus magnitudine non cedunt. Ut verò album sinapi in vinum verradiam injiciunt, ne ferveat, sed diutius suam dulcedinem retineat: sic Arabes istarum Capparum semina in suis Vinis commiscere solent, ut dulcia ea conservent, quod etiam Avicenna annotavit. Bellon. Ob. l. 2. c. 60.

Synon.

C.B. pin. Capparis 4. sive arborecens fructu Iuglandis magnitudine: Capparis Arabica fructu ovi magnitudine, semine piperis instar acris, Bellon. Capparium arbor, Rauvv. qui fructus magnitudinem non expressit. Cappares plurimum ab his que in arboribus adolefcunt, & que in Græcia proveniunt, differentes in Tauri montis saxorum filluris, Bellon. notavit.

CAPPARIS FABAGINEA SIVE
Peplos Lutetianorum.

CAP. VIII.

Deser.



Longis lentisque caubibus est prædita, glabris, striatis, ramosis, ad quorum genicula nascuntur duo ex adverso siti pediculi unciales & fescunciales, bina folia in summo cacumine gerentes, modicè distantia, positu serè foliorum Visci, pinguis, ex rotundo oblonga, Portulacæ foliis quodammodo similia, nervo medium percurrente, à quo venula obliquæ in margines exporriguntur, a-

mata, ex eorundem sinu pediculi femunciales prodeuntes, florem unum sustinent singuli miniatum, extra quem prominent longa rubentia stamina, apicibus donata concoloribus: florem extrinsecus ambiunt foliola oblonga, viridantia: siliqua auctore Rauvvolfio, Sesamo similis: addit frater C. Bauhinus oblonga, angulosa, quatuor veluti ex thecis composita, in qua semina continentur plura, lata, compressa, ex rotunditate in acumen desinentia. Vniuersa planta gustu amaro Salicis aut Capparis.

Synon.
Fabago.
Peplos.

Lob. Obs. & Ic. Capparis leguminosa, sive Fabago Belgarum: Peplos Petri Quithe & Parisorum.

Rauvvolfii. Halepi Morgesani, Avicennæ Ardifigi, *Morgesani.* & Andiria Rhafis. *Ardifigi.* *Andiria.*

Dod. hist. annotat à recentioribus Capparin Fabaginem & plerisque Capparin leguminosa dici: veteribus notam fuisse non constare: Cepam Dioscoridis esse, non esse facile affirmare, brevi ac succincta admodum apud Dioscoridem extante descriptione: describi verò ab Avicenna capite 28. herbam quandam Ardifigi nomine: cum qua responderet, si tam gravi esset odore, quam sapore amaricante. Si nihil aliud impedit, quam gravis odor, quominus sit Ardifigi, nos illud recipimus ex auctoritate Rauvvolfij, qui ait Halepi gratissimi esse odoris, ac eam ob occasionem incolæ crebrè uti ad expellendos vermes. *Cepam.* *Dod. notat.*

Cam. apud Matth. ejusdemque Epit. Capparis silvestris sive fabaginea, vel leguminosa: Avicennæ Ardifigi, aut Ardifigi, Rhafis Andiria. Eid. h. Capparis, Fabago. Tabern. Capparis leguminosa, *Ge-schede det Capparen.*

C.B. in Lugd. Fabago Belgarum. repetitur in append. Morgiani Rauvvolfij nomine: duæ descriptiones ex utraque una faciendâ erat, siquidem in prima fructus repenatur: aliâ figura posterior magis probatur. Fallitur C. Bauh. nam fructus alii- *C. Bauh.* quosies pingitur in ipsa planta, & separatim juxta eam. Eid. pin. Capparis 5. sive Portulacæ folio: Telephium Dioscoridis & Plinij. Colum.

Observavi florentem Augusto, Lutetiz in horto regio: Romæ inter rudera spontè nasci perhibetur apud Camer. *Locus & Tempus.*

CAPPARI FERÈ SIMILIS
Alhaut.

CAP. IX.

Thevetus auctor est, in Insula Suachem Æthio- *Locus.* pico littori adjacente, nasci herbam quandam Alhaut nomine, in rupibus, latè sese diffundentem, foliis serè Capparis, cujus fructus germina sunt, sive capitula rotunda. Folia, radices, fructus, gustu sua- *Vires.* vissimi sunt, & cordi salubres, quibus indigenæ ad colicos & stomachi dolores quovis, præterea ad hepatis & pulmonum affectus utuntur, decocto ex tota herba parato, cum Corallij albi pulvere.

C.B. pin. Capparis 6. sive Cappariibus similes bac- *Syn.* cæ in Virginea. Sacquenuncner bacæ plantæ, que in stagnantibus aquis reperitur, par. Ind. occid.

FINIS LIBRI XIII.





HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM LIBER XV.



FRVTICES SCANDENTES ENARRAT, VT
VITES, CONVOLVULOS, ET HIS ALIQUA RATIONE

SIMILES PEREGRINOS, ET AROMATA QUEDAM.

PLANTARVM genus quoddam est, quod non nisi alterius ope, ac sulcro sustinere se commodè potest, quas ob id *αἰσθητὸς ἐστὶν ὁ ἀσθενὴς καὶ ὁ ἀσθενὴς* Graeci dixerunt, ut Vites, Convolvuli & huiusmodi. Quaequam Theophrastus quem & Plinius sequitur Vitem inter arbores recenset: quod sanè & de aliis quibusdam maxime dicendum quae assueti. Columella tamen diligentissimus stirpium cultor arborem esse negat, sed medium quoddam inter arborem & fruticem esse vult, ut fustis infra patebit. Vitis sit scandentium illustratio resiat, triplici ordine producenda. Primum praedictarum & similiarum huiusmodi; alter scandentium pomiferarum; tertium scandentium siliquosarum & leguminosarum, subsequenter libris dicendarum.

VITIS VINIFERA. CAP. I.

Descriptio
Vitis viniferae.



NOTIOR est Vitis vinifera, quam ut describi debeat, sed gratificemur frigido subiectis Septentrioni, ut vel lectione novissae discant notissimi etiam ipsi nectarei liquoris parentem, quae nihil obiectis intuenti videri possit, alienae opis indigantia dicarum & pedamentorum adminiculo innitens

Stipex.
Cortex.

Gemmae.
Pampini.

Capreoli.

Flosculi.



que fibrillis herbidis luteolus apices sustentibus compastilium racemis divitem colonospem excitat uvarum, quas alias ne coloris putes obligatam generalitatem, ochra: tanta talique saporum viriutque varietate, quantum qualisquae tam adversa quam secunda valetudine quotidie experimur. Vitis (adit Casalp.) quae ambigit inter arbores & frutices, florem non in summo fructus, sed in sede habet, ac plura semina in communi conceptaculo, brevi tempore ad magnam altitudinem crescit, ita ut nisi crebra amputatione coercesatur, multitudine vitularum luxurians silvescat: folia fert ampla, varietate laciniata, ut Ficus, quos pampinos vocant: flosculos parvos & candidos, ut Olea: racemos ingentes, o-nustos suis granis, quae uva appellatur.

Vitem arborem dicere videtur Theophrastus enim scribit. Arbor est, quod ab radice caudice simpliciter ramosum, nodosum, surculosum, haud facile dissolubile affurgit, ceu Olea, Ficus, Vitis. Et: inter ostenta in arboribus ait, Nigrum racemum adere candidum fructum; candidum verò nigrum tanquam prodigia, & praeter naturam accidere arbitrantur aruspices, ostenta esse astimantes; solum verò in Vite Capneia nullo pacto mirantur, nec interpretantur, quasi quae ratione regionis mutari soleant. Sed hoc ita fieri mirum, quoniam una tantum, aut duae, & haec rariè per universum tempus mutantur. Et si aliquando ita fit, in fructibus potius discrimen, quam in totis arboribus percipitur. Nam talis rei temeritas, fructibus quoque nonnunquam contingit, ut Vitis caudice suo averso fruticet, fructumque ad seque foliis producat. Meminit porro circa agrum Elephantium (ubi eam inter arbores quoque refert)

Racem.

Folia.

Vitis.

Theophr.
Pampini dif-
ferentia
Vitis in bar.

Vitis ca-
pneia
Vitis rariè
no regionè
mutantur.

Vitis elo-
phantiae.

Vitibus folia nōn decidere. Tandem de factu arborum agens, eam in his verbis etiam recenset. Vitium solo differentia maximē numerosa est. Quot enim generatullius, totidem & vitium esse quidam affirmant. Verū in inter eas, quae minis fructificant, geminis crebrioribus constant, solidiorēque sunt. Ex eodem Theophr. hac habentur. Vitis corticem speciem radicis habere, nervosum, macilentum, tunicis multiplicem, quem auferunt cultores: medulla in carnosam materiem lentam: radices tenues, sobolem sursum versus procreantes, ideo euellendas, quae in summa tellure sunt: folia ampla, aliquatenus filia, longo pediculo propendentia, & tremula ex nervulo, & cortice, & carne constantia: frutificare ex novellis furculis: florem lanugineum amplectentem fructum: nam decidunt perforati: fructum congestum: succum vinosum. Ex semine natam degenerare, ut pro nobili ignobilis, & saepe silvestris oriatur, aded ut quaedam fructum non maturet, quaedam eundem non compleat, sed ad florem usque perducat.

Varroni differentia. Marcum Varronem quoque Vitem arborem sacere colligitur ex sequentibus. Praeterea quae arborum in ordine sacrae sunt, eas aequabiliter ex omnibus Sol & Luna coquunt. quo fit ut uvae plures nascantur, & ut celerius coquantur, quas res duas sequuntur altera haec duo, ut plus reddant musti & precij pluri.

Colurnaella. Columella, ut suo loco constabit, nec arborem, nec fruticem, Vitem proprie dixerit. Ejus autem genera haec tradit. Vitis, inquit, vel ad escam, vel ad effusionem deponitur. Ad escam non expetit instituire vineta, nisi cum tam suburbanus est ager, ut ratio postulet in conditum fructum mercantibus, vel ut pomum vendere, quocum talis est conditio, maximē praecoques, & duracina, tum denique purpurea, & bumasta, dactylisque & rhodiae, libyca quoque & ceranica, nec solum quae iucunditate saporis, verum etiam quae specie commendari possint, conseri debent, ut Itephania, ut tripedanea, ut unciarica, ut cydonica. Item quarum uva temporibus huiusmodi durabiles vasis conduntur, ut venucula, ut nuper in hos usus explorata, numisana. At ubi vino confusimus, Vitis eligitur, quae & in fructu valet, & in materia, quod alterum ad reditus coloni, alterum ad diuturnitatem stirpis plurimum confert. Sed ea tum praecipua est, si nec nimis celeriter spondet, & primo praecipua tempore de florescit, nec nimis tarde mitescit, quin etiam prunas, & caliginem, & carbunculum facile propulset, eademque nec imbris putrescit, nec siccitate aboleat, talis nobis eligatur vel mediocriter secunda, si modo is locus habetur, in quo gustus nobilis, pretiosusque fluit: nam si sordidus, aut vilis est, feracissimam quamque serere conducit, ut multiplicatione frugum reditus augeatur. Ferē autem omni statu locorum campeltria largiunt vinum, sed iucundius afferunt collina, quae tamen ipsa medio statu caeli magis exuberant aequiloni prona, sed sunt generosiora sub austro, nec dubium quin sit ea nonnullarum vitium natura, ut pro locorum sibi bonitate vini modo vincat, modo superetur. Solae traduntur

Vitis ad effusionem.

Vitis ad effusionem.

Aminea G. Amineae excepto caeli statu nimis frigido, ubicunque sint etiam si degenerent sibi comparatae, magis aut minus probi gustus vina praebere, & ceteras omnes sapore praecedere. Ea, cum sint unius nominis, non unam speciem gerunt. Duas germanas cognovimus, quarum minor oculis & melius deflorescit habilis arbori, nec non iugo: illa pinguem terram, haec mediocrem desiderat, longēque praecedit maiorem, quia & imbres, & ventos fortius patitur, nam major celeriter in flore corrumpitur, & magis jugis, quam in arboribus, ideoque non est vitis

Germana minor & maior.

apta, vix etiam arbutio, nisi praepingui, & uvida terra, nam nec mediocri valet, multoque minus in exili, prolixarum frequentia materiarumque, foliorumque & uvarum, & acinorum magnitudinem dignoscitur. Inter nodos quoque rarior, largis fructibus a minore superatur, gustu non vincitur, & haec quidem utraque Amineae. Verū & alia duae geminae, quae ab eo quod duplices uvas exigunt, gemellae vocantur, austerioris vini, sed aequē petennis. Earum minor vulgē notissima. quippe Caepania celeberrimos Vestuvii colles, Surrentinōque vestit. Hilari inter aestivos favonij status, austri affligitur. Ceteris itaque partibus Italiae non tam vineis, quam arbutio est idonea, cum praedictis regionibus commodissimē jugum sustineat, materiam, fructumque, nisi quod duplicem non ab similem minorem germanae egerit, sicut maior gemina minor germanae, quae tamen non hoc melior est, quod laetundior etiam mediocri solo, nam illi nisi praepingui non respondere dictum est. Lanatum quoque vineam quidem maximē probant, quae hoc vocabulum non ideo usurpat, quod sola ex omnibus Amineis, verum quod praecipue canescit lanugine. Sanē boni vini, sed levioris, quam superioris, crebram quoque materiam fundit, atque ideo propter pampini densitatem saepe parum recte de florescit, eademque maturo fructu celeriter putrescit, super hunc numerum, quem retulimus, singularis habetur Amineae, majori gemina non dissimilis, primum specie pampini, & trunci, sed vini sapore aliquanto inferior, quamvis generosissimus sit, proximē praeferenda etiam propriis vitibus, nam & feracior est, & flore melius exiit, spissaque, & albidas uvas, ac tumidioris acini gerit, gracili arvo non deficiat. Atque ideo inter uberrimas uvas numeratur.

Aminea lae nana.

Aminea singularis.

Nomentana. Nomentanae vini nobilitate subsequuntur Amineas, saecunditate verō etiam praeveniunt, quippe cum se frequenter impleant. Sed earum quoque feracior est minor, cuius & folium parcius scinditur, & materia non ita rubet, ut Amineis, a quo colore Rubellianae nuncupantur, eademque fecine, quod plus quam caetera fecis afferunt. Id tamen incommodum repensant uvarum multitudine, quas & in iugo, sed & in arbore melius exhibent. Ventos, & imbres valenter suffrunt, & celeriter de florescunt, & ideo citius mitescunt, omnis incommodi patientes, praeter calor, nam quia minuti acini, & durae cutis uvas habent, aestibus contrahuntur. Pingui arvo maximē gaudet, quod ubertatem aliquam natura gracilibus, & exilibus uvis praebere valet, frigidum, ac rosidum solum & caelum commodissimē sustinent Eugenia, dum sunt in Albano colle. nam mutato loco vix nomini respondent suo, nec minus

Eugenia.

Allobrogica.

Apiana.

Bitonica.

Basilica.

Coculubus.

Allobrogica.

Apiana.

Bitonica.

Basilica.

Coculubus.

quas ante retulit, etiam patientia, quippe tuffi-
 bus, imbrésque fortissimè su tinent, & co n nodè
 fluūt, nec deficient macro solo. frigora meliùs quàm
 humores succulent; humores co n nodiùs quàm
 siccitates, nec calidibus tamen contitantur. Vifu-
 la deinde ab his & minor Argitis terræ medio crita-
 te lætantur. nam in pingui nimis viribus luxuriant,
 in macra tenues & vacua fructu veniunt. A nicio-
 res jugo quàm arboribus, sed Argitis etiam in sub-
 limibus fertilis vastis materiis, & uvis exuberat, hu-
 millimis tabulatis aptior. Vifula brevem materiam
 & latum folium exigit, cujus amplitudine fructus
 suos optimè ad versus grandinem fuerit, qui tamen
 nisi primo quoq; tempore maturi legantur, ad ter-
 ram decidunt, humoribus etiam priusquam defluat
 putrescunt. Sunt & Helvæ, quas nonnulli Varias
 appellant, neque purpureæ, neque nigre, ab helvo
 (nisi fallor) colore vocitæ, melior est nigrior abun-
 dantiâ vini, sed hæc sapore pretiosior, color ac no-
 rum in neutra conspicitur æqualis, utraque candidi
 multi alternè vice annorum plus, aut minus affertur,
 meliùs arborem, sed & jugum commodè vestiunt,
 mediocri quoque solo læcundæ, sicut Pretia minor
 & major, sed ea generalitate vini magis commen-
 dantur, & frequentibus materiis florident, & citò
 maturefcunt. Albuclis utilior, ut ait Celsus, in colle
 quàm in campo, in arbore quàm in jugo, in fumina
 arbore quàm in ima, ferax & materia frequentis, &
 uve, nam quæ Greculæ vites sunt, ut Marcoticæ, Tha-
 sia, Pphythæ, Sophortia, sicut habet probabilem gu-
 stum, ita nostris regionibus & raritate uvarû & aci-
 norum exiguitate minis fluunt, Inerticula tamen
 nigra, quam quidam Græci Amethyson appellant,
 potest in secunda quasi tribu esse, quod & bori vini
 est, & innoxia, unde & romen traxit, quod iners ha-
 betur in tentandis nervis, quamvis gustu nō sit he-
 bes. Tertium gradum facit earum Celsus, quæ ser-
 cunditate solâ commendantur, ut tres Helvena-
 tiæ, quarum duæ majores nequaquam minori boni-
 tate, & abundantia nulli pares habentur, earum
 altera, quam Galliarum incolæ Emarcum vocant,
 mediocri vini, & altera quam Longam appel-
 lant, eandemque Avaram fordidi, nec tam lar-
 gi quàm ex numero uvarum, quas prima spes pro-
 mittit. Minima & optima è tribus facillimè folio
 dignoscitur, nam rotundissimum omnium id gerit,
 atque est laudabilis, quod siccitates maximè perfert,
 quod frigora sustinet, dum tamen sine imbribus sit,
 quod nonnullis locis etiam vinum ejus in vetusta-
 tem diffunditur, quod scipud sola acerrimum quoq;
 solum fertilitate sua commendat. Ac Spionia dapsilis
 musto, & amplitudine magis uvarum, quàm nume-
 ro fertis, ut Oleaginea, ut Murgentina, eadem qua
 Pompeiana, ut Numisiana, ut Venucula eadèmq;
 Scrpula, atque Sticula, ut nigra Fregellana, ut Meri-
 ca, ut Retica, ut omnium, quas cognovimus copio-
 sissima Arcelaca major, à multis Argitis falsò exili-
 mata. Nam hæc nuper mihi cognitæ, Pergulanam
 dico, & Irtiolam, Ferreolamque non facillè asseve-
 rem quo gradu habendæ sint, quod & si satis læ-
 cundæ scio, nondum tamen de bonitate viri, quod
 afferit, & judicare scio, ut am etiam præcoquem Vi-
 tem ante hoc tempus incognitam græcæ consuetu-
 dine Dracontion vocitæ comperimus, quæ læcun-
 ditate jucunditate vè Arcelate Basilicæque & Bithu-
 ricæ comparari possit, generalitate vini Amiricæ.
 Multa præterea sunt genera Vitium, quarum nec
 numerum, nec appellatio es cum certa fide referre
 possumus. Neque enim ut ait Poëta, numero com-
 prehendere refert,

Quem qui sive velit Libræi velit æquæ ris idem
 Discere quàm multæ Zephyro vententur harenæ.
 Quippe universæ regiones, regionumque penè sin-

gula partes habent propria Vitium genera, quæ
 consuetudine sua nominant, quædam etiam in stirpes
 cu n locis vocabula mutaverunt, quædam in propter
 mutationes locorum etiam à qualitate sua discesse-
 runt, ita ut dignosci non possint. Quare prudentis
 magistri est, studioso ejusmodi nomenclationis
 aucupio, quo potiri nequeant, non demorari.
 Plinium igitur consulamus naturæ miraculum, Genera ex
 de Vitium natura & quibus modis ferant. Vites ju-
 re apud præcos magnitudine quoque inter arbores
 numerabantur. Iovis simulacrum in urbe Populo-
 nia ex una [Vite] conspicimus, totæ vis in corruptum.
 Item Massilia pateram; Metaponti templum Ino-
 nis viginti columnis stetit. Etiam nunc scalis ste-
 tum Ephesæ Dianæ scanditur [ex] Vite una Cy-
 pria, ut ferunt, quoniam ibi ad præcipuum amplitu-
 dinem exeunt. Nec est ligno ulli æternior natura
 [materia verè]. Verùm ista ex silvestribus facta credi-
 derim, quando hæc Vites tonsurâ annuâ coëscen-
 unt, & vis earum omnis evocatur in palmites, aut
 deprimitur in propagines, succicque tantum gratia
 his pluribus modis ad cæli mores, solique ingenia.
 In Campano agro populis fortè legendum Opulis
 rubunt; maritæque complexæ, atque per ramos
 earum procacibus brachiis geniculato cursu scan-
 dentes, cacumina æquant, in tantum sublimes, ut
 vindemiator aut rotatus rogum ac tumulum excipiat
 [dum ad putandum vineam conducitur, patitur, si fortè
 casu perca, & rogum ac sepulchrum sibi fieri impendio auo-
 rantia]. Nullo sine crescent, dividique aut potiùs a-
 velli nequeunt. Villas & domos ambitur singularum
 palmitibus, ac sequacibus loris quoque, memoria
 dignum inter prima Valerianus quoque Cornelius
 exillimavit. Vna Vitis Roma in Livia portibus sub-
 diales in ambulationes umbrosis pergulis [operculis]
 opacat, eadem duodenis multi amphoris læcunda.
 Ulmos quidem ubique exsuperant. Miratùmque al-
 titudinem earum Aricie ferunt legatum regis Pyr-
 rhi Cineam facitè luisse in austeriorem guttùm vi-
 ni, meritò matrem ejus pendere in tam alta cruce.
 Rumbotinus vocatur, & alio nomine Populus [upu-
 lus Dalech.] arbor Italia Padum transfecisset, cujus
 tabulata in orbem patula replent, puroque produ-
 cto [emerito palmitè, multo annis durato. Sic vocant à
 suam scortice & aspero qualis est Draconum curis, vel
 à longitudine anguineæ, scil.] Dracone in palmæ
 ejus, inde in subreptos ramorum digitos flagella di-
 spargunt. Eadem modicè hominis altitudine ad-
 miniculatè sudibus horrent [hærent alijs] vineamque
 faciunt: & alia improbo reptam, pampinorūmq;
 superfluitate perita [superst a peculauria] domini
 amplo discursu atria media complentes [hæ sunt tu-
 gate & e. mptuata Vites] Tot differentias vel sola plena
 Italia recipit. Stant provinciatarum aliquarum per se
 Vites sine ullo pedamento, artus suos in se colligen-
 tes, & brevitate crassitudinem patientes [brevitæ-
 tem crassitudine patientes, Dalech.] Vtant hoc aliubi
 verti, ut in Africa & in Narbonensis provincia par-
 tibus. Exerescere ultra suos [senes] pollices prohibi-
 ta, sempèrque pallinatis [putatis Dal.] similes [nam
 et in vinea pastinatur, sicut a si in adminiculis sarmen-
 tavitores huius iacere patiuntur, quod ad putat a suis rur-
 sem pedamentis alligent] herbarum modo vagantur
 per arva, ac succum terra passim uvis bibunt, quæ ob
 id magnitudinem infantium puerorum in interiore
 Africa parte exuperant. Vva non aliubi gratior
 [crassiore Turr.] collo, ut inde possit inveniri no-
 men [a dura acinis] duracina. Namque genera ma-
 gnitudine, colore, saporibus, acinis, innumera, e-
 tiamnum multiplicantur vino. Hæc purpureo lucent
 colore, illic fulgent, roseo, nitentque viridi. Candi-
 cans enim nigerque vulgares. Tument verò mam-
 matum modo Bumasli. Pralongis Dactyli porti-
 gunu.

Vifula Ar-
gita minor.

Helvola, si-
ve Variæ.

Albuclis.

Greculæ.

Amethyson.

Helvenatis
tres.

Emarcum.

Longa,
Avara.

Vites da-
psilis musto.

Pergulana.
Irtiola.
Ferreola.

Dracontion.

Vitium nu-
merus &
appellatio-
nes incerta.

Genera ex
Plinio.
Arbor Li-
gas Vitis
diuturnæ.
1. 14.

Vitis syl-
derim.

Populis nu-
buntur.

Sublimi-
tas.

Amplissima
Vites.

Romana
Vitis.

Ulmos exu-
perant.
L. 14.

Drao.

Vitis sine
pedamento.

Crassiore
Turr.

Crassiore
Turr.

Bumasli.
gunu.

guntur acinis. Est & illa natura lasciuia, ut prægrandibus adhæreant parui, mites, & leuitate certantes: Leptoragas has vocant. Durant alix per hiemem, pensili concameratæ nodo [pensiles, congeminate nodis, Dal. pensili conglomeratæ nodis, ver.] Alie in sua tantam continentur anima [horum conditura generum meminit Caro & Varr.] ollis fistilibus, & in super dolis incluse, stipatæ vineæ circumfundantibus.

Fabriles. Alis gratiam, qui & uinis, fumus affert [Fabriles vocat Aurelianus] fabrilis, iisque gloriam præcipuam in fornacibus Africa Tiberij Cæsaris autoritas fecit. Ante cum Rharicis prior mensa erat, & uuis Veronenensium agro. Quin & patientia nomen acinis datur passis [salitur Plin. Passus vocamus, quod ad solem expantantur] Conduuntur & multo uua, ipseque uino suo inebiantur. Alie decoctæ in musto dulcescunt: alie uero sobolem novam in matre ipsa expectant translucente vitro, additque acinis eandem, quam in dolis, a niphorsive duratricem illam firmitatem auferitas picis in fusa pediculo: jam inventa Vitis [Allobrogica] per se in uino picem respiciens, Viennensem agrum nobilitans, Arverno, Sequanorque & Heluico generibus non pridem illustrata. Atque hæc Virgilij Vitis arate incognita, à cuius obitu xca guntur anni. Quid, quod inferte castris summam rerum imperitumque continent? Centurionum in manu Vitis, & opimo præmio tardos ordines ad lentas perducit aquilas atque etiam in desertis pœnam ipsam honorat. Nec non vineæ oppugnationum dedere rationem. Nam in medicaminibus ad eam magnum obtinent locum, ut per se uino ipso remedia sint.

Genera Vitium numero comprehendi posse unus ex illiuit Democritus, cuncta sibi Græcia cognita professus. Cæteri innumera atque infinita esse prodiderunt, quod uerius apparebit esse ex uinis. Sed omnia dicentur, sed maxime insignia: quippe que totidem penè sunt, quot agri. Quamobrem celeberrimas Vitium, aut quibus est aliqua proprietate miraculum, ostendisse satis erit. Principatus datur Amineis, propter firmitatem, sentioque proficentem uini ejus ubique vitam. Quinque earum generum ex iis Germana minor acino melior de florescit, imbres, tempestatesque tolerat; non item major, sed in arbore, quam in jugo, minus obnoxia. Gemellarum, quibus hoc nomen uua semper geminæ dedere, a sperimus fapor, sed vires præcipua. Ex iis minor Austro læditur, cæteris uentis altur, ut in Vesuui monte, Surrentinisque collibus. In reliquis Italiae partibus non nisi arbori accomodata. Quintum generis Lanata, ne Seres miremur, aut Indo, ad eod lanugo eam uelut. Prima ex Amineis maturefcit, occylimæque putrescit. Proxima dignitas Nomentanis rubente materia: quapropter quidam Rubellas [Rubellus Colum.] appellare vineas. Ex minus ferules uino, acinis & face nimia, contra pruinas fortissimæ, siccitate magis, quam imbre, æstu quam algore vexantur. Quamobrem in frigidis humidisque principatum obtinent. Fertilior, quæ minor acino, & folio scilla minus. Apianis apes dedere cognomen, præcipue earum avidæ. Ex his duo genera [maior & minor, uel candidans & nigra] lanugine & ipsa pubescunt. Distant, quod altera celeritè maturefcit, quanquam & altera properante. Situs frigidus non respunt, & tamen nulla celeritè imbre putrescunt [nulla celeritè maturefcit imbre uina M.] Vina primo dulcia, auteritate annis accipiunt, & rubra fiunt. Nulla magis uita gaudet. Et hæc uis potissima nobilitas datur peculiaribus atque uerna culis Italiae. Cætera aduenere Chio, Thasoe. Gracula non infertor Amineis bonitate, præterea acino: & uua tam parua, ut nisi pinguissimo solo colere non potest [colere non possit M. colere non possit, uer. colere, L. Bauh.] Eugeniæ Tauromitani

Leptoragas
Durant
per hiemem

Fabriles.

Rhætica
Veronenst
Pass.

Allobrogica
picem
respiens.

Germana
minor
maior.

Amineis
quinque.

Germana
minor
maior.

Amineis
lanata.

Nomentanis.

Apianis
duo.

Gracula.

Eugeniæ.

colles cum generositatis cognomine, misere Albano tantum agro: quonia in transflata statim mutatur. Namque est aliquibus tantus locorum a nor, ut omnem in his gloriam suam relinquunt, nec uisum transant. Quod & in Rhætica, Allobrogicaque, quàm supra Picatam appellauimus, uenit, domi nobilibus, nec agnoscentis alibi. Fæcundæ tamen, bonitatis uice copiam præstant. Eugeniæ feruentibus locis, Rhætica temperatis, Allobrogica frigidis, gelu maturefcens, & colore nigra. Ex his, quas adhuc diximus, sed etiam è nigris uina uetustate in album colorem transeunt. Reliquæ ignobiles. Aliquando tamen cæli aut soli opera non fallunt uetustatem, sicuti Feceniæ [supra Rubellæ sic dicta, quod fecu plus asferat, quàm cætera] & cum ca florens Bitutica, acino rarior, nunquam floris obnoxij [tempestatibus obnoxia, quoniam filia antecedit, Dal.] quoniam antecedit, uentisque & imbribus resistunt, meliores tamen argentibus locis, quam calidis; humidis, quam siccis. Vix illa magis tam densò uuarum partu, impatientis uariantis cæli, sed contra tenorem tun-algoris æstusque constans. Quæ minor est eo genere, melior. In eligendo solo morosa, pingui putrescit, gracili omnino non prouenit. Mediam temperiem delicatè querit, ob hoc Sabinis collibus familiaris. Uua ejus indecora uisui, sapore jucunda, nisi matura protinus rapiatur, etiam non putrescens cadit. Contra grandines ea tuetur soliorum amplitudine atque duritia. Insignes jam colore inter purpureas nigraque medio Heluicæ, scitius uarietati, & ob id Variatæ à quibusdam appellatæ. Præfertur in his nigrior: utraque alternis annis fertilis: sed melior uino, cum parior. Et Præciæ duo genera magnitudine acini discernuntur, quibus materies plurima, uaque ollis utilissima, solum Apio simile. Balsamicam [Balicham CH.] Dyrthachini celebrant, Hispani Coccolobin [Coccolobus Colum.] uocant. Rarior uua, æstu aëstrosque tolerat: capiti inimica, copia larga. Hispani duo genera ejus faciunt: unum oblongo acino, alterum rotundo: nouissimas uindemiunt. Quo dulcior Coccolobis [Coccolobus CH.] hoc melior. Sed & austeritate transit in dulcem uetustate: & quæ dulcis fuit, in austeritate: tuncque Albano uino emulatur. Tædunt uelice uicini utilissimum ex his potum. Albulicis fumis arboribus fertilior est, uisulamis. Quamobrem circa eadem satæ diuersitate nature locupletant. Interculam è nigris appellatæ, justiss Sobriam [Latinis uel can. quod in Sobria, noxia sit & iners tenentis ueris Colum] diuersitate ueterato præcipue commendabilem uino, sed uiribus innoxiam. Siquidem temulentiam sola non facit [ideo Græci Amethysion uocant, Colum.] Fertilitas commendat cæteras, principemque Heluenacam. Duo ejus genera: maior, quam quidam Longan: minor quam Arcam [Arcum M. Emarcum Colum.] appellant, non tam secundam, sed gratiore hauili. Discernitur folio circumpato. Verum utraque gracilis. Furcas subdere his necessarium: alioqui ubertatem suam non tolerant. Maritimo afflatu gaudent, rosico odore [r sida odere, Dal.] Nulla Vitium minus Italiani amat: uua rara parua putrescens in ea: uino quoque, quod gerat uir, æstatem non exuperans. Nec alia macro solo familiarior. Græcinus, qui alioqui Correllum Celsum transcripsit, arbitrat non naturam ejus repugnare Italix, sed culturam, auidè palmites, euocantium. Ob id fertilitatem suam absumi, si non præpunguis soli ubertate læcescentem fistineat. Cui bunculani negant, magra dote, si uerum est, aliqua in Vite celo non esse jus. Æstum fert Spionia, quam quidam Spieam uo. ar. autumant, que & imbribus pinguefcit. Quoniam nebulis uia altur, ob id Raver nati agro peculiaris. Venticulam [Venticulam Colum] inter optimè de florescens, & ollis

Rhætica
Allobrogica
Picata.

Feceniæ seu
Rubellæ.
Biturica
florens.

Biturica
minor.

Mediola.
Variatæ.

Præciæ duo.

Folio Apio.
Balsamica.
Coccolobis.

Albulicis.

Visulamis.

Inertulam.

Sobria.

Heluenaca
duplex, longior
& Arc.

Græcinus
notatur.

Venticula.
ollis

Sircula. ollis apūssimam, Campani malunt Sirculam vocare, alij Staculā, Tarracina Numisānā, nullas vires proprias habentem, sed totam perinde ac solum valeat. Surrentinis tamen efficacissima testis Vesuvio tenuis. Ibi enim Murgentina & Sicilia potissima, quam Pompeianam alij vocant, Latio demum feracem: Pompeiana sicut Horconia [*feratissimam Areliacam maiorem Colum. vocat*] in Campania, tantum vilitatis cibariæ, sed ubertate præcipua. Tolerat & annos Mærica, contra omne fœdus hærmisima, nigro acino, vinis venter rubescentibus. Et hæcenus publica, sunt genera: cætera regionum, locorumque, aut ex his inter se in situ mista. Siquidem Tulcis peculiaris est Tudernis, atque etiam ejus nominis Florentia. Est opima Aretio Talpana & Etesiacæ & Confemina Talpana nigra candidi facit mustum [*Talpana dicitur à colore Talpa. Etesiacæ fallax [qua Etesis variat] quæ quod plus tulit, eò laudabilius fundit: mirumque sæcunditate cessat [miraque sæcunditate non cessat, Dal.]* Confemina [*Confemina cognomen hic proprium est. alioquin Confeminalis Vitis Colum. diversis vitium generibus confusa*] nigra, vino minimè durare, uva maximè; post xv dies, quam ulla alia metitur, fertilis, sed cibaria. Hujus folia, sicut Labruse, ac prius quàm decidant, sanguineo colore mutantur. Evenit hoc etiam quibusdam aliis, pessimi generis argumeto. Iruola Vimbriæ, Mevanatiquæ & Piceno agro peculiaris est, Amiter nino pumula. Iisdem Bannanica fallax est: vixit tamen eam. Municipij uvam Pompeij nomine [*Oppidum Neapoli vicinum*] appellant, quamvis Clutinis copiosorem. Municipij & Tiburtas appellavere, quamvis Oleaginanæ nuper inventum à similitudine Olivæ. Novissima hæc uvarum ad hoc tempus reperta est. Vinaciolum soli novère Sabini & Laurenti. Nam Gauranas scio à Falerno agro translatas vocari Falernas, celeritè ubique degenerantes. Nec non Tarentinum genus aliqui fecère, prædulci uva. Capniæ & Bucconiatis, & Tartupia, in Thurinis collibus non ante demetuntur, quàm gelaverit. Pharia gaudet Pise, Mutina Prusina, nigro acino, intra quadriennium albescente vino. Mirum ubique cum sole circumagi uvam, quæ ob id Streptos vocatur. Et in Italia Gallicam placere, trans Alpes verò Picenam. Dixit Virgilius Thalias & Mærotidas, & Lageas, complurèque externas, quæ non reperuntur in Italia. Sed sunt etiam in insigne uva, non vino, Ambrosiaca, Duracina, sine ulla vasis in vite servabilis, tanta est contra frigora, ætus, tempestatèque firmitas. Nec Orthampelos indiget arbore, aut palis, ipsa se sustinens; non item Dactylites digitali gracilitate. Columbinæ acinosissimæ [*racemijssima Iam.*] & magis purpureæ, cognominæ Bimammia, quando non racemos, sed uvas alias gerunt. Item Tripedanea, cui nomen à mensura est. Item Sarpula passo acino. Et Rhetica in maritimis Alpibus appellata, dissimilis laudatè illi. Namque hæc brevis, conferta acino, degener vino, sed cute omnium tenuissima, nucleo, quem Chium [*quod gygartum Turmerus vocat*] vocant, uno ac minimo, acinum prægrandem unum alterumve habens. Est & nigra Amminea, cui Syriacæ nomen imponunt. Item Hispana ignobilium probatissima. In pergulis verò ferunt Escaria appellata, Ederæ acinis [*duracinis M. & CH.*] albæ nigraeque. Et Bumalti totidem coloribus. At nondum dicitæ Agra & Rhodia, & Vncialis, velut à pondere acini. Item Pucina [*picina à picis colore*] omnium nigertima: & coronario nature lulu Stephanitis, acinos foliis intercurfantibus: & quæ forenses vocantur, celeres proventus, vendibiles aspectu, portatu faciles. Contra damnantur etiam vitium cinerea & rabufula. & asinifca: minùs ta-

men, caudas vulpium imitata, Alopecis. Alexandrina [*Idea Theophr.*] appellatur Vitis circa Phalacram brevis, ramis cubitalibus, acino nigro Fabæ magnitudine, nucleo molli & minimo, obliquis racemis prædulcibus, folio parvo & rotundo, sine divisuris. Septem his annis in Narbonensis provinciæ [*arvo*] Alba Elvia inventa est, Vitis uno die deflorescens: ob id tutissima. Narbonica vocant, quam nunc tota Provincia conferit.

Doctiss. Dalechampius apud Plinij vult Rubotinum Columellæ non esse arboris genus, sed arbuti gallici, vulgò de *Haurins* appellati, arboribus lehumilioribus & minimè frondosis confiti, eaque re ab arbutto Italico differentis. Duracinam Vitem, cuius uva magnitudinem infantum puerorum in inferiore Africa parte exuperant, vulgò *Piquepaille*, Monspefulanis verò *Murraquin*, à Martoch Africa civitate denominatam. An hanc intelligit Lugd. cum ait. Sunt in regno Merin oppidi Syriæ nobilissima magnitudinis tum acini, tum racemi, quos ipsi lingua patriæ privatim vocant Alzibib: nam generi commune est nomen Haneb, nos à succo uvam. Illius vocis imitatione suas grandiores uvas corrupto vocabulo Provinciales dicunt *Augibim*. Helvicam, per se in vino picem respicientem, ab Helvis, Gallie Narbonensis populis, hodie *Vivareæ*; Ammineam, *Vivareæ Gros plant.* Quidam, inquit, scribunt cum duplici m, syllaba penultima correpta. Aufonius, *Sicut qui Chium nūscet & Ammineam*.

Alij cum simplici m, penultima producta. Serenus.

Succo Amineæ Vitis cum pane medetur. Virg.

Sunt & Amineæ Vitis fortissima Vitis.

Vitis Amineæ quintum genus, cuius folia lanugine vestiuntur, ait Marcellum Caniculatam vocare, veluti lanugine canescentem & hirtam: Apianam autem tradit esse *Muscata*, cuius uva è vinea longè suaviores sint, quàm pergulis, arbutto, jugo. Nos Moschatehnam observavimus duplicem in Burgundia, rubram & albam, & hanc rursus Stugardias; Graculam non inferiorem Amineis bonitate, *Raisins de Corvinthe*; Rheticam, *de la Val d'Alina*; Allobrogicam, quam Picatam Plin. quoque nominat, Viennensem, *qui sent la violente*; Bituricam, *le plant d'Orleans*; Bituricam minore, Sabinis collibus familiarem, *des Gde metz.* Lugdunensibus vocatam; Vitulam eam dictam fuisse ostendit Columella. Helvolam, sive ut ipse vocat Elveolam, olim fuisse dictam, Oleram & Eleram, & inde cognominari Elvelam, Oleram minutam, & Elveolam Vitium heribacæ coloris, Titinium appellare, *Lentis calido*, Elvelam, Rapulam, & *Lentis calid.* Runicis Scalignerum: Cocolibin esse eam Vitium ex do.

qua vinum Monspefulanis *Piquardant*, aliis *Muscata* *Piquardant*, de *Languedoc*, dictum exprimat. Forenses celerem proveniunt, uva aspectu vendibilem, ac portatu facilem, rusticis Lugdunensibus servato nomine *des Foirars*: Rabufulam, eandem facit cum Ravuscula, colore ad ravum inclinante: Asinifcam ab asini colore denominat: Quæ Plinio Alopecis dicitur, is eam vulgò *Raisins barbus* nuncupari tradit: ceu *Albam Elviam* in Narbonensis provinciæ arvo inventam. *Aubenas de Vivareæ.*

Tragus ne nihil fecisse videatur, paucis vulgarissimam Vitium genera ipsi quidem cognita obiter ita recenset. In tractu Rheni plerumque eæ Vites plantantur, maximè calidioribus locis, quas *Muscataleser & Traminer* [*Muscataleser & Traminer*] à loco Traminij dicto, vulgò vocant, hæc posterioris generis Rhetice superiori & Alfatice familiare quoque lit. Præterea & eas quoque, quas vocant Germani *Gross vnd Heu*, Francicis [*Francias*] oder *Eedel vnd lauter Trauben* h. e. Vitem nobilem. Ad Mosellam, Rhenum, & in agro Vormatiensij Vites procreantur *Bisling* appellatæ. Quæ verò uvas *Kynsche* præcubunt.

Alexandrina.

Veterum Vites non sunt accommodantur.

Duracina Vitis.

Piquepaille Martoch.

Augibim.

Helvicam.

Vivareæ.

Vivareæ Gros plant.

Aufonius.

Sicut qui Chium nūscet & Ammineam.

Sunt & Amineæ Vitis fortissima Vitis.

Lanugine vestitur.

Muscata.

Raisins de Corvinthe.

Di la Val d'Alina.

qui sent la violente.

le plant d'Orleans.

Bituricam minore.

des Gde metz.

Lugdunensibus.

vitulam eam dictam fuisse ostendit Columella.

Helvolam, sive ut ipse vocat Elveolam.

olim fuisse dictam, Oleram & Eleram.

inde cognominari Elvelam, Oleram minutam, & Elveolam.

Vitium heribacæ coloris, Titinium appellare.

Lentis calido, Elvelam, Rapulam, & Lentis calid.

Runicis Scalignerum: Cocolibin esse eam Vitium ex do.

qua vinum Monspefulanis Piquardant, aliis Muscata Piquardant, de Languedoc, dictum exprimat.

Forenses celerem proveniunt, uva aspectu vendibilem, ac portatu facilem, rusticis Lugdunensibus servato nomine des Foirars.

Rabufulam, eandem facit cum Ravuscula, colore ad ravum inclinante: Asinifcam ab asini colore denominat: Quæ Plinio Alopecis dicitur, is eam vulgò Raisins barbus nuncupari tradit: ceu Albam Elviam in Narbonensis provinciæ arvo inventam. Aubenas de Vivareæ.

Tragus ne nihil fecisse videatur, paucis vulgarissimam Vitium genera ipsi quidem cognita obiter ita recenset. In tractu Rheni plerumque eæ Vites plantantur, maximè calidioribus locis, quas Muscataleser & Traminer à loco Traminij dicto, vulgò vocant, hæc posterioris generis Rhetice superiori & Alfatice familiare quoque lit. Præterea & eas quoque, quas vocant Germani Gross vnd Heu, Francicis [Francias] oder Edel vnd lauter Trauben h. e. Vitem nobilem. Ad Mosellam, Rhenum, & in agro Vormatiensij Vites procreantur Bisling appellatæ. Quæ verò uvas Kynsche præcubunt.

Germanice
Len.
Dutsch und
Autsch
trauben.

Genesiffel
Bartisch

Grünswarz
Grünfian
dich.
Schwarz
trauben

Vitis septies
in anno fru-
ctum ferens

Tab. nov. 11.

c. 8. diff.

trauben vocatas proferunt Vites, ea in omnibus propè regionibus vulgatissimè habentur. Est & aliud Vitis genus quod uvas facit, Dutsch und Autsch trauben nominatas, & in môtanis Ladoix oppido imperialis nascitur. Ità & in agro qui & Neapoli oppido Palatinus celebri adjacet, Vitis genus habetur, quod Genesiffel incolæ dicunt. Aliud deinde Vitis genus Barthisch vocatù propè Turckheimium & V Vacheheimium provenit. Prope V Veisfenburgum denique (quis enim reliquarum provinciarum, Austriæ inquam & Franconia &c. Viti-um innumera penè genera persequi queat) Vites plantantur, quæ uvas Frûschwarz, oder Kleber appellatas, neque non quæ Grünfranchisch dictas, & quæ Schwarzlenperstrauben nominatas procreant. Atque hæc Tragus.

Bellon. observavit in Thraciæ Callipoli in Augustinianorum monasterio Vitem fructu suo semper onulata, quam ipsi Monachi affirmabant septies in anno fructum, eumque maturum præbere.

Tab. ut plus quàm ceteri supivisse ducatur, præter Vitem vulgarem, alias duas nominetenus duntaxat icone exprimit, eas non describens, nec demòstrans ubi terrarum observari. Ipsimet incognitas fuisse satis indicat quæ scribit. Folium & uva, inquit, vulgari non multùm dissimilia: sapor autem ei constabit, qui has uvas noverit. Quia igitur sapor ei nõ cõstitit, certè eas non noverit. Si sapor constituit, cur non paucis eum expressit? Si folium & uvam vidit, cur differentiam non annotavit? quid opus erat inania pro necessariis & proficuis effundere verba. Inferitur autem prima, Vitis duracina major: altera, Vitis chenopodia. Addit & tertiam, Vvam barbaram.

C. B. pin. Vitem dividit in sativã & sylvestrem. Sativa alia major est, inquit, cu jus plurimæ species: alia minor. Majoris uvæ & colore & magnitudine differunt: alterius namque acini, aut virides albicantès, vel fulvi, aut saturatorubore nigricant, aut carulei, aut subrubentis coloris: alia acinis oblongis magnitudine & forma prunorum, quæ Pergulana dici potest; alia rotundis, aut vel magnis, vel parvis; alia acinis sunt frequentioribus alia rarioribus. Sunt quæ granis aut vineaceis carent, in terdum unicum vel alterum granum habent: Rariàs uva barbarata reperitur. Minor verd est acinis nigris, rariissimè albidis, aut fulvis, nucleo minimo ac molli. Sapore etiam differunt, ut dulci, acerbo, muscato, quæ Vitis Apiana Plinio.

In foliis quoque differentia, alia majora profundius incisã, ut Italica foliis ad pediculum usque in lacinias acutas divisis: alia minor sunt: Sic alia tenuiora, alia crassiora, alia viridia, alia rubentia, alia maculata: alia ad tactum duriora, molliora, alia lævia, alia denique subhirsuta.

In India insula Baly, Vites bis in anno uvas promunt: Linc. par. 3. Ind. or. cap. 40. & in insulis Azores, super mæras rupes crescunt, quæ radices in medios hiatus seu saxorum rimas immittunt, & quibus succum sibi necessarium præliciunt. Et in istis petras recessibus, Vites multò lævius se proferunt, quàm quæ in planitie sunt, quæ ad frugem pervenire nequeunt. Idem cap. 6. Sed in Hispaniola plantatæ exiguas uvas fundunt, nec admodum grandi saporis & serè Februarii & Martii vindemiarum solent, auctore Benzone, sive Americæ hb. 4. cult. & ut Iosephus Acofta 3. c. 22. & 4. c. 32. nec in insulis, nec in firma terra uvæ aut vinum nascitur. In nova Hispania, vineæ uvas proferunt, sed nunquam probè maturefcunt, ut vinum confici possit, nisi in Peru & Chile approbium vinum nascitur: nam jam vites colere didicere, & vineæ plerumque in convallibus Peruanis nascuntur, juxta quas fossas ad aquam colligendam excavant, quâ vites subinde irrigant.

VITIS CORYNTHIACA SIVE Apyrina.

Vitium genera pluribus persequi, licet plerique supervacaneum ducant, contenti Vitem in cultivam & silvestrem distinxisse, at athen Dodo-næus cultivarum plures esse meritò affirmat. Eas autem in majores & minorem dividit. Minor, sive parva, inquit, Idæa modò cognominatur, de qua Theophr. lib. 3. hæc scribit. Nascitur Vitis in ea parte Idæ, quam Phalacras vocant. Est autem fructicola, fructuosa alibi) virgulis parvis, & ramulis cubitalibus penè exporrigitur, quibus acini laterales, nigri adhaerent, magnitudine Fabæ, dulces, qui vineaceis simile quid (γρηγορῶν) continet. Palladio dicitur Vitis sine vva sine granis. Plinius hanc Alexandrinam facit, isdem quibus Theophr. verbis ipsam describens. Dioscorides silvestris Vitis alteram statuit speciem. Nos maluimus eam inter cultivas retinere. In officinis hujus exigui passii acini, Passularum de Corintho nomine veniunt. Idem Dod. frum. Passulas Corinthiacas vocat. Cap. verd de Vacciniis ait: Nascitur Vitis quam modo Idæam cognominant, non in altissimis ac nivosis Idæ tractibus (ut Gesn. interpretari studuit) sed circa Idam provenit: Idam quidem montem non Cretæ, sed Troadis in Asia minore, quæ à Ptolomæo Geographiæ libro, Alexandri Troas appellatur, unde & non temerè à Plinio Vitis Alexandrina dicta est non secus quàm illic enata Alexandrina Laurus, à Theophr. nominatur. Huic autem Viti similes apparent, quas Philostratus in vita Apollonij apud Mæones & Lydos (haud procul à Troade sitos) nasci refert, cum his Vitis ubi illas comparans, quæ apud Indos ultra Caucasum gi-gnuntur. Vites autem, ait, parvæ admodum, quales apud Mæones Lydosque ibi nascuntur: vinum tamen ex illis expressum gustatu ac ore jucundissimum. Traditur autem hæc Vitis, juxta Idam natam, fructibus [parvis] instar esse virgulis [parvis] parvis: tamen verò ad cubitum extensis, circa quos acini obliqui [nigri] nigri, magnitudine Fabæ, dulces, intus habentes vinaceum quoddam [molle] molle: folium autem hujus rotundum, indivisum, ac parvum. Describitur hæc à Plinio hb. 14. cap. 3. isdem serè verbis, Alexandrina appellatur, inquit, Vitis juxta Phalacram brevius, ramis cubitalibus, acino nigro, Fabæ magnitudine, nucleo molli & minimo, obliquis racemis prædulcibus, folio parvo ac rotundo sine divisuris. In quibus verbis, pro eo quod Theophr. habet, [parvis] parvis, Plinius non acinos, sed racemos obliquos legit: quod Viti magis convenit. Cum descriptione autem hæc fruticulum Germaniæ Officinis Myrtillum dictum, haudquaquam convenire satis manifestum.

De hac etiam Lob. agit Corinthia sive Apyrina uva quæ vocatur, nomen patrium testata, effigie nihil planè differt à communi: Sed algidioris est temperans, gracilitate tantùm racemorum, & evilitate acinorum superatur, qui pigritas carent, surtque à [parvis] parvis, ut quædam mala Granata arillis vacua. Botri enim, sive racemuli ipsi, conflantur acinulis, piperina aut sambucina grana quantibus. Ad topiariorum pergulas & fornice deducuntur hodie in Italiis & Pedemontanis hortis vitis hujus.

Dalechampio apud Plinium, qui ejusdem Græculum esse autumat, dicitur Raisins de Corinthe. Lugd. Vva à [parvis] parvis, Corinthia vulgò vocata. An eadem uvæ Maderentes sine granis?

C. B. pin. Vitis 3. sive Vvæ passæ Indiciæ gigantis carentes: Vva sine vineaceis seu apyrenos, ad Clusur. post. Eidem. Vitis 4. sive Vvæ passæ minores, vel Passulæ Corinthiacæ. Passulæ, Trag. Vvæ passæ mi-

Vitis summa genera

Vitis Idæa Theophr.

Vitis sine granis Alexandrina

Passula de Corinthe

Theophr. Scribit illustratur.

Vitis Corinthia Apyrina

Gracula Plinij

Vitis Maderentes sine granis

lae, sed minores, acinis sine arillis, Montbelgardi etiam habentur in horto E. C. VV. Vite Bizuntio ex horto Dominorum de Granuelle illuc translata.

Eidem C. Eaubino Phyt. Vva passa maior *Biquas* & Vitis 2. dicitur.

VITIS FOLIO APIL



Peculiaris folii forma hanc vitem facile ab aliis distinguit, quippe non tantum plerumque minus virgineis vulgaribus, sed & profundè dissectum, ex pluribus quodammodo foliis apparatum videri possit, singulis segmentis in Apil foliorum formam subdivisis, ita teniter, vt plurimè etiam viticibus, quibus

obtuli, non agnoscerentur pro foliis vitium, rarè sanè diuisura. *Botris* fert albos, donatos *acinis* satis magnis, non inultum compactis, sed paulò rarioribus, valde dulcibus & sapidis: similes sunt vuz hz *Botris vuz*, quam Burgundi *Raisin blanc* aut *sendans*, Germ. *Wirttrub. Gur Edel Reben* vocant, citò maturefcunt, & vt illa cibo expectantur.

Hoc pulchrum vitis genus obseruavi Vesuntii & nusquam alibi, in horto insignis Medici Turnonii, quod delatum dicebant ex Hungaria. Sarculi inde delati apud nos feliciter prouenerunt.

Quo referendum hoc genus vitis nondum animaduertit, nisi comprehendatur sub Vitibus à Plinio dictis *Pretia*: quibus solum Apio simile. Scio Guill. Penam & Lobelium pro ea exhibere Vuam crispam, quam Grossulariam vocant: verùm non mihi fit verisimile Plinium fruticem spinosum, cui nihil simile cum vitibus, cui non est vva, nec materies plurima, reposituisse inter vites: fortassis quod Plinius dixit duo genera & ollis vtilissima, persuasit illis hunc fruticem Plinium intelligere: verùm ille postea dicit. Veniculum [Vitim] inter optime deflorescentes & ollis appetissimam.

Vva alba dulces, dicta Monb. & Burg. Raisin sendans, ou de l'hospital.

Longi his sunt *Botri*, plurumque ratios acini, valde dulces, citò maturi, albi, folia profundè diuisa, vtrinque viridia, & pellucida. Germani in Ducatu Vvire, has *Gur Edel trauben* vocant, easque ab aliis separant, quia vinum bonum ex iis fit, sed non durabile. In Burgundia integras ex eis plantant vineas.

Vva nobiles alba.

Vvæ, quas Germani & Alati vocant *Edel Trauben*, appellant Vviremb. vitiores Tom. II.

weiss freuschen. Hæ vuz ferunt acinos cute duræ, non magnos, dulces, si bene maturi. Ex his fit *freuschen* vinum illud dulce, in Alatia celebre, *Nangens Rangenæ wein* dictum. In Than aliquando diligenter *wein* perquisit, an ex particulari genere vitis hoc fieret vinum? Verùm comperi locum esse particularem, montem glareolum, qui vites illas fert, quæ nulla ratione differunt in figura, sed tantum variant vuarum ratione: ex enim sunt multò dulciores, & ad tactum viscidæ, bene & citò maturefcunt, quæ in superiore montis parte proueniunt. Eæ autem quæ in vicinis & potissimum inferiori loco producuntur, tardius maturefcunt, minus dulces sunt, & ad tactum non glutinosæ. Ceterùm, quoniam ex his nobilior vinum parari existimant, nolunt quibusdam in locis alias plantare, quamuis minus vini, quàm multæ aliæ reddant: apud nos Montbelgardi parum vitiles, quia tardius maturantur.

Vesontii vocant Vites *Blanc gentil*, quibus vuz acinis rotundis dictis similes: Lignum ferè simile, nisi quòd paulò crassius vbi maturit & rufum. Huius vuz esut meliores, ex quibus etiam inelus fit vinum album, vt *Arbofiacum*. Vesontii in colle *Ragor* dum putantur, triones relinquuntur palmites. Audio in Ducatu Vviremb. abudare, præsertim circa *Maulbrun*. Prope *Eltingam* referunt esse montem eà vite consitum, cuius vinum vocant *Staubwein*. Vuz suspensæ diu durant.

Vva germanica dicta des Alemans, alba.

Nosti vitiores has Vites nostro loco commodas dicunt. *Botris* sat magnis, fatatis, acinis etiam maiusculis, tunicâ duriusculâ, mediocriter dulcibus: foliis subrotundis, angulosis, in tres partes diuisis. Vitiores nostri Germani in Ducatu frequenter excoliac dicunt *Elbe* & *Gur Elbe*: in Alatia autem *Rhein Elbe*, esse duo genera, vnum iam denominatum, alterum *Rauch Elbe*, cui facile decidant folia, quod in nostris Vitibus tollitur & extirpatur.

Vva Lausannenses alba.

Vvæ Montbelgardi dictæ *Lausanois* probantur pro nostra regione. Vitis eius profert folia rotunda ferè, parum profundè partita, vtrinque viridia, vvas dulces, acinos mediocres: Audio vocari in Ducatu Vviremb. *Fiderling*. Solet esse fructifera, vt aiunt, & ex vuis eius fieri vinum laudabile.

Vva alba dicta Melons.

Viti dictæ folia sunt rotunda, angulosa, subtus tomentosa, non profundè laciniata: vuis Lausannensibus similes vuz: acini non magni, dulces, & iis gratiores: sunt enim Lausannensibus paulò acidiores, vt indicant Vitiores, vinumque aiunt minus durabile, neciunt nomen Germanicum. Ex quo Ill. E. C. Montbelgardi excolendas curauit Vites, multa millia fuculorum ex Vitibus ad eundem E. C. vrbum *Grangianam*, & arcem suam *Sohersweil* in monte *Sitam*, sunt plantata.

Vva alba dicta Guaches.

Magnæ vuz, acini crassi, minus dulces, ex quibus multum vini, sed minus laudabile: folia magna in acutos angulos desinentia, subtus hirsuta. Suspicio dictas à *Trago hirsch trauben* & nonnullis *Schweif trauben*.

Vvæ circa Epæ.

Vitis Blanc gentil.

Lucni.

Elbe.

Duplex gè.

nni.

Fiderz ling.

Lucni.

Hirsch trauben. Schweif trauben.

Vitis Pretia Plin. Guill. Lobel. notatur.

Vitis Vire nobilis.

manduodurum abundant his vuis in montibus dictis Champuermot. In hoc genere, vt asserunt vinitores, quadam malæ, ex scil. quibus vix decidunt priusquam maturefcant, vnde etiam vinum earum austerum.

Vua alba, Raisins Brulans, dicta.

Hoc genus vuarum albarum simile est vuis melons, minus dulce, facillè putrescens, ac vix dicitur corruptibile: quippe facillimè siccatur: multas alioqui hoc Vitium genus fert vvas, & fructiferum est: folium eius quinquepartitum, subtus hirsutum. Hoc Vinitores, si viciniore alicuius Vites occurrant ex meliore genere, extirpant.

Vua alba acinis minimis.

Præfentes vix Montbelgarden sibus *chenois* quemadmodum Burgundis quoque dicuntur, vinitoribus VVirtemb. *Bösc hirtchen*. Vitis genus hoc minimis plerumque acinis profert, ita vt vel degenerasse, vel particularis generis esse videri alicui possit. Verum vix, assero, mihi nondum placè constat. Nostri paulatim id extirpant, & meliores sensim in locum propagant.

Vua alba en farin nuncupata. Ger. weyß Klemmer.

Folia Vitis huius quasi farinà aspersa conspiciuntur, alba, albi racemi, dulces. Ex Burgundia bonum hoc genus Vitis deferretur, ac in *Wiltassan* abundat.

Vua acinis se findentibus.

Est in vineis Montbel. potissimum Ill. E. C. genis Vitis, delatum, [ni vinitores fallant] Sturgardiâ, copiosè ferens vvas, cui nomen *malmer*: vuis viridis penè coloris, dulcibus, quibus acini magni, facillè putrescentes. Abundant ad Nicarum circa Canlat & Turques. Frigore facillè corrumpuntur, ac idè in Ducatu VVirtemb. gico ante hyemem eas terrâ obruunt. Nos Montbelgardi neque has, neque alias humi sepelimus.

Vua maxima alba.

Hoc Vitis genus Basileâ curauit deferendum pro horto Ill. E. C. vuis donatum longissimis, acinis etiam magnis, albis, carne firmâ, difficulter putrescente, suspensis diu conseruabilibus. Audio vocari in Ducatu VVirtemb. *groß laimpentraubcn*, vbi tamen non frequentes.

De his hæc fortè scribuntur: Genus Vitium, quod vulgò vocant *groß lein*: omnium maximis vuis, & acinis maximis, quarum vltus tantùm pro culina ad omphacium: vnica siquidem vva interdum reddit Omphacii semi-mensuram, ita vt seps vnicus quandoque reddat Omphacii plusquam 30. mensuras. In pergulis hortorum coli desiderat. An ex his vuis parentur vva passæ maiores, considerandum.

Vua rubella.

Vites ex Alsatiâ & Richenvilla oriundæ, Germ. *Braklemmer* nuncupatæ, Montbelg. *des grises*, vvas ferunt esui valdè gratas & dulces, quibus color rubellus. Sunt maiores & minores. Non copiosè plantantur.

Vua Rhetica.

Vites Rheticas, siue Veltolinas [*Veltliner*] vocant Vinitores nostri delatas ex Sturgar-

dia, vvas gignentis satis magnas, ex albo rubentes, cute tenui. Vincam ex eiusmodi Vitibus circa *Hohenwill* confecti iussit Ill. Comes *Wirtembergicus*.

Vua rubra, Gamé.

EX Burgundia habetur genus Vitis, quod vocant *Gamé rouge*: vvas mittens, sicut & acinos non paruos, ex quibus excipitur copia vini, quâ de re eas Burgundicè quibuldam in locis colere multùm laborant. Verùm Vesuntii non excoluntur, nec permittitur vt vinum ex his in vbera inferatur, quia non durabile.

Vua nigra dicta.

Vitis hæc folio ornatur penè rotundo quadrupartito, sed non profundè, inferna parte non nihil hirsuta. Vinitores vocant in Ducatu *Wirtemb. Schwartz Klemmer* & *Augsst Klemmer*. *Schwarz Klemmer*. Vva huius, quas Montbelgardi vocant *Noirins*, sunt purpureæ, siue rubræ, mediæ cum acinis magnitudinis, dulces. Ex his bona vva parantur, si multum subitè separetur à fratribus. Vesuntii putando ramos, breues relinquuntur, loco potissimum macro & petroso.

Vua atra Traminea cognominata.

Inter vites rubras non vltimum obtinet locum *Traminea*, *Rothschäben* *Wirtemb.* siue *Traminer*, ceu & *Allatus Schwarz Klemmer* dicta, *Montbelg.* verò *summentans rouges*. Eius vva valdè dulcis est, ex qua in Ducatu VVirtemb. Ill. E. C. vinum curat parandum, *Salfemer* dictum.

Vua dicta Vesuntinis Grappenans.

Extollendæ hæc Vites loco declinæ & petroso quòd Solis orientis radii eò perueniant. Ceterùm vuis modò dictis sunt acini maiores, quàm in *Noirins* dictis, dicti illius maturefcunt, lignum quoque crassius. Vva esui non commoda, sed si maturæ sint, optimæ sunt pro vino rubro faciendo, quod diu conseruari potest. Satis copiosè Vesuntii. His vva dictæ *Torpor* similes, sed minores, lignum magis rubet.

Vua Vesuntina.

Harum Vites sunt fertiles, cum coluntur locis calidis & petrosis, vbi tamen non desit terra, nec peruenire possit ventus orientalis. In iuriâ cæli primo Vere & Æstate melius fert, quàm reliquæ Vites. Vvas profert magnas, & acinos magnos, rotundos, nigros. Esui minus commoda, quàm alix, nisi suspensæ & reseruatæ vique ad Natalitia Christi. Ex his habetur vinum, crassum, rubrum, quod diu reseruari potest, licet minus bonum, verùm copiosum.

Vua Cressans.

Vesuntinis forma & colore Bræginæ similes, nisi quod carne firmiori & duoriore edendo sentiuntur.

Montbelgardi vocant *Gris* vvas rubellas minores, à colore mixto ex rubro & albo, dulces valdè, facillè que maturefcentes. Germ. vocant *Traminer*. Sūt huius generis & maiores, quæ an

Bösc hirtchen

VV almer

Groß Lâpen

Groß lein

Klemmer

Veltliner

Gamé.

Schwarz Klemmer

Rothschäben

Grappenans

Vesuntina

Cressans

à mi-

à minoribus differant, præterquam magnitudi-
ne, me latet adhuc.

Vua Arboresca rubra sive nigra.

Spektandæ pulchritudinis sunt vuæ, quas
Montbelgardi *Arbois* vocant, à loco in Bur-
gundia, vbi vocantur à quibusdam *reste d'oiselet*,
Vinitores in Ducatu Vviremb. dicuntur *Rot-
welsch* trauben. Hæ rubræ vuæ non conveniunt
nostro solo, quia difficulter maturescunt, acini
sunt magni, sublongi, ovales, carne firma, dulces
tamen. Vinitor meus extirpat has Vites, vt alius
locum det, magis fructiferis & melius ma-
turefcentibus. Velutii vocant etiam *Arbois* colore
minüs rubro vuas, vel, vt dicere solent, minüs
nigro, parte acinorum pediculo hærente, ligno
crasso. Ex hoc genere vuarum scribunt fieri vi-
num rubellum, quod *Clarey* vocant, admixtis
vuis *Blanc genil*. Sunt etiam, vt tradunt, *Arbois
blanc* eiusdem naturæ & formæ cum nigris.

VVA MONSTROSA BARBATA.



Vuabit fortè
inter tot natu-
ræ creata legi-
tima, eiusdè
quoque pecca-
ta detegere. Si
modò peccatù
sit, à consueto
curfu deflecte-
re, & partüs
legitimi vice
monstru oculi
nostris sub-
iicere. Res
sanè rara, nec
vulgi modò
rumore sparfa,
sed principum
curà cognita,
& ad prototy-
pum depicta.
Racemus vua-

rum est geminus, suo quisque pediculo commu-
ni ramo hærens. Hoc naturale. At vterque com-
mò obseptus erat crinita, flauescènte, ad duos ferè
cubitos longa, infernè in vnum iuncta & cons-
fusa: Hoc vetò nouum est, atque monstro-
sum.

Picturam cum descriptione ex authentico ad
me misit Cl. D. Rentzius Fontis admirabilis Med-
icus Bollenfis ordinarius. Dicitur ab Illustriss.
Principe Ernesto Morchione Badensi repertus
prope Fridelsheim in Palatinatu anno 1599. &
Dorlacum missus, vt noui spectaculi eicone ten-
us ad posteritatem quoque rediret. Huius e-
tiam rei fideri nobis fecit Laurentius Zysar, qui
& vidisse & diligentius consideratos manibus
palpasse ad eundem D. Rentzium scripsit.

Tabern. ic. & Hist. vocatur Vua barbata, Vuæ
tertium genus, quod ab aliis nonnihil variare
scribit, oblongo filamento, multo ex vua depen-
dente, ac barbam exprimente. Figura sanè posita
à Comp. Taber. placet, sed displicet quod gen-
us tradatur: nec tradatur nec, ascribitur locus,
vbi id proueniat

Altera & *antiqua* à *rupe*, Vitis vinifera siue
cultiua appellatur. Vitis quidem dicitur, quòd
inuitatur ad vuas pariendas auctore: Varrone.

Tom. II.

Hebr. *Gaphan*, Trago, Arab. *Harin* seu *Karit*, siue
etiam *Karin*, Germ. *Räben* / *weint äben* / *weint stock* /
oder *Räbstock* / Belg. *Wingacert* / ost *Wynstock* /
Gall. *Vigne*, It. *Vite* & *Vigna*, *Vite vinifera*. Vite do-
mestica Hisp. *Cast. Vid. Port. Vide*, Angl. *Wynde*
ost *Weintree* / or *Grape tree* / Boh. *Rywy wine*.
Hung. *Ten zolo*

Vitis porrò arbutiua, quæ maritata est arbo-
ribus, vt attestatur Had. lun. dicitur *Græcè* *οἰκί-
α* & *αἰκίον* / Ger. *Räben an bäumen* / *gerzogen*,
Belg. *wyngacert an Een boom gestofden* / Gall.
vigne mariée aux arbres, si qui rampe en arbre, It.
vite che rampa sopra li arbori, Hisp. *vid abraçada
con arbol*

Vitis viduæ, non associata, nec maritata ar-
bori meminit Catul. in eam nupt.

Vitis compleniata Plin. et celi in modum longè
lateque formicata, germ. *Räbstock weit vünd
breit zerlegt*. Belg. *wyngacert galere wyss ener-
decht* ost *gheleyt*. Gall. *vigne liée au long du rayon*,
It. *vite ligata & condotta à guisa d'arco di vetro*, d. di
figna, Hisp. *vid parrida de patio*, en arco d'boneda

Vitis pergulana Colum. Germ. *Räbgländer* /
Belg. *Wingacert lünst ouerleyde wyngacert*,
Gall. *vigne qui est faite en treille*, It. *vite fatta in
guise di pergola*. Hisp. *vid sbre percha*.

Vitis iugata, canteriata Colum. quæ pedamen-
tis canteritque transversa iugatur, Germ. *weinz-
rüb an cinen ghad nit dwercksiangen aufgez-
richt*. Belg. *Wyn gaacert met latten of ut resten
dweers gelyt*. Gall. *vigne eshalassée*, *substienne de
perches traueses*: It. *vite sustentata da perche tra-
uersate*: Hisp. *vid sustentada de perigas atraver-
sadas*.

Vitis pedata, statuminata Plin. palis pertici-
que firmata: Germ. *gustürzer Rüb*. Belg. *wyn-
gaert aen stock* ost *staecten gheset*: Gall. *vigne
eschalassée son mur d'eschalas*. It. *vite s'ienta & ap-
poggiata sopra pertiche & pali*, Hisp. *vid puesta en e-
stado, y sustentada de sus rodriqones*.

Vitis ordinaria Colum. in quincuncem ferè
disposita: Germ. *Räben nach ordnung gepflanzt*
rzer: Belg. *wyngacert der reye* / ost *Verholgens
gheset* Gall. *vigne plantée par ordre*. It. *vite posta à
plantura per ordine*: Hisp. *vid puesta y plantada en
orden*.

Vitis luxurians, *αἰκίον* & *δὲ κλωνίς*: Germ. *Über-
stüssig schießend*. Belg. *weelidige wyngacert* / Gall.
vigne croissant trop abondamment, qui terre trop de
branches: It. *vite supr. abondante, che cresce troppo*: Hisp.
vid superflua demastada, que crece mucho.

Vitis lachrymans, *δενυτὸν ὄνυξ* & *δενυτὸν ὄνυξ* & *Sotio-
ni*: germ. *Ein Trießende rüb*: Belg. *Een Druy-
fende wyngacert*: Gall. *vigne qui pleure ou degoute
vne sorte d'eau*. It. *vite che lagrima*: Hisp. *vid quel-
lora*.

Vitis fiderata Plinio *ἀσπιδιὴ* & *ἀπυλα* & *Bassia-
no*, Ger. *berdorret wein rüb*: Belg. *werbrät doort
ouwerder*, Gall. *Vigne mellee & gassée du temps*,
Ital. *Vita prussiat a & guasta par la tempesta*, Hisp.
vid pasmada.

Viuiradix Plin. Vitis quæ cum radice pangi-
tur *vizyrua*, Germ. *Sezling* / Belg. *wyngacert
mit den wortel gheset* / Gall. *vigne plantée avec la
racine*, Ital. *vite piantata con la radice*, Hisp. *vid
baruada con r. ayces*.

Propago Virg. vetula vitis humi depressa,
quo ex vna plures emergant, *ἀπὸ τοῦ ἰσχυροῦ*
Anatolio, Germ. *ein altes Rübstock wider ein-
gelegt* / Belg. *Oude wyngacert stock weder in
gheseyt*. Gall. *Prouin de vigne*, Ital. *prouina della
vite*, Hisp. *prouena del sarmiento de la vid*.

Korwelsch
trauben

Cbma:

Locus.

Tab. repub.

Nomina
Linguarum

Vitis arbo-
resca.

Vitis vi-
dua
Vitis com-
pleniata

Vitis perg-
ulana

Vitis iugata

Vitis pedata

Vitis ordi-
naria

Vitis luxu-
rians

Vitis lachry-
mans

Vitis fidera-
ta.

Vitis radix

Propago

Tradux

Tradux Varr. Rumpus eidem propago vitis ab arbore in arborem iadaeta, Germ. Uberschling, Belg. der ouerschüete / die haer in de ho ochdent in breede wt Erecte, Gall. l'auantin, ou longue branche de vigne, Ital. rampollo, Hisp. Sarmiento para prouenir, mugron de la vid.

Vitis partes

Generum Vitium appellationibus ita appositis, partium vitis Nomenclatura exponenda.

Palmes

Palmes igitur siue sarmentum Colum. praelonga luxuriantis vitis virga est, καμια, καμιας, αμυγδalis, German. die ubrige gerten an den beschnittenen weinträben. Belg. wyngaert ranef, welche blystant nicu hoür te schieten, Gall. le viel bois de la vigne, Ital. palmito, dralcio, Hisp. el sarmiento de la vid, el pampano.

Palmes fo- canens

Palmes locaneus Colum. qui in bifurco medius profilit, Germ. ein schößlin in achßlin / hürling / beygerten. Belg. cui riefßen oft byschēite, Gall. le retetton qui croiß entre la fourchure de la vigne, Hisp. sarmiento soperon.

palmes fru- ctuaris

Palmes fructuaris, racemarius, flagellum Vitis fructuarium, Germ. ein fruchbar schod. Belg. Früchtbare scheüt / Gall. retetton fruitier.

palmes or- bus

Palmes orbis Colum. qui nihil parit, Germ. Blinde rāben ohne rābüngen / Belg. Blinde scheute daer niet acn en combt.

palmes pā- pinarius

Palmes pampinarius Colum. Pampinarium Plin. colis, qui primo anno frondem sine fructu fundit, Germ. Rābschoß ohne träuben / Belg. de ranef die riet dan blāderen voortbrengt, Gall. Sarmen- to qui p. rie futelles seulement sans fruit, Ital. Tralcio del primo anno, f. gli. so. Hisp. Sarmen- to que no lleus fruta.

R. Sex.

Relex Colum. alves subsidiarius eidem Sarmentum cui out nm quod putatur ad fructificā- dum: praesidiarius palmes Colum. palmes vinaris & cultos Varroni, Germ. Ein gerten an rāb gelassen / ein gesch. nitte gerten. Belg. de rāb die ghecorriß / de rāef die gesch. nēden wort. Hisp. Sarmient. del cuerpo de la vid.

Malleolus.

Malleolus, nouellus palmes plantationi idoneus, malleolaris virga Colum. Germ. Jünge rābschoß, gürling / Fnebel, Belg. Zoot, Zönghe ranef, Gall. prouin, Ital. & Hisp. pampano. Flagellum, summa palmitis pars & cyma, Germ. gerten, Belg. der böienße ranef, Gall. fin, ou menu bout de la vigne.

Flagellum.

Capreolus.

Capreolus Varr. Clanicula Cic. Colum. Viti- cula Plin. Crinis eid. Cochulus viteus cincinnati in modum contortus, quo locum serpendo capit, Annulus vitis Aureliano lād, Germ. Gablen an weinträben, Belg. Clānkerken. Gall. Fleaux ou vitilles de la vigne, Ital. uinceio, dralcio che lega & se & la vite allipali, Hisp. sfereta, d' carçillo de la vid.

Pampinus.

Pampinus Cic. Folium vitis quod vestitur, Sine- per. Germ. Rābblat, Belg. wyngaertblat, Gall. pampre, ficille de la vigne, Ital. pampano, Hisp. pampaua, hoja de la vid. Et hinc est pampinare, cacumina defringere Colum. coles en atos è sar- mento tollere Cato ni, frondium luxuriam tol- lere.

Gemma.

Gemma [quod omisit Hadr.] ea dicitur, à qua ineunte Vere oriens vna sese ostendit, quæ & succo terræ & colore Solis argescens, primo est peracerba gustatu, deinde matura dulcescit, vestitaque pampinis, nimios Solis defendit ardo- res.

Caput Sa- gittæ.

Quemadmodum autem flagellum illud Vitis vltimum & prodestissimum, caput quidam appellat, ita furculi nouissimam partem Sagittam vocant, siue quia longitūs à matre recessit, &

quasi emicuerit, atque profuerit: seu quia cacumine attenuata, prædicti teli speciem gerat.

Surculos autem qui nihil attulerint, Spadones apud Ruellium appellantur.

Virgas tandem, quæ è radicibus aut caudicis lateribus produnt, quasi nepotum paru grauidis, Sobolem dicunt, rustici tamen malunt Suffraginem appellare.

Nunc, quod superest, palmites appellantur, quodd in modum. palmarum humanatum, virgulas quasi digitas edunt, Capreolus à capiendo dictus est, à quo & Veteribus Caprea vitis cognominabatur. Malleolus à similitudine rei nomen habet, quodd in ea parte, quâ deciditur ex vetere sarmento, prominens vtrinque malleoli speciem præbet: vel quod capitulatus vtrinque & furcatus solebat feri: differt enim à Sarmento, sicut pars à toto, verum tōstratam ostendit imaginem.

Sed iam ad Vitis partum veniamus. Vna con- stans scapo (scopo Ruell.) & acinis, ab vuido fonte, qui latex est, nomen traxit, vocaturque Græcè σκαπός, Germ. träuben, weinträuben, Belg. drüyne / wyndrüyne, Gall. raisin, Ital. & Hisp. vna. Scapus Varr. Scopus Ruell. Scopus Trago, racemus Virg. propriè ramulus vnde acinid dependent, Botrys, Cobotrys, Botrus, Botryo Mart. Germ. der rapp oder drapp an träuben / der Chan / Belg. ein drüyne, Gall. la grappe, It. racemo, grappolo, Hisp. uencerron de las vnas.

Acinus, & Acinum. Acinus vinaceus Cic. Græcè ἀκίνη & ἀκίνος, Lat. etiam granum. idē ut ēν ἀκίνη τὸ γένος, inquit Democritus, Acinus siue idē granum est vna. Germ. träuberbe cr. Belg. wyrbesfe, Gall. grain de raisin, Ital. acino, grano d'vna, Hisp. granillo de racimo.

Composita est autem acinorum substantia, ex membrana, siue folliculo, aut cono acini (vulgo G aci appellat) carne, humore (πῶν σκαπὸς καὶ ὑγρότης) per carnem disperso, & semine, eiusdem acini, quod Vinaceus Varroni, Vinaceum Colum. uelcus Trago, ὑγρότης ὑγρότης Græcis dicitur, Hebr. vt alioium fructuum nuclei garei- nim, Germ. der kern / Belg. de feceren, oft farfel / oft seen wan ein drüyne, Gall. le marc de raisins, Ital. vinaculo, Hisp. granillo de la vna, Offic. arilli, quasi ariduli, quodd siccī, & succum nul- lum præbeant: sunt tamen & vinacea Colum. quæ ab vuis expressis ac prælo subiectis reliqua sunt. Recreatione tamen hæc propriè σκαπὸς dicitur, membram osti videlicet acinorum folliculi, & vinacea cum scapis. Sed Attici, inquit Galenus, quæ ex musto expresso superfunt σκαπὸς appellat: σκαπὸς uerò, quæ ab Oliuis relin- quuntur.

Vinearum genera quod attinet: alia sunt hu- miles, vt quæ appellantur iugata, vt plerique in Italia: quibus stat recta vinca dicuntur peda- menta, quæ transuersa iunguntur, iuga, ab eoq; Vinæ iugata.

Iugorum genera quatuor, pertica, arundo, restes & vites. Pertica, vt in Falerno: Arundo, vt in Arpino: Restes, vt in Brundusino: Vites, vt in Mediolanensi agro, Iugationis species duæ, vna directa, vt in agro Canusino, altera compluuiata in longitudinem & latitudinem, iugata vt in Italia pleræque. Hæc vbi domo nascuntur, vinæ non inuentunt sumptum, vbi multa ex propinqua villa, non valde. Primum genus, quod dixi, maximè quarit Salicā. secundum Arundinetā, tertium iuncta, aut eius generis rem aliquam, quantum Arbuta, vbi traduces possunt

Spado.

Suffrago. Palmis c- tymen.

Capreoli.

Malleoli.

Vna. Scapus.

Botrus.

Acinus.

Corium ac- cin.

Arilli.

Vinearum genera. Pedamen- ta.

Vinæ iu- gata. Pertica. Ar- undino. Restes Vi- ti. Iugatio duplex.

Tradux.
Opulus.
Pedamentum.
suu.

possint fieri Vitium, vt Mediolanenses faciunt in arboribus, quas Opulos vocant: Canusini in harundulatione in Ficis.

Ridiculi Pa-
lus.

Pedamentum item serè quatuor generum. Vnum robustum, quod opimum, solet afferri in vineam è Quercu ac Iunipero, & vocatur Ridicula. Alterum Palus è pertica, meliorque è dura, quòd diuturnior. Tertium quod in horum inopia subsidio sit, Arundinetum. Quartum pedamentum est, vbi ex arboribus in arbores traductis vitibus vinea fit, quos traduces, quidam Rumpos appellant.

Arundine-
um.

Vineæ altitudinis modus, longitudo hominis. Interualla pedamentorum, quæ boues iuncti arate possint.

Vinea ser-
ua.

De loco Vitibus apto ita Virg. in Geor. canit,

Locus Viti-
bis aptus.

Salsa autem tellus, & qua perhibetur amara
Erugibus infelix, ea nec mansuetur arando,
Nec Baccho genitus, aut pomis sua nomina ser-
uat.

Aptum, ait Florentinus, Vitibus solum, est omnis terra nigra, non valde densa, neque glutinosa, humiditatem habens.

Colū. Vitem (inquit Colum.) nos cæteris stipitibus iure præponimus, non tantum fructus dulcedine, sed etiam facilitate, per quam omni pænè regione & omni declinatione Mundi, nisi tamen glaciale, vel præferuida, curæ mortalium respondet. Tamque felix campis, quam collibus prouenit, & in densa non minus, quam in resoluta, sæpe etiam gracilis, atque pingui terra, siccaque, & vliginosa. Tum sola maxime vitamque patitur intemperiem cæli, vel sub axe frigido, æstiuo, procellosoque. Refert tamen cuius generis, aut quo habitu vitem pro regionis statu colere censens, neque enim omni cælo, solæ cultus idem, neque est idem stirpis eius genus, quodque præcipuum est ex omnibus non facile dictum est, cum suum cuique regioni magis, aut minus aptum esse doceat vsus. Exploratum tamen habebit prudens agricola genus Vitis habile campo, quod nebulas pruinaque sine noxa perfert, cælique siccitatem, ventosque patitur: pingui, & vberi dabit agro gracilem Vitem, nec natura nimis secundam, macro feracem, terræ densæ vehementem, multaque materia frondentem, resolutam & læto solo rari samentum, humido loco sciet non rectè mandari fructus teneri, & amplioris acini, sed callosi, & angusti, frequenisque vineæ, sicco rectè contribui diuersæ quoque naturæ femina. Sed & post hæc non ignorabit dominus loci plus posse qualitatem cæli frigidam vel calidam, siccam vel rosicidam: grandinosam, ventosamque, vel placidam: serenam, vel nebulosam. Frigidaque aut nebulosa duorum generum Vites aptabit, seu præcoques, quarum maturitas frugum præcurrit Hiemem, seu firmi, durique acini, quarum inter caliginis vix deflorescunt, & mox gelicidius, ac pruinis, vt alix, calidius mitescunt, ventoso quoque, & tumultuoso statu cæli sidentes easdem tenaces, ac duri acini comittet: rursus calido vberiores atque teneriores concredat: sicco destinabit eas, quæ pluuiis, aut continuis roribus putrescunt: rosicido, quæ siccitatis laborant: grandinoso, quæ solis duris, latiusque sunt, quò melius protegant fructum: nam placida, & serena regio nullam non recipit, commodissimè tamen eam, cuius vel vix, vel acini celeriter decidunt.

At si voto est eligendus vineis locus, & status cæli, sicut censet verissimè Celsus, optimum est

Tom. II.

Solum, nec densum nimis, nec resolutum, soluto tamen propius: nec exile, nec latissimum, proximum tamen vberi: nec præceps, simile tamen edito campo: nec siccum, nec vliginosum, modicè tamen rosicidum, quod fontibus non in profundo terræ scaturiat, sed vt vitinum radicibus humorem subministrat, cumque nec amarum, nec salsum, ne saporum vini corrumpat, & incrementa vitentium veluti quadam scabra rubigine coëreat. Cælum porro neque glaciale vinea, nec prorsus æstuosum desiderat, calido tamen potius, quam frigido lætatur, imbribus magis quam serenitatibus offenditur, & solo sicco, quam nimis pluuiosus est amicior, perflatu modico lenique gaudet, procellis obnoxia est. Atque hæc secundum Colum. maxime probabiles est cæli & soli qualitas:

Cælo porro calido, ait Dod. Vitis lætatur: æstuosissimum tamen non desiderat: frigidum vero ac glaciale non sustinet: In calidis idcirco regionibus vber est potentis vini prouentus, vt in Hungaria, Austria, Italia, Hispania, Gallia, & aliis locis calidioribus: in frigidioribus tenuis est, & oligophorum, ac exigua aquam admittens, vel etiam omnino *apud bos*, quale est quod Louaniam & alibi apud Brabantos, tum quod & apud Bohemos ac Saxones, ac circa horum fines, nascitur. Validiores siquidem & potentiores vvas Sol efficit, sed & dulciores, si multum calefecerit: vt in Geoponicis Quintilii affirmant, qui & Lunani ad maturitatem, ad dulcedinem verò noctes conferre aiunt. Monspelii Vites abundant: verum longè aliter coluntur, quam nostræ: stipites enim vix excedunt cubitum: quoannis omnes ferè rami absconduntur, relictis paruis stolonibus, nec vtuntur pedamentis. Verum quibusdam locis Narbonensis Gallix permittunt vt consendant arbores ordine constitas, inter Vites crescente gramine. In Italia vulgate est, vt agri tria ferant, triticum, ligna & vinum: solent enim Itali ordine in agris conferere Salices, Populos, Iuglandes, quas consendant Vites, inter arbores serunt triticum. Geneuæ aliquas ita colunt & vocant *des Hutins*.

Iam [ne quid omitatur] cui vinea sacere cordi est, præcipue caueat, ne alienæ potius curæ, quam suæ credere velit, neque mercetur viuiradicem. Sed genus furculi probatissimum domi conferat, faciatque vitianum, ex quo possit agum vineis vestire: nam quæ peregrina ex diuersa regione semina transferuntur, minus sunt familiaria nostro solo, quam vernacula, eoque velut alienigena reformidant, mutatam cæli, locique positionem. Sed nec certam generositatis fidem pollicentur, cum sit incertum an is, qui conferuerit ea, diligenter exploratum, probatumque genus furculi deposuerit, quam obrem biennij spatium longum esse minimè existimandum est, intra quod vtique tempestiuitas seminum respondet, cum semper primum retulerit, exquisiti generis stirpem deposuisse. Post hæc deinde meminert accuratè locum vineis eligere, de quo cum iudicauerit, maximam diligentiam sciar adhibendam pastinationi, quam cum peregerit, non minore curâ Vitem conferat, & cum seruerit, summa sedulitate cultura seruiat, id enim quasi caput & columen est impensarum.

Vt autem ea quæ proposita fuere suo quæque ordine prosequamur. Vitianum neque tenuina terra, neque vliginosa faciendum est, sicut

*Feccarii
loci: et
compfitio.*

cosâ tamen & mediocri potius, quàm pingui, tametsi ferè omnes Autores huic rei lætissimum solum destinauerunt, quod ego minime reor esse pro agricola. Nam deponitur stirps valido solo, quamuis celeriter comprehendant, atque proficiant, tamèdum sine viuatradices factæ, puiusquam transferantur, retorrescunt, nec adolebere queunt. Prudentis autem coloni est ex deteriori terra potius in meliorem, quàm ex meliore in deteriore transferre. Propter quod mediocritas in electione loci maxime probatur, quoniam in consilio boni, malique posita est. Siue enim postmodum necessitas postulauerit tempestiua semina ieiuno solo committere, non magnam sentient differentiam, cum ex mediocri terra in exilem translata sunt, siue latior ager conferendus est, longè celerius in vberitate coalescant. Rursus tenuissimo solo vitarium facere minime ratio nis est, quoniam malleolorum pars maior deperit, & quæ superest tardè fit idonea translationi. Ergo mediocri & modicè siccus ager vitatio est aptissimus, siquæ bipalio prius subigi debet, quæ est altitudo pastinationis, cum in duos pedes & semissem conuertitur humus, ac deinde tripedaneis relictis spatiis, per quæ semina excoluntur, in singulis ordinibus, qui duenos quadragenos pedes obtinent sexcenteni malleoli pangendi sunt: is numerus consumat per totum iugerum, feminum millia quatuor & viginti.

Verùm hanc curam preuenit inquisitio, & electio malleolorum nam, vt sepe iam retuli, quasi fundamentum est prædictæ rei, probatissimum genus stirpis deponere. Sed electio dupliciter facienda est, non enim solum fecundam esse matrem satis est, ex qua femina petuntur, sed adhibenda est ratio subtilior, vt ex his partibus trunci sumantur, quæ & genitales sunt & maxime fertiles. Vitis autem fecunda, non tantum debet ea æstimari, quod vvas complures exigit: potest enim trunci vastitate id accidere, & frequentia palmitum, nec etiam eam feracem dixerim, cuius singulæ vva in singulis fatmentis conspiciuntur, sed si per vnumquemque palmitum maior numerus vvarum dependet, si ex singulis geminis compluribus materiis cum fructu germinat, si denique etiam è duro virgam cum aliquibus racemis citat, si etiam nepotam fructu grauidam est, ea sine dubitatione ferax destinari debet legendo malleolo. Malleolus autem nouellus est palmes innarus prioris anni flagello, cognominatusque à similitudine rei, quod in ea parte, quæ deciditur ex vetere famento prominens vtrinque malleoli speciem præbet. Hunc ex secundissima stirpe legendum esse semus omni tempore, quo vineæ putantur, ac super terram gemmis tribus vel quatuor extantibus diligenter obruendum loco modicè humido non vliginolo, dum tamen antiquissimum sit considerare, ne vitis, ex qua is sumitur, ancipitem floris habeat euentum, ne difficulter acinus ingrandescat, ne aut præcoquem, aut ferè maturitatis fructum afferat, nam illa volucris, hæc etiam tempestatibus hyemis infestatur.

*Pites et
seraces fa-
cienda.*

Ceterùm fecunditas Vitis adiuuari potest cultoris industria, celeritèque infitionibus ad maximum numerum perducitur. Rescit vt in transferendis feminibus similem statum cæli, locique, & ipsius Vitis habitum obseruemus, quoniam plerumque degenerat siccus, si aut situs agri, aut æris qualitas repugnent, aut etiam si ex arbore in iugum descendit. Itaque de frigi-

dis in frigida, de calidis in similia, de vineis in vineas transferemus, magis tamen ex frigido statu, stirps potest calidum sustinere, quoniam ætate tepore potius quàm frigore. Sed & qualitas soli plurimum iuuat, vt ex macro aut mediocri transfudatur in melius, nam quod assuetum est pingui, nullo modo maciem terræ patitur, nisi sæpius stercores.

Custodiemus autem, vt à prædictis locis, quos humeroso rustici vocant, semina legamus, tamen quæ attulisse fructum antea animaduertimus: nam si facta vacua sint, quamuis à laudabili parte, nihil censemus ad feracitatem conferre malleolo.

Quare magnopere in eligendis feminibus adhibenda cura, vt fructuosa parte Vitis palmitres legantur ei, qui futuram fecunditatem iam toto fructu promittunt. Nec tamen contentissimus singulis vuis, maxime que probandi ii, qui numerosissimis fructibus conspiciuntur. An non opilionem laudabimus ex ea matre sobolem propagantem, qua geminos enixa sit, & captatum summittentein factus earum pecudum, quæ trigemino pitru commendantur? videlicet quasi semper sit parentum fecunditati proles responsura, & nos sequamur in Viribus hanc ipsam rationem, tantè quidem magis, quod compertum habeamus naturali quadam malignitate desciscere interdum, quamuis diligenter probata semina, idque nobis poëta velut furdis veritati indulget dicendo.

Vidi lecta diu, multo speiata labore

Degenerare tamen vis humana quotannis

Maxima queque manu legeret sic omnia satis

In peius ruere, ac retrò sublapsa referri.

Quod non tantum de feminibus legumitur, sed in totam agriculturalionis rationis dictum esse intelligendum est.

Sequitur hanc eligendi malleoli curam, pastinationis officium, si tamen antè de qualitate soli constiterit, nam id quoque plurimum & bonitati, & largitati frugum conferre nihil dubium est. Ac prius quàm ipsum perspiciamus, illud antiquissimum censemus, rudem potius eligendum agrum, si sit facultas, quàm vbi fuerit seges, aut arbutum: Si tamen rudis terra non sit, proximum est vacuum arboribus æreum. Si nec hoc est, rarissimum arbutum, vel oliuatum quod non fuerit maritatum vineis, destinatur. Vltima est conditio resistibilis vineæ: nam si necessitas facere cogit, prius quicquid est residua Vitis extirpari debet, deinde totum solum siccum fit, aut, si id non sit, altius generis quàm recentissimo, stercoreari, atque ita conuerti, & diligentissimè resollas omnes radices in summum tegeri ac comburi. Tunc rursus vel stercore vultu, quia non pignit herbas, vel de vepribus egesta humo pastinatum largè contegi. Sed hoc in totum ad illud, quod vineis præcipue est idoneum, propriè considerandum, si facilis est humus & modicè resoluta, quam pullam vocitant, nec quia sola eâ, sed quia sit habilis maxime vineis. Quis enim vel mediocri agricola nesciat etiam durissimum tophum vel carbunculum, simul atque sunt contra di, & in summo regenti, tempestatibus, gelivæ, nec minus æstivis putrescere caloribus ac resolui, eosque pulcherimè radices vitium per ætatem refrigerare, succumque retinere: quæ res alendo furculo sunt accommodatissima: simili quoque de causa probari solutam glaciem, calculosumque agrum & mobilem lapidem, si tamen hæc pingui

*Præceptum
de legendo
semine.*

glebæ

glebæ permixta sunt, nam eadem ieiuna maximè culpantur. Est autem [vt mea fert opinio] vineis amicus etiam Silex, cui superpositum est modicum terrenum, quia frigidus, & tenax humoris per ortum caniculæ non patitur scire radices. Higinus quidem secutus Tremellium, præcipuè montium ima, quæ à uerticibus defluentera humum receperint, vel etiam valles, quæ fluminum alluuiæ, & inundationibus concreuerint, aptas esse vineis asseruerat me non dissentiente. Vitibus contrà inimica Cretosa humus quam argillam vocant. Nec minùs ieiunus fabulo, & quicquid, vt ait Iulius Atticus, retorrimum furculum facit. Id autem solum vel vlginofum est, vel salisum, vel amarum, vel siticulotum, vel petaridum. Nigrum tamen, & rutillum fabulonem, qui sit humidæ terræ permixtus, probauerunt Antiqui. Granis est rubrica, vt idem Atticus ait, & ad comprehendendam radicibus iniqua. Sed alit eadem vitem, cum tenuit, vetum est in opere difficilius, quòd neque humentem fodere possis, quòd sit glutinosissima, nec nimium siccam, quia ultra modum prædura.

79. Gracina
mors de terra
Spiritali.

Sed ne nunc per infinitas terreni species euagetur, non intemptè commemorabimus Iulii Gracini conscriptam vel formulam ad quam posita est limitatio terræ vinealis. Idem enim Gracinus sic ait. Esse aliquam terram calidam vel frigidam, humidam vel siccam, raram vel densam, leuem aut grauem: pinguem: aut macram: Sed neque nimium calidum solum posse tolerare vitem, quia inurat, neque prægelidum quoniam velut stupentes, & congelatas radices, nimio frigore moueri non sinat, neque humidum, quoniam cum se promunt vites, modico tempore euocant humorem terræ iusto maiorem qui putrefacit deposita semina. Rursus nimiam siccitatem desituerit plantas dicit naturali alimentò, aut in totum necare, aut scabras & retorridas facere. Per densam humum celestis aquas non sorbere, nec facile perflari, facillimè perumpi, & præbere rimas, quibus sol ad radices stirpium penetret. Eademque velut conclusa & coarctata semina comprimere atque strangulare. Raram supra modum velut per infundibulum transmittere imbres, & Sole ac vento penitus siccare, atque exarescere. Grauem terram vix vlla cultura vincibilem, leuem vix vlla sustineri, pinguis simam & lætissimam luxuria macrem, ac tenuem ieiunio laborare. Opus est, inquit, inter has tam diuersas inæqualitates, magno temperamento, quod in corporibus quoque nostris desideratur, quorum bona valetudo calidi & frigidi, humidii & aridi, densi & rari, certo & quasi examinato modo continetur. Nec tamen hoc temperamentum in terra quæ vineis desinitur, pari momento libratum esse debere ait, sed in alteram partem propensius, vt calidior terra sit quàm frigidior, siccior quàm humidior, rarior quàm densior, & si quæ sunt his similia, ad quæ contemplationem suam dirigat, qui vineas instituit.

Quæ cuncta sicut ego reor magis profunt, cum suffragatur etiam status cæli: cuius regionem, quam spectare debeant vineæ, vetus est dissentio. Sæternà maximè probante Solis ortum mox deinde meridiem, tum occasum, Tremellio Scropha præcipuum positionem meridianam censente, Virgilio de industria occasum sic repudiante

Næue ribi ad Solem vergant vineæ cadentem.
Democrito; & Magone laudantibus cæli plagam Septentrionalem: quia existimant ei subiectas

Tom. II.

feracissimas fieri vineas; quæ tamen bonitate vini superentur. Nobis in vniuersum præcipere optimum visum est, vt in locis frigidis meridiano vinea subiiciantur, tepidis orienti aduertantur, si tamen non infestabuntur Austris, Eurisq; velut ortæ maritimæ in Bætica. Sin autem regiones prædictis ventis fuerint obnoxie, melius Aquiloni, vel Fauonio committentur, nam feruentibus prouinciis, vt Ægypto & Numidia, vni Septentrioni rectius opponentur, quibus omnibus diligenter exploratis tum denum pastinationem suscipimus.

Et hæc pleraque ex Columella: cætera verò quæ tum ex sua tum ex aliorum sententia de vitis Pampinatione, Positione, Pampinatione, Ablauatione: Putatione, reliquæque eius cultura prolixè prosequitur, ex ipso fonte haud grauius petet Lector.

Natura vitis, inquit Palladius, cælum omne, solumque sustentat, si genera conuenienter appetentur. Plano igitur loco statues vitem, cuius genus nebulas sustinet, & pruinas: collibus, quod siccitatem durat & ventos. Pingui agro graciles, atque infæcundas, macro feraces & solidas: denso, validas atque frondosas, frigido & nebuloso, quæ hyemem celeri maturitate præueniunt, aut quæ duris acinis inter caligines securitibus florent: ventoso, stabiles, & tenaces: calido grani tenerioris, & humidii: sicco, eas, quæ pluuias ferre non possunt: & ne multa dicamus, eligenda sunt genera quæ profusione vitiorum suorum contraria loca diligunt, in quibus durare non poterant. Placida sanè regio, & serena turò genus omne suscipiet. Virium genera numerate non attinet, sed notum est maiores Vuas pulchre speciei, grani callosi, & siccioris ad mensam: feracissimas verò, & cutis tenerioris, & sapore nobiles, & maximè quæ citius deflorescunt, vindemiis esse seruandas.

Natura vitis
est omne cælum
et solum
luna et sol
luna sustinet
net.

Loca naturam plerisque vitibus mutant. Sole Amminæ ubi cunq; sint, vinum pulcherrimum reddunt. Calidum statum potius quàm frigidum sustinebunt. De macro ad pingue transire non possunt, nisi sterces adiuuerit. Harum duo genera sunt, maior & minor. Sed minor melius deflorescit, & citius internodiis minoribus, & grano breuiore. Si arbori applicetur, pinguem terram: si colatur in ordinem, mediocrem desiderat. Imbres contemnit, & ventos, nam maior sæpe vitatur in flore. Sunt & Apianæ præcipue: Satis est genera ista dixisse. Industrius vir probata delgat, & terris talibus mandet, quæ imitari eas possint vnde sumuntur: sic merita sua quæque seruabit. Sed vitem vel arborem, melius erit de exili ad pinguem transferre: nam si à pingui terra ad solum exile transferint, viles esse non poterunt.

Permixta.

Eligenda sunt sarmenta quæ pangimus de Vite media, neque de summa, neque de infima, quinque vel sex gemmarum spatio à veteri procedentia, quia non facillè degenerant, quæ de locis talibus transferuntur. Sumantur autem de Vite secunda, neque putemus brachia esse fertilia, quæ Vuas singulas, aut binas producunt, sed quæ multà vberitate curuantur: nam potest ferax vitis feraciores in se habere materias. Erit & hoc signum fertilitatis, si de duro aliquo loco fructum citabit, si sætu impleuerit ramulos ex ima parte surgentes. Sed hoc signis positus per vindemias est notandum. Ad pangendum, nouellus palmes eligi debet, duri in se nihil habens, & veteris sarmenti, quia hoc putrescente sapè

Electio sari
mentorum.

Fertilitatis
signum.

corruptur. Summa flagella repudiemus, ac furculos, qui licet bono loco nati sint, tamen feracitate caruerunt. Pampinarius, qui de duro nascitur etiam si attulerit fructus, pro frugifero non est ponendus, in suo enim loco fecundatur à matre, translatus verò tenet sterilitatis vitium, quod renascendi conditione suscepit. Caput sarmenti, cum deponitur, torquendum non est, nec aliquo modo vexandum, ne demetia penitis fecundiore parte, quod sterili proximum est supra terram relinquatur: deinde quoniam ipsa tortura vexatio est, & parsea, de qua radix futura præsumitur, iniuriz nulli subiicienda est, cum qua contendere cogatur, antequàm teneat.

Posterioris tempus.

Ponendæ sunt vites placidis diebus ac tepidis. Curandumque ne sarmenta Sole vrantur, aut vento, sed vel statim ponantur, vel obruta referentur. Martio mense, ac deinceps toto Vete vinea ponenda est regionibus frigidis, pruinosis, pinguibus campis, & humidis prouinciis.

Menſura ſarmenti.

Sit autem mensura sarmenti cubitus vnus. Vbi pinguis est natura terrarum, maiora inter Vites spaua relinquemus, vbi exilis, angusta. Nonnulli itaque in iis vitibus, quas toto solo pastinato disponunt, ternos pedes inter singulas vites quoque versus dimittunt. Sed hoc genere diuisionis in iugerali tabula pangentur tria millia tricesima vicena sarmenta. Quod si duos & semis pedes inter vites relinqui placuerit, in eadē tabula ponentur vites quatuor mille septingentæ quinquaginta tres.

Posterioris v. q.

Sed ad ponendum vtemur hoc ordine. Lineam seruatis iis spatii, quæ placuerit custodire, candidis signis, vel quibuscunque notabimus: tunc tenſa per tabulam lineæ, in eis locis furculos, vel calamos figemus, vbi vnaquæque vitis ventura est. Spatium totius tabulæ furculis complebitur ad numerum Vitium ponendarum, atque is qui pandendus est, protecta circa furculos sarmenta sine vilo errore deponet: Præterea nõ est vno genere vitium omne pastinum conferendum, ne annus iniquis generi speni vindemiz totius extinguat. Et idem quatuor, aut quinque eximij generis sarmenta pangemus: sed maximè expedit genera tabulatum disponi, & decimanis diuidi, nisi deterreat operis difficultas, quod si est vetus vinea, singulorum generum furculis tabulatim poterimus inserere, & facillè hoc genus colendi, quod est pulchrum, atque vtile, consequemur. Ita & maturitatis & floris tempora, quæ in vite diuersa sunt, suis temporibus opportunitatis obtinere poterimus. Nec paruo constabit, si legatur maturitas cum acerbitate: dispendium, cum vnus tempestiuam vindemiam sequi, sit permista cruditate vitiosum, & alterius seras maturitates expectare, damnificum. Huic commodo adicitur, quod pro generum diuersitate per gradus accedente vindemia, minor operum numerus eam poterit expedire, & generatim condere, ac melius puros sapores, sine luctamine alterius generis, vnaquæque vina seruare. Hoc si difficile videbitur, non alias simul conferas, quàm quæ & sapore, & flore, & maturitate conueniunt. Sed hæc in pastinis, vel sulcis ratio erit, in scrobibus verò per angulos 4. sarmenta depones: Sed [vt asserit Columella] vineam stercore mistam simul sparges, & si exile solum fuerit, pinguem terram scrobi inferes, vel aliunde portatam. Cum verò plantã, vel malleolum disponimus, modicè humido solo, sed potius

Maturitas et floris tempora in vite diuersa.

arido, quàm latoſo, duabus gemmis supra terram relictis, sarmenta ponemus obliqua. & sic facillè comprehendunt.

Quod si arbutus te habere, delictat plantã generis *Arbutina* *vites.* rosæ vitis prius in seminario nutrire debebis, vt inde radicata transferatur ad scrobem, cui arbor iniuncta est. Seminarium verò dicimus aquè solfam tabulam pedum duorum semis altitudinem. In hac, quam pro numero ponendarum vitium, vel qualiumcunque plantarũ protendis, aut contrahis breuissimo spatio inter se sarmenta depones, si vallis aut humectus est campus, trium gemmarum, exceptis minutis, quas habebit inferius, & vbi conualuerint, hinc post biennium radicata vitis, vel arbutus transferas, quas cum depones in scrobe, ad singulas materias rediges, putatis omnibus, quæ scabra sunt, curtatis etiam radicibus, si quas poteris inuenire vexatas. In scrobe autem ad arbutum faciendum duas radicata vitis deponis, hoc seruans, ne se in radice contingat: sed lapides quinque propè librarum medios in vtramque confites, & ipsas vites ad scrobis latera discreta coniunges. Mago asserit, *Mago de ponenda scrobe.* scrobem non purno anno esse complendam: sed se binde cox quandam, quæ res vitem facit altius fundare radices: sed hoc aridis prouinciis fortè conueniet, humidis autem sata putrescent recepto humore nisi statim terra cumuletur. Sed arbuta, qui facit plantas arborum de his generibus ponat, si agro suppetit abundantia, Opulo, Vulnio, Fraxino in montanis & asperis, in quibus, Vlmus minus lata est. Has etiam Columella dicit seminario debere nutriri. Mihi videtur, quod nulla prouincia sit, quæ non ex his quamcunque spontè producat. Sed si ager frumentarius fuerit, vbi arbuta disponis, quadragenos pedes inter arbores relinque, vt ser possit, in exili autem vicenos. In scrobe verò vitis ab arhore sua se sequi pedis spatio distare debet. Nam vitis multum subiecta arbori, incremento arboris opprimetur. Cauets etiam munienda est aduersum pecoris appetentis iniurias, & arbori suæ protinus alliganda.

Compendium de transferenda vnaqueque vitis in arbuta.

Est & aliud de transferenda ex arbuto vite compendium. Fit ex vimine parua corbicula, quæ mensura pedis, vel aliquantò minus circini spatio possit amplecti. Hæc ad arborem, cui vitis inhaeret, fertur. Et in fundo media parte pertunditur, quod sarmenti virgam possit admittere. Inducto itaque sarmento vitis eius, de qua transferre disponis, cornicula ipsa ex aliqua arboris parte suspenditur, & vna terra repletur, vt sarmentum terra possit includi, quod sarmentum prius intorquetur. Ita exacto annui temporis spatio, sarmentum quod clausum est, radices creabit intra prædictam corbiculam. Tunc sub fundo corbis incisum radicatum sarmentum cum ipsa corbe portabitur ad locum quem vitibus arbutiuis destinabis implere. ibiq; obruetur circa arboris maritandæ radices. Hoc genere quantum volueris numerum vitium transferes sine ambiguitate prehendendi.

Vinæ in prouinciis multis generibus sunt: sed optimum genus est, vbi Vitis velut arbutula stat breui cruce fundata. Hæc primò calamo iuuatur, donec solidetur: sed altior se sequi pede esse non debet, vbi robusta sic erit, sola consistet. Aliud genus est, in quo cannis pluribus circa dispositis, ipsa vitis per cannas sarmentis ligatis in orbiculos hæditur se sequentes. Vltimæ positionis vitis est, quæ per terram protecta discumbit. Hæc omnes & scrobibus ponuntur & sulcis.

Vinea primò uinculata.

*Putatio Si-
nearum
communis
altarum,
Sed humi-
lium.*

Hoc mense (Martio) locis frigidis aliquatenus, & temperatis vitium iusta putatio est. Sed ubi sunt multa vinea diuidantur, & pars earum, quæ Septentrionem respiciet, Vere putetur, alia pars aduerfa clementioribus plagis recidatur. Autumno: Sed in putatione semper nitamur, vt vitis fiat in crure robustior, ne debili vincula duo duramenta setuemus. Aferenda sunt lata, intorta, debilia, malis locis nata sarmenta. Focancus etiam, qui inter duo brachia medius nascitur, debet abradi, qui si pinguitudine sua brachium quodcumque proximum debilitauerit, illi decimo ipse succedat. Erat tamen optimi putatoris, inferias sarmentum, quod bono loco natum fuerit, reparanda vitis causa semper rueri, & ad vnam, vel duas gemmas relinqere.

*Focancus
abraden-
dus*

*Loci consi-
derandi*

In locis clementioribus altius vitem licebit expandere, in exilibus aut æstiuosis, aut decliuis, aut procellosis, humilior est habenda. Locis pinguis, singulis brachiis vitium bina flagella dimitte. Sed erit sapientius æstimare vinu vitis. Nam quæ altius tollitur, & fœcunda est, plus quam octo palmites habere non debet, ita vt conueruemus semper in inferiore parte custodem. Circa crux quicquid nascitur amputandum est, si non desideret vinea reuocari. Quod si truncus vitis sole, aut pluuiis, aut noxiis animalibus est cautus, purgamus quicquid est mortuum, plagaque eas amurcâ linimus, & terrâ aduersum prædicta.

Cortex etiam recisus & pendens a vite tollatur, quæ res minoram facem reddit in vino. Muscus radatur vbicunque reperitur. Sed plagæ, quas in duro vitis accipiet, obliquæ & rotundæ esse debent. Decisis sicut supra dixi, malè natis omnibus & veteribus nouellis, & fructuarios ferua. Vngues etiam custodum siccos, & annotinos recide, & omnia quæ vetera, vel scabra reperies.

Illæ, quæ altius coluntur, vt in iugo, vel pergula, ubi quatuor pedibus supra terram leuata steterint, quaterna brachia habeant. Si macra Vitæ erit, in singulis brachiis singula flagella dimittimus, si pinguis, bina. Sed prouidendum, ne in ima parte sint sarmenta, quæ fetus. Quod cum fit, vitis tanquam si fulgure tangatur, arefcit. Relinquenda sunt sarmenta, neque circa durum, neque in summo, quia hæc velut pampinaria minds affectum, illa vitem nimietate fœtus onerant, & longius ducunt. Quare in medio loco seruanda sunt, quæ tuemur. Plaga non iuxta gemmam, sed aliquant superius fiat, & auertatur à gemma propter lachrymam defluentem.

*Putatio ar-
bustæ*

Vitis, quæ in arbore collocatur, prima eius materia ad secundam vel tertiam gemmam præcidatur. Deinde omnibus annis aliquid per ramos crescere, subinde patiamur, vnam materiam semper ad cacumen arboris dirigentes. Sed qui fructum volunt maximum, materias plures per ramos submitunt qui vinum melius, sarmenta in cacumen extendunt. Fortioribus ramis arborum plures materiz, debilioribus imponendæ sunt pauciores. Putandi autem ratio talis est, vt & vetera sarmenta, quibus primi anni fructus pendit, omnia recidantur, & non oia circumcisus capreolis, & ramulis inutilibus dimittantur. Sed prouidendum est, omnibus annis vitem resoluere, ac religari, quia refrigeratur. Ita formandi sunt rami arborum vitiferarum, ne alter sub alterius linea dirigatur: sed loco pingui vltimo à terra octo pedibus, gracili verò se-

ptem sine ramo relinqenda est. In solo roscido & nebuloso rami arboris vitifera in Orientem, & Occidentem putatione dirigantur, vel latera vacua Solis radiis membra totius vitis ostendant. Agendum est autem, vt Vitis spissa non sit in arbore, & deficientibus primis arboribus substituendæ sunt alia. In loco cliuoso humilitus rami arborum seruandi sunt, in plano & vliginoso altius. Palmites ad arborem non duro vinee ligentur, ne eos vinculum recidat, aut atterat. Hoc autem noueris quia palma quod extra ligaturam pendens habuerit, fructum inducet, quod infra ligaturam, materia sequentis anni deputabit.

Vites quas Prouinciali more velut abufculas stare dixi, si instituere velis, ramos à quatuor partibus his relinques, & in eis brachiis sarmenta pro vitis possibilitate seruabis. Vites autem, quæ cannis in orbem cinguntur sic putentur, quemadmodum eæ, quæ nituntur radicis, aut palis. Illæ verò quæ sine adminiculis iacent, quod pro sola indigentia faciendum est, vel necessitate prouinciæ, primo anno duas gemmas: deinde plures habebunt. Sed huius generis vinea stricte est putanda.

Nouellam vitem dicit Columella à primo anno ad vnam materiam esse formandam, nec recidendam totam, sicut Italiæ consuetudo est. Anno secundo expleto, quia vel intereant vites in totum recitæ, vel infecunda sarmenta producant, quæ amputato capite velut pampinaria de duro coguntur exire: quate iuxta ipsam veteris sarmenti, vnam vel duas gemmas censemus relinqendas, quod est mentio in viticula fortiore seruandum, & sanè excipiendam calamis nouellam, vel exiguis palis, vt tertio anno robustiores possit accipere. Nam quadrina nouella, vbi lætum solum est, tres materias meritis nutrire cogetur. Statim post putationem sarmenta decisa à vineis, & Rubi & impedimentum fossoris omne tollatur.

Hoc etiam mente [Martio] propagandæ sunt vites: sed vetus, & exesa vinea cuius duramenta longè processerunt, vt Columella dicit, mergus melius reparabitur, quam si in fossione totius corporis obruatur, quod agricolis certum est displicere. Mergum dicimus, quoties velut arcus supra terram relinquitur alia parte vitis in fossa. Nam (vt ait Columella) cum tota stitata sunt, plurimis radicibus totius corporis fatigantur. Mergi verò post biennium reciduntur in ea parte, quæ supra est, & in loco iustas vites relinquant. Sed [vt agricola asserunt] post biennium si recidas, plerumque infirmas habent radices, & repente simul pereunt.

*Propagatio
Sisum*

*Inflis tri-
plex*

Hoc Mense calidis & apricis locis optimè celebratur in stio, quæ fit tribus generibus. Sed ex his duo nunc fieri possunt, tertium referatur æstati. Sunt autem genera inferendi hæc, aut sub cortice, aut in trunco, aut emplastro. Inferemus ergo sic. Arborem vel ramum, in loco qui nitidus est, & sine cicatrice, ferrâ recidemus non leso cortice. Post scaturam plagam ferramentis acutis nitidamus. Inde quasi cuneum tenuem ferream, vel osseum, maximè leoninum, inter corticem & lignum tribus prope digitis consideranter disponimus, ne corticis sciccia dissepatur, & in eum modum subducto cuneo, statim furculum mergimus una parte decisum salua medulla, & cortice partis alterius, qui supra arborem sex, vel octo digitis emineat, Duos vel tres, vel plures furculos pro trunci qualitate constituimus, qua-

ternis digitis, vel amplius inter eos spatium relinquimus, tunc lunco, aut Vlmo, aut vimine stringimus, & supra lutum musco refectum ponemus, ac ligabimus, vt quatuor digitis super lutum possit furculus eminere. Plerosque delectat strictum primo lectæ arboris truncum vinculis arctioribus in medio findere, & ibi furculus ex vtraque parte ramos in modum cunci, vt integra sit medulla demergere, pramisso antè cuneolo, quo subducto, depositus furculus redeunte in plagam materia, possit astringi. Sed hoc vtrumque genus vernum est, & fit crescente luna, vbi incipit gemma arborum turgescere. Surculi autem, qui inferendi sunt, sint nouelli, fertiles, nodosi, de nouo nati, ab orientali arboris parte decisi, crassitudine digiti minoris, bifurci, gemmis pluribus vbertati. Si arborem minorem desiderabis inferere, in qua sine dubio meliora incrementa proueniunt, circa terram secato, & quod melius est, furculos inter lignum, corticemque depone, tunc stringe. Quidam rasum ex vtraque parte furculum coarctantem soliditati arboris inferendæ sic in medio deponunt, vt cortex furculi vndique cortici arboris reddatur æqualis. Sed in nouella arbore terra mota vsque ad ipsum insitum colligatur, quæ res eam à vento, & calore defendet. Mihi asserunt diligens agricola, omne insitum sine dubio comprehendere, si depositis furculis vitæum non temperatum in ipsa plaga pariter mergamus, quasi glutino quodam succos materiam vtriusque misturum. De emplastratione suo mente dicemus. Quartum genus Columella sic retulit: Gallica terebra vsque ad medullam arborem perforandam, plaga interioris leuiter inclinata. Ibi educito omni scobe, vitæum vel ramum admodum foraminis impressi delibratum, succidum tamen, & humentem strictè imprimi, vnâ aut duabus gemmis foris relicta, tunc argilla, & musco locum diligenter operiri, ita & vites in Vlmo inferi posse commissas. Hispanus quidam mihi hoc genus nouæ infusionis ostendit, quod ex Persico se aslebat expertum. Salicis ramum brachii crassitudine solidum, longum cubitis duobus aut amplius terebrari iussit in medio & plantam Persici in eodem loco, in quo consistit, spoliatum ramis omnibus, Solo capite relicto, per ipsum saligni manuhii foramen induci, tunc eundem salicis ramum terræ capite vtroque demerso, in arcus similitudinem debere curuari, foramen luto, musco, vinculis stringi: anno deinde exempto, vbi insita medullam salicis caput plantæ sic coluerit, vt vitæitas sit ex duobus mista corporibus, plantam subtenendi, atque transferri, & æggetari terram, quæ acutum salicis cum Persici cacumine possit opterre, hinc Persici poma sine ossibus nasci, sed hoc locis humidis conuenire, vel riguis, & salices aquationibus adiuuandas, vt & natura ligni vigeat, quæ delectatur humore, & superfluentem copiam succi germinibus ministrat alienis.

Infusionis quartum genus

De soden. dist. palandis, ex ligandis viti-bus.

Vitis terebra, & si facienda.

Nunc locis maritimis, & calidis sodendæ sunt vites: vel [si hæc prouincæ consuetudo est] exarandæ, & in eisdem locis palandæ, aut ligandæ sunt vineæ prius, quàm genima procedat, cuius concussionem, vel attritum incurritur grande dispendum. Theriacam vitæum, cuius iste profectus est, vt vinum eius, vel acetum, vel vna, vel sarmentorum cinis proficiat, contra morsus omnium bestiarum: sic facies. Sarmentum, quod pangendum est, trium digitorum spatium in ima parte findatur, & sublata medulla ad

eius vitæum Theriacæ medicamen addatur. Tunc terræ mandetur vinculo diligenter strictum. Aliqui eadem sarmenta iam medicamine satiatæ, intra squilla bulbum recondunt, & terris prædicta ratione committunt. Aliqui antidoti eius affusione radices vitis insundunt. Sanè sarmentum, si de hac vite sumatur ad transferendam, potentiam materni medicaminis non tenebit, oportebit autem Theriacæ infusione assidua, vim succi senescens iterare.

Vna sine granis.

Est pulchra species Vitis, quæ granis interioribus caret. Hinc efficitur, vt lumina incurditate sine impedimento forberi possit, velut vnâ omnium corpus Vuarum. Fit autem Græcis Athoribus hac ratione, per artem succedente natura. Sarmentum, quod obtinendum est, quantum latebit in terra tantum findere debemus, & medullâ omni sublata, ac diligenter exalpta, membra iterum diuise partis adunare, & vinculo conficta deponere, Vinculum tamen papyro asserunt esse faciendum, & sic in humida terra esse ponendum. Diligentius quidam sarmentum reuinctum quantum excisum est, intra squilla bulbum demergunt, cuius beneficio asserunt facta omnia comprehendere facilius. Alii tempore, quo Vites putant, sarmentum finctum ferunt putatæ Vitis in ipsa vite, quàm possint de alto sublata medulla excavari, non ditium, & calano affuso alligant, ne possint inertiri. Tunc *betula*, quod Græci sic appellant, in excavata parte insundunt, ex aqua prius ad sapæ pinguedinem resolutum, & hoc tractatis octidnis diebus se nper renouant, donec Vitis germina nouella procedant. Et in granatis malis fieri hoc posse asserunt naturæ Græcis, & in cerasis epus est experiri.

Vites quæ lachrymarum nimietate tabescunt, & deplorando vim roboris sui auertunt à fructu, truncum earum lacerato Græci sinum fieri iubent. Si hoc minus proderit, radicem tobur pingue rescindi, vt asserat medicinam vulnus impellulam: tum insulsâ amurcâ ad medietatem decoctâ, & refrigeratâ plagæ excisio perlineatur, & sub hac acetum acie fundetur.

Vites lachrymarum.

Conditum vel absynthium, vel rosatum, vel violatum procedere spontè fertur ex vitibus [vt mata spon-tè nascuntur.] si sarmenta in vas aliquod semiplenum supradictis potuonibus mersa seruentur, & viuum terram simul resoluas ad lixiuii modum, donec oculi sarmentorum nitantur exire: tunc eadem sarmenta gemmantia in quo volueris loco, vitium cæterarum more deponas.

Vt Vitis botryones & albos asserre possit, & nigros. Græci sic fieri debere iusserunt. Si vicinæ sunt vites nigra & alba, citra putantur, sarmenta vtriusque inter se diuise liges, vt medios vtriusque generis oculos a quâdo reddere possint vnitati. Tunc papyro ligabis stricto, & molli, atque humida terra curabis adlinire, & interiectis ternis diebus adaquare, donec germen nouæ frondis erumpat. Hinc exempto tempore, si libuerit, genus effices per plura sarmenta.

Vt botryones & nigros nascantur.

Martio mense locis frigidis putatio vineatum celebratur, de qua abundè Februario mense locuti sumus, vsque quò incipit gemma esse suspecta. Vbi calor temporis ceperit, ligaturæ ipsi pinnicillo circa vespertam tenuis debet frequenter humor affundi, vt hoc alimento contrarium cæli torrentis animeatur. Cùm ergo getmen eruperit, & aliquod ceperit incrementum, calami adutorio debet annexi, ne motus aliquis frigiditatem

Putationis tempus.

lem procedentis farmenti quasset ætatem. Vbi solidius quantumcumque processerit, vincula oportet abscindi, ne adolescentia mollissimi germinis nodo dura contrictionis angatur. Aliqui infra terram semipedali spatio effossa vitu furculos inserunt, & beneficio congestionis accumulunt, vt hoc quoque nouis farmentis præter nutriticis alimenta subueniat. Nonnulli circa terras melius afferunt inserendum, quia in altioribus difficultus comprehendunt. Vique ad Idus, vel æquinoctium vites locis frigidis pangendæ sunt, seu pastinato, seu sulco, seu scrobibus, more, quo dictum est.

De nouellis puluerandis & fodendis vitibus.

Hoc mense nouella vinea incipit puluerari, quod nunc ac deinceps per omnes Calendas vsque ad Octobres faciendum est, non solum propter herbas, sed ne tenera adhuc femina, solidata terra confringat. Graminum radices, quæ plurimum vitibus nocent, extirpandæ sunt. Nunc locis frigidis vinearum fossio celebranda est: & palandæ, atque ligandæ sunt vites: sed nouellam mollibus vinculis alligemus, quia eam teneram vincula duriora præcidunt. Palis maioribus vitibus solidus, minoribus ponatur exilis: propter vimbres molestiam statuatur ab Aquilone, & plaga frigida, spatio quatuor digitorum, vel semipedis, motus à Vite, vt possit ex omni parte circumfodi.

Vi Getas Simeæ reparatur.

Vineas veteres nunc aliqui de terra altius truncant, studentes reparationi, sed vitiosum est. Nam plerunque vastior plaga Sole putrescit, & rotibus: quare hoc genere reparatur. Prius ablaqueabitur altius, donec eius nodus appareat: deinde infra terram supra nodum recidatur, vt operata, de frigore & Sole nil timeat. Hoc faciendum est, si optimi generis vitis sit, & altè posita. Omnia supra dicta locis calidis primo mense, frigidis verò, post Idus ipsius exequemur.

Vi agræ Simeæ resacilandæ.

Agros vites, vel quibus fructus arescit, circumfodias, & vinam veterem suffundes. Item cinerem farmenti, vel quercii acetum mixtum subiice, aut incisas circa terram letamine resoueto, & quæ germinant, fortiora dimitte.

Cùm Vitis bidente leditur aut ferro, plagam si terræ iuncta est, ad lineam stercore ouillo, vel caprino: tunc terra mista circumfossila ligare curato: si in radice læta est, operiens liquidum latamen admisce.

De nouella vitis (armata) resacilandæ & pampinandi.

Maior mense consideremus nouellæ vitis farmenta, quæ protulit, & ei pauca & solida relinquamus, & adminiculis firmemus, donec brachia prolata durecant. Non enim amplius refectæ, & pullulanti viticula, quam duæ vel tres materia relinquantur, & alligentur propter iniuriam venti. Idè autem tres materias dixi debere dimitti, ne dissipantibus ventis nulla remaneat, si in primordio reliqueris pauciores. Hoc mense pampinari conueniet: sed tunc est opportuna pampinatio, cùm teneri rami digitis stringentibus crepabunt sine difficultate carpentis: hac res Vitas efficit pinguiora, & maturitati consulit Solis admisso.

De occandis vitibus.

Hoc mense Vites quæ ablaqueatæ fuerant occare, hoc est, operire iam conueniet. Augusto maritimis locis vindemiæ apparatus vrgetur. Locis verò frigidissimis octauiæ vinearum fit. Hoc etiam tempore, si terra exilis in vinea est, & vinea ipsa inferior, tres, vel quatuor lupini modios in iugero spargis, atque ita occabis.

Quod vbi fruticauerit, euertitur, & optimum stercus præbet in vineis, quia letamen propter vini vitium non conuenit inferre vineis.

Nunc locis frigidis pampinatur, locis verò feruentibus, ac ficcis obumbratur potius Vua, ne vi Solis arescat: si aut vinea breuitas aut facultas operarum permittit. Hoc etiam mense extirpare possumus carectæ, atque filicetæ.

Extirpationis carectæ & filicetæ tempus.

Septembri locis tepidis maritimisque celebranda vindemia est, frigidis apparanda. Sed maturitatem vindemiæ cognoscimus hoc genere.

Maturitas Vite vt cognoscenda.

Si expressa vua, vinea quæ in acinis celantur sint fusca & non nulla propemodum nigra, quam rem naturalis maturitas facit. Vuas quas feruere volumus, legamus illicatas, neque acerbitate rigidas, neque in maturitate desuientes, sed quibus est & granum luce penetrabili, splendidum, & tactus cùm molli iucunditate callosus. Si qua sunt corrupta, vel vitiosa refecemus, nec patiamur interesse, quibus in ex pugnantibus acerbis contra blandimenta æstiuæ caloris induruit. Tunc incisos botryonum tenaces calida pice oportet ambiti, atque ita in loco sicco, frigido, & obscuro sine luminis irruptione suspendi. Vitis cuius fructus humore putrescit, per latera pampinanda est, ante trigessimam vindemiæ diem, & sola frons illa seruanda est, quæ in summitate posita Solem nimium defendit à vertice. Octobri vbi calidi, ac sicci aëris qualitas est, vbi exilis, & aridus est campus, vbi collis præruptus, aut macer, vites vitissimè ponuntur, de quibus satis mense Februario disputauit. Nunc locis ficcis, calidis, exilibus, macris, arenosis, aridis, quacumque de pastinis, de vitibus ponendis, putandis, propagandis, reparandis, vel arbutis faciendo, antè dicta sunt, rectius fiunt vt contra exilitatem glacie hybernis imbribus adiuuentur. Sic & humorem hibernis conferunt, & recisa, vel mercata glacie non adurunt, quia talibus locis pruinarum vis, & natura nascitur.

Ablaqueatio vineæ resacilandæ.

Post Idus Octobris ablaqueanda est omnis nouella vinea, seu in pastino, seu in scrobibus, aut sulcis, vt amputentur radices superuacuas, quas produxit æstate, quæ si conualuerint, inferiores radices faciunt interire, & ita remanebit vitis in summitate suspensa, quæ res eam frigori obnoxiam faciet & calori. Sed hæc radice non ad siccum debent recidi, ne aut plures inde nascantur, aut noua plaga corpori vitis impressa, vifecuturi algoris vtatur. Recidemus autem relicto digiti spatio. Est si placida ibi hyems est, a peritas relinquemus vites, si violenta, ante Decembres Idus operiemus, si perfrigida, aliquantum columbini stercoris sub ipsa hyeme circa viticularum vestigia largiemur, quod contra frigus nimium Columella dicit toto faciendum esse quinquennio. Hoc tempore idcirco locis quibus dixi, propagatio melior est, quia firmatis radicibus vitis in cumbit, cùm proferendi palmites eam cura non permouet. Gracii iubent si Vuam nimium imber infuderit, postea quàm multum eius primo ardore feruebit, vt ad alia vascula transferatur. Ita propter naturæ grauitatem remanens aqua subsidet, & translatum vinum purè seruabitur, relicto quicquid se illi ex umbræ miscuerat.

Novembri toto mense locis calidis, & ficcis, vel apricis, erit vitium celebranda positio. Nunc & propago iure dicitur, & locis frigidis nouellas vites, & arborum plantas circumfodere, atque operire conueniet, & ante Idus. Nunc mergis;

hoc est pnpaginis curuatura post triennium, quàm pressa fuerat, recidetur à vite.

Nunc ac deinceps vinea vetus, quæ in iugo est vel pergula, si robusto & integro trunco sit, ablata queata fimo facietur, & angustius putata inter quartum, & tertium pedem à terra viridissima parte corticis, acuto setramenti mucrone feriat, ac fossa frequentiùs incitetur. Nam (sicut asserit Columella) ex eo loco germen plerumque producit, & veniente Vere fundit materiam qua vitis reparatur antiqua. Nunc putatio Autumnalis celebratur in vitibus, maximè ubi inuitamur tepore prouincia.

Remedium vitium sine fruge luxuriantium

Locis calidis, & apricis vites quæ fructu carent, fronde luxuriant & pauperem satum compensant vbertate foliorum: nunc putare pressius conueniet: frigidis verò mense Februario. Si permanebit hoc vitium, circum fossas arena fluuiali, vel cinere debemus aggerare. Quidam lapides inserunt inter flexuosa radicum.

Remedium sterilitatis vitis

Isdem temporibus, & locis vitem quæ sterilis, fuerit Græci ita præcipiunt esse curandam. Trunco eius fillo lapidem asserunt includendum, & ibi vrinæ veteris humanæ quatuor cotulas circa truncum debere suffundi, vt ad radices in stillatiam ipsa descendat. Tunc adicienda est terra admista latamini, & circa radices solum omne vertendū.

Vt sua fruge in seruis seruetur

Græcis asserentibus, vt Vuam serues in vite vique ad Veris initia, circa ipsam vitem, quæ fructu plena est, loco vmbroso serobem fodies trium pedum latitudine, altitudine duorum, & mittis sabulonem, & ibi calamos figis, in quibus retorques assidue sarmenta fructibus plena, & illis boryonibus alligabis, vt solum non contingant, & cooperies, vt imber eò penetrare non possit: Item Græcis docentibus Vuas in vite, aut poma in arbore si diu seruari volueris, vasculis clausa fistulis ab ima parte pertusis diligenter à summo tecta suspende, quamuis poma & gypso cooperta in longam seruentur aratem. Et hæc sunt Palladii verba formalia.

Vindemia et instillanda. Praeox miscella nigra

Vuà tandem maturà vindemiam ita fieri oportet, vt videas à quo genere Vuarum, & à quo loco vini incipias legere: nam & præcox, & miscella, quam vocant nigram, multò antè coquitur, vnde prior legenda, & quæ pars arbuti, ac vineæ magis aprica prius debet descendere de Vite. In vindemiam diligentius Vua non solum legitur ad bibendum, sed eligitur ad edendum.

Repositio vitium

Itaque lectius desertur in forum vinarium, vnde in dolum inane veniat, electa in secretam corbulam, vnde in ollulas addatur, & in dolia plena vinaceorum contrudatur: alia, quæ in piscinam seu Amphoram picatam descendat: alia, quæ in aram, vt in carnarium ascendat. Quæ calcate vix erunt, earum scopi cum folliculis subiciendi sunt prælum, vt si quid reliqui habeant musti, exprimat in eundem lacum. Cùm desit sub prælo fluere quidam circumcidunt extrema, & rursus premunt, & rursus, cùm expressum, circumcisum appellant, ac seorsum, quod expressum est, seruant, quod respicit ferrum: expressi acinorum folliculi in dolia concitiuntur, eoque aqua additur, ea vocatur *lysæ*, quòd sorta acina, ac pro vino operariis datur Hyeme.

Scopi

Circumcisum

lysæ

Vuarum conferuandarum & recondendarum meminit Cato de re rustica, & Plinius cuius verba antè recitauimus.

Vires vitis viniferæ. Capitis doctæ

Vitis viniferæ folia cum clauiculis (*clauiculis*, capreoli) nita & imposita, capitis dolores mitigant, itemque stomachi inflammationem & ar-

dorem cum polenta. Idipsum etiam folia per se imposita præstant: quippe quæ refrigerandi adstringendique vim habeant. Potus eorundem succus iuuat dyfentericos, sanguinem excreantes, stomachicos, ac mulieres maliciâ laborantes. Eadem efficiunt macerati in aqua capreoli & poti. Lachryma vitium, quæ veluti gummi est, quæque circa illarum caudices concrefcit, ex vino pota, calculos pellit: inuncta lichenas, pforas, lepraque nitro affricto preparatas sanat. Eadem cum oleo sæpils pilis illitis plyphoræ effectum habet, maximè liquor quem censentia sarmenta vitium viridia exudarunt, quo & peruncta myrmecia tolluntur. Cinis autem sarmentorum & vinaceorum detrahit circa sedem condylomatis & thymis illitus ex aceto medetur. Prodest & luxatis ac viperarum morsibus: quin & contra lienis inflammationes proficit, cum rosaceo, Ruta, & aceto impositus.

Stomachi aridor.

dyfenteria Malacia

Calculus Lichen.

Pfora Lepra Plyphoræ

thymus Luxata Superarum, morsus.

DE OMPHACIO.

Omphacium, succus acerbae atque nondum maturæ Vuæ, Sole delatus ac resiccatus, potest ex cuiusvis vitis cruda ac immatura Vua confici, licet Diofcori ex Thasiæ solum aut Aminææ vitis Vua fieri referat, qui modum etiam resiccandi docet his verbis. Omphacium succus est acerbae Vuæ, seu Thasiæ, seu Aminææ nondum varians. Oportet autem ante Canis ortum expressum succum in ahero ex ere rubro, quod linitatem coëat, in tereaque semper totum id quod ipsi valè concrectum adhæserit liquido reliquo permiscere, atque noctu ipsum à locis subdialibus sub tectum referre: quandoquidem obitant nocturni rores, quominus spiffescat cogaturve. Eligendum est flauum, friabile, perquam astringens & linguam mordens. Sunt qui coctione succum condensent. Prodest contra tonsillas, Vuam oris, vlcera, gingiuis humore flaccidas, purulentaque aures, cum melle aut passlo: item ad fistulas, vetera vlcera, nomasque ex aceto. Dyfentericis & mulieribus fluxione vuluæ laborantibus clystere infunditur Oculorum quoque claritati confert, eorundemque scabritiæ angulifque atrosis conuenit. Bibitur & ad recentem sanguinis excretionem etiã ex ruptis vasib obortam. Sed eo admodum diluto & paucovtendum: siquidem potenter exurit.

Omphacium Vascibus. Dissectis

Delectatus

Vires & vltis

Fluxione

Vires an Galena.

Omphacium [vt Galenus proddit simpl. 4.] calidis morbis omnibus magno inuamento adhiberi potest, quippe cùm id omninò acidum sit, per se eò etiam refrigerat, vnicèque ardoribus prodest, siue ori ventris impositum, siue totis hypochondriis, siue cuiilibet alii, quòd refrigerare velimus, Omphacium quod in æreo vase inaruit, adstringendi ac insigniter resiccandi potentia pollet: particeps est & absterfionis ab æreo vase contracta.

Omphacium liquidam recentiorum.

Recentiores hodie Omphacium appellant, haud aridum Vuæ immaturæ succum, sed liquidum & consistentia vino similem, ex collectis ante maturitatem Vuis, præloque subditis expressum, qui deinde in vasa reconditus, in solatur, vel tepenti loco reponitur, vique dum efferefcens & sordes quasdam à se abiecerit, & sculentata resederint, & tunc quidem sale addito (vti acerbum permaneat) in vsum seruatur. Galli & Belgæ da verius passim, Latini ægressam: Ital.

Nomina linguarum Ital.

Ital. *agresto*: Hispani *agraz* appellunt. Et hoc Omphacium liquidum, siue *agresta*, refrigerationem, & egregie adstringentem facultatem habet, ori ventriculi gratum, nauseam, ac cibi fastidium tollit, appetentiam excitat, alui fluores reprimat: ardores viscerum mitigat, non modò sumptum, sed & foris admotum, sed tamen & iccinoti lienibusque obstructis parum vile: sunt qui maiorem Omphacio adstrictionem comparent, è siluestrium vitium visis [imò etiam silu. pyris & pomis] illud exprimentes, non ad medicamenta tantum, sed etiam ad ciborum condimenta.

Vinum omphacites. Omphacio liquido non asimile est Vinum Omphacites, imò reuera specie haudquam differens. Hoc Dioscorides refert peculiariter fieri in Lesbio. Vnà nondum planè maturà, sed adhuc acerba, ad tres quatuorue dies in cratibus siccatà Sole, donec racemi in rugas contrahantur: ex his postquam exprellum sit vinum, cadis in solari [Sole inueterari Plinius.] vim habere adstringendo stomacho amicam, & malacia laborantibus, ileosis, agrè concoquentibus & stomachi dissolutione vexatis, vilem. Credi & asorsortum pestilentibus affectibus auxiliari. Cæterum huiusmodi vina non nisi post annos complures potui apta sunt.

Quilibet Vuarum recens alium turbat, & stomachum inflat: quæ verò decerpita aliquandiu pendit, propterea quòd ea ventilatione magna humiditatis portio decessit, innocenter est, ac tum stomacho vitilis est, tum & appetentiam ciborum restituit, atque ad eòs ægis languentibus idonea est. In vinaceis & ollis seruata, ori stomachoque grata sunt: alium sistunt [sed vesicam & caput tentant] & sanguinem excreantibus conueniunt. Similes porrò sunt & quæ in mustum coniectæ suere. At quæ in sapa aut passio conditæ sunt, stomachum magis infestant. Seruantur & in aqua cælesti quæ prius Solem passa fuerint: sed ea parùm vinosa: sunt sticulis tamen, ardentibus ac diurnis febribus vitiles. Reconditi vinacei, inflammatis, præduris lacteque turbatis mammis cum sale imponuntur. Eorundem decoctum in summe dysentericos iuuat, & cæliacos, itè que feminas fluxione vuluæ laborantes, sed & ad deflectiones ac fetus vrsupatur. Cæterum acinorum nuclei adstringendi vim obtinent, stomachoque sunt vitiles: iidem tostii tritice ac polentæ vice inspersi, dysentericis profunt, itè que cæliacis ac stomachi dissolutione vexatis.

Vuarum [vt Galen. lib. 2. de alim. fac. memoria prodidit] quemadmodum inter fructus autumnales principatum obtinent: ita fugacibus omnibus magis nutriunt: minimumque prauis succi habent, præsertim cum exactam maturitatem fuerint adeptæ: porrò quòd ipsæ nutriant, maximo argumento sunt ii qui vinearum fructum custodiunt, pinguè qui tunc temporis Vuarum esu admodum pinguescant. Cæterum non omnes vno quidem modo nutriunt, quoniam quæ dulces existunt, cæteris succum habent calidiores, ob id sunt sticulosæ, ac ventriculum inflant, & alium subducunt. Contrarium efficiunt austeræ: siquidem & ventrem cohibent, parùm nutriunt, agrè que concoquuntur. Acerbæ autem vitari profus debent vtpote quæ ventriculo aduersatur. Vuarum è laudabiliores, quòd carnosiores fuerint, præsertim cum probè maturæ à vite decerpuntur. At pensiles, si prius maturæ sint, & dulces, cæteris minus ventriculum inflant

Tom. II.

& alium conuenienter emolliunt.

Capillos denigrare grana Vuarum asata in testa infusa in oleo, & sepulta in fimo per mensem, si eo oleo, vnguantur, testis Bayrus.

Grana ad capillos color.

Vuarum grana reposita in sacculos qui hieme calefiant in foraminibus fornacum ac pedibus noctu apponantur magni facio ad eos non solum calefaciendos, sed etiam ad roborandos, vt minis fluxiones arthriticas recipiant.

Ad pedum anbecul.

VVA PASSA.

Vua passa alba, inquit Diosc. adstringentior est. Prodest esitata earum caro arteriæ, tussis, renibus, ac vesicæ. Est ut cum nucleis per se contra dysenteriam, itemque admista milij ac hordei farina & ouo, in sartagine cum melle fricta sumitur. Sed & eadem ad eliciendam è capite pituitam tum per se, tum etiam cum pipere commanducata proficit. Testium quoque inflammationes sedat imposita cum lomento farubarum & cumini farina. Epinyctidas verò, carbunculos, fauos, putrescentiaque articulorum vlcera, atque gangrænas sine nucleis trita & cum ruta illita sanat. Conuenit & podagræ cum panacis succo adhibita: denique & mobiles vngues illita celerius extrahit.

Vires ex Dyse.

De Vua passa. Galz. de Alim. hæc prodidit: Vuarum passa cum aliis Vuis eandem habent rationem, quam carica cum ficibus. Multa enim sunt dulces, acerbæ autem omninò pauca: plurimæ verò ex dulci & austeræ qualitate sunt mistæ: quanquam dulces non nihil quoque austeræ qualitatis habent: & austeræ dulcedinis. Cæterum vt dulces temperamento sint calidiores, ita austeræ frigidiores. Ad hoc austeræ stomachum roborant, & ventrem constipant, & his multò magis acerbæ: mediam autem quodammodò inter ipsas constitutionem dulces obtinent vt quæ nec alium subducant. Dulcibus tamen, vt vis quædam semper inest contemperandi, ita & medio-criter detergendi: quibus duabus facultatibus exiguas modicationes, quæ os ventriculi infestant, obtundunt. Et libro 8. cap. 7. de compos. pharm. locos, idem Galenus sic inquit. Vua passa contemptibilis videri possit, oh familiaritatis eius vsum. At verò hoc ipsam eam facit vtiliorem: nam cum familiaris sit nobis, in tantum adstringens est, quantum opus habet viscus affectum. Habet autem & vim concoctoriam crudorum humorum, & vim coercendi maligna, sitque ipsa haud facile putredini obnoxia: & vltra hæc secundum totam substantiam, visceri ipsi, hoc est iccinori, familiaris, & propria est. Item libro de attenuante victus ratione, sic habet. Vuarum passæ si non sint adstringentes, leni quidem, & hepatis tumentibus non conducunt, thoracis tamen, & pulmonis affectibus conducunt. De Vuis autem passis, vt cibus sunt, locus est ipse Galenus lib. 2. de alim. fac. his verbis. Alimentum ex passis vuis tali qualitate in corpus distribuitur, qualis ipsarum natura fuerit, dulce ex dulcibus, austerum ex austeris, mistum ex iis, quæ vtriusque qualitatis sunt participes. Quantitate verò copiosius ex pinguibus, ac dulcibus, parcius ex austetis, & macris. Quod si passarum pinguium, ac dulcium, à quibus semina fuerint exempta, parum molem, cum pari Vuarum mole contuleris, passas valentius nutrire deprehendes. Huiusmodi sanè, vt minus quam carica subducit

Vires ex Galen.

Decessum insusum.

Austeræ.

Acerbæ.

Dulces.

H

cant, abstergeantque, magis tamen quam illæ stomachum iuuant.

Sententia
multorum
reprobatur.

Ceterùm *Vuas passas*, quatum vbiq̃ vulgaris & frequens est vsus, omnibus notissimas esse arbitror, inquit Matthiolus. Verumtamen non est, meo quidem iudicio, credendum, quod cum de *Vuis passis* mentionem faciunt Galenus, & Veteres alii, paruulas illas tantùm intelligant, quæ hoc tempore ex quibusdam Aegæi insulis, ac Peloponneso, Venetias conuehantur, & in quibusdam etiam Italiæ locis insolantur. Siquidem Galenus nulla magnitudinis, vel paruitatis habita ratione, omnes in vniuersum *vuas* Solis calore ficasas, *passas* appellat. Id quod ipse Galenus libro secundo de alim. facius verbis declarat. Porro quemadmodum *passarum* differentia, quæ à colore sumitur, nihil ad *passarum* facultatem conseruit, ita nec magnitudo: sola autem qualitas, quæ gustui inest, differentia, potest omnia. Ex his nimirum Galeni verbis satis colligi potest, ipsum omnium generis *Vuas*, quæ Solis feruore flaccescunt, nullo proforsim discrimine *passas* appellasse, nempe *Damascenas* ceteris grandiores [Zibibum officinæ vocant] ac pariter his congeneres, quæ è Smyrnis (vt aiunt) Cypro, & Creta comportantur. Præterea loco citato idem Galenus ita scribit: Nonnulli autem, & rectè sanè, è dulcibus, grandibusque, quales sunt *Scybelitides*, priuquam mandant, semina eximunt: quæ & ipse inueterata, cutim duram, crassamque habent, easque prius in aqua coguntur macerare: nam & semen ipsum faciliùs sic eximuntur. Aliæ quædam sunt his contrariæ, solidæ, & crassæ, quæ nullum proforsim semen habent. Crescunt hæc in Cilicia, colore subflauo. In Pamphylia autem *Scybeliticæ*, & colore nigræ: quæ, vt dixi, sunt maximæ, hæc ille. Ceterùm sciendum est, non omnes *Vuas passas* eiusdem esse facultatis: alia namque facultas inest dulcibus, alia austeris, alia vinaceos habentibus, alia non habentibus. Quæ itaque vinaceis carent, vel quod ita naturâ producantur, vel quod in arte fuerint exempti, si dulces sint, adstringente facultate vsque ad eò priuantur, vt etiam mirificè leniant: quamobrem peccoris angustis, tussi, exasperatis faucibus, & renum, vesicæque vitis maximè conueniunt. Id quod planè confirmat Galenus lib. 7. & 8. de comp. medic. sec. loc. vbi *Vuas passas* sine vinaceis leniendo peccoris, ac ictericis plurimum commendat. Contra verò, facultate omninò adstringente censentur, quæ cum suis vinaceis manduntur. Quod cum non ignoraret Dioscorides, *Vuam passam* cum nucleis in dysenteria edendam esse tradidit. Hinc itaque fit, vt maximo in errore versari existimem Medicos alioqui ætatis nostræ celebres, qui alii deiciendæ gratia, *Vuam passam* paruam vulgatem, quæ ex locis suprâ dictis in Italiam defertur, & simul cum vinaceis deuorandam exhibent, quippe cum alium fluidam facere in animo sit, eam potius cohibent, quàm lenientidque potissimum, vbi *Vuæ passæ* temporis tractu succi pattem amiserint. Quæ re perspectâ in hanc sententiam deducor, vt ad alium emolliendam aptiores censent *Damascenas*, *Cyprias*, ac *Creticas* [quibus tamen prius nucleis exempti sint, vel exsumantur, quæ sine nucleis nascuntur] quàm quæ minuta passim in Officinis inueniuntur, quandoquidem hæc succi longè minus, quàm corticis, & vinaceorum continent, nisi sint omninò recentes, & diligenter asseruata. Quapropter si hoc tenui *Vuatum* *passarum* genere vti quandoque cogimur ad emolliendam alium, eas eligi

Medicorum
error.

præstat, quæ sine vinaceis proueniunt: vel si hæc defint: suppleant illæ, quæ à nucleis fuerint expurgatæ, tametsi *Damascenas*, & *Creticas* longè bonitate cedant: de quibus sanè intellexit Galenum, easque ad peccoris vitia laudasse, planè suspicamur. In quorum genere hæc etiam tempestate sunt, quæ semine carent, quemadmodum quæ Galeni ætate esse Cilicia conuehebantur. Illud porro animaduertendum est, quod vbi quis alium bonam facere contendit, non debet *passis* vti, quæ gustui acerbam, vel austeritatem relinquant: sunt enim tales frigida, ac terrefres, quibus vtique facultatibus cohibent, adstringunt, & roborant, præsertim si cum vinaceis nucleis comedantur.

Vuarum *passarum* sciendarum rationem hanc tradit Columella. *Vuas*, inquit, dulcissimi saporis albas maximis acinis, nec spissis, Luna de crescente sereno, & sicco cælo post horam quintam legi oportet, & in tabulas paulisper potrigi, ne inter se pondere suo pressæ collidantur: deinde ahenò, vel in olla noua fictili ampla, preparatam lixuriam cineris samentis calefieri conuenit, quæ cum feruebit exiguum olei quàm optimi adici, & ita permisceri: deinde *Vuas* pro magnitudine binas vel ternas inter se colligatas in ahenum feruens demitti, & exiguum pati, dum decolorentur, nec rutilus committere, vt excoquantur, nam quadam moderatione temperamentoque opus est. Cùm deinde exemeris, in crate disposito rariùs quàm vt altera alteram contingat. Post tres deinde horas vnquamque *Vuam* conuertito, nec in eodem vestigio reponito, ne in humore, qui defluerit, corrumpantur: noctibus autem contegi debent quemadmodum fici, vt à rore, vel pluuia tutæ sint: cùm deinde modicè aruerint, in vasa noua sine pice operculata & gypata, sicco loco reponico. Quidam *Vuam passam* foliis ficulneis inuoluunt, & assiccant: alii foliis vitignis, nonnulli plataninis semiuitas *Vuas* contegunt, & ita in amphoras recondunt. Sunt qui calmos sube exurant, & ex eo, quod cremauerint, cinere, lixuriam faciunt: deinde in lixiurâ sextarios decem salis tres cyathos, & olei cyathum adiciunt: tum adhibito igne calefaciant, & cetera eodem modo administrant. Quod si videbitur in ahenò parùm inesse olei, subinde quantum satis erit adiciatur, quod sit pinguior & nitidior *Vua passa*.

Vuam autem *passam* præceptore Palladio, sic facies. Meliores acinis, & dulcis, & lucidi botryones in ipsa umbra suspendis, & *Vuam* constrictam cùm ponis in vasculis substernis pampinos sicco algore frigentes, & manu comprimis, & vbi vas impleueris, item pampinos addis nihilominus non calentes, & operculahis, ac statues in loco frigido, quem nullus sumus infestet.

Non pessulani *Vuam* dum parant, racemos binos hinc illinc filo ligatos vitiosis acinis forfice detrahis, feruenti lixinio addito olei paululò immergunt, quoad flascant tantùm & corrumpentur: deinde peritici imponunt, vt siccescant, ac post triduum quadriduuum insolant, vt & Columella docet.

Passas Græci vocant *πυρρίδας*, quasi conculcatas, non quidem quod conculcentur, sed quòd ob resiccationem calcatis similes videantur.

MUSTVM.

Genera multi.
(M. Plin.)
Genera multi hæc recenset Plinius l. 14. c. 19. Cifibiles multi genus in Galatia nascens, & Halynium in Sicilia. Medium inter dulcia vinumque est quod Græci Agleuces vocant, hoc est, semper mustum. Id euenit cura, quoniam feruere prohibetur. Et l. 23. c. 1. Musta differentias habent naturales has, quod sunt candida, aut nigra, aut inter vtrumque: aliâque ex quibus passum: cura differentias innumerabiles facit. In plenum ergo hæc dixisse conueniat.

Nomina.
Linguar.
Mustum, liquor videlicet recens ab uuis calcatis, aut torculari subditis effluens. Græci γλυκύ, & Νύκιν. Τάρχαο, & εἶνος πέρην. Epigram. Al. Mosti / weinmost. Belg. Most. Gall. Mouff. It. Musto. Hisp. Mosto.

Mustum li-
quium.
Mustum lixium Colum. protropium Phn. quod in lacum fluxit priusquam prælo pressum sit. *νίκιν* Polluci, *εἶνος πέρην* Apollodorus. Al. Vorführungwein, trumffwein. Belg. Leetzweyn / most ban sels gheleest. Gall. La mere goutte. It. Vino mosso de giocosa. Hisp. Mosto de vino del tintin.

Mustum
tertium.
Mustum tertium Colum. quod post primam pressuram vinaceorum exprimitur, Al. wein bem nachdruck. B. Most laest wurgepress. Gall. Vin ou mouff de pressurage. Ital. Mosto dultimo torchio. Hisp. Vino de musto torcido, e quod sale del husillo.

Mustum vi-
roto dures
anno.
Mustum si uoles totum annum habere, M. Catione tradente, in amphoram mustum indito, & corticem oppicato, demittito in piscinam, post trigessimam diem eximito, totum annum mustum erit.

vt dulce
permaneat.
Mustum vt semper dulce, tanquam recens permaneat sic facio, inquit Columella, antè quam prælo vinacea subiciantur, de lacu quàm recentissimum addito mustum in amphoram nouam, eamque oblinito, & impicato diligenter, ne quicquam aquæ introire possit: tunc in piscinam frigida & dulcis aquæ totam amphoram mergito, ita ne qua pars extet: deinde post dies 40. eximito, sic, sicut in annum dulce permanebit.

Musti vires
et sicc.
Mustum recens flatu ventriculæ & intestina implet: difficile concoquitur: crassi est succi: & nisi celeriter descendat, nocentius etiam efficitur. Hoc autem vnum illi tantummodò bonum, vt Galenus ait, adest, quod ventrem deiciat. Cistissimè autem secedit dulcissimum, ac ex maturis uuis expressum. Quod verò ab acidis & austereis redditum, ad omnia pessimum est: magis inflat, difficiliius concoquitur, crudiores ingenerat humores. Et tamen alio perturbat etiam descendat, colicos tamen sæpenuerò simul ingenerat humores, & calculi molestias adfert. Quod si verò alius etiam non commoueat, grauiora ac molestiora omnia sunt: frequenter verò & lienteriam & dysenteriam efficit: tale succo Vuarum respondet, & citò quoque descendit. Postenus vinaceorum, folliculorum, ac scaporum naturæ paticeps, deterius est. Mustum omne, auctore Plinio, stomacho inutile, uenis iucundum. A balneis raptum & sine interpiratione potum, necat. Cantharidum naturæ aduersatur. Item serpentinibus, maxime hæmorrhoidi & salamandræ. Capitis dolores facit, & gutturi inutile. Prodest renibus, iocinori, & interaneis vesicæ: colleuat enim ea. Pnuatum contra buprestin valet: Contra meconium, laetis coagulationem, cicutam,

Tom. II.

tozica, dorycnium, ex oleo potum, redditumquè vomitionibus. Ad omnia infirmius album, iucundius passum mustum, & quoddam minorem capitis dolorem afferat: Si quod animal, ait Columella, in mustum ceciderit, & intenerit, vt serpens, aut mus, foréxue, ne mali odotis vinum faciat, ita vt repertum corpus fuerit, id igne aduratur, cinisque eius in vas, in quod deciderat, frigidus infundatur, atque rutabulo ligneo permisceatur, ea res erit remedio.

SAPA SIVE HEPSEMA.

Confectio
sapa.
EX musto ingenii non naturæ operâ conficitur quod Græci ἑψήμα ὑγιεινόν vocant, Latini Sapa & defrutum: cum videlicet mustum dulcissimi saporis ad tertias decoquitur, vt Columella ait. Plinius Sapa & Defrutum decoctionis modo differte asserit: & sapa quidem fieri musto ad tertiam partem reducto: defrutum ad dimidiam. Siraum, inquit lib. 14. cap. 9. quod alii ἑψήμα, nostri Sapa appellat, ingenii non naturæ opus, musto ad tertiam partem mensuræ decocto: quod vbi factum ad dimidium, defrutum vocamus. Palladius his Carocentum adicit quod ait fieri cum tertia perdita, duæ partes remanserint. Leontius in Geoponicis hepsēma ex musti partibus octo, & vini centum, ad tertias decoctis conficiendum refert. Galenus tamen ἑψήμα esse mustum plurimum decoctum testatur: Recentiores hepsēma siue sapa, vinum coctum appellant. Mustum quam dulcissimi saporis decoquatur ad tertias, & decoctum, sicut supra dixi, Defrutum vocatur: quod cum defixit, transferatur in vasa, & reponitur: vt post annum sit in vsu, inquit Columella, qui in huius coquendi ratione multus ac prolixus est.

Vini habet Sapa calfaciendi, non tamen æquè vt vinum, hoc autem crassior est, minus facillè distribuitur, tardiusque per vinas descendit, per ventrem verò subinde citius, nam hunc modicè seducit. Nutrit autem valenter, & corpus citò implet, in ventriculo tamen propter crassitatem alquantisper hæret, ac iocinori aut heni minus idonea: concoquit etiam sapa crudos humores, pectori ac pulmone inhaerentes, eorumque citam expurgationem procurat. Tussi idcirco ac respirandi difficultati auxiliatur. Galen. lib. 3. de med. sec. loca, Sapa aurium etiam dolores leniri tradit. Refert autem non parum, ex cuiusmodi musto sapa confecta fuerit. Nam ex optimi ac generosi vini musto procul dubio præstatur est, atque ad omnia supra scripta efficacior: ex renuis verò ac oligophori vini musto, imbecillior & minus efficax. Carenum Sapa Marcell. appellat, vulgè Vin cuir, at defrutum Resine. Plinius Sapa in adulterium mellis excogitatum ait.

DE DEUTERIIS ET SECVNDARIIS,
vini generibus tribus.

NON possunt, inquit Plinius lib. 14. cap. 10. Deuteriis iure dici vina, quæ Græci Deuteria appellat, Cato & nos loram, maceratis aqua vinaceis: sed tamen inter Vina operaria numerantur. Tria eorum genera. [Leg. Decima parti musti quod expressum sit, pari aquæ addita, & ita nocte &c. Dal. ex Colum. & Diosc.] Decima parte aquæ addita, quæ musti expressa sit, & ita nocte ac die madefactis vinaceis, rursusque prælo subiectis.

H 2

Tertium

Alterum, quemodo Græci factitauerè, tertia parte eius quod expressum sit, addita aqua, expresso que decocto ad tertias partes. Tertium est, fæcibus vini expressum, quod fecatum Cato appellat. Nulli ex his plus, quàm anno, vsus.

Prioris Loræ compositionem Columella etiam docet, ex tanta nempe aquæ qualitate, quanta est musti expressa decima, vinaceis superfusa, sed adici ait præterea spumam defrutii siue sapæ: & fæcem ex lacu: quorum Plinius non meminit. Quantum, inquit, vini vno die feceris, eius partem decimam, quot metretas efficiat, considerato, & totidem metretas aquæ dulcis, in vinacea, sed quibus vnus diei vinum expressum sit, addito. Eodem & spumas defrutii, siue sapæ, & fæcem ex lacu confundito, & permisceto, eamque tritum macerari vnâ nocte finito, postero die pedibus proculcato, & sic permistam prælo subiicito: quod deinde fluxerit aut dolis aut amphoris condito, & cum defruberis, obturato. Commodius autem feruatur in amphoris. Hanc ipsam loram M. Columella ex aqua vetere faciebat, & nonnunquam plus biennio innoxiam feruabat.

Loram Græci faciat Dioscorides

Deuteria, Puzos

Tempus. Vires. Vini subtilitatem

Compositio. Lora differens duplex Gal.

Prior, semphylis Græci de dicta Altera, deuteria Atticorum. Vinum adynamon

Tertia lora compositionis

Dioscorides similem aquæ ad mustum, modum ac proportionem retinet, sed à vinaceis loram expressam ad tertias recoquit, additque ad singulas metretas, salis sextarios duos, & huiusmodi Loram non modò *δευτερια*, sed & *πημων* nuncupari refert his verbis. Lora, quam Græci Deuteria, alii potimon appellant, paratur hunc in modum. In vinacea, è quibus vini triginta metretæ expressæ fuerint, tres aquæ metretas adicit: ac vbi vinacea ipsa versaueris calcauerisque, exprimito: expressum decoquo ad tertias partes, & in singulos residui congios salis binos sextarios addito, ac post hyemem in cados defundito. Eo post annum vitior: celeriter enim exolefcit. Conuenit portò agris, quibus vinum propinare dubitamus, & cogimur tamen ipsorum desideria obtemperare: itémq; à longa valetudine sese recolligentibus.

Galenus verò 2. de alim. facult. multò differentis huiuscemodi Loræ compositiones, & quidem duas habet: Vinaceis, inquit, in parua doli coniectis, tantùm aquæ superfunditur, quoad omnia permeadeant, quod vbi satis visum factum fuerit, in doli fundo foramen aperitur, vt dilutum effluat, idque pro vino bibunt. Deinde tursus, ait, aliam aquam, parcioem tamen prioris, vinaceis affundunt: sic vt hoc quoque potior sit attemperatum: Priorem *σημυλητον* appellari refert, ab ipsis nempe vinaceis, quæ Græcis *σημυλα*: Alteram verò Atticæ proprietatis curiosos propriè *δευτερια* dici velle.

Secundam Plinii Loram Dioscorides quoque videtur descripsisse, sed tamen non tertiam ad mustum aquæ, vt Plinius, partem accipit, sed musti & aquæ æquales: Fit & vinum, ait, quod vocant adynamon, viribus iisdem quibus Lora præditum. Pares aquæ & musti mensuræ leniter ac lento igne feruehant, dum excoquatur aqua, reliquum vbi restixerit, in vas picatum transfunditur. Alia aquæ marinæ & pluuiæ, mellis atque musti pares miscentur portiones, elutriant, & in Sole quadraginta diebus torrent. Huiusmodi potu ad eadem illa omnia post annum vtuntur.

Tertiz verò Loræ compositionem, Dionysius Vticensis in Geoponicis Constantino Imperatori dicatis haud absimilem habet: *σημυλα*, inquit, hoc est, *δευτερια*, post musti de fluxum mox efficienda sunt, & in doli reponenda ac concultanda. Etenim *σημυλα*, id est, fæc ex his, quam patri

lingua *σημυλα* vocant, haud iniucundus fit ruralibus pralo. Conficitur autem hæc lora, ex vinaceis prælo antè non subiectis, sed à quibus mustum tantummodò, citra pressuram defluxit ac percolatum est: Quid enim ab ipsis exprimi vltèriùs poterit citra liquoris affusionem, vbi semel prælo subdita fuerint.

Vini genera.

Nunc genera vini prosequamur, quorum alia Nalis gratiora esse quis dubitet, inquit Plinius lib. 14. c. 6. aut non ex eodem lacu aliud præstantius altero germanitatem præcedere, siue testis [natura] siue fortuito euentus [arte.] Quamobrem de principatu se quisque iudicem statuat. Iulia Augusta, octoginta duos annos vitæ Pucino [Pizzino de Istria] vino retulit acceptos, non alio vsu. Gignitur in sinu Adriatici maris, non procul à Timano fonte, faxeo colle, maritimo afflatu paucas coequent amphoras. Nec aliud aptius medicamentis iudicatur. Hoc esse crediderim, quod Græci celebrantes niris laudibus pycanon appellauerunt, ex Adriatico sinu. Diuus Augustus Setinum [Setia oppidum in colle, à Tarracina paludibus quinque millia distitum: hodie Sezza] prætulit cunctis, & ferè secuti principes, confessa propter experimenta, non remerè cruduituribus noxiis [in ea salebra Dal.] ab ea salua. Nascitur supra forum Apii. Antea Cæcubo erat generositas celeberrima in palustribus populis, sinu Amyclano: quod iam intercidit & incuria coloni locique angustia, magis tamen fossa Neronis, quam à Baiano lacu Ostianum vsque nauigabilem inchoauerit. Secunda nobilitas, Falerno ægro erat, & ex eo maximè Faustiano. Cura culturaque id collegerat. Exolefcit quoque hoc, copia potiùs, quàm bonitati, studentium. Falernus ager à ponte Campano leua petentibus vrbanam coloniam Syllanam nuper Capuæ contributam incipit. Faustianus autem crater quatuor milliaria à vico portu Cædias, qui vicus à Sinuesis 6. millibus abest. Nec vlli in vino maior autontas: solo vinorum flamma accenditur. Tria eius genera austerum, dulce: tenue. Quidam ita distinguunt, summi collibus Gauranum [Caucanum cu.] gigni, medius Faustianum, imis Falernum. Non omitendum autem nulli eorum, quæ celebrantur, incundum vaporem Vux esse. Ad tertiam palmam variè venèrè Albana vrbis vicina, prædulcia [*παρθενη*] subtilce esse, non prædulce. Athenæus lib. 1. ex Hale no asserit,] ac rara in Austero. Item Surrentina in vineis tantùm nascitur: conualecentibus maximè probata, propter tenuitatem salubritatemque. Tiberius Cæsar dicebat consensisse medicos, vt nobilitatem Surrentino darent, alioquin esse generosum acetum. C. Cæsar, qui successit illi, nobilem vappam. Certant Maflica,

[nec veteris pocula Mafsicæ.

Horat.] aquè, ex monte Gaurano [Gaulo cu. in emend. Gauro] puteolos Baiaque protectantia. Nam Falerno contermina Satana ad principatus venèrè non dubiè: palamque fecere sua quibusque terris tempora esse sicut rerum prouentus, occasusque. Iuncta his præponi solebant Calena, & quæ in vineis arbutifug; nascuntur, Fundana, Ex (vt) alta vicina vrbis Veliterna, Priuernatiæque. Nam quod Signiæ nascitur, austeritate ni

Vini genera Plinio.

Vinum naturale & artificiale.

Pucinum.

Locus.

Aptum medicamentis.

Pycanon Græcorum.

Setinum Augusti.

Cæcubum.

Faustianum tria genera. Gauranum Faustianum Falernum.

Albana.

Surrentina.

Maflica.

Satana. Calena, Fundana Veliterna. Priuernatiæ.

ma continenda vitale alio, inter medicamina numeratur. Quartum [auctoritatis & nobilitatis gradum. Sumpta metaphora ab aurigis, qui curru in Circo certabant:] curriculum publicis epulis obtinere à Diuo Iulio [is enim primus auctoritate his tribuit, vt in epistolis (epulis) eius apparet] Mamertina. circa Messaniam in Sicilia genita. Ex iis Potulana, ab autore dicta, in loco proximo Italiae laudantur præcipue. Est in eadem Sicilia & Taurominitanis honos, lægenis pro Mamertino plerumque subdins. Ex reliquis autem à supero mari Prætutia, atque Anconæ nacentia, & quæ à palma vna fortè enata, Palmesia, appellatur. In mediterraneo verò Cefenatia ac Meccenatiana [A Meccenate, Augusti familiari & fido amico, regio sanguine orto, quod Horatius palam scit.] In Venonensi item Rhætica, Falernis tantum posthabita à Virgilio 2. Georg. --- & quo te carmine dicam Rhætica? (Admirantis hoc esse Plinius existimat: Seneca verò, incerti laudaturus, an vituperaturus sit. Turn. cap. 26. lib. 29. Magis placet Plinii expositio: Nam & ipse ea hauriens egregie mirabar terrenæ & conuallium sanguinis bonitatem.) Mox ab intimo sinu maris, Adriana. Ab infero autem Latiniensia, Grauisca, Statoniensia. Hetruriz palnam Luna habet, Liguriz Genua: Inter pyreneum Alpesque Massilia gemino sapore, quando & condis aliis pinguius, [Nigrius & crassius] gignit, quod vocant succosum. Beterarum (Biterarum Dal.) intra Gallias consistit auctoritas. De reliquis in Narbonensi genitis alleuerate non est: quoniam officinam eius rei fecere tingentes fumo [vinum id Plato Comicus apud Athenæum *καπνισμὸν* vocat: Martialis fumos Massilianos] vinamque non & herbis ac medicaminibus noxiis. Quippe etiam aloën mercantur, quæ saporem colorémque adulterant. Verum & longinquiore Italiae ab Ausonio mari, non carent gloria, Tarentina, & Seruittiana, & Consentia genita, & Temples Babia (Balhis, Herniol. in Diosc. Barbina vina eadem esse putat, quæ Athenæus Barbarina vocat.) Lucanaque antecedentibus Thurinis. Omnium verò eorum maximè illustrata Messilæ potu & salute Lagarina, non procul Grumento nacentia. Campania nuper excitauit nouis nominibus auctoritatem, siue cura, siue casu, ad quartum à Neapoli lapidem Trebellicis, iuxta Capuani Caulinis, & in suo agro Trebulanis [Italorum vulgò Trebiano] Aliqui semper inter plebeia & Trifolinis gloriantur. Nam Pompeians summum to. annorum incrementum est, nihil fenestà conferente. Dolere etiam capitum in sextam horam diei sequentis infesta deprehenduntur. Quibus exemplis, nisi fallor, manifestum est, patriam terramque referre, non Vuam: & superuacuum generum consecrationem in numerum, cum eadem vitis aliud aliis in locis polleat. Hispaniarum Laletana (Lustana M. Laitana CH.) copia nobilitantur, elegantia verò. Tarracensis, atque Lauronensis, & Balaerica ex insulis, conferuntur Italiae primis. Necigno, multa prætermissa pletoque existimaueros, quando suum cuique placet, & quocumque eatur, fabula eadem reperitur: Diui Augusti iudiciorum ac palati penitissimum è liberis, censuram vini in epulas eius facientem, dixisse hospiti de indigena vino, nouum quidem sibi gustum esse eum, atque non ex nobilibus, sed Cæsarem non aliud poturum. Nec negauerim & alia digna esse fama:

Tom. II.

sed de quibus consensus xui iudicauerint, hæc sunt.

Et eiusdem l.c. 7. Nunc simili modo transmarina dicemus: in summa gloria post Homericam illa, quæ diximus, fuisse Thasium Chiumque. Ex Chio quod Aruifum vocant (ab agro aspero & importuoso insula Chii: Strabo 14. Verg. *Vina, nouum fundæ calathis Aruifis nebar*: quamuis aliqui legat Arethusia.) His addidit Lesbium Erastriatim Medici auctoritas, circiter de. annum vrbis Romæ. Nunc gratia ante omnia est Clazomenium, postquam paruis mari condiunt. Lesbium sponte natura (sue mare sapit. Nec Tmolus per se gratia, vt vino: sed cuius dulcia admisto, reliquorum duritia suauitatem accipiat, simul & aratem quoniam vetuliora protinus videtur. Ab his dignatio Sicyonio, Cyprio, Telsefico, Tripolitico, Berytio, Tyrio, Sebenyitico. In Egypto hoc nascitur tubus generibus vuarum ibi noble, Thasia, athalo, peuce, Athalo, quasi fuliginosa: Peuce quasi picea.] Posthæc auctoritas hippodamantio, nylico, canthantæ. (A cantharorum dolis. De canthate vite Theophr. c. 20. l. b. 2. de Causis) protropo Gnidio, Catacecaumeniæ (quasi retortido, *κατακεκαυμένη* regio 500. stad. longitudinis 400. latitudinis Myciæ vitina exustæ similis, vino generoso celebris, de qua Strabo lib. 13. & 14.) petita, Myconio. Nam melogiten capitis dolores facere compertum est: nec Ephesium salubre esse, quoniam mari & defuto condiatur. Apauenum nullo præcipue conuenire dicitur, sicut partium in Italia. Est enim & hæc proprietates generum, vt dulcia vitæ inter se non congruant. Exoleuit & Protagion, quod Italicis proximum fecerant Acleptidis scholæ. Apollodoros Medicus in volumine, quo fuisse Ptolomæo regi quæ vina biberet, Italicis etiam tum ignotis, laudant in Ponto Naspei ceniten, mox Oroeticum, Oeneaten, Leucadium, Ambraicoten & quod cunctis, prætulit Præparetium. [Præparethium Turr. & nobis] sed minoris famæ esse dixit, quoniam post sex annos non placeret.

Et eiusdem lib. c. 14. Vinum omne dulce minus odoratum: quò tenuius, eò odoratius. Est vini genus quod vocat dulce Narbonensis provincia & in ea maximè Vocontii. Aferatur eius gratia Vva diutius in Vite, pediculo intorio. Ab aliis ipse palmes inciditur in medullam, ab aliis vva torretur in tegulis: omnia ex Heluenaca vite. His adiciunt aliqui, quod vocant diachyton, Vuis in Sole siccatis loco clauso per dies septem, in cratribus, rotidem pedes à terra altè, noctibus à rore defensis, octauo die calcatis. Ita fieri optimi odoris saporisque.

Sunt & in vino prodigia, id perhibente Theophrasto, Athenæo & Plinio. Dicitur enim Arcadia fieri quod fecunditatem [sterilitatem] Theophr. *ατρωδὸς τοῦ* scaminis importet, vitis rabiem. At in Achaia maximè circa Caryniam [Charmiam CH. Cabyniam Theophr. Caryniam Athenæo. Addit Theophrastus, canibus, si Vuas gustauerint, etiam caculos elidi.] abigi partum vino, atque etiam si Vuam edant grauidæ, cum differentia in gustatu non sit. Trezenium vinum qui bibunt, negantur generare. Thasios duo genera vini diuerfa facere proditur: vnum quo somnus concilietur, alterum verò quo fugetur. Apud eisdem vitis theiæ vocatur, cuius & vinum & Vva contra serpentium ictus medetur. Libanios thuriz odore, ex qua Diis

H 3

Mamertina
Potulana.
Taurominitanæ

Prætutia
Palmesia.
Cefenatia.
Meccenatiana.

Rhætica.

Adriana.
Latiniensia
Grauisca
Statoniensia.

Beterra.
rmm.
Fallica.

Italica
Tarentina
Seruittiana
Consentia.
Temples
Babia
Lucana.
Thurina

Lagarina

Trebellica.
Caulina.
Trebulana.
Trifalina.
Pompæiana.

Lalera.
Tarracensis
Lauronensis
Balaerica.

Lesbium

Clazomenium.
Tmolus
Sicyonium.
Cyprium
Telsefico
Tripolitico
Berytium
Sebenyiticum
Myssicorum
Gnidium.
Myconium
Nespeiticum.

Ephesium.

Apauenum

Protagion

Naspeicenis
Oreticum
Oeneates

Vina dulcia
Diachyton

Vina prodigiosa.
Achaia

Trezenium
Thasium
duplex.

Theiæ.

Libanum

HISTORIAE PLANTARVM.

Aspendium Vnde dicitur.

prohibant. E diuerso Apendios [Quidam sic di-
gam interpretantur ab Aspando vrbis Pamphy-
liae. Lego Aspendos, vel Apendios, à particula
priuationis Graeca & verbo ἀπιδίο libare, vt Vua
fit, cuius vino Diis libare nefas est.] damnata aris.
Ferunt eam nec ab alite vlla attingi, Thasiam V-
nam Aegyptus vocat apud se prædulcem, quæ
soluta alium. Est contra in Lycia, quæ solutam
firmat. Aegyptus & Echolada habet, ab ortu mutan-
tur quædam, posteaque restituntur sibi. Sic &
mani navigato cuius in Statu his quæ dura uentis
tantum vet uistatis adiciere sentitur, quantum ha-
buerint.

Lycium Aegyptum Echoladum.

Setinum Martialis.

Vini Setini, quod Plinius D. Augustum cun-
ctis præferre scripsit, recordatur eum Martia-
lis.

Pendula Pontinus quæ spectat Setia campos
Exigua vetulus misit ab urbe cadis.

Idem
Setinum dominaeque uives, densique clientis:
Quando egere medico uou prohibente bibam.
Iuuenali.

Iuuenalis Cæcubum Galeno Vnde dicitur.

— & lato Setinum ardebit in auro
Vicinum & Setia oppidum Signia, vino Signino
clarum.

Galenus parò lib. 7. secund. loc. in. Arteria-
corum expositione Cæcubum vinum à loco di-
ctum minime putat, sed ita uocatum fuisse quod
uis uetustissimum, & ob uetustatem solum
uicini, quod etiam 12. Meth. rursus confirmat, &
lib. de Antidotis.

Trifolium Dalech.

Trifolina uero uina quorum supra meminit
Plinius, illa sunt, vt notat Dalechampius, quæ ter-
tio foliorum exortu, nempe tertio anno ad bi-
bendum tempestiua forent: vulgò, vin de trois
feuille. Martialis.

Non sum de primo satior Trifolina Lyco.
Iuxta illud Est, est, est. Propter est, est, est. Domi-
nus meus mortuus est. Transmarina vt vocat
Plinius, Plautus in Pœnulo hæc memorat.

Vbi Leucadio, Lesbio, Thasio, Coo,
Vetustate uis edentulo atatem irriges.

Vini nomi-
na in gene-
re.

Vinum succus defæcatus, iamque purus niti-
dusque apparet absoluta scilicet feruæfactio-
ne, sordibusque residens. Græcè εἰς dicitur,
Al. Wein. B. Wyn. Gall. Vin. It. & Hisp. Vno: &
quidem propriè, Nam alii quidam succi ac li-
quores, vt i malorum Punicorum, Cotonæorum,
Pyrorum, Mespilorum, Sorborum, uel qui ali-
unde veluti ex hordeo ac frugibus confunt,
hæudquaquam simpliciter, sed addito no-
mine eius ex quo conficiuntur uina dicuntur.
Ita vinum Rhoites ex Punicorum malorum
acinis expressum: Cydonites ex malis Cotonæis:
Apytes ex pyris: in vno uelut in vno
sive vinum hor-
deaceum, quod & Zythum, ex hordeo composi-
tum. Cognomina tamen & alia quædam & qui-
dem à stirpibus in iis maceratis uina accepere,
quæ ex vite tamen uina sunt: vt Absynthites,
Myrsinites, Hyssopites: factitia autem hæc di-
cuntur.

Vinum sim-
pliciter.

Propriè uero ac simpliciter vinum appellatur,
quod ex vitis uis expressum est, ac nullius alce-
rius misturam admittit. Vinum merum, mer. ac uis
Cicer. puri, purum: dicitur in vno uelut in vno
u. Eurip. Al. Lauter vnd vngheingster wein.
B. Louter pure syster / ein ongemende wyn.
Gall. Vin pur, clair, point mixt, u. u. Ital. Vno schiet-
topuro. Hisp. Vno pura y sin aqua.

Vinum di-
lutum.

Vinum dilutum, lymphatum, dicitur. Al. Gee
wasserter wein / vermischter wein / mit der

wasserstangen geschlagen / Gheswaterde Wyn
Gal. Vin trempe, Ital. vino con aqua, acquare. Hisp. vi-
no aguada.
Villum Terent. in vno. Al. Weinle. B. Wynfen /
fleine ostschre Wyn. Gall. vin de table, u. vino pi-
colo, de tavola, ordinario, Hisp. vino ordinario y de
mesa.

Vinum ignobile

Vinum generosum, nobile Horat. in vno. Al.
Schlicher wein. B. Schacher wyn / Gall. vin deli-
cat & friant, Ital. vino delicato & piacevole, H. vino
delicado.

Vinum ignobile, cibarium Varroni quod dicitur: Vinum
Al. ringher wein / tisch wein / B. Schliche Wyn
tafel wyn, Gall. vin ordinaire, u. de table, u. vino pi-
colo, de tavola, ordinario, Hisp. vino ordinario y de
mesa.

Vinum con-
sistens

Vinum consistens, ferens atatem, firmum
Plin. & Vug. dicitur, u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur,
u. dicitur, u. dicitur. Al. Bschender wein. B. Sch-
achtige Wyn. Gall. vin durable. Ital. vino di lun-
ga dura. H. vino que se poue decener.

Vinum in-
clinans

Vinum inclinans, atatem non ferens, dicitur
u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur,
u. dicitur, u. dicitur. Al. wein der absalt, vmbfalt / absehr. B.
Zfigends wyn / ende die mer diceren en mach /
Gall. Vin altere, u. vini durable, Ital. vin caru, che
se guasta / u. uen nupul durare, u. u. vino que no se
puede decener menu.

Vinum ac-
cescens

Vinum accescens, vappa Horat. mardicum
Scatio, dicitur, u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur,
u. dicitur, u. dicitur, quod odorem, la-
poremque genuinum exiit. Al. verrocher
vnd verdoorder wein. Boh. ver schalder / siter /
verdoorden wyn. Gall. vin pousse & u. u. u. u. Ital.
Vino fumato & guasto. Hisp. vino reborado, desua-
necido.

Vinum pen-
dulum

Vinum pendulum, quod lentescit. Al. Sager
wein. Belg. Langhe wyn. Gall. vin relant. Ital.
vino che fila. Hisp. vino liento, lo que hila.

Vinum hor-
num

Vinum hornum, hornotinum, dicitur, u. dicitur,
u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur,
u. dicitur, u. dicitur. Al. Heuinger / oder lauriger wein. Belg.
Zarighe wein / ost wyn von diefen zere. Gall. vin
de ceste année, u. vin d'vne année, Ital. vino di que-
sto anno, vino d'un anno. Hisp. vino de un año, d
que esta cogido este año.

Vinum bi-
num

Vinum binum Horatio, dicitur, u. dicitur, u. dicitur,
u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur,
u. dicitur, u. dicitur. Al. Zweyfarige wein. Bel. Zweyfarige wyn. Gall.
vin de deux feuilles, Ital. vino di due anni. Hisp.
vino de dos años.

Vinum an-
tulum

Vinum antulum, edentulum Plaut. vetustum;
u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur,
u. dicitur, u. dicitur. Al. Alter wein. Belg. Wäde wyn.
Gall. vin viel. Ital. vino vecchio. Hisp. uino uicio.
Vinum acrum Plauto, tubeum. Al. Sicker rote
ter wein. Belg. Roode wyn, wyn tint / wyn van
Alicanten. Gal. reature. Ital. vino rosso d negro.
Hisp. vino tinto.

Vinum heluolum

Vinum heluolum Colum. & Cat. Medium in-
ter album & ruffum dicitur, u. dicitur, u. dicitur,
u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur,
u. dicitur, u. dicitur. Galeno etiam
Zaridæ, quod tamen vir doctus an notat esse rubei
coloris, sed erroris non vacuus, hoc est, ruffum
pallens. Al. Schiller oder schillerter wein. Belg.
pilsger, vel pilsler, uoce à Gallica detorta, quæ est
pailter, wyn claret. Gall. vin clairet. Ital. chiarello.
Hisp. vino clero.

Fragrans
odoratum

Vinum fragrans odoratum, flos Liberi Plauto
dicitur, u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur,
u. dicitur, u. dicitur. Al. wol rie-
chende we n. Boh. wyn von godden rücker / we-
rie chende wyn. Gall. vin de bonne odeur, sentant
bon. Ital. vin. de buon odore. Hisp. vino che ole,
echando de si odor.

Aromaticum

Vinum aromaticum Plin. dicitur, u. dicitur, u. dicitur,
u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur, u. dicitur,
u. dicitur, u. dicitur. Herodoto, uelut aromatica potio. Al. ges-
turger wein / hippocras / oder claret. Belg.
Hippocras / claret wyn. Gall. hippocras.

Vinum

vinum sac- Vinum saccatum Plin. *σικκιδας* Poll. *σικκιδος* Eu-
 pol. Al. durch ein sack abgezic gener wein/hip-
 pocras. Belg. door cenen sack gedaen oft ghe-
 gotin wyn.

Vini latex. Vinum igne eliquatum, vini latex. Al. brantz
 wein. Belg. Ghebrande wein. Gall. *eau de vie,*
eau ardente. Ital. *aqua vite, aqua di vita.* Hisp. *a-*
gua ardente.

Pattium Vinum pattium, vinum indigena Plin. *ιδαινη*
διος Hipp. *αιθριος* Athenæo. Al. & Belg. Landt-
 wein. Gall. *vin du pays.* Ital. *vino della patria.* H.
vino di su tierra.

Honorariu Vinum honorarium Cic. *γερουσιαστικου* *διος*, *γεροποντος*
 Hom. Al. Schenck wein/werbrung wein/ Belg.
 Presentarie wein/ stadporten wyn. Gall. *vin*
d'h. mayor. Ital. *vino da presentariò* *far presente.* H.
vino di honra, que se da, quale principibus aut ex-
teris Legatus offerri solet honens ergò.

Praecium. Vinum praecium Virg. Praeligancum Catoni,
 siue quod prae omnibus legitur & vindemiatur,
 siue quod in vsum familiae operansimque ex vuis
 ante in vtu maturitatem collectus sit. Al. Der
 erst wein im herbst. B. d'ersie weyn, vroech wyn.
 voortwyn/G. *in premier vendangé.* It. *vino dellapri-*
ma vendimia. It. *vino de la primera vendimia.*

Operarium Vinum operarium Plin. quod operariis exprimi-
 tur. Al. Botten oder fuedren wein. B. Dranck
 voor de botten cun verleden/ G. *vin de ma-*
nourriers ou de famille. It. *Vino di famiglia.* It.
Vino de obreros.

Tortium. Vinum tortium, *βοσποριος* *διος*. Al. Presse
 wein. B. Perse oft gheperse weyn. G. *le pressirage.*
 H. *vino de mosto torcido.*

Fatum. Vinum factum Varr. in dolia conditum, nec
 turbulentum amplius: doliare vinum Vlpiano,
 nouum necdum veteranum, ac proinde vilius. Al.
 Süßr wein/ ghesaeter wein. B. Voeder weyn. ges-
 vaette wein. G. *vin paré.*

Molle. Vinum molle Virgil. lene. *μυσειδης* *διος*. Plu-
 tarch. Al. Milder wein. B. Milde mondeltude oft
 Lieslycke wein. G. *vin saoureux & amiable.* It. *vin*
gustoso, saporoso, di buon gusto.

Asperum Vinum asperum, *σπερον*. Al. Barter wein/ der
 rauch/ onlieblich vnd harb ist. B. Straffe oft har-
 de weyn. G. *vin rude degouté.*

Mucidum. Vinum mucidum Mart. Al. Konachiger/ nudhtz-
 lender Wein/ wein der nach dem seß schmachet.
 Boh. Kacnachstige. Kiemachtige / oft waetsche
 eun na ruat schmachende weyn. G. *vin chani, moi-*
si. It. *vino moffo.* H. *vino mohoso.*

Saccharum. Vinum sacco castrate Plin. sacco frangere, sa-
 cellare Nebrissensis ponit, vini vires emedul-
 lare: *σικκιδας* Plutarch. *ευνυγιου* *διος* Eidem. Al.
 wein durch ein sack abziehen / auf daß ihme die
 stecke wergehe. B. wein lecken.

Transusa- Vinum eluiriare Plinio. Vinum de vase in vas
 sum. transerre, quod & transfusare minus vsitate di-
 citur. *μετακλινεν τον διον ιστορου*, *μετακλυσειεν* Poll.
 Al. Wien ablassen oder abziehen. B. Wynn verla-
 zen van de monder trefen. G. *Fralacer du vin.* It.
Tramurare il vino d'un vaso all'altro. Hisp. *Trasfe-*
gar vino.

Cicum Vinum atrum & asperum [auterioris gustus
 Sinim. Plin.] Crucium vocat Festus, Galliam Lucilius: De
 hoc vino Plinii anterioris gustus, vt etiam de vi-
 no Rhetico & Allobrogico, aliisque plunibus, vi-
 dendã plura antè de vinibus.

Vinum Commendantur hodie vinum Creticum, siue
 Creticum Maluaticum, Virgilio, Arnisum dictum, teste
 Hadr. Iunio, Chium & Monembalites *δελετος* A-
 then. *εμπυριος*, *εμπυριος* *διος*. Al. Maluasey Boh.
 Malhegic. G. *maluoise.* Ital. *vino maluatico, malua-*

sa & maruifia. Est autem Arnisum, vnde nomen
 habet vinum, promontorium in insula Chio,
 vulgò dictum Maluafia, vel Maruifia. Belgii, in-
 quit Dodonæus, & praesertim Zelandiæ *σνοπο-* *βινι μα-*
 λα ex sapã & vino vitisque Hispaniensibus cer- *uatici ad-*
 uulcerum
 uitum miscellaneum, quod pro Cretico, vulgò Malua-
 tico nuncupato, substituunt ac venum expon-
 unt. Alii accipiunt Galangæ, Garyophyllorum, *Maluaticis*
 Zingiberis, Macis ana drachi. puluerem confi- *compositis*
 cientes grossum, quem macerat spiritu vini in
 in vase ligneo bene obturato per 24. horas. Qui-
 bus peractis in sacco vino per tres dies impo-
 nunt, ac ita vinum Maluaticum mentiuntur. *Alii*
 accipiunt mustum seruefactum cum quo triti-
 cum ad consumptionem tertie partis despumando
 decoquunt, colant, vasis imponunt. Hic sub-
 iungeremus rationem componendi vini Malua-
 tici artificialis ex aqua & melle, nisi passim apud
 Authores eius descriptio occurreret.

Vinum Apianum [vide antè; apud Plin. vi- *Apianum,*
 tem apianam] siue Moscattellinum, Falernum, *qa-* *Moscattel-*
lænos Atheno vocatum, Germ. Moscateller. *linum siue*
 Belg. Moscatelle weyn. Gall. *vin moscatel,* Ital. *vino* *Falernum.*
moscatell, *moscatella.* De vino Phalerno scribit
 Gal. ad Pilon. dicens, Vinum autem illud sit opti-
 mum, quale Falernum, quod Faustianum ap-
 pellant. Idem de Antidoto lib. i. cap. 3. Eligenda
 sunt in conficiendis antidotis vina suaapte natu-
 ra, inter quæ Falernum non hæc solum excellit,
 verum & omnibus aliis doctibus antistat, eligenda
 sunt in conficiendis antidotis vina suaapte natu-
 ra, inter quæ Falernum non hæc solum excellit, *Delectu*
 verum & omnibus aliis doctibus antistat, eligenda
 sunt in conficiendis antidotis vina suaapte natu-
 ra, inter quæ Falernum non hæc solum excellit, *Delectu*
 verum & omnibus aliis doctibus antistat, eligenda
 sunt in conficiendis antidotis vina suaapte natu-
 ra, inter quæ Falernum non hæc solum excellit, *Delectu*

Vinum moscatellinum ita adulterabis. Colli- *Adulteriu*
 ge flores Sambuci, abiectis petiolis in ære exsic- *Moscattelli*
 ca, in doliom, dum mustum feruere incipit, sac-
 culum iis plenum suspendito, ac bis in die, quam-
 diu feruet mustum, facculum in doliom expri-
 mito, tandemque flores abiecto, & sic saporem
 & odorem vini moscatellini conficito. Aut reci-
 pe Glycyrrhizæ: Polypodii, Anisi ana Drach. ii.
 Nucis myristicæ Drach. iii. pulueriza grosso mo-
 do, & in vinum immittito: Aut multo feruenti
 Ocymum siccatum, aut Gallitricum satium im-
 ponito. Muscatellinum rubrum conficies hoc
 modo. Collige flores Sambuci nondum planè
 explicatos, horum recipe vnc. iiii. Cinnamomi
 Drach. ii. coq. cum multo rubro.

Vina Maluatica, Muscatellina, Corsica, & alia *Vina ad-*
 ex Graecia, Hispania, Italia, & Languedoc nobis *idatum rã-*
 sunt valdè pernitioua in communi potu, licet o- *ganum.*
 ptima ad cruditates ventriculi, ad colicum dolo-
 rem, & alios morbos à causa frigida: ac licet vina
 peregrina ex calidis regionibus aduecta videan-
 tur gustui grata, non temerè ea bibenda; nam nõ
 solum nocent qualitibus manifestis, sed etiam in
 aliis oculis, antipathiã quadam nobis com-
 trariis, quia regiones nostræ diuertes: cùm tamen
 sint familiaria & amica per sympathiam incolis;
 vbi illa crescunt.

Vina Gallica enumerat Nicol. Abrah. à Fram- *Vinorum*
 boiffere in regimine sanitatiss. Vina Francia, in- *differentiã*
 quit, quæ circa Lutetiam proueniunt, & in tota *Fransuã*
 Francia insula, maxima ex parte alba & rubella,
 calida & sicca primo gradu aut principio sec. oli-
 gophora: vbi benè matura, grati saporis, studio-
 sis apta, vrbium incolis, qui tranquilla & seden-

taria vita vtuntur : vaporibus acris non replent caput vt Aureliaca, interna non vrunt vt Galconica, Hispanica, & aliarum regionum valde calidarum : non replent corpus stercoreis excrementis, vt vina cruda & acera : non coaccuant humores melancholicos qui pariunt obstructiones, vt vina crassa & nigra. Inter omnia Franciæ vina præstantissima existimantur vina ex

Vina Conf. fi.

Conssi : idè dicata & referuata Regio potui: platurque sunt rubra aut rubella generosa, consistentia mediocri, grati saporis & potui iucunda: optima summè imbecillibus à Venere, & iis qui magnam passî euacuationem. Inter Campaniæ vina primum obtinent locum bonitatis & perfectionis quæ in Aproueniunt: rubella, subtilia, delicata, palatui admodum grata, ad Rubum Idæum accedentia, expetita Magnatibus: prouocant tamen defluxiones & caput ledunt iis qui raram corporis texturam habent, bibenda ante dies caniculares, postea enim minuitur eorum bonitas. Inter vina Burgundica primum locum obtinent Beauensis, consistentia mediocri, coloris oculorum pèdicum, saporis grati: generosa, minus vaporosa Aurelianensibus, vnde vulgare prouerbium,

Vina Burgundica Beauensis

Vinum Belnensè super emia recenset. Vina Aureliana magni sunt in Francia ob generositatem & bonitatem: plerumque rubra sunt, mediocri substantiâ, boni saporis, ad Rubi Idæi saporem accedentis, generosa, ventriculo commoda: magis calfaciunt & nutriunt quàm Francica: verùm præ cæteris caput grauant & cerebrum lædunt: noxia sunt obnoxii Hemicanicæ & defluxionibus, & iis quibus viscera calida & sicca: meliora sunt sec. anno. Diu cõseruantur vina ex Anjou. Vina ex Bar-sur-Aube, accedunt proximè colore, sapore, & bonitate ad vina ex Anjou. Vina Gasconica licèt calidiora & sicciora viris Aurelianis, nihilominus non sunt ita vaporosa, nec ita cõtè offendunt caput, vt experientia cognouit, quia crassiora, nec ita subtilia.

Vina ex Bar-sur-Aube. Vina Gasconica.

De vino languente, vapescente, aspero, turbido, accescente &c. vt & de unarum adulteris peculiaris instruetur tractatu. Omne autem vinum vplurimum in aceto, & in vappam transit circa Pleiadum occ. sum, & circa Solstitium hybernium, aut efflorescet iam Vites, & circa Solstitium æstiuu & sub Caniculæ æstium, & in summa circa omnes accessiones & frigoris & caloris, aut largorum inbrium. Idem contingit & propter violentos ventos, aut vehemens tonitru, aut etiam inxta tempus quo Rosæ florent, aut à fulgure violento. Plura qui volet, videat Constantinum Mizaldum, & Colerum.

Accesat quando, & cur.

De vini natura & facultate.

Vini naturam pro ætatis ratione differre nemo sanus dubitat. Vina vetusta neruos reliquaque sensuum instrumenta, lædunt, at tamen gustu saniore, iucundiorè que sunt: quare vitanda iis qui internè alicuius partis imbecillitatem sentiunt. N. h. lominus in secunda valetudine vinum erusmodi paucum & aqua dilutum innoxie sumitur. At nouum in inflationes parit, ægè coquitur, graua facit in somnia, vinalque ciet. Quod verò ætate medium est, vtroque illo vitio caret, proinde que ad vsum sanorum, ægrorumque deligendum. Insuper album [variat enim vinum pro ratione coloris] est tenue ac stomacho vtilè, facitque in membra diuiditur. Nigrum ve-

Acetis vini variis naturam. Vina seruata, sensuum instrumenta aduunt.

Nouum inbrium. Vina. Acetæ medium, optimum. Color album, & nigrum.

rd crallum est, & ad concoquendum difficile, temulentiam facit & corpus auget. Fuluum, vtpote quod mediuu est, medias etiam inter vtrunque vires obducit. Album tamen tum in secunda, tum & in aduersa valetudine laudabilius. Sed & vin a sapore distat.

Fuluum. Delectu.

Sapor enim atque quæ vino admiscetur, ea differre faciunt. Siquidem dulce crassis partibus constat & ægè de corpore expiit, stomachum inflat, aluum & intestina, it & mustum, turbat: sed minus inebriat, vesicæ ac renibus aptum. Auiterum vinas magis expellit, sed capitis dolorem facit, ac temulentiam gignit. Acetum ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum: aluum cæteraque fluxiones cohibet. At vinum molle & sapore languidum neruos minus tentat, minusque vinas pellit. Pissum & heptenia nigra quidem si fuerint, crassa sunt & corpora multum alunt: at candida, tenuiore: quæ verò medio inter hæc colore sunt, medias quoque vires fortuntur. Omnia tamen attingunt, languidos pulsus excitant, & faciunt aduersus venena quæcumque exulcerando necant, ex oleo pota & vomitionibus reddita, itemque contra meconium, pharicum, toxicum, cicutam, & lactis in ventriculo coagulationem: necnon & contra renum ac vesicæ rosiones & exulcerationes: nihilominus in inflationes pariunt, & stomacho aduersantur. Primum cõfert Melampsitium iis qui alui fluxione laborant. Album magis cæteris emollit aluum. Gypso conditum neruos offendit, capitis grauitatem infert, viscera calore accendit, & vesicæ aduersatur: sed contra venena cæteris aptius. Picata aut resinata excalfaciunt, & concoctionem adiuuant, languidum excreantibus inimica. Quæ verò aparachy-ta, hoc est, mais experta dicuntur, & sapam tamen admistam recipiunt, caput implent, temulentiam gignunt, de corpore difficulter expiunt, & stomachum male habent.

Sapor. Dulce. crassum.

Pustulum caput tentat.

Acerbum fluxiones cohibet. Molle passu. Sapor. Heptenia.

Venena.

Lactis coagulatio. Exulcerationes.

Melampsitium.

Picatum.

Mais experta.

In vniuersum vinu in omne mericum & syncerum, ac sua natura auiterum excalfacit, facile in membra distribuitur, stomacho conuenit, appetentiam ciborum inuitat, corpus alit, somnum conciliat, robur auget, & colorem commendat. Potum liberalius, auxilio est contra assumptam Cicutam, Coriandrum, Pharicum, Ixiam, Meconium, argenti spumam, Taxum, Aconita, Fungosive: nec minus contra serpentium morsus, & omnium ictus mortificæ, quæ refrigerando necant, aut stomachum in vomitiones effundunt. Facit & ad diuturnam hypochondrii inflationem, rosionem, atque distentionem, itemque singultum, ac stomachi, intestinorum, & ventris rheumatismos. Vina conueniunt sudatoribus, & quibus corpus immo dico sudore digeritur, maxime quæ sunt alba, vetera, & odorata. At que sunt vetusta simul & dulcia, renum ac vesicæ vitis sunt accommodatiora: nec non vulneribus in inflammationibusque in succida lana commode imponuntur. Quin & isdem fera, phagedænica, & affluentibus humoribus irrigua vlcera vtiliter fontur. Porrò vina quibus aquæ marine nihil addidit est, austera, & alba, ad sanorum vltus commode vlturpantur. In his præstant Italica: vt Falernum (quod inter Italica principem locum obtinet, & trentinum, Cæcubum, & permulta alia è Campano agro, itemque Præ-tutianum, Adriaticum & Siculum, quod Mamer-tinum appellatur. Ex Græcis, Chium, Lesium, & Phylgites, quod in Ephelo pigritur, Crassa verò & nigra stomacho aliena sunt, statulque pa-

Vini facultates in generis.

Meracum, suncerum, ac natura auiterum.

Alba vetera, odorata.

Vetusta dulcia.

Austera & alba.

riunt

fiunt: attamen corpus augeat: tenuia autem & austera, stomacho quidem profunt, sed carnes alunt. At quae sunt valde vetera, tenuia & candida, vehementius vinas ciunt, & dolores capitis inferunt, nervosumque genus largius pota tentant. In media etate, vt à septimo anno, potui saluberrima sunt.

Modus autem pro etate, anni tempestate, consuetudine, & qualitate vini decernatur. Oprimè verò præcipitur, vt ne fitis immodica toleretur, & tantum potionis adhibeatur, quantum proluendis cibis fat fit. Siquidem ebrietas omnis, maximèq; iugis, frequentiorè perniciosa. Enimverò largior perpotatio nervos ohfessos in dies remittete, morborumque acutorum initia quotidie introducere, consuevit. Attamen moderatè aliquot diebus vino indulgè, maximèque postquam potum vitale. Ita namque modo quoddam, quæ sub sensum deinde cadunt recrementa ex alto euocantur, & per cæca corporis spiracula repurgantur. Sed illi perpotationi aquam superbibere par est: siquidem medicationis alicuius gratiâ factè ex composito temulentia, remelium affert. Et hæc hæctenus de vini natura Dioscorides.

Miror, inquit Alexandrinus, fuisse Galeni tempestate inuentos, qui Vinum, ex præstantia quadam potus maximè nomine dignandum, alere quidem dixerint, at alimentum, quod illis *πρωτον* erat, dicendum non esse contenderent, nimia animi pernicacia, & litigandi studio, idque verbo tenuis: quoniam rem concederet, verbum negarent. *σπέραιό τίνος, ἀλλ' οὐ δέ τι πρῶτον αὐτῶν δύναμις*. Alere & nutrire dicis, & nutrimentum non dices? Quis hoc vnquam Sophista euenit? Illud potius dicerent, quom non deessent copiosissime dialecto voces, *πρωτον, σπέραιός τε, πρῶτον* vtrunque esse, *δὲ τι πρῶτον*: alterum verò *σπέραιός τε, δὲ δέον*: alterum *πρωτον, δὲ πρῶτον*.

Plurima alia, nec illa leuis momenti, de nobilitate huius vitis Fructus, Vini, inquam, simpliciter sic dicti, Natura, differentiis, qualitatibus variis, duratione, conseruatione, adulatione, temperamento, vtu, viribus & noxis, hæc, cum ex Veterum tum ex Neoterico, nostræque ipsamet obseruatione adicere erat animus: vetum ne in immensam excresecat noster Codex molem, reliqua quæ huius Loci esse possent, in peculiarem referuamus tractatum, breui prælis submittendum, in quo, ni nos spes fallit, Lectori beneuolè abundè satisfiet. Ac sic illis dimissis ad factitia vina, & factitios aliquot ex vino liquores prope- rante pergitimus.

Vina factitia.

Fictitiorum vinorum, aut si qui malunt, factitiorum, tot generum à Dioscoride descriptorum, nec pauciorum à Plinio, traditorum, quædam, tantum in præsentia adscribemus (cætera enim sibi quisque petere legenda de suo simplici potest esse actum agendum toties fit) ea scilicet, quibus aptiorem locum adinuente haud potimus. Et hæc sunt vinum Melitites, Mulsum, Passum, vina marina siue falsa, & vina quædam dulcia.

Vinum melitites.

Vinum igitur Melitites, autore Dioscoride, datur in longis febribus, iis qui stomacho sunt imbecilli: leuiter enim alium emollit, vinas ciet

ac stomachum expurgat. Prodest & articulario morbo obnoxiiis, nephriticis & capitis infimitate laborantibus: vitale quoque mulieribus aqua potantibus: siquidem odoratum est: corpora que alit. Distat à mulo, quoniam fit illud è vino austero ac vetere, & melle exiguo: Melitites autem adiecto ad quinque congios austeri mellis congio, & salis cyatho. Porro in magno vase fieri ipsum oportet, quò locus amplior ad vehementer efferescendum pateat, antedicto sale sensum asperso, quandiu efferbuerit: ac vbi feruere desierit, in cados alios transfunditur.

Mulsum.

Mulsum præfertur, quod ex vetere vino austeroque & bono melle factum est. Tale siquidem minus inflat, & celeriter in vsum venit. Ac vetus quidem corpus alit: quod mediæ est ætatis, alio vitale est, vrinamque pellit. Sed à summo cibo sumptum, nocet: inter initia verò potum, stomachum implet, deindeque tamen appetendi auiditatem reuocat. Fit mulsum vt plutumum, duabus vini metretis admixtâ vnâ mellis. Alii qui quò promptius perfici exhibetique possit, mel cum vino coquant, atque ita transfundunt. Alii impensa parcentes ad multi feruentis sextarios sex vnum mellis adiciunt, ac vbi ferbuerit, elutriant: dulce autem permanet.

Vina marina siue falsa.

Marina vina variè factitari, auctor est Dioscorides. Aliqui enim protenus vt decerpæ calcataeque sunt vix, aquam maris admiscunt: nonnulli prius in cratibus, vvas Sole siccant, usque deinde calcatis marinam adiciunt. Alii passas prius vvas in dolis aquâ marinâ macerant; moxque calcatas expriment. Et eiusmodi quiddem vinum dulce eradit. Quæ tamen austeriore gustu temperantur, etiam in febribus subsidio sunt, siquidem meliora defuerint. Valent & ad alium subducentiam, profuntque purulenta excreantibus, usque qui alio sunt dura, qui que facile ex vinorum Amnærorum vsu capite tentantur: attamen & huiusmodi vina stomacho aduerfantur, flatuque pariunt. Situm porro facit, nervos infestat, & à valetudine sese recolligentibus haudquaquam idoneum est.

Vini falsi genera septem enumerat Plinius his verbis. Apud Græcos iure clarissimum nomen accepit, quod appellauerunt bion [ab ion Turnet. bizon Vet.] ad plutum valetudinem vsus excogitatum. Fit autem hoc modo: Vux paulum ante maturitatem decerpæ, siccantur acri Sole, ter die vetatæ per triduum, quarto exprimentur, deinde cadis Sole inueterantur. Cui marinam aquam largiorem miscent, à serui furtò origine orta, sic mensuram explentis; idque translatum in album mustum leucochrun appellatur. In aliis autem Gentibus simili modo factum thetalassomenon vocant. Thalassiten autem vasis musti deiectis in mare, quo genere præcox fit vetustas. Nec non apud nos quoque Coum vinum ex Italico faciendi rationem Cato demonstrauit, super cætera in Sole quadriennio maturandum [coquendam Vuam] præcipiens. Rhodium Cou simile est, Phormeum [Phorineum est, fortè, Phormium, vel Formium] falsius Cou. Omnia transmarina septem aut sex annis ad vetustatem mediam peruenire existimantur. Idem alibi ait. Fictitium non potest videri, quod Bion

Febres.
Alaus. V.
na.
Arthritis.
Nephritis
Differre à
mulo.
Melitites com-
positio.

Delectio
mulsu.

Vetus.

Mulsu com-
positio.

Vina mari-
na siccant
falsu autu

Vires &
vius
Febres.
Alaus.
Pur.

Sitio.

Vini falsi
genera se-
ptem Plinios
Bion.
Vius.
Compositio

Leucochrun
Thetalassomenon.
Thalassiten

Coum.

Rhodium
Phorineum.

Bion sicut

Modus bi-
bendi vnde
desummen-
dus.

De vino A-
lexandri-
nu.

Vina falsi-
tia.

Vires & v-
sus

appellauimus, cum sit in eo sola pro arte festinatione. Prodest stomacho dissoluto, aut cibos non perficienti, prægnantibus, defectis, paralyticis, tremulis, vertigini, torminibus, ischiadicis. In pestilentia quoque ac peregrinationibus, vim magnam auxiliandi habere dicitur.

Vnde dicitur

Βιζανov, vt testatur Rhod. lib. 26. cap. 8. dicitur, quoddam ad vetustatem accelerandam assulo mari cogere. Marinam enim Veteres vinis miscabant, tum vt gratior sapor esset, tum vt celerior & præcocior vetustas contingeret. Maris experts vinum Gal. 12. Method. *αδελφον* vocat. Hermol. in Diosc. à festinatione nomen impostum, quasi violenter fiat. Plaur. in Rud.

Aparathyo.

Quasi vinis Græcis Neptunus nobis affudit mare. Itaque aluum prodipsaravit nobis salis poculis. Vini Græci facienda rationem Cato docet. Vini verò dulcis & Græco similis conficiendi modum Columella: tadens sal vino additum id in corruptum feruare.

Scillatitius ex vino liquor, vulgò Aqua vita.

Aqua Vita siue ardens

Elicitur ex vino liquor quem *Aquam vita*, & *aquam ardentem* vulgò appellant, quod veluti ex herbis aut aliis stillatitij liquores, eodem ac simili modo è generoso vino extrahatur, per organa videlicet ad hoc comparata, quæ Alembica passim appellantur. Est autem eiusmodi liquor colore & consistentiâ cum ex herbis distillatis aquis, tum & simpliciter puræ aquæ, colore similis, sed facultate longè diuersus. *Vita* cognomen accepit, quod ad hominis vitam & conseruandam & prorogandam faciat. *Ardens* verò dicitur, quia facillè flammam concipit. Cum enim vix aliud sit, quàm generosissima ac tenuissima vini pars, citò ad motâ ignis flammâ accenditur ac ardet.

Aqua Vita cur dicitur. Aqua ardens.

Temperamentum.

Calidissimus hic liquor est, & subtilissimam ac tenuissimam partium, tertio ordine calidus ac siccus, & quidem intenso, præsertim qui purior, quod enim putior, hoc & calidior, siccior, ac tenuiorum partium: puriorem efficiunt aliquoties repetitæ per organum distillationes.

Vires & sapor.

Color naturalis. Sensus

Prodest verò hæc ex vino stillatitia aqua omnibus vel per longiorem morbum, vel per ætatem grauiorem refrigeratis, vt senibus ac decrepitis. Calorem naturalem & souet & auget: vires tuetur, reparat ac intendit: vitam producit, sensus omnes vegetat, memoriâ nô modò conseruat, verùm & redintegrat: visum acuit: utilis cataractis ac caro, si febris absit, occupatis, alitque frigidis cerebri ac capitis malis laborantibus: facit ad cordis debilitatem, tremorem, ac palpitationem: ventriculum languidum excitat ac excalfacit: flatus tum in hoc, tum in hypochondriis, vel etiam in intestinis hærentes disiecit: cibi concoctionem promouet, frigidis venenis potentet resistit. Tanta in corroborando corde, ac sensuum organis excitandis huius vis ac potentia est, vt non modò intrè exigui cochlearis, vel etiam medi mensura sumpta, verùm & fors ad mota efficax reperiat: naribus videlicet applicata, vel temporibus, brachiorum item carpis illita. Subinde hoc modo vsurpata etiam morientibus atque animam agentibus vitam ad aliquot horas producit, vel etiam restituit: quæ purissima ac exquisitissima est. Dentium dolores in ore detenta sopit: lenit & neruorum partium ex frigido contractos, illita. Sunt qui in quartanis ante accessionem, præsertim post morbi statum exhibere audeant. Exhibenda autem hæc aqua

Hæmo moriens

Dentes

ex vino, cum magno in morbis est iudicio ac delectu: cum enim impensè calida sit, & partium tenuissimarum, ac nec aliud, quàm spiritus ipse vini, citissimè permeat, ac cerebrum facillimè petit ac ferit. Apoplexia idcirco occupatis, Comitiali morbo obnoxius, Hemicrania, Cephalæa, aut vertigine ex frigida licet causa laborantibus, non tamen tutò semper dari potest: nisi enim materia morbi effeatrix omninò sit exigua: & temperamento ipse ægrotus, perquam frigidus, etiam periculum exhiberi nequit. Subis siquidem humoribus caput amphissimè plerumque, & morbi vis intenditur. Quod si verò & calidi adint humores, veluti sanguis, inflammationes quoque non parum augentur.

Morbicæ

Nocet verò hæc aqua omnibus natiuræ ac temperamento calidis, summè biliosis. Icur etiam offendit: tenibus quoque haud utilis est, sæpius aut copiosius sumpta

Nona.

Chimixæ quidam vini fortissimi non adultati lib. xii. ampullæ indunt, & per vas refrigeratorium, vulgari modo desillant, vsque dum vini effusio imminuat: tunc amoto vase quod excipit vinum distillatum vitæ amplo recondunt diligentissimè, ne quid exipier, & in aquam calidam ponunt, sinuntque ebullire per dies octo: postea in vapore balnei spirituum vini subtilissimum exullant. In hoc autem opere tria notari debent: primò ne vas in quo vinum digeritur altius aquæ calidæ imponatur quàm vinum apparatus: secundò, vt commixturæ luto optimè circumlinantur: tertio vt spiritus inter desillantem reuè separentur à vino, caloreque moderato euocentur.

Tria in hoc perficiendo notanda.

Potrà iidem Vinum Alcalizarum, vt vocant, parant, dum aquosam materiam ex desillatione vini relictam, exhalatè sint ad succum sacculentum vsque: hunc deinde probe exiccant, conteruntque, & igne vehementi in calcem albam redigunt, quam sal vini appellant: Postea spiritus vini vncias duas, salis eius leuissimam miscunt, induntque ampullæ: hanc diligenter oclatam per dies 24. in cineribus sinunt. Mox exiit idem primum lento, deinde fortissimo igne educunt: postea saltem relictum iterùm exurunt, conteruntque, & spiritus vini imbuunt, digerunt, euocantque vt prius, atque hunc laborem toties reiterant, donec sal per operculum extillari: sic nobilissimum vini spiritum alcalizarum prouocant, ad rerum colores extrahendos.

Vinum Alcalizarum

Vel Vini rubri valentissimi, vt Hispanici, aut Alfacici, aut alterius similis, libræ octo pellicano, aut ampullæ vitæe satis amplè infunduntur, & vase diligenter obturato, macerantur in fimo equino, vel aquâ moderatè calidâ diebus triginta: tunc oleosus liquor phlegmaticè innatare videbitur: qui igne lento in ampulla frigidiusculè tantum separatur, donec oleosum illud tenue vel spiritus vini vegetabilis à summitate operculi emanare desierit. Hic postea rursus in aqua calida digeritur per dies viginti quatuor: atque sic è libra vini emergit essentia serupulus, verum ad vitam producendam præsidium. Ex hoc vini liquore subtilissimo essentia siue tinctura rerum, & aquæ vitæ parantur, dum stirpium planta & odoramenta, nec non metalla, atque terra fossilia præparata in illo macerantur, liquantur, extrahuntur, desillanturque. Experientia constato scribit Ringelberg, si vino exusto Linum immergatur concipere quidem flammam posse, sed non aduri.

Sal Vini.

Fax vini.

Vini.

art arm. omnia ugarum

electus.

ires & us Diofcori.

medic. rheumatif. us. Paris

ires ex Egineta. Cachexia. tydrops. Argentum ac politur anni emuntur.

ritur hae.

ngues sca. bri.

Delectus. Repofitio. Oleum tartari. Vires tyrosus.

Cinis Ci. tum & fa. cum vino.

Vju.

Aceti ma. gna ex. qua. Acetum na. tural

Vperest vt de Face Vini pauca dicamus. Hac Scrutata instar concreta vaporum ac cadorum vinariorum lateribus adhærens, aded sicca & solida euadit, vt in puluerem atteri possit.

Hanc officinæ Tartarum appellant, Græci τάρταρον: Germ. Weinstein. Belg. weinstein. Gall. la grotte: It. Feccia, Hisp. rasura de Vno. Laudatur verò à Diofcoride vino veteri Italico: sin minus ab alio consimili. Nostra ætas eam commendat, quæ de vino albo colligitur, & Tartarum vini albi nuncupat.

Vlus huius facis ad multa. Habet enim vim, iuxta Diofcoridem, supra modum vrendi, detergendi, cicatricem inducendi, astringendi, & vehementer exedendi, sicandique. Et hinc œdemata perse & cum Myrto cohibet: ventris stomachique rheumatismos in cataplasmate adhibita fistit: muliebri profluuium abdomini & verendis impofita mitigat: panos nondum exulceratos, itemque tubercula discutit. Turgentis mammæ si uelque lactis impatientes cum aceto peruncta extinguit. Abundè vt Egineta ait, desiccatur ac discutit. Adstricoria ei subinde facultas ex vini specie, vnde colligitur, accedit. Facit ad humidam corporis affectiones, prodest cachexiæ ac hydropsi, præsertim Leucophlegmonia laborantibus. Vtilis & Argentariis. Argentum enim hac poliunt ac purificant. Sed & tingtores pannorum ad suos eam conuertunt vlus.

Vitum hæc fax non rarè, vt Alcyonium, antè diligenter excicata. Sunt qui testæ nouæ inditam igni largo cremant, vsque dum tota inalbescat, & linguam tactu vtere videatur, quod signum legitime ac perfectæ vtionis est. Alii ignitis carbonibus facis glebam obrunt, & similiter faciunt. Sic vitam Græcis ἄσπιδα appellari Egineta ait: Officinis Tartarum vstum & calcinatum. Vehementer causticam siue vrentem, abstergentem, ad cicatricem perducentem, adstringentem, exedentem & valdè resiccantem vim, Diofcoride autore, habet: vngues scabros cum resina eiicit: medicamentis, quæ adurunt, Paulus ait, admiscetur. Vtendum cæ, inquit Diofcorides, recenti quoniam celeriter euanescit: vitæ siquidem vini fæx, citò humida fit, ac in liquorem resoluitur. Idcirco qui ea vti volet, vitreo aut vitreato vase diligenter obstructo, in calido siccoque loco, repositam habeat oportet. Colliquescit verò hæc & in liquorem resoluitur, si facno ex lino alicubi in cella subterranea frigida suspendatur. Lepras, scabies, impetiginis, aliaque cutis & faciei fœditates citissimè tollit: addita æquali mensurâ ex rosâ stillatitia aqua, & tanto quâto ad linimentum consistentiam satis sit, quo vesperæ affectæ partes illinendæ sunt. Fit & liquor tartari aliis modis.

Cinere Vitum & facum vini, teste Trago, exustarum, quidam victum suum querunt. Nam cum facès destillaræ fuerint, quod reliquum est fecatur, & post in cinerem redigitur, quo ad colores, & ad saponem conficiendum vtuntur. Vterque cinis Chirurgicis quoque magno vsui esse potest, in sedis condylomatibus & thymis.

Acetum.

Ex liquoribus, quicumque potûs vini vices exhibent, penè omnibus fit acetum, natura & arte. Natura, cum vinum aut cereuisia in loco nimis calido detinentur, vel eum eadè simis din referuantur. Arte, cum vinum aut cereuisia co-

quitur, refrigeratque fermentum, aut panis calidus hordeaceus [qui vnus omnium præualeat] aut pisa, aut hordeum tostum imponitur. Alii panem tostum in aceto aliquoties reiteratis viciibus macerant & siccant, vinòque aut cereuisiæ imponunt.

In tempore sic acetum parant aliqui. Sal, piper, fermentum, aut (quod citius & minori sumptu fit) lapides, lateres, aut chalybem candentem in vino extinguunt. Vide hac de re Colerum lib. 2. sive Oeconomix. Si vasa mellaria (vase melle Gal. vocat) aut faui laentur aqua, eaque decoquatur, fieri saluberrimum acetum, apud Plinium præcipitur. Rondeletio probabile non videtur, acetum ex melle fieri, sed potius ex propoli, quæ acidum oleat. Ait contra experientiam: Fit liquidum ex melle cocto cum aqua.

Acetum, quod secum quilibet deportari valeat, sic efficit. Accipe tartarum, macera nouem aut decem diebus in aceto forti, sicca in Sole, idque repete secunda aut tertia vice, ad vsuum. Si necessitas adsit, puluerisa, in vitrum vini parum impone de puluere, & habebis acetum.

Dicitur à Græcis ἄσπις, German. Essig/ Belg. Azyn/ Edif & Eef: Gall. vinaigre: Ital. Aceto: Hisp. vinagre. Boh. Ocet.

Ceterum acetum, auctore Diofcoride, refrigerat & adstringit, stomacho est vtile, & appetentiam cibi excitat: erumpentem vndeunque sanguinem potu infelluue fistit: prodest alni fluxionibus, cum cibariis coctum, et venter vulneribus idoneum est, ac inflammationes arceat, in luccidis lanis aut spongis impostum. Reprimat & prociendam sedis vuluæ; item ginginas abscedetes & sanguine manantes. Est etiam effica ad noimas, erysipela, herpetas, lepras, lichenas & pterygia, si cum aliquo conuenienti miscatur: phagedænas vlcerrum, nomasque totu continuo cohibet: podagricis calido fotu, cum sulphure auxiliatur: fugillata tollit, cum melle inunctum. Contra capiti ardores, cum rosaceo in luccidis vteribus aut spongia imponitur. Ad hydropem, auditum difficilem, auriumque sonitum ac sibilos, feruentis vapor proficit: earundem quoque vermes instillatum necat. Panos coarctet tepidi fotus, aut si imbuta eo spongia admoventur: & pruritus permulcet. Contra venenatorum morsus, quæ refrigerando nocent, calidi fotus prodest: vti frigidi, contra eorum idus quæ exurens virus eiaculantur: Calidum potum atque vomitionibus redditum, aduersus omnia venena effica est, ac præsertim contra haustum meconium cicutamve, sanguinem in ventriculo conglobatum, lac ibidem coagulum, fungos, ixiam, taxumque, cum sale. Haustu voratas hirudines, si forbeatur, eiicit: tussim veterem mitigat, & recentem lacescit. In Orthopnæa, calidum commodè forbetur. Sed & guttatis fluxiones gargarizatum inhibet: anginis & laxatæ columellæ conuenit: nec non & calidum contra dentium dolorem colluitur. Aceti nequitia inest virtus magno ad vsus, inquit Plinius, sine quibus vita mitior degi non possit. Summia ei vis in refrigerando. non tamen minor in discutendo: ita fit vt insulum terræ spumet. Dicitum est sæpius, diciturque quoties cum aliis proficit. Per se haustum fastidia discutit, singultus cohibet, stertnuta menta olfactu, &c. Idem alibi aceto facillè gummi elui, margaritas resolu, mirænaque gustu eius in rabiem agi scripsit. Metallis viridem colorem induci, si humectentur aceto falso, annotat Ringelbergius.

Acetum artificiale

Rondeletius not.

Nomina linguarum

Aceti Græc. ἄσπις. Lat. Esus. Diof. Stomachus. Sanguinis fluxus

Inflammationes

Erysipelas

Podagra, Sugillata

Hydrops

Venenæ

Hirudines Orthopnæa

Dentes

Aceti Græc. Plinio

Fastidia Margaritas resolutæ

Temper.

penetrat.

Facultates aceti Variæ

In condimentis Obolerium Genie. Intinctus ex copulantur

Emkamma

Nona

Acrimonia eius ut resimpatur

Sunt referendi nobis hoc loco, sicuti etiam in aliis fecimus, quicunque tractationem hanc ingrediuntur, præcipui Aceti in Medicina & culina vsus. Frigidum igitur naturâ omnium iudicio Acetum statuitur, longè autem magis siccans: Reuera namque exsiccatissimum. Cæterùm in Aceto penetrandi, atque ad profundum se per omnia indendi vis, ambas hæc efficaces magis adiciit, vt his particulæ omnes imbutæ nihil putrefactionis causis obnoxium expositumve relinquant, ipsæ primò sicciores factæ, ne peregrinum humorem faciliè excipiant, frigiditate autem eùm externum calorem arceant, tum internum inuentum priùs inelufumque coerceant. Iam ex calidis Aceti particulis, quamuis non multis, acrimonia sæpe tamen multa, quod acria omnia faciunt, ipsa quoque partem suam excludendis putrefactionis causis conferet, atque hac conditurâ res nõ minùs quàm ex sale custodiuntur. Condiendi cibaria, & opsonii præparandi ratio, ab incidendi difsecandique facultate, potissimum illi, quâ rerum constitutionis pleniusque durities, & humorum crassities tollitur, attenuaturque glutinositas, acrimonia abstergitur, calidæ paulò magis partes frigiditatis potentia ad temperamentum deducuntur, ac si quæ frigidæ inlunt, calorificam ex quoque vim sentient temperatiores factæ. Quapropter, quæ multa condire alia non poterunt: Acetum condicit, diuersarum atque etiam contrariarum facultatum viribus pollens. Quibus nominibus in condimenta opsoniorum penè omnia iure meritoque venire potest. Intinctus autem parantur ex eo cuiuscunque generis, modò sinapi, modò oleo, modò saccharo additis, modò odoratarum herbarum feminibus, & aut aromate aliquo gratiam intinctibus addente, aut rosarum odore conciliato, maceratione earum. Sapius ipsummet appositum per se dapibus multis Embamma fecit, quatum præsertim glutinosior crassiorque substantia, humòrque extenuari possulent, tum ex quibus timetur bilis, cuius humoris vim reprimere Acetû aptissimû iudicatur.

At idem in temperamento melancholico, affectibusque, peculiariter damnatum, neruis nervosisque partibus inimicum: vtero, intestinis, ventriculo, nisi bilioso, aduersum, mulieribus in super noxium, & iocinoris virtutes debilitare existimatum: nempe nimio sæpè vsu, & intempetiuo, refrigerato viscere, quemadmodum nervosis quoque partibus qualitatibus eiusdem efficacia, sed & penetrabilitate officere maximè potest, acrimoniæ non minùs sæpè violentia læsis. Ventriculum quidem, eiusque præsertim os, quò maior in hoc sensus, ita quandoque vehementer ingruens, afficit, vt manifestè veluti percussione eiusdem læsionem sentiat: os quidem nonnunquam ipsum, linguæque, ac palatum, non satis acrimoniam ferunt: sæpè etiam antequàm admoueatur ori, perhorrescunt. Hoc quidem acerrimum facit, quod faciliè aquâ retundi, aut vino, aut mitioris alterius alicuius succi additione, poterit. Saccharo alii, alii passulis, mitigant: sicuti è duerto, paulò magis fatuo ex aromate acrimoniam, pipere præcipuè, & gingibere quaerunt.

Acetum portò nullum, quod Oxymel vocant hoc modo à Dioscoride temperatum. Acet heminas quinque, salis marini minam vnam, mellis minas decem, & aquæ sextarios quinque, pariter coquit, dum decies efferverint: mox vbi refrigerint, diffundit. Constat potè sumptum crassos

humores extrahere, atque ischiadicis, arthriticis & comitialibus opulari. Est & auxilio contra morsum viperæ & lacertæ quam Seps vocant: itemque contra haustum meconium, ixiâmque, anginis denique veliter gargarizatur. De aceti natura & viribus, plura tract. part. quem de vite eiusque præcipuo fructu breui publici iuris facturi sumus.

Vitis vinifera filv. sue Labrusca.

Cultivam hæc refert caudicibus, ramis, articulis sarmenis, foliis, claviculis, flosculis & fructu, quem tamen non perficit, sed immaturum, durum, ac austerum relinquit.

In sarmetosam, aut Lobelium, arboreamque penè sobolem luxuriat, prolixitate anfractuam, vnde sterilefcit, aut minores, minusque lapidas & maturas vuas fert, caque raras & perpaucas. Virg. in Bucol.

Aspice ut antrum

Sylvestris varis sparfit Labrusca racemis.

Oenanthen à Labrusca separat Dioscorides, Labruscam dum statuens generum. Nos autem Oenanthen non vnius Labruscæ modò florè esse, sed vtriusque asserere non dubitamus cum Matthiolo: cùm non aliud Vetricibus significet Oenanthe, quàm Vitis florè, id quod ipse Diosc. in proprio capite manifestè declarat: quippe qui tradat Oenanthen vocari Vitis silv. fructum, eùm floret, nullius facta generis distinctione. Quin & idem alibi confirmat, vbi vini Oenanthin meminit, è feracis sylv. Vitis floribus fieri scribens. Ex his itaque abundè constat, non tantum infructiferæ, sed etiam fructiferæ Labruscæ florem Oenanthen vocari. His adde auctoritatem Galeni qui lib. 8. de comp. med. cap. 1. Oenanthen appellat Vitium silv. germen vrâ cum floribus, ex quo succedentibus diebus Vua fiat.

Plinius lib. 12. cap. 28. Oenanthen vuam, non florem esse censet, Eodem, inquit, & Oenanthe pertinet, Vitis Labruscæ vva: colligitur cum flore eùm optimè olet. Sed in his Plinii verbis rectè suspicatur Matum, mendâ fuisse, rectiusque legendum esse cum Dioscoride eùm floret, non cum flore. Quo modo enim quis vnquam vuam cum flore collegit? Cæterùm ad Vitis silvestris genus pertinere scribit Dodon. quas Plinius Triferas & intanas vocari refert lib. 26. cap. 27.

Ab hac Vite silvestri ea est diuersa, quam Glycypteron, seu Amaram dulcem, postea vocabimus. Differt & ab illa Vite silv. Dalechampii, quam Clematin alteram latifoliam hoc loco inscribimus. Nec est Bryonia, quæ eandem appellationem apud nonnullos cum Oenanthe sortita est.

Nostra, quam hîc tradimus, silv. Vitis Græcis *Συμνα* & *ἀγρίον*, Latinis Vitis spontanea, Oenanthe, & Labrusca dicitur. Germ. Wild râben. Belg. Wilde Weinstock. Gall. *vigne sauvage*. Angl. wild wine. Fructus eius Græcè *ἐράδον*, Hebr. *Rofar* & *Reusibim*, Germ. *Reutling trauben* dicitur. Illud silentio haud dissimulandum est quod etiam domesticae vitis flos Oenanthe dicitur. Verùm quia silvestris Vitis vi multò magis adstrictoriâ pollet, per excellentiam Oenanthe appellatur.

In qualidisi agrorum marginibus vanis in locis occurrit ac Prouinciæ & Narbonæ maritimis, altas prærumque scandens arbores. Nonnullæ ex hoc genere Junio mensè, vt fatiua Vitis, florem ostendunt.

Labruscæ folia, caules, & claviculæ, quibus repunt, vim habent cultuæ vitis similem.

Ribes

Vitis & vitifera Humores crassi Venena.

Descriptio Frustris

Diosc. not. Oenanthe duplex.

Plin. corruptus.

Nomina linguarum

Locum

Tempus

RIBES VULGARIS ACIDVS
ruber.

CAP. II.



rent plurimi ex pediculo tenui unciali & sesquiunciali, aciduli, quique foliis pallide videntibus, oris extrorsum reflexis constantes, stami nulis sex sessilibus exiguis albis umbilico in medium, qui colore obsoleto est, stilo virenti minuto bifido lacunam aperit, ambientibus.

Veterebus, quantum reor, incognita, & silentio involuta, quam plures id esse contendunt, teste Bened. Curt. quod à Mauritanijs Ribes dicitur, ut nonnulli etiam recentium Medici, sub hac appellatione illo in Medicina utantur. Ast adtipularibus Fuchsio, Matthiolo, Lugd. & alijs, Ribes Mauritanorum à nostro diversum est: nec enim respondet descriptioni Serapion is, licet Amat. & Dodon. id asserant, ejusdemq; Ribes esse credant, vel ob saporem acidum cum quadam permixtum dulcedine. Verba Amati hæc sunt: Post Berberorum fruticem proximam citare, Ribes ferentem, quum de illo quoque antiqui nullam fecerint mentionem. Antiquos quum dico, velim intelligatis Hippocratem, Theophrastum, Dioscoridem, Galenum, Orbasium, Paulum, Aëtium, Catonem, Varroem, Plinium, Palladium, & Columellam. Inest huic fructui sapor acidus, cum quadam permixtus dulcedine, unde firmiter crederem, hunc ipsum fructum, quem nos Ribes appellamus, eundem apud Serapionem Ribes esse, quum eundem saporem Serapio suo tribuat, quem in hoc Officinarum gustamus, nec enim in cæteris rotis Serapio ab hoc communi quicquam deviat, proinde nostros Ribes, Serapionis quoque esse crediderim. Ast Amatium cæteris, qui putant hunc fruticem esse Arabum Ribem (de quo postea) hallucinari aburde constat. Siquidem, ut posteritatis memoria prodidit Serapio, Ribes est arbor proferens capreolos colore viridi rubescerente, & folia lata, magna, & rotunda. Quas sanè notas huic non respiciete satis notum est, neque erim fert hæc capreolos, neque ejusmodi foliis viret: tametsi fructus Ribem admodum referat, quod is gustui sit acidus simul & dulcis, qualem est Ribis bacca cum acet. est. Serapio. Sunt quoque nonnulli, qui esse existimant Poterium, de quo apud Dioscor. Plin. & Galenum. Sed errant & hi toto calco. Descriptiones confertant & videbunt discrimen. Totum Ribis fruticem circumvestit lanugo subtilis ve-

Tom. II.

luc pubescens; spinis Poterium horret. Nec desunt qui hanc plantam esse arbitrentur, quam Gal. lib. 7. de comp. med. loc. loc. Vrsi uvam appellat. Quorum error ah ipsomet Galen. satis refellitur eodem loco: quandoquidem asserit hujusce Vvæ plantam Menæcyli folio virescere.

Matthiolus scribit Lonicerum hallucinatum, Ribem vulgè dictum, Halimum dixisse, id tamen non competio apud Lonicerum; meminit quidem alterius plantæ pro Halimo. Idem Matth. in post. comm. Lat. & Ital. & hist. germ. silvestre genus in collibus & montibus nasci tradit, hortensi simile, sapore tamen minus grato, acerbiore, vehementiore. Genus quidem silvestre dulce mihi notum: nullum autem hortensi acerbius. Monachi aiunt hujus arbuti fructu omnes pharmacopæcos falsè pro vero Ribes uti: quid autem sit eos adhuc latere. Talia & Cardanus, Ribes loco, inquit, utimur frutice incerto, fructum in umbella (debebat dicere in racemo) ferente.

Ribes vulgare acidus ruher vocatur Grossularia rubra, à Lugd. (à qua & Vva transmarina) Tab. Dod. gall. & lat. cui etiam Grossularia transmarina dicitur. Cam. ad Matth. Grossularium rubrum & transmarinum. Vulgo gallico apud Ruell. rubra Grossula, & transmarina. Gest. coll. Ribes vulgè dictum, Acinos divi Ioannis; Itemque h. Ceanothus levis. Trago Ribes i. & hortense. Cam. h. Ribes vulgare baccis rubris. Matth. Ribes officinarum, Ep. & hist. Ribes vulgare. Cluf. Ribes vulg. rubro fructu dulci. Ribes Fuchf. Lac. Gronemburg. Lon. Apoll. Tab. Cæs. qui & fruticem sine spinis nominat. Lob. Adv. Ribes rubra: Obs. & Ic. Ribes Arabum, Ribesium Dodonæi.

C.B. pin. Grossularia 5. multiplici acino sive non spinosa hortensis rubra, sive Ribes officinarum: Ribes hortense, Trag. vulgare fructu rubro; Eyst. Ribes vulgare domestica, Matth. Cast. Ribes vulgo, Ang. Bellon. Cæs. Vva urfi, Dod. gall. Ribesium fructu rubro, Dod.

Germani nostri appellant Ribem Sant Johans Treibel / S. Johans Beerlin, quod sc. circa divi Iohannis Baptistæ diem ad maturitatem fructus pertingant, Belg. Bestiensis ouer zee: Gall. Groseliers, Groselles d'ouere mer: Ital. Vuetta rassa: Hispan. Ribes: Boh. Zahodi So. Jana: Hung. Apro rengori zolo, hæ minor marina Vva.

Passim in hortis nascitur, eandem pulvinos & Lacus & atæas sepiens, florens Aprilis Maio, sub finem vero Julij quandoque; sapius verò Julio mense bæccas maturans.

Quæ de fructu Oxycanthæ dicuntur, ea de acinis Ribis quoque ferè intelligi debent. Exhibendi sunt illi, Tragi consilio, ægris, qui ardentibus laborant febribus, neque non his qui calidas alvi fluxiones patiuntur. Namque hi acini sicut & Serapia & Sitis elegmata, atque Rob (ut vocant) de Ribes, sitim immensam resurgunt, vomitiones siliunt, cibi appetentiam invitant. Quidam Saccharo has hæccas condiunt sicut & Cerasa, quo pacto pueri variolis, aliisque alvi calidis profluvii laborantibus aptissime conducunt. Bæcca Ribis in sole siccatæ, ad easdem affectiones asservari poterunt. Reliquas cum Oxycantha easdem vires obtinet Ribes. Succus è bæccis Ribes expressus, cum aqua Cichorij aut Acetosæ confert ad febres ardentes & biliosa alvi profluvia, autore Matthiolo, confringendo roborat ventriculum, & iis qui cholera morbo afficiuntur subvenit. Idem facit contra hæmoptysin, cum aqua Portulacæ aut Plantaginis bibitus. Vvæ lachrymam gargarisatus cum aqua rosacea curat. Fronti illitus, lachrymantes oculos adjuvat. Dentes quoque vacillantes & gingivas corroboret. Folia vehementer adstringere testis est Fuch-

Vrsi Vva
Galenus non
est.Matth. ve.
darguntur.
Halimum
non est.Genus Ri-
bis silvestre
Matthiolo

Ribes falsè.

Synon.

Syn. C.B.

Nominis
linguarumLacus &
Tempus.

Ribes.

Febres ar-
dentes.Sitis
Rob Ribis.Comissiones
siliunt.Variola.
Profusio
calida.Bæcca sic-
cata.
Succus.Cholera.
Hæmoptysis
Vvæ lachry-
ma.Oculi.
Dentes.
Fuch-

fius, Ribesij nostratis, ait Dodonæus, rubentes bacca, quarum usus & non aliarum est, frigida & sicca temperamento sunt, ordine secundo satis intenso, & cum partium tenuitate nonnihil quoque adstrictioris obtinent. Ardores febriles restinguunt ac mitigant: bilem reprimunt, sanguinem contemperant; putredinibus adversantur; sitim vehementer sedant; ventriculi subversiones, & choleram morbum solum; dysentericis ex calida causa laborantibus utiles. Syrupus de Ribes conficitur, ut de Granatis, acidus, cui etiam facultate omnino respondet. A vulgo Montpellier, pluris fit, quod ibi rarior sit Ribes, quam Malum Granatum. Ribesium ad seipenta utile, tum & ad topiarias scenas, quas non difficili opere convescit ac ornata.

Putredines.

Dysenteria ex calida causa.
Syrupus.

RIBES VULGARIS ACIDUS, albas bacca ferrens.

Defr.

Vulgaris similis foret, nisi cortice esset candidiore, florisque facile diffuissent, ita ut sæpe remaneant paucissime bacca, ac etiam singulares. Sed & alia differentia est; bacca enim quamvis acidæ sint, albæ tamen manent, pellucidæ, uniones penè referentis, eisdem tamen cum vulgaribus magnitudinis. Hujus meminit Clus. hist. nomine Ribes vulgaris albo fructu, quem ait Hungaris incognitum. C. Bauh. apud Matth. dicitur Ribes bacca instar unionum candidis. Eid. pin. Grossularia 8. horten-sis fructu margaritis simili; Ribes fructu albo, Eyst.

Synon.

Locus.

Montbelgardum Stutgardia ex horto Ill. Ducis VVirtemb. translata, ubi primùm observata est, floret & fructum fert eodem tempore quo vulgaris.

RIBES FLORE RUBENTE.

Defr.

Firmior bujus frutex est vulgaris, ac robustior, cortice rubescente vestitus; foliis hirsutis, ad tactum levibus, angulosis ut vulgaris, sapore tantillum acidis; longis florum racemis, quos Maio in horto Ill. C. VVir. Montbelgardensi profert, ferè palmari-bus, figura ferè Vvæ crispæ floribus similibus, obsoleto rubore præditis, quorum simbria quinque partita albescit, sapore subacido.

An Clus. Ribes vulg. 2. genus.

Synon. C. B.

An Clus. est Ribes vulgaris secundum genus amplioribus foliis & majore fructu, licet acidis saporis ut vulgaris; hujus enim flos variat, quia qui in vulgari herbacei coloris est, in hoc eleganter rubet & puniceus est. An buic similis quam Ioannes Boisor in horto Bruxellis alebat; Hæc Clusius.

C. B. pin. Grossularia 6. horten-sis majore fructu rubro: Ribes rubro flore, foliis & fructu majoribus, Clus. pan. & hist. Ribes bacca majoribus, Cam. major fructu rubro, Eyst.

RIBES MONOCARPUS.

Vvæ crispæ rubro fructu.

Fructus singularis.

Mittebat anno 1598 aliud Ribes genus ex Anglia acceptum ad Clusium Carolus de Tassis, quod Vvæ crispæ rubro fructu appellatione inscriptum erat. Postea tamen è Jac. Gareti epistolâ Londino missâ fructum ferè intelligebat vulgari similem, paulò majorem, confertim tamen in eodem pediculo non nascentem, sed singularem ut in Vvæ crispæ.

C. B. pin. Grossularia 7. distinctis bacca.

RIBES ALPINUS dulcis.



Ribes alpinus Desfr. dulcis fruticat ut præcedens, tenui vimine, cinereo cortice connecto; folia ex al-Folia; ternis tuberculis, exeunt simul aliquot, cum floret, plusquam dimidio minora vulgaris Ribis foliis, Vvæ crispæ æqualia, in tres acutos angulos exeuntia, in ambitu serrata, l-vissimè hirsuta, superne atrovirentia, infernè lato virore splendens, excurrente in angulos singulos

nervo satis elato, gustu subdulci, ex pediculis femuncialibus, hirsutis; flores ex tuberculis istem racematis coherent numerosi ut in vulgari, herbacei, sed floribus Ribis vulgaris magnitudini multum cedentes, foliis tamen quinque perinde & apicibus constantes, odore gratissimos; singularibus stoculis ad pediculum adnascitur soliolium concolor tenue & oblongum. Vvæ breviores quam vulgaris; acini rubri, subdulces, ferè insipidi.

Gest. b. est Ceanothi levis genus sylv. Rusticis Synon. Red-beer. Eidem in app. Ribes sylvaticus. Lob. Ceanothus. Obs. Ribes candidioribus foliis, acinis dulcibus. Lugd. Grossularia rubra, sive Ceanothi levis genus Grossularia circa sylvas Gesneri. Clus. Ribes genus quoddam, rub. quod Austriacæ & Stiriacæ Alpes alunt, nihil vel minimum à vulgari differens, fructu tamen non acido, sed dulci. Clusius, quod non silendum, iconem habet, qualem Lobelius pro Ribe Arabum exhibet, cum inscriptione, Ribes vulgaris fructu dulci. C. B. apud Matth. Ribes silvestris fructu dulci, aliàs à vulgari nil differens. Eid. pin. Grossularia 9. vulgaris fructu dulci; Ribes vulgaris fructu dulci, Clus. pan. Locum. & hist. Ribes minor fructu rubro, Eyst. Item, Grossularia 10. sive sylv. rubra; Ribes silv. Matth. Gest. app. Lon. Cast. Cam.

Vidi Geneva in monte Saleve, deinde in Thuiri, ac etiam in montibus circa Basileam.

RIBES NIGRUM VULGO dictum folio olente.

Ruticat Ribes nigrum ceu vulgare, folia vitiginea, lata, aversâ parte leviter pilosa, odore sætudo; flores ex eodem tuberculo plures, aut racematis digesti, Vvæ crispæ floribus persimiles, concavi; quinque foliis rubentibus extrorsum reflexis, totidem surrectis pallidè virentibus, alternante cum quinque fibris concoloribus situ; stilus in medio viridis; odor, qui & foliis, gravis; bacca oblonga colore nigro, quæ sive maturæ, sive immaturæ acide sunt, cum sapore partim grato, partim ingrato.

Ruellium de hac loqui existimo quamvis descriptio ejus non placeat, quæ sic habet: Non est o-mittendum arboreum fruticem apud nos esse, quo

quo velut vivā sepe latiores horiorum areas, venustatis potius causā, quā munimentū, cingunt. Is altitudine tenerrimū cubitorum inolefcit, & virgineā fronde viret, supra modum asperā, utrisque lateribus acuminatā, medio in mucrone desinente, ambitu leviter fimbriato, satis ad Lupi salictarij, vel albæ Vitis folium accedente; ramos fundit breves, in quibus excusso flore primū baccule pendent virides, ut in Ligustro racematim coactę, quæ maturitatem adipiscentes nigrescunt, gustu & sapore piperis, sed mitiusculo. Ex prorsus rotundū Piperis faciendi exprimunt; verūm desideratur in eis retorrada illa rugosaque maturitas; abest etiam illa validior amaritudo; gustum Piperis sapore complent; & os, quibus anima foetet, odoris jucunditate commendant. Piperolitores nostri nominant, quōd atrum Piper colore & sapore forsitan æmuletur, Sit ergo nostris Piper atrum, quoad melius vocabulum



invenimus. Vides itaque quā cæca sit harum rerum effigies.


Arbuscula piperis. Math. in Diosc. est Arbuscula piper racematim profertens, Venetiis visa, faciēque illius plantę profus exprimens, quā vulgus Ribem appellat. Et hinc merito appellatur Ribes nigrum. In epist. ad Cortulum scribit, se audire quosdam Dioscoridis Amomum esse recense. Sed quantas recedit nugas, qui ut videatur singulare aliquid conspexisse, Piperis plantam Venetiis in horto Maphæi videri fabulatur. Atqui si frutex ille Piper est, vel etiam Amomum, ut alij sentiunt, parū aberit, quin vulgare Ribes, vel Piper, vel Amomum (teste Guilandino esse possit.

Cum Amomum (ait Lobel. in Adv.) doctos diu exercuisset, & eos peregrina planta descisisset, nostram Ribes nigram opinati sunt, quæ vera non est. Esse scribit Apollo quosdam (est Anguill.) qui Piper silvestre Syrium, Pimento del Rabo Lusitanis vocatum, cujus plantę, tum Venetiis, tum Patavij in hortis quibusdam visuntur, Amomum existiment. Sed considerent docti, an Pimento del Rabo non falsè existimetur fructus Ribis nigri, nisi Venetiis & Patavij, non autem plantę Pimento del Rabo, sive Piperis caudati. Lon. Ribes silv. ingrati odoris. Hadr. Amomum, Pipet hortense ab holorum gente dictum. Tigurensum quidam apud Gesl. quadup. vocat Palmstennden nimis communi vocabulo. Is Pseudamomum esse conjicit, cujus folia & ramuli Sabinam herbam aut felis urinam quodammodo redoleant. Vocatur autem à Gesnero de coll. Ribes silv. aquaticum, Sabinæ ferè odore: de hort. Ceanothus Ribes acris nigris: Item Amomum Anguillarę, Amomum falsum, Pseudamomum, Piper quorundam. Eid. cat. Amomum, in hortis præsertim Gallię Piperis vocabulo olitoribus nominatum; Pfeffer mit bletter wie Schmarwurz: Piper obteres aliquibus Gallis vocatum. Cam. h. Ribes baccis nigris, minoribus & majoribus. Eid. ad Matth. germ. Ribis silvestris quædam acipis nigris. Dod. gal. Ribes nigrum, Groselles n. n. Bel. Schwert Tom. II.

te aelbestien. Lob. Obs. & Ic. ut & Tab. (cuius icon non in omnibus placet) Ribes nigra, Schwartz Johana beer. Lugd. Mos live O. los niger Theophr. Grosularia nigra & alius Pipirella, Officinis Ribes niger, Gallis Porurier & Groslier nigr; fructus Groselles noires. Clus. Ribes vulgaris nigro fructu, Vngaris ignota. C. B. apud Matth. Ribes fructu nigro. Eid. pin. Grosularia n. non spinosa, fructu nigro; Ribes silvestre Trag. Thal. Ribesiu n fructu nigro, Eyst. Frutex Ribi similis fructu nigro, Cal.

Copiosè se multiplicat in hortis: Februarij principio prorumpere incipit. Frutex Gesneri folijs Grosularia hortensis in multis Gallię, Italię quę locis in hortis colitur. Tiguri spontè nascitur, circa rivorum quorundam ripas, ubi facilè comprehendit transfatus in hortos, quem acinos nigros piperi similes in calidioribus locis proferre aiunt, sed Tiguri, ni fallitur Gesnerus, sterilis est. Crescit abundè, si Camer. hort. rectè meminit, in montanis Misnię circa Annzbergam, atque ibi venenati quid istis baccis infesse asserunt, cum aliis in locis esui esse soleant. Sunt qui folijs cibos condiant.

RIBES VERVM Arbum.



Ribes herba Deser. Spica Celtica nascendi modo aliquo pacto naturam refert: siquidem ea sub nive ferè perpetuò degit, folio Lapathi acuti prædita, ni grandius est & rotundius, & ad Papyrus accedens. Baccas fert ex finu medio foliorum rubras, ut in Lauro Alexandrina, Hippoglossio & Rusco conspicimus; septena ut plurimū à radice allurgunt folia, in quorū medio fructus veluti racematim dependet, ex quo is f. coccus qui exprimitur, turbidus est lactisq; e albedinem habet: idèd aliquantisper fini & insolari deest, donec clarescat & depuretur. Hactenus Bellonius, cui lucem addent quæ ex Rauvvolffio paulè diversa (est eandem videantur plantam ambo intelligere) subjicimus: nolimus enim in planta non visa, alterum corrigendi provinciam sumere. De Ribe ergo Arabum (parsum Rauvvolffius; Vera Ribes Arabum, caules habet asperos, longitudine ferè cubitali, crassitudine & pollicari, colore viridi, infernè (ut etiam meminit Serapio) rubescente vel purpurascente. Autumno in veni Septembri mense, sine flore & semine, duobus tantum folijs præditum, tanquam primū prorumpentibus, rugosis, rotundis, Petasitidis folijs æqualibus, ex pediculis crassis, brevibus, quæ etiam grato illo acido succo, sicut & caulibus, plena sunt.

Sunt apud Serap. qui putarint Ribem esse, quam Synon. Acetosam nominamus, & Lapatium; alij Grarum acetosum quod asserunt ex Coracem. Illam Rhazes inter fructus recensuit. Belloni is vult (ait Matth. in post. comm. Ital.) Ribem Serapionis esse plantam reperiunt in monte Libano. Plura Libani.

Verum nescio quomodo possit convenire cum Serapionis descriptione cum notas non habeat, quas tribuit ei Serapio, rotunda folia, capreolos, & arborem esse. Hæc ille, In meo quidem Serapione, arboris nulla fit mentio. Fructus est racemosus, ut scribit Bellonius: capreolos verò habere manifestè scribit Rauwolf. ad iconem, qui folia rotunda; & ipse Bellonius, rotundius Lapathò dicit. Card. var. lect. Ribes verum Bellonij in Libano. Rauwolf. Camer. ad Math. Germ. & Lygd. in app. Ribes Arabu n. Clus. hist. (qui libenter acquiescit sententia Rauwolfij) Ribes legitimum. C.B. pin. Grossularia 12. Ribes Arabu n. folijs Petasitidis; Ribes Serapionis, Camh. An idem cu nhac, Ribes Serapionis folijs Oxylapathi, Bellon. de coniferis, Dod. & Lug. In Libano nascitur, si à Cedris paulò altius usque ad præcipitium montis scanderis. Halepum reversus Rauvol. agnovit in Offic. Rob de Ribes ex veteri nomine & acido sapore. Non parva ejus ibi quantitas apparatur, aliò etiam mittenda, in primis verò ad Turcicum Imperatorem.

Ribes Liban.

Ribes legitimum.

Lacus.

Vires, & temperamentum.

Marbilli.

Ribes Serapionis frigida & sicca est ordine 2. Ex capreolis contritis exprimitur succus, qui coctione inspissatur. Ventriculùm refrigerat, roboratque, car fert cardiacis; sitim restituit; fluxum ventris biliosum, & vomitum compescit, appetentiam excitat; utilis in morbillis & variolis; adversus hæmorrhoidas & ebrietatem. Sapa de Ribes stomachum calidum confortat, autore Mesue, vomitum colericum sedat, sitim extinguit, cordis ebullitionem mitigat, & ipsum confortat, biliosam vomitionem, seu fluxum colericum sedat, & alterat.

AN RIBES RAVVOLFFII, AUT illi congener planta?



Inter plantas, quæ in sportulis Doctoris Colij, sive Coolmans reperta, unam etiam conspiciebam (Clusij verba sunt Exot. lib. 4. cap. 21.) quæ hæc mutila, nec integra, mihi in memoriam revocabat ea, quæ in Cl. V. Leorard Rauvolffij Itin. Germarico sermone conscripto arte aliquot annos legeram. Is enim lib. 2. cap. 11. mentionem facit ejus plantæ quam Arabes appellant Ribes, ex qua Rob

Ribes plantæ congener

Icon Ravv.

de Ribes conficiunt, cujus magnam copiam è monte Libano delatam in Iudicis Halepani horto videbat, ad Rob illud conficiendum, quod deir de Constantinopolim esset ablegandum. Et cap. sequente ejusdem libri, Ribes plantam numerat inter eas quæ ab ipso in monte Libano fuerunt observata. Libro autem quarto, qui seorsim postea fuit editus, & Plantarum figuras additis nominibus dumtaxat continet, ejusdem Ribes primum è terra emergentis iconem exhibet, binis solummodo folijs præditam. Cogitabam itaque apud me, an illa, quæ inter chartas conspiciebam solia cum super rema caulis parte, ad Ribes Arabum plantam referri possent (verisimile enim est, pluribus quam in monte Libano locis nasci, quando quidem apud Medicos Arabes fre-

quens est ejus mentio) aliquot enim notas habere mihi valebantur non valde dissimiles iis, quas suo Ribes Rauvolffius tribuit, veluti foliorum formam, et nelli Petasitidis, quibus Ribes folia comparat, foliis longè inferiorum, nec adè orbiculatatum, ut ille Ribes folia pingit, sed mucronatatum, deinde extrema in caulibus abruptam partem quibusdam folliculis præditam, iis ferè similibus capreolis, seu verticulis vesiculis quas Ribes plantæ adpingit. Quùm verò & sola, & caulis illa extrema pars valde sicca essent, nihil mirum, si aciditatem, quam fortè habuerit, in illis deprehendere non potuerim: nihil tamen asserere volo, sed meam opinionem dumtaxat dubius profero.

Qui porro in regione eam plantam observasset & legisset Colius, nihil in charta quâ folia involuta, erat adscriptum, nec quidem an aliquo in usû apud incolas esse compesceret. Operæ pretium tamen me facturum existimabam, si mutilam plantam qualem conspiciebam, in tabellâ exprimentam curarem, quæ hic adponeretur. Cæterùm, illorum foliorum quorum picturam hæc damus, nonnulla orbiculatis penè erant formæ, hoc est, quinque uncias longa, totidem lata, præsertim in infimâ parte, pediculo cui videlicet inhærebant, proxima, summâ verò & aliquid quantum mucronata; alia, tametsi ejusdem longitudinis & circa pedicelulum latitudinis, sensum tamen in mucronem desinebant, nec adè sphericæ forme erant, sed He dera solum angulorum exers, aut Còvolvuli majoris quodammodo referebant, ejusdemque formæ unâ inter reliqua conspiciebam, cujus longitudo & latitudo sex unciarum erat. Porro non valde densa sive crassa erant ea folia (nescio an sicca, id accidisset) & supinâ parte quandam vitæ in colorem tenebant, pronâ autem, ex albo nallecebant, & pediculis binas uncias longis nitentibus, à quibus nervus prodiens per medium folium secundam longitudinem protendebatur, & ab illo deinde alij minus tumentes nervi inæquali situ oriebantur, ex utroque latere quini aut seni, qui ad folij oras usque excurrentes, intermixtis multis obliquis venulis, magnam gratiam folio conciliabant: summi caulibus abrupta pars, teretes quosdam & oblongos folliculos inter folia proferbat, sed eos, ut mihi quidem videbatur, novellos & recenter natos, còlque inanes & siccos, ut facillimè confringeretur.

Folio Petasitidis.

Icon Clusij & descript.

Folio He dera.

DE SAMBACH SEV ZAMBACH, & Isafimino quædam in genere. CAP. III.

Zambach multis (& verius meâ quidem opinio- Acquisocia. re) dicitur de Gelsemino, ut Ang. Dod. gal. Lob. Adv. Math. Cam. h. Clus. & Bellunensi, qui scribit Zambach absolutè sumptum, esse Liliùm album. Liliùm album. Gelsemus tamen in cat. credit Arabes per Zambachum intelligere Violam [Leucoium] quod non plantam. Leucoium. Præterea hist. quadrup. Virgilij Cassiani esse putat, apibus gratam. At consideratis iis, quæ de Cassia gely. scripsit Virgilius, non video quomodo conveniat cum ea. Verba autem Virgilij posita sunt capite de Cassia poetica. Idem tandem loco proximè citato pro Nerfin Isefeminum vulgò dictum, aut Leucoia poutis, quam illum Rosarum genus usurpare mavult. Nos tamen dicimus Rosam moschatam melius convenire cum Nerfin quam Isefeminum. Gelsem inu. Sunt qui pro certo sibi persuadent Isafimino unguentum Dioscoridis ex floribus fieri, quos in Italia Gelsemiri vulgò appellamus, inquit Matthiolus. Gelsemiri. Quorum opinioni non parum suffragantur tum Hermolæus, tum Marcellus, qui inter Leucoij genera nostrat. Leucoia. ra nostratam Gelseminum comprehendisse videtur, cujus sententia nõ probanda. Gelseminum dicitur à Leu-

omni
re a
co.
min.
bach.
me Diof.
est Gel
inum.
ce.
ila.
illa Le
omina
guar.
omine.
rea.
emper.
leum.
to Set
vorum.
mpetigo.
atarchim.
emper.
Defer.

à Lencio abundè ostendit Serapio, qui alteru n ab altero diversis capitibus distinguit. Nec de Gelsemino agens cap. 17. ulla n Diof. aut Galeni auctoritatem adfert. Credimus ergo Diof. ceterisque veteribus incognitum. Ceteru Arabes Gelsemin appellarunt, tan tñ vernacula eorum lingua Zambach sive Sambach, vocitetur. Addit idem in com. Ital. cap. 63. Gualterum Germanum Argent. manifestè errasse qui existimavit Diof. intellexisse de vulgati Gelsemino. Mattholi n in Diof. meminit ex Serapione, Gelseminum floribus albis, cum luteis, rum caruleis reperiri, quale etiam se vidisse ait. Modo autem in post. com. dicta de diversis coloribus Gelsemini omittit, quasi ante scripsit non visa.

Iasme porò Dioscoridum non esse Gelseminum comprobat Lob. in Adv. dicens. Concinniore quàm certiore ascrivit sibi Gelseminum vulgatum flore albo appellationem de sententia doctiorum, quibus Iasme dictu n putatur, quasi Viola odora, quia solum esset istius floribus oleum apud Persas imbutu, quod tamen gravius spirat, eoque arguit, non esse nostru n Gelseminum. Et Viola latior significatio multò est, quàm ut certam quampiam plantam designare valeat, nedum hanc quam Mauritari Zambach & Gelseminum dicunt. Gelseminum vulgare Casalpino videtur Diof. Smilax levis esse: qui nvis Diof. odorem floris subituerit.

Iasminu n [douron] quasi violaceu, à Violis quas ia vocat; vel Iosine quasi Violæ odor; aut Iasne quasi medicatus odor: Sambach & Zambach Arab. quibusdam Apiaria, quòd apes ejus floribus plurimu n dele teritur. Germ. Deyelröben. Gall. Iessmine. Ital. Gelsmin. A mat a mennis & calidos tractus habeturque in vitidaris & hortis.

Avicenna lib. 2. Canon. tra 2. 2. cap. 619. de Sambacho, Iasmin alba est calidior citrina, & citrina purpurea; & est universaliter calida sicca in secundo. Est subtilitativa humiditatum, & confert senibus ejus oleum. Delet panum quod ex ea humidum, & quod siccum, & facit possidere citrinitatem multitudine odoramenti ejus. Ejus oleum confert ægritudinibus frigidis in nervis, & senibus. Ejus odor facit suda: veru tamen hoc resolvit suda factu m à phlegmate, quando odoratur: & purum oleum ejus facit fluere sanguinem ex naribus calefactu, cum ipsum odoratur. Serapio de temper. simpl. cap. 176. de Iesmine quod est Zambach tradit ex Isaac eben amram, esse quoddam ex eo album, habens florem, & quoddam citrinu, & citrinu esse minus in operatione sua, & citrinu reperiri in Babylonia. Quàm teratur humidum aut siccum, & ponatur super impetiginem aut panum, expelli eos, & resolvi omnem superfluitatem frigidam, & conferre habentibus catharrum, & inducere dolorem capitis illis, qui sint calidæ complexionis, & oleum ejus esse juvativum in hyeme. Sed si calidus aliquis in complexione ndoret ipsum nimis, timendum esse ne faciat fluere sanguinem ex naribus ejus. Esse etiam speciem aliam ex ea, cujus flos sit caelestis coloris. Idem ex Aben mesuai ait esse calidum in principio secundi gradus, cor ferre humiditibus & phlegmatu salso, & senibus frigidæ complexionis, & conferre doloribus quæ fiant à phlegmate viscoso. Ex Mesuaria folia Iesemin humida aut sicca poni docet super impetiginem aut panum, & auferre eos.



coëuntibus viticulis instar caudicis.

Sunt apud Lugd. docti, qui Pothon album à Synon. Theophr. lib. 6. hist. cap. 7. memoratum, Iasminum album putant; Delidertium veru Gaza. Plinius sic interpretatus est: Sed maximè spectabilis Pothos, alterum candidius. Avicen. Zambach, Sambach, vel Iasmin alba. Isaac eben amram apud Serap. Iesemin sive Zambach album. Hermod. Ieseminu flore candido, & Viola Persica, Parthica & peregrina. Viola Pers. Ieseminum Marcello. Gesn. h. Iasne floribus albis. Lob. Adv. Gelseminum vulgatum flore albo: Obs. & Ic. Gelseminum vulgatum. Casp. Gelseminum floribus candidis. Cam. h. & epit. Gelseminum sive Iasminum, Zambach Arabum flore albo. Tab. Ger. Lugd. & C. B. Iasminum album; Miror Tabern. & asclepiam ejus Gerardum pro Iasmino caruleo ponere eandem figuram, quæ albi, ac etiam pro Iasmino luteo, cum luteum differat formam. Caruleum nullo vidi, nec invenio, qui intuitus sit, quamvis ejus mentio fiat apud Matthiolum & post. illum apud alios. Iasminum primum Anguill. Iasminum Cord. in Diof. Dod. Clus. Cam. apud Matth. C. B. pin. Iasminum 1. sive vulgatum flore albo: Apiaria. Dod. Iasminum flalbo Eyf.

Lobelubivis in hortorum angulis apricis & pro prædiorum cavædiis furculo pangitur, àdque ornamenta pergularum, pedamentis erigitur ad fornices. Casalp. floret post Rosam diutius è singulis foliorum alis. Fructum apud nos nequaquam perficit. Hyeme amittit folia.

Iasminum album sicut odore flagrat, ita & viribus multis pollet. Oleum ex hujus floribus confectum cundos discutit humores; frigidis ac catharris confert, & hyberno utile tempore. Quibus autem temperatura contigit calidior, his dolorem excitat capitis, & si diutius odoretur, periculum adfert sanguinis & narium profluvij. Præcipua olei è floribus utilitas ad contractos, induratosque artus, articulos, tendones, nervosque calefacit, emollit, aperit. Vteri morbos arceat, non solum hypogastrici & locis muliebribus illitum, sed etiam potu aut enemate usurpatum. Simili modò prodest & doloribus colicis quos frigidus & viscidus humor concitavit.

IASMINVM HISPANICVM FLORE majore externè rubente.

Consimiles progressus & incrementa habet cum Iasmino vulgato, sed omnibus modis concinnus est; foliorum conjugationes tres quatuorve cum extremo impari alam complect, at singularia folia ex oblongo rotundantur non in mucronem

IASMINVM SIVE GELSEMINVM flore albo.

Longissimis & lentis, licet tenuibus viminibus, & nisi sustententur appositis pedamentis, pro Tom. II.

vulgati more designant, illisque latiora, propius ple-



Synon.

Asmini [Zambach] species tertia. Lob Obs. Chamagelseminum grandiflorum peramænum, humile Gelseminum. Cef. Gelseminum humilius, flore grandiore, supernè candido, inferè subrubente. Cam. apud Matth. & Epit. Gelsiminum Catalonici- cum, Germ. Fremdd Deyelraben/oder Zafsmnen mit grossen blumen. Ger. Iasminum candidiflorum majus, Great white Geseimine. C. Bauh. apud Matth. Iasminum Hispanicum grandiflorum. Eid. pin. Iasminum 3, humilius magno flore: Gelsemi- num humilius 1. Cluf.


Gelsim Ca- talonici.

Zaf. Hisp- anici.

Locus & Tempus.

E Chio insula Gerua primùm advecta, inde Lugdunum. Qui Byzantium profecti sunt, affirmant plantam hanc in eo tractu & multis Peloponensi locis, à Grecis & Turcis studiosissimè coli, & ubivis in hortis spectari. Vt autem propagetur in vulgari inseritur. Floret Autumno & serè per totam hyemem Patavij, Lugduni, Basileæ & alibi in urceis pensilibus culta.

IASMINVM SIVE SAMBACH Arabum, Alpino.



Deser.

Esia.

Flores.

Vires & Sues.

Oleum.

Tumores uteri. Partem in- Sat.


Sambac, sive Gelsimiru, aut Iasmin Arabicu, ut autor est Alpirus, frutex est Cayri in Ægypto, sarmen- tosus, qui sarmen- tis serperdo altiùs se extollit, foliis Mali aurancij pro- vimis, flores albi, odoris foliis præ- diti, omnino si- miles vulgaribus foliis, magnitudi- ne odoreque præ- validiori, ac sua- viori. Vfus florum est magis ad ornatum corporis, quàm ad sanitatem: nihilominus parat oleum, quo utun- tur mulieres in balneis ad uterum calefaciendum & laxandum, ejus enim scirrhosis tumoribus maxi- mè conferre experta sunt, ut partum etiam in illo- rum reddant, oleum hoc & bibunt cald. m. & ip. o

liniunt extrinsecas uteri partes. Vtuntur quoque eo extrinsecis uteris thoracis regionem, cum per os ipsum calidum bibentes, ad ruffim, anhelitumque diu, culratem, & ad pleuriticum lethalem, in qua spu- tum maxima cum difficultate educitur, & ad peri- pneumoniam, atque ad dolores vehementes sto- machi, intestinorum, atque uteri. Parant hoc nostri unguentarij ex dulcibus amygdalis atque de a- mi semibus, ex quibus odore florum lesinam im- butis oleum exprimunt valdè odoratum.

Tussis Pleuritis

Stomach Inestum Venter

IASMINVM SIVE GELSEMINVM luteum, & caruleum.



Iasmini vulgati ri- tu fructat, virgul- tis vicidaribus, an- gulosis, striatis, in- quibus folia, alias terra Polemonij Montpellier sium ri- tu, sed acutiora, fir- miora quàm in albo, interdum duodecu- plo majora, ad Tri- folij bituminosii cul- ti folia magnitudi- ne accedertia, aliàs ve- rò pir. rata ex una duab. ÷ve conjug- ationibus costæ an- nexis, impani semper ur o alam claudente: flores eo ordine & situ quo in Iasmino sive vulgato, sive Hi-

Deser.

spanico, foliis obtusis, luteis. Fructus mediocri- mag- nitudinis, niger, oblongus, bina continet semina magna, nigra, oblonga, quæ se mutuo spectant pla- ra, alterà parte modicè gibbosa.

Lob. Adv. Gelseminum luteum. Eid. ic. & Tab. Synon. Iasminum luteum, Geel Deyel Râben. Quem quis quæso cum ejus imitatore Gerardo excusabit qui pro non viso Iasmino luteo ex sola phantasia ponit albi iconem. Arg. Gelsiminum flore luteo. Gelsin. ha- sine, Iasminum luteo flore, quo nomine Eyst. & C. Bauh. id apud Matth. nominat, qui seorsim Iasemi- num vel Gelsemirum luteis floribus inscribit. Eid. pin. Iasminum 2, humilius luteum: Gelsiminum hu- milius alterum fl. luteo, Cef.

Tab. ex C. raris la- p. sue.

Pflore heimia in horto Grieningeri, qui hieme tegit, adhuc viret Novembri: Argentina floret lu- lio & fructu maturat Octobri. Patavina & quæ- dam Gallica vireta habent florens in æstate.

Locus & Tempus.

Iasminum caruleum nondum vidimus: An Ara- be Ligustrum orientale, quod aliàs Syringa caru- lea dicitur, intellexerint, Cef. dubitat: alij Clema- tide caruleam esse volunt.

Iasminum.

Iasminum caruleum, Tab. Ger. Iasminum 4, caruleum Serapioni, C. B. pin.

PAVATE ARBOR FOLII MALI aureæ. CAP. IV.

Frutex est non admodum ramosus octo aut no- vem pedum altitudinis, cui rara sunt folia, Mali aureæ minoribus foliis similia, exceptâ appendice quæ caret, utrimque eleganti virore prædita: flos exiguus, candidus, quatuor foliis præditus, è cujus medio exit alba filira cuspidè viridi insignis, odore floris Periclymeni, cui procul aspicientibus persi- similis

Deser.

milis videtur, rotundum semen, lentissimi magnitudinis, ex viridi nigricans, & ubi maturerit, nigra n. Caudex & rami cinerei sunt colores, radix alba & inspidata, cum nonnulla tamen amaritudine, odoris propemodum expers.

Acost. de arom. autor est dici, vulgò in Malabar Pavate, à Brachmenis & Canarinis *Vasiveli*; Lusitanis *Arbol emra lus*



crispulata, h. e. Arbor erylipelas curans. Lugd. Pavate Acost. C. B. pin. Arbor Malabaricum fructu Lentifici.

Tamet si utilis sit hæc planta adversus alvi profusiva, quæadmodum Maacet & Coru, cum illis tamen minimè comparari potest, quædoquidem imbecillior est itaque qui jam dictas novit, ea haudquam utetur in alvi profusivis, at in curando omnis generis duntaxat ery-

lipelate, & eo præsertim quod è mera bile orum est. etenim insigni virtute adversus hunc morbum pollere deprehensum est. Teritur & maceratur hujus plantæ truncus sive radix orizæ decocto (Canicie uocant) aliquot horis quiescere sinitur ut acefcat hæc aqua, erylipelas deinde ea inurgitur bibendaque propinatur sufficiente quantitate bis in die purgato priùs ventriculo. Eadem ratione præbetur radix orizæ decocto macerata iis qui jecoris inflammatione laborant & febrium arduoribus, addito autem succi foliorum Tamarindi momento vulnereum labia circumquaque inungi solent ad inflammationes prohibendas, & humorum defluxus cohibendos. Quoniam verò iis in provinciis multò majore quantitate Pavate quam Coru crescit, incolæ eo utuntur.

Pavate.
Vasiveli.
Arbor erylipelas curans.
Vires.
Erylipelas.
Radix.
Inflam. accoris.

Clymenum Diosc.
Clymenos Plinio.
Similis Plantagini.
Succus.
Plinij Lævis.

CLYMENVM VETERIBVS. CAP. V.

DE hoc ita Dioscorides differit. Clymenon caulem profert quadrangulum, seu Fabæ, folia Plantagini similia; folliculos verò habet supra caulem ita dispositos, ut alter in alterum propendeat, velut in Iride ac polyporum citris. Hoc alij inter notha Dioscoridis Calycanthemon vocant, alij Periclymenon, alij Heliophycs, quasi folis plantam. Nonnulli Hepatitum, alij Smlacem, alij Anatolicon, alij Pyticon, alij Merginem, Latini Volucrum, seu Volucrum majus. Egyptij Oxivi, Clymenon, alij Clymenium, & Agonon (quod sterilitatem inducat quamquam id Periclymeno magis convenit) nuncupant.

Plinio Clymenos herba à rege appellata est, Ederæ foliis, ramosa, caule inani, articulis præcincta, odore gravi, & femine Ederæ, sylvestribus & montosis nascens. Græci plantagini similem esse dicunt, caule quadrato, folliculis cum femine inter se implexis, velut in polyporum cirris. Succus in usu vi summain refrigerando. Et alibi. Præcordiis & ilibus utilissimum Clymeni semen potum diebus 30. pondere denarij in vino albo. Hoc in loco Plinius Clymeno perpetam illi omnia reddidit, quæ Diosc & Gal. (qui hujus nusquam meminit sicut nec post

ipsum Paulus) Periclymeno assignarunt. Quam re quidem Theophrastum secutus est, scribentem: *Impotentes facere posse creditur, qui fructum [τοῦ κρυπτοῦ, sem. in Gaza] Clymeni [τοῦ κρυπτοῦ, Volucris Gaza] collectum modo sextarij triginta assidue diebus, portionibus æquis biberit ex vino albo. Sic enim penitus sterile scere hominem aiunt, si potionem absolverit. Gaza æquivoco vocabulo usus est, Volucrum interpretans, eo tamen nomine Periclymenum Dioscoridis se intelligere demonstrat. Is Theophrasti *Asoplu* lib. 2. de caul. cap. 25. etiam Volucrum interpretatur.*

Clymenon describi aliter à nostris (ait Hermol. coroll. 622.) quam à Græcis Plinius affirmet. Nam quod is de Clymeno prodidit, Diosc. Periclymeno vocatæ tribuit, & descriptio nostrorum de Clymeno, Periclymeno serè convenit. Cur quæso Hermol. descriptione nostrorum non vocat, quam hoc in loco se prætexisse scribit. Plinij ea est, nec ulla n aliam prætexit. Si quis præterea consideret, quæ cap. seq. adfert, apparebit eum nullum tradere discrimen, inter Clymenum primum Plinij & Periclymenum Dioscoridis. Ruellius quæ recitat partim ex Plinio, partim ex Hermolao transcribit, licet more suo eos silentio præterire non erubescat.

Ex hætenus dictis igitur constat Clymenum dici à Plinio de Periclymeno Dioscoridis, id quod Hermol. & Matth. attestantur. Clymenum Cortusi. *Lathyrus sativus latifolius* v. seu *Clymenum Matthioli*, Lugd. bellè facis Clymenum Dioscoridis imitari videtur Matthiolo: de hoc hist. nost. lib. 7. de Lathyro majore flore tractabimus. Clymenum Ruellij, *Lathyrus Scrophularia secunda* Dod. *Ocimum strum* Tragi, seu *Scrophularia Betonica aquatica* Septentrionalium, perperam quibusdam Clymenum Dioscoridis creditur. Ad Scrophulariam majorem (de qua lib. 28.) Clymenum Ruellij referendū existimo, verèor tamen ne ei attribuat quædam, quæ ad Saponariam pertinent. Clymenum (inquit Matth.) non est Saponaria vulgò dicta, ut voluit Ruellius. Sed fallit Matthiolum. Ruellius per Clymenum suum non intellexit Saponariam, de qua ipse scribit.

Clematitum alteram minorem longifoliam Lobelij, quidam apud Lugd. Clymenum esse arbitrantur. de hac poltea agemus, sub titulo Clematidis flore leucocæruleo, surrecto.

Cæterò, probatissimum Clymenon est, autore Dioscoride montanum. E frutice toto cum radice succus exprimitur, qui ad sanguinis rejectionem in Succi. potu efficax est, itemque ad cæliacorum profusiva, rubentemque fluxorem muliebrem: quippe qui astringat simul atque refrigeret. Sanguinem quoque naribus erumpentem supprimit. Folia tuta aut follicali, si vulneribus recentibus imponantur, eorum efficaciter sanant, ut etiam ad cicatricem perducant.

PERICLYMENVM VETERIBVS. CAP. VI.

PERICLYMENON, ex Dioscoridis sententia, frutex est exiguus ac simplex, habens ex intervallis foliola caulem amplectentia, subcandida, hederacea, ac inter ea nascentia germina, in quibus semen Hederæ; florem candidum seu Fabæ aliquid rotundum aliquid tantulum rotundum in folium procumbentem; semen durum & quod difficile evellatur: radicem crassam acrotundam. Hæc sic paulò aliter Plinius. Periclymenos fruticat & ipsa, ex intervallo duo folia habens, subcandida, mollia. In cacumine autem semen inter folia du-

Permelis ch. ar.

Caprifolium. Matrisfolia recentiorum.

Lignum.

Vires & vjus. Lien.

Serilitas. Febres.

Ex Galeno temperatissimum.

Ex Plinio.

Errat Plin.

Marcelli error.

rum, & quod difficile evellatur. Considerans, quæ Hermo. præcedenti cap. de Clymeno scripsit, observabit facillè eum Clymenum primum Plinij idem facere cum Periclymeno Dioscoridis. Dicit enim in Clymeno de Periclymène actum est, quod runc Caprifolium [perperam teste Cron.] & Materfolva vulgò [officinis] appellatur. Ceterùm id maxime Matthiolum ad credendum impellit, vulgatam Matrifolvam esse Peridymenon, quòd non solè n omnes hujusce ætatis rei herbariæ peritissimos in hanc sententiam devenisse compererit, sed quòd etiam ex notis, quas illi reddidit Dioscorides, ita esse cognoverit. Periclymenon, inter Diosc. nota, aliquid Ægine n [nomenclaturâ à capris facti] alij Clymenon, alij Carpathum, alij Splerium, alij Hepatitum, alij Helixen majorem, alij Clematium, alij Myrsinon, alij Calycanthemon, Prophetæ Pileum Veneris, Ægyptij Turcum, Romani Volucrum majus, Aphri Lanath appellat.

Nascitur in arvis ac sepibus autore Diosc. convolvens te propinquis fructibus, admiculis quibuscunque, Plin.

Semen postquam ematuit collectum & in umbra siccatum, si drachma pondere ex vino bibatur quadragesim diebus, lienem absumit, lassitudinem discutit, & orthopnoeæ atque singultui prodest; sed unnas ciet statim è sexto die cruentas. Idem partum quoque accelerat. Sed & folia idem sunt prædita viribus, ac tricenis septenis diebus epota sterilitatem in viris facere produntur. Eadem, si ex oleo perungantur, febrim circuitibus redeuntium horrores abigunt.

Periclymeni ex mente Galeni, utile est & semen & folia, siccandi simulque calefaciendi vim habentia, adeò ut etiam urinam cruentam efficiant, si diutius bibantur. In principio tamen solum urinam cient. Si verò foris cum oleo illinantur, calefaciunt. Semen autem etiam siccatur. Et quidam tradunt si amplius bibatur, omnino effici ut bibentes non gignant. Quidam etiam certum diem in tempus præterniunt tali potioni: quæ admodum & Diosc. septem & triginta dies. Hæc etiam urinam cruentam reddicit à sexto die. Semen Periclymeni, ait Plinius, in umbra siccatum tunditur & in passillos digeritur. Hi resoluti dantur in vini albi cyathis tribus, tricenis diebus ad lienem, eumque urinam cruentam, aut peralvum absumit: quod intelligitur à decimo statim die. Urina ciet & folia decocta, quæ & orthopnoicis profunt. Partum quoque adjuvat, secundaque pellunt pota simili modo. Dicitur autem tea est, Plinij aperte Clymenum cum Periclymeno confundere. Nam quæ de Clymeno tradit, ad Periclymenum pertinent: quæ verò ex Græcorum sententia scribit, ad Clymenum Dioscoridis spectant. Et in hoc sequutus est Theophrastum, qui & ipse Clymeno adscripsit, quæ Diosc. de Periclymeno prodidit. Illius sententiam sequutus quoque Marcellus à vero aberrat. Etenim magnum est utriusque herbarum discrimen.


PERICLYMENON PLVRIMIS, SIVE
Caprifolium duplex, perfoliatum, & non perfoliatum.

Deser. non perfoliat.

Hvjus radix lignosa, reptatrix, teruis, cum suis radnatis; flagella plura, atheræ epis indiga, tenuia, longa, lignosa & in ramulos parva, sursum reptantia, cauliculis & geniculis intercepta, leviter pilosa; folia ad genicula ex intervallis bina longiuscula & acuta, mollia, dilectè virentia, in superiore tamen parte magis increscentia: flores in summis ramulis complures pariter emicant, oblongi, amariissimi, suavi odore, subæ bellicæ directæ aut promiscidi

similes ex corniculato argufo principio in latius orificium fuscitentes, laciniatæ simbra ligularumque pulchritudine spectabiles: ut scilicet, stamtribus al quot è medio excurrentibus: color albus ac interdum flavescens. Fructus acinis Sabuci similis cõglomeratus, per maturitatem rubens, in quo semen duriusculum; succo abundanti acini saporis ingratum.

PERICLYMENVM NON PERFOLIATVM.



PERICLYM. PERFOLIATVM.



nascitur acinorum Sabuci magnitudine colore rubro, diluore, ut ait Dodon.

Meminit Periclymeni Pandectarius, qui quidem Periclymenon nullum ejus discrimen tradit, sed in genere de herba hæc his verbis. Matrifolia latinè, græcè Splenion, vel Splenaria, vel Lienalis, vel Periclymenos. Herba est cujus folia ex altero laterum subalbida, & ex altero subviridia; se involvens & adherens sepius; cujus fructus est magnitudinis Cubebarum in principio viridis, & cum maturaverit citrini coloris tendentis ad rubedinem positi ordinariè, & conclusi in duobus foliis simul conjectis, existentibus in capiibus stipitium iuxta eum.

Matris sylve nomico (inquit Cron. in comp. Matrifolia) insignivit Periclymenon Græcorum Scrib. Largus, quam luculenter ex veteribus Dioscoridis & Plinius aperuerunt, & Gal. 8. simpl. Volucrum majus quoque appellat, Pandectarique Caprifolium nostrum declarat: nam notæ cum Periclymeno veterum satis conveniunt; unde doctissimis idem sonant, si Matthiolum & Amatium excipiamus: nam ij Caprifolium Pyxacar thama ferunt. Mefue inter Volubiles tertia speciesi ostendit.

Principio in latius orificium fuscitentes, laciniatæ simbra ligularumque pulchritudine spectabiles: ut scilicet, stamtribus al quot è medio excurrentibus: color albus ac interdum flavescens. Fructus acinis Sabuci similis cõglomeratus, per maturitatem rubens, in quo semen duriusculum; succo abundanti acini saporis ingratum.

Alterum genus (perfoliatum) Narbonense quale in horto habemus à præcedenti vulgari in Germania differt foliis penè glaucis rotundioribus &

pediculis brevissimis, quorum quædam sunt sepe corrinqua & à viticulis trajecta pertusave, suprema autem acetabuli instar modicè concava, sapore subacri; ex quorum cotyla flores prodeunt præcedentibus similes arenatissimi, suavitiam odore, colore ex purpura albescente aut in luteum larguescente, superioris similes, breviores tamen ac paulò minores Dodon. ex tubulo eminet stammina albidia. Semen glomeratim nascitur acinorum Sabuci magnitudine colore rubro, diluore, ut ait Dodon.

Meminit Periclymeni Pandectarius, qui quidem Periclymenon nullum ejus discrimen tradit, sed in genere de herba hæc his verbis. Matrifolia latinè, græcè Splenion, vel Splenaria, vel Lienalis, vel Periclymenos. Herba est cujus folia ex altero laterum subalbida, & ex altero subviridia; se involvens & adherens sepius; cujus fructus est magnitudinis Cubebarum in principio viridis, & cum maturaverit citrini coloris tendentis ad rubedinem positi ordinariè, & conclusi in duobus foliis simul conjectis, existentibus in capiibus stipitium iuxta eum.

Hermol.

Clymenos
Plinij 1.
Pericylymenum
Romano-
rum.

Hermol. in Diosc. vocatur Clymenos Plinij prima, Pericylymenum Dioscoridis. Ruell. Car. Steph. in coll. & Fuchs. Pericylymenum Romanorum, Volucrum majus, Pericylymenos Plinij: Sylva mater Scrib. Largi: Caprifolium & Matrifylva vulgi, licet Caprifolium ei, quam Matrifylvam vocant, teste Cornario parum respondeat.

Caprifolium
non est
Matrib.

Sunt (inquit Matth.) qui Pericylymenum perperam Caprifolium appellant; Officinae Matrifylvam vocant: Italis quia in sepibus & frutetis nascitur, adeo ut sepe tam pertinaciter inhaereat ligetque admiculata, ut in ea imprimat vestigium, merito Vincibosco dicitur. Planè hallucinantur ij, qui Caprifolium, & Matrifylvam seu Pericylymenum idem esse existimant, in quorum numero esse deprehendunt Ruell. & Fuchsius (in p. st. e. mm. non Fuchsiem, sed Mantium accusat). In hunc autem lapsum hos fortasse deduxit Matthaeus sylvaticus Pandectarum autor. Si quidem is suum Caprifolium Matrifylvam nominat, cum tamen, ut subinde legitur, nil aliud Sylvatico Caprifolium fuerit, quam Dioscoridis Pyxantha, seu Lycium, non autem Pericylymenum, de quo seorsum sub titulo Matrifylvae Sylvaticum ipse disseruit. Quod fortè non animadvertentes ij, Caprifolium & Pericylymenum idem esse putarunt. Ruellium autem, simul ac Fuchsum lapsos, falsè concludit Matthiolus, quum vulgè atque recentioribus herbariis Caprifolium vocatum asserant, nec propria sententiâ id statuunt: ipse autem affirmat Matrifylvam (repetens verba Dioscoridis sicuri & cetera in sua ejus descriptione) semen prædurum & quod difficilè evellatur habere, caule & radice simplicia, quæ an manifesta sint in Matrifylva aliis dijudicandum relinquimus. Matthiolus sua iconè exhibet Pericylymenum perfoliatum.

Vincibosco.
Error multo-
rum.

Pericylymenum perfoliatum. Ruell. Carol. Steph. in Coll. Cord. in Diosc. Fuchs. Corn. Matth. Dod. gall. & lat. Trago, Ruyffo, Cronemb. Gesn. hort. & de coll. stirp. Had. Junio, Turnero & plerisque. Dorsth. sub titulo Caprifolij ineptè ponit iconem Hepaticæ stellariæ.

Lycium.

Lob. Adv. Pericylymeni Periplocas hodiernis Græcis vocati, duplicem observari varietatem testatur ex folio. Italicæ sc. & Narbonensi vulgationi folium unum & continuum. Septentrionali, non perfoliatum. idem Obsiduas habet figuras, unam hoc titulo, Pericylymenon perfoliatum calidarum regionum; alteram hoc, Pericylymenon non perfoliatum; In Ic. Pericylymenum perfoliatum calidarum regionum officinarum, Pericylymenum non perfoliatum, Septentrionalium. Apollinaris nomine Geißblatt figuram ineptam exhibet, alia verò impressione penitus omittit. Tab. Pericylymenum. Item, Pericylymenum perfoliatum durschige Speck Lilgen. Compilator Tabern. satis demonstrat suam imperitiam stirpium in nomenclatura Germ. tribuens Pericylymeno perfoliato quod tribuitur Hyperico. C. Bauh. phyt. Pericylymenum. 1. sive perfoliatum, ex purpureo niveo colore nitens; aliquando & luteo asperfo. Item Pericylymenum 2. sive Germanicum vulgare. Eid. pin. Pericylymenum 1. non perfoliatum germanicum. Caprifolium, Brunf. Gesn. & Lon. Germanicum, Dod. Pericylymenum, Trag. Fuchs. Dod. gall. Turn. Cord. in Diosc. Gesn. h. Cam. Thal. Tab. Ger. Germanicum, Eyf. Pericylymenum Septentrionalium, Lob. Clus. Item, Pericylymenum 2. perfolia. um: Pericylymenum, Matth. Ang. Lac. Lob. Adv. & Cast. alterum Dod. gal. Pericylymeni species foliis urticis, Gesn. h. Peric. perfoliatum, Lob. Lugd. (& grandius) Tab. Ger. Eyf. Peric. vulgare alterum, Clus. hist. Vinciboscum vulgo, Cast.

Matth. re-
suscitatur.

Dod. gall. Pericylymenum in hist. duo ejus genera tradit. Vnum Caprifolium germanicum, alterum Caprifolium Italicum; utrumque fruticem amplexicaulem, & vicinis adminiculis sese circumligantem. Porò Sylvaticum reprehendit qui dixerit Lycium vocari Caprifolium & Matrifylvam. Ejus verba hæc sunt: Matthæus Sylvaticus Caprifolium & Sylvarum matrem cap. 137. rectè quidem Pericylymenon, sed perperam Lycium & Pyxantham interpretatur, Pericylymenum cum Pyxantha ineptè cõfundens, pejus uerò etiã facit Caprifolio vires Pyxanthæ ascribens. Sed cap. 131. Matrifylvam Pericylymenon & Caprifolium rectè asserit ac legitimis ei ex Diosc. vires refert.

Matth. Scri-
ba Diosco-
ridis recit-
at.

Diosc. bis videtur Vinciboscum plantam describere, ait Cast. Pericylymenum, modò Cyclaminum alteram vocans. Pericylymeni descriptio in cæteris quidem congruit exceptâ radice, quam dicit crassam & rotundam. At Plinius radice non meminit cum in cæteris cum Diosc. consentiat. De altera autem Cyclamino inquit Diosc. folia fert Hederæ minora, &c. Vbi eadem prorsus facultates leguntur, quæ in Pericylymeno. Afferit quoque Plinius alterius Cyclamini descripti nequaquam diversam à Diosc. enarrationem. Ex quibus patet prædictam plantam magis convenire cum altero Cyclamino ob fructus molliorem & radicem supervacuam. Si igitur eidem accommodari possit Pericylymenum, & fructus durities de semine intelligatur, auferaturque conditio radiceis rotundæ, & crassæ, error erit in repetitione ejusdem diversis nominibus. Probabilius igitur dicendum videtur legitimum Pericylymenum adhuc non comperit esse, non tamen à prædicta planta multum differre. Plinius alibi Clymenum vocat.

Icon Matth.

Pandell. re-
preh.

Clus. hisp. & hist. Pericylymenum vulgare, duplici genere consistit. Illud quod in Septentrionalibus nascitur, extremis ramis multos flores, odoratos admodum & rubrum fructum in unum caput co-

Lycium
perperam,
ut & Py-
xantha.
Error alium

Diosc. not.

Peric. du-
plex. Clus.

atum profert; alterum quod in calidioribus regionibus, veluti Italia, Hispania, & Narbonensi Gallia crescit, est latioribus foliis & binis aut ternis acetabulis extremos ramulos ambientibus, in quorum singulis feni plerumque flores exoriuntur præcociores & minis odorati quàm in priore, quibus succedunt bacca ferè punicea.

Cam. ad Matth. Pericylymenum perfoliatum: de hort. ait, Pericylymeni, Matrifylvae vulgè, sive Caprifolij radix etiam Dioscoridis descriptioni repugnet, nihilominus tamen ex Crateva & Onibasio affirmatur convenire, qui dicunt radicem esse densam & longam. Hujus generis habui elegantissimam stirpem ex horto Ill. Princ. Landgravij Hassiæ V Vilhel. Pericylymenum perfoliatum sive Italicum flore odorato vocatum.

Pericylymenum Hermol. Ruell. Carol. Steph. in Coll. Cord. in Diosc. Fuchs. Corn. Matth. Dod. gall. & lat. Trago, Ruyffo, Cronemb. Gesn. hort. & de coll. stirp. Had. Junio, Turnero & plerisque. Dorsth. sub titulo Caprifolij ineptè ponit iconem Hepaticæ stellariæ.

Lob. Adv. Pericylymeni Periplocas hodiernis Græcis vocati, duplicem observari varietatem testatur ex folio. Italicæ sc. & Narbonensi vulgationi folium unum & continuum. Septentrionali, non perfoliatum. idem Obsiduas habet figuras, unam hoc titulo, Pericylymenon perfoliatum calidarum regionum; alteram hoc, Pericylymenon non perfoliatum; In Ic. Pericylymenum perfoliatum calidarum regionum officinarum, Pericylymenum non perfoliatum, Septentrionalium. Apollinaris nomine Geißblatt figuram ineptam exhibet, alia verò impressione penitus omittit. Tab. Pericylymenum. Item, Pericylymenum perfoliatum durschige Speck Lilgen. Compilator Tabern. satis demonstrat suam imperitiam stirpium in nomenclatura Germ. tribuens Pericylymeno perfoliato quod tribuitur Hyperico. C. Bauh. phyt. Pericylymenum. 1. sive perfoliatum, ex purpureo niveo colore nitens; aliquando & luteo asperfo. Item Pericylymenum 2. sive Germanicum vulgare. Eid. pin. Pericylymenum 1. non perfoliatum germanicum. Caprifolium, Brunf. Gesn. & Lon. Germanicum, Dod. Pericylymenum, Trag. Fuchs. Dod. gall. Turn. Cord. in Diosc. Gesn. h. Cam. Thal. Tab. Ger. Germanicum, Eyf. Pericylymenum Septentrionalium, Lob. Clus. Item, Pericylymenum 2. perfolia. um: Pericylymenum, Matth. Ang. Lac. Lob. Adv. & Cast. alterum Dod. gal. Pericylymeni species foliis urticis, Gesn. h. Peric. perfoliatum, Lob. Lugd. (& grandius) Tab. Ger. Eyf. Peric. vulgare alterum, Clus. hist. Vinciboscum vulgo, Cast.

Pericylymenum perfoliatum. Ruell. Carol. Steph. in Coll. Cord. in Diosc. Fuchs. Corn. Matth. Dod. gall. & lat. Trago, Ruyffo, Cronemb. Gesn. hort. & de coll. stirp. Had. Junio, Turnero & plerisque. Dorsth. sub titulo Caprifolij ineptè ponit iconem Hepaticæ stellariæ.

Pericylymenum Hermol. Ruell. Carol. Steph. in Coll. Cord. in Diosc. Fuchs. Corn. Matth. Dod. gall. & lat. Trago, Ruyffo, Cronemb. Gesn. hort. & de coll. stirp. Had. Junio, Turnero & plerisque. Dorsth. sub titulo Caprifolij ineptè ponit iconem Hepaticæ stellariæ.

Pericylymenum Hermol. Ruell. Carol. Steph. in Coll. Cord. in Diosc. Fuchs. Corn. Matth. Dod. gall. & lat. Trago, Ruyffo, Cronemb. Gesn. hort. & de coll. stirp. Had. Junio, Turnero & plerisque. Dorsth. sub titulo Caprifolij ineptè ponit iconem Hepaticæ stellariæ.

Nascitur in silvis & in fœticetis, & fruticibus, nonnullisque arbutis. Vere folia exeunt, flores quandoque Aprilis, crebrius Maio ac Junio conspiciuntur; fructus sub Autumni tempus. Vtrumque genus Belgicis & Germanicis hortis valde familiare, pergulas interdum vestit. Neutrum spontè nascitur quod sciat Clusius, in Vngaria, Austria & Bohemia. Frequens tamen est in Hærcymia Saxono thungarica.

Nomina
linguarum

Locus &
Tempus.

ca circa Osterodam oppidum Ducum Grubenhagiorum ubi dicitur Wildrancken. Montbelgardi passim in dumetis, sepibus & sylvis provenit; sponte folio non persoliato, Basilea etiam variis in locis in sepibus: floret Maio, Junio, Julio, Augusto, Septembri & Novembri Montbelgardi: In Alsatia copiosè occurrit non persoliatum: Montspeli persoliatum florens Aprilis & Maio in sepibus.

Vires.
Temperamentum.

Vehementer calefacit & desiccatur, id quod gustu etiam ipso apprehenditur. Folia siquidem, at tunc tantum Fuchsis, acrimonia in quandam præ se ferunt gustata. Ex facultatibus autem superius à Dioscorido, Galieno, & Plinio comemoratis, nemo non intelligit,

Gustu.

fruticem hunc esse Periclymenon: cum enim gustu acrimonia in præ se ferat, necesse est omnia hæc quæ veteres Periclymeno tribuunt, possit. Quibus accedit, quod recentiores etiam herbarij suo Caprifolio eandem vires assignent. Exiccare enim ipsi non tradunt ulcera humida & sordida, sanare impetigines, & alias cutis feracitates, lienem abluere, difficultati spirandi conferre, partus celeritatem facere, calculos pellere, facies maculas abstergere, & ista posse quæ non ardent referre. Cæterum Matrisilvain eorum in unguentorum usum venit, quæ ad capitis vulnera parantur. Namque hac in re efficacissimum est medicamentum, namvis è veteribus neminem hæc inveniunt in usu venit, quæ ad capitis vulnera parantur. Namque hac in re efficacissimum est medicamentum, namvis è veteribus neminem hæc inveniunt

Vlcera.

Ad unguenta.

inveniunt in usu venit, quæ ad capitis vulnera parantur. Namque hac in re efficacissimum est medicamentum, namvis è veteribus neminem hæc inveniunt

Id. de Pigno.

Error pharmacopœicæ huius succum.
Error alium decoctum.
Aqua.

inveniunt in usu venit, quæ ad capitis vulnera parantur. Namque hac in re efficacissimum est medicamentum, namvis è veteribus neminem hæc inveniunt

inveniunt in usu venit, quæ ad capitis vulnera parantur. Namque hac in re efficacissimum est medicamentum, namvis è veteribus neminem hæc inveniunt

inveniunt in usu venit, quæ ad capitis vulnera parantur. Namque hac in re efficacissimum est medicamentum, namvis è veteribus neminem hæc inveniunt

inveniunt in usu venit, quæ ad capitis vulnera parantur. Namque hac in re efficacissimum est medicamentum, namvis è veteribus neminem hæc inveniunt

Partes.

inveniunt in usu venit, quæ ad capitis vulnera parantur. Namque hac in re efficacissimum est medicamentum, namvis è veteribus neminem hæc inveniunt

PERICLYMENV M RECTVM PRVCTV rubro & nigro.

Descri.



Svo caudice rutilo fulci indigum sui gignit hoc Periclymenon, fruticibus annuerandum: cui folia Corni feminae vulgè dictæ, molliora, minus nervosa, utrinque hituta, bina opposita: quo numero quoque flores uni eidemque pediculo insidentes ex foliorum alis erumpunt, ex luteo pallescentes, Periclymeni vulgaris formâ, minores tamen superiore

folio sursum reflexo, umbriato; inferiore demisso, angustiore, integro, odore grato, quibus decidentibus bacca gemella subnascuntur eidem pediculo testium instar appensæ, per maturitatem rubentes, Sambuci aquæque, sapore nauiscofo.

Dod. gall. Caprifolij 3. species, existimata Periclymenum & Caprifolium, cujus flores, fortè Dioscorides floribus Fabæ verè comparavit; fructus Helvetis Gindstürben nuncupatur: Item, Periclymeni species, Cerasum caninum. Eid. hist. Xylosteum, quod plerique Periclymenum stans appellant: Germani alicubi Gunda Bisfen / & Gonds Zerfen: unde Xylosteo nomen datum. Sunt qui Clymenon esse suspicentur, quibus Periclymenon, ab huius similitudine, veluti convolvulus est Clymenon dictum videtur. Sed Clymenon aliud omnino stirpis genus, caule Fabæ, & folio Plantaginis: ut quidem Dioscorides ait.

Synon. Caprifolium.

Xylosteum. Periclymenon.

Gesl. h. Periclymenon cognatus frutex, Xylosteon, Beinholz à Tigurenibus vocatus: Eid. in fin. hist. Cordi, Periclymenum erectum, vel mas de coll. Periclymenus minor gemellis acinis.

Clus. hisp. primi generis erecti Periclymeni repetendam descriptionem non ducit, lectorem tamen ad nonitum vult (in hist. ubi secundi generis Periclymenum re. tum. i. vocat. in æquales baccas non ferre, quemadmodum nonnulli existimant, sed geminas semper, easque perpetuè æqualis ferè magnitudinis, etiam in Pannonia, Austria, Moravia, Bohemia, ubi plurimum, tum in Allobrogum, Helvetiorum, nec alpebus & aliis locis, in quibus spontè crescit. In Belgicis autem hortis cultum, vivit unquam æquales ad maturitatem perducere deprehensum esse, ac cum una [bacca] excresecat & turgida fiat, alteram semper exillem, plenam tamen remanere, lagenulamque gestatouam, aut Cucurbitulam referre quodammodo videri. Hoc porro Periclymenum re. etum. i. Clus. parva ubi eadem scribit, duplex tradit re. etum. i. fructu sc. rubro & nigro, æqualibus perpetuè bacca. cis variis in montibus Hispaniæ satis copiosè reperitur. Lob. Alv. Periclymenum alterum Allobrogum, Corni feminae effigie: Obs. & Ic. Allobrogum Periclymenum. Trag. Halimum (seu ut alij legunt Alimum) à Dioscoride descriptum esse existimat. Sic & Lonic. Halimum Dioscor. cum Trago esse finit, donec aliud quod melius conveniat producat. Sed uterque fallitur, nec enim convenit cum Halimo hæc planta. Folia siquidem solis Oleæ, ut Halimi, proxima non sunt, sed multò latiora.

Locus.

Periclymenon.

Halimum. Trago & Lonic.

Trago. & Lonic. re. etum. i. Probantur.

An Cæf. frutex quidam in Alpibus sine nomine, similis Corno, brevior: fructu similis parvis Cerasis, qui geminus in uno longo pediculo est rubens in maturitate, coëuntibus aliquando ex toto granis, in singulis duo, aut tria femina continentur sine ossè, bipartito conceptaculo, ipsa femina oblonga, ut etiam grana, ut Corni, sapore amaro. Hæc Cæsalpini iudicio, quoque Cornus femina dici possit apud Theophrastum. Contra Dalechampius vocabat Vitæ Idæam Theophrasti.

Ant. & fin. tex. sine nomine similis Corno?

Cornus femina.

Vitis idæa Theophr.

Dalch.

Tab. Periclymenum rectum, Ger. Periclymenum rectum fructu nigro, Flæse berried woodbinde. Cam. h. Periclymenum, sic & Lugd. rectum, dictum Xylosteon Dod. Thal. B. pin. Chamæcerasus spuria sive Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rutilo Xylosteum fl. albis vulgatus. E. y. f.

Abur dat passim in sepibus, fructu in maiori o lilio, qui cum amari dir edulcis est. Trago, rasitur inter cæteras ferres in dumetis & frutetis, Alsatia admodum familiaris, qua regio e secus ior era & vivis sepibus occurrit. Apud Helvetios & plerisque alios Germaniæ populos, in sylvis locis saxosis perenni tellis est Dodonæus: Aprilis aut Maio flores, sed fructus Autumnio appetere demulsi perfici.

Locus & Tempus.

Tragus

Vitis
Tragi opi-
no expladi-
sur.

Tragus eadem vires quas Halimio tribuit quod Halimum existimavit. Ad ritum dignum quod postquam in descriptione dixisset baccas guttatas nauseam & vomitus ciere, ex Solini sententia Halimum famem compescere scribat, quod equidem facile crediderit, siquidem ubi baccas illius vel semel degustasset, quam primum satius fuit, nec ab eo tempore unquam tanta illum invasit fames, ut predictum deinceps appeteret fructum. Ast si cum Tragulo, quicquid famem compescit & gustu ingratum est Halimum esse dicendum sit, multæ tales plantæ reperirentur. De viribus hujus fructicis nihil compertum habet Dodonæus.

PERICLYMENO SIMILIS.

Vitis filio-
uide.

Vitis sylvestris (inquit Cordus in Diosc. l. 4. c. 183.) aliquam cum Vite similitudinem habet. Idemque hoc nomen invenit, improprie tamen. Non enim idem genus cum Vite fativa habet, ut fativa cultura tantum ab hac distinguatur, sed suum genus à Vite diversum habet. Germanis hæc sylvestris Vitis Spectraben appellatur & flores ejus Spectabilien/Periclymeno valde similis est. Viderunt ergo erit ne cum eo confundatur. Hæc ille. Quam verò plantam intelligat Cordus nondum intelligo: Spectabilien dicitur de Periclymeno.

PERICLYMENVM RECTVM
folio serrato.

Defr.



PERICLYMENO recto vulgari multo humilior est, humarâq; altitudinem rarissimè attingit: multo graciliores & rariore habet ramos albicante cortice testos: folia priore teneriora, longiora, in ambitu nonnihil serrata, supernè virentia, infernè minus incana, quam primis tenellis gemminibus enascuntur inter folia graciles pediculi: unum interterdum, sed binos ut plurimum flores sustinentes, superiore minores & teneriores, non pallescentes ut illi, sed purpurascetes, quibus succedunt gemelli fructus æque magni ac in priore, etiam æquales, nigri tamen, non rubri, succulenti, gustu ingrato. Radius dura est & lignosa.

Clus. hisp. & hist. Periclymenum rectum 2. (ut & Lugd.) germ. Austraciæ & Styriaciæ Fündfber. Tabic Periclymenum rectum 2. Sabaudicum, Duffrecht Waldwind: hoc ei quiritam in hist. Ger. Periclymenum rectum Sabaudicum, Savoy Bois succulents. C.B. pin. Chamæcerasus spuria 2. sive alpina fructu nigro gemino.

Rarum est inventum, & unicum fructicem in Pyrenæis montibus; binos aut tres apud Allobrogos in Sabaudicis; deinde frequentiores variis montibus Austriciæ & Styriæ inveniebatur Clusius; floscit cum aliis Periclymeni generibus; semen Julio maturæscit.

Synon.

Locus & Tempus.

CHAMÆCERASVS GESNERI, VEL
Chamæpericlymenon quoddam
Alpinum.



PERICLYMENI HVIVS ET
sequenti flores.

FRUTEX ligni m. *Defr.*
dulla alba, facie tota ad Xylosteum aliquatenus accedit; brevis ille quidem, licet sit uli quatuor cubitos æquet, ramis aduersis, fragilibus, cineraceo cortice obductis, folia Xylostei jam dicti, sed majora multo, acuminate, hirsuta, potissimum subsus, nec usquam serrata, binæ opposita; flores longiusculi, ad florem Periclymeni recti, seu Xylostei, accedentes, rictu patulo hiances, rubentes, ex aduerso sitis pediculis, longis, ex alis foliorum exortis insidentes; fructus ruber interdum geminus, tanquam ocellis notatus, ex longo pediculo, Ceraso similis, succo insuavi & amaro plenus, in se continet grana ferè sex septemve aut plura, alba, lata.



Frutex hic si Periclymeno recto cognatus videtur, Chamæpericlymenum appellabimus (inquit Gesn. in hist. Cordi) interea Chamæcerasum cupenium: nam & mortuum rostrorum incolæ Bergfrieße appellant, h. e. Cerasa montana. In literis quidem quod sciam, nulla hæc enus ejus memoria extitit; Cerasa rubra sunt veris simillima, paulo minora, succo subamaro, croceo per maturitatem; semina sex septemve aut plura; fructus quidam gemelli visuntur, gustu ingrato; singuli tanquam ocellis aut pupillis notantur; folia Cerasi vel Arbuti, sapore ingrato; medulla ligni alba. Vocat de hort. cum Simlero de alp. Chamæcerasum montanum veteribus inditam.

Lob. Adv. Chamæcerasus sive alpigena humilis Cerasus Cerasus; floribus albidis, pallentibus aut luteolis, fructu binosigartis quinis aut feris; Obs. Chamæcerasus alpigena, (ita & ic. & hist. Belg.) Xylosteum alterum quorundam, Chamæcerasus Cordi: Clus. hisp. Periclymenum rectum 3. Eid. hist. Periclymenum rectum 4. floribus gemellis nunc ex purpura candicantibus, modo purpureis, fructu plerumque unico, rubro, succulento, transparente, duplici summo, ubi flores inhaescent, stigmate notato, sed uricum granum [plura ego semper observavi] continente

Periclymenon recto no cognati.
Chamæcerasum n. r. s. m.

Cerasus humilis.
Clamæcerasus.
r. s. alp. g. e.
Periclymenum.

HISTORIAE PLANTARVM

nente. Cui tēn probatur eorum sententia, qui Plinianam Chamæcerasum esse existimant: cum ejus fructus nullā saporis gratiā commendetur, nullamque habeat tota stirps cum Ceraso affinitatem. Sed magis verisimile judicat (imō verissimum nostro judicio) Plinij Chamæcerasum non esse diversam ab ea, quæ pluitimis Pannoniæ & vicinatum quarundam provinciarum locis spontē provenit, cujus historiam lib. 2. h. n. g. titulo Cerasi pumilæ prosequuti sumus. Nec ipsi satis faciunt qui Ficum Ideam Theophr. lib. 3. hist. c. 17. esse volunt: nam hæc planta nullam notam habet cum ipsius, nec cum Pliniana Ficu Ideâ convenientem. Hæc Clusius, cujus iconem exhibemus sculptam sine floribus, quos in secunda tabella 1. loco depingimus: sicuti 2. loco sequentis flores exprimumus:

*Chamæcerasum
Diaz est
nosstræ
Cerasi pumilæ
Ficus Ideâ
Theophr. nosstræ*

Icones.

Xylosteum.

Dod. in sol. figuram habet Plantini, & describit sub titulo Xylostei alterius, dicens, omnino humilem esse fruticem, cui nomen idem, quod Xylosteo postetitas deditur, cujus minor ac humilis species habeatur ac dicatur: falli qui Chamæcerasum appellant, cum non parum differant.

Tab. vinar.

Tab. Ic. Periclymenum rectum 3. ut & in bist. ubi sexti titulum ei præponit, ac temerè flores appingit. Hæc planta apud Lugd. Idæa Ficus, vulgò Frangule, nomine exhibetur, ac pro Halimo Tragi & Loniceri depingitur, aliorumque Chamæspilum esse dicitur. Sed eorum sententiam magis probat Dalechampius, qui Idæam Ficum hunc fruticem esse putant, quòd ejus historia à Theophr. descripta lib. 3. hist. cap. 17. huic sententiæ ad stipulari videatur: de qua Plinius lib. 15. cap. 18. ubi Alexandrinam vocat. Eandem rursus Lugd. Chamæcerasi Alpina titulo à Lobelio picta tradit, itēque Chamæcerasi Cordi, Xylosteique alterius quorundam, atque, quæ Pena tanquam de rara planta scripserit, Idæam Ficum ostendere videtur. Hæc Lugd. qui confundit Periclymenum tertium Dodonæi sive Halimum Tragi & Loniceri cum Ficu Idæa Dalechampij. Nescio quis vocari Chamæspilum. Miscet etiam cum Alno nigra quæ Frangula Matthioli, duasque habet figuras ejusdem plantæ.

*Repetitio
H. Lugd.*

*Confusio H.
Lugd.*

Synon. C. B.

C. B. pin. Chamæcerasus spuria 1. sive alpina fructu aliquando gemino in uno pediculo, rubente, aliquando ex toto coëuntibus feminibus in bipartito conceptaculo, in quolibet duo aut tria sine ossè. Periclymenum rectum vel mas Gesn. h. Chamæcerasus, Cast. Xylosteum alius, quasi lignum ossèum, ob ligni duritiem dicitur. An Corno similis frutex in alpinis, Cast.

*Locus
Tempus.*

Reperitur propè Genevam in monte Salevæ & in Thuiti cum fructu Iulio. In Waldenburg ditione Basileensium, & in montibus Wassersal cum fructu maturo Augusto. Plantata in horto feliciter provenit. Glaronæ circa Fabrias thermas alibi que & Tiguri etiam in Albio monte nascitur, matura in fine Septembris; locis frigidioribus Augusto. Floret una cum Periclymenis, ait Dodon. fructus Augusto perficitur. Ex Germania in Belgium illatus frutex est. Frequens est Clusio in montibus Pyrenæis & Allobrogicis sed omnium abundantissimum in Pannonicis, Austriacis & Stiriacis, præsertim supra monasterium Neuberg, ubi, & in reliquis vicinis Alpibus plurimum provenit, florens Aprilis & Maio, fructumque Iulio & Augusto plerumque perficiens. Chamæcerasi montani nullum esse usum putat Gesn. audivit quidem quatuor aut quinque cerasa devorata vomitum cretæ: aliquid etiam alvum.

Vires.

*Vomitus
Alvum.*

Diser.

PERICLYMENVM RECTVM

fructu caruleo.

Eiusdem cum Periclymen. o serrato folio alitridinis, sed crassiusculo est stipite, multos in ramo-



diviso; nigricante cortice obductos, qui seaber est, & plerumque multis locis hiat: interdum statim à radice in multos ramos sese dividit: tenelli ramuli purpurascunt, & incanè lanugine pubescunt: folia contrariò situ inter se disposita, ut in reliquis Periclymeni generibus, illi quòd rubras baccas fert non similia, exsiccantis & amarissimi gustus: flos non fuerat Clusio cõspectus cum hujus historiam primùm evulgaret; quando quidem sub finem Iulij solium modò observatus frutex suo maturo fructu onustus: at aliquot deinde annis elapsis, semine natæ stirpes, tertio à latu anno, flores è tenellorum ramorum alis pediculo inhærentes, protulerunt geminos [hos cum præcedenti floribus 2. loco depictos dedimus] rudimento fructus, ut cæterorum, innixos, pusillos, pallefcentes, cavos & in quinque lacinias divisos, ut reliquorum Periclymeni surti ètque generum flores, è quorum umbilico prodeunt quinque staminula flavâ appendice insignita, fructus singularibus baccis, utrimque inter folia brevi pediculo dependentibus, constat, Chamæspilo Gesneri imaginitudine æqualibus, sed longioribus paulò, coloris carulei, quæ vinolo & acidiusculo succo plena, manus rubro colore inficiunt, & multa plana grana continent: radix lignosa latè diffunditur, & multis fibris prædita est.

Videtur nobis habere multa communia cum Synon. Chamæceraso Gesneri. Cluspan. Periclymenum rectum 1. fructu caruleo: Eid. hist. Periclymenum rectum 3. Tab. Ic. Periclymenum rectum 4. In hist. Periclymenum 7. Proponit autem descriptionem Clusij, & figuram à Lobelio exhibitam pro Chamæceraso, cui appinxit flores ad descriptionem effictos, Ger. (qui figuram Tab. sicam proponit) Periclymenum rectum germanicum Germany Consuetud. C. B. pin. Chamæcerasus spuria 3. montana, fructu singulari caruleo.

Crescit sponte ad radices cujusdam montis pago Malitz vocato contiguit, ad fristram, via quæ ad Taurum, superioris Stiria Salzburgensem ditionem pertingentis præcellum montem, ducit: nunc autem semine parum in quibusdam hortis alitur. In Pannonia fructum diligenter colligunt, atque in tinctorium usum reponunt.

PERICLYMENVM PARVVM PRV- tenicum Clusij.

AD Periclymeni etiam genera procul dubio referenda est elegans hæc planta, quæ cauliculis dodrantalibus est, quibus quatuor, sex, rarius octo adherent folia ex adverso per intervalla sita, Phillyrex Narthonensis, sive medix foliis similia, sed paulò majora, magisque nervosa, in mucrone declinentia, quinque costis ab ipso pediculo ad mucronem excurrentibus. E supremotum scolorum cavis duo veluti ramuli exeunt binis foliis eodem modo quo in caule, dispositis præditi, qui cacumine quarta

Tab. taxat.

visus ramosus.

Deser.



terna alia folia genitalia. Existunt ramulorum medio pediculus nudus & sine foliis exit, in cuius summo rubrae baccae flores non fuere observati) racematim coherentes nascuntur, Prutenis rusticis circa Gedanum vulgo Dactiscum appellatum expetita, atque etiam in Norvegia & Succia, ubi in maritimis copiose nascitur, tenui radice se propagans, & vicina loca occupans, hinc inde fibras spargit.

Thomas Pennus qui huius iconem cum descriptione Clusio communicavit, Champericlymeni nomen, nec immerito, indidit. Considerandum verò proponit Clusius an eadem nomen sit (aut certe persimilis) cuius brevi historia ipsi participavit Plen. Hoir. anno 1596. in quibus herbulam inter bacciferas stirpes in Norvegia à me observata foliis Hypeticò humilem tenitur: florè unicò profert, Nigella florì quodammodo similem, ex quo bacca per maturitatem rubentes, non fecus ac vaccina rubra, eijusdem quoque magnitudinis propendit, intus alba, succulenta, sapore admodum dulci: quae mädicata scabiè pruritumque generare vulgò creduntur, atque hinc illis nomen inditum Schrubbeeren. Hæc ille.

Plantulam autem, quæ Clusio sicca relinquebat, valde tenella erat, ex quibus si observabat (q. Hoirus brevitate studens omiserat) singulis succulis five cauliculis sena pletunq; interdum octo na in hætere folia, ex adverso, five contrario situ sæpe nascentia, in imis cauliculis minorâ, in extremis ampliora, Afyri foliis valde similia, è quorum sinu ad laterum pediculi florè sustinentis, aliquando unicuq; ut plurimum bini, utrinque scilicet unus, exsurgunt ramuli bini aut quaternis foliis simili serie dispositis prædicti; florem porò summis cauliculis nitentè, quatuor foliis candidantibus constantè, in cuius medio multarum bacularum suis petiòis in hærentiù rudimenta nigricantia, quæ magnam gratiam florì addere debent.

Clus. pan. Champericlymenum Prutenicū; Periclymenū 2. hist. Champericlymenū: Et, Periclymenum aliud tenerius. Tab. Periclymenum minus, Waldwinder / Zeinlung. Ger. Champericlymenum, Swarff / Bonisfaele. C. B. Periclymenum 3. humile: Itè pin. Periclymenum 4. humile Norvegicum.

GLYCYPICROS SIVE AMARA-DULCIS. CAP. VII.

ARMETA lignosa pedes duos aut tres longa & serè nisi sustineantur procubentia emittit, viridantia, & non nihil purpurea scia, angulosa, gustu primum amaro, postmodum dulcescente, ex quibus alternatim enascuntur folia Solani hortensis atrovirentia, duabus pinnis nonnunquam imâ parte aurita, pediculo circiter unciali: flores serè 4. sed colore purpureascente, pulchellissimos purpurei, quândò candidi. Gest.] in quinque folia extorsum reflexa partiti, in quorum medio apices lutei; hinc succedunt bacca per maturitatem coccinei coloris, sul longæ formæ, molles, lenti & ingrati saporis, patvis granulis plenas: radix fibrosa.

Multum aberrat Cordus tradès, Amarum dulcem Tom. I.



Solano somnifero [Solanium] valde cognata esse, quod foliis scilicet florum formâ, stuctu & viribus (quas in seiplo expertum esse ait) Solanum referat. Quæ enim affinitas tanta est soliorum? Sunt somnifero Solano solia pingua, densa, Cotoneæ mali foliis similia, aut majora: huic vetè solia Solani hortensis, Ocyani assimilata. Præterea non statim dicendum est, Amara dulcis formâ suâ externa Solanum hortense refert, ergo Solano somnifero cognata est.

Dorsth. iconem Glycypticidis exprimens, eâ inceptè Chamapityn & Ajugâ vocat, id quod Traeus etiam monet. Nomen germanicū, Vergiß mein nit, dū Matthiolus à Germano Pharmacopœo pro Chamapity additū erroris inculat Braslavolam immemritò facit: & imperitiùs multò habitur, cū vocatū Ze lenger je lieber (quod diutius ed amantius aut gratius, quod Amara dulci five Circeæ quadrat) sit in Chamapityn transfert. Is autem Hederam Ciliam aut Milacè Theophrasti esse sibi falsò imaginatur, ut & Smilacem levein [quid dicitur in Disf.] magno errore esse contendit, & Smilacè tertiam non a culeatâ antiquorū. Sunt porò qui Vitem silvestrem Dioscoridis esse existimant, inter quos est Mattiolius. Sed hanc opinionem non recipiunt Ang. & Dod. quibus & nos utroq; subseribimus. Herbari studiosi Lutetia, & Monspelij præsertim, Solani speciem faciunt, Solanū lignosum aut fruticosum appellantes; Solano autè simile nihil habet. Sed, ut & Dodoneo placeat, plus fortè similitudinis cū Cyclamino altera habet, quæ Dioscoride, Dioscoridis & Dioscoridis dicitur.

Gels. coll. Solanum perpetuum vulgi, dictum Malacocissus. Eid. h. Solanum fruticosum, Solatrum mortale quorundam, sed mihi minus noxium, in aliis rectius perpetuum, quoniam caules in eo perennent: nam folia amittit hyeme. Aliqui Amara dulcem: quod siquis ramulum aut corticem mandat, primò quidem ingratus videatur gustu, sed quò diutius manditur, eò insignior ejus dulcedo se prodatur, unde nomen ei factum Ze lenger je lieber.

Ex quibus patet Eckardum Chemnice nomen in seroto nuptiali hanc falsò Chamapityn vocare, dum ait, Namque Chamapityn Amara dulci vocatur, Quod magis atq; e magis grata sap. refert.

Chamapityn enim non est grata sapore, ut ipse ait. Amara dulcis dicitur Corn. Trago (cui & Pictiglycy) Lon. Hieron. herb. in apodri, Anguil. Gesh. Matth. germ. Lob. Tab. Ger. & plerisque. Amarum dulce Euchar. & Dorsth. Dulcamara Dod. & Lugd. Circeæ, Lob. Adv. Eid. Obs. Circeæ, Monsp. Cyclaminos altera, Dod. Siliquastrum Plinij, Guil. the. An Melothron Theophrasti: Putat autem Lob. alibi asserti non posse Dulcamoram esse Cyclaminum secundam, cuius sententia sumus cum Dodoneo.

Matth. non bene est Vitis silvestris, ut & Lac. Cast. Cam. h. & ep. cui & Amarum dulce & Solanū arborescens quorundam. Nam Dioscor. viti silvestris multo scilicet florem tribuit. Lugd. Dulcamara, five Vitis silv. Matthioli, & Melothron Theophrasti. Cæc. Siliquastrum Plinij videtur, quod Dioscoride dicitur de Vite silvestri dicitur: folia habere Solano similia.

Solanum scandens. Solanum rubrum. Nominis lingua.

C.B.Solanum scandens, seu Dulcamara, à corticis sapore: Schvv.Solanu rubru, Solanum, λυκίμαρος (ut & Thalia) flore sapiùs violaceo, rariùs càdido. Dulcis amara flore pleno, & fl.cæruleo vulgarior, Eysl.

Locus.

Glycypticis aqua plerumq; subesse indicat. Aquosa enim & rigua amat, & hinc circa serobes & fossas frequenter reperitur, sepibus aut fruticibus aliis in-nitens. Ramulus in aquam impositus, brevi radicu-las emittit, instar Salicis. In terra etiam putat Gesn. furculum de fixu facillè crescere. Folia Vere erupunt: flores Julio exeunt: Augusto bacca maturæ sunt. Monspelij, Patavij & Genevæ floret Aprili & Maio; Bailex Julio & Augusto. Alii in orto flore albo.

Vires.

Morbum, què patrio nomine (inquit VVicius) Warm vocant V Vespali, scilicet potiunculà carant ex Je lenger je lieber radicibus aliquot diebus exhibitâ, ex qua manè sudor gratus sequitur: nec abs-re. interna enim obstructione liberat, & ex ea ortos morbos solvit, urinâ ciet, quare & contra hydropem cum fructu exhibetur. Accipe, præceptore Trago, li-gnû de hac planta libra pondere, ac minutim in fru-tula tali ludici instar concide, dein cû mensura vini albi in novâ ollam eamq; operculo (per quod tamè foramen in medio exiguâ transfigito) probè contectâ; ita quidè ut cû farina ex aqua undiq; oblinatur, reponas, supèrque carbones lento igne decoquito su-pra tertias, demumq; his utare. hæc potio manè hora una priusquâ furgas, & vesperi cû lecto te comit-tere velis, cyathi vulgaris mensura sumpta, morbum regium, præsertim in veteratû leniter per alvû & uri-nâ exigit. Quidam hoc decoctû adversus putridas vē-triculit febres, ex quibus morbus regius oritur, exhi-bent. Nota est hæc planta pastoribus: nā solent illam pecori è collo suspendere adversus morbû què vo-cant die Hynsch; unde Germanicû herbæ nomè natum est, ut Hynschkraut vocetur. Facultate, autore Dodonæo, foliis, fructu calida, resiccans, abstersgens, & digerens est. Fertur ruptis & ex albo præcipitatis, aut casis etiam succum utiliter bibi. Creditur siquid- em concretû alicubi in visceribus sanguinè dissol-vere, & partiû lesarû sanitatem procurare. Calefacit, siccatur (ait Schvv.) tertio ordine, abstergit, digerit. Gu-stanti primùm non nihil amaroris exhibet calore & acrimonia linguâ feriens, quæ tamen ilicò abeunt, perflante dulciculo & imbecillo quopiâ sapore Gly-cyrrhizæ ingratiore fastidiû pariente, magis magisque dulcorem ostendendo. Potû moderatè, citra virium dispendiû viscerûmve incèdium, egerit per sudores urinâq; aquas; atque obstructiones demolitur, quæ sunt i&teri præviæ atq; alumnæ. Eadem facultate lac-mâmis suggerere fructus potis est. Bacçe ex vino ac- diebus splenem liquunt, & per urinâ & alvum absumunt. Bibitur ad Orthopnœam, reliquias à partu purgant. Folia foris utiliter cõtra inflammationes & prunginosos pedum tumores admoveantur, plebis vulgato experimento. Attegiis & topiario operi conveniret, nisi gravior esset fruticis odor.

Tempus.

Hydrop.

Morbis regim.

Pecori sus-penditur è collo contra morbum regium.

Sanguis con-crat.

Tem. Sobr.

Lac.

Splen.

Inflamma-tio i&su copiatum.

HEREDA VETERIBUS ET IN genere. CAP. VIII.

Diosc. sum-ma differ-tres.

V Eteres de Hedera consulamus. Ea multas in specie differentias sortitur apud Dioscoridem: summas autem genere tres: candida enim quædam est, nigra altera, tertiâque vocata Helix: Candida quidem fructum fert candidum: nigra, quam vulgus Dionysiam vocat, nigrum, aut Croci æmulum; at Helix fructum non gignit, tenues autem habet

viticulas, folia verd parva, angulosa & scrubta.

Theophrasto quoq; Hedera multiplex est. Quædam enim humi repit, alia in altum attollitur. Atque excellarû genera plura, maximè verd tria patebunt, candida, nigra, tertiâq; Helix [sic] Clavicula Gæza, sed male. Hæc sunt species plures. Alia enim fructu solo, alia etiam foliis candida est. Rursum fructu tantum càdido in ferentiâ, quædam grandiorè, densum, & veluti in orbem circâ ætium fructû producti, quam nonnulli Corymbian vocant, Athenienses Acharnicâ, quæ in riguis nascitur; quædam minorè, spatiosiorè, nigra modo. Habet & nigra differentias, sed non ita perpicuas. At Helix [Clavicula Gæza] maximis Helicis diff-ferentiis distinguitur. Etenim foliis plurimum dif-ferit, tum quodd minorâ, tû quodd angulosa & concin-niora sint [sic Plinius & Gæza interpretati sunt] quoniam dicitur, quare Cornarum n. placet emendatio, qui in hac foliorû Helici delineatione apud Dioscoridem, & Gæza dicitur, quoniam dicitur, i.e. folia habet re-mia, angul. s. et rubra. vocem dicitur, sed legi cum per-spicere, quod nullus in foliis Helicis rubor conspi-ciat, æquè falsè in vulgari Theophrasti codicibus dicitur, quæ concinniora Plinius reddidit, hic dicitur, id est succulentiora legit, in Dioscoride verd dicitur eadem significatio. id est, crassa] Hederis etiam reliquis rotundiora, & simplicia. Differt etiam flagellorum [incern diorum, Gæz.] longitudine, longius enim porriguntur [hæc Gæz. omisit.] Præterea quodd sterilis sit. Quidam Helicem aiunt Hederæ naturam adipisci, mutariq; in eam, cdm perfecta jam adoleverit. At si in eo genere omnes in Hedera adolefant [hedera sere Gæza verit] ut non nulli volent, ætate sanè & affectu, non genere constabit hæc differentia, qualis est Piri à Pirastio. Tamen ejus Helicis folium ab Hedera folio pluri-mû distat. Rarè autè, & in paucis eventit, ut vetustate cõmutetur, velut in Populo alba, & Ricino [Quæ sic expressisse videtur Plinius. Maximè sistorum unitas in suo cuique genere permanet, præterquam Populo, Hedera, Crotoni, quam & Cic vocari diximus.] Sunt igitur Helicis [Clavicula, Gæz.] genera multa, maximè verd Helicis 3. nota & summatia. Prima est virens sive herbacea, genera. quæ plurima est, secunda candida, tertia versicolor, quam Thraciam quidam nominant. Et singularium differentia quædam sunt. Nam virentis alia tenuior est & longiorè folio [Plinius habet, in ordinem dig-ressu] densiorèque. Alia minus hæc omnia habet. Et versicoloris alia majus, alia minus folium habet, & Versicolor. colorum varietatem in eo dissimile. Similiter & magnitudine & colore distant candidæ folia. Facillimè augetur herbacea, & altissimè assurgit. Manifestum esse aiunt Helicem in Hedera transituram, in Hedera non solum foliis quæ majora tioraque gerit, sed etiam in geminis: protinus enim recta gerit, non in flexa vel inclinata, tum ob tenuitatem, tum ob longitudinem. Nam alii Hederis [Gæza legit] breviora & densiora [deser. un-] id est, herbacea pro virentis] breviora crassioraque sunt germina. Nam Hedera cum semen parit, subli-ter. Theophr.

Nigra.

Cern lectio: reprobanur.

Helicis 3.

Versicolor.

Candida.

Deser. un-

versalis

Theophr.

tur.

ferentia
turi. Est & hujus non parva differentia à fructu sum-
pta. Nam alius dulcis est, & alius valdè amarus, tam
candida, quam nigra. Id demonstrant aves, quæ a-
lio vescuntur, alio minimè. Duo genera Hedera
prima, inquit Plinius, ut reliquarum, mas, & femi-
na. Major traditur mas, corpore & folio duriore et-
iam ac pinguiore, & flore ad purpuram accedente.
Vtiusque autem flos similis est Rosæ sylvestri, nisi
quòd caret odore. [Tursipisimè lapsus hic Plinius, que de
Cisto audienda sint, quòd xisq, id Hedera, quòd uasq, tri-
bit. Nec apud Theophr. nec apud Diosc. ulla Hedera differe-
rentia statuitur è sexu petita.] Species horum gene-
rum tres. Est enim candida & nigra Edera, tertiã-
que quæ vocatur Helix. Etiamnum hæ species divi-
duntur in alias: quoniam est aliqua fructu tantum
candida, alia & folio: fructum quoque candidum fe-
rentium aliis densus acinus, & grandior, racemis in
orbem circumactis, qui vocantur corymbi. Item Se-
lenitium cuius est minor acinus, & spatior racemus.
[Hæc aliter legisse videtur Plinius quam in grecis exem-
plaribus exaratum sit, in quibus Selenitium vox deest &
Hederam Corymbiam vocari legimus.] Simili modo in
nigra. Alicui & semen nigrum, alij crocatum: cuius
coronis Poëta utuntur, foliis minùs nigris, quam
quidam Nysiam, alij Bacchicam vocant, maximis
inter nigras corymbis. Quidam apud Græcos etiam
num duo genera hujus faciunt, à colore acinorum Ery-
thranum [erythrocarpon, Dal.] & chrylocarpum. Ph-
rimas autem habet differentias Helix, quoniã folio
maximè distat. Parva sūt & angulosa concinnioraq;
cũm reliquorũ generũ simplicia sint. Distat & longi-
tudine internodiorum, præcipuè tamen sterilitate,
quoniam fructus non gignit. Quidam hoc ætatiss esse
non generis existimant: primòq; Helicem esse, fieri
deinde Ederã vetustate. Horũ error manifestus in-
telligitur, quoniam Helicis plura genera reperiu-
ntur, sed tria maximè insignia: herbacea ac virens quæ
plurima est: altera cãdido folio: tertia versicolor, quæ
Thracia vocatur. Etiamnum herbacæ tenuiora so-
lia, in ordinem digesta, densioraq;. In alio genere di-
versa omnia. Et in versicolori alia tenuioribus foliis,
& similiter ordinatis densioribusq; est: alteri generi
neglecta hæc omnia. Majora quoque aut minora
sunt folia, macularumq; habitus distant: Et in candi-
dis alia sunt candidiora. Adolefcit in longitudinem
maximè herbacea. Arborea autem necat candida: om-
nemq; succum auferendo tanta crassitudine aug-
etur, ut ipsa arbor fiat. Signa ejus folia maxima atque
latissima, mãmãs non manimas uasq; sed ramos fraxosq;
erigenti, quæ sunt cæteris in flexa: racemi stantes, ac
subrecti. Et quanquã omnium Ederarum generi ra-
dicofa brachia, huic tamen maximè ramofa ac robu-

sta: ab ea nigra. Sed proprium albæ, quòd inter me-
dia folia emittit brachia utriq; semper amplectens;
hoc & in muris, quamvis ambire non possit. Itaque
etiam pluribus locis intercifa, vivit tamen duratque
& totidem initia radicum habet, quot brachia, qui-
bus incolumis & solida arbores fugit ac strangulat.
Est & in fructu differentia albæ nigraq; Ederæ: quo-
niam aliis tanta amaritudo acini, ut aves non attingant.
Est & rigens Edera, quæ sine adminiculo stat,
sola omnium generum ob id vocata ciffos. E diverfo
nunquam nisi humi repens Chamæciffos.

Kissos & Kissos Græcis, Hedera Lat. Hebr. teste
Aruch Kaffus, Serap. Ciffus appellatur: Gorm. Ephetw.
Belg. Veyl & Clys: Had. Jun. Gall. Lierre: It. Hedera:
Hisp. Yedra, & Edera: Angl. Jui. Brab. oft. Eerd fuel:
Boh. Brectom: Hung. Foly, bor, slyan. quoniam vide-
licet serpit. Kissos autem dictam putat à Cisso, quem
pusionem Liberi patris fuisse Græci fabulantur, & in
nominis sui fruticem conversum: dum minister cum
eo Deo saliens, allisus terra petiit. Atheniensis Cit-
ton Bacchum ipsum vocant, & apud se Achænis vi-
co, Hederam primò natam volūt. Quin & Hedera
Dionysiam, à Baccho Bacchicam appellavit antiqui-
tas, hoc honore Liberũ patrem dignata, qui primus
ex India in Græciam Hederam importavit: itaque in
tutela Liberi patris putabatur esse. Nam ut ille ju-
venis semper, ita hæc perpetuò viret. Nec secus o-
mnia, quã ille mentes hominum illigat. Mavult Lo-
belius kissos [zissos leg.] dictum à textura porosa & spi-
raculis innumeris serè pervia, quæ vini transmittit,
quale Catoni & Varroni Cillymbion poculum est
quã à pusionis Citi saltantis in Hederam poëtica
deformatione à Baccho versũ, ut fingunt Græci: quæ
xiosness pumex porosus lapis ob fistulosas cavitates
ita dictus sit. Vel potius Kissos Hedera dicta est à
Frisos. i. e. à verme seu curculione, in Hordeo & Tri-
tico nascète, qui cuspidula, aut acu, potius quã ore
triticum hordeumq; tercbrat. Latini ab edendo Hede-
rã dixerunt: Etenim arborum importuna amafia,
& veluti assentatrix, cortice rimoso impacta, mace-
ries vetustiores demolitur, & radicatis propaga-
tionibus arbores amplexa, enecat & exedit: præsertim
illa species quæ major & arborea vocatur. Põpeius
verò dictam censet Hederã quòd hæreat, vel potius
quòd edita petat. Hederam poëta cognominant
etiam lasciva (propter amplexus artissimos, & hinc
circumfertur illud, Lascivis Hederis ambitu osior) & Proserbina,
comantè, quòd olim in Anthisteriorũ, i. e. floralium
festorũ (videntur autem illa fuisse, quæ Latini vocat
Bacchanalia) ludis antiqui hæc coronarentur. Hinc
natum habetur adagium: Hedera post Anthisteria.
Quum serò quippiam adhibetur.

Nomina linguar.

Cistum Lab.

Fabula Troctarum.

Hed unhe dicta.

Ephibeta

Adagiurn.



Tota. 11.

HEDERA COMMVNIS, major & minor.

Prioricon ex nostris empiriis major. Icones.
rem Hederã exhibet, & altera minore. Deser.
In censu earum quæ adminiculis susti-
nentur, Hedera etiam communis occur-
rit referenda, licet tamen & per se non-
nunquã cor sitat. Et quidem famulit te-
nibus longo & errabundo reptatu pro-
ximis arboribus aut macteribus innixa,
alta petit iis quæ semel apprehendit pro-
ridicis usã, barbitio fibrarum propaga-
to radices in alieno solo agens, cortice
magnã parte rugoso, cinereo, in novel-
lis ramis viridi, materie albã, firmã: fo-
lia nullo ordine pediculis semipalmari-
bus & palmaribus appensa, magna,
nervosa, rigida, crassa, superne ex a-
tro-virentia & splendoria, inferne ad

HISTORIAE PLANTARVM

lateum tantillum ex virore declinans, sinuosa, triquetra, alias rotundata in mucronem exacuuntur, sapore siccante & acris; flores in sarmentorum extremitatibus, sex radiatis foliis herbido colore praeditis constant. totidemque luteis apicibus in orbem circumacti simul multi umbellae inlita: corymbi succedunt per maturitatem nigri: acini singuli semuncii longioribus pediculis intendent baccis juniperulis aequales, sessiles & quasi vtrinque compressi, circulo umbilicato, cui abest ille reliqui acini nitor, inscripti veluti opercula imposito urceolo, cuius centrum designat prominulus niger stilus: in eis distinctis sepimento membranaceo, nonnihilque pulposo, loculis continentur semina, unum, duo, tria, quatuor, quinque, oblonga, gibba, turgidula, circuli non convoluta similia cuticula tenui connecta, intus pulposa conftracta orizae cum gluma sua aut puliculae est pane syncomisto non ab similia.

Corymbi acini.

Semina.

Trag. specia.

Bacchica.

Asplen.

Poetica.

Discrimen Hederarum est ad usum.

Cur autem non separantur Hederam.

Esca.

Ex cultu arboreo.

Folia mur.

Tragas licet proponat unam tantum figuram & unam descriptionem, duas tamen eius species nasci tradit. Quarum priorem Hederam minimam, *καλλιόνη*, Hederam terrestrem, *κλίμα*, Claviculam, Hederulam, germ. Klein Ephew nuncupat; Alteram vulgarem, germ. Ephew / Dioscoridis *κλίμα*, *κλίμα* *κλίμα* *κλίμα*, & (quoniam olim hac Hederam Bacchus coronatus fuerit) Hederam Bacchicam, Myricam & Dionysiam cognominat. Dicitur haec quibusdam *ἀσπλην*, quod ad splen faciat, nec non, *ποικιλή* quod hac Poetae olim coronarentur:

Pastores Hederam crescentem ornate Poetam

Hederam vulgarem portis, acinos ferentem, Theophrasti *κλίμα*, & *ἀχαρικό* *ἀρδανούτων*; Exiguam vero, que appetente Autumnum colorem varium acquirit, helicem & Thraciam cognominat. Recenset autem Tragus quam paucissimis omnem hederam historiam, quod nullum ferè discrimen observari posse credat, nisi ab ætate ipsa. Omnem namque hederam, dum in tenera sua ætate assiduè reptatu per terram vagatur, triangularis figurae solius spectandam se præbere; quam primum vero arborem murusque invaserit, ilicè foliorum figuram variare ait, quod vel Theophrastus dixerit maximam hederarum differentiam in ætate ipsarum positam esse. Nos quoque non separamus hederas nostras, sequuti sententiam Tragi, existimantes unum tantum genus repetiri, ratione loci, ubi crescit, & ætatis, formam mutans.

hedera, ait Cæsalpinus, frutex est petularissimam scitius naturam: non enim solum radicibus in terram dimissis vivit, sed & gemminibus alimentum exsugit & arborum caudicibus, quas scandit; nam præcisa iuxta terram, non emoritur tamen, nisi à totis caudicibus avellatur; frequentissimas enim, easque breves per tota gemmina radicales, centipedis animalis modo edit, quibus pertinacissimè hæret arbores suffocat, & ædificia (quamvis robusta) tandem demolitur; expetit tamen viridariis; nam sponte nullo adminiculo totos parietes circumvestit, fronde perpetuè exornans; ex cultu arboreo, caudice fatis crasso, & ad magnam altitudinem latitudinemque distenditur, nisi desit quod amplectetur, cum ad eam ætatem accesserit, in qua fructum ferre possit, tota mutat faciem, naturamque; nam per se erigitur, & quidem in tantum aliquando, ut nullum relinquatur conjunctionis vestigium cum repente Hedera. Quamdiu enim affixa est, folia fert in plures angulos desinentia, ad summum quinos, quorum duo utrinque prominent, unus in summo folio: quo autem magis adolescit, folia & pauciores edunt angulos obtusiorisque, & ipsa majora fiunt, ac virentiora, & unicolora, cum ab initio eadem pullilla sint, nigra, & maculis albis distincta, aliquando infernè subrubentia; cum autem erigitur,

folia rotundantur obliteratis ex toto utrinque angulis omnibus, solo eo, qui in summo est, relicto. differentias alias non ætatis, sed generis adhuc non vidi, quamvis Dioscorides tria asserat genera: Theophrastus quoque & Plinius eadem tria in alias plures differentias distribuit, pro fructus magnitudine, sapore, & colore foliorum: sed de Helice, ambigit Theophrastus, utrum generis, an ætatis sit differentia, ut multi putant, primò fieri Helicem, deinde vetustate in Hederam transire: appellant autem hederascere, & in Hederam transire, cum erigitur nullis affixa, quando, & simpliciora sunt folia rotundiorisque, cum in Helice sint parva, angulata, & concinnè disposita ac sine fructu: contendit Plinius eadem genere differre maximè ob foliorum varietatem in Helice. Quamdam enim herbaceo folio virentique, aliam candido, tertiam versicolori constare, quæ Thracia vocetur. eandem Dioscorides tradit rubro folio, quod nemo alius notavit; sed non cognitur ob hæc Helicem genus diversum ponere cum in ea, que manifestè hederascit, variam foliorum & germinum naturam contemplerur, quod in paucis aliis reperitur, ut notavit Theophrastus: fir verò alicubi, ut Helix nunquam hederascit ob imperfectior em quandam, non speciei, sed individui, ut in arboribus plerisque accidit. Patet ergo quam quidam sine rationibus nos non habere Hederam contendant.

Theophr. ambigit an Hedera helix differat sit ab arborea.

Plinio genere diversè dicitur.

Plinij opinio reprobandatur.

Dod. Gall. sicones.

Dod. gal. duas habet figuras dicens ex tribus Dioscoridis Hederæ generibus priorem albam, Hederam seminam Plinij, nobis esse incognitam; secundam speciem Hederam nigram & *κλίμα* Plinij, hederam mare n est, Neotericorum Hederam arboream, Hederam muralem, Gallis *Liaire noir*, German. Schwarzer Eppich & Maur Ephew aut Baum Ephew. Belg. Veyl. & Boonen wyl. Tertiam verò speciem *κλίμα*, Claviculam & Hederulam dicit, Gall. Petit *Liaire*, Germ. Klein Ephew; Belg. Cleyn Veyl. Dod. lat. autore Theophrasto Hederam in majorem & minorem distinguit, majorem rursus in candidam, nigram, & Helicem, cuius plures species Theophrastus tradat. Cæterum, majorem se in altitudinem attolentem aut assurgentem, Theophr. *κλίμα*, Gazam excellam, Plinium rigentem Hederam, dicere scribit; recentiores verò Hederam arboream, quod arbores complectatur: muralem, quod secundum parietes nascatur: Esse tamen qui velint omnem assurgentem arboream cognominari, quibus eorum tandem illa descendens adheret, ad differentiam nempe alterius Hederæ terrestris per humum reptantis. Minor denique, ait Dod. nigræ similis est, ac *κλίμα* vocatur; germanic. Klein Ephew. Dicitur & *κλίμα*; differens tamen multum ab Hedera terrestri alibi describenda. Helicem sive Claviculam latinè nuncupatam non pauci latini hanc existimant, sed Theophrastus *κλίμα* ab *κλίμα* differentem ostendit. Tertiam enim inter assurgentem facit.

Hedera maior Dodones.

Hedera arborea. Muralis.

Hedera minor.

Hedera Helix.

Nec plures duabus (Hedera majore seu arborea & Helice sive minore) novit nostra ætas, air Lobelius, differentias genericas: tamen si quamlibet multas dixerit species Dioscorides. Majoris multæ decernuntur varietates, quæ antiquis persuadere poterunt, ut plures differentias, sive species statuerent. Hujus quædam arboreo, suapræque stat stipite, nulli innixa pedamento, qualem in sylvestris quibusdam Anglie meminimus, Orthocitulum antiqui dicunt. Interdum etiam quibusdam locis xeram-pelii colore folia nitent. Pisis nobis ostendebant barbarij corymbos cæsi & albicantis coloris. Melinos subfuscos corymbos pleræque plantæ factæ in Italici & Germanici ex Campania & Apulia, hodie manant. Humilis planè minor & infrequentior coccinea voca-

Differ. Lob.

et voca-

exerat clavículas, capreolôve viticôis, qui humi panguntur: & propagatione quadam quasi in spicas & anfractus provolvuntur: interdum etiam serpendo muscidis truncis & caudicibus advolvitur gracilioribus farmentis. Hæc Lob.

Edes. Prior vocatur à Matth. Cast. Lugd. Brunf. Gesn. h. (qui hujus speciem tradit luteis bacis) & Tab. Hedera scandens, major, & arborea; à Trag. Ang. Cord. in Diosc. Dod. & Cam. ep. Hedera; à Lon. (qui quamvis solum unius iconem exprimat, attamen tres ejus species nominat) Fuchf. Dod. gall. & Lac. Hedera nigra; à Lob. Hedera corymbosa communis; à Tab. ic. Hedera corymbosa major arborea; à

A. mino. Schvv. Hedera baccifera. Altera autem Hedera minor five humilis à Matth. Fuchf. Brunf. Dod. Lac. Cam. h. ep. & hist. Lugd. Lon. Cæf. Tab. & Ger. Hedera helix; ab Ang. Hedera sterilis; à Lob. Helix five provoluta sterilis Hedera; à Gesn. h. Hedera arborea silv. genus semper repens; à Thal. Hedera species; Helix vocata; à Cast. Hedera minor; à Schv. Hedera minor reptans; à C.B. Hedera; major sterilis: Eid. Hedera 4. humi repens; Hederula Tragi; Hedera minor, *Edes.* Dod.

Hedera passim nascitur ad arbores, in silvis, campis, & hortis, & ad edificiorum muros. Sylvarum opaca arida & saxosa perrepat. Plutarch. in Alexandr. memorie prodidit Babyloniam regionem non ferre Hederam, rationemque reddit, quod nimis sit calida, cum loca frigida amet. Edera jam dicitur apud Plinium in Asia nasci. Negaverat Theophrastus, nec in India, nisi in monte Mero. Quin & Harpalum omni modo laborasse, ut ferret eam in Medis, frustra. Alexandrum verò ob raritatem ita coronato exercitu, victorem ex India rediisse, exemplo Liberis patris: cuius Dei & nunc adornat thyrros, galeasque etiam & scuta, in Thracia populis in solennibus sacris. Inimica arbori sacis que omnibus, sepulchræque ac muros tumpeus: serpentium frigori gratissima, ut mirum sit ullum honorem habitum ei. Hederam vidi in monte Saleve trunco crus æquante & sæpè crassiflorem in plurimis Helvetiæ locis. In Castello l'Abbatie reperi ferentem resina rubram, odoratam, pellucidam, gustu acrem, chartam imbuentem olei instar, igni admodum, flammam concipientem, ut cætera resina.

HEREDA DIONYSIAS.

Dalechampiij.



Ex congeneribus nigris folium habet minus atrum, minimè angulosum, crassum, carnosum, venosum, in acumen fastigiatum, nec admodum densum: in corymbis acinos luteos aureo nitore fulgentes, ex congeneribus aspectu maxime pulchros. Hæc radicosis brachiis reliquarum modo vicinas arbores ceneat, succo earum exhausto. Rarè in Gallia provenit.

B. pin. Hedera 2. poëica: Hedera

Dionysias, & Chrysoctarpus Dalechampiij, Lugd. Dionysias, aut Bacchia, quòd ex ea Poëtarum com. Tom. I. I.

ronæ consueverunt: Chrysoctarpus, à fructus colore auco.

HEREDÆ ÆQUIVOCA.

Præter Hederam communem & Dionysiam Dalechampiij, plures alix occurrunt plantæ Hedera nomine donatæ, de quibus suo loco agemus, ut de Hedera Cilicia Theophrasti, sub Smilace aspera hoc Smilac. libro. Æquivocè quoque, ob græci nominis similitudinem Hedera nomen transit in Cistum marem Cist. & sceminam, quibus flos Rosæ sylvestris inodorus, ut Plinius scribit ex Theophrasto, ubi in versione Gaze, pravâ tamen lectione *Kis* legitur non *Kis* de Cisto lib. 13. Sed & Chamæcisus herba Chamæcis. Hedera humilis, seu terrestris nomen sibi vendicat, ut videre est lib. 28. Per Hederam arboream sunt qui intelligant Apocynon Dioscoridis, minùs rectè, in remediis ad gangrænam Theodorico, de quo pauld post, ut & de Smilace lævi, five Convolvulo majore, quem Hederam arboream cognominat Dalechampiij. Hederam terrestram suspicatur Dodon. Volubilem minore, five Helxine Cissampeloni, ut infra dicemus. *Edes.* etiam *Kis* Constantino *μαλακκίας*, h. e. Hedera mollis dicitur. est hæc nobis Helxine Cissampelos, semine triangulo. Hederula [*κισσίου*] seu Hedera folium [*κισσούλου*] de Asclepiade dicitur apud Dioscoridem. Tandem præter dicta genera esse & rigentem Hederam, per se stantem, & ob id solam omnium generum vocatam esse Hederam, tradit Plinius: hanc Cæsalpinus Agrifolium esse censet: sed in Theophrasto non aliam intelligit, quam atatis perfectæ Hederam. Tandem quæ Hederula aquatica & palustris à Lob. ic. Tab. & Bauh. phyt. vocatur, à nobis Lenticula aquatica trifurca inscribitur. Quam demum Hederam saxatilem C.B. cum Lobelio cognominat, est Afazina sterilis Sevenæ Narbonensis agri.

VIRES ET TEMPERAMENTVM.

Omnis Hedera, auctore Dioscoride, acris est, adstringit, nervos lædit. Flores ipsius quantum ipsorum tribus digitis capi potest, accepti & in vino poti, faciunt ad dysentericos, sed bis per diem bibere oportet. Faciunt & ad ambusta cum cerato triti. At tenera folia cum Aceto cocta, aut cruda cum panetrita, spleni medentur. Succus foliorum & corymborum cum irino oleo, aut melle, aut nitro, naribus infunditur, & ad veteres capitis dolores commodus est. Irrigatur & ex eo caput, cum aceto & rosaceo. Aurium dolores & purulentas aures, cum oleo sanant. Cæterum nigra hedera succus & corymbi potius debilitatem corpori inducunt, & amplior usus mentem turbat. Acini verò corymborum quinque triti, & cum rosaceo in malicorio calfacti, & in oppositam aurem instillati, dentium dolores mitigant. Denigrant item capillos corymbi. At verò folia cum vino cocta ad omne ulcus imponuntur. Eadem imposita velut dictum est cocta, ambusta, ulcera maligna, & maculas solares curant. Movent & menses corymbi triti subditi, & post purgationem drachmæ pondere poti, conceptionem impediunt. Sed & foliorum pediculus melle tinctus & utero appositus, menses & sætus educit. Succus autem naribus instillatus, graveolentias & putredines expurgat. Lacryma verò hederae illita, pilos abolet, & pediculos occidit. At radicem succus cum aceto potus, commorsis à pbalaris opitulatur. Hedera (inquit Gal. 7. Ex Galeno. simpl.) ex cõtrariis composita est facultatibus habet enim quiddam adstringentis substantiæ, quam terrenam & frigidam esse ostendimus, habetque etiam non nihil acris, quam calidam esse vel gustus comprobat: nec deest tertia, æqueam rãque substantiam quandam tepidam obtinet, certè si viridis sit.

HISTORIAE PLANTARVM

114

Siquidem dñi arefcit, hæc prima exhalet necesse est, manetq; quæ terrea est & frigida adstringensque, & ea quæ calida est & acris. Viridis autem, foliis ejus in vino decoctis, ulcera grandia conglutinat, quæque maligna sunt sanat, tum igne factas exulcerationes cicatrice includit. Porro cum aceto decocta folia lienosis profunt. Parari autem ejus quodammodo validiores sunt, & ad levorem redacti cum cerato ambustis conveniunt. Præterea succus medicamentum est errhinum, h. e. in nares fufum, capiti purgando idoneum, tum vetustas aurium fluxiones sanat, adhuc vetera ulcera tum in auribus tum in natibus. Porro si acrior appareat, aut rofaceo aut dulci oleo miscetur. Lachryma ejus pediculus necat, pilis nudat, usque ad eod calidæ potestatis, ut obscure adurat, est enim veluti aqueus quidam liquor, sicut omnes aliæ lachrymæ. Hederæ mira natura traditur à Plinio ad experienda vina, si vas fiet

Vlcera.

Pediculi.

Ex Plinio.

Vid. lignum ad experienda vina. Ignaria. Vicerum excusat. Hederæ suffusum.

Calculus.

Pulsis Hederæ.

Dysenteria.

Succus.

Menses.

Ebrietas.

Vlcera caeteriorum deperita retinet.

Epilepsia.

Vrina.

Frigidi articulorum dolores.

Pregnantium de vitibus a fiere. Hæc.

anno 1605. quo hæc scribimus, se observate ex Hederæ flore hoc anno futuram copiam vini, quia circa natalitium Domini nostri cum floretet non defluxisse flores, ita non defluxuros etiam vitium flores, unde sepè deficiunt Vvæ & vinum. Lignum Hederæ de radice refertur, ubi crassius esse consuevit, à sutoribus in eum usum parari solet, ut postquam cultellos suos ad corium discandum idoneos ad cotem exacerint, asperiores etiam nuncillos aequales levigatosque reddant ad dictum lignum ultra citraque ducendo. quod autem præ aliis idoneum esse judicatur fortè ob mollitiem substantiæ ipsius, quæ tangentibus se talem offert. Vendibilis vini signum Hederam olim extitisse, probat illud vetus adagium: Vino vendibili non opus esse Hederam suspensa. Exponit autem hoc dictum Erasimus, veram virtutem non egeret alienis præconiis: aut tæ præclaras per se placere, neque desiderare exoticam commendationem.

Cos ex ligno Hederæ pro sutoribus.

HEDERÆ LACHRYMA.

Glebæ quæ Hederæ gummi nomine in officinis Descri-
prostant, ex saturo rubore ferè nigrescunt, vitreo nitore, sed non pellucido, durâ fati compactaque consistentia, non tamen uniformi, rubiginosis intercurstantibus micis: hæud difficulter in pollinem redigitur, saporem imprimens siccum adstringentem, haud in jucundum, cum levi quadam amaritudine, salivam croceo colore tingens. Candele admodum claræ & pertinacem edit flammam, nidore ferè Thuris, & ne vel tum quidem liquefcit. admittit reperitur interdum Hederæ folia. Ipse etiam ex Hederæ lachrymam collegi Genevæ circa l'Abatie dictum locum, anno 1570. mense Aprilis, similem ei, quæ in offic. profstat.

Flammam redit.

GRANADILLA HEDERÆ similis. C. A. P. IX.

Allatus Monardi ex Continenti herbæ fructus *Locus.*
est, quæ in Peruanis montibus, ubi spontè nascitur, Granadilla appellatur, quod nomen illi imposuerunt Hispani ob similitudinem quam cum Malis granatis habet, nam e jusdem ferè est amplitudo, diris, atque etiam coloris, quando maturus est, nisi quod corora careat. in eo reficcato, si agitur, fornum edit semè intus oclusum, pyri semini simile, alieno majus, tuberculis quibusdam eleganter, elaboratum & aspectu jucundum: pulpa candida est, & saporis exerts. Planta hunc fructum ferens Hederæ similis est, eodémque modo reperit & scan- dit, quoque loco ponatur. Elegans est cum fructu ovata conspicitur, propter ejus amplitudinem: florem habet albæ Rosæ persimilem, in cujus foliis aliq; veluti passionis Christi figure delineate conspiciuntur, quas magnâ diligentia istic pietas existimes, eam ob causam elegantissimus est flos: fructus ipsi sunt granatula jam dicta, quæ matura acidulo liquore abundant, & semine plena sunt: aperiantur ut ova, & liquorille cum magna voluptate sorbetur cum ab Indis tum ab Hispanis: nec, etiam si multos forbeas, ullam ventriculi gravedinem, sed potius alvum emollitam sentis. Herbararia est, quæ duntaxat uno in loco invenitur. Fructus temperatus esse videtur, & aliquantulum humidus. Granadilla etiam meminit Petrus de Cieza, parte 1. b. lib. 1. Peruanæ c. 28. his verbis: Amplamistâ vallem de Lile distat, in qua oppidum Cali, medium fecat sume, cujus tunc abundant fructus ejus loci, inter quos sunt admodum saporis & jucundi odoris est Granadilla nuncupatus. B. pin.

Disser. plant.

Flos passionis.


Temperamentum.

Fructus.

B. pin. Clematisis tr. trifolia flore roseo clavato: Granadilla, Monardi, Petro de Ciega in hist. Peruana, Lugd. Vide in A. nericæ par. g. l. 4. c. 27. at cap. 30. Granadilla inter ligna recensetur.

SMILAX ASPERA. C. A. P. X.

Smilax aspera longis, rigidis, striatis, contortis, valdè implicatis, lentis, farmentosis viticulis exercet nunc in banc, modò in alteram partem, inquit Clusius, certà quadam serie ferverat in flexis, ex geniculis capreolos proferens quorum ope vicinis arboribus, aliusve advolvitur, & ab imis ad summa repit, horret autem spinis duris rigidisq; non tantùm per farmenta surgentibus, sed et per pediculos, un tales plus minus, quibus folia e intervallis singularia appenduntur. cæterum folia Sigilli B. Mariæ dicti possidet, sed longè crassiora, rigida, nervosa, spinis non tantùm per margines horrentia, sed & in dorso secundùm nervos, nunc ampla & viridia, modò angustiora & albis maculis conspersa, autore Clusio, flores è singulis extremorum ramulorum geniculatis tuberculis racematim coherentes crebri erumpunt, parvi, albi, odorati, tenuis foliis constantes, in exiguis in medio apiculis hosc excipiunt fructus, rotundi seu Vvæ, per maturitatem rubra, vel, ut ait Clusius, rutila in quorum singulari semina duo, vel tria, vel unicum, lubrica magnitudine, colore & figura, feminum Rhamni tertij seu Paliuri multis dicti, sed duriora, pulpâ albicante, nanteosa cujusdam dulcedinis particeps, Clusius nucleos vocat duros, ossios, veluti Asparagi, foris nigros, addens radicem longè latèq; serperet sub terra fibras habere terues, candidas & germina summâ tellure spargere minimi interdum digiti crassitudine, nodosa seu articulata, albicantia.



Theophr. accuratissimè Smilacem hanc descripsit videtur his verbis : Smilax [Edera Cilicia, Gaza] caulibus suis sese alius implicat & obvolvitur. Caulis autem ejus spinosus, & veluti rectos aculeos gerit. folium ederaceum, oblongum, angulosum qua pediculo arnectitur, & latius. Proprium huic quod medium ipsum nervus spinæ tenuis modo secar, & flamineas propagines non ab ipsa spina, ut in aliis foliis, sed circa ipsam in orbem circumactas ducit, ab ipso pediculi annexu. Ad caulem vel imbecillû, qua folia veluti intersitio quodam ab ipso se junguntur, ex eodem sinu erascitur cum foliis cauliculus gracilis & convolutus : flos est albus, odoratus verius [Græcus textus habet heobn. sed Cornar. a. de Smilace cum Plinio legit xeoewh. i. liliaceus] Feuctus similis Solano aut Melothro & maximè Viti silvestri, racemis, ut Hedera pendentibus, proprius tamen ad Vvæ figuram accedentibus : quoniam ab eodem puncto pediculi acinorum exerunt. Fructus ruber, septius quidem nucleos binos complexus, major ternos, minimus singulos. Foris au-

tem nigri sunt nucleis, & valdè duri. Peculiare habent racemi, quod ex obliquo caulim obspiciunt, & unus omnium maximus est in summo caule, velut in Rhamno atque Rubo. Vnde liquet Smilacem & in summo, & in latere fructiferam [Venerum legit μαζακας ἀνὰ τὸν ἰσθμὸν εἶς πρὸς μαζακίον πρῶτον, vel μαζακὸν ἀπὸ τῆς ἠ.] esse.

Smilax aspera folia habet Periclymeni, farmenta multa, tenuia Paliuri aut Rubi modo spinosa, & sese arboribus circumvolvunt, per eas sursum deorsumque repens. Fructum verò profert racematim, seu exilem Labruscæ racemulum [desunt hæc in Ald. cod. Varra. in com. extn. & ad n. rha. transferuntur] qui quidem ubi maturerit, colore est rubro, gustumque leniter quodammodo mordet: radice denique est crassa duraque. Smilacis asperæ fructum hic Dioscorides ἄνη- quὸν εἶδος similem facit, h. e. (ut alia ἄνη- quὸν εἶδος significata à Suida & Aristoph. scholiaste commemorata, tanquam huic loco non satis conveniente cum Saraceno omitteremus) exili racemulo : qualis is esse solet, qui vel summis palmitibus supra folia ipsa innascitur, vel in nativi viridinis tempore inter folia latitat. Theophrastus autem uti jam dictum, scribit esse fructum in Solani & Vitis albæ fructu similem, maximèque Vvæ silvestri nuncupatæ. Pensiles autem esse racemos, seu Hedera, verùm ad Vvam propius accedere: folio autem esse hederaceo, parvo non anguloso.

Sed & Phirius de Smilace eadem, quamvis paulò aliter ita prodidit. Similis est Ederæ, è Cilicia quidem primam profecta, sed in Græcia frequentior, quam vocant Smilacem, densis geniculata caulibus, spinosis fruticosa ramis, folio ederaceo, parvo, non anguloso, à pediculo, emittente pampinos, flore candido, olente Lilium. Fert racemos Labruscæ modo, non Ederæ, colore rubro, complexa acinis majoribus nucleos ternos, minoribus singulos, nigros duròsque : in saula omnibus sacris & coronis : quoniam sit lugubris, virgine ejus nominis propter amorem juvenis Croci, mutata in hunc fruticem [Ovid. 4. Met.

Et Croci in parvos versus cum Smilace flores] Id vulgus ignorans, plerumque festa sua Polluti, Ederam existimando : sicut in Poëtis aut Liberti patre, aut Sileno, quis omninò nescit quibus coronentur. E Smilace sunt codicilli. Propriumque materia est, ut ad mota auribus levem sonum reddat. Sed quod hic Plin. dicit de codicillis è Smilace, non existimo intelligendum de Smilace aspera, quomodo enim ferent ex tali frutice? Idem alibi de hæloquitur. Smilax quoque (aitis) qui & Nicophoros cognominatur, similitudinem Ederæ habet, tenuioribus foliis. Cororam ex eo factam impari foliorum numero, aiunt capitis doloribus mederi. Quidam duo genera Smilacis dixerunt. Alterum immortalitatis proximum, in convallibus opacis, scandens arbores, comantibus acinorum corymbis, contra venenata omnia efficacissimus, in tantum, ut acinorum succo infantibus sæpè instillato, nulla postea venena nocitura sint. Alterum genus culta amare, & in his gigni, nullius esse cibus. Illam esse Smilacem priorem, cuius lignum ad aures sonare diximus.

Fatetur Matth. in com. It. se posse affirmare aliud discrimen esse inter Smilacem asperam & Zatzam parillam. Idem tamen dixit esse, qui affirmant Zatzam parillam nihil aliud esse, quam Smilacem asperam, quorum opinio ai se facillè allentiri. In hist. demum germ. addit, quosdam doctos viros existimare radicem Salsæ & Sarsæ parillas Smilacis asperæ radicem esse : alios negare, se nihil afferere posse, quia nihil certi habeat de Salsâ parilla. Vides Salsâ parillam Matthiolum lectorem ircerum suspenderit. Si- milis quidem Garcia Smilacem asperam Salsâ pa-

Tapresis.

Spina.

Pediculi. Folia.

Floris.

Fructus.

Semina.

Nuclei. Clusio. R. a. ix.

Smilax Theophr.

Diosc. de Smilace aspera.

Diosc. lectio.

Diosc. expli. catur.

Plin. de Smilace. Smilax Græcorum.

Infusio sacris. Smilacis metamorphosis.

Plin. taxatur.

Nicophoros. Superstitio. Jus Plin. Smilacis generata.

Zarza pa. rilla quo. vruilam.

Salsâ pa. rilla sin. lis. sed non eundem.

HISTORIAE PLANTARVM

laxa, sed tamen eandem esse non concedit. Salva parilla (inquit Alp.) est Smilax aspera: Smilax tamen Zacynthii in salis, ex qua Salva parilla, à Smilace aspera in Italijs locis inventa multum differt. Sed quicquid sit, Smilax aspera radices habet non tantè cum Salva parilla similitudinis fortitas quantum hæcenus perstatum doctis quibusdam fuit, ut dicitur cap. seq.

Synon.

Smilax simpliciter dicitur Theophrasto & Anguillaræ; Smilax aspera Diosc. Ruell. Matth. Fuchs. Turn. Cordân Diosc. (cui & Hedera Cilissâ) Theod. Golio in onom. Dod. Euchar. Roeflin (cui & Smilax trachæa) Bellon. Obs. Acostræ (qui similem facit Chinæ) Gesn. h. Lac. Lob. Cam. h. & epit. Cast. Cæf. & Lugd. cui & Volubilis acuta, vel pungens; Smilax aspera vera Trago; Smilax aspera fructu rutilo, Clus. hisp. & hist. Smilax aspera i. fructu rubente, C. Bauh. Hedera Cilicia Plinio (& post eum Gazæ) cui & Smilax, Nicophoros cognominata: Milax, Galeno; Volubilis aspera, Lonicerio.

Trago & Fuchs. notatur. Icones.

Ceterum, in Tragi figura apparent aliquæ spinæ in foliorum dorso, ut in Fuchsij pictura (qui Smilacem nascentem non vidit, sed ex sicca transmissa pingendam dedit) quæ in nostra icone, quæ Guarniana, omisit. Nomen etiam gallicum apud Fuchsium *Phascolus espinosus* non placet: mallet vocare *Liferon espinosæ*. In Matthioli imagine in foliis nulla spina: in post. comm. cum mag. fig. duo tantum spinosæ. In figura per Camerarium facta ad Hist. germ. & Ep. folia in marginibus spinosa. In iconibus Matthioli & Fuchsij, ex qua nostra quæ minis placet, flores appicti tantum cum quinque foliolis. Compil. Tab. Smilacis asperæ tres ponit figuras, nec indicat quin re differant.

Tab. tax. cur.

Nomina linguarum.

Notia.

Επι δὲ ἄρα ἕτα Græc. Lat. Smilax aspera; Ger. *Stechendel oder scharpff Winden* ah aculeis quos habet aptè denominatur: Gall. nostro iudicio, *Liferon espinosæ*, alii tamen *Lifer picquant*, *Tau*, sive *Smilax aspre*: Ital. *Rovo cervino*: [*Rubus cervinus* sive *Hedera spinosa*] Hispan. *garca parilla*, h. e. Rubiviticula appellatur: Angl. *Scharpe Smilax*. Aliqui inter notha Dioscoridis Hepaticin cognominant, quasi lecorariam appellant, alij *Lycantheon*, quasi florem lupinum, alij *Cynobaton*, quasi sentem canis, alij *Aniceton*, quasi invictam, alij *Heliophyton*, quasi plantam Solis, alij *Anatolcon*, hoc est *Orietalem*, alij *Dyticon*, occiduam, alij *Heliden*, *Ægyptij* *Lysithe*, Romani *Merginam*. *Hetruscij* *Rhadiam*.

Acquisita.

Smilax aspera fructu nigro. Smilax aspera parilla.

Smilacis vox, quod silentio non est prætereundum, valdè est ambigua, ut quæ quasdam cognatas vel similes plantas significet, ut Smilacem asperam fructu per maturitatem rubro, de qua in præfenti: Smilacem asperam minis spinosam fructu nigro, de qua mox; Salvam parillam Smilacis affinem, post dicendam.

Denotat.

Denotat & Smilacem lævem, quæ dicitur *Convolvulus* major Fuchs. Dod. Matth. Lob. Rob. Constant. & aliis, à quibus dilentiunt Cæf. & Turnerus: nos de *Convolvulo* postea ageamus.

Smilax aspera fructu rubro. Smilax aspera fructu nigro.

Smilacis lævis speciem esse *Volubilem* minorem (quam nos vocamus *Helixinen* *Cilampelon*) sciam manifestum Dodonæo. Eidem haud aliud est *Sammonium*, quam species Smilacis lævis radice crassa. Cæsalpino tamen Smilaci lævi magis videtur convenire *Gelsemium*.

Smilax phascolifera.

Cum Smilace hortensi phascolifera, Cordo eadem est lævis, de qua H. n. g. lib. 17.

Smilax aspera.

Quasdam admodum discrepantes, & viribus planè contrariis pollentes, ut Smilacem arborem è genere glandiferarum de qua egimus in ger. lib. 7.

Fraxino.

Smilacem quoque de *Fraxino* dici, ostendimus l. 3. Nec desunt indocti, qui magno sanè errore *Taxum* Smilacem appellant, ut videre est lib. 9.

Nascitur Dioscoridi in locis palustribus & asperis; Locis. Plinio autem in convallibus opacis. Dioscoridem imitatur *Tragus*, sensens, in superiori Helvetia uliginosis locis & tenebrosis provenire, quod non placet. Vbi enim legitur apud Diosc. in *Asiæ* sibi malim legere cum doctiss. Dalechampio *Asiæ*, vel *perphæra*: Corn. malam Dioscoridis lætionem retinuit. Non nisi montosis & collibus fervidiorum tractuum, Romaniz, Hispaniz, Linguagotiz, plurimam provenire Lobelius testatur. Serius floret, imò Autumno etiam ipso, cum suo fructu *Orobri* & *Novembri* florentem Clusius reperiebat: at frigidis regionibus culta & scitilibus adservata, Autumno duntaxat floret, nunquam semen perficit. Magna ex parte altero duntaxat à satuo anno germinare incipit, nonnunquam & tertio. Perpetuò folia retinet: crescit variis Hispaniz locis, & in Narbone nisi Gallia aspero & arido solo nascitur & aliis calidioribus regionibus: rara in Lusitania conspiciunt. *Montspelij* olim observavi variis in locis, in ter sepes locis siccoribus, florentem & baccas ferentem autumno, quamvis toto anno hæbeat maturas & immaturas, folia in circuitu & in dorso spinis armata interdum iis destituuntur, vel rarissimas habent, ut non inirum si variè pingatur, ut Matthiolas & Alpinus fecit. apud Frid. Meier vidi Smilacem asperam mitiorem in fuliginis vasis, quam hyeme reponit.

Folia fructuque contra venena efficacis antidoti vim habent, autore Dioscoride, sive ante, sive post. *Disse.* stea hiantur. Quin & memoria proditum est, siquid ex his infantem recens nato tritum propinetur, nulla ei postea venena nocitura. Inciditur & ad alexipharmacum, id est, ad ea medicamenta quibus venena arcentur. Plinius autem, ut ex ante dictis patet, alium utendi modum tradit, dum scribit, acinorum *corymbos* contra venenata omnia efficacissimos esse, in tantum ut acinorum succo infantibus sæpè instillata nulla postea venena nocitura sint. *Ex Galeno.* Milacis asperæ folia gustata acrimoniam aliquam habere, & si illis utatur calefacte legitur apud Galenum: alioqui calidam & siccam haud dubiè Fuchsius credit. Fallopius cum in monte Iuliani Pisis videret Smilacem asperam, eà usus est loco *Salfæ parillæ* per biennium quo ibi fuit, scilicet cum successu plurimos à lue venera liberans. Certè no stratem *Sarfam* parillam (quæ Smilax aspera est, inquit *Monardes*) expertus sum simili facultate præditam, cum illa, quæ ex hispania nova adfertur, ad quam magis accedit, quam ad eam quæ in Honduras invenitur. Gustu insipidus est, & sine acrimonia, necejus aqua, hordeacè à lapidior est.

SMILAX ASPERA MINVS SPINOSA, fructu nigro


Smilibus cum priore sarmentis & claviculis prolixima quæque amplectentibus nascitur, non est tamen adeò spiris horrida: folia etiam paulò breviora, atriora, molliora, nullis aut certè rarissimis aculeis obsita habet: flos alteri omninò formâ similis, sed colore differens, nam ex albo quasi carneus est, fructuque rudimentum. quod ex medio flore tanquam umbo prominat, rubescit, plenus autem & maturus fructus non est rutilus, ut in priore, sed omninò niger, & succulentior, quantum quidem Clusio videtur, officula conveniunt. Smilax altera Clusij extremæ Beticæ incolis, *Vva Nomina de Perr.* i. e. *Vva canina*, Lusitanis conterminis *Re-Hispanica* canis, Olystipponensis *Allegacum* appellatur. Icon hujus à Clusio hisp. & hist. proponitur cum inscriptione Smilacis asperæ nigro fructu. Eandem etiam exhibet Lob. in Ic. sub hoc titulo: Smilax asperæ nigro fructu Clusij, tera,

tera, facie Salsæ parillæ, aut congener. In obli. de pingit Smilacis asperæ è spinis verietatem, folio non spinoso, famentosis viticulis, multò minoris spinis referta; cæterò quàm cæteris cunctis similibus, aut iisdem, fructu nigro.

Baub. Ex his ita dictis clarum est C. Baubinum in phyt. multiplicata entia, nec sine errore Clusii Smilacem asperam fructu nigro (quæ ipsi Smilax aspera est) à Lobelii Smilacæ aspera altera, facie Salsæ parillæ, aut congenerè (Smilacæ ejus asperæ, diversam statuere. Sed hunc errorem apud Matth. silentio involvit, neutriusq; meminit: in pin. verò cortex, commemorans & aliam varietatem foliis angustissimis in Galloprovincia. Quàm henè porò Clusii Smilacem asperam fructu nigro, cum Smilacæ aspera Lusitanica Tab. & Ger. (etiam adhuc in pin.) eandem faciat, monstrant eorundem diversæ figuræ. Folia in icone Clusij sicut & Lobelij sunt absque spinis, in Tabernæmontani verò sunt spinosa.

Locus. Hanc plerisque Lusitanix provinciæ locis, circa sepes & collium convexa, & extrema Bæticæ parte, qua Lusitanix contermina est, Clusius cum priori florentem conspiciebat. Nobis visæ est Heidelbergæ in horto D. Sprengerij Smilax aspera sine spinis. Eadem etiam observata Argentine in horro D. Meieri. Considerandum an eadem cum Clusiana: perpendendum etiam an eadem sit, quam Matth. in post. comm. cum mag. iconibus exhibet pro Zarza Parillia, de qua hoc seq. capite.

SMILAX ASPERA ZACYNTHI, Alpino.



Monardes triplicem describit. Carzæ parillæ Carzæ-parilla, inquit, Hispaniæ novæ est planta multis radicibus nitens, duos cubitos aut eo amplius longis, colore cinereo diluore, quæ interdum tam altè demittuntur, ut, qui integras erueit voler, ei profundâ fossione opus sit, tamis nodosis & lignosis, qui facillè deficiantur: florè sine aut fructum proferat, ignoro. Ab hac differens est quam provincia Honduras profert, quod hæc cinerea, nigrior atque crassior sit, illa verò candidior, ad pallorem tendens, & gracilior. Nunc ex provincia Quito inserti cepit, copiosè nascens vicinis urbi Guayaquil locis, ad flumen ejusdem nominis maximum, cujus aqua admodum salubris, & multos morbos curare dicitur. Indi & Hispaniæ aqua se abluendo, & magnam ejus quantitatem sapiti hauriendo manè, plurimum urinæ excurrunt, & valdè sudant, & consequenter morbis liberantur. Sunt autem qui putent ab hujus fluminis aqua Sarsum parillam facultates suas mutuari, quæ colore est ex cinereo nigricante: majoribusque & crassioribus radicibus constat, quàm quæ ex Honduras adfertur, itaque interdum tam longis, ut alitudine humanè fodiendum sit, ut erui possint. Hujus certè ad fluvium Guayaquil & in Punainsula nascentis, Petrus Cæca part. Chronici Peruviani c. 54. meminit, alteraque in plerisque Indiæ regionibus nascenti præfert. At Cæsalius duas primas differentias agnoscit.

De Salsæ-parilla sibi minis constat Matthiolus, in diversis locis ita scribens. Radix (inquit in comm. lat.) quam nuper aliqui Salsam, aliqui Spartam parillam nuncupare cæperunt, Ebuli tam ad unguem æmulatur radices, ut quandoque crediderim Spartam parillam & Ebulum esse idem, tamen id asserere non auisim, cum hæc enuse ejus folia non viderim. Idem in comm. It. ait: Radicis Indiæ Hispanis Zarzæ parilla vocata parvus ramus ex Hispania mihi missus, foliis est iisdem cum Smilacæ aspera, ita ut existimem eos non errare, qui asserunt Zarzam parillam aliam non esse à Smilacæ aspera. Cujus opinio nis primus autor fuit Ghinus. Non desunt tamen qui huc opinionis contradicant, quod vident harum radices facie non parùm differre, cum Smilacis asperæ, nodosæ; Zarzæ parillæ verò rugosæ habeantur. Ego quamvis neutram opinionem certò affirmare possim, cogor tamen potius Ghino assentiri, & Zarzam parillam scilicet esse dicendam Smilacem asperam aut speciem ejus. Libro autem 4. in post. comm. cap. 140. ponit figuram nominè Zarzæ parillæ non spinosam: eam scribit sibi à quibusdam missam, affirmans aliquid discrimen inter Smilacem asperam & Zarzam parillam esse, interim rati-

SMILACI AFFINIS SALSA parilla. CAP. XL.

SALSA PARILLA.

Hanc ob similitudinè quam cum Smilacæ aspera habet, facillè post Smilacem posuerim. Qualis autem reliqua sit plantæ facies vix certi quicquam adferre possum. Radices verò notissimæ sunt ad deludationes eorum quibus vagus concubitus luem affricuit. Sunt autem flagella longissima, plurimarum ulnarum, surci majoris crassitie, obliquosa funiculorù flexibilitate, striis per longum decurrentibus, colore exterius fusco, cui substantia farinacea, alba subest, crassiuscula, mollis & digitorum atritu in pulvisculum solubilis, Agaricum ferè referens, sapore glutinolo, amaricante, non ingrato tamen, medullibus verò lignosum nitidum, lertum, stricturne contumax. pendens porò flagella hæc ex pollicaris crassitudinis radice transversa, squammata, quæ famenta crebra sursum mittit, vitiginis non absumilia, parique crassitudine, veluti geniculis quibusdam intercepta, striata, adnatis spinis minacia, coloris buxæ, substantiâ inrus Palmæ instat fibrosâ, albicante, sapore nullo evidente.



Defec. fumentosa. **Color.** **Sapor.** Cùm icon Lob. adv. persimilis sit ipsi plantæ sicæ, quam communicavit Douez, eam assumpsimus. Folio est (inquit in Obli.) Smilacis asperæ spinoso, & famentosis implexis viticulis, spinis adun-

Defec. fumentosa. **Color.** **Sapor.** Cùm icon Lob. adv. persimilis sit ipsi plantæ sicæ, quam communicavit Douez, eam assumpsimus. Folio est (inquit in Obli.) Smilacis asperæ spinoso, & famentosis implexis viticulis, spinis adun-

Defec. fumentosa. **Color.** **Sapor.** Cùm icon Lob. adv. persimilis sit ipsi plantæ sicæ, quam communicavit Douez, eam assumpsimus. Folio est (inquit in Obli.) Smilacis asperæ spinoso, & famentosis implexis viticulis, spinis adun-

Smilax aspera non est.

men perseverat in sua opinione, congeneres esse plantas. Cujus autem plantæ sit Salsæ parillæ figura Matthioli, asserere non auiam. considerandum in eum sit figura aliqua ad Smilacem in modis aspera in expressa. Mira sanè fuit ejus opinio de radicibus Ebuli, quæ obsecro similitudo inter Ebuli radicem & Salsæ parilliam vulgè dictam. Neque si similitudine forent, ideò continuò eadem astruendæ. Neque Colutea eadem est cum Sena, licèt illa possit nonnulla eadem, quæ hæc præfere. Sed nec tantam Smilacem cum Salsæ parilla in radice fortitur similitudinem, quanta hæc tenus persuasa quibusdam fuit. Siquidem Smilacis geniculatæ, articulatis segnentis ra licis, candidæ, loris nitentes, Graminis canini, aut Harundinis valatorij. At Parillæ crebris loris prolixissimis, ab uno trunco radicis magno, præduro, strumoso, rugosisque capitibus, hinc inde subtus, ut in Asparago, vel Rusco, oriuntur numerosi concolores lori, æquabiles & sine geniculis vel nodis; ræti, flexiles, cortice durissimo, pullo, rugis striato in longitudine, quam vicenum pedum interdum mensus est Lobelius. Intus farinacea medulla, non ita ingrata, sed viscida, non nihil emplastica, amaricantem, nec tamen calorem prodente. Et quanquam Zarzæ parillæ & Smilacis asperæ hispanicæ radices similes Garcias concedat, tamen easdem esse jure negat. Reperiuntur enim sæper uterò similes, quæ tamen vel mirimo aliquo discrimine differunt. Differentiæ etiam cæli folique diversa constitutio adfert. Quare licèt Salsæ parilla, quæ è novi Orbis sive Americæ provinciis infertur, Smilaci asperæ in Europa ratæ similis videatur & sit, viribus tamen differat. Neque enim soli cælique diversitas, ad formæ modò commutationem aut alterationem facit; sed plurimum etiam ad qualitatem virtutis remissionem aut intentionem confert. Et sanè calidis locis enata potentiora serè, odoratoraque sunt: frigidis minus. Ita Salsæ parilla Peruviana, quam provincia Horduras, & nunc etiam Quito profert, tametsi Smilaci asperæ in Hispania ratæ similis sit, temperati tamen cæli occasione, tum & ipsius foligenio, longè efficacior est, quam vel in Hispaniis, aut etiam in Africa nata.

Zarza parilla Matth. Lac. Monard. Garc. & Lugd. qui cum Dodonæo Zarzæ parillæ etiam in America meminit, ut & C. Bauh. phyt. qui hanc suam Salsam parilla in 4. malè meo judicio separat ac diversam statuit, ab America, ejus scilicet Salsæ parilla quiritæ. hunc autem errorem corrigiit Bauh. in pin. ubi ambas sub Smilacæ asperæ 4. Peruviana, sive Salsæ parilla comprehendit. Caterùm apud Lugd. duæ sunt figuræ, quarum secunda, quæ tantum radicibus constat, inversa est culpâ typographicâ. Zarzæ parilla Peruviana, Dod. Zarzæ seu Salsæ parilla, Cast. Sarzæ parilla Cæs. Salsæ parilla, Lon. & Frag. Salsæ parilla, Lob. & Tab. cui & Smilacis Peruviana, & Ger.

Smilacis asperæ Smilacis asperæ Zacynthi insule Alpino quæ agnovit esse verâ Salsam parillam quæ medicutiuntur ad sanandam luen venerem: ante dubius erat: quoriam omnes Smilacæ asperæ quas viderat exiles admodum brevè que ac capillares radices habebant: sed in Zacyntho insula longas crassas, asportatis hispania radicibus Salsæ parillæ omninò similes observavit plantam radicibus ab omni terra deletam impetuosa torrentis aquâ, quam transeuntis Græcis, loci accolæ & agricola Smilachiam nuncupavit. Ea vulgum præ se ferebant saporem uti radices Salsæ parillæ. Pharmacopola ejus loci multum lucri se fecisse his radicibus ipsi affirmavit aliud missis pro Salsæ parilla: quam mercatorem clam faciebat Cayri in Salsæ parillæ fascibus ex Hispania asportatus vidit portiones radicum nodosarum vel gericularum Asperæ Smilacis, à quibus procedunt radices, qui-

bus utitur cum foliis & ramulis spinosis. Zarzæ parillæ verò Smilacem asperam ab Italica diversam ostendit figuræ foliorum varietas: sunt enim in breviora: radices habent etiam in nodos quodam qui non reperiuntur in aliis Smilacibus a peris. Hispani Carzæ parillæ nomen indiderunt propter cognationem, quam cum Smilacæ asperâ habet, quam in Hispania parillam (quasi dicas Rubum viticulam) vocant: Parra enim in Matthioli interprete, Vitis dicitur, & Parilla viticula, sive parva Vitis; Zarzæ autem, Lacuna teste, Rubus significatur.

Semper autem Salsæ parilla deligitur nigrior, recens, non cariola, sicut contumax, quæ que assulati in frangitur, & ponderosa: nam quæ cariem sentit, & dum frangitur pulverulenta est, inutilis existimatur.

Vitis Carzæ parillæ Hispani ab hinc sexaginta annis circiter innotescere cepit, quoniam ea Indis præstanti medicamento erat, ad multos variòsque morbos. Longè alia erat ejus virtus ratio cùm primùm in medicinam recepta est, quam nunc est: tum enim Indorum consuetudo observabatur, quam in suis morbis curandis usurpare solent, ad quos profigandis maximè reperiebatur efficacia. Verùm nostri sæculi delicia in causa fuerunt, ut eodem quo Guayaci aqua modo nunc propinetur, Carzæ parillæ scilicet minutim concisa aqua macerabatur, deinde in mortario diu tundeatur, donec omnino in mucaginè quandam resolveretur, quam deinde colabant. Hujus liquoris ita expressi scis capocem cyathum calidum manè hauriebant, deinde tragulis sese tegebant, & duarum horarum spatio sudabant. Quod si interdum sitis urgeret, idem mucorillus potus erat. Sub noctem, alium ejus calentis cyathum hauriebant, atque tunc interdum teporis, ut manè sudabant. Hic ordo triiduo in tegro observabatur, ut neque aliud ederent, aut lberent: præter eum lentorem calidum expressæ Carzæ parillæ. Hæc ratione præparata ego initio plenumque propinavi: multo tunc melius curavi, quam nunc sanatur. Subsecuta est alia ejus propinandæ ratio videlicet, duæ uncie Carzæ parillæ lotæ, corfractæ, & rati-

Icon Mat.

Discrimen radicis Smilacis et Salsæ parillæ

Guay.

C. Bauh.

Lugd.

Smilacis asperæ Zacynthi Alpino

Smilacis asperæ

Carzæ parilla nomen unde.

Carzæ parilla præparanda a pud Indos ratio.

Carzæ parilla altera ratio.

Vitis parilla medicus.

tamus, quæ ad çarçam panillam pertinent. quandoquidem medicamentum est, cù jus usus & facultates maximè celebrantur. Iam annus est sextus & vicefimus, quòd syrupum confeci, non modò in hac urbe, sed tota Hispania laudatissimum, ad morbum gallicum, atque alios profrigidos: nam neque calfacit, neque in flammam, Guayaci videlicet siccitate temperata, & çarçæ parillæ calore mitigato: hoc modo. Çarçæ panillæ unciæ duæ, Guayaci quatuor, ut supra dictum est, præparata, Zizipha sex & triginta, pruna passa viginti quatuor, utraque officulis repurgata, florum borraginis semuncia, violarum randundem, bordei mundi aliquot grana, in sex aquæ sextariis lento igne coquantur ad quatuor sextariorum consumptionem: colantur, & decem hujus decocti unciis, una syrupi violati admiscetur. Calidus mane & vespere forbendus datur, eodem servato ordine qui supra dictus est, sudorem etiam (si provocabitur) detergendo. Conceditur ab initio ejus pulli gallinæci exigui, & reliqui cibi supra enumerati, & bibitur simplex aqua çarçæ panillæ, quæ fit ex ejus semuncia in octo aquæ sextariis cocta, ad duorum vel paulò amplius consumptionem. Ea ratione curantur, cum omne genus morbi gallici, tum reliqui, quos aqua Guayaci, China, aut çarçæ parillæ curari diximus. Fuit hoc serapium primò conscriptum in gratiam Pantalæonis de Negro Genuensis, qui licet jam multorù Medicorù operâ usus fuisset, atque Guayaci decoctum aliâq; medicamenta sumpsisset, de seculis tamen erat viribus, scirrhòque insuper in cruce, & sævis doloribus afflictabatur: at sumpto serapio, probè curatus est. Fit item alius syrupus hujusmodi: çarçæ panillæ octo unciæ constat, & concisæ, in octo aquæ sextariis ad sex consumptionem coquantur; in binis qui supererunt sextariis, sacchari libræ quatuor injiciuntur, sit quæ syrupus, ut moris est. Ejus syrupi tres unciæ manè, totidem nocte sumuntur, prandium esto de cibis boni succi, cæna sobria; potus è simplici çarçæ panillæ aqua. Eo utatur donec assumpsit sit, quo tempore ad sua negotia peragenda egredi nõ verabitur. Curat hic syrupus plethoræ ex morbis supra enumeratis, sine molestia. Ex ea etiam fit pulvis in hunc modum: Nervo illo interiore seu matrice exempto, çarçæ panillæ exsiccat, contunditur, & citratur. Hujus pulveris (purgato priùs corpore) drachmam manè jejunos sumit, atque simplicem prædictam aquam haurit, idem nõ aut facit dormiturus. Cibis sit boni succi, potus illa aqua simplex, vino abstinere. Utiles est hic pulvis in luc venerea, aliisq; morbis ab ea oriundis: nec non scabiem purulentam & saniosam, in manibus & pedibus misicè sanat, hac ratione: Purgatus æger, etiam (si necessitas urgeat) non purgatus, pulverem modo prædicto sumet, simplicem illam aquam sumet, & rimis quæ in hoc morbo à falsa pituita, corruptòq; humore natae, pedes & manus occupare solent, paululum aquæ sublimati rosacea simpliciore dilutæ plumulâ illinet, deinde emplastrum Galiehlî ferventis vulgò appellatum, aut palmum, panò sericeo tenuiter inductum omnibus locis quibus illa fuerit sublimati aqua simplicior imponet, singulis diebus repetetur, & quindecim dierum spatio perfectissimè curabitur, nec aliis medicamentis opus erit: abstergit enim carnem generat, & ad cicatricem perducit. Hodie tam frequens est aquæ çarçæ panillæ usus modo prædicto, ut in omni morborum genere sumatur, sive in de fluxionibus, flatibus, uterque morbis frigidis, sive aliis quibuscunque, modò non sint acuti, aut iis febris accesserit: ideòque non minore copia multis locis afferatur decoctum simplex çarçæ panillæ, quàm aqua vulgaris. Certum est tamen, his qui calida, hepatis præsertim, intemperie laborant, non

convenire: nimiam etenim exalfacit, sed ventriculos frigidos fovet, & flatus mitificè discutit. Illud autem animadvertendum est, has tres aquas non nisi Autumno, aut Vere propinandas esse. Calida est & sicca in secundo serè gradu. Duplex verò ejus Sarçæ parillæ, quæ ex provincia Quito caput inserri, exhibendæ ratio apud illos observatur. Prior, quâ Indi & nunc utuntur, & ab initio usi sunt, hæc est çarçæ panillæ radices, quot opus erit, sumentes, nervo illo interiore repurgant; corticem, si sicca sint radices, macerant, donec mollescat (virides maceratione non egent) deinde minutim concidunt, & addita aqua contundunt, ut succus extrahi possit viscidus & mucosus, cujus manè eam quantitatem sumunt, quam uno hauitu aut pluribus bibere possunt: lectum deinde ingressi, plurimum sudant, postea, mutatis linteis, pulum edunt, & corticis illius succum hauriunt, in prandio, in cæna (quæ levis erit) atque interdium: deligendus est tamen locus ab aère & frigore liber. Hac ratione, & usu conservarum, necessariorumque aliquot succuum siccatorum per nullo, octo aut novem dierum spatio, omnibus morbis liberantur, quos çarçæ panillæ curare solet: validum autem & robustis viribus eum esse oportet, qui hac curatione utetur. Altera convenientissimè imbecilliores sunt, nec superiorem, sine manifestò vitæ discrimine, ferre possent, çarçæ panillæ nervo suo liberatæ, & ut superius, macerata, si sicca sit, deinde contusa, quatuor unciæ, plurisve aut pauciores (nam hæc nullus ponderis aut mensuræ usus) in octo aquæ sextariis ad dimidias decoquantur, ex ea aqua quantum possunt semel aut pluries bibunt, in lectulo deinde se componunt, ad sudorem provocandum, qui tametsi adeò vehemens non sit, ut superior, copiosus tamen est: mutatâ veste pulum edunt, & eadem aqua (nam uno die coacta absumitur) cum in prandio, tum in cæna, illis potus est: ab aère & frigore sibi cavent: repetitum per quindecim aut viginti dies hoc medicamentum, omnes morbos sanat, non sine magna omnium admiratione, præter febrim, aut morbos acutos, in quibus çarçæ decoctum exhiberi non solet. Istic neque initio diæte, neque in mediâ, neque sub finem sese purgant, uti nos facimus (nam & medici & medicamenta composita illis desunt) sed muliercularum duntaxat operâ utuntur, quæ illis hujus decoctum pro arbitrio exhibent. Illud verò observatio ne dignum in hac curatione, quòd solus radices cortex, nervo exempto, in usu est (efficax enim ille nervus inutilis, imò operationem, nisi eximatur, impediens.) Ideòque nunc eorum exemplum secutus, solo cortice in hunc modum uti soleo. Quatuor corticis çarçæ panillæ lotæ unciis in octo aquæ sextariis viginti quatuor horarum spatio macero, deinde ad dimidias decoquo: quòd si calorem in egro metuo, hordei mundati dimidiam unciam inter decoquendum adjicio, & in magno calore, vulgaris aquæ loco, cichorei stillatitium liquorem cum hordeo substituo. Hæc aqua temperatissima est, & admittendos ejus effectus in multis expertus sum. Observandum item est, ut quanta possit quantitate æger hanc aquam, uti retulimus, bibat, sive uno hauitu, sive pluribus, quia magnam quantitatem bibendo plus sudabit, & citius certiusque sanabitur. Itaque hanc novam sumendæ çarçæ panillæ rationem maximè utilem fore puto, faciliusque & brevior tempore curandos ægros. Aliam addit Fragosus ejus præparandæ rationem, quæ est: çarçæ panillæ libra una bis lota, benè contusa, & minutim concisa, in decem & sex aquæ sextariis toto triduo maceratur, deinde lento igne coquitur usque ad integram serè consumptionem, h. e. ut acetabulum seu scutella ejus decocti solium remaneat: çarçæ statim ex prælo imponitur, succusque, ex pri-

*Çarçæ panillæ
yquilana
exhibet nã
& prior ratio.*

*Çarçæ panillæ
substantia
vio ulcra.*

*In quibus
morbis non
exhibenda.*

*Çarçæ præ
paranda
ratio opti
ma.*

*Quantum po
tissimum
bibere
liberanda.*

*Çarçæ panillæ
ex çarçæ.*

*arsæ sy
ppm prior*

sypp. 2.

*Çarçæ pul
vis.*

*Pulvis u
endi ratio.*

*Çarçæ a
qua usque
frequens.*

*Quibus mor
bis non
veniat hu
jus aqua u
su.*

HISTORIAE PLANTARVM

ca. conatur ad uncias duas aut eo amplius, etiam si ex eo quod super fuit decocto quantitas augeri debeat. Lento igni imponitur: ubi fervere coeperit, pulveris aloës optima ʒij. myrrhae selexa, Nucis pōice magnitudine; Croci momentū (sunt qui Ligri aloës pusillum addant capitis roborandi causa) injiciuntur & continuè agitantur, donec a nyli crassitiem contrahant: ex ea massa catapotia formantur. Ex his duo singulis decem prioribus diebus devoranda dantur, & singula reliquis viginti, sub horam undecimam noctu. Si verd in veteratus ut morbus, & aeger validus, tria singulis decem prioribus diebus, bina subsequentibus decem, singula reliquis sumi poterunt. Dimidia gallina elixain aqua (cui salis & croci momentum, & aliquot cicercis grana injecta sint) meridie datur edenda, reliqua pars in cœna. Potus erit aqua gargæ simplex: surgant hora decima, cubitum eant ante solis occasum. Iltis catapotii gravissimo dolore, & brachiorum crurūque paralytici curari experientia se consecutum scribit. Zarza parilla (attestante Benz.) Venereæ contagioni & ailiis morbis medetur. Eā nempe duabus silicibus trita expressus & percolatus succus a limbo aqua calida modico egrotis bibendus porrigitur. Ii mox hauri ejus potionis, quantum natura patitur, mensurā, loco calido compositi, quoad tollere possunt exsudent. Eo medicamento tres aut quatuor dies, ut viliū est, utuntur: bis octo tantū in interea pane & pulli gallinacei assi paululo vescunt. Alij ejus herbæ ramulos dumtaxat aqua incoquentes, jus eliciunt quod interdū bihunt: & eo sorbitionis genere nonnulli duos trēve continuos menses utuntur. Radicum decoctum exsiccat, si Lobelio credendum: sudores & urinas cit: cutem evacuat, & quæ cutem subierunt, educit. Pro Salla pariglia ut & Ligro sancto se feliciter usum esse, Rosmarino, Sabina, Smilace spinosa, Junipero & Amulibus, autor est Bovius.

Exhibendi ratio.

Spissa succ. em.

Herbar. majus.

Substantia.

Est autem duplex China ab autoribus descripta; alia ex India occidentali, Hispania nimirum nova & Peru, quæ colore intus magis ruffo est; alia ex India orientalis regione Sinarum allata. Orientalem sic describit Garcias: Trium aut quatuor palmorum altitudine affurgit cauliculis tenuibus, quos rara folia cingunt, Mali Assyrii junioris similes radices palmi longitudine, interdum crassa, nonnunquam tenuis, quæ recens eruta ad nodum tenella est, & cruda aut elixa mandi potest: arbores Hederae modo scandit. Linscho. Ind. or. par. 4. c. 17. Chinae radix fruticis more excrecit, foliis paucis, Aurantiorum forma. Acostræ Orientalis China planta est multis tenuibus spinosisque fructibus prædita, Smilaci asperæ non absimilibus, quorum maxima minimum mandis digitum crassitie non superant, foliis Plantaginibus latifoliae magnitudine: radices pugnum nonnunquam æquant, interdum minores sunt, solidæ, graves, candidæ, interdum etiam rubescentes, & multa sæpenumero simul coherentes. Est occidentalis China Monardi Arundinis majoris radices similibus, nodosa, intus alba, interdum rubescentes, foris rubra. Saxoniæ radix est Arandinis latifoliae, quam videntem se vidisse refert Venetius in horto Petri Bosselli, idè quæ deceptum ait Acostram, ut qui arbitratus sit plantam esse arboribus adhaerentem, ut Hedera. Amatus quoque inter Arundines recensuit: at Casalpino, China orientalis potius ex genere Iridis, quam Calami videtur. Cæterum cum China suis samentis Smilaci asperæ absimilis non sit & suis cauliculis Hederae modo arbores scandat, merito in scandentium classem refertur.

Considerandum quinam sint ij apud Auger. Ferr. qui Chinam & Apion, res & delineatione & facultatibus aperte diversas confuderint. Miror, inquit prædictus autor, doctos aliquot viros ex sola China figura turbinata Apion judicasse, quasi nihil sit, quod Pyrum referat præter Apion. Ego hæc in parte Augerio non subscriperim: meo enim iudicio non propter formam aut quod Veterum apion existimant, Apion vocarunt; sed ex eo quod China insipida sit.

Lob. Adv. sub Acoro aquarico, Schinx (ita enim vocat) obiter meminit, appellatque Schinam Americi orbis. Titulo autem de Apio vera Chinam sive officinarum Apium & Acori (propter nullam ferme gustus perceptibilem qualitatem, sic enim sonat de Acori Græcis) & non Acori cognominat, & Occidua Florida Pyriformam. Eid. hist. belg. videtur species Acori, Arundinis aut Cyperi.

Monardi, Iouh. Lac. Lob. ic. Cast. Matth. (huic & Cina) & Tab. China, cui & Schina, Bochenwurg. China sive Cinna, Cæf. China radix, Frag. Garc. Acostr. & Lugd. qui in app. alteram figuram dat sub titulo, Radicis Chinx Acostræ. Chinea radix, Cord. hist. China. C.B. Dicitur China & Chinx radix, à China India regione, in qua copiosè nascitur: Vocatur hoc excellens medicamentum apud Acostram in Chinarum regione Lanpatam, Lompaton vel Lompaton, in Decar Lompas. in Canavin Boni, ab Arabibus, Persis & Turcis Ch. ph. china.

Radix China piimò innotescere cepit post annum 1515. adferentibus Chinenibus, qui sunt Astitici Scithæ, Goam India ubi viciniam duntaxat plantam perpusillam vidit Garcias. Iuxta arbores ferendam esse perhibent, quoniam Hederae modo eas scandat & amplectatur: nascitur in Chinarum regione vastissima, quæ Moscoviam usque extendi creditur: invenitur tamen etiam in Malabar, Cochinchina, Crangar. or. Tanor & aliis locis. Monardes autor est etiam ex Occidentali India Chinam de ferri, vulgò autem in Sina Orientalis India Chinam de ferri, Seythæ atque Sericania hixtima, maritimis locis nasci,

CHINÆ RADIX. CAP. XII.



Magnæ crassæque sunt radices, apophylibus tuberosis inæquales lentis fibrarū fragmentis hinc inde; parentibus, latis ponderosæ, modò effictæ ror sint, colore foris ex fusco rubente, intus ex modica rubedine albescente, substantia medio criter compacta, nullis fibrarum pedunculūve vel vestigiis apparentibus, quo modo ferè videmus Iugaridium fungo compactiores, sapore nullo manifesto, urde

Lib. 1.

Apic. 100.

ambulo nomen apud nuperos meruit. Figura nostra est ex ipsa radice, cui etiam partem addidemus ex Lobelio, ut & folium spirulo pediculo ex append. Lugd. cuius figura, ut ait, ex recentissima China expressa est, quæ demonstrat eam sub terra serpente, ac variis ex locis teretes ac lignosos processus emittere, quibus novaradicum aliarum folioles adnascitur & incrementum capeffit, multis & terribus aliis qui fibris capillata, quibus nutrimentum attrahit.

Descriptio plantae.

Occidentalis.

Occidentalis.

Apium 100.

Auger re. 100.

Schina.

Apium officinarum.

Acorus.

Locus.

leas. naldi, Arundinis, aut Vlvæ modo. Optimam esse recentem, sapore inspidum, pinguem, ponderosam, solidam, quæ neque tececedum, neque cariem lenferit. Mercatores autem foramina à teredinum erosionem, aut carie facta obturant bolo Armeniâ aquâ dilutâ, velut cæmento quodam, obducuntque extrinsecus pari fraude totam radicis molam, quæ fraus & nativum illius colorem ementitur & ei pondus addit. Melior candida quàm rubescens, Garcia. Lincotano tamen quo nigrior radix, eò melior.

lobel, quoniam omnis saponis experts est China, gratissima est faciendo cõtra luem venereæ decocto, *sp. rad. Chinæ* in orbiculos concise ʒ.ij. aq. fontanæ lex aut septem libras, macerentur simul diem & noctem in fictili novo; postea lento igne coquantur, fictili benè operculato, aut in balneo mariæ, ut sit decoctum Salæ, aut Guayaci, quoad fatis videbitur. Hujus decocti bibat quotidie bis, quantum ægroto & Medico fatis esse videbitur. Prodest hoc decoctum non tantum in lue venereæ, verum etiam omnibus morbis sudores profulâtibus. Tametsi porò non desint ex recentioribus, qui Chinæ radicem acriter, sed immeritò damnant, tamen non sine causa magnis effertur à Garcia laudibus, quonia vel lue venereæ in ficti ut culerentur, extremâ illâ victûs ratione non egeant, qualis non citra molestiam in Guajaci usû observanda, sed tantum abstinentium illis sit à bubulis & suillis carnis, pisce & crudis fructibus. In magnis autem doloribus & in veteratis hujus radicis uncia in septem aquæ sextariis coquitur, ad dimidij usque humoris consumptionem. Servatur id decoctum in vase aliquo vitreo, aut figulino vitrato. Spuma verò inter bulliendum colligitur, & utiliter ulceribus tumoribusq; imponitur. Salutaris est etiam densus ille vapor inter coquendum exhalans ipsius doloribus. Interdum calido decocto tumores fovemus: non nunquam lineos pannos decocto madidos ulceribus imponimus, eaque mundamus. Solent Sineses majori quâtitate in sua regione alimere, quòd frigida admodum sit. Quos cum sciaticâ laborâs imitari vellè ait Garcia, radicis duas uncias, additâ interdum semissè in præcedenti aquæ quantitate decoquens, & calidè hauriens, provocandi sudoris causâ, ob nimium medicamenti calorem, in tantos hepatis ardores incidi, ut universum corpus erysipelate & phlegmone laborare cõperit. Itaque meo periculo facti sapientiores reliqui, calido decocti potu, & tantâ radicis copiâ in posterum uti desierunt. Quare hujus unciam in septem aquæ sextariis decoquimus ad medias, aut ad tertiam partem, pro morbi & ægri natura, subinde ea medicamenta injicientes, quæ hujus radicis facultates corrigant. Eg. Si dolor capitis, aut nervorum adit, rotè marinum, aut rosas in jicio: si obstructioibus hepar laboret, apium: si ardor adit cõ obstructioe, in tubum: si ulcus vesicæ aut renum in festet, addo glycyrrhizæ succum interdum radici admisceo æquale pondus bordei. Soleo autem hujus radicis decoctum sumptuos, prius syrups convenientibus purgare, & non nunquam syrups Chinæ decocto diluere. Bene autem pûrgato corpore, radicis decoctum propriare incipio; post 15. diem, minorativo, si opus sit exhibito: item alio interdum post 30. diem. Toto hoc tẽpore, naturâ, vel arte alvus libera sit. Quòd si nimium incalescat æger, radicem minùs decoquo, aut decocto aquam intybi, vel sumiterræ, aut bugloffi injicio. Quòd si nec hoc sufficit, decoctum subtrahatur, donec que in aliud tempus magis oportuit un differo. In singulas verò curas, radicis usus esse solet ad ʒ. xxx. uncias totidem dierum numero, quibus cura perficitur, respondentibus. Rarè calidum decoctum exhibeo, nisi in vehementibus & in veteratis doloribus, quando sudoribus

Tom. II.

materiam evacuari oportet, bis in die manè se. & vesperi. Efficacior est hæc radix in veteratis, ubi videlicet magni tumores, & ulcera maligna ad sunt, q̄ in recentibus morbis. Quidam in Balagata calido radicis decocto, ejusdem radicis tritæ ʒ. j. b. injiciunt, quotiescunque mane & vesperi sumunt. Sunt qui manè laminam conservæ ex hujus radicis pulvere & melle (sive saccharo, si magnus adfit calor) paratæ edant, deinde radicis decoctum hibant. Augetur autem, aut minuitur pulveris quantitas in hac cõserva, & quandoque corrigitur, pro Medici arbitrio. Radice adhuc tenerâ Sineses cum carne elixa vescuntur. Vtile demum etiam est hujus radicis decoctum præter eos morbos, qui cõ contagio lue venereæ committunt quid habent, ad paralytes, tremores, articulorum dolores, sciaticam, podagram, tumores schirroides & œdematoses; tum etiam strumas extirpat. Succurrit vtriusculi imbecillitati, in veterato capitis dolori, calculo & vesicæ ulceribus. Intellego illos qui hoc decocto utuntur, mulierû conspectu vehementer ad libidinem accendi. Quare consultum videtur, ut per curæ tempus nullæ ad ægros mulieres admittatur. Et hæc Garcia. Hæc radix ad eò innoxia apud Acoftam censetur ut eâ sumentibus, tametsi nullam victûs rationem observât, sed liberè carnibus & piscibus vescantur, nihil in eò modi adferre cõtendatur. Vulgaris in Sinarû & Indiæ provinciis sumèdi hujus decocti consuetudo est, ut radicis ʒ. j. additis radicû apij. ʒ. ij. decoquantur lento igne, sine fumo, in aquâ lb. xvj. ad lb. vj. consumptione reliquas x. in fictili vitreato ad servat, sumuntq; ægri singulis diebus recentis decocti (nâ facillè corrumpitur, nec ultra diè ad servatur) tepidè manè plenum hautû, duabusque horis in lecto remanent, postea surgunt, duabus autem horis ante cenam totidè hauriunt, interdum de eodè frigidè bibentes. Plerique tamè etiam dum sua negotia exercent & navigant, singulis diebus manè & vesperi duas ejus radicis in pulvere redactæ drachmas ex vino, aut ipsius radicis decocto felici successu bibere solent. Ad his magna quantitas radicis absumitur, quâ Garcia plurimû sident, non modò in curandis morbis ab eo enumeratis, sed etiâ in hemicrania, in herniis humoraribus & ventosis, in colli vesicæ & penis callis, eorumq; ulceribus: venerè etiam admodum excitare creditur. Ex hac etiam radice recenti aqua siliacitâ elicitur, delicatioribus admodum familiaris: decoctû ipsâ aquâ præstantius est. Optimè cõservatur radix, si pipere confrecto involvatur. Hactenus Acofta. Solius radicis est usus apud Indos, inquit Monardes: propinatur ejus aqua in diuturnis & acutis morbis, febribus præsertim; etenim sudores provocat, cujus rei gratia multi sanâtur. Lusitani eam prædicant adversus omnis generis morbos, sed maximè luem veneream. Ejus autem parandæ hæc est ratio. Radicis Chinæ minutim concisâ fictili novo imponitur, huic adfunduntur aquæ sex sextarij, maceratur quatuor & viginthi horarum spatio: fictili obaturato, coquitur lento igne ex prunis incensis ad dimidias, quòd eâ ratione deprehendetur quam in Guayaco edocui; stigeicit, colatur, atque in fictili novo asservatur loco aprico, aut juxta ignem, ut diutius maneat incorrupta. Purgato, ut decet, corpore, collocatus æger loco aprico & conveniente jejuniis dictæ aquæ calidæ decem uncias hauriet: deinde horas aut paulò diutius sudabit: sudore deinde absterlo, indusium & lintheamina mundis & calefactis mutabit: deinde in lectulo duas aut tres horas perdurabit; postea vestitus, calidè se in cubiculo continebit, quò neque aër, neque frigus permeabit, genio indulgens, & lepidis colloquiis se oblectans. Circiter undecimam horam dimidiam pullum coctum, aut gallinæ quartam partem cum paucò sale edet, initio prædij

Alia hæc radix utendi ratio. Conserva.

Radix in cibis.

In Indis sumendi consuetudo.

Radix in Pulvis.

Aq. siliacitæ.

Præparanda China ratio.

Aqua China sumendi ratio.

cyatho iusculei epoto: pro bellariis carnes cotoneorum adperentur: potus erit similis aqua, quam jejunos sumplit, quia decocti tantummodo unum genus est. A sumpto iusculeo, uvas arillis emundatas, aut pruna passâ sine ossiculis, & panis benè cocti crusta, biscoctum uenitio prandij edere poterit. Si interdiu bibere uolet eadem aqua cum conserva aliqua propinetur. Octo post prandium horis lectum denudè ingrediatur, alias decem aquæ uncias quam calidè poterit, bibat, duas horas sudet, sudore detereso, indusium & lintea calefacta mutet, post horam cœnet conservam aliquam, aut uvas passas, aut amygdala, & aliquantulum biscocti, de eadem aqua bibat, postremò cotoneorum carne uescatur, potu deinde abstineat. Hæc victus ratio triginta continuis diebus obseruanda, nullâ aliâ purgatione adhibita, sed per cubiculum calidum obambulans, & sese oblectans, ab omnibus abstineat quæ illum offendere possunt. Purgatio ne absolutâ, bona victus ratio seruanda est quadraginta continuis diebus, uinôq; abstinentium & mulieribus: potus erit & Chinæ superioris jam decoctæ, deinde in umbra resiccatæ, uncia una, in sex aquæ sextariis denudè bullita ad dimidias. Illud uerò diligenter curandum, ut Chinæ radix per quatuor & viginti horas semper mace-retur ante decoctionem, siue illa fiat in triginta, siue quadraginta dierum potius usum. Ad uarij generis morbos utilis est hæc aqua, luem ueneream cuius-cunque generis, vulnera & ulcera antiqua, tumores schirofos discutiens, articulorum dolorem soluens, & qualemcunque pedagram, sed coxendices præferentur curans. In ueteratos capitis dolores mitigat, & stomachi de fluxiones omnes & rheumatismos sistit, bonum colorem conciliat, iterum soluit, & omnem hepatis in remperiem emendat, ad quam ualde celebratur. Paralytin & omnes neruorum morbos sanat, atque uelicæ enterocelis utilis, quia humorem, unde generantur, absumit, frigidis omnibus morbis & melancholicis conuenit, uentriculum roborat, & omnes flatus discutit. Febribus diuturnis, quotidianis, & erraticis prodest, sudoris insigni pro-uocatione, quæ etiam in pestilentibus febribus uti-lem quidam arbitrantur. Sicca est in secundo gradu cum exiguo calore, idque deprehendere licet ex eo, quodd aqua, cum Guayaci, tum Sarcæ-parillæ calefacit, & sitim excitat, hæc neque sitim ciet, neque caloris alicuius indicium relinquat. Ad pituitam con-sumendam & ad iuncturas, cerebrum & uentriculum roborandum decoctum radices Cynæ sæpè maximo cum ærotantium iuuentum a se fuisse comprobatum scribit Franc. Indiæ de Gutta. Sed in Chinæ præparatione & usu quatuor castigatione digna tradit Augerius, quæ quis datâ operâ ex ejus libris repetere poterit. Chinæ radix ut annotat Saxonia, accepit summam auctoritatem à Carolo V. Imp. qui summo cum fructu primus ferè omnium radicem accepit & à morbo uenereo antiquisque doloribus est liberatus. Certum est Chinam ritè administratam luem ueneream superare, ceterum mundare, dolores profligare, macies reparare: est in adujs qualitatibus temperatissima. desiccatur quidem excrementiis humores, alimentales autem vel resicit, vel saltem conseruat. Ideo humiditatem habet oleo-sam atque firmiter substantiæ hærentem, ut hæc ratione & diuturnam & multoties repetitam patiatu decoctionem: si minimè cariola fuerit, neq; admodum gracilis & sicca, sed mediocriter gravis, colore inter album & ruffum medio. Rad. Chinam incise in tabellas, unciam: infundatur in aqua lb. vj. deinde bulliant in uasè oris angustij benè tecto usque ad consumptionem mediæ partis: præcipit Vesalius in sua epistola de China ut decoctum hoc calidum conseruetur, uel singulis diebus recens fiat, alioquin

ait acidum ferit: sed experientia docetur oppositum, nec seruatum 4. dies accessit: ex residuo sic aqua secunda facta decoctione in lib. 12. usque ad consumptionem tertæ partis. Iterum uerò quod residuum est coquitur in totidem aquæ libris ad eandem consumptionem. De radicis Chinæ usu Vesalius inter-grum librum scripsit.

CHINA SPURIA PYRIFORMIS siue turbinata.



China nomine Defen. Nobis ante annos plus minus 28. datum radices cuiusdam fragmentum, quod necdum ad eum usque annum terebinthæ aut cariem sentit, quod haud scio qua in re à China officinarum differat, consistentia eadem, coloreque, sapore itidem nullo: fibrosis ueris medijs transcurrentibus, quæ admodum figura ex Lobelio exhibet, alioqui in reliqua substantia nullum

neruulo rum fibrarum uel apparet uel vestigium: tatummodo cortex, quo obtegitur, rugosus est, & nonis que præcinctus, uti ex icone apparet. apophyses in hac radice ueluti & in China apparent. Quoniam uerò proximè accedit ad Chinam spuriam pyriformem Lobelij, utramque con iunximus. Lob. suam in hunc modum describit: Majusculæ sunt radices, & Pyri formâ tuberculis prægrandibus, Apium ab effigie turbinata mentientes; colore uerò & concretionem Chinâ, pro qua ex India missa sed falsâ: adstringunt enim potius substantiâ fibrosâ & densâ, colore & micis Rhabarbari amulis, siue odore, foris color ruffus. Quidam in India uersati affirmat, nec Arundinis, nec Acori, nec Cypri radicem esse, qualis esse potest China dicta, sed cuiusdam magnæ arboris. Notandû autè ad sudores potius sistendos, quâ pro-uocâdos facere: id quæ esse cõperit, qui expiri uolet. Nostra leon est ex ipsâ radice eam habemus, & China spuria pyriformi siue turbinata Lobelij. In adu. c. de Acoro Aquitanico, h. e. de China spuria Acori effigie, vocat radices prægates, turbinatas. Americi orbis Schinam ementientes; item c. de Apio, Occidua floridæ Pyriformem. B. pin. Chinam 2. spuriam pyriformem.

PSEUDO-CHINA RADIX CLVSII.

Falsè nobis persuademus jam dictam eandem esse cû Pseudo-Chinæ radice Clusij Exot. quam Londino ad ipsum pro Chinæ specie mitebat anno à Christi nativitate 1591. Iac. Garetus, è VVingandeco v. siue Virgineæ reletam. Valdè autem nodosa erat hæc radix, & in aliquot tubera formata, fibruloso colore, sarmentum aliquam partem summo fastigio adliuc retinens, quale in Smilacæ asperâ conspicitur, duri, lignosi, multis uenis, ut Smilacis sarmentum prædicti: ipse radices substantia etiam subtrita, ut in Butomi (ulgo Pseudo-acorus nuncupat), & nostrâ adhuc uicinate à nonnullis magno errore pro legitimo Acoro usurpat) radice, salu initio saporis siue gustus, quàm uidelicet uelusta, deinde desiccantis.

China fa. culatæ.

China tem. perata.

Purita in sumpturis.

China præparata.

Vires.

Tempera- mentum.



Pin. China 3, nodosa. Pseudochina radix ex Virginia, Cluf. exot.

Illam porro esse arbitratur Clusius, quam Virginianus historice scriptor, capite de radicibus, in Angliam delatam esse tradit pro radice Chinae, tamen si indigenae illius usum non norint: sed alia radice utantur valde simili, quam ipsi Tsinaw appellant, e qua concisa contritaque, & cum aqua expressa, ad succum elicendum, panem sciunt.

B.phyt.China 3, sive pyriformis;

CHINA SPURIA ACORI effigie Lobelij.



Postquam avari mercatores lucri studiose animadvertissent facile & magno divendi Chinae radicem; alias duas radices ex Guinea importarunt, Chinae praedictae extrinsecus similes, quas ut facilius venirent, Chinae nomine ambas donarunt. Innotuerunt haec primum Tholosae, dicebanturque a locis vicinis erutae; has pharmacopole Tholosates pro Chinae vanum exposuerunt, quod Chinae

non ab similes viderentur, itidemque sapore omni carerent. Radix crassior est & densior, quam Chinae aut Galangae majoris, colore diluore, immensa duritiei, fractu contumax, lignosior quam Chinae, admodum longa, rugosa, tuberculis geniculatis nodosa, foris flava, intus alba, substantia radices Arundinis. Eadem allata est e Guinea Antuerpiae & Londinum, proque China vendita, quae res Medicos in salam conjecit opinionem, ratos inventam in Gallia Chinae radicem ad luem veneream profligandam. Verum sapor docuit & effectus, Acori aut Arundinis radicem esse, non autem Chinae: Adstringit enim vehementer, estque tota crassa inertisque facultatis, nihil levitatis emplastice habens, uti Chinae, & haesecit. An conferat contra luem veneream, norunt qui frustra usi sunt saepe; tamen ad ulcera mala & strumas non desunt illi suae doses. An autem juxta Tholosam nascatur, oblitus sum observare, cum ibi agerem. Haec Lobelius: Nos etiam habemus radicem pro China spuria datam quae eadem sit asserere non possumus. Radix est palmari longitudine, crassitudine pollicari, recurva, tuberculis hinc inde exstantibus & acutioribus turbinatis

Tom. II.

oculis inaequalis, colore foris nigricante partim cinereo praedita, partim ponderosa, dura, compactior quam radix Chinae, fibris oblongis rectisque fractu contumacibus contexta, coloris intus aliquatenus ad rubedinem vergentis, saporem nullum linguae offerens.

Lob. Adv. Acorus aquitanicus; item, Acorus Tholosae; Eid. ic. China spuria Acori effigie. C.B. phyt. China 2. sive Acori effigie: Eid. pin. Acorus 3, adulterius Aquitanicus.

VITIS SYLVESTRIS, ET Athragene veteribus.

CAP. XIII

Paucis sane & obscuris verbis hanc l. 5. c. 10. hist. flux ita descripsit Theophrastus. Ignarium verò aut optimum quidem ex Athragene [ou è άθραγενος, Gaza Athragene] vocata à quibusdam. Haec verò est arbor similis Viti [τῆ ἀκτιδίου] & Oenanthe [τῆ οἰνάθου, Gaza Labrusca] silvestri. Sicuti illa, & haec ascendit arbores. Oportet autem focum ex his facere, cerebrum verò ex Lauro [scilicet άδύων]. Non enim ex eodem agens & patiens. Sed aliud esse oportet secundum naturam. Et hoc quidem oportet passivum esse, illud verò activum. Vitis autem silvestris [scilicet radix pergit l. 9. c. 14.] annua est, si in umbra fuerit, & ille salin verò non, putris & fungosa fit. Theophrastus non videtur agnovisse quae sequuntur. Ocori 3. sive pyriformis [scilicet sive pyriformis male Gal. qui veterem sequitur] admodum sive pyriformis. Haec igitur verba omisit Gaza, uti consuevit, quoties ejusmodi scopulos animadvertit: quamvis hic adeo difficilis non fuerit, quem vel inferior Gaza, viro tanto, non facile superet. Sensus quidem verborum eorum est. Perhibent solum hoc ex omnibus medicamentis nimio per purgationem efficere per superna: aut (uti Corn.) maxime nimiam purgationem sui sum facere. Est enim ut Gal. exponit in glossis Hippocratis. Medici actum ipsum violentae purgationis [scilicet άθραγεν] & superpurgationem non inepte vocant. Capite autem 22. ejusdem libri ait. Calida & acris est Vitis silvestris [scilicet άθραγεν] radix. Quare etiam ad psilothrum [ad depilantem] comoda est & maculas solares tollit: fructu verò ejus depilant coria [pro depilantem legit ac vertit Corr. interpres άθραγεν, de foliis arboris fructum eius scilicet in Theophr. interpretans. Corn.] Caeditur autem quovis tempore, Autumno maxime.

De eadem Vite Plinius in diversis locis scribit. Et quidem l. 23. c. 1. ait: Labrusca quoque Oenanthen fert, satis dictam quae à Graecis Ampelos agraria pellatur, spissis & candicantibus foliis, geniculata, rimoso cortice: fert uvae rubentes cocci modo, quae cutem in facie mulierum purgant, & variis coxendicium & lumborum vitis tulae cum foliis & succo profunt. Radix decocta in aqua, pota in vini Coicyathis duobus humorem alvi ciet [aquosa purgat Diffor.] idem hydropicis datur. Hanc potius crediderim esse, quam vulgus Vvam taminiam vocat. Utuntur ea pro amuleto: & ad expuitionem sanguinis. [Cum is crassus & viscidus putuit a perniciosis facibus adhaeret. & strangulati vis pericula adfert, Dalec.] quoque adhibent, non ultra gargarizationes, [scilicet ulcera ad garg. Dal.] & ne quid devoretur, addito sale, Thyimo, aceto mulso. Idem & purgationibus incipitem putant. Ceterum Plinius his verbis (Labrusca quoque Oenanthen fert satis dictam, quae à Graecis άθραγεν appellatur) Labruscam quae etiam άθραγεν vocatur, cum Vite silvestri confundit, nisi ita contenter distinguamus. Labrusca quoque Oenan-

then fert, satis dictam, quæ à Græcis *ἀμραν* & *ἀπέλα* nominatur &c. Vt verba hæc, quæ à Græcis *ἀμραν* & *ἀπέλα* vocatur, & cætera, ad præcedentiâ [Labrusca quoque Oenanthen fert, satis dictam] non referantur, sicuti revera referri non dehent, sed ea velut à novo principio legamus, ut de duabus stirpibus Plinium hîc loqui accipiamus; priore Labruscâ, alterâ Vite sylvestri, quæ etiam *ἀμραν* & *ἀπέλα* nominatur. Legendum est (inquit Hetmol.) non ita ut Labrusca Oenanthen ferens, Ampelos agria vocetur, sed ita ut duo genera intelligantur, & verba illa, quæ à Græcis *ἀμραν* & *ἀπέλα* appellatur, initium sint novæ pæodi. Id & Dioscoridis, & ipsius Plinij testimonio probatur. Plinij dicentis lib. 16. c. 40. Probat & Vitis sylvestris [Athragenam significat mentratam Theophrasti. Dal.] alia quam Labrusca, & ipsa Hedera modo arborescens. Rectè quidem Plinius 1. 23. c. 1. Ampelon agrian appellari dixit, quam ante (inquit Cornar.) apud Dioscoridem, Vitem sylvestrem tradidimus, sed non est Labrusca, quæ Oenanthen fert, ut Plinius ait; Verùm ea Labrusca idem Ampelos agria & Vitis sylvestris nominatur, proinde in his erravit Plinius, sicut neque in Vva taminia sibi constat, quam alibi ad Ampelon agrian recitit cùm paulò ante Vvam taminiam negasset esse Staphidem agrian; cujus tamen contrarium alibi habet. Idem 1. 27. c. 7. Vitem sylvestrem aliam esse à Labrusca prodidit his verbis: Ampelos agria vocatur herba, foliis duris, cineracei coloris, qualem in satis diximus, viticulis longis, callosis, rubentibus [rubentibus. Flos qualis eius quem Iovis flammam. ver.] qualiter flos, quem Iovis flammam appellavimus in Violis, fert semen Punci mali simile acinis. Radix ejus decocta in aqua cyathis ternis, additis vini Coi cyathis duobus, alvum solvit leniter, ideòque hydropticis datur. Vulvæ vitia & cutis in facie mulierum emendat. Ichthiadicis quoque uti hæc herba prodest tusa cum foliis & illita cum succo suo. Sed vulgata Plinij exemplaria falsissimè habent; vulvæ vitia & cutis in facie & variis, legendum enim ex veteri codice & re ipsius evidentiâ: varos & vitia cutis in facie. Verba illa (viticulis longis) Dalech. ita reddidit: Sarmentis longis, duris, rimoso cortice vestitis; flore capillaceo, fructu exiguis Vvis simili, post maturitatem rubente, granis figurâ rotundis. Diosc. *κόκκους* Plinius ad Punci femina retulit ostanter, & aliàs totam historiam corruptit. Cæterum, ex omnibus plantis quæ vicina scindunt res assignat Dalechampius, quarum flos cæruleus, sive purpureus, Iovis flori, nempe Aquilegie, color similis sit: primam quidem quam granum Nil vocant; alteram, quam Dulcamaram; & tertiam quam pro Clematide secundam pinxit Dodonæus, & quam Pothon cæruleam esse quidam putant. Quæ verò de Vite sylvestri hæc tradit Plinius, ea magis convenire putat Dulcamaræ, quam Salicæ supra vocavit, & Viti sylvestri similem esse dixit, eisdemque effectum habere. Sed & Hermolao teste, à Plinio lib. 21. in Violis [inter Violas] Iovis flos, non Iovis flamma nominatur. Nam phlox, est flammam & genus floris apud eum significet, diversus tamen est Iovis flos. Vitis sylvestris [*ἀμραν* & *ἀπέλα*] sarmenta Vitis [*ἀμραν* & *ἀπέλα*] modo longa quidem emittit, ita descenbente Dioscoride, sed ea signota, aspera, & rimoso cortice [αειρηζουσα. Οριβ. non habet] folia verò Solani hortensis familia, at laciore, longioraque [*αειρηζουσα*. Serap. legit *αειρηζουσα*] florem capillaceum, musculosum [*αειρηζουσα*. Οριβ. *αειρηζουσα*, si Matthei credimus quidam *αειρηζουσα*] fructum exiguis Vvis similem, ac ubi maturitatem consecutus est rubentem; rotunda [*αειρηζουσα* ver. *αειρηζουσα*], quidam autem acinorum figura. Radix decocta in aqua potaque in vini aquâ marinâ diluî cyathis

his duobus, aquosa ciet: atque ideò hydropticis datur. Vvæ ejus tum maculas à Sole contractas, tum maculas, & alias omnes expurgant. Cibi verò gratia novelli surculi condiuntur.

Vitis sylvestris racemi, inquit 6. simpl. Galen. c. 5. Ex Galeni Vitis cuss. tem extergendi vim habent, ut epheles & navos [maculas solares & alias] & eid genus omne in extrema cute vitium curare possint. Sed & adstrictionem quandam extrema germina [tum borri ipsi, tum ramuli] obtinent, quæ & sale [ac etiam muriâ] condiuntur.

Vitis sive Ampeli sylvestris nomine plures ac diversissimæ plantæ exhibentur. Serapio enim Dioscoridis verba de Vite sylvestri transcribens, & Avicenna, Vitem hanc sylvestrem, cum Labrusca, Vitis sylvestri turpiter confundunt: Actum est à nobis de hac in principio huius libri cap. de Vite vinifera, titulo de Labrusca. Matthioli pro Vite sylvestri, sive Ampelo agria, plantam exhibuit ab Herbariis Dulcamaram & Solanum lignosum nuncupatum, de qua ante sub titulo, Glycypticos, seu Amaraculcis. Dalechampius Vitem sylvestrem statuit, eam nimirum quæ Vitala Itolorum multis nominata est. Nos hanc paulò post Clematin latifoliam sive Athragene quorundam inscribemus.

Dod. diversam ab his Vitem sylvestrem depingit & describit Tamùmque cognominat, eam scil. quam Matthioli pro Vite nigra proposuit, alij pro Cyclamino altera. Est hæc nobis Vitis nigra Matthioli appellata. Dalechampius & quidam periti Vitem sylvestrem, Theophrasti *μικρῶν* esse congiunt: Meluthrum sed repugnat florum figura, quòd muscosi non sint, nec capillacei, verùm racematim coherentes.

CLEMATITIS ACRIS VETERIBUS.

CAP. XIV.

Sæquentia, quæ ex Dioscoride, de Clematide sacri adducuntur, in Græco cod. Bas. per Cornarium rejiciuntur: deinde verò ex ejus versione tanquam malè rejectæ iterum assumuntur pro legitimis. Est altera Clematidis [*κλεματίτις*, quod idem est ac Sarmentaria. *κλεματίτις* a *κλεματίτις*, quæ emittit: dicitur aliis *ἀμραν*; & Egyptiis *φυλάκου*; Romanis *δύκων*] quæ sarmentum [*κλεματίτις*] pro dicitur subrubicundum, Viticis modo lentum [*κλεματίτις*] solium acre admodum in gustu, & exulcerans. Circumvoluit se arboribus velut Smilax. Sementrum, cum aqua aut aqua mulsa potum, pituitam & bilem deorsum ducit. Folia imposita lepras removet. Cum Lepidio condita servantur ad usum.

Clematidis folia Galeno acris & adurentis sunt facultatis, adeò ut etiam lepras excoriant. Fuerint itaque ex quarti ordinis calefacientium initio.

Plinius de hac loquitur lib. 24. cap. 10. in hunc modum: Similem huic [Smilaci videlicet] aliqui Clematida appellaverant, repentes per arbores, geniculatam & scipam. Folia ejus lepra purgant. Semen alvum solvit acetabuli mensura in aqua hemina, aut aqua milsa. Datur ex eadem causa & decoctum ejus. Idem lib. cum dicto cap. 15. ita scriptum reliquit. Nunc subtexemus herbas mirabiles quibus, sed minus claras, nobilissimas in sequentia volumina dilatis. Itali Centunculum vocant rostratis foliis, ad similitudinem capitis penularum jacentem [*nascentem* ver.]. In arvis; Græci autem Clematidem. Est ejus egregius effectus ad sistendam alvum in vino autero. Idè sanguinè silit tritus cū Oxymelliis aut aqua

Labrusca sylvestris.

Plin. error.

Vitis sylvestris alia à Labrusca.

Vitis.

Plinij & Dio corriguntur.

Dalechamp.

Dulcamara.

Iovis flos, non flamma.

Vitis sylvestris Diosc.

Orib. lectio manca.

Vitis.

Hydropticis.

Ex Galeni Vitis cuss.

Aequilegia.

Labrusca.

Glycypticos.

Clematis latifolia.

Vitis nigra.

Meluthrum Theophrasti.

Cornarium.

Clematidis altera Diosc.

Vitis. Semen pinum.

Ex Galeno temperamentum.

Plinius de Clematide.

Inter herbas mirabiles.

Centunculus.

Clematis.

aque calidæ cyathis quinque denarij unius ponderis sic & ad secundas mulierum efficac. Sed Græci Clematidas & alias habent, unam quam aliqui Echiten vocant, alij Laginem, [decr. an quam Lygon. alij.] nonnulli tenuem Scammoniam: & pedales, foliosos, non dissimiles, Scamoniae ramus habet [ea viticulis foliosus non dissimiles similis ramus habet. alij] nisi quod nigriora minoraq; sunt folia. Invenitur in vineis arvisque. Estur, ut olus, cum oleo ac sale: alvum cicit. Eadem à dyfentericis cum Lini femine in vino austero sorbetur. Folia epiphoris imponuntur cum polenta, supposito udo linteolo. Strumas imposita ad suppurationem perducunt, deinde auxungia adjecta percurant. Item hæmorrhoidas cum oleo viridi, phthysicos juvant cum melle. Lactis quoque ubertatem faciunt in cibis sumpta. Et infantibus illita capillum alunt. Ex aceto dentium dolores sedant. Venerem stimulant. Est & alia Clematis, Ægyptia cognomine, quæ ab aliis Daphnoides [myrsinides. Gal.] ab aliis Polygonoides vocatur, folio Lauri, longa tenuisque, aduersus serpentes ac privatim aspidem ex aceto pota efficac. Ægyptus hanc maximè gignit.

Ceterum, qui hoc in loco Centunculus à Plinio nominatur, Aloisio herba est, quam Dod. pingit pro Helxine Cissampelo: sed vires non conveniunt.

Placet magis Dalechampio Dodonæi iudicium, qui Herbe impiæ genus Centunculum vocat.

De Clematide Ægyptia quam Plinius mirè cum aliis confundit & perturbat, aegemus postea sub titulo Clematidis Daphnoides.

Dalechampi sententia nobis non prohatur referentis Echiten Plinij ad priorem Dioscoridis Clematidem: descriptiones enim multum discrepant. De Clematidibus Plinij sub Convolvulo ex Ruellio multa dicemus.

CLEMATIS LATIFOLIA dentata.



Ruell. ipsi attribuit. Verba ejus ita breviter perstringemus: Ampeloz agria vocatur Vitis silv. palmatibus longis, ut Vitium; si Plinio credimus, spissis & candidatibus foliis: pars acinorum ejus æstu moritur, prius quàm celi qua, qui & solstitiales: universi nunquam maturefcunt, etsi prius quàm tota Vva maturit, detur cibo; generi gallinaceo fastidiū gignit Vvas appetendi. Flos in racemis candidus dependet: folium Solani per initia, post &c. Vitis silv. annū

durat. Est ei similis quod Salicastrum vocatur: hanc Plinius describit folio duro, cineracei coloris, viticulis callosis, rubentibus, qualiter flos quem Iovis flammam appellat in Violis. serentem semen punicæ Mali in acinis ad eosdem effectus. Propterea sunt è recentioribus, qui hæc & Flammulam & Iovis flammam appellarint. Sylvestris vitis ea mihi videtur, quam ruta modo Viornam, modò Hardeam vocant, quòd ramorum fascies ea perinde quasi vinculo ligantes distingrat. namque viticulis prælongis asperisque cernitur &c. [ex Diosc.] Hanc Plinius credit esse Vvam taminiam.

Hardea unde dicitur. Vva Taminiana.

Sunt qui putent plantam Getmanis Waldraben aut Lynen vocatam, Vitem esse albam. Sed errant: est enim, inquit Tragus, Dioscoridis *δύσμηλον* & *δύσμηλον*, *γύμνιστον* h. e. Vitis sylvestris, cui Serapio cap. 35. florem carum *δύσμηλον* & lanuginosum tribuit, Butaniam que appellat: Vitis silv. planta & Plinius mentionem fecit: & nico quidem iudicio hæc planta Salicetarium e jusdè fuerit.

Corn. in Diosc. altera Clematis, Voluhilis appellata, *Wyelein* & *Waldraben* Germanorum dicitur, *Waldraben* non obstantibus aliis qui *Waldraben* Clematidem Daphnoidem esse volunt. Fuchs. est. Vitis nigra [du- *Vitis nigra* *Waldraben*] ubi quidam annotavit in edit. Lugd. *Waldraben* ejus Vitem nigram videri esse Viburnum etiam vul. *Viburnum* Gallorum cum Virgilio dictum. Sed Fuchs. cum apud illum essem nominabat Vitem sylvestrem. *Vitis sylvestris* Cord. in Diosc. Pervinea alvum ducens, & Clematis altera, ubi scriptum reliquit, quosdam codices, ut à *alvum* *du-* Gompulo editum, Clematidem alteram nõ habere *cent.*


Vitis alba non est. Diosc. Serap. Butania. Salicetarium. Clematis altera. Vitis sylvestris. Pervinea. Alvum du-

Alteram quoque hæc Clematida, ut Galenus referat, Dioscoridè in fine quarti libri descripsisse, aliàs verò in principio libri quarti utraq; describi, sed malè. Priorem enim in principio hujus libri adstringentibus herbis propter virium similitudinem conjunxisse. Hanc verò quoniam alvum semè ejus duceret, in quarti libri fine, ubi de purgantibus agit, descripsisse. Esse autè Clematidè hanc duplicis differentie, quarum una grandis frutex sit, proceras arborescens, & singulis annis incrementum sumens, quoniam caudex & viticula illi aliarum arborum modo durent. Altera verò per omnia hæc similis sit, brevior tamen (quamvis & hæc interdum 15. pedum longitudine adolescat) & Autumnno caules sive viticulas amittat. Nasci hanc in pratibus circa arbuta, quoniam inundationes pervenire queant. Illam in montibus arbores & vinearum sepes ascendere. Vtramque Germanis *Waldraben* vocari. Arborecentem tamen majotus, & herbaceam minoris cognomine habere.

CLEMATIS LATIFOLIA SIVE

athragene quibusdam.

CLEMATIS LATIFOLIA integra.



Sarmentis aliis luxuriat crassis, iisque angulosis, rugosis, junioribus, subhirtutis, subinde rubentibus, obsequioso flexu lentis: folia quina, Dulcamaræ æmula, aliàs integra, aliàs dentata & fimbriata, gustu acris Clusio, viticula media tortili, quæ capreolorum loco vicinis arbutis implicata scandit, adnectuntur: flores racematim petiolis incanis insident, suaveolentes, candidi, quaternis aut quinis

radiatis foliis constantes, quorum medullium obfidet mucosus staminum pallidulorum cincinnus, flores excipiunt acini complures cuneatim indidem orti pinnatæ lanuginis tonient barbati: radix crassifuscula, fusca, fibris donata.

Ruell. cap. de Ampelo agria, licet multa simul misceat, repetat, nec plantam describat, auctorèq; non cicit, sed confusè transcribat: nos tamen per Viornam & Hardeam, plantam à nobis descriptam ab eo intelligi credimus, quamvis non competant ei, que

Saxones etiam *Wilde rancken* nominare, quod sarmen- tis Vitem emulgetur.

Clematis altera.

Matth in Diosc. Clematis altera, quam Vitalbis italicis vulgò vocatis plurimum facie respondere ait, propter eaque sibi omninò persuasit, Italicam

Vitalba.

Vitalbam esse Clematidem alteram (quam secundo loco reddiderit Dioscorides) contra eorum opinionem, qui acrem Clematidem eam plantam putant esse, quam quidam rei herbarie imperiti falsò

Ligustrum falsis

Fuchsi error.

Ligustrum vocant: falsò, inquam, quoniam Dioscoridi Ligustrum arbutula est, non herba, ut suo diximus loco. Fuchsi Vitalbam Matthioli, Vitem nigram esse existimat, sed errat, ut postea dicitur. Cam. apud Matth. germ. aliam apposuit figuram, dicens, quam Matth. vocat Clematidem tertiam, aliàs dicitur Viorna, & Vitalba, & quibusdam Atragena Theophrasti.

Viorna.

Gesl. coll. Vitis sylv. caustica, Viburnum aliquibus, ac Gallis Viorna, ab usu urendi vulgò vocata. Flore enim, semine, cortice, & radice (inquit idem de hort.) vim urendi habet. Est hæc Clematidi plan-

Flammula.

Labrusca.

Hardea.

Gesl. ut.

te cognata: quare à nonnullis recentioribus, si niter Flammula nominatur. Eidem cat. Labrusca, Vitis silvestris exulceratoria, *Hardea*; Item Vitis sylv. solis Solani; Viorna, Hardea. Sed Gesnerum de præsentis planta minus distinet & scripsisse, satis demonstrat vocabulum Labrusca & Oenantes, qua nomina huic non conveniunt.

Ryff. Clematis altera, & Gallorum Viorna.

Bryonia nigra.

Bucranium.

Vitis nigra.

Turn.

Lon. *Waldraben/Lynen*; Vitis nigra vulgò, Bryonia nigra Græcorum, Vitis Chronia & Bucranium. Confundit autem nomina duarum plantarum, pingens Atragenam. An eidem in Diosc. l. 4. c. 3. Clematidis altera species, Flammula Officinis. Turn. Vitis nigra, Blatf Bryonye.

Atragene.

Nihil invenit Anguilla. quod meliùs respondeat Athragene, quam Vitem albam, quam Fuchsi pro Vite nigra posuit. Si Atragene haberet fructum racemosum, uti vult Diosc. suum habere Vitem silvestrem, eam esse diceret Anguilla. Rob. Corst. in lex. *Edend. Theoph.* quam Plinius Vitè silvestrem transfuisse refert. Qua de re tamen Lob adv. adhuc dubitat, dicens; Viorna vulgi, sortè Vitis sylv. Diosc. & Atragena. Theophr. Non ergo pro Vite sylv. eam planè recipit. Acinis, inquit, est compluribus confertum stipata ab uno pediculo, aptis, rotundis, rubentibus ex fusco, compressis tamen: quare nonnulli docti, ubi *ακτινους* *χρῆμα* legitur, id est, spherica figura acinorum vel granorum, *ακτινους* leviuscula imitacione & commodiore tenus legi volunt, id est, rotundam compressam figuram. Acra neti conjectura hæc ipsi non satis animu in expleat, tamen muleò minus ejus judicio respondent, Amara dulcis vocata, aut Bryonia nigra quas suis locis commodiùs & necessariò aptavimus, notis. Eidem. Obl. dicitur Viorna vulgi, & Vitis alba Italarum, Ie. Viorna.

Amaro dulcis.

Viorna vulgi.

Cyclaminus.

Vitalba.

Dod. gall. l. 4. c. n. Cyclamini species secunda. Cyclaminus altera, *κικονίς* *μακροβύτη* & *μακροβύτη* in aliorum, quam postea eodem hb. cap. 48. Vitalbam & Viornam inscribit, speciemque Clematidis alterius haberi refert, sed sibi Cyclaminum alteram potius videri asserit. Idem de purg. & hist. in sol. ait Vitalbam, Bryoniam nigram non esse, ut voluerit Fuchsi legitimum Bryoniam nigram aliam esse. Verùm non negandum ad Clematidem alteram accedere atque ejus speciem esse, licet tamen & alia sit.

Bryonia nigra non est contra Fuchsum.

st. arch. ut.

Thal. Clematis a. Matthioli. Castori, ejus figura non placet, Clematis a. Italo-rum Vitalba. Matthiolum ignorasse, Clematidem alteram liquidò consistere arbitratu Gwiland. eò quæ dixerit Matthioli, quam gens Italica Vitalbam vocat, à Diosc. sub Vitis sylv. nomine describi. Soleno, Clematis altera Diosc. Plinio

indicta, Vitalba Italarum. Lugd. Vitis sylv. Dalechampi, Clematis a. Matthioli. Dalech. in lib. 6. *Æginete* c. 77. est Colli & Latinorum Vva taminea, Vitis sylv. Diosc. & Theoph. Athragena. Tab. Vitis nigra 2. Icon ejus nihil valet: Compilator etiam de hæc planta confusè scribit. Ger. quoque pro Bryonia nigra sylv. Cordi, malè ponit iconem malam Vitis nigra 2. Tab. Sed ejudem planta aliam exhibet meliorem, cui titulus Viorna, *The tranelera* loc.

Vitis sylv.

Athragene Theophrasti.

Ad Clematidis alterius classem quin sit referenda quam Anguilla Athragene Theophrasti censet, non dubitat Cluius, & in super Phnio l. 16. c. 4. Vitis sylv. nomine notam fuisse asserit, ut etiam culleber utriusque scriptoris verba conferenti facile apparebit. Sed Plinius l. b. 23. aliam adhuc Vitem apparet. Sed Plinius l. b. 23. aliam adhuc Vitem apparet. Sed Plinius l. b. 23. aliam adhuc Vitem apparet. Sed Plinius l. b. 23. aliam adhuc Vitem apparet.

Caf. Vitalba. Schv. Clematis seu Vitis sylvestris. Diof. & Athragene Theophr. referenda. Eid. pin. Clematis a. sylv. latifolia in soliorum divisuris mirè ludens, & farneta aliquando brachiorum crassitudinis producens.

Natura l.

Natura l.

Locus.

Secus margines agrorum inter vepres & sentes crebrò reperiri apud Italos, Germanos, Gallos ac etiam Belgas, lecto secundoque solo, autor est Dodonæus. Vulgaris omnibus quas Cluius abijt provinciis vicinis arboribus & sepibus sese implicans; Julio mense flores; fructus plumis suis incanescentes Autumnò, dependent. Passim provenit spontè Basile & vidi florentem mensè Junio & Augusto extra portam S. Albani: ibidem cum seminibus inter portam *Stru* & *Eschen*.

Tempus.

Vitis sylv.

Vitis sylv.

Gustus servidus & acris calidam arguit vim. Vitis sylv. & ejus ad circulos pro retinendo habente utero. Ad constringendos fauces, veluti Salices & alia vincula, adhibetur.

CLEMATIS BÆTICA CLVSIQ.



Peregrinum est hoc Clematis Bætica genus, & à nemine quod Cluius sciat, antequam ejus historia evulgaretur observatum. Longa autem habet farneta, lenta & ramosa, binos per intervalla capreolos contraxit semper inter se pediculis nascentes proferentia, quibus vicinas arbores & frutices scandit: folia pyri ferè, mirorata tamen, dura, viridia, in ambitu incisi sive serrata, acris & servidi gustus, singularia in singulis pediculis, sed plurima simul ex clavicularum alis prodentia: inter que, ex utroque farnetorum latere pediculi exeunt, calculum Tithymali caveolis seu labellis similem sustinentes, ex ejus medio exit capitulum ex multis feminibus milio æqualibus constitutum, quibus insident oblongi cincinni, & albe quodammodo villose plumule.

Deser.

Deser.

Clus. hisp. & hist. Clematis altera Bœtica. Lugd. & B. phyt. Clematis altera Bœtica Clusij. Lob. Obs. & Ic. Clematis Bœtica Clusij. Tab. & Ger. Clematis Bœtica; Germ. Spanische Waldraben: Angl. The rancilous Joce of Candie. B. pin. Clematisis 3. peregrina foliis Pyri incisus.

Hanc stirpem primùm inveniebat Clusius anno 1569. inter Asindum (vulgò Medina Sidonia appellatum) & Calpen, secundum fluentia, vicinas arbutusculas operientem & suo pondere deprimentem: deinde alijs Bœticæ locis, Ianuario jam suos concinnos explicantem. Non dubium est quin ad hæc præterea, cuius Dioscorides lib. 4. meminit, referenda sit, cum & formâ & temperamento sit illi valdè similis.

CLEMATIS SIVE FLAMMULA scândens tenuifolia alba.



Clematis hæc per se infirma, non nisi proximis sulta in altum nititur, neque tamen id ullorum capreolorum ope facit, sed foliorum pediculis sepes amplectitur. Sarcienta habet striata, vitidantia, geniculata: folia recticaulis Flammulæ foliis similia, à Vitalba sive Athragéné differunt longitudine, angustità & soliditate: tota etiam planta minor: flores albi, odorati, qui uridâ vi labia, si imprudenter attigerint, inflammant. Semen succerefcit plumacè cristâ insignè: Huic similis si non eadem, parva admodum, foliis valdè tenuibus à nobis observata est, seminibus cum prædictâ iisdem.

Gesl. h. Clematis, Flammula quorundam flore albo, in Gallia Narbonensi. Lob. Adv. (ubi falsò scribit Matliolum hæc rejecisse, siquidem is eam non novit) Obs. & Ic. Clematis altera, urens, vulgi Flammula. Dod. gall. Clematis altera vera, aliquibus Ambuxii & Epigæti, modernis Flammula nuncupata. Eid. hist. purg. & in fol. Flammula, Flammula adminiculis egens, Flammula prior: Flammula pro Clematidis alterius specie habita [ipse sem in gall. hist. fuit eius opinionis] licet & semine & florum cum figura, tum colore & magnitudine ab ea differat. Lugd. Flammula, Flammula Dodonæi, quâ nulla melius respondet facie & viribus Clematidi alteri Dioscoridis, teste Lobelio. Cæs. Viticella. Tab. Clematis urens. 1. Lænen/Leinen aut Waldraben. Cujus icon possit etiam competere Clematidi latifoliæ quam debet eo capite Compileri ponere & non alio relegare, ubi eam vocat Vitim nigram, oportebat annotare discrimen si non cæcus de coloribus scripisset. Ger. Clematis urens, Ang. Wiggins Bower.

An Cam. h. Clematis altera flore albo, Flammula repens Dodonæi: An Gesl. coll. Salicastrum, quam ait esse Clematin alteram, plantam amplexicaulem & urentem? An Ang. Clematis?

C. Bauh. 1. B. phyt. Clematis sive Flammula. 1. repens. Eid. pin. Clematisis 4. Flammula dictâ, quod contulâ ap-

plicata, vesicis flammæ instar excutet: foliis est altiquando Apij modo divisus: est etiam simplex vulgatis, alia multiflora, quæ Clematis urens 2. Tab. Clematis urens multiflora, Ger. Idem per Clematidem maritimanam repetem fortè intelligit nostram Clematidem parvam. Est autem ipsi hæc in pin. Clematisis 5. Clematites, Angl. In prod. sic describit: cauliculos habet farmentolos, geniculatos & striatos, cubitales, atrovirente cortice vestitos: folia Flammulæ erectæ instar oblonga, acuminata, nervosa, frigida, sed angustiora, quod communiter tria uni pediculo, qui velut in capreolum abiit, insident, & quædam per circumferentiam non nihil crenata, quæ verò in summo caule floribus subsiciuntur, angustissima sunt: flores albi sunt, multis staminibus villosis albis, medullium occupantibus, longis pediculis sustentati: quibus semina plana, subrotunda, rufescentia; ut in Flammula erecta, sed minorâ, bina, ternæve jucta, singulis capreolo plumoso, veluti incana cristâ donatis, succedunt: hæc acria sunt quemadmodum & tota planta. In maris Adriatici litoribus, ut in Venetorum Insula Lio & Litzefusina, suis farmentis repentem observavi.

Spontè sua (ut scribit Dod.) in Belgio nusquam exit, sed hortensis est: flores sub Augustum, semensectis succedit. Vidi ego in Rhætia florentem mense Junio; Monspelij Septembrij, ubi sepes & arbores scandit. Eam etiam ramos, ambientem observavi mense Ianuario, & Martio, Patavij apud Cortusum. Clematis autem parva à nobis visa est in montibus præpè Castelnèuf non longè à Monspelio, mense Octobris.

Acris & valdè calida est, sed tamen Flammulâ Ranculo mitior.

CLEMATIS SIVE FLAMMULA furrecta alba.



Fibrosam radicem demittit & albicantem: farmenta nullius opis indiga, suâ in duorum & plurium cubitorum altitudinem nititur, lævia, teretia, propter terram non nihil rubentia, fistulosa, & geniculis intercepta: folia cujusmodi ferè in vulgi Flammula, aversâ parte subhirsuta & ferè incana, aversâ verò atrovirentia, flores confimiles, copiosi, quadrifolij, candidi, apicibus vitidantibus. non minùs uridâ vi vesicæ hæc excitat quàm cognata repens. Hæc ab iis, qui diligentiùs observant, teste Clusio, duorum generum esse deprehenditur. Vna enim farmenta sublecepta habet, quemadmodum & foliorum nervos & pediculos, præcociorque est, & odoratum fert florem. Alterius autem farmenta cum foliorum pediculis virescunt, & florem sectis proferunt. Hanc etiam verò altitudinem utriusque farmenta ut plurimum superant, & singulis annis nova, eaque frequenter incunente Vere (marcidis & corruptis prioribus) renascuntur. Huic prorsus similem sibi natam meminit

Duim. g. nrum.

I. 4

- Clematis flore albo pleno.* Clusus, semine ab amico sibi misso Clematidis flore albo pleno appellatione. An verò talis reperitur, Clusium latet: ipsi certè nunquam videri contigit.
- Flammula Platearj.* Matth. existimat esse Flammulam Platearj. Dodonæus tamen Platearium de Flammula Ranunculi quadam specie citiit, quàm de hac scripsisse crediderit, ac etiam recentiores ab acri & mordaci eius qualitate nominasse.
- Matth. rec. daquitur.* Matth. & Lugd. Flammula. Dod. Flammula altera. Lob. obl. & Ic. Flammula altera surrecta. Tab. Flammula, Flammula Iovis, Brenwurz / Bletterzug. Ger. Flammula Iovis surrecta, Vprigt Würgens Bower. Clus. Flammula Matthioli, & Clematis altera; sic & Turn. Cord. in Diosc. Flammula strux. B. phyt. Flammula 4. Eid. pin. Clematidis 4. sive Flammula recta; sic & Cam. & Eysl. Centella herba, quæ trita tumoribus imposita pustulas excitat, in epist. ad Monardem huc referri potest.
- Lucu.* Aded frequens in Austria inferiore & Pannonia ut nullæ sint cedux silvæ præsertim circa fluviorum in Danubium delabentium ripas, illis tu nescientibus inundari solitas, quæ eà non abundant. Rarissima aliàs, Dodonæo, Germanis ac Belgis est, & hortensis tantummodo. Vere noua promit foliola, & cauliculos, æstate flores; Hyme solæ reliquæ sunt radices. Basilæe florentem mense Junio & Septemhri vidi in hortis.
- Tempus.*
- Vires. aqua.* Ex Flammula (rectam proposuerat) sepit Math. aquam elicit, demisso vitreo organo in calentis aquæ balneo, quæ eadem, quæ herba ipsa, pollebat acrimoniâ. hanc compertum est efficacissimam esse in morbis frigidissimis. Flammula (ut Platearium est auctor) exalciat siccatque ordine tertio. Sed quòd imposita carnem non secus exulceret ac ignis, calidam ordine quarto rectius crediderim: Sunt qui Flammulam quartanaris edendam præbeant, magno (ut ferunt) iuamento. Alij eius oleum commendant ischiadicis, articulorum, illiùmque doloribus, urinæ angustis, & renum calculis, in quibus morbis aut calidum illud inungunt, aut clysteribus infundunt. Id autem præparant hoc modo. Flammulæ folia tenuissimè concisa in rosaceum imponunt, quòd vitreum vas exceperit, ac inde per astatem insolant obturato vase. datur etiam in cibis hisce morbis affectis, trium drachmarum pondere. Ex Flammula (inquit Camer.) scandente elicitur aqua, quæ spiritus vini instar seruida est; solia carpò imposita vesicas excitant, & multis contra odontalgiam prodest, cuius etiam in febribus pestiferis usus est.
- Odontalgia.*
- Cataplasma.* Tumores suppurati difficiles cataplasmate ex Flammula (rectam describit) contusa cum oleo, tum maturat, tum aperit Tabernamontanus. Qui ex ea stilliciti liquor elicitur, intra corpus non usurpatur. quòd si quis eo uti velit, in morbis frigidis, cum aliis aquis est miscendus, ne viscera lædat.

CLEMATIS SIVE FLAMMULA
flore caruleo & purpureo
scandens.

Defr. Concinnior est quàm vulgaris Flammula, foliis cad Athragenen propius accedentibus, ut quæ quàm Flammulæ breviora sint & latiora, & variâ specie Athragenes foliorum modo ludentia, modò integra, aliàs divisa semel aut iterum, minimè tamen serrata, lævia, atrovirentia, sapore acri, ex pediculis tenuibus, rigidis, subrubentibus, subhirtis; farnientis autè luis innititur depectis pedamentis non secis ac Flammula vulgaris repens: sed præcipua est florum gratia, qui non tantum odore suavi placet, sed & colore purpurante oculos morantur, quatuor



foliis (quorum vel unū integrū Flammulæ vulgaris florem facile superet) crucis modo dispositis constantes: in quorum medio cinninum staminum ex viridi pallētium, succedunt femina.

An Matth. Iese-*Synon. Gelseminum.* minum sive Gelseminū caruleis floribus: Est ei in post. comm. lat. Clematis *Clematis.* tertia floribus purpureis: hist. Germ. Keinen od Walderraben / Clematis altera Dioscoridis, Gesn. h. Clematis, Flammula Coldenbergij, flore rubro. An eadem ibidem Gelseminum caruleis floribus? Dod. gall. Clematidis alterius altera species: Eid. hist. Clematis altera, *ambuxum* & nonnullorum *ambuxum*, Latinorum Ambuxum, ut *Ambuxum.* quidem Dioscoridis spuria habent: Hispanorum *Gormaderæ*, quasi Vomitoria. Lob. Adv. (ubi Dodonæum ait deceperit ab iis, qui sibi persuaserint in Anglia passim luxuriare) Obl. (ubi dubitat an Pothos Theophrasti sit) & Ic. Clematis peregrina cerulea & purpurea. Cam. h. Clematis altera flore purpureo, topiario operi aptissima. Hist. Math. germ. *posuit novam figuram, sub titulo Clematidis alterius Dioscoridis. Est & Castori Clematis altera, Ic. Vitalba purpurea, scandens arbores ut Smilax, floribus purpureis magnis, ex quatuor foliis. Cast. pro hac planta malè habet figuram Vincæ pervincæ. Apud Clusium hist. Clematidis alterius titulo simpliciter sine descriptione posita icon. Fortè hæc cerulea verior Clematis, quia flores magis accedunt ad Clematidem priorem sive Daphnoïdem, & ut illa, sit topiaria. Cast. Flammula flore caruleo. *Flammula, Pothos.* Theophrasti *ambuxum* quorundam, Desiderium Gazæ, *Desiderium* flore Hyacinthi. Tab. Clematis cerulea peregrina, *Clematis.* fren. h. d. blaw Walderrabe. Cur huius figuram repetit sub diverso titulo, qui est Clematis purpurea, *Purpureum Walderraben.**

B. phyt. Clematis 6. sive cerulea repens: qui annotat, & rectè, Iconem Matth. germanici esse transpositam & sub Clematide tertia exhibitam; ad Clematidem Diosc. referendam, variare flore simpliciter ac pleno, ut Cam. in epit. unâ figurâ expresserit; colore etiam purpureo, cuius nomine Tabern. duas figuras proposuerit. Eid. B. pin. Clematis 9. 3. cerulea vel purpurea repens: Clematis tertia, quæ Flammula, *Cast.* Clematis peregrina carnato simpl. flore: & Clematis peregrina purpurea simpl. flore, Eysl. Ger. Clematis peregrina 1. cerulea / Blowe lazdiera Bower. Clematis peregrina. 2. rubra, *Rod lazdiera / Bower.*

Gaudet, ait Dodonæus, Soli expositis, sed tamen non omnimò aridis locis: lato & haud irriguo solo melius proficit. Apud Belgas hortensis, in Hispania verò & quibusdam Italicis locis iuxta sepes & agrorum margines spontè exit. Augusto mense, & quandoque Iulio, floret; semen Septembri perfcitur. Flammulam flore purpureo ex femine natam habui Lugduri, florere in orto Maio. In Rhætia peregrinans cum D. Gesnerio in monte propè Münsterthal inveni plantam valde similem, fruticosam parvam, flore magno ex longo pediculo, caruleo, constan-

constante quinque foliis. florentem menſe Julio: foliis magis fertatis quàm in ea, quàm Lugduni habui.

CLEMATIS PURPUREA FLORE pleno ſcandens.



CLEMATIS hæc ſarmentis & foliis ſcanſilique inplexu per carum proximè deſcendit ſimilis: ſos verò, purpureus multo pluriſoliorum ſtipatu luxurians, ſaturatior, internà poſiſimam foliorum facie, extrinſecus enim lanugine cinerea pubeſcunt.

Cluſ. exot. appen.

2. ad ejus hitoriam lib. 1. c. 36. Clematis alterius nova ſpecies, illius quidem generis, quod ſorem habet ex caruleo purpureſcente.

tè; ſed alterius formæ multiplici ſeſoliorum textura.

Bauh. phyt. & pin. Clematis carulea flore pleno: Eid. pin. Clematis 10. Clematis altera flore pleno, Cam. ep. & Cluſ. cur. poſt. Clematis peregrina purpur. fl. pleno, & Clematis perſegri. incarnata plena, Eysf. Flore eſt caruleo, purpuro caruleo, incarnato, ad purpureum colorem, ſed admodum dilutum accedente.

Clematidem flore purpureo pleno vidi Stutgard. in horto Il. D. VV. ubi Hæmæ ſub tecto reſervatur: floruit Junio & Julio.

CLEMATIS CÆRULEA SERRATO folio.



Esquipalmatis hæc eſt, cauliculis pluribus oblongis, quibus ſingulis folia crebris diviſuris in ſepta inſident trigemina coherentia, ut in Anemone Geraniſolia; ſos longiſſimo ac tenui pediculo inſidet, ex quatuor tantum foliis compoſitus, coloris obſcure purpureſcentis; ſemen non viſum, nec radix, à C. Bauh. qui eam ex ſicca deſcripſit.


A ſarmentoſa radice (ait Pona in d. ſcript. Baldi) germinant multi caules vitiginei, magis ſubtiles, quàm in aliis Clematidibus; lignoſi, angulares, lenti, & tricubitalès: è quibus ſurculi multi adhuc magis ſubtiles quatuor digitorum alitudinis, qui æqualiter bipartiti ad latera dividuntur. ſingulique obtinent tria folia juſto intervallo diviſa, & pediculo brevif-

ſimo adnexa, formâ marteâ, tamen majora, ſatis profundè per ambitum ſecta, nervoſa, rugoſa, in æquilis magnitudinis, nigroque vitentia: eſt illi ſos crucem repræſentans, foliis mucronatis, lanuginofis, cæruleis albicantibus, cujus mediæ næcervulo quodam extremis foliolis (uti in Roſa Alexandrina apparet) decoratur. Eæ ſarmentofos, inſipida & perennis radice: tota planta aliàs aliquantulum acri ſapore prædita eſt.

C. B. Clematis 7. ſive alpina Getani-folia: Clematis cruciata ſungermanni. Clematis cruciata alpina, Pona.

Oritur in altioribus Baldi rupibus, quibus Eurus Locuſi dominatur. Brumâ aſcendunt folia. Hanc eandem ſpeciem, quàm anno 1561. in mea peregrinatione per Alpes Rhetice obſervavi florentem menſe Julio in monte ptopè Münſterthal, de qua antè ſub Clematide cærulea ſive purpurea.

CLEMATIS PANNONICA FLORE caruleo ſurrecta.



Complures ræſta

Cedix ſatis craſſa à lateribus ſurgit fibras, ſulvas, nervulo ligneo candido ſatctas: ſarmenta inde complura, Cluſio quaternæ aut quina, ad cubitum & ſeſquicubitum exſurgunt, recta, dura, ſtriata, arguloſa, ſubhirtuta, non nihil purpureſcentia, geniculata: ad quorum ſingula genicula, ſolia ſine pediculis ſunt bina oppoſita, Plantaginis majoris ſerè paria, minora tamen, ſimiliter per longitudinem nervoſa, acuminata, in ambitu lanuginola, ſupernè ex atro vitentia, infernè dilutiora, lanugine quadam per nervos reſperſa, Cluſio Aſclepiadis parè ſolis reſpondentia, non valdè dura, ſerè vidi guſtus, quæ admodum Flammulæ Matthioli folia; ex ſuperiorum foliorum alis, pari incremento ſurgunt gemini adverſi ſurculi, eodem modo ſe habentes quo ſarmenta primaria, niſi quoddam minora ſint nullis numeris folia: atque tam in primariorum ſarmentorum, quàm alarum ſurculorumque extremis, ſos ruſtabundus unicus magnus, quatuor foliis mucronatis crucis in formam, inquit Cluſius, decuſſatis conſtans, modicè ſuſum reſlexis, foris ſaturatè cæruleis, canaliculatis, minùs cæculâ lanugine per margines obſitis, intus verò glabris, nec tam intensè, atque medium extimi folij, cæruleis: medium occupat villoſus glomer ſibrarum ex luteo albefcentium, quarum complexu continentur ſtamina alia glabra, viridantia, apicibus ex albo luteis; atque intra hæc tertia fibrarum viſeſcentium intorta phalanx; ſemen compeſſum magnum Cluſio Pulſatilla ſemini ſerè ſimile plumatum, ut in Viorna vulgi Gallorum; nullius acrimoniæ particeps auctore Cluſio.

Tametſi hæc fruticibus ſeſe non implicet, ſed ſatis firma ſit, nec adminiculis egeat, Clematidis tamen nomen ei impoſuit Cluſius, quod ejuſdem ſit temperamenti & ſorem purpureæ Clematidis ſerè ſimilem habeat. In pann. hujus Clematidis duas ſiguras

Cluſ. 207 habet,

habet, primamque & secundam nominat, quae meo iudicio unius plantae sunt, cum etiam in his unam tantum describat, & depingat, quam quosdam Clymenum falso vocare referit, cum Clematis carulea pannonica sit.

Tab. nat. sc.

Tab. Clematis carulea pannonica, Ungerisch blass Waldraube Item, Clematis carulea 2. Blaw Waldraube. Duae haec sunt ejusdem plantae icones ex Clusio à Tabern. mutatae, unam tantum stirpem denotantes. Lob. Obs. & Ic. Clematis altera longifolia minor. Cam. h. Clematis pannonica caruleo flore, folio pæne Asclepiadis. Lugd. Clematis altera minor longifolia Lob. Clymenum quorundam. Ger. Clematis pannonica, busch Boweri Item, Clematis major pannonica, great bush Bouwer.

Tab. nat. sc.

B. ph. Clematis 3. carulea erecta. Figura Lobelij (ait) & eam quae simpliciter, & quae pleno est flore exprimit à Clusio Clematis carulea pannonica prima, flore simplici, secunda pleno, pingitur. Tabern. duas habet figuras Clematis caruleae pannonicae, & Clematis 2. nomine: at utraque simplicem florem exprimit. Dumerin Lobelij figura nimitardam curavit non adverteat apud Lobelium & plenum & simplicem florem. Haec frater. Ego Clematidem caruleam surrectam nunquam in vidi flore pleno, nec Clusius qui figuram exhibet ullus meminit quae pleno sit flore, nec etiam Lobelius: semen quidem dicit Clusius eam ferre plenum, in capitula rotunda & veluti pullulas congestum, quale pingitur in figura Clusij & Lobelij, non autem flos. Eid. p. Clematis 3. magnitudine varians: hinc duae figurae apud Clusium & Tab. Flore est caruleo, ramis albo.

Specie.

Inventa à Clusio spontè nascens in pratis circa Stampfen duobus ultra Posonium Vngariae miliaribus & aliis ad Danubij ripas sitis supra Posonium, medio serè itinere inter eam urbem & Tabern. Floret Maio & Junio, semen maturum est Augusto. Caulis sive sarmenta singulis annis ad radicem usque marcescunt, & in curte Vere novella, frequenteraque ex ipsa repugillat. Sturgardie vidit in orto Ducis, mense Novembri semine maturo: Montbelgardii in orto Ill. C. V. Viri. proventus mihi ex semine & sequenti anno floruit Junio & Julio.

Tempus.

CLEMATIS DAPHNOIDES, SIVE prima Veteribus. CAP. XV.

Clematis Dioscoridis.

Clematis [Clematis] quam aliqui Daphnoide[m] [Clematis] alij Synrnoide[m] [Clematis] vocat apud Dioscoridem, gignitur lato, pinguique solo [Clematis] in Aegypto [Clematis] quae lectio ut Cornario, ita & Sarraceno placet, quod & Plinius de hac Clematide agens, lib. 24. cap. 15. eam Aegyptiam cognominet, subditque Aegyptiam eam maxime gignere. Sed non probatur nobis eorum opinio. Nec propterea quod Plinius aliquam Clematidem in Aegypto tantum scribat, textus Dioscoridis est eorum per dūs. Nihil etiam probat in cultum solum, quod pro confirmanda eorum opinione facere credunt.

Marcellus, C. 1. 1. Sarraceno lectio non probatur.

Non enim obstat, quod minus incultum solum etiam pingue letu[m] neque esse possit. Sarmenta longa [Clematis] pro parvis legendu[m] in consuetu in Corn. Sarraceno, quod & Clematidem longa[m] ac tenuem non folia magnoscat Plinius loco jam citato. Sed & ab ista ita legendu[m] n. a. h. a. neat. Elle enim longa, imò interdum longissi[m]a in ejus Clematidis, quam Vincam pervinca n. vocent, sarmenta, seu vitiginea flagella. Nimis autem temerè, meo iudicio, Clematidem Daphnoide[m] Dioscoridis, & Clematidem Aegyptiam n. Plinij, eandem cum Vinca pervinca scavit Sarracenus. Nos de Clematide Aegyptia Plinij plura diximus ante sub Clematide veterum. Sunt qui volunt, Plinij hanc tradidisse lib. 21. c. 11. ubi Vincam n. pervinca describit his verbis. Nam Vinca pervinca semper viret in modum lineae [Clematis] seu virgulae habet lunci crassitie, Dalech. [Clematis] solis geniculatim circumdata, Topiaria herbam inopia[m] tamen florum aliquando supplet. Haec à Græcis Chamaedaphne vocatur. Arida tusa [Clematis] (inquit cap. 2.) hydropicis datur in aqua cochlearis mensura, celeritè mede reddunt aqua n. Eadem decocta in cinere, sparsa vino, tumores siccant. Auribus succo medetur. Alvinisi n. posita multum prodesse dicitur. Haec Plinius, qui si per Vincam pervinca[m] eandem intelligit cum Clematide, malè hydropicis praescribitur: nec etiam placet quod ait Diosc. apponi moribus venenatarum bestiarum, & dolores uteri sanare. Vincapervinca quidem apud Dioscoridem etiam Daphnoide[m] vocatur, sed non Chamaedaphne. Heronolus, ut demonstratur h. n. g. lib. 5. cap. de Chamaedaphne per Pervinca[m] Plinij, eandem quam nos intelligit plantam. De Chamaedaphne igitur cathartica, cuius adstringens facultas dysenterias & diarrhas cohibet, verum id est, non autem de Clematide, qua n. Plinius cum illa ignoranter confundit.

Diosc. lectio Sarrac.

Sarrac. res prob.

Vinca pervinca.

Diosc. expl. tenem virgam, ut exprimat quod Diosc. ait, Viticolas caulis.

seu virgulae habet lunci crassitie, Dalech.

Chamaedaphne.

Plin. res prob.

Ceterum in Clematis Aegyptia [Clematis] in proverbio n. ahit, & joco dici solum fuit in eos, qui corpore praeter modum procero atque atro colore essent: natu[m] n. huiusmodi dicitur (inquit Erasim.) ab ejus herbae specie de qua meminit Dioscor. lib. 4. & Plin. lib. 4. cap. 15. Lærtius in vita Zenonis Philosophi, ex autoritate Apollonij scribit, Zenonem gracili fuisse corpore, statu procero, atrâ cute: deinde autorem citat Chrylippum, qui in 2. proverbiorum suorum libro scripsit, ob eam causam à quodam Clematidem [Clematis] palmitem reddidit interpreti Latini Diogeni Laertio Aegyptiam fuisse dicitur.

Procerbum.

Diog. Laert. inter praecur.

Licet porro una tamen modo Clematis à Dioscoride notetur, tres tamen ejus differentias magnitudine differentes observari scribit Marantha, & quartam etiam, duplicem in flore foliorum eorum habentem.

Diff. Clematis Marantha.

CLEMATIS DAPHNOIDES MINOR flore caruleo, purpureo, violaceo, ut & albo, simpliciter a pleno.

Clematis Daphnoide[m] reptatrix parva, humore non artolli nisi proximis sulcis innixa: radix fibrosa: sarmenta nulla, ter vicia, teretia, virentia, & geniculata, quaeque versum per terram se spargunt, quam ubi arripuerit, & geniculis prepagatis fibris rursus radiceat: ter: folia è geniculis bina opposita, foliis Lauri similia, mirora tamen multo, acuta, rigida, lavia, brevis pediculis appressis, superne saturato virenter teretia, serrè diluore, sapore adstringente, subamaro; flos pediculo è geniculis enato, duas uncias longo, singulari singulari infidet, oblongus Gallemiri modo, nunc simplex in quinque laciniis altiusculis & latis diffusis.

Deser.



ctus, nunc aucto foliorum numero multiplex, quorum interiora modò bina, modò terna ad imum integra, superius ut extrema laciniantur duntaxat, aliàs penitus separata: color simpliciter caeruleus cum apicibus concoloribus, sed dilutioribus parùm: vel albus cum staminibus luteis, pistillo albo, fundo candidis versibus striato: vel pulcherrimo spectaculo violaceum florem per singulas lacinias à

summo ad imum linea decurrit lactea, id quod & in multiplici observatur: verùm quæ multiplici est flore, eam non alio quàm purpureo, aut purpureo-violaceo colore observavi & bicolori variegato ut dictum: Anno 1600. observavi in alba partes caeruleas, quod ante nunquam animadverteram quamvis à plurimis annis in horto colerim.

Hæc est illa (inquit Marcell.) quam Æthiopia nunc Vincam herbam vocat, quæ desinit à virginibus in gente nostra ad sepulcrum coronatæ efferuntur: & quæ familiæ Florentinæ aliquæ gentili jure suo primum ingredientem urbem Archiepiscopum coronatæ ad portam excipiunt stipantque & per urbem comitantur. Cognitio facillima est: in hortis passim nascens; tenuissimis viticulis potius per terram serpens, quàm virgis ut Dioscor. ait de Chamædaphnæ, à terra se extollens: foliisque olæagineis magis quàm laurinis similibus. Denique à Dioscoridis Chamædaphnæ historia longè differre, & nihilominus tamen Vincæ pervincæ Plinij, l. 23. c. 11. descriptæ respondet.

A Ruellio l. 3. c. 30. Clematis daphnoides in scribitur, cujus si quis (aitis) imaginem, naturam, & effigiemque exquisitè exploret, ea censebitur esse, quæ Lat. Vinca pervinca, officinis Pervinca, vulgò Pervinca nominatur. Misceat autem Ruellius in hoc capite diversissimas plantas, aut reliquas: mirè confundit, nec sibi constat. Idem rursus suo nomine lib. jam citato, c. 12. Hermolai verba de Pervinca repetit.

Corn. Clematis prior, Vinca pervinca officinarum, & Chamædaphnæ Græcorum. Tragus Pervincæ florem assignat ex purpurea caeruleum, quinis foliis distinctum, instar Borriginis, proflus in odorum. Hanc, inquit, quoddam mortui eam coronari consueverint, nonnulli germanicâ voce *Todrenkraut* aut *todren Viol*, h. e. Herbam, sive Violam mortuorum vocarunt. Commune apud Germanos Pervincæ nomen est *Yngrün*, à perpetuo illi virore inditum, Officinæ Pervincam nominant. Est autem illa ipsissima Clematis Dioscoridis, quæ Plinio & Daphnoides cognominatur. Poslet & Chamædaphnæ, h. e. Terrestris, seu humilis dici Laurus, aut ut Romani dicunt Laurago, & Laureola, & Vinca pervinca, quemadmodum alibi meminit Plinius. Apud Dioscoridem sequentia Pervincæ nomina leguntur, *αεικωνιδες, σμυρνοειδές, παλαιοι ποειδές*. Apud Apuleium verò cap. 58. multa extant nomenclaciones illius, nimirum Eupelios, Daphnoides, Hypoglossion, Eupetalon, Diloglossos, Nycephyllon, Pelleon, Idæa Daphne, Samothracia Daphne, Alexandrina Daphne, Mition, Danaæ, Stephane Alexandrum,

Chamædaphnæ, Carpophyllon, Daphnitis. Latine Pervinca, Victoriæ folium, Laurus Alexandrinæ & Macedonica, Laurago, Mustellago terrestris. In Plinio nonnullæ ex his reperiuntur, & aliæ etiam adjiciuntur, videlicet Hypetale, P. dasgum, & Stephane Alexandri. Sed quantum mihi quidem videtur, relictis universæ hæc appellationes Laurus Alexandrinæ quàm Pervincæ tribuentur. Licet verò controversia nominum in hanc quoque plantam irreprehit, nihilominus tamen descriptio, quæ apud Plin. l. 23. c. 11. extat, Pervincæ huic satis respondet.

Clematidem Daphnoidem, inquit Fuchsius, Plinius l. 24. c. 15. Clematida Ægyptiam nominat: lib. *Ægyptia*. aut e n. 21. c. 11. Vincam pervincam, aliòque nomine Chamædaphnen dici tradit, quod scilicet hu milis videatur Laurus, ut nomen sonat. Non est autem Laureola eam Chamædaphnen putos, quæ Romanis Laureola non est Chamædaphnæ: hæc enim à Vinca pervinca genere & facultatibus diversa est, & seorsim illam Chamædaphnen depingit Plinius l. 24. c. 15. ut hinc manifestissimum sit Plinio duplicem esse Chamædaphnen. Vnam quam sic appellant Dioscorides, Galenus, & alij Græci. Alteram quam privatim Vincam pervincam alio nomine vocat Plinius.

Cord. in Diosc. Clematis, Pervincæ species, astringendi vires habens. Matth. Clematis primo loco à Diosc. descripta, ac aliquibus Vinca pervinca dicta; vulgò tamen Italis Provenca. In hac nullam reperiri notam scribit, quæ Clematidi primi generis reclamare videatur. Quamobrem eorum sententiam explorandam putaverit, qui Pervincam Chamædaphnen esse sibi persuadent, quàm vulgò Laureolam appellant. Eid. hist. germ. Clematis daphnoides. Ca. n. apud Matth. Clematidis Daphnoides quatuor agnoscit differentias: flore purpureo, caeruleo, & albo, & quandam pleno: In hort. Clematis Daphn. sive Pervinca apud Plinium, flore caeruleo, interdum albo; & purpurea Austriaca, à Clusio missa flore elegantissimo: In Epit. Clematis: & Clematis flore multiplici.

Gordonius de cons. vita per Laureolam, quam ad fluxum ventris infantium (ad lienteriam & diarrhæam Arnold. de Villan.) præscribit, plantam de qua hæc agimus, intelligit. Confundit utriusque in Diosc. l. 4. c. 14. Chamædaphnen Dioscoridis cum Vinca pervinca, quæ Dioscoridi Clematidis species est. Ejus verba hæc sunt. Chamædaphnæ i. e. terrestris Laurus, Alexandrina à similitudine, vel virium paritate; Daphnitis à Laurus; Hydragogus, quod aquæ & urinam trahat; Laureola ut & Laurago à Laurus, non Lastrago; Latinis Vinca pervinca: Germ. *Yngrün*.

Anguill. Vinca pervinca optimè correspondens Clematidi primæ Dioscoridis. Gesth. Clematis Ægyptia silv. flore caeruleo passim: hortensis purpureo: transfuit autem purpureum è Sabaudia circa Lau fan nam hortis Tigurum: In cat. Clematis daphnoides vulgò Vinca pervinca. Dod. purg. & hist. *phnoid*. Clematis daphnoides, floribus colore ut plurimum caeruleis; quandoque candidis; rariùs rubentibus. Clematis (aitis) quidem dicitur, quia in star *καυμάτων* repentes proferat cauliculos, quos *καυμάτων* [sarmen-ta] Græci vocant. Daphnoides verò, cum à Lauri foliorum figura, tum ad differentiam alterius [matoris] veletiani aliarum. Nam Plinius plures ejus nominis refert l. 23. c. 15. ubi & hanc Ægyptiam cognominat. Polygonoides verò vox inter nothas appellationes etiam in Dioscoridis exemplaribus reperitur. Præter hæc sunt etiam *φαια κλωνία, σμυρνοειδής*, aut potius *μυρνοειδής*. Alio autè loco Plinius l. 21. c. 11. Vincam pervincam & Chamædaphnen appellat, ubi iterum legitur in modum huius pro Lauri. Describitur Plin. corristamen ab eodem, & à Dioscoride & alia Chamædaphnæ. De hac nos lib. 5. H. n. g. agimus.

Lab.

r. 54.

nea her-
Mar-
B.

Chama-
daphne dif-
fer.

Clematis
aphn.
Cuell.

Ruell. com-
p. 150.

Pervinca
Trago.

Herba Sel-
vula mor-
tuorum.

Laurus hu-
milis.

Nomenclatio
varia.

Clematis

Laureola non est Chamædaphnæ.

Pervinca

Diff. Cam.

Laureola Gordon.

Lauro.

Clem. Da.

Clematis cur dicitur?

Daphnoides cur?

HISTORIAE PLANTARVM

Lob. Clematis daphnoides, Vinca pervinca : an Cennunculus Plinij? Item Obs. Daphnoides, polyflora Clematis purpureo rubens. Lug. Vincam pervincam, sive Clematidem majorem peramena florum duplicatione variare scribit, quod Lob. non dicit: nec nos majorem observavimus flore pleno. Cæs. Provincia vulgò in officinis vocata, in umbrosis nascens; flore cæruleo; fructu oblongo, veluti siliquâ bifurcatâ, in qua semina oblonga, depresso: Vinca pervinca Plinij. Tab. Clematis daphnoides; Vinca pervinca flore cæruleo, purpureo & albo, & pleno.

Clus. Clematis prior, *de quædam* cognominata, vulgò Vinca pervinca, quo nomine etiam ab ipso Plinio vocatur, qui lib. 24. c. 15. Ægyptiam quoque cognominare videtur. Ejus autem duæ sunt species: Vna vulgatiore, cæruleo ut plurimum flore, sed qui eum etiam variat, ut nunc albus, nunc subpurpureus conspicitur, interdum & medium florem complectatur.

C.B. Clematis daphnoides i. minor. Vinca pervinca, Brunf. Chamadaphne altera Dioscoridis, Eid. Brunf. Clematis, Lac. Turn. daphnoides, Thal. minor fl. cæruleo, albo, & purpureo, Eyst. qui tres figuras. Eid. B. Clematis, flore pleno: Clematis altera flore pleno, Clus. hist. ap. alt. Clematis daphnoides fl. purpureo pleno, Eyst.

Clematis daphnoides vulgò dicitur, & Vinca pervinca, Germ. Singrün / Ingrün / Wintergrün / & Stryten / Geln. Berwinck / aut Berwinck. Tab. Wilder Singrün / Cord. in Diosc. Belg. Vtcorde & Macchde palmen: Gall. Peruente: Gallobelg. *anche & Pucelage*: Ital. Pervinca: Hispan. Pervinqua: Angl. Perwinck: Fland. Vincorde: Brab. Macchden palm & Ingroen: Boh. Berwinck: Hung. Clematis altera per sepes repens, *Eyer venjeh*. Ceteroqui cur Clematis & Daphnoides appelletur, jam ante Dod. ostendit. Dicitur autem Vinca pervinca, quod humi serpat, & se in modum funiculi porrigit, vicina quæque vinciens, autore Fuchso. Ingrün à Germanis, quod semper, & particulatim Wintergrün [*Hiema-le viride dixerit*] quod hieme vireat, nominatur. Stryten similiter appellatur, quod contra frigus ceteris, & victrix evadat.

Clematidem numerosis, umbrosisque tractibus, & senectis, atque agrorum marginibus gaudere; perpetuò virere; Martio tamen & Aprilis potissimum florere in confesso est. Clusius subpurpureascentem apud Allobroges spontè nascentem inter vepres observare meminit, præsertim circa Lausannam, càmque interdum alium florem medium complectentem. Vidi ego in montibus Euganeis florentem sine mensis Februarij; Inter Veronam & Castellanc, Ferraria, Basilea & Geneva, flore albo Aprilis mensis principio; cæruleo fl. circa collem l'Abbatie & in hortis adhuc Novembri, aliàs Martio: Montbelgardi frequentem Aprilis extra novam portam in colle in dumetis juxta fossas, & in hortis. Videtur degenerare non transplantata.

Siquis habuerit vinum turbidum, quodque colorem amisit, accipiat tantum hujus herbe (Pervincæ) quantum pro quantitate & copia vini sufficit, vasque imponat, ac illud deinde obturet, obturatumque quindenam relinquat, quod cum secerit, vinum brevi purissimum ac clarissimum reddetur, & genium suum colorem clarabit: præstabit tamen, si ritè rem perficere voles, ut vinum prius in aliud vas transferatur, tuncque herba ut diximus utiliter injicitur. hæc ita se habere experientia certâ comprobavit Tragus. Folia ore retenta singulis fluxum è naribus erumpentem compressisse se eouenter vidimus, inquit Costeus in libro suo de stirpium differentis. Fæmorbis adaligata vitidia folia, mensium

abundantiam cohibent & conceptus adjuvant. Capiti adalligata, & collo, guleve circumdata, sanguinem è naribus manantem sistunt. Adidunt quoque utiliter vulneratis emplastris, & potionibus. Refrigerat enim (authore Math.) liccat, roborat, cohibet. Apollinaris calidam & siccam facit tertio gradu, quum tamen ejusmodi caloris gradu non sapor non indicat. Felix Plat. extrinsecus ad venas hæmorrhoidales apertas occludendas præscribit Clematim. Obscurè admodum. Sunt enim vigintiquatuor plantæ, vel etiam plures, quæ nomen habent Clematidis. Vnde quis obsecro (nisi valdè peritus stitium) dicit quæ planta sumenda sit: pleræque causticæ sunt & vesicatoriæ. Nos sumendam censemus Clematidem daphnoidem vulgò Vincam pervincam dictam. Vires quæ videntur Pervincam convenire apud veteres, sunt ante scriptæ sub Clematidis Daphnoidis, sive piumæ veterum titulo.

CLEMATIS DAPHNOIDES MAJOR flore cæruleo & albo.



PER omnia major est hæc Pervinca vulgari: folia quæ opposita ex semina albus & longioribus pediculis pendentia è viticulis junco crassioribus oriuntur, tres circiter uncias lata, paulò longiora, nunè acutiora, nunè obtusiora, cum acrimonia amarefcunt, saporis ingrati. Flores ex foliorum alis pediculis herent sextantibus, longo corniculo, divisione & formâ florum Pervincæ vulgarioris, sed, ut par-

est, multò majores, coloris cærulei, & albi; apud nos interdum frigore absumitur: in hac siliquis sive cornicula singularia observavimus.

Dod. purg. & hist. & Tab. Clematis daphnoides major. Lob. Clematis sive Pervinca major. Cam. Math. & hort. Clematis daphnoides major cæruleo flore. Cæs. Provincia altera major, folio latiore, quasi hederaceo, grandioribus floribus cæruleis; Clematis Ægyptia Plinij. Clus. Clematis daphnoides latifolia. C.B. Clematis Daphnoides sive major. Clematis Ægyptia hortensis flore purpureo, Geln. h. Pervinca major, Eyst. Clematis i. major, Cæs. Cur Gesneri purpuream hæc referat, non oc. C. Bauh. currit: inquam vidi purpureo flores, nec scio an talis tradita sit ab aliquo autore: minor sanè dicitur purpurea.

Lugd. Pervincam majorem Lobelij peramena florum duplicatione variare scribit, sed præter Lobelij opinionem, qui hæc ab ea separat, nec conlapsus. furdit ut Lugdur. ensis. Hæc nec purpureo, nec pleno flore observavimus unquam. Spontè nascitur, cùm multis Hispania locis, tum in Narbonensi Gallia, magrâ præsertim copiâ circa Monspelium, toro ferè anno florens, ibi spontanea floribus etiam albis quæ tur Frontignanum.

H. Lugd. notatur.

Nomina linguarum.

Vinca pervinca nomen vulgare. Viride hyemale.

Locis & Tempus.

Ad vinum turbidum.

Vires.

Hæmorrhægia.

Temperamentum. Apoll. not. Ecl. Plat. reproh.

Deser.

Sym.

Lugd.

Lucen.

APOCYNON VETERIBVS. CAP. XVI.


A Pocy non, inquit Dioscorides, alique Cynanchon [κινανχων, κινανχων, vet.] nonnulli Pardalanchen [παρδαλανχη] alij Cynomoron [κινυμορον, κινυμορον, Ald.] alij denique Cynocrambe [κινυκράμβη, h.e. Brassica caninam, vet. hū caret], appellant. Est verò frutex [δένδρον, vulg. exempl. γένος, germen] longis [μακρὰς, sunt qui μακρὰς, Yegerini] constans virgulis, vitilium modò obsequiosis [αυτοειδὲς flexilibus, συνόδους add. Ald. grave olentibus] fractūque ferè in victis: foliis Hederæ, attamen mollioribus & per extremum acutioribus, gravique odore, quadanterus viscosis, & luteo succo turgen- tibus: seu eū Fabarum siliq̄a digiti longitudi- ne pretenditur, folliculari specie, minutis intus semi- nibus, duris [σκληρὰ] parvis [μικρὰ] atque nigris [αἰσῶδες, pro qui voce Ruell ex Marcelli textu, & dicitur alba legit. veteris autem, duris, parvis atque nigris omnino caret.] Hujus folia cum farina subacta [sciam, adipe leg. non capi. Fab. Colum.] in panes coacta & in cibo data, canes, lupos, vulpes, & pantheras necant, ac protinus earum quadrupedum coxendices resolvunt. Alij inter rejectanea Dioscoridis apud Corn. Pardalanches, alij Cynocten, alij Phaleon, alij Oligo- ron, alij Hippomanes, alij Onifin, alij Ophiofo- rodon, alij Cynaricen, alij Elaphoscorodon; pro- pheta Paralytin; Romani Brassicam rusticam aut caninam vocant. A vi & effectū nomen accepit hæc planta, inquit Columna: quæ quia interimit, nomen à canibus habet, ἀπὸ τῶν κύνων ἀποκύνων dicta, cui vi respondent etiam nomina alia κινανχων, κινανχων, κινανχων, & κινανχων, addiderunt etiam à vi necandi Pantheras, παρδαλανχη. Hanc verò, ut ab homini- bus caveatur, quia venenosa sit, atque ne pro Ascle- piade, à similitudine decepti accipiant, Dioscorides ut alia quadam venenosa diligenter descripsit: at- que notam illi privatam ab Asclepiade alienam ad scripsit, luteum scilicet succum, quo turgere asserit.

Apocynum ex Plinio videtur homini salutare, quadrupedibus venenum esse. Galenus verò contra ait Apocynum sive Cynocrambe, vocatur à quibusdam Cynomoron, quoniam canes celerrimè necat. Est autem hominibus venenum, herba valdè graveolens, & omninò calida non ingenero- sè: non tamen juxta propriationem sicca. Quare etiam imposita, multam discutendi vim habet. Hæc Galen. 6. simpl. pharmac. Ex quibus ego, inquit Cyn- nat. moveor, vt non rectam esse putem Plinij le- ctionem, ubi lib. 24. cap. 11. sic habet. Sic & pleuriti- cos, & omnes lateris dolores, Apocyni semen ex aqua, scilicet sanat. Quum enim Diosc. nullum eius usum ad humanum corpus præcibat. Et Galenus venenum esse hominibus dicat, & extra solum cor- poris impositam, discutendi vim habere asserat: me- ritò suspectum est Apocyni semen, ut ex aqua bibat- ur. Ego itaque verba: sic & pleuriticis, & omnes la- teris dolores ex aqua: ad precedentia pertinere pu- to, quæ de Radicula traduntur, ita ut sequatur, Apo- cyni frutex est folio Hederæ, molliore tamen, & minus longis viticulis, semine acuto, diviso, lanugi- noso, gravi odore: canes & omnes quadrupedes ne- cat in cibo datum. Et hæc Diosc. sententia consona sunt. Aliqui forè non abs re Plinium interpretant- ur, ut Apocyni semen ex aqua, intelligatur imposi- tum, nam digerendi càm habeat facultatem, poterit lateris dolores sanare: sed certè intrò sumptum Plinius intelligere videtur, cùm ad superiorum simili- tudinem dicat. Sic, & c. Hoc tamen periclitatori- bus est relinquendum. Cæterum cur Cynocrambe, quasi canina Brassica, item Brassica rustica nomi-

netur à quibusdam, non video inquit Gesn. n si quoddam siliquas proferat similes forè Brassicæ ma- inæ, cui similia habet folia, nempe hederacea: simi- liter etiam succo turgere, quamvis Apocynon luteo, illa candido. Habent insuper ramulos similes, nam quales Dioscorides Apocyno tribuit, longos & lentos: tales ipse in Brassica marina, id est, Solda- nella vulgò dicta observavit. Apocyno (quod Apocynum Mattheolus depingit, ex Egypto autem primùm à Bellonio inventum & demonstratum arbitror) profus congenetam herbam illam existimo, quam aliqui ridiculo nomine, Noli me tangere. Nntandum potèd aliam esse Cynocrambem Apo- cynon dictam, priorus venenosam quam hoc loco Diosc. describit: aliam Cyniam, quæ item Cynocram- bes cognominatur.

Cæterum Apocyni nomine donatæ sunt sequen- tes plantæ: Apocynon sive Periploca scandens folio longo, purpurante flore, lacteo succo, cuius & altera species Clusio, angustioribus foliis, quæ Anguillaræ Apocynum alterum. Apocynon Dioscor. Secamone. sunt qui suspicentur esse Secamone Egyptiorū flo- re albo. Est & aliud Apocynon folio rotundiore, Apocynum Apocynon Mattheoli non repens. Apocynum latifolium amplexicaule tertium Clusio, est Lobelin Apoc. lati- Apocynus sive Periploca prior. Apocynum 4. la- folium Clusij est Scammonia Monspelientis. Apo- cynum Syriacum sive Palestinum Beid elzar Alpino. Apocynum Diosc. Fahio Columnæ, aliis herbariis Asclepias Asclepias sine nigro quorundam. Apocynum ar- bitrantur, inquit Turnerus, quidam Itali eam, quæ Asclepias Hirundinaria dicitur, sed esse non potest. Inscrubi- tur hæc à nobis, Asclepias sive Vincetoxicum mul- tis. Per Hederam arthorem sunt qui intelligant. Apocynon Dioscoridis, minus rectè.

APOCYNVM SIVE PERIPLUCA scandens, folio longo, flore purpurante.



T Opiarii opetis Defca. tubis ad præ- gulas obumbradas expetita est ana- dendras hæc plan- ta, non aliter ac Pe- dalymenton vicina admnicula solita scandere, vicinis pedamentis sese involvens (unde Periploca, quasi circumplectens; eò quòd proxima am- plexetur, dicitur) multis longissimis sarmentis, quibus teste Clusio, & iam prælatum arborum (si vicinas nan- ciscatur) cacumina superat: sunt verò

ea sarmenta dura, lignosa, lenta, fractu invicta, ruti- lans ex succo colotis, multis nodis sive geniculis distincta: è quibus bira folia opposita, Asclepiadis sed ex minus lato principio sensim dilatata, ex inter- vallis, lacteo præstantia succo: in mucronem acu- tum paullatim facientia, obliquis à medio nervo venulis cis margines desinentibus ut in Myrto lau- rea, quarum extremitates colligit vena totum ambitu circumcurrens vitidis; flores extremis ramulis late- ralibus quaterni, quini, aut plures; veluti umbellam cõficiunt, quorū singuli quinque foliis radiatis consistit.

qua in fetnâ parte glabra ex luteo virescunt, super-
 flore verò hirsuta, obsoletâ purpurâ (cujus mediam
 aream rhomboides macula viridis obunet) tinela
 sunt, oris virescentibus: quâ verò foliorum concen-
 runt exortus, corollam efformant vegetioris pur-
 puræ, quinque eisdem coloris staminibus intrò re-
 curvis emissis, omnium autem medium occupat
 quinquepartitum villosum albidum capitulum, flo-
 rihus porrò succedunt siliquæ Rhododendri ob-
 longæ, torosæ, geminæ ut plurimum & extrorsum
 aliquantulum inflexæ sive divaricatæ, deinde mu-
 crore coalescentes, quibus dehiscensibus papposâ
 lanugine involutum semen apparet; rari latè se
 spargens & subinde germinans.

Synon. Matth. Apocynum, Periploca non modò repens,
 sed & arborescens scandens. Cam. ep. & hist.
 & hort. Apocynum repens, vel potius *arborescens*.
 Arbores enim scandit, & admodum altè crescit. Gi-
 gnitur in Græcia, ubi vocant *Periploca*; lacteum
 succum emittit & folia ac siliquas profert instar O-
 leandri. Dod. purg. & hist. Periploca altera repens
 dicta, caulibus petennibus de fluensibus foliis, unde
 repentis fortassis cognomen: floribus haud magnis,
 quinque foliolis albicantibus: rara Belgio, & qui-
 dem ut Matth. scribit, etiam Italiæ ex Syria istuc af-
 fertur; ad Diosc. Apocynum referenda. Hanc plan-
 tam Dodonæo non fuisse visam florentem satis de-
 monstrat quod annotavit de floribus. Ang. Apocy-
 non alterum. Lob. Periploca serpens angustio-
 re Periclymeni folio. Column. Apocynum alterum
 & Apocynum repens vulgare. Clus. hisp. Apocy-
 num 2. amplexicaule. Eid. hist. Apocynum 2. an-
 gustifolium. B. phyt. Apocynum 2. sive repens,
 purpurascens flore: Eid. pin. Apocynum 2. folio
 oblongo: Apocynum repens, Matth. Lugd. & Cam.
 Apocynum foliis Oleandri, Ang. Periploca, Caf.

**Repentis cogno-
 men.** Semine ex Italia accepto Clusio nata est, cum in
 Belgio, tum Viennæ Aultrix, perennisque est, deci-
 duis tamen hieme foliis, ferius flores producens,
 quam ut fructus ad maturitatem (quemadmodum
 & Rhododendri) pervenire possit. Apocynum
 vidi Patavij in orto D. Cortusij, mense Januario ad
 magnam altitudinem circumvolvens palos, vetim
 tunc erat sine foliis. Rauwolf. misit semen Au-
 gusta pro Periploca repente ex monte Libano: ea
 primo anno vix dodrantalis, sequenti duos homi-
 nes superavit, se involvens foliis longis ad Nerium
 accedentibus, quibusdam tamen latioribus in acu-
 tum desinentibus: pulchra visu planta, succo lacteo
 turgens, necdum tertio anno florem proferens:
 etiam in altissimam evasit, hiemem facile fert:
 interdum tamen gelu corrumpitur remanente radice.

**Lacus.
Tempus.**


**Periploca
repens.**

APOCYNO AFFINIS SECAMO-
ne flore albo.

Deser. Planta est repens, altius saliens, seque aliis at-
 bonibus convolvens. foliis duris, longis, sefeli
 Ethiopici proximis, sed majoribus; flores fert albos
 styracis similes, à quibus producantur siliquæ, lon-
 gæ ac crassæ, quales in Rhododendro cetuntur,
 plenæ lanugine albâ, ac sefeminibus parvis. ex hac
 planta succus emanat flavus, urens, quem siccatum
 Ægyptij valenter tenues humores purgare aiunt.


Secamonij speciei. Ægyptij referente descriptionis autore Alpino,
 Scammonij speciem affirmant quam Secamone ap-
 pellant, cujus tamen nullum usum in medicina apud
 eos novit. Hanc plantam Apocynum Diosc. esse
 suspicatur Guilandinus eamque putat, quam ali-
 qui è Syria venisse, Periplocam vocatam prodide-
 runt.

Clus. hisp. Apocyni alterius genus 2. Eid. hist. Apo-



cyni secundi sive angustifolij species altera per omnia fe-
 rè similis Apocyno angustifolio dicto:
 sed tenuioribus rami-
 mis, multoq; angus-
 tioribus foliis, non
 minus tamen viri-
 dibus & nervosis.
 B. phyt. Apocynum
 2. sive angustifolij
 albo flore. Eid. pin.
 Apocynum 2. angus-
 tulo Salicis folio.
 Spontè hoc Apo-
 cyni genus nasci
 non visum à Clu-
 sio, sed in hortis se-
 mine ex Italia mis-
 so ab eo cultum.

APOCYNUM FOLIO ROTUNDO-
re, flore ex albo pallefcente.



BREVIS frutex Deser.
 Brevi stirps hæc
 neque proximis se
 advolvens, verim
 suis mixta viribus re-
 cta statim plures ra-
 mos divisa, cortice
 cinereo: folia ad sin-
 gulos nodos ex ad-
 verso hinc nascuntur,
 hederacis simi-
 lia, non angulosa,
 modicè acuminata,
 crassa & mollia, un-
 cialibus & sextanta-
 libus pediculis her-
 rentia, succum re-
 mittentia ex albo
 pallefcente, ex quo-
 rum sinu flores ur-
 bertim emicant lon-
 gis innixi pediculis,
 umbellam quodamodo emen-
 tentes, candidi è quinque oblongis foliolis contexti.

Hanc Clusita describit: Hujus stirpis pollicari est
 crassitudine, brevis, cinereo cortice tectus, in plu-
 res alas sive ramos divisus, qui licet lenti sint & vi-
 minei, ratò tamen vicini fructibus sese advolvunt,
 aut implicant, sed nullo adminiculo egentes, per se
 subsistunt: folia perpetuò gemina inter se opposita,
 ad singulos ramos nodos adnascuntur hederacè
 formâ, molliora, quâvis satis carnosâ, quibus avulsis
 aut fractis, ex albo pallefcente succus emanat: flos pu-
 fillus, albus, Atelepiadis non dissimilis, ex alarum si-
 nu quasi umbellatim prodit. Fructum (inquitis) non
 observabam, sed Atelepiadis fructui parè similem
 intelligebam: semè certè quod hoc nomine aliquando
 ad me missū fuit, Atelepiadeo par erat, planū, in me-
 dio aliquantulum intumescens, nigrum, albâ interio-
 re pulpâ, quod terræ cômistum, nō est natum. Plan-
 tam autem ipsam satis crassâ radice, pingui succo
 turgidâ & fragili accipiebam à C. V. Alphonso Pan-
 cio, Ferrarie Ducis Medico & Academiae professeore.

Apocynon, q; Brasica canina appellant, et si-
 diu Matthiolo quidem incognita fuerit, ad eam ut eam
 inter alias incomperatas stirpes in amplissimo natu-
 ræ viridario posteriorum exploratori non relinquitam
 putarit: an no tamen 1554. è Pisis Lucas Chinus duas
 ad ipsum misit siliquas, Rhododendri siliquis ad-
 modum similes: quarum alteri insectum erat Periplo-
 ca

Deser.

**Styracis
flore.
Rhododendri
siliqua**

**Secamonij
speciei.
Apocynum
Diosc.
Periploca.**

**Atelepiadis
flore fruct.
& semine**

**Brasica
canina.**

plocarepens, alteri verò Periploca non repens, fortasse quòd ita Syri eas nominant: inter eas tamen hæc erat differentia, quòd repentis Periplocæ siliqua eà sanè longitudine constabat, quæ & Rhododendri, gracilior tamen erat: alterius verò brevior. E longiori facta plantam provenisse ait, quæ non modò humi repent; sed & arbores quantivis proceras scandit: è breviori verò aliam, quæ notis omnibus Apocyni non retulerit. Vtraque porò non minùs late abundavit, quàm Tithymali omne genus: verùm id repenti omninò album fuisse: non repenti verò subcroceum. Hinc itaque factum est ut Ghino planè subscripserit, & hanc cui omnes proisus notas ad stipulam credidit, Apocyn non esse certò affirmarit. Siliquas autem, quas huic suo Apocyno appinxit, ficitas fuisse, in eomm. It. & lat. cum mag. fig. demonstravit, ut in quibus eas, & meritò, mutant.

Apocyni prima species, inquit Anguil. multas habens notas respondentes, Apocyn non esset, si occideret canes; Periplocas nomine intelliguntur omnes plantæ amplexicaules: nec est nomen particularis plantæ, ut quidam existimarunt.

Clusio ad veterum Apocynum, quod Dioscorides etiam à nonnullis *apocynoides* appellari ait (differentem tamen à Cynocrambe, de qua peculiari capite agitur) ante descriptæ plantæ & sequentes referendæ videntur, sed hæc, de qua hic agimus, omnium maximè. Est autem ei hisp. Apocyn non 1. Eid. hist. Apocynũ 1. latifolium. Lob. adv. & ic. Apocynum, Periploca græca foliis latioribus hederaceis: Obs. Apocynum, Periploca græca, Apocyn on Guilandini, Matth. & Itolorum, Cynocrambe Galeni, & Cynomorus Adversariorum. B. ph. Apocynum 1. subrotundo folio, non repens: Eid. pin. Apocynum 1. folio subrotundo: Apocynum, Matth. Ang. Gef. h. Lac. Lugd. & Cast. Cynocrambe, Lon. Apocyni alterum genus, Cam. Periploca repens, Carl. Dixerat Bauh. in phyt. non repentem, quod in pir. silentio involvit, & ex Casalpino repentem facit. Quondam ex horto Patavino allatam, nominavit Apocyn non Dioscoridis, & Zingiber caninum Avicennæ, Guilandini.

In horto Ill. E. C. (unde delata nunc non recordor) quotannis floret, sed siliquas hæc tenus anno 1600. à multis annis non protulisse conservatur in vase & hieme reponitur. Clusius eam Viennæ Austriae alebat, hieme quidem folia abiecitentem, illus autem in clementiam facile ferentem.

Mauritius Thaurer, Laurentius Hyperius & Joh. Krug, Doctores & Cancellarij Ill. Princip. Guilhelmi Landgravijs testantur apud And. Bertholum de Terra sigill. & Clus. de Apocyno, se Apocyni 3. f. dedisse cani, qui post semi-horam, licet partem evomerit, nihilominus post symptomata crudelissima convulsionibus & tremoribus interierit: alterum verò canem, qui cum Apocyno partem Terræ sigillatæ equalem devoravit tribus post sumpcionem horis debilem utenque fuisse, postero tamen die convalescisse, & maximo cum appetitu edisse, ut sumpri veneni vix minimum signum apparuerit. Historia hæc revocat nobis in memoriam quod evenit Mòtbelgardi gubernante Nobili D. Io. Jochemio à Mundeheim summo prefecto: Quidam se Chymico dicitantes, quàm perquirentem Chrysolopæam, aurum suum reddidissent totum potabile & comestibile & fame penè perierit, voluerit ex Medicina quæ sum facere, quod consecuti ejusmodi impostoribus Chrysolopæis. Terram igitur Silesiacam supra dictam, ac ut suspicamur à predicto Bertholo nacti, magno pretio divendere conabantur, pollicentes utilem adversus omne venenum. Sed eorum pollicitatio flagris digna erat: hoc enim per experientiam tractare non poterant: imperante enim Prefecto noctro duabus

gallinis data radix Napelli (verùm nimis in parva quantitate) nullum illæ nocumentum expertæ eo per se, vel cum Terra silesiaca assumpta: dato autem Sublimato utraq; perierit, eaque citius quæ terram assumpserat, quæ enim non sumperat vomitu partim rejecto veneno citius supervixit, altera cum non potuerit evomere, terrâ consistante fauces, citius perierit. Quare nulli intoxicato consilium dandam Silesiacam tertam, nec veram Turcicam, ante rejectum venenum per vomitum, nisi parvâ quantitate cum multo liquore ad movendum vomitum. Considerandum an Andreas Bertholus non deceperit medicos: fortè (quod non declarat ipse, nec Clusius) terram sigillatam exhibuit cum multo liquore, unde calida veneni vis infracta & vomitus facilius subsequutus: quod fortè commodius præstitisset sola aqua tepida, vel cum oleo, aut butyro, aut melle, aut Oxy mellite & similibus: lectores videant imposturam quam descripsimus lib. 4. hist. n. g. de Ligno Nephritico carulo & flavo tingente.

APOCYNVM LATIFOLIUM amplexicaule.



Longis, tenuibus, & frequentibus sarmetibus proxima quæque scandit, multiplici circuvolutione & arctico nexu illa amplectens, viridibus, geniculatis, foliis hederæ mollibus, subcineracei coloris, lacteo succo, ut etiam sarmenta, adè turgidis, ut vel levissimo vulnere, non minùs copiose, quæ ex quovis Tithymali genere profiliat. Flores ex altum sinu multi umbella serè in motem prodeunt, candidi, parvi, quinque foliis perinde ac Adlepiadis flores constantes: siliquæ præterea similes, multo tomento & lanugine plene, quæ semen occultatum planum, ex cineraceo fuscum, Adlepiadeo femini par. Molestissimæ huius radices, quæ sarmentosa & fibrose admodum, eadem serè crassitudine longissimè bacillæ serpunt, & latè vicina circum loca occupant, candidæ alioqui & fragiles, adè tamen vivaces, ut, si vel minima fibra sub terrâ latens oculos illam eruentis effugerit, proximo Vere germinare, & vicina loca occupare conspicitur. Itaque, non minùs exosa hæc planta rei herbariæ studiosis, quàm Aristolochiæ & Clematidis illud genus, cui vulgus Sarracenicæ cognomen imposuit. Hujus cauliculi & sarmenta hieme exarescunt & pereunt, sed novo Vere alia & frequentiora germinant.

Apocyni 3. latifolij siliquas femine paucos annos post meum (inquit Clus.) ex Hispaniis in Belgicam reditum, Pincia usque mittebat Joannes de Ioigny Fabricarum istic Praefectus, hispanicâ inscriptione additâ, que trepa por los arb les. h. e. per arbores repit: postea radicibus adè multiplicata est, ut nemo esset in universo Belgio rei herbariæ studiosus, qui eam ex suo horto penitùs erutum non cuperet.

Apocynum Dod. Dod. Periploca prior, potissimum ad Diosc. Apocynum referenda, rara Belgio, & quidem ut Matthioli scribit, etiam Italia: ex Syria isthuc allata. Nos Matthioli Apocynum ad hanc non referimus, potissimum in quoad iconem.

Scammonij Monsp. & rivetis, Lob. Lob. Obs. Scammonij Monspelici varietas: Apocynos sive Periploca prior Dod. & Belgatum quorundam. Cognata figura & natura est eum in Scammonio Monspelienfi flore, succo, viticulis & longo radice reptatu subtus hinc inde porrecta, quæ ad vivax est, ut semel in hortos ascita, vix truncari deleverit queat, etiamque frustillo tantillo relicto repullulet: sed foliis longioribus, siliquis verò & semine Vincetoxici eujusmodi è littoreis Adriatici finibus & mediterranei maris in hortis Belgicis alitur.

C. B. phyt. Scammonium 3, & Scammonia affinis. Eid. pin. Scammonia 3. Scammonia Monspel. affinis, foliis acutioribus: Apocynum 3. Clus. hisp. 3. latifolium, Eid. hist. Scammonij quoddam genus, Cæf. Volubilis marina, Tab.

Scammonia Clusij. Fratet C. Bauh. misit semen (quale fuerit non recordor) nomine Scammonia Clusij, quod secundo anno non tulit florem; folia erant cinereo colore, crassa, turgentia lacteo succo, acri, acutiora & minorâ quàm in Monspelienfi, nisi immutet ætate formam: protulit hiemem unam in horto Montbelgardii, tandem periiit, fortè hæc est Apocynos modò à Clusio tradita: suspicor me hanc etiam collegisse Lutetia in horto Robini pro Scammonia Monspelienfi.

SCAMMONEA MONSPELIACA
flore parvo.

Defcr.



Asari folie.

IN longis, tetetibus, tenuibus, hinc cubitalibus farnetis, vicina quæque amplectentibus, ramosis, vel ut ait Lobel. loris reptantibus & stratis humi viticulis, vel piscatorum atregis & Tamariscis advolutis quinque cubitorum; folia nascentur opposita, Aristolochia, Clematidis vel Asari, falcata ad pediculum, in mucronem desinentia, lata, densa, glabra, albidâ, utriusque longioribus pediculis hæ-

rentia, succo lacteo prægnantia; flores ex foliorum sinu pediculo orto multido insident plures confertim congesti, parvi, stellati, albi; semen Lobel. angulosum in utriculo minore quàm Aristolochia. Radix longa, digitali ferè crassitudine, alba: longo inquit Lobelius reptata, multùm fibrosa, succulenta veluti reliqua planta.

Convolvuli genu.

De hac Clusius: Convolvuli genus observabam non multùm dissimile proximè descripto Apocyno, cum in sarmentosis ramulis, tum foliis quæ magis quidem orbiculata: in mucronem tamen desinentia, cineracei coloris. Tota etiam planta lacteo succo prægnans & vicinarum stirpium cauliculis sese implicans, cuius semen mihi nõ conspicuè. Eius autem iconem, qualis isthuc florès & sine radice à Clusio fuit picta, studiosorum oculis subjicere libuit.

Lob. Adv. Scammonium, Volubilis marina com-
muni Pharmacopæorum consensu facta, cuius flos à Volubilibus omnium floribus differt: Eid. Obs. & ic. Scammonium Monspelienfe. Apud Cord. in hist. lib. 4. c. 109. hujus Scammonia pictus est ramulus, quamvis Cordus ejus eo loco mentionem non facit. Gesn. h. Monspelienfi Scammonia quædam floribus exiguis. Rauh. vol. Scammonium in Monspelienfe, incolis Tripolitanis Meudhendi; Razi lib. ad Almanfotem Cortizola. Cam. h. & Lugd. Scammonia Monspelienfi maritima. Clus. hisp. Scammonia Valentina & Monspeliana: Eid. hist. Apocynum 4. latifolium & Convolvuli genus: Valentini & Mompelienfi Scammonia dicta, plurimum tamen à legitima Scammonia distans. B. phyt. Scammonia 2. sive Monspeliana: foliis rotundioribus, Eid. pin. Scammonia Monspelienfi, Eysl. Scammonia Valentina, Tab. Ger.

Lob. copiosissimi natoto illo littore & sabuleto, ab usque Rhodani ostio ad aquas Marianas & Sinum Agathorfen; flores fert Junio & Julio. In regni Valentini & Narhonenfi Gallia maritimis, præsertim littore illo, quod inter Volcarum stagnum & mare Mediterraneum est, herbis locis Clusius observabat. Ego Monspelij in maritimis copiosam vidi, florentem mensè Augusto.

Massilienses cum succo istius herbe & Colophonia, adulterant Scammonium tam exactè, ut vix cognosci queat. Succo lacteo concreto (quo multo tota turget) purgationes moliebantur, sed majore do-
si (quam Scammonij) & minore effectu: quippe succo nihil additum erat, sed coctione coactus niger vel fuscus erat.

BEIDELSA ALPINI SIVE APOCYNUM SYRIACUM. C. A. P. XVII.



ALPini murene Patavio retulit D. Cherlerus Beidelsaris fructum, qui oblongus, pugnum crassitudine æquat, pediculo hærens uncial, crasso, tereti, duro, incurvo; cortex extimus membranaceus, viridis, inferius croceus qui renuem alutæ eleboratam æmulatur: utrunque committit filameta villosi mellei arborei referentia: integrum denique sinum totius fructus implet tomētum, vel, si holoferico mollitie neutquam cedens, colore car didum, semine involuto Cucurbitini forma, dimidio minus, compressiore, fusco, pulpâ albicarte, sapore amaro.

Est autem plâta ipsa, uti scribit Alpinus herbacea, fruticosa, multis stoloribus ab radice reëctis, sursum ad duorum ferè cubitorum altitudinem se extollens; foliis latis, oblongis, ut Alcès folia, crassis & candidis, ex quibus dissectis lac album manat, totaq; planta lacte abundat: flores fert croceos Ranunculi floribus proximis, fructus bini invicem alligati pendent satis hominis testibus similes in quib; alba lanugo, semina parva, lata, lactuce seminibus multa cõtinètur.

Quia

Quia autem elegans hac planta in terra nostra exsul ut plurimum est, non abs re erit, ut aliorum de ea observationes addamus. Allirgit autem, referente Christophoro VVeixio, ad duorum cubitorum, vel etiam ampliorem altitudinem, satis crasso stolonem, in aliquot ramos divisio, qui multo succo ex candido pallescere abundant. Quantum verò ex resiccatae plantae parte (quam ipse VVeixius ex Aegyptiaca, Syriaca, & Constantinopolitana peregrinatione redux, mihi, inquit Clusius, Vienna Austriae communicabat cum uno fructu, colligere potui, striato est caule, cui alternatim binae semper, contrariis inter se pediculis innascuntur folia satis magna, crassa, & quodammodo cutacea, ex viridi pallescencia, aliquot nervis, ex media costâ satis crassa se spargentibus, praedita, obtuso mucrone, gravis odoris, tenella folia extremis ramis adnascencia, profusum incana sunt: ex foliorum alis alternatim emergunt crassi & longi ramuli bifidi, sustinentes aliquot flores longiusculis petiolis innitentes, unico quidem folio constantes, sed quinque profundis incisuris divisio, instar florum Apocyni, Adlepiadis & multorum aliorum, coloris, quantum coniecere licebat, foris pallescens, internè obscurè & obsoletè purpurascens: quibus succedunt singulares, binae, aut ternae crassae, incurvae, binas uncias longae siliquae, quibus hiscentibus, sub summâ siliquae cute, inclusa apparent membranaceo involucto, frequentia & quasi imbricatim disposita grana plana, qualia serè Adlepiadis, & Apocyni vulgaris semina, quorum extrema & angustiori inhaeret candidissima & mollissima quaedam villosa materia. Sine perennis an non, nihil affirmare possum. Qualem autem à VVeixio accipiebam plantam, ut com nodius describere possem, paululum in aqua macerabam; deinde crassâ minervâ delineabam, observatâ in fructu addito eâ proportionem, ut dimidio minorem exprimerem, quam ille qui à VVeixio mihi donatus. Beidfar ab incolis appellari dicebat. Cùm autem multas notas habeat Apocyno non dispares, non ineptè, meo iudicio Apocynum nuncupare poterimus sive Syriacum, sive Palaestinum, & fortè etiam Aegyptiacum, quandoquidem in Aegypto, ut postea dicemus, crescit. Non dubium est quin ea sit, quam Alpinus Medicus c. 25. libri quem de Plantis Aegyptiacis evulgavit, & circa Alexandriam Aegypti observatam descripsit Beidfar nomine.

De hac porro planta consulamus Honor. Bellum, qui multa, diligenti observatione dignissima memoriae prodidit; cuius verba haec sunt. Olfar frutex est stolonem multos à radice proferens rectos, rotundos, leves, geniculatos, quibus circa genicula infundit folia longa, rotunda, crassa, per quorum medium nervus excurrit albus, è quo utrinque venae exeunt diversâ foliorum parte satis conspicuae, folia autem ex intervallis binae semper inter se opposita sine pediculis stolones undique ambiunt, ex quorum alis multi rami nunc erumpere incipiunt, non quidem ex omnibus, sed alternatim, ita ut si, à primo initio sumens, lineam ab uno ad alium ducas usque ad ultimum, perfectissimè lineam helicen describes. Radice firmatur validâ in multas fibras divisâ, luteos flores profert, fructusque Mali magnitudine, cordis figurâ, colore virides, binos aut ternos ex uno pediculo pendentes, in quibus feminalata, lanugine quadam mollissimo candidissimoque sericeo simillimâ involuta: Caules & folia incana sunt, lanugine quadam tecta, ut crassiore quâpiam farina tota planta conspersa videatur, quae imbricibus eluitur, eoque tempore folia & caulis colorem ex viridi ad album tendentem contrahunt: patet caulis radici proxima albo cortice tecta est,

Tom. II.

fungoso, rimis dissecto, ut Sambuci caulis videri possit, & illius instar multa medulla alba refertus est. Stolonum cortex & foliorum nervus copioso lacte amaro & acri abundat: brevis tota planta aspectu pulchra est, & quas in scitibus servo semine ex Aegypto accepto natas, ad trium cubitorum altitudinem jam excreverunt, foliaque hieme retinent: nondum autem vel flores, vel fructum tulerunt. Planta haec in Aegypto vulgariter Olfar appellatur, fructus verò Beid el olfar, hoc est, ovum ex olfar, Beid et aut Italicè Ovo del olfar. Beid enim Arabicè ovum significat, & est articulus, qui Italicè dicitur del. Huius fructus lanugine pulvinaria implent, lacte autem coria depilant. Sine dubio, hac planta illa est super quam Avicenna & alij Arahes Saccharum Alhufar (mannae speciem) inventi scribunt: & quam Serapio ex Abanisa sententia, Muto no interprete descripsit his verbis: Haoser, seu Alafer, seu Alhufar, planta est quae lata habet folia, singulis annis succrescens. Saccharum ex ramis extillans, & à foliorum cavis quod copiosissimè legitur, non parum quidem amarefcens: poma profert camelorum testibus non dissimilia, à quibus res quaedam caustica, adurènsve emanat, cauteriis maxime accommodata, ex qua etiam & calcitrae, & pulvinariae fulciuntur, planta cuius Cherea nuncupatur: folia autem Haoser incisa humorem destillant in Maio colligi solitum, in quo coria depilantur, adeoque exsudat, ut vas quàm capacissimum ex una, vel altera expressione adimpleatur: lignum verò Haoser leve est, crassum, erectum, pulcherrimum, ut non in iuriam in suis catminibus tum haerelia, tum crura formosarum sanè mulierum, ligno Haoser Poëtae bellè comparant. Est & alia planta Haoser nominata ex Tithymalo-Haoser aut quidem genere. Hac Serapio. Sed animadvertendum est, veterem Serapionis interpretationem rectius huic plantae quadrare, quàm Mutoni, ut utramque cum nostra conferenti facile patere poterit. Describitur etiam hic frutex ab Abembitar Medico Arabe Hispano, in sua Simplicium hist. & à Malahysah Medico Persa, qui Abembitaris historiam in Epitomen contraxit: quorum libros manuscriptos apud Haym Abensulem Medicum Hebraeum Hispanico sermone vidi, qui mihi Olfatis historiam ex eorum scriptis ad verbum hoc modo humanissimè interpretatus est. Olfar frutex est Tithymalaceus, longus & parte superiore tenuis, folia habens lata, super quae decidit manna quae Zucur et Olfar vocatur (flore fert Oleandro similem) hoc addit Malahysah: Abembitar enim nullam floris mentionem facit, sed fructus duntaxat: folia ipsius plana & levia sunt, caulem habet viridem, concavum: fert fructum quendam similem saculo pendenti, qui intus continet particulas albas unas super alias, quibus utuntur Arabes ad accedendum lignem, nihilque (dicunt ipsi) ad hoc munus peragendum praestantius in veniù posse: pulvinaria etiam hac materia implent. Oritur in montium cavitatibus, Locis scilicet ubi mons jungitur monti, quandoque etiam in arenis nasci conspicitur. Si caulem aut folium incidas, lac magnâ copiâ emanat, ita ut quatuor & amplius librae ex una planta exeant, quod quidem est acre, calidum & siccum, corrodit & incidit, ut sit in principio quarti gradus caliditatis, planta verò ipsa calida est in fine secundi aut principio tertij. Habitatores Mechae pilos extrahunt à coriis, depilant videlicet coria cum hoc lacte, eam ipso infundentes: quod quidem est vehementius pulvinariae omnium Tithymalorum: drachma enim una & semis per os assumpta interficit evacuando & excoiando: folia verò in pulverem redacta, & inspersa super ulcera maligna atque corrodentia amplius progredi non sinunt: viget

M 3

exficat ulcera fordida, humiditatem exrem entiam, carnemque superflua consumit; lac co nferat maculis cutem inficiētibus. Hujusmodi stirpes nonnullae Tripoli referuntur, nonnullae etiam Cayri. Sed cavendum ne propter quos accedat; ipsis, aut sub umbrā dormias. Bellonius lib. 2. O bſerv. cap. 60. hanc stirpem fortē intellexit sub arb-oris lanigeræ nomine, non tamen descripsit. Si verò hanc lanigeram esse Theophrasti, aut Plinij putavi t, valdè hallucinatus est: nam lanigeræ Theophrasti nihil aliud sunt quàm Gossipium, quod in Arabia & Ægypto arboreſcit, & multos annos durat: sed in Creta hieme perit. Alpinus quoque hunc fitticè de scribere videtur libro quem de plantis Ægyptiis edidit sub nomine *Beid el ſar*: sed ut ingenue fatear, ipsius descriptionē nō satis assequor. Nescio enim quid commune habeat hujus planta folia cū Aloës foliis, quibus ipsa cōparat; neq; in quibus semina hujus conveniant cum Lactuæ seminibus: & icon quam spectandam proponit diligentiore pictore m requireret: semina verò & fructus satis rectè expressi: at majores sunt his quos ex Ægypto accepi, ut ex siccis foliis & fructu cum sua lanugine & seminibus, obſervare memini. De lactaro autem quod super hanc stirpem inveniri scribunt, aut ab ipsa manare, nihil adhuc compertum habeo: nam in novellis plantis illud obſervare non potui. Illud tantū animadverti, quòd lac detracto folio emanans, succellu temporis circa vulnus concreſcit in ſtar gummi cuiusdam albi, Traganthæ valdè ſimilis, dulcedinis tamen expertis. Hucusque Bellus.

Macula cutis.

Arbor lanigera Theophrasti.

Beid el ſar Alpinus.

Syn. C. B.

Locus & Tempus.

Vires.

Doloris frigidus.

C. Bauh. pin. Lapathum filv. latifolium c. & Lapathum Ægyptiacum lactescens, siquā Asclepiadis: Esula Indica, quibusdam.

Anno 1595. Julij 1. Stutgardia in orto D. Hieronymi Gerhart Vicecancelarij obſervavi parvas plantas Beid el ſar, quæ foliis correfpondebant figuræ ab Alpino propositæ; erant autē purpurascētia: parvas etiam plantas in olla vidi Argentina in orto D. Georgij Obrechtii Turifconſulū ex seminibus missis nomine Beid el ſar à D. Agerio. Nascitur, auctore Alpino, in humidis locis propè Alexandriam in ramo Nili Calig vocato & Cayri, propè el Mattharia, loco ferè perpetuè humido ac ferè palustri ex aqua Nili ibi diu remanente. Christ. VVeixius Medicus circa Hierico nascentem ad flumen Iordanem obſervabat & legebat.

Folia contusa, ut ait Alpinus, tum cruda, tum in aqua cocta, emplastrum modo apponuntur in frigidis tumoribus & doloribus; ex lanugine parant cubilia in suum usum. Utuntur etiam ea ad excipiendum ignem ex silice excussum, tanquam escā ac pabulo. Tota planta scatur lacteo succo calidissimo & exurentis facultatis, quem plures in quibusdam vasis excipiunt ad depilandam coria, nam si aliquanto tempore in eo macerantur, pilis nudantur. Lac quoque siccitatem præstantius corpora solvit, atque dyfentericos fluxus etiam lethales facit. Est etiam præstantissimum remedium, ad impetiginem curandam, & ad plures cutis maculas & infectiones tollendas, si eo partes illinantur.

ASCLEPIAS VETERIBVS.

C. A. P. XVIII.

Asclepias Dioscoridi Hederæ folio Securidacæ semine. Vires.

Asclepias, ut ait Dioscorides, ramos producit longos, in quibus sunt folia longa, hederacea; radices habet multas, & tenues odoratas; florem graveolentem; semen ut Securidacæ. Nascitur in montibus. Radices in vino potæ auxiliantur torminibus, & contra bestiarum venenatarum morsus.

Folia imposita, ad mammarum & uteri maligna ulcera faciunt.

De Asclepiade eadem apud Plin. leguntur. Asclepias folia Hederæ habet: ramos longos; radices numerosas, tenues, odoratas; floribus viris graves; semen Securidacæ. Nascitur in montibus. Radices torminibus medentur, & contra serpentium iactus, non solum potui, sed etiam illitu.

Galenus de Asclepiade herba scripsisse dicit Dioscoridem, se verò nondum experimentum ejus habere. Paulus calidam, & siccam & tenuium partium esse testatur, & reliqua ex Dioscoride addit. Vocatur hæc inter notha Dioscoridis ab aliis Ciffion, quasi Hederula; ab aliis Cissophyllon, h. e. Hederæ foliis prædita.

Falluntur vel Marthiolo nobis adſtipulante, qui putant Asclepiadem eam esse plantam, in quam vulgus herbariorum Vincetoxicum vocat, quæ frequenter in saxosis & asperis locis provenit, levi admodum caule; foliis Lauro acutioribus; flore albo, muscoso; corniculis tenuibus, oblongis; radicibus in numeris albicantibus. Quandoquidem hujus radices nullo odore commendantur: flores vitus aliquod non redolent; semen non est Securidacæ simile. Adde etiam quòd ex Onbasij lectioe Asclepias non profert folia longa; cui subſcripsit Marcellus interpretes, fretus fortasse, ut foliis, probatissimis exemplibus. Præterea antiquissimus codex manu scriptus de radicibus non legit *πικράει*, h. e. multas, sed tantum *πικράει*, i. e. tenues, odoratas.

Veterum ergo Asclepiadem, esse neotericorum Vincetoxicum, crederent, sed falsò, Trag. Fuchf. Corn. Lon. Cord. Lob. Dod. & Tabernamontanus. Nos herbariorum Vincetoxicum mox inſenſimus Asclepiadem sive Vincetoxicum multis, floribus albicantibus.

Nec minis etiam hallucinantur ij, qui Asclepiadis vice, quam in montibus nasci Dioscorides, nec non etiam Plinius tradiderunt, eam herbam accipiunt, quam Hederam terrestrem cum quibusdam alibi nominamus, quæ plerumque secus vias nascitur & perpetuè humi serpit foliis rotundis. Siquidem præterquam quòd Dioscorides scriptum non reliquit Asclepiadem in viis publicis nasci, nusquam etiam, quod legerim, proddit eandem tam longo reperere tractu, & folia rotunda proferre. Anguillata ait se Asclepiadem non nosse: Turnerus autem non facile posse affirmari perhibet quamvis illa fuerit.

Est porro etiam Asclepias altera flore nigro Loh. Camer. Tabern. C. Bauh. & Hort. Lusitanico, quam Columna vult esse Apocynon plantam lethalem, malè meo quidem judicio. De hac paulo post, ut & de Asclepiade Cretica Clusij.

ASCLEPIAS SIVE VINCETOXICUM multis, floribus albicantibus.

Numerosas radix demittit fibras, benè habitas, longas, albas, gustu nauseoso [Trag., odorato, contrarias & implicatas, inſtar Hellebori nigri, adeoque interdum ponderosus ut decem libras æquet, cuiusmodi à se iam olim in silvis, quam Germani den Ydar vocant propè arcem Bubenfeld reperas ait] caules surrigens lentos, cubitum & sesqui cubitum altos, hirsutos, geniculatos: ex ad quorum genicula hina semper folia ad versa ex brevibus pediculis sursum vergentibus, nonnihil per extremos margines & nervos hirsuta, formà hederaceorum, longiora, rugosiora: ex quorum alis pediculi prodeuntur flores privatis insuper pedicellis donatos sustinent albicantes, quinque foliis constantes [Trago, ex candido passentes] totidem apicibus concoloribus rotulæ modo, sessilique

ulcera.

Asclepias Plinia.

Temperamentum.

Vincetoxicum non est.

Orbitas lectio.

Error alius.

Hederæ virentis non est.

Asclepias nigro quocunquam.

Asclepias Cretica.



lique pistillo viridi, medium occupantibus. hęc succedunt cornicula fecundiam aut amplius longa, semen tomento involutum continentia, ruffum. Trago aculeatę & oblongę siliquę, Ciconię rostrum imitantes, intus candida lanę & lato semine Gentianę simili refertę, quę si ad maturitatem suam pervenerint, lanuginosum & quasi pinatum semen in auras evanescit.

An Ruell. l. 3. c. 26. hanc nostram plantam per Asclepiadem, quam alii Ciffion, alii Cissophyllon, quosdam Hederalem nominasse refert, in elleceris, asserere non ausimus propter jesunam ejus descriptionem.

Quo nomine veteribus sit appellata nondum satis constare scribit Tragus, tamen si omnino sit pronuntianda sententia, non inepte se facturum existimat, si Asclepiadae corundem nominet. Asclepiadem autem à Theophr. Peliconium dici prodidit. Ast meminit quidem Theophr. lib. 8. c. 8. *πελαγονίου*, vel ut vertit Gaza Securine, verum eo loci nihil est quod Vincetoxico conveniat.

Quidam Herbarij Itali, cum Turn. in Italia ageret, Hirundinariam vulgi Apocynon arbitrabantur: verum cum nec succum habeat luteum, nec vina intoxicet, Apocynon esse negat. Porro quod Hirundinarię radices non sint odoratę, non facillę affirmari posse scribit, veram esse Asclepiadem. Nec ullam hæcenus vidit, quę cum Asclepiadis descriptione conveniat. Licet Cornarij Asclepiadem Dioscoridis, esse Officinariam Vincetoxicum, & Herbariorum Hirundinariam, descriptione totā & usu approbati sibi imaginatus fuerit. Sed est & Cordo in Dioscor. & hist. Fuchf. Lon. Turn. Gesn. h. (cui & Herba cognata Apocyno, & Apocynum dicitur) Lob. Obs. & Ic. (cui & Vincetoxicum) Dodon. gall. purg. & hist. Lac. Tab. (cui duplex frustra effigies) Columna, Cam. ep. & Cæs. Asclepias, uti & Lugd. qui duas unius plantę dat icones Primam scribitur Vincetoxicum live Asclepias Fuchfij; altera Vincetoxicum Matthioli. Matth. Fuchf. Montagnanę (cui & Herba Laurentij dicitur) Dod. gall. purg. & hist. Cam. hist. & ep. Cast. & Thal. Vincetoxicum.

Lob. Adv. Asclepias Vincetoxicum, qui invehitur in eos (iniquę) qui Asclepiadem regant. Sic & Dod. Vincetoxici descriptionem, & descriptioni Asclepiadis Diosc. conformem esse dicit, & tergiversari Matthiolum scribit. Sed exigui momenti ejus rationes. Radices (inquit) si se opponens Matthiolo odoratas & similes flores, maxime que locis montosis, nemo, cui in corruptum odoratis organum, esse negaverit: folia odore commendari, Dioscorides non asserit: non omnia *βαρυκόκκου* virus redolent, graveolentia enim omnibus haud aequę magna est: semen tamen non exquisitę quadrangulum, planā tamen oblongā que figurā, magnitudine item & colore satis Securigida refert. Voces *μυκηδ* & *μαλλ* omiffa quid Matthiolo conferre poterunt? folia hederacea sapenumērō longa, veluti Periclymeni & aliorum: & tenuis radicle frequenter multiplices.

Ger. Asclepias flore albo. Cam. h. Asclepias vulg. Asclep. fl. flore albo: flore candido, Hort. Lus. C. B. A. albo. Asclepias albo flore: Eid. apud Matth. Asclepias, Apocyno cognata herba, Dod. purg. & hist. Ger. & C. Bauh. Hederalic Ruellij, securę nimis. Hirundinaria, Brunf. Trag., Gesn. h. & Lon. Asclepias vulgi, Apocynum Dioscoridis, Col.

Asclepias floribus albicantibus, Vincetoxicum dicitur ab Officinis; Hirundinaria ab Herbariis; Ger. n. Schwälbenwurz: Belg. Swalawē worde: D. mare venen gall. Fuchf. Vixitrix toxici. It. Asclepiado & Vincetostis: Ang. Swallow wort & white Swallow wort; aut Swallow wort: Bohem. Hřivocik. Hung. Fehér szi. i. e. Hirundinis herba. Asclepias autem nominata est ab Esculapio, qui *ασκληπιός* Gręcis dicitur, antiquo Medicinę autore, juxta illud: *Inventum Medicinam cum est, opifexque per orbem* Dico. & *herbarum subiecta potentia mihi est.*

Hirundinarię nomen haud dubie sortita est, quod aculeę & apertę ejus siliquę cum candida lanugine volanti hirundini semē similes sint. Licet hæc ipsa Hirundinarię appellatio, ad Chelidonium & Numulariam quoque sit referenda, sed diverso respectu. Vincetoxicum, vel rectius *μυκηδονίου*, quod illi insignis adversus venena visus sit.

Nascitur in altis, areiosis que montibus & sylvis, in nonnullis etiam rupibus, in primis verō in culis ac desertis locis, Hircinia sylvā ad Mosellam & in V. Vasgovia. In sylvā ydar ut ante dictum reperitur 10. libras ponderans, autore Trago. Ceptiosissime nasci scribit Fuchf. in monte haud procul à Tübinga sito, in quo olim arx posita fuisse fertur, Augusto mense florens. Ego Asclepiadem Basileę vidi florentem mense Junio & Augusto in monte propē Leurach, cum seminibus in longis siliquis maturis: Montpelij & Lugduni florentem Maio & Junio: radix rarō hęcne moritur.

Eadem planē ex sententia Tragi facultates Hirundinaria obtinet, quas Aristolochia longa. Radix Aristolochie illius utilissima est evocandis mensibus mulierum. Potest verō intro sumi & foris quoque: tutō adhiberi. Radices Asclepiadis in vino decoctę & potę subveniunt torminibus. Arcet & hæc potio venenum nec cor petat, in iis præcipuē qui rabiosi canis, aliorum que venatorum animalium morsu infestati fuerint. Hęc radix pondere semilibrę per noctem in vino macerata, & deinde usque ad tertias decocta, manē jejuno stomacho calida pota, sudore interim provocato, mitiçę expellit aquam inter costas, ad eū illa per pedum plantas erumpat: estque hoc singulare experimentum. Mulieribus ad mensium provocationem magna efficacia in desolosis semper usurpata: matricis dolores juvat. Herba cum floribus tulā, mammis tumentibus cataplasmatibus instar imposita, tumorem deprimit. Pulvis ex herba & radice fordidis ac putridis ulceribus medetur non secus atque Aristolochia: potest etque hæc illius loco usurpari & illa viçes hujus obire, si alterutra desit. Radix pota ab iis, quorum in corporibus sanguis ex casu coagulatus est, eum educere totum per urinas creditur. Matthiolum Asclepiadem modatę calidam & siccam dicit. Marantha torminibus succurrere volens, ejus radicibus utitur: folia verō adversus vulvę, mammarumque ulcera, quę cacoethe vocantur, illinit: floris & seminis nullum esse utum tradit. Apud Fuchfium tamen contrarium scribitur, scilicet flores & folia siccata, mox trita vulneribus utiliter in spergi: fordida etiam ulcera purgare & ad cicatricem perducere, genitaliumque vitis, & rupturis egregiē mederi. Peste laborantibus hujus radicem in vino decoctam potamque commendat Tabernomontanus. Idem ex radice & herba recentia aquam distillat, ac cum syrupo de quin-

Asclepias Ruell. non est con. Tragus.

Asclepias ceterum non est con. Tragus.

Apocynon non est.

Asclepias in s. d. sum.

Asclepias H. Lugd. mot.

Herba Laurentij.

Lob. redarguitur. Dod. refertur.

Hederalis Ruellij an str. ambrosia.

Nomine linguar.

Asclepiadis Etym.

Hirundinaria.

Vincetoxici cum unde.

Locus et Tempus.

Virere. Aristolochie facultate.

Termina. Causa rabiosi morse.

Hydros.

Menstru.

Virere. Aristolochie subst.

Temperamentum.

Cacoethe. Marantha.

Virere. Pesse.

Sapientia. que radicibus calculosis propinat; cum Syr. verò de Artenuia retentis menftris laborantibus. Tandem etiam ex radice & herba fuccum exprimit in eodem ufus.

ASCLEPIAS FLORE NIGRO quorundam.

Defcr.



Asclepiadis faciunt speciem alteram, eam quæ folio Asclepiadis viuitur, nigrore, caulibus non suâ vixis, sed radice adnuniculo, cui se Periplocæ alicuius instar circumvolvitur, in altum conscendentibus ad duos, aut tres cubitos, in multas alas divisus: floribus multis ex aduersorum foliorum alis erumpentibus, Asclepiadis formâ, sed colore atris, atròve-rubentibus, umbilico videntante, quos cornicula excipiunt Asclepiadis, cui & radix similis.

Apocynum Digc. Dulch. & Lob. noc.

Dalechampius atque Lobelius (ait Columna, qui Apocynon Dioscoridis esse contendit) nullo facultatis facto periculo, quia planta hæc similis erat Asclepiadi, nisi quodd succum luteum, & flores haberet fucos, Asclepiadem esse scripserunt. Cur potius, cum similis sit etiam facie Apocynis aliis, & forsitan eadem cum Apocyno non repente, floribus tantum colore diversis, habeatque luteum succum, non Apocynum est denominanda? Infelix quidem est hominum natura, alienis erroribus supposita, quibus vitam cum morte commutari accidit. Huius quidem forma hæc est. Radice nititur fibrosa Asclepiadi non dissimili, viticulis flexilibus, lævibus, longis, quælibet sulcata, aut alia ipsi propinquas scandit non minus quam alterum Apocynum, quatuor cubita vel magis longitudine æquans extenditur, folia habet hederacea, mollia, viridia læuia, Asclepiadi similia, non nihil in summo acuminata: flores Apocyno repenti vulgari similes, sed colore pullo, parùm in purpureum vergente, quam obrem nigrum florem habere dicitur. Siliquas & semina papposa uti aliud vulgare Apocynum, compressa & nigra Augusto mense perficit. Succo turget luteo, ingrato, uti tota planta. Hanc nasci in collibus Montiphenensis sagri Frorigianæ vicinis, tradit Lobelius sub nigra Asclepiadis nomine, quod an rectè impostum sit jam demonstravi.

Defcr. Co. Linnæ.

Siliqua & femina.

Asclepias nigra.

Vincetox p nigro Hirund. p nigro.

Lacm. ex tempus. Vires.

Lug. Asclepias nigra Dalechampi. Cam. h. Asclepias flore nigro, subnubescente, pusillo; siliquâ tamen satis longâ, & priore Asclepiade grandiore: Herba anadendras. Eid. ep. Vincetoxicum flore nigro: Item ad Match. germ. Hirundinaria, vel Asclepias nigro flore. Tab. Asclepias 3. flore nigro. Ger. Clus. hist. & Hor. Jus. Asclepias si. nigro. Asclepias altera nigro flore, C.B. & Lob. Obs. & ic. cui & Periplocæ minor. Vincetoxici altera species, Dod. Est mihi radice perpetuâ in horto ex semine sato: floret Julio; Augusto siliquas fert. Inter plantas, quæ à vi, vel effectu nomen accepisse creditur, Columna & hæc cõnumerat, ideoque Apocynum Diosc. facit, huic illius vires attribuens, non sine errore, nec quidem iudice.

ASCLEPIAS CRETICA CLVSII.

Multis ab eadem radice virgis assurgit, lentis, flexilibus, gracilibus & viridibus, quas alterna ambiunt folia, vulgaris Asclepiadis folijs non dissimilia, bina ut plurimum, contrariis inter se pediculis nascuntia, dilutiùs virentia: inter quæ terni aut quaterni prodeunt flosculi brevibus petiolis nitentes, quinque pallidis foliolis constantes, quibus succedunt interdum singulares, nonnunquam geminæ siliquæ, breviores quàm in vulgari, sed crassiores, striatæ, bifido mucrone, continentes semen planum suâ lanugine involutum, perinde atque vulgari. Tota planta gravis est odoris buxum referentis.

Asclepiadem Creticam vocat Clus. hist. app. Asclepiadem: siliquâ bifido mucrone, C. Bauh. pin. Eam multis perniciosam esse deprehendebat autot, quando quidem illas floribus insidentes, enecatas reperiebat.

Pernicium maj. car. m.

ASCLEPIAS INDICA.



Asclepias hæc Indica, qualem hic depingi curavimus, pro Asclepiade Virgintana sive Vincetoxico Indiano, VV. la. sauck, à Gerardo Anglo lib. 2. c. 320. p. 752. primùm effigie expressa fuit & descripta. Quòd autem doleo, ejus historiam ex Gerardo adscribere non licuit, quòd præfatus autor, què fratri C. Bauhino mutuo communiticavi, ad præsentem horam nodum mihi redditus sit, sed

licentiosè nimis suppressus, dissimulatique. Est B. pia. Asclepias 4. ex Virginea.

FRUCTVS APOCYNII, SIVE generis alicujus Asclepiadis.

Fructum tertium, Batavorum mercatorum Amstelredamensium navigatione ex Java anno 1597. relatum, Apocyni, sive generis alicujus Asclepiadis fructum esse sibi persuadebat Clusius exot. l. 2. c. 15. Nam illorum siliquis per omnia similis erat, atque internè continebat planam, nigram seminam, candidam lanuginem involuta, perinde ac illorum siliquarum; membrana tamen quâ semen includebatur, longè densior & durior erat, ut magna ex parte, eorum fructuum, quæ illâ navigatione relati, cortices esse solebant.

Apocyni sive Asclepiadis fructus.

C. B. pin. Asclepias 5. sive Fructus Asclepiadis siliquæ similis, seminibus planis nigris: Fructus 3. è navigatione Batav. Clus. exot. l. 2. c. 15.

NERIVM SIVE RHODODENDRON flore rubro & albo. C. A. P. XIX.

Nerion arborea est planta, caudice recto, rectisque & firmis ramis bractæata, croceis seu ex viridi;

Defcr.



fidi pallescentibus: in quibus folia, multa, acuta, longa, unciam circiter lata, ut plurimum terna simul orientia, interdum bina, ubi rami dividuntur, transversū ferè digittum invicem distra, rigida, dura, crassa, & superiore parte atrovirentia ut Lauri folia; infernè magis, propter asperas hinc inde maculas, albidam, & succa; supremi rami in furculis al quot divaricantur, quibus insidēt flores multi simul

frondis honore, Rose similitudine, caulibus fruticosum: qui locus falsi suspectus est. Sunt qui legant Sabinè, hoc est lingua Sabinorum, quibus non accedit Hermolaus, huncque ejus loci sententiam esse ait, Rhododendron Sabinam herbam dici, cum tamen in Sabinis primum orta non videatur, ex ipso nomine quod Græcum est: Sciendum enim aliud fruticis genus Sabinam vocari, Græcè brathy. Planta verò est Lauri facie, non iniucunda spectatu, præsertim suis floribus ornata, quorum similitudine deceptus quondam L. Apuleius in Asinum mutatus, dum Rosas quæreret, quarum pastu in pristinam formam restitueretur, parum abfuit, quin imprudens eos devoraret. Verùm qui in plantarum Historia, & viribus cognoscendis diligentissimus fuerat, recordatus Nerij flores asinis venenum esse præsentaneum, statim labra substraxit, demissisque auribus abiit. Idem Lucianus sibi in asinum quoque transformato narrat accidisse. Sed Nerium ^{de quibus dicitur}, id est Laurum silvestre in vocat, perniciosum asino & equo cibum, cum afferant id comedentes eventigio mori.

Math. (cui in prioribus comm. siliquæ malè pictæ sunt, tanquam fortè ab eo nondum viderentur) Ca. nep. & hist. it. inque h. & Lugd. Nerion sive Rhododaphne, sive Rhododendron, Oleandrum vulgi, flore rubescens & albo. Matth. J. c. in mag. fig. Turn. (qui duas habet figuras frustra meo iudicio) Fuch. & Ang. cui & Oleander in Candia; Oleandro & Neandro Italorum quorundam, flore albo & rubro, sive roseo. Lon. (qui figuram malam exhibet: siliquæ enim deorsum nutant) Nerion, Rhododaphne, Laurus rosea. Trag. cuius figuræ non bene appiæta siliqua deorsum pendentes. uti etiam quondam in Fuchsiana) Nerion, qui idem Nerin Nicandro vocari ait. Lob. Adv. Nerion, Oleander, Laurus rosea, & Rhododendron purpureum & album: Eid. Obs. Nerion; Item, Nerion albis floribus: Icon Trag. Tab. hist. Nerion (Rhododendron addit in Icon.) Item Nerion floribus albis. Ego cum nullum discrimen noverim præter colorem, frustra ab his duas figuras poni existimo. B. pin. Nerion floribus rubescentibus: Nerion, Trag. Cord. in Diosc. Lob. Tab. flore rubro, Eyst. Nerium, Matth. Fuch. Dod. gall. Geln. h. Lac. Lon. Cast. Lugd. Rhododendron. Bellon. Geln. h. Dod. Rhododaphne, Geln. h. Caf. Eid. B. Nerion 2. floribus albis: Nerion candidis floribus in montis læ convallibus Bellon. Nerium sive Rhododendron flore albo, Eyst.

Nerium, in præd. dicitur, in Diosc. dicitur Græcis dicitur: Lat. Nerium, Rhododaphne, & Rhododendrum; Offic. & Barbaris Oleander; Ger. Olander; Vnholdenfraut; Rosenblumlein & Lorberrosen; Belg. Oleanderboom; Gall. Oleandre, Rose, ou Rose gine; It. Rosa Lauro & Oleandro; Hisp. Adelfa, sive Elendro; Ang. Olander; potest etiam vocari (inquit Tur.) Rose tree; aut Baye Rose tree. Afr. Nymphæ fortassis Nerij cymis Nerces nomen dederunt. apertius alij Rhododendrum, quasi Arborem Rosam; vel Rhododaphnem, i.e. Lauream Rosam, vocitarunt. Rhododaphnem (inquit Fuch.) Græci dixerunt à Rose floribus & Lauri foliis, quæ fruticis hujus præcipuæ sunt notæ. Nec refert quod Dioscorides Amygdalæ foliis ejus folia comparaverit: Lanro enim & Amygdalæ non dissimilis magnopere foliorum figura est. Fecit idem Rose flos & arbor, ut eadem gens Rhododendrum nominaverit.

Nasci in hortis arborum [et in montibus] & mariti. Locum. mis locis, & juxta flumina, author est Dioscorides: scater Nerio silvas in Ponto, quod propagine & semine feritur, prodidit Plinius. Vidit primum Matthiolum

es aut
mies
albis
qui d
ni
doda
e Diosc
una le
suspe
se nos
se corri
ose refri
m
hodosen
ron Plin

juncti, odori, pulcherrimè rubentes, quæli ferè colore Rose incarnatæ conspicuntur, aut albi, divisa quinque partita Clematidis daphnoidis; singulisque divisionis partibus internè adnata quædam trifurca appendix, in medio apices quinque simul juncti albi, pilosi: floris verò longi veluti calycis immum extrinsecus obvallat foliola intensè rubentia; siliquæ marcidis floribus succedunt, quales Apocyni vel Asclepiadis sursum præstantes, contrario scilicet situ ei quem Lon. & Tragi figura demonstrat, papposo semine plena.

Nerion quibusdam apud Diosc. Rhododaphne, aliis Rhododendron vocatum, frutex est notitiæ vulgaris, folia longiora [κακχότερα] crassioraque [εξ αμυγδαλῶν] habens, quàm Amygdalus. Læna lætion non placet cum legit, folia Amygdalo longiora vidi, sed non latiora: præstat igitur legeres, κακχότερα εἰς πικρῶτερα. ut habent alia exempl.] flos ad Rose similitudinem conformatum: fructum [καρπῶν. Miror Diosc. dicere καρπῶν εἰς πικρῶν αἰσῶν δὲ δα. in quo enim consistat similitudo non vidum mihi constat, & non siliquam, ut Sarrac.] similem Amygdalæ, velut cornu [ὡς κέραν. ὡς λέβητος] legum Cornu, seu potius ὡς κέρατον] & post aperturam plenum lanosâ naturâ, simili pappi Acanthis. [ἀκανθῆς] Sicut juxta vetusti codicis fidem legit Corn. Siquidem quod intra Nerij siliquam continet ur semen, lan. sili. scilicet albidum est implicitum, quales & ij sunt pappi, qui in Acanthio videntur. præstat ergo hac lætio, impræbat utque vulgaris, quæ dicitur ὡς κέρατον h. b. c. Radicem acuminatam, longam, lignosam, atque gustanti saluginosam. Hæc Dioscorides interprete meliori veteri codice. Rectè verò fructum intus lanâ quâdam referum dixit, spinarum seu Carduorum pappi simili, quæ in quibusdam Dioscorides exemplaribus falsò ὡς κέρατον similis esse legitur, cum Hyacinthus nullus profusus pappos habeat. Quare legendum ὡς κέρατον ὡς κέρατον, id est spinatum, seu Carduorum pappi, ut meliores codices, & ipsa experientia testantur. Similitudo fructus Nerij cum Amygdalo intelligenda profusus est, vel adhuc exiguâ siliquâ, & adolecentem, vel ob corticis viriditatem, & crassitiem, alioquin haud rectè adulta siliqua, angusta, oblonga, nullo subiecto duro & lignoso nucleo, lanuginosis tantum villis farta cum Amygdalo comparatur.

Rhododendros, inquit Plin. l. 24. c. 11. quia ne nomen quidem apud nos latum invenit, Rhododaphnen vocant, aut Nerium. Idem l. 16. cap. 20. ait, Et quamvis herba dicatur Sabina, Rhododendron, ut nomine apparet, à Græcis venit. Alij Nerion vocarunt, alij Rhododaphnen, sempiternum

thiolus ad Benaci ripas, & in Argentario promontorio in maritimis Senenſibus. Vtrumque (inquit Anguill.) in inſula Candia abundat, ſpontè proveniens, apud flumina, ibique vocatur *ῥοδον*. In Italia noſſima ſunt, ut Venetiſ in hortis. Circa Tripolim in Syria (ubi incolæ vocant Deſſe) Nerium ſpontaneum obſervavit Rauvvolff. Paſſim ad aquarum fluentia repetiri ſcribit Cam. in Creta, nonnullis quoque Galliz locis, item Genæv, & in Hetruria propè Libornuū. In montis Baldi parva inſula Monachorum minorum D. Franciſci abundanter provenit Nerium albis & rubris floribus ex faxis nudis propè aquam pullulans, teſtatur Pona. Copioſiſſimè provenit in tractu maritimo alpino & montoloſo Ligurię, inter Niceam & Genuam, cum ſiliquis, ait Lugdunenſis. Quo autem menſe floribus & fructu prægnans ſit Nerion, non ſatis Fuchſio conſtitit neque enim vel flores, vel fructus ejus ipſi videre contigit. Hinc eſt quod etiam pictura quam exhibet, iſdem careat. Montſepij vidi cum ſiliquis in Autumno, ubi abundat, & hyemem fert, & floret menſe Maio & Junio. Lugduni, ubi reponitur, Julio & Auguſto. Patavij cum ſiliquis Vere, ut in horto Bembi ſub tecto menſe Ianuario cum ſiliquis nondum maturis. Rhododendron, inquit Bellon. in nonnullis Cretę inſulis ad ædicularum trabes conſtituendas aptum eſt, cum aliqui parvum ſit.

Deſſe circa Tripolim.

Tempus.

Vives ex Dioſc.

Serpentium morſus.

Nerij mira virtus.

Galenus Dioſcoridi Et Plinio contrariis.

A Matth. conciliatur.

Conciliatio Cordis.

Error compoſitionis Eſdrę.

Dioſcorides tradit Nerij flores & folia mulis, aſinis, canibus, & quadrupedum plurimis venena eſſe, hominibus verò contra ſerpentium morſus conferre, è vino pota, eoque magis rutã additã. Imbecilles etiam animantes, ut pecus & capræ, ſi aquam bibant in qua folia ea manduerint, mori. Eadem planè tradit Plinius. Nerium jumentis, capriſque & ovibus venenum eſt. Item homini contra ſerpentium venena remedio: quã iterum alio loco repetit. Mirum folia Nerij quadrupedum venenum eſſe, homini verò contra ſerpentes præſidium, rutã additã, è vino pota. Pecus etiam & capræ, ſi aquam biberint, in qua folia ea manduerint, mori dicuntur. His maxime refragatur Galenus, ita ſcribès. Nerion aut Rhododaphne notus omnibus frutex, foris quidem illuſus digerendi vim obtinet: intro verò in corpus aſſumptus, pernicioſus ac venenoſus, non ſolum hominibus, ſed plerique etiam pecudibus eſt. At dicendum, inquit Matthiolus, Nerium ſumptum hominibus à ſerpentibus non demorſis pernicioſum eſſe, Dioſcoridis verò ſententia idem iſis remedio eſſe quos ſerpentes momorderint, quã ratione Canthaüdes auctore Avicennã, à cane rabido demorſis medentur, & Euphorbiũ à Scorpione iſtis, alia denique lethalia medicamenta aliis venenis adverſantur. Cordus alio modo conciliari poſſe hos auctores ſcripſit. Si intra corpus ſumatur Nerium venenum eſſe, ſi foris imponatur, contra venenatorum morſum auxiliari. Sed revera Nerium intro ſumptum contra ſerpentium morſus opitulari Dioſcorides intellexit: fideliora enim exemplaria habent *ῥοδον* in *ῥοδον*, cum vino pota, videlicet flores & folia. Sic etiam in Plinio perſpicuè legitur, qui procul dubio videtur hec ex Dioſcoride trãſcripſiſſe. Præterea in Eſdrę antidotum, cujus contra venena animalia præcipuus eſt uſus, flores Nerij recipiuntur: cuj medicamentum contra venena efficaci. In hæc verò apud Aëtium, & Paulum compoſitione Eſdrę, malè legimus flores Nerij, deinde paulò poſt, Roſe Rhododaphnes. Nerion enim & Rhododaphne idem eſt frutex, & Roſe Rhododaphnes nihil aliud ſunt, quàm flores Nerij: Interpretatio Roſarum Rhod. daphnes, quæ in margina rotata, ab aliquo indocto in contextu inſerta eſt. Id tamen verum eſſe tradit Cordus florem Nerij in ſaniam parere, ſed non ſemper: accidere enim in quibusdam lo-

cis, & quibusdam temporibus, arborẽque quibusdam temporibus venenatam eſſe, ex cujus & Acorniti floribus in Ponto venenatum melapes colligant. Scribit etiam Galenus athletarum dorſum Rhododaphnis vellicari. *ῥοδον* ad aquas calidas in *ῥοδον* dicitur. Cæterum Bachanellus in ſuo conſenſu de cognof. ſimpl. contrarius Dioſc. & Plinio eandem cum Cordo diſtinctionem adhibet. Ego quomodo conciliandus ſit Gal: & Paulus cum Dioſc. & Plinio, hæreo, ſi Matthioli ratiocinatio non recipitur. Du n porò ſcribit Dioſc. Nerion è vino potum, rutã additã hominibus contra morſus ſerpentium præſidium eſſe: Tragus eas facultates non ipſi Nerio, quin potius Rutæ attribuit. Sed ſi Nerium vina non habet reſiſtendi ſerpentium morſibus, ſed tantum rutã efficit, fruſtra ad id probatur à Dioſcoride: fruſtra etiam admiratur Plinius vim illam. Quicquid ſit conſulimus omitendum uſum internum medicamenti dubij, ne in jaſtura vaſis artem figulinam faciamus.

A statua de conciliatio

Tragus

NERII FACIE ARBOR.



Nerij facie arbori propendent ſiliquæ de ramis & furculis, Sâbuci paluſtris, medulloſis, pallidis, pullis, nodofis, ſcl- quipalmum & pedem lögis vaginis, cutaceti, uno cohaeſu ſeptenis aut novenis, ſingulis gracilem Lampetram effigiantibus: intilis ſarcinatur pelliculis ceptacis & tomentofis, aded exuvium ſerpentis emententibus, & quiddam cadaveruli anguini ſimile involuentibus, ut

pueris horrore ſit & illudat: conſimili ſorum exorto oblongi exeunt calculi, herbæ Sanctæ, aut Strammonia.

Lob. adv. & ic. Nerij facie arbor, ut & Lugd. apud quem tamen utulus tranſ- oſitus eſt incuria typographi. Eſt enim Palmaceæ pinnae ſpinofe adſcriptus, de qua egi lib. 1. ad finem. Tab. Nerio ſimilis arbor: ſic & B. pin. cui etiam Nerion 3.

Diſcr.

Incuria typographi. Eſt enim in Lugd. ſtræ. ſpoſita.

NERII SILIQVÆ EFFIGIE, Kaye Baka.

Teres, inſtãque minimi digiti craſſitudinem erat fructus, qui integer, ſex unciarum longitudinem ſuperalle videbatur, immaturæ Nerij ſiliquæ formam quodammodo referens, denſo cortice præditus, ſi rufus rugoſo ſtriatoque, & veluti innumeris tuberculis obſito, in ſtar onagricæ pellis ſive corij è quo vaginas ſuis cultellis & acinacibus excipiendis tegunt Turcæ, nigro alioqui, niſi ea parte quæ pediculo proxima, illa enim ruſſa erat: an ſemina contineret, mihi (inquit Cluſ. ex ot. l. 3. c. 19.) ſincompertum, ſed pulpam admodum duram, & quæ vix cultelli mucrone eximi poſſet, in eo obſervabam, quæ ſubacidi ſaporis erat. Huc fruſum oſtendebat Theodoricus Cluſius, Lugduni Batavorum. Similem poſte a

Diſcr.



postea à Bernardo paludano accipiebam, quem dum per longitudinem secare vellem, vt quid còtineret obseruarem, corrumpebam, quàm aded solidus esset, ut frāgetetur citius & in partes disiliret, q̄ scissuram admitteretā contracti tamen paticulis, lanuginem quasdam obseruabam, illi nō valdè dissimile, quæ in Nerij siliquis cōspicitur. Similem etiam Amstelredami videbam: eum Abdala Guzarate oriū-

101. dus, illā nauigatione, ut dixi aduectus, Kaye baka appellari aiebat, atque, dum recens est, edulem esse affirmabat. C.B.pin. Nerion 4. sive Fructus Nerij siliquæ figurā.

VITIS ALBA SIVE BRYONIA. CAP. XX.



Rachialem in- terdum crassitudinem radix a- dipiscitur alba (ex- ficcata similis Me- choacæ: circulos enim habet, verūm differt quidd sit fungosa, sapore acri, amaro & vi- rolo) unde flagella exiit tenera, striata, subhirsuta, quæ longè latèq; clavi- cularum usq; benefi- cio se spargunt & proxima quæque scandunt: folia he- deracea, angulosa, hirsuta, incana, vi- ridantia, aut aetis cādidis discurren-

tibus undulata ut in Cretica quam vocant recentio- res; ex foliorum alis flores simul aliquot iuncti, è quinque foliis compositi exeunt, colore albo in herbaceum languente, quibus succedunt acini sambucinis pates, per maturitatem rubri, succo croceo, nauseoso, granulisque turgentibus.

Vulgarem porò Bryoniam esse veram Dioscori- dis Vitem albam patet ex multis notis, quas ei Dio- scorides assignat, tam aptè coherentibus, ut qui per campos spatiaretur, illam primo occurrit facile cog- nosceret. immò & Dioscoridi gratiam habere de- beret, quippe qui effodiendæ radicis tam vastæ la- borem nobis eriperit. nam qui cognoscere solum hanc plantam affectat, ut eum opus sit, usui adaptet, satis supèrque esse possint notæ à foliis, à viticulis, à pampinis, à fructibus, à nascendi, & crescendi mo- do, alijsq; quibuldam: qui verò ad medendum eam accipere intendat, poterit radicem (si hac uti volet) effodere. nam multus pollere remedijs hanc, vel ipse Dioscorides docet. Quia autem eos qui vulgare n

Bryonia non esse veram Dioscoridis Vitem al- bam argumentantur ex hoc, quòd notatu dignam notam non appofuerit, nempe radicem: quam ob nimiam magnitudinem non reliquisset, si vera esset; stultus esse dicit Marantha, placet veterum de Bryo- nia hic subscribere historiam, quo veritas magis eluceat.

Hippocrates passim, præsertim in voce πῶς ἐξο- γήσονται πῶς οὖν - utitur, quam Galin exegit apud eundem Hipp. Bryoniam albam [πῶς λευκὴς Bryoniu] exponit, & rectè meo iudicio, sed ἐξήγησονται quidam vitiosè leg- unt. Vitis albæ [λευκὴ - λευκὴ] quam aliqui εὐρω- Vitis alba Diose. rian, alij ἰσοστάφυλοι, alij χελιδόνια, alij μηλωδρον, alij λευκὸν, alij ἀργύρεον, ἀγροστυ, aut κεδρωστυ, referent Dioscoride, nominarunt, sarmenta, folia, & tortiles pampinis [πῶς κλημαται, ἢ τὰ φύλλα, ἢ ὅς (forte ài sarrac.) λευκίς] lativæ Viti similia sunt, sed omnia hirsutiora. Vicinis verò fructibus implicat sese, illos suis clavi- culis ample ætens fructum autem habet tacemosum, silyum [rubente in cal.] quo quidem coria depilan- tur. Quod autem Diose. in hac sua descriptione, ra- Diose. lectio dibus. dicitur, ut aliàs facere solet, & paulò post in Vite nigra facit, non meminerit, suspicatur Cornarius radicis vocem in Diose. elapsam esse, & quidem ante verba πῶς οὖν ἢ ἀσπύργου, ut è radice exeuntes asparago accipiamus. Notandum porò, nomina supra dicta Favor mul. in Dioscor. lectione retinere quosdam, ut Hermol. 107. in Corn. Sarrac. & alios: quosdam verò rejicere, ut Ruellium, C. salpinum, & nonnullos alios. Non aut- Melothron Theophr. tem esse rescindenda patet ex Theophrasto, qui inter fissurites Bryoniam hanc Melothrum vocat, ei fru- ctum Similac similem assignans.

Plinius quoq; de Vite alba scribens, ait à Græcis Plin de Vi- Ampeloleucen, ab alijs Ophioleucon, alijs Melo- te alba. thron, alijs Ptilothrum, alijs Archezostin, alijs Cedro- stein, alijs Madon appellari; bujus sarmenta longis & exilibus internodijs geniculata scandere; folijs pam- pinosa ad magnitudinem Ederæ, dividi ut Vitium, radicem albam, grandem, Raphano similem initijs; Radice Ra- ex ea caules Asparagi similitudine exire; semen in phans. uva raris acinis dependere succo rubente, postea Croci [Crocin legit exemplar Cornary] Novis id, qui coria perficiant, illo enim uti eos.

Apuleius cap. 65. non contentus recitatis nomi- Apuleius de Bryonia. nibus, plura adscribit: Græci, inquit, Bryoniam, Che- lidonium, & Melothron, & Archezostin sive Apia- stellum; Itali Vvam taminiam, Vitem albam, Agrifolium, Dentariam; Ægyptij Thidona, Dardiadana; Syri Hugadesii, Dinupria; Daci Docklea appellavê- re. Herba virgultis atque folijs & corymbis ut vini- fera Vitis, sed omnibus hirtis, quæ se colligat vicinis fructibus, fructu sive semine botruoso, longo, raro, Fructus bo- sulvo, quo etiam tergora depilantur, thyrsos emit- truo/an- tens primâ informatione è radice quæ sunt aspara- gis similes. Humelbergio Bryonia hac est quæ alio nomine Ampeloleuce, i. e. Vitis alba vocatur, Vitis alba. Teutonice Schmerwurz. Est autem græca appel- latio Bryonia, sic dicta, à verbo βρυον quod est extol- lo & exalto, eo quidd in propinquos frutices scan- dente dicta. Chelido- nium. nium.

melothron appellari videtur à coriorum concinnatione. Nam Græci μηλωδρον vocant ἐλιμαστυ & κηλοποικαστυ i. e. colorum in- sectiones & concinnationes: quod coris fortè ex Bryonia albæ fructu accedebat. Archezostin dicitur Archezostin quasi princeps cingulum: Ζῶνι enim græcè, latinè cingulum est, ἀρχὴ princeps. Sic appellatum quòd inter alia principaliter propinquos frutices cingit, & implorando comprehendat. Apiastel- Apiastel- lum. inum.

man habere videtur & causam, ab herba, quæ Græcis Apios, montana, aut agrestis Raphanus dicitur, de qua suo capite Dioscorides agit, idque quoniam radix Raphano similis est initio, alba & grandis, ut ait. Sed nos longè aliud censemus, utpote, dictio nem esse corruptam ex ea, quæ est Ophiostaphylon, quod latinè interpretatur uva anguina, cuius nominis ratio & causa est, quòd in sepibus, ubi & angues plerumque latent, vitigino folio & acinoso fructu nascitur. Vix tamen appellatio Bryoniae accessit ex pediculari pituitariaque vocata herba, quam Græci Staphida agria vocat, & propriè à Romanis Vva taminea appellatur, licet Plinius cõtra Celsum Vvam tamineam aliam dicat esse à Staphide agria. Ceterum, suspicamur nos hoc loco non Vvam tamineam, sed anguinam potius esse legendum, ut respondeat græcæ appellationi, quæ est Ophiostaphyle, & Vva anguinalatirè interpretatur, de quodidum est in dictione priore Apia stellum. A radicis colore candido, & à viticulis, foliis, claviculisq; vinifera Viti similibus, & fructu racemoso, dicta est Vitis alba. Dentaria dicta videtur, quòd quemadmodum reliqua ossa fracta, sic etiam dentes imposta extrahat. Quidam (addit Heimol.) Ptilothrum dicunt, quia pelles corfici huius acinis quemadmodum & Labrutæ possint. Vulgus teste Ruellio, quod per dumos serpat, Colubrinam vocat. Alij apud Cornarium ob fructum eius sulvum Cerasa Diaboli (Cusselsurfsen) appellant.

Ophiostaphyle
Vva anguina

Vva taminea

Vitis alba
Dentaria

Colubrina
Cerasa
diaboli

Vitis nigra
Eunselio

Fesirensis

Quotquot rei herbaria, ut quod Tragus, extant scriptores Bryoniam hanc ad Vitem relictur altam Dioscoridis excepto Brunfelsio, qui in Orchematico suo Vitem nigram Dioscoridis, veram esse Bryoniam pehibet. Huic aspiulatour & Simon Ianverfis atque Fesirensis, h. e. Bryoniam esse nigram, & non albam Vitem. Diversum sentiunt & Avicenna & Mesues, nec non Iacobus Manlius, qui dicit Fesire Vitem esse albam, ac albis vocari, Alphefera, Alhazarah, Hezeriazem, & Tanorus. In Mattheo Sylvatico Fesiera & Viticella, Germ. Wildrüben/ h. e. Rapum silvestre; Wilden Zitwen/ zedoaria sylv. & undersüben/ cucumis caninus, & Cusselsurfsen/ Caccadonoris Cerasum; In Theophrasto pauperum, quod Dodon. addit, Rorastrum appellatur.

Bryoniam hanc ob radicis candorem albam, eandemque propter acinotum ruborem, ruffam cognominare, non absurdum esse pehibet Cordus in hist. ubi eam differre à nigra scribit, quòd acinos rubentes habeat, & radicem tam foris, quam intus caridiorum; quòd succum nigrae radicis habeat paulò viscosiorem, eam quidem eandem sit cum illa qualitatibus, sed efficaciorum. Viticellam [Balsaminam] eandem facit cum Bryonia Eur. Cordus contra vulgares herbarios, qui eas metidè separant. Confundit Cornarius duas admodum diversas plantas, figurat & temperamento, dum dicit, Vitè albam, Labruticam, calidam esse & humidam 2. gradu. Galenus enim 1. de comp. pharm. sec. loc. *ἡ βρυονία* & sequentia separatim, tanquam diversa commemorat: nec malè Sarraceni iudicio, quare quidem ipsemet rursus 6. simpl. Vitem nigram propnè *βρυονία* vocari scribat: quod ipsum Plin. lib. 24. 1. admonet.

Bryonia
alba sive
ruffa
Diff. Bryonia
nigra Cor
do.

Viticella
Eur Cord
Error eius
dem
Error Cor
narij
Labrutica

Synon.
Ignis ar
dens
Bryonia
Bryonia
alba

Vitis alba
ampeloleuce
& ucurbita
siv

Galeno, Marcello, Matth. Ryffio (qui autor est Gallis Ignem ardentem, *de feu ardent*, dicit) Trag. Lugd. Tab. Cam. ep. & hist. 1. ob. Geff. h. Bryonia. Coid. hist. 1. onic. Dod. Thal. Bryoria alba. Diosc. Plin. Ruell. Corn. Fuchf. Math. Arg. Lac. Cord. in Diosc. 1. ob. Cast. Lug. Tur. Cam. ep. & hist. Vitis alba, sylvestris. Diosc. Galen. Hermol. (cui & Bivonias Columella) Ampeloleuce. Matth. Vitis alba est sic. P. yonia ferbar. vulgò multierularum Cucurbita sylvestris: Cam. li. Bryoria bacis rubris. Deme. Const. Agriostaphis alba. E. phy. & apud Matt.

Bryonia 1. sive alba bacis rubris, seu Vitis alba Dioscoridis: Eid. pin. Bryoria naspera sive alba bacis rubris. Schv. Bryoniam *ἡ βρυονία* (Diosc.) confundit cum Bryonia bacis nigricantibus, quam etiam albam cognominat, sine ratione. Alphonf. Morefch. Vitis sylv. vel Bryonia sylvestris.

Bryonia
Bryonia
Bryonia

Ceterum communiter Vitis alba ab officin. & Herb. Bryonia nominatur, quam Græci *ἡ βρυονία* descriperunt, Maurit. Fesire, Alsefira, Fesslera, seu Alsefira, Nezarziesan seu Nezarzabesen; Germ. Stidwurz/ Gidhwurz/ Zauwreben/ Gidwreben/ Zundwreben/ & Cord. in Diosc. Zundwreben/ Schidwurz/ Baidwurz/ Romschreben/ Wilder Zitwen/ & Teuffelsurfsen/ Weysweimab/ Lon. Belg. Bryonie; Gall. Colucure, Colubrine, ou Feu ardent uti dictum: Ital. Vite bianca, Bryonia, & quod non placet Zucca salutaris: Hisp. Nezza & Anora: Angl. Bryonie/ Wilde wyne & Wilde Kopper: Hung. Fedi tok. h. e. Terrea Cucurbita. Boh. Pefed.

Nomen
linguarum
Comitatus
Tempus

Quod poterat à legentibus in hujus Bryoniae historia desiderari: quos scilicet natales habeat, & quibus locis inveniendi sit, id Columella Romanus scripor in carmine suo explevit, dicens:

Quaque tuas andax imitatur Nysie vitis:
Nec metuit senes: nam vepribus impra, ba surgens
Ahradas indomiti sique Bryoniam alligat ulmos.

Bacchi vitibus similem & in sepibus spinas & aculeatos fructus alligantem descibens: quæ tota serè est candida: in hoc scriptore Bryonia historia. Moruit illud ebiter etiam Romanus ille auðor consuevisse veteres ob quotidianum & multiplicem ejus ad vitæ remedia usum: Silvestrem alioquin stipitem in hortis conserere ne cogenter in cultis locis & inter sepes querere, quod non in hortis tamen utile esset: sed in fanitatis usu simplex & sale servatum etiam placeret. Plurimam nasci tradit Cordus in VVirttembergensi Suevia atque Romana provincia. Multis in Belgicis locis reperitur. Floret Æstate, Autumno suo dum producit. Montelpardi ptovient propè urbem variis in locis, propè Adircourt, inter Vangeincourt & Dampiere propè fontem. Monspelij, Paravij, Genevæ floret Maio; Bastilea propè S. Iacobum & extra portam S. Albani Junio, & Julio.

Locus
Tempus

Bryoniae radicem foris cineritiam, intus albicantem, amplam, consummatam Veris initio colligit Sylvius.

Delectatio
Celle
tempus

Vites & usus.

Hippocrates variis in locis Bryoniae albae radicem ad uteri morbos, ejusdemque ulceram acria & in inflammationem commendat. Hanc sequitur Ruell. cent. 1. cur. 99. in matricis dolore, motu & præfocatione. Ioh. Liebau ad fluorem uterini album accipit Bryoniae radicem [oleum] recentem, excavat & replet oleo Liliortum, teponit loco calido, per diem & noctem, donec totum oleum absorbeat, exprimit, colat, & calidè in uterum injicit. Diosc. Vitis alba asparagi primâ geminatione prodeuntes eduntur costè unam & album montes. Vim habent & fructus, & radix acris. Vnde in Chionis, & gamparicis, & pbagedanicis, & putridis tistarum ulceribus, cum sale inposita *ἡ βρυονία* acriter purgant. Radix autem extergit ac erugat. Maculas item solares, varos, lertigines, cicatrices nigras, cum Ervo & terra Chia, & Fenograceo depurgat. Eadem cum oleo doreæ flaccida fiat, ad eandem facit. Tollit & sugillata & pterygia in digitis contrahit. At [oleum] inposita cum vino in inflammationes discunt, & abcessus rumpit. Educti & ossa, trita inposita: & erodentibus medicamentis commedè amiscetur. Bibitur eadem ad morbum comitialem dorchmæ pondere quotidie per annum. Prodest & syderatis & vertiginosis, similiter accepta.

Morbi

Asparagi
nonelli
nam
cum
cent. dist.

Maculae

Sugillata
inflammatio
ssa edunt

Comitatus
morbis

Verum duarum drachmarum pondere pota, com-
moris à vipera auxiliatur, & factus enecat. Ali-
quando verò mentem turbat aliquantulum. Et urina-
nas movet pota. Apposita verò utero, & fetus & se-
cundas trahit. Sed & eclegia ex ipsa cum melle da-
tur his qui suffocantur, difficulter spirantibus, tus-
sientibus, latus dolentibus, ruptis & vulsis. Ace-
nem liquat trium obolorum pondere, cum aceto ad
dies 30. pota. Imponitur etiam commodè cum fico
ad eadem. Decoquitur ad infessus, ut quæ uterum
purgat, & abortum procurat. Succus è radice collig-
gitur Vere. Bibitur hic cum aqua mulsâ ad eadem,
ducens & pituitam. Fructus facit ad scabiem & leu-
pram, tum illitus, tum impostus. Attrahit lac suc-
cus ipsius fructus [Aur. de veteris codex, Lac.] cum triti-
co cocto absorptus. Hæc Dioleorides. Ex quibus il-
lud quod scribit attrahere lac, intelligimus purgan-
do, sive retrahendo à mammillis, non autem abun-
dantiam lactis facere ut Plinius tradit. Qui enim fac-
ceret lac vitosa & maligna hæc planta, nisi per acci-
dens repurgando malè affectas morbidasve nutri-
ces? Asparagorum Bryonia usum contra Dioleorides. Plini-
um & Galenum in cibis non probamus nisi affu-
mantur loco medicamenti & ad evacuationem alvi,
quæ fortè moderatior si subsequatur, nõ propterea
dixerimus cū Galeno factidam hanc plantã edulium
stomacho acceptum: quod etiam non placuit Do-
donæo, ut postea dicitur. Cæterum, Plinii verba
hæc sunt. Caules Asparagi similitudine decocti in
cibo alvus & urinae cient. Folia & caules exulce-
rant corporis, utique ulcerum phagedænis & gangre-
nis, tibi arumque tædio cum sale illinuntur. Novère
seminis succum qui coria perficiunt, illo enim un-
tuntur. Pforis & lepris illinuntur. Lactis abundan-
tiam facit coctum cum tritico, potumque. Radix nu-
merosis utilitatibus nobilis, contra serpentium ictus
tritã drachmis duabus bibitur. Vitia cutis in facie
variosque & lentiginis, & fugillata emendat & cicat-
rices. Eademque prætat decocta in oleo. Decocta
datur [præstat in oleo decoctã. Datur & Corn.] & comiti-
tibus potus: item mente commotus, & vertigine
laborantibus drachmâ pondere quotidie uno to-
to. Et ipsa autem largior aliquanto sensus purgat
[turbat censes legendum Corn. ut habet Diosc.] Illa vis
præclara, quod ossa infracta extrahit in aqua imposi-
ta. Herba Brionia, inquit Apuleius, in cibo data
lienosis, per urinam lienem digerit & emendat.
Hæc herba tam laudabilis est, ut in thieraces etiam
compositiones mittatur. Item si in capite, vel in cin-
ctu eam tecum portaveris, nulla mala te cõtinent.
Ampelileuces, auctore Galeno 6. simpl. prima qui-
dem germina ab omnibus pro more edi Vere so-
lent, utpote edulium stomacho, propter adstrictio-
nem acceptum: sed & subamara sunt & modicè a-
crem adstrictio nem possident: quare & urinam mo-
dicè cient. At radix & abstergentem & desiccantem
vim habet, & moderatè [moderatè ubique legitur, sed
necesse sit dicitur] calidam: quam obrem & lienis
induratos liquat tum epota, tum foris cum ficibus
imposita: & pforam & lepram sanat. Porrò fructus
ejus racemi speciem præ se ferens, iis qui coria de-
plant, est utilis. Scribit Dod. facultate Bryoniam
albam omnibus suis partibus calidam & siccam esse
tertium præsertim caloris gradum excedentem, cum
expurgandi vi potentissima, per quam non modo
biliosos ac pituitosos, sed & aquosos humores edu-
cat. Galenum notat in eo quòd ab omnibus pro mo-
re per Ver edi, eduliumque, esse stomacho propter ad-
strictio nem gratiam dicit de Vitis silvestris sive Ta-
mi asparagis, sed nequaquam de hujus Bryoniae ger-
minibus veritatem habere asserit: albæ enim Bryo-
niæ asparagos, sive prima germina nequaquam ad-
stringere, sed alvum vehementius commovere, sto-

Tom. II.

machoque gravem molestiam inferre: Dioscoridem
quoque scribentem corrigi, radici succum Vere ex-
primi. bibique cum aqua mulsâ, pituitamque ducere: du-
cere autem addit, non modo succum, sed & radicis
decoctû, pituitam, bilem flavam, ac serosos aquosol-
que humores, & quidem validissimè, unaque ven-
triculum ita sæpenumero perturbare, ut & eisdem
vomitione reddi procuret. conferre ejusmodi vehe-
mentem purgationem hydropicis posse, & quos
comitialis morbus, aut capitis diuturnæ & pertinac-
es vertigines detinent: sed tamen epilepticis non
quotidie, ut Dioscorides monet, exhibendas: subin-
de etenim dedisse satis fore molestum: validè enim
esse remedium, violenter purgans, & nature vim in-
ferens. Plinium denique taxat, qui lactis abundan-
tiam facere scribit: videri enim magis lactis genera-
tioni adversari, quòd acris sit, & eo velleræ ac coria-
teste Diosc. depilentur. Præter quæ omnia hæc ad-
dit Mesues: Ex succo Bryoniae, melle & vino ana, sic
potio ad strumas experta, & emplastrum ex ipsius
radice & melle, eandem delet. Ex Bryonia medica-
mentum à Democrito compositum apertè efficac-
ad epilepsiam, paralyfin, vertiginem, & cæteros affe-
ctus frigidis cerebri, spinalis medullæ, & ortorum
inde utrinque nervorum, accipit radicis Bryoniae
mundatæ & tritæ lb. s. sapa uvarum passarum lb. iij.
squilla assatæ, strobilorum purgatorum añ. ʒ. j. b.
nucis moschata, Cardamomi, Macis, Zingiberis añ.
ʒ. ij. Caryophyllorum, Piperis longi, Stoechados
añ. ʒ. j. b. Sefelios, Salis gemmæ, Galliae añ. ʒ. j. spica
ʒ. b. Agarici ʒ. ij. Datur post sex menses à ʒ. ij. ad ʒ. v.
Idem accipit succi Bryoniae ʒ. v. Aceti scillini lb. j. a-
quæ coctionis Origani, Hypsipici, Lybiftici, Sefelios,
Cardamomi, Stoechados añ. ʒ. j. Sape uvarum
passarum lb. s. Mellis lb. ij. facitque syrupum idem
pollentem, quod prior compositio, si detur uncis
duabus. Ex succo ejusdem & sapa uvarum passarum
eclegma ad tussim & asthma efficac silius Zezar cõ-
ponit. datur autem radix Bryoniae ab auro uno ad
aureos duos: succus autem à ʒ. j. ad ʒ. ij. Quendam
epilepsia curatum esse tribus septimanis, solummodo
purgando se succo Bryoniae depurato, addito
paucò saccharo legitur apud Arnold. de Villanova.
Magni sit à quibusdam radix ad arthritidem, quam
sectam macerat in aqua Vitæ deinde distillant, lin-
tea madefacta in aqua calida imponunt parti dolen-
ti. Bayrus, radicè terit, & circa collum ligat, ac sic epi-
lepsia tollit, & spasmi sanat. Idem fructu fricato pi-
los removet. Neutram Bryoniam esse in usu ad pur-
gandum asserit Fallopius, sed solùm cum lenienda
alvus sit, inunctionem ex oleo radicis Bryoniae con-
venire. Sed quæ vera scribat, patet ex hætenus dictis.
Ei præterea refragatur Mesues, qui Vitam albã inter
sua medicamenta dejectoria reposuit, & de ea hæc
ad sèsum scripsit. Vitis silvestris, quòd hausta, quem-
admodum & Dracunculus vetriculo, & jecinori no-
xam inferat, danda non est, nisi aromatum pulvere
permissa, aut addito mastiche, Cydoniis malis, aut
aliis adstringentibus, roborantibusque medicamentis.
Succus è contrita radice expressis pituita eicit, uri-
nã remorantè trahit, & cerebrũ mundat, quin etiam
pectus, & nervos à pituitosis, putridisque excrementis
liberat, viscerũ obstructions aperit, renes à calculis
expedit subvenit itè vertiginosis, comitialibusque.
Prætat opem minificè tussientibus: & induratos tu-
mores resolvit, præsertim lienis, si cum vino & ficu-
bus tusa radix illinatur. Mèstrua elicit, & universum
purgat uterum, atque etiam fetum expellit, si in ejus
decocto insideant semina. Succus fabarum, aut ci-
cerum farinã exceptus, maculas in facie, & vulne-
rum cicatrices emendat, linimenti modo adhibitus.
Oleum excavatis ejus radicibus immisissum, ciner-
ibusque incoctum, fugillata delet. Præterea mulieres

N

Vetri frangulatus.

vulvæ strangulationibus obnoxias mirum in modum juvat, aded ut eas à strangulatu liberet, & sanet. Equidem novi (inquit Matth.) mulierem quotidie ferè per plures annos hoc morbo vexatam, quæ tandem à quodam vulgari herbario edocta, ut vinum album biberet, in quo Vitis albæ radicis uncia effuberisset dormitum itura semel in hebdomada, cum hac medicinâ petannum usâ fuisse, optimè ex illo morbo convaluit. Cæterùm non placet ad dyfenteriam decoctum Bryoniæ, cuiusdam Empirici, cum Thymbra aromatica potum. Mulcò minus aridet phantasia Portæ phyt. l. 3. c. 17. dicentis, Bryonia ex pallido albescens flores habens, pituita emendat: Item, radix eisdem lactescens ostendit cauliculis cum tritico coctos, potòsque, lactis abundantiam facere. Retulit Io. Stoffelius, radicem Bryoniæ

Empirici cuiusdam phantasia. Et Portæ.

Succi colligendi ratio.

si quis summâ tellure refecerit, partem verò reliquam terræ in hærentem excavaverit, amputatamque partem superiorem, tanquam operculum rursum imposerit (cavendo ne quid pulveris foridumque terrestrii in cavû incidat) postero die detegendo cavû illud succo quodam lacteo plenu, etiam ad tertium usque diem reperiri. Hujus succi cochleat unum propinatum, clementer per inferiora, sæliciterque purgata quemlibet hominem. Agyrtæ nonnulli mira quedam monstra ex hac radice effingunt, quæ cum aliquot dies sicca arena mandaverint, pro Mandragoris postea distrahunt; alij immaniter per illam homines purgant, Tragus.

Vires et desis.

Mandragora adultæ.

si quis summâ tellure refecerit, partem verò reliquam terræ in hærentem excavaverit, amputatamque partem superiorem, tanquam operculum rursum imposerit (cavendo ne quid pulveris foridumque terrestrii in cavû incidat) postero die detegendo cavû illud succo quodam lacteo plenu, etiam ad tertium usque diem reperiri. Hujus succi cochleat unum propinatum, clementer per inferiora, sæliciterque purgata quemlibet hominem. Agyrtæ nonnulli mira quedam monstra ex hac radice effingunt, quæ cum aliquot dies sicca arena mandaverint, pro Mandragoris postea distrahunt; alij immaniter per illam homines purgant, Tragus.

BRYONIA ALBA MACVLATA.

Deser.

E Semine misso à D. Jacobo Zvingeto pro Bryonia Cretica provenit mihi planta Montbelgardi in hotto E.C. radice magnâ, albâ, viticulis, foliis (in quibus tamen sunt maculæ albæ) & floribus ac uvis similis vulgari jam descriptæ. De hac ferat C. Bauh. Radice est longâ, altè descendente (amplâ, Rapæ modò, dixerat apud Matth.) sed ad vulgaris magnitudinem non accedente, fusco cortice tectâ (quæ forinsecus cum vulgari convenit, verùm intrinsecus candida, nec circularibus lineis prædita) ex qua longa & tenuia sarmenta prodeunt, quæ ambiunt folia aspera (qualis & tota planta) ad similitudinem Vitium, aut Bryoniæ vulgaris divisa, sed minora, viridia, albis striis per medium discurrentibus, vel maculis albis notata, quibus capreoli ut in Vite adduntur. Flores habet pallidos, quinquefolios, striatos, vulgaris Bryoniæ floribus majores, ex longis pediculis propendentes: cuilibet flori, fructus succedit semicircularis, sup ernè in partes duas divisus, viridis primum, at per maturitatem ruber, (qui vulgaris fructui major est, aliquando unicus, aliquando plurimus, ex longo pediculo dependens, aiebat apud Matth.) semina duo continens, quare dicoccos appellari potest. Hæc ille, cui dicitur in phyt. & apud Matth. Bryonia, sive maculata, à vulgari differens, quod minor sit, & folia per medium albis striis notentur: In prod. Bryonia 1. In pin. 2. Cretica maculata: Bryonia dicoccos, frequentissimè in Creta proveniens, elegans, & ab aliis alibi natis differens: Bryonia Cretica, Pona Italico.

C. B. deser.

Deser.

E Semine misso à D. Jacobo Zvingeto pro Bryonia Cretica provenit mihi planta Montbelgardi in hotto E.C. radice magnâ, albâ, viticulis, foliis (in quibus tamen sunt maculæ albæ) & floribus ac uvis similis vulgari jam descriptæ. De hac ferat C. Bauh. Radice est longâ, altè descendente (amplâ, Rapæ modò, dixerat apud Matth.) sed ad vulgaris magnitudinem non accedente, fusco cortice tectâ (quæ forinsecus cum vulgari convenit, verùm intrinsecus candida, nec circularibus lineis prædita) ex qua longa & tenuia sarmenta prodeunt, quæ ambiunt folia aspera (qualis & tota planta) ad similitudinem Vitium, aut Bryoniæ vulgaris divisa, sed minora, viridia, albis striis per medium discurrentibus, vel maculis albis notata, quibus capreoli ut in Vite adduntur. Flores habet pallidos, quinquefolios, striatos, vulgaris Bryoniæ floribus majores, ex longis pediculis propendentes: cuilibet flori, fructus succedit semicircularis, sup ernè in partes duas divisus, viridis primum, at per maturitatem ruber, (qui vulgaris fructui major est, aliquando unicus, aliquando plurimus, ex longo pediculo dependens, aiebat apud Matth.) semina duo continens, quare dicoccos appellari potest. Hæc ille, cui dicitur in phyt. & apud Matth. Bryonia, sive maculata, à vulgari differens, quod minor sit, & folia per medium albis striis notentur: In prod. Bryonia 1. In pin. 2. Cretica maculata: Bryonia dicoccos, frequentissimè in Creta proveniens, elegans, & ab aliis alibi natis differens: Bryonia Cretica, Pona Italico.

VITIS SIVE BRYONIA NIGRIS baccis. C A P. XXI.

Deser.

Quamvis videatur Bryonia nigris baccis posse paucis verbis tradi, nihilominus tamen cum libuerit Cordo particulatim eam delineare, placet e jus diligentem descriptionem proponere. Bryonia quæ nigras fert baccas, ab una radice viticulas

emittit plures, tenues, longas, & angulosas, foliis asperis, leabris & formâ virginis similibus vestitis. Secus quæ linguli, longi, intortique exeunt capreoli, arbutorum virgas, & sepium sarmenta apprehendentes, quò facilius ipse viticula, alioquin infirma, sepes scandans, quas ubi ascendente in omnes partes reptantes se expandunt: flores à Veris exitu, usque post medium Ætatis fert parvos, foliaceos, colore pallidos, pauca intus stamina habentes, quibus singulæ succedunt bacca, seu acini, mediocri Pisi quantitate, formâ rotundâ, colore primum vitides, in maturitate verò nigra, & in exiguos racemos congestæ, tactu molles, intusque lubrico & glutinoso succo plene, quibus quina senave femina continentur, cannabis colore & quantitate, sed modicè acuminata, in latitudinem compressa, & candidum nucleum intra se claudens. Radice nititur perenni, secundum ætatem grandi carnosaque, longitudine plerumque cubitum excedente, crassitudine brachij aut tibiz, longo Rapo aut Raphano simili, capite multis ceu verrucis tuberoso, in profundo in duas vel tres partes distrecta, colore foris in candido cineracea, intus autem candida, aut Buxi modo pallida, quæ gustu amara & subacris est, cum astrictione non pauca & aliqua senaveosâ qualitate abundat. Eadem lubrico & glutinoso succo & gravem odorem spirat, bacce sive acini, radicem qualitibus emulantur, minis tamen siccant. Colligitur primo Vere mox proditrus asparagis. Ex radice aqua præfesto radicis capite, & excavata radice, quæ in cavum (singulis diebus matutino tempore tollenda) confluxu, ischiadis utilis. Nasquitur in sepibus. Plurima in VVirttembergensi Suevia atque Rhena-na provincia, in Hassia, Saxonia, VVestphalia, Pomerania, Marchia, VVirttembergensi Electoratu & Misnia abundat. Lectores considerent an Cordi Bryonia hæc nigra quæ formâ foliorum non differt ab alba, eadem sit quæ veterum ut Diosc. Plinij & Galeni, quorum verba subijcimus.

Bacca Pisi quantitate.

Semina cinnabris.

Radix R. capisulæ.

Gustus.

Colligitur.

Call. P. V. s. s.

ischiad. L. u. s.

Vitis nigra Diosc.

Vires.

Vitis.

Menfes.

Vertigo.

Lux. u.

Diosc. ap. pellatione no. he.

Nigra Vitis, inquit Dioscorides, quam aliqui Bryoniam nigram, alij Chironiam Vitem nominat, folia fert Hederae, ad Smilacis folia propius accedentia, sed majora, caules etiam huic similes, ac ipsa quoque vicina arbore capreolis suis amplectitur, fructus racematim coheret, qui inter principia vires, at post maturitatem nigricat; radix foris nigra, intus buxo colore. Hujus etiam cauliculi qui primum getminum patu erumpunt, olerum modo in cibos recipiuntur. Vitis prout dicit, menses pellunt, ac lienem miruunt, nec non & comitalibus, vertiginosis, ac nervorum resolutione tentatis profunt. Radix isdem quibus alba viribus pollet, eademque præstat, sed inefficacius. Folia verò cum vino extuleratis jumentorum cervicibus efficaciter illinuntur; ac luxatis etiam similiter imponuntur. Nigram Vitem inter Dioscoridis notha alij Bucranium, Romanum Vvam taminiam, alij Batanutam, Bateonda alij, alij Betifalcam, Daci Priadela, alij Peregrinam, Asti Lavothen vocant.

Bryonia nigra efficacior in eodem usu [cum albis, Bryonia nigra ad extrahendum usu infusuræ] cum melle & thure, ita tradente Plinio: Suppurationes incipientes discutit, veteres maturat & purgat. Ciet menses & utriusque nam. Ecligma ex ea fit sulphuris, & contra lateris dolores, lalores, vulvis, ruptis. Splenem tetnis obolis pota triginta diebus consumit. Illinitur eadem cum fico & pterygis digitur. Ex vino secundas seminarum apponit: sita trahit: & pituitam, drachma pota in aqua mulla. Succus radicis colligi debet ante maturitatem seminis: qui illitus per se & cum eruo, latiore quodâ colore & cutis tenentate magonizat corpora: serpetes fugat. Mandragora Tuditur radix cum pingui fico, rugat; corp' si statim murtam, bina stadia ambulat: alijs urit, nisi frigida abluatur. Lucun.

ina.
onia.
& vāthe.
vnia.

Iucundius hoc idem præstat nigra Vitis: quoniam alba pruritu n̄ affert. Est ergo & nigra, quam propriè Bryoniam vocant, alij Chironiam, alij Cyneanthem, aut Aproniam, similem priori, præterquam colore. Hujus enim nigrum esse diximus. A sparago ejus Diocles prætulit veris asparagis in cibo urinae ciendæ, hienique minuendo. In fructibus & harundinetis maximè nascitur. Radix foris nigra, intus buxco colore ossa infracta vel efficacius extrahit, quàm supra dicta. Cæterùm eidem peculiare est, quòd jumentorum cervicibus unicè medetur. Aiunt si quis villam eà cinxerit, fugere accipitres, tutâque fieri villaticas alites. Eadem in jumento hominè phlegma, aut sanguinem, qui se ad talos deiecerit, circumligata sanat.

onia
vse Ga.

Vitis nigra, quam Bryoniam propriè vocari scribit Galenus, supra dictæ ad omnia similis est, nisi quòd imbecillior. Quod autem non auisimus asserere hanc Cordi Bryoniam nigram [ἐπιτολήν μὲλ. αὐγῶν, quam in Diosc. in quibusdam similem statuit cum Vite alba] eandem esse cum Vite nigra Diosc. Plinii & Galeni, facit potissimùm Dioscorides suâ diversâ descriptione in forma foliorum ab alba.

Bryonia
ra Mar
ia.

Bryoniam nigram inventu rariorem tradit Marcellus, idèoque cogniti difficiliorum: inventam tamen totam veterum scriptorum historiam confirmare. Sunt illi, inquit, per intervalla cum foliis dispositi racemi: & qui non ultra octo decemve acinos ostendunt: multo minore quàm in punicis magnitudine, & colore ante & post maturitatem, quo ab hoc describuntur. Quos tamen Diosc. hic caules vocat: nos potius viticulas dixerimus: eorum enim speciem magis, quàm caulium habent. Maturescunt acini ejus extrema æstate: & ubi minus calet: umbrosiusque locis Autumnio. Nascitur & hæc, ut in alba diximus, in Sepibus & inter fruteta propinquas stirpes ascendens & alligans. Minor hæc quàm alba est: nec tam latè ut illa viticulas suas spargit. Pares utrinque vires antiqui omnes esse tradiderunt: idèoque sine discrimine uti ceteris jussurunt. Licetque id in Paulo Aegineta cognoscere, qui contra nigras cicatrices utriusque ope his verbis utitur: Nigras cicatrices delet Bryonia radice alba & nigra in oleo decocta &c. De ejus appellationibus non est quòd dicamus præter quam Chironiam quem vocari potuisse: aut quòd Chiron Medicinæ & herbarum in Thesalia peritissimus ulceribus jumentorum & hominum ex ea primus remedium invenit: aut quòd Chironis ulceribus eà veteres medentur. Quod autem in Dioscoride legitur Vvam taminiam dici à Romanis, falsum est. Alia enim à Bryonia taminia Vva est: quemadmodum Latini antiquiores omnes docuerunt.

mpns.
cas.

egineta
Bryonia
gra.

Bryonia
ia.

mpelos
elana.
mnia.
amnia.

uell. not.

lematis
stifolia.
mhiis op
to repro
stra.

svata.

Ampelon melanam, aliquos Aproniam vocare autor est Hermolaus. Hanc etiam Tannum sive Tamum quosdam putare, & vulgò Tamarum. Esse qui Tannum quoque scribant, non Tamum, aut Tannum. Ruellius Vitem nigram vocat, recitans confusè Dioscoridis, Plinij & Hermolai verba, quem non nominat. Cæterùm credit Fuchsius eam stuprem esse legitimam Vitem nigram, quæ Hetrurienlibus vulgò Vitalba dicitur, ac à nobis Clematis latifolia inscribitur. Verùm hæc ejus opinio nobis cum Matthiolo, pace sua, planè reprobanda videtur. Siquidem nostra Vitalba non habet radicem foris nigram, intus buxco colore: non fert folia Hederæ majora, sed potius minorâ, & per ambitum laciniata: nec semen edit in racemi modum, sed simul compactum, nullâ cum Vitis similitudine. Adde, quòd eadem suâ facultate exulcerat. Vitis verò nigra exulceratis hominum cervicibus medetur, & luxatis ob adstringentem vim, quam habet, utilissimè imponitur. Vitem nigram Dioscoridis, temerè nimis Matth. her-

Tom. II.

bariorum & officinarum Sigillum B. Mariæ nuncupat.

An Corn. in Diosc. Bryonia nigra, herbaris nota, fructibus & radicis colore ab alba tantum differens? Matth. in Diosc. cum mag. fig. Bryonia fructu nigro, quem ait Dioscoridem non vidisse. Is autem Vitem nigram legitimam non exhibet, ut sequenti historia dicemus. Fallop. Bryoniam nigram ait Pfilochron vocatam à Græcis, eò quòd usus ipsius attenuet pilos. Cam. h. & Hort. Lufir. Bryonia baccis nigris. Lugd. Vitis nigra quoque descriptionem, non verò quoad iconem, quæ est Vitis nigra quorundam, de qua mox. Hanc eandem iconem eodem titulo retinet Lacuna, Cam ep. & hist. Matth. germ. & Tab. Vitis nigra quoque dicitur Arnold. Gillen. Hort. Luf. & Ryffio absque iconè, qui Fuchsiùm & alios falli scribit, qui nigram Vitem aliam esse plantam ab alba differentè arbitrentur, cum eadem sit & colore in radice, quæ huic nigra, alteri alba, & fructu tantum differant, quem alba Vitis rubrum, nigra verò nigrum proferat & in Norico agro copiosiss. cum alba proveniat, quamvis simul nascentes nunquam repererit. Dod. gall. Bryoniam nigram à nemine adhuc in Galliis cognitam esse testatur. In hist. eam paucis (ex Cordo ni fallor) describit. Bryonia nigre radix aliquando ad nostras manus venit, ait Casalpini, nautis eam pro victu circumferentibus: vocitant Panem Turcharum: est radix brachialis crassitudine amplior, sed brevis, carnosa, colore intus subrubente, ut divisa in taleolas, sarcininis speciem gerat. hæc quamvis multò antè eruta, adventante Vere germinare capit. Quamprimùm igitur eà terra mandavi, ut planta speciem addiscerem: protulit autem caulem circumvolvèntem se admiculicis ad multam altitudinem, & folia Hederæ mucronata, colore subrubente, vixit usque in Autumnum; frigore verò adventante penitus extincta est. ejus neque florem, neque fructum videre licuit.

Sigillum B.
M. aria.

Pfilochron

Fuchsinor.

Panem Turc.
charum.

Tabern
mala.

Gerar. Bryonia nigra silv. qui malè malam habet iconem Tabern. Vitis nigra secunda, quæ est Cle-

ματ. @ μέλων. Græcis, & Βρυόνια μέλων, & χερσό- Nomina
viva μέλων. @; Latinis Vitis nigra, & Bryonia nigra, & lingua.
Vitis Chironia nominatur; Arabib. Fesire sent anim,
Alfistrefim, sive Fafstym: Ger. Schwarz Etickwurz;
It. Vite nera: Gall. Couleucree n. v. r.

VITIS NIGRA QVIBVS DAM,
sive Tamnus Plinij, folio Cyclamini.

C A P. XXII.

Radix magna, crassa, tuberosa, totunda ferè, fo. Deser. ris nigra, intus alba, profundè in terra demersa, ut non nisi altissimè adacto ligone quis facillè consequi possit, viridis à nobis gustata, saporem acrem lingue imprimebat, non tamen ingratum, aut amarum: siccata candidissimâ substantiâ accedit ad Dracunculi minoris radicem nullis circulis donata quales apparent in Bryonia, quæ facillè in polinem redigi potest, nec rara ut illa, sed compacta in eo accedens ad Mechoacan, ab ea etiam diversâ circulis, sapore quoque est non ingrato, cum aliqua

Sapor.

Dracunculi
radice.



Folio Cyclaminis ferici.

Cyclaminus altera. Sigillum, Vel Tuberculum Mariæ. Malacocylisua.

Math. si gura falsa

Icon nostra ex Lob. & Dodon. non placet. Math. opinio refutata.

acrimonia, plures viticulis emittit quæ proximis quibusque se circumvolvêtes in altum nituntur, nullis claviculis donatæ: folia alternatim longissimis pediculis hærent, Cyclamini foliorum serè formâ, sæpè tamen acutiora & duplo triplove majora, infra supràque læto virore splendèntia, tenera, multis nervis sinuatis prædita, gustûs viscidî. Flores inde oriuntur unde foliorum pediculi, racematim coherentes, ex luteo virides sive chlori: quibus racemi succedunt uvarum rubentium, aut ex rubore fulcarum.

Ruell. Cyclaminos altera Diosc. & Plinij, Herb. & offic. Sigillum Mariæ; Mauritanorum Bothormatien primum [Tuber Mariæ] nominatum, Malacocylisus Democriti. Sic & Corn. Ferncl. & Dalechampio. Sed falluntur. Non enim radicem, aut facultates habet Cyclamini alterius.

Math. Vitis nigra, Hetruscis vulgò Tamaro appellata, corrupto à Tamno vocabulo. Sunt enim (inquit is) qui hanc Tamnum, sive Tamnum etiam vocent, unde Latinis ejus uva taminia dicta est. Viti nigra, quæ in Italia nascitur, illud objici posse putavim, quòd in uvarum colore à Dioscoridis dissidèrem invenitur, quòd ejus Vitis uvæ post maturitatem nigrescant, nostræ verò perpetuò rubentes spectentur. Sed hoc nihil me movet, neque facit, ut mutare debeam sententiam, & credere hanc aliam esse à Vite nigra, quod sæpè viderim naturam plerumque in florum & fructuum colore ludere. Idcirco nil mirum esse debet, si in Italia Vitis nigra rubentes uvas proferat, alibi verò nigras, ut in Græcia, Asia, aliisque calidioribus, quòd hujusmodi discrimina sæpenumero cæli, ac soli diversitate contingant. Hac igitur ratione fretus, quæ, si fallor, illam objectionem diluit, non dubitaverim asserere, hanc plantam, esse veram ac genuinam Vitem nigram, quoniam cæteræ omnes prorsus notæ illi ad stipulari deprehenduntur. Hæcille, qui plantæ capreolos appingit, qualem observare nunquam potui. Amplectitur quidem proxima, sed non per capreolos: Racemi etiam in prionibus comm. malè exprimuntur: Radix quoque non tenuis, sed crassa, quam non observavit Matthiolus. Plantam præterea non describit, sed fictam tantùm iconem proponit. Quare merito in comm. cum magn. fig. eam inutavit, pingens melius uvam & radicem, licet capreolos reliquerit. Radicem ita longam, qualis est in postrema ejus iconè, ac etiam apud Dod. & Lob. ac in nostra, ad imitationem illorum facta, non observavi, sed penè rotundam & tuberosam. Meherem Cam. in epit. & hist. sub Vite nigra exhibuit figuram. Quis autem quæso plantam hanc eandem dixerit, cum Vite sive Bryonia nigra Dioscorideas folia huic non sunt angulosa, qualia esse solent albæ: siuctus non niger: caret capreolis, quicquid Math. ex descriptione Dioscoridis pingat: plurimum denique in figura foliorum ut in cæteris differt, cum tamen è contrario Gal. per omnia similem dicat. Tandem radix odore & sapore differt, quæ di-

versam vim ostendunt. Fallitur præterea Matthiolus hujus racemos uvam taminiam Latinos dixisse. Hæc siquidè Staphisâgria est, autore Dalechampio.

Dod. Vitis sylvestris [sæpè nigra] Bryonia species, non autem Labrusca. Quod ad more ere voluit, ne quis cum Avicenna, Serapione alii que Medicis Arabibus, falsò putet eandem esse Labruscam & Vitem sylvestrem. In quo & Plinium (in hist.) particulatim notat, ut cui utriusque synonymiam occasionem præberit, ut satis de his se explicare non potuerit, & Lx. c. i. utraque inter se confuderit. Hanc præterea ait Columellam & Latinos Tamum appellare, fructumque ejus uvam tamineam. Vvam autem tamineam, etiam Staphisâgriam esse, sed hanc falsò ita nuncupatam Plinium confirmare, qui & Salicæstrum vocet. Non esse refellendam eorum sententiam ducit, qui Cyclaminum alteram hæc esse velint, vel solam enim radicis magnitudinem facile hos redarguere. Cyclaminus siquidem radix, quòd nullius usûs [exemplum] ac exigua sit, hujus autem magna & multi usûs. Cùm eo magis ipsi videretur agendum, qui dicitur sive Bryonia nigræ esse perniciosis tueri: nisi repertâ, & ab eo conspectâ legitimâ Bryonia nigra, sententiam mutaturum speraret. Sed tamen quid vetat & in hujus errore animadvertere, & Tamum nò esse Bryoniam nigram docere? Caret capreolis Tamus; fructum non nigrum, sed pulchrè rubentem gignit. Bryonia verò nigra capreolis habet in star Vitis, & acinos proferi nigros. Ostendunt hæc differentiam satis evidentem. Describit autem is Vitem sylvestrem, quòd longos, ligniferos, medicis crassitudinis, rimoli corticis, in star lumentorum Vitis obscurè subrubentes promat coliculos; capreolis sive viticulis caret: flores candidos, musculos odoratòsque proferat. Sed patet cum Vitem suam silv. ex libris, & non ad plantam, quod ei sæpius evenit, describere: verè quidem dixit ad verus Math. capreolis carere: reliquæ verò notæ non reperiuntur in sua Vite silv. vel Tamno.

Vitum nigram silv. Ollingeri (si modo est eadem quæ Tanus Plinij, inquit Gesl. quæ Matthiolus pingit, quavis radicè non prohè, fructû verò omitit: & capreolos addit descriptione Dioscoridis in hoc, nò naturâ sicutus.) ego cû capreolis nûquâ vidi, sed viticulis tantùm suis flagellisque citè volventem. Aut igitur Dioscorides lapsus fuerit, aut in hac planta nominando, aut nò propriâ significatione usus: aut Vitis nigra Dioscoridis hæc non erit. Accedit quòd fructû ejus primò viridè, in maturitate nigrum facit: cû Tani acini post viriditatem semper rubeant. Item quod Dioscorides minis efficacè hujus Vitis radicè facit, quod albeum Tani radicè exulceret, quod meo periculo didici, Vitis albæ non itè, aut non adeo. Interim hanc Vitè nigra esse non negabo, aut proximâ ei speciem: quoniam non invenio aliâ que propius ad descriptionè accedat. Eid. Gesl. Malacocylisus Democriti videtur Vitis nigra, quæ Ruellius Cyclaminum altera existimat, aut nò longè dissimilè. Eadem habet etiam in cat. plubi præterea (sparsum tamen) Cyclaminum alterum, Tamum & Tannum, ac Vitum nigram appellat. Non placet autem quod aliquando dixerit Tamum habere baccas nigras, maxinè cum postea ex autopsia tales naverit.

Lob. adv. Vitis, vel Bryonia nigra, Sigillum Mariæ, Cyclaminos altera: Obs. Vitis, sive Bryonia silv. (ita & ic.) Tamus & Bryonia silv. Dod. quem ait merito, vulgatum Sigillum Salomonis [Matth. ge] sive Bryoniam nigram, sylvestrem Bryoniam, Tamumve statuisse. Item alibi, Cyclaminos altera, Bryonia nigra quorundam. Lugd. Vitis nigra Matth. cl. qui fallit, e jusdem figuram retinet, quam eam Tab. sub Vite nigra albi primâ proportionem, quem & Gen. imitatur, Bryoniam nigram appellat. Schvv.

Ficus silv. Bryonia species. Arabum error. Plin. lapsus.

Tamus Columellæ.

Cyclaminus altera non est.

Bryonia nigra non est.

Dod. repræsentat.

Matth. repræsentat.

Tamus radicè exulcerat.

Gesl. not.

Engl. Tab. Ger. not.

Schv. securè nimis pronunciat Sigillum B. Mariae esse Cyclaminum alteram & Bryoniam nigram.

C. B. phyt. Bryonia 4. sive silvestris: Eid. apud Matth. Bryonia silvestris. Non autem convenit (quod fratri placet) descriptio Dioscoridis. Velim etiam ab ipso ubi nigrescentibus bacis, ut ipse prodidit, repererit: Tandem quæ Theoph. 1.9. hist. c. 14. & 22. de Vite silvestris plantæ de qua accipitur, non quadrant. Eid. B. pin. Bryonia 4. laevis, sive nigra racemosa: Vitis nigra Matth. Ang. Lac. & Cast. Tamarum vulgo, Crf. Vitis sylv. Diosc. & Theophr. quibusdam. Sed florem capillaceum, muscosumque ei tribuit Diosc. qui in nostra non observatur. Aliis Cyclaminus cyllanthemos Diosc. Aliis Vva taminia Plinij: alii eisdem Salicastro, quod potius Amara dulci convenit. Bacca maturæ aliquando rufescent, aliquando nigrescent.

Provenit à me plantata in horto E. C. collecta ex vicinis locis urbi Montbelgardensi, ut in colle verisus Arbonam eundo ad plantitum in dumetis: item propè la Chau Vitium monte. Genevæ florentem observavi mense Maio in colle l'Abbatie. Frater C. B. in Hüningen collegit. Tiguri in sylvis spontè provenit, ut & Porentrii cum bacis perfectis Augusto. Radicem valdè profundè agit. Vitis nigra Matthioli frequentissima in Hetruria provenit, quin & in Goritienfi comitatu, ubi Martio & Aprili mensibus ejus cauliculi pronascuntur.

Tamati viticulas, quæ Vere primùm erumpunt, quoddam Asparagis similes sint, eorum more decoctas, suã etiam tẽpẽstate madi Matthioli prodit, quamvis non eam, quam Asparagi, cum palato ineat gratiam. Alii comedat Matth. suos Asparagos, ejus ego auctoritati non confido, nec securè sumi posse existimo. Comperitum est (inquit Lob. adv.) vel mulierculis, vehementius utinam, renumque fabulum & mensium sibirram, impellere potu: verùm veneris tanto perè incentivam esse, non perinde assentiuntur quidam Commentatori: quin potius experti eidem conviciantur; conquesti lumbos enervare, sanguinem, renesque, inflammare, pluriusque esse sibi unam aut alteram Cynaram, quam incertam & periculosam suam Bryoniam: quam si propter colorem, venerem accendere vult, haberet sibi uni, aut Flammula vesceretur, ad sui Satyri erithronij vires enerves supplendas. Planta à Matthioli pro Bryonia nigra exhibitã, legitima Turneri judicio non est; tum quod hæc planta manifestè cum sit frigida, non eas habet facultates, quæ Bryonia nigra tribuit Dioscorides, Galenus, & Mesuæus; affirmant enim eandem esse virium cum Bryonia alba. at illa Matthioli tam valida non est. Mesuæo Bryonia alba, calida & sicca est in tertio recessu. Nigram manifestè calidam statuit etiam, ubi ait non ad eam esse calidam ac albam, additque utriusque radicem frigidis conferre morbis &c. Tam verò utrum planta frigida, qualem scio certò Matthioli illam esse, ejusmodi possit morbos persanare, doctis dijudicandum relinquo, & an frigida sit rãne, periculo factò circa Sollitium estivum, docebit sapor. Antè diximus ex Gesnero radicem exulcerare, quod tamen nobis non constat, ex gustu sanè acrem comperimus: dubitamus etiam an quod dicit Dod. radices sint calidæ & siccæ ordine tertio: addit fructus ad similes facultate, at tamen mitione: utramque abstergere & digerere: Quod Galenus scribit de asparagis Bryonia ab omnibus pro more per Veredi, de Vite silv. sive Tamo, nequam de Bryonia alba veritatem habere: esse qui asserant in Hispania Batica in cibaria recipi: Dicit à porcis hujus radices quæri, erui, ac cum voluptate mandari, neque minus esse gratas quam Cyclaminum orbicularis, quæ inde Panis porcini nomen indeptæ sint: Sed temerarium fore idcirco Tamum Cyclaminum.

Tom. II.

mini speciem afferere, quoddam ejus radices porcino generi gratæ sint.

BRYONIA LAEVIS, SIVE NIGRA baccifera, C. Bauhini.

Radice[m] habet magnam, crassam, longam, succo glutinoso plenam; caules verò samentorum Vitis instar lãgos, lignosos, angulosos, quibus se, (licet capreolis careat) crebris circumvolutionibus vicinis fruticibus circumvoluit; folia hederacea, Similicis laevis familia, magis tamen sinuata, tenuia, splendenda, & nervosa, longissimis pediculis donata: flores albi sunt, muscosi: ad cujuslibet folij exortum, in viticulis maximè superioribus, pedicellus brevis ex caule exurgit, qui baccam unicam ceraso minorem, virentem primùm, at per maturitatem rubentem, sustinet: cui semina satis magna, rotunda, nigraque, quaterna, quinave includuntur. Provenit in sylvis circa pagum Hüningen, Junio florens: at bacca Septembribus sine maturæ sunt.

Hæc à communi Bryonia silvestri, quæ Tamus dicitur, potissimùm in his differt, quoddam virentem florem minorem habeat, racemosa sit: hæc verò flore sit majore & baccifera. Hæc C. Bauh.

Est autem in prod. ipsi Bryonia 2. silvestris baccifera: Eid. pin. Bryonia 5. laevis, sive nigra baccifera.

MECHOACAN. CAP. XXIII.



Alex sunt radicis brachialis crassitudinis per transversum sectæ, cortice rugoso tectæ, ex fusco cinerea, per quas vix ulla apparet fibra, substantiã molliusculã, sapore subdulci cum obscura quadam acrimonia, nauseam movete mastrificando, circulos habet ut Bryonia, verum ab ea differt, quod compacta sit & non fungosa, nec sapore aceti, amaro & viroso, qualis illa. Porcentrii Pharmacopœo nobis data Mechoaca tota fusca nescio unde, sapore non nihil acri in qua circuli valdè manifesti altera radix secundum longitudinem secta externè rugosa cinerea, internè albicans.

Mechoacan Monardes duplex tradit, & tertium genus sylvestrius. De primæ verò Mechoacan an. num 1560. primùm in provincia Mechoacan dicta, radiis reperta planta hæc scribit. Video sibi in magno vase terræ pleno repositam Hispani in monasterio Franciscanorum, multis tamis supra terram expansis luxuriantem, colore fusco ad cinereum tendente, qui vicinas perticas aut pergulas (si adponantur) scandere, & multiplici nexu amplecti possit: foliis circinatæ ferè rotunditatis in mucronem tamè desinentibus, non unquã admodum amplis, atrovirentibus, fibrosis, perennibus, ad eam verò delicatis, ut humiditate carere videantur: fructu, ut perhibent, cotiandi sicci magnitudine, racematim coherente,

N 3

Radice Bryonia.

Radice crassa, Vitis alba seu Bryonia modò inspidi & sine acrimonia, quae advehitur magnis & parvis fragmentis, partim in taleas concilis, partim manu contractis. Non desuerunt autem, qui huius radicem, cui Rhabarbari Indici & Mechoacani nomen indium, eandem cum Bryoniae radice (quòd huius modo crassa sit) esse putarunt, aut saltè in ei congenerem: sed multùm differunt. nam Bryoniae radix, cilium vitidis, tum sicca, admodum acris est: Mechoacan verò insipida & sine acrimonia.

Mechoaca ex Continenti.

Ceterum nunc ex Continenti advehitur Mechoacan, natum circa Nicaragua & in Quito (ubi diligenter colitur & magno in usu est, ob eius mirabiles effectus) longè præstantius eo quod ex nova Hispania adferri consuevit: cuius flos, semen, & ranculi etiam allati sunt. Erat verò is flos quasi Mali autææ, quinque foliis constant majoribus, subfusci coloris, & cuius umbilico protuberat calyx sive vesicula quædam avellanæ magnitudine, membranâ constant tenui, albicante, quæ in duas cellulas tenuissimâ pelliculâ secretas dividitur, & in singulis bina granâ, ciceris exigui magnitudine, colore per maturitatem nigro, gustu insipido continebantur.

Floremali aerea.

Mittit promontorium D. Helænæ, quod in eodem quo Nicaragua tractu est, aliud Mechoacan genus silvestrius quod simile est alteri cum folio, tum sarmentis, tum radice, sed per omnia minoribus: & ipsa etiam radix acrimonia non nihil habet. Scammonea autem hoc genus nuncupatur propter rationem inter vires adducendam. Hactenus Monardes, qui rursus de Ind. Occid. lib. 1. cap. 22. ait Mechoacan dici Rhabarbarum Indicæ, Rhabarbar. novæ Hispaniæ, Rhabarbar. ex Mechoaca: quodam voluisse Vitæ albam esse, verum multùm differre. Quam in re huic subscribit Lob. (cui dicitur Peruviana Mechoaca, Mechoacæ provinciæ planta Bryonia similis. In obs. autem solitaria radix exprimitur, in Ic. verò folia, Bryoniae silvestris similia adduntur ipsi sum deniq. florem pingit ex Monarde) Lugd. Car. Steph. in domo rust. germ. lib. 2. c. 76. cum Agid. Everardo post. com. de Panacea herba sive Tabaco. Putat autem is maiorum cum in Vite nigra affinitatem habere, aut cum Turbith, saltè in quoad facultates. Inferius ex Monarde patet, eundem Scammoneum quoddam esse Americum cum Dodon. tradat, qui & Scammoneij speciem non temerè credit, etiamque Nil Americum esse posse concedit, ac cum Carol. Steph. in domo rustica germ. Convolvuli speciem facit.

Scammonea.

Missâ sunt Clusio ex Hispaniis duo feminis Mechoacan generaturum brevi calyculo sive siliquâ, feminæque nigro, quale est Scammoneij, aut Convulvi majoris. Alterum oblongiore aliquantum calyculo, & feminæ rufo, & quam superius longiore tenerioraque utriusque siliqua parte interiore latuginosa est. Ex utriusque feminæ natæ plantæ (quas hęc mis in iuncta susculit) prohibant Scammoneij aut Convulvi modo, deinde de multis sarmentis proxima pedamenta scandeant & amplectebantur: foliis Convulvi majoris, sed tenerioribus, & colore magis fulvescente: radix pollicarem, vel maiorem crassitatem jam erat adepta.

Rhab. Indici ex nova Hispania.

Tab. duas ponit figuras, quarum prior inscribitur, Mechoaca. Bryonia Peruviana, Indiam inscribitur, & Mechoacan; posterior, Mechoaca. Ponit autem priorem pro Mechoaca Monardis, appingens flores & capreolos, cum tamen capreolorum nullam hactenus invenirim mentionem factam à quoquam, nec ipse dicat, ubi, vel apud quem vident: non ostendit quatinus differat à secunda quam Lobelio attribuit, cuius figuræ similem ponit sine capreolis. Dodonæus etiam nullos habet capreolos. Nos studio omisimus flores & capreoles, nolent, sponere minus incertum pro eo.

Turbith. Scammoneum Americum.

Genera duo Clusio.

Semine utro.

Semine utro.

Semine utro.

Tab. not.

Icon nat. 1661.

Lugd. nat. Loc. usq. Tempus. Temperata. Delectus. Affer. Confes. Lævis. Ven. rea. Pulvis. Difer.

Lugd. nat. Loc. usq. Tempus. Temperata. Delectus. Affer. Confes. Lævis. Ven. rea. Pulvis. Difer.

Lugd. nat. Loc. usq. Tempus. Temperata. Delectus. Affer. Confes. Lævis. Ven. rea. Pulvis. Difer.

Lugd. nat. Loc. usq. Tempus. Temperata. Delectus. Affer. Confes. Lævis. Ven. rea. Pulvis. Difer.

Lugd. nat. Loc. usq. Tempus. Temperata. Delectus. Affer. Confes. Lævis. Ven. rea. Pulvis. Difer.

Lugd. nat. Loc. usq. Tempus. Temperata. Delectus. Affer. Confes. Lævis. Ven. rea. Pulvis. Difer.

Lugd. nat. Loc. usq. Tempus. Temperata. Delectus. Affer. Confes. Lævis. Ven. rea. Pulvis. Difer.

Lugd. nat. Loc. usq. Tempus. Temperata. Delectus. Affer. Confes. Lævis. Ven. rea. Pulvis. Difer.

Lugd. nat. Loc. usq. Tempus. Temperata. Delectus. Affer. Confes. Lævis. Ven. rea. Pulvis. Difer.

Lugd. nat. Loc. usq. Tempus. Temperata. Delectus. Affer. Confes. Lævis. Ven. rea. Pulvis. Difer.

Lugd. nat. Loc. usq. Tempus. Temperata. Delectus. Affer. Confes. Lævis. Ven. rea. Pulvis. Difer.

mentum horā somnus conceditur, iis praesertim qui vomitibus obnoxij sunt, sed brevis, nam purgati incipienti, nec somnus, nec cibis, nec potus concipit. Si verò qui hunc pulverem, vel aliud quodvis laxans medicamentum sumperit, sibi a vomitu moritur, utatur eo quod sapientiū expertus sum in remedio, videlicet, illico à sumpto medicamento, albu non ovi allium & adhuc calidum digitique atrium in lineo panno tato involvat, & in nodum colliget, quem gutturis orificio imponet, & istuc retinebit, donec medicamentum laxare incipiat; etenim non modò vomitum prohibebit, sed etiam fumos & vapores à medicamento sublevatos reprimet. Facti purgatione datur jusculum, & paulò post cibus, qualis his dari solet qui sese purgant. Peracto prandio neque somno indulgeat, neque bibat ante carniam, quae levis erit, & rerum boni succi. Postridie eluat corpus medicamento aliquo, & conservā quapiam utatur, deinceps in victu & reliquis rebus necessariis sese gerat, ut decet. Fiant nonnunquam ex eodem pulvere, excepto eleuario rosato Mesic Catapotia Coriandri sicci magnitudine ut facilius dissolvantur & citius opus suum peragat. In manu autem est Medicus, aut ejus qui sumperit, eam humotis quantitate purgare quam volet, quoniam sumpto pauillo jusculo aut aliā re, ejus operatio illico cessat. Negat Io. Fragosus Regis Catholici Medicus, jusculo aut alio cibo injecto Mechoacan vim purgativam sibi aut infingi. & quotidianā experientiā id se observasse ait, eandemque nostrī autors in Pimpinichi opinionem reprobat. Mittit Monardi promontorium D. Helene, quod in eodem quo Nicaragua tractatur est, aliud Mechoacan genus silvestrius, quod gravia symptomata excitat, ut vomitus immodicos, tormina, & alvi profusiva, quam ob causam Scammonia nūcupatur: sed nemo (periculo semel facto) vitur. Mechoacan agrestis gustu acridem praese fert, & domestica nigrior est vehementiusque & cum molestia purgat: quare magis noxia, autore Evertardo.

BRYONIA MECHOACANA nigricans.

Radice est Mechoaca famili, sed cortice nigricante vestita, interioris rufescente, quae tessulatim incisa rotunda, magnitudine & figura calculo aleatorio resporrens, ex India Chelapa sive Celape nomine ante annos undecim allata fuit. Ab Alexandrinis & Massiliensibus, Talapim vel Galapo vocitatur, & à Massiliensibus, Mechoaca nigra, vel mas existimatur.

Gustu est non ingiatio, & gummoso, & ob copiosam gummositatem, si carbonibus, vel igni admoveatur, flammam concipit. Facultate, vulgarem sive albam Mechoacam superat: nam ob gummi copiosum, fortius humores serosos purgat, cum imi vètris levi dolore, & praecipuè viscera, hepar & ventriculum torborat. Quare drachmae unius pondere exhibetur tutò, & sine fastidio opus suum exequitur. Sunt qui ea in dosi, cum aqua Cichoreae, aut simili stillatitia, seu jure actu frigidis, tribus horis ante prandium, agrosus propinent.

Ex Bauhini prodromo, ubi eam sub Bryonia 3. Mechoacana nigricante exhibet. In pin. facit Bryoniam 7. Mechoacanā nigricantem.

RADIX QUIMBAYA. CAP. XXIV.

Emittit apud Clus. Petrus Cieqa part. 1. Peruvia hist. in Provincia Quimbaya, cujus metropolis Carthago, nāci tenues quāsdam radices digiti

crassitudine inter arbores, quarum si fragmentum brachiali longitudine duobus aequae sextariis per noctem maceretur in vase aliquo, majorem aquae partem eā nocte absumit. Ex ea quae superest aqua, Vires. qui tres uncias sumperit, ad eò benignè purgatur, & sine molestia, ut si Rhabbaro purgatus esset. Cujus rei aliquoties periculum fecit magno illorum, qui sumperunt, commodo.

Luzd. Petti Cieqa radix Quimbaya. C.B. Radix Synon. Quimbaya: meminit etiā Fragosus, sed succinctiā.

BEXVGO' DEL PERU. CAP. XXV.

Plantis illis quae ex utrinque Mechoacan generis semine Scammonij aut Convulvuli modo prodibant forsitan similes erant, quae ad Clitium Diepā mittebat doctissimus vir Godofredus le Bru, Medicus Regius, Bexugo del Peru appellatione, quarum drachman sumptam, purgandi vim habere scribebat, praesertimque Mechoacan & nactibus Indici purgativis. Erant verò illae, sarmenta verius, quam radices, longa, & qualis ferè ubique crassitudine, digitalis videlicet, nonnulla etiam minor, lenta, & funiculorum, sive Athraenae sarmentorum instar nonnihil contorta, cortice cineraceo obducta, veldè nervosa internè, lenti gustus initio, deinde nonnihil acri & salivam cientis, denique guttur & fauces urentis, breviter ad Athraenae sarmenta proximè accedentia, ut quodammodo mihi persuasam Athraenae fuisse sarmenta illis in locis nascentis. B. pin. Clematis 2. Peruviana.

RADIX PURGATIVA INDICA Matalista. CAP. XXVI.

Illustri Principi Frid. Duci VVirtembergico missa fuit haec radix, nomine radices purgativae Indicae Matalista, quae fibrosa erat, representabatque quodammodo segmenta Helenij, fusca, rugosa, internè nonnihil rufescentis & albicans, nullo sapore manifesto, nisi quiddam mallicata, acrimonia quandam habebat. Haec autem erant adscripta: Assumpta pondere ʒ. ij. pulverisatam in aqua cordiali stomacho jejunio mane, refrigerat, valet in febribus cholericis & aidentibus. Syrupus ex hac radice paratus est unci. iij. in lib. i. aqua decoctis cum Sacchari pondere ʒ. ij. refrigerat, mundificat sanguinem. Sed quis non intelligit sacchari dosim nimis parvam esse. Syrupi dosis etiam erat adscribenda.

LVPVLVS MAS ET FOEMINA. CAP. XXVII.

LUPULVS MAS.



Nadēdras Lupulus, per se infirmus, facillè rīdicas, aut proxima adminicula, quae arripuit, conscendit, non ille quidem capreolorum, quos nullo habet, ope, sed torulibus, aspernis, angulolis purpurascētibz & cōcavis samentis tenaci pedamētorum complexu in altum subnitens, cetero qui humo se tollere vix petis, folia è geniculis bina, adversa, pediculis palmaribus, asperis, rufis.

LUPULUS FOEMINA.

Foliorum
Lupuli.



bentibus adnexa, aspera, modò Mori folia imitata, integra, in mucronem abeunt, modò trifariam divisa totidem mucrones ostentant, tum hie, tum illic per ambitum ferrata: flores ex foliorum alis racemosi, cannabacei, colore herbido pallecentes, ex foliis & totidem staminibus componuntur, qui in aliis nullo sequente fructu evanescent, aliis squamis compactiles fructus semen continent ruffum, amarum.

Lupulus gener.

Lupulus fem.

Lupulus salicinarum.
Bryonia.
Ficus Septentrionalis.

Salicinarum nomen unde.

Volubilis.

An Seterib. nota?

Lupulus salicinarum.

Lupulum dividunt aliqui (ut Trag. Lob. & Cam. ep.) in sativum & spontè provenientem, sive sylvestrem, scie non differentem, præterquam magnitudine & exilitate: nam sylvestrem aiunt florum conomas minores, rariore, pauciorè que habere.

Alij distinguunt in matrem & foeminam. Mas (ait Cam. ep.) folliculos edit; foemina stoculos. Non desunt qui matrem appellent Lupulum, qui steriles habet flores; & foeminam cui folliculares fructus, folia (addit C. Bauh.) circa radicem sine incisuris, serrata tantùm, rotundiora; stoculi subpallidi, sine fructu pereuntes in pollinem lutuam. Illud mirum eum qui floret non ferre semen [fructum C. Bauh.] & qui semen [fructum C. B.] non florem.

Lupulum salictarium spontaneum in Græcia etiam nunc hodie vernaculè *Quercus* vocari audit Lobelius: Sativam verò, Vitum Septentrionalium inscribit: de qua dicit. Munifica Phronæa misera algidiores regiones, eis largita est banc quasi Vitem alteram, quæ quasi vitæ quæpiam suas potiones animarent, & salubrioris efficiere. Quare sedulo coluerunt hæc vulgò Vitem, depactamque, è sylvestri utbanam fecerunt, jam tot locis, ut etiam tractus patientissimos vinearum superent, depactis multis pedamentis & ridicis, quæ tenella clavícula & capreolos fulciant atque maritent: hæc autem fulera, quia saligna ut pluvium sunt, idèd fortè Salictarium vocarunt Lupulum: solo humentiore, lætiore, pinguiore, radicem fibras inserit hodie Germania, superior præsertim, atque Flædria, Anglia & Northmania, unde uno aut altero anno se porrigit viticæ propagines multis anfractibus prolaxæ, post amplexantes obvia quæque atborum & arbutorum, lucosque efficiunt fornicatâ pulchritudine visendos: quippe lætior multò tota planta culea evadit, florumque thyris foliaceis & squammosis adulationibus, semine etiam multò majore. Vindemiarum tempore uvæ decerpuntur, & in saccos coguntur ad Bieræ sive Cerevisiæ confectioem.

Volubilis, ut postea dicitur, plura habentur genera, quorum unum illud est, quod Lupulum appellant. Hujus etiã apud Medicos hæc ætate frequentissimus sit usus, nihil tamen, quod Matth. e quidem invenit, Galenus, & Dioscorides, aliique veteres tam Græci, quàm Latini auctores, posteritatis memoria perdidit, quæquam non desint, qui venior, hanc Phirio esse Lupulum salictarium, ab eo tantùm no rine demonstratam lb. 2. c. 15. atque ibi inter eas herbas connumeratam, quæ spontè nascun-

tur, quibusque plerè que gentium utuntur in cibis. Lupuli vocatè facili meminit Mefues inter sua dejectoria facultatis medicamenta, ubi hæc ad sensum habet. Est & aliud [Lupulum salictarium] Volubilis genus, quod Lupulus appellatur, folia habens aspera, Cucumeris modo: flores exilibus folliculis squammatim compactos, tacematimque dependentes, colore subcinereo. Hanc plantam, inquit Tragus, Mef. c. 24 in simpl. Volubilem tertiam nominat, Barbarus credit Lupum salictarium Plinij, & Græcorum *βρυον*, quasi ad Bryonia aliquò pacto pertineat dictum. Manardus Lupulum, Lupum reptitium, Tolophiam, Volubilem magnam & mediam, Habiolam, Habillam, & Bruscululam vocari tradit I. epist. Quorum sanè omnium sententia, ut non multùm ab invicem distant, ita maxime mihi probantur. Sed cum iis convenire non possum qui Lupulum Corradum interpretantur, cum Asparagus Corrada dicitur Theophr. 6. c. 3. Ceterùm ut quid mihi de Lupulo videatur, explicem, existimo Lupulum eam esse apud Dioscoridem plantam, quæ illi *αυλιος* & *ραυλιος*, h. e. Smilax aspera dicitur. Idem Tragus ait, quæ de Smilace aspera sua Plinius tradit, ea efficacitè & certè præstare Lupuli florem odoratum (qui in Petro de Crescentiis Leverigo dicitur) se credere, idèdque Lupulum Smilacis asperæ genus esse se firmiter tenere. Sed ejus sententia, Cornario teste, tota Diosc. ac Plinij descriptio repugnat, & in primis fructus racemosus.

Matth. Trag. Brunf. Turm. Dod. hist. Tab. Clu. hist. Camep. Cast. Lug. Cluf. & Cæ. Lupulus. Iac. Fuch. Geln. h. & coll. Lon. (qui & Humulum vocari scribit) Dod. gall. Lob. obs. Lupus salictarius. Lob. ic. Lupus salictarius spontaneus sive Lupulus, & Vitis Septentrionalium. Schiv. Lupulus spontaneus mas, Lupulus sylvestris, Lupus salictarius, Wilder Hopffen/ Dorn Hopffen: Item, Lupulus spontaneus sterilis, Lupus sylvestris foemina, Wilder femel Hopffen: folio rotundiore, nec tam profundis, ut mas, incisuris dissecto, & juxta radicem potissimùm sine incisuris. Eid. l. 2. Lupulus mas, *βρυον*, *βουονια*, Lupus salictarius sativus, I. ob. Humulus lætior majoribus capitulis & semine copiosiore. C. B. ph. & apud Matth. Lupulus mas & foemina. Eid. pin. Lupulus 1. mas: Lupulus sativus & sylv. Trag. Lon. Cast. Lugd. Item, Lupulus 2. foemina, ut & Camep. & h.

Lupum salictarium, sive Lupulum Fuchsius à Bryonia. Græcis recentioribus Bryon vocari refert, & à vulgo Humulum & ab aliquot Italicè ruriibus ad græcam appellationem alludentibus Bruscululam, quasi Bryon scansle nominari. Bryon quidem à Bryonia similitudine haud dubiè dictum: Lupum verò salictarium, quia subbeat, scandatque Salices & arbusta omnia circumvolvendo sit appellatum: & hinc quoque Lupum reptitium nonnullis nuncupatum. Hæc ille. Quo verò auctore, Fuchsius Græcis *βρυον* appellari asserat, nondum reperire licuit. Bryon Mulsus est. Dicitur & Caucais *βρυον* à Democrito, ut Orbasius testis est.

Lupulum Officinæ passim vocant: pletique Lupulum, vel Lupulum salictarium: Germ. Hopffen; linguar. Belg. Hoppe & Hoppecruyt; Gall. Dr. Houbl. in It. Lupolo; Bras. and. l. Hisp. Hambre villos. Angl. Hoppe; Boh. Chmel; Hong. Komlo.

In sepius passim abundat ad dumeta & marginibus pratiorum hunc nentium luxuriant. Vitis instar colitur à Germ. Septentrionalibus capitulis & semine copiosiore. Capitula Augustò & Septembri colliguntur & coguntur in saccos.

Vires, temperamentum & usus.

Volubilis quarta Mefues Lupulus temperatus vel potius frigidus principio ordinis primi. Sanguimentum.

Volubilis genus Mefues.

Volubilis; Mefues. Bryon.

Tolophia. Habiola. Habilla.

Corrada.

Smilax aspera Diosc.

LeSerrigo.

Synon. Lupulus.

Lupus salicinarum.

Hemulius. Brusculula.

Bryon scansle.

Lupus reptitium. Fuch. repr.

Locus et Tempus.

nem bile flavâ modicè purgat, eumque clarum reddit, & sedato ejus calore temperat, præsertim in sero lactis infusa: itera in syrupus ex eo sanat, febribusque biliosis & sanguineis prodest. Ipsa quoque & succus ejus cum hordei polenta cephalalgiam calidam sanat, & ventriculi, ac hepatis interperiem calidam. Cumque sit tam efficaciæ medicamentum, mirari subit, cur à nostræ tempestatis medicis in usu tam rarè habeatur.

Qui cervisiam coquant, loco condimenti Lupulum habent, sine illo enim rarè bona conficitur cervisia. Flores tamen cerevisiæ largius incocti caput tentant. Pistores etiam nonnulli Lupulo carere nolunt. Est enim ad multa quàm utilissimus. Proinde tam flores quàm radices ejus temperaturæ sunt calidæ, & sicca. Recentes verè ac verni Lupulutiones medicam obtinent naturam, ad humidam & refrigerantem qualitatem vergentes. Apicij recentes Lupuli turiones non aliter atque Asparagus, acetarius in Vere expetunt, nec sanè ineptè illi facere videri debent. Siquidem Lupulus in tenera suæ ætate in cibo devoratus, sanguinem purgat, ventrem solvit laxatque, & obstructionibus epar & lien liberat. Vnde colligi potest non solum turiones hos in cibo usurpatos, sed flores Lupuli vino decoctos ac potos, adversus venenum, & si cuius aliud malum in interaneis fuerit, unicè facere. Flores Lupuli in deflectionibus duritiem & tumorem matricis juvant, nec non difficulter urinam reddentes & eos qui inter menjendum, calculum vesicæ sentiunt. Turiones primo Vere aquâ ferventim macerati & frigidâ abluti, cum aceto & oleo communi, addito sale in aceteria veniunt. Cichorij sapore non ingrato, calore temperato ad alvum emolliendam, Lupulus flore & semine calefacit, exicat, extenuat, aperit, abstergit, sanguinem purgat. Bibitur contra venas, scabiem, luem gallicam, & ceteros affectus, qui cutim extimam inhiunt. Datur etiam contra febres ab infarctu provenientes. Semen lumbrius ventris necat, urinam provocat & menstrua educit. Vultus & vetule Salmanticæ sces, sæpenumero medicinam empiricam facitære solita, ad curandam alopeciam à venerea lue natam, hæc ratio in Lupulo utebantur. Eius radices pondere libræ unius probè lotas & à sordibus repurgatas, per noctem in aquæ libris octo macerabant postridie in illa ipsa aqua, lento igne & fumi experte, ad tertiam partem consumptionem coquebant, vel etiam ad mediam partem, si vehemens esset alopecia. Decoctionem servabant in usum: ejus uncias octo manè agris jejunis propinabant, deinde stragulis in jectis sudorem provocabant. Addebant interdum Apij sive Selini hortensis, duas aut tres, & graminis aliquot radices, nonnunquam etiam passas Vvas à gigartis mundatas.

RADIX CAROLI SANCTI,
foliis Lupuli.
C A P. XXVIII.



Lupulo similis est, & periculis se convolvit illius more; quibus si careat, humi spargitur & diffusit. folia etiam Lupulo similia, colore viridi, sed obscuriore, odore gravi: neque florem, neque fructum fert. Radix crasso capite est, ex

quo alie radices oriuntur digiti crassitu line majoris, colore candicante: cortex qui facilè separatur, cuiusque odore aromatico, gustu avaro, cum usum. quadam acrimonia; nervus radices corticè spoliatur, multis quasi filuris seu tabellis tenuissimis constare conspicitur, quæ sigillatim separari possunt.

Monard. Carlo Santo. Geof. lin. de pl. Bras. de Car. Synon. Lo Suro. Cast. Carolus Sanctus. Lugd. Radix contra venena Carlo Sancto. B. phyt. Lupulo similis Mechoacana. Eid. pin. Lupulus 3, Mechioacan: Indica radix, Monardi, par. alt.

Nascitur temperatissimis provinciæ Mechoacan Locue. locis solo neque nimium secco, neque humido.

Calida & sicca initio secundi gradus. Radicis Caroli Sancti cortex manè aliquanto tẽpore commanducatus, multam pituitam, aliosque humores ex capite elicet, eamque ob causam rheumatismos, capitis dolores & deflusiones curat: in nonnullis etiam vomitu multam bilem & pituitatem è stomacho expellens, sed illius decoctum maximè ejus gratia ventriculorum noxiis humoribus liberat, eumque roborat: purgationem tamen precedere necesse est. Idem commanducatus, gingivis abscedentibus auxilio est, dentes stabilis eoque à scabritia & corruptione liberat, orisque halitum commendat: sed postea vino os eluendum, ad amaritudinem tollendam. Pulveris ejus exigua quantitas ex vino albo, aut Adianti Canelleque decocto sumptus, vulvam obstructionibus liberat, mensisque provocat, & status discutiit, purgato videlicet priùs corpore, & alvo (dum ejus remedio utentur) ex æquis partibus Liquidambar & unguenti Dithære inuncta. Cordis affectibus, præsertim qui ex uteri sympathia oriuntur, auxilio est ejus pulvis, ut ante, sumptus, aut illius decoctum hoc modo preparatum: Radicis minutim concisa drachma duæ in tribus aquæ sextariis coquantur ad dimidias, corticis Curi in pulverem redacti drachmæ quatuor, pulveris Canelle drachmæ duæ statim injiciuntur, ac denudè fervent, deinde colantur. Istius decocti sex uncias singulis diebus manè addito laccaro propinantur, purgato tamen priùs, ut decet, corpore. Hunc pulverem, & decoctum nonnulli in morbi gallici affectibus, atque etiam epilepsia commendant. Alterius experiri non admodum necesse est, quod multis aliis ad eum morbum remediis abundemus. Alterius periculù faciendum in iis qui vigesimum quintum ætatis annum nondum excessere: nam epilepsiam in adultis tolli, non est verisimile. Descriptis his Caroli Sancti facultatibus, qui proximè classe è Nova Hispania advenerunt, istam radicem Indicam cognominabant, eamque valdè estimabant: tartas enim illius facultates experientiâ comprobatas se habere dicebant præter modò enumeratas, ut plures de Rore-marino celebrari non soleant. Ejus corticem in pulverem tritum puerperis obstetricum negligentia animi deliquium patientibus, propinanti; plurimum enim sudorem provocando liberantur. Idem pulvis ex vino aut florum malorum Aurantiorum stillatio liquore datus, mulieribus parvis difficultate laborantibus magnam utilitatem adfert. Monachus quidam ventriculi debilitate affligebatur, ortâ tam ex frigidorum humorum abundantia, eam ex imbecillo colore naturali, sic, ut nec cibum concoquere posset, sed is corrumperetur, & in magnos flatus converteretur: has radices cum pro sua opinione in aqua decoxisset, cæcæ parillæ modo, decoctum per multos continuos dies in prandio & cena hausit: id illi ad eò feliciter cessit, ut & ventriculus roboraretur, & cor calefceret, eadè que opera cibos postea probè concoqueret, ac idis nidioribus liberaretur, & flatus absumerentur. Aliud præterea confectus est non speratum auxilium: nam horniâ (quâ

Ventriculi debilitas.

per

per multos annos laborabat, sic, ut braccis & ligamentis quasi assidue uti cogeretur, nec nisi certis quibusdam intervallis eas deponere posset) liberatum sese sensit, eam bimestri hujus radices decocto usus fuisse, nec braccas amplius adposuit, sed sine illis incessit. Vtile etiam est hujus radices decoctum ad os colluendum: nam gingivas roborat, dentes à corruptione præservat, atque si jam corrumpti incipiunt, ne latius malum serpat, impedit. Cæterum adversus hoc malum habeo remedium multorum jam annorum experientia comprobatum, ut videlicet æquis partibus aquæ & rosarum calycibus stillatitz, & aceti scilicet subinde os colluatur: nam certissimum est dentes eâ collutione à putredine liberari, & sillâ jam correpti sint, ne ulterius serpat, prohiberi. Hactenus Monardes.

Ad gingivæ & dentes.

Dise. leſio Saria.

V. ſua.

Vires.

Somni & tumuluoſa.

Milax levis Galen.

Arquibaca. Smilax horrenſis. Sel phasolisfera.

Convulſiva maior.

Helxine ciliſampelos. Celſeminum.

Smilax ilicis genus. Smilax aſpera. Hecraura borea.

SMILAX LÆVIS VETERIBVS. CAP. XXIX.

Smilax lævis, ita describente Dioscoride, folia habet hederacea, sed molliora, leviora, tenuioraq; [ἀσπύρα, & μὴν ὑπότροπα ἔχει] flagella æquæ ac prior [Smilax aspera] at nullis spinis horrida: quibus tamen haud secus ac illa arbores scandit, us sese circumvolvens: semen verò gerit ceu Lupini [δένδρον: Auth. ad verſ. ἔχει: quidam legendum conjiciunt κακοπὸν ἢ ἔχει δὴν δὴν ἀπὸ] nigrum, exiguum, supra quod flores perpetuò videntur, candidi, undiq; numerosi & orbiculati. Ex hac porro Smilace per ætatem et p[er]iarij operis umbracula factitantur: at folia per Autumnum amittit.

Cæterum semen cum Dotyrenio potum ternis singulorum obolis [πεπρωμένη ὄκλι ἐκ τριῶν: Matth. τριῶν βελονῶν ἀπὸ τῶν ἐκ τριῶν] ut somnia tum varia, cum etiam tumuluoſa videantur, efficere perhibetur. Galenus hæc Milacem lævem nominat, ac asperæ quodammodo similem esse, quoad vim atinet, refert. At Plinius contra lib. 24. cap. 6. nullius esse effectus scribit. Quidam, inquit, duo genera Smilacis dixere, &c. [vide titulum de Smil. nec aspera.] Alterum genus culta amare & in his gigni nullius effectus.

Quidam, ut Cordus, existimant Smilacem lævem eandem plantam esse cum Smilace Phasolisfera: ego eam opinionem refuto lib. 17. Ruellio Smilax lævis est grædis Phafellus. Non desunt, inquit Saracenus, qui Smilacem lævem eandem esse cum fativa seu hortensii Phasolisfera existimant: tum quoniam utriusque descriptio propemodum eadem, viresque itidem eadem à Dioscoride trihauntur, tum quia Galenus & Paulus, Smilacis hortensii in simplicium censu nullâ factâ mentione, Smilacis lævis tantummodò meminerunt. At ego cum peritionibus rei herbariæ professoribus inter utramque manifestum discrimen agnosco, Smilacemque hortensianam eam esse credo, quæ καλοῖται seu phaseolos profert: hæc verò, ad asperæ differentiam lævem dictam, eam quam recentiorum plerique Convulſivi majoris aut etiam albi nomine designant.

Alij autem contra Saracenum negant, nec fortè sine ratione, Smilacem lævem esse Convulſulum majorem.

Quidam apud Corn. Smilacem lævem Helxinem Cissampelon vocant, malè.

Cælsalpino Smilax lævis est Galseminum, quæ opinio fortè non rejicienda: lectores pendant diligentius.

Smilacis equivocaciones alias posui lib. 7. ubi ago de illicibus: Item hoc libro ubi scripsi de Sitalace aspera.

In lib. 6. Æginetæ cap. 84. in Theodorici remedio contra gangrenam intelligunt quidam per Hede-

ram arboream, Smilacem lævem, quibus assentitur Dalechampius.

CONVOLVVLVS MAIOR.



Pergulis obumbrandis posset interſervire Smilax lævis, ita subsidio proximi cujusvis sustentaculi in altum nititur, longissimis & veluti contortis tenuib; striatis viticulis, ex quibus, longis intervallis, pediculis unciâ longioribus herentia prodeit folia, hederaceis longè majora, acuminata, duas alas hinc & hinc juxta pediculum promittentia, lævia, nitida, viridatâ, ex quorum sinu profertur pediculus longus singularis, cui insidet flos unicus magnus nivei candoris, calathi formâ, cujus imum tubulum folliculo complectitur, semina in capitulo Cerasi mediocri magnitudine rotundo continentur fuliginosi coloris.

Hanc ita delineavit Dodonæus: Smilax lævis major viticulosis ac farnentosis cauliculis longis ac tenuibus sursum ac deorsum arboribus, fruticibus, vicinisque sepimentis obvolvitur circumligatitque: folio est lato hederaceo, sed molliore, lævigatiorèq; flores exiliunt candidi, copiosi, rotundi, calathi effigie, colore candidissimi ac Lilia æmulantes: semen angulosum, sordido colore nigricans, exiguis sylvestribus Lupinis propemodum simile, capitulo ex tenuibus membranis continetur, radices longæ, trifloribus cirrhis similes, intus candidiores, hæc illæ per obliquâ, infra terræ tamen superficie feruntur.

Mesic Volubilis magna, Lactaria, Funis arborum dicta. Sylv. Cissampelos Dioscoridis. An Dioscoridi (quod Trago, Matth. Fuchf. Dod. Lob. C. Bauh. Schvvenck. & alijs placet) Σπιθαμὴ λέγεται, folio Hederæ simili molliori? An præterea (quod Fuchf. & Dod. affirmant.) Μόλαξ λέγεται, Galeno & Paulo Æginetæ? Cord. in Diosc. Helxine Cissampelos Græcorum, Latin. Convulvulus, cujus flores Ligustrum interpretati sunt apud Virgilium, magno errore. Sed eodem planè lapsu existimatur quoque Ligustrum, de quo Martialis lib. 3. in Procillum scripserit. Quod si enim (ut dictæ opinionis autores sentire videntur) Smilax hæc Ligustri nomen aliquando sortitum sit, quoddam vicinis circumligetur, ac circumvolutionibus plurimis implicetur, non tantum non sola Ligustrum erit, sed & Vitis, Lupulus, Cuscuta, & infinitæ aliæ. Sed & ipsum quoque Ligustrum, Ligustri nomen non merebitur, cum per se erectum sit, nec vicinis se circumvolvatur.

Tragus Volubilem suam majorem (ita enim Convul. majorem inscribit) quam Germanos à forma florum Campanam candidam vocare scribit, eam esse dicit quam Mesicæ simpl. c. 2. s. Funem arborum, candidam. quod est (si germanicè interpreteris) Seilbann; Avicer na l. 2. c. 735. Funem Papaverum; vel ut alij habent, Pauperum (quod sonat germ. Ectetera Scit) appellari; Alij autem Cymbalarem, & Campanellam vocant; Otho tandem Brunfelsius Volubilem esse.

Folia hederacea.

Deser. Dod.

Synon. An Smilax lævis. Diosc.

Campana candida.

Funis Pauperum. Funis pauperum.

estrophyllon aut Cissampelon esse existimavit. Verum Cissophylli appellationem proprie ad Asclepiada pertinere Tragus ait & Plinium Volubilem majorem Convolvulum vocasse L. 2. c. 5. ejusque florem non inepte Lilio albo consimile. Quosdam tandem velle scribit Volubile sub Clematide altera apud Dioscoridem L. 4. esse descriptam; alios Peticlymenum esse dicitare; non nullos rursus Smilacem laevem facere. Quæ opinio ipsi magis aridet, ut quam etiam Ruellius sequatur. Proinde si omnino quid sentiat, effari liceat, videtur ipsi sane hæc planta Scammonæ (quæ Dioscoridi Colophonia, Dactylon, Colophonium, Apopleumonos, & Sanilum cognominatur) genus esse sylvestre, sed non noxium quale est Scammoncum, quo officina utuntur.

Malocissus, quæ Democrius mollibus Hederae foliis depingit, caule tenero, fere cuncunque, quod fuerit nactus, involvente, videtur Gessu. h. Iasionis, sive A-sines, seu Convolvuli speciei major. Huic subscribit Anguill. ep. 5. dum ait, Malocissus Democriti apud Cassianum Bassum nihil aliud est, quam Convolvulus, vocaturque à Catone Volubilis. Convolvulus (pergit Gessu. h.) vulgò Volubilis, Liliatrum, καλυμνίτης ἕρπον, secundum Ruellium: Item Clematis altera, herbariis nunc Volubilis major ex Ruellij sententia, sed non est Liseron, Campanella Ruellio.

Nullam hætenus inveni (inquit Turn.) descriptioni Smilacis lævis per omnia respondentem. Est enim Convolvulus flore magno nolæ instar in aliis omnibus respondeat, dissentiunt tamen fructus, Lupino dissimilis. Aëtium quoque de curanda hydropo, ait Smilacem in sepibus & propter aquas nascentem, si quas proferte Smilacis hortensis. Sed tale quicquam nusquam observavi in Convolvulo maiore. Smilax lævis Matthioli cum nec semen habeat Lupini, nec si quas Smilacis hortensis, nequit etiam esse meo iudicio Smilax lævis, nisi alij sint Lupini mihi incogniti, aliaque si quas Smilacis hortensis nunquam mihi conspectæ. Mihi quidem videtur Smilax lævis Matthioli primum esse Volubilis genus apud Mesuræum.

Convolvulum potè huncce majorem, Smilacem esse Dioscoridis negat etiam Casdicens: Sunt, qui putant apud Dioscoridem, Smilacem lævem esse; nam descriptio in cæteris valde congruit, sed non ad eam altitudinem adolescit, ut in æstate ad umbras quærat, neque tantum folia in Autumnum decidunt, sed & caules & tota planta perit; idcirco magis visum est Smilacem laevem albo Gessuino convenire.

Fuchs. Math. Acosta, Bellon. Turn. Cam. ep. (qui non audeat affirmare, an legitimum Smilacem lævem referat) Smilax lævis. Lugd. Smilax lævis Matthioli. Dod. hist. & purg. Lob. Obs. & ic. Smilax lævis major. Dod. gall. Smilax lenis alba major. Lob. adv. Convolvulus major, Plinij Smilax lævis, vel lenis, Volubilis major vulgi. Trag. Tab. Volubilis major, ut & Cam. hist. ubi figura nova. Schvv. Convolvulus major (ita & Gessu. h.) ζυλινάξ λαά, Dioscoridis. C. B. Smilax lævis, Convolvulus i. major albus: Volubilis, Brunf. latifolia, Fallop. de decor. Volubilis major, Trag. Lon. Thal. Tab. Smilax lævis, Lac. Cast. Lugd. major, Dod. Lob. Ger. Campanula alba fily. Schvv. Convolvulus major flore albo, Eyft. Est semine nigro, aliquando rufescente.

Geru. vocant Windefraut / glatt Winde / oder Weisglocken; Belg. Winde & Wrange; Gal. Liseron, Liset, Campanette & Phasides Fuchio, minus commode: Ital. ilucchio maggiore: Hisp. Tadra Campani, Lob. Camp. milla Yer va, Dod. Correg. eta maior Math. Angl. Bindweede & Winde Lobel. Schmooth Smilax / Verb Winde / Great Winde / Wurwain de / Turnero: Hung. Feyer venyi, mag. b. j. lak, Clema-

tis altera, Nomenclatori Pannonico. Convolvulus quidem dicitur, quod arbores scandat, & eis se convolvat: Lævis autem Smilax appellata, non aliâ ratione, nisi quod asperis aculeis careat: Liser & Liseron, ut quidam apud Fuchium annotat, à ligandis, quibus adnascitur plantis dicitur.

Nascitur passim per fruteta & sepes, sese involvens: amat culta & in iis etiam potissimum dignitur; æstate floret, Autumno semen profert. Particularim in monte Moutetz florentem adhuc Orobri observavi.

Fuchius præter quod ei modicam amaritudinem in gustu præferentem attribuat, huic etiam, ut plures alij, vires ex Dioscoride, Plinio & Galeno ascribit. Sed si non sit Smilax lævis ut existimaviderentur Turn. & Castalpinus, suspectæ erunt vires ei attributæ ex Smilace. Miror Tragum dicere folia quæ stata linguam urere cum amaritudine, & postea scribere stillatitiam aquam florum internæ & externæ valde utilem in omnibus calidis affectibus, & ad ruborem oculorum. Volubilis magna, Laetaria, Funis arborum dicta (inquit Melsin veri Sylvi) Dioscoridi est temperata, vel paulò calidior; sicca ordine succundo: resolvit, maturat, terget, solvit, aperit officina vasorum; ob id datur cum tragacantho, mastiche, spica Nardi, sero lactis; obstructionem venarum mesentericarum, & hepatis liberat; ob id sanat icterum cum succo apij & intybj, vel sero lactis; bilem istam elementem purgat, ob id febres putidas, præsertim biliosas, diuturnas; thoracem & pulmonem extremis repurgat, ob id asthmata confert, phlegmonem hepatis externam, præsertim cum polenta & oleo rosaceo & aceto. Cephalalgiam antiquam præsertim cum oleo rosato aut chanaemelino & acetato. Succus ejus aurium ulcera sanat. Empirici id perhibent Fuchio, sicco Volubilis majoris ad calidas uruntur passiones, capitis potissimum & oculorum. Montbelgardi animadverti hortulano diligenter hujus radices colligere, non solum quòd suo reptatu multiplici odiosa, sed quòd porcis gratum & utile alimentum sit. Hæc degustata nec amaritudinem, nec acrimoniam sensit.

IASIONE VETERIBVS. CAP. XXX.

Exploratum illud habeo (inquit Theophr. l. i. c. 21.) Idem flor. gen. & differ. per omnes partes differentias plures vario modo exultare; nam nonnulli etiam folio uno emergunt, descriptionem tamen plurium ostendunt, ut flos Iasionæ: in hoc enim haudquaquam folium unum quoque discernitur, nec conceptaculo [legend. in γαίης, ut in γαίης quod Gazæ error est veritè conceptaculum, Rob. Consf.] pars infima eget, sed postrema in angulos exeunt, Oleæ quoque flos panè talis esse videtur. Hæc nos ita reddimus. Nonnulli flores etiam unico folio naturâ constant, delineationem tamen plurium ostendunt, ut flos Iasionis [id est, ab ἰσίων, τὸ ἰσίων, s. τὸ ἰσίων, s. τὸ ἰσίων.] Non enim singuli flores in folia dividuntur, neque sanè conceptaculi pars inferior distinguitur, sed ex superiore parte projecturæ angulosæ exeunt, τὸ τὸ ἰσίων, s. τὸ ἰσίων, s. τὸ ἰσίων. Est enim τὸ ἰσίων, ut ita dicam, capedo. Nican. det χεῖρα αἰν in Theophr. Interpres τὸ τὸ χεῖρα αἰν τὸ χεῖρα αἰν, at ego à manu. Sic enim habes χεῖρα capti vau apud Sophoclem. Et χεῖρα ἰσίων ministerium recitat. τὸ Αἰθερο-

Cissophylli.
Dioscoridi.
L. 4.
L. 2. c. 5.
L. 2. c. 5.
L. 2. c. 5.

Malocissus.
Democritus.
Ep. 5.
L. 2. c. 5.

Matthioli.
L. 4.
L. 4.
L. 4.

Turn.
L. 4.
L. 4.
L. 4.

Geru.
L. 4.
L. 4.
L. 4.

Locus et Tempus.
L. 4.
L. 4.
L. 4.

Tragus.
L. 4.
L. 4.
L. 4.

Temperamentum.
L. 4.
L. 4.
L. 4.

Observatio.
L. 4.
L. 4.
L. 4.

Astima.
L. 4.
L. 4.
L. 4.

Cephalalgia.
L. 4.
L. 4.
L. 4.

Porcorum alimentum.
L. 4.
L. 4.
L. 4.

Theophr.
L. 4.
L. 4.
L. 4.

non semel. Ex his Scaligeri verbis, quæ opinioni Rob. Conf. taxator. Theophr. à Roberto corrigatur.

Olea floribus autem similitudo cum Iafone, in quo consistat, apparet ex cap. 22. lib. jam citati, cum ait. Olea foliis prostratis spectantur perforati. Sanè plurimi sunt flores in eo cum Iafone convenientes, qui licet appareant ex diversis foliis, tamen unicum sunt folium, quod & decidens subsistit integrum sine conceptaculo; Leucoia verò omnia, Rosa, Cisti, Lilia, Trifolium hepaticum, & alij multi flores cum decidunt, extra conceptaculum separantur, unde manifestò apparet, foliis pluribus consistere. E genere verò unifoliorum florum videtur esse Verbafea, Phlomis, Iasminum, Trifolium fruticosum luteum, Sambucus vulgaris, Ebulus, Campanulæ omnes, Anthirina, &c.

Theophrastum l. 2. caus. c. 25. de plantis, quæ aliquid quærunt, cui incumbant, hanc intelligere credo, dicentem. Adde quæ arboribus sustententur, atque amplexicaulia constant. Hæc enim aliquid, cui incumbant quærunt, cui inter minora Volucrum [Gaza in cod. Veneto & Basl. dicitur: alij, ut Gesnerus & Scalig. innot. Rob. Conf. Ligustrum Virgilij secundum Servium, i. e. Clematis sive Convolvulus] quod vitam apud aliud agit [cod. Venet. legebat ægypti, in Basl. autem ægypti melius] quod si obtinere non valeat, humile præcipit, atque humicula [ægypti] fit. Hoc autem corpore levi constat, facilèque arborescendit, offensatque. Et hinc noxam arboribus infert perstringendo, obumbrandoque pabulum aufert, cætera prohibendo.

Plinius Iasionem diversis in locis, diversis nominibus exhibet. Libro namque 21. c. 5. ait. Est flos non dissimilis illi [Lilio] in herba, quam Convolvulum vocant [ea est Iasione à Theophr. & ab auctore dicta, D. leib. ex Scalig.] nascens per fructu nullo odore, nec croceus intus, candorem tantum resertens, ac veluti naturæ rudimentum Lilia facere condicentis.

Idem lib. jam citato cap. 17. inquit, Iasione unum folium habet [ad s. rem referendum, Hermol.] sed ita implicat, ut plura videantur. Addit autè l. 22. c. 22. Et Iasione olus silvestre [Iasione olus repens, alij] habetur, in terra repens, cum lacte multo; florem fert candidum; Concilium vocant. Ethujus eadem commendatio ad stimulandos coitus. Cruda ex aceto in cibo sumpta mulieribus lactis ubertatem præstat. Salutaris est phidus in sentientibus. Infantium capiti illita, nutrit capillum, tenacioremque ejus cutem efficit. Rectè Hermol. apud Plinium pro Lasiene Iasione legit, dicens. Quidam verbum Iasinen corruptum esse nescientes, Plinium culpant, quasi hanc ipsam herbam lib. 24. repetierit inutiliter, Laginem vocando, non Iasionem. Sed cum longè alia sit, ut ex superiore libro constat, nec ea vocabuli sit affinitas, quam putabant, modestè suæ parùm consulenti, nisi recantant.

Iasione Scaligero est Convolvulus; Rob. Conf. Smilax lavis Dioscoridis; Dalechampia Volvulus major, Smilax lavis Dioscoridis, Convolvulus Plinij. Nobis autem inter plantas jam denominatas, melius placet Convolvulus major, sive Smilax lavis dicta.

Iasione Theophr. & Plinij censetur à Gotopio, Lobelio, & Gesnero Convolvulus minor, quem Helxinen Cissampelon quorundam irrisa inscribimus, qui que Ruellio, Car. Stephano & Gottæo Liferon, sive Lalleron cognominatur.

Convolvulum folio Althææ ad quam plantam à veteribus descriptam referri possit, ignorare se fateatur Clusius, nisi fortè Iasione Plinij sit. Vocatur hic Clusij Convolvulus à nobis peregrinus, de quo paulò post.

Dodonæus videtur in nuere suam Campanulam cæruleam hortensem esse Iasionem Plinij & Theophrasti. Sic Penæ & Lobin adscribunt Campanulam hortensem meritò putari Theophr. Iasionem. De Campanula cærulea agimus lib. 20.

Iasione Plinij, olus silvestre, lib. 22. c. 22. traditum, non abhorret à Rapunculo, auctore Cæsalpino, quamvis non repant caules, nec flos candidus infit. De Rapunculo agimus lib. 20.

Alia verò est Iasione (ait idem Cæsalp.) apud Theophrastum: de qua idem Plinius alibi, quam Aquilegiam putò. De Aquilegia scribemus lib. 30.

Laginem Plinij, quidam malè censent, auctore Hermolao, ut jam ex eo scriptum eandem esse cum ejuisdem Iasione.

HELXINE CISSAMPELOS veteribus.

C A P. XXXII.

Helxine [dicitur, car. d. s. m.] cognomento Cissampelos (addunt interpretes) folia habet Helxide similia, at minora: ramulos verò longos [dicitur, car. d. s. m.] quibus circumplectitur quodcumque contigerit adminiculum. Nascitur in sepibus, vineis ac legebibus. Potus foliorum succus alvum solvendi vim habet. Cissampeli quidem hoc in loco cognomentum rectè adjectum interpretes ex Galeno & Paulo ad distinctionem alterius Helxines seu Muralis herbe [Parietaria] de qua suo loco agemus. Neque porrò existimandum Helxinem, de qua agit Plinius l. 21. c. 16. harum alterum esse. Siquidem alia est, quam Ixinen veteribus nominare debuit cum Theophrasto hist. l. 6. c. 4. ex cuius verbis suam ipse historiam deprompsisse videtur. Hoc verò capite descriptam Helxinem, rectè Plinij Convolvulum, l. 21. c. 5. commemoratum, esse dixeris, eo nomine donatum, quod suavitè vidualium ope vicinis sese advolvat adminiculis. Quod autem Galenus & Plinius huic Helxine vim tribuant [dicitur, car. d. s. m.] in eo minimè (quod voluit Marcellus) Dioscoridi repugnant, quandoquidem, teste Sarraceno, utraque facultas & discutienti & solvendi alvum, potest citra controversiam, uni eidemque plantæ competere. Marcellus Virgilius malè Cissampeli Helxines car. d. s. m. putè Dioscoride, quasi adulterinum reject, nihilo minus tamen nomina ejus in Helxines (quæ Parietaria est) capite, relinquens, ut sunt, Cissampelon, Cissampelon, Melampelon & Cissanthemon.

Ex hæcenus dictis apparet duas diversas esse herbas à Dioscoride Helxines nomine descriptas. Una Cissampelos ab interpretibus cognominata, quam Cordus in Diosc. Convolvulum à Latinis vocari scribit, cujus quidem species duæ habentur, major scilicet & minor.

Helxine Cissampelo Elatinem similem esse scribit idem Cordus in Diosc. quam quidam inibi Orbachen nonnulli facere tradit.

Alterà verò Helxine, Parietaria Latinis dicta, Galieno Perdicium & Herba muralis Celso.


Helxinem suam Plinius lib. 21. cap. 16. Ixion [Ixine] que Chemeleon albus est, D. don.] verius nominare debet (inquit Sarracenus in Diosc.) cum Theophrastò ex quo suam ipse historiam desumpsisse videtur. Et hoc ipsum Cordus in Dioscoridem admittit, cum dixit. Magnò errore apud Plin. lib. 21. cap. 16. Helxines appellatione Carduus quidam describitur.

Rob Conf. taxator.
Similitudo cum Olea in qua consistat.
Flores foliis pluribus. Flores unifolij.
Volucrum.
Theophr. l. 2. caus. c. 25. de plantis.
Gaza in cod. Veneto & Basl. dicitur: alij, ut Gesnerus & Scalig. innot. Rob. Conf. Ligustrum Virgilij secundum Servium, i. e. Clematis sive Convolvulus.
Arboribus noxia.
Iasione Plinio.
Convolvulus.
Plin illustratur.
Lagine.
Concilium veter.
Plin excus. Lagine. Nascitur plurimis.
Aquilegia Convolvulus major.
Convolvulus minor.
Convolvulus peregrinus.

Campanula cærulea.
Rapunculo.
Aquilegia.
Lagime Plinij.
Diosc. & Marcellus.

Diosc. & Marcellus.
Lacina ex vet. cod. qui addit, & dicitur sic legit & Carac. ac vulgatum exemplar purgè.
Lacina.
Parietaria.
Ixine.
Marcellus.
Diosc. & Marcellus.
Parietaria.
Cissampelon.
Melampelon.
Cissanthemon.
Cissampelos.
Elatinem.
Ixine.
Carduus.

HELXINE CISSAMPELOS MV L-
tis sive Convolvulus
minor.



Non videtur, licet se proximis circumvolvat etiam, anadendras, ut Volubilis major; sed brevioribus, tenebrioribus viticulis per terram spargitur; folia intorto pediculo, multo minora quam scandentis majoris, ideoque minus pinata, magis tamen rugosa, nervosaque; flores ex foliorum alis longè minores, ex albo purpurantes, ac etiam omnino albi; radix similiter tenuis & tetes, reptatrix.

Volubilem minorem, forem valdè variare agro Francosurtenis observabat Clusius: Nam vel omnino niveus erat, vel albus quidem, sed in quo secundum quinque complicationum longitudinem subpurpurascens color elucebat, umbilico etiam albo, aut omnino purpureo vel profus purpurens, radiis secundum complicationes albis: vel medio inter utroque colore: vel radiis crassioribus, saturatius purpurascens, reliqua parte albis.

A Iasione Theophrasti & Plinij non multum diffidere putatur ea quam nostrum vulgus (inquit Ruel. & post eum Gorrh. def. med. Lob. adv. Gesn. coll. & cat. ubi ipsi quoque videtur Clematis tertia Plinij) Liferonem; rura Liferotam appellat: namque ferpit humi flore Convolvuli candido: videtur quoque nonnulla prisci nominis rudimenta in gallico vocabulo relucere. Nam & in Plinio Iasione pro Iasione haec tenus depravate legebatur. Sed & Goro-pius Ruelli sententiam tenet: Plinius, inquit, Iasionem Convolvulum minorem vocare videtur, aliens ferre florem candidum, Concilium; minorem vocat. Theophr. hujus florem uno solo constare dicit, quod Plin. ad ipsam herbam transtulit, malè.

Considerandum an Carolo Stephano Iasione Ruellij fuerit nota, & quo pertinet quae dicit de ejus usu, quae videtur ad Iasionem Ruellij, vel, quod suspicor, verius ad Sonchum referenda. Obscurius sanè de ea scripsit, addendo verbis Theophr. & Plinij, quaedam de suis, ut ex sequentibus patet. Iasione Theophr. & Plinio olus est sylvestre humi serpens copioso lacte succulentum, flore candido & in hoc nobili, quod singulari folio constat, sed ita implicato ut plura videantur, floris margine in angulos exeunte. Haud multum differre ab ea videtur quae in nostris vineis crescit: quam rustici per astatem & acumnum colligunt ad cuniculos educandos: iis enim mirum in modum placet & gratissima est, quemadmodum & Brassica. Vaccis quoque & bubus pro esu porrigitur quam Laceronem, sive Lacerotam appellant [Galli du Laceron] nisi quis potius Sonchum esse putaverit, qui vulgò Lacteronis, à lacte quo dissolvit, potius quam Lacteronis nomen habere debuit. Sed alia est profus à Iasione, ut ex Ruellij descriptio e patet.

Cord. in Diosc. Helxine in legetibus nascens, gracilibus & oblongis foliis, flore praedicti [Convolvuli minoris] floribus similibus, sed secundum proportionem Tom. II

minore, lacteam liquoran contracta remittens, Germ. Kornwinden [Convolv. frumentisium, dixerit] appellata.

A Trago Volubilis minor (sic & Lon. Thal.) sive secunda, Cymbalaria cognominatur, quam Cissampelon esse aut Helxinen, ut multi astruunt, negat, & nihil aliud esse affirmat, quam Anginam & Pestem hortensium herbarum.

A Dod. gall. Smilax lenis alba minor inscribitur ac poitea inter nomina Volubilis minor appellatur, magnamque similitudinem cum Chamacisso [Hedera terreftri] habere dicitur. Quae opinio à Dodon.

purg. & hist. (ubi Smilax laevis inscribitur) his verbis retractatur. Non est Chamacissus, quod quandoque suspicatus. Tametsi enim foliorum, ramulorum, & radicum figura & color descriptioni, quae passim extat, conformes apparent: & flores quia speciosi ac elegantes Leucois aliquo modo comparari queant; huic tamen nomen non minus quam Cissampelo conveniat, non idcirco tamen Dioscoridis Chamacissus. Vires quoque adesse oportet, quae in hac Smilacis specie desiderantur. Chamacissus calida & amara foliis est, haec verò nec amaritudinem, nec caliditatem ullam obtinet: pustata siquidem qualitatem nullam exeret, magis superba quam calida. Quod hanc nullatenus Chamacissum esse abundè ostendit. Ignava autem est, nulliusque usus herba. At laevis Smilacis speciem esse, neque alio referendam satis est manifestum. Non desunt tamen

[inter hos Matth. Fuchs. Ang. qui Scammoneam tenuem Plinii quoque facit, & Gesn. de h. Cast. Lugd. C. Bauh. & Plinij Scherz.] qui Helxinen esse velint, cognomento Cissampelon. Sed pro hac aliam ostendo, Dod. Lob. adv. obs. & ic. Convolvulus minor purpureus. Lugd. Helxine cissampelos Matthioli arvensis & separius. Turn. Convolvulus. Gesn. Cat. & Clus. hist. Convol. minor, cui & Volubilis minor. Tab. Volubilis arvensis. Scammonea parva Cam. & Ang. cui & Orobanche Theophrasti. B. phyt. Convol. sive minor arvensis. Eid. pin. Smilax laevis sive Convol. minor arvensis. Annotat autem ipse quibusdam Orobanche Theophrasti 8. hist. 8. ubi Gaza Ervanga reddiderit, dici. Ervanga verò cognomento cissampeli nomine Dioscoridem meminisse, quod folia Hederae similia habeat. Schv. Convol. minor, sive Convolvulus minor. Diosc. sive Ervanga, à Ervino circumvolvendo. Dicit autem Ervino, quod significat trahere & arripere.

An de hac loquitur Amatus l. 4. c. 42. quando ait: Graecè, sive sive dicitur. Lat. Helxine cissampelos, Convolvulus; Arab. Asim; Hisp. Campanello; It. V. Nucchi; Gall. Li. et, qui Campanettes; Germ. V. Witt. Winden; Weingartwinden. Hanc quoque Servius Grammaticus, non sine errore Ligustrum appellavit; brevissimè Galenus l. 6. simpl. Helxinen alteram Cissampelon dictam, digerere di obtinere facultatem ait. Convolvulum minorem & Volubilem minorem Germ. Klein Windkraut; Klein Zaungloster; Klein Schellen; Belg. Klein Winde / Gall. Petit Liseron; It. Vincchio minore; Hisp. Tervus; Boh. Svitlacc menszky; Hung. Fülök, z. lak.

Passim observatur. Gigritur autem in cultis arvis frequentius, non raro tamen & in neglectis, ac secus margines agrorum: frugibus pluvio praeruptum celi statu molesta. Floret unà cum majore.

HELXINE SEMINE
triangulo.

Altera Helxines cissampeli species & ipsa quoque quaecumque proxima arripuit, circumvolv-



Atriplicis folio.

Cenunculus Plumy, Ang. Elatine, Cordi.

Hel. cistampelos Altera Atriplicis effigie, Lob.

Atriplex.

Orobancha

Leonium legumen.

tionem tortili obsecundat, nullis usq. capreolis, sed viticulis suis, quas ex radice mediocriter crassa, multifida plures emittit, interdum palmo paulum altiores, alias etiam sesquicubiales, subrubentes, ad quarum genicula in pediculis longis nascuntur folia singularia, triquetra, Atriplicis (Ocymini Trag. Fagopyri Dod.) acuminato, nigro.

Hæc est illa Cenunculus Plinij l. 24. c. 15. Anguilæ, quam nihil aliud esse tradit, quam speciem Clematidis. Helixina Cissampelo Cordus in Diosc. Elatinem (ita enim hæc præfens planta ab ipso vocatur) flore valde exili, femine triquetra, lacteum liquorem non remittentem, quæ solâ notâ eam à Cissampelo distinguit, similem esse, ac propterea Serapionem statim post Convolvulum eam describere, ac Athin corrupto ab Helixine & Elatine nomine appellare scribit.

Lobelius in adv. à doctis persuasus, Helixinen cissampelon alteram Atriplicis effigie putare legitimum Helixinen, cum tamen huic aliquantum dissimilis sit: Frequens namque (ait ille) amplexibus multis, vites arripit, nec secus aut arectat, aut enecat, vel iisdem pabulum surripit, atque Calythæ; foliis est hederaceis, oblongis, in angustum Atriplicis facie & modo desinentibus; flores item Atriplicis albicant racematim; femine triquetra, nigro, Sefami Theophr. sed minore; radice exigua; ubi vis magno proventu vinetis, frugibus, ac sepibus adnascitur. Sed de succo vel facultate subducendi alvum, mihi ignota, nisi quis Atriplicem putet, eoque lubricare posse alvum statuat, multò tamen imbecillior em illa maritima certum. Hæc ille, qui in obs. & ic. picturam habet sub titulo Helixines cissampeli alterius, Atriplicis effigie. Nisi Elatine, ait Amat. in Diosc. alterius Cissampeli species sit, quæ illa sit ignoratur.

An porò est herba illa Ruellio l. 2. c. 30. quæ Fabam, Cicer & Ervum suo brachiorum complexu circumligans enecat, & Orobancha vocatur; agricolis quidem Græcis Ospreoleon, vel Leontobotanon, h. e. Legumen leoninum, vel Leonis herba: rusticis Gallia Tenia dicitur, forsàn à tenendo, quo tenaci noxa obvolvatur, circuminsq. vel cirris tanquam brachiis strictim amplexetur, ut ea penitus strangulet. Et hæc ille qui lib. jam citato c. 75. eam sequentibus describere videtur. Orobancha cauliculus sesquipedalis aut paulò excelior, subrebens, sine foliis, hirsutulus, pinguis, tener, flore subalbido in luteum vergente; radix illi subest digiti crassitudine, quæ dum ariditate flaccescit, seapum dehiscens in rimas dissilit. Legumina, inter quæ nascitur, strangulat, unde & nomen invenit. Estur oleris vice. Placet tum cuda, tum patinis decocta sicut Asparagus. hæc specie per ætatem inter segetes & legumina identidem ostenditur. A recenti Græcia Ospreoleon, quasi Legumen leoninum, aut Leonteos botane, quod est Herbal. omnia dicitur. Nec mihi susceurridoneum

nomen, quo vulgus ruræ passim utatur, nisi quòd in Parisiensi agro Teniam supra diximus appellari, ubi de Orobancha inter vitæ frugum abundè dictum est. Ex his Ruellij verbis luce meridiana clarior patet, eum duas diversas plantas confundere, præb. vocando Orobanchen Teniam, quam posteriore hoc loco ex antiquis describit, quam prius longè aliam habere nomine Orobanches & Tenia. Sed Ruellium nullus admiretur amplius. Est enim ei ordinarium & assuetum, plantas & diversis in locis repetere, & mixtè inter se miscere.

A Dod. gall. Helxine Cissampelos, Gall. Liferon itelxine noir inscribitur, ac Const. Imperatoris Max. Alex. in Cissampelos. Dod. gall. [Hedera mollis] Latino nomen nonnullorum Convolvulorum, vitæ, officinarum Volubilis media appellatur. Ad Similacis autem lævis genus, Dodonæus Convolvulum suum nigrum sive Helxinen cissampelon de purg. & hist. pertinere scribit, ubi eam præterea Volubilem nigram, in Epist. v. 10. dicitur, in uariis locis appellat, & hæc subjungit: Cissampelos cognominatur, non modò ad differentiam alterius Helxines, quæ & Parietaria; verum quòd & Vitibus crebris amplexibus sæpenumerò circumvinciatur. Reperitur hujus & multè alia, in exemplari quo Matcellus Virgilium usus est, descriptio, & appellationes complurimæ: sed Ruellij & Cornatij editiones magis probandæ. Plinius l. 21. c. 6. non de hac Helxine, sed de Ixine scribit. Exemplaria perpetuam Helxine pto Ixine habent. Ixine verò Chamaeleon albus est.

De præfenti nostra planta Tragus verba facit, ubi l. 2. c. 33. de Orobancha, sive Cusso altero Serapionis agit. Inter vitæ, ait, frugum non postremo loco habetur, quod Germani Spyn seu Windkraut appellant, quam etiamnum Anginam seu Orobancham quam dam esse judico. Cùm verò Orobancha Dioscoridis descriptio huic non per omnia quadret, iudicium candido lectori committo. Videtur sanè mihi quòd præfens vitium altera Cussus Serapionis sit, de quo c. 44. scribit, ac Lebleb vocat, h. e. Volubilem minorem; German. Kleinwinden / vel Schwarzwinden. Hæc ille. Id hic silentio prætereundum non est, cùm Orobancha Diosc. semen in cibo ob dulcedinem ejus, quam præ se fert, edatur; hæc autem iumenta in cibo falsidant, Dioscoridis Orobanchen esse non posse. Hanc porò, quam Ruell. & Tragus Orobanchen esse suspicantur, Gesn. coll. & h. Convulvulo similem herbas dicit præterquam flore. Et licet is locis jam adductis Orobanchen esse neget, atamen in cat. pl. non solum Orobanchen nominat, sed ad imitationem Ruellij cum ejusdem Tenia, planta valde differente confandit. Orobancha nominatur, inquit, quod Ervum strangulet, Leontobotanos. Forsàn hæc fuerit, quæ absurdissima quorundam impetitia, nescio unde, Hypocistis aude appellare, in Parisiensi agro Teniam appellant. Cam. epit. & hist. habet figuram novam cum capraulis sub inscriptione Helxines cissampeli, vulgò Volubilis minoris. Huic autem adscribit nomina linguarum Helxines cissampeli. Lugd. Helxine cissampelos Dod. B. phyt. Convul. sive minor femine triangulo: Eid. B. pin. Smilax lævis 4. sive Convul. minor fem. triangulo: Volubilis media sive nigra, Thal. Volubilis nigra, Tab. Ger. Fromentone alterum genus, Cæf. Polygonum hederaceum, Colum.

Nascitur in cultis locis, arvis, vineis, segetibus, ac sepibus circa Montbelgardum, etiam in horto E. C. Bailleæ observavi mense Octobri seminibus maturis quæ itur in Moutez, Geræva passim florentem & femine turgentem Junio. Vindemiæ tempore, autore Dod. temen pathectur, ex quo, nec aliunde, primo Verè succrescit. Tenia

Tenax pestis (ita enim ait Ruellius non abs re dici posse quidam putant) quod non facile extricari possit, ideo græcæ agriculturæ auctores remedia, adversus natales ejus exortus condiderunt. In arvis ut aiunt non prodidit, si in quatuor eorum angulis & medio Rhododaphnæ ramuli pangantur. hoc eodem remedio putant legumen omne à noxa vindicari. Qui volunt hanc frugum pestem prorius aboleri, quinque testas cretæ depingunt, Hercules effigiem Leonem strangulantis, referentes, & in quatuor agrorum angulis atque in medio collocant. Sunt qui delincentiam eo modo testam in area tantum media ut hanc amoliantur perniciem, jubeant obui. Democritus affirmat Orobanchen herbam confectam abigi, si mulier quæ in menstruis est, solutis crinibus & nudo corpore, gallum in manibus tenens, aream circumeat. Ita validiora coalescere legumina testantur, qui hac superstitione sunt imbuti; quippe cum herba, gallinaceum verens gallum, delitescat. Sunt, è græcis qui longè probant experientia, quæ fetendo sunt legumina galli cruore conspersa, nullam ab hac adveniente herba sentire penitus injuriam, eoque rotata à nocentibus tuta esse afferunt. Cavendum tamen ne quæ sementi destinantur legumina, bubulo cornu contingantur; sic enim inania & casta vanescere produnt.

Quod si hæc planta alter Cuslus Serapionis, seu Trago videtur, fuerit, poterit in medicina usurpari (licet Cordus nullum illius esse usum tradat) præsertim verò ad tumores lienis, in aceto prius coctus, dein tufus, ac cataplasmatim instar impositus, id quod non semel faciendum, sed sæpius repetendum. Quid verò præter hæc efficere valeat, usus quotidianus fortè docebit.

positus. Radix Clusio tenuis, exilis, fusca per summos cespites repit & subinde alias plantas producit.

Ad quam stirpem Veteribus descriptam referri hæc planta, cui à viticulis, vicinis fruticibus aut herbis se implicantibus, Convolvuli nomen Clusius hisp. & hist. indidit, ignorat: nisi quis fortè Iasko-^{Ad Infusione Plinij.} nem, cujus Plinius l. 22. c. 22. meminit, esse existimet. Valentini Convolvulum folio Althææ; Hispani vulgari nomine *Campanilla* i. e. Campanulam; Lusitani *Verdezilla* appellabant, & ad vulnera curanda *Vive*, efficacissimam esse tradebant.

Lob. Obs. & ic. Convolvulus peregrinus Clusij, ^{Synon.} Convolvulus Scammonij facie, an Helixine cissampelos Dioscoridis? Advers. p. 274. Sed apud Advers. ^{Convolvuli Scammonij facie.} saria nullam ejusmodi plantam invenio. Non etiam intelligere possum, cur dicat Scammonij facie, nisi referat ad florem. Tab. Scammonium minus Plinij 2. Flein Scammonium. Hujus iconem Gerardus habet, ac Papaver cornutum luteum minus, ^{Papaver cornutum luteum.} Small Yellow horned poppie inscribit. Lug. Convolvulus folio Althææ Clusij. B. phyt. Convol. 6. ^{Parvicae formata.} (pin. 9. aliis Helixine cissampelos.) sive argenteus Althææ folio, flore ex purpura candicante, interdum omnino purpurascens.

In collibus juxta Tagum flumen lato solo, in Bætica, plurimisque aliis Hispaniæ locis nascitur. Floret Martio & April. Ad Tagum quidem, etiam Decembri florentem Clusius inveniebat. Mihi autem, cum essem Monspelluli, allata est mense April ex monte Seti. Similem vidi apud D. Zvingerum Bafileæ foliis ferè pellucetibus.

CANTABRICA VETERIBUS.

CAP. XXXIV.

IN Hispania, inquit Plin. l. 25. c. 8. inventa est Cantabrica, per Divi Augusti tempora, à Cantabrica ^{Plinij.} perta. Nascitur ubique; caule junceo pedali, in quo flosculi oblongi, velut calathi; in his semen perquam minutum. Ea cum Distanno & radice Aristolochiæ, in vini hemina sæpius bibenda, contra serpentium morsus.

Cantabricæ nomine diversæ plantæ ab authoribus indigitantur. Turnero enim Cantabrica Plinij est Caryophylleus, quæ nobis est Betonica altilis ^{Betonica altilis sativa.} sativa, de qua pertractabimus lib. 29.

Lobelius in adv. videtur existimare Caryophyllos silvestres esse Cantabricam Plinij, de quibus ^{Betonica altilis sylvestris.} jam dicto libro, sub Betonica altili silvestri agemus.

Cantabrica (inquit innominatus quidam) est fortè Aquilegia (de hac lib. 30.) licet Ruellius aliam ^{Aquilegia.} demonstret, quam rura Colubrinam herbam ^{Colubrina herba.} vocant.

Sunt qui Cantabricam Plinij, teste Lugd. Convolvulum minimum Clusij esse putant. Vocamus hunc nos Volverum terrestrem, quem mox descri- ^{Volverum terrestris.} bimus.

Cantabrica minor rotundifolia Lobelij in adv. Cantabrica Plinij Anguillaræ, est nobis Campanula ^{Campanula parva.} parva, cujus meminimus lib. 20.

Sed & Campanulam rotundifoliam minimum Cortusum, teste C. Bauh. phyt. Cantabricam Plinij nominat. Hæc qualis sit, vid. lib. proximè citato.

Herbam quoque Rapunculo spicato similem in Baldo, Cortusum Cantabricam alteram Anguillaræ cognominat. Tradimus hanc libro jam facti ^{Rapunculo spicato simile Baldi.} mto.

CONVOLVULVS PEREGRINVS pulcher folio Betonice.

CAP. XXXIII.



FLORIS cum Convolvulo similitudo facit ut hanc plantam, alioqui non congenerem superioribus, nec formâ illis respondentem subnectam. Peregrina est peregrini Convolvuli elegantia, in foliis potissimum spectanda, quæ ex viticulis proxima fulcra arripientibus tenuibus, pilosis, pedalibus aut cubitalibus longis pediculis hæret, argentei coloris, splendido tomæto villosa, in fima quidem & radici (quæ tenuis

summo cespite vagatur) proxima, Betonicæ purpureæ foliis similia, sed multò minorâ, crispis serratisque marginibus, reliqua etiam laciniata & profundè incisa, gummofa Clusio si gustentur, subacta & subamara; flores inter Helixines cissampeli & Smilacis lævis flores medijs, his minores, illis majores, purpurascens, calathi formâ, ex continuo unico folio conflant, longis pediculis hærentes, quarum basin ambit folliculus ex pluribus foliis con-

166
Tragopogō
Hispanicus
sive *Scor-*
zonera.
Tragopogon Hispanicum, sive Scorzonetam opinantur aliqui posse referri ad Cantabricam, sed non rectè vel Camerario teste.


Cantabrica titulo extat etiam Rhededa Plinij Neoteritorum, Lobelij Belgarum Eruca peregrina Italica, quam nos suspicamus Rhededam floribus albis, quæ delineatur lib. 29. Per eandem tamen Thalus Rhededam majorem flosculis luteis intelligit.

Variat magnitudine, reperitur enim vix duas tresve uncias altus: flore est communitet purpureo, rariùs albo.

Rariùs inventu Convolv. minimus alii regionibus quàm Galloprovincia, Allobrogum & Norb. Tempus. nã ad margines aridos fatorum & Olivetorum, ubi Junio & Julio florem promit. Frequens est multis Hispaniæ & Lusitanicæ locis, Clusio. Postea illam etiam inveniebat in colle Thermarum urbi, vulgò Baden, imminente, quarto ab urbe Viennâ Austriacâ miliari. Floret Maio & Junio, non nunquam & Autumnò. Apud Belgas semine ex Hispaniis accepto nata, non nisi Julio & Augusto, ubi nullum semen perficere observabat, tametsi magnâ diligentia te laicis conservatam: calidioribus autem locis spontè nascitur, semè que fert dictum. Nos eam descripsimus anno 1561. collectam quaitur Montspelio Castellæ fucus viam florentem Vere. Qui. Infectione quo. dam Iasione putant. Frater in montibus Euganeis inveniri indicavit, & purgare.

VOLVULVS TERRESTRIS.

Descri.



Helxines flore.

Volvulus terrestris ex radice crassa, lignosa & sicca, nigricante, multorum capitum, crebros juncos coliculos tenues proferit, duos vel tres palmos ut plurimû furrectos, aliquando etiam cubitales, hirsutos, valctulos, per quos cernuntur nullo ordine folia angusta, ohlonga, pilosa: extemis ramulorum insident ex calyculis hirsutis, flores ex albo purpurascens, Helxines Cissampeli, calathi formâ. Ex

Lobelio addimus nostrâ descriptioni, radicem sesquipedalem longam, albidam: folia gustu exsiccante, non nihil calfaciente.

Quamvis autem Icon Lobelij & Clusij, quam proponimus, variant non parum, ac etiam descriptiones, eandem tamen plantam existimamus, variantem pro diversitate locorum: ne tamen quibus fallatur, nos hic subjicimus descriptionem Clusij quæ sic habet. Multis tenuibus, adæoque juncis ex eadem radice proceduntibus ramulis, prædicta est hæc planta, humi procumbentibus, pedalis, interdum cubitalis longitudinis, duris, flexibilibus tamen, lanuginosis, qui in summo aliquot flores proferunt purpurascens, inodoros, Convolvuli æmulos, minores, unico folio constantes, sed ita implicate, ut quinque videantur, florum oris in totidem angulos delincentibus, & dum clauduntur complicatis; folia per ramulos nullo ordine sunt sparsa, longa, angusta, tenui lanugine obducta, Salicis foliis haud ab similia, gummofa si quis mordeat, & aliquantulum amara: semen fert in vasculis Convolvulo non ab similibus, minoribus tamen, suffeunt, angulosum, inæquale: radix candicans singulari, infimâ parte ramosa est, & vivax.

Varietas.

Descri. Clusij.

Flore Constantis.

Salicis folio Convolvulâ femine.

Convolvuli minoris spicæ foliis.

Scammonium tenue Plinij Cantabricæ.

Helxines stans Lugdunens.

Lob. adv. & ic. (ubi figura Clusij) Convolv. minimus spicæ foliis, vel Stechadis citrinæ, aut Linariæ. Obf. Convolv. minor spicæ foliis, sed ejus effigies minis scitè expressa adv. p. 274. Scammonium tenue Plinij quorundam. Scammonium minus Plinij, Tab. Clus. hisp. & hist. Cantabrica quorundam. Cañ. Cantabrica Plinij. Pona in Baldo Convolv. minor spicæ foliis Lobelij. B. phyt. Convolv. 4. (10. pin.) Linariæ folio: Guilandini Helxine stans dictum at Cortusi Scammonia Patavina. Is rectè annotat Lugdunensem duas figuras & duas descriptiones unius plantæ exhibere. Vna enim planta est Vobilis terrestris Dalechampij; & Convolv. minimus spicæ foliis. Lob. aut Ger.

SCAMMONIA ET SCAMMONIUM Veteribus, & in genere.

CAP. XXXV.

SCAMMONIA, ex autoritate Dioscoridis, ra- Disce lectio Variis. mos ab una radice profert multos [tres, aut quatuor] tricubitales [triatribus Orib. ut vet. quatuor cubitarum] pingues & quadantenus hirsutos [i. q. d. v. o. r. d. s. r. d. u. r. t. q. d. m. p. e. r. u. e. l. l. u. m. u. n. i. h. i. l. c. r. a. s. i. t. u. d. i. n. i. s. p. r. e. s. e. f. o. r. e. n. t. e. s. s. e. d. p. r. i. o. r. e. m. l. e. c. t. i. o. n. e. m. t. e. n. e. r. S. e. r. a. p. i. o. q. u. i. s. u. a. m. h. i. s. t. o. r. i. a. m. e. x. D. i. o. s. c. o. r. i. d. i. t. r. a. n. s. c. r. i. p. s. i. t.] foliis videm hirsutis Helxines [non Parietaria sed Cissampeli.] aut Hedera similibus, sed mollioribus ac triangulis: floribus albis, rotundis, in modum calathorum [c. s. o. i. x. g. l. a. d. o. r. i. v. e. t. q. u. i. d. a. m. x. g. l. a. d. u. m] concavis & graveolentibus: radice prælongâ [L. u. l. i. a. n. s. Orib. d. h. i. a. n. o. n. s.] crassitudine brachiali [Orib. & Herm. de vulg. codex cubitali, que lectio non placet, cum nunquam nisi improprie, dicatur aliquid esse crassitudine, sed longitudine cubitali. Sed & Serapio inepte vertit, radice grossâ, sicut pollex] candidâ & gravis odoris, lacteæque succi plenâ. Succus legitur hunc in modum: capite exempto radix ita cultro incavatur, ut excavatio sensim à latiore orbe in acutum desinat, proindeque in id cavum confluit succus, qui concis demum excipitur. Alij postquam scrobes in terra [Add. Lacuna ex vet. cod. x. g. i. r. u. i. p. l. a. v. u. i. t. e. r. r. e. s. d. o. d. o. e. i. d. o. s. f. o. r. n. i. c. Orib. d. i. c. e. n. d. o. s. i. m. o. r. t. a. r. i. i. n. s. t. a. r.] concamerato sine effoderunt, juglandis foliâ insternunt, in quæ radices incisæ succus diffundatur, cumque inibi siccatum tandem auferunt. Bonitate præstat qui pellucidus est ac levis, rarus & colore glutini taurino similis, rimulis fistulivæ tenuibus, atque fungosis, qualis scilicet ex Myria regione Asia deportatur. Neque verò in probatione animadvertere solum par est, utrum lingua- Adulte. tactu albescat: hoc enim evenit etiam admisso thymali succo, sed longè magis antea commemoratis attendendum est: itaque si non vehementer linguam exsiccaverit, id quod & misti thymali argumentum est. Natione autem Syria- Propriat. cus & Iudaicus deterimini habentur, graves, dero- Disce Sy- rati an t. Iudæorum. succi disti-

præstat qui pellucidus est ac levis, rarus & colore glutini taurino similis, rimulis fistulivæ tenuibus, atque fungosis, qualis scilicet ex Myria regione Asia deportatur. Neque verò in probatione animadvertere solum par est, utrum lingua- tactu albescat: hoc enim evenit etiam admisso thymali succo, sed longè magis antea commemoratis attendendum est: itaque si non vehementer linguam exsiccaverit, id quod & misti thymali argumentum est. Natione autem Syria- cus & Iudaicus deterimini habentur, graves, dero- rati an t. Iudæorum. succi disti-

dantur fucci tres oboli, cum Veratri nigri duobus, & Aloës drachma una. Fiunt & purgatorij sales, drachmis viginti fucci Scammonia in fenos salis cyathos adjectis. Horum modus proportione virium: integer quidem, cochlearia tria: medius, duo: minimus, unum. Purgat & radicis drachma una aut altera cum iis que retulimus. Ipsi quoque decoctum nonnulli ebibunt. Ex eadem decocta in aceto contritaque cum hordeacea farina, cataplasma fit ischiadicis utile. Succus autem vulvæ applicatus in lana, partus enecat: tubercula quoque discutit, cum melle oleové perunctus. Eodem decocto in aceto illitæ lepræ auferuntur. Sed & eodem caput contra diturnum dolorem ex aceto & rosaceo irrigatur. Vinum Scammonites ita fit. Radicis Scammonia per melle effusæ trita & linteo illigata drach. xv. in multo congiunt unum mituntur ad dies triginta. Purgat hoc alvum, ac bilem & pituitam detrahit.

Scammonium, quod est Scammonia succus, copiosum quidem in Italiam advehitur, præsertim Venetias, quo ex Alexandria Ægypti & Syria importatur: sed quod probatissimum sit, rarum admodum invenitur, nec unquam fe consecutum esse, ingenue fatetur Matthiolus. Quod autem Scammonium illud, quo omnes ferè officina referunt, Tithymali succo fit vitium, hinc quiddam patere arbitrat quod decem vel quindecim ejus grana alvum pluries resolvant, cum pingueri drachma, Dioscoridis testimonio, id vix præstare possit. Plantam è cuius radice Scammonium colligitur, vidit primum Neapoli, a latam (ut quidam Scylasarius asserat) ex Gargano Apulie monte, quæ omnibus notis ejus quidem judicio, legitimam Scammoniam referat. Sed profectò mirati nobis subit, quod Matth. in comm. it. non amplius Scammonia Gargani montis meminerit, led aliam tradat, depingat, ac Constantinopoli misam esse dicat. Hanc (Scammoniam Syriacam intelligit) ostendit etiam esse in annotationibus Andrea Martinelli supra Mesum depictam.

Ignorantem & incertum herbariarum fe Euch. Roesslin ostendit, dum arborem Scammonem facit, & liquorem ejus succum arboris cognominat, cum nec frutex sit, sed herba, id quod Plinius his verbis docet, Scammonium quoque dissolutionem stomachi facit, bilem detrahit, alvum solvit, præterquam si adjectantur aloës drachmae duæ obolis ejus duobus. Est autem succus herbae à radice ramosa, pinguis solis, triangulis, albis, radice crassa, madida, nauseosa. Nascitur pingui solo. Radix circa canis ortum excavatur, ut in ipsam confluat succus: qui sole siccatus digeritur in pastillos. Siccatur & ipsa, vel cortex. Laudatur Colophonium natione Mysum, Priense: specie autem nitidum, & quàm similitimum taurino glutini, fungosum tenuissimis fistulis, citò liquefens, virus redolens, gummosum, lingue tactu lactescens [hoc signum fallax & incertum esse Dioscor. tradit] quàm levissimum, quàm diluitur albescens. Hoc evenit & adulterino, quod fit ervi farina, & Tithymali marini succo, in Judæa ferè, quod etiam strangulat sumptum. Deprehenditur gustu. Tithymalus enim linguam exalfacit. Vfus bimo, nec ante, nec postea utile. Dedere & per fe ex aqua, vel aqua mulla, & sale, quaternis obolis. Sed utilissimè cù aloës, ita ut incipieret purgatione multum bibatur. Fit & decoctum radicis in aceto ad crassitudinem mellis, quo lepra illinuntur. Et caput ungitur in dolore cum oleo. Hæc Plin. quæ multum faciunt ad Dioscor. intelligendum. Faciunt & ad Plinij lectionem rectam. Sunt enim de veteri codice transcripta. Nam vulgata exemplaria tribus locis emendant. Primum ubi dissolutionem stomachi legitur, in vulgatis stomachi vox in totum deest; Secundo ubi Tom. II.

ervi farina habetur, in vulgatis herba farina falsò legitur. Tertio ubi usus bimo legitur, pro eo vulgata exempla habent, Bulbi more: quam lectionem falsam esse sequentia verba declarant: nec ante, nec postea utile: quæ neque ad Bulbum referri possunt, sicut neque Bulbus ad Tithymalum, de quo præcedit quòd linguam exalfacit. Hoc tamen de Scammonia succo Dioscor. non tradidit, quòd usus bimo fit, ut nec ante, nec postea utilis sit. Et profectò ego hodie novi in quibusdam officinis usum ejus ad decem annos servari. Et scribit Arabs Mesues Scammoniam per annos duodecim conservari. Scammonium Syriacum hæc Dioscoridi improbetur, Plinius tamen contrarium sentire videtur. Commendatur enim illi præter Mysium & Colophonium, etiam Priense, quæ Priene civitas Syriæ est. Mesues Antiochenus & Armenicus laudat, Corascenium vituperat. Galenus in Simplicium censu Scammoniam præterit. Paulus Scammonia, inquit, calidam & disculforiam, & biliosa extergentem vim habet, & magis succus, qui etiam tubercula discutit, & scetus necat applicatus, & lepras extertit. Et in diturno capitis dolore, caput ex eo cum aceto & rosaceo irrigatur. Sed & radix potè purgat, tum ipsa, tum decoctum ejus. At cum aceto & farina hordeacea cocta, ischiadicis imponitur. Idem l. 7. c. 4. Scammonia, inquit, similiter ut veratrum purgat, & magis flavam bilem. Verùm magis quàm omnia purgatoria, stomacho noxia est. Detur itaque non febrientibus, & stomacho bene affectis, pondere obolorum quatuor cum sale, aut pipere, aut zingibere, aut quodam oxyporo citò transeunte, stomacho grato, aut cum melle. Fiunt & catapotia cum gummi. Aëtius l. 1. c. 25. ferè eadem habet. Et addit, ammiscetur ipsi sal, & thymi coma, aut pulegium. In his verò qui ferre possunt, præstat Aloën miscere. Datur & per fe cum melle, aut pisanæ succo, si clanculum exhibere volumus. Et hi ambo Scammonia nomine succum solum intelligunt, & non radicem, aut herbam ipsam. Et hinc etiam solum utilem Theophr. 9. hist. dicit, & aliud nihil, nisi 3 oxymuroides, inquit, è βόδιον χερσίνου & αλλο δ' αὐδύ. Recentiores Græci Scammoniam vocant δακρυδίον, i. e. lacrymam, ex qua voce corrupta officinae vocant Diagrydium. Vfus ejus hodie ferè est ad reliqua purgatoria medicamenta acuenda. Sed in his, quæ à veteribus de Scammonio produntur, duo sunt expendenda: ejus delectus, & in purgationibus dosis. Laudant enim illi leve, pellucidum, colore quàm similitimum taurino glutini. At vulgare nostrum squalidum est, & cineritio colore, & aspectu tristiore: quia non succus, aut liquor manans, aut lacryma Scammonia ad nos adfertur, sed succus vi expressus. Scammonia lacrymam, quam Venetiis apud Albertum Martinellum vidit Pena in Syriacis conchis allatam, Colophoniam concolorem, concretione simili, ex sulco cæruleam fuisse ait, cujus coloris non est Scammonium nostrum. Verùm cum pura ac meara lacryma Scammonia tam sequenti usui non sufficeret, succum multum vi expressum ad nos asportari oportuit: cujus maxime delectus habendus, quia nullus nisi vatè adulteratus ad nos adfertur. Nam aliquando ex eodem corpore, eadem morbi causa, & eodem planè modo affecto, grana aliquot sumpta facit, & sine ullo cruciatu, bilem pituitamque expurgabunt, ex eadem prorsus gleba, frusto parvo effracto multò plura grana sumpta minus evacuant, nec sine molestia, & cruciatu. In causa est dissimilis molis concretio, quæ hic plus, illic minus, aut lactis Tithymali, aut Lathyridis, aut alterius stirpis valentius succi accepit: unde dissimiles purgationes consequuntur. Cùm autem veteres, aut drachmam, aut quaternos obolos, piscantur.

Scammonij durario Scammonij delectus.

Temperamentum.

Scammonij correctio.

Dacrydium.

Confertur Scammonium nostrum cum antiquioribus.

Veteres extem veteres, aut drachmam, aut quaternos obolos, piscantur.

aut majorem aliquam dosim præscribunt, purum & merum succum imperant. Purgat Scammonij succus per inferiorem ventrem vehementer, nulli aliorum purgantium medicamentorum potentia cedens. Nulla enim parte, ut Oribasius ait, superatur ab iis que agitant & commovent. Efficacitudo non vehementer aliqua calida facultate; sed alia quadam latente totius substantia proprietate. Nam gustu quidem nulla in eo caloris vehementia deprehenditur. Cuiusque siquidem liquori aut rei permisceatur, nullam ei vel amaritudinem, vel acrimoniam, aut alium ingratum saporum communicat. Quam obrem nec inter calidissima, ut plerisque videtur, sed inter moderatius calida & sicca habendum censet Dodonæus. Extergit autem & educit potissimum bilem flavam, serosos item tenuisque humores, & quandoque pituitam, ventriculo tamen magis, quam reliqua omnia medicamenta, ut Paulus tradit, noxium est Scammonium. Mefues verò non modò ventriculo grave atque molestum, verùm & intestina ipsam abradere, interna viscera erodere; venarum ora dilatare, totiusque fixæ substantia essentia cordi visceribusque reliquis obesse sentit. Immoderatum & minus oportunitum idcirco ejus usum animi sequuntur deliqua, ventriculi subversiones, alvi fluores, dyfenteria, & tenesmi. Occurritur his malis, eodem auctore, si Scammonium in cotoneo malo decoquatur; & muccagine pillij, prunorum carne aut succo, alii sive lentis similiter succis permisceatur, additâ mastiche, aut aliquo ex moderatè astringentibus. Plinius noxam ejus tolli posse affirmat admixtâ Aloë: Veteres Scammonium in malo cotoneo etiam decoxerunt, sed omisso Scammonio ipsum malum edendum præbuerunt, quod absque stomachi subvectione alvum subduxit: ut lib. i. de facult. alim. Galenus scribit: & de simpl. Quinque de causis corporibus læsiones inferre potest. Prima est, quòd status quosdam mordaces gignit, usque ad eò ventriculum lacessentes, ut sumentibus nauleam commoveat. Noxa hæc tollitur, si in excavato cydonio malo, clibano, aut prunis in alletut, pasta undique circumlitâ: præsertim additis aut feniculi, aut dauci, aut apij semine, aut galangâ. In flammâ deinde acetidinis exuperantia corporis spiritus: quòd fit, ut facilè febris excitet, iis præcipuè qui obstructionibus viscerum, & humoribus putrescentibus obnoxij sunt. Sed id nocenti auferitur, admixtis inter coquendum, que refrigerant, & fervorem extingunt: cujusmodi est pillij seminis spissamentum, prunorum decoctum, seu potius pulpa, rosarum & violarum succus, aut diluatum, aut aqua: quin etiam antè coctionem maceratur oleo rosaceo, aut violaceo, aut cotoneorum misti saporis succo, aut admixto rhoë, aut castitio spodio. Ad hæc, quòd magna tum attrahendi, tum aperiendi facultate sit præditum, immoderatas alvi fluxiones facit: vasorum enim oscula plus quam par sit, aperit. Hæc læsio admittitur admixtis rebz adstringentibus, cohibentibusque, nempe mastiche, cydoniis malis, succo que ab eis expulso, & myrobalanis, præsertim flavis. Abradit præterea acti succo, quo scætet, intestina: proinde & tormina, & dyfenteriam, & tenesmum excitat. Sed deletur hoc in commodum additis humidis pinguibz, lentisque medicamentis: cujusmodi sunt tragacanthum, bdellium, amygdalinum oleum aut rosaceum: item prunorum pulpa per se, aut saccharo asservata, psyllij spissamentum, mastiche, cydoniorum mala post sumpta, & calida aqua post bibita: utpote que medicamentum occlus à ventriculo & intestinis expellant, & ita simul noxam prohibeant. Hinc est, quòd prudentes Medici, quòd celeritis Scammonium à ventriculo & intestinis deiciant, hordei iustculum cum saccharo superbiben-

dum præbent. Obest postremò Scammonium cordi, jecori, ac ventriculo substantia sua totius proprietate. Vitium hoc aboletur, si illi tum calida, tum frigida admisceantur medicamenta, quæ cordi, jecori, ventriculoque opem suam præstant. De jicit Scammonium valentissimè hilem, quam à vasis & à sanguine exhaurit. Ejus de jicendi facultas haud sanè aliis medicamentis abfimilis est, quæ purgant cum labore & molestia.

De dosi Scammonij non consentiunt autores, De dosi Scammonij nam Scammonium posse ad ʒ. usque tutò dari censuit Dioscorides, quamvis rursum dicat posse interdum satis esse ʒ. ʒ. ut libetalis fiat purgatio: duos verò obulos, h. e. scrupulum, posse commodè alvum ciere. Videtur itaque dosim ejus esse à ʒ. ad ʒ. Paulus verò ait dandos esse iij. obulos, cum quo Actius & Actuarius consentiunt. Rufus usque ad ʒ. j. & radicis usque ad ʒ. ij. exhibet. Mefue tamen, quem omnes fermè juniores sequuti sunt, non audeat ʒ. dare, imò consulto non esse excedenda grana xij. sicuti minimum, quod dari possit, ut ventrem solvat voluit iij. esse grana. Eum autem loquutum esse puto propriè de Diagridio, de quo mox. Videtur igitur quanta sit varietas scripturum. Vnde non est mirum quod Avicenna admittit varietatem ponderum in hoc medicamento, quam varietatem ipse refert ad varietatem locorum, nã Dioscorides fortasse exhibet unam drachmam illius Scammonij, quod mite erat, & ortum in miti loco: vel quia Scammonium illud erat mite si non ratione loci, saltè ob vetustatem. Sed sit utcunque. Ego scio (inquit Fallop.) quod Scammonium aliquando exhibitum in pauca quantitate non evacuat: aliquando in pauca exhibitum evacuat præter modum: aliquòd è contra: unde nescio quid dicam de dosi hujus medicamenti: consulto tamen vobis, ut semper exhibeatis paucam quantitatem, quæ quantitas sit potius pro calcari: vocatur autem Calcar pauca Scammonij quantitas addita medicamentis purgantibus pro rufficis, vel pro aliis robustioribus, & cervicolis quibusdam hominibus, quibus nihil fuisse videtur factum, nisi pharmacum eduxerit usque ad ultimum, & plurimum ut ita dicam cacarint; & id eò pharmaca pro hujusmodi hominibus debent habere calcaria, qualia etiam debent esse pharmaca pro Monachis, & eò magis quia difficile in ipsis fit evacuatio, quoniam cum vescatur malis cibariis semper abundant crassis excrementis, & viscidis humoribus. Vnde præparetis quantum velitis, semper tamen difficile movetur. Itaque utamini semper pauca quantitate Scammonij, & steris potius in dosi Mefue, quam etiam non excedetis, quam in dosi Grecorum, quos nolim ut in hac re imitemini. Tractatus qui pro quo, Scammonex loco aut Cucumerem agrestem, aut lac Tithymali, aut Euphorbium accipit. Sed Sylvius in Antibal. Scammonio deficiente, Ricinum probat.

Scammonia, quam Diosc. describit, paulò diversa est, attestante Cæsalpino, à Scammonia ejus, floribus ex candido pallentibus, ex semine è Syria misso enata. Est hæc nobis Scammonia Syriaca floribus.

Scammoniam aliam quandam Monspelij ostendunt, Scammonia Monspelica, à Gens. h. (qui portionem pingit in figura adhibita Scammonia Cordi) Clus. Lob. Cam. & nobis vocata, cujus est & altera varietas.

Ægyptij quoque suam Secamonem [Apocyn] affert. Apocyno affert Scammonij speciem affirmant.

Camerario apud Matth. getm. lib. 4. cap. 8. Volubilis sive Convolvulus major videtur genus Scammonex.

Scammonia tenuis Plinij, ita tradentibus Cordo in Diosc.

Obest cordi

Autores de dosi Scammonij ut interpretantur

Calcar medicamentorum

Substituunt

Scammonia Syriaca flore maiore Cæsalpini

Scammonia Monspelica

Scammonia Cordi

Scammonex

Scammonia tenuis

Scammonium moderatè calidum.

Scammonij noxa.

Scammonij correctio.

Status mordaces gignit.

Inflammat spiritum.

Noxium movet alvum.

Abradit intestina.

in Diof. Ang. Cam. h. & Czelnihil aliud est, quam Helxine Cissampelos.

Planta,quam Tab. pro Scammonio minore exhibit, est nobis Volvulus terrestris.

Idem jam dictus autor exhibet & secundum Scammonium minus Plinij, quod Convolvulum peregrinum infetibimus.

Tertius est Cæsalpinus alterum genus pro Scammonia ostendi folijs subhirtutis flore cæruleo,quam Mefites Volubilem lanuginosum vocet. An hæc Nil Arabum quibusdam.

Mechoaca Scammonij species, & non temerè quidem,ait Dodonæus, creditur. Ob mala symptomata,quæ excitat Mechoacan genus silvestre,Scammonium à Monardæ vocatur. Vide Mechoaca. Et de his omnibus prærenti libro pertractauit.

Scammonium dici de Thapfia Diofcoridis l.4. autor est Tragus l.2.c.8.& Brunfelsin Onomatitico.De hac nos lib.27.

Colophonia officinæ succum crudum quidem Scammoniam; in cotoneo verò malo dectotum; Diagridium vocant:quasi *diagridium*, i.e. lacrymulam. Est verò ipsum Scammonium (ut cap.de Campana carulea affirmat) nihil aliud,quam species Smilacis lævis, radice crassâ. Lactariam hanc,scanforiamque Volvulam (unde fortè, Lobelio aduers. nomen Volvulo fuit) solo penicillo commentatoris pictor expressit. Cùm tamen pauca sint planta, quas de facie & facultatibus, penitè notas habere, magis interfit boni Medici, & Pharmacopœi quàm Scammonium hoc Syriacum, Antiochenum & Nonbonense. Anno igitur 162. in defestus ille barbarum no varum vestigator Venetus pharmacopœus Sequinus Martinellus, ex Syriaco Alepo miserat plustquam centum libras glebæ Scammonij Antiocheni succi concreti, cui exprimendo interfuerat: conchas etiam non paucas lachrymâ plenas, seu Diagridio antiquorū, cum seminibus angulosis Volubilibus. Hæc femina tum Patavij & Venetiis primo Vere tertè mandata, in luculentam Volubilem, seu Volvulum abiit, aded sinuosis Smilacis folijs, triquetris, vel potius Cissampeli folijs, floribus, & facie, ut planè nostræ Cissampelo eandem dixisses: verum radice insigni fuit, & mole grandem Bryonia radicem aequante atque teneritudine simulante: foris tamen pulla, aut cinerica, intus albidâ carne: cujus fissæ torulus five cor medium exemptum, planè idem est, aut simile radici communis & probatoris Turbith officinarum: verum facilius aliquantò frangitur hæc, tametsi perinde gummosa succoque lacteo prægnat, atque Turbith. Hanc eandem postèa Antuerpiæ, quò semen miseramus serendo meminimus, speciosam factam, floribus & viticulis quinum & senum cubitorum, prorsum nihil diversam, cujus Guilielmus Dries, non minùs peritus pharmacopœus, quàm probus civis Antuerpianus, adnata, radicūmq; pululationes excitas, exsiccatâque ostentabat, aded Turbith Alexandrinum ementita, ut discernimins perparum, aut nihil percipi posset. Hæc Lob. adv. Synon. qui in obs. figuram habet eandem cum Dodonæo, titulo Scammonij, Adv. 272. In ic. vocat Scammonium syriacum; antiochenum, & Scammonium. Geln. h. est Scammonia de Syria allata. Ang. & C. B. (cui prima) Scammonia Syriaca. Cam. h. Scammonia Antiochena; Eid. hist. & epit. ut & Lon. & Cast. Scammonia. Rauv. Scammonium verum. Cæf. Scammonia floribus ex candido pallescentibus, ex femine de Syria misso nata. Matth. in comm. cum mag. fig. Scammonia. Lugd. Scammonia Matthioli.

Colophonia

Diagridium

Smilax lævis

Lactaria

scanforia

volvulus

Turbith

Synon.

Matthioli

Cæf.

Rauv.

Ang.

C. B.

Cam. h.

Eid. hist.

Lon. & Cast.

Matthioli

Lugd.

Matthioli

Cæf.

Rauv.

Ang.

C. B.

Cam. h.

Eid. hist.

Lon. & Cast.

Matthioli

Lugd.

Matthioli

Cæf.

Rauv.

Ang.

C. B.

Cam. h.

Eid. hist.

Lon. & Cast.

Matthioli

Lugd.

Matthioli

Cæf.

Rauv.

Ang.

C. B.

Cam. h.

Eid. hist.

Lon. & Cast.

SCAMMONIA SYRIACA FLORE majore Convolvuli.

E Syria delata Scammonia, etiam nostro aethiueit solo, licet nullum ad ecchylosin studium ad junctum: profert autem è radice longâ, crassâ, lacteo succo prægnante, multas aliquot cubitorum viticulas, proximis radicis sese convolventes scandentisque; folia triangula ceu hastilis barbatus, mucro, Smilacis lævis æmula, sed minorâ, glabra, tenuia; flores calathoides nonnihil purpureascut, Helxines cissampeli floribus proximi.



Hanc ita describit Cæsalpinus. Tenuis viticulas fert, bicubitales: folijs triangulis, effigie sagittarum, parvis: flores ex candido pallescentes: fructus veluti pinguedine obductos, in quibus femina nigricantia: radicem grandem Raaphano similem, succo sam.

De Scammonia nostra Syriaca Cordum loqui supicater, si folia non diceret spinosa in hist. l. 4. c. 109. cum ait. Scammonia est, cujus liquor est Scammonium, Convolvulo per omnia similis, quantum ad viticulas, flores, lacteum liquorem & qualitates attinet: folia quoque ab hujus folijs parum discrepans sunt enim ipsius folijs similia, sed pilosa, triangulata, atque in alata sagittæ figuram redactæ. De radice priùs dixerat in Diof. majorem esse Convolvuli radice. Et hinc etiam Cissampelum, terræ Scammoniam vocari, quoniam multò tenuiorem radicem, quam Scammonia habeat. Verum hæc descriptio Cordi ex Diofcoride concinnata est. Figura quidem malè picta aliquatenus nostram Scammoniam Syriacam exprimit: ramus verò appictus, nõ est Scammoniaz Cordi, sed Monspelientis. Quintam speciem Volvuli Mefites, esse plantam illam scribit Fallopius, ex cujus radice emanet Scammonium. Greci (inquit Dodon. purg. & hist.) *σκυμμονια*, Latini ferè Scammonium nominant; ita appellantes non modò stirpem ipsam, sed & densatum concretūmq; succum. Dicitur & à nonnullis *σκυμμονια* *σίσα*, ab alijs

eser.

Smilacis lævis

Cissampeli floribus

Descr. Cæf.

De Scammonia Cordus

Cordus

Volvulus

Species Mefites

succ.

Locus & Tempus.

Habui Lugduni, Genevæ & Montbelgardi in hortis. Basileæ in orto D. Plateri florebat Junio, & Julio, Augusto, & Septembri. is hieme recondebatur. In calidis, pingui exit solo, veluti in Asia Mylia, Syria, aliisque similibus. Reperitur & in Creta insula, Bellonio teste. Verisimile est, ubi sponis est, citò & plurimâ deinde Æstatis parte florere: nam & in Belgio, ut Dod. tradit, æstivis mensibus subinde cum flore videri potest. Scammonia Antiochena Cameratio aliquot annos duravit asservata in fœtibus per hyemem, & Æstatis iniùo floruit, sed femina nunquam absolvit.

Meminit idem Cortusum patritium patavinum, veterum naturalium summum indagatorem ex crassis radicibus aliquot uncias succi extraxisse. Aiunt si propè Tithymalum seratur, aded ejus caliditatem accendi, ut veneni naturam acquirat. Hujus tamen liquor caloris acrimoniaeque vi per atatem amissâ benignior nonnihil evadit. Quod verò non eas notas habet Scammonium, quales illi Diof. tribuit, causa esse putatur, quod hoc tempore non obferent veterem parandi modum, ac non ex incisa, sed dissecta prorsus vel expressa radice, aut è stirpibus & folijs contusis paretur: aliqui tanta copia Scam-

monij quo pacto quotannis ad nos adferri possent vel etiam lacte Tithymali sepius adulterant. Pulerit m. hercule alicubi Ruellius inquit: Nulla medicina patris certior, quam quæ ab alio arbe quam nostro petitur.

SCAMMONIUM, SVCCVS SCAMMONIÆ DENFATUS.

Defr. Vlnera Scammonia succus emanans lacteus concreuit qui in magnas massas coagulatus importatur, tophosæ & sitis leves taurini glutinis inflat nitidas & veluti pellucentes, colore fulvo, nigricante aut cinereo, atque is quidem color potissimum elucet in pulvere, in quem levi digitorum attritu friatur, odore nauseoso, sapore amaricante & mediocriter acii.

Diagridium quid & eius præparatio per concocionem. Scammonium, succus Scammonia denfatus, per cocionem, aut etiam per macerationem paratus Diagridium appellatur. Confectio autem ejus per cocionem hæc est. Accipitur cotoneum, extrahiturque durior ejus illa pars media, quæ semina continet (recisa tamen superiori prius lamina) cujus loco in excavatam partem Scammonium induitur: mox lamina, quæ prius fuerat recisa, pro cooperulo addita cooperitur, triticeæque palli circumquaque malo cotoneo obducitur, ac ita coquitur in clybano, h. e. vase fictili crudo. Quidam tamen succo cotoneis expresso, Scammonium macerant, ac Diagridium parant. Accipiunt autem Scammonij partes duas, succi cydoniorum partem unam, miscerunt probe, ponunt in locum calidum & quotidie movent, donec mediocriter induretur ejus massa: deinde formant pastillos, eosque quantum satis est efficcant. Alij alium probant modum, & quidem ex malis communibus, ita, ut accepta ollâ, aut testaceo mundo vase, malis primò surdum ad digitale crassitiam sterrant, mox itidem tarturdem Scammonij superponant, & sic subter dorree vas plenum fuerit. Mox autem carbonibus accensis, ac in camino posito vasi eoque optimè triticeâ massâ operito, quantum satis sit, coquant. Satis autem cocta dicuntur, cum mala induruerint. Ex cotoneis autem, quàm ex aliis malis per cocionem tutior & cum minori molestia fit purgatio. Quare & amplior ejus dosi sumi potest. Ac rursus magis ex aliis malis, quàm ex maceratione in succo cytoniorum. Sicut & magis ad purgatiorem videtur facere, cum ex hoc succo paratum est, quàm si sine hoc detur. De dosi hujus ac etiam facultatibus vide plura arte. Officinæ Scammonium preparatum, quod ut diximus Diagridium vocant, compositioribus ferè omnibus, crudi ac non preparati Scammonij loco admiscunt. De hujus dosi loquutum putamus Mesuem.

Per macerationem.

Modus alius.

Optimus modus quæritur.

NIL ARABVM QVIBVSDAM, sive Convolvulus cæruleus.

C. A. P. XXXVI.

Defr. Cæruleus Convolvulus tortilibus viticulis, tomentosis, proxima quaque arripiens, in altum nititur, texturis topiariis peridoneus, nisi longiorem vitam ter eritudo, frigorum male patiens negasset: folia palmum circiter lata, paulò longiora, formâ hederacæ, in tres acutas lacinias sinuantur, laruginosa, colore ex herbido in flavum vergente, priora ad folia Sigilli B. Maris accedunt; folia Lob. ternis argulis singula, in tenerulis pediculis: flores Similacis levis, cyaneo colore ad blandiuntur, extra tamen in singulis quinque lacinarum zona exaruit albida, quo etiam colore totum floris in-

Folio ledaracco.

Similacis levis flore.

fundibulum tam extrâ, quàm intra tingitur, quinis folis herbæ concoloribus obvallatum, in quo stammina & apices lateri altè reconduntur, flores Dodonæo sunt veluti Similacis levis instar campanule, sed per oras arguloli. & colore in caruleo purpurei, floribus Lob. è pediculis calice excutibus, lamini aut



laminis floribus. Vincæ pervincæ similibus sed oris quinque stellatis prominentibus argulis, Nola caruleæ vel alureæ effigie; semen nigricans Dodon. radix subest parva, fibrosa (gracilis, longa, Lob.) clamen, Hederæ nve annosam imitata, non nihil hirsuta.

De hac planta hæc Serapio. Habel, i. e. Nil, est Habel granum Indicum [Granum Nil, Cartanum Indicum, Hæb. Arabum, i. r. Arabum, Indicum] cuius planta, autore Isaac Eben Amtan, similis est plantæ Lebleb, ad hærens arboribus duobus brachiis, vel tribus, habens ramos & folia viridia, & in radice cuiusque folij florem coloris purpurei, similem pomulis in figura sua, quo decedente apparet semen in vaginis, in quibus latitæ tria grana, minoræ granis Staphisagria, levia, tribus paribus divisa, & ista grana sunt id quod de ea administratur in medicina. Hujus etiam meminit Bellunen sis in interp. in Avic. diceus. Habel Almefachin est herba quæ dicitur Funis pauperum, & est species Lebleb, Funis pauperum. Granum Nil est semen nigrum reperitum in planta Volubilis cujus flos habet colorem azurum: & figuram Campanellæ similem, terdentem ad longitudinem aliquam, & hujusmodi planta non est herba, ex qua Nil seu Indicum [sine hæc est, & est solum Nil ex sine non] exprimitur sicut, ex quo conficitur Indicum tingens, conficitur ut quidam putant, sed est species Volubilis nota, & semen hujus plantæ granum Nil, in Oriente administratur ad evacuandum humores grossos phlegmaticos & melancholicos, sicut ait Avicenna à quo in cura vermium administratur. Ex quibus ita dicitur vel me taceret facile judicatu est, opinionem Tagaultij non esse recipiendam, dicitur Opinio Tagaultij resertur. ut in li. can. Mesue, Nil granum esse istatidem Græcorum, & vulgè Gallis passim Gueda, du G. eide dicit herbam notissimam, quâ insectores utantur in tingendis pannis. Addam tamen verbis Bellunen sis argumer tum ex ipso Mesue desumptum quo Tagaultij opinio sustinetur resertur, nempe quod istudis semen vix possit mensurari pleno & vacuo: quum admodum compressum sit, nec quicquam simile habeat, cum reliquis fructibus, quâ Mesue loco jam citato recensentur.

Hæc est illa planta, quæ à Monachis in Mes. Vo. Valubilis lubilis cærulea nominatur, cuius semen Bellunen sis cærulea, dicit esse Granum Nil. A Dod. gall. dicitur Lifer nbleb; Conjugulum nigrum. Dod. purg. & hist. (ubi eam pingit & describit) dicit accedere laxivum Convolvulorū numero, optimè etiam exprimeret C. m. lus, panam cæruleam vocatam vulgè Campanam lozu. Campana ram, & Convolvulum cæruleum dicit recentioribus, existimari autem Liguistrum esse nigrum, Colum. Liguistrum lib. 10. Nec sine ratione, quando quidem Similax læ-nigrum, vis

vis major etiam album dicatur Liguſtura. Nam è caruleo purpureo colore ſubinde nigrum dicitur veluti Viola nigra. Eſſe autem qui hæc Campanam granum Nil Avicenna eſſe velint, e. 306. differens quidem ab eo Nil, quod deſcribitur c. 512. Iſtud enim Iſatis Græcorum eſſe; illud verò peregrinam ac Indicam ſtirpem: ut non modò Avicenna, ſed & Serapio teſtetur.

Non deſunt & aliæ Convolvulorum ſpecies, quæ ad Nil quoque Avicenna referuntur, uniculis, ſpinulis aſper, alter abſq̄ illis. Sed Mechoaca quoq; poteſt & Nil, & Scammonium Americanum eſſe. Anil etiam Arabum & Turcarum in Guzarate à plerique Nil vocatur. Nil tandem Germanorū, Pſopholix eſt.

Nunc quod ad nos attinet per Granum Nil Arabum quibuſdam dictum præſentem intelligimus plantam. Lob. in adv. hæc intelligit per Aſureum ſuum, ſive caruleum Convolvulum hederaceum, vel ſmilaceum, exoticum, quem in Ic. pingit eodem titulo: in obſ. autem inſcriptione Aſurei; ſive carulei Convolvuli, Campanula laſurz herbariorum, adv. 274. Noctū florentis Pleutonariæ dicitur.

Geſn. h. Convolvulus peregrinus, vel caruleus, Nil Arabum. Tab. Ger. Caſt. & Cam. h. Convolv. caruleus, de quo hic ait: Nil Arabum, vel potiùs Habal Nil Setapionis, Latine granum Indicum. Haſniſen circa Alepum ubi multum creſcit, Perſis Acaſia, Italis Campanula Azurea aut ſua de nocte: quia noctū potiſſimūm floret, ſole oriente clauditur.

Lug. Volutus ceruleus, ſive Campana Azura Lobelij. Dod. (ut ait Lug.) quidam Pothon caruleum Theophrasti eſſe credunt, ornamento & umbraculis ſepulchrorum laudatum antiquitùs. Alij Pothon illum eſſe malunt Convolvulum purpureum duplicem Cortuſij.

C.B. Convol. 5. ſive caruleus hederaceo anguloſo folio: Smilax carulea Dod. gall. [non inveniunt a ſe eo vſuari] ſine icone. Scammonia ſimilis flore caruleo, Ang. Nil Arabum, Eyſt. Campana carules, Dod. Bry. Convolvuli alterum genus, quod pro Scammonio oſtenditur, Caſ. Campanula carulea hederaceo folio, Svver. Quibuſdam Pothos caruleus Theophrasti: quibuſdam Volubilis lanuginofa Meſuci.

Montbelgardi in horto E.C. floret Auguſto & ſequentibus menſibus, non facile autem matureſcit ſemen. Hæc, inquit Lobelius, non niſi hortis Italiae, Gallia & Belgia nota, ubi amena purpurâ portæ ætatiſque ſecus parietis & peticas ſunibus viticis, gracilibus, umbracula concinnant, atque fornice ſvſu per jucunda. Peregrinam hæc ſtirpem, & aliunde illatam ſub ſine æſtatis, ſi calida, ferventiſque fuerit, in Belgio flores facere ſcribit Dodonaus. Geſnero flores ephemeræ ſunt: noctū enim ſe aperiant (unde florem noctis vulgo quidam in Italia nominant) poſtridie vi ſolis pereunt. Satus variè provenit, nunc infra palmi altitudinem conſiſtens, at florens tamen: nunc altius excreſcens, ſemel etiam ad cubitos ſere novem, quæ planta ſemen initio autumnæ maturavit.

Gtanorum Habel Nil in medicina, ut autor eſt Serapio, proprietates eſt (ex Aben Meſuai) laxare phlegma, & mundificare ipſum. Preparatio ejus eſt, quòd benè teratur, miſceatur cum oleo amygdalarum dulcium. Et melius ex eo novum, ponderoſum, & non ſtypticum in ſapore ſuo: & doſis à quatuor Kirat uſque ad octo. Granum Nil (ex Habix) eſt cattamum Indum, calidum & ſiccum in primo gradu, & hæbet hoc, quod quando miſceatur cum medicinis, ſcit moram in inteſtino duodeno, atque in illo quòd ſequitur ipſum, & eſt propinquum meſeraicis, & facit ibi punctiones, & quum ſumitur in potu ſolum, non laxat eadem die, niſi completis viginti

quatuor horis poſt ejus punctiõnem, & quando admisceatur ei Scammonia, facit ipſum deſcendere, & tunc laxat phlegma viſcoſum, & operatio ejus eſt etiam in educendo cholera, & fortalliſs accidunt ex potu ejus juvenibus ſtypticitas in ore ſtomachi, & torſiones magnæ, & ſi nimis ſumpſerint, faciet eos evomere, & fortalliſs inducit tenaſmonem. Et doſis ejus cum aliis medicinis eſt drach. ſemis, ſed ſimplex nunquam vidi dari in potu, niſi admisceatur ei Scammonia, quia juvat ipſum ad expellendum phlegma, & cholera, quoniam ipſum expellit humores duorum diverſorum colorum per ſecceſum. Grani Nil ſemen, ut Bellunenſis teſtatur, in Oriente adminiſtratur ad evacuandum humores groſſos, phlegmaticos & melancholicos ſicut dicit Avicenna. can. qui Granum Nil, Carthamum Indum eſſe dicit, ac calidum ſiccum primo ordine ſtatuit.

CAMPANULA INDICA.



Congener videtur rara hæc Campanula, ei quam Nil Avicenna nupetorum quidam eſſe voluit, tortilibus flagellis hirsutis rubeſcentibus circum peticas cõvolutis in altū nitens; folia hederacea ſive Cyclamini, acuminata, qualia nẽpe primūm pululantia eſſe ſolent Campanulae lazuræ ſive Nil Avicennæ, ad pediculum uncia longiorum, rubetem, hirsutum, ſalcata, ſtibus ſupràq; pilofa;

flores campanulati ſeu calathi formæ, calyci inſident in quinque acutas lacinias diviſo, villoſo, nigricanti, plures ſimul juncti ferè, pediculo ex foliorum ala prodeunte.

Primūm viſa Argentinæ apud D. Fridericū Meier qui Campanulam Indicam nominabat, nobis etiam Montbelgardo in horto E.C. provenit aliquoties, ſed non maturavit ſemen.

An B. pin. Smilax lævis 7. ſive Convolvulus folio ſubrotundo: qui 1. in prod. Convolvuli ſpecies altera, quæ ad Nil Avicennæ referri poteſt, Dodon. Campanula azura, Svver. Campanula Indica purpureo-violacea, Bry. Convolvulus Indicus flore violaceo, Eyſt.

CONVOLVULVS BONA NOX dictus, flore candido, grandi.

ſcribit Cluſius L. 2. exot. c. 18. ſe à doctiſſ. Viro Simone de Tour urbis illius primario Medico inter fructus exoticos anno 1596. Hiſpali delatos, tertium accepiſſe, cui magna affinitas erat cū Convolvuli aliquo genere, quòd tota facies reſpondere videbatur, licet longè major eſſet, quàm ullus ſimilis generis ipſi unquam conſpectus. Etenim calix qui florem continerat, quinque foliis unciam ferè longis & latis invicem amplectentibus conſtabat, ut in Cappariis quibus includebatur caput trigonum membranaceum, tria grana inſta magnorum piſo-

rum continens, coloris ex fusco cineracci, & penè fuliginosi; tres autem flores ex longis pediculis dependentes crassiusculo ramo in hæcile apparebant; similia porò grana illo ipso anno ab eo Convolvuli peregrini appellatione, his additis verbis, accipiebat Cluius.

Convolvul.
peregrinus.

Buenas noches.



Folia.



Caulis.

Spinula.
Flores.

Planta ex
seminibus
data.

Sarmenta.

Folia.

Semina.

Buenas noches, plàte ex occidentali India delatæ femina, quæ etiam stirps apud fortunatas Insulas repetitur, ubi Buenas noches vocatur, voce Hilpanis consuetà, quâ se congregientes vel discedentes, vesperi salutant. Hæc verò primo sui ortu bina profert folia Campanule Indicæ primum nascentis foliis similia, sed ma-

juscule & crassiora, cui etiam similia edit folia recens natus Mechoacanum, antè quàm innascentur alia folia. Multi porò ab unica hujus plantæ radice caules prodeunt, qui pedamenta adfixa, vel vicinas plantas multiplici ambiunt spirà, Smilacis asperæ instar, cui etiam similia habet folia, majora tamen & molliora: in caubus etiam aliquot hamatas continet spinulas, quales & Smilax aspera, sed rariores ac minus horridas: flores autem pandit candidos & grandes, mediocri disco pares, qui matutino tempore dehiscentes, noctu illicè flaccescunt, unde nomen accepisse videtur.

Cæterum ex feminibus à Touaro acceptis, quæ amicis communicaverat Cluius, unica planta insequente anno nata est ornato vito Honesto Lopez, quæ initio prodibat simili modo quem Touarus refert, deinde multa longa sarmenta proferebat, perticæ, multis spiris & nexibus sese circumvolventia, & tenellos veluti spinarum aculeos, præsertim circa articulos, generantia, qui nihil aliud erant, quàm radicem rudimenta, ut in plerisque plantis, puta Mayo, Harundine, & aliis quibusdam similibus interdum contingere videmus, quæ haud dubiè comprehendissent, si quis terræ obivisset: folia habuit valdè viridia, Convolvuli foliis similia, sed longiora, & pleraque hederæcorum foliorum instar angulosâ, atque in longum angustum foliorum inftar angulosâ, ut Smilacis asperæ folia; florum quidem gemmas ferre incipiebat, sed perfici nequeverunt, quia præmaturæ prius totâ plantam corruerunt. Hæc ille.

Ego duo femina & portionem capitis trigoni prædicti Convolvuli habeo inter fructus delatos ex Anglia 1605. per generum Cherlerum, qui plerisque acceperat ab honesto viro Iac. Gareto: grana sunt instar magnorum Pisorum, non tamen maximorum, angulosâ ex compressione ut evenit quibusdâ Pisis, colore, qualis ei tribuitur à Cluiso, dura sunt officulorum modo. Est mihi etiam capitis nifallor trigoni pars una triangularis ferè, medio criter fusca: Semina in aquam injecta non sident.

C.B. pin. Smilax aspera 3, India occidentalis.

CONVOLVULVS PEREGRINVS

cæruleus folio oblongo, C. Bauhini.

Defr.

Radice est singulari, oblongâ, rufescente, ex qua caules multi, tenues, pedales, interdum cubita-

les, flexiles, ramosi, levissimis pilis pubescentes prodeunt, quos folia oblonga, inferiora quidem, uncias tres, quatuorve longa, vix unciam lata, inordinatè vestiunt, quæ sensim minorâ redduntur, & per marginem leviter hirsuta sunt: ex omnium ferè foliorum sinu, pedicelli tenuissimi, oblongi exurgunt, quibus singulis flos cæruleus ad exortum pallidus, Campanulæ formâ, unico folio constans, & ex caliculo prodians, insidet: floribus succedunt capitula membranacea parva, quibus femina parva, nigra includuntur. Planta sanè ob florum copiam elegantissima, & quæ ob cauliculorum flexibilitatem fulciri debet. Hic in horto meo ex femine, Campanulæ cæruleæ nomine accepto, sæpius crevit.

B. prod. Convolvulus 2. Eid. pin. Smilax lævis 7. Synon. five Convolvulus peregrinus cæruleus, folio oblongo.

LOBVS CVM SEMINIBVS CONVOLVULO MAJORI ACCIDENTIBVS.

INTER fructus & cætera quæ gener deulit ex Defr. Anglia, anno 1605, ab honesto viro Iac. Gareto reperimus Lobum five siliquam nigram magnitudinè articuli postremi pollicis simili quodammodo, sublongam unciam, tumidam, & leguminum modo in duas partes sese separantem, cortice duro satis, Cortex. qui non nihil contrahebatur, pediculo longiusculo: intus grana duo (an plura adfuerint nescimus, Lo. Grana. bus enim erat apertus) magnitudine pisorum mediocrium ferè, triangularia ut Convolvuli majoris siliqua, continentem, quorum latera duo minorâ ferè plana, tertium verò gibbosum extabat, leviter hirsuta vel tomentosa, colore fusco tribus costis, uti etiam circulo circa umbilicum cinereis, cortice duro, qui si abradatur flavescit. Quid contineant hæc officula nondum introspeximus, sunt enim nobis tantum duo. Injecta in aquam fluitant.

BRASSICA MARINA, SIVE Soldanella.

C. A. P. XXXVII.



QVIA Brassica marina toto genere (quia enim ut inquit Adrian. Spieg. flore & folio herbæ atque floris Convolvulus, virtute verò Scamoniæ) differt à reliquis

Brassicis, ideò non Brassicis (de quibus lib. 2. scribimus) sed Smilacibus lævibus Smilax. & Convolvulis ea subjungit voluit.

Brassica autè marina, quæ hodie officinis Soldanella appellatur per terram suas spargit viticulas, à quibus folia prodeunt subrotun-

da, retusis alis prædita, latiora quàm longiora Chelidonij minoris similia, crassiuscula, liquoere lacteo manantia, pediculis longis innixa: flos magnus, purpureus, quadrantaliter ferè, campanulatus, non absimilis multum floribus herbæ, quæ pro Nil Avicennæ exhibetur, aut Smilacis lævis, indivisus, semen in lo-

in loculis rotundis non tantum nigrum, sed & album, angulosum. Gustu est salso, subamaro.

Soldanellam aliqui etiam Soldanam vocant, & eam Brassicæ marinæ à Dioscoride descriptæ perique fumilem affinant. Imò nos non similem, sed planè illam ipsam esse cum multis aliis ex hoc maxime concludimus. Quòd Dioscorides hanc Brassicam à luita evariare dicit, quo modo certè Soldanella à Brassicæ penitus evariatur. Quæ marina Brassicæ [in prælo] in Sarcocolla: male Lugd. Sarcocolla: nec melius Ryff. in Diss. Sarcocolla: inquit Dioscorides, dicitur, à fativa in totum evariatur, habetque folia longa [uaxpò] fortè legendum uaxpò aurb. Matth. Quædam, prælonga Ruell. qui tenuia addit, quam ob causam, ipse videtur Aristolochiæ rotundæ [πρὸς σπυγγίαν δεσπομένη] similia, quæ singula de ramis subtrubris prodeunt, ex uno pediculo velut Hedera. Habet liquorem album, non multum, qui gustu subtilis est, & quodammodo amarus, compage pinguis. Ethære est illa, quam priori ævo Theophrastus l. 7. c. 4. Brassicæ [Sarcocolla] tertix agrestis cognomento intellexit, cui solum læve esse patrum & rotundum scribit, ac multis ramis, multisque foliis constare: huic præterea succum acrem inelle & medicatum, quo Medici ad purgandas alvos utuntur. Eadem & Plinius tradit. Raphani inquit, genus silvestre Græciæ, cui lavia quidem [folia] sed breviora ac rotunda, copiosaque atque fruticosas, sapor autem asper, & medicamentis instar ad eliciendas alvos. Cæterum licet Dioscorides prodiderit marinam Brassicam folia ferre rotundæ Aristolochiæ, longa, ac tenuia; ea tamen non abs re ab omnibus esse censetur, quàm vulgus officinarum Soldanellam appellat. Quippe quæ in maritimis nascatur, foliis lacteo succo madeat, ramulis confert rubentibus, à quibus prodeunt ipsa folia, Hederae modo, quæ gustu salta, & amara, & quadantenus acris sentiuntur. Quamobrem Dioscoridis codicem hoc in loco, sicut & in aliis permultis, mendii suspitione non vacare cum Matth. puto. Facile enim evenisse crediderim librariorum incuriâ. ut folia uaxpò, i. e. longa, pro uaxpò, i. e. parva, hoc loco successerint: & certè facilis fuit unius literæ lapsus. Siquidem Soldanella vocata omnibus notis marinam Brassicam repræsentat, exceptis foliis, quæ sunt Aristolochiæ rotundæ minora.

Cæsalpinus autem sic apud legendum putat, foliis rotundis, longæ Aristolochiæ similibus, & non ut vulgati codices legunt, transpositis dictionibus, foliis longis rotundæ Aristolochiæ. Et hinc congruè Dodonæus Soldanellæ five Brassicæ marinæ folia tribuit Afari, aut Aristolochiæ longæ (non ut ipse, rotundæ) rotunda. Quo Dioscoridis loco sic emendato, Soldanella omnibus planè notis Brassicam marinam Dioscoridis refert. Ruellius etsi in hoc nobiscum cæterisque consentiat, quòd marina Brassicæ hæc sit herba, quæ vulgò Soldana, & Soldanella dicitur, nullâ etiam (ut inquit) reclamante notâ; in eo tamen manifestè aberrasse deprehenditur, quòd Soldanæ folia Aristolochiæ longæ, atque etiam prælonga reddiderit. Etsi rectè quidem videatur Matthioli existimasse pro folia uaxpò legendum uaxpò, tamen in meis (inquit Dalech.) Dioscoridis exemplaribus non legi uaxpò, sed Quædam [prælonga] pro quo lego uaxpò potest, quod est verissimum. Hæc ille. ego etiam nolim tam manifestè erroris cum Matthiolo incurfare Ruellium, quòd dixerit foliis prælongis: fortè enim ad foliorum pediculos longos respexit. Nec video tantum Ruellij errorem, quantum dicit Matthiolus, quia dixerit l. 2. c. 54. Soldanæ esse folia Aristolochiæ longæ: id quod optimè fecit (uti & Cæs. legit) melius enim longæ quàm rotundæ folia referre videntur: rotundæ enim folia sunt longiora quàm latiora. Soldanellæ autem latiora.

ut plurimum quàm longiora, sicut folia Aristolochiæ longæ, quorum longitudini latitudo æqualis: dein quoad eorum folij ambitum & anchoræ formam, melius convenit Soldanella cum Aristolochiæ longa, quàm rotunda: deinde quoad pediculos, quibus prædita est longa, rotunda non item. Verum: Matthioli non fuit cognita longa, pro qua exhibuit Clematitin doctis luita nominatam. Ca. n. hist. addit Carolus Stephanus existimare Soldanellam esse dictam, quòd ad solidandas rupturas facia.

Videamus nunc quid Turnærum Anglum, unum Volubilis ex multis, qui Volubilis speciem facit, impellat, cur Turnæro adhuc dubitet an Soldanella sit Brassicæ marina, in d. cap. de Cochlearia neget. Etsi inquit ille, jam ab annis pluribus Brassicam marinam veram indagaverim, unamque invenerim à vulgò doctorum receptam, alteram verò quam ego solus pro vera Brassicæ marina habui: attamen cum utramque cum Dioscoridis descriptione confero, neutram per omnia convenire comperio. Ea quam ego veram Brassicam marinam arbitratus sum, nascitur intra primas maris aquas in litore, in ripis rivulorum præteriturgantium, & lapidosus infulis quas interdu mare perluit. Visa mihi in Frisia Orientali circa Jordan ubi Luppel Fruyt à cochlearis forma in folio, dicitur: nec non in Anglia in Cestria occidentali, juxta Portlandiam & Portbecum, verum nullum nomen aliud audivi, quam Scirby wode aut Scirby wurt: posset etiam appellari Spontaneute. Vbi primum erumpit, folia habet quinque aut sex, modò pauciora, modò plura, erecta simul omnia ad modum Pyrolæ aut Betæ tenerioris. caulis longus, teram versus rubescit. folia pinguis, crassa, rotunda, Afari similia, minor, virentiora, sapore non nihil salso & amaro, gustanti fervida & acris, Brassicæ quodam sapore ingrato, fervore & amaritudinis conjunctæ ratione. caulis spithamam æquat ferè, in quo quæ nascuntur folia, longiora sunt, acutioreque, quæ statim à radice surgunt. flos albus, semen tenue, nigrum. Indigenæ contra Scorbutum utuntur. Ego verò non contra cum solum utilem expertus videri sum, sed & contra hydropem, quem admodum Doctiss. Reirerus Reçtor Scholæ Gruningensis, & Henricus Herbartus testari possunt. Non ausim tamen pronuntiare, esse veram Brassicam marinam Diosc. præcipuè cum magna ejus quantitas parùm, vera autem Brassicæ marina vehementer purget: deinde etiam quòd nullum in eo lac aut succum lacteum animadverterim. Idem nunc subdit. Recepta passim in Italia, Gallia & Germania Brassicæ marina, Herbariis dicitur Soldana aut Soldanella. A Matthiolo verò exhibita, quoad radicem siltèd, non eadem est cum nostra Soldanella, quæ in Anglia & Belgio nascitur, neque quæ venalis habetur Francofurti & Antuerpiæ. Quippe, ut reliqua omnia totius plantæ familia sunt Volubili aut Helxinæ distampelo, nisi quòd folia rotundiora sunt, non ita acuta: ita radix cum ejusdem radice convenit nostra Soldanella verò Soldanella procul intuenti Malvæ similis videtur, tum floribus, tum foliis: propius si accedas, tam similis est Volubili, ut nihil aliud, quàm Volubilem quandam marinam dixeris. flores planè Volubilis vulgaris, campanam referunt, nisi quòd majores sunt, & ex cæruleo purpurascunt. Cùmque reliqua tota planta per fabulum serpat, flores recti stant & amœno decoro lites pingunt. Semen aliorum Volubilibus instar, nigricans, rotundum, viciorum autem majus. folia rotunda Aristolochiæ rotundæ aut Afari: sapore non adeò acris, ac Cochleariæ: purgant pulverizata ad ʒ. ij. sed non adeò vehementer, ut Diosc. in nuere videtur de Brassicæ marina: inquit enim κατὰ τὰς ἀποκαταστάσεις, ἐρῶν ἢ ὑποκαταστάσει. Plinius etiam de Brassicæ marina scribens ait vehementissimè ex omnibus

Anna. n. m. a. Diss.

ose. lectio rna.

quor. al. s.

aphanus scopbr.

aphani nnu Plin.

extus Diss. Satio laborat.

ca. 10. Caf.

Error Ruell.

Ruell. de fenditur.

Castil. ref.

Err. 1. Mat. tholi.

Brassicæ marinae Sc. ra. Locus.

Cochlearis. L. 2. m.

Soldanella. Matth. ra. dice d. ff. 1.

Diss.

omnibus alvum solvit: neque tam sunt calida folia ac Brassica marinae apud Diosc. Inquit enim *βρασις θάλασσης*, *κατὰ τὴν ἰσπανίαν* dicitur *ὅτι τὸν βρασιόν τε καὶ τὸν ἰσπανίαν*. Cùm igitur Soldanella, nulla habeat folia longa, sed omnia rotunda, neque tam vehementer purgantia, ac suam Brassicam marinam facit Diosc. neq. ullam habeat qualitatem, sive in odore, sive sapore, cur Brassica marina debeat vocitari, cùmque tota planta tam similis sit Helxinæ cissampelo & Smilaci sylvestri, quarum neutri ea confertur, dubitare posset quispiam an Soldanella sit Brassica marina Dioscoridis. Quòd si tamen Soldanella non sit Brassica marina, potest nihilominus aquis hydropicorum detrahendis rectè deferre, quemadmodum alia Helxines cissampeli & Volubilis mediteranæ genera idem præstant. Dicit Aëtius Smilacem sylv. quæ ad aquas, fruteta & sepes conscendit optimam esse ad hydropem: idem habet Nicolaus Myrepsus, Aëtium fortè sequutus. Scribit Diosc. Helxinen cissampelon alvum solvere. Mesueus de quinque speciebus Volubilis agens, omnes facit purgatices. Quare mirum non est, Soldanam, eùm Volubilis sit species, aliarum Volubilium modo purgare. Matthiolus, ut omnes tollat remoras, quæ prohibere possint, ne Soldanella sit Brassica marina, inquit corruptum esse Diosc. textum, & *μακρὰ* pro *κατὰ* talis irrepsisse: quod quidem verisimile videtur. Nã quod Aristolochia folia aliàs sint longiora, aliàs breviora & rotundiora, ut in Cochlearia, & generibus quibusdam Malvæ, aliisque plantis: tunc autem Soldanella non fuerit Brassica marina. Verùm enim verò apparet aut nullum in textu omninò esse errorem, aut antè multa sæcula corruptum. Nam tum utraque vetus barbara versio Diosc. (ordine alphabetico) tum etiam Serapionis legit folia longa. In nullo autem codice græco, qui hodie extet, aut veteri interprete, invenio *εὐχάριστα*, seu folia tenuia, ut habet Ruellius. Quod miror non an aduvertisse Matthiolum, hominem alioqui oculatissimi, tum, ut multis in locis Commentariorum eius apparet. Hætenus Turnerus.

Dubitat an sit Brassica marina.

Volubilis species.

Ruell. lectio notatur.

Error Matth. de Cachile Serapionis.

Brassica marina.

Lonic. not Soldanella.

Brassica marina.

Nomen Arguar.

Locus & Tempus.

Errat in hac planta, ut prodidit Matthiolus, Matthæus Sylvaticus pandectarum autor, quòd credidit Arabum Chachile Soldanellam esse. Cuius error aperte convincitur ipsius Serapionis testimonio: quippe qui Cachile suum *βρασις* simile fecerit, folioque non Aristolochiam, sed Nasturtium imitari tradiderit.


Brassica marina, Diosc. Ruell. Corn. Matth. Leon. Trago, Altom. Ang. Cord. in Diosc. & hist. Cast. Get. h. Dod. gall. Lob. Cam. Lac. Monach. in Mes. Lugd. Sylvio, Valeriola, Port. phyt. Alton. Morefc. Turn. Cæf. Io. Agric. Ryffio, Euch. Roessl. & Lonic. in quorum figuris capreoli non placent, & aliis plerisque Soldanella Lob. Dod. Levin. Lempr. Cam. Gat. Get. h. Cord. Leon. Altom. Ang. Ryffio, Adolph. Occ. Cast. Lonic. Sylvio, Alton. Morefc. Monach. in Mes. Lugd. Valeriola, Euch. Roessl. Cæf. Io. Agric. Tab. & aliis. Soldana Trago, Altom. Dod. Gat. Bionfels. Apollini, Lev. Lemni, Lonic. Lugd. & Fallop. Volubilis species, Mesue. B. phyt. Brassica marina minor (hæc vox apud Matth. omissa) seu Soldanella officinarum. Eid. pin. Soldanella 2. Soldanella marina. Ger. Eytt.

Brassica marina vocatur Græcis *βρασις θάλασσης*, Germ. Meerwinde: B. lg. Zee wind, i.e. Convolv. marinus: Gall. *Choux de mer*: Ital. *Caulo marino*: Hispan. *Verga marina*: Ang. *Sea coole*.

In hortis plantata felicissimè ex semine adolescit. Soldanella passim ad mare provenit, potissimum circa Venetias, Genuam & similibus locis: item ubique ferè in Belgico litore. Ad mare Mospelij æstate floret: autumno semen perficit.

Herba in totum stomacho inimica, acis vehementissimè, alvum ciet in cibo cocta: coquitur propter acrimoniam cum pingui carne, Dioscorides. Marina Brassica suprà quàm quòd ventrem deiciat, utpote subsalsa & subamara gustu, fuerit sanè etiam ad externos corporis usus, & ad omnia ea, ad quæ tales qualitates accommodantur, idonea, Galenus. Brassica marina assumpta aquas ducit, præcipuè prærogativè in alcite. Utendi modus varius: si liquidem folia ejus ex sale, aceto, & saccharo acetarij modo ad quinque aut sex bucellas comesta mitabiliter aquas per alvum ducunt. Eadem in jure carniū cocta, adjecto dein saccharo aut melle, propinatur. Posset & sicca in pulvere redacta ad ʒ. ij. aut ii. ex jure pulli bibi. Rectè autem cinnamomi pulvis & similia corrigentia addentur; alioqui usu nimio ventriculo nocet. Pulvis in catapotis ad ʒ. ij. deglutitur. Sunt qui scribant multos tertianarios Soldanellâ curatos, Matthiolus. Puerulis ad ʒ. j. & ulterius datur in conserva salviæ vel rosmarini, Brasavola. In hydropre pro siccatione, & evacuatione aquar, nullum vidi medicamentum præstantius, inquit Fallopius, & exlubetur vel in pulvere ʒ. j. pondere, vel in decocto, vel asparagorum modo, si planta recens habeatur, quo modo est suavissima, & siccata, aperitque vias, & evacuat aquam. atque experientiâ hujus Brassicæ ductus ego exlubui etiam aliquando in hydropre asparagorum modo Volubilem minorem optumo cum succella. Sed hæc folia species Volubilis in usu est: aliarum verò specieum nullâ utimur ad purgandum, Contrarium sentit Altom. de acitis curatione agens. Quidam, ait, ex tumoribus succum marinæ Brassicæ cum vino, aut sapa, seu aqua lactis approbant; hodie vulgus Medicorum Soldanam, seu Soldanellam appellat, cujus usum non valdè admitto: namque ventriculo mirificè advescatur, & ipse pluries experientiâ vidi noxam inferre, potius quàm auxilium aliquod hydropicis præbere, imò quosdam citius pericillè observavi.

CONVOLVULVS MARINVS Soldanellæ ætinas.



Convolvulus Desfer. Quidam rarus, cujus folia inferiora quidem, quæ uncialibus pediculis committuntur, salcata Phyllitidis in more sunt, adverso sine rotunda, velleacutè in medio excelsè in medio imitantia, sefcunciam circiter longa, unciam lata, nervis obliquis à medio recto in latus exportectis; superiora verò folia, Hemionitidis alterius peregrinæ Clusij modo auriculis pulchris geminatis (in quas nervi excurrunt) pinnata; flores ex foliorum alis prodeunt magni ut in Smilace levi sive Convolvulo majore. Provenit in horto D. Zvingeri Basilee.

An est Hermolai in Diosc. cap. 666. lecotaria sive An Hermolai Venetiis in litore passim nascens, & olivario foro teuniorum tempore vernalis, hederaco ferè

Vires ex Diosc.
Aquas ducit Aëtier.
Corre. 3. 10.
Pulsia.
Hydropis.
Diosc. p. 666.
V. J. Sol. d. mella & p. 10.

ferè folio; flore purpureo, Lilij puilli effigie, se convolvens, quibus appropinquat; solvens alvum cocta & cruda oleris modo accepta.

Convolvulus marinus ad nostrum mare (inquit Impet.) se expandit supra terram, ad quinque vel sex cubitos, folia habens incisâ, crassa, saporis salis, flores campanæ modò albos; femina cõtinet in folliculo triangulo, hirsuto, Soldanellæ modo, cui congener, & quia vitibus similis illi, ejus est usus quum è terra prodit: est herba lactifera. Lugd. in ap. hujus iconem ex Rauvvolfio ponit, ac Brassicæ marinæ genus inscribit, quod ab incolis Meudhendisâ Rhafè ad Almanforem Corigiolum nominari tradit. Sed nec Meudhendi, nec Corigiolæ nomen alteri sitæ Brassicæ marinæ Rauvvolfi. attribuit, verum Scammonio Monspelienti.

Fatur frater C.B. phyt. & apud Matth. (à quo Brassica marina 1. sive major inscribitur) hujus sibi Convolvuli marini nomine & plantam & semen Imperatum Neapoli misisse; folia autem ejus quædam laciniosa esse, quædam non: omnia tamen parte superiore sinuata. In pin. Smilacis levis generibus adscribit, & Soldanellam, maritimam majorem vocat.

CONVOLVULVS ÆGYPTIACVS QVINQUEFOLIUS, Casp. Bauhini.

CAP. XXXVIII.

Viticulus est tentibus, geniculatis, lavibus: ex quolibet geniculo solum, longo tenuissimo pedicello donatum, prodit, q. in quinque lacinias angustas longiusculas dividitur, & quandoque inferior una alterave bipartitur, & cuilibet lacinia, tenuissimus mollisq; aculeus insidet. Supra folij exortum, pedicellus aequè tenuis, duarum triumve unciarum longus & nudus exurgens, florem magnum purpureo caeruleum, aliorum Cõvolvulorum forma, sustinet. Semen non conspectum, cum solum hujus ramum, Convolvuli Ægyptiaci nomine, à nobiliss. Cortuso Patavio ante viginti annos acceperim, inquit C. Bauhinus, cui in prod. est Convolvulus 3. foliis laciniosis, vel quinquefolius: Eid. pin. Convolvulus 7. Ægyptiacus Bauhini, Bry.



DE LIGNO COLVBRINO in genere.

CAP. XXXIX.

PLURES stirpes inveniunt plurimùm dissimiles, cum formâ tum nascendi modo, uno tamen eodemque nomine nuncupatas, Lignum Colubri-

num, quod singulâ mirum in modum utiles sint adversus coluhorum virulentos ictus & morsus, faciliè animadvertetis, qui sequentes earundem descriptiones diligenter contulerit. C Bauh. Lignum colubrinum, Clematiudem Indicam vocandam censet, quod plerumque sarmentis sit, & per arbores repant. Hoc verò lignum, sive potius radicem, ut Garcia placet, serpentium morsibus prodesse, hoc modo deprehensum est. In Zeilan insula, Serpentis genus est coronatum, seu diademate insignitum, Lusitani Cobras de Capel (nos Regulum dicere possumus) maximè noxium. Est item animalis genus magnitudine viverræ huic serpenti inimicissimum, Quil, vel Quirpele vocant. Quotiescunque cum serpente congressurum est hoc animalculum, istam radicem (quæ multa istic nascitur) eâ parte præmordet quâ denudata est: etenim pars aliqua extra solum prominat. Præmorsâ radice, pedibus anterioribus salivâ conspersis, caput primum, deinde reliquum corpus sibi demulcet: postea serpentem aggreditur, nec eum dimittit, donec occidit. Quod si illo congressu serpentem vincere non potest, denudè ad radicem confugit, ad quam se fricat, deinde in prælium redit, atque ita mortuam serpentem necat. Hoc spectaculo edocti Chingala (ij sunt Zeilan incolæ) istam radicem venenis resistere cognoverunt.

Tria porò hujus ligni genera in insula Zeilan esse prodit Garcia, de quibus in genere ait. Non modò adversus animalium virus ejaculantium morsus ictusve efficax est hoc lignum, sive potius radix; sed etiam ejus pulvis lumbricos necare; papulas, exenthemata, & impetigines tollere creditur, & Cholera cholericam quam vocant passionem (incolæ Morde-morbus, xi dicunt) sanare. Similiter utile esse medicamentum ferunt adversus febrium circuitus, uncia ponderate propinatum, prius tamen tritum, & aquâ maceratum, per vomitus expurgatâ multâ bile.

Nullum autem ex tribus Garcia Colubri ligni generibus, cum Acoftæ ligni Colubri bina stirpes convenit, quas describit, & in provincia Malabar inveniri tradit. Idem mentionem facit & tertij Colubri ligni generis, vultu arboris magnitudine, de quo in alio libro se acturum scribit, qui ad nostras manus nondum pervenit, nec eum oculis nostris videre licuit. His adde & aliud lignum Clusius, quod an illis congerer sit, ignorat. Sed singularum adscribimus historiam.

COLVBRINVM LIGNVM I. Garcia.

DVorum aut trium palmorum magnitudine surgit, paucis virgulis, quatuor aut quinque duntaxat tenuibus: radix quæ maximè in usum venit, veluti tenuiorum nostrarum vitium radices, multis capitibus aut nodis se propagans, ita ut semper radix aliqua extra solum se exerat, & radice unâ exemptâ, aliæ in ejus locum succedant. Radix hæc ex candido cinerea est, solida admodum, amaro gustu; folia Persicæ mali, magis tamen virentia; flos longè à foliis racematim cohaeret, pulcherrimo colore ruhens, fructus Sambuci, sed rusciclymeno.

Primum & laudatissimum, secundùm mentem autoris, hoc est, à quo subsidium quaerit viverra, vocaturque incolis Rametul, Lusitanis Pao da Cobras, i.e. Lignum Colubrinum. Hujus ligni Colubri Garcia, fragmentum trium digitorum trans-

rum longitudine anno salutis 1564. ostendit Clusio Salmantica Vateus, dono olim à Lusitania missum.

Synon.

B. pin. Clematis Indica 3. foliis Persice, fructu Periclymeni. Ligni colubini 1. genus, Garz. Frag. Palo del Cebrá 3. c. Lignum serpentinum, seu colubrinum, Lincoe par. 4. Ind. or. c. 3. P. 10 de Cobra lignum seu radix Lusitanis dicta, omnium venenorum antidotus, in Insula S. Laurétij Ind. or. par. 4. c. 7.

Locor.

In Insula Zeilan, & multis aliis regionibus; & in Goæ Continenti nasci tradunt.

Vires & usus.

Teritur primum hæc radix, & ex vino, aut aqua cordiali propinatur à serpente percussis: teritur etiam ad eandem finalem modo, & vulneribus inspergitur.

Serpentes vitus. Cul. nera.

COLVBRINVM LIGNVM II. Garcia, Clusio scandens.



Malo punicea similis arbor.

Deser. Clus.

Arbor est (cum soli provent nullis vicina arboribus) Malo punicea similis, spinis brevibus & firmis horrida, cortice candido, denso, rimoso, & amaro, non tamen veluti prioris cortex, foliis est luteis, aspectu pulcherrimis. Hanc autem (si juxta aliam quâpiam arborem proveniat) per summos ejus ramos serpere, atque Cucurbitæ modò ample hîseunt.

De hoc ligno hæc Clusius. Secundi

generis Garciae descripti ligni fragmentum, quinque unciarum longitudinis, quodque ut conjicere licebat, duarum unciarum crassitudinem æquarat, mihi non modo ostendebat Londini anno 1581. C. V. D. Hector Nunez Medicus Lusitanus, sed etiam dimidiâ ejus parte liberaliter donabat. Ejus porro materies firma erat, candida, venis quibusdam distincta, non dissimilis Fraxini ligno: cortex autem qui eam integebat, candidans & quasi cinereus, utraque verò degustata, amaro sapore prædita esse deprehendebantur. Ejus qualem accipiebamus à Clusio fragmenti iconem lectioris oculis subsicimus.

Synon.

Garc. Lignum Colubrinum secundum Clus. Ligni Colubini 2. fragmentum. Lugd. Lignum Colubrinum Acolte, qui d. bebat scilicet Garcia. Tab. Lignum Colubrinum. B. pin. Clematis Indica 2. spinosa foliis luteis: Ligni colubini alterum genus, Garz. Trag. & Clus. qui ligni frustum pingit.

Locor.

Secundum hoc genus in insula Goa nasci ferunt, sed nunquam Garciae videre contigit.

Vires.

Commendatur adversus venena veluti primum, eodemque modo usurpatur. Soler ipsum lignum cum cortice & radice permixtum exhibere. Præferatur tamen radix.

Cortex.

COLVBRINVM LIGNVM III. Garcia, foliis Lentiscii.

Deser.

Ramos habet paucos, tenues, quatuor aut quinque cubitorum longitudine, qui, nisi alligati, sustentare se nequeunt, sed per solum sese distendunt: folia raris, lentisciorum effigie, oblonga,

non vitidia, sed maculosa, sive nigricantibus ex candido maculis respersa. Radix ter vis est, dura, nigra, & odorata.

Synon.

B. pin. Clematis Indica 1. foliis lentiscinis, candidis maculis aspersis: Ligni colubini 3. genus, Garz. Frag.

Locor.

Cùm Protex in Iasnapatan insula Zeilan contermina esset, dono data est illi hæc radix. Similem in Continenti Goæ nasci ferunt.

Hanc mirificè prædicabant, & adversus venena pollere aiebant,

COLVBRINVM LIGNVM HEDE- racum foliis Bryoniae, Acolte 1.



NASCITUR in Malabar Hedera modo, colore Dracunculi majoris, sive Serpentariae, folia illi sunt Bryoniae ferè similia, integra tamen initio, nervosæ prædita per longitudinem excurrente, & quinque aut sex venis in latera vergentibus; succellu temporis accedunt exigua foramina, quæ paulatim cum foliis incrementum sumunt: donec tandem omnino folia scindat,

quæque Vitis foliis similia reddat; conspiciuntur enim interdum in eadem stirpe, folia integra, alia exiguis, nonnulla majoribus foraminibus prædita, omniaque ad eandem inter se dissimilia, ut ejusdem plantæ folia, minimè esse videantur. Tanta verò habet hoc lignum cum colubro similitudinem, ut (Acolta tradente) qui non norit aut de die non videt, si ad Lunæ splendorem noctu conspiciat, vivum colubrum esse existimet.

Acolta ex versione Clusij, Lignum Colubrinum Synon. prius. Cast. Lugd. Ligni Colubrinum 1. Acolta, B. pin. Clematis Indica 4. Malabarensis foliis Vitis, colore Dracunculi.

Vulgò præstantissimum censetur remedium adversus colubrorum [unde sibi commone cum aliis] mendum in agros tendunt, magnâ ex parte circumferre solent hoc lignum (sunt enim in ea Provincia multæ vipera, varîaque serpentum genera) aiuntque solo ejus odore serpentes fugari: & si dum colubros venantur, illos attingere hoc ligno queant, illic rumpi & extingui.

COLVBRINVM LIGNVM DVDA Sali Canarinis, Acolte II.

Ligni Colubini alterius (cui nomen apud Canarinos est Duda Sali) planta admodum brevis est & tenuis, triaque solummodò folia habet, mollia, lævia, saturatis virentia: flos aut fructus non conspectus, nec quisquam se vidisse asserit: radix oblonga & tenuis est, minimo digito minor, hinc inde nonniquam extuberans & summi t. lute serpens, exterior ejus cortex valde tenuis, est & cinereus, nullo,

De la S. Deser.



nullo, dum gustatur, manifesto sapore præditus, deinde tamen gustum in ore relinquens suavem, & uti Moschus odoratum; filius est undique hic cortex, & spontè sese expedit ab alio crassiore, flavoque cortice subtus nascente, qui odorem Lori silvestris, sive Trifolij odorati vulgaris refert, & saporem Glycyrrhizæ dulciorem; præmansus odote admodum suavi, nec injucundâ mordicatione,

momentaneâ tamen, præditus esse deprehenditur; ipsa materies lignosa est, candida, dura, & insipida; folia Napi saporem referunt; germen producit hæc radix supra terram criciter quatuor uncias longum, in caput extuberans.

Lugd. Lignum Colubrinum 2. Acofta. B. pin. Clematidis Indica 5. Malabarenfis altera radice serpente; Palo della Culebra, Cast. ap.

Invenitur in Malabar altera ligni Colubri stirps, proveniens in locis humidis & inter arbores, præsertim verò secundum illas, quæ Angelinus nuncupantur, nec procul à mari.

Tritam radicem cum aqua rosacea aut vulgari, vel cum vino (indifferenter enim Canarini ut autor est Acofta utuntur) præsens certumque asserunt remedium adversus omnis generis serpentum morsus. Plurimum etiam ejus est usus in febribus continuis, tertianisque, syncope, ventriculi debilitate, & cordis tremore; daturque adversus omnis generis venena. Multi mihi sanctè affirmant, dummodo manum hanc radicem tenerent, nullos serpentes, vel alia similia virulenta insecta formidare: & certissimum esse, serpentes & vipetas ejus aspectum minime ferre posse, sed fugere, celeritèque in aliam partem sese proripere, si quis ante serpentes projiceret. Periculosum etiam censetur iis quibus anheli-tus ab ore vitiatum aut dentibus corruptis fœtet, modò eam continuò mandant, dentiumque cavis gestent.

COLUBRINUM LIGNUM CLVSII, Pao da Cobra dictum, fortè III. Acofta.

NVLlum dictorum Ligni Colubri generum cum hoc convenire facilè animadvertet qui descriptiones diligenter conferet: & haud scio, inquit Clusius, apud Acoftam, an Garcia ligno Colubri-nocongener sit lignum illud, cujus iconem ad me mittebat Iacobus Gareus Londinensis Aromatarius; erat verò hæc icon delineata, ex fragmento ligni cum tubere, sive superiore radicis parte in nodum coacta, & suo etiamnum cortice (cujus superficies ex clavo pallefcebat & rugosa erat, cortex verò exalbidus erat) tecta, majorisque quam ipsum lignum amaritudinis, quod crassi allicujus fructus non qualis à Garcia & Acofta nostro describitur, fuisse videbatur.

Fragmentum verò illud Pao da Cobra nomine insignitum, repertum fuerat in magna illa navi Præto-Tom. II.



B. pin. eandem suspicatur cum Clematide sua Synon. Indica 6. quæ est Colubrinum lignum 3. Acofta.

RADIX MALACÆ QUÆDAM, toxicis sagittis resistens.

RADICEM quandam in Malaca inveniri rumorem sparit Garcias, quæ adversus vulnera sagittis toxico illitis facta præsentaneum exhibeat remedium.

B. pin. Clematidis Indica 7. Cur autem non ostendit ob quam causam Radicem hanc Malacæ ad Clematidem referat. Indicare debet, si Clematidis sit appellanda, quæ in parte aliquam cum ea habeat cognationem.

ARBOR ANGELINA. CAP. XL.

QUÆ arbor sit Angelina, cujus Acofta sub Colubri-no ligno meminit, edoceri non potui, inquit Clusius, licet diligenter ab Hispanis & Lusitanis sciscitatus sim, atque ipsorum plerique existiment, peculiarem Malabar regionis arborem esse, nobis incognitam: quam mirum est Acoftam non describere.

An C.B. pin. Lignum durissimum, ferri duritiem æmulans 3. Angelina arbor apud Cachinum, ex cujus continuo trunco naves Tonas vocatas extruunt tam grandes, ut unâ 20. vel 30. dolia aquatica vehi possint, cujus lignum adeò durum ut ferrum atterat, Linscot. part. 4. Ind. or. cap. 14. & par. 7. c. 27. An arbor cujus pars innâ crassitie 24. orygarum in Guineæ insula Formosa par. 6. Ind. or. c. 4.

HALICACABVM PEREGRINVM multis, sive Cor Indum. CAP. XLI.

NON nisi adminiculo clavicularum quibus per-ticæ advolvitur, humo surgit, caulibus striatis, glabris; foliis lato virore nitentibus, Apij allicujus scèrè divisurâ, gustu viscida, in iis pili quidam minuti, & quorum alis pediculi exeunt floribus donati albis, quos rugida excipiunt vesicæ grana continentes, Piso parvo similia, nigricantia partim, partim albida, in quibus cordis effigies pulchre delineata; radix subest digitali crassitudine, multò minore, fibrosa, lignosa, duruscula.

Defc Cord.
cau Dory-
enium &
Granium
cordis.



Cord. hist. sic de-
scribit; Doryenium
ex breui caulis trā-
co plures singulares
& triatas emittit
juncea gracilitatis
viticulas, duorum
plerumque cubito-
rum altitudine, te-
nua affixa virgulta
ascendentes. Equi-
bus per intervalla
striati pediculi tria
folia Apio similia
ferentes prodeunt,
& quodlibet eorum
in tres partes per
ambitum profun-
dius incisus dividi-
tur. hæc quò sum-
mitati propinquo-
ra fuerint, eò mino-

ra etiam sunt [gustū viscida, in foliis sunt quidam pili
minuti] ex foliorum alis singuli exeunt pediculi, lon-
gitudine digitali, gracilitate tuā mediocri filo aqua-
les, in extremitate duobus brevibus, & retro flexis
e proleis contrario annexi sibi ipsi oppositis, vir-
gultorum alas ac furculas apprehendentes, quò me-
dus viticulae ex ascendere & imbecillitati suæ con-
sulere possint. In fine pediculorum ante capreo-
los fert flores candidos, parvos, exquisitus intus luteo
colore staminibus, quorum magna pars caduca re-
pud nos; qui verò abortivi non ceciderunt, sed re-
manerunt, e medio triquetros densos & aëre infla-
tos emittunt folliculos, magnitudine Halicacabi
vesicis aequales, tenui admodum membranā con-
stantes pinnipio, viride mox in ruflo pallefcente,
intus tribus membranulis à medio ad angulorum
intervalla usque transeuntibus in tres camerulas in-
terleptos. Qui interdum non tribus tantum sed qua-
tuor constant angulis, verū hæc non est propria
eorum, sed monstruosa forma ex superabundanti in
ea parte nutrimentali humore caulam & originem
habens singulis camerulis, ubi in medio folliculo
conjuguntur, singula semina innascuntur magni-
tudine parvi Pili, figurā rotundā, colore nigra, ab
una parte, nempe in annexi candidam & sauis ma-
gnam maculam habentia, figurā quādam tenuis A-
zari folium, vellatiunculum Cor imitantem, unde
etiam ipsa semina grana Cordis appellantur, ea foliis
dura sunt, intus verò candidum & inflexo septo di-
stinctum nucleum complectuntur; sapore dulcem
radicem habet, digitali crassitudine, multis fibratam;
cirris, [signis & duris foliis] Aëstiva est herba.

Hæc Cordi descriptio mihi placet, cui apposita
figura Tragi, & ascriptum à Gelnero, se nec Dory-
enium putare, neque Solanis cognatum, etsi aliqui
Halicacabum peregrinum nominant. Cordus au-
tem in Dioc. prodidit nullum ex veteribus, tum
Græcis, tum Latinis Doryenij herbam descripsisse,
præter Dioscoridem, qui historiam ejus ex Crateva
desumpserit: Plinium & alios cuosdam credidisse,
Doryenium idem esse cum Solano furioso, quod
salsum esse Nicander, Dioscorides & plures alij te-
stentur. Revera autem esse hanc herbam Dory-
enium opinatur Cordus. Scribitur, inquit, à Venetis
Monachis, & à paucis in Germania Medicis her-
ba, quam Grana cordis & Halicacabum alterum vocant,
ab Halicacabi fructus similitudine. Habet hæc
omnes notas & vires, quas Nicander & Dioscori-
des Doryenio tribuunt [Reprehendit hanc opinionem
Matthi. Gesn.] sola tamen folia non conveniunt,
quæ Dioscorides Oleæ foliis similia esse dicit. Sed

hoc me nihil mover: Desumpta ex Crateva est hi-
storia, potius quæ corrupti locis ite, ubi de foliis a-
gitur. Respondent candidi flores, folliculi, unde et-
iam Halicacabus à veteribus & nostris appellatur.
Conveniunt etiam ad amissim in folliculis conten-
ta, rotunda, dura, levia & colore varia semina. Con-
venit etiam eorum numerus, & commanducata
lactem habent colorem & saporem, quas notas
Doryenio Nicander tribuit. Quinetiam somnifica
sunt ejus semina, nec sine periculo vita intra cor-
pus sumuntur. Quapropter cum omnes alia nota
conveniunt, verisimile est in foliorum comparatione
mendum esse. Sevimus hanc herbam, vidimus &
gustavimus. Propterea non ex aliorum relatione
ista de Doryenio scripsimus. Grana ejus comesta
suaviorem somnum quam Opium afferunt: Sed ca-
vendus est magnus illorum numerus. Hæcille de
Grano cordis, quod si vires possidet, quales illi tri-
buit Cordus, non poterit esse Doryenium Diosco-
ridis & Nicandri, qui omnino diversas illi adscri-
perunt facultates.

Trag. Dod. gall. Euch. Roelslin, Vesicaria nigra si-
ve peregrina. Fuchsi Ger. & Hort. Luf. Halicacabum nigra.
peregrinum. Matth. Vesicaria genus aliud. Dod.
purg. & hist. Gesli. Cam. h. Tab. (cui & Cardispermō.
Nomen autem germanicum, Ser Balsam spissl
cin ander Gesl. blech / non convenit) Euch. Roels-
lin. Lugd. (qui & Fuchsi & Matthioli figuram exhi-
bet) & Lon. Halicacabus peregrinus. Gesn. coll. Ca-
put Monachi, Halicacabus Fuchsi (supplet de hor.)
peregrinus, que in Fuchsiū & alios Solanum Vesi-
carium peregrinum vocare scribit, cum tamen toto
genere à Solano Halicacabo differat, nec è Solano-
Colum. & Dod. qui cum Grano, à Setapione Ab-
rong, & Abrugi dicto, convenire dicit.) Doryenium
à Cordo dici.

Lob. adv. dubitat, Pisum cordatum sitne potius
Isoyryum, quàm Melanthis quædam species, aut Tri-
folium palustre? Mavult tamen amplecti amici cu-
jusdam sententiam quæ Isoyryum statuit, plantam
vulgò Cor Indicum vocatam, officinis Halicaca-
bum peregrinum. Idem alio loco etiam ostendit si-
bi non placere eorum opinionem, qui Vesicarium
cordis effigie, Doryenium hariolanum. Eid. obs. & ic.
plant. Pisum cordatum, ut & Schw.

Lobelo se opponit Columna dicens, neque Vesi-
caria Indica, Pisum cordatum, vel cor Indicum di-
cta, à Pena amici cujusdam sententiā Isoyryum pu-
tata, Isoyryum est. Nec ut idem Pena scripsit, phia-
soli mænes, quod nonnulli etiam folium interpre-
tantur, habet, quod ipse ignorans, Dodonæo obji-
cit, ut intellexisse videatur.

Cam. ep. & hist. Vesicaria, sive Halicacabum re-
pens. Calt. Vesicaria altera. Solanum peregrinum,
Lac. Fab. in versa recentiorum, Gesl. Bapud Matth.
Solanum 3, sive Vesicaria repens. Eid. pin. Pisum io.
Vesicarium fructu nigro, aiò maculā notato.

Halicacabum peregrinum multis sive Cor In-
dum, Ger. Niuichsi Fopflin / h. e. Calvariam Mona-
chij; Schwart oder Welsch Schuren / nigram seu
peregrinam Vesicariam appellare placuit Trago;
Cam. autem in ep. & hist. Hertzmann / & Hertzfor-
ner nominat. Belg. dicitur Dod. gall. Vrende Crac-
ten / & Swerte Cuxen vom oute Zee; Gall. Halica-
cabon orange, Fuchsius tamen Bagnenades seruges
appellat: Ital. Cam. in ep. & hist. Vitucchio serugero.
Angl. Bloef winter Cherin.

Halicacabum peregrinum sæpius mihi provenit, sed
semen non maturavit. Lugduni, Geræva &
Basilæ cultam in hortis & flores profertentem
obleravi mense Junio, Julio, Augusto & Se-
ptembri.

Cred-

Grana cor-
dis.

Pisum & a-
lorum er-
rer.

Granium
cordis.

Doryenium
Dioc.

Vesicaria
nigra.

Halicaca-
bum peregrinum

Solanum
Halicacaba-
rum no. 3.

Cor Indi-
cum.

Isoyryum
non est.

Vesicaria
repens.
Fab. in
Versa.

Nemina
linguar.

Locus &
Tempus.

Creditor valere semen ad omnes cordis affectus, ob notam, quā insignitur. Matthioli etate scenas, attegias, tuguria, & pergulas inumbrabat: quia etiam ad dium fenestras topiario opere contegebat & opacabat.

CACUBALVM QVIBVSDAM vel Alfine baccifera. CAP. XLII.



Haud absimilis huius radix ab Hippici majoris, uti nec folia: at farmenta longissima, duriora, reptantia, nervum transmittunt à quo cortex hirsutus facillè strictu cedit, crebris geniculis tuberosis donata. verum florum hinc prima est observatio, qui è turgidis Halicacabi utriculis vix rantillum foliorum, quæ numero quinque herbido pallore albescunt, apices bifidos proferunt, pen-

nitidis latentibus staminibus simul & baccæ rudimento, quæ per maturitatem nigra, grana continens nigra, nitentia, rotunda, compacta.

Hanc ita describit Clusius: Sarcimenti verius quam caulibus, usque numerosis, prædita est hæc planta, geniculatis, flexibilibus, humanam altitudinem plerumque superantibus, præsertim si frutices, quos scandere possit, vicinos habeat, alioqui propter infirmitatem, humi diffusis: bina singulis geniculis & internodiis adnascuntur folia ex adverso sita, Alfinæ vulgaris foliis figurâ & colore similia, longè tamen majora, & ad Helxines foliorum amplitudinem accedentia, mollia: flores ex calicibus, seu folliculis prodeuntes ex herbarco candidi sex foliis constant, quibus succedunt acini Piperis nigri, aut granorum Luniperi vulgaris magnitudine, folliculo illo inclusi, initio virides, per maturitatem nigri, semine exiguo & plano pleni: radix candida, valdè fibrosa, longa & sarmentitia: quæ singulis annis novos caules promittit, aliis per hiemem marcidis & corruptis.

Licet sapor insipidus & herbaceus secerit, ut eam ad Alfinæ genera retulerit Clusius. Liberum tamen omnibus reliquit, ad quam voluerit classem referre. Sunt, inquit, quibus Alfine repens, quam nonnulli [Lycas Ghymus aut h. re. Dodon. & Lobelii] *κισσός* seu *κισσός* vocant] dicatur, quoniam multis cum Dioscoridis descriptione notis conveniat. Sed ob notas aliquas, quas cum Cyclamino altera habet, si eadem nominanda non erat. Non in multis, ut idem esset, sed in omnibus convenire oportebat.

Recentiorum planta, Alfinæ majoris facie, baccis Solani, an Cacubalum (ait Lob.) Plinij: Intellexerat enim Valerianum Dourez ascriptisse hæc nomina. Cacubalum Plinij, Vera Polemonia Dioscoridis Constantini.

Geherus autem negavit esse Cacubalum, aut Polemoniam. Lugdunensis contra Cacubalum Plinij esse affirmare videtur, ita enim eam inscribit, ac Tom. II.


dicit esse aliorum Ocimoides repens: nec deesse, qui Clymenum herbam esse putent à Plinio l. 25. c. 7. descriptam. Alfine baccifera (ita enim vocari potest magis particulariter) dicitur Alfine repens à Clusio. & hist. ap. alt. Lob. obs. & ic. Dod. Cast. & Cam. h. A Thalo Alfine maxima fructu nigro. A Tab. Clematis urens 2. Keinnen oder Waldrae Clematis ben / non lavi errore, quem sequitur Gerardus, qui Clematis urentem multifloram, Double flowered Virgins Bower. Est B. phyt. Alfine 9. In pin. Alfine 6. five scandens baccifera: Cyclaminus altera Diosc. Chini.

In hortis in quibus alui quotannis suos renovat caules ex radice perenni; floret & baccas fert è se. mine collecto in Gallia Campania. Copiosa invenitur Salmanticensi agro, umbrosis locis & circa sepes: nostris etiam nunc in hortis frequens & pergulas scandens: aliquot verò post annis abundè observabam, inquit Clusius pone artem Eberstorf, loco paludoso inter arundines. Floret totà Æstate. Secus, auctore Dodonæo, margines agrorum inter vepres & fentes crebrè repetitur apud Italos, Germanos, Gallos ac etiam Belgas, ubi læcum fecundumque solum. Julio mense huius flores; fructus plumis suis inanescentes Autumnò dependent.

Dodonæo refrigerans hæc esse videtur & Alfinæ fa- cultate ac potentia proxima. Vim refrigerandi adstringendique obtinere, oculorum inflammationibus cum potentia illini, succum aurium doloribus infundi, & omnia, quæ Helxine, emendatè, prodidit Clusius.

NASTURTIVM INDICVM FOLIO peltato scandens. CAP. XLIII.

Peregrina elegantia est ex Indiis delatum Nasturtium, cui cum nostri orbis Nasturtio, præter



laporem odorèmiq; nihil est commune: folia peltata, circumscripta ferè rotunditatis, sæpè latiora quâ longiora, nonnunquam & Hederae modo angulosa, supernè glabra, infernè brevi lanugine hirsuta, medio ferè ut in Cotyledone, unde radij in ambitum porriguntur, pediculum excipiunt palmarem & sesquipalmarem subrubentem, tortilem & capreolorum ritu bacillo depecto seles circumvolventè: quo etiam complexu nituntur cum ramis caules: ceterum ex foliorum alis undatim tortiles pediculi rubentèsque exorti florum sustinent delicias artificij arguti plenas: posticâ parte productum carticulum sextantem circiter longum ex flavo puniceum, in quinque lacinas digitatas, concolores, striatas, qua reliquo flori committitur, succensens, quantum terzæ duo suprema florum folia sursum explicata à tergo suffulcunt, colore luteo prædita, miniatilincolis ad basin striata, per suprêmâ orâ subrotundâ mucrone brevifuculo donata id quod in reliquis tribus est videre, unioribus licet & rotundioribus ac veluti cordatis radiatim digestis, quorû tamè basis non virgata,

sed rhomboidem maculâ miniatâ insignis, utrinque barbato comans: Semen tricocon accedens ad Heliotropium tricocon, rugosum, mediocris magnitudinis.

Nasturtium Indicum quoddam foliis angulosis depingitur à Dodonæo, Lob. Obs. & ic. ac etiam Lugdunensi, quod quia verum non est, nos hoc præsentî hoc titulo omittimus, ac genuinam plantam duntaxat exhibemus, quam Nervij semine fatamin pensilibus hortis alebat Jac. Plateau: Huic (inquit Lob.) folia peltata; semina Betæ quadantenus, qualia nobis ostendit prædictus: Cuculo Indiano ferè paria afferebat D. de Brancion, in siliqua admodum eleganti, qualem habeo à nauderis reducibus ex Peruanis Indijs. Siliqua autem, quam Dod. & Lob. obs. & ic. Nasturtio suo Indico appofuerunt, alterius est plantæ, de qua paulò post, nec femina continentur in siliqua: sunt enim qualia descripsimus. Figura adhuc eorundem caret flore, ac propterea non undique placet. Meliorem Lugd. pingit, sub titulo Nasturtij peregrini Myconij, Peruanî etiam à Peru, unde advectum est, dicti. Albi pingitur pro Flore sanguineo Monardis, semine ex Peru delato.

Iconi Dodonæi & Lob. siliqua non est Nasturtij Indici.

Flos sanguineus, ad Monardis.

Nasturtium Ind.

Convolvulus.

Clusia.

Plantæ Clusio nata de scripta.

Cultiva.

Locu.

Nos regis.

Locus & Tempus.

Nasturtium Indicum quoddam foliis angulosis depingitur à Dodonæo, Lob. Obs. & ic. ac etiam Lugdunensi, quod quia verum non est, nos hoc præsentî hoc titulo omittimus, ac genuinam plantam duntaxat exhibemus, quam Nervij semine fatamin pensilibus hortis alebat Jac. Plateau: Huic (inquit Lob.) folia peltata; semina Betæ quadantenus, qualia nobis ostendit prædictus: Cuculo Indiano ferè paria afferebat D. de Brancion, in siliqua admodum eleganti, qualem habeo à nauderis reducibus ex Peruanis Indijs. Siliqua autem, quam Dod. & Lob. obs. & ic. Nasturtio suo Indico appofuerunt, alterius est plantæ, de qua paulò post, nec femina continentur in siliqua: sunt enim qualia descripsimus. Figura adhuc eorundem caret flore, ac propterea non undique placet. Meliorem Lugd. pingit, sub titulo Nasturtij peregrini Myconij, Peruanî etiam à Peru, unde advectum est, dicti. Albi pingitur pro Flore sanguineo Monardis, semine ex Peru delato.

Convolvuli speciem facit Dodonæus in quorum classem etiam admitti posse putat. Nasturtij autem Indici nomē ipsi datum est ex eo, quòd sapore Nasturtium referat. Et hinc dicitur Cam. h. Nasturtium Indicum Dodonæi: Item in Icon. annexis N. 2. Nasturtium Indicum: Et N. 3. Flores & semina Nasturtij Indici. Cast. & Eyf. Nasturtium Indicum; n. sive majus, B. pin. Monardi ex versione Clusij Flos sanguineus, ubi Clusio videtur Convolvuli genus, fructu *χρυσάλιδος* formam referens, ex Hispanijs *Μαστουρο de las Indias*, h. e. Nasturtij Indici nomine missi. Sed nobis fructus *χρυσάλιδος* formam referens alius est. Imò ipse apud Monardem in exot. suis fatetur Nasturtium hoc Indicum non ferre fructum, Chrysalidi similem, sed tribus seminibus simul iunctis constantem. Mihi, inquit, & multis alijs femine nata est frequentibus armentis perticis scandens, folijs Alari modo orbiculatis, nunc minoribus, modò amplioribus, præsertim si fertile solum nacta sit: flore admodum eleganti, aureo, Perficariæ siliquosæ (quam vulgus Noli me tangere appellat) florem non nihil æmulante, sed ampliore, quinque folijs constante, quorum terna inferiora, quâ umbilico adhærent, tenuia admodum & angusta, atque ubi in latitudinem sese expandere incipiunt, multis barbulis hirsuta, singula verò circa unguis punicante maculâ infecta, & calcari quinque radijs præditæ, in longum protensa, qui rarisimè apud nos ad frugem pervenit. Surculi terræ commissi satis feliciter proveniunt, & in Autumni finem egregiè virè: sublequens tamen hiems plerumque corrumpere solet. Ceterùm neque in Germania, neque in Belgio nata fert fructum Chrysalidi similem, sed tribus seminibus simul iunctis constantem.

Coronidis loco addamus, quæ pulchrè scripsit Arnold. Gillenius de Nasturtio Indico: Rectène is fecit, inquit, qui plantæ huic Nasturtij nomen indidit quòd huius sapiat acritatem? An is qui à cinabaticis venulis, quibus aspersi flores, Florem cruentum appellavit? Cur non liceat ad Violas referre, quarum graüissimum flores spirant odorem? Cur non ad Regios flores, quorum faciem huius flores egregiè exprimunt: Cur non ad Astarum, cuius folio est: Cur non ad Convolvulos: amplexicaulis enim est. Est Nasturtium ob saporem quem verè exprimit, à quo maxime dependet efficacitas: Indicum à loco natali.

In hortis nõ solum ex furculis, sed etiã ex semine deciduo facillè pvenit, florès Junio, Julio & Augusto.

Vites Nasturtio similes esse gustus demonstrat. Quare in acetarijs & medicamentis, idem qui Nasturtij usus. Intingit, calidus Flos sanguineus à Monarde dicitur.

NASTURTIVM INDICVM folio anguloso.



Icone huius Dodonæo tantum videre contingit, Nasturtij Indici nomine missam, sed coloribus suis expressam, plantæ Europæ peregrinæ, quam America, vocata Occidentalis India gignit, speciem exhibentem Convolvuli; folia lata angulosa & pulchrè depinguntur virentia; flos luteus retrò propendens habet corniculum instar floris Regij quam Delphinium appellant.

Lob. obs. & ic. ac Lugd. Nasturtium Indicum ex Dodonæo.

Siliqua huic Nasturtio appicta, putatur à Dod. Icon. Lob. & Clusio siliqua Nasturtij Indici peruviana, de qua mox dicendum.

NASTURTII INDICI PVTATA siliqua Peruviana.

Siliquam (huius icon in præcedenti tabella exhibetur) admodum elegantem habet Lob. à nauderis reducibus ex Peruvianis Indijs, teretem, rotundam, unciali & duos digitos longam, coriaceam, strijs & rugis exarata, luteolam, summo & imo ventriosam, tantillum falcatam.

Diximus nos ante titulo de Nasturtio Indico folio peltato, hanc siliquam non esse Nasturtij ut Lob. loco citato annotavit, qui juxta radicem Nasturtij Indici iconem huius siliquæ Peruvianæ posuit, quam etiam videre est in Icon. & apud Dod. hist. Nos hanc siliquam etiam habemus, non occurrere unde acceperimus. Et hæc est illa, de qua loquitur Clus. apud Monard. de Flore sanguineo cum ait: videtur Convolvuli genus, cuius fructus Chrysalidos speciem refert.

An B. pin. Nasturtium Indicum 2. Peruanum Monardis, folio rotundo, Lenticulæ paulò maiori.

CYCLAMINVS ALTERA veteribus. CAP. XLIV.

Cyclaminum alteram veterum Medicos ignorare eruditorum pace cum Ruellio dixerimus. Quin caput Cyclaminum alterius in ipsius Dioscoridis quibusdam exemplaribus desideratur. In quibus autem habetur, sequentia leguntur. Cyclaminus altera, quam nonnulli Cissanthemon aut Cissophylon vocant, folia fert Hederæ, sed minoræ; caules crassos, geniculatos, quique circa vicinas arbores capreolorum

Cyclaminus altera Diosc.

Cissanthemon aut Cissophylon.

capreolorum modo sese volvunt. Flores visuntur candidi, odorati. Fructus verò *Addit Lacuna ex veter. cod. Dioscor. & Rhazis*] uvæ acinorum instar, corymbis Hederæ imilis, mollis, ac sapore aliquantulum acris, atque lentus: radix supervacua. Nascitur locis asperis. Huius fructus drachmæ unius pondere potus [Goupylus esse scribit in veteri vestigia diverse cumdam scriptura. sed vulgatam, quippe qua optimum habeat sensum, veram esse existimat] cum vini albi cyathis duobus ad quadraginta dies, lienem liquat, ac per urinas & alvū absumit. Bibitur & ad orihopnæam: ac potus [modicus, pota] quoque reliquias à partu purgat. Quoniam autem alterius Cyclamini radicem supervacua esse scripsit Galenus, ista [quæ dicitur modicus, purgat exhibit a] vel ad reliquam plantam, vel potius ad ipsius fructum, vel acinos (quod facilis Sarrae. crederit) referenda sunt. Quare pro modico, modis [eporus] legendum putat, nimirum xapm̄s, cuius fit mentio. Verba autem Galeni de altera Cyclamino hæc sunt. Porrò altera Cyclaminus radicem quidem supervacua neam habet, sed fructum admodum efficacem: nam hic cum vino pluribus diebus potus lienes sanat, urinam movens, ac ventrem subducens: locos quoque ejicit, & asthmaticis prodest. Qualitas ejus gustanti acris est & sublentia.

Hanc etiam Cyclaminum describit Plinius l. 25. c. 9. Dioscoridem ferè exprimens his verbis: Est & altera Cyclaminos cognomine cissan themos, geniculatus caulibus, supervacuis, à priore distans, circa arbores se volvens, acinis Hederæ, sed mollibus; flore candido, specioso; radice supervacua. Acini tantum in usu, gustu acris, sed lenis. Siccantur in umbra, cuiusque dividuntur in passillos.

Cyclaminus uterque, autore Mesue, est medicamentum, calidus siccus in initio tertij ordinis.

Pro Cyclamino altera variæ exhibentur planta. Cordus enim Glycyperion seu Dulcamaram, quod Lobelio non placet, pro Cyclamino altera exhibit.

Sigillum B. Mariæ quidam existimant Cyclaminum alteram, quorum opinionem falsam esse, facile intelliget, qui harum descriptiones contulerit. Nos Sigillum B. Mariæ, Vitium nigram quibusdam sive Tamum inferibimus.

Bryonia nigra est nonnullis Cyclaminus altera, quam sententiam non approbat Lobelius.

Placet Cæsalpino Vincibosum [Periclymenum à nobis inscriptum] convenire cum altero Cyclamino Dioscoridis, vel ob fructus mollitiem, quod nobis non probatur.

Periclymenon alterum, autore Lobelio quibusdam dicitur Cyclaminus altera, verum ea opinio ei non placet.

Albine repens Luca Ghino est Cyclaminus altera Dioscoridis. Nos de Albine repente sub Cacubalo quorundam hoc libro (ubi eam opinionem rejicimus) agimus, ut & de jam dictis.

Dubitat Lob. in obs. & c. de planta quadam Hederaceis foliis, an sit Cyclaminus altera, de qua jam dicendum.



lius in obs. Hederæ est Hederæ foliis sinuatis patibus; in mollibus flexilibus, cubito prolixioribus, ni labat memoria, cauliculis flores oblongi, galericulati, ex purpura pallentes.

Lob. obs. & ic. Synon.

An Cyclaminos altera, hederaceis foliis planta?

Lug. Cyclaminos altera hederaceis foliis. B. pin. Hederæ 5. sive hederaceis foliis planta.

QUAMOCLIT. CAP. XLV.



Planta est anadendras, foliis prodiens oblongis & laeviculis initio binis sibi invicem connatis, quæ diu durant, eam sese peticæ involvente jam ipsa planta: reliqua folia Myriophyllo alteri apud Matthiolum similia sunt ac tenuia admodum, ut Convolvulus tenuifolius non ineptè vocari possit, cauliculi rubent, sed magis vergunt ad nigredinem; flores elegantissimo rubore placent in quinque

angulos collectis oris, Peti florum similitudine; semen in capsulis oblongis fert itidem oblongum & fuscum, quod aquâ maceratum plerumque rumpitur, ut Campanæ Lazuræ grana. Sapor ipsius herbae est subdulcis & modicè nitrosus; capsulae verò non nihil piper vel brasma Piperis gustatu referunt, ut & semen, quod parùm abest, quin haud minore caliditate sauces nonnunquam afficiat.

Inferiore parte adjectos vides folliculos duos effractos; superiore verò florum calyculos duos, semotas laminulas tres, & exempta semina trina.

Quamoclit plantam novam ex India allatam, & à Cæsalpino sub nomine Jasmini, folio Millefolij descriptam (cujus semen ipsi communicatum fuit à Iosepho de Casâ bona) representare studuit Cam. inter figuras in sine hortu sub 40. numero, quamvis ipsi Norimbergæ exilior creverit, quam in calidioribus regionibus. Sed hujus naturalæ formæ referret Pona, Jasminumque Indicum alterum rubrum Myriophylli folio inscribit. Huic autem anno, 1604. virefcebatur ex semine à Ferdinando Imperato accepto, fructumque ad maturitatem producebat.

B. pin. Jasminum 6. millefolij folio: Gelseminum alterum rubrum, Cæf. Gelseminum Indianum pennatum flore sanguineo, Pona It. Convolvulus pennatus exoticus, Col. Quamoclit, Cam. sive Jasminum americanum, Clus. cur. post.

CYCLAMINUS FORTE ALtera, Hederaceis foliis planta.

SI quid conjecturæ captari potest, cujusmodi stirps fuerit Cyclaminus altera: cognata Hederæ & Cyclamini planta accipienda videtur: Hanc multæ adumbrare videntur, nulla autem explere asseri potest. In Italia collibus, quo loci & quâ radice jam non occurrit, reperta plantæ inque sportulas conjectæ sedulis vestigatoribus iconem & descriptionem exhibeo, inquit Lobe-

PIPER IN GENERE. CAP. XLVI.

Diosc. de Piper.

Philostatus Vitici Piperis arborem assimilat, tum aliis partibus, tum fructuum racemis. Sed Dioscorides arborem piperis feram neque delineat, neque cuiquam alteri comparat, ita scribens; Piper brevis arbor [πείπερος] esse traditur, nascens in India, quæ inter initia prælongum fructum veluti siliquam promit, quod est longum piper, habens in-

Longum.

Candidum.

Delectum.

Theophr. genera.

Juniperi similis arbor.

Piper longum.

Candidum.

Nigrum.

Erachmasii.

Radix non est Zingiberi.

Adulterum.

Piperis in Italia arbor.

Adulterum.

Generositas.

Longum.

Album.

grana ferentes, qualia videmus. Ea acerba candidum piper faciunt. Piperis radix Costo similis est. Eligendum est gravissimum, plenum, nigrum, non valdè rugosum, recens, non furfurulosum. Invenitur etiam in genere nigri, nutrimento deficiente, inane, leve, quod vocatur Brasina, de quo ceu & de Pipere nigro & albo postea plura. Theophrastus, qui πείπερον tantum fructum esse dixit, ejus duo genera facit. Vnum rotundum [πείπερον] ut Orobus, cute, carneque constans, sicuti Lauri bacca, subrubrum [πείπερον] Alterum verò oblongum, [πείπερον] nigrum [Eugd. contra rotundum nigrum, oblongum subrubrum ducendum videtur] semina parva papaveris [πείπερον] continens: longè hoc validius altero. Ambo calefacientia, idè conferunt hæc contra cicutam.

Plinius qui Junipero arborem comparavit ita scriptum reliquit: passim verò quæ piper gignunt arbores, Juniperis nonnullis similes, quanquam in fronte Caucaei solibus opposita gigni tantum eas aliqui tradidere. Se nunc à Junipero distant parvulis siliquis, quales in Fæcolis videmus. Hæc priusquam dehiscunt decerpæ tostæque sole, faciunt quod vocatur piper longum, paulatim verò dehiscentes per maturitatem ostendunt candidum piper: quod deinde tostum solibus, colore rugisque mutatur. Verùm & iis sua in injuria est, atque cæli intemperie carbunculantur, fiuntque semina casta & inania, quod vocant Brachmasii, sic Ludorum lingua significante abortum. Hoc ex omni genere asperissimum est, levissimumque & pallidum. Gracius nigrum, leniusque utroque candidum. Non est huius arboris radix, ut aliqui existimavèrunt, quod vocant Zingiberi, alij verò Zimperi, quanquam sapore simile. Piper longum facillimè adulteratur, Alexandrino Sinapi. Emittit in libras xxv. Album xvii. Nigrum xiiij. Vsum eius adèd placuisse mirum est. In aliis quippe suavitas cepit, in aliis species invitavit: huic nec pomi, nec bacca commendatio est aliqua, solà placere amaritudine, & hanc in Indos peti. Quis illa primus cibus experiri voluit? aut cui in appetenda aviditate esurire non fuit satius? Vtrumque sylvæ gentibus suis est, & pondere emittit ut aurum vel argentum. Piperis arborem iam & Italia habet maiorem Myrtho, nec absimilem. Amariudo grano eadem, quæ pipere musteo credita est. Deest costa illa mauritas, idèoque & rugarum colorisque similitudo. Adulterantur Juniperi baccis mirè vim trahentibus. In pondere quidem multis modis.

Galenus tria piperis genera prodidit. Piperis, inquit, radix Costo maximè vitibus similis est. Fructus autem recens iam germinantis, est piper longum. Quare etiam humidus est, quam maturum. Signum humiditatis est, quod repositum facillè perforatur, & non statim mordet, sed paulatim incipit, diutius autem perseverat. At fructus qui velut uva immatura est, album piper est, quod nigro acrius est. Illud enim velut superallatum iam & superexcisatum est. Ambo verò vehementer calefaciunt & exsiccat.

Longum piper, fraudulenter præparatum deprehendes, si aqua maceraveris. Solvitur enim quod præparatum est. Quod verò nativum est Indis solum permanet. Est autem id quo piper, longum adulteratur, flavæ quadam herba, quæ ab exteris adfertur; similis illi aspectu, non tamen gustu similis. Quare etiam facillimum est ipsam discernere à longo pipere. Verùm par est monente eodem Galeno lib. de Ther. ad Pistem te non ignorare fraudes quas in longo pipete struunt. Quidam enim ipsum confingunt verò Piperi longitudine æquale, & imposito Pyrethri vel Napyos aliquid, quia sensum hoc pacto mordet, gustantem fallunt. Verùm qui circa hæc peritus fuerit, & suave acutumque gustu judicare noverit, præsertim si pediculum ipsi adherentem accuratè inspexerit, verum piper invenit, & ab istis decipi non potest.

Longi adulterum.

Sicco pede prætereunda non sunt, quæ postertati relinquere voluit Ludov. Vartom. Piper, inquit, suburbanus Calecuti ager mittit: legitur etiam non nihil intra urbem cultores. Caulis piperis infirmus est admodum, instarque vitis absque adminiculo (pedamenta vocamus) consistere nequit, Hederæque non est absimile piper, qui piper quod ferpit, & altiore complexu proximam semper arborem vincere consuevit. Dicta arbor, imò frutex dispergitur in ramos complurculos, intra geminum ac tertium palmum longos. Folia eius Mali Adlyrij figuram expriment, sed hæc crassiora pinguiscula non nihil, intercurrentibus ex aduersa parte minoribus venis. E singulis malleolis seni dependent racemi palmo haud ampliores, passibus non absimiles, confertiores tamen. Coloris est, qui & immaturis vitibus vis. Leguntur itaque mense Octobri atque Novembri in colorem præserium adhuc inclinantes, ad solèmq; aspiciantem assandum imponunt tegetibus. Triduum nigrescit non aliter quam huc affertur: absque ullo alio cultu putandi, minùsque lignonizandi cura est illis, simpliciter ac sincèrè telluris proventu.

Lud. Vartom.

Piper Hebraea non absimile.

Apud Plinium lego, inquit Ruellus, Piperis arborem iam olim Italiani habuisse maiorem Myrtho, nec absimilem. Qui Lusitani regis diligentissimi studio, Liburnicis magnè parte meridiani sitis ambitu Mauritanie circumvectis, in novum orbem se contulerunt, natale reliquamque faciem stirpis ad nos reuerti repræsentarunt: autem qui plurimas se vilisse fateantur, fructum non arborem piper edere narrat, alba vitæ in sepibus proreptati simillimum, vicinas scandentem arbores, qui racemosum ostendat fructum, primum viridem, nec aliter quam in Ligustro coærvatam, quem antequam legitimè maturitate nigrescat, lectum, sub sole palmis tegetibus expandant: sicque baccas Solis æstu corrugari, vel passas nigrescere commemorant. In eodem fructe longum piper aut album offendi negant, sed alias arbores, quæ sapore, piperis non nihil ferant oblongum, compahtibus callis racematum coherentibus, veluti Ponticæ Nucis julum, quod omnibus longum piper incolæ nominant, inquit etiam æmulà facie longum piper exprimitur, ut nisi sapor fallaciam proderet, nullo in signi discerniculo notarentur. Vides quam dissimiliter exotica arbor à variis authoribus sit depicta, qui forsitan eam non viderunt, sed potius indigerant fidem sequuti repræsentarunt. Id tamen non est omitendum, arboraceum fructum apud nos esse, quod velut vivà sepe latiores hortorum areas verustatis potius causa, quam munimenti cingunt. Is altitudine ternum cubitorum innotescit & vitigineà fronde viret, supra modum asperà, utriusque lateribus acuminatè, medio in mucronem desinente, ambitu leviter fimbriato, satis ad Lupi salictarij, vel vitis albæ solum accedente. Ramos sunt breves in quibus excussio flore primùm baculæ videtur

Bryonia similis fructu.

Piperis longi & album plantæ descripta.

An Similæ aspera.

videtur.

vidides, et in Ligustro racematum coacta, quæ maturitatem adipiscentes nigrescunt, gustu & sapore pipetis, sed mitiusculo. Eæ prorsus rotundi piperis faciem expriment, verum desideratæ in eis retorrda illa rugosaque maturitas: abest etiã illa validior amaritudo, gustum piperis sapore complens, & os, cuius anima fetet; odoris iugenditate commendans. Piperolitores nostri nominant, quod atrum piper colore & sapore forsitan amulatur: sit ergo nobis Piperastrum quoad melius vocabulum inveni-erimus. Vides itaque quàm cæca sit harum rerum effigies. [Si licet iudicium nostrum adferre suspicor esse Smilacem asperam, Piperastrum Ruellii.] Alij oculatâ fide referunt longum piper esse ex alius arboribus veluti nucamentum quoddam, exilibus granulis quammatim compactum, quod veluti julus in Avellana nuce, vermiculosâ facie dependet, piperato gustu, nunquam in album tamen vel nigrum piper coalescere. Qui Vitici assimilant julum compactibus granulis coactum in eadem arbore fructum, veluti quandam convirescentis semini conceptum contendunt, quale forsitan in falicibus apparere cernimus, & etiam Vitice, Nucæque pontica. Nec deest qui tradat visum sibi in India piperis fructicem, Hedera modo amplexicaulem, folio Mali Assyrii, sed carnosiore pinguique, racemis palmaribus, coloris immanitate utra: hos legi mense Novembri, ac in folios nigrescere. Necius ultra citroque adjunctis volumus fidem antiquorum placitis derogare. Variæ sunt forsitan diversis regionibus arbores piperifera: uti & varia palmarum multarumque stirpium genera, palmulas tamen ferentia. In Ægypto ut Straboni placet, granum piperi simile, paulo tamen majus nascitur Corsion nomine, quod piperis vicem & acumentum pensat, si alterius non detur occasio.

Lustiani, Matthioli ita tradente, navig. suis, hoc ævo confectis per Oceanum Atlanticum versus Austrum primo, & hinc deinde in Orientem ad Calcut, Taprobanam, aliâque Indici pelagi insulas: item Hispani Liburnicis vecti ad Occidentales Indias, Peru, atque alias complures regiones, quæ antiquos Geographos penitus latuerunt, non modò pipere & hujusmodi odoratis simplicibus, universam repleverunt Europam, sed & stirpium historias, à quibus oriuntur posteritati memoria prodiderunt. Quod postea fecit, ut planè nobis ignorasse videantur Theophr. Diosc. & Plinius aut ob regionum distantiam (indigenam potius in hoc sidem sequuntur, quàm quod fortè ea viderint, quæ de pipere scriptis tradiderunt) aut ob aliam quamvis causam, plantæ illius formam, ac notas, quæ piper in India gignit, ac quonam modo piperis planta suam edat fructum, an scilicet racematum, an corymborum modo, an in siliquis inclusum, an baciferarum arborum more. At hi qui suis Liburnicis immensa trajecterunt maria, propriâque perlustrantur regiones, ubi piperis utriusque plantæ virebant, nigrum ac rotundum gigni narrant à quibusdam infirmis viticulis, vicinis arbores altiore complexu scandentibus, acutè Clematidis non dissimilibus, folio tamen Malum Assyrium amulantibus. Quin & racematum profertur uvarum Labruscæ modo, confertissimum tamen: deinde mense Octobri per maturitatem decerpi, & sub ferventi Sole tegebibus palmis expansum torrerit, quousque nigrescat, & rugosum evadat, quod tridui spatio plerumque fit. Longum autem ut idem testantur, alie ferunt arbores, est que velut nucamentum quoddam, exilibus granulis compactum, quod velut julus in pontica Nucæ, qui pulchre ad stipulatur, vermiculosâ facie dependet piperato gustu: nunquam tamen in album vel nigrum piper coalescit. Galenus indigenam fidem &

Dioscoridem sequutus, eandem plantam tam rotundam quàm longum piper edere credidit. Piperis fructicem vidi Neapoli, qui Lufitanorum descriptioni maximè respondere visus est, quod viticulis caule esset, Clematidis acutè modo. Sed & aliam arbutenlam piper racematum proferentem vidi Venetiis, quæ prorsus illius plantæ faciem exprimit, quam vulgus Ribem appellat. Viret hæc in hortu Medici Maphæi à Maphæo, in quo plurima simplicia notata digna visuntur. Quò fit ut mirum non sit, si in piperis histotia variant auctores. Quandoquidem eam variæ in Italia piperifera habeantur arbuticula, facillè credendum est varietatis longè majores eas in India reperiri. Hæc ille, qui figuram sibi depictam à Poruigalensibus exhibet. Matthiolum autem negligentem Botanicum fuisse apparet ex eo quod visum piper Neapoli non descripserit. Si bene considerasset plantam Venetiis visam, comperisset à pipere plurimum differre & nihil habere commune, nisi quòd racemum fert: ea autem planta nihil aliud est quàm Ribes nigra quibusdam dicta, de qua nos præsentis libro. Icoem quàm ponit fallam existimamus quales plures habet.

Nascitur piper apud Indos, ut Amat. scribit, eo modo quo apud nos Hedera, sic enim piperis planta patibibus & arboribus hæret, circumvolviturque folio Mali Cotonæ, sed rotundiore, quamquam piper quoque in planta folia Vitis ferente nasci à nonnullis visum est, & hodie Venetiis in nonnullis hortis conspicitur. Nascitur enim prius piper, affixum ramulo, tanquam verruca carni, sed postea pediculis tanquam Hedera bacca pendet. Virides namque piperis racemos aceto servatos, ex India ad nos amici transvexerunt: ex quibus exactè censemus, quod piper dicto modo crescat, nascaturque, sed quum ad maturitatem pervenit colligitur & in floreis ad torridam solem ponitur, ubi eo modo, quo nos cortugatum videmus, efficitur. Interdum autem granum hoc omphax ac immaturum est, albumque piper appellatur, ita ut piper nigrum, & album ejusdem sit arboris fructus, nec in alio differant quàm majori, vel minori maturatione. Diosc. & Galen. errant, quia piper longum ejusdem arboris fructum esse credant, quum vera piper longum alterius arboris fructus sit, quæ ex insula Somata, Taprobana dicta adfertur. Hæc Amatus qui in eo maximè decipitur, quod Piperis arborem folio Mali Cotonæ tradat

Cord. hist. Piperis genera describit, verum cum vix quicquam, quod sit alicujus momenti, aut quod ab antiquis non sit dictum, tradat, nihil hic addemus, ait enim, cum illis, sicuti & Monachi, omnia tria Piperis genera esse ex una planta. Ex Dodonæo etiam nihil addam quàm quod dicit Anturcipiam adferri ex India Piper conditum cum pediculis.

Salvo meliori iudicio in defectu piperis albi, pro eo potius apponendum censent Monachi piper longum, quam nigrum: quia in stipticitate & confortatione magis convenient inter se. Postea etiam poni nigrum putant, quia quòd album sit in medio, & de utroque ipsorum participet. Similiter & caret longo, potius præcipiunt accipiendum album, quàm nigrum, quia album magis appropinquet longo, quàm nigrum: Et de diversis in defectu nigri ponderum consulunt album, quia propinquius sit. Item quando cunque due ipsorum species defunt, per reliquam supplendas arbitrantur. Sed quando simpliciter legitur piper, semper album intelligendum docent secundum alicunorum opinionem, quod etiam probat Nicolaus Pepsus in suis Analogiis, quia (ut ait) Avic. & filius Serap. quædam ipsam ponant autoritate Galeni piper album confortet stomachum, plura quàm alie due species.

De

Piper nigrum acrimonia candido.

De acrimonia Piperum hac Cordus hist. Vtrumque odoratum & gustu acerrimum, seruidissimumque est, odoratum tamen acruumque candido nigrum sentitur: ideoque medias habet candidum, inter longum & nigrum qualitates: tardius enim longi, citius candidi, citissime autem nigri acrimonia gustu percipitur, quamvis Dioscorides candidum (quoniam acerbum sit) utroque ignavius esse tradat, quam bene non video, cum absurdum quoddam inde oriatur: nam idem Dioscorides nigro ignavius candidum ideo esse ratiocinatur, quoniam acerbius, h. e. immaturius sit nigro, ergo cum longum quoque acerbius, immaturius, imperfectiusque sit candido, sequitur necessario longum Piper omnium esse ignavissimum, ergo videtur aut hac ratiocinatio nullum in veritate locum habere, aut Dioscoridem male tradere, candidum tam longo quam nigro ignavius esse. Hac Cordus qui Piper rotundum seu nigrum, ex longo fieri odoratum, acruumque candido dicit, sed male, Quod autem quum Piper simpliciter pronunciat, nigrum contra Monachos qui album praefert, intelligat, nostro iudicio doctè sentit.

Disse not.

Cord. not.

Piper simpliciter, de nigro intelligitur.

Sed quid de Pipere referant, qui id se vidisse gloriantur, mox audiendum. circa Calecut (inquit Cronemb.) in India copiosè provenit piper, etiam in urbe sed parvè quantitate: truncus similis est Viti, si planretur juxta arborem, alioquin non potest assurgere: provenit Lupuli modo: plurimos fert ramos, duarum aut trium palmarum longos; folia similia Melangoli. Ex ramulis prodeunt 5. 6. aut 8. pediculi paulò longiores digito, quibus adhæret piper parvorum hororum modo, sed magis angulosum, viret in ista Aegreæ. Mense Octobri & Novembri immaturi botri exciduntur, supra lintea exponuntur foli per tres aut quatuor dies, sic exsiccat & nigrum fit. Simile quid refert Ioan. Stadius, dicens duo genera Piperis in America sunt; alterum flavescens; alterum verò tubescens, eodem ferè modo ac formâ succrescentia: dum viret Cynosboti habet magnitudinem: frutex per se humilis est, sesquicubitum altus, foliis exiguis, sed abundans Pipere, quod acriter in ore mordicat: maturum decerpunt, & soli expositum sicant. Est & tertium genus Piperis, sed minoribus granulis, à prædictis non multum distidens, quod similiter sub sole torretur. Sunt illi radices Letuki dictæ, satis boni saporis, quas si plantare instituant, conscindunt eas in minuta frusta, quæ terrâ obruta radices agunt, & abundè producunt. Hac attestati videtur Marantha cum ait, Piperis arborem cum Dioscoridi videre non licuerit, atque ex aliorum scriptis ejus fructus describeret, tria illius genera ejusdem arboris esse tradit: & tamen hi, qui in novas Indias navigarunt, quique arbores viderunt, diversarum arborum fructus nigrum, candidum & longum esse affirmant.

Stadius.

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Quod ipsum tamen neque à Galeno animadvertit Galen. not. sum est. Hos enim verius exponens inquit, non querere oportere de Aglaia, tanquam aliterius ali- Aglaia cuius pharimaci nomen sit, quum neque in pedestri Galeno. junioris Andromachi descriptione, neque in ea que ad ejs ætatem per successione pervenit, alius pharimaci nomen Aglaia reperitur, & ea omnia que hoc pharmacum sex drachmarum pondere recipit, conlonè tum seniori, tum juniore Andromacho sunt relata, & omninò nihil extra illa additum sit, ad quod Aglaia nomen referendum qui putet, ut fortassis Aglaiam epitheton Thuris, elegæ auctori apponere visum fuerit. Sic Galenus. Ego itaque omninò rem inquirendam, & quidem attentius duxi, & sanè repertam etiam mihi feliciter spero. Aglaia est Andromachus senior nihil aliud quam Piper album, velut dixi, appellavit. Piper autem album aliis in versibus Andromachi non habetur, quum tamen junior Andromachus ipsum ponat, sed ita ut hac parte vacient hæ hujus Antidoti descriptiones, aliis nullà re differentes, quod videlicet senior Piper longum in principio xxiiij. drachmarum pondere posuit, & eo loco pro eo junior piper nigrum habet eodem pondere: hoc vero loco inter res quæ sex drachmarum pondere recipiuntur, senior album & nigrum Piper posuit; junior verò album & longum reulit, ita ut diversitas tantum in nigro & longo pipere sit, quorum alterum alter xxiiij. drachmarum pondere, alter sex recepti album verò in utroque inter res sex drachmarum pondere ammixtas habetur & ἀγλαία à seniore appellatur. Hæc Cornarius.

Piperis igitur simpliciter dicti nomine, intelligendum venit in primis Piper nigrum: In cuius genere Dioscoridi est Brasma, Plinio Brachmalis, sive Abortus piperis. Præterea & Piper album, quod Andromach. senior in Theriaca Aglaia vocabulo insinuat, quamvis Dioscorides existimavit, esse epitheton ut annotavit Cornarius.

Piper insule Taprobanæ candidus Melaga dictū. Piper caudatum, Piper longum, Piper Ethiopium siliquosum, Piper floridum, & Piper longum Felsel Alpini, de quibus mox ordine dicemus.

Piperis præterea genus, vel Piperastrum Ruelli habetur, quod Smilax aspera creditur.

Piper etiam in horto Maphari à Matthiolo visum est Ribes nigrum à quibusdam dictum: De his jam egimus.

Piper Indicum sive Calecuticum siliquosum. Piper siliqua parva Brasil. Piper siliquosum magnitudinis baccatum Alparagi. Piperis Calecutici parvum genus, siliquis oblongis: de his lib. 21.

Piper, Piper Lat. Germ. Pfeffer: Belg. Deper: Gall. Poivre: Ital. Pepe: Hisp. Piment: Arab. Fulsul. Boh. Deper.

Loca in quibus Piper potissimum provenit hæc sunt. Malavar, Onor, Bariclor, Malgalor, Calecut, Granganor, Cochín, Coulan, ubi lingua Malavari- ca, Malonga appellatur. Crescit etiam in Queda prope Malicam: & Malayvicè Lada vocatur. Hoc Piper potissimum versus Pegu vehitur & regio es Nordidæ Septentrionalis. Piper etiam sequentes Provincie ferunt, Pedit, Camper, Andragin, lambe, Bares, Spenamon, Dampin, quæ regiones sunt Sumatra: Item in Java Bantam, & Java plaga West- feren/ Anter, Chucnon, Molafery, Char gabaya, Cherola, Chanta, Cheregin, Labuan, Buama, Ise- borgor, Patban, & locus quidam quatuor miliaribus distans à Bantam versus Orientem, Puncta vicus. Hæc igitur omnia loca Piper alunt. Piper maturefcit in Java mensibus Septembris atq. Octobri. Colligitur Novembri & Decembri, & in Bantam, & potissimum in Chinam vehitur. Lingua javanicè

Galen. not.

Aglaia

Galeno.

Aglaia est Piper album.

Aequivoce

Smilax aspera.

Ribes nigrum.

Piper Indicum.

Siliqua parva.

Lingua.

Tempus.

Tempus.

Tempus.

Tempus.

Tempus.

Tempus.

Tempus.

Tempus.

Tempus.

Tempus.

Tempus.

Tempus.

Tempus.

Tempus.

Tempus.

Tempus.

Sababi vocatur. In regione Caraganora ubertim piper nascitur, quod torretur, ut scribit Iosephus ad calorem solis, ne forte fatum albi geminet in damnum eorum. Est & in regio Eli, Melibar, & Cedum in magna copia. Nam memora (itaquit M. Paul. Ven.) & campestris ejus plena sunt. Colligitur verò in Maio & Julio, Linchot.

VIRE* ET USUS.

Piperis grana [πεπέρων κόκκους] quingue cum pauco Elaterio muliebris lacte paulatim infillato, Hippocrates in vellere unguento intincto subijcit, eodémq; modo detrahit. Inter medicamenta subditiua vehementer purgantia, quæ magis aquas, mucosa & pelliculas educere queunt, Piperis grana [πεπέρων κόκκους] majuscula quatuor, aut parva, si opus videatur, ad Elaterij potionem admixta leuiter terit & lacte muliebris infillat, cum pauco melle subactum, id ex lana molli pura circum pennam linteo tenui conuolutum, unguento albo Ægyptio intinctum supponit. Per diem autem adharere finit, deinde, ubi detrahit, cervinum adipem subdit. Sed

& Indici medicamenti aliquantulum in lacte mulieris masculum lactantis, si ita visum fuerit, terit. Aut grana tria decorticata Indici medicamenti oculorum, quod Piper vocatur, & rotunditria [ή κόκκους διαλύσαν δσον πρέβη λυθικω φαρμακω, & πύβη εφθαλαμω, δνα λυθω πύβη ή πύβη φαρμάκω πύβη] leuiter tria & vino veteri tepide dilata, circum volueris pennam in glandis formam obduct, huncque in modum intromittit. Hoc Hippocratis in loco *Πεπέρωνος τριώνων τετριώνων* legitur, & grana Cnidia triginta assimi & teri vult, verum illum locum ex isto potius repono & Indici medicamenti grana tria trita sumi volo quod piper vocat Hipp. ex lib. 2. *πεπέρωνων*. Vim habet in uniuersum cal. faciendi, urinam ciendi, concoquendi, attrahendi, discutiendi, exterendi ea, quæ pupillis tenebras offundunt. Commodum est etiam ad rigores per circuitum in febribus repetentes, tum si bibatur, tum si illinatur, & commorsis à belsiis venenatis auxiliatur. Educit etiam fetus. Putatur & conceptionem impedire, si post coitum apponatur. Tu si quoque & omnibus circa thoracem affectionibus commodum est, tum si delingatur, tum si in potu accipiat. Anginis item conuenit, illium cum melle. Tormina [πεπέρωνων] quoque dissoluit cum teneris Laurifolis potum. Pituitam e capite detrahit cum uua passa manducatum. Dolores sedat, & in sanorum usu multum est [ύπερβολήν τούτου λέγεται apud Di. si. Corn.] ac appetentiam mouet, & ad intinctus admixtum, concoctionem adiuuat. At pice exceptum strumas discutit. Detergit & virilignes cum nitro. Torretur autem in noua testa pruinis admotum, & ut lenticula mouetur. Ceterum, radix ipsius non est Zingiber, ut aliqui existimauerunt, quem admodum satis declarabimus. Nam Piperis radix Costo similis est, calefacitque gustum, & humores pro uocat. Eadem si cum aceto imponatur & bibatur, plenem minuit. Pituitam verò de capite detrahit cum Staphide agresti commanducata. Galeno simpli. 8. Piperis radix vires Costo similes potissimum obtinet. Per rò fructus nuper quidem admodum germinantis, longum piper est: quare etiam maturo humidius est: humiditatis eus indicium est quod facile repositum perforetur, ac non protinus mordicat, sed post paulo incipiat, verum plusculum duret. Porò fructus qui velut omphax est, Piper album est, nigro quidem acius Nam illud jam quasi superassatum est, & super assicatum, verum utrumque valenter, tum exallicit, tum de siccat. Minus inquit Gal. apud Ioa. Ach. Curatum Piper calidius est quam Zinziber, quia in Pipere caloi funditur in materia valde tenui quæcò absumitur, sed Zinziberis substantia est magis terrestris & solidior, idè calor, sicut in pru-

nis, diutius in ipso conseruatur, & hac ratione, quoties ventriculum refrigeratum calefacere oportet, nec tamen epati vel sui natura, vel ex accidenti aliquo calenti, noxam inferre volumus, iubet nos Galenus pipere uti. Huius enim calor in ventriculo & in primis vis deflagrat, nec peruenit ad epur lecus quam contingit ex cinnamomo, zinzibere, aut aliis aromatibus. Ut annotatur in Schol. Salerna, piper est salamentum rusticorum, commiscet enim piper cum fabis & pisus. Similiter etiam ex pane aslo cum cereuisia vel vino & pipere, sit salamentum nigrum ad modum pulvis, quod etiam Piper vocant & hoc effundere super carnes solent, aut pisces. Ceterò, quod paucum piperis pro uocet urinam, & multum eius ventrem soluat, ita tradit Bapt. Fiera:

Ardet & in nervis, glutinose que phlegmata fertur

Sic piper, ut nullum sicet aroma prius.

Exacerat stomachum, molliore uentre superbit,

Huc caueas seruare si tibi bile tecur.

Corporis huic minus numero latus damna repositis,

Plura mouent alvum, metere pauca iuben.

Quod autem piper frigidum non sit, plebrei docet Leon Botall. his uerbis: Piper plerumque effurpatur solum felicissimo successu ubi gurgulio flammæus est: unde plebrei & qui parè ueritati sunt in rationibus medicis, audent dicere hoc argumento fulti piper frigide potentia esse, putantes calida tantum expelli à frigidis, ignorantes præcipuum inflammationum curationem absolui à calidis resoluventibus id quod parti hæret: ad magnos capitis dolores (ut V. Vir. Empir.) accipe 20. grana, contunde cum pauco uino & suspeliga vertici capitis.

Vel, coque piper in forti aceto, postea excitetur redigaturque in puluerem qui in saculum oblongum ponatur. effundatur prædictum acetum & aliquoties percoletur. Dum durabit acetum abluatur quotidie manè jejuno caput: statimquin uoluitur pannis calidis: hoc sæpè probatum fuit. Ut impediatur caricula, re uenereum sentiat feruorem, huic priusquam catulos haberit, per nouem dies manè nouem grana piperis in cibo aliquo dat Iac. Foulloix. Fufite & Pipere Magnes si alatur, feruente Nic. V. bino Chinirgo, longè ualidius ferrum ad sustinet, quam si Ferri scobe fo ueatur.

Notatur quædam digna.

Piperis frigidum non est.

Dolor capitis.

Carnis rabies.

Adynamia alacritas.

PIPER NIGRVM.



PIPER nigrum Deser. racematia in ligula longa sine pediculis coheret, acinis Sabuci paulo minus, rotundum, cortice rugoso, nigro, aut fusco, quo detracto substantia conspicitur duriuscula & compacta, cujus exterior orbita ad uiridem irclinat, interior albicat, & serobiculum in medio vacuum ostendit, saper seruidus totum os & fauces adutens. in istis racemis hæret grana quædam multo minora, maturitatem nondum affecta, idè que rugosiora & evarida Brasnatis in moiem. Nostrum piper nigrum solet esse crassius cardido, potissimum

Sambucus acina.

Sipor.

Si affusa.

Ex Hippo.

Indic. med.

Ex Diosc.

Febres. Venens. Fetus.

Anginis.

Strumas.

Radix Piperis non est Zingiber.

Ex Galeno.

Temperamentum.

ra. In illud quod minus rugosum, consuevit enim esse obductum cortice rugoso, & quod majus est eò minus rugosum videtur: vidimus enim sepius Lugduni racemos ubi grana quòd minora, eò magis rugosa erant & inania magis. Ex majori quod maturius existimamus, facilis detrahitur cortex, eòque detracto albescit, id eò à quibusdam perperam pro candido assu ni observavimus.

Error quorundam.

Lingua etiam exotica.

Ignorantia Veterum.

Mali Alsyrii folio.

Fructus racemosis.

Dioscori resatur.

Racemi muria conditi.

Descr. Clusii.

Clematidis aut Perichlymeni samentum.

Folium de raco.

Vocant Germani piper nigrum *schwarzen Pfeffer* & simpliciter *Pfeffer*: Angli *Pepper*: It. *Pepe*: Hisp. *Pimentas*, Belgæ *svet Peper*: Galli *Poudre noir*; Lusitani *Bambu*; Malayentes *Mambo*: Nomè verò est, inquit Garcias, lingua Malavarica *Molangas*; Malacitanè verò *Lada*; Arabibus tum medicis, tum vulgo *Fisfil*, tametsi Avicenna l. 1. c. 549. & 550. secùdum Bellunenens translationem *Fulful* appellet, & *Fulfel*, quem secutus est Serapio lib. simpl. c. 307. In Guzarate & Decan *Meriche*, & in Bengala *Morois*. Mirum non est si Theophl. 3. c. 22. Diosc. l. 2. & hos sequutus in plerisque Plinius l. 12. c. 7. piperis plantæ formam ignorarint. Quòd verò Arabes in eodem errore versati sint, & nonnulli etiam ex recentioribus, illud mirum.

Garcias sic describit: ad arborum usque fastigium sese convolvendo scandere solet: foliis raris, Mali Alsyrii effigie, sed minoribus, & per extremum acutis, virentibus, gustu calidis aliquantulum & folium Betre five Betle sapientibus; fructus uvarum modo racematim coheret, minores sunt tamen Piperis racemi, & ipse fructus minor, semperque virens, donec siccetur & plenam maturitatem consequatur, quæ incidit circa medium Ianuar. um; radix postea non Costo similis ut voluit Diosc. quandoquidem Costus radix non est, sed Lignum: Inter plantam quæ Piper nigrum fert, & ea quæ candidum, tam exigua differentia, ut à nemine quàm à incolis dignosci possit, nisi cum uvas habent & illas quidem maturas,

Piperis historiam etiam describit Lud. Rom. sed paulum à Garcia variat. Racemis interdum cum Gingiberis radicibus muria conditis Antuerpiæ reperire licet, oblongos quidem illos & graciles, neque ita sarctos ut sunt uvarum racemi. Tametsi Garcias, & hunc sequutus Acofta (quorum historiam aromatum anre multos annos latinam faciebat Clusius) de Pipere commentati sint: quia tamen his proximis annis Batavi qui in Tavam navigarunt, & ad Moluccas usque insulas etiam penetraverunt, aliquot ejus sarmenta cum foliis, ipsaque adeò radice, atque qui inter illos magis curiosi, etiam ramulos cum suo fructu immaturo inhaerente retulerunt; & horum unum cui folia & fructus inhaerent, tum etiam sarmenta quaedam, amici curâ & diligentia idem Clusius nanciscèbatur. operæ pretium se facturum existimavit, si ex illis notis quas in planta & ramis sicis observare potuit, ejus historiam condinaret, & ramuli cum suo fructu & foliis, radicisque parte à perito pictore in tabella expressi figuram hic subijceret.

Aldè autem sarmentosa est piperis nigri planta, & adeò imbecillis atque caduca, ut nisi pedamentis sulciatur, aut juxta arborem aliquam circa quam se convolvere possit, pangatur, humi procumbat & spargatur, perinde ac Lupus salictarius; lenta verò & flexibilia sunt ea sarmenta, frequentibusque nodis five geniculis distincta, & quæ humi sparsa, multas fibras ad singulas internodias agunt, quibus se humi figunt, quemadmodum Clematidis aut Perichlymeni flagella, ut in illorum nonnullis observabatur, quæ libtas ad huc retinebant: sic ut in illarum plantarum numero reponenda censetur, quæ facile pangi possunt, sarmenta porro ad singulos nodos singulare solum proferunt alternatim, hoc est,

nunc in hac, modò in altera sarmenti parte nascens, hederacea quodammodo formâ, vel ejus Cyclaminis quod hederaceo constat folio, cui tamen angustius desint, neque adeò crassum, verum multò tenuius, interdum verò adeò latum, ut quatuor unciarum latitudinem æquet, & quasi orbicularem formam adquirat, nisi in mucronem desineret: maximâ verò ex parte binas duntaxat uncias latum, quatuor longum, breviter Tambul five Betle folio adeò simile, ut alterum ab altero vivè discerni queat, nisi piperis solum paulò durius, & nervos illos per folij longitudinem excurrentes paulò crassiores habere videretur: nec illud in ambitu serratum est, ut quidam pinxere, sed prorsus æquale & nihil similitudinis habens cum mali Alsyrii folio, ut nonnulli tradunt, omnia verò folia quinque nervis sunt præfata, quorum medius & crassior medium foliorum per longitudinem secat, reliqui quatuor minus crassius ab illo oriuntur, utriusque bini, in latera secundum folij prænè longitudinem expansi, & illi quidem in nonnullis foliis æqualiter ex opposito nascentes (ea Acofta seminei sexus ab incolis censei sentibit) in aliis verò inæqualiter oriuntur, neque istam

Folio Tambul five Betle.

Folia non sunt mali.

Piperis sexus.

PIPER NIGRUM CLYSII.



proportionem servant (hæc ab incolis masculini sexus appellatione donatur asserente eodem Acofta) sine porro quæ seminini generis censeatur, diluitori vitriditate prædita quæ pro masculini generis foliis habentur, nihil præcipiari potest Clusius, sicca duntaxat folia vidit: sed quandoquidem in eodem sarmento utriusque formæ rata conspexit, vix sibi persuadet, colore inter se variare, illud autem observabat, utraque,

licet resiccata pronâ parte diluitoria esse, quàm supernâ, atque per universum solum venulas obliquas transversim evagari, insuper non mediocrem acrimoniam adhuc retinere. Vix porro ad aromorum internodia nascuntur teretes & oblongæ, multis granis orbicularibus, nunc majoribus, modò minoribus ipsi scapo sine petiolo adnexis constantes; & illæ quidem non ex foliorum ala, h. e. inter sedem pœociuli solum sustinentis & ipsum sarmentum, sed ex altera sarmenti parte, solum pediculo videlicet oppositâ, quemadmodum ex adposita figura ad vivum expressâ videre licet. Caterum illam acrimoniam non modò retinent sicca folia, sed etiam ipsa sarmenta, atque (quod magis mirum) ipsa radix quæ sub terra latet, ut experiebatur Clusius. Piperis solum, quale in Bantam Iavæ emporio nascitur nullam similitudinem habebat cum Mali Alsyrii foliis, sed Betule solum æmulâ videbatur, non adeò tamen tenellum, sed magis firmum, duabus crassis venis ex utroque nervi medio latere verus atas excurrentibus, oblongiusculo mucrone præditum, quinque uncias longum in ambitu minimè serratum, tametsi folia ampliora conspexerit. Ipsum porro non ebat N. V. Fabricius Mordente, Indos sole-re, Piperis botros adhuc vitrides & immaturos in os indere: deinde ramulum, cui grana inhaerent, digitis prehens-

Acrimonia.

Piper in Bantam.

prehensum sensum extrahendo leviter dentibus premere, ut grana in ore mancant; illa postea mandere non sine voluptate. Idem ipsa facta esse, & gustu suaves deprehendisse, quia levem quandam acrimosiam cum pauca acerbitate conjunctam in illis deprehendebat. Idem Clusius in notis in Garciam ait: Putat errorem esse Garcias si Piper ab aliis *Fulful* dicatur, cum Arabes *Fisfil* vocent. Sed cum omnes totidem literis scribant, & diversitatem diverſi literarum apices tantum efficiant, in omnium arbitrio est, utro malint modo, pronunciarer, *Fisfil*, aut *Fulful*. Piperis plantam ita describit Auctor geographicæ Arabicæ: Et in insula, h. e. terra Mali, nascitur arbor Piperis, neque nascitur nisi in ipsa, aut in Candacia, aut in Gerbathan: & nulla invenitur, nisi in istis tribus terris. Est autem planta, cujus stipes aliquantum similis est stipiti Vitis, foliis instar foliorum plantæ Volubilis sive Fæcoli, longa, non alta, racemis instar racemorum Vitis, quorum unusquisque occultatur folio suo propter pluviam, quod inflectitur, adveniente pluvia. Piper verò album non inflectitur ab ea, superveniente illa initio aut ante. *Hachi* filius Charii dicit de eo, quod quum est pluvia, inflectuntur folia ejus super racemos istos, & defendunt eos à pluvia, quum recessit pluvia, attolluntur sive remonentur folia à racemis, neque revertuntur, nisi tempore pluvie. Revertente pluvia, revertitur folia ad ipsos. & hoc est mirum. Hæc ille, quæ nisi fallor, ait Clusius, indigent peritorum hominum examine. Nam mihi suspecta sunt. Sed Arabes multa ejusmodi fabulantur, ut Iudæi.

A COSTA Piper aliud domesticum esse tradit, cujus usus sit; aliud sylvestre, quod ob amarorem negligatur. Domestici, inquit is, planta sarmentosa est, scanditque Hederæ modo, arboribus, quas nascisci potest, sese circumvolvendo: nodis per intervalla prædita, ad quos nascuntur folia, Betele foliis similia, parte interiore saturè virentia, exteriore dilutiora, cuspide mucronata, & gustu linguam vellicante. Horum foliorum alia aliis nigriora sunt: quæ dilutiora sunt fibræque æqualiter nascentes habent, feminas cæsent (nam utrumque sexum in



foliis ejusdem plantæ constituunt) nigriora verò inæqualibus fibris, maxes. Ad singula internodia, unde folia dependent, ex ipsa foliorum sede nascuntur novæ, quatum maximè circiter quinquaginta grana obtinent, minores verò triginta. Radix pullula est & summa tellure fibras agit. Summa autem similitudo est plantarum quæ nigrum Piper proferunt & album: alibi tamen folia tenuiora & molliora videntur: ejus etiam fructus magis aromaticus, meliorisque saporis quam nigri.

Lugd. quæ quatuor exhibet figuras, Galenum notat quòd Dioscoridem secutus eandem plantam piper longum, candidum & nigrum proferre falsò crediderit. Figuras autem quatuor sub his titulis exhibet Lugd. Arbor piperifera Theveti: Piper nigrum & album: Piper Matthioli: Item in app. Piper nig-

rum Acoſta. Galeni sententiam Cana quoque rejicit. Pingit autem racemos rotundi piperis & folia reperta sæpius inter grana, item longum piper, negat tamen in eadem planta crescere piper album & Piper album nigrum, sed consimili tantum, ut botros rubros & albos in diversis vitibus; ratiore autem statuit esse plantas quæ album, quàm quæ nigrum piper proferant: piper nigrum ait atundinibus sustineri quem admodum ferè apud Belgas Lupulū. Caulem namque debilem esse, & sine ope alterius surrigi non posse; rami Juniperinis similes; grana vitidia primum, dein matura facta atque siccata nigrescere.

Folia quæ pingit Linſcho. non sunt Hederæ similia, sed Lauro: Nos figuras diversas proponimus; Prior quam ponimus nobis absentiſus depicta est ex Clusio. (Hæc olim posita simpliciter pro Piperis uva; postremò verò pro piperis albi uva) vera quidem, verum per Sculptorem malè sculpta: ad latera additum granum caudatum, quod est Piper caudatū sub signo crucis; & Haermia sub signo Stellæ, sed utrumque semen per Sculptorem corruptum. Icon secunda, quam proponimus est ex Clusij exoticis; Tertia, quæ est ex Acoſta & figuris æneis, displicet nobis, verum certè asserere non possumus non visâ plantâ quæ melior icon: Camerarij folia piperis exhibemus juxta iconē Piperis caudati sub litera A. Matthioli figuram nō exhibemus, quia ei non consuetum vera figuris exprimere, eam facillè possemus asserere falsam & numquam ei ita visam. Theveti effigiem non sine occasione omitimus, quam tamen Ambrosius Pareus assumpsit lib. suæ Chirurgiæ 26. c. 12. quia falsa est, quod apparet ex seminibus quæ pingit cum pediculis Hederæ modo adhaerentibus, cum uvam representent: Ex historia & iconē præterea Clusij, quam hoc capite ponimus, apparet satis ineptè Thevetum appingere piperi truncum arboreum magnum, licet scribat esse arbuticulam: & cur scribit, Mali Medici foliis similia, & nihilominus in iconē sunt planè Hederacea.

B. pin. Piper rotundum nigrum: Piper nigrum, Matth. Lac. Cast. Garz. Frag. Clus. & Lug. Tab. Piper rotundū nigrū, Cord. hist. Lob. adv. & Cæſ. Piper nigrū in Calecut, Lud. Romano. Piper rotundū Hippocratis, Garz. Quid sibi velit Matthioli cū sua figura, q̄ & Cast. Lugd. Tab. & Ger. habent, nō asseruor. de ea figura sic Guilandinus: si frutex ille Piper est, vel etiā Amomū, ut alij sōniant, parū aberit, quia vulgare Ribes, vel Piper, vel Amomum esse possit. Scriitur Piperis planta hoc modo: sarmentū ejus tenramū juxta prægrandē quæcūmq; arborem (magna certè ex parte juxta Fauſel, ut Palmā plantatā vidit Garcias) aut palū defoditur, atq; bubulū sterens, & cineres cū aqua inſpurgūtur: inſta annū deinde fructifera est, quòque vetustior est planta, eò feracior, quippe quæ ad ipsius arboris, cui maritata est, fastigiū sese circumvolvendo scandere solet. In Couchin verò ubi plurimū nigrū nascitur, quinq; aureis emi solebāt ceteræ libræ: sed post quadrienniū aut quinquenniū, q. in alias etiā regiones importari ceperunt, quindecim aut viginti aureis emendæ erāt. Piperis autē nigri pretium in centenas libras est duorum Lusitanicorum cum semisse, natali loco: at in Bangala duodecim Lusitanicis emuntur totidem libræ.

Piper nigrum rotundum in Insula Sumatra provenit & præcitas Cānas scādit. Maxima Piperis quantitas provenit in Malavæ, tota ea maritima regione quæ à Promōtorio Comorin ad Cananor usq; pertingit. Nascitur etiā in Malacæ maritimis, sed bonitate superiori cedens & magna ex parte inane. Provenit similiter & in Insulis Java vicinis, & Sunda, & Cuda, aliisque locis. Sed id totū in Chinæ regionem deportatur, & loco natali consumitur, præter id quod in Pegu & Martaban exportatur. Potif-

De iconib.

Matth. not.

Thevet. not.

Eius ser. derivatio.

Pretium.

Loeus.

Piperis maritales.

fina etiam ejus pars quod in Malavar gignitur, in usum incolarum cedit, tamen regio admodum ampla non fit: non nihil etiam à maritimis ejus regionis populis absumitur: Pars deserta in Balagae bubulis coriis: & magna copia (tamen regio mandata sit vitum) à Mauritanis per mare Erythraeum exportatur, id suffurantibus ipsis incolis. Ex sunt regiones quae Piper gignunt, quamquam & inveniunt supra Cananot, quae Septentrionem spectat: sed adeo exigua quantitate, ut ipsis incolis non sufficiat, & externo importato opus habeant. Etenim non gaudet haec planta locis desertis & mediterraneis. Quam verò procul à Caucafo monte distat sint haec regiones, ex topographicis chartis satis patet.

Vires.
Colica.

Tempera-
mentum.

Piperis nigri foliis utuntur incolae aduersus dolores colicos aliisque frigidis corporis affectibus. Condiuntur aceto aut sale virentes adhuc & immaturi piperis nigri racemi & usui asservantur. Arabes & Persae medici piper calidum tertio ordine consistuunt. Sed Empirici cuiusmodi sunt maxima pars Indicorum medicorum, frigidum piper faciunt, ut & pleraque alia aromata quae exsiccant. Eiusmodi autem erroris causa sortè haec fuit. Quod ut ait *Fracast.* lib. de Contag. dum mistio perstat, dum igneae partes separatae sunt & dispersae, sepultaque in aliis, alteratio nulla introsum fit, quare & Piper & Euphorbium, & reliqua tractata manibus frigida sentiuntur. At ubi casu aliquo mistio illa soluitur & mutatur, & partes quae ejusdem rationis sunt, in unum coeunt, & majorem quantitatem & potentiam ad agendum acquirunt, tum actu fiunt, & agunt jam, unde & Calx, & Piper, & Euphorbium jam calida percipiuntur, quum prius potentia solùm calida essent, actu verò aliter se habentia propter eandem causam, nec feminaria intrinsecus sese alterant, quamquam è diversis consent, utpote mista, quod autem in tam pauca quantitate vis multainesse possit, declarant & Euphorbij, & Piperis, & similibus particulis minima & effugientes visum, quibus tanta vis à natura tributa est, adeo refert ignem in materia densa contineri, quamquam parua sit. Item: Quis putaret à Piperis, Indis, & Prarmica sternutamentum conciliari? exhalant nimirum ex omnibus his ac circumquaque feruntur in sensibilia corpora, quorum diversae actiones sunt & facultates.

PIPER ARBOTIVVM, BRASMA.

Reperitur etiamnum Piper quoddam in genere nigri, nutrimento defectum, cassum seu inane acleve, quod Brasma [*βρασμα*] Diosc. vocat. Hoc non dubitamus nos alterere esse Piper immaturum. Lugduni saepius vidimus, racemorum instar, quale habemus adhuc, de quo egimus in descriptione Piperis nigri, id manifestè demonstrat longum Piper à nigro multum differre.

Brachma-
sis.
Piper abor-
tivum.

Syn. C. E.

Vires.
Punita.

Semina, inquit Plinius, cassa & inania vocant Brachmasin Indorum lingua, sic significant abortivum. Cael. Brasina. Cord. hist. Piper abortivum, sive Brosina sive Brasma, Negotiatoribus Gerbelor nominatum. Sed nec Brasma vocabulum quod apud Dioscoridem legitur, nec Brechmasin, quod apud Plinium, unquam his in regionibus audivit, aut auditum putat Garcias, cui Piper quod lingua Malavaricà à Canara nomen sumptit.

B. pin. Piper 10. inane: Piper Canarinum, Frag. Lugd. Linscot. 4. part. Ind. or. c. 18. Hoc catuleum est, intus cavum, in cuius spatio granula quaedam continentur, quod paupercula plebis usus cedit, quare Canarynum, russicanum vocari solet: & propter vilitatem ad exterius non effertur.

Est hoc inane illoque utuntur ad pituitam à capi-

te evacuandam, dentiumque dolores mitigandos: Dentis, nonnulli & in cholericis, quem vocant affectu, miris laudibus celebrant. Colica.

PIPER ALBVM.

Piper album magnitudine videtur nigro cedere, *Defen.* utrinque umbiliceflo tantillum prominulo, exiguo, minime rugoso, albo sive cinericeo: substantia ejus interior bicolor est quae admodum piperis nigri, & cava in medullio (praeter alba pelliculam quam habet) apparet: cortex, quo grana integuntur, nigricans facile detrahitur, quod non fieret si esset immaturum, ut Galenus & nonnulli volunt; sapore adeo est fervido praeditum, ut jam supra triginta annos in capsulis meis reservatum saeces igneo ardore urat, quanto magis recens, quo argumento convincuntur ij, qui piper album nigro immaturius contendunt, nec alia ratione differre ex veltiguis reliquiarum corticum apparet dehibitum. *Immatu- non est.*

Ceterum piperis albi meminisse constat Diosc. nominantem *πῖπερ λευκόν, πῖπερ ἐκκαυδόν*, quod commodum maxime dicit ad ocularia medicamenta & ad antidotos theriacalesque compositiones. Hoc Galenus lib. de antid. ex Androm. seniore, per *ἀγρίου* significat, quam Cornarius, uti dictum antecadentem Flammam, à flammae fervore nuncupat, & *Flamma agriensis*, quasi igneam candidum Philo dicit.

Et licet Sylvius piper album ex longo fieri testatus sit: attamen piper candidum in propria planta provenit differente à nigro, ut Vitis albam ferens uvam, ab ea quae nigram fert: Candidum quidem nigro calidius & odoratus est, vel Lobelio testem. Et hinc Cordo attentius non possum, qui l. 4. lust piper album ignavium nigro existimat, Dioscoridem sectatus, licet eum in eo interim reprehendat, quod candidum etiam ipso longo ignavium putat. Sed errat & Matthiolus, qui in hist. germ. piper rotundum album ante maturitatem colligi, ideoque nec tam acre & gratum esse dicit, quam nigrum.

Candidi autem plantae rariores sunt, nisi certis Malavar & Malacae locis rare nascuntur, autore Garcia. Vidit Clusius Vlyssipone candidum piper, & inde secum attulit grano non rugoso, sed pleno, acriore & odoratiore quam nigrum, Vlyssipone tamen neglectum. Ex Indiis verò copiosum saltè quod medicamentis sufficeret, haberi posset, si Lusitani pharmacopolae paulò diligentiores essent. Invenitur interdum Antuerpiae apud Myropolas nigro permixtum: sic & racemos non nunquam cum Zingiberis radicibus muniti conditis, ibidem reperire licet, oblongos quidem illos & graciles, neque ita sacros, ut sunt uvarum racemi. *Loca.*

Matib. Lac. Garc. Frag. Clusad Garc. Cast. Lugd. *Synon.* Linsc. 4. par. Ind. or. c. 18. Tab. Turn. & Lob. obs. Piper album. Piper rotundum album, Cord. hist. Piperis alterum genus candidum crassiori grano, Cael. Piper 2. rotundum album, B. pin. cui & piperis alterum genus, quod in Taprobana *Melaga* vocant, Lud Romano. Saban h. pute, seu piper album, reliquis paulo exilius, in Sunda, part. 4. Ind. or. c. 8. Nos cum Caelalpino piper in Taprobana, Melaga vocatum, à pipere hoc candido sejungimus. *C. E. Aub.*

Candidum piper solet magnatum mensis inferri: eo enim utuntur quemadmodum nos sale: venenis resistere & ocularibus medicamentis prodesse afferunt, quod & Diosc. annotavit, atque utinam totam hujus plantae historiam tam verè descripsisset. Oratos autem omnes Medicos volo, ut piperis candidi loco (quod calidius est & odoratus) nigrum non praescribant, nisi candidi sit peruria. Similiter ne longum piper candidi aut nigri loco substituant. *Vires V. Jus. Amonit.*

PIPER

PIPER INSVLÆ TAPROBANÆ
candidius Mol. g.

I Vd. Vartom. lib. 7. Indicarum rerum de pipere
in insula Taprobanæ ita tradit. In insula Sumatre
urbe Pyder, procerioris piperis uberior est proven-
tus, miraque copia: lingua patrii piper Molaga dicitur,
i. e. longè procerius illo quod huc advehitur,
multoque candidius, verùm inane ac mordax pluri-
mùm, sed ponderosum minùs: venit enim inibi pi-
per non pondere, sed mensurâ, ut apud nos Triti-
cum exponitur. Tanta est huius evertas, ut inde an-
no singulo vicenâ naves onustæ evchantur, hæc Ca-
taium proficiscuntur, illic exponitur haud difficul-
ter ob frigidius cælum. Arbor verò, quæ piper hu-
jusmodi gignit procerius, et affioris est caudicis, am-
plioraque folia, eadèmq; carnosiora habet arbori-
bus ubis Calcut. Cæf. Piperis alterû genus in Ta-
probana copiosum, & patrio nomine Molaga voca-
tum, quod maximè apud Tartaros dispensatur.

PIPER CAVDATVM.



Piper caudatum
nomen partim
à sapore, partim à
forma invenit: gra-
na sunt pipere &
albo & nigro ple-
rumque minora,
quædam equalia, ex
rotundo sublonga,
& pediculo ver-
sus turbinata, & ut
vulgare nomè præ-
fert, caudata, colo-
ris nigricantis vel
fulci, inter piper al-
bum & nigrum me-
dijs, cortice cras-
sifusculo, extenso,
interdum non nihil
vel tugoso, vel cris-
po, medullam
comprehendente,
piperis vulgaris
modo bicolorum,
duriosculam, in cu-
ius tamen medio
non conspicitur
vacuus ille scrobi-
culus: saporidem
nihilominus cum
pipere vulgato, iam
etiam supra an-
num trigessimum.

An Monachis in
Mcl. dist. 1. prima
Cubeba Pandecta-
rijs, sylvestris sortè,
cujus grana tra-
duntur minora &
sicut piper acuta.
Olim Antuer-
piani in vêtum pi-
peris genus, quod
Lusitani Pimenta
del Rabo (de quo dubitat Scalig. exerc. 148. ne fit
Cubeba, quamvis nihil alierat.) caudatum piper ap-
pellabant: Cnibebis serè simile erat (ita describente
Tom. II.

Clusio] pediculo subnixum exiguo, rotundum, ple-
num, aliquantulum rugosum, nigricans, eadèma-
crimonii quâ piper præditum, aromaticum, rac-
ematim (ut ab his qui racemos habuerunt, didicit)
coherens. Amomum nonnulli periti perpetam ex-
istimarunt. Cæterùm similes uvæ septennio
post ex Guinea recens allatas, accipiebat ab hone-
stissimis, idèmq; humanissimis viris, V Wilhelmo
Parduyne & Petro Gareto, Piperis ex Guinea appel-
latione. Erant autem illarum quædam breves & un-
ciales tantùm, nonnullæ verò tres uncias serè
longæ, tenui stilo inherentes, longiusculo petiolo
grana rotunda, vel minora, vel crassiuscula conti-
nentes, vicena, tricena, interdum plura, legitimo
quidem pipere minora, non minùs tamen servi-
di saporis, duravè & solida, ejusdem etiam penè
coloris. An porò ipsa planta periade arbores &
perticas scandat, ut ejus quod ex Orientali India
adfertur, hæcenus intelligere non licuit.

Quùm caudati piperis figuram curavimus pa-
randam non visâ erat racemosa Clusij: ea autem
cum à sculptore minùs feliciter sit effigiata (ceu in
prima icone piperis nigri sub signo crucis videre li-
cet) Clusij etiam figuram proponimus.

Anguillara, cui dicitur Amomum & Piperis
species, à Portugalensibus Pimenta del Rabo di-
ctum, pro Pipere Æthiopico vendi solitum, ait
in Syria vocari Piper sylvestre; plantam descri-
bi folio Vitis, quæ ipsi quondam visâ sit Venetijs
& Patavij. Lectores perpendant an Anguill. non
existimant esse Ribes nigrum quibusdam dictum,
fruticem ferentem hoc Piperis genus, licèt bacce
succulentæ nullo modo respondeant. Lob. adv.
Piper caudatum Pimenta del Rabo Lusitanis (Clus.
ad Garz. Frag. Lugd.) dicta, Amomo apta planta
Piper metsterten vocata Belgis i. e. caudatum pi-
per cujus folia prodidit esse folijs Vitis Anguilla-
ra. Eid. Lob. de Balsamo: Piper caudatum, Amo-
mum ereditum.

Apollon, ex Anguillara hæc pro suis vendit: ait,
qui piper sylvestre Syrium, Pimentum del Rabo
Lusitanis vocatum (cujus plantæ tum Vene-
tijs, tum Patavij in hortis quibusdam visuntur) A-
momum existimant, suffrutex enim est viugineis
folijs, racemosis floribus, candentibusque in acer-
rime femina Aphacæ magnitudine terminantibus:
omni ex parte gravi, acrique odore præditus.

Lugd. Piper caudatum Clusio. Imp. hist. nat. Pe-
di Rabo, Piperis racemosi genus, quod adferunt Lu-
sitani, quidamque Amomum antiquorum existi-
mant, novum Piperis genus. B. pin. Piper n. ra-
cemosum caudatum ex Guinea: Amomum Anguilla-
ra: Pimento del Rabo, Linscot. part. 4. Ind. orient.
fig. 15.

PIPER LONGVM.

Piper longum nucamenta betulacea amulatur,
unciam aut leseunciam longum, teres, ali-
quando planum, coloris fulci vel cinerei, reticula-
Color.
to verruculatur plexu, in superficie asperum, cujus
pro numero grana pelliculis scortim privatis in-
clusa, Sinapi granis paria, foris nigricantia, intùs
subalbida, gustu non cedente nigro vel albo,
quamquam non statim apparente: pendet au-
tem hi juli ex pediculo gracili unciales, alteri fini-
fero.


Dioc. metabo dicitur, quod tandem in per-
fectum piper evadere credit.

Theophr. qui innuit longum piper diver-
si generis esse, vocat piper prælongum nigrum,
si generis esse, vocat piper prælongum nigrum,
diversa.

Fructu piperis germinatus.

femine papaveris. Galen. Fructus piperis jam germinatus esse piper longum contendit, quod si fraudulenter preparatum sit, si aqua macetetur, solvatur, si verò nativum sit, indissolubile permaneat. Magnitudine verò Piper hoc aliud superare ait corticemq; subtiliorem & minus rugosum habere.

PIPER LONGUM MONARDIS.



Gal. & Dio. reprehenduntur.

PIPER LONGUM CLUSII.



Planta, inquit Garcias, quæ longum piper profert, longè alia est, etenim non plus habet similitudinis cum nigro & albo, quàm faba cum ovo. Nos piper longum, quod à viris doctis recipitur, non provenire in eadem planta, in qua album & nigrum, certò credidimus non lecto Garzià: erat enim nobis piper longum & rotundum, cum pediculis qui demonstrabât diversam esse plantam: per illos enim apparebat, longum in rotundum non posse diffundi, femina etiam jam perfecta & matura medullâ suâ differabant. Vt D. Presburger annotarat, Guilandinus piper Indum, Capsicum Aëtuarij, & piper longum Diosc. idem esse tradit. Cordin Diosc. facit piper longum nigro & candido omninò dissimile. Idem verò hist. (ubi describit) censet esse cum Diosc. Galeno & Plinio rudimentum piperis albi & nigri. Sed si piper est immaturum cuius granula medullâ albâ plena: cur in uvis piperis granum ejus integrum apparet, ac etiam illa, quæ minorâ sunt, inania & idèd Brasina. Lob. obli. piper longum, Macropiper. Eid. adv. ang. Lang pepper; Ger. Langcnpfeffer; Belg. Lange peper; Hisp. Piment. Item piper longum à pipere nigro diversa planta, folio Mori. Tab. piper longum minus.

Piper Indum.

Cord. refut.

Macropiper.

Folio Mori.

Arbor Juniperi similis.

Locus.

Qui proprias lustrant regiones ubi piper longum (q̄ reliquis duobus est acius) viret, testantur apud Matth. aliam arborem à pipere nigro & albo esse, licet Galenus & Diosc. eandem plantam tam rotundum, quàm longum piper edere crediderint.

Plantam, inquit Garcias, quæ longum piper profert, longè alia est, etenim non plus habet similitudinis cum nigro & albo, quàm faba cum ovo. Nos piper longum, quod à viris doctis recipitur, non provenire in eadem planta, in qua album & nigrum, certò credidimus non lecto Garzià: erat enim nobis piper longum & rotundum, cum pediculis qui demonstrabât diversam esse plantam: per illos enim apparebat, longum in rotundum non posse diffundi, femina etiam jam perfecta & matura medullâ suâ differabant. Vt D. Presburger annotarat, Guilandinus piper Indum, Capsicum Aëtuarij, & piper longum Diosc. idem esse tradit. Cordin Diosc. facit piper longum nigro & candido omninò dissimile. Idem verò hist. (ubi describit) censet esse cum Diosc. Galeno & Plinio rudimentum piperis albi & nigri. Sed si piper est immaturum cuius granula medullâ albâ plena: cur in uvis piperis granum ejus integrum apparet, ac etiam illa, quæ minorâ sunt, inania & idèd Brasina. Lob. obli. piper longum, Macropiper. Eid. adv. ang. Lang pepper; Ger. Langcnpfeffer; Belg. Lange peper; Hisp. Piment. Item piper longum à pipere nigro diversa planta, folio Mori. Tab. piper longum minus.

Et licet Casulpinus, cui piper tertium longum dicitur, arborem à recentioribus describi neget, ac Solinum & Plinium eam Junipero tantùm similem tradidisse scribat, non desuerunt tamen, qui eam delinearint. Piperis longi apud Aromatarios multi culci pleni conspiciuntur: sed & Batavi naucleri magnam ejus quantitatem cum aliis aromatibus anno 1597. ex Iava adrevertunt, & singulis annis adhuc adve-

hunt, q̄ cum differat ab eo cujus Nicolaus Monardes meminit libro de simpl. med. ex Novo orbe delatis, ejus iconem ad vivum expressam exhibet. Exoptetam, post piperis nigri iconem, hic adjuccendum (inquit Clusius apud Garc. atom. l. c. 22.) putavi. Botrorum maxima pars duarum unciarum longitudinem raro excedit, tamen inter recens allatos repererim ad trium unciarum longitudinem productos, nullum verò minimi digiti crassitudinem æquantem, sed graciliorem, & æqualis penè ubique crassitudinis, plurimis granis Millij repurgati granorum in star, oblique secundùm longitudinem dispositis constantem, cineraci quodammodo externâ parte coloris, internâ albi, fervidi saporis. Plantam

igitur (pergit Clus. exot. l. c. 20.) quæ longum piper profert, ab ea in qua nigrum nascitur, longè dissimile esse scribit Garcias, sed (quod ejus viri pœdidit volo) plurimùm fallitur, meâ quidem sententiâ. Nam plantæ longum piper ferentis ramulum pedalem ternis foliis & binis fructibus præditum anno à nato Christo 1601. Amstelredami dono accipiebam ab eruditiss. viro Doctore Lamberto Hortensio, qui eodem anno ex Iava venederat, ibidem ab ipso decerpit: acceperunt & nonnulli ab aliis illo etiam majores, sed omnium folia à pipetis nigri foliis non multùm differre mihi videbantur, nisi quòd paulò teneriora dilutiorq; viriditate prædita essent, meâ opinione, tum etiam breviora pediculo subnixâ, atque etiam pluribus nervis insignita: nam à medio illo nervo folium à pediculo per longitudinem secante, non modò quaterni alij nervi exoriebantur, sed utrinque quini & seni, interdum etiam & plures, pro foliorum videlicet amplitudine, illi tamen minùs eminentes quàm in nigri foliis, & inæquali ortu nati, multis etiam obliquis venulis per folium transversim evagantibus: & licet resiccata essent ea folia, ac per multos menses inter chartas adservata, non levitamen acrimoniâ etant adhuc prædita. Fructus qui juli quodammodo formam æmulabantur, oriri etiam conspiciuntur ad singula internodia, non in folij alâ: sed quemadmodum in pipere nigro, ex ipsius folij opposita parte, in altero videlicet ramuli latere, atque etiam alternis perinde ac in pipere nigro: erant verò illi fructus modò longiores, modò breviores, quasi ex multis granulis elegantis serie secundùm pediculi longitudinem congestis constantes, virides tamen, quia ante maturitatem lecti, in quibusdam autem ramulis adèd tenellum fructum conspicebam, ut jam primùm natus videretur, quùm ramuli abrupterentur. Horum etiam ramulorum internodia sive articuli breviora spatio ab invicem videbantur distiti, quàm in nigro. Nulla autem istius piperis fermenta vidi, sed, ut dixi, ramulos dantaxat ab ipsa planta abruptos, quorum magis integrum in tabella adposita à perito pictore exprimi curabam.

Bry. frat. Icon. Ind. Orient. de pipere longo hæc habent. Chiabe est piper longum, crescit in Iava, à præstantioribus & opulentioribus incolis præfertur, quippe quodd rotundo Pipere salubris puteat. C. B. pin. Piper 3. longum orientale: Piper longum, Matth. Lac. Cord. hist. Lob. Garz. Frag. Clus. Garz. & exot. l. c. c. c. Linscoto & Iavensis Pipleni. Piper longum orientale, Cast. Macropiper minus, Tab. Hujus arboris facies longè alia exilit Linscoto, non autem Clusio.

Garcia, qui longum piper Pimpilim vocari ait, in Bengala nascitur, quæ regio quinqueaginta leucarum spatio à Malavar distat, ubi candidum & nigrum gignuntur. prærium longi piperis in Bengala est unius auci femelle in regulas centenas libras. Aloyf. Cad. Piper longum in Same invenit.

Deser. Fa. error Clus.

Deser. plant. ra.

Error Garz. c. 1.

A. rimont.

Chiabe.

Synon.

Locus.

Piper longum intensa mordacitate præditum est & subamarum, quoniam immaturum: antidotis item & theriacis medicaminibus accommodatum, Diosc. Nonnulli statim ab initio curacionis uvula relaxare ab inflammatione pulvere piperis longi auxiliari conantur, quod quidem periculo non vacat.

PIPER EX FLORIDA.



Styli sunt palmaris longitudinis, plus minus, haud ita Myosuri spica affimiles, crassitudine pari, fusci, veluti pulvere crispatis, nudi tamen & politi circa imum, obsequiosi, sapore acriusculo, ad piper accedente. In Musæi mei thesauro habeo à quadraginta ferè annis titulo, *Poirure de floride.*

Considerandum an hoc piper sit idè cum pipere longo Monardis quod sic describit:

Toto Continētis tractu (in quo Nata, Carthago) & etiam in Novo regno, magnus est usus piperis cuiusdam oblongi, quod majori acrimoniâ præditum est Orientali, magisque aromaticum, & jucundiore odorem spirat, quàm Axi, seu Capsicum; quinetiam præfertur piperi nigro, cum saporis, tum suavitatis causâ. Alæ cuiusdam plantæ fructus est, oblongus, crassitudine quidem funiculi, at dimidij pedis longitudine, confians veluti multis granulis, circa pediculum oblongum conjuncto & continuo ordine dispositis, seminibus plantaginis modo; quibus ademptis, pediculus nudus conspicitur. Recens viridis est, sole maturefcit & nigrescit. Calidum est tertio gradu.

An est porro illa plantula peregrina, de qua Clus. exot. l. 4. c. 3, ita scribit: Habet hæc plantula cauliculum uncialis longitudinis aut amplio rem, valdè gracilem, sustinētē ut plurimum binas, oblongas, graciles, quincuncialesq; veluti spicas, longo pediculo subnixas, adè obliquè quaquaversum striatas & rugosas, ut exilium lumbricorum siccatorum, aut tere retium limularum formam quodammodo referant, coloris fusci & fuliginosi, subacris & calidi saporis, odore autem Melilotum penè referentes. Quoniam autem Iacobus Garretus, qui plantulam Clusio mitebat, nullum nomen adscripsit, nec unde habeat ipsi significavit, idè ad cuius plantæ genus hæc referri possit, ignorat, quod nemo inficias ibit, eum difficile sit, de plantis nunquam antea conspectis, eisque mutilis & corruptis, certi quidpiam statuere.

PLANTULA PEREGRINA Clusij.



Tom. II.

Monard. Ital. vocat suam plantam *Pepe longo di* *Synon.* *Carthagenia:* Item ex versione Clusij, Piper quoddam oblongum. Ejus autem iconem antè posuimus cum figura piperis longi, quæ sanè non ita respondere videtur, ut descriptio. Lob. obs. & ic. Piper longum Monardis. Cæs. Indiæ Occidentalis quoddam genus piperis, quo indigenæ loco piperis utuntur. Lugd. ex Monard. Piper longum. Tab. Macropiper majus. Hic cum Lob. & Lugd. proponit figuram Monardis. B. pin. Piper 4. longum occidentale (sic & Cast.) dimidij pedis longitudine: Piperis longi genus ex Carthagine, Frag. Piper longum incolis *Chiabe* dictum, Linscot. 4. part. Ind. or. fig. 20. Ego hoc ad præcedens piper longum refero. Cæterum B. pin. plantulam peregrinam Clusij, ad piper longum Felsel Alpini pertinere scribit.

PIPER ÆTHIOPICVM filiquosum.



Siliquæ plures *Deser.*

Sex uno tuberculo pendent unciarum duarum, trium, quatuorve longitudine, rotundæ, pennæ anserinæ crassitudine, nigricantes, incurvæ aliquantum, thorulis pro condecorum seminum numero distinctæ, alioqui etiam rugolæ, fibris longis, lentis, fractisque cõtumacibus contextæ; interior substantia ex rubro nonnihil est cinerea: semina distinctis comprehendentur oculis (carnoso pariete unumquemque distinguente loculum) ex rotundo oblonga, difficulter è siliqua avellenda, magnitudine minimi Phaeoli, foris nigra & nitida, medullâ duriusculâ rufescente, textura cancellata (præsertim juxta pelliculam, quâ integitur) favos apum imitata. Saporem *Sapp.* siliquæ, quàm seminum ad Piperis nigri saporem accedit.

An Lon. *Cubeben?* Certum si quidem est figuram *Cubeba:* apud eum non esse *Cubebæ* vulgarij, dubitamus igitur an piperis *Æthiopicum*, licet non placeat *Piper Æthiopicum* icon, nec etiam nostra, quæ per ineptum sculptorem corrupta. Lob. adv. & ic. Piper *Æthiopicum* [ita etiam Tab.] *Marchioli;* *Amomum officin. non Amomum.* nullarum & Longa vita.

Habzelin (inquit Guill.) granum nominatur *Serapioni* Piper *Æthiopicum*. Verùm Piper *Æthiopicum* revera est aliud, in *Barbaria* dicitur *Crony;* formâ speiatur *Phaeoli*. Memini *Venetis* Agyrtam siliquas pro *Balsami* fructu venditasse quæ res & *Imposura.* doctis, ut audio, impossuit.

Siliquas nigras quas pro *Carpesio* Paul. *Hestus* ad *Matth.* misit, cur probet legitimum esse *Carpesium*, nihil penitus argumenti sibi sese offert. Etenim quum *Galenus* *Carpesium*, præter id quòd *her. Carpesium* ha sit figurâ & facultate *Phu* similis, *festucis* vel *st. non est.* pulis tantum constare asserat, non siliquis, neque granis, non videt, quo pacto ejus acquirat sententiæ, præsertim quum jam pridem compertum habeat, hæc siliquas nil aliud esse.

Piper Ni-
grorum, Se-
rap.

quàm Piper nigrorum ita Serapioni vocatum, qui
ejus historiam posteritatis memoria commendavit
his verbis: Æthiopicum Piper Barbari nominant
Cr. III, & est in forma sua Phaeolis non ab simile,
femina tamen minima habet, & cortices, filiquas
breviores, colore nigro & gustu ferè acri; veluti pi-
per, atque è Nigrorum plaga advehitur, dentium
doloribus non inutile. Quæ quidem notæ adeò
conspicua sunt in hisce filiquis, & granis intus con-
clusis, ut nullus relinquatur dubitationis locus. Ad-
de quod mansum (ut experimento constat) denti-
um dolores perinde ac Pyrethrum in masticato-
riis mulceat. Et non ex Syria vel Pamphylia (ubi
Carpefij plurimum provenire testatur Galenus) sed
ex Æthiopia adferatur.

Vires.

Dolor den-
tium.

An Piper
Cardano
Diepa Vi-
sum?

An hoc intelligit Cardanus, cum dicit. Vidimus
Diepæ piperis genus quoddam ex India allatum,
mucosum & pingue valde, in vaginulis conten-
tum quæ nigra erant, cum ipsum piper colore esset
ferrugineo & majus nostro quod ex Oriente defer-
tur. Itaque cum plurimum habeat humiditatis concocti,
gratius est ventriculo jecorique: & maximè, quòd
saporis sit mitioris & longo piperi similis. Est nobis
piper Æthiopicum filiquosum, pulcherrimum à Pa-
ladano missum sapore acri, vegeto.

Syn. C. B.

B. pin. Piper 6. oblongum nigrum. An Piper lon-
gum, Diosc. Habzeli & Piper nigrorum, Serap. Pi-
per æthiopicum, Matth. Lob. Calt. Lugd. Tab. Cro-
ne & Granum Anefen Avicennæ, Ang. Carpe-
sium, Cord. hist. Piperis aliud genus æthiopicum,
Frag.


PIPER LONGVM FELFEL
Tavil, Alpini.

Defr.

Folia succi.

Temper-
amentum.

Morbi fri-
gidi.



EST quaedam
herba in viri-
dariis quibusdam
custodita, juncti fo-
liis, è quibus se-
ctis succus quidam
flavus manat, val-
de acris ac exurès,
totaque planta est
calida in quarto
gradu, magis quàm
piper exurens. Eà
utuntur emplastri
modo apposita, ad
coxendicis dolo-
rem, nec non ad
frigidis articulo-
rum dolores; cor-
rigit verò nimium
ejus calorem oleo
rosaceo, vel myr-
thino.

Syn.

B. pin. Piper 5. longum angustissimum ex Florida:
Piper longum, Felfel, Alpino. Plantula peregrina,
Clus. ex l. 4. c. 11. De Piper ex Florida, cccu & plantu-
la peregrina Clusij, nos ante diximus.

FRVCTVS SQVAMMOSVS
cum granis piperis nigri; An Bra-
sina Diosc.

Defr.

Nuci Fau-
sel simili.

EVValachria delatus fructus, quem VVilhelmus
Parduynus, Clus. exot. l. 2. c. 22. communicabat; e-
xilis erat, semunciam magnitudine non superans,
exigua & immatura Nuci Faufel non valde dissimi-

lis, exalbidi coloris, calice præditus quatuor squa-
mis constante, continens aliquot grana fusca, ro-
tunda, instar Piperis nigri, sed valde rugosa, quia
forsitan immatura, intus, alba, acris saporis; An Bra-
sina Dioscoridis?

An B. pin. Piper 9. abortivum: B. aqua Diosc. pipe-
ris scil. nigri genus cal. n. seu inane & leve, ob nu-
trimenti defectum. Brasina, sive Brasina, Cord. hist.

LOBVS ÆTHIOPICO PIPERI
similis, acris.

LOBVS (inquit Clus. ex l. 3. c. 16.) non valde diffi-
milis Æthiopici Piperis lobis: nam & illorum
instar articulis distinctus, & granâ in singulis conti-
nebat nigra, crassiuscula, rugosa, acris saporis: alio-
qui lobus crassior erat piperis Æthiopici lobis,
cortice denso constans, foris rugoso, coloris ex rufo
nigricantis, supernâ & inferna parte duplici ner-
vo à pediculo ad extremum lobum excurrente:
pluribus aliquot articulis præditum fuisse verifimi-
le; nam post quartum articulum præcisus fuerat.
Hujus figura comprehenditur in sequenti tabella, l. c.
1. loco. B. pin. Piper 8.

CROPIOT RVGOSVS FRVCTVS
acerrimus femine similitudine
Æthiopico.



EXoticus fructus
Cropiot, quem
(autore Clus. exot.
l. 2. cap. 21.) orn. vir
VValichius Syvertz
anno 1599. de nau-
tis ex America re-
deuntibus redeme-
rat; parvus & rugo-
sus erat fructus, sed
valde dissimilis sin-
gularibus ejus fru-
ctus articulis, quem
piper Æthiopicum
appellant, & Avi-
cennæ esse putatur,
magnâ acrimoniâ
præditus, nigrumq;
semen continens,
ut piper Æthiopi-
cum. Solere autem
incolas eum fructum

admiscere Tabaci foliis, adscriptum erat: quum illius
fumum haurire vellent, ad capitis dolorem lenien-
dum. Erant autem aliquot ejus fructus funiculo tra-
jecti, ut in icone videre est: quod incolas fecisse ar-
bitratur ad eos commodius resiccandum, vel ut in
promptu haberent, quando illis utendum. Hujus
icon 2. loco exprimitur.

BODAGLAM FRVCTVS EXOTI-
ticus, Paludano.



PIperis ferè ma-
gnitudine fru-
ctum exoticum no-
bis missi Paludanus,
cinereum, imâ parte angulosum nullo pediculo do-
natum, supernâ amplo hiatus cavernosum, interger-
minorum quorundam parietum beneficio in tres
cellulas distinctum, apertum, cæteroque per ambi-
tum

tum ita æqualem, ut cultello dissectum, & mediam quandam fructus portionem dicas. Cellulas porro feminij quiddam continuisse suspicior est, quæ fortè exciderant, aut ad maturitatem non pervenerant. Totius alioqui structura non male fortè quis Mespilio comparat, nisi quòd totus hic cavernosus, & feminij (si quod fuit) nil nisi vasculum corticosum esse videatur, qui dentibus facillè atteritur, sapore est acriusculo & ferè evanido. Est & gemellus, & compressio nes qua circa angulos imà parte apparent, plures cohasisse immediatè & sine pediculo manifestè arguunt.

MUNGO.

Est semen, inquit Garcias, viride, quod per maturitatem fit nigrum, Coriandri fidei magnitudine. Nasci ferunt in Palestina. Ejus meminit Avicenna l.2.c. 431. vocatque Messè [Meisse habent nostrà exemplaria & additum margini Mes, Mex, Clus.] Bellunen- sis ejus interpretè Mens (Mex autem dici debere ab eruditis Medicis Arabibus seductus sum.) Huic lectioni accedit ipsium ipsius Avicennæ testimonium qui l.7.Fen.3.doct.2.c.7. phibet ne aves cùm Mex edantur, q. periculum sit, ne crudum adhuc Mex cum eorum chilo ad hepar rapiatur: pabulum esse equorum; interdum tamen etiam ab hominibus edii: Guzarate & Decan incolas in febribus hoc modo uti. Febritatis cibo abstinet, per decem, non nunquam per quindecim dies: post quos hujus fructus decoctum illi propinatur, in quo non nihil pulpæ remaneret: deinde cortice delibratum Mungo & instar Orizæ coctum febritanti exhibetur: panis verò triticeus non nisi post multos dies administratur: non quod frumento careant hæc provincie; nam eris non stercorentur & colantur agri, quemadmodum apud nos, sed superficie tenus duraxat arentur, nativà suà pinguedine & ubertate etiam interdum sine pluvia frumentum Novembrii mense sibi commissum, medio Ianuario colligendum & maturum exhibent. Mungo frigidus est, quantum ex ejus facultatibus colligere licet.

B.pin. capite de Cubebis quarto loco dicitur Fructus niger Coriandro similis.

HAERMIA SERAPIONIS, sive Piperella.

HAËRMIE nomine datum granum, pipere est super, Coriandro paulò majus, aliquando æquale, rotundum, colore fusco vel citrino, pediculus tenuis qualis pipere caudato, ab ejus vestigio ad adversum mucronem brevissimum producuntur pulcherrimæ stria crebræ, atque huic quidem cortici separabili substantia subest compressa, solidiuscula, punctis rubentibus guttata, in qua est sinus exsculptus, ad medium usque penetrans: sapor apparet adhuc aromaticus, ad Caryophyllorum saporem accedens, etiam in his granis, quæ totos jam triginta annos & plures asservo, Lugduni per D. Val. Dourez data; Clusius ait granum contineri nigricans calidi gustus. Icon est cum Pipere nigro ubi stellâ notatur: ineptus sculptor malè eam imitatus est.

Haërmia, vcl Piperella Serapionis est in figura sua sicut figura pipere minoris, nisi quia est in colore suo quasi citrina. Est autem granum parvum, minus pipere odoriferum, cujus odor est sicut odor ligni Aloes. Lugd. Mungo similis fructus. Cæterum non placet nostra Haërmia pro Mungo: quia hoc semen Valerandi non mihi videtur aptum febritantibus, & equorum pabulo, quod prædicatur de Mungo. Anomum. D.B. Paludanus 1598. misit nobis pro Anomo.

Mitius est Valerando Dourez ex Ormuz (inquit Clus. exot.) fructus pipere magnitudine, rotundus, striatus, qui Coriandri grana ita emulatur, ut primum intuentibus Coriandrum videatur, majus tamen & nigrum, membrana superior granum continet nigricans calidi gustus. Non ineptè quadrare videtur Negundo: sed neque etiam huic Mungo: Negundo, cui exactissimè conveniret, nisi calidus esset, Mungo verò frigidus, quantum ex ejus facultatibus colligere licet.

B.pin. Pip er 7. sive Pipere similis fructus striatus: Haernia Serap. Fructus cap. de Mungo additus, fortè Negundo; Clus. ad Garz. Caryophyllus Plinius sive Negundo, Imper. Negundo, Garz. Acolt. Fragofo. Nos de Negundo & Mungo sub suis titulis.

In Haernia duas esse virtutes contrarias scriptum reliquit Serapio. nam testatur eam & caliditate & siccitate & frigidityte participare; interim nec humiditate care- re, in doloribus frigidis gutturis & ventris siccitate utilem esse: non nihil eam abstergere.

NEGUNDO ARBOR MAS ET femina.



PROVENIT in Balaguate & Malavar arbustula di Persicæ magnitudine, frequentibus ramis, qui recis frequentiores latiore sive enasuntur, foliis Sambuci, simili modo per ambitum serratis Sambuci & aliquatulum hispidis: flos ex cinereo candidus, fructus niger, pipere magnitudine, paulò major. Malavar incolæ eum suis eduliis Caril runcupatis inspergunt. Hæc Garcias.



De Negundo hæc tradit Acolta; Dux arbores multis India locis, præsertim verò provincia Malabar inveniuntur. Earum prior mas censetur Amygdalæ magnitudine, foliis superè virentibus internè lanuginosis & hirsutis, foliorû Salvia modo, in ambitu serratis, quæ procul aspicientibus Sambuci foliis similima videntur. Altera Negundo femina nuncupata. Eadem magnitudine quæ prior assurgit, folia verò habet ampliora, rotundioraque, neque in ambitu serrata, foliis Populi albæ perquam similia; utriusque folia Salviam odore & sapore referunt.

magis amarā quam mari & acria: in plurimis foliis parte aversā summo manē inhaerens conspicitur spuma quadam candida, quæ nocte ex illis emanat; flos cinerei coloris, plurimūque ad Rorifmarini florem accedit, fructus similis piperi nigro, acris gustūs, minimē urentis uti Piper, at Zingiberi propemodum patis.

Rorifmarini flos.

Nomina singularia. Vires non est.

Vulgare nomen est, teste Garcia, Negundo quam nonnulli in Balagata *Sambali* appellant, in Malavar *N. che*; qui Viticem esse contendunt, multūm errant. Acosta ex veris Clusij, duas arbores facit: priorem marem censet & à Canatinis *Varalo Nigunda* appellari refert: alteram Negundo feminam nuncupat quam ait *N. chilla* à Lusitanis, vulgo in Canaria *Nyergundi* dici, in Balagata *Sambali*, in Malabar *N. che*: utramque verò tam marem, quàm feminam ab Arabibus, Persis, & Decan in colis *Bache* vocari, Turcis *Ayr*.

Si Acostæ icon legitima est, folia quæ dicit Populi, ego potius Juglandis dicerem, à forma quæ prædita sunt & materia. Meritò Negundo subnectenda subjiçendave historiæ Haemiæ Serapionis, quandoquidem fructus qui existimatur Haemia, traditur à Clusio & Imperato pro Negundo, quem admodum & Cariophyllum quoque Plinianum querundam, aliis Anomum Lusitanicum censetur.

Cariophyllum Plinij quorundam aliis Anomum. Vires. P. s. m.

Contra.

Multis facultatibus prædita est hæc arbor, teneriorum ramulorum cum foliis decocto, aut ipsis elixis, aut contusis, utilissimè contusa soventur, modò non adit vulnus. Friguntur interdum iidem rami cum foliis in oleo, & contusionibus applicantur, resolvunt enim tumores & curant. Frequens est ad eò hujus usus, ut in omnibus doloribus, frictum cum oleo, aut elixum exhibendum censent. Non desunt qui supra vulnera admoverint, unaque nocte dolorem sustulisse, materiāque digessisse asserunt: deinde foliis contusis, ipsis vulneribus impositis ita ea emundasse, ut brevi ad cicatricem perducta sint.

Tumor.

Vulnera.

Utilem perhibent esse mulieres ad juvandum conceptum, ejus enim succo aut decocto epoto, uteros ad conceptionem præparari. Ego (ait Garcia) malum præmandi, valentius enim futurum existimo medicamentum. Masticata folia oris halitum commendant. Actimonix verò cujusdam participant veluti Nasturtium: unde manifestum est calidam esse hanc plantam. Experti sunt nonnulli veneris stimulos & impetus cohibere, eamque ob causam Viticem esse contenderunt. At bore in moderatè calidam faciunt, ut notat Acosta, & semini paulò plus caloris tribuunt. Folia, flos, fructus, contusa aut in aqua decocta, vel in oleo fricta, utiliter imponuntur omnibus doloribus ex quacunque causa provenientibus: præsertim verò in articulorum doloribus ex frigida causa natis, atque in tumoribus & contusionibus mirabiles præbet effectus. Vlcenibus etiam vetustis folia trita imponuntur, felici successu, quandoquidem eorum materiam digerunt, eaque emundant, & ad cicatricem perducunt, modò corpus non sit impurum. Et sanè in vulneribus, apostematibus, & contusionibus ad eò utilem experiuntur, ut Chirurgo operam minime requirant. Mulieres horum foliorum decocto omni tempore universum corpus lavant: tantaque invasit persuasio apud illas, Negundo folia, flos & fructus, utilia esse ad juvandum conceptum, ut eum, qui contrarium persuadere conetur, lapidibus obruturæ sint. Obstetricibus etiam, quas illi *Dayas* vocant, apprimè nota est hæc arbor. Ad eò frequens est hujus arboris usus ad medendum in illis regionibus, ut nisi Deus præciso ramos multiplici fertura renasci faceret, jam diu fuissent consumptæ arbores, aut certè maximi pretij nunc essent. Sed quo magis præciduntur rami, eò felicius renascuntur, perperuaque fronde virent.

Oris halitum.

Veneris obicit.

Temperamentum.

Delares frigida. Vlcera.

Vulnera.

Conceptum in aqua.

CVBEBÆ. CAP. XLVII.

Cubebæ grana sunt Piperi familia, interdum *Disfer*. Capullò majora, pediculo longo stili in star donata. Piperis ta, cortice fusco, rugoso, interdum erugato, extenso. *grano*. que, nucleo subiecto exiguo, rotundo, foris nigricante, intus albo: aliquando casta teperiuntur, equè efficaci vel etiam efficaciore sapore prædita, quàm Sapor: nucleata, sativi, aromatico, acris, sed qui Piperis acrimonia multūm cedat, pertinaci tamē.

Considerandum an Cubebæ pingantur cum Piperis caudato?

Cubebatum quidem meminit Avicenna: verum non describit: quare considerandum an vulgares Cubebas intelligat, vires siquidem respondere videntur.

Myrti sylvestris fructum ait Hermolaus Cubebas Mauticè vocatas, quod quam verum sit, diligenter animadverti cupit, præsertim ab iis dissentiens, qui hoc asserunt: Galenum certè id, quod Cubebas Medici appellant, Carpesium vocare tradit, esse autem odoratum semē Carpesium, h. e. Cubebam, quam Paulus & Carpesiam quandoque vocatit: Mauros sylvestris Myrti baccas, Carpesium, & Cubebas esse putasse.

Serapio (attestante Brassav.) magno errore, at horrem ferentem Cubebas, esse Diof. Oxymyr sine arbitratore. Recentiores etiam (ut Pandect. & alij) cum Serapione Carpesium Oxymyr sine esse putant, & tamen Cubebæ Oxymyr sine esse non possunt: nec Carpesium Galeni.

Actuarius, referente Ruellio, Carpesium à Barbaris jam suā ætate Cubebas vel Combebas dictas, esse professus est, & hoc nomen officinis vulgè usum, longè etiam rem esse à Rusco. Carpesium autem Actuarius & Nicolai Myrepsi Combebam vel Compedam nuncupari, & officinis Cubeba dici, testatur etiam Fuchsius de comp. med. qui Actuarius dissest fecisse scribit quòd Combebas alio nomine Carpesia dici annotant. Sed licet Actuarius *rubellus*, vel *rubra* etiam *varmina* vel *varpina* vocari scripserit, Galeni tamen *varmina*, aut Dioscoridis Oxymyr sine, seu Myrti sylv. fructus (nam cum Carpesium nō meminisse legitur apud Silvium de comp. med.) Cubebæ esse non possunt, id quod Serapio & alij quidam Neoterici existimant. Cubebas verò longè diversos esse à Carpesio fructus, Cord. Lob. & Pena confirmant: existimat autem cum Pena Lobelius fieri posse, ut sit nigro piperi congener. Est ipsi in obli. Cuba officin. piper Hippocratis simpliciter & Piper rotundum Theophr. Guilandino.

Veris, aiunt Monachi, Cubebis, si Plateario credimus, caremus: communes Cubebæ non solum non habent acutum saporem, sed cum quadam pauca amaritudine insipide sunt, & nullam præbent aromaticitatem: tres autem Cubebatum species esse scribit Pandectarius ex autoritate Plinij [apud Plinij non invenimus] quarum ultima, quæ pro domestica scribitur, potest esse communis Aromatariorum. Heus quàm depravatus, si non peritū aboliis Monachorum gustus & odoratus. In Cubebis vulgaribus acrimonia & aromaticum sapor, ac odorem comperimus, quem concedunt & observant Hermol. Sylv. Fuchsi. Matth. & Cæsalpium.

Quid hæc tempestate sit Carpesium arduum sanè fuerit Matthiolo explicare. Tamen si Hermol. Ruell. Fuchsius ac etiam Monachi pro certo exploratum habent, Avicennæ, Serap. & Actuarius autoritatibus innixi, fructus piperi simile, qui vulgè Cubebæ vocantur, legitimum esse Carpesium: verum eos in errore versari existimat, qui credunt (ut Hermol. Ruell. & Fuchsius) vulgares Septasiariorum Cubebas, illas refer-

Error multorum.

referre, de quibus scripsere Serapio, Auicenna & Actuarius, quando quidem qui dixerit Cubebas fructum vel semen esse, eorum reperit neminem: nec minus probari posse putat, id usquam dixisse Galenum: cuius stirpis fructus vulgares Cubebe sint, quid asserere velit. non habet; eam ex Orientali plaga peregrinae afferantur. Hac Matthiolus qui scribit Monachos nostras Cubebas recipere, quod falsum est. Scribit Robertus sub vocabulo Opocarpali *καρπώσια* aut *καρπώσιον* aliud esse, quam Opocarpason; Actuarius *καυβέβας* appellare, & Nicolaum Myrepsum: sed Combebas, sive Cubebas Mauritatorum, vel *καρπώσιον* Græcorum differre à Cubebis officinarum: *καρπώσιον* enim herbam esse Phu appellato generi similem.

Cubebe (tradente Linschott.) crescit in Iava sylvis sua sponte ad ripam Sunda. Vocatur ab incolis *Covanihi* & *Cumia*. Malayvicè, *Cubachini*. In Sunda faccus plenus, Barhut (mensura genus est) ponderis 56. librarum dum carè venditur & in summo pretio est, sex aut septem millibus caxas dicitur. Arborea earum pomis nostris haud ab similes sunt: racematim coherent grana, sicut uva vitium quæque tamen proprio hærent pediculo. Iava incole Cubebas coquant antequam diverdant, ne & albi locorum semineorum atque proveniant.

Ab Arabibus Medicis, ut Garcias scribit, appellatur hic fructus *Cubebe* & *Quabebe* à vulgo *Quabebechini*: in Iava, ubi frequens nascitur, *Cumia*; à reliquis Indis, præterquam in Malayo, *Cubabini*, & etiam à quibusdam *Cubachini*, non quòd in Sina vel China nascatur, sed eò perferatur: sylvestris autem est planta, & spontè nascens, non domestica, neque multorum generum, uti falsò Monachi putant: neque est folio Myrthi: fructus autem neque piperis genus, neque Carpesium, neque Viticis semen, ut quidam asserere aut sunt, quorum sententiam utriusq; historia & facultates planè dissimiles fati consuevunt. Putat Silvaticus ex Arabum auctoritate Cubebas nihil aliud esse quam Dioscoridis Myrtum sylvestrem, quem Ruscum vocant; aut Carpesium Galeni. Sed fallitur.

Apud Acoftam It. appellantur Cubebe aromatica & veneræ; vulgo Arab. *Cubeba Chini*; incolis *Cubal Chini*, non quòd in Chira proveniat &c. Hac ille qui sua ex Garcia desumpsit. Ruellium autem & Monachos taxat, quòd existimant Carpesium esse Cubebas Serapionis & Avicenna, quia ubi Galenus ponat Carpesium, Serapio scripserit Cubebas. Verùm Cubebas fuisse cognitas Dioscoridi, & Galeno scitè negat. Lacuna per Carpesium intelligit radices, & idèò concludit pro Carpesio simendas Cubebas Arabum. Monachi dicitur se vidisse varias species Cubebarum, quasdam sine sapore, alias amaras, & alias bonas. Sed fieri potuit amaras fuisse corruptas, bonas recentiores & melius conservatas. Ant. Musa & Serapio dicentes nos habere Cubebas, hallucinantur, constat d'artq; Carpesium cum Myrtho sylvestri. Pande&atius existimans Galenum vocasse Cubebas Cauti, errat, quia est species Dauci sylvestris: Qui volet videre varietatem opiniorum legat Monachos in Mesæde Cubebis, Brassafrican, Ant. Musam, Platear. Parde&. Luminare majus, Sim. Garuensem, Serap. Galen. Avicen. Math. Sylv. Hermol. Lacun. Matthiolium & alios.

Cubebe nostre non sunt Carpesium Galeni: sed nec ut Scalig. somniat, Plinij Caryophyllon. Pimento del rabo Luitanis, quod significat piper caudatum, valdè veretur idem Scaliger ne sit Cubebe, nihil asserit tamen. Officina pro Cubebis substituerunt grana quædam odorata, formâ piperis, quem legitimum Amomi fructum putat Cæsalpinus. Sed & Cubebas vulgi; quas Medici accipiunt pro Carpesio,

putantes esse fractus Myrthi sylvestris, potius Anomali fructum idem Cæsalpinus arbitratur.

B. pin. aut Cubebas officinis vocatis, Actuatio dicitur *καυβέβας* Arabibus Cubebe & Quabebe. Idem in bicum Matthiolo negare videtur Cubebas t. vulgares esse Arabum Cubebas, aut Carpesium Galeni.

VIRES ET USUS.

Cubebe ex autoritate Avicennæ, calidæ & siccae sunt, aperient, attenuant, Cinamomo ignaviores, utiles ad genitalium & gingivarum putrida ulcera, ac aphthas; ore retenta vocem claram reddunt, hepatis obstructions aperient. Urinæ vias emundant, arenulas extergunt, calculos pellunt tam renum, quam vesicæ. Salivam manæ è capite allicunt. Hermol. Barbar. de Cubebis vulgaribus dicit: Carpesium si ore contineatur claram vocem facit pronuntiantibus: ob id Bernard. Justin. homo in ptinimis doctus, & eloquens nunquam sine hoc semine concionabatur. Sed & illam dotem prædicant: majorem in coitu voluptatem sentire ab his, qui habeant in ore, quasi non sit in ea titillatione mens commotari: nisi doceamur quemadmodum nos Venus administratione, & violentior transvectos auferat. Cubebe vulgares (teste Matth.) excalescere valent tertij ordinis initio & siccat in fine ejus. Languentem ex pituita ventriculorum, vel etiam ex flau roborant: peccus à lentis crassisque humoribus expurgant, lienem juvant, flatus discutiunt & frigida uteri affectibus auxiliantur. Diu cum Mastiche manæ, pituitam à capite trahit & cerebrum roborant. Cubebarum apud Indos, inquit Garcias, magnus in vino maceratarum est usus ad excitandam Veneream: tum etiam in Iava ad excalescendum ventriculorum. VVit. Emp. ad vertiginem accipere jubet 4. aut 5. Cubebas masticandas, & retinendas in ore, expuendam humiditatem que cumuletur, postremo etiam ipsas Cubebas. Idem ad eundem affectum suadet Cubebarum ʒ. j. Sacch. albi ʒ. j. b. seducendas in pulverem: accipiendum quantum supra nummum grossum dictum manere possit manè & vesper: quàm autem accipiantur obtinendas esse nares, ut odor pulveris ascendat ad caput, sed & de fluxionibus à capite obnoxio manè masticandas præcipi. Cubebas conditas vel non conditas.

FRAGRE SERAPIONIS.

Fragre, ut autor est Aben Mesuai, assimilatur Ciceribus, & est calidum & siccum in secundo gradu, & ingreditur medicinas quæ præparant stomachum. Fragra assimilatur ab Isaac Eben amram Ciceri, & habet interius granum parvum, nigrum, rotundum, de foris verò rubeum, & ex succo ejus fit collutio ad fatorem oris, & confert, & nos utimur eo in Nodach, i. e. in pulverizationibus & unguentis. Fragaria non idem est, teste Cæsalpino, quod apud Serapionem Fragra vocatur.

AMOMVM IN GENERE. CAP. XLVIII.

DE Amomo, quod apud Theophr. l. 9. hist. c. 7. a. Theophr. dicitur ex Media, alij ex India advechi narrant, patet tamen, at vehementius odoratum, ita dicitur Dioscorides. Amomum frutex est (cuius fructus, Mollis) velut botrus ex ligno perplexus sibiipsis. habet etiam florè quædam parvam velut Violæ albæ: folia verò Bryoniae similia. Optimum est Armenium colore aurum referens (quod) habet rubeum & que lignum subfulvum, admodum odoratum. At Medicum ed quòd in campestribus & aquis locis nascitur, invalidi-

ath. ve
rgatur.

tonachi re
reb.

racill ex
Monachi
notantur.

Pandellarij
error.

Quadam
de aquis
cuiuslibet
est.

Temperat
Avicenna.

ylcera.

Obstruē
nti.

Vo.

Temper.

Math.

Affectus ut
teri frigidi;

Venerem
excitant.

Defluxio
nti.

Tempera
mentum.

Factor oris.

Diosc gene
ratic.

Armenium.

Medicum.

validius est. Est autem magnum & subviride [Codex Basil. *mayan*]. Rura odore, *non* *Organum ut Cornar. verit.* Ponticum verò subfulvum est, non longum, neque fractu difficile, racemosum, fructu plenu, & odore nares percillens. Eliget quod recens est & album, aut subrubrum, non adstrictum, aut perplexum [nō coactum vel coactum, gummi liquido ex Plinio add. Maron.] sed solum & diffusum, semine plenum, simile parvis botris, grave, valde odoratum, citra cariem, acre & gustum mordens, simplici colore & non varium. Vim habet calefaciendi, adstringendi, siccandi, somnum inducendi, dolorem eximendi, si fronti imponatur. Inflammationes etiam & meliceridas concoquit ac discutit. A scorpione ictis cum ocimo impostum profest. Podagricis auxiliatur, ipsosque lenit, oculorum item inflammationes, & eas quae in visceribus sunt cum uva passa. Ad menses & in pessis, & in infessibus commodum est. Decoctum verò ipsius potum convenit hepaticis, nephriticis, podagricis. Miscetur etiam antidotis & pretiosissimis unguentis. Quidam adulterant Anomum, per eam quae Amomus dicitur, & similis est Amomo, sed sine odore, & abique femine, & nascitur in Armenia, ac florem similem Organano habet. Ceterum, in eiusmodi probandis fraginenta figere oportet. Elige autem quae ab una radice ramos perfectos habent. Postea verò videant lectores pleniorē interpretationem verborum Diosc. sub Amomo novo facie Cardamomi.

Uva. Amomi uva, Plinio autore, in usu est Indica Vite Labrusca [ex India Vite forte restituta Dalech.] ut alij existimavere, frutice Myrtuoso [fibris Diosc. *ver. n. s. Ver. Myrtulo Scilicet. nempe colore Dalech.*] palmi altitudine : carpiturque cum radice, manipulatum leniter componitur, protinus fragile. Laudatur quam maximè Punice Mali folijs [Di. s. Bryonia.] simile nec rugosis, colore ruffo. Secunda bonitas pallido. Herbaceum peius, pessimumque candidum, quod & vetustate evenit. Pretium Uvae in libras 10. 60. [sili 70. ver.] fiat verò Amomo 48. Nascitur eā Armeniae parte, quae vocatur Otena, & in Media, & in ponto. Adulteratur folijs Punice [Punice M. Bryoniae Diosc.] & gummi liquido ut cohæreat convolvæque se in uva modum. Est & quae vocatur Amomus, minus venosa atque durior, ac minus odorata, quo apparet, aut aliud esse, aut colligi immaturum. Simile his & romire & frutice Cardamomum semine oblongo. Mentur eodem modo & in Arabia quatuor eius genera. Sanguinem quoque experientibus subvenit Anomon victorialis pondere tritum & in nulli cyathis datum. Quae constant Amomo, omnia acutiora sunt, inaximèque nares feriunt: acerrima per se Amomo. Hinc tegale unguentum appellatum, quoniam Parthorum regibus ita temperatur, Amomo etiam constat. Sed interpretationem Plinianorum verborum videant lectores postea sub titulo Amomi novi Cardamomi facie sive racemi Indici.

Amomum (ut Galenot) Acoro similem facultatem obtinet, nisi quodd Acorum siccius sit, majore autem concoquendi facultate Amomum. Aëtiis e legit Amomum recens semperque fragmenta reprobata electis ramis perfectis ab una radice. Xystus Betulerus in comm. suis doctiss. in Lactantium in carmine Phœnicis, fruticem esse, vel ut alij volunt, Vvam ex frutice convolutam tradit, quam Ruellius Pedem columbinum, & Agricola contra Ratum Hierichontis Rosam esse negat: Ipsi videtur nomen habere ab eo, quod reprehensione careat, à *synon. i. privativo* *α, μωδία, i. μωδία, & μωδία* reprehensionis Deus apud Lucianum. De Amomo jam diximus ex Dioscoride ut frutex sit exiguus,

Ponticum.

Delectum.

Vires.

Inflammationes.

Podagra.

Menses.

Adulterium.

Delectum.

Uva.

Delectum.

Lotus.

Adulterium.

Amomus.

Ad sanguinis spurium.

Galenofacultate similis Acoro.

Rosa Hierichontica.

Servius tamen ait herbam esse suavissimi odoris, *Se-Sium* quæ tantum nascatur in Assyria Asia regione. *Cæ-notar.* Ceterum Amomo (quod Ravius Textor arbutuleam *Ravius cr-* venenolo [legendam *venso* ex *Barth. Fontis*, palmi *at-* ritudine, ortu in Armenia, Syria, Media & in Pontu, *cus* *Vvam* in Vite persimili Labrusca in India nasci scribit] frutice facit) hæc attribuntur epitheta, Syrium, *Al-Epithet.* lyrium, Armenium, Arabum, spiliam, pingue, stragrans, odoriferum, sprans, olens, mite, gratum, odoratum, crassum, Perhuss;

Compositum læt, crassique litatus Amomii.

Inter ea quæ Dioscorides obscure tradidit, non postremum est etiam ipsum Amomum. Nam quum fruticem esse dicat, ex ligno perplexum sibi, vel lutebotrum, non hoc jam dicit, fruticem Amomi esse botrum, sed accipie ndum esse ipsum proferre botros in quibus sint Vvæ fructus particulares, qui semina in se habeant, sicut sunt vinacei in uva Vitis studibus: ita tamen ut omnia minora quàm in Vite accipiamus (inquit Cornar.) sive botros, quos nos racemos appellamus, sive acinos, i. e. uvæ particulares, sive vinaceos, i. e. grana seu femina, in ipsis spectemus: sive etiam totum fruticem, qui palmum altitudine non excedit, velut Plinius ait. Et ex hac sententia intelligimus, cur etiam racemosum appellet, & fructu & rursu semine plenu, & parvis botris simile. His autem ita se habentibus, non video quomodo rectè asseratur, Amomum quod hodie officina ostendunt semem admodum minutum, nigrum, sabulosu velut illi dicunt specie, nec odoris argumento, nec aliâ ratione congruere cum eo quod à Dioscoride describitur. Ego certè & vestissimum Dioscoridis Amomum id esse credo, & vinaceos ex botrorum acinis esse puto, quos etiam Plinius his verbis ostendisse videtur, dum ait; Amomi uva in usu est: & ubi post Amomum & Amomidem subiungit: simile his & nomine & frutice Cardamomum semine oblongo. Hoc volunt etiam indicare *Cardamom.* *num.* Græci Medici, ubi in compositionibus medicamentorum *Amomi botri* [Amomi botri sive racemi] usum præferunt, femina nimirum ex bottorum acinis assumere jubentes: ita videlicet *Amomi* vocem Amomo adijcentes, velut alius *Amomi*, aut *Amomi*, aut *Amomi*, aut *Amomi* vocem adijcere solent. Quod si odoris gratia hodie ex Amomo exolevit, sicut potius ut vetustatem culpabimus, quàm ut totam rem intuisse arbitremur, & longi temporis usurpationem simul & semel evertamus. Hæc Corn. *Corn. absen.* quem, ut verum fateamur, non intelligimus adhuc, *1. 11.* quid intelligat per vinaceos ex bottoru acinis quos Amomum credit: nec etiam quid velit per Amomum ex quo odoris gratia hodie exolevit. Amomum Vva Galeno & Aduario ob id dicitur, quod racematum velut in Vva cohæreat. Hodie passim Cordo & Fuchio testibus, Amomum desideratur, nam quod ostendunt Officina (ait Sylvius) inodorum est: habeo apud me sulcum, parvum, oblongum, odoris dum spiciatur succundissimi. Quod sit Amomum Sylvij, ut dicam, nondum mihi patet. Sed nec id Matthiolo constat Dioscoridem semen in Amomo nō probasse, sed potius lignum arbutule mate- *Diosc. pro-* riem, ut in Ciramomo & Cassia videre est, quo sit *but lignum* ut legitimum Amomum lignum potius, quàm semen existimaverit: Amomum quod jure probari possit pullibi (quod sciverit) in Italia provenit, nec eo aliunde translatum hæcenus videre potuit. Fuchio libro de compos. medic. dum ea simplicia examinat, quæ Theriacam ingrediuntur, ubi Amomi *Fuch. nos:* racemosi meminit Andromachus senior, omnes Galeni interpretes in simulat, existimans Andromachum de duabus inter se differentibus herbis esse locutum, nempe Amomo & Botry: verum is à Fuchio dissentit, ipse enim Andromachus senior et refragatur

Botrys quomodo intell...

Amomum officina...

Cardamomum...

Corn. absen. 1. 11.

Amomi uva...

Diosc. pro-but lignum non semen.

Fuch. nos:

gatur cum cecinit *Botrys* & *Amomum*. Matthioli sententia ad stipulari deprehenditur Junior Andromachus, qui nusquam Botrym commemorat, sed Amomum tantum. Hæc ille, qui quom nos (ait Amat.) vero carere Amomo sciret, ut illum tamen haberemus nos in Lusitaniam remittit, ubi ex India nunc delatum contendit: Amati tamen sententia fallitur, cum hoc usque Amomum verum incompertum sit. Sed Amato in Apologia refragatur Matthiolus dicens, nunquam meis scriptis affirmavi Amomum ex India in Lusitaniam conveli, nec eo quemquam remissi. Scripsi quidem me à quibusdam non spernendæ fidei Medicis accepisse jam primum ex India in Lusitaniam afferri Amomum, nec sanè plura quam hæc.

Hamama Columbam, non pedem Columba; ut vult Garcias, significare scribit Clusius. Quod verò Garcias ait pedem Columbinum esse Diosc. Amomum, præterquam quod illi inpositum est ab illo Iudæo, scire debemus Columbam scribi per He in fine, Amomum autem per Elis. quæ sola scriptiois differentia constituit & significationum differentias; ut Amomum vel ejus notio nullam cognationem habeat cum Columba. Itaque vanum est pedem illum Columbinum cum Amomo Dioscoridis conferre, propter solam allusionem nominum. An est Olivij Amomum, quod vidit in Musæo Calceolarij colore ad aurum vergente, pallente scilicet & uram referente, quod Piperis genus esse apud Lusitanos non audent affirmare. Observat Maronea (cujus sententiam videant lectores postea sub Amomo novo facie Cardamomi minoris) Amomi vocem antiquissimam, quæ Theophr. etiam utitur, Indicam esse, non Arabicam ut existimant recentiores, qui dum Amomi Etymon ab Arabicis frustra perquirunt, in ea bis peccat: siquidem duplici utuntur incertissimo fundamento, uno quidem, quia Amomi vocem asserunt Arabicam esse non Indicam: altero verò quia ponunt tanquam notissimum antiquissimam linguam Arabicam ab ætate Theophrasti ad hæc usque tempora suam integritatem servasse. Significat autem vox Amomi & fruticem ipsum, & etiam racemum, qui est præcipua pars quæ interfuit usus medico. Theophr. & Galenus satis jejunè petrastrarunt de Amomo, cum ejusdem descriptionem omiserint. Verum Dioscorides & Plinius eas dederunt Amomi descriptiones, quæ si unà conjugantur Amomi notitiam & faciem & perspicuam faciunt. Recentiores autem, qui utrinque auctoris de Amomo descriptiones invicem se jungerent student, ipsi veterum Amomo magnas tenebras offundunt. Diosc. & Plinius unanimes est consensus in Amomi historia describenda: explodenda opinio recentiorum existimantium Plinium & Dioscoridem non convenire inter se in Amomi descriptione. Plinij est singularis diligentia, quæ ipsum superavit Dioscoridem in Amomo delineando, unde adhuc magis redarguendi recentiores afferentes Plinium ignorasse legitimum Amomum. Hæc enim Maronea, qui diligenter consensum Dioscoridis & Plinij demonstravit quem omittimus, quia patet ex utrorumque scriptis huic capiti præpositis, acetiam ex his quæ excerpta ex Maroneæ Commentariis à nobis posita sunt postea sub titulo Amomi novi Cardamomi parvi facie sive Racemi Indici.

Amomum Humelbergio, apud Auleium frutex est odoratus, transmarinus, cujus semen in usu esse scribit. Sed miramur Humelbergium, cur non indicet ubinam sit in usu, & quale sit. Latet nos præterea san Castous Durantis, *Amomum*, sive Hamanis & Hamanz icon vera sit, necne.

Bellon. in obs. ait terram adhuc proferre Amomum: hoc verò Constantinopoli, qui volet habere,

petendum; nec (addit de neglect. cult.) sine adminiculo subsistere. Quale autem Amomum intelligat Bellonius nondum nobis constat, an fortè in Obs. per Constantinopolitanum intelligit Amomum verum quorundam, de quo mox? Et de neglect. cult. aliud, nempe Ribes nigrum.

Volunt præterea aliqui Cardamomum vulgare esse Amomum.

Nec desunt qui per Amomum, Amomum novum Cardamomi minoris vulgaris facie sive Indicum racemum (de quo paulò post, quod Clusius spiritum vocat) intelligi dicant.

Amomum, autore Hadr. in nomencl. est Piper hortense ab holitorum gente dictum. Hoc Piper Hadriani est Ribes nigrum.

Piper denique caudatum, *Pimenta del rabo* quibusdam Amomum nuncupatur.

Est & Amomum Garyophylli odore quorundam. Est & piper Æthiopicum Matthioli, Amomum officinarum non nullarum.

Lob. in append. ac Icon. plant. & Cæs. (quod nobis nondum aridet) putant Cubebas legitimum Amomum.

Rosa Hierichuntis multis est Amomum, quæ opinio quibusdam displicet & nobis etiam.

Pro Amomo Plinij vulgus Italarum Strychnodendron ostendit.

Botrys falsò æstimata à multis Amomum, & pro Botrys eo malè usurpata fuit.

Sic quoque Sison falsò Amomum officinis dicitur.

Ammi Alexandrinum etiam ab aliquibus malè existimatur esse Amomum. Amomi nomine in officinis vendi Bibinellæ tertium genus scribit Gualterus Ryff. in reform. pharm. germ. l. c. 2. Est hæc nobis Saxifraga hircina.

Ceterum aberrare eos, qui pedem Columbinum faciunt Amomum demonstramus sub Geranio Columbino. Et hoc nobiscum sentit Ioh. Agric. Serapionem erroris incusans, quod Amomum pedem Columbinum esse putavit.

Galenus l. 6. simpl. sicut & codex de substitutis Acorum imponunt, quem sequitur Cordus in Aurore Alexandrina, in Diatriot. Mesin Theriaca, in trochiscis Hedichroi, Placet. Borganæ. Matth. Turn. Lac. Bacchanell. & Apollo, quorum opinio minimè improbanda videtur: quum Acori radix quam seplax falsò Calamum odoratum vocant, & odorata sit & acris & præter id adstringat siccè que. Quum Galenus Amomum similem Acoro facultatem obtinere scribat, præstaret, inquit Clusius, legitimum Acorum, satis videlicet jam cognitum, medicamentis Amomum recipientibus admiscere, quam alias plantas, quæ pro Amomo obtrudi solent. Fuchsius quidem Amomi vice Acoro utitur, ast ejus penuria Galanga majore. Idem & Amatus, qui Acorum, Galangam crassam censet. Dispens. Col. Amomi loco ponit in troch. Hedr. id quod dicitur, Calamum aromaticum. Hunc sequitur Tab. apud V Virsung. dicens: Galenus scribit Acorum [Calamus] eadem habere vires cum Amomo: eo igitur utendum censeo in defectu Amomi. Amomi sive Pomi Hierosolymitanum (sic Michaeli Neand. placet) explet Acorum. Hic si intelligit per Pomum Hierosolymitanum ut puto Rosam Hierico, nomen Pomi Hierosolymitani certè non placet.

Quid tandem Amomi loco accipiendum sit, & Diosc. & Galenum declarare dicit Marantha. Et hinc ex dictis Dioscoridis colligit recentiores Medicos magno in errore versari, atque in illo quidem duplici. Primum quidem, quod semen, nescit quod, ex vera Amomi planta minimè excerptum usui adaptent: Deinde, quia putant Amomi semen (si modo

Cardamomum.

Amomum novum.

Ribes nigrum.

Piper caudatum.

Amomum Garyophylli odore.

Cubeba.

Rosa Hierichuntis.

Strychnodendron.

Botrys.

Sison.

Ammi Alexandrinum.

Saxifraga hircina.

Geranium Columbinum.

Substitutum Acorum.

Galanga maior.

Calamum aromaticum.

Marantha redargemur.

Alum.

ribes nigrum.

Amomum novum.

Piper caudatum.

Amomum Garyophylli odore.

Cubeba.

Rosa Hierichuntis.

Strychnodendron.

Botrys.

Sison.

Ammi Alexandrinum.

Saxifraga hircina.

Geranium Columbinum.

Substitutum Acorum.

Galanga maior.

Calamum aromaticum.

Marantha redargemur.

Alum.

do verum repetitur) accipiendum esse; cum potius ejus lignum utile à veteribus judicetur, ut ex Dioscoridis lectione se accepisse gloriatur. Inquit enim adulterari ex Galeno solere Amomum herbà simili, quæ sit sine fructu: jam si fructus ad usum ducerentur, non posse plantam, quæ fructu careat, adumbrare: monere præterea Galenum fragmenta fugienda esse, & integros furculos capiendos. quod de fructu nunimè intelligi possit, deligendum etiam esse, valdè odoratum, modò cariem non contraxerit. cariem autem non ita femini videri propriam, sicuti ligno. Sed erroris hujus causâ fortè Phinium fuisse qui l. 12. c. 13. Amomi uvam in usu esse asseruerit: Nec ipsum latere in usu etiam fuisse Amomi uvas, & racemos: ut 9. x. r. r. r. cap. 3. ubi Asclepiadis pharmaca ad hypodermem recenset Galenus: similiter & x. r. r. r. in stomaticis Heræ, Amomi racemos: & 7. x. r. r. c. 9. Amomi uvas. Sed dicendum esse præcipuam partem lignum, sive furculos fuisse, quos intellexerint, cum Amomi absolute mentio fieret: & cum aliam partem cuperent, veluti racemos, v. v. valde explicatè protulisse. Sed de Amomo aliàs longè plura.

Amomi que pars accipiendâ.

Azarum.

Amomi loco substituitur Azarum à Collegio Florent in antib. Turnero, Borgaruco, & Monachis in Mesuem dist. 1. cen. 23. quos ridemus meritò quòd substituant Azarum purgans medicamentum, pro non purgante, in quo magnum facultatum discrimen. Anmadvertendum tamen ab Adolpho Oceone in Bened. lax. Nicol. pro Amomo tolerabilius substitui Azarum, cum compositio fit purgans, quàm in aliis compositionibus non evacuantibus.

Sabina.

Porro ab Avicenna pro Amomo poni Sabina duplum planè displicet, in gratarum medicamentum & parè fætidum pro odorato.

Cubeba.

Pro Amomo substituantur Cubebæ à Cordero, Placotomo, Turnero, & Borgaruco. Turnerus tamen deficiente vero Amomo uti posse putat Carpesio, quod quibusdam Cubebarum nomine notum sit.

Ammi.

Avicenna Amomi loco supponit Ammi quasi duplum, ut & Fuchsius in antiball. pro Amomo substituit semen Aneos, in Aurea Alex. & in Benedicta.

Caryophylli

A nomi loco præstatih Caryophyllos substituit, qui longè præstare videntur auctore Matthiolo, quod & ipsum Gesn. in Hedychroi passillis non improbat, & nobis præceteris antiballomenis summè placet.

AMOMVM QVORVNDAM odore Caryophylli.

Amomum Lusitanorum Deser.

Clariss. Paludani munere missos fructus inscriptione Amomi verui Lusitanorum adseruamus. Eisdem anno 1605. attulit ex Anglia Cherlerus. sine nomine, datos ut censemus à Iacobo Gareto. Magnitudinem autem variat: quidam namque piper æquat, quidam etiam duplo ferè major est: omnes sunt cortice fusco, rugoso, umbilico, summo tenus, non quo parti adhæserunt, præditi, quadripartito. Vnum vel duos continent nucleos nigros atrovirente membranulâ tectos, qui intergerino pariete disperseuntur. Totâ sanè fructus figura externa pulchrè Mali Granati, colore excepto, respondet. Sapore est acriusculo, aromatico, ad Caryophyllos accedente. Manifestè differt ab Haermia Serapionis, ut conferenti apparebit: inter cæte-

Mali Granati fructu.

AMOMVM NOSTRVM EX ipso fructu.

Sapor.



riophyllos accedente. Manifestè differt ab Haermia Serapionis, ut conferenti apparebit: inter cæte-

ras notas, huic non adsunt pulchritudine striæ. Nos curavimus ex ipso fructu pingendum.

Garofalo Pliniano, semen aromaticum, inquit Imperatus, adfertur per Lusitanos, magnitudinis pipetis nigri communis, odoris & saporis Caryophylli aromatici, odor tamen vetustate evanescit: Neotenci vocant nomine Indico Negunda: multum convenit cum descriptione Caryophylli apud Pliniam. Et hæc ille qui alibi vocat Caryophyllum Plinianum, aroma nuper delatum ex India. Dnos autem pingit fructus, & secundo loco Haermiam nostram.

Amomi descripti Clusius exot. l. 1. c. 17. iconem & Deser. Clusii

AMOMVM CLUSII.



ad me Londino lac. Garetus anno 1601. fructum orbicularem, pipetis grano plerumque majorem, nonnunquam etiam minorè, rugosum, fusci coloris, satis fragilem, qui apertus semen continere deprehendebatur rotundum, nigrum, in hinas partes scissile, non minus aromatici odoris & saporis quam ipse fructus, atque aromaticos Caryophyllos quodammodo referentis: botri autem in modum nascitur, ut ex multis granis, quæ petiolo

los fios adhuc retinebant, & binis ternisque granis uni ramulo inherentes conjecuram facere poteram: his adjecta erant folia, unius quidem formæ, sed magnitudine valdè differentia: nam quædam septem uncias erant longa, tres lata, nonnulli quinque duntaxat uncias longa, duas cum semisse lata, alia trium unciarum longitudinem non excedebant, & vix duarum latitudinem attingebant, quæ etiam iis longè minora & angustiora præsertim quæ cum granis permixta reperta fuerant, pro loci quem in ramis aut ramulis occupaverant ratione: nulla autem inter illa repertæ ferratas haberent oras sed æquales omnia, & multis tenuibus venis, à nervo folia per longitudinem fecante, in latera obliquè excurrentibus, prædita, eorum mucrone nunc angustiore, obtuso tamen, nunc latiore & quasi orbiculato, cineracei & ex spadiceo coloris, & satis actis saporis: ramuli qui additi fuerant, tenues quadranguli, cineracei coloris cortice tecti, anno uni videlicet, qui verò postea nati, spadiceo, retinentes adhuc vestigia ubi folia adhæserant, quæ ut plurimum, ex adverso nata esse demonstrabant, & illi etiam acrisusculi saporis, perinde ac folia nec ingrati odoris. Additum præterea erat radicis cuiusdam fragmentum cubitalis longitudinis, à nautis quos ex India redisse sensiebat, relatum cum prædicto fructu & foliis: intelligebat autem ab aliis fragmentum illud ab arbore, sive frutice folia illa & fructum ferente, recisum: ejus materia valdè dura & firma erat interna parte alba, externa & sub cortice latente, fusca ob vetustatem forsitan: erat autem gemino cortice tectum, interno quidem satis denso, fusci que coloris & acris saporis, interno verò breviorè, ex cineraceo flavescens coloris (quem ex argillacea terra in qua planta nata contraxisse vetustate est) acerrime

Color & Sapor.

Radicis quædam.

rique

simique saporis. Eam porrò radicem multis tenuibus fibris firmatam fuisse, quædam adhuc in harentes, & aliarum, quæ abruptæ, vestigia apparentia satis innuehant. Ipse autem Garetus adscribebat, se, licet omni diligentia adhibita, ut nautas qui hæc attulerant convenire posset, ad percontandû in qua provincia legissent & an nomen atque facultates ab incolis intellexissent, illos nunquam invenire potuisse. Similem autem fructum, petiolis tamen carentem, aliquot annis ante accipere memini, additâ ejus, qui mittebat, interrogatione an Amomum: Et certè huic fructû sunt facultates Amomi, quod Dioscorides nobis proponit, facultatibus non valdè dissimiles: etenim calfaciendi, adstringendi & exsiccandi vim habet, & reliqua præstare posse arbitror, ad quæ Amomum utile esse Diosc. l. i. scribit: aliquot tamen notæ, iis quas Diosc. suo Amomo tribuit, non respondent, veluti folia quæ Bryoniae foliis dissimilia, radix crassior, quàm ut fruticis videri queat, tamen in quibusdam fruticibus nec minores, nec minùs crassas, quàm hæc sit quæ missa mihi, observare meminerim, ut in Cisti plerisque generibus & quibusdam aliis. Sed iudicio iis relicto qui in his rebus sunt me penitiores, & magis exercitati satis officio me perscrutatum existimabam. si eam quæ de fructu, foliis & ramulis & radice observabam benevolentiori proponerem. Cæterum hanc exoticum fructum diligentia considerans, primarias quasdam notas reperio, quæ me plurimum movent (proferam enim ingenue quod sentio (ut Plinij Caryophyllon esse censei possit. Nam is l. 2. cap. 7. postea quàm de Piper egit, hæc subjicit: est etiam in India piperis granis simile quod vocatur Caryophyllon, grandius fragiliusque. Tradunt in Indico loco id gigni. Advehitur odoratis gratiâ. Tamen brevis hæc sit & succineta descriptio, nec ulla facultates fructus ipsius continet, habet tamen insignes notas, quæ cum iis, quas fructus tamen lectoris oculis sub jectio possidet, collata, valdè similes deprehenduntur, velut comparatio cum piperis granis, illis tamen esse grandiora fragilioraque, ut plerumque hæc sunt grana, licet etiam parva reperiantur. odor gratus, & ad Caryophyllos aromaticos, qui nobis in usu, valdè accedens, cujus gratiâ Plinij tempore adferrebantur. Et certè hunc fructum manducatum, oris haliuam gratiore reddere comperiebam: ad multos præterea alios usus utilem fore credibile est, si quis periculum faceret.

AMOMVM NOVVM CARDAMOMI vulgaris Facie, sive Indiæ racemus.



Amomum novum, nobis primum demonstratū est per fratrem C. Bâubinum, quod est instar uvæ. Ejus autem dedit duos folliculos Cardamomi minori accedentes, & femina continetes Cardamomi minori paria, ejusdemque cum meis saporis & odoris. Eam uvam exprimit Clusius

in exot. Aucluario: de ea autem scribit sub titulo Anomi spurij, quæ sequuntur. Anno Christi 1605, mittebat ad me Ioan. Pona, plantæ cujusdam aliquot fructus uvarum instar confertim in ramulo aatos, & aromaticum quidpiam redolentes, Tom. II.

quos pro legitimo Amomo sibi datos scribebat: atque ad eam opinionem Plinij autoritate confirmare nitebatur, qui l. 12. c. 13. Amomi & Amomidis mentionem faciens, subjicit; simile his & nomine & fructe, Cardamomum, semine oblongo. Verùm quidem est singulos uvarum quos accipiebant fructus, aliquam cū minore Cardamomo, in officinis vulgè recepto, similitudinem habere, certè uterq; fructus triangularis est forme. At Cardamomi vulgè recepti theca oblongior est, & minùs crassa, multisq; striis distincta femina continens crassiuscula, Melegueteæ seminibus non valdè ab familia, odorata, subrusti coloris, nec ingrati saporis, licet acriusculi: ejus vero fructus qui pro Amomo missus, theca brevior, crassior & candidior est, nec ad eò striata, feminaq; continet tenui membranâ involuta, nigra, oblongiuscula, duplo quàm minoris Cardamomi femina majora, splendentiaque & valdè dura, albâ quidè medullam continentia, quæ acrimoniâ quandâ tandem exerit, sed nullius amaritudinis participem atq; in super tota uva cum suo fructu nativum odorem habere non videbatur, sed ascititium potius & olei Lavendulæ odorem quodammodo spirabat, quasi illo delibuta fuisset, vel certè apud simile oleum adservata.

Antiqui utebantur uvâ Amomi ut apparet ex Plin. l. 2. c. 13. Amomio & Galeno in Catageni medicamento Asclepiadis *Βότρυς Αμωμίου* [Αμωμίου φύλλον] in Theriaca Andromachi senioris *Βότρυς Αμωμίου* [Αμωμίου φύλλον] racemosi Amomi. Nescio (Cerch. Martin. loquitur) cur Matthiolus dicat, sibi non costare Dioscoridem semen in Amomo approbasse; ego contrariū invenio in Anazarbeo, & meliortè partè Amomi esse fructum similem racemis parvarum uvarum: ait enim deligito recens, seminis plenû, uvis parvis simile, grave: celebrata igitur ab antiquis uva Amomi & non lignû. Meû Amomû nuper missum per M. Cerchinum Martine. ex Malaca civitate Indiæ, habet multa grana simul juncta, quæ referunt parvâ uvæ racemum &c. Plinius Cardamomû cū Amomo confert unde apparet affinitas magna, nò solû nominis, sed formæ & figuræ ac etiâ virtû: cū ratione dixit Pena. Nò parû affinitatis esse Amomo cū Cardamomo. Si Antiquitus magis erat notû Amomû ut diceretur qui novit Amomum, statim novit & Cardamomum: hodie dicendû è contrariò: qui novit Cardamomû statim novit & Amomû: Cardamomû enim nihil aliud est quàm Cor Amomi ut nominis Etymologia ostendit: Meû Amomi racemû existimarunt aliqui esse speciem Cardamomi, nò cõsiderâtes Cardamomû nò proferre grana, in racemo, nec rotûda sed lōga. Nostri Amomû habet omnes notas quas in Amomo Diosc.

requirit. Probat hoc Colleg. Med. Venetorû cū dicit, Amomû præsentatum per D. Cerch. Martinellum Aromatatum ab Angelo 15, mensis Septēbris 1604, habeatur pro vero & legitimo Amomo, ac in cõfect. Theriacæ ac Mithridatij, cæterisque medicamentis adhibeatur. Rejicit autè Libellus contra Cerch. Martinellum incerti aitoris, ohlatus Pharmacop. Mantuanis dicens: Deberet explodi hoc novû Amomû ex omni benè instituto pharmacopolio & ex tota Italia: nullo enim modo convenit cū descriptione Diosc. & aliorum bonorû authorû: Nicol. Stelliola contra opinionè Patavinorû in suo libello de Theriaca & Mithridatio, secutus opinionem Matthioli & Marathæ dicit Diosc. describere plantam & notas ligni Amomi & non feminis, unde concludi vult lignum non semè aut fructû Amomi usurpandû in medicamentis: quod ex Diosc. verbis apparet, Plinij autoritas est suspecta cū nullus sit ex antiquis vel neotericis qui certè affirmat Amomum nasci in India; quin imò Garzias scribit falsam esse eorum opinionem qui dicant nasci Amomum in India, ita ut existimandum sit aut Plinij non benè cognitum Amomum.

Amom.

es.

Caryophyllon.

or.

oris hæc.

omium

iam

is.

Plin. l. 2. c. 13.

Amomio.

Asclepiadis.

Βότρυς Αμωμίου.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

Αμωμίου φύλλον.

num: præterea ejus verba demonstrant diversum esse à Diofco. Amomo, ita ut quilibet possit judicare quantum valeat auctoritas Plinij ut prober ut edum uvâ Amomi & non ligno. Si Galenus intellexisset Amomi fructum aut semen, dixisset καὶ τὸ πρὸς Ἀμώμῳ aut Στρυγίῳ, licet 14. ultimi libri de comp. med. per gen. scriptum sit Andernaco interprete Amomi uvæ, malè tamen id factum, ut etiam libro 1. Antid. ubi idem nomen Στρυγίῳ malè interpretatur per vocem uvæ, in eo etiam reprehensus fuit à Fuch-
 Martinell. sicut.
 siat.
 Ruell. re. prob.
 Racemus ex Malaca delatus non convenit cum Amomo.
 unde delatum legitimum est nomen.
 Collegij M. Veronensis sum con-ferens.
 mum: præterea ejus verba demonstrant diversum esse à Diofco. Amomo, ita ut quilibet possit judicare quantum valeat auctoritas Plinij ut prober ut edum uvâ Amomi & non ligno. Si Galenus intellexisset Amomi fructum aut semen, dixisset καὶ τὸ πρὸς Ἀμώμῳ aut Στρυγίῳ, licet 14. ultimi libri de comp. med. per gen. scriptum sit Andernaco interprete Amomi uvæ, malè tamen id factum, ut etiam libro 1. Antid. ubi idem nomen Στρυγίῳ malè interpretatur per vocem uvæ, in eo etiam reprehensus fuit à Fuch-
 Martinell. sicut.
 siat.
 Ruell. re. prob.
 Racemus ex Malaca delatus non convenit cum Amomo.
 unde delatum legitimum est nomen.
 Collegij M. Veronensis sum con-ferens.

inter species Cardamomi, vel demum nova plâta existat, pifcus viris proflus incognita. Verù necessariù esse duxi, hujus descriptionè, antequàm ad ipsam expositionè accedâ, præmittere. Amomû igitur Indicû ejus descriptio nem facimus, nò est integra plâta, sed fructus: cujus etiâ exhibemus iconè, exprimitè naturâlè Amomi magnitudinè. Est autè patvus racemû, abiq; pediculis ex unico sarmetò enatus, sibi ipsi ar-ctè coherens, & convolutus in uvæ modum, còstâs, denis, aut duodenis ad summû acinis, seu folliculis, fibrosis, se mutuo còpimentibus, tâquâ de còmuni loco inter se decertâibus, ad eò ut sibi invicè patvas cavitates imprimât. Racemum sustinet lignû teres, pollicari lógitudine, fibrosû, odoratû, ac tē, foliis còstertim exornatû, tû pullis liguimârû serie distributis, quâ parte folliculorû est ex pter, tû lógioribus foliis, lenis singulos folliculos ambiëtibus, quâ vicem quandâ præstât calycis illius, què in Nucè Avellana còspicimus, ex lógioribus foliis tria quidè còstât lógitudine semunciali, tria verò paulò breviora sunt, eadè folia tenuia sût, fibrosa, acria odorata: sed quæ privatim folliculos còplectûtur, æmula sunt foliorû Mali punici, suis cacuminib; sèpè còtâcta, rarò integra, ut vix extra Amomi acinos emineât, q; evenire credèdû est, quia mutuo attritu foliorû laminitates còstringûtur in lógissimo itinere. Acinorû crassitudo, & figura orbicularis existit, qualis mediocrius uvæ acini, ornâtur folliculi Amomi externis tenuissimis filamētis, seu nervis quasi lineis per longitudinè ductis, ternis etiâ præditi sunt parvis sulcis, totidè quæ interpositis exiguis emineëtis, quæ triplicè internorû seminû ferè circûscribunt, singulos folliculos replèt tres semina eadè solida quidè sût, sed frâgibilia, nò frâctu còtumacia, ut Cardamomi semina. Racemo odorine validus, sed dâpèr, ingenitus verò, nò alci-
 Color racemi & ligni.
 Odor racemi.
 Interpretatio serborum Diofco. & Maronea.
 Interpretatio serborum Diofco. & Maronea.
 Est sicuti uvæ racemû. Στρυγίῳ seu racemû significatio apud Græcos duplex videtur, una còmurißima, quæ

ante citatis ac etiam ex aliis: Quodnam sit Amomum Armenicum considerandum.
 Nic. Maronea Veronensis Philof. & M. Doct. in cò-
 mèt. suo de Amomo inter alia hæc habet. In juria tē-
 pōrû Amomi notitia deperdita est seculisq; nò nul-
 lis Amomû latuit ad nostra usque tēpora, quibus A-
 momi uvâ denud in lucè prodiit operâ & industriâ
 cgregij & honestissimi Viri Cerchini Martinelli qui
 ex remotissimis Indiæ regionibus verû & legitimum
 Amomû ad nos tranßiit, sanè hoc idè Amomû tâ-
 quâ legitimû, nostrû Medicorû Veronensium Colle-
 giû agnovit & multi alij viri doctissimi amplexati sunt.
 Verùm, quia diversa sunt hominû ingenia, fuerunt
 aliqui, qui editis scriptis Indicû Amomû, tanquam
 spurium repudiarent. Idcirco decevi Amomi Indici
 patrociniû suscipere, ipsâ scilicet veri veritatè, atque o-
 stèdere Indicû racemû esse ipsorû veterû legitimum
 Amomû: quo usus est Io. Pona in còponèdis suis an-
 tidotis, Mithridatio & Theriaca, quia illû admisi, tâ-
 quâ legitimû, quo tēpore Collegij nostri nomine, ego
 unâ cû exc. viro Jacobo Dionylio præfui ejus re-
 censendis Antidotis, quæ publicè parabat. Sû autem
 explanaturus Amomi historiam [Nos integrum nò po-
 nitimus, sed hæc maxime faciètia tâtum depr. minus] quam
 Diofcorides & Plinius nobis scriptâ reliquerûnt, quò
 perscrutari quilibet possit, nû Racemus ex India al-
 latus, possideat notas veri & legitimi Amomi, an ve-
 rò, ut recentioribus placet, idè racemus referèdus sit

que comprehendit omnes fructus racemolos. Altera significatio denotat non univcrsum genus racemorum, sed illorum quandam notissimam speciem, nempc racemum uvæ: Hanc significationem cognoverunt Marcellus & Ruellius, qui nomen *Επιρρυον* exposuerunt ut uvæ vel uvæ racemum, quæ inter se non differunt. Recentiores autem aliqui hanc *βήρυον* significationem ignorarunt cùm Ruellium reprehendunt, tãquam malè interpretantem hanc vocem *βήρυον* nomine uvæ, qua in re suam prorsus patefaciunt inscitiam. Veteres sanè Amomi fructum existimaverunt esse racemum. Dioscorides declarat Amomi racemum similitudine seu exëplo ipsius uvæ.

Ex ligni] et si ligni nomen significare possit & integrum Amomi fruticem & singulas illius partes, nepe stipitem, ramos, surculos, nihilominus tamen hoc loco denotat tenue farmentũ, cui uvæ coheret.

Convolutus in se ipsum *Αμωμὸς ἐστὶν ἐν αὐτῷ*] sensus verborum est Amomi fructus est similis illi uvæ racemo, qui est in seipsum convolutus seu complicatus. Verùm racemus ille dicitur complicatus in seipsum, qui a contrariis omnibus locis libet coheret & convolvitur: sunt verò loci differentie contrarie, ante, retrò, sursum, deorsum à dextris & à sinistris.

In seipsum *ἐαυτῷ*] Vox relativa nostram confirmat expositionem, vocem convoluti referendam esse potius ad proximum substantivum racemum, quàm ad remotiorem fructum vel fruticem. Recentiores iniquiunt Diosc. de scriptis plantam convolutam, sed Indicium Amomum est racemus convolutus non planta, quare non est Dioscoridis legitimum Amomum: patet solutio dubitationis ex Diosc. & Plinio, quia uvæ ipsa convolvitur non planta. Recentiores negantes Indicium racemum esse convolutum & sensui adversantur & vocis significationem non rectè accipiunt, si enim ex Plinio uvæ convolvitur, cur Indicis racemus uvæ similis nõ convolvitur etiã?

Enimvero recentiores hallucinati esse videntur, in hac voce convolutus, tanquã significet Amomũ alicui rei esse convolutum. Recentiores Indicium racemũ, illegitimum Diosc. Amomũ dicunt, quoniam ramulo adhæret herbaceo potius quàm lignoso, cùm idem ramulus flexibilis & venosus appareat: Sanè verissimè asserunt Amomi Indici pediculũ flexibilẽ & venosum, sed nõ inde sequitur eundem ramulũ esse herbaceũ. Duplex est lectio vulgaris, una quidem que Greci ex plaris seriem sequitur, altera verò est Latinorũ interpretũ qui pertubant ordinẽ verborũ. Lectione vulgarã nõnulla absurda cõsequuntur, si fruticẽ exponamus plantã expertẽ fructuum Diosc. dupliciter errat. Sed quia Recentiores vulgarẽ insequentes lectione existimant Dioscoridẽ declarare Amomi plantã, exemplo ipsius uvæ, illorũ partes erant ostendere etiã alia Dioscoridis loca in quibus plantas ipsas cõparatione fructuũ illustravit. Adhuc uvæ exemplũ inceptũ est ad exprimentũ fruticem. Recentiores autem quandam excoGITARUNT similitudinem cõmunem Amomi plantæ & uvæ racemo quam vocarunt cõnexionem seu adhærentiam partium tum fructus tum uvæ. verũ est similitudo tenuissima, indigna prorsus Diosc. diligentia. Latinitorũ interpretũ lectio (Amomũ exiguẽ fruticẽ ex ligno se cõvolvens in uvæ modũ) pluribus de causis repudianda, sensum Diosc. immutat, obscura est. Errarunt recentiores illi qui rupe adversus Indicium Amomum scripserunt: si quidem illi vocem *βήρυον* in amplissima significatione racemi acceperunt, hoc pacto legentes: Amomum est parvus frutex in seipsum convolutus veluti racemus. Ex hac lectione sequitur falsum & impossibile.

Hæret autem *ἡ ἄνωμο πρὸς τὴν ἑλκὴν ἢ τὴν ἀλβὴν*] *ἢ τὴν ἑλκὴν ἢ τὴν ἀλβὴν*] Ita Diosc. coniungit florum & foliorũ descriptionẽ ad antecedentia ut nemo inficiari possit, quin antea Amomi fructũ figuraverit, quẽ admodũ nos exposuimus. Verissimè est foliorum & florum Amomi historiam Dioscoridẽ accepisse potius ab aliis scriptoribus quã a quodã Amomi flores & folia ipsemet unquam viderit.

Optimum est Armeniacum.] Dignũ inquisitione an Amomũ nascatur in Armenia, Ponto: causã debetandi quia Theophr. antiquitũs adnotavit, odorata partim ex India, & Syria advehĩ, indèq; mitti ad mare, partim ex Arabia deportari. Ad hæc scribit Plinius Amomum in India provenire. Quibus accedit Dioscoridẽ persèpẽ exoticatũ plantarũ suas ignorasse regiones. Verissimè esse puto Amomi plantã indigenã Indiæ esse, ex qua olim deferebatur primũ in Sinum Persicũ, mox in Mediã, Armeniã, Pontũ importabatur, inde verò in Græciam & Italian pervehiebatur. Equidem censeo si Amomum in Media, Armenia, Ponto nasceretur haud difficile esse, hoc tempore ex illis regionibus illud exportare. Secunda fidei dubitatio an tres sint Amomi species, vel potius sint tria individua sub unica. *Quid autem ad auri color.* *colorem inclinat, habetque lignum subcirrum*] *ἡ χρυσοειδὴς ἔχει* non significat ipsummet auri colorẽ prædictum esse, sed ad auri colorẽ inclinare: sanè ejsmodi color esse videtur medius inter album & aureũ, quem Plinius pallidum, atq; secundã bonitatis vocat: ligni nomen intelligendum est tenue farmentũ, cui racemus hæret. *Subcirrus*] color, *ἡ χρυσοειδὴς* magis ad fuscũ vergit quàm subaureus. Quod Diosc. Armeniaci Amomi nomine non intelligat fruticem, sicuti recentiores aliqui opinantur, non est difficile ostendere.

Odoratum valde] *ἡ ἄνωμο ἵκεται*] Theophr. lib. de odor. Odoribus, vero Amomo tribuit odoris vehemẽtiã his verbis: vehemẽtiora parcius adhibent ut Costum & Amomum. Sanè Indicũ racemum vehemẽter nares excitare, verissimũ est, quãvis aliqui Recentiorũ id ipsum negare nõ erubescãt. Sed Medicũ, quia in capite, stribus & aquosis locis nascitur, invalidũ. *Magnus* & *subviridis*] cũ recentioribus Medicũ Amomum subviride exponamus fruticẽ, ista coloris subviridis observatio in ipso frutice erit prorsus plebeia & indigna herbatio, racemo est adhibẽdus, cui Plin. etiã tribuit. *Et ad tactũ molle* *ἡ ἄνωμο ἵκεται*] lignũ sunt ramuli, qui ipsos racemosos fructũs ferũt. Medicũ Amomũ venosũ est nõ suis fructibus sed lignis, imo suis fructibus est ad tactũ molle, seu fragile: fragile autẽ & venosũ sibi adversatur. Patet Dioscoridẽ de racemo non de frutice loqui, nã si frutex venosus erit, sicuti plerũq; interpretes exponũt, quid erit ad tactũ molle seu fragile nihil prorsus. *Odore ad origanũ inclinat* *ἡ ἄνωμο ἵκεται* *Odore origanũ* *ἡ ἄνωμο ἵκεται* non denotat odorẽ Origani, sed us, quod accedit ad Origani odorẽ, inter racemos Indicos nullũ adhuc observavimus subviridem. *Cur Nicot.* *Marum* *ἡ ἄνωμο ἵκεται* interpretetur ad *Origanum* inclinate nescio, significat enim ad *Rut.* inclinate.]

Ponticum *ἡ ἄνωμο ἵκεται*] *subcirrum*] cirrus color ex ruffo & rubro commixtis enascitur, sed subcirrus ex pallido & cirro fit. Ex Indicis aliquos observavimus subcirros, eodẽq; cæteris præstantiores cũ odoratiores sint & graviores. Color subcirrus est racemo assignandus non frutici, præfettum cùm Plinius colorẽ ruffum racemis tribuat, nõ frutici. *Non longum*] Si Medicũ Amomi racemus magnus est, est etiã longus: Huic Diosc. opponit Ponticum, non longum, de racemo autem loquitur, non de frutice.

Neque fructu contumax] Ponticum Amomum non est fructu contumax, veluti exempli gratia est *Cardamomum* fructus: mediam obtinet conditionem inter duritiẽ Cardamomi & Medicũ racemi fragilitatẽ. *Racemum sicuti herisodas*] Ponticũ Amomum est racemosum, quia uvæ effigiem habet non racemi, tãtum cõmuniter sumpti. Amomũ racemosũ significat fructum, non plantã ut perperam recentiores scribunt: *Recent. err.*

verum quia negarunt Amomū racemosum esse fructū effugit urae pradium, sed scripserunt esse plantā suam racemo: ipsorum partes erant, suam confirmare expositionem, Dioscoridis testimonio.

Carpor & sperm. Diof.

Fructu plerumq Si Amomum Ponticum est racemus, sicuti docuimus, inde colligitur eundem racemū ex acinis seu folliculis constare: qui intra propriā cavitatē si uclus aut semina continet. Falsū est solū Amomū Ponticū esse fructus plenū, namq; & Armeniaci Amomi racemus debet esse fructus plenus cū optimus existit Dioscoridis testimonio. Dioscorides parum videtur esse constans in usu vocū *καρπός* & *σπέρμα*. Hoc in loco obijciunt Viri docti, si Dioscorides nō de Amomi planta sermōnem habet, sed de fructu Pontico, quem dicit esse fructus plenū, propositiōne esse nugatoriam, cū unū idēdem sit subiectum atq; prædicatū, fructus est, fructus plenus, facillē diluitur obiectio ex fructus & seminis significatiōibus. Namq; subiectū est Amomū Ponticū, seu racemus Pōticus, qui ex pluribus fructibus, seu folliculis constituitur. Sed prædicatū rationem habent interna semina angulosa, quæ in eisdem folliculis continentur. Falsum ergo est quod assumunt recentiores, idē esse in propositiōne subiectum & prædicatum.

Recentiorū falsitas.

Odor an scitius.

Odor scitius, feruens Homines recentiores qui Indico Amomo infesti sunt, racemi Indici suavē validūque odorem suis scriptis extenuant, tanquam ascitium. Opponimus testimoniū ipsorum sensuum. Quasi verit jure quispiam, quibus permoti cōjecturis putaverint quōd Amomo odor ascitius. Recentiores frustra inquirunt, num Indici Amomi odor existat in ejusdē penicarpus vel in feminibus internis: cum Diof. ipse collocaverit in racemo toto.

Colores.

Substrubris color.

Subruber

Eligito autem recens & album vel subrubrum Amomi color albus & subrubrus ipsius racemi existit, nō fructus, nāq; & Plinius eosdem colores racemis Amomi assignat. Omnes colores quos Diof. observavit, nos præter ipsū subviridē in racemis nostri Amomi observamus: verūm hōc colorē nos observatos fuisse à recentioribus illis vitis, qui Amomo Indico bellum indixisse videntur, facillē crediderim. Subrubrus autem color esse videtur is, quem Diof. supra vocavit tuberrū: albus verò color Amomi nō videtur esse simplex, sed remissior ob admixtā exiguam fuscedinem: si tamē de Veterū Amomo licet iudicium facere ex nostris Indicis racemis, quorū illi qui albi existūt, ita sunt albi ut ad colorē cineritū aliquatūlū vergant. Quod spectat ad colorē albū quē Diof. parē bonitate cū subrubro facit dicendū est vel codicē Græcū esse corruptū ut Marcel. Virg. suspicatur, vel Dioscoridem adversari Plinio, qui pessimū esse candidum affirmavit, vel voce candidi intelligendū esse racemū subaureum, quē Plinius pallidum dixit: verū si lectio depravata est vel expungenda sunt duæ voces (albū vel legendūq; non albū sed subrubrum.

Diof. text corruptus.

Adulterata racemata.

Non coactum vel coactum ut est adulterata racemus qui constat acinis seu fructibus, qui est à suo ligno aliās avulsi sã fuerint postea tamē gūmi liquido in unū factū racemū, conglutinati adeò fuerūt, ut unū continuū & solidū cornus præ se ferant potius q̄ racemū ex pluribus acinis constitutū. Suspiciari licet, si in Græco codice fortasse desiderari aliqua verba, quæ significat ipsū Gūmi liquidū, quo racemū Amomi adulterari Plinius scribit. Verū recentiores, qui Ruellij interpretationē sequētes existimāt, optimū Amomū, nec attritūm coherere, neq; esse cōvolūtū d. cipiunt. Nō cōdū vel cōnexū (scil. gūmi liquido ex Plinio addēdū est Marcel. Virg. libeter assētirer, verba isthæc esse expūgēda, nisi ex Plinio haberem? vaide p̄ticiū expositionē modō enarratā.

Recentiorū error ex Ruell. Serfione.

Diof. lectio corrupta.

Solutum & diffusum Diof. legitimū racemū denotat, qui cōstitit acinis ab uno sarmento enatis, se quēdē cōtūctibus, nō verò conglutinatis in unum.

Diffusū & solutum sunt voce: polyonyma, quæ excludunt cōtūctū, & cōglutinatiōem minime verò nomē diffusū significare potest diffusū inter eisdē Amomi fructū u. Recentiores scribūt, q̄ exponūt pars.

Recentior error.

Semius plenus Græcis autoribus plures fructus & seminis significatiōes sunt, sed hoc in loco semē id significat, quod in penicarpus cōtinetur. Amomum plenū est ipse racemus, cujus folliculi acinosi continent semina multa & perfectā, quæ totā eorundem folliculorū cavitatē replent. Recentiores proficētur Veteres Medicos solā Amomi plantā semper usos fuisse, negasse verò fructus & semina ejusdem Amomi, tanquam inutilia, sed non satis est affirmare, nisi etiā ex classicis autoribus id ipsum ostendatur.

Recentior error.

Barryd.

Simile parvis uvis Recētores cū videant nomen uvulę vel racemū admodum sapere Indico parvo racemo, cujus acini d. nos aut duodenos ad summum non excedunt, negant Dioscoridē dist. se unquā Amomū eligēdū esse simile parvis uvis aut parvis racemis, sed res est luce meretriciana clarior, β. q̄dē significare parvā uvā vel exiguū racemū. Verū si Diof. in præsentia eligit Amomū plātū ut placet Recentioribus, illa non potest esse similis parvæ uvæ. Diof. voce parvi excludit Medicum racemum magnū quem (ut potē in validum) antea repudavit. Recentiores novā assēturit expositionē verborū Diof. Eligit Amomū plenū femine simili parvis racemis. Sed ejusmodi expositio statim apparet falsa: siquidē seminis vox, q̄ est le cōdi casus, regitur à voce plenū, & connecti non potest cū simili, q̄ est quartus casus, quæ propter expositio cōmunitis retinēda est, q̄ ait, Eligit Amomū femine plenū, simile parvis uvis.

Barryd.

Recentior error.

Recentior error.

Grave Recentiores qui Amomū Indicum reprobant, tanquam illegitimū, quia grave non sit, in eadē re multiplex peccant, nam & sensui contradicunt & una simul confundunt signa Amomi tū legitimi tō optimi. Demū Amomi gravitatem faciūt absolutam, cū tamē sit cōparativa, quæ dignosci nō potest, nisi plures Amomi racemi invicē cōferantur.

Recentior error.

Recentior error.

Valde odoratum Tantū racemus Indicus odoris fragrantī pollēt, ut racemus quē jam multos dies aqua servētū maceratum, postea exsiccavimus, suam quandā nativam suavē volentiam spiritū quam obrem ignoro quid compulset Recentiores ad negandum validā nostri Amomi scībū scībū ipsi exponit.

Recentior error.

Recentior error.

Sine acie & acra Errant Recentiores inquirētes acrimoniā Amomi in ejusdē paruculis, quārū per se nullus unquā fuit usus, nēpe in solis folliculis, vel in solis seminibus: siquidē veteres toto utebāt racemo.

Recentior error.

Recentior error.

Gustum mordens Eligit Diof. quo excludat Medicū Amomū invalidū. Recentiores racemi femina gūmū mordere negant, sed hæc in re dupliciter errāt, & quia negāt nō sensibus aperitissimā, & quia racemi acrimoniā absolutam faciunt, non comparativam.

Recentior error.

Recentior error.

Simplex & acrimonia Color varius in uvis tūc existit, quando in uno & eodem racemo acinorum hic viridis apparet, ille purpureus, vel quādo idēmet acinus ita existit. Sanē variū hunc colorē ignotū Recentioribus, in quibusdā Indicis racemis Amomi nos observavimus. Diof. hoc loco racemum ipsum describit, non totam Amomi plantam ut Recentiores opinantur. Varius autem color imperfectæ maturitatis est notus, ut in uvis ipsius postulum observare.

Recentior error.

Recentior error.

Adulterata verò aliqui Amomum istud vocant. An p̄ticiū similē existētia Amomo, modico autē & sum. An p̄ticiū vō ab ipso vō p̄ticiū d. cipiunt. Omnes expoltores Amomi tribuūt esse inodoram & sine fructū, nō ipsi Amomo, verū iam ipse verborū cōtextus ostendit eadē voces adjectivā, connectendas potius proximiori substantivo Amomo, quā remotioni Amomidi. Deinde cūm Amomi vox multiplex sit, quæ significat plantam absque fructibus & plātā fructibus onustam, atque fructum racemosum similem parvis

Recentior error.

Recentior error.

uvis

uvis : Amomo inodoro & sine fructu, hoc est, Amomo immaturo ut Plinius etiam scribit.

Quæ nascitur in Armenia, florêntque habet seminem Origano] Sulpicamus quoddam noster auctor de Amomide scripsit, potius quæ apud auctores legitur. Amomi plantam Dioscoridi solo auditu fuisse cognitâ, non autem oculatâ inspectione compertam nobis suspicandi occasio: quod verò ex veteribus herbariis aliqui Amomum describentes plantam integram cum sua radice figuraverint, apud Plinium locum monstrabimus.

Operet autem huiusmodi probationibus fragmenta vitæ. Eligito autem quæ ab una radice habent surculos integros] Amomi radix non est utilis ad compositiones, quoniam radicem Amomi apud Veteres Medicos nulla unquam mentio habetur. sed radicis mentionem facit Diosc. ut manifestum faciat, ipsas plantas integras, suisque radicibus coherentes, non esse expositas dolis & fallacis. Recentiores ex incertiori Amomidis descriptione student confundere & perturbare certiorum & dilucidiorum notitiam legitimi Amomi racemosi. Hæc ex Maronea in Dioscoridem dixisse nobis sufficiat.

Offendit porro Maronea Plinium de Amomo verè scripsisse & consona iis, quæ Dioscorides de Amomo tradidit: quinetiam aperte monstrat, Indicium racemum omnibus Amomi Pliniani notis insigniri: præterea comprobat, Plinium in describendo Amomo fuisse diligentem & dilucidiorum ipso Dioscoride. Nos ex Maroneana explanatione in Plinium, quædam tantùm adscribimus, plura desiderantem ad ipsius Maroneæ commentariorum relegantem. Sciendum itaque est, quod quando Plinius dicit: *Amomi uva in usu est.* Amomi nomen significat plantam ipsam, eiusdem verò plantæ fructus, dicitur uva Amomi. Recentiores qui Ruellio vitio vertunt quod Dioscoridis vocem *βόρυξ* & perperam exposuerint uvam cum significet racemum, eisdem erroris etiam Plinium ipsam tacitè reprehendunt. Amomi uvam intelligit Plinius racemum, qui refert imaginem uvæ. Recentiores qui Plinium in Amomi frutice describendo ancipitè vident, inde colligunt, eundem auctore etiam uvam Amomi ignorasse, admodò fallaci argumento ducti.

Indica vite Labrusca,] Aliqui ex Recentioribus reproba verunt Plinij de Amomo historiam, quia illa admodum fævet nuper invento Amomo. Garzias autem audiendus non est qui Amomum in India nasci suis scriptis negat: non credendum est vel Garziam omnes Indiarum vastissimas regiones petragrasse, vel omnia simplicia medicamenta cognovisse.

Frutice Myrtuosa] Nobis aridet opinio, quòd Amomi planta sit frutex Myrti effigie præditi, nãq; in Racemi Indici (in sic loquar) pediculo folia insunt breviora, quæ non sunt dissimilia à foliis Myrtinis.

Punici mali foliis simile.] Amomum quod est simile foliis Mali Punici, atque à Plinio laudatur, non est altera Amomi species, sed est Amomum antea descriptum, illud autem est Amomi fructus vel planta: Amomum quod folia obtinet Mali Punici similia, est ipsamet uva, non plâta. Indicus noster racemus in scipso continet folia cùmula foliorum Mali Punici, sena singulos folliculos ambientia in modum calycis. Recentiores autem quibus incognita sunt folia dicta, frustra obijciunt Plinio, quòd Amomum descriptum longè diversum à Dioscoridis Amomo. Ex Plinio folia Mali Punici pertinent ad uvam Amomi, non ad plantam: sed ex Dioscoridi Vitis albe spectant ad plantam Amomi, nò ad fructum. Racemi quibus insunt folia integra & longiora, quæ extra Amomi acinum perspicue eminent, sunt pulchriores visu & plerumq; recentiores, & incorruptiores existunt: folia ante maturitatem decrepta, rugosa evadunt, quæ

Tom. II.

nondum animadvertere potuimus in Indicis racemis: sed acinos racemi rugosos. Plinius Amomo rufo primum bonitatis signum assignat: idem Nardo tribuit colorem rufum, nihilominus tamen in Indicis racemis nò videmus colorem illum, sed subruffum: *Color rufus subruffi autem racemi Indici Amomi plerumq; omnium ponderosissimi & maxime odorati existunt.*

Præterea] Quis assentietur Recentioribus scribitur. Recentioribus Plinium ignorasse Amomi uvam, quam nullus vnguentarius aut Medicus Plinij seculo ignorare poterat? Frustra laborant Recentiores, qui fingunt duas Amomi species à veteribus descriptas, cum illi unicum tantùm cognoverint.

Folii Mali Punici & gummi liquido] Cum Recentioribus uvæ fragmentis in unum factitium racemum. Recentiores frustra obijciunt Plinio, foliis foliis inodoratis Mali Punici & Gummi liquido effingi nò posse fructus odoratos, qui legitimam racemum emulandi possint: Plinius in sua narratione historica prætermisit Amomum fructum ut pote notissimum in ætate.

Minis venosa atque durior] vulgaris Codicis lectio hac in parte mendosa est, legendum est minis venosa, atque dura.

Simile his & nomine & frutice Cardamomum] Constat opinio Recentiorum, qui scripserunt Amomum Indicium esse speciem Cardamomi racemosi. Docet Plinius, Cardamomum simile esse Amomi speciebus, nempe Armeniaco, Pontico, Medico: qui verò exponunt Cardamomum simile esse his, Amomo & Amomidis scilicet, illi perperam faciunt unum Amomi genus & Amomidis, cum planta sit sui generis ab Amomo diversa.

Frutice] quoniam Plinius nunquam vidit Amomi fruticem, eadem ratione credendum est eundem nunquam vidisse ipsam Cardamomi fruticem, utpote peregrinè inutilemque vnguentariis & Medicis. Existimandum cognovisse Plinium similitudinem inter plantas Amomi & Cardamomi vel ex veterum monumentis, vel ex ipsa similitudine fructuum Amomi & Cardamomi: Nostri ætate nemo adhuc vidit (quod sciam) Amomi & Cardamomi plâtas: *Ex nomine*] Amomum, Cardamomum, & Cinnamomum sunt vetustissima nomina, & sunt inter se familia: Ex hac verò similitudine nominum licet facere probabilem cõjecturâ unâ & eadem regionè aluisse illas plantas atq; nomen eisdem imposuisse. Quãobrem eum ex historijs continentis etiã Cardamomum & Amomum nasci, indèq; in Europã deferri: Verùm eum Plinij inter Amomum & Cardamomum duplicem similitudinè descripsit, scilicet fruticis & nominis similitudinem, Recentiores ipsi qui affirmant nostrum Indicium racemum esse Cardamomum racemosum fateri coguntur, inter Cardamomum & Amomum, tertiam reperiri similitudinè notatam dignâ, nẽpe racemorum similitudinè, ad eò ut uterq; Amomi & Cardamomi racemus eodem modo cohereat, convolvatq; se ad unam similitudinè. Verùm Veteres quidè vocarunt Amomum racemosum, sed Cardamomum nunquam dixerunt racemosum, vel quia Cardamomi racemus laxus, & rarus, nullam præ se ferat imaginem uvæ, vel quia Cardamomi fructus tenuibus haret pediculis & propterea suam racemi figuram diu servare non possit. Ex his colligendum est Galenum, Diosc. Plin. & alios veteres nunquam cognovisse Cardamomum racemosum.

Semine oblongo] Recentiores longitudinem seminis exponunt, quã similitudinè Amomi & Cardamomi: sed Plinius Cardamomum semine oblongo præditum esse dicit Amomi nullâ mentione factâ. Plinius voce feminis intelligit Cardamomi fructum, qui externo folliculo, internisq; seminibus constat, sed Recentioribus

R 3

iores hanc impugnant expositionem. Procul dubio omnes Cardamomi fructus cum sua theca oblongi; interna verò femina angulosa & brevia suat, non oblonga: quia verò eadem femina seriatim deposita sunt, sibique invicem connexa tenui intercedente membranâ, quâ involvuntur, inde fit, ut unaquæque series seminum, unici tantum longioris feminis ostendat imaginem, quæ recentiores in errorem induxit. Cùm dicunt Recentiores Cardamomi fructum non esse semen, veritati repugnant, nam ex Aristotele fructus & semen reidem sunt. Ex Theophr. feminis vox communissima, quæ sub se continet fructus & femina, tam nuda, quam in pericarpis contenta. Plinius ipse Balsami fructum semen appellat & nucleos Pineorum. Et si verò scripserit Plinius Cardamomum in Arabia provenire, attamen id falsum esse, novimus ex Neoterico rum historis.

Recentior.

Contra Plin. Cardam. non adferri ex Arabia.

Cardamomum quadruplex.

Viridissimum.

Indici racemus huc refertur non potest.

Plinij lectio corrigitur.

Color.

Cardam. 3.

Varius.

Locus.

præstitit. Quia verò in Indico nostro racemo omnia apparent legitimi Amomi notæ, recitata à Dio. Indici racem. & Plinio, asserendum est hunc Indicum racemum esse verum & legitimum Diosc. & Plinij Amomum.

Quod Latinis Amomum, Græcis, & Arabibus *Hamana* five *Hamanus*, & Constantino poli in officinis *Amama* nominatur; mihi verò Amomum i. racemosum dicitur, ego (inquit Bauh. in pin.) verum credo Amomum, Martinelli & Pona; de quo Nicol. Marogna Medicus librum latinè scripsit, quem Pona Italicum dedit. Amomum spurium, Clus. exot. auctario. Fructus 5. è VV. alachria, Eid. exot. l. 2. c. 22. Amomum verum Pona; Clus. cur. post. & ibidem sub Amomo.

CARDAMOMVM VETERIBVS ET in genere. CAP. XLIX.

Cardamomum (exorditur Theophr. hist. l. 9. c. 7.) Locus ex Theophr. Calij ex Media, alij ex India, cum Nardo & reliquis omnibus, aut plurimis advehi narrat. Hoc ad unguenta utuntur. Simile his (*Amomo* & *Amomidi*) est Plinio l. 12. c. 13. & nomine & frutice Cardamomum, semine oblongo. Metitur eodem modo & in Arabia. Quatuor ejus genera, Viridissimum ac pinguis acutis angulis contumax fricanti quod maxime laudatur. Proximum de ruffo candidans. Tertium brevius atque nigrius. Peius tamen varium & facile tritu, odorisq; pravi quæ viridis Costo vicinus (*quod verius Costo vicinius Dal.*) esse debet. Hoc & apud Medos nascitur. Precium optimi in libras duodecim (*Presum.* [libras x. duodecim. Dal.] Cinnamomum proxima gentilitas erat, ni prius Arabia divitiis indicari conveniret, causasque quæ cognomen illi felicitis ac beatæ dedere. Cæterum ex quibus autoribus Plinius sua quatuor genera faciat, non constat, teste Mat. di. Dio. Dioscorides enim, Galenus & cæteri Græci, unius tantum Cardamomi meminerunt. Quæ verò commentantur de his Cardamomis Plinij, vide cap. præcedenti apud Nicol. Maroneam de Amomo novo Cardamomi minoris facie, vel Indico racemo.

Diosc. de Cardamomo tractans id non describit, sed duntaxat quibus in locis nascatur optimum, qualeque illud sit, docet his verbis: Cardamomum optimum est quod ex Comagene & Armenia & Bosphoro asfertur. Nascitur etiam in India & Arabia: Elige verò id quod agrè frangitur (*id est quod*) plenum est ac conclusum (*quod rubeis*) quod enim ejusmodi non est, exoletum est: quod item odore nares percellit, & lapore acre & subanarum est. Vim habet calefactoriam. Cum aqua potum facit ad Comitiales, tussim, coxendicum dolores & resolutionem: ad rupta item & convulsa, ac tormina, & lumbricum latum ejicit. Cum vino verò potum renam affectio nibus, urinæ difficultati, à scorpione idâs, & ad omnia venenum ejaculantia commodat. Cum Lauri radice cortice, drachmæ pondere potum, calculos atterit. Fætus eam perdit suffitu. Et scabiem eximit illitum cum aceto. Misceatur etiam ad unguenta cum spissamenta.

Temperamentum adscribit Galen. simpl. Qui sanè adstruit esse facultatis admodum calidæ, non tamen usque adeò ut Nafurtium: sed quanto suavius magisque fragrans est Nafurtio, tanto ei imbecillior et calida facultas inest: nec enim ulcerare idoneum est vel ipsum per se illitum. Porrò adjunctum habere quiddam etiam amaritudinis quâ lumbricos interficit, & cum aceto valenter piores detergit.

Apud Galenum in theriaca Androm. (quæ & l. i. Antid. & in lib. de theriaca ad Pisonem habetur) Indruum

Indeam Cardamomum non pro nigro, & Indorum colorem habente accipio (inquit Cornar.) sed pro Indico & in India nascente, ut Dioscorides docet. Porro idem Galenus 7. c. 3. ejusdem operis, in consecratione Pamphyli, Cardamomum exenteratum habet: sic enim ego καρδαμύμον εζυρωται ῥιζώνι reddo: & accipio non id cuius interna pars evacuated & ejecta est, sed cui exterior cortex sive pellicula, in qua continentur, detracta est, ita ut interna pars in usum assumatur, & sit εζυρωται ῥιζώνι, ut ex interna parte acceptum: contrario modo ei quo glycyrrhiza εζυρωται ῥιζώνι probatur, ex qua ejecta est medulla, & radix reliqua in usum accepta. Quanquam autem in Scribonio, & Marcello Medico Latino vetulorum, per me ex officina Frobeniana edito, εζυρωται ῥιζώνι vox reddita legatur per vocem animatum: Nam & Nalurtium animatum, & cacthy animatum, & misty animatum habent. & animatum ita pro exenteratum & inanimatum, positum videri possit, per errorem exferibentium, qui animatum pro inanimatum agnovissent: tamen velut etiam in relatis commentis meis scriptis, animatum pro pleno & integro, & evacuato contrario dictum esse potest, atque adeo pro interno, quod ad externum collatum, animatum, & velut anima præditum haberi: atque ita Galenus 2. de antid. dixit καρδαμύμον ῥιζώνι ῥιζώνι, ὅ ἔπιτελώνης. i. e. Cardamomi interni absque folliculis. Quamquam in Galeno ambiguum sit, an ῥιζώνι ad ῥιζώνι, aut εζυρωται ῥιζώνι vocem referenda sit. Quam autem ῥιζώνι usus nullus à Dioscoride prescribitur, εζυρωται ῥιζώνι, & quod supra εζυρωται ῥιζώνι dixit, i. e. internum in capsulis comprehensum accipi debere videtur. Et hoc declarat Galenus ibidem, ex eo quod in sequenti medicamento καρδαμύμον καρδαμύμον accipere jubet. Acus tamen 2. c. 47. καρδαμύμον ῥιζώνι ὅ ἔπιτελώνης habet, i. e. Cardamomi medulla privati, tanquam rejecto interno grano, capsula ipsa accipienda sunt: sed ego vocem ῥιζώνι deesse puto, & legendum, καρδαμύμον ῥιζώνι, ὅ ἔπιτελώνης: ut sit eadem quæ Galeni lectio.

Avicenna de Cardamomo duobus distinctis capitibus tractavit. Priore de Cardamomo Sacola, de qua suo loco dicemus: altero de Cardamomo Cordumeni. Quo capite eadem planè vires ei assignat, quas suo Cardamomo Dioscorides. Ex quo perspicuum est de Græcorum Cardamomo Avicennam hic verba facere. Item Serapio nomine Cardamomi eadem prorsus refert, quæ Diosc. & Galenus de suo Cardamomo. Sed Cardamomum ne Græcorum sit, quod vulgo in officinis habetur, id in controversia est. Gelneri quidem iudicio, Cardamomum Græcorum, aut illud ipsum est, quod nostri simpliciter Cardamomum vocant, (cujus tamen tres ferè differentie magnitudinis inveniuntur) aut pro eo lectio ulurpari potest. Matthiolus suspicatur Melegetas vulgo dictas, Cardamomum majus esse: sed illæ profectò longè calidiore sunt Cardamomo, & acrimoniâ pipen non cedunt: & quod Matthiolus ignoravit, Arabicum sive Arabum Cardamomum sunt, sacolla etiam & aliis nominibus apud Arabes dictum, apud Actuarius modò *Cavilla*, modò *Cachrys*, modò *Capsicum*: quod potestimum indocti aliqui in compertio nibus quibusdam in Tarsiam mutarunt, (ut in Diamarg. Avicennæ quadam descriptione) quæ mortis quorundam occasio extitit, ut testatur Lacuna in sui Dioscoridis hispanici præfatione: alij verò in *Cassiam lignicam*, ut Matth. in epist. sed Gelnerus *Capsicum*, i. e. Cardamomum Arabum esse legendum primus animadvertit. Quod si quis etiam Cubebes pro Græcorum Cardamomo uteretur non aberraret is ipsius iudicio. Ipsi Melegeta non videtur cum Matthiolo magis respicere aroina, quam alia Cardamomi nomine dicta semina: quæ

quidem, cum non nihil subamara sint, ut Cardamomum Geshero visa sunt: Melegeta verò acerrima, absque amaritudine, nescit quid somniarit Matthiolus, ut Melegeta in potius Cardamomum Græcorum esse patarit, quàm id quod noimen retinuit.

Cordus præter Melegeta, Cardamomi tria generat facit, magnitudine tantum distincta, Math. duo solum. Cæterum cum omnia hæc quatuor genera, sua semina folliculis includant, ridiculum est, quod nugatur Matthiolus, Melegeta sibi præ cæteris videri Cardamomum Græcorum, quoniam folliculos habeat. Melegeta dicitur etiam *Nux sacra*, & *Nunte sacra* Myrepto, quasi *Nux Cachrya* vel *Cachrys*. Temere etiam Matthiolus pro Cardamomo Mytti *Cardamomum* baccas supponit, corruptam Martiati Rotæ *Ανθελα-μίσυββ.* λαζώνιον versionem sectatus: melius Luniperi baccas aut Cedri substituisset. Piper Indicum seu Siliquastrum quorundam, primus Gesnerus ante plurimos annos Capsicum aut Cardamomum Græcorum sibi videri scripsit: in quo errasse se agnoscente: isti sententiam illam aliqui non indocti sunt sequuti. Cæterum minus Cardamomum Serapionis, nullo capitulo aut folliculo inclusum, ipsi ignotum est. Quod si quæ compositio Cardamomum duplex majus & minus requirit, Cardamomum quocumque habeatur, ex tribus illis magnitudine tantum differentiis, duplicatum ponere approbat, aut Cubebas pro altero. Pro *Sacolla* autem & *Capsia*, vel *Capsia Cacalioe*, in lexico Græco rei herbariæ, quod D. Sambucus ad ipsum misit in numeris erroribus refferunt, verba hæc inveni scribit, *καρδαμύμον, καρδαμύμον, & κρυβός, καρδαμύμον, ὁ ὅμοιος τῷ μέλι.* Melegeta vocè vel Melegeta granum paradisi vulgè dictum, non est Cardamomi species: sed sui generis, quod & precij vilitas indicat, & nulla odoris aromatiçi gratia. Græcis veteribus incognitum fuisse putat: recentiores Græci *Capsium* nominant, ut Actuarius: & alibi *Siverefium*, si bene meminit ab Arabico nimirum *Seirængi* (quæ vox tamen alibi Lepidium significat) in recentiorum quibusdam antidotis *Capsia*, interdum etiam *Capsia* pro *Capsico* legi videt: vocatur & *Nunte sacra*, & *Nux sacra*, & aliis barbaris nominibus, de quibus nunc inquirere non vacat. Quod autem Gesnerus Matthiolum Cardamomi duo tantum genera statuisse scribit, se negligentem ejus lectorem ostendit, nos siquidem contrarium brevi ostendemus.

Cardamomi appellatio e grana quædam in pharmacopoliis habentur, & gustu & olfactu admodum aromatica: Manardus & Antonius Musa contendunt nos (inquit Cordus) verò Cardamomo *caracæ*, quoniam ab authoribus descripta nota grani Cardamomum appellatis non conveniant. Quod quidem verum esse ipse fateor, non tamen continud proclamandum erat, nos vero Cardamomo carere. Dioscorides enim & Serapio integros Cardamomi utriculos sive fructus grani cõserctos, ut olim afferbantur, atque non raro nostrâ etiam ætate, descripserunt. Hodie verò ut plurimum cortices, quia lignosi & nullius qualitatis sunt, abjiciuntur, & sola grana folliculis inclusa, propter saporis & odoris fragrantiam ad usum reponuntur: hinc etiam est quod Græci in compositis medicamentis semper expectant Cardamomum: *εζυρωται ῥιζώνι* & *ῥιζώνι* Cardamomi, h. e. exenteratum & ex utrinus exempta viscera sive grana, Matius alterum & minus alterum. Arabes utrumque Cardamomum generali nomine, & *Cordumeni* & *Sacolla* appellant. Ita *in Ex M.* vehementer errant ij, qui *Cardamomi* apud Serapionem Carui agreste interpretantur, idem enim est cum Cardamomo: nec aliquam suspensat quod Serapio, eandem rem alibi *Cordumeni*, alibi *Sacolla* nomine describit: in capite enim de *Cardumeni* ea recenset, quæ apud Dioscoridem de *Cardamomo* le-

Matth. n. gatur.

Cardamomum

Gesnerus erroris fatetur.

Cardamini minus Serap. quid.

est Cardamomum.

Gesnerus.

De Card. Cordus.

Manard. Musa.

Cardamomum

Cardamini

guntur: in *Sacolla* verò rem eo depingit modo, ut Arabes descriperant, & ut ipse viderat, & quemadmodum adhuc affertur *Cardamomum*. Iam cum Dioscoridis & aliorum Græcorum descriptioni, & *Cordumeni* & *Sacolla* apud Serapionem historiae per omnia conveniat, nemo diversum statuat esse *Cardumeni* & *Sacolla*. Arabes pulchrè etiam suis nominibus *Cardamomi* species distinguunt. Siquidem majus appellant *Heyl*, minus verò *Helbano*, qui autem contrarium dicunt, errant. *Cardamomum* minus, nomen servat in Pharmacopolijs, Ger. *Cardaz*

Cardamomi specierum distinctio Arabum.

Error quorundam.

Cardamomum pinguius.

Cardamomum triplex Corn.

Minus eligendum.

Cardamomum Græc. & Arabicum diversum.

Avicenna confundit.

Error Ianuensis.

Cardamomum simplex.

Cordumenum Avicennae.

Cardamomum 4 generis.

Cardamomum Arabicum non nostrum Monachi.

mōmle, diversū à granis paradisi, quæ aliqui *Cardamomum* minus impropiè vocant, minus fortè precio & viribus intelligendum: mole enim majora sunt, & aliqui majori *Cardamomo* substituunt. *Habet* idem *Cordus* in obs. silv. *Cardamomum* quoddam pinguius, acrius, odoratius, scabritiusque veluti inculius quiddam.

Francosurti ad Menum in nundinis *Cardamomi* tria genera hodie officinæ apud Cornarium agnoscunt [Manardus inter hæc. *solan amaritudinem desiderat*] maius quod ad fuscum & prope modum nigrum colorem declinat semen, medullam albam habens; minus, cuius color ruber est, tertium quod *Grana paradisi* vocant, sulvi coloris. Sunt autem omnia femina angulosa, & velut compressa. Sed ex his nullum proprius ad Dioscoridis *Cardamomum* accedit, quàm quod minus appellant, & est, ut quod sapore acre sit, & leviter amarum. Majus nec acre est admodum, nec amarum. Grana verò *Paradyfi*, quæ vulgo *Paradyfi förner* vocantur, acrimoniam ad excellentem habent, ut fervorem linguæ inducant, & piperis loco cibaria condiant, in multorum usu. Minor itaque Cornarius utetur, si ita usus ferat.

Monachis in *Mes. dist. 7. cens. 265.* autoribus, aliud est *Cardamomum Græcorum* & aliud *Arabum*. *Cardamomum Græcorum* scilicet *Diosc.* & cæterorum, apud Arabes vocatur *Cardamenum* vel *Cordumenum*, sive *Cardameni*, vel *Cordumeni*. Arabes, vt Serapio & Avicenna, faciunt plura *Cardamomi* genera. Avicenna confundit species in diversis capitulis vt in capitulo *Cardamomum* & capitulo *Cibabague*, & capitulo *Elbue*. Interpretes etiam Serapionis, Simon Ianuensis in capitulo de *Sacolla*, quod est de *Cardamomo* (vt idem putant) erravit, ac etiam aliqua de suo addidit, videlicet *Cardamomum* maius esse *Heil*, & minus *Helbano* (quod putat minus corruptum) & esse masculum. vt idem scripsit in sua clavi in litera *Cardamomum*: similiter erravit in capitulo 216. quod incipit *Cardameni*: quia non debuit intulitate ipsum de Carui agresti. Vt omnes communiter tenent, quando absolutè est scriptum *Cardamomum*, semper maius est intelligendum. Bellunensis in suis interpretationibus ait, *Elbua* est *Cardamomum* minus, & est granum apud Italos appellatum *Melegerte* & dicitur etiam *Heilbua*. Quomodo *Mesues* ponit *Cordumenum* vt in *Diamoro*, & in *Athanasia magna*, & in *Diasulphure*, & in confectioe *alferere*, & alijs pluribus: tunc non petit *Cardamomum Arabicum* sed *Cardamomum Græcorum*, quod ipsi Arabes sub nomine *Cordumeni* describunt. Vnde sciendum quòd *Cardamomi* sint quatuor genera, *Cardamomum* maius & minus, & *Heil* & *Cordumenum*: Et omnia quatuor genera tangit *Plinius* 12. c. lib. 12. Fatentur *Monachi* se nescire quid sit *Cardamomum Arabicum* maius, & *Heil* penitus ignorant; & *Cordumeni Arabicum*, scilicet *Dioscoridis Cardamomum*, quod certè sit adhuc nõ benè percipiunt. Minus *Cardamomum* quod aliter *Helbaugue* appellatur autoritate *Bellun.* tenent pro certo esse *Melegertam* sive *Melegertam* usulem, quam omnes aromatarij agnoscunt, & hæc ponent

da in trochiscis de ligno Aloë *Mesues*. Loco *Cardamomi* majoris, acetiam loco *Heil*, licet illis uti *Cardamomo* scilicet *Melegerta*.

Legitimum *Cardamomum* hac tempestate non cognoscit, ne ab ipsis quidem mercatoribus, qui ex Syria, vel Aegypto aromata ad nos cõvehunt, *Matthiolum* competum habet. Quo fit vt *Medici*, ac *pharmacop.* in componendis medicamentis aquè errent in *Cardamomo*, atque in alijs compluribus, quòd *Cardamomi* loco varijs quibusdam seminibus, odoratis tamen, indifferenter utantur. Quorum primum *Cardamomum* maius: secundum *Nigellam* quod *Melathij* est genus: tertium verò *Melegertas*, vel grana *Paradyfi* nuncupant, cum tamen eorum nullum nec *Græcum*, nec *Mauritanum* sit *Cardamomum*, quandoquidem aliud *Græci*, aliud verò *Africi* pro *Cardamomo* intelligunt. Serapio *Dioscoridis Cardamomum* *Cordumenum* appellat, deinde auctore *Isaach* sui *Cardamomi* peculiare caput in sinit, idque *Sacollam* nominat: quin & duum esse generum tradit, alterum maius, alterum minus, quorum nullum nõ modò *Dioscoridis Cardamomo* responderet, sed nec etiam ulli eorũ, quibus officinæ indifferenter utuntur. Probatur itaque primum quòd omne officinarum *Cardamomum Dioscoridis Cardamomum* esse non possit, pluribus tum notis, tum etiam qualitatibus. Quippe quòd hæc in uniuersum parum, vel serè tantillum densa sint, fragrantia non contumacia, & gustui nihil amaroris relinquunt. Quòd præterea ab Arabicis distent, si cum illis comparentur, faciliè disparitas deprehenditur. Siquidem Serapioni maius *Cardamomum* semen est plantæ, quod oblongis quibusdam cõcluditur capitibus iis sanè similibus, quæ è rosis prodeunt, granis obnigris rotundis, *Pipere* longè maioribus, in quibus minuta femina concluduntur, angulosa, facta, & odorata: minus verò nullo contegitur capitulo majoris modo, quamquam colore conveniant. Quod planè indicat, omne officinarum *Cardamomum* nec *Arabum* esse, nec pariter *Græcorum*, sed potius ab utriusque maximè differre. Quare putauerit *Matthiolum*, illud falsò sibi persuasisse *Monachos*, qui in *Mes. scribere*, quòd *Arabum Cardamomum* minus illud semen sit, quod *Seplasia Melegertas* vocant, *Andree Bellun.* qui *Avicennam* mendis expurgavit, auctoritate freti. Sed cum *Bellun.* id asserat vulgari tantum opinione ductus, cumque nota minime eorum sententia ad stipulendum, errasse *Morachi* faciliè deprehenduntur. Semina enim quæ *Melegertas* appellant (vt omnibus planè constat) capitulis excepta suboriuntur, quod minori Serapionis *Cardamomo* non evenit. Crediderunt *Ruellius* in suis de natura stirpium libris, & *Fuchsius* in sua metho-

Cardamomum minus nostrum cognoscitur.

Nigella.

Sacolla n. est Cardamomum Diosc.

Monachorum error.

Piper Indicum contra Ruell. & Fuchs. m. est.

non autem maiori femina, lentium modò nasci ait Avicenna: quâquam Ruellius, vi suam tueatur sententiam, secus fortè legerit Avicennam. Tria genera Cardamomi ex Alexandria Egypti & India Orientali à Lusitanis adferuntur, inquit Matth. germ. & Italicus. Maius vocatur à quibusdam Melegesta ab aliis Grana Paradisi. Medium & minus nò certò scio an unum homin sit verum Cardamomum veterum.

Veteres testantur Cardamomum habere siliquas ut legitur apud Galen. Zenonem in suis remediis adversus venena rejecisse siliquas: præterea id vidèdum apud Gal. lib. 10. de antid. post Democriti descriptione, in Theriaca carmine descripta: Item l. 7. de comp. med. secund. loc. cap. 2. Facile autem dicerem maius Cardamomum esse veterum verum Cardamomum, si non deesset amaritudo, quam requirit Gal. lib. 7. simpl. si odore caput offenderet, & non facile frangeretur. Neutrum volo asserere. Non valè agunt qui Cardamomo vulgari utuntur loco veri Cardamomi. Cardamomum maius dicitur Melegeta propter similitudinem cum Melega; & propter gratum odorem quibusdam Grana Paradysi.

Culius in fine Dod. gall. scribit, antiquis Græcis vocari *καρδαμύνη* Lat. Cardamomum, Arab. Cardamum, Cardumoni, aut Cardumoni. Ab hoc Cardamomo aliud habere Arabes diversum, i cuius maius genus vocetur ab eis *ساعلة* aut *Chacule* minus autem dicitur *هيل* & *هيلانة*. Officinis utrorumque Græcorum & Arabum Cardamomum esse incognitum: pro ijs alia duo haberi genera, primum & maius Grana esse Paradisi. Idem in exot. auct. quale sit Græcorum aut Latinorum Cardamomum nondum cuipiam constare opinatur, certum enim ait esse ab Arabum Cardamomo differre.

Acosta de arom. c. 64. de Cardamomo scripsisse ait Avic. cap. de *Caculæ* & divisisse in majorem & minorem. Magnam esse confusionem nominum huius medicamenti in scriptis Arabum. Et quamvis Serapionum ex his vocet *Chaculæ*, & alterum *Heilbane*, sciendum textum corruptum & scribendum esse *Caculæ*, & *Heil*. *Caculæ* autem ut vocant omnes Arabes, aut *Caculee* ut dicit Avicenna, vel *Elachi*, significare Cardamomum, si verò non habeat nomen apud Græcos & Latinos, id accidisse quia non cognoverint: & hinc credi Galenum non scripsisse de hoc. Dicere Dioscoridem melius adferri ex Comagene, Armenia & Bosphoro, adferri etiam ex India & Arabia, quod si ibi invenitur illud quod tradit Galenus & Dioscorides non esse Cardamomum quo vulgò utuntur in India, sed duo fore & non unum si dicitur esse Avicenna & Serapionis Cordumeni, non esse quod contradicat, quia non sit id, quod Avicenna & Serapio vocant *Caculæ* vel *Heil*: Non competere etiam signa quæ Dioscorides attribuerit Cardamomo, nò enim difficile rumpi. Quod vulgari vsus (ait idem Acosta) vocetur Cardamomum, quum non sit Græcorum ait in causa Girardus Cremonensis in sua versione, quia non noverat hoc simplex, præstitit ille cum reliquis nomen Arabicum. Non est etiam hoc Plinij Cardamomum quia quatuor tradit genera. Vulgare Cardamomum diversum est admodum ab eo quod Valerius Cordus tradit, cuius unum genus maius est magnitudinis glandis, & minus magnitudinis Avellana, quandoquidem Cardamomum maius non excedit magnitudine Pini nucleum. Ruellius dicit fruticem similem Amomum, ac colligi Amomum in Arabia, unde patet quod exhibet non esse Cardamomum, quandoquidem ex India fertur, in Arabiam, nec etiam ibi Amomum provenit. Dicit præterea ex Theophrast. auctoritate esse vicinum Nardo & Costo: verum in eo videtur deceptus, quia Nardus & Costus reperitur in Chitòs & Mandou: *Caculæ* autem vel Cardamomum in

Malavar. Dicit præterea femina alba, ita colida ut velicas excident in ore quod non convenit Cardamomo vel *Caculee*: cortex enim albus & semen nigrum. Andreas Lacuna dicit demonstrari tria Cardamomi genera, maius & minus, & alterum quod est Nigella. Maledicit Atabibus sine occasione quasi confundant omnes species. Erravit Mercator, qui ei dixit ex Armenia veli Venetias tria genera Cardamomi si faltem verum erat Cardamomum, quia verum ex India venit Alexandriam. Cardamomum igitur Græcorum non est Arabum. Præter rationem Manardus & alij dicunt Cardamomum Arabum medicamentum novum & remouent ab usû, quia Galenus & Diosc. eo non sint usi. Eo usi sunt Avicenna, Abenzoar, Isaach, Rhafis & alij. In formulis medicamentorum Græcorum & Latinorum antiquorum qui non scripserunt post Arabes, accipitur Cardamomum Galeni, nec accusentur qui culpâ vacant. In compos. Arabum & Latinorum recentiorum assumatur Cardamomum majus & minus, quæ vulgaris & ejusdem figuræ, quæ quantitate tantum inter se differunt. Avicennam oportebat distinguere Cardamomum in majus & minus, quia diversis in locis proveniunt. Assumatur reperiri in Zeilan aliam speciem Cardamomi majorem & minus aromaticam vulgari. Garzia ab Orta vult ut utamur vulgari majori & minori: Minus magis aromaticum. Andreas Bellun. dicit *Cacule* esse Cardamomum majus & *Alial*, vel *Hibaleil*, vel *Cairbua* & *Hilbua*, Cardamomum minus. Verum hæc nomina sunt depravata in libris arabicis, nec mirum si errarit Bellunenſis. Quod ait Matthæus Sylv. Indicos Medicos dicit uti ad febrem, res non ita se habet.

Qui tandem novit Amomum Diosc. & Plinij, is teste Lob. adv. illicet noscet eorundem Cardamomum, utpote Amomum simile nomine, frutice, semine oblongo & idem dicit nostrum siliquosum, Cardamomum officinarum, aut Græcorum non esse, aut descriptiones prorsum depravatas esse: Nam Galeni locus adductus de exenterato fructu Cardamomi, potest intelligi de glumis mundato: nec ullus locus advertatur ex Dioscoride. Neutiquam tamen contemnèdi usûs hæc siliquas putamus: tum quia tacito consensu & prerogativa usûs receptæ sunt: & fortè Arabum sunt: Earum quæ maxima, Melegesta aut Millegetta, nomine Grani Paradyli notissima est. E quatuor aliis siliquis quæ inter se perquam similes sunt, ea quæ officinis majus Cardamomum vocatur oblonga triquetra lapidi dactyli concolor. Triquetra etiam siliqua sed brevior est media vocata, quam verius putant Cardamomum. Minima pariter triquetra, sed vix nucleum Pruni æquat. Alia quedam recens allata ex Indiis occidentis, pusilla Melegetta penè par, gustu Gingiber prorsum testante. Istas omnes siliquas Cardamomi esse, aut plantarum consimilium, nec Gingiberi absumilium, non abs re quidam peregrinator narrabat. Dum Lob. in adv. notat Anguillaram, licet non nominet, non videtur observare Galenum meminisse *Melegestæ* sive siliquarum quod competit nostro Cardamomo. Item Diosc. dicit *καρδαμύνη* & *αμύνη*, plenum & oclusum quæ siliquæ optime conveniunt. Anguill. sententiam videant lectores post sub titulo Cardamomi cum siliquis triangularibus. Minus distinctè scribit Lonicerus de Cardamomo & ejus viribus. Hæc ponimus totâ ejus historiam re quid desit lectoribus, Ille igitur inquit. Cardamomum est fructus arboris: grana similia Rutæ feminibus continentur in parvis terribus lobis inclusa. Est autem Cardamomum duplex, hortense & sylvestre, sive majus & minus. Ex his domestica, sive majora prevalent, magisque odorata sunt, subruſa, acris, cum quadam dulcedine. Sylvestriâ & minorâ non adèb

Lacuna v. e. p. hendi. t. r.

Man. v. d. r. d. r. e. t. e. n. t. e. t.

Cardamomum in Zeilan

Cardamomum in India quæ sunt non siliquis v. e. t. r.

Gingiberi absumilium

bona,

bona, minus odora, nec tantis viribus praedita, quam culta, quibus in Medicina uritur, separatis tamen officulis, pulverbisque prius excussis.

CARDAMOMI AEQVIVOCA- tiones.

Ceterum Melegetha, sive Grana Paradyfi, multis Cardamomum, quibusdam majus, aliis minus habetur. Cordo quidem, Cardamomum majus Melligetæ simile creditur.

Gingiberis siliqua. Siliqua Gingiberis pusilla Melegetæ penè par Lobelij cui consimiles plantæ apud Lobelium in Adverf. dicuntur Cardamomi siliquæ, quanquam aliter sentiat Garcias, de hac autem siliqua scribimus lib. 18.

Cardamomum siliquatum quadruplex. Cardamomum cum siliquis quadruplex majus, & minus vulgare, medium & minimum. Hoc Cardamomum aliqui pro vero recipiunt, alij non ut Clusius.

Amomum arabicum. Cardamomi facie Amomum novum quibusdam Cardamomi species, negante Cerchino Marinella. Vide ante.

Substitutum. Cardamomo substituit Colleg. Flor. in antib. nunc Cardamomum officinarum, nunc etiam Nasturtium. Idem facit & Borgarucus: Sylvius pro Cardamomo majore minus, & contra. Idem & Placotomus.

Cordo in atom. ros. teste, cum simpliciter Cardamomum scribunt autores, minus Cardamomum [vulgare] intelligunt.

Piper Calicutinum. Cardamomium Arabicum interpretantur aliqui Piper Indicum siue Calcuticum siliquosum quæ opinio à plerisque rejicitur.

Quam porò Ruellij opinio sit erronea qui Capsicum aut Siliquastrum pro Cardamomo Mauritanorum proponit, omnibus notissimum est, inquit Garcias lib. 1. c. 24. De hoc Cardamomo scripsimus hist. n. g. l. 21.

Nasturtium. Galeus nigrum Cardamomum habet l. 7. c. 2. xij. n. 10. Sed falsò isthic, sicut etiam in multis aliis apud Græcos Medicos locis, *vulgaribus* pro *vulgare* usque *legi*, in Comment. medicis in id opus à me scriptis (inquit *Cornar.*) ostendi: velut etiam vicissim Cardamum, i. e. Nasturtium pro Cardamomo apud eosdem suppositum habetur, tum ob serpionis, tum ob vitium aliquam similitudinem, altero pro altero agnito & recepto.

Trad. qui pro quo, nonnisi quam Piper longum, quandoque Cinnamomum, interdum etiam Carui ut Agricola ex Manardo, pro Cardamomo substituit, quamvis Cordus eos vehementer errare dicat, quæ Cardamomi apud Serapionem Carui agreste interpretantur. Quod idem asserunt Monachi, qui Simonem Ianuensem in cap. 316. errasse dicunt, quod incipit Cardumeni, quia non debuisse intitulare de Carui Agrestis: quoniam non sit de Carui agrestis, sed de Cardumeni. Nonnulli dicunt ipsi juniorum, ut Simon Ianuensis, Pandectaris, Luminare maius, & ceteri ita confundit Cardumeni Arabum (quod quidem Carui agreste falsò interpretatum legimus) quod vix sit, qui sciat ab ipsorum laqueis abire.

Addunt Monachi, Cardamomum cum ignominiam, addunt Auienna possumus uti Harmel [Ruta agrestis] aut Squinantho.

Rosa sylvestris. Maximè tandem erant, ut nobiscum equidem doctè sentiant Monachi in Mef. dist. 8. cenf. 766. Ieniores qui asserunt Cardamomi esse Peucedanum, Selen, & Kessim. Lege in Oryxmelite, iniquant, & squilluco descriptione Democriti, ubi utrumque recipitur. Vbi & Luminare maius, etiam plura confundit.


Nigella tertium id genus quod Lacuna in officinis haberi asserit non est Cardamomum quandoquidem Nigella totis his regionibus non nascitur *Garc.* Alij etiam Nigellam citrinam perperam Cardamomum crediderunt. Cam. scribit in hort. Bononienses eam in suo antidotario substituere pro Cardamomo.

Cardamomi loco supponit Galen. aut Myrtum, aut Cyperum quem sequuntur Matthiolus in Diof. lib. 1. cap. 7. Clusius in sine hist. gall. Dod. c. 20. Monachi in Mef. dist. 8. cenf. 295.

Tragus tandem lib. 1. c. 11. inter nomina Geranij habet vocabulum Caradomomes, quod ait alio pertinere. Est ulmiò & Cardomomon, Gesnero in a. script. Diof. Geranium alterum.

CARDAMOMI GENVS MAXIMUM, Grana Paradyfi, sive Melegeta.

Melegeta siliqua oblonga est striata, Ficus nondum passe ferè magnitudine, tenuis quidem illa, sed validiuscula, pediculo satis crasso hærens. Semen copiosum, membranis disclusum continetur, angulosum, spadiceum, penè splendens, substantia siue medullà albà, sapore fervido Piperis,



sed qui non tam citò se exeret. Cum jam parata esset figura ex Camer. hist. dono accipi à Cl. Paludano aliquot elegantes siliquas Melegethæ, quæ Cardamomū majus vocatur, ex quib' statim animadverti iconem nitis Ficum representare, nisi alium intellexerit fructū. Hæ in summitate lato & circulari sunt umbilico, in medio tripartito, quæ adpingi conveniebat: Præfens

tabella proponit inspiciendum hoc Cardamomi genus maximum, & præterea tertium minimum sub sequenti titulo commemoratum. Melligetæ, i. e. Grana paradyfi seu Cardamomum piperatum Cordi hist. l. 1. c. 27. [Cardamomum officinarum tertium, Corn.] oblongus est fructus, & magnitudine figura prope modum ovo æqualis, folliculo similis, cortice constanti venoso, fractu contumaci, subrufo, aut in pallido fusco, supernum pythmenia, inferius pediculi vestigium habens, intra senitidis, angulosis, pipere minoribus, superficie ruffis, intusque candidis seminibus, crebris, fungosisque membranis distinctis & interceptis plenus, gustu servidis ut piper & zingiber, quibus odore etiam non dissimilia sunt. Cortici nulla ferè in gustu qualitas. Afferuntur ex India, & regno Mellicortice exempta ejus grana raroque folliculo inclusa: eligenda sunt nitida, ruffa, sup. effice extera, minimèque rugosa, solida atque perdetiosissima. Erant porò (ucidem adfiruit c. 28.) que quot diebus Melligetam majus Cardamomum esse, Cardamomis er un tenuis minimæ que ferè sed gratis ac jucundus est sapor: Melligetæ vero piperis instar acerrimus. Idem in Diof. au Cardamomum majus quæ parcius asseritur, propterea quidam ejus locum Grana Paradyfi aliis Melligetæ nominata

Melegetha.

Geranium.

Defert.

Icon.

Figura non bona.

Defert. Cord.

Locus.

Dele. Fur.

Melligetæ non est Cardamomum.

nominata substituerunt, eaque Cardamomum majus vocarunt: improprie tamen & male. Nam sapore quo piperi familia sunt & odore, plurimum à Cardamomo differunt: fructus tamen sive utriculi figura magnam habet cum majore Cardamomo similitudinem qui ovi plerumque magnitudine conspiciuntur, & granis (quæ novimus) onusta sunt Cardamomi insar.

Matthioli sententiam de Cardamomo & Meleggeta ante posuimus. Ejus sicut tria genera in sua epitome: Majusita describit, Majoris capitulum sicut fei pyri faciem refert, femine intus subrufescente, angulosoque.

Ruellij temporibus tota Seplasiarum caterva ad Mauritios planè deficiens, hoc duplicis fastigij Amomum abutebatur, pro eo quod à Diosc. & veteribus Græcis perferrebat. Vnum ostendebant, Amomum appellates, alterum viribus prælatum, vulgò Malagreta Hispanis; nostris officinis Grana Paradisi non minatum. Cardamomum minus hoc intelligunt quod vulgò Italis Melligreta.

Offendimus autè ex Monachis, Cardamomum minus Heilbaugue Bellunensi dictum esse Meleggetam & usurpandum in troch. de aloës Mesues & pro Cardamomo majori ac etiam loco Heil. Sylvius contendit Cardamomum Serapionis utrumque, tam majus, quod Granum Paradisi & Meleggetam vocatum putant plerique, quàm minus nihil habere commune cum vero Diosc. & Galeni Cardamomo: sed Valerius Cordus contrarium asserit, nos fecerunt Cardamomum hodie non desiderare. Icon à Rislio exhibita videtur repræsentare Cardamomi maximum genus, de quo hoc capite agimus. An verò Rislius intellexerit quæ scripsit considerandum? Apud Lonicerum icon ferè similis iconi Matthioli, pro Granis Paradisi vulgò & Cardamomo majore.

Tab. Cardamomum majus Arabum. Lac. Cardamomum majus, vulgi Meleggeta, & Grana Paradisi, Cardamomum Dioscoridis: Cardamomum hortense ex Ragulsi opinione. Lacunam taxat Garcias, dicens, eum satis protèrè in Arabes invecum esse: ejus Meleggeta non esse Cardamomum Diosc. si quidem ignota fuerit Dioscoridi, neque Cardamomum majus coloris sit cinerei: Malageta sive Meleggeta nonnullis Paradisi grana, cujus in Europa usus Cardamomi minoris loco, non esse Cardamomum, Avicennæ *Combaz-gue* dictum: cætera vide paulò post sub Cardamomo siliquofo.

Clus. apud Garciam scribit Matthiolium Cardamomi iconem Ficis formâ exhibere: eum tamen nihil aliud sit quàm Meleggeta suo involuero tecta, quæ sanè inter Cardamomi vulgaris sive Saccolæ Arabum genera ex Garcie sententia recipienda non sit: Adhortamur nos ut videant lectores quæ antè annotavimus capite de Cardamomis cum siliquis: olim enim Clusius videbatur confundere Grana Paradisi cum Cardamomo siliqua sive thecâ longiore.

Lob. adv. Cardamomi siliquarum maxima Meleggeta aut Millegeta dicta à semine crebro, sarcto, oclusto & folliculo membranoso, Ficem foliis effigians nomine Grani Paradisi notissima est, & ex Oecidua Africa frequens allata.

Lacuna (inquit Acofta) concludit primam speciem Cardamomi esse Meleggetam vel Granum paradisi, & esse Cardamomum de quo scripserit Dioscorides. Sed Diosc. non vidit Cardamomum cum cortice, quandoquidem Lacuna dicit esse Meleggeta: neque hanc cognovit Diosc. nec sicut ubi nasceretur. Majus dicit habere colorem rubrum: sed est clarum non ita esse. Cardamomum minus non esse illud semen quo utuntur in Hispania pro Meleggeta, vel Granum Paradisi, constat per mul-

ros qui fuerunt in Meleggeta, qui affirmant se nunquam in Meleggeta vidisse *Cacolaam*, vel Cardamomum. Si quis benè consideret, Avicenna vocat Meleggetam Cobenbague.

Platearius Cardamomum duplex assignat: majus quod dicitur domesticum, minus quod dicitur sylvaticum & illud esse pilosum & subalbium. Ast Castor facit triplex, majus simile Ficui; medium longum; minus capitellum triangulare.

Cam. hist. ait Avicennam Cardamomum majus vocare *Saccolæ quebir*; minus *Saccolæ ceguer*; quo nomine etiam hodie, teste Garcie, cognita sint mercatoribus & Medicis; item *Saccule* & *Elacto*: putâq; Cardamomum nostrum antiquis, tam Græcis quàm Latinis in cognitum fuisse: Cordumeni autem Arabum fortassis esse Cardamomum Græcorum. Et maximum quidem, cui jusiconem damus, continere in se Meleggetam, quæ à Cardamomis distinguenda veniat.

B. pin. Grana paradisi & Cardamomum r. sive of- *Synon. C. E.* ficinatum: Cardamomum majus, Matth. Lon. Lac. (cui etiam Cardamomum hortense) Cast. Lugdun. Grana paradisi, Cord. in Diosc. Meleggeta seu Cardamomum piperatum, Eid. hist. Milleggeta, Lob. Malaguetta, Gatz. (cui & Combazbange Avic.) & ad Clus. cur. post. Cardamomum primum, Cam. epit. alterum, Cæs. Cardamomum Arabum majus, Tab. Grana paradisi seu Meligettas, Lincott. part. 3. c. 14. Hoc Cardamomi minoris loco aliqui utuntur, & Meleggeta dicitur, propter similitudinem, quam cum Melicæ femine habet.

Hujus folia sub Meleggeta in prodromo sic de *Foliorum* scribit: crassa sunt, uncias quatuor longa, tres lata, *deser.* per quorum longitudinem costa elata fertur, à qua fibræ plurimæ per transversum abeunt, ut in Caryophyllorum foliis cum quibus maximam similitudinem habent: fructus satis cognitus habetur in officinis, ut & grana exempta: hujus folij pediculus sapore est aromatico, ipsis granis correspondente, non tamen ita acuto & aromatico, ut in foliis Caryophyllorum animadvertitur, quo signo potissimum à se invicem distingui possunt.

Cardamomum in India provenit, potissimum à Calcutio usq; ad Cananor. Itè in Malavar & Iaio, Cam. *Locus.*

CARDAMOMI CVM SILIQVIS sive thecis longis & brevibus.

Præter Cardamomum, quod Melegeta & Granorum paradisi nomine innouit, sunt & alia



Siliquati Cardamomi genera. Ex his maximum, unciam 1, aut semunciam longam, gracilem, triquetram, striatam, coloris cinerei fractu contumacem siliquam habet, modicè turbinatam, seminibus numerosis, triplici versu, membranis intercedentibus tenuissimis candidis, sarctam; color granis spadiceus & cinereus ferè, figura ut Melegeta angulosa, rugosa; substantia alba; sapor fervidus

duo confimilis. Alterum genus femencialis longitu-
dinis habet filiquam, striatam, cineream, sed e viden-
tius triquetram, ad tegegmina Lathyridis femina
accidentem, femine factam membranulis distin-
cto, cinereo, (in meis filiquis etiam rubente) an-
gulofo, sapore & substantia prioris. Tertium affi-
gnant, quod sola magnitudine videtur à jam dicto
differre, est enim filiqua omnium minima, cæterum
quid differat præterea non video.

In præsentè tabella Cardamomi filiquati duo prio-
ra depingimus; tertium verò omnium minimum, in
icone Cardamomi maximi effigiamus.

*De Card. fi-
liquatis
Cardom.* Cord. in Diosc. Cardamomi genus alterum mi-
nus dicitur, quod fructum fert Avellanà ut pluri-
mum minorem, triquetrum & minoribus granis, e-
jusdem cum majore sapotis & odoris, sed vehe-
mentius palatū & linguam penetrantibus, hoc frequen-
tius est in usu & licet simpliciter hodie Cardamo-
mum vocetur, in pharmacopoliis tamen Cardamo-
mi minoris nomen servat & à Germ. *Cardamomle*

dicuntur & ab Arab. *Helbane*. Idem describit hist. l. 4.
c. 29. Cardamomum mediocre, figurà oblongum,
triquetrum, utriusque acuminatum, colore in candi-
dò fuscum, quantitate grandi avellanæ nuci æquale,
majore Cardamomo minus, minore verò majus,
ideoque mediocre nominatum, intus densè in se
factis, majorique Cardamomo similibus granis
plenum: cortice confas prædicti instar, venoso, sed
multò tenuiore, in tribus suis angulis, quibus matura-
rum dehiscit, singulas commissuras habens. Gustu
Cardamomo majori grana ejus respondent. Affertur
& hoc ex *Egypto* & *India*, sed paucissimum, id-
que perquam rarò, cum utroque Cardamomo. Et

c. 30. Cardamomum minus mediocri per omnia si-
mile est, paulò tamen minus, candidiori, paulò te-
nuiori cortice, & trium angulorum commissuris de-
hiscente vestitum, quo detractò femina apparent
densè in se facta, nullis membranulis distincta, ma-
jori Cardamomo similia, paulò minorà, magis que
angulosa, in ruffo cineracea, atque tam arctè sibi-
ipsis conjuncta, ut unum semen figurà bubulos re-
nes æmulans, appareant esse. Saporem grana ha-
bent valdè aromaticum, tenuem, majoriq; Carda-
momo similem, sed paulò tenuiorem. Affertur &
hoc ex *Egypto* & *India*, folliculis suis exemptum,
nonnunquam etiam unà cum folliculis, idq; copio-
siss, quàm majus, solùmque vulgò hodie cognosci-
tur: majus enim cum parcius advchatur, paucissimis
notum est: probatur quod majoris rotas habuerit.
Cæterum cum auctores simpliciter scribunt Carda-
morum ut ait in dispens. arom. rosat. minus Carda-
morum [*usuale*] intelligunt.

*Arab. de
Cardom.* Matth. hæc depingit & describit vocans unò
Cardamomum medium, alterum minus, quamvis nec
pro Cardamomo Græcorum, nec Arabum recipiat.
In prior. comm. negat etiam cognosci Cardamo-
mura, medicos & pharmacopæos reprehendens,
quòd semen quoddam pro Cardamomo majore ex-
hiberent. Idem hist. germ. sit ne Cardamomum Gre-
corum dubitat: non tamen eos peccare dicit, qui lo-
co veri ponant. In epi. sic describit: Cardamomum
medium folliculo contegitur oblongo, colore mi-
nus rufescente. Minus minore cõstat capitulo, ipsò-
que triangulari, femine subrotundo, aperiensuloq;
semen omnibus acre & odoratum, majoris tamen
acrius & odoratius [*de quo sub Melegera*] minus ut
medium acridinis vehementiù superat, ita & odo-
ris fragrantia. Nos que sit sententia Matthioli de
his Cardamomis & ubi proveniant antè annotavi-
mus. Camapud Matth. distinguit in medium, mi-
nus & mirinum, tres ponens icores.

Medium. Anguill. in genere loquens de Cardamomo, di-
cit se credere vulgaris nomen Cardamomum esse ve-

*Cardam.
Sulgaris
usuale.*

rum & legitimum, idque argumentis conatur pro-
bare: sed frustra, non enim distinguit Anguillaria mi-
nus à majore, fortè quòd similia femina, & filique
non multum differentes, nisi magnitudine.

Lon. meminit Cardamomi majoris & minoris, si-
ve sativi & sylvestris, ubi non dubitarim eum loqui
de aliquà specie hæc tradidit: nos tamen cum obscurè
tractet, ea in genere proponimus, lectoribusque ea
discernenda relinquimus.

Garciam de hoc Cardamomo crediderim locutum
cum ait: Cardamomum quod vocant aroma est illis
in regionibus probè cognitum in quibus magnus
ejus usus est. Hujus etiam magna pars in Europam,
Africam & Asiam evehitur. Quàm verò rectè sit illi
inditum Cardamomi nomen, aliis disceprandum re-
linquo. Avicenna l. 2. c. 159. sanè peculiare caput in-
stituit de *Saccolaa* quod dicitur esse generum tradit,
Alterum *Saccolaa quebir*, i.e. magnum, alterum verò
Saccolaa cegueri, i.e. minus. His nominibus cognitum
est utrumq; Cardamomum cum Medicis Arabibus,
tum mercatoribus. In Malavar vocatur *Erenelli*; In
Zeilan *Encal*; in Bengala verò Guzarate & Decan,
interdum *Hil*, interdum *Elachi*, idque inter Mauri-
tanos: nam à gentilibus indigenis omnium provin-
ciarum emartatarum *Dure* nuncupatur. Quod alter-
um in Serapio *Saccolaa*, alterum *Hilbane* vocat, men-
dosum est exemplar, & *Hil* duntaxat scribendum e-
rat. Erenim si *Bane* omninò adiciendum volumus,
potius *Bara* dicendum erat, quod lingua Canarina
magnum significat. Nihil igitur aliud *Saccolaa* est om-
nibus Arabibus nuncupatum, aut *Saccolaa* Avicen-
ne, aut *Elachi*, quàm quod Cardamomum vulgò ap-
pellatur, veteribus enim Græcis, rum Latinis planè
ignotum, ut ex eorum monumentis colligere licet.

Siquidem Galeni notè nostro Cardamomo non
conveniunt. Nostrum Cardamomum in illas regio-
nes defertur è quibus Dioscor. suum de vchi scribit.
Sed neque id frangenti contumax est, neque caput
tentat, neque amarum, neque gustu adeò acri, ut
Caryophylla. Plinius l. 12. c. 13. etiam quadruplex esse
Cardamomi genus scribit, tamen Dioscoridi & Gre-
cis unicum tantum extat Cardamomi genus. Sed
nullum ex prædictis cum nostro quicquam commu-
ne habet, quod fragile esse debet, siliquã candican-
te, granis intus nigris. Sericur verò id leguminum
modo, altitudine, quando summa, cubiti in quo
pendent siliquæ granulæ interdum utque ad vi-
ginti continentes, non ut Cordus lib. 1. in Dioscor.
scripsit, glandis avellanæ magnitudine. Gerard. Cre-
mon. *Saccolaa* ignorans, nomen illi ex Græcis pro
arbitrio indidit, tametsi legitimum Arabicum no-
men in tegrum & non mutatum reliquisse præstiterit.

Non multum fortè refagaboris qui Coidu-
meni Arabum, Cardamomum Græcorum esse pu-
tant: quandoquidem Serapionis & Avicennæ *Sac-
colaa* Græcis est ignota. Quòd verò *Saccolaa* uten-
dum negent non concedo, multis enim experimen-
tis improbatum est, pleurisque morbis peritile: eòq;
uter dum ceriseo in omnibus compositionibus Ara-
bum & recentiorum qui Arabes sequuti sunt. Mala-
guetam porrò, sive *Meleguetam* à nonnullis Paradisi-
sitana nuncupatam, cuius in Europa usus Cardamo-
mi minoris loco, non esse Cardamomum didici (in-
quit idem Garcias alibi) quor iam sæpius cum in Hi-
spania, tum hic in India percontatus eos qui in Lu-
litania in Malaguetam profecti fuerant, an istic *Ca-
colaa* sive *Saulna* (quod Cardamomum appellamus)
nasceretur, negarunt omnes: rictus Indi interroga-
ti an *Malaguetam* apud eos cresceret, negarunt & ipse.
Deprehendebam tamen Malaguetam ab Avicenna
Combazogue dicta, eumq; scribere ex Sofalaa, cui Ma-
lagueta provincia contermina est, defecit: verissimi-
le autem mihi non videri Avicennam, virum adeò

periti-

*Malagua
Carda.
nimum
non est.*

*Card. fil.
& sativus*

*Cardamo-
mi nomen
Saccolaa
1. 2.*

*Serap cor-
rigitur.*

*Cardamo-
mum Sulg.
Geteribus
Græcis sac-
colaa*

*Plin. Card.
A. Genera.
Saccolaa
descriptio.*

*Contra
Cardom.
Cremi. ar.*

perirum, bina capita de eadem re scripsisse. His cogitationibus occupato animo, Turcam mercatorem professione Iudæum, in Cochim commodum reperio, qui diceret sibi mandatum, ut præter cætera aromata *quodam quælibet*, hæc Cardamomum majus, emeret: quod me movit, ut sciscitarem an in aliis etiam regionibus nasceretur. Tandem regiarum mercium in Ceilan curator (Factorem vocat) mihi reculit, istic quidem inveniri, nostro quidem multò majus, sed minis odoratum: rémque ita se habere contempni, illius specimine (me curante) ex Ceilan delato. Accersitus præterea in Balagate ad curandum Illustrem Hamjan, cuiusdam Regis in Balagate, nomine Verido, fratrem, de industria medicamentum, in quo Cardamomum majus & minus arabica lingua præcipitur, ut conficiere possem: utrumque mihi exhibitum ad medicamenti compositionem, eadem quidem utriusque forma, sed magnitudo diversa, nulla tamen cum Malageta similitudo. Optimum autem censetur minus, quod odoratus est altero, & facultate majus dici potest, meo iudicio. Provenit utraq; in India, præsertim verò ab emporio Calecut usque ad Cananor, tametsi aliis etiam locis Malavar, & in Ioa nascatur, non tamen adeò copiosum. neque cortice adeò candido. Multus ejus usus est in his provinciis, siquidem unà cum Betre (veluti supra diximus) manditur pituiticæ caput & stomachum expurgat, & serapis admiscetur. Falsum autem est quod Sylvaticus c. 17. scripsit, Indos ejus radice adversus febris circuitus uti, nascique in tuberibus quarundam arborum. Nam exili est admodum radice, nec nisi factum provenit, solo autem ignibus perusio, ut facilius enascatur. Pandæcharium Cardamomi meminisse invenitur alibi: in nostris autem exemplaribus apud Rhafam haud facile invenies. Nullam autem facultatem similem *qualem imprope-riat Garzia* nostra Pandæcharij, qui Mathæus Sylv. est, exemplaria tribuunt. Cæterum, quicquid sit Garzias mihi videtur immeritò Cordum. redargue- re. vidimus enim hos fructus, eo modo, quo describit, in quibus femina illa, que passim in Officinis dicebantur Cardamomum, non enim loquitur de feminibus, in theca contentis: sed de toto fructu.

Clus. in fin. hist. gall. Dod. cap. 20. tradit Cardamomum Officinatum majus, diversum à Grecorum & Arabum Cardamomo, quod vocat grana Paradisi, siliqua longâ, durâ, lignosâ, ut nux *[nux Gaugæ]* longius & angustius in quo multa grana, angulosa, dura, firma, & boni odoris: Cardamomum autem minus Officinatum fructu duro, rotundo, instar Avellanæ, aut minoris, in quo etiam grana parva, angulosa, minora multò quàm majoris: Idem ait Cardamomum antiquorum & Arabum utrumque in nostrum Officinatum majus, siliqua longiore: in ea Icone multæ sunt siliquæ simul hærentes, cum foliis Lupuli aut Vitis adpictis: habet etiam aliam Cardamomi minoris Officinatum cum ramis sine foliis: si ejusmodi plantas vidit, oportebatur plenius describere. Suspiciamus etiam eum confundere Cardamomum majus siliquâ longiore cum Melegueta. Pergit idem in exor. Amomum spurium, cujus singuli uvarum fructus aliquam cum minore Cardamomo in Officinis vulgo recepto, similitudinem habent (quale autem sit Græcorum & Latinorum Cardamomum, nondum cuiquam constare opinor, certum est ab Arabum Cardamomo differre) certè uterque fructus triangularis est formæ. At Cardamomi vulgò recepti theca, oblongior est & minus crassa, multis striis distincta femina conti-

Tom. II.

nens, crassiuscula, Melegueta feminibus non valdè abimilia.

Lob. adv. officinis Cardamomum majus vocatum, oblongi siliquâ, triquetra, lapidi dactyli color est & par, semen cõdit angulosum Melegueta minus. Triquetra item siliqua sed brevior est media vocata, nec dispari semine, quàm veris putant Cardamomum propter amarorem & acrimoniam non exiguam. Minima pariter triquetra, sed vix Pruni nucleum æquat. Ast plura dignetur lector videre antè ex Adversariis tradita, quæ non recipiunt pro veterum Cardamomo, ubi notatur Anguillara, quamvis non nominetur. In obs. quatuor Cardamomi agnoscit genera, majus, minus, minimum, & medium. Hunc sequitur Plantinus & Tab. Lobelius ergo & ex eo Plantinus addunt speciem non enumeratam in adv. quia hæc non comprehendunt siliquâ Gingiberis, ut factum fuerat in Adversariis.

Cardamomum Græcorum, ut vult Oeco in el. Indo majore, aut illud ipsum est quod nostri simpliciter ita vocat, aut certè pro eo usurpari potest. Veronè in musæo Io. non reperit Maronea Cardamomum racemos esse raros & spatios; Indici verò Amomi, densos, & in seipfos convolutos; veteres Amomum dixisse racemosum, minimè verò Cardamomum: idem observavit Amomi fructum utve imaginem referte, suamq; eleganter figuram diurnissime servare, quia arctè suo ramulo adhæreat: at Cardamomi fructum etiam si suâ naturâ racemosum fortè, nihilominus tamen longè distare ab uvæ racemis: præterea quoniam tenuibus hæreat pediculis, suos racemos non diu servare integros: & hinc videntur Cardamomi fructus qui ad nos efferuntur, ferè semper avulsi à suis ramulis. Sed de Cardamomo siliquæ de quo hic agimus legant lectores ex Maronea præcedenti capite de Amomo novo Cardamomi facie, multa notatù digna. Norandum tamen Maroneam suâ iconè, cui titulus *Cardamomi tres species*, videri duas ejus species in uno & eodem ramo pingere, quasi ejusdem plantæ; nos verò ante etiam meminisse duarum Iconum à Clusio olim exhibitarum.

B. pin. Cardamomum 3. majus officinarum. Saccollaa Arabum, aut Sacoule Avienne, Elachi Mauritaniis: Cardamomum medium, Matth. I. on. Cast. Lug. Cardamomum majus, Cord. in Diof. (cui Heyl Arabum) & hist. Clus. ad Dod. Linc. 4. part. Ind. or. c. 23. Cardamomum majus vulgare, Lob. Clus. in Garz. Cardamomum, Garz. Frag. secundum, Cam. ep.

Eid. B. Cardamomum 4. medium, ut & Lob. & Tab. Cardamomum mediocre, Cord. hist. Item, Cardamomum 5. simpliciter in officinis dictum: Cardamomum minus, Matt. Lac. Lon. Lob. adv. Lug. Tab. Linc. & Cord. in Diof. & hist. cui & Helbane Arabum. Cardamomum verum, Ang. Cardamomum minus vulgare, Lob. Clus. in Garz. Cardamomum 1. Cæf. 3. Cam. ep. Eid. B. Cardamomum 6. hve minimum, ut & Lob. & Tab. Cardamomum 4. Camer. ep. Nos Cordi Cardamomum majus seorsim describendum ducimus, nec ad hæc dicta referimus.

CARDAMOMUM MAJUS MEL- ligethæ simile, sicut modo tur- binatum, Cordo.

Cardamomum majus Cordo hist. c. 28. l. 4. Melligetæ similis fructus est, minor tamen, longitudine rard sextatè superas, superius justa pythumena latior, inferius propè pediculum angustior, & sicut aut pyri modo turbinatus, nullam commissuram

S.

habens quā aperiri queat, colore foris in cinereo subrustius, veposo & distractu difficili cortice costis; intrus feminib? crebro membranulis interseptis ac distinctis. Colore, figurā ac magnitudine Melligetæ granis similibus, obtusioribus tamē angulis, plenus. Saporem grana habent quemadmodum & odorem valdè jucundum, aromaticum, tenuem, subacrem, ac modicè amarescentē. Cortici nulla est in gustu gratia, ideòq; eo exempta semina ad nos ex Syria & Ægypto afferuntur, quamvis interdum etiam integri fructus, quales jam descripsimus, advehitur. Eligito grana ejus nitidiora, ponderosiora ac odoratissima. Fructus autem integri probantur maturi, h. e. superficiem extensam habentes, undiq; præclusi, neq; ex industria aperti, neq; teredinibus cerosi, pōderosi, & consummati densiq; in se fatēti feminibus pleni. Idem in Diosc. l. c. 5. Cardamomū majus hodie quod affertur fructū habet lignosum, fractu contumacē, sicūs propemodum magnitudine & figurā: in-tus angulosi & aromatici granis Mali punicī modo plenum hoc parçibus affertur, propterea quidam in ejus locū Grana Paradisi substituunt. Scriptum in annou. apud Cordum, Cardamomū majus dici arabicè Heil diversum à Grana Paradisi, quod cū parçibus advehatur pauca simis notum esse.

Meminit Corn. Cardamomi officinarū, cujus ad fuscū & propemodū nigrū colorē delinet semen &c. Ejus verba vide ante sub Cardamomo maximo, Cōsiderādum an intelligat Cardamomū majus, de quo hīc agimus: Meminit etiā Cardamomi minoris quod utendum censet, de quo mox. Memor est etiā Clus. apud Garz. Cardamomi majoris propemodum magnitudine Cordi, verūm non demonstrat, quam plantam intelligat. Exhibet Matthiolus pro Cardamomo majore sicū similem iconem, quā ante cap. de Melegheta posuimus, quam Clusius, ut ante dictum, dicit esse Melegueta.

VIRES ET USUS.

Vi-res ex veteribus jam antè à nobis traditæ sunt. Restat igitur hoc in loco, ut eas quas apud recentiores annotatas invenimus, adscribamus. Cardamomū & Grana Paradisi calida sunt & sicca ordine secundo, inquit Lon. In corrupta decem asseruatur annis. Vfus eorū salutaris, lipotimiā laborantibus. Vertigini medentur in potu macerata, sicut & pulverifata, in juscū exhausta. Quin & ita usurpata vētriculum roborat, concoctionemq; juvant, Cardamomū cum tantundē ligni Paradyi pulverifatum ebibitumque ex vino generoso, rudibus auxiliatur, & vomitibus. Cordis tremorē pulveris hujus drachma ex vino sumpta, dubio procul emendat. Aniso mixtum, cum vino propinatum appetentiam excitat. In omnibus affectibus internis à frigore obortis uti possumus Cardamomo, quod his magnoperè conducit, præsertim muliebri sexui.

MELEGVETA SIVE CARDAMOMVM malè quibusdam existimatum Clusio.

Legantis alicujus plantæ fructum, reor (inquit Clusius ex. l. 2. c. 15.) decimum quartum, quæ fortassis crescit Cannæ Indicæ vulgò vocatæ modo: nā caulis suprema pars, capita sive siliquas sustinens, portus similis mihi videbatur, lenta ut illius & fibrosa, multisq; foliis seu appendicibus cepta, quæ foliola, quem florē proferat, nemo indicare poterat, nam Pharmacopœus qui hæc collegerat, in reditu extinctus nullum nomen adscriptum reliquerat.

Erant hæc portò capita binas uncias longa, infernā parte crassa, deinde paulatim ad supremam usq; partē gracilescētia, quali triangulari formā prædita, obtusis tamen aſgulis cartilaginosa, externè fusci ex rufo coloris, internè veluti in ternas cameras fe-

eundū longitudinem membranacā quadam cartilagine divisa, atque plena nigris, splendidibusq; feminibus, milio majoribus, densè simul congestis, & tenui membranulā involutis, intus albis & quadam acrimoniā præditis. Nascuntur autem ea capira in summo caule, quaterina aut quina, atque veluti ex eodem ortu procedunt.

Ceterū qui anno à Christi nativitate 1601. ex Java & Sumatra redibant, similes fructus, etiam in Madagascar infula lectos adferbant, quos mihi obtudere volebant pro Melegueta sive Cardamomo majore vulgò credito. Verūm quidem est, similitudinē quandam esse in externā facie: sed qui vel mediocri diligentiā utrumq; fructum consideret, discrimen obser-vabit: nam Melegueta fructus, magnā ex parte brevior & crassior est, hic vetò gracilior & oblongior; Melegueta cortex etiam minus fistis cortice durus, imò facis fragilis: hujus præterea granā nō tā numerosa quā in Melegueta, majora tamen, fusca & splendentia, singulaque peculiari candicante membranā involuta videntur, minora tamē sūt, magis rugosa & duriora istius fructus granis: præterea nō ita splendent; & subruhi sunt coloris, acerrimiq; saporis. Si quis tamen Melegueta esse cerebrosiūs cōtendere velit, mihi cum illo litem esse non cupio, modò non legitimum, sed ejus spurium aliquod genus esse non diffiteatur.

B. pin. Gtanis paradisi sive Melegueta affinis fructus: fructus 14. sive Melegueta spuria, Clus. ex l. 2. c. 15.

CARDAMOMI FACIE FRVCTVS triangularis malignus. CAP. L.


Exoticus fructus, quem accepit Clus. exot. l. 2. c. 22. È V Valachria à VVilhelmo Paduyno, erat triangularis formæ, semuncialis etiam magnitudinis, exalbidis coloris, tenuiq; membranā tectus, Cardamomi officinarum fructū perbellè referens, continensque multa grana inæqualia & rugosa, cineraci foris coloris, intus albi, omnia in globum congesta, facis validi & gravis odoris & acris saporis, qui brevissimo, & vix apparente petiolo plantæ in hæserat, calice tribus foliis constante inclusus. Qui mittebat, consulem suæ urbis unum, ex his fructibus edisse scribebat, ex cuius esse morbum contaxisset: quæ adeò causa fuit, ut ganum leniter duntaxat gustare vellem, nihil minus (an ex odore, an verò ex degustatione acciderit, ignoro) caput mihi dolere cepit, & haud dubiè petiis mihi accidisset, si devorassem.

AMOMVM VERVM QVORVNDAM. CAP. LI.

Amomi nomine à Valerando Dourez insigni pharmacopœo accepti aroma quoddā, magnitudine spicarum Stachadis Arabicæ, cujus rāmen portiones separaræ his angustiores erant: duas simul junctas vidi Pedem columbinum hirsutum exprimentes. Constant autem foliis multis squamularum imbricato positū, compactis, ex luteo albicanibus, simile aliquid & colore & formā cum Origano [onite quorundam] habentibus, odoratis, sapore viscoso, amaricante & acri.

Garcias de Amomo scribens narrat se percontatū à quodā pharmacop. Hispano quid esset Amomum: cum respondisse Arabicæ lingua Hamama nuncupari. Ejus verò Scholiastes nobis picturam exhibit ut ad Valer. Doreum Amomi nomine & Ormuz celebri sinus Arabici empotio missam: non tamen cum Plinij & Dioscor. Amomo convenire ille putat, nisi id forte sit quo se Garcias donatum asserit. Hamama verò

verò interpretatū pedē colūbinum significat: Medici Nixamoxa Regis in Decan potētissimi, dixerunt isthic non nasci, sed inter alia atomata quæ ad Regem ex Asia, Persia, & Arabia conficiendis alexipharmacis pferretur, Amomū etiam adferri, cuius ramulo medonantur. Hic cum Diosc. descriptione contuli, ad quā venisset quadrabat, & licet jāsicus, Pedem tamen



re feriens Dux sunt Hiericuntidis Rosa species, una insipida, nec odorata quæ Amomis: altera gustu aromatica valde odorata quæ verè Amomū vocatur. Hæc Cordus, cuius annotationibus quidam addit, non probati sibi Rosam Hiericuntis vulgò dictam Amomum vocari. Huic autem adscribitur Coldemb. qui absolute concludit, quod Rosa Hiericuntis vulgò vocata Amomū esse non possit. Ceterum hæc Cordus sibi odoratam pronunciat, cum tamen nobis Rosa Hiericho nec recens ac virens, nec etiam sicca odorata observata sit, nec folia habeat Bryoniae.

Cordus.

Amomum non est.



columbinum referebat. Sciendum est Amomum apud Avicennā nihil aliud esse quam Pedem columbinum. Hæc Garcias. Qui ut Clusij vetbis utar, utinam Amomū descriptionem pleniorē dedisset. Acosta de Amomo nihil certi habet: scribit de eo loqui Diosc. in Lac. Math. Amatum enar. 14. Serap. Fuch. Galen. 6. med. & Ortam, dicentem sibi denominatum Amama arabicè, quod significet Pedem columbinum & esse Amomum Avicennæ, verum quia non vidit, non describit.

Ruellius dicit Cardamomum simile Amomo & colligi cum Amomo in Arabia. Clus. ad Garc. Lug. & Tab. Amomū. B. pin. Amomū 2. spiritum solotum.

AMOMIS SIVE PSEVDAMOMVM.

AB eodem Valerando pro Pseudamomo & Amomide mihi exhibita sunt fragmenta seu partes quædam non nihil Amomo præcedenti similes, inter quas lignæ aliquæ portiones nigra, in quorum extremitatibus apparent partes squamosæ breviores quam in Amomo minus albicantes, saporis viscidus, ut nobis videtur. Hujus figura sub Amomo in præcedenti tabella, in infima ejus parte.

ROSA HIERICHO. CAP. LII.

Ignosis & confertis statim à radice natis fruticatos stolonibus, palmaribus, aut paullo majoribus, crassis, cinere coloris, in numerosam ramulorum sobolem cancellatim divaricatis, superiore parte omnibus in globum veluti coarctantibus, per quos folia rara unciam seculumve longa, semunciam lata, laciniata, cinerea, bifurcata, stoculi secundum ramos intrinsecus ubique racematim quodammodo nascuntur, candidi: quorum unumquemque sequitur vasculum, duobus loculis, membranula distinctis, totidem semina orbicularia compressa ruffa, acria continens, binis supra loculos extrinsecus veluti auriculis prominentibus ex adverso positus, ex intergerino calycis pariete, surgente stylo longiusculo: radix fatis crassa, lignosa, simplex.

Amomum (inquit Cordus in Diosc.) ut parens meus Euricius Cordus prodidit, est odoratus frutex, quæ Monachi Rosam Hiericho, & Rosam Mariæ vocant cui sententiæ ego quoque subscribo. Antorius Mufa tamè huic judicio cōtradicit, co fretus argumento, quod folia tribuatur Bryonia. Si Bryoniae folia habet, maneat Amomū, si verò dissimilia, tum primum hæc de re merito dubitamus. Mufam remora tur quod ea Rosa nares non vulnerat, quantum vis recēs, quod dictum quomodo intelligat, nō possum cōjicere. A Diosc. probatur ἡ ῥοσὴ ἱερικῶν, h. e. odoratum II.

vidisse & crevisse D. Trevisiano Patavij. Crescit enim hand difficile ex femine recentibus autem seminula complura, racematim unā stipata, glutinosa, longi minora: & intra fructus, cancellatim, reticulatimque implexi glomum contenta. Non describit Lob. femina, sed vascula.

Coloniae vidit, ait Turnerus, suffruticem manu (in pugnum cōtracta) paullo minorem, per omnia fructici à Diosc. descripto respondentem, quem ex Iudæa peregrinationis Hierosolymitarum voto defunctus quidam secum retulerat. Eadem Herbarijs dicitur Rosa Hiericuntis, i. e. Ang. Rose of Hiericho. Ferunt, quotannis circum festum natalitium aperiri, unde à quibusdam nominatur Christe masse rose. Hoc ipsum censent verum esse Amomum, si odorem haberet (quem in Amomo requirit Diosc.) nec non folia Bryoniae, in aliis enim omnibus muricè convenit descriptioni, si quis in hujus generis plantam incidat odoratam cum reliquis novis (ex Diosc.) pro vero Amomo licet accipiat.

Rosa Hiericuntis.

Gesh. in cat. Amomum quod Euricius Cordo videbatur Rosa Hierosolymitana, Aspalathum esse judicat, & idem paullo post Radicem nigra Hippoc. nominat, germ. Rosen von Hiericho. Sed Rosa Hiericuntia nihil commune habet, nec simile quicquam cum Aspalatho & Radice nigra Hippoc. quicquid scribat Gesh. Nobiscū autem sentit Casp. Bartholin. Gesh. no. dicens: Rosa Hiericuntina, vetè Rosa non est, neq; Amomū Diolcoridis, neq; Aspalatus. Neque nascitur hoctēpote in Palessina: hiericūnis hortis aut agtis.

Aspalathus. Radix nigræ.

Gesh. no.

Quidam (inquit Scalig. in lib. 1. de plantis Aristoteli in scripto) cum exeunt, spica figuram gerunt, ac evadunt postea: cujusmodi sunt qui in Arabia dicuntur Benteli, & planta quae nominatur Helofecium. Benteli apud ipsos Arabes quid sit, quosdam non inveni. Si non est Amomum, quid aliud asseram nescio. Est enim Amomum id omnino, quod Rosam Hierosolymitam, aut beate Mariae vulgus vocat, perplexo latumillo in racemi modum, quae si nihil spirat odoratum, natalium humori, atque vetustati est attribuendum: non autem detrahendum speciei, propter accidentium absentiam quorundam. Athenaeus 3. *Serap.* Bentelos concha genus margariferum prodidit apud Indos. Miror tantum iudicij vitum asserere, ita temere Rosam Hierosolymitam esse Amomum, cum nec recens, nec vetus odorem spirat ullum. Idem mecum sentit Brasavolus: non desuere ait, qui Hierosolymitanam Rosam Amomum esse putant: verum hanc non esse dubito, quia non vulnerat nares odore. Confirmat idem & Sylvius & Fuchs. l. 2. de compos. med. & Amatus in Diosc. l. i. c. 1. apud quem icon male posita cap. de Rosa. Et Rillius in Diosc. cum Lacuna. Et Lohel. Adv. & icon. pag. 203. Tom. 2. Item Lugd. Rosa Hiericonthea. Falluntur igitur cum reliquis Michael Neander phyt. part. 1. Andernachus in med. veteri & nova com. 2. dial. 5. Fritschlinus in Nom. graeco-latino c. 22. Bened. Curtius, Rob. Const. Lonic. & (teste Cronenburgio de comp. med. lib. 1. fol. 5.) Eurius Cordus, quem imitatur Cordus junior & Dasypodius, qui omnes inepte Hierichuntis Rosam Amomum esse credunt. Ex horum numero est & Regin. qui & *Lacuna Hierichuntis*, & *Evam Diosc. Galeni & Aeris* vocari scribit. Sed inter hos adhuc deterius Fritschlinus c. 32. Aspalathum, *Rosen von Zericho* esse scribit. Plus etiam ridendus Cordus quod Rosam de Hiericho Amomum esse dicat: cum idem in expositione Theriacae, nos Amomum vero carete asserat.

Benteli.

Amomum

Rosa beate Mariae Hierosol.

Bentelos concha.

Scalig. not.

Non Amomum.

Error existimantium esse Amomum.

De Rosa Hierichuntica impostura.

Rosa Hierico qua.

Locus.

Hierichuntica planta

Rosa D. Mariae.

Cord. reprehenditur.

suipius oblitus habere nos Amomum negat. Vt ut Hierichuntica nos rates mulieres tempore partus ad investendam parandam horam, quando quidem (ut ipsa fateatur) in aquam demissa, non prius fatiscit, quam fetus nasci incipiat: tanta inter Christocolas inter se superstitio.

Gabriel Girauder in itinere hierosolym. In plantae hierosolymitanae proveniunt quidam flores qui dicuntur Rosae ex Hierico, quarum insignes vires. Die nativitate eorum qui natus Dominus nosse se aperit & expandunt eorum Rosae & sunt valde utiles purperis: cum partu tunc imponenda in phyalam in qua aqua benedicta & subit Rosa aperitur, tunc femina itatim parit sine periculo. Vel haec sola hist. Girauder reddit plurima eorum quae scribitur spectata. Rosa Hiericho non meretur nomen floris, quia flores minimi & non speciosi: vires enim tales non sunt quales praedicat. quociescunque enim imponitur in aqua calida, expanditur: nec in eo parturientibus consert, quod se aperiat.

Est Catolo Stephano Rosa species, quae vulgo Rosa Hierichontis dicitur, *Rose de Hiericho*, ex qua Amomum Dioscor. colligitur, ut putatis, qui dialogum illum conscripsit, qui botanologicum inscribitur: Cui etiam Marcellus & Barbarus assentire videntur.

Caes. de Cubebis agens, inquit: Quae Amomis vocatur a Dioscoride & Plinio, hodie Rosa Hierici, vel sanctae Mariae vocatur: fructus cum sua radice palmatis, lignosis, tamulis frequentissimis implicitus, rotunda figura, quasi Chamaleontis albi caput, antequam dehiscat, fructus fert in mediis ramulis frequentes, figura Myrti tenuiores, duros, candidates, quidem est totus fructus color: continetur in duplici cavitate pauca semina nigricantia, quibus satis, aliquando provenit planta foliis parvis ut Polygoni, sed ad frugem non pervenit.

Oportebat Colerum annotasse ubi viderit Rosam Hiericho florere, vel auctore citare, qui id scripserit. Falsum est eam in Natali Christi florere.

Cordus in constantia, latine taxat Matthiolus, quae tamen facile defenditur, ut notat Apollo, quoniam tamen Hierichuntam legitimum esse Amomum contendit. Paucis tamen dehinc interjectis foliis, nos vero Amomo carere, i. e. Rosam illam Hierichuntam desiderari, non ideo suipius immemor appellandus, sed verius errore damnandus.

Rosa Hierichuntica vulgo dicta, Amomum esse nequit. Sed aliquid (teste Cam.) sermè habet commune cum Thlaspi, patum tamen vel nihil accedens, quae gustu percipiatur, nisi in radice & furculis, quorum sapor emulatur Raphanum. In festatur admodum in campis viridibus, ut Nasturtium, Eruca, Brassica & congeneres herbae. Ejus sylvestrem speciem Syria tectis & rudicibus in nascentem invenit D. Rau volflius.

Amomum tandem non esse Rosam hierichunticam testatur etiam Maronea in com. de Amomo, ubi Amomi fructum esse ait in secundo, sed valde odoratum, suapteque natura sibi met coharentem, atque multo artius, quam ipsa sibi adheret Rosa Hierichuntica sicca, nihilominus tamen idem fructus Amomi non erit similis uvae, quia veris fructibus destitutus supponitur, & quia ipsius rami & furculi nullo modo possunt referre imaginem acinorum ex quibus racemus componitur.

Nimis securè scribit Bauh. apud Matthiolum de re sibi incognita Rosae hierichonticae duas esse species, alteram totam lignosam inspidam, & inodoram; alteram aromaticam & valde odoratam. In pin. dicitur ei Rosa Hierichuntica. vulgo dicta: Amomum, Cordus in Diosc. & hist. Amomis Diosc. & Plinij, Caes. Rosa Hiericonthea, Turn. Lon. Lob. Garz. Cast. aperta

Superflua

Christicola

Vires.

Fabula

randat.

Amomum

Amomis

Rosa Hierici

ca. & S. S.

Mariae.

Colerum

prebend.

Cord.

Matth.

prebend.

Amomum

non est.

Thlaspi.

Rosa Hierico

duplex.

Rosa Hierichuntica

est Amomum.

aperta & conclusa, Eyst. Rosa de Hiericho, & Rosa Mariz monachis, Lugd. Rosa Hierichontina 1. & 2. Tab. major, Ger. In hortis facillè & crescit & floret: de hac Ioh. Sturmius Lovaniensis professor, libellum superstitionibus plenum scripsit. Eid. B. Rosa Hierichontea 2. sylvestris: Rosa Hierichontis sylv. species, Rauv. Cam.

Münstero in cosmograph. teste, Rosa hæc dicitur à Hiericho, non in agro Hiericho, sed ultra Iordanem, & regione Hiericho in Arabia nascuntur. Lutetia habui semen ab hortulano regio Robin, quod fatum Montbelgardis in horto E.C. plantam proferebat, quæ florebat lunij principio.



Hollandi copiosè invenerunt & vocarunt Blätterloß/ quia nulla folia exadè habebat. Teneiores ramulos scorbuti curacioni adhibuerunt non sine effectu. De hac planta apud alios auctores hæctenus nihil invenimus.

B. pin. Rosa Hierichontica exsiccata similis: Blätterloß Holandis, fructiculus ad scorbutum, Ind. or. par. 4. fig. 21.

APHYLLON INDICVM.

er. Syn. Locm. **B**R. v. fratrib. icon. 4. part. Indiz Orientalis scribentibus, in Insula Sancti Laurentij plantam

FINIS LIBRI XV.

Tom. II.

33





HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM LIBER XVI.



SCANDENTES POMIFERAE ET HIS AFFINES.

Scandentium classis altera, affurgendi modo serè solo, arbores imitatur, sarmentorum naturâ ab herbarum con-
diti, ne non multùm recedens, sed profectò eò ipso notabiliores, quòd fructuum mole, vastâque magnitudine cum
ipsis adèrrent arboribus. Ad hos nunc gressum festinanter dirigamus.

COLOCYNTHES CUCURBITA VETERIBVS.

C A P. I.

Kολοκυνθη
ἰδιόφυτος
Diosc.

Cucurbita
species
Theophr.

Obus est.

Satio.

Mangania.



DIOSCORIDES quamvis καλο-
κυνθη (quam ad κολοκυνθηδος
differentiam ἰδιόφυτος cogno-
minat) non describat, vires
tamen recenset, de quibus
nos infra.

Theophrastus lib. 7. hist.
c. 4. simplicem non esse Cu-
curbitarum speciem affir-
mat, sed alias meliores, alias deteriores. Cucurbitæ,
ait, partim genera esse existimant, partim negant,
sed in uno eodémque genere alias meliores, alias
esse deteriores affirmant. Cucurbitain olerum ge-
nere cum seminibus ipsis flores edit, quippe ei flos
in postremo fructûs, & crescentibus fructibus flos
diu infixus servatur. Inter æstiva brevem radicem
fortitur, tum propter tempus, tum & forsitan magis
ratione naturæ, quæ tempus secuta est: patte am-
pliatur supernâ luxuriaturque: radice tamen pusil-
lâ in hæret. Semina distantia fert: succum aquosum.
Circâ quintum diem erumpit, aut sexto, (vel ut alij
volant) septimo, sed postterius, tardiusque Cucu-
mere. Refert ad celeriores proventus recentior
femina ætas. In olerum genere Cucurbita vel ex
toto immatura atque incommutabilis permanet. Si
quis mollem, parvâmq; absconderit, ita ut alimen-
ti copia largè accedat, percoquatirque, incremen-
tum quoque largè consequitur. Sic enim nulla pars
alimenti à sole detrahitur, nec flatibus resiccatur:
quibus causis mōles augeri non potest. Dulciores
& molliores redduntur, pulverem furculo excitante
sine ngatione, cum venti anniverfarij perfiant,
hoc generi rotundo convenit.

Magnam Cucurbitarum varietatem, diversita-
témque à feminis natura dependere testatur Colu-
mella, elegantiss. suis verbis, quos hic subjicimus:

pragnânsque Cucurbita serpit.
Vna neque est illis facies, nam si tibi cordi
Longior est, gracili capitis qua vertice pender,
E tenui collis semen lege, sive globosi
Corporis, atque utero nimum qua vastâ tumescit
Ventre leges medio, subolem dabit illa capacem:
Narcicia picis, aut Actæi mellis Hymæsi
Aut habitem lymphis hamulam, Bacchòve lagenam.
Tum pueros eadem fluxus innare docebit

Docet itaque Columella in hoc carmine suo, quâ
ratione ex eodem seminio, utrumque genus, longa & rotunda Cucurbita fieri possit. Quod autem in
carmine jam recitato hac ipsa de re omisit, in prosa
non multò post addit: Aquosis autem locis primo
quoque tempore, non tamen ante Calendas Mar-
tij, semen ponendum est, ut defertur possit. Equino-
ctio confecto. Idque de media parte Cucurbitæ sem-
men in verso cacumine ponito, ut fiat incrementi
vastioris: nam sunt ad usum vasorum satis idonea.
At si esculentas merci præparabis rectè cacumine
de collo Cucurbitæ sumptum [semen] ferendum
erit, quò prolixior & tenuior fructus ejus nascatur.

Sed jam unde digressa est, revertatur oratio no-
stra. Plin. l. 19. c. 5. de Cucurbitis hæc memoriae pro-
didit: similis (cum Cucumeribus) & Cucurbitis natura,
duntaxat in nascendo. Equè Hiemem odore. A-
mant rigua ac simum. Seruntur semine in terra tes-
quipedali fossurâ, inter Æquinoctium vernum &
Solstitium: Partibus tamen aptissimè. Aliqui ma-
lunt ex Calendis Martij Cucurbitas serere simili
modo reptantibus flagellis scandentes parietum a-
spera in tectum usque, natura sublimitatis avida.
Vires sine adminiculo standi non sunt, velocitas
pernix, levi umbrâ cameras ac pergulas operiens.
Inde hæc duo prima genera: Camerarium & ple-
beium, quod humi reptit. In priore mihi tectui pedi-
culo

Rotunda
longa ex
eodem se-
minio.

Esculenta.

Plin. l. 19.

Cucurbita
vires a ge-
nere ana-
culo

culo libratur pondus immobile auræ. Cucurbita quoque o uni modo fastigiatur, vaginis maximè vitilibus, coniecta in eas postquam defloruit. Crescit quâ cogitur formâ, plerumque & draconis intortitur figurâ. Libertate verò pensili concessâ, jam viâ est novem pedum longitudinis. Cucurbitarum numerosior usus. Et primus caulis in cibo. Atque ex eo totum natura diversâ. Nuper in balinearum usum venere urceorum vice, jam pridem verò etiam cadodorum ad vina condenda. Cortex viridi tenet. Deraditur nihilominus in cibis. Cibus saluber ac lenis pluribus modis existimatur, qui perfici humano ventre non queat, sed non intumescat. Semina quæ proxima collo fuerint, proceras pariunt: item ab imis, sed non comparandas supra dictis: quæ in medio, rotundas: quæ in lateribus, crassas breviorèsq; Siccantur in umbra, & cum libet sereri, in aqua macerantur. Cibis, quò longiores tenuiorèsq; eò gratiores. Et ob id salubriores, quæ pendendo crevènt: minimùmque feminis tales habent, duritiâ ejus in cibis gratiam terminant. Eas quæ femini serentur, ante Hyemem præcidi non est mos. Postea fumo siccantur, condendis hortensiorum seminibus rusticæ felle cili. Inventa est ratio, quâ cibis quocumque serventur, usque ad alios penè preventus: & id quidem in muria fit. Sed & scrobe, opaco in loco arenâ substrato, sænôque sicco operatas, ac deinde terrâ, virides servari tradunt.

Martio Cucurbitam ferendam esse annotat Palladius: amare verò solum pingue, humidum, stercoratum, solum. Hoc in Cucurbitis insigne esse, quòd longas pariant & exiles semina, quæ in earum cervicè nascuntur: quæ in ventre fuerint, Cucurbitas faciant crassiores: quæ in fundo, latas, si in versis cacuminibus obruantur. Vbi adulescere cæperint, administris adjuvandas esse. Quæ servandæ sint ad semina, utque ad Hyemem in sua vite dependere debere, deinde sublata in Sole ponendæ, aut fumo, alter semina putrefacta deperire. Diocles author est prope Magnesiam Cucurbitas amplissimas gigni. Menodorus Erasistratus amicus Hiceli, Cucurbitarum, inquit, alia est Indica, quam & Sicyam nominant, alia est Colocynthe, nempe vulgaris. Indica ut plurimum elixatur, vulgarem autem etiam assant. Cnidij etiamnum Indicas Cucurbitas vocant. Hellepontij, quæ longæ sunt, Sicyas nuncupant, rotundas verò, & globosas Colocynthas. Apud Athenæum Euthymedus Atheniensis lib. i. de Oleribus, Cucurbitam vocat Sicyam Indicam, quòd ex India semen ejus advectum fuerit: Megalopoli- tæ verò Sicyoniam appellant. Attici uno vocabulo Colocynthen vocant. Phrynicus diminutivo nomine protulit:

Vel exigua maza parum quidpiam, vel Colocynthij.
Nihil omninò longius Marcellus de Cucurbita repetendum censuit: Græci, inquit, dulcem & quæ edendo est, Cucurbitam feminino genere in secunda declinatione *κοκοινθιδας* dixerunt: Medicam verò & amarâ, de qua nos paulò post seorsum acturi sumus, in quinta: & ab hac diminuta appellatione *κοκοινθιδας*. Est & illud animadvertendum in dulci Cucurbita ex duplici genere, duplex etiam nomen esse: rotundâ, & in globum tumenti, quæ Cucumeri similis sit, *αριδα*: tereti & in longitudinem extensâ, *κοκοινθιδας*: Latini utramque eodem Cucurbitæ nomine appellaverunt.

ÆQUIVOCA.
Cucurbitæ, sive Colocynthæ, & Colocynthidis sive Coloquintidis æquivocatione & substituta nunc proponimus. Cucurbita igitur, Græcis *κοκοινθιδας*, flore *αριδα*, & *κοκοινθιδας* *αριδα* cognominata, Latinis Cucurbita cameraria, Cucurbita plebeia, & Cucurbita sativa, est nobis Cucurbita folio molli, flore albo.

Sed & Cucurbitæ propriè dictæ genus quoddam est longum, cujus aliquot sunt differentiæ, Anguinæ dictæ.

Quædam habentur angusto collo, diverforum generû & scissæ, magnæ & parvæ, Lagenariæ vocatæ.

An plebeia Cordi referenda ad modò dictam?

Cucurbitæ folio aspero, flore luteo.

Cucurbitæ folio aspero, amaræ, diverforum quoque generum.

Cucurbitarum generi an numerat Anguriam Gesnerus. Nos Citrulum folio Colocynthidis laciniato nuncupamus.

Κολοκυνθιδας, Cucurbita silvestris, agrestis, silvatica, *Colocynthidis* Cucurbita amara, Cathartica, ex Græcia, Cucurbitula, Cucurbita caprina, Cucurbita deserti, Cucurbita Elisæi Propheta: Coloquintis vulgaris, quibusdam silv. Barbara, marina & Somphos Plinij.

Cucurbitæ scissiles, capitatæ, clypeatæ diversæ generæ, & eis affines.

Cucurbita silvestris & exigua, Græcis Somphos, Somphos, Latinis Barbara, & Marina Plinio, de qua ex eo post, Dodonæo autore adhuc incognita.

Cucurbita arborea Indica an Guanabanus, vel Higuero, de qua H. n. g. l. cap.

Cucurbitaceus fructus arboreus Clusij l. 2. c. 12. Præb. Ind. exot. traditur à nobis H. n. g. lib. 1. cap. sub fructu In- p. r. form.

dico pyriformi granis intus nigris.

De Cucurbitino fructu Indico magnitudine ovi Struthij vide postea hoc lib.

Cucurbitularum Americi Vesputij, Lagenularum Americarum Clusij exot. l. 2. c. 8. mentio fit in H. n. g. lib. cap.

Kikaium Ionæ Propheta non est Cucurbita, sed Ricinus. Ricinus, ut ostendimus H. n. lib. 3. 4. cap.

Cucurbita canina dicitur de Bryonia seu Vite al- ba, Basilio Fabro teste.

Chamæpitys dicitur Cucurbitularis Hadriano in Chamæpiti- Nomend.

SUBSTITUTA.

Si semina Cucurbitæ haberi non possint, accipienda suadet Plateatius semina Malorum dulcium. Ego verò malum Melonum, vel Cucumerum substitucere.

Cucurbitæ succo deficiente, Tract. qui pro quo sumit succum Violarum in inspidiarum.

Ad quid Felix Platerus in clystere ad febres continuas præscribit Cucurbitæ seminum loco, semina iora ferè quatuor majora ferè rancida, quæ corrupta & corruptione calidiora reddita sunt?

DE CUCURBITIS IN GENERE ex Neotericis.

Inter scandentes pomiferas plantas præcipuè nota est Cucurbita, quæ Græcis *Κοκοινθιδας*, & *Κοκοινθιδας* *αριδα* *αριδα* *αριδα*: item *Κοκοινθιδας* *αριδα* dicitur: Latini Cucurbita, Cucurbita edulis, & Cucurbita sativa: à nonnullis verò *Κοκοινθιδας* per *α* ulimâ syllaba: ab aliis *αριδα*: à Plinio Cucurbita cameraria, quòd cameratas, testudines, pergulas, topiarias hortorum fecnas scandat ac operiat. Huic verò & altera, quæ nullis prope affinentibus sulta humi repit, plebeia cognominatur.

Arabibus autem Cucurbita *Haraba*, *Hara*, seu *Charaba*, & ut Trago placet, *Vila* dicitur: Germ. *Zürbzig*, *linguar*. Belg. *Cawtoorden*: Gall. *Courge*: It. *Zucca*: Hisp. *Calabazas*: Angl. *Gourde*: Bohem. *Tyřew*: Hung. *Tök*. Græci potior ex adverso vocabulum imposuèrunt, *αριδα*. *αριδα* nominantes, quòd scilicet pumili brevèsq; sint partus, quos ipsa passim eniuntur, cum tamen corporis mole omnes herbarum arborumve fructus videantur superare. Cucurbitam verò Latini à concurvatu baud dubiè dixerunt, quòd facile si quid obstiterit, aut fuerit impedimento, quo minus extendatur, incurvescat.

Progerbia.

Quod cito fit, cito perit, sic vulgo dici solet, inquit Tragus. Quod sanè disterium, si ulla alia de re, certè de Cucurbita quàm verissimè dicitur. Ea namque unà *Æstare*, in sublime ita conscendit, ut fastigia altissimarum arborum attingat. Autumno verò si vel unam pruinam senserit, deicitur, foliis & palmatibus prorsus marcescentibus. Qui fit ut quotannis Cucurbitam serere necesse sit, id quod in nostris regionibus Aprili mense facere solemus. Tum enim nonnulli ea accipiunt semina, quæ in ventre Cucurbitarum enata fuere, eorumque mucronatas partes in terram defigunt, pollicentes sibi hæc ratione feliciter Cucurbitarum proventum. Alij semina priusquam serant, in dulci lacte, aut aqua sacchari macerant, quò scilicet erumpant, & dulciores evadant fructus, id quod non ratò contingit. Quamprimum verò bina prima ac pinguia Cucurbitæ folia eruperint, continuò rigare humum oportet, aliter tardius augetur. Iunio mense appetente, cum folia quaternâ aut quinâ Malvæ Romanæ haud dissimilia prodierint, tum & capreoli Vitium claviculis similes progignuntur, quibus natura sublimitatis avida, palos, arbores, aut quodcunque apprehenderit, conscendit Cucurbita. Post hæc flos apparet, atque is quidem dudum generum. Primus namque lanuginosus, albæ Rosæ exigua similis, quinis aut senis foliis præditus spectatur, qui tertio ab ortu die sine fructu decidit. Qui hunc subsequuntur flores (diversorù colorum) magis exigui sunt, in quorum sine fructus in pyri formam silvestris turbيناتus, conspicitur, qui in dies flore marcescente admodum augetur, ac aut in orbem collectus intumescit, aut in longum propagatur, quidam cornu instar recurvus spectatur, alius rectâ figurâ contentus est, alius gtrandis, alius contra exiguus evadit, quæ sinè varietas, diversitatique à feminis natura dependet, quod Columellæ versus testantur. Hucusque Tragus, qui unicâ figurâ tres Cucurbitæ species exprimit, ac Hebraicè Cucurbitam Kikaion (Ionæ 4.) vocat. Nos verò Guilandino potius assentientes Kikaion Ionæ non credimus Cucurbitam esse, sed potius Ricinum.

Diff. Tragi.

Icon Tragi.

Kikaion Ionæ est Ricinus.

Cucurbita species Matthioli.

Mulieres enecant herbas.

Sine femine ut nascatur.

Cucurbita. Sychia, Sycha, Sixa.

Colocynthis.

Matthiolus in Diosc. figuram habet non multum dissimilem, ab icone Tragi, tres Cucurbitæ species demonstrantem. Cucurbita sativa, inquit, quæ per Æstatem in cibum frequentissimè vario sumitur apparatu, in triplici censetur genere, nempe longa, rotunda, & sessilis. Sed quanquam Cucurbitæ inter se formâ dissimiles habeantur, non tamen propterea viribus, & naturâ sibi invicem repugnant. Si quidem (ut Columella tradit, & Plinius l. 9. c. 5. refert) forma varia in Cucurbitis arte & mangonio fieri facillè potest. Diligenter custodiendum est, ne eò mulieres accedant: ranque earum contactu facillè enlanguescant incrementa virentium, tantòque magis, si eis fluxerint menses: tunc enim solo oculorum intuitu tenellos enecant sætus. Amant Cucurbitæ mirum in modum aquas: nam si propè in patens vasculum aqua subiciatur, à quinque vel sex digitorum intervallo, ante posterum diem adrepentes cognoscantur descendisse. Sine femine nascuntur, si per triduum antea spargenda semina oleo sesamino macerentur. Camerarius quoque in ep. & hist. germ. Matthioli ut iâ imagine, tria pinxit Cucurbitæ genera, nempe longam, rotundam, & sessilem.

De Cucurbitis, hocritulo (Cucurbitæ, Sychia; Sycha; Sixa) præmittit, hæc scribit in Advers. Lob. Tanta est Cucurbitarum, Cucumerum, & Peponum inter se cognatio, ut antiqui Græci & Latini, nêdum recentiores, minus accuratè nomenclaturæ distreverint. Euthydemus si quidem in oleraceo libro Syciam Indicam nominat Colocynthidem: puta post Hippocratem, cui, uti etiam Theophrasto

videtur, quamlibet varietatem & differentiam genericam horum fructuum *oviviviv* vox significare, *Sichia* namque bullire est, unde *oviviviv*, quæ vas, ollam & pyxidem significat, & sanguisugum vitreum, aut cornu instrumentum: indeque sortè Latinis Cucurbita, tamenit Varroni à curvando dicta putetur. Aristoteles etiam Sycias Pepones appellat, & Galenus Pepocucumerem. Quare quòd facillè percipiuntur & discernantur ab invicem, quæ hodie in usum culinarium & medicatum venerunt, genera cuncta non incommodè *oviviviv*, vel Cucumeres vocamus: quarum duo summa fastigia sunt, Cucurbitæ & Melopepones, varia nomina adepta propter fructuum, foliorumque varietatem. Et rursus: Admodum verisimile fit, *Zuchra* nomen (sic enim Italianè vocant Cucurbitam depravatus elementis) *oviviviv*, aut *oviviviv*, vel *oviviviv* (utroque enim modo scribunt nonnulli Græci) designare nam *oviviviv*, unde etiam Ficus Latinis derivatur, generalissima fuit appellatio Cucurbitarum, Cucumerum, & Melopeponum. Quare Cucumerinæ familiæ maxima vocati possunt Cucurbitæ, & commodiore etymo à curvando deduci, quasi curvando, ut loquuntur Vascones & Pyrenæi. Hæc ille. Quas alij Cucurbitarum differentias agnoverint, nunc est ostendendum.

Calabassi seu Cucurbitæ in India ad miraculum usque augetur, quæ in hac sola provincia Chile nascuntur & Capallos nuncupantur: Cucurbitarum species prope infinita sunt, quædam immensâ mole monitosa sunt, quæ dissectæ & ressectæ excavantur, & ex iis varia vasa effinguntur: ex minoribus pocula, aut patenas ingeniosè cælatas concinant: Bauh. pin. ex Iosiph. Acosta l. 4. c. 9.

Cucurbita ferè etym.

Cucumerina familia.

Calabassi.

Capallos.

CUCURBITA LONGA, FOLIO molli, flore albo.



Cucurbita longa. Descrip. Ga viticula digitali crassitudine, angulosas, orgyias aliquot longas à radice tenerâ fibratâ emittit, quæ per terram sparguntur, alioquin pergulas & peticas capreolorum ope scandunt, folia rotunda, pedem aut sesquipedè lata molli lanugine tomentosa, crenis subinde nonnullis per ambitu incisâ, ex pediculo tereti, longo, concavo, flores nivei candidos, lilicæi, quinque partitù, intus villosi, exterius breviorè pilo oblitù, atque hi quidem aliâ pedicula immediatè coherent, talèque steriles sine fructu marcescunt, aliâs mediante fructus rudimento, qui delapso flore succre scit, inque in signem adolefcit magnitudinem, pedes quinque aut sex longos, cervicè crassâ, in ventrem ingeniosè turgescens, qui, si quid, quod resistat, offendit, curvatur. Cortex recentè tener, herbaceus, adulto durus, flavescens, medulla alba, insipida, medicè fungosa; femina longitudinalè ferè, longa, planâ, compressâ, unâ parte lata, duobus angulis conspicua, infernâ, quâ germinare solet, & plures angulos habentia, & sub tunicâ

tunica duriuscula alba, medullam includentia albam, dulcem, et vitatam.

Stitgardia præter vulgarem longam, aliam observare in omni, minoris crassitudinis & longitudinis, cortice candidiore.

De Cucurbita folio molli, flore albo, cui competere videntur, quæ veteres de Cucurbita memoria prodiderunt, hæc scribit Cordus. Cucurbita (inquit in Diosc. duæ sunt potiores differentia. Vna longos fert fructus, altera latos & sessiles: semine ejus Medici utuntur. Modò autem dictum genus in hist.

(ubi Tragi icon assumpta) diligenter sic descripsit: Cucurbita cameraria, quæ ante camerarum fenestras seritur, viticulam ab una radice emittit, quæ in multas alias angulosas, tenetas, & modicè concavas viticulas dividitur, folia ex intervallo proferentes, singula ferè rotunda, nisi in iis anteriori maximè partè tres plerumque acuminati anguli eminent: eadem eminentis quibusdam brevissimis, rarisque per ambitum circumvallantur, & tactu molli sunt, foliorum Albæ modo, magnitudo eorum seu latitudo secundum natalium diversitatem variat, secundo autem aprico & humido solo, apud nos in Germania pedem cum quadrante interdum latitudine excedunt: pediculus is est longus, tenet, leviter hirsutus, modicè concavus, & propemodum teres, si non modicè canaliculatus esset eo latere, quo superiori foliorum parti respouderet, capreolos secus folia producit singulos, quibus affixos baculos, & perticas apprehedit, in magna altitudinem ascendens, flores juxta folia & capreolos fert figurâ liliaceos, partim steriles, partim verò fecundos, utriusque quinis, candidis, intus hirsutis, scilicet longa iotibus, unciâ paulò angustioribus, forasque modicè reflexis & repandis consistant foliis, differunt tamen inter se. Siquidem steriles breves habent in medio apices & hirsutiores sunt, nec quicquam habent tumidi post se (ubi pediculo junguntur) quod sequuntur fructus spem faciat: fecundi verò in medio tria crassiuscula, bifidaque stamina continent, nec immediate pediculo junguntur, nam inter ipsos flores & pediculum parvum & leniter hirsutum extubertat, quod tenera Cucurbita est, capitulum juxta an nexum in angustum collum desinens, quod marcescente flore paulatim accrescit, deinde ab Autumno in magnam molem, quam Cucurbitam vocamus, aut ètum maturescat. Magnitudo & forma nõ est eadem omnibus Cucurbitis: quædam enim longæ sunt, quædam verò inferius vêtrosæ existunt, & superius in angustum collum coarctantur. Cum apud nos in Germania feliciter enate maturerint, longæ quinos ferèq; pedes longitudine, & dodrantem cum unciâ assequuntur, maximè si pensili licentiâ concessâ, liberè pependerit. Vetrosæ autem interdum in duorum pedum longitudinem & pedalem latitudinem adolefcunt: utrumque tamen genus frequentius minus capit incrementum. eam enim magnitudinem quam posuimus non semper, nec ubique consequuntur: color omnibus est in maturitate flavus, durusque & ligneus cortex: pulpa teneris est candida, gustu dulcis, maturis verò fungosa, seminibusque plena, præterquam in collo: nam eo loco ventosæ nullum semen continent: longitudo semini uncialis est, latitudo autem semuncialis: idem planum & compressum est, atque anteriori parte modicè acuminatum, posteriori verò latiusculum, duobusq; eminentiis cornutum: cotticem habet lignosum, candidum, acuminatum, compressum, gustuque dulcem nucleum claudentem. Radice tota herba nititur candida, in multas tenues partes distracta eaque semestri: in hortis sita cameras perticis extructas ascendit & oblit, facitque jucundis frigidisque scenas, latis foliis arcens: scribitur

etiam in hortis pensilibus, ante camera & fenestras, ut dictum est, unde hoc Cucurbitæ genus Camerarium Romani appellabant, ut Plinius estatur. Cord. eodem libro aliam tradit Cucurbitam, quæ an una sit ex Cucurbitis, quas postea trademus, Iagennariis, considerandum. Cucurbita plebeia, inquit, viticulis, foliis, floribus & semine camerariæ si. nilis est, fructum tantum dissimilem producit, cui duorum dodrantum, aut nonnunquam cubiti apud nos est longitudo, latitudo verò quincunx aut sextans, formâ sunt inæquali: nam in se nius longum habent ventrem, à quo in longum, nec angustum collum desinunt, interdum etiam incurvantur. Est & alia, quibus distinguuntur, differentia. Cameraria altitudinis avida est: Plebeia verò humi prorepat, quoque verus viticulas suas spargens. Saporem habet dulcem, carnemque, cum tenera adhuc est, quæ edendo fit. Et hæc Cordus.

Cucurbitam longam folio molli, flore albo, vocavit Lob. in adv. Cucurbitam sive Zuccham in obs. & ic. omnium maximam, arguinam. Ger. ut & Dod. gall. qui tertio loco describit, Cucurb. anguinam; hist. ubi Lobelij figuram habet, Cucur. longiorum. Turn. Lon. Cal. Cam. & Tabern. (apud quem icon transposita per incuriam typographicam ut existimamus, sub titulo Cucurbitæ Indice minoris, Cucurbitam longam: & sic etiam Fuchl. & Hort. Lufit. appellavere. Lugd. Cucurbitam camerariam longam. Ang. ep. 7. Cucurb. Zuccham longam; Hellepontiorum. B. phyt. Cucurb. 4. Idem pin. Cucurbita, s. five oblongam flore albo, folio molli, Cucurb. fructu oblongo, Tragi, Cord. in Diosc. Cucurb. oblongam, Fuchl. Cucurbitam, Gesn. h. sativam longam, Cal. Cucurbitam falcata figurâ serpè crescentem, quandoque cervicem tantum habentem recurvam, nonnunquam rectitudinem servatâ bicubitalem, tricubitalémque acquirentem longitudinem.

CUCURBITA LATIOR FOLIO molli, flore albo.



TRagus hujus Synon.

fructum pingit, tres enim species unâ effigie representat: Fuchsius separavit & hanc majorem vocavit, gal. Courge aut Courge grosse. Dod. gall. Cucurbitam 1. & (ut & Lugd.) Cucurb. camerariam majorem: hist. Cucurb. latiore, ventricosam ac crassam oblique collo, & inferiore fede latiore, pyri turbinatam figuram quodammodo referentem.

Hort Lufit. Cucurbitam rotundam. B. phyt. & pin. Cucurb. sive majorem sessilem flore albo, Cucur. fructu in orbem collecto in rursuscente Tragi: Cucurbitam sessilem, Matth. ep. Cucurbitam majorem, Fuchl. Turn. Latiore, Dod. Zuccham rotundam, Ang. Cucurbita sessili fructu, Cord. in Diosc. Variat hæc, inquit, magnitudine, variat colore corticis: nam sunt virides, flavæ, candidæ, quædam maculoso cortice, quædam sulcis distinctæ, quæ d' tuberosæ.

CUCUR-

CUCURBITA LAGENARIA.

Descr.

Cucurbita lagenaria non variat foliis & flore, à longa prius descripta: verùm fructu plurimum differt, collo angusto ventreque crasso, lagenas & phyalas representans: semina putamus magis fusca esse, quàm longarum.

Aurium differentia.



1. Lagenariam, collo multè longiore, colore pallido, albisque maculis ornàtam. Conditur & hæc saccharo.

2. Vidimus tandem Cucurbitam mediam inter longam & lagenariam, corpore crasso rotundo, magnitudinis circiter capitis, collotenui cubitum penè longo.

Synon.

Tragus appellat Cucurbitam camerariam & plebeiam Plinij, germ. Flesden Türbs. Turn. Fuchl. Cucurb. minore. Dod. gall. Cucurb. 2. minore. 1. hist. Cucurb. priorem. Tab. Cucurb. lagenariam majorem, & alteram minorem. Ger. Calit. & Lob. obs. & ic. Cucurbitam lagenariam, hanc in Adv. duplicem agnovit. Lagenariam, inquit, voco, ut qua pe-

Lagenar. maior.

1. regrè proficiscentes lagena utuntur, præsertim in Gallis, Hispaniis & Italia: commodiùs namque gestatur vinum, quàm vitreo aut figulino vase, quæ oneri sunt, & faciliùs franguntur. Semen illi minus, quàm superiorum: folium alioquin, flores & reliqua non disparia. Ab hac tantùm differt fructu minore, lagenulæque concinniore in exprimente, eoque lubentius commodiùsque gestatur itinerantibus. Semine, folio, & flore, delicate, non diverso.

Lagenar. minor.

2. B. phy. & pin dicitur Cucurbita, sive lagenaria flor. albo, folio molli, Cucurbita, Brunf. Cuc. plebeia Cordi, Gesf. h. Cucurbita cameraria minor, Lug. Variat fructus quandoque lagenarum formâ; aliquando ventricosâ absque collo pyri turbinati figurâ.

Varietates C. Bauh.

DE LOCO IN GENERE.

Ante in genere ex Neoteriis, ceu etiam ex veteribus, quadam de loco, tempore, satione, cultu, & mangonio commemorati sunt. Quare hic illud dentaxat adscribimus, quod apud Dodonæum in sol. lat legimus. Cucurbitæ in hortis feruntur ac coluntur. Sub Autumni tempus ad maturitatem demum perveniunt in calidis tamen regionibus citius maximè præcoces: Præcoces autem Cucurbitæ, tum & Cucumeres sic redduntur, ut Quintiliani tradunt. In cophinos aut fictilia inutilia terra cibrata mittenda, stercore admixto liquidior facta: & anticipato consueto tempore, Vere videlicet inchoante, semina implantanda, & cum sol fuerit, & calor, & mo-

Tempus.

Præcoces ut sunt.

derata pluvia, cophinos sub dio expones, circaque Solis occasus in domum: contectam inferes: atque hoc assidè faciendum, aqua irrorata, quando usus postulat erit: postquam verò perfectè de labum frigora & glacies, cophini sive dolia in locum subactum & excultum desodiendi, ita ut labra æqualia sint terræ, deinde reliqua cura adhibenda: sic ille ex Plinio.

VIREB ET USUS IN GENERE.

Cucurbita quæ editur, ex Diocoridis quidem auctoritate, cruda trita imposita, tumores & abscessus mitigat. Ramenta ejus pueris infantibus, in partium circa cerebrum & membrarum ejus inflammatione utiliter per sinapit imponuntur. Similiter ad oculos & podagricas inflammationes. At succus ramentorum expressorum, & per se, & cum rosaceo insutus, ad aurium dolores commodus est: & cuti summè à febris ardore ac astu vexatæ illitus prodest. Totius autem Cucurbitæ servata & expressæ succus, cum modico melle & nitro potus, alvum leviter solvit. Et si quis in ipsam crudam excavaram insusum vinum per noctem sub dio exponat, & temperatum jejunis bibat, leviter alvum mollit. Quantum porro ad ejus in medicina usum attinet, Galenus de simpl. humidæ frigide que temperaturæ esse scribit, utraque qualitate secundi ordinis. Quocirca ramentorum ejus succum ad aurium dolores cum phlegmone junctos, cum rosaceo utilem esse tradit. Sicutam quoque calidam illitam calidas phlegmonas mediocriter refrigerare. In esu autem humidam esse & sium propellere: crudam quidem ad esum injucundam esse, & concoctioni extremè rebellem, aded ut si quis ad ejus usum in alterius cibi inopiâ cogatur, onus frigidum in ventre situm sensurus sit: ut stomachus subvertatur, & ad vomitum concitetur, qui etiam solus liberare potest illum ab instantibus symptomatibus. Quare omnes homines, inquit 2. de Alimentis, post cocturam statim aut fatigantem fixam, aut affatam edere solent. Diphilus scribit Cucurbitam parum nutrit, facile corrumpi, habitum corporis humectare, egeri celeriter, bonum succum generare, si ex aqua & aceto sumatur, jvarèq; magis ventriculum: meliorem succum nobis suppeditat: conditam in falganum: potentius extenuare cum sinapi: concoqui minori negotio, ac excerni lessilem. Mnesitheus censet, quæ naturâ facillè ab igne vincantur, & coquantur, ut Cucurbita, corpori alimentum subministrare, non multum sanè, sed humidius & nihil molestum. Epimarchus suo carmine videtur Cucurbitam ceu inlubrem damnare:

Longè solubrius id erat, quàm Cucurbita.

Plinius l. 20. c. 3. Diocoridis sententiam ampliter explicat. Satura quoque rase succus tepesctus auribus medetur: caro eius interior sine semine, clavis pedum & suppurationibus, quæ Græci apostemata vocant. Decoctæ autem universa succus, dentium motus stabilis, & dolores inhibet. Vinum cum ea servectum, oculorum etiam impetus. Folia ejus cum recentibus Capressi, contusa & imposita, ipsa quoque tosta in argilla, ac trita cum adipè anferis, vulneribus medentur. Nec non ramentis corticis recentis podagras refrigerant, & ardores capitis & maxime infantium. Et ignes sacros vel strigmentis his impositis, vel lenientibus. Succus ex strigmentis illitus cum rosaceo & aceto, febrium ardores extinguat. Arida cinis moositus, mirè combusta sanat. Chrysippus Medicus damnabat eas in cibis. Sed omnium consensus somacho utilissimè judicantur, & interaneorum, vesicarumque exulcerationibus. Quos itaque dixit Plinius capitis ardores, & maxime infantium, Diocorides hæc dicitur habere: cophina verò pueris sunt pueri, quos inflammatio partium

Tumoribus.

Inflammationes.

Aurium dolores.

Alvum solvit.

Temperamentum ex Galeno.

In esu non.

Diphilus.

Mnesitheus.

Epimarchus.

Plinius.

Clavis.

Dentes stabilis.

Podagra.

Ignis sacros.

Diocorides.

Partium.

tium circa cerebrum & membranas ejus vexat. Ita enim Paulus l. i. c. 13. habet: *σείβεται ἐπὶ τῶν ἀρτηριῶν τοῦ πύθου ἐπιπλοῦντος ἐν τῷ κεφαλίῳ.* Et ibidem mox etiam ipse Cucurbitæ ramenta ad sriales præferit. Plinius alibi adustionem infantium, siriāsin vocat, ut l. 30. c. 15. Ossibus in canino simo in ventris, adustio infantium, quæ vocatur siriāsis, adalligatis emendatur. Et alibi infantium destillationes, ut l. 22. c. 21. Folia Heliotropij infantium destillationibus, quod siriāsin vocant, illita medentur. Alibi etiam simpliciter græco vocabulo utitur. at l. 32. c. 10. Sitalias q; infantium spongia frigida cerebro humectato, rana inversa adalligata efficacissimè sanat, quam aridam in veniā affirmat. His itaque modis Plinius siriāsim reddere conatus est. Verùm Alexander Aphrodisensis l. i. probl. 98. *σείβειν* vulgus dicere, ardorem habere ait. *ἡ δὲ τῆς, inquit, τῆς ἀρτηρίας ἐν τῷ σπέρματι τοῦ πύθου ἐπιπλοῦντος ἀποστρέφεται.* Et videtur sanè verbum à Sirio stella factum esse, de quo Pœta ait:

*Sirius ardor,
Ille sitim morbosque ferens morte alibus agris,
Nascitur & levo contristat lumine celum.*

At verò quod ex strigimētorum, (quæ ramenta Dioscorides succo Cucurbitarum ardotes refrigerari voluit, id dicit quod Dioscorides ait, cuti sum nã à febris ardore ac æstu vexata illius prodest. Cæterum, ut ad institutum redeamus, veteres Medici a pulcherrimo Valeriano de Cucurbita ita senserunt, ut eam aquam coagulata dicerent. Galenus humidam putat virtutis & frigida; idq; ex eo probat, quòd ipsa in cibo sumpta stomachum relaxat, bibendi desideria non excitat. Cætera etiam in Cucurbita talia, ut aptè frigida potestatis exempla demonstrat. Crude & trix leniunt omnem tumorem. In cibo sumptæ molliunt ventrem. Succus earum, ut Galenus ait, ad compendendum velociet auriculæ dolorem tepidifcus infunditur. Idem succus & dolorem dentium mitigat, si diutius in ore teneatur. Sed & rosaceo mixtus, & unctioe corpori ad motus, febribus resinguit ardores. Cinis aride corticis efficaciter potest combusta sanare. Eundem cinerem didicimus ab expertis vulnera in veretro jam in putredinem versa purgare, & ad cicatricem usque perducere. Semini sicco illa vis traditur, ut in pulverem tritum & inasperum impleat vulnera quæ cavata sunt. Quidam illud in vino bibendum dedere, ut solutiones alvi fluentis inhiherent. Viticulæ quoque Cucurbitæ jam senescentes cum passo & acetate dysentericis datæ, miro modo sanca intestina componunt. Ex Simeonis Sethi sententia, Cucurbita concoctu facilis, bonique succi est, & admodum nutrit. Sitim sedat, urinam cit, & ventrem movet. Calidis & siccis temperaturis prodest, & inflammationes ventris & jecoris sedat. Pituitolos autem hædit, colicòque affectus. Si malos humores assequitur, ab iis corrumpitur, & malum succum generat. Semen genitale minuit, & veneris appetentiam extinguit. Sanguis ex ea proceat, consistentiã tenuis est. Thoraci, pulmōni & vesicæ prodest. Succus ramentorum ejus cum rosaceo impositus, ad aures inflammatione laborantes confert. Integra verò illita, calidas inflammationes refrigerat. Tragus ait quosdam se vino, quod in excavata cucurbita manserit, purgare. Hoc an verum sit non sum expertus, id tamen potius existimari præferat Cucurbitas amatas folio aspero. Omnia Cucurbitarum genera, inquit, frigide & aquee sunt nature, ut rectè dixerit Plinius, Cucurbitam nihil aliud esse, quàm congelatam aquam. Cucurbitæ ad ardentes febres urinæque usurpata misceæ faciunt. Quamquam autem Cucurbitarum usus, propter frigidam, quam obtinent, humiditatem, stomacho non usque adedè conducatur, nihilominus tamen culinis passim familiares cernun-

tur. Sunt enim qui teneras illas & molliuiculas adlucina cibis estare solent, eo quo sequitur modo. Corticem exteriorem abijciunt, interiorem verò & candidam substantiam unã cum mollioribus ac immaturis seminibus bulliunt, posteaquè minutim confidunt, ac cum cepa, butyro & sale coquunt. Hic cibus ferè cum brassica capitata cõcisilla & cocta convenit, macilentisque hominibus prodest. Nonnulli Cucurbitam immaturam orbiculatam instar malorum scissam, cum butyro in sartagine fringunt. Quidam purgationes ex Cucurbita conficiunt hoc pacto. Cucurbitam recentem excavant, vinòque repletam noctis spatio relinquunt, ac manè jejuno stomacho, illud vinum bibunt. Aqua ex immaturis Cucurbitis distillata, his qui ardentibus febribus ita laborant, ut nullis aliis medicamentis calorem restinguere possint, potanda exhiberi, nec non foris in epithimate cordi & jecinori, ut reprimatur calor impenus, admovei potest. Eadem ardori capitis, quam siriāsin vocant, maxime infantium, efficacissimè magno experimento in linteolis imponitur. Quòd si aqua distillata non suppetat, succus fumatur, parique ratione usurpetur. Aqua stillatitia & succus immaturæ Cucurbitæ, non tantum aurium dolori insillatu auxiliatur, sed & oculorum, omniumque aliorum membrorum inflammationes & podagras refrigerant. De Cucurbita ita cecinit Pler:

*Succi aquei, curvis rapidique Cucurbita, bilem
Vincit, & ista cum non bene cocta ciet.*

*Quam bene gratæ tamen, cunctisq; admixta secundat.
Huic externa magis quam sua forma placet.*

Cucurbitæ folia recentia, secundum Matthiolum (ex Cardano) jumentis illita, affricatq; muscas abigunt. eadem mammis puerperarum admodum lac siccant. Oleum q; de Cucurbitarum floribus paratur, iis in oleo diutius insolatis, renum calores inunctum extinguit, & capitis dolores, præsertim in febribus mulcet: aridæ cinis ambusta, & pendendum ulcera sanat. Estur passim Aestate in cibis cum jusculis elixatum quoq; in oleo, aut butyro fixa, farina prius circumlita, & acerbæ utæ succo aspersa. Si infanti dormienti paris longitudinis Cucurbita, vel etiam Cucumis, inquit Dodonæus, in lectulo adjungatur, & febricitaverit, mox à febris liber erit. Editur & Cucurbitæ pulpa cocta, & quæ facillè subsidet, præcipuè autem elixa, quæ & præter substantiã suã lubricitatem, tum & humiditatem, alvum emollit. Asa vel fixa quàm plurimum de propria humiditate deponit, atque idcirco minus facillè descendit, nec alvum adedè citò emollit. Semen urinæ acrimoniam contemperat, & eandem mediocriter provocat. Quidam (teste Amb. Pareo) dicunt suã indultissimò loco extecti cranij se supponere frustum corticis cucurbitini exsiccati, ac coalescere, decipientes in eo ignorant. Diximus ante Cucurbitarum cortice carne exinanito peregrinè proficiscentes ureorum vice frequenter uti, in eo vina condientes, quo per iter se à sitis in jurã vindicare possint. Cæterum notissimam ait Lobelius, & de Cucurbitarum genere condituta aptissimam, arguinam vocatam. Hanc maxima copia in taleolas longas dissectam, saccharoque conditam, Lusitanos, Hispanosque venum in Septentrionem adferre, vocatq; Carbasidesiticulosus & æstu febrili vexatis gratissimas osulas esse.

Vnguentum ad achores singulare & certum (si Timot. Roef. credimus) recipit Cucurbitam, in qua oleum Olivarum fuerit, admovet igni, scutella terrea excipit sibilans oleum, cujus capit drach. iij. & tantundem Salviz silvestris, coquendo simul in patella terrea nova, dum incipit bullire, tunc ceræ & cinerum Ficis nigre, singulorum drach. unam injicit, statimque ab igne demit, agitatur deo nec refri-

Tencya in cibo / munn;

Aq. distilla / febris ur / dens.

Oculorum / dolor ex in / flammatis / ne.

Ex Mart. / Musc. / abigunt. / Lac siccant.

Calores ex / inguit.

In fan / fe / bricitans.

Urinæ acri / monia.

Impositura / quorundam / de cortice / supposito / pro cranio. / recorum / sices cor / tices subit.

Conditur / apta.

Carbasides / iticulus.

Vnguentum / ad achores.

s r aler.

carb. his / de Cris / ta.

dividi / eris.

duera.

Sium in / ter.

menteria / m. Sethi.

oxa.

enrem / hiber.

ragus re / reb.

cucurbita / ß congel / a aqua

frigeratur. Cum verd uti necesse est, in aceto decoquit fuliginem, quo abluit caput, exsiccat, deinde inungit unguento, semel in die, tertio quoque die lavat per mensem & sanati: cum pili apparent, inungit melle calido.

CUCURBITA LONGA, FLORE albo, protuberante ventre.

Defr.

ANNO 1608. sub finem Septembris exhorto Princip. Montbelg. allata fuit Cucurbita, quae longitudine sua plus quam tres spithamas aequabat, ventre oblongo orbiculati ferè, nisi lacune quaedam depressiores, costarumque obscuriorum secundum longum procurrentium sinus aliquid adimerent, ambitus ventris duas spithamas & semissem ampliabat, ad extremum quadam sui particula in unum magis latus vergebat, inclinabatque: collum cum capite spithama longius protendebatur, ambitu suo spithamam latius ampliusque existerat, in medio tenuius, caput crassius tereñisque evaserat, in eam ipsam, quae ventris prius extremum, partem magis in flexum torquebatur, incurvabaturque, levis erat undique superficies, colore albo in luteolum tendente, pediculum capiti infixum gerebat quadrangularem, & aliquantulum Helicis in morem intortum aerebat, in quatuor dein superius alias propagines multiplicabatur. Aperta carne veram proximam cortici unciam crassam obtinebat sub flavescentem, subdulcem & aquosam nondum plenè maturam, reliquam carnem albißimam, spongiosam, mollem intra se abditam condebat, cuius substantiae longè serie inharesebant femina foris albidæ, dumuscula, tunica albâ, pellucidâ, humidâque donata, cum appendice ab eadem orta longiuscula. femina contracta sublutea sunt interiùs, medullâ destituta, humore tamen aequo repleta ferè, dulcia, esùque jucunda.

Epistim.

Caro.

CUCURBITA LUTEA, COR-tice tenero.

Cucurbita hæc lutea vix utraq; manu amplecti potuit palmam alta, Martio sulcis latis & costis itè sulcois, cortice tenero, carne pallidâ, sapore aliarum Cucurbitarum. Est de genere, nisi fallor, Cucurbitarum Sicilianarum capreolis carentium. Semè habet parvum, subrotundum: duravit ad Aprilem.

Cucurb. Siciliana.

CUCURBITA OVALIS FERÈ, variegata, parva.

Provenit Montbelgarbi in horto E. C. Cucurbitæ genus parvum, longitudine palmari, ovali ferè figurâ, quod manu amplecti non poterat. Hæc ut Cucurbita amara pyriformis maculata est, minùs ramen iussa, lineis etiam latoribus multè & magis albicantibus, maculis etiam pluribus: carne albicante, saporis aliarum Cucurbitarum.

CUCURBITVLA PILÆ PALMARUM non multè major, rotunda.

Cucurbitulæ speciei miniè rotunda, pilæ palmariæ nõ multè major, lecta fuit in horto L. C. Montbelg. anno 1607. Octobri mense. Foris erat cortice tenui, fragilique, viridanti colore in summitate circumquaque imbuta, ad regionem autem petioli viror ille saturator sensim dilutus cernebatur,

Defr.

& in petioli ambitu partim luteola, partim etiam albicans viscebatur: caro ipsius interior dulcedine perfusa fenebatur, cui semina multa interjecta hinc inde sparsim fuerant, reliquis Cucurbitularum seminibus consimilia, quibus decorticatis pulpa alba simul & nonnihil flavescens conspicietur & ad dulcedinem gratam tendens. Hoc semen Româ delatum per D. ab Andlavv. Canonicum Mogun- num, nobisque communicatum fuit.

CUCURBITA FOLIIS ASPERIS, sive Zucha flore luteo.
C A P. II.

Defr.

Vlgaris notitiæ Cucurbita, flagellis sarmentifera longissimis, canaliculatis, modicè concavis, crassitudine pollinari, asperis, latè vagatur, & periticas, si quas nasci est: capreolorum in nixu & voluminibus scandit: folia larga, Cucurbitæ flore albo longè majora hianioraque, siculneis laciniis, aspera, atro virore splendentia, & per ambitum ferrata, ex pediculis dodrantalibus, solidis, modicè canaliculatis, & spinulis horrentibus: flores nonnihil odorati, fundo acetabuli

CUCURBITÆ ASPERÆ in star, in quinque icones quinque.



ICON II.



linea elata, costæ instar, pulpâ candidâ dulci & suavi.

folia hliaceis majora dissecantur, intus crocea & lanuginosa, foris ex croceo in herbaecum tendentia, costis que & venulis eminentioribus herbidis rugosa, brevissimis pilis donata: medium florem occupat, quæ aliarum platarum apicibus respondent, crocea, bisulci animalis pedem exprimentia. ij duplices sunt, quidam sine fructu pereunt, aliis succedunt fructus, qui & formâ, & magnitudine, & colore subinde variant. Est enim vel longus, vel compressus, vel globosus, vel pyramidalis, cortice duro & veluti lignoso, colore viridi aut in viridi subnigro, notis albis maculoso vel striato: carne tenerâ, albâ, subduli, non usque aded insipida, ut in Cucurbitis flore albo: femine cineraceo, magno, oblongo, alterâ parte anguloso, alterâ obtuso, iuxta crux margines circumcurrit

Magna

ICON III.



Magna sanè turba est & penè innumera Cucurbitarum folio aspero, quarum duas icones ex iis quas jam sculptas emimus præmittimus: Tres quæ sequuntur sunt etiam ex imaginibus à nobis emptis. Secunda à nobis proposita, est apud Dodon. lat. in fol. nomine Peponis majoris oblongi. quartam ponit pro Pepone rotundo minore: Eadem apud Tragum extat sub titulo Cucumetis, sive Zucconis marini.

ICON IV.



Tragus de Cucumere, seu, ut vulgò loquitur, Zucco marino hæc inter alia prodidit. Intra paucos annos quamplurima peregrinarum stipitium genera è longinquis regionibus in Germaniam deportata sunt. Inter cætera verò, & hæc poma æstiva, quæ unà in Æstate totâ suâ substantiâ adulescunt, florent & maturantur, ad nos commigrarunt. Eorum nonnulla magna, alia parva, quædam rotundæ figuræ, alia oblonga; rursus hæc dulcia, illa amara; quædam cerea seu aurea, alia luteola, sed pallida, nonnulla candida evadunt. Omnium verò eadem serè folia, idem caulis, iidemque flores, licet hæc in his majora, in illis magis exigua appareant. Flores quidem serè duplices, luteos, cymbali formam præsentantes, quorum priores nullo post se relicto fructu decedunt. Qui verò superstites manent, campanulæ similes, odore

suavi præditi cum cortugari cæperint, illic pomeus fructus consequitur, alius oblongus, alius rotundus, alius levis, glabèrque, alius multis crassifsculis & prominentibus quasi costis striatus, alius albus, alius ex pallido luteus, alius nigricans, qui tamen cum Autumni tempore maturaverit cerei efficitur coloris. Porò omnium horum generum poma, corticem seu cutem exteriorem lignosam habent, intus crocei sunt coloris, maxime ea quæ fois nigricant, lato & dulci semine referta, ita ut ducenta unum quandoque pomum contineat. Porò quod inter semina & corticem in omnibus generibus medium est, præstantissimum censetur. Quæ candida, foris & quæ ex pallido lutea sunt poma, carnem habent candidam, Rapòque formâ & sapore similem. Vniversa verò eorum genera durare per annum possunt, nec interea temporis putrilagini obnoxia sunt, siquidem ritè legantur, eaque quæ decet curâ conserventur. Postremò quòd in his pomorum generibus aureo nitet, seu cereo colore, subinde mutatur, nam vitidem rursus assumit colorem, quem mensè integro servat, deinde aureum recipit, atque sic alternis mensibus, alio atque alio tingitur colore, quod non semel magnâ cum admiratione observavi. Sunt qui hæc poma Cucumeri adnumerent, asserantque Turcicos vocari Cucumeres, quorum sententiam probare non possum. Cucumeres enim omnes humidæ sunt qualitatis, putrilagini facile obnoxii, quare diu durare non possunt. Ego vero hæc fructum, Sumner Opffel/h.e. Mala æstiva, & Tridiansch Opffel h.e. Indica Mala appello. possunt verò cum multa eorum sint genera, ita suis appellationibus distinguantur, ut dicantur,

Cucumis Socari nos mercatur.

Mala æstiva Mala Indica.

Mala Indica	} Crocea Lutea Citrina Nigra	} Gem.	} Saffrangäl Eleichgäl Geldrigäl Schwarz	} Indiansch Opffel.
----------------	---------------------------------------	--------	---	------------------------

Vulgò Zucco marina dicuntur, quòd ex ultro-Zucco marinis regionibus, partim ex Syria, partim ex India ad nos primum venerint, quod testantur appellationes ipsorum. Vulgò enim Zucco de Syria, Zucco de Peru dicuntur. Et hæc habuit de Syria. Tragus quæ de nomenclaturis hujus plantæ diceret, quibus nos haud contenti, certiora & magis probanda in medium adferemus.

Cucurbitæ folio aspero à Fuchsi Cucumeribus annumerantur. Alterius generis Cucumer est peregrinus, quem vulgus Turcicum nominat, vulgari multò major ac procerior foliis, floribus, & fructu, qui ut in vulgari Cucumere non est maculosus, sed tamen oblongus etiam, & admodum flavus. Et hinc est quòd multi eundem privatim Citrulum & Citroolum, quasi citrinum, h.e. flavum vocent. Hujus semina alba & lata sunt. Tertij generis Cucumer est qui marinus dicitur, Turcico, quod ad folia, flores, & semina atinet, serè similis, nisi quòd in hoc omnia sint minorâ: fructus verò rotundus. Vulgus Zucco marini vocat: Meer Cucumer: Galli Concombre ou Concombre marin: Officinis perinde atque Turcicus est ignotus. Et hæc Fuchsius qui Cucumeris Turci effigiem exprobit illâ icone quam secundo loco ponimus; Cucumeris verò marini imaginem illâ picturâ exhibet, quam quarto loco locavimus. Nos, ut liberè dicamus nostram sententiam, pronunciamus Fuchsi malè confuditæ, miscuissèque Cucur-

Cucumis Turcicus, Fuchsi.

Tom. II.

bitam aspero folio cum Cucumere vulgari, Citrulo & Melonibus. Magna sanè est differentia inter Cucurbitam aspero folio & Cucumerem vulgatem. Turcicum verò Cucumerem ineptè vocari ait Ctreolum.

Zuchagum que Cordo De quinque Zuchæ speciebus Cordus scripsit.

Zucha major longa inquit, viticulis, foliis, capreolis, floribus, feminibus, radicibus & asperitate, grandi oblongæque Colocynthidi similis existit. fructu verò ejusque sapore ab illa differt. siquidem figura est longum, in longitudinis circumferentia viginti sex plerumque uncias complectens, latitudinis verò ambitu octodecim uncias rard excedit. Pondere autem quinque libras sex uncias superat, pediculo hæret crasso, anguloso, nigro, solido, & tactu aspero: à cuius annexu contigui inter se & tereti superficie exeunt anguli, ipsum fructum circa pediculum veluti crassioribus striis ornantes. colorem habet principio viridem, & candicantibus maculis conspersum: in maturitate verò citrinum, superficie constar aliquantulum tuberosa, cavernosaque.

Zucha major rotunda viticulis, foliis, capreolis, floribus, feminibus, radicibus atque asperitate jam dictæ longæ Zuchæ similis est, folia tamen figura aliquantulum ad Vitis & Ficiæ folia accedunt. Fructum fert globi modo rotundum, aut modicè in latitudinem depressum, crasso, anguloso, aspero, solidoque pediculo hærentem: longitudinis circumferentia viginti duas aut nonnunquam plures, pauciorève uncias complectentem, ambitu verò latitudinis viginti quatuor uncias nonnunquam excedentem, pondere autem quinque libras atque octo uncias habentem, colore & cavernosa superficie longam majorem Zucham æmulantem. Saporem habet dulcem, a quo succo dilutum. colitur ut longa. Zucha rotunda mediocri, viticulis, capreolis, foliis, floribus, radicibus, asperitate, atque omnibus aliis proprietatibus oblongæ & grandi Colocynthidi similis existit: fructum verò habet globi modo rotundum, aut modicè compressum: in superficie modicè, ita ut vix appareat, tuberosum, quam grandis, rotundæ Colocynthidis [Colocynthis Cucurbita amara] paullo majorem, pondere civilis libræ unius cum dimidia: principio viridem, deinde maculosum, in maturitate verò luteum: qui dissectus luteam carnem ostendit, & in medio ejus sex latorum, oblongorum, acuminatorum, candidiorumque seminum ordines, quibus candidus inest nucleus. Saporem habet fructus dulcem, semen verò dulciorem. scribitur prædictorum modo. Zucha rotunda minor, per omnia mediocri similis est, præterquam quòd folia latiora habeat, fructus autem minores, sed eminentioribus angulis striatos, & in superficie magis tuberosos, quorum etiam cortex multò lignosior & durior est quàm mediocri Zuchæ, carnem habent ferè croceam, & senos feminum ordines. sapore mediocri Zuchæ respondet, cui etiam similiter colitur. Zucha magna rotunda, glabra, majoribus Zuchis viticulis, foliis, capreolis, floribus, feminibus, radicibus & asperitate similis est. fructum producit grandi & rotundæ Zuchæ figurà similem, tam longitudinis, quam latitudinis ambitu viginti duas plerumque uncias complectentem, pondere autem quinque libras duabus uncias excedentem, pediculo crasso, anguloso, aspero, nigro, solidoque hærentem, à quo eminentes prodeunt anguli, undique per fructus latera transeuntes, donec circa floris vestigium collecti, rursus conjungantur. colorem habet etiam circa maturitatem in

nigro subviridem. Si verò serenus & tepidus fuerit Autumpus citrinum colorem induit, quòd si caelum frigidum & triste fuerit, tepido loco fovendus est, ut citrinescat. Colitur prædictorum modo. Et hæc Cordus.

Celsus hort. Zuccam marinam Italiam vocatam, Cucurbitæ speciem esse concludit, Zuchamve majorem rotundam apud Cordum Zucham Indicam Matthioli suspicatur. Sed & Matthioli Zuchæ Indiane (ita enim inscribit) inter Cucurbitas refert. Sunt & alia, inquit, Cucurbitarum varia genera Italiam peregrina, quæ diu per Hiemem recentes asservari possunt. Ferunt has ab occidentalibus Indiis in Italiam venisse: una de Indiæ à pluribus vocitantur. His in post. comm. addit. Sed jam diu Italico solo proveniunt. Harum varia habentur genera, magnitudine, facie & colore differentia, referunt tamen omnes Melopeponum effigiem. Sed alia magna, imò maxima, ventricosaque, alia parva, alia mediocres, & alia oblonga, alia rotunda, vario colore, quæ quidem omnibus notiores sunt, quàm à me descripti debeant. Fructus decerpuntur Autumno & asservantur Hieme totà in eulinis. Semen in ventre condunt magnum, amygdalini nuclei figurà, in quo nucleus concluditur dulcis & suavis. Saporis subdulcis, non ut nostratibus usque aded insipidus: verum gustui insuaves sunt, nisi præcipuis condimentis saturantur. In hist. german. & epit. cum add. ubi eadem leguntur, vocat (ut etiam Castor p. 490.) Cucurbitam Indicam, Ital. Zuchæ Indiane, oltramarine & marine.

Dodon. gall. vocat Cucurbitam aspero folio Peponem, eumque duplicem facit, longum & rotundum, ut ex iconibus patet. Longum vocat magnum [Pepon grand] iterumque duplicem facit, album, scil. & viridè.

Peponis 1. sive magni, ait, fructus est prægrandis, amplus & longus, duarum specierum, viridioniger, pluribus costis, cortice admodum duro, alter albus testus cortice tenui, dulci.

Pepon 2. sive rotundus, folia habet minora, non ita profundè secta: sed & caules minores sunt, & plerumque in terram decumbentes: fructus nonnihil compressus, unus viridis, alter albicans, in quo semen minus quàm prioris, sed majus quàm Cucumeris vulgaris. Hoc genus quomodo describit Dodon. in fol. lat. haud scio. Icon. hist. gallicæ secundo loco exhibita, sit tertia in lat. quæ descriptioni non respondet. Iudicent igitur lectores, an Dodon. cognoverit plantas quarum habet icones & descriptiones. Peponum (inquit in hist. lat. in fol.) aliquot repertiuntur species, vel magnitudine, vel formâ differentes. Peponi majori oblongo folia ampla aspera, aliquot profundis incisionibus divisa: flores auri colore lutei: fructus magni, crassi, rotundi, oblongi, crassioribus striis veluti angulosi: color corticis quandoque obscurè virens, aliàs albidus: virentis autem Peponis cortex durior est, ac veluti lignosus, albidus verò mollior ac tenerior. Alterum Peponum genus, Pepon rotundus major, caulibus & foliis utriusque asperis, tum & claviculari priori simile est; sed foliorum fissuræ minus profunda, caulisque teneriores: fructus globosus, rotundiores, modò majores, frequentè minores: & quandoque virentes, duriorisque corticis: subinde cute molliore ac albicante: semina aliquando minora. Hujus generis & tertius est Pepon, asperis caulibus, foliisque fissis ac ferratis priorem referens: flos magnus quodæ ac luteus, veluti alio-

tum: fructus modicæ magnitudinis, cujus cortex

Zucha rotunda mediocri viridis.

Zucha rotunda minor.

Zucha major rotunda viridis glabra.

Cucurbita

Zuchæ Indiane Matthioli.

Cucurbita Indica generis Peponum Matthioli.

Pepo Dodonæi.

Pepo magnus, album & viridè.

Pepo rotundus, viridis & albicans.

Dodonæus.

Peponum speciei Dodonæi.

Pepo major, oblongus.

Pepo rotundus major.

Pepo citrinus, sive citrinus.

Peponum speciei Dodonæi.

Peponum speciei Dodonæi.

tex tuberculis nonnullis exasperatus, veluti Malicitei cutis, qui per maturitatem similiter luteus est, proinde & Citrium malum eum colore, tum asperitate referens. Quarti generis Pepon, sive latus, forma ab aliis plurimum differt: de hoc nos postea.

Græcis *πέπων*: Latinis similiter Pepon. *πέπων* autem omnes fructus perfecti ac maturi communi nomine dicuntur: unde Medici quidam, inquit Galenus, fructum hunc *καυοπέπων*, i.e. Peponem cucumeralem nominari oportere contendunt. Plinius lib. 9. cap. 5. Cucumeres, inquit, cum magnitudine excessere, Pepones vocantur: Germanis *Pluzer* (in hist. gall. *Pfeben* nominari dixit.) Belg. *Pepoenen* / Gal. *Pepous*, *Popous* & *Pompons* vocantur. Majores à nonnullis Turcici cognominantur: Secundi verò Martii: Tertij Hispanici: Quarti lati. Hæc Dodonæus, cui an perspecta fuerint sua Peponum genera dubitamus. Icones enim non respondent suis descriptionibus. Prima autem ejus imago in hist. gall. & lat. exhibita, ponitur à nobis pro Cucurbita asperio solo secunda. Secundum ejus Peponem hist. lat. describit foliis esse fissis, cum tamen icon foliorum fissuris careat: Hunc nos putamus in hist. gall. non describi, esseque Cucurbitam, quam fructu maximo folio non fisco cognominamus. Tertia quoque effigies in hist. lat. quæ in gall. pro secundo Peponem datur & describatur, ut Tertium Peponem exprimeret, fructus tuberculis exasperatus, ut in descriptione habetur, pingendus erat, & Citro similis.

De quarta icone, latorum Peponum, quæ in hist. gall. tertio loco posita fuit, agemus sub titulo Cucurbitæ clypeatæ affinis ovalis ad Citrum accedentis.

Cucurbitas aspero folio Lobel. in Advers. talibus descripsit verbis: Sicyopeponibus, Cucumetibus, Peponibusve oblongis, sive ovalibus, vulgarissimis, hortorum ruralium nullus vacat, eodemque vocat cuncta Germania & Anglia Pepones magnos, admodum Meloni vel Citrullo similes. Variant verò compressi, rotundi, Melonis effigie, folio minori, minisque incisio: cortice delicatesiore glauco, vel albo, nitente: semine albo Citrulli. Latiores clypeiformes nihil proferam distinales in ramis & foliis. Minus autem distinet scribit Lobelius de his fructibus. Nos clypeiformes ut & strumosum aliud referimus. In Obs. p. 363. Icon. p. 541. dedit Peponis oblongi vulgarissimi iconem, quæ ad nostram tertio loco positam accedit: nomen germanicum *Pfeben* non placet.

Suspiciamus Tabernomontanum per Peponem maximum oblongum intelligere Cucurbitæ aspero folio genus, quamvis ponatur capite de Melonibus: Itaque per Peponem Indicam minorem oblongum. Videtur nobis etiam Cucumis ejus Turcicus nihil aliud esse, quam dictæ Cucurbitæ picturam, accedentem ad nostram iconem primam.

H. Lus. Cucurbitam Indicam majorem & minorem tradit. B. phyt. & pin. Cucurbita 2. sive major rotunda flore luteo, folio aspero: Cucurbita Indica, Math. Cast. Zuecha major rotunda, Cord. hist. Cucurbita Zueca marina Italis vocata, Gesl. Cucurb. rotunda, Cæf. Cucurbita Indica rotunda, Lugd. Cucurb. Indica major & minor, Tab. Citrullus major & Pepon major sylv. Ger. quoad icon.

Varia hujus genera, magnitudine, facie & colore differentia: earum namque quoddam genus est, quod utrisque ulnis vix amplecti potest, & in insula S. Laurentij ejusmodi colore rubro, flavo & albo, & saporis longè gratioris atque nostrates ubertim proveniunt. Palud. in notis ad

Lincol. par. 2. Ind.

or. c. 5.

Tom. II.

CUCURBITA ASPERO FOLIO,
flore luteo, semine in morem
intorta.

Cucurbita hæc nata fuit in horto Montbelgard. Deser. Anno 1607. in Autumno matura facta, uncias circiter novem longa, parte superiori longiori tenuiorique duas circiter uncias in latum porrigitur. Superius à pediculi regione deorsum versus ad quatuor plus minùsve uncias in longum protensa, sensim à graciliori habitu ad crassiorem extumescit, undique rotundatur, atque in morem semiaræ intorquetur, in quibusdam verò ut in unum latus arcuatur, sic in oppositam assurgit: colore in virenti adhuc recentique fructu saturato virore nigricanteque conspersa, matura autem, reservataque diutius flavescit, extremis tamen ejus partibus adhuc viridantibus: superficie per omnia lævi, nullisque extuberantiis asperata, nisi una alterave verruca occurrenti. observantur etiam in toto longitudinis tractu costæ plurimæ à suprema parte ad inferiorem protensa, neque tamen superficiem aequalem excedentes, asperiorumque reddentes. Inferior ejus pars latior est tres uncias, ventricosisorque & rotunda, costisque, ut superior, exarata, quæ tamen in nigrore illo viridis saturatioris coloris sæpe oblitescunt, sub sinem appendicula cernitur protuberans papillæ manarum persimilis, in medio albescens.

Cucurbitam folio aspero, flore luteo, fructu non magno, ex albo ad cinereum vergente, Augusto mense vidi in Ducatu V. Wirtemberg. in pago Boll dicto, prope fontem admirabilem.

Cucurbitam folio aspero flore & fructu omnino nigro observavi in horto D. Jo. Lutz Pharmacopæi in urbe Kirchen.

Data fuit olim ab eodem Lutzio Cucurbita tenuis, longa, sesquicubitalis, circa medium angusta, costis magnis, & colore virente celebris, maculatave.

Novimus tandem Cucurbitæ folio aspero parvum genus, fructu non multo majore pugno, rubro, cum quibusdam maculis. Et hæc est Cucurbita s. Baubino in pir. sive Cucurbitæ parvum genus, fructu pugni magnitudine, cortice rubro, maculis asperata, & semine rubro, Joh. Bauhini.

CUCURBITA ASPERA, FOLIO
non fisco, fructu maximo, albo
fessili.



Fructus magnus, Deser. Caput ferè æquans, si rotundus esset, & non compressus, angulosus est & candidus: folia aspera cæteris similia, sicuti & flores lutei. Observavi in Brisgola Heterosphen arce Illustr. Equitum Rhodiensium, nondum maturum Augusto. Hoc Cucurbitæ genus, aut simile diligenter consideravi in Abbatia Mafsinster mense Octobris, fructu maximo, T 2

speciose, quem narrabant interdum ponderare ad triginta libras. Albus erat, utrinque sessilis, costis eminentibus & latis distinctus: folia hęc sunt aspera admodum, differēbant tamen ab aliis, quod non essent laciniata & filia, sed rotunda, ferē ad folia Personatę sive Bardanę accedentia.

Pepo max. Ind. comp. pressus Lob. Lob. obs. & ic. inscripsit Pepo nem maximum Indicium compressum: magnitudine à superioribus differētem, interdum 80. libras pendentem: foliis rotundioribus.

Pepo rotundus maior. Ded. Dod. lat. eandem cum Lobelio iconem habet, nomine Peponis rotundi majoris: verum ut ante nominis descriptioni non respondet iconi. Cæl. dicitur Melon sive Pepon modicē depressa & sessilis. B. phyt. & pin. Pepo 2. compressus major, corticis colore & substantiā varians, qui enim albedo est colore, substantiā est molliore: qui obscure virentes, duriore.

CUCURBITA VERRU-
cosa.

Cucurbita verrucosa fructu ab aliis differt.



Cucurbita verrucosa Dalechampia apud Lugdunum vocatur, quę aliis Cucurbitis, radice, folio, flore, capreolisq; similis est, sed fructu differt, qui in aliis lavi & plano cortice tegitur, costis tamen in Indicis e-latis & eminentibus, in hac verrucarū acrochordorum modo nodis plurimis tuberosus est, ludentis lascivientisq; naturę visendo spectaculo.

B. pin. Cucurbita 7. (6. in phyt.) verrucosa Lugd. Montbelgardi sata nobis provenit in horto E. C. V. Virt. coloris albi.

Coloris albi. An Sicyopepon strumosus Lob.

Considerandum an ad hanc Cucurbitam verrucosam, referendus sit Sicyopepon, vel Cucumis Pepon Lobelij strumosus, de quo in Adv. ait: Perelgans & rarus, foliis alioqui ficulis proximis, fructu Melonem magnum æquante, sed Limonia mala experiente, tuberosisque cortice papillatim variegato: speciosa item tricolori strumarum bullatione: semine non dissimili, Sicyopeponibus putata sive Cucurbitis folio aspero.

CUCURBITA SESSILIS FLAVE-
scens folio aspero.

Deser.

Hęc Cucurbita flavescens est novem uncias in longum porrecta, diffusa verò novem uncias in latum, undiquaque levis, nisi ubi verrucosa quędam eminentię, modò majores, modò autem minores, modò etiam duę tresve in unam quasi corpus coalescentes, lavorem ejus exasperaverint: costas lavi impressione a se mutuo distinctas diversimodęque latas obtinet, latitudinis in medio sui ventricoli corporis sesquiunciam late sunt, ad partem verò illam laterem, cui in medio flos caducus

adnatus affixus erat in angustius contrahuntur, sed tantę ibi latitudinis redditur ipsa, ut novem quoque uncias æquet, itaque complanata est, ut toti Cucurbitę sessilis nomen tribuerit, quod quasi huiusmodi projecta federe videatur: pediculus ipsius inflexus, virens, asperior & octangulus est: pulpositas ipsius substantiā interitis duas plus minùs uncias lata est, pallescens: cuius dein medium spacium in totum complent fibrosa filamenta plurima seminum magnam copiam appensam inter se condenti: cortex durus.

Exprimitur hęc quodammodo icone, quę posita est sub titulo Cucurbitę latioris folio molli, quod fructum atinet: folia autem diversa sunt, quia aspera, sicuti & flos.

In horto E. C. durant adhuc folia sequenti anno *Locus.* menſe Ianuario.

CUCURBITA SESSILIS ALBI-
cans folio aspero.

Cucurbita hęc sessilis teres & albicans fenas & *Deser.* amplius uncias longa, octòque in latum diffusa est ad floris regionem planiorem, costas habet sursum deorsumque summo lavore politas, nullis-que nisi quandoque duabus ad summum verrucosis per obliquum ventricoli corporis tendentibus eminentiis, asperiores redditas, superficialibusque sulcis ad invicem commissas: utque ad pediculum angulosum in angustum coarctantur, sic vice versà in parte subjecta ipsi è diametro opposita in latum primum diffunduntur, donec ad floris ambitum undique sinuosum angustioribus suis finibus rursus coarctantur. In horto, &c. Non multum differt hęc à precedenti flavescente.

CUCURBITA MEDIO-
crocea.

Cucurbita mediocrocea variat magnitudine. *Cucurbita mediocrocea var.* Nam aliàs ad capitis humani magnitudinem accedit, sæpè etiam minor est. Coloris quoque situ variat: communiter enim medià parte sui superiore vel inferiore, vel laterali crocea sunt poma, reliquã viridia, pallidis maculis aspersa: fit tamen ut aliquando de hoc, aliquando de isto colore magis participent. Qua junguntur colores, virides veluti pictarum regionum Alpes in croceo elevat: cortex item durus, firmus, levis: caro firmis cutela, sapore cucurbitino, subdulci: semina alba, magna, per ambitum simbriata.

CUCURBITA ASPERA MEDIÆ
magnitudinis, turbinata vari-
gati coloris.

Cucurbita aspera genus mediocris magnitudinis ferè pyriforme, variegati coloris provenit in horto E. C. quod suspensum in hypocaulo duravit totã Hieme. Semina parva subrotunda, qualia ovati.

CUCURBITÆ TURBINATÆ
maiores albę.

NOBIS missi tres fructus Basileę à D. Jacobo Zvingero, quorum duo sex aut septem unciarum, pyriformes, basi ventriosã, propter pediculum turbinatã, & aliquantulum angulosi: super-



superficies lavis est, ex luteolo pallida: caro unciam ferè crassa, Cucurbitæ vulgaris aspero folio insipida penè, gustique aqueo: semina ovata sunt, sapore dulci, grato. His similis tertius, nisi major esset, & turbine latiore & minùs acuto, ac quibusdam tuberculis, vel verrucis rariùs obsitus: Huic adaptamus figuram Guarinianam hunc fructum nostrà opinionione facis commodè exprimentem.

CUCURBITA ASPERA
pyriformis, parva,
alba.



Cucurbita pyriformis foliis est asperis laciniatis; caules longi cum capreolis per terram sparsi, Cucumerum modo: flores lutei duplices, steriles & fructiferi, ut in cæteris Cucurbitis aspero folio fructus pulcher, copiosus, albus, politus, longus unciâs quinque vel sex, superius angusto collo, infra ventricosus, qui manu completi potest: cortex, ubi maturus, durus: caro pulposa, dura, saporis cæ-

terarum: semina qualia illis parva, lata, compressa, medullam dulcem & albam includentia.

An Ger. & Tab. Pyromelo, Byren Melonen. In hist. non describit, & cum Melonibus miscet. An B. pin. Melo 4. pyriformis.

Nusquam observavi nisi in horto Illustrium Equitum Rhodiensium in Heterischi Brisgoiæ, ubi mense Septembri supra terram sparsa adhuc florebat.

Hortulanus asserbat comedi copiosè teneras cum oleo, aceto, pipere, & sale Cucumerum modo. Minùs tamen sunt palatui meo grati, illis enim peculiaris sapor.

CUCURBITA ASPERA
minima, turbinata, pal-
lida,

Clariss. Plateri munere & hanc habemus Cucurbitulam obiter turbinatam, cortice sub-

pallido, h. e. in flavum albicante: carne subduci: at semine oblongiore quàm Cucurbitula sphaerica, in subflavum etiàmque in citrinum vergente.

CUCURBITA ASPERA TUR-
binata, subcrocea.

HAUD ita pridem ex Italia delatas binas Cucurbitas accepimus, æqualis ferè magnitudinis, pingno vix capaces, in pyramidem affabrè turbinatas, adeoque quàm proximè ad formam Pyrorum, à Germanis Speßbirn/ quasi lardina distortum accedentes, nullo collo angustiore, ut in cæteris Pyriforbibus, testâ subfirmâ, cui obducta cutis lavis admodum & subcroceo lavore splendicans profusè eleganti & rariori facie. Caro qualis in cæteris, sed paullo dulcior. Semina minuta, candidissima, subrotunda, cæteris Cucurbitæ generibus ventriosiora. Plantam nondum vidimus: ubi semen terræ commiserimus, tum demum ejusdem formam describemus.

CUCURBITA ASPERA
ovalis, flavo colo-
re.

Minoris Cucurbitæ asperæ species perelegans Desf. Ovalis Cucumeris masculi penè magnitudine & figurâ quodammodo, siphnam longa, quam una manu non amplectaris. à pediculo per ejus longitudinem læves & obscuri quidam sulci descendunt: cortice est laevi, flavo, nec crasso testâ, & parum duro; circa pediculum angustior, parte oppositâ obtusior: colore est ex flavo croceo: caro cucurbitina, flavescens, digito non crassior; insigni cavitate semina iidem cucurbitina, parva, sed subrotunda claudit, qualia Pyriforbis variegata. Ejus planta tota aspera est & flore luteo.

Fructus calido loco suspensus fert Hiemem ad Locum Aprilis usque: sapor qui reliquis Cucurbitis: sata provenit in horto E. C. Montb.

CUCURBITA ASPERA PV-
gillaris, ex rotundo ob-
longa.

HAUD inelegans Cucurbitæ genus in horto Montbelg. crevit ex semine, nescimus unde importato, quod majoris Pomi magnitudine ex rotundo in ovatam tendit figuram, cortice pallido subflavo. Caro uti cæterorum, subdulcis, etui admodum grata.

CUCURBITA ASPERA MI-
nima sphaerica, crocea, va-
riegata.

ALID. Platero Cucurbita parvæ admodum generis accepimus, sphaericum ferè, flavum, & croceo emblemate Damasceni Pannoserici in morem pulchrè variegatum: caro dulcis ut cæterorum, crassifcula: semina ex rotundo oblonga, candida, mediocria. Huic similis quædam amara descripta.

An Pepo
Ind. minor
Tabern.



An est Ger. & Tab. in ic. & hist. (sine descriptione) Pedo Indicus minor rotundus, sicut runder Indianisch Peponen.

An B. pin. Pepo 4. rotundus Melonis effigie: Pepo oblongus, rotundus, luteus, viridis, Trag. Pepo sylv. Dod. Pepo rotundus compressus Melonis effigie, Lobel. & Lugdunen.

CUCURBITA ALBA ASPERA,
fructu longo collo.

Deser.

Cucurbita hæc, folio asperiori in umbrata, octo uncias longa, lagenæ figuram similem representat. Collum ipsius à petioli initio ad ventris confinia tendens, rotundum capite donatum, æquabile est, nec ullis striis intercurstantibus exasperatum, tres cum semisse uncias longum, unam unciam cum dimidia latum: venter majoris & oblongioris videam referens, longus est uncias quinq; & aliquid amplius, unciam vèd unam & aliquoulsque ulterius latus densisque, multis iidem asperioribus sulcis inæqualior redditus, sed lavorem quandam tactui gratissimum, per omnes suas partes ad capitulum usque teretis extremitates exhibens: paucis iisque minutoribus alicubi tuberculis aspersus: cortice duro. Provenit Montbelg. in E. C. horto.

CUCURBITA LAGENAM EX-
primens, parva, aspera.

Deser.

ANNO 1606. in horto E. C. crevit Cucurbita lagenulam exprimens, sulcata, palmum longa, ac etiam brevior, quam una manus amplecti non poterat, cuiusque pars inferior haud sessilis, sed veluti umbilico protuberans ad unciam semis; superior autem longum, curvum, satique angustum collum præ se ferens: color externus albidus, nonnihil flavescens: pulpa flava: semina parva, inæqualia.

CUCURBITA ALBA VERRUCOSA.

Cucurbita hæc anno 1605. Martio mense ab affine Lutzio accepta, semicubitalis erat, alba, angulosa, sessilis, costis multis interstitiis latis elevatis, tota verrucosa: cortex tener: semen magnum album.

CUCURBITA VERRUCOSA
parva.

EX Siciliis sine capreolis, ni fallor, hæc una erat, tota verrucosa, infantis capite minor, & quodammodo pyramidalis, palmum alta, lutea: semine lato.

CUCURBITÆ FOLIO ASPERO
plantatio.

Cucurbitæ folio aspero semine quotannis in hortis optimis & apricis conveniunt. Plantatio eorum sic se habet. Aprilis mense lata & dulcia semina (quæ Amygdalo putamine detracta ac purgata conferenda rectè duxit Tragus) in pingui solo panguntur, sed non nimis profundè, cubitali interstitio ab invicem distantia, requirunt enim latum spatium, siquidem feliciter provenire debeant. Decimo à satu die erumpunt, eruptione binum foliorum Cucurbitis similia, inter quæ alia majora aspera, & nigricantia, formi Malvam Romanam seu hortensem referentia prosiliunt. Cùm ergo in caules & viticulas planta hæc exierit, quod unius mensis spatium sit, tum suffulcire illam ac in alium adminiculum promovere oportet, quod nisi feceris, brevi totum agrum obducat, solet enim se longè latè que diffundere, flagellisque suis perniciose reptatu vicinis se alligare fructibus veluti Bryonia. Fructus durare per annum possunt, nec interea temporis putrelagini obnoxia sunt, siquidem ritè legantur, eaque quæ decet curâ conserventur.

Quandoquidem autem longo tempore à putrelagine tuta sunt universa hæc pomorum genera, necesse est, ut mediam quandam inter frigidum, calidum & sicum, temperaturam obtineant. Possunt ergo non tantùm in cibo, sed & medicina usui esse. Omnium horum pomorum caro, à cute & interna medulla purgata in olla cum aqua modica, sale & butyro decoqui potest, quo ritu Rapas & Mala decoquimus, èstque hic cibis non contemendus, quod si loco aquæ vinum iis adjicias, gustum suaviorem obtinebunt, Malisque decoctis similem. Ex semine putaminibus repurgato juscula dulcia parantur, instar jusculi Amygdalini. Hæc decoctio stranguriæ, calculo, ardori urinæ apprime conducit. Si quæ alia hujus plantæ sint jumenta, ea progressu temporis cognosci fortè poterunt. Cucurbitas Indicas, cùm subdulci sint sapore, credidit Martialis primo excessu refrigerare, & humectare secundo.

CUCURBITA CLYPEIFORMIS
sive Siciliana, Melo pepo latus à
nonnullis vocata.



Cucurbita hæc creta provenit absq; capreolis: folia profert Cucurbitis folio aspero nò multum dissimilia: fructus fungum representans tenero est exteriori cortice, carne luteola, sitinâ, saporis aliarum Cucurbitarum, semine pennè circinnato, palmam manus terè implet: labra reflectuntur & crispantur. In hypocausto duravit ad mensem Februarium, deinde putrefcere cepit.

Memini & hoc, & aliud Cucurbitæ hujus generis in horto E. C. Montbelgardi observasse non rectum, longioribus ramis se spargentibus, quale pingit

git Dodonæus, qui eandem cum Lobelio iconem habet cum inscriptione Peponis latioris fructus.

Lob. autem in obl. & ic. p. 542. Melopepones latiores clypeiformes vocat, & de his in adv. ait: Si-cyopepones, Cucumeres Peponesive latiores clypeiformes nihil prorsum dissimiles in ramis & foliis [à si: yopepone compressi rotundo] horti alunt, rotunda galeri specie, aut clypei umbilicati, & ambitu rimoso, atque plicis fimbriisque rugoso cortice, deli-cato, & concolori, nec diversi saporis à prædicto.

Gefn. in ap. hort. vocat Cucurbitam sessilem, ra-ram, albam, latam, compressam ab altera parte, paulo majorem Cucumere, marginibus partis latioris crispis veluti fimbriis eminentibus.

Nominavimus nos aliquando Cucurbitam Sici-lianam, & cum quibusdam germ. Muschel Kürbß. Primum nobis visa Tubingæ & Essingæ, unde semen delatum feliciter provenit in horto patris p.m. anno si bene recordor, 1561. Ego autem hæc scribo anno 1606.

B. pin. Melopepo r. clypeiformis: Peпо latus, Dod. gall. latioris fructus, Eid. & Gefn. h. Cucu-mis, Peпоve latior clypeiformis, Lob. adv. Melo-pepo latior clypeiformis, Lob. ic. Cucurbita laci-niata Dalechampij, Lugd. Cucurbita sessilis, Gef. app. Melopepo clypeatus, Tab. Peпо maximus clypeatus Ger. Nos de Pepone lato Dodonæi postea sub Cucurbita clypeiformi cortice molli, & ramosa mox plura dicemus.

Sicyopepones latiores clypeiformes in talcolas scissos, fructusque in sartagine, & farinâ asperfos, suaves admodum mandunt, in Belgio, Gallia & ali-bi, ut refert Lobelius.

CUCURBITA CAPITATA TA-
bernontani sive clypeiformis.



Pingit Tab. Cu-curbitam hanc capitatam, Böpfel Kürbß / cujus icon multa habet simi-lia, cum Cucurbita clypeiformi sine cap-reolis, sive Sicilia-na, cujus etiam hæc genus est, quod mi-ror à Compilatore alio capite fuisse positum.

B. phyt. dicitur Cucurbita 5. Eid. pin. Cucurbita 6. capitata: Cucurbita sessilis alba lata, ab altera parte com-pressa, Gefn. h. Cu-curbita capitata, Tabern. Cucurbita fungiformis, Ger. Cucurbita stellata sive sessilis, Cam. Curfrater inter capitatam Tabern. & sessi-lem (prædictam) Cucurbitâ Gefneri non distinguit.

CUCURBITA CLYPEIFORMIS
cortice molli, & ramosa.

Hic fructus satvæ flavedinis, latam, planam-que serè, circa petiolum viridem, asperam, an-gulosamque superficiem gerit, unciam circiter la-tam: mollem item corticem habet, raris sulcis exa-ratum, extremam circumferentiam multis quasi lo-

bis mollioribus, rotundioribus, sibi invicem succe-denti bus exornatam obtinet, supremam partem di-midiæ sphaeræ, depresso tamen undique, minúsq; con-vexæ similem exhibet, inq; me-dio sui fovæolâ ali-quam decidui flori-s latioris aspe-rioremque sedem spectandam offert; cortex corrugatur successu temporis: duravit ad Februa-rium menslem: ca-ro firma lutea: fer-tina parva, circi-nata serè, inæqua-lia.



Toretsche Melonen valdè similis Peponi rotundo, ramis procumbentibus, foliis & floribus, caulibus tamen non ita asperis: fructu compresso, lato, & rotundo, tecto cute leni & tenui, rugato, in margine clypeum exprimente: semine albo, simili Cucume-rino, majore tamen. De Pepone lato in sol. lat. hæc scribit: Quarti generis Pepon, latorum Peponum nomen obtinuit: Ejus caules, folia, florésque alio-rum Peponum similes sunt: fructus autem haud longus, aut globosus, verùm latus & quodammodo planus, scuto alicui propemodum similis; in medio quidem crassior, per circumferentiam verò tenuior, & quibusdam locis reflexus, crispiorum instar; cor-tex hujus mollis, tenuis ac candidus est; caro inte-rior satis dura ac durabilis; semen quàm Cucumeris majus, formâ & colore conveniens: quia durior ca-ro Peponum latorum idcirco diutiùs, quàm reliqui asservati queunt. Et hæc Dodonæus, qui tum in hist. gall. tum lat. iconem exhibet plantæ non surrectæ, aut sponte se sustinentis, sed ramosæ & procumben-tis, cui capreoli, quibus præcedens destituitur, in qua fructus, quales descripsimus ante, negleximus tamen observare qualis esset planta: hoc certò me non fugit fuisse in horto E. C. Cucurbitas fimbriatas procumbentes & se latè spargentes, sed illud non observavimus an capreolos habuerit: Præterea in hist. lat. ponit, ut diximus, præter modo dictam a-liam iconem, nomine fructus Peponis lati, quæ ead-em cum Lobeliana, de qua ante.

Peponis Indici minoris clypeati (Hain Indias Peпо Indi-nisch Schult Peponen) icon apud Taber. non mul-tùm differt ab icone Dodonæi, capreolos habente.

B. pin. Peпо 6. minor clypeatus: Peпо Indicus mi-nor clypeatus, Tab. Peпо Indicus fungiformis, Ger. Lati Pepones eduntur non modo clixi, sed & in v. su. pingui aliquo fricti. Descendunt verò & per alvum haud segniter. alimentum autem adferunt, quale a-liorum Peponum, i. e. Cucurbitarum folio aspero.

CUCURBITÆ CLYPEATÆ AFFI-
nis, sive Sicilianæ genus parvum, utrin-
que obtusum, quibusdam Me-
lo-pepo rotundus.

In horto E. C. anno 1606. provenit genus Cucurbi-licæ, quam Sicilianam vocamus. Ea pugno major est, uncias quatuor vel quinque longa, utrinque pe-


ne fessilis, magno Granato non multò maior, sed e-
larior, alba, costis uncialibus ex internodijs parvis
distincta: cortex mediocriter durus: semina parva
qualia ferè Siciliam sive Cucurbita fimbriatæ pro-
venit in horto Montbelgardensi.

Melopepon
teretis, Lob.
& Tab.



Lob. ic. p. 645. fi-
guram habet sub
inscriptione Melo-
peponis teretis,
quæ folijs destituta
minùs placet. Me-
lopeponis teretis
fructus pinguntur
apud Tabern. cum
ipsa planta carente
capreolis. Melo-
nem autem vocari
& cum Melonibus
confundi non pla-
cet. Planta nostra
capreolis non ca-
ret.

B. pin. Melopepo
3. sive teres, ut &
Lob. & Tab. Pepo
maximus rotundus,
Ger.



compressa, & ferè plana figura.

B. pig. Melo-
pepo 2. compres-
sus: Melopepo,
Ang. Pepo maxi-
mus compressus,
Ger.

Provenit anno *Locus.*
1605, in horto
E.C. Montbelgar-
di Cucurbitæ fel-
silis genus (quod
videtur respon-
dere iconi Lobe-
lij & Tabern.) la-
tum quantum ex-
pansa manus am-
plecti potest, al-
tum quatuor un-
ciarum, costis ma-
gnis, elevatimq;
superiore par-
te, ad pediculum

SICYOPEPON COMPRESSVS, rotundus, Melonis effigie.

Deser.

Sicyopepones, Cucureres Peponis sive compres-
si rotundi, Melonis effigie variant [à Cucurbita
aspera folijs] folio minori minùsque inciso, alioqui si-
mili nec dispari flore, aut fructu, nonnihil aliquan-
do orbiculatim striato: cortice delicatior, glauco,
vel albedo, nitente: femine albo Citruli. Hæc Lo-
belus in adv. qui in obs. p. 365. & ic. p. 642. figuram
habet (ut & Lug.) sub titulo Peponis rotundi com-
pressi Melonis effigie. Hanc eandem effigiem exhibet
Dodonæus pro Peponis silvestris, quam nos Cuc-
urbitam amaram vocamus: ea verò pictura accedit
ad iconem nostram ex Fuchsio pro Cucurbita aspe-
ro folio quarto loco positam, cui Dodonæus, ut mo-
nuimus, similem habet pro Peponis rotundo mino-
re. Nos peritioribus in horum pomorum cognitio-
ne indagandam relinquimus, uter melius, Lobelius
an Dodonæus accommodavit suæ descriptioni ima-
ginem.

Pepo rotun-
compressus
Melonis ef-
figie Lob.

B. pin. Pepo 4. rotundus Melonis effigie: Pepo
oblongus, rotundus, luteus, viridis, Trago. Pepo
Indicus minor rotundus, Tab. Ger.

F. us.

Sicyopepones compressos, rotundos, Melonis
effigie in taleolas scissos, frictosque in sartagine &
farinâ aspersos suaves admodum mandunt in Bel-
gio, Gallia & alibi, Lob.

CUCURBITÆ GENVS, SIVE Melopepo compressus alter, Lobelio.

Melopepo
compressus
alter Lob.

Ob. hujus figuram exhibet in Ic. p. 642. sub Me-
lopeponis compressi alterius inscriptione. Ex-
tat hujus descriptio, ni fallor, ni Hist. belg. sive teu-
tonica Lobelij, quam Strati mutò dedimus, nec-
dum recepimus. Pingitur apud Tabern. Melopepo
compressus, Breyte Pfebcu / an ex ipsa planta in e-
latet. Ic. Braun in hist. ipsius confundit cum Melo-
nibus, non sine lapsu.

Melopepo
compr. s. us
Tabern.

CUCURBITA ASPERA, CORTICE molli, alba, magnitudine Arantij.

Cucurbitæ genus magnitudine Arantij colle-
ctum in horto D. Felcis Plateri anno 1601.
mense Augusto, album erat & rotundum, costis
multis, quibusdam latis, alijs angustis, pulchro ordi-
ne distinctis: cortice molli & tenero: medullâ fun-
gosâ albâ exuccâ ferè, sapore nullo insigni: femine
pro pomi magnitudine satis magno, longiusculo.
In hypocausto reservatum mensis Martij 16. die ru-
gas contraxit.

B. pin. Pepo 5. rotundus Arantij forma: Cucurbi-
ta Arantij forma, Eyslt.

PEPO INDICVS MINOR, angulosus, Tabern.



Nihil habemus
adhuc certi &
notatu dignum
de Peponis Indico mi-
nore anguloso Ta-
bern. dicto, germa-
nic. Klein India
nisch edeching Pe-
ponen. Ejus ta-
men iconem & no-
men suspicatur ef-
se genus aliquod
Cucurbitæ folio a-
spere. An hoc ca-
pite bene ponam-
us hanc iconem
asserere non aude-
mus. Idem de se-
quiti dicimus. Cõ-
siderandum item
venit, an quæ inscri-
ptiõs describitur, sit

eadem cum precedenti?

Cucurbita ista utrinque tuberosa, & extume-
scens, lata est uncias quinque, & quatuor ferè lon-
ga, petiolum habet inflexum, exasperatum, quin-
quangulum, striis per longitudinem aliquot inica-
tum: regio amplior (cujus medio infixus hæret pe-
tiolus)

Deser.

tiolus) multis costis, modo majoribus, quasque geminis, modo minoribus, sinumque aliquem latum inter majorum interstitia relinquuntibus inæqualiter quidem, non autem aspera reddita est: costæ ipsius majores plurimæque à medio petioli centro deflectentes, versusque ventem excurrentes undique prominent: alterà verò parte, quâ floris regionem spectat, iisdem quoque sulcis à costis latioribus inculcatis, & zonæ instar transversim Cucurbitam amplectentibus, donata est, sed in eo distat à priori regione pediculum respiciente, quod hæc tuberosa cum sit, non tamen in fastigium ita strictum constringat, sed latius, ut aliquomodo scissilis imibi evadat, circa verò ventris extruberantiam depressionem fortitur, quæ in altera regione ipsi adjacenti minime conspicienda exhibetur, quia rectâ ad pediculi culmen usque fastigiatur.

C. B. B. pin. Pepo 7. minor angulosus: Pepo Indicus minor angulosus, Tab. Ger. Huc & Peponem minorem Indicum 4. Tabernomontani, referendum censet Bauhinus in pin. Nos hunc postea pingimus & describimus.

CUCURBITA INDICA MINOR Tabern.



*P*inxit Tabern. in Icon. Cucurbitæ genus hoc surrectum, sine capreolis, titulo Cucurbitæ Indicæ minoris, Klein *Zn dantsch Kürbß*. Verùm in Hist. (ubi icon trãsposta, malè sub titulo Cucurbitæ longæ) nulla differentia ab altera Cucurbita Indica, quæ ibi posita, traditur, præterquam à magnitudine. Verùm sicõ vera, & herba sine capreolis provenit, genus erit pulchrum & à nobis nondum observatum. An ritè hunc locum eidemus, ignoramus.

An Cordo in obs. silva, Cucumis recto caule, fructu Melonis aut Peponis parvi?

CUCURBITÆ INDICÆ MINORI Tabern. accedens, tuberculis abundans.


*P*rovenit hæc anno 1605. in horto E.C. Montbelgardi Cucurbitæ genus sessile, accedens ad iconem Cucurbitæ Indicæ minoris Tabernomontani. Ea palmo longior, crasso ventre, quem non utraque manu amplexus fueris, parte supremâ, in qua costæ latæ & magni sulci, angustior multò, alba tota, multis tuberculis, & veluti verrucis exasperata: cortice mediocriter duro.

CUCURBITÆ INDICÆ præcoces.

*D*E Cucurbitis Indicis spacio 25. dierum à satumaturis scribunt Hist. & nographi novi retum

Indicarum, quarum meminit Quæqueranus Galus in libro de laudibus prov. n. c. De magnis Cucurbitis quibus Brasiliæ ad piscandum utuntur, J. Ge. I. Olor. lib. 2. hist. Port. parte 15. Cucurbitas ad natandum aptas commemorat Levinus Apollinaris lib. 1.

CUCURBITA INDICA PARVA.



*I*nter fructus raros ostendit p. m. E. C. Princeps Friederici, Dux VVirttemberg. Cucurbitæ genus ferè globosum, pugno paulò majus, versus pediculum nonnihil pyriforme, cortice crasso valdè, subflavo, maculis fuscis notato: seminibus Cucurbitæ molli folio longo, minoribus, angulosis; cortice duriore; medulla alba; ejusdem saporis cum prædictis.

CUCURBITA CLYPEIFORMIS tuberosa & verrucosa.

*H*æc Cucurbita lata depressaque est, planitie Deser. sicut alicui similis, dodrantalibus propè latitudinis, quaternumque unciarum altitudinis, circumscripturæ (à petiolo crasso, aspero, anguloso, albicanteque) ad summum sermè ipsius fastigium, hemisphæricæ rotunditatis & longitudinis, cum adnatis quibusdam tuberculis inæqualis magnitudinis, eandem interverterent, inæqualiterque redderent: superioris sui parte uncialem undique planitiæque superficiem occupat, in quibusdam verò locis eadem declivior & prominentior, ad instar saxosæ extuberantia, constituitur ob tubercula mammata, verrucosaque: planitiæque mediùm occupat convexa quadam, omnique ex parte declinans globositas, suis quoque sulcis à summa globi parte ad inani, nunc altius, nunc verò levius incisa, suisque tuberculis exasperata, summitas verò ipsius latiusculam forata est superficiem, quam sive tuberculum aliquod latum vocare malis, sive alij cuivis rei assimilens, licebit. Duri atque crassi est corticis particeps. Pulpa ipsius interior carnosâ & firma, asservaturque diu. Semen ipsi parvum, latiusculum, quate aliis Clypeiformibus. Alebatur anno 1607. in E. C. VVirt. horto. *Locus.*

CUCURBITA LATA, CLYPEIFORMI accedens, minus tuberosa.

*H*ic fructus flavidi coloris à tuberosa & verrucosa clypeiformi Cucurbita in eo distat, quod depressam undique, & in se consistentem coarctatamve magis formam obtineat, sulcis suis modo altius, modò verò levius cortici impressis, deinde quoque, quod superiori sui parte, non ut ille mortuculum planitiæ medio incumbentem, imminentemve sustineat, sed rectâ sursum versus, sulcis iisdem eo tendentibus mollior, clementerque elevatur,

tur, affurgitque, inque sui summa parte floris decidui vestigium albicans, latiusque gerit, qua parte pediculo hæret sessilis & nonnihil concamerata: cortex non multum durus: semina planè clypeiformis similia, subrotunda fetè: pulpa subflava. Duravit ad Februarium usque sequentis anni 1607.

Cortex.
Semina.

CVCVRBITA CLYPEATÆ AFFI-
nis, ovalis, angulosa, ad Citrum
nonnihil accedens.

Deser.

Fructus hic ovalem figuram per omnia fetè refert, longitudine sua ad quinque uncias protenditur, latitudine verò crassitieque quatuor uncias complectitur. ad petiolum viridem, angulosum, striatum, & scabrum, plures occurrunt majores striæ, juxta eminentias protuberantes, ex minoribus plurimis in ventris sinuoso ambitu obvius in unam petioli extremitatem concurrentibus striis producta. Venter in orbem circumdatus per transversum multis magnis majoribus, minoribusque sulcis est exaratus, in terque medios sulcos tubercula inæqualis eminentiæ circumquaque se visui spectanda offerunt. Ad extremum fastigio acuminatio-ri quam ad pediculi regionem apparebat, donatur. Colore est flavescens. Citrium medium æmulatur nonnihil: cortex durus: semina subrotunda ad clypeatas accedentia. Consideretur an huic, Pepono Citrio similis, quem capite de Cucurbita aspero folio ex Dodonæo delineavimus, conveniat: Icon certè non respondet.

Venter.

CVCVRBITÆ CLYPEATÆ AFFI-
nis à pediculo in conum
definens.

Deser.



Cucurbita hæc turbinem inversum (seu conum) metanque referens, quincuncialis est longitudinis, digitorumque in pugnum compressorum amplitudinem suà ventriositate exæquat, isque ad petiolum (qui crassus est, ubi dependentem fructu sustinet, striatus, subherbaceus, albidis punctis notatus) profundioribusque liris profusus est, ut fossulam quasi aliquam petiolum sibi inversum quasi ambiente visendum exhibeat, quæque ab alioribus sulcis ex latiore ambitu ad usque innum petioli centrum excavatur, venter etiam compluribus altius incisus liris exaratus est, qui tandem secundum ductum suum continuum ad extremum usque verticem sensim disparent, vertex ipse demum colliculum gracilescens fastigio donatum exhibet. Cortex durus flavescens, caro ejusdem coloris: semina subrotunda, inæqualia. Provenit in horto E.C. Montbelg. anno 1607, duravitque usque ad Martium anni subsequentis.

Locus.

Tabern. inscripuit Peponem minorem Indicium quartum. Hunc Bauh. in pin. cum Pepono suo 7.

sive Indico minore anguloso Tab. eundem facit, quod non probamus.

CVCVRBITÆ CLYPEATIS AFFI-
nes utrinque aliquo modo
turbinata.

Cucurbitæ gentis folio aspero varians magnitudinem totius fructus, crassitiem ventris, ejusque etiam longitudinem, vel denique longitudinem, crassitiemque colli. Vnum enim genus, longum est in totu uncis octo propemodum. Venter verò ipsius in longitudinem quatuor unciarum protenditur, suaque crassitie trium est unciarum. Collum denique extensum est ad quatuor uncias, crassitudine verò suà duas uncias complet.

Secundum porro genus oblongum est secundum totum sex uncis, ventriositas verò ipsius extensa est ad quatuor & amplius uncias, crassa verò quatuor unciarum. Colli demum spacium inter ventrem & pediculum interjectum est unius uncie & dimidiatæ. Crassitudo verò ejus adæquat duas uncias.

Tertia varietas integram longitudinem absolvit: quinque uncis. Ejus verò venter ad tres uncias & dimidiam porrigitur, crassus autem est trium & amplius unciarum. Collum denique productum est ad duas uncias cum semelle; crallum verò trium & si quid est amplius, unciarum. Cæteroque in omnia genera in universum considerata in eo conveniunt, quòd striis secundum ipsorum totum ductum sunt profusa, excepto primo genere quod usque ad ventriositatem suam sulcatum est, reliqua pars rotunda est fermè, omnibusque striis destituta, tuberculis ramen aliquibus hinc inde compressa diversæ magnitudinis. Dein verò sub finem ventris cuiusque differentie tuberculum aliquod prominens conspicitur. Pediculus denique viridis, in medio autem ipsorum genere albicans visitur, angulosus & ad tactum asperior: cortex durus flavescens: semina qualia Cucurbitæ latioris. Hi fructus diu in corrupti conservantur.

CVCVRBITÆ FOLIO ASPERO
amaro. CAP. III.

Dodonæus lat. in fol. Pepones agrestes vocat Pepones & tota natura silvestres, fructibus crassis, oblongis, striatis, durioris corticis ac colore virentibus, sed minoribus multo: pulpa & interiori medulla, unà cum seminibus, veluti fativorum, sed admodum amaris: semine quoque paulò minore. Horum veteres non meminerunt, inquit Dodonæus, qui iconem habet, que non videtur multum differre, à sui Peponis rotundi minoris effigie, quæ eadem cum figura nostra pro Cucurbita folio aspero, quarto loco posita. Dodonæi imaginem Peponis silvestris Lobelius pro Pepono rotundo compresso Melonis effigie pingit. De Cucurbitis verò asperis folio amaris in Advers. loquitur, ubi ait: S: tas Colecyntides in hortis Batavis, Gallicis & Italis vidi triplicis aut quadruplicis varietatis: fructum nempe pusillæ Cucurbitæ, aut pyri, aut lagenulæ effigie, ex fusco viridante, cortice nonnihil maculis variegato, reliquâ foliorum facie Cucumerem silvestrem referente, teterrimi saporis. Memini etiam exactè sphericas. maximum Arantium aut Citrium vocatum Adami pomum æquiparantes, etiam nonnihil variegato cortice. Vides & nonnullam compressæ rotunditatis, subflavi corticis, quarum omnium eadem vires, & dicitur amaror. Saxissimè pusilli, Peponis oblongi effigie, ovum asferium aut olonnum æquan-

æquantes, corticis durioris, & viridi in atro, & cinereo maculati sunt.

De Cucurbitis asperis amaris nobis cognitis, deinceps seorsim actui sumus. Et primum quidem eas describemus quas Cordus in hist. pl. delineat.

Trag. lat. vocat Cucumeris seu Zucco marini tertium genus amatum profus, veluti Colocynthides. Meminit in hist. germ. hujus Cucumeris sub nomina Indianisch Opffel.

Alicubi locis incultis sponte Pepones silvestres (Cucurbitas folio aspero amaras) gigni concedit Dodonæus; Verùm in Germania ac Belgio non nisi fatos provenire.

Vti porro totâ suâ naturâ silv. Pepones valdè amari sunt, ita quoque temperamento calidi, sicci- que, & secundo quidem ordine intenso: expurgandi quoque non in minorem vim, quàm silvestres Cucumeres obtinent, inquit Dodonæus. Vinum præterea quod calyci, exemptâ cum semine medullâ, infusum, tantisper in eo hæserit, donec amaritudinem plenum contraxerit, per alvum purgat. ac pituitosos biliôsque educit humores. In summa hujus succus idem quod Cucumeris agrestis præstat: reficatus verò Elaterij loco succedere potest.

CUCURBITA ASPERO FOLIO,
amara, grandis, oblonga, viridis.

Colocynthis grandis, oblonga Cordi, ab unâ radice viticulam emittit digitali aut pollicari crassitudine, quæ in multas alias angulosas, undique per terram aliquot orgyiarum longitudine sparsas dividitur. hæ juxta exortum graciliores sunt. æt aliquantulum reptando progrella digiti ferè crassitudinem consequuntur, eadem in dodrantali intervallo geniculis præcinguntur, secus quæ capreolos emittit, & singula erigit folia, longitudine & latitudine pedali, in tres partes Lupuli modo secta, tactu aspera & brevibus aculeis horrida, pedalius aut cubitalibus, teretibus, asperis, concavique pediculis in sidentia, ab eisdem geniculis radices in terram demittit tenues, quibus nutriendo fructui succurrit, flores secus foliorum exortum profert duplicis generis, fecundos & steriles. Steriles longo concavo in sident pediculo, Lilijque figuram & quantitatem habent, præterquam quod intus hirsutus, & colore luteus sit, atque labrum ipsius in quinque tantum partes dissecetur, reliqua floris pars concava & continua est, in cujus medio cæchryi simile capitulum eminet, retro ipsum florem nullum extuberat tuberculum, quod sequuntur fructus spem faciat. Fecundus autem flos breviori, solidiori & crassiori nititur pediculo, intusque tria crassa, hirsuta, luteaque tubercula, staminum vice continet, quibus in fundo floris melleus liquor circumfunditur: retro florem capitulum eminet, quod decidente flore in grandem & humi procumbentem excrescit fructum, longitudine plerumque dodrantalem, ea crassitudine, quæ utraque manu circum amplecti vix possit, duarum civilium librarum pondus habet, is primum viridem colorem habet, postea candicantibus maculis conspergitur, in maturitate postremò totus in luteo pallet, & circa pediculum eminentibus angulis distinguitur. dissectus, corticem primum ostendit durum, lignosumque, mox flavam, cartilagosamque carnem, & in medio ejus sex ordines feminum candidiorum, acuminatorum, laterum & planorum. in quibus candidus est nucleus. Radice nititur semestri & admodum brevi, à qua alia multa candida in diversas partes exeunt, longitudine cubitales, & funicularum modo tenues, quòd si quis plantam hanc humi repere nolit, supra

cameras perticis extructas ducat, ea enim ratione capreolis baculos apprehendet, & atregias five fecinas faciet. Saporem fructus habet amarissimum & gravem odorem: feminis autem nucleus dulcis est. Scribitur spectaculi gratia in latis hortorum areis. *Locus.*

B. pin. Colocynthis, oblonga: Colocynthis grandis oblonga, Cord. hist. Colocynthis grandis candida, solo colore ab oblonga differens, Eid. hist. Variat colore: alia enim primum viridem colorem in cortice ostendit; postea maculis candicantibus conspergitur; postremò totus in luteo pallet, sitque durus & lignosus: alia principio viret quidem, sed mox albicantibus maculis aspergitur, at in maturitate totus albicat. Cordus. hist. differentias sex proposuit, & ex eo Lugd. inquit frater.

Ego verò hinc primam Cordi differentiam describo, & de secunda nunc dicam. Tertia & quarta mihi est Cucurbita foliis asperis, five Zucha. Quintam inscribo Cucurbitam aspero folio, amaram, turbinatam, &c. de hac mox, ut & de sexta, quam voco Cucurbitam oblongam, non angulosam, &c.

CUCURBITA ASPERO FOLIO,
amara, grandis, rotunda, viridis.

Colocynthis grandis, rotunda (ita à Cordo de *Colocynth.* descriptionis auctore vocatur) oblongæ grandis *grandis rotunda Cord.* Colocynthidi, viticulis, capreolis, floribus, foliorum magnitudine, radicibus, asperitate, atque omnibus aliis accidentibus similis & æqualis est. duobus tantum differt. folia namque in quinque partes divisa habet, fructusque minores superfcie equali, pondere civilem libram excedentes & globi instar rotundos, aut modicè planos, utrinque tam circa pediculum, quàm floris vestigium modicè eminentibus angulis distinctos: quibus color est primum viridis, in maturitate verò pallidus, qui dissecti substantiâ, feminum ordine & figurâ oblongis similis sunt, præterquam quòd nonnunquam octonos feminum ordines habeat, ac totidem quoque oblongæ Colocynthidi contingere possunt. Sapore & odore oblongæ respondet.

CUCURBITA ASPERO FOLIO,
amara, turbinata, flava candicantibus
lineis inscripta, parva.

Colocynthis turbinata, viticulas, capreolos, folia, & flores grandis & oblongæ Colocynthidi *Colocynth.* similes profert, & similiter per terram repent, sed *turbinata* omnes partes tenuiores habet. fructum producit pyri *Cordi.* turbinatum (cujus pyramis circa pediculum est) ovo majorem in maturitate flavum, & candicantibus lineis per longitudinem distinctum, foris durum & lignosum, intus autem fungosâ carne plenum, in qua quatuor oblongorum, planorum, parvorum ac candidorum feminum ordines continentur. Radicibus nititur prædictis similibus, sed minoribus multò, quibus semestris est vita, è geniculis autem nullas in terram demittit radices. Saporem habet amarum, ut prædictæ Colocynthis species, quibus etiam similiter colitur, inquit Cordus de Colocynthide turbinata, cujus descriptioni male Gesnerus, vel alius apposuit Colocynthis iconem ex Trago. Nec enim hoc capite Colocynthidem describere ei animus fuit.

CUCURBITA OBLONGA, NON
angulosa, colore viridi, amara, folio aspero.

Colocynthis oblonga, glabra. auctore Cordo, *Colocynth.* viticulis, capreolis, foliis, flore & radicibus *oblonga glabra, Cordi.* grandis

grandi & oblongæ Colocynthidi similis & æqualis est, folia tamen quoque versus dodrantem vix excedunt, & non longè à mucrone duabus incisuris, sed non profundis in tres partes dividuntur: fructum habet oblongum, eidem Colocynthidi similem, sed sine angulis & omninò glabrum, minorèmq. nam longitudinis circumferentia quindecim uncias rariò excedit; latitudinis verò duodecim uncias complectitur; colorem habet primò viridem, in maturitate verò obscure luteum, ac in paleorem saturatum degenerantem; seminum ordine, colore, & quantitate, atque carnis substantia, colore ac sapore prædictas Colocynthides æmulatur, quibus etiam similiter in hortis colitur.

Tragus hujus meminit in hist. germ. nomine Colocynthidis: in hist. lat. vocat Cucumens seu Zucco manni tertium genus, amarum.

CVCVRBITA AMARA, MAGNA,
folio aspero, colore vario.

Descr. **S**apor nomen dedit. Nam Colocynthidis in modum amaricat caro. Magnitudo capitis humani ferè est, aliàs major, aliàs minor, quèmq. certis limitibus coëtere facilè non sit. *Cortex.* Cortex herbeus, guttis & maculis flavis perfusus, porracinis, h. e. ex viridi flavescens, lineis latis intersectus, durissimus cætero qui, ac firmus, non ita tamen ut in Cucurbitis vulgaribus non amaris. *Semen.* Semen majusculum est, album, oblongum, quale in Cucurbitis aspero folio, quibus etiam similia folia, flores lutei, rami, & cætera.

Varietates. Anno 1606. provenerunt in horto E.C. quædam duobus pugnis multò majores, aliæ minores penè orbiculares, & quædam verrucosæ. Durantur ad mensem Martium anni sequentis hæ Colocynthides, si ita appellare malis, quàm Cucurbitas.

CVCVRBITA ASPERA, AMARA,
fructu parvo, globoso, colore vario.



Alia prioris similia

Montbelgardi in horto E.C. provenit Colocynthis folio aspero, parva, rotunda, pilis palmariis paulo major, amara, cortice duro, externè diversè colore. Novimus quoddam hujus esu sibi insignes vomitus provocasse.

Similem observavimus non amarum, quæ à nobis hic descripta minor videbatur. Ico autem ex Guarianianis jam seulptis emptis, citm propositam Cucurbitam

amaram exprimere videretur eam assumpsimus. Et hæc fortè fuerit satæ Colocynthidis secundæ Lobelii, fructu maximi Arantij, de qua ante.

CVCVRBITA SIVE COLOCYN-
this amara, pyriformis, variegata.

Descr. **L**ongius paulò à Colocynthidis, quam officinarum usus accepit, formà recessit; præsertim fo-



lis: satmentis longissimis, asperis, capiculatis, clavicularum beneficio ricas topiarias cõscendentibus: folio Cucumens, magis laciniato, atrovi-
rente superius & molliore, inferius herbido & aspero: floribus Cucurbitæ folio aspero, duplicis generis, croceis: fructus succedunt pugillares, formæ pyri turbinatæ, viridantes, lirisque albicantibus virgati, consimilibus quoque notis temperè maculosis: car-

ne candida, odoris gravis dum venter, saporis amari intolerabilis, cui semen immergitur copiosum, compressum, candidum, sive Cucurbita usitatis, folio aspero.

Hæ Cucurbita proveniens in horto E.C. non varietat parum vanat, cœu anno 1607. deprehendimus. In tres eodem namque horto parvæ quædam mediocri pyri magnitudine provenerunt, quædam pugno crassiores, & quædam ferè rotundæ: cortice tenui, non valdè duro, coloris supra dicti: seminibus parvis, sublongis.

Tragus Colocynthidem alteram sive germani-Colocynthide vocat, ac diversi planè generis esse à Colocynthide vera, non solum ex fructu, verùm etiam foliis, & univèrta formà demonstrat. Spiræ à nonnullis, inquit, voluptatis gratiâ plantari consuevit. Semine quoque, quod habet latum, & Citrullis vulgò vocatis quadantenus simile, feritur. Folia profert non cineracea, sed nigricantia, aspera, formà verò Cucumerem luteum repræsentantia. Caules ejus seu sarmenta rotunda & aspera humi repunt, sicut Bryoniæ, neque unquam sublimia affectant, humilia ac dejecto statu semper contenta. Per terram enim reptant, ita quidem ut una sepe planta latissimum campum vestiat, nam plures obtinet clavículas, quibus vicinis se alliget fruticibus. Duo gignit florum genera, & ea quidem lutea, ac flori Cucurbitæ con-
similia, quorum primum quidem cum nullum habeat in fine adjunctum fructum protinus evanescit; alterum verò fructum post se relinquit, in modum pyri mediocriter magni, maximè ejus quod Germani Negelsbyren vocant, turbinatum. Is ubi Autumno appetente maturescit, citreæ cernitur coloris, intus fungosus, ac multis seminibus repletus, impensè etiam amarus. Hic bilem & pituitam leniter & citra periculum purgat. Colocynthid hæc arenosâ & humidâ gaudet terrâ, fructum fert copiosum, ut non rarò ducenta lata pomæ una de planta legerit Tragus.

Dod. lar. in sol. Cucurbitam sylvestrem inscribit, ac de ea ait: Viticulis, caulibus, capreolis, ac foliis mollibus, ac vltimi lanuginosis sativam æmulatur, omnibus ac singulis multò minoribus. scandit verò & hæc scenas, umbracula, actestudines hortenses: fructus Cucurbitis ventricosis ac lagenulis referentibus, forma quidem similis, sed magnitudine longè inferior, omninò videlicet parvulus, nec vulgari pyro major, utpote qui & manu concludi ac comprehendendi queat. cortex hujus exterior initio vires, postea durus sicut ligni quoque colorem assumit. interior medulla humida, & admodum succulenta est, in

est, in qua semen latet. amara autem hæc est, veluti silvestriam Peponum, h. e. Cucurbitarum asperarum amararum. Sunt quibus legitima hæc Colocynthis videtur, sed à veritate aberrantibus: Nam Colocynthis Anguria sylvestris est, cujus & tenuis cortex facillè admittitur, & pulpa interior fungosa reficcatur. Hujus autem Cucurbitæ silvestris datum ac lignosum putamen, medulla verò adèd humida, ut se non reficcari, aut ægrè admodum patiat. In calidis regionibus (pontè alicubi gignitur, sed in Germania ac Belgio non nisi facta reperitur, ubi & tadè ac rarò perficitur. Hæc Dodonæus, cui ut suspicamur, non bene nota fuit, quam pro Cucurbita silvestri exhibuit. Ea enim quæ nobis nota, & ante tradita est, folio est Cucurbitarum asperarum filio, sive laciniato, floribus luteis, non Cucurbitarum mollium floribus albis: Icon quam exhibet Dodonæus foliis est laciniatis, qua in re differt à Cucurbita flore albo, quod monere oportebat Dodonæum. Nos ejus iconem proponimus, ut quæ mediocriter nostram Colocynthidem pyriformem exprimat.

Lob. in obs. p. 397. Icon. p. 645. vocat Colocynthidem pyriformem, de qua ante ex Lobelij Adv. egimus. Tab. inscribit Colocynthidem fœminam.

B. phyt. & pin. Colocynthidem 4. sive pyriformem, seu Peponem amarum; Colocynthidem germanicam, Tragi. Colocynthidem 2. Dod. gall. fœminam, Tab. Colocynth. turbinatam, Cord. hist. Colocynth. pyriformem, Loh. Lugd. & Ger. Colocynth. nigram, pyriformem, Cam. Cucurbitam silv. Dod. figurâ pyri, Cæf. Pseudocolocynthidem pyri formâ, Eysf. Cucurbitam silv. Somphon dictam Plinio, quorundam.

Cæterum facultate hæc Cucurbita calida & fœca est, nec minùs quàm Colocynthis, ut Pepones silvestres [Cucurbita aspera amara] utriusque videlicet qualitatis ordine secundo: Est verò & insigniter amara, quamobrem & obstructos meatus expurgat, ac aperit: purgandi quoque vim per inferiorem ventrem, æquè ac silv. Pepones obtinet, si Dodonæo credimus. Vinum etiam, quod in excavatam hæc Cucurbitulam nocte totâ permanserit, valenter quoque purgat, & biliosos ac pituitosos humores educit.

CUCURBITA AMARA PARVA, mediocri magnitudinis.

MONspelio egregius Medicinæ Candidatus, Anton. Dinot, pro Colocynthide pyriformi nobis semina misit parva, Cucumerinis breviora, sed latiora, Cucurbitarum asperarum formâ, in ambitu veluti linea lucida & splendentem circumducta, nucleum continentia non amarum, ac ferè insipidum: cortice interim amaro. Planta quæ nobis inde Montbelgar di enata, folia fert cæteris Cucurbitis asperis figurâ similia, quædam profundius, alia minùs profundè laciniata, quædam ad Xanthij folium quodammodo accedunt, ita aspera ac hirsuta conspiciuntur. Caulis angulosi, flores parvi, lutei; cæteris alioqui similes: fructus parvus, pyriformis, albus. Caulis summi valdè amari, qui excreverunt ad multos cubitos, suis capreolis proxima quaque amplectentes.

CUCURBITA MINIMA lutea amara.

Cucurbita minima, Arantio similis, sulcata, lutea, cortice est duro, carne flavescente, amarâ: Tom. II.

femine parvo. Similem habemus ex Mafsiunthes, pugno minore, majorem verò præcedenti, valde amarâ, luteam cortice & carne: femine majora Eadem fortè cum præcedenti.

CUCURBITA SESSILIS ET compressa, flava, amara.

Cucurbita hæc parva est & sessilis admodum, vix uncias quatuor alta, palmo latior, flava, cortice duro, seminibus parvis sublongis: insigniter amara. Accedit ad Sicilianam, non tamen fimbriata. Provenit nobis anno 1606. Montbelgardi.

COLOCYNTHIS VETERIBUS, & in genere.

C A P. IV.

Colocynthis, quæ aliis Cucurbita silvestris [Cucurbita alex. Corn. d. 3. legend. in suscipitur] aliis Cucurbitula amara [Cucurbita alex. d. 3. legend. in suscipitur] & aliis Cucurbita Alexandrina [Cucurbita alex. d. 3. legend. in suscipitur] dicta est, frumenta, foliaque emittit per terram strata, sativi Cucumeris similia, incifutis divisa: fructum verò rotundum, mediocri pilæ similitudine, vehementer amarum: quem legere oportet, cum cæperit ad pallidiorum colorem vergere, Diosc.

Plin. l. 20. c. 3. Cucurbitam silvestrem alteram vocat, postquam enim de prima Somphos à Græcis altera Cucurbita silv. appellata egit, sic ait: Colocynthis vocatur alia [Cucurbita silv.] ipsa plera, sed minor quàm sativa. Vtilior pallida, quando ejus sunt medicinæ. Herbacea arefacta per se inanit alvum, &c.

Mesues videtur marem & fœminam facere. Præstantissima fœmina, inquit, præsertim si est magna, alba, lenis, rara, levis, uti ejus interior medulla, sexus, alba, rara, lenis, levis, &c. cumque languescente virore cæperit in luteum colorem mutari.

De Coloquintida apud Serapionem, præter ea quæ de vinibus ex Dioscoride, Galeno, Habix, Rafe, Christiano, Aben Mesuai, & Abuberig habentur, hæc leguntur. Kandel, h. e. Coloquintida est Habix Melo agrestis. Et oportet quòd ille qui colligit Coloquintidas, colligat eas in fine sui anni, quando sunt maturæ, & color earum incipit fieri citrinus, & non colligatur illa, quæ est viridis, quando videlicet incipit condenfari sua Rosa, aut dum ipsa habet aliquid viriditatis, quoniam modicum ex ipsa occidit, & propriè illa quæ reperitur sola in arbore sua occidit potantem se sine dubio, &c. Sed quando colligitur, postquam citrinatur pomum ejus, & est perfectè maturum, & hoc est, quando advenit frigus ei, videlicet quando accenditur lampas, scil. in mense Septembri, in principio Autumni, confert potanti, &c. Et scias quòd Coloquintida, quæ oritur in rupibus & locis altis, est fortioris operationis, quàm illa quæ est propinqua aquis. Hæc fusius infra de viribus recensentur.

Videtur autem Colocynthis, silvestris, spontè nascentis Cucurbitæ species illa, quam Morsem sive Exitim in cacabo, vocant queribundus prophetæ illi, qui apud Eliseum fame pressi, cum cibo indigerent, jussitque esset quidam incoquere pulmento olera, collectam magnam hujus copiam, ratus esse Cucurbitam esculentam, olla indidit: Illi verò ut esitare cæperunt amarorem insectum, quasi in ortem detestati sunt, nec potèr comedere potuerunt, tum ad Prophetam protinus exclamaverunt, & Mors inquit, Dinine, est in cacabo, V

ne piffumus vefi. Vates autem Elifeus miraculis potens fretusque multis, farina adjecta pulmentum Colocynthisaque silvestres dulcoravit, edendoque commodas reddidit: quare oportuit esse amarissimas.

PLANTÆ COLOCYNTHIDIS nomine donatæ.

- Præter Colocynthidem vulgatam officinarum, Colocynthis nomen plantæ sequentes obtinuerunt. Cucurbitæ folio aspero amaræ, de quibus ante, ceu & de sequentibus.
- Guc. aspera amara.* 1. Cucurbita aspero folio, amara, grandis, oblonga, viridis.
 - Rotunda.* 3. Cucurbita aspero folio, amara, grandis, rotunda, viridis.
 - Turbinata.* 4. Cucurbita aspero folio, amara, turbinata, flava, candicantibus lineis inscripta, parva.
 - Non angulosa.* 5. Cucurbita oblonga, non angulosa, colore viridi, amara, folio aspero.
 - Colore vario.* 6. Cucurbita amara, magna, folio aspero, colore vario.
 - Fructus globoso.* 7. Cucurbita aspero folio amara, fructu parvo, globoso, colore vario.
 - Pyriformis.* 8. Cucurbita five Colocynthis amara, pyriformis, variegata.
 - Cuc. largenaria.* 9. Cucurbita folio molli, flore albo, longa five largenaria.

COLOCYNthis.

Descr.

Notiora officinis poma hujus quam herba, quæ per terram sparsa, striatis, asperis flagellis, folia per intervalla profert singularia, pediculis duarum triumve unciarum, vel etiam longioribus hærentia, aspera, incana & hirsuta, præsertim verò parte inferiore pûctis albicantibus notata, laciniata, Citrulli divisura, sed minore, ad quorum pediculos exeunt tortiles capreoli, & ipsi quoque hirsuti. flores luteoli. poma pugno æqualia, Lob. subflava, virentia, virosaque: deferuntur exempto cortice flavescente: pulpa candida, fungosa, levissima, amarissima, horrenda & ingenter



amaro gustu, fauces, viscera, intestinæque lædens, teste Lobelio, cui immersa femina parva compressa, dura (per æque lignum, Lob.) polita, alba, vel rufescentis, vel ut Dod. sordentis coloris.

Nomina linguar.

Colocynthis hæc, surgosam obtinens medullam, græcè *κολοκύνθη*, latinè Colocynthis, Cucurbitula, Cucurbita amara, Cucurbita silvestris, Cucurbita caprina, Cucurbita deserti, Cucurbita Alevandrina, Thymbra, Autogenes & Tutrastra appellatur. Mefues Fel terræ & necem plantarum nominat: Scapio *Kandel*, Habix autem Melonem agrestem nuncupavit. Averrhoes *Haanthal* dixit. Apud Ephem Prophetam Regum 4. Colocynthisdes *Parlyoth Sa-*

Fel terra. Melo agrestis.

de, h.e. Cucurbitæ silvestres dicuntur à singulari nimirum *Pakkuah*, h.e. Colocynthis. Vocæ ut autem in Imaëlica lingua *Chiydel*: Germ. *Frieblin*/ *Coeloquint*/ *Witterfarb*/ *Wildfarb*/ *Wesfarb*/ *Erdgallen*: Belg. *Quint* appel: Gall. *Coloquinte*, seu *Courge sauvage*: Ital. Hisp. Angl. & Bobem. *Coloquinrida*. Colocynthis porro, ut Cordo placet, diminutivum est à Colocyntha, i.e. Cucurbita. Apud Cordum in Diose. quidam annotavit eam esse propriè Colocynthidem, quæ est fructu longiore: Alteram verò, quæ in pharmacopoliis utitur, Somphon esse. Idem in historia ejus l. c. 97. posuit Colocynthis hujus iconem ex Trago. Verùm hoc loco non ponenda erat, quia Cordus banc Colocynthidem ibi non describit.

Dodon. in fol. lat. p. 378. figuram Lobelij exhibet: descriptio verò & reliqua conveniunt cum iis, quæ tradita sunt in hist. purgantium. Idem p. 654. eandem rursus iconem habet sub titulo Colocynthis, iniquis: silvestre autem hujus (Anguriarum intellige) genus est Colocynthis dicta, de qua supra dictum fuit. Quia porro consimili esset facie [cum Cucurbita] sed multò minor tota, Cucurbitulam & *ovobolu*, five Cucumerulum vocarunt Hippocrates & Ægineta, ducti, ut ait Lobelius, potius foliorum aspectu, quam planè contrariis facultatibus.

Lob. dicitur Colocynthis five Cucurbitula amara cathartica, ut Icon. p. 645. L. p. byt. & pin. Colocynthis i. five fructu rotundo major. Cucurbita agrestis, Brunf. Colocynthis vera, Trag. Colocynthis, Math. Ang. Cord. in Diose. (& Cucurbita deserti) Gesn. h. (& Cucurbita silv.) Lac. Lon. Lob. (& Cucurbitula amara) Lugd. Cast. Cam. Ger. Colocynthis prima, Dodon. gall. mas, Tab. Dodonæo alicubi Anguria silvestris. Colore est viridi, magnitudine utramque manum replente.

In Germania (inquit Fuchb) sua sponte non nascitur, lata tamen provenit, sed rarissimè perfectionem attingit, quòd frigidior sit ejus terra, quàm quòd in ea fructum profere possit. Ex orientabilibus enim & calidioribus locis ad nos defertur. Fuchb. ad stipulat. Gesner. Cucurbitæ, inquit, silvestris species non reperitur, quòd sciam: nam Colocynthis, dicta Cucurbita silvestr. necio ubi sponte nascatur, nisi in Græcia fortè. Lobelus perhibet banc serere Herbariæ voluptatis studiosos Vere, in Gallia, Germania, & Angha, fructumque decerpere Septembri, ac proinde purgationibus minus aptum, eo qui ex Græcia, Hispanisque deferatur, exempto cortice. Nobis certè Colocynthis folio dissecto, five officinarum Montbelgardii fata sæpius in borto E.C. & albi provenit, sine fructu tamen.

Vim habet medulla fructus purgatoriam, si ejus quatuor oboli ex aqua mulsâ sumantur: vel additis Nitro & Myrrha melle decocto excipiantur, & in pilulis cogantur. Ipsa verò pile arefacta teruntur, & utiliter infunduntur clysteribus ad coxandicum dolorem, paralytin, & coli vitia: ut coxandicum que pituitam bilem, strigentiaque, interdum etiam cruenta eliciant. Subdita eadem, secus enecat. Quòd si quis unam exempta medulla obducatur luto, in eaque acetum ac nitrum terrefaciatur, decocti jus illud, dentium doloribus collutione proderit. Sin mulsâ aut passum in eadem decoquatur, & sub dio frigeat, potu crallum humorem, strigentiaque alvi detrahet: stomacho tamen supra modum adversatur. Sed & subdita ex ea balneo alvi excrementa evocantur. Virentes denique fuscus prodeit coxandicum dolor, inficitur, auctorè Dioscoride. Gustu amara quod est, inquit, Galenus, sed quæ amarissimo medicamento

to epoto adfunt opera, ea evidenter efficere nequit ob purgatoriam facultatem, quam validam in se continet, nimirum cum illis, quae expurgant, ante & ipsa per alva necerni praeventens. Cucurbita, Colocynthis vocata Plinio, herbacea arescens per se inanit olivum. Infusa quoque clysteribus, intestinorum omnium vitiis medetur, & renum, & lumborum, & paralyfi. Ejecto semine, aqua mulsa in ea decoquitur ad dimidias, sic tussienti infunditur obolis quatuor. Prodest & stomacho, farinae aridae pilulis cum decocto melle sumptis. In morbo vero regio utiliter semina ejus sumuntur, & protinus aqua mulsa. Carnes ejus cum Absinthio & sale, dentium dolorem tollunt. Succus vero cum aceto calefactus mobiles sistit. Item spinæ & lumborum ac coxarum dolores, cum oleo si inficitur. Præterea mirum dictum, semina ejus si fuerint pari numero adalligata febribus, sanare dicuntur, quas Græci periodicas vocant. Et hæc Plinius, ex quo Dioscoridis loci declarantur, hætenus, ut ait Cornarius, à nullis interpretibus rectè intellecti. Primam enim confusa est lectio Dioscoridis græca & duo modi sumendi medullam ejus, in unum coaluerunt, paucis particulis elapsis. Sic igitur lectio distinguenda est, velut etiam nos reddimus. Διῶμα μὲν δὲ ἐστὶν ἢ μὲν ἐκτετακτὴν τοῦ κερποῦ καὶ σαρκίῳ, ἢ τὴν αὐτοῦ κερποῦ μὲν ἄνευ σαρκὸς καὶ σαρκὸς μὲν ἀνευ κερποῦ. Πρῶτον μὲν δὲ καὶ αὐτὴν καὶ μὲν τοῦ κερποῦ καὶ σαρκὸς μὲν ἀνευ κερποῦ. Priorem modum docet aperte Aëtius lib. 3. cap. 35. Dantur ex medulla ejus scrupuli duo, in aqua mulsa cyathis duobus. Posteriorem habet Plinius ubi ait: prodest & stomacho farinae aridae pilulis cum decocto melle sumptis. Deinde rectè dixit Plinius, Ejecto semine, aqua Mulsa in ea decoquitur ad dimidias. At in Dioscoride plerique contrarium intellexerunt, ipsam medullam videlicet in aqua mulsa coqui debere: quod falsissimum esse Aëtius clarè ostendit eodem loco. Quòd si mitius purgare volueris, inquit, sumito Colocynthidem justè magnitudinis, eamque aperito supetnè, & semen totam eximito. Deinde quicquid tomenti speciem præ se fert in ipsa, rursus citra semen in ipsam indito, & repletam ipsam sapa, aut vino dulci veteri, per diem ac noctem macerari finito. Deinde excolatum per pannum vinum calefactum hibendum dato. Hoc tamen interest, quod Dioscorides aquam Mulsam, aut Passum, in ipsa priùs coquendum, deinde per noctem sub dio exponendum præcipit. Aëtius autem per diem solum ac noctem macerari finit. Atque ita etiam Paulus lib. 3. cap. 13. Et hic sanè usus hodie quoque frequentissimus est Medicis, qui illa utuntur, modum infusionis Colocynthidis, ipsi appellant. Medulla hujus Colocynthidis (quam Hipp. σκευάσμα, σκευάσμα, ἢ σκευάσμα σπιγγῶν, nominabat) apud varios Medicinæ autores, varia est dosis. Mefues ceratia decem; Paulus drachmam integram exhibere non veretur. Ruffus itidem drachmam unam ex aqua mulsa propinat. At Aëtius scrupulos duos exhibet in aqua mulsa cyathis duobus: eodèque loco, imbecillibus etiam scrupulum unum sat esse scribit. Nonnulli volunt pomum Colocynthidis, exempta medulla, simul & semine, luto oblitum incoqui aceto & nitro. Sed absurdum illud est. Modum præparandi diluti Colocynthidis plenius supra descripsimus ex Aëtio. Ruffus itidem in libello de Purg. med. nullà tamen medullam factà mentione, eum sic tradit: Quòd si quis mitius purgare volet, semine Colocynthidis ejecto, affusque intra corticem vino dulci, lento igne coqui ipsam oportet dum probè incaluerit, illud tandem potandum

exhibetur. Sed & Paulus lib. 3. cap. 13. eodem modo præparatum Colocynthidis dilutum in morbo comitiali propinat. De Coloquintida Serapio ex autoritate Dioscoridis & Galeni tractat. Nos eorum verba ante recitavimus. Addit autem hæc ex opinione Hibit. Coloquintida, quæ est Melo agrestis, sumitur in potu, purgat phlegma grossum, quod advenit juncturis, & illud phlegma quod emittit fuositates ad caput, & expellit humores qui aggregantur in corpore ex melancholia, & aliis malis humoribus. Et oportet quòd ille qui colligit Coloquintidas, colligit eas in fine sui anni, &c. Illa quæ reperitur sola in arbore sua occidit potantem sine dubio, quoniam quando datur ex pulpa sua, facit torsiones fortes, & evomere fortiter, & est laxatio ejus sine juvamento, & inducit tæphionem, & anxietatem animi, & coactationem anhelitus, & frequentiam ejus & sincopin, & sudorem frigidum, & fortassis interficit, sicut dixi. Pomum ejus perfectè maturum confert potanti, & expellit humores, quos volumus purgare, & non est necesse, quod misceatur cum medicina alia. Sed est valdè cavendum ne detur in potu in tempore magni frigoris, vel magni caloris, nam ista sunt duo tempora, in quibus nos docuit Hippocrates non debere dare medicinam laxativam, dixit enim in libro suo Aphorismorum, Non oportet quod detur medicina laxativa, quando ascendit scabari, & in magna Hieme: & intelligit in Junio, Julio & Augusto, & per Hiemem voluit intelligi, in Novembri & Decembri & Januario. In istis igitur duobus temporibus anni non oportet quod detur medicina laxativa, & propriè acuta, sed solum duobus temporibus aliis, volo dicere in Vere & Autumnno. Quando igitur bibitur Coloquintida in hora magni caloris, nocet membris interioribus fortiter & nocet etiam stomacho, & expellit sanguinem per ora venarum, abradendo ea. Et quando datur in hora magni frigoris, fatigat patientem fortiter, quia natura non assentit ei, quare facit torsiones. Si igitur volueris Coloquintidam rectificare, & miscere cum aliis medicis, purga ipsam primo à granis suis, & à cortice exteriori, adè quòd remaneat pulpa sua pura, deinde tere ipsam cum gammi Arabico & Dragaganto & Amilo cum omnibus istis, vel cum uno ipsorum, & quando addis ei aliqua ex istis Medicinis, pone de ea quantitatem æqualem ei, sed si vis admiscere ei omnes, pone de unaquaque Medicina æqualiter, ita quod summa quæ proveniet, sit æqualis Coloquintidæ in pondere, & hoc quando facis medicinam laxativam, sicut sunt pilulae. Verùm quando vis ipsam ponere in Hieris, & medicinis magnis, non oportet quod temperes eam cum aliqua medicina alia, nisi cum illis, quæ ingrediuntur in medicina illa nec cures multum reprimere acuitatem ejus. Et quantitas quæ datur ex ea, quando præparatur secundum istum modum cum medicinis aliis, est à duobus daich [Jusque ad unum Kirat. Et scias quod Coloquintida quando extrahitur à pomò suo, & permanet sic diu, est minoris virtutis in laxando, & minuitur acuitas ejus. Et quando tenetur, & dimittitur sic tempore longo, sit adhuc in hoc minus, & magis remissa virtus ejus, sed quando dimittitur in pomò suo, non recipit immutationem, nisi in longo tempore. Et oportet quod non colligatur Coloquintida ex arbore, in qua ex vna radice non est ortum, nisi pomum illud solum, quoniam nutrimentum totius radicis venit ad illud pomum

Ex Serapione.

Purgat phlegma.

Colocynthis una sola in arbore.

Colocynthis perfectè macerata.

Cautio.

Colocynthis dicitur in hora caloris aut frigoris bene vitæ nocere.

Colocynthis dicitur rectissime casio.

Colocynthis in medicinis magnis.

Colocynthis dicitur arbore vna radice non est ortum, nisi pomum illud solum.

solum, & auget in eo virtutem multam lavandi. Talis igitur Coloquintida interficit propter acuitatem suam nimiam, & fortitudinem, nam qui sumpsit ex ea duobus davich, non retinebitur fluxus ejus, quousque moriatur. Et scias quod ego vidi in omnibus hominibus qui degunt in terris magnæ frigiditatis, quod in pluribus eorum vincit super naturam eorum cholera nigra, quapropter non possunt in eis operari, nisi medicinae fortes & acutæ, sicut est Coloquintida, & folia ejus, propriè & Esula, & Mezerion & Damdefeni, & similia horum. Scamonea verò non est eis necessaria. Et oportet cavere, ne apponatur in aliqua medicina ex cortice Coloquintidæ, neque ex seminibus ejus, quoniam cortex est durus & siccus, & adheret villis stomachi, & intestinis, & pungit punctione forti, & prohibet affellationes: similiter etiam facit cortex feminum, sed feminis ipsius oleum est calidum mollicativum. Et Arabes quidem infundunt semina ipsa in aqua pluviali donec recedat amaritudo eorum, & sic comedunt ea decocta, & alio aliquo modo, & præbet eis nutrimentum, verùm quando comeditur ex eis nimis, inducunt fastidium, sed quando fricantur plantæ pedum in domo primâ balnei fricatione forti, facit eos hæc fricatio egerere & evomere, & confert, &

Cautia

Oleum feminum infusum feminum.

in Clistere non augetur nocumentum. Et quando fuerit necesse apponi Coloquintida in clistere aliquo, oportet quod apponatur in decoctione clisteris integra sine contritione & repressione aliqua, quia tunc confert colicæ, & facit descendere humores grossos, crudos, & melancholiam. Sed

Folia.

Correctio.

Antiquorum quæ videntur errare.

Delectua.

Dosis.

folia Coloquintidæ quando aliquis vult purgare cum eis, oportet quod colligantur ex arbore sua postquam maturaverint poma ejus & citrinæcant, quando scilicet incipit aer infigidari, in tempore videlicet quo diximus debere colligi poma ipsa, & siccantur in umbra, donec non remaneat in eis aliquid humiditatis, & sic reponantur, & quando fuerit necesse, quod exhibeatur de us in potu, oportet quod temperetur cum amilo, aut Gummi Arabico, aut Dragaganto, cum vino istrum, vel cum pluribus, sicut diximus in Coloquintida ipsa. Quando igitur poruntur cum eis, ex istis faciunt operationem mirabilem in expellendo melancholiam, & quando admiscerunt cum eis medicinae convenientes ad hoc, sicut Aloës, Anisum, & Epithimum, & Sal Indum, & si dantur in potu cum Hiera picra, erit medicina juvativa multum. Ego non vidi aliquam ex medicinis laxativis magis conferentem in doloribus melancholicis quam folia Coloquintidæ. Et antiqui quidem defecerunt in memoracione ipsorum, & omiserunt usum eorum. Et ego tentavi & dedi de eis in melancholia, & alopecia, & tyria, & lepra, & inveni juvamentum magnum, & fortassis facient evomere illum qui sumpsit ex eis, & nihilominus confert multum leprosis, & faciunt consistere ægritudinem suam, & dolores suos & non permittunt augeri. Et scis tu quod ista est cura eorum, in quibus confirmata fuerit ægritudo, nam à quibus membra ceciderunt, impossibile est quod renascantur eis propter hanc medicinam modo aliquo. Et scias quod Coloquintida quæ oritur in rupibus & locis altis, quæ non est inbibita humiditate pluvie, est fortioris & melioris operationis quam illa quæ est propinqua aquis, & imbibitur ex eis & quantitas quæ datur ex Coloquintida illi, qui est fortis, est pondus drachma semis, usque ad duos davich [] & est operatio ejus conveniens hominibus qui sunt

duræ nature ad lavandum, sicut illi qui degunt in regionibus frigidis, & qui utuntur in cibis eorum lacte, & caseo & similibus, quia istorum natura non movetur, nisi per fortes medicinas, & quando ponitur in clisteris, laxat humores crudos & melancholiam, & confert colicæ, quando ponitur de ea in medicinis, cum quibus clisterizantur à drachmis iij. usque ad v. & coquitur & colatur aqua, & sic clister cum ea. Et scias quod folia Coloquintidæ quando accipiuntur ex arbore sua, & servantur, quousque annus unus pertranscat super ea, aut anni duo, aut tres, minuitur de virtute eorum & propter hoc necesse est, quod Medicus auget in pondere eorum quando voluerit ex ipsis exhibere. Dixit Rasi quidam quod radix Coloquintidæ est melior medicina quæ esse possit puncturæ scorpionis, & Arabes habent ipsam pro communi & manifesta medicina ad hoc.

Et dixit Rasi Arabs quidam quod scotpio purgerat silium suum in quatuor locis scorpionis, & dedit ipsi in potu drachmam unam de radice Coloquintidæ, & sedata sunt statim omnia, quæ patiebatur. Rectificatio ejus est cum Bdelio. Christianus terit & linit super locum puncturæ, & datque dolorem ejus, maximè radice Coloquintidæ masculi: nam feminam ait mollem, albam, & esse debiliorem in hoc. Proprietas Coloquintidæ est (ut ait Aben Mesuai) quod mundificat humores ab humiditatibus malis & expellit humores crudos, sed ipsa inducit punctiones, & tortiones, & tenasmonem in intestinis, & vomitum, & rectificatio ejus est quod admiscetur ei Dragagantum, & quidam admiscunt ei gummi Arabicum, sed Dragagantum est melius eo, quia juvat ad laxandum, gummi verò est stypticum & oportet quidem quod Coloquintida non teratur multum, ne adhæreat intestinis, & ulceret ea. Melior autem est illa, quæ est matura, citrina in cortice suo, & interioris alba, & lenis. Cavendum verò est ab illa, quæ est sola in sua arbore, quia est mortifera. Dosis Coloquintidæ est à tribus Kirat [] usque ad sex. Coloquintida (secundum Abuberig) purgat choleram admixtam humiditati viscosæ, non illam quæ est admixta sanguini, quemadmodum facit Helleborus niger, & Scamonea, sed ipsa trahit à membris nervosis, & ille cui convenit potus Coloquintidæ est ille, qui habet ægritudinem in capite suo, aut in velamine cerebri, quod est simile recli, aut in alio velamine propinquo cranio, sicut est habens scotomiam, & hemieriam, & cephalicam, i.e. Ovum, & Soda, & habens stuporem & paralyticum, & spasmodicum, & humiditatem neulorum antiquam, & stricturam anhelitibus ab humoribus grossis, & dolores juncturarum, & sciaticam ab humoribus grossis, & ægritudines renum & vesicæ. Et hæc Serapio ex autoritate Habix, Rasis, Christiani, Aben Mesuai, & Abuberig.

Melureus Arabs inter alia huc reducenda vim ejus, potissimum catharticam, nobis sic descriptam reliquit. Immaturo Colocynthidis status rotundissimos & molestissimos excitat, immodicè purgat, ut etiam sanguinem educat. & (æpè) mortem afferat pessima etiam ac venenosa est, quam produxit unicam tantam una planta: quæ planta si loco illo est unica, multo perniciosiorem fructum parit, præsertim si locus ille est uliginosus, vel pulverulentus, vel thermis propinquus, vel serpentinus abundet. præfatiissima semina, præsertim si est magna, exactè quoque matura, alba, lenis, rara, levis, uti ejus interior medulla albißima, rata, lenis, levis, quòque levior, eò melior: sitque ex agro, laxo,

In clisteris

Folia coquebat & admiscuntur virtute.

Ex Rasi.

Izus scorpionis.

Ex Christiano. Sexus Coloquintidæ.

Ex Aben Mesuai.

Dragagantum admiscendum.

Ex Abuberig.

rig.

Ex Mesuai.

Immaturo.

una in potu.

Præsertim.

Ex materia.

Præsertim.

laxo, arenoso, libero, Autumno lecta, cum lan-
 guescente virore exepit n luteum colorem muta-
 ri. Calida est ac sicca ordine tertio, signa substā-
 tiā & tertia per usionem tenuat [eximie amara]
 consistat. pituitam & alios humores crassos & glu-
 tinosos, magis ex profundis partibus & distanti-
 bus, ut cerebro, nervis, musculis, juncturis,
 pulmone, thorace, quam ex venis attractos, ut
 Dioscorides censet, purgat: ac etiam bilem fla-
 vam, ut voluit Humain. Quapropter dictarum
 partium morbis mirè subvenit, cephalalgie an-
 tiquae: dolori cranij totius, hemicranie contuma-
 ci, epilepsie, apoplexie, vertigini, aquosae flu-
 xioni in oculum, podagrae frigidae, ischiadi ma-
 xime, ac reliquis nervorum juncturarumque ac-
 scisibus; asthma item, ac tussi antiquae, dys-
 spnoeae ex thoracis repleti angustia. ac praeterea
 summe omnium prodest colico dolori, tam à pi-
 tuita quam flatibus, & hydropi. Omnia autem
 haec sive sumpta, sive clystere, aut balano intesti-
 nis immissa praestat, utero autem imposta, scru-
 tum necat. eadem cum aceto forti affricta, al-
 phos, lepram [psoram] elephantiam sanat. Oleum
 denique super cineres calidos incoctum, cortici
 ejus inanito, capillos illitu nigrat, eosque ne
 cadant, firmat, canitium tardat. Idem auri in-
 stillatum ejus dolorem ac tinnitum sanat. Acetum
 autem similiter incoctum collusione dolo-
 rem dentium sanat: incidit enim, tenuat, ter-
 get, digerit. Ne autem eordi, ventriculo, hep-
 ati & ceteris visceribus noceat turbando, sub-
 vertendo, violenter trahendo, miscenda ei sunt
 dictas partes roborantia, ut Mastiche, Gallia &
 similia, uti miscentur glutinosa, lubricando ci-
 tius deturbantia, acrimoniam mordacem obtun-
 dentia, ut gummi, Tragacantha, Bdellium, Mas-
 tiche, & similia, ne amplius vias exulceret [per
 quas fertur] & ora venarum adeo vehementer aper-
 riat, ut inde sanguis manet. Filii Serapionis Co-
 locynthidem mulsā cui incocta fuerit Ruta ma-
 cerabat [eius drachmam unam in mulsā cyathi duo-
 bus cum Ruta coquit Paulus, non Serapio] sicabat,
 laxissimè terebat, ex mulla praedicta dabat. Graecus
 quidam Colocynthidem rosato oleo fricabat,
 & cum aequali portione Ladani in catapotia for-
 mabat, utilia praedictis affectibus. Ego autem
 eam minutissimè forcipibus incido, glutino &
 nucagine Tragacanthae aut Bdellij perlino, sic-
 co, tenuissimè tero: cum Ladano, vel mulsā, vel
 Mastiche oleo rosato dissolutā, in pastillos co-
 go citra molestiam purgatorios. Quod si noxam
 corpori impresserit, mulla, vel avarum passerum
 decoctum, cum oleo amygdalino, vel oleo nu-
 cum, eam abolet. Longam decoctionem susti-
 net, estque, ut mihi cum Serapionis filio vide-
 tur, contra filij Zezar sententiam, pulveranda
 tenuissimè, ut ejus facultas malefica permista illi
 exquisitè alia plenius obtundatur, utque visce-
 ra celerius permeet, neque in ipsis ob partium
 minis tritarum crassitiam cesset: qua fortasse sit,
 ut in visceribus pigra retineatur, eaque ulceret,
 praesertim cum sensu perceptibiles fuerint ejus
 particulae. datur à siliquis sex ad decem, frigus
 & aestum vitantibus. Agittae, attestante Trago,
 Colocynthidem vino maceratam, aut decoctam,
 iis quos purgatos volunt, exhibere solent, ac ita
 quidem illos purgant, ut plerique satis conced-
 ant: hac arte ferè omnes Iudei imbuti sunt.
 ab his ergo Medicis, qui valetudini suae restè
 consultum cupit, abstinere. Semen Lobelii con-
 stat non tanta virulentia ad purgandum, quam
 caro ipsa sive medulla: dedimus namque, inquit,
 multò majorem dosim, quam medullae, majore

Tom.II.

commodo, nullo aut longè minore tumultu.
 Scribit Dodonaeus ejusdem semen ad mortuorum
 corporum conservationem ac condituram utile,
 praesertim Aloe ac Myrrha admixtis. Pater p.m.
 literis prodidit, se ex clystere, quem Colocynthidis
 ingressa erat, summe debilitatum, & ferè mor-
 tuum fuisse. Fernelius Colocynthidem calidam
 siccamque dixit ordine tertio, amarissimam; len-
 tam pituitam, crassosque, ac glutinosos humores,
 pariterque bilem utramque (quod vix alij conce-
 sum est) detrahere, & aquam citrinam, idque maxi-
 me ex articulis, & distantissimis reconditisque
 partibus. Conferre morbis inveteratis, contuma-
 cibus, quos neque Agaricus, neque Turpetum sol-
 verit. Vehementer autem ventriculum, viscera,
 corpusque conturbare, venas aperire, & sangui-
 nem elicere, quam Aloe, aut aliud quodvis pharma-
 cum, potentius: intestina corrādens gravibus tor-
 sionibus exercitare. Quocirca exquisitissimè tri-
 tam diluit oleo amygdalarum dulcium, additāque
 tragacantha, aut mastiche concinnari in trochiscos,
 vel coqui ex jure pingui, aut ex alio quovis liquo-
 re lenientem. Nec puerorum, nec senum, nec pra-
 gnantium (foetus enim vel supposita enecat) sed æ-
 tate duntaxat florentium & robustorum medica-
 mentum esse, vixque nisi aliorum permixtione tu-
 tum. Dari à scrupulo uno ad drachmam dimidiam.
 Quod si tandem omnino Colocynthide uti velis,
 accipere te jubet Tragus Germanicam nostram, pi-
 ro similem, utpote in expellendo non tam stre-
 nuam & immitem. Pilam ergo seu fructum Co-
 locynthidis bene excavato, fungosamque ejus unā
 cum seminibus medullam cyatho vini injecto, ac
 quatuor, aut quinque horis maceratam per linte-
 lum exprime, expressumque succum, noctu cum
 cubitum ire voles, bibe. quod si feceris, visibilibus
 appetente, pituitam, crassos ac viscosos humores,
 nec non bilem citra noxam leviter exigi. Idem me-
 dicamentum colicis prodest, & ad putridas ventri-
 culi febres facit, hydropicis apprime conducit.

Bayrus l.6. c.24. Colocynthidem silvestrem co-
 quit, prius tamen tritam, & in aceto infusam, donec
 mellis acquirat crassitudinem, sanificat gingivas cir-
 ca dentem, & jubet os claudere per modicum tem-
 poris, postea accipit dentem cum digitis, & sequit-
 ur sine dolore. Probet, qui volet. Nos fidem lu-
 jufnodi stultitiam non habemus, quamvis Schenck-
 kius l.1. obs.med.424. de dentibus agens, eandem
 teneat opinionem.

CITRVLVS FOLIO COLOCYN-
 thidis seeto, semine nigro,
 quibusdam An-
 guna.

CAP. V.

S PARGIT per terram farmenta fragilia, hirsuta,
 sfoliis vestita amplis, in profundas lacinas disse-
 ctis, asperis & hirtis, è quorum sinu exeunt ca-
 prooli, nec non pediculi flores sustinentes lu-
 teos, quos fructus excipiunt magni & rotundi,
 quos ferè ambabus manibus ambias; cortex du-
 riusculus, sed lavis, nullis tuberculis inaequalis,
 atro-vindior, dilutissimè virentibus maculis per-
 fusus: caro Cucumeris vulgaris, alba, firma, grati sa-
 poris; semen furgosā medullium occupante sub-
 stantia immergitur oblongum, latum, compressum,
 nigrum, rugosum, duriusculo cortice praeditum, sub
 quo medulla alba, esui grata, ut Cucurbitarum.

V 3

*Citruli ge-
nus ariad*



Synon.

*Tetrangu-
ria
Sicya.
Melopale-
stinus.*

*Cucum. Sa-
racen.*

*Cucumis
Sulgaris f.
milo.*

*Cucum ci-
trinum.*

*Anguria
Italor.*

*Angur. Ge-
ra
Citrull. offi-
cinar.*

Meloppo

*Semen è
quatuor
majorib.
num.*

*Brassa Gola
hullucina-
tur.*

*Cucumis
Hetrusc.*

*Græcis Ge-
teribus
ignota.*

crassiora, colore buxæo obscuriore, nullis lineis per ambitum notata.

An Citrulus hic sit Simeonis Sethi, cujus verba infra de viribus adscribemus, Anguria, Cucumis dicta, secūdūm verò communem sermonem Tetranguria, considerent lectores? Hermol. coroll. 3. 6. vocat Sicyam quorundam, Angurium vulgi, & Melonem Palestinum. Serapioni dicitur *Batecha, Chathis, & Kurasi.* e. Melo, Citrullus, & Cucumer. Jacob. Manlius *Batecham* Serapionis, & *Albathecum* Avicennæ (quam nonnulli Cucumerem Sirracenicum, Anguriam interpretantur; & Languriam) unam & eandem plantam esse contendit.

Tragus Cucumeris genus facit, ac per omnia vulgari simile ait, sed magis exiguum, laetis & phœniceis feminibus intus refertum: filii Colocynthidi peregrinæ, aut Bryoniæ similibus, multis incisuris distinctis. Hoc genus autem Citrullum, Citreolum, & Cucumerem citrinum vocat.

Fuchs quartæ generis Cucumerem statuit, & officinas, quæ Citrullum vocant, respiciens, germ. *Citrullen* nominavit, gall. *Citrulle*. Cord. in Dissc. Cucumeris quandam speciem vocavit, & Anguriam Italorum. Dod. in fol. lat. Geln. de coll. stirp. & Tah. Anguriam. Geln. h. Anguriam veram. Lob. in Obs. p. 364. & Icon. p. 640. Citrullum officinarum. De hoc verò ait in Advers. Imitatur majorem aliquem Melonem effigie, & carne solidiore, fragili: sed sapore, vespensōque magis Pepones vulgatos refert: unde Melopeponem, ut ancipitis naturæ, mixtæ de utroque nomenclaturâ dictum puto, nempe Mali sive Melonis circinîtâ rotunditate, non tamen torulis sulcata, & sapore magis Peponem, quàm Melonis dulcedinem melleam referente: quibus etiam, monente Galeno, discernitur à Melone. Semen verò unum è quatuor vocatis majoribus est; majus Melonis, minus Peponis, duriore entice septum, rigro, omnium durissimo: alioque tota planta similis Peponum plantæ, sed foliis altioribus, lacinii Colocynthidi præprioribus. Seritur etiam & manditur caro cocta, vel cruda, & prærisque Pedemontij, Italiæque hortis enascitur.

Cæterum, hallucinari Btassavolam putat Mortholus, quod existimavit veteres Græcos, præsertim Dioscoridem, sive appellacione, Hetruscorum Cucumis, vel aliorum Italiæ populorum Anguriam representasse. Facile adducor, inquit, ut ctedam, Angurias veteribus Græcis incognitas. Eas nunquam vidisse, vel cognovisse veteres, demonstrat Fuchsius. Minus illis assentior qui Pepones Angurias esse dicunt. Anguria hæc, quam Dallaha appel-

lat Serapio, planta est folia ferens Colocynthidis medicamentosa, majora tamen, aspera, & per ambitum divisa: caulem firmo tosum, humi repentem, ut Cucumis & Peponem edit aureum, fructum magnitudine mirum in modum extuberantem, ponderosum, subrotundūque: cortice lævi, herbaceo colore, maculoso tamen, & eâ parte quâ humi jacer, albicante, carne intus humidâ, aquosâ, in quibusdam prædulci in nonnullis autem subacidâ, insipidave, sicutæ extinguentæ perquam idoneâ. Semen concludit latum, Peponum duplo majus, Cucurbitæ paullo minus, cortice solidiori, & nucleo grandiore. Est quoque feminis in colore differentia, quod uni nigrum, alteri rubrum innascitur. Seritur in hortis & viridatis, ac etiam in agris. Deceptur fructus, & diu quoque asservatur in hortis. Tritici enim acervis insidens, non solum à putredine tectur, sed coquitur, si immaturus deceptur. Hæc illæ qui Anguriam in scubir, vocatque germ. *Angurica, Gurden & Erdtrappel*: Hisp. *Cogombro*: & gall. *Concombre*. meo judicio non absque errore.

Anguria voce primo Aëtium usum esse censuit C. Bauhinus, qui alias Citrullum vocari tradit à citreo colore, ac propterea Anguriam i. Citrullum dictam vocat, variareque ait colore corticis, nunc virente, nunc maculoso, subacidis maculis: carne nunc rubente & dulciori, nunc candidâ: femine nigra, aut rubro, aut fulvo; rariis sine femine reperiri, Cæsalpino teste. Esse tandem narrat, qui Peponem Dioscoridis, Galeni & Plinij esse credant. Citrullus dicitur Trago, Geln. h. Lon. Tab. officinarum, Lob. & Ger. Anguria, Math. Ang. Lac. coll. Dod. Lugd. Cast. & Cam. Cucumer, vel Cucumis citrullus, Fuchf. Dod. Geln. h. & Turn. Cucumer vulgo, Cæf.

In calidis regionibus Anguria suavior provenit, ideoque circa Romam in Campania, Apulia, Calabria, & Sicilia, præstantiores habentur & mnlæ vastiores. Dodonæus hanc in Germania rarò ferri, rariùs verò etiam mature scere scribit. Nobis tamen aliquoties felicitet provenit ac maturuit in horto E. C. Montebelgardij. Genex ex femine dicto Citrulli, statuit Junio, Julio, Augusto & Septembri. Basileæ in hortis colitur Citrulli nomine, semen officinis vulgare, oblongum, latum, compressum, nigrum, & rugosum, in quo differt à Batecha, cujus semen læve, æquale, sive politum, nigrum & album, quod etiam majus.

Anguria vires, quas hic primo loco tradimus, habet Simeon Sethi, non tamen asserimus cum intellexisse plantam, de qua præsertim capite sermone instituimus. Petpendant lectores an fortè Cucumerem vulgarem assignarit. Anguria, inquit, quæ Cucumeres dicuntur, secundūm verò communem sermonem Tetranguria, ob frigidum & humidum temperamentum, noxia sunt, & mali succi. Exiis autem in partæ magnis antefere oportet. Hæcurium ducitur, & si in aceto macerentur, in acutis præsertim febribus, mitiorem calorem reddunt. Crebrior verò horum usus semen genitale minuit, in vereremque impetum aufert. Semen autem horum de fœcibus, caliditate n quandam possidet, contrariamque his actionem efficit, urinamque magis provocat. Pituitam Tetranguria in ventriculo gignunt, quæ cruda per venas diffunditur. Proferæ qui his crebrius utuntur, illi propter humores rempors spacio in venis & aliis corporis cavitatibus cnaetos, longis corripuntur febribus. Semen verò horum urinam cit, sed minùs quàm Peponum, quoriam celestius in ventriculo corrumpuntur. Meliora in his sunt, quæ habent semen exiguum. Calidos autem & siccos stomachos juvant, & si in ardente febre cum aceto porrigantur, valde profant.

Caro.

Semen.

AsserGa.

Math.

Anguria.

Aceto.

Varieta.

C. B.

Locum.

Tempus.

Vires.

V. Jm.

Temperamentum.

Sethi.

Febres.

ta.

Semen.

Noxia.

Calidi.

sicca stom.

cha.

Pro-

Propriam verò horum est, nauſas, ventriculi calore excitatas, fed ure. Horum autem interiora esse oportet: nam quæ foris sunt, mali succi existunt, & difficulter admodum coquantur, & ferè venenata. Habent verò & alias proprietates, ut animo deficientes propter excedentem calorem reficiant. Si autem pituitam in ventriculo nanciscantur, nauſas faciunt, & colicos affectus & hypochondriacas passiones. Hæc ille. Anguria fructus, inquit Mathiolus, frigidus est & humidus, ordine secundo, siti accendæ apertissimus. Quo fit, ut Itali ardente Syrio e jus pulpâ internâ se refocillent. Confert aduentibus febribus, & linguæ ariditati quàm maximè. Acutos humores vincit, & iis præsertim auxiliatur febrientibus, qui humorum malignitate magis, quàm abundantia scaten. Siquidem Anguria (ut Serapioni placet) alvum in principio fortiter non citat: idè què in illis convenit, qui tenuis & imbecillus sunt temperamenti, macri & exangues: etenim iis alterantibus magis opus est, quàm ducentibus humores, verum quamvis id effici possit acidis medicamentis, insipida tamen, quæ non nullam dulcedinem habent (ut Anguria) hisce in casibus longè magis conveniunt. Impossibile enim est, quin acida, & quæ cum aceto parantur medicamenta, incidant & attenuent. Id quod imbecillia corpora, macra, & exanguia, haud quamquam sustinere queunt, quod ejusmodi acidæ potionis maciem augent, & ventriculum lædant. Atqui etiam ubi quilibet acida adstringentia propinaverit, impossibile quidem videtur, ut obstructions non augentur, si eæ in jecinore, & ejus meatibus extierint. Etenim acida & adstringentia medicamenta exiccant, & nihil profus humectant. Porro insipida, & quæ crasse sunt substantiæ, quibus aliqua, ut in Anguria, dulcedo insit, suo quidem temperamento humectant, ac simul refrigerant, generantque in ipso jecinore sanguinem aquosum, qui flavæ bilis fervorem & malitiam coercet tam in jecinore, quàm in venis. Caterum, ut Dodonæus cor cludit, Anguriæ caro quæ cortici subest, cruda, sed frequenter cocta comeditur: alimen tum autem confert exiguum, sed quæ frigidum ac humidum, sanguinemque ingenerat aquosum, qui internarum partium inflammationes mitigat, & bilis acrimoniam ac fervorem contemperat. Cruda in ore commanſa linguæ in febribus asperitatem lenit, & sitim sedat. Semen facultate Cucumerum simile est.

CITRULO AFFINIS MELO

Indicus, sive Patheca.

CAP. VI.

EST apud Indos Melonis genus pregrande & rotundum, oblongius tamen aliquantulum, formæque quodammodo ovali, quod Lusitanis Indiam incolentibus Patheca (corrupto ab Indorum Batice vocabulo) dicitur. Hunc Melonem per longitudinem non appetiunt, ut Meloepones nostrates comesturi aperimus: sed per transversum secant. Et licet dulcedine à nostris superetur hic Melo, attamen flavis est, refrigeratque mirum in modum & humectat, tota carne sese in quandam liquorem resolvente, authore Garcia, arom. l. 2. c. 20.

Reperiunt autem Arabes & Persæ primum hunc fructum ad se delatum, eamque ob causam Batice inde appellant i. e. Melonem Indicum, quo nomine etiam ab Avicenna multis in locis appellatur. Batice enim eorum lingua Melonem sonat. In India verò ab ipsis incolis Calangari dicitur. Meminit hujus Avicennæ lib. 4. Fen. c. 39. de tertiana pura, ac eum multis laudibus commendat. Putarunt nonnulli id

Melonis genus, quod in Hispaniâ Castella nascitur, quòdque Baticeas vocant, esse hunc Melonem Indicum & depravato à Batice nomine Baticeas appellatum. Sed magno opere falluntur. Nam plurimum ab hoc differt cum foliis, tum plantâ totâ, quæ Melonem Indicum modo per solum non extenditur & serpit, sed sese in altum extollit. Aiumt etiam in Africa Indicis similem nasci, sed cum non viderit author, affirmare hoc non auit.

De Citrulo affine Melone Indico hæc scribit Linschottanus: In Java magni atque elegantes Melones aquatici proveniunt. Fructus hic siliavus est admodum, obscure virens, intus albus, magnitudine Cucurbitæ oblongæ: quem incolæ suis hospitibus præcipui honorarij loco apponere solent, propter insignem vim refrigerandi, quæ pollet: In universâ India appellantur Batice.

Nos Citrulli officinarum seminato; compresso & nigro simile, sed majus vidimus, magisque æquale, & lubricum, a viro celeberr. D. Theodoro Beza exhibitum, cujus duo genera, nigrum sc. & flavum. Genevæ plantata duobus foliolis productis periere. Ex India allata fuere.

B. pin. Melo 7. Indicus fructu oblongo: Batie Indici, sive Indicus Melo, Garz. Patecas, Anguria, sive Melo Indicus, Linsc. part. 4. Ind. or. c. 10. Melones aquatici in Java, Batice in universâ India par. 4. Ind. or. cap. 6. & fig. 20. An Comolanga Lud. Romani, Clusini Garz. Scalig. Lugd.

Vtilis verò est in biliosis febribus & ardentibus adversus jecoris & renum ardores, ut experientia Garcia didicit. Urinas ciet: solentque sani cum fructum edere, quatuor horis à jentaculo, quoniam tum maximè sit infestus calor. Melius tamen facere videntur, si ab eis suas mensas auspicantur. Hujus semina (quæ ante maturitatem candida sunt, per maturitatem verò nigra) somnum provocant, eaq; reliquis feminibus frigidis, tamen eis non careamus, præstantiora æstimamus. Ignorabant eruditum hujus regionis Medici, istius Melonis in Medicina usum: non solent enim ad hujusmodi minutias sese abjicere, & in suis curationibus experientiâ & consuetudine duntaxat nituntur, sed à me (Garcia) edocti, eisuti cœperunt.

CITRULO VEL MELONI

Indico accedens Camolanga.

MEMINIT Joseph. Scaliger exerc. 31. par. 15. in Corp. Indici provincie Camolanzæ fructus, qui ehitur, & sesquipede major est, Cucurbitæ colore, humi, in star Melonis, jacentis, pulpæque plurimum habentis. Cum Melone vero Indico similitudinem quandam habere videtur Clusio apud Garciam, quam Ludovicus Roman. l. 5. navig. c. 15. in hunc modum describit: Habent in Calecut fructus quosdam Cucurbitis similes, sed conditurae puriores. Res est non indigna memoratu, huic nominem est Comolange. Oritur in culta tellure Peponium modo. An autem is est, cujus succum Turcæ, & Vngari in delitiis habent extinguendæ sitis gratia: vel Napæca Bellonij Ob. lib. 2. c. 6. quam vulgari Arabica appellatione Copous nominari scribit ca. Lugd. p. 137. vocat Camolangam. Müntz. Cosm. lib. 5. Camolangam provenientem in Calcut. Portugalenſis hist. gall. l. 13. Malucanorum fructum, valde refrigerantem, Camulini vocatum.

CUCURBITIVS FRUCTVS INDI-

cus, magnitudine ovi Struthij.

FRUCTUM hunc ex India allatum, accepti ab Illustr. meap. principissima, Ducissa V. Wirtembergica, & c.

HISTORIAE PLANTARVM



Cucurbita
Papa
Semina
Papa

nullo insigni: feminibus facta parvis, compressis, Colocynthis ferè similibus, longioribus paullo, ruffis, & superne cordatis, ruffa cum simbra diluitoris coloris: sapore subdulci, & jam ob vetustatem tancefcente, Condimenta ex hac Canolanga componunt, vel Cucurbitis quas Carabassadas vocant Hispani, vel Citris meliora atque lapidiora, Scalig.

ΣΙΚΤΟΣ, ΣΙΚΤΑ, ΣΙΚΤΕ, ΠΕΠΟΝ, & utramque, Cucumis, Pepo, & Melopepon, veteribus, & Neoterics.

C A P. VII.

PAUCA veteres & obscure de oleraceis modo nominatis pomis scripsere, ac fortè confusè Plinius, ac magis Neoterici. Nos igitur statuimus priusquam de pomis nobis notis scribamus, omnia proponere, quæ veteres de nominatis in titulo tradidit, ita ut posteritati ansa & occasio præbeatur, quomodo nostro seculo denominandæ sint, certius & liberalius iudicandi & decernendi. De his igitur omnium antiquissimus scriptor Theophr. hæc passim prodidit. Humor Cucumerem [cucurbita] quoque comitatur, ex carne, & nervo: femina hujus [cucurbita] non congesta atque promiscua, sed discretæ atque distincta: luccus verò [cucurbita] aquosus. Megareses Peponibus [peponibus] Cucumeribus [cucumeribus] fortè legebat Gaza, abest tamen in cod. Basil. & Ald. cum veni anniverfarij persilant, terram scalpentes, pulverem excitant, atque ita dulciores, tenerioresque reddunt absque irrigatione. Ad summam, omnia æstiva brevem radicem sortiuntur: etenim Pepo [pepo] & Cucumis [cucumis] exiguam sortiuntur. Floret Cucumer eū in modum [quæ Faba & Helutis] Cucurbita [cucurbita] qui Pepo cognominatus est [in Theophr. grecis] & quæ nomen tantum legitur etenim huic præposito germine accidit. Quædam plantæ figura subditi loci imitantur: Cucumis enim [cucumis] formam accipit loci, in quo facta fuerit. Saporum differentiam preparata Cucumeris [cucumeris] semina capiunt, si lacte macerata terantur: circa quintum diem facta erumpit, aut sexto, vel (ut alij volunt) septimo, prius, celeriusque Cucurbita. Cum feminibus ipsis flores edunt in olerum genere Pepo [pepo] & Cucumis [cucumis] Quippe omnibus flos in postremo fructus, & crescentibus fructibus flos diu infixus servatur. Simples autem Cucumerum [cucumerum] flo-

Theophr.
Sicyos, & Sicya.
Sicyos, Peponi.
Cucurbita lect.
Tempus.
Oler.
Flos.

res sunt, qui postremis firmentorum emergunt, & ob id eos auferunt: Cucumeris enim [cucumeris] prohibent incrementum. Maturius ex recentioribus feminibus exit, in quem finem nonnulli semen lacte, aut aqua etiam præmaceratum ferunt. Cucumis [cucumis] plurius generibus constat, quod partim affirmant, partim negant. Illi tria genera notant, Laconicum, Scytalicum, Bæoticum. Ex his Laconicum melius rigatum evadit: reliqua verò duo non rigata præstantiora fiunt. Cucumis [cucumis] ut cætera hujusmodi olera, præhumida est & frigida. Cucumis [cucumis] vocata, quamvis arboris altitudinem capiat, in ramisque sese, Vitis abutitur modo diffundat, tamen vitæ admodum fragilis est. Itaque ante ætatem geminare non potest, sed ad Autumnum usque prorogari cupit. Tertio portò die Cucumis [cucumis] exit. Sua imbecillitate facile perit in annuis Cucumis [cucumis] licet radice pumila inhæreat. De Cucumeribus [cucumeribus] portò dictum est, quod feminibus in lacte, multo vè maceratis dulciores reddantur. Amaritudo autem Cucumerum [cucumerum] per summitatem sentitur. Enimverò foras versas rem hujusmodi externi consentaneum est, utpote alienam. Quia portò Cucumeres [cucumeres] pulvere occultati nutriti, tenerioresque reddi creduntur, idè Megareses ita eos tractare consueverunt. Si quis nunc parvos Cucumeres [cucumeres] in mollitia absconderit, alimenti que copia largè accesserit, percoctaque fuerit, incrementum quoque largè consequuntur. Sic enim nulla pars alimenti à Sole detrahitur, nec flatibus refectatur: quibus causis moles augeri non possunt. Et hæc Theophrastus, qui & Cucumis silvestris [cucumis silvestris] alibi meminit. Quæ autem de Sicyo tradit, ea nobis videntur omnia venire cum Melonibus nostris, de quibus post. Quæ portò de Sicya prodit, competunt fortè Cucumeri nostro vulgari.

Plin. 19. c. 5. de natua, & genitibus, & historia nascentium in hortis, ait: Cartilaginei generis, extraque terram est Cucumis, mirè voluptate Tiberio principi expetius. Nullo quippe non die contingit ei, pensiles eorum hortos promoventibus in Solem rotis olitoribus: rutilisque hybernis diebus intra specularium munimenta revocantibus. Quin & lacte mullo femine eorum biduo macerato [Hæc sit & hodie in saru nostrorum Peponum, Dalech.] apud antiquos Græciæ authores scriptum est seri oportere, ut dulciores fiant. Crescunt quæ coguntur forma. In Italia virides, & quàm minimi [Melones minimos, & Cucumerum Malo Cratonon in amplis, res, adhuc habet Hispania, Dal.] vides quæ In Provinciis quàm maximi: & citrini [cerini legit Dalech. qua voce autor quoque usus est cap. 13. lib. 15. Apud Marcellum ex Planti Asularia, in voce Flammæus, Hadrianus Linius pro carnarij legit cerinari. Alibi Plautus cerinum & melinum colores memorat] aut nigri. Placeat copiosissimi Africæ, grandissimi Mæliæ: cum magnitudine excelsere, Pepones vocantur. Vivunt hausti in stomacho [de Cucumere, hoc Diosc.] in postterum diem, nec perici queunt in cibis, non insalubres [de Melone idem] tamen plerumque. Natura [de Cucumere & Anguria, idem] oleum odere mirè, nec minibus æquas diligunt. Defecti quoque, ad eas modicè ditantes adrepunt: contra oleum refugiant, aut si quid obiter, vel si pendeat, cui vantur: id que vel una nocte deprehenditur, si vas cum aqua subijciatur à quatuor digitorum intervallo descendentibus ante postterum diem: si oleum eodem modo sit, in hamos curvatis. Idem in fistula flore demissolo, mira longitudine crescunt. Ecce cum maximè

nova

nova forma [de Melombus, idem] eorum in Campania provenit, Mali Cotonei effigie. Fortè primò natum audio unum: mox femine ex illo generis factum, Melopeponas vocant. Non pendunt, sed humerantur. Mirum in his, præter figuram, colorè que, & odorem, quòd maturitate adepti, quantum non pendentes [de Melonib. idem] statim à pediculo recedunt. Columella frum tradit commentum, ut toto anno contingant. Fructum Rubi quàm vastissimum in apricum locum transferre & recidere, dudum digitorum relietà stirpe, circa vèrnum Equinoctium: ita in medulla Rubi femine Cucumeris insisto, terrà minutà, firmò que circumageratis resistere frigori radices. Cucumerum Græci tria genera fecèrunt: Laconicum, Scytalicum [verid-ly, habena, flagellumque scutica. V. carum inde Cucumeris hoc genus, aut quòd ex eius sarmenis fierent habena, loricæque scuticarum, vel quòd his sarmenis similia essent. Galb. fructus inde Conrgees nominantur. Est & inde sumptum nomen scytilis serpentis cum mentio fit c. s. l. 32. Et nōs avvarias Theophr. cap. 5. 4. his. que scutica baculum significat. Dalech.] Bæoticum. Ex his tantum Laconicum aqua gaudere. Sunt qui herbà, quæ vocatur culix nomine, tritā, semen eorum maceratum ferri jubeant, ut sine femine nascantur. Idem Plin. l. 20. c. 2. ubi de anguino, sive eratico Cucumere egit, de sativo, & de Peponè subdit. Multi eadem omnia [qua Cucumeri silv.] fativis tribuunt. Magnū etiam in eis momentum. Namque & eorum semen, quantum tres digiti apprehenderint, cum Cumino tritum, potumque in vino tussentibus auxiliatur. Sed & phreniticis in lacte mulieris. Et dysentericis acetabuli mensura. Purulenta autem expientibus cum cumino pari pondere, & jocularis vitis in aqua mulsa. Urinam movet ex vino dulci, & in renum dolore clysteribus simul cum cumino insunditur. Pepones qui vocantur, refrigerant maxime in cibo, & emollunt alvum. Caro [Dioscoridi ad hæc, in infusum: Ruell. verò legit, quòd solum samentum] eorum epiphoris oculorum aut doloribus imponitur [contra infantium siccitatem imponitur sincipiti: & ad motum siccitatis pro anacollemate, oculorum fluxiones cohibet, Diosc.] Radix sanat ulcera concreta in modum savi, quæ carina vocant. Eadem contra vomitiones siccatur, & in farina tusa datur contra obolis in aqua mulsa, ita ut qui biberit, quingentos postea passus ambulet. Hæc farina & in smegmate adjicitur. Cortex quoque vomitionem movet, faciem purgat. Hoc & folia cyjuseque fativi illita. Eadem cum melle epinyctidas sanant: cum vino, canis morsus. Item Millepedæ, spea Græci vocant, oblongam pilosis pedibus, pectori præcipue nocivam. Mortuum tumor insequitur & putrefcit locus. Ipse Cucumis odore defectum animi. Coctos de raso cortice, ex oleo, aceto, & melle jucundiores esse certum est.

De Cucumere sativa [quæ nō habetur nisi in] hæc scribit Dioscorides: alvo, stomachoque utilis est, refrigerandi vim obtinet, si modò non corrumpatur, ac vesicæ prodest. olfactu verò defectos animo recreat. Sed & ipsius semen modicè urinas cit, & cum lacte aut passio vesicæ exulcerationibus subvenit. Ceterum ejusdem folia cum vino imposta, canum morsus sanant: ex melle verò epinyctidas. Idem de Peponè [quæ nō habetur nisi in] ait. Ipsa quoque Peponis caro in cibo sumpta urinas movet: oculi verò in inflammationes imposita lenit. Ejus verò rarietum infantium siccitatis laborantium sincipiti imponitur: ac fronti quoque anacollematis vice adligatur ad inhibendas oculorum fluxiones. Porro succus cum femine adjecta farina siccatur in Sole, faciem smegmatis vice repurgat, illique nitorem corollat. Cæterum sicca radix ex mulla drachmæ por dere pota, vomitiones movet. Quòd si quis placidè ac citra

molestiam vorare à cena voluerit, oboli bini latiffecerint. Sanat quoque cum melle imposta capitis ulcera concreta in modum savi, quæ ceria vocant. Et hæc Dioscorides qui neque Cucumerem sativum, neque Peponem, ut vulgaris notitia plantas, descripsit, sed nec aliorum veterum ullus suis notis nobis illas representavit. Dioscoridis autem Pepones nobis quidem videntur esse Cucumeres nostros; Ejus verò Cucumeres, nostros Melones.

Cucumeres, ut tradit Galenus, urinam quidem, ut & Pepones cient, sed minus quàm illi, quòd ipsorum substantia minus est humida, ideò que non facilè, ut illi, in ventriculo corrumpuntur. Invenias autem qui ipsos bellè concoquant. Qui autem eo ipso sibi affatim sese impleverunt, tandem longo tempore succum frigidum ac mediocriter crallum in venis coæcant, qui in ea concoctione, que in venis fit, haud facilè mutationem in probum sanguinem recipit. Quam ob causam omnibus pravus edulis abstinentum, etiam si ea quibusdam concoctu sint facilia. Nobis enim non advertentibus pravus succus ex ipsis post longum tempus in venis colligitur, qui postea exiguum ad occasionem putredinem nactus, febres malignas accendit. Et hæc. l. 2. alim. Idem s. simpl. Cucumis esculentus maturus quidem tenuioris essentia est, immaturus autem crassioris. Sed & abstergeri & incidendi facultas eis inest. Quare & urinam movent, & corpus splendidum reddunt, ac magis quoque si quis femine arefacto, contusò que ac cribrato vice pulveris absterforij utatur. Superat in eis frigida humidàque temperies, non tamen magnopere, sed quasi in secundo censetur ordine. Attamen si quis aut femem, aut radicem arefaciat, haud etiam humidà fuerit natura, sed jam desiccantis: idque in primo quodammodo ordine, aut etiam secundo, sed incipiente. Est & in istis major abstergeri facultas, quam in fructus ipsius carne. Et lib. de euchym. & cacochym.

Sunt autem inter fructus Cucumeres, & Pepones & Melopepones. Sed qui à bonitate succi tantum abstant, ut nisi celeriter transeat, in ventre corrupti succum ex ea corruptione faciant mortiferis venis proximum. Huic sententia, ut assentiuntur omnes, ad stipulante ipsa etiam experientia, ita Dioscoridi Carysij opinio reprehensione digna, qui apud Athenæum Cucumerem noxium damnavit primis mensis, ut qui raphani modo sursum feratur, ultimo cibo innocentiorem esse, concoctumque faciliorem, alioqui usum eis abdicavit. At contra cum pravi sit succi, ante alios omnes cibos sumendus, ut facilius per alvum subeat, nec in eo corrumpatur, quòd facile ei eveniet, si aliis cibis postremus ingeratur. Addidit his quæ vera sunt, urinas eo citi, refrigerandi vim habere, difficile in corpus distribui, ægrè per ventris anfractus evadere. Quinetiam horrores concitare, bilem creare, venæ em arcere.

Plenilunio maxime gliscunt in hortis Cucumeres, manifestumque capessunt incrementum, & increverunt. more marinorum echinorum implentur, ut tradit Athenæus, quod est aquei humoris incrementum. A mulis Cucumeres expectantur, capiuntur que mirrà eorum voluptate, nec non odorem emittis sentiunt. Quare munienda sunt cucumerata, ne iturruentes, ea de populentur ac proterant.

Martio mense, inquit Palladius, Cucumeres seminantur, rare sulcis factis, altitudine sesquipedali, latitudine pedum trium. Inter sulcos octo pedum spatium crudum relinquant, ubi possint vagari. Herbis juvantur, ideò sarculo & runcatione non indigent. Semina si ovillo lacte & mulso maceres, dulces nascuntur, & candidi. Longi & teneri sunt, si aquam in patenti vasculo sub eis ponas, duobus palmis inferioriorem, ad quam festinando tales efficiantur.

Caro.

Epe.

Mel.

Rub.

Gall.

Serp.

Cuc.

Diosc.

Plin.

Theophr.

Ruell.

Diosc.

Athen.

Carysij.

Diosc.

Pallad.

Martio.

Semina.

Sulcis.

Spatium.

Herbis.

Sarculo.

Runcatione.

Semina.

Ovillo.

Pepe Diosc. est Cucumis noster.

Cucumeres Galeno.

Temperamentum.

Non boni succi.

Diph. Carysij opinio reprehensione digna, qui apud Athenæum Cucumerem noxium damnavit primis mensis, ut qui raphani modo sursum feratur, ultimo cibo innocentiorem esse, concoctumque faciliorem, alioqui usum eis abdicavit.

Difficuler distribuitur.

Plenilunio.

A mulis expectantur.

Ex Pallad.

Cuc. dulces.

Longi.

Sine femine. cientur. Sine femine nascuntur, si puius eorum semina oleo fabino [sesamino aliq] perungantur, & herba ea quæ Culex dicitur, trita conficiuntur. Aliqui florem Cucumeris cum viticulae suæ capite cannae inforunt, cui prius omnes nodos perforaverint: ibi Cucumis nascitur in nimiam longitudinem tensus. Oleum sic metuit, ut si juxta posueris, velut hamus plicetur. Quoties tonat, velut timore perterritus convertitur. Si eius florem sicut in sua vite est, in forma scitili clauseris, ac ligaveris, qualem vulcum forma vel hominis, vel animalis habuerit, talem Cucumis figuram præstabit. Hæc omnia Gargilius Martialis asseruit. Columella dicit, loco aprico & stercoreoso si Rubos habeamus, aut Ferulas, post Autumni Equinoctium, his juxta terram recillis & excavatis ligneo stilo, inter medullas letamen immittamus, & Cucumeris semen addamus, hinc nasci fructus qui possent & inter frigora non necari. Hæc enim, ut hyemem odit. Inventa est ratio, ait Plinius, qua cibis ferventur Cucumeres usque ad alios proventus: & id quidem in muria fit. Sed & serboe opaco in loco arena substrato, scænoque sicco opertos, ac deinde terrâ, virides servari tradunt. Salsamarij hodie sale, aceto, Fœniculo, & Sampsucho condunt. Alii triti sinapi cum aceto.

Locum. Sicuti Græcè dicitur, cognominaturque *ήμερο* ad *ήμερα* sc. differentiam, & Artico more *άριστο* & *αίσιον*, & à Phrynichio Ποιτά *απόθου*. Demetrius verò, Athenæo auctore, *ακτινός* dictos esse ait *από τού σήλαμα* & *γρονο*, i. e. quod venerem ciant, cum contra veneri refragentur. Inde proverbium fuisse commemorat Athenæus *τόν σίνυον ὁρώμεθα γυῖον, τὴν χελώναν ὕφαντος*, i. e. texens pallium mulier Cucumerem devoret. Cum enim textrices magnâ ex parte, si Aristoteli creditur, sint impudice, ut in iis veneris impetus refrenetur, adagium edendos Cucumeres textricibus confulebat: nam veneriorum aviditatem inhibere tradidit Diphylus. Quare *κατ' αὐτοπάραμον* nomen impositum fuit. At potius *αίσιον* dicitur *ἀπό τῶ σήλαμα* & *γρονο*, quod ad gignendos, spargendos, diffusendos ramos caulisque valde incitantur, non quod venerem stimulent. Matron suis carminibus tertæ filium nominavit. Heraclides Tarentinus Hedygeon, quasi terræ suavitatem. Recentiores Græci Cucumeres *ἀγγούριον* vocantur, & communi sermone, teste Simeone Sethi, *τὸ ἀγγούριον*. Latinis verò Cucumis & Cucumer dicitur, à curvitate ut Varroni placet. Arabes *Chate*, *Cheta* & *cherhete* vocant: Germani Cucumern: Belgæ Concomeren: Galli *Concombre* & *Coesmbre*: Itali *Coesmera*: Hetrusci *Cedruolo* Hispani *Cogmbro*: Angli *Cucumbres*: Bohem. *vvokvoriky* Hung. *gorka* & *Buburka*.

Arguesora. Tanta porro est naturæ cognatio, inter Cucumeres, Pepones, Melopepones, & Cucurbitas, ut hæc peponum et proprietates, & nomina Latini, Græciq; confunderint. Pepo enim, qui à Græcis Pepon, à Theophrasto Sicyos & Persicyos dicitur, à Polluce Cucumerum generi contribuitur. Nec desunt, qui Sicyam hoc intelligant, quod vulgo Angurium & Palestinus Melo dicitur. Athenæus certè Sicyam veteres pro Cucurbita vocare solitos affirmat, atque ita Nicandrum Pœtam uti Georg. vol. 2. Apud Græcos certè Cucumeris appellatione Pepones quoque veniunt. Plinius quoque tradit, ut ante annotavimus, Cucumeres cum magnitudine excessit: Pepones vocari.

Tragus. De Melone, Pepone, Cucumere & Citreolo in genere hæc habet Tragus. In Italia & Gallia multa plantantur Melonum, Peponum, & Cucumerum genera, quæ & in Germaniam commigrarunt. Habent verò Melones, Pepones, & Cucumeres ejusdem ferè formæ folia, caules & flores, ac humi magis sparguntur, quam in altum sepe atollant, davi-

culas quibus proximis completantur frutices, Cucurbita longè magis exiguis obtinent. Folia Melonum & Peponum rotunda sunt, aspera, ac minorâ Cucurbitæ foliis. Ramuli suæ viticulæ duplici eoque luteo emicant flore, quorum alter decidit, alter verò (posterior) fructum facit, qui nihil aliud est, quàm pomum quoddam, sed diversæ formæ & coloris. Invenias enim Melones & Pepones alios oblongos, alios rotundos, nonnullos luteos, quosdam virides. Hi omnes foris cernuntur striati aut fulcati, intus verò succoli, senuinibusque in utero litratim digestis refertis, odore suavissimi, jucundissimi, sapore verò satis dulces. Melonum & Peponum magna in agro Norimbergensi copia provenit, nec non in Vngaria. Cucumeris folia asperiora sunt, majora & latiora Peponibus & Melonibus. Radices omnium tectæ sunt, multisque ac candidis capillamentis fibratæ. Maturantur verò eorum poma in nostris regionibus inter Aëtatem & Autannum, hæc Augusto plerumque mense. Quemadmodum autem Dioscorides omnia Melonum, Peponum, & Cucumerum genera sub *τὸ ἡλίον αἴσιον* & *τὸ ἀπὸ τῶν γρονο*, hæc lativi Cucumeris & Peponis voce comprehendit, ita Germani omnia prædictorum generum poma, & Melones vocant. Cucumeres verò cum magnitudine excellere, Pepones, dictos Pseidon Galii Peponis nominant. At rotunda & citrei coloris poma, Melopepones & Stapones à forma appellantur. Quæ verò ex viridi colore nigricant, gustuque optimo prædita sunt, quidam Hircos & Hircanos (Germani *Boßhöden*) vocant. Galli *Pepons Turquois*. Cucumerem luteum, Columella Anguinum vocat. Reliquos Cucumeres vocant Citrinos, Citrulos, Citreolos, & Citrullus: Serapio *Batecha*, & *Chatha*, & *Cura*. i. e. Melonem, & Citrullum, & Cucumerem. Itæ Manlius Bathecam Serapionis, & Albathecam Avicennæ (quam nonnulli Cucumerem Saracenicum, Anguriam & Larguriam interpretantur) unam & eandem esse plantam contendit. Hebræi Cucumeres *Kissibum*, Chaldaei *Kattâia* (à qua voce *Chatheth* Serapionis non multum abluat) Pepones verò *Arthibim* (quod à *Batheca* & *Albatheca* non multum abelle videtur) & ut Thargum habet Hierosolymitanum) *Malpasia* vocant. Hac de re vide Num. xi. Et hæc Tragus, qui unâ iconè plutes comprehendit plantas, Melones, Pepones, Cucumeres vulgares, & Angurias, quæ vulgo officinis Citruli dicuntur. Non distinguit præterea inter Melones & Pepones.

Cucumerum genera Fachsio sunt Pepones & Melones in quos statim degenerant, figura tantum & quantitate inter se dissidentes. Si quidem: qui magnitudine excedunt, aut in longitudinem procedunt, quales multis locis nascuntur, Pepones quondam vocati fuerunt. Sed qui formam & effigiem Malireferunt, & humi rotundantur, Melopepones à Græcis vocantur. factio ex Peponè & Malo nominem, neque inter Pepones & Melopepones aliud, quàm quod ex figura quondam sumebatur, discrimen fuit. Totum hoc genus Palladius Melones, quasi *υἰόνες*, i. e. pomos, à Malorum figura appellavit, quo nomine major pars hodie Medicorum simul cum officinis utitur. Sunt itaque in universum tria Cucumerum lativorum genera. Primum genus absolute Cucumis, à nostrâ avaris Herbaris, & cum adjectione Cucumis citrinus, hæc flavus, à colore quem habet cum maturet, appellatur. Aëtius, quod equidem sciam primus Anguria vocari tradit, quæ vetenitus *siva*, i. e. Cucumeres vocantur. Horum sanè plura sunt genera: nos quatuor potiora commemorabimus quorum etiam picturas exhibemus. Primi generis est vulgaris Cucumeris fructus obtinens oblongum & maculatum, germanicè vocatur

Sine femine.

Tomitro confertim. Diversa forma.

Locum.

Afferatio.

Nomina lingua. Sicyos Etymon.

Præverb.

Trym. aliud.

Terra filium.

Terra sua. Sicuti.

Arguesora.

Eppo. Sicyos.

Cucumis.

Anguria.

Cucurbita.

Tragus.

Anguria.

Cuc. Siva.

Genera.

catu gemin Cucumerem / gallicè simpliciter *Concombre*. Sunt qui illum privatim Anguriam appellent. Ad quod sanè nomen alludentes, Germani nostri alio nomine *Eurthen* nominant. Alterius generis Cucumer est peregrinus, quem vulgus Turcicum cognominat, prior multò major ac procerior, foliis, floribus, & fructu, qui ut in primo non est maculosus, sed tamen oblongus etiam: Germani *Türsch* Cucumerem nuncupant: Galli *Concombre du Turc*. Fructus ejus admodum flavus existit, hinc est quòd multi eundem privatim Citrulum & Citreolum, quasi Citrinum, h. e. flavum vocent.

Hujus femina alba & lata sunt. Tertij generis Cucumer est, qui Marinus dicitur, Turcico quòd ad folia, flores & femina attingit, serè similis: nisi quòd in hoc omnia sint minor: fructus verò rotundus: Vulgus *Zucco marin* vocat. Germani *Necer Cucumerem*: Galli *Concombre marin*. Officinis perinde ac Turcicus ignotus. Quartij generis Cucumer est, quam Officina hodie Citrulum vocat. folia habet serè Colocynthidis, multifariam dissecta & incisa, fructum rotundum, herbacei coloris, & in eo semina lata, & colore spadicea, h. e. in rufo atra. Ego officinas respiciens nominavi hunc Cucumerem Citrulum, germanicè *Citrullen* / gallicè *Citrulle*. Alterum genus Cucumeris est, qui nunc simpliciter Peponem, *à πόνος* *πρωτόν* h. e. mature scere dicitur. is enim mitis ac tener maturitate flaccescit: Germani *Pfeben* appellant, Galli *Pepon*. Tertium genus Cucumeris hodie Melon ab omnibus vocatur, Germani *Melam* nominant, Galli *Mel us*. A priore forma & suavitate differt: rotundior liquidem & Mali Cotonei quasi formam referens, mitiorque existit. Diferentiam hoc sentientes posteriores, Græci *απόρ* simpliciter dixerunt, quem nos privatim Cucumerem vocamus. Adjectâ autem Peponis voce, hunc quem nostras etas privatim Peponem nominant, *απόρ* *πρωτόν*, i. e. Cucumerem. Peponem dixerunt, mitem sc. & maturitate tenerum Cucumerem inruentes. Sub quo eum etiam quem à tereti ac rotunda Mali effugie *ωσπύρα* peculiariter dixerunt, complexi sunt. Et hæc Fuchsius. Videtur autem valde indistinctè de Cucumere, Pepone, Melopepone & Angurii scripsisse, miscens cum iis Cucurbitis folio alpero. Præterea non sine errore Cucumerem fativum vulgarem, maculosum cognominat, & Anguriam dici credit: competunt siquidem ista duo nomina plantæ quam pingit nominè Cucumeris Citruli.

Dalechampius author est Plinium Cucumeris nomine Gallorum Melopepones, vulgo *Melons* dictos, Cucumeres, Anguriasque complexi, & de iis diversâ tradere, cuique suo generi tribuenda. Citrinos adhuc in Gallis vocari *Suerades blanches*, & nigros autem, *Suerades rouges*. Cucumeres Italæ virides Plinij, esse Pepones, i. e. Melones mininos & Melo Cidonio non ampliores, in Hispania adhuc cognitos. Idem apud H. Lugdunensem ait dubitari à multis an Cucumeris nostratis vitis capite de Cucumere fativo [*απόρ* *πρωτόν*] exposceret Diofcorides, an vulgaris Anguriz. Sed Diofcoridem, cæteròque Græcos *απόρ* nomine Cucumerem, Gallorum *Concombre*, intellexisse veris consensibus assecutum esse Matthiolum. Diofcorides siquidem scribat Cucumerem silvestrem fructu solo à fativo differre, cumque foliis, floribus, samentibusque fativum prorsus referre. Quare cum his omnibus Cucumis fativus silvestri proptus similis sit, nemini dubium esse debere Diofcoridem de Cucumeris vulgaris, non de Anguriz vitibus *απόρ* nomine tractasse. His accedere Plinij auctoritatem, ita scribentis: Cucumeres crescunt, quæ cognitur formâ, &c. Hæc enim de Cucumere nostro verissimè dici posse, minime verò de Anguria. Nam Angurias in Italia in

magnam excrecere molem, ac eum aquæ sint substantiæ, ac prædulces eum maturæ fuerint, facile à ventriculo descendere, quod Cucumeribus nostris evenire negat, quòd frigido glutinosoque sint succo, ac ob id concocto contumaces, nec non nisi longo tempore labi. Præterea Cucumeres eodem Plinio auctore, in fistula flore demisso, mirâ longitudine crescere: & hoc in Cucumeribus nostris certâ experientiâ se competum habere. E quorum semine qui postea sint orti, eandem retinuerunt formam, ut in vite sua pendentes longi, & anguini modo contorti spectentur. Adhæc natura oleum odisse mirè, ut idem scripserit, nec minùs aquas dilixisse. Dejectos quoque ad eas modicè distantes adrepisse, &c. Hæcille. Cucumerem Diofcoridis nobis videti nostros Melones dicimus paullo post. Inquiremus etiam an nostri Cucumeres sint Pepones Diofcoridis.

Apud Theophrastum, inquit Casalpini, & Diofcoridem duo tantum Citreoli genera traduntur: appellat Theophrastus alterum quidem Sicyon, alterum verò Sicyan: uterque verò utitur à Gaza Cucumis, quamvis aliquando distinctionis gratia Sicyos Peponem, & Cucumer vocetur, Sicya autem Cucumis. Ex Theophrasti verbis colligere licet Sicyam signi-

ficare Citreolum nostrum: hic enim figuram accipit loci, præcipuè genus illud intortum anguis modo. forte & idem Sicyos intelligitur sc. Laconicus, qui melius evadit rigatus, id enim convenit nostris Citreolis: gaudent enim aqua ut Cucurbita longa: reliqua autem Sicyorum genera, quæ non rigata præstantiora sunt, optimè quadrabunt nostris Peponibus, & Cucumeribus, qui maturi cibis expectantur: hi enim pulvere æstivo gaudent, & aquas oderunt. Diofcorides Sicyon masculino genere vocat: quam Theophr. Sicyan appellat: Peponem autem quem Theophr. Sicyon. Sicyos autem Diofcoridis vires Citreolis nostris conveniunt. Ex Peponis quidem nomine colligere licet Peponem accipi debere aliquem ex iis, qui maturi expectantur in cibis, ut nostrum Peponem, aut Cucumerem, aut utrunque, sed ex eo usu, quo *βελύχια* *απόρ* *πρωτόν* *απόρ* *πρωτόν* i. e. ejus testa veluti calvaria pueris imponitur ad calvariam, significatur potius noster Cucumer: rotundum enim ejus cornum, & testæ modo fragile, & planitie ac levitate calvariam æmulatur: idem comprobatur & facultas refrigeratoria, & vis repellendi: hæc enim in Cucumere magis est manifestata, quàm in nostro Pepone. Apud Galenum re-

peritur Sicyos, & Peponem, & Melopeponem. Quæ autem de Sicyis inquit, ea profecto cum Sicy Diofcoridis conveniunt, i. e. cum nostris Citreolis. Quæ porro de Peponem scripsit, cum Diofcoridis Peponem concordat, & nostris Cucumeribus quadrat: Sed unum tantum an fam dubitandi præbet, quòd ipse inquit, homines in Peponibus, à carne intima, in qua semen habetur, absterent: contra enim apud nos usu venit: gratior est Cucumeris interna caro, in qua femina, quàm externa prope corticem. De Melopepone tandem quæ tradit, adamussim nostris Melonibus congruunt, sed eandem dubitatio. nem afferunt, quam in Peponem indevicimus. Inquit enim in Melopeponibus homines carnem intimam, in qua femina continentur, mandunt: idque ipsis ad dejectionem confert. Qui verò eorum quasi carne tantum vescuntur, non tam cito eam, ac Peponem excerunt: raro enim ex nostris Melonibus internam substantiam, fibrosam comedimus. sed dura cum femine auferimus: idcirco suspicor errore aliquo commutata esse in eo loco vocabula Peponis & Melopeponis, ut restituis in hunc modum restituatur Galeni locus: Qui verò eorum quasi carne tantum vescuntur: non tam cito eam ac Melo-

Citreolus Casalp.

Si ya' hea' phrast' est Citreolus Casp.

Sicyos Pepon Diof.

Cucumer.

Sicyos Galeni est Citreolus Casalp.

Pepon Diof. Galeni idem est cum Cucumere.

Melopepa Galeni sunt Melones.

Galeni le- Diofusse- dia restituitur.

1718

3

4

umeris um

umeris um ge

of. re-

ech. Cucu- c' quod Alexerit ins.

o mini

ocuum Cucu Dulce. sict.

1.

lopeponum excurrunt. Quasi hoc sit in causa, cur Melopepones tardius discendant, quam Pepones: quia interna caro eorum non comeditur ut Peponum; vis enim ad dejectionem faciens magis in ea parte est: idem si ex Pepone aliquis tantum circum duriorem assumeret, ut sit ex Melopepone, sentiret tardiore Peponis defensionem: huc accedit, quod in Melopeponibus homines ad carnem intimam, in qua semen habetur, abstinent, in Peponibus autem mandunt, idque ipsis ad dejectionem confert. Plinius omnes hos fructus Cucumeres vocat: nam Pepones & Melopepones inter eos recentat, quasi species. Cucumis tamen privatim ab eo intelligitur Citreolus noster Italicus, non solum parvus, sed & grandis, qui peregrinus est. Cui autem inquit, Pepones vocantur, eam magnitudinem excellere, consentit cura nostris Cucumeribus seu Anguriis. Cum praeterea ait, Ecce cum maximè nova forma eorum in Campania provenit, Mali Cotonei effigie: fortè Melopeponas intelligit. Per non pendentes, qui statim à pediculo tecedunt, manifestè Melones nostri indicantur.

Cucumeres Plinij Cas. quid?

Citreolus italicus.

Anguria.

MELONES. CAP. VIII.

Deser. generis.



Multorum generum Melones sarmatensis, aspectuque & longis caulibus, per terram se spargunt: foliis alpestris angulosis, sed minus, quam Cucumerum, quorum respectu rotunda dici possent, quibus etiam magnitudine videntur cedere: è quorum sinu flores emittunt lutei, cucumerinis similes, floribus pomorum Amoris pares, in diem plures unam cum in tortis capreolis, quos excipit fructus non nihil pilosi, omnes ventrosi, modò sublongam aliam, contractiorem, rotundam figuram obtinent, majores & minores, totosi & canaliculati, in superficie aliquas veluti à vineis corollas seminas reticulatas habentes, colore virente, & cinereo: cortice duriore, quam Cucumeris. Caro subest per maturitatem coloris melini, mucilaginesa, humida destituta, ubi nimium matura, sapore suavi, molli: non subinde redolens, aut saccharum respiciens: medullam occupat mucilaginis osae quaedam substantia, cui immergantur semina, siccioribus quodammodo similia, minora, candida, sapida, imbecilla.

Sapor.

Varietates.

Sicyos Theophr.

Multiplex in siuctu est differentia, non tantum colore cutis, carnis, saporeque, & odore, verum etiam forma oblonga, sessili, &c. Consideratis quæ Theophrastus scribit de Sicyo, nihil inuenio, quod non convenire possit cum rotis Melonibus: ubi Theophrastus habet *σικύος*. Gaudet interdum vertic Peponem, sed plerumque Cucumerem: quin *σικύος* sit Cucumis agrellis vulgaris neminem existimamus dubitare: is sarsè majorem habet similitudinem cum nostris Melonibus, quam cum Cucumere.

De Cucumeribus que tradit Plinius magna ex parte referenda videntur ad nostros Melones vulgè dictos, cum in quibus, nisi fallimur, confunditur Sicya Theophrasti, sive Melopepones Galeni, & Cucumeres nostri vulgares: mihi facile persuadere sinam à Tiberio. Certe Melones postius expetitos, quam Cucumeres vulgares. Quæ sentiantur de preparatione feminum, & de vanis generibus, quæ etiam de Peponibus dicuntur, melius conveniunt, cum Melonibus, quorum sanè varia genera. quæ Dioscorides scripsit Sicyos fativæ nomine, videntur repugnare Meloni (nisi quis obijciat, quod ait *σικύος* *σικύος*, quod potius videtur convenire Cucumeri vulgari folia Cucumeris sive stritis, ut jam diximus, similia sunt, Melonum foliis, quam Cucumeris vulgaris.

Quæ Tragus, de Melonibus tradidit, ante posuimus. Dalech. apud Lugd. hæc particulatim habet. Sunt etiam Cucumerum species, Pepones & Melopepones. Sed ex Plinij verbis, Cucumeres cum magnitudine ex. esse. intelligere licet Pepones in genere Cucumerum esse, & Melopepones in genere Peponum: quos Palladius Melones appellat à Mali Cydonij figura, quam referunt romine composito Melopepones appellari. A Peponibus autem differunt, quod Pepones majores sunt, magis striati, magisque succulenti, sed minus grati, carne molliore & semine pauciore, oblonga figura, ut Cucumeres; Melopepones globosi. *Πέπων* igitur Græcis, secundum Galenum *πέπων*, h. e. maturum significat, quod omnibus aliis frugibus maturis convenit. Sed peculiarem fructum hoc nomine appellarunt, quo modo atramentum quo scribimus *νύκτα*, i. e. nigrum. Quare Medici non simpliciter fructum hunc nominare voluerunt Pepona, sed *σικύος*, *σικύος* i. e. Peponem cucumeralem. Atiſoteli *σικύος* dicitur, & Polluci. Quir etiam *σικύος* de quo Dioscorides, Galenus & Plinius seorsum de Cucumeribus & Melopeponibus tractarunt, Gallis Pepon & Peponis dicitur. Ejus permulta sunt genera, quæ Dalech. figurat, & colore differunt. Est enim ventericosus Pepon, qui à pediculo ad umbilicum usque trifidus striatus & canaliculatus est. Alius quam seminum vocatur, miris striatus. Quidam totum corticem texturatum quadam reticulati, miro naturæ artificio conspersam habent. Aliquorum fructus grandis est, humani capitis in stat, aliquando etiam major, nonnullorum longè minor. Sunt qui herbaceo sunt colore, alij flavo, alij pallido, nonnulli cinereo. Interior quoque pulpa varia: in quibusdam enim rubet, in aliis albicat, in nonnullis ex albo rufescit. In quibusdam dulcis & gustu suavisissima, in aliis insuavis & insipida. Sunt item qui Hircini, & vulgo Turcici dicuntur. Melopepones etiam varij sunt, nunc magri, nunc Mali Cydonij figuræ & magnitudine. Horum caro interdum candida est, interdum flava, quandoque pallidior, aliquando solidior, aliquando laxior. Præferuntur candidi, solidi, ac sic dulces, ut saccharo corditi videantur, quos idè saccharatos vocant, Galli *Sucrius* & *Sucredes* vocant. Præterea quibusdam semen pulpæ firmissimè inhæret, ut eultelli mucrone particulatim evellendum sit, aliis in medulla humida semen jacet, quæ concusso suo à separatur sponte, ac decidit à reliqua pulpæ junctura. Sunt præterea qui olitorum marginibus Rosarium & Molchi odorem spirant, seminibus, quæ parte germinant, parumper apertis, & aqua rosacea, quæ molchum exceperit, maceratis. Est etiam quoddam herbaceum, quod in area non maturet, sed flavescit laquearibus appensum, magnaque voluptate Hieme comeditur. Hoc Hetrusci melle saccharoè condiunt Citrei pomi modo. Ac Citreulus & Anguria Peponum etiam species sunt.

Hec

Hæc omnia Peponum, Melopeponumque genera feliciter in Gallia proveniunt. Paucis qui ex eadem planta nascuntur fructibus pauci sunt, qui hinc excellant, ceteri sunt insuaves. Odor suavior, crassior pediculis, pondusque bonitatis sunt indicia. Videtur apud Dioscoridem in roseo *βέβαιον* pro *βήμα* positum fuisse, sicut etiam in Dioscorides de Cucurbita dixit, *τὸ δὲ βήμα αὐτοῦ πικρῶς οὐκ ἔστιν ἀρκεῖται* *τὸ δὲ βήμα* *κατὰ τὸν ἀστυ.* i. e. Ramenta ejus infantibus siccata vixit simpliciter admoventur. Cornarius tamen vocis *βήμα* *ὀλέθριον* non improbat, & significare contendit, sicutipit & apicem, ac sumnam Peponis partem, quæ recisâ cum usum præbeat, quem Cucurbitæ *βήμα*, q. e. ramentum. Plinius, nisi mendosi sint ejus codices, Dioscoridi & Galeno planè adversatur. cum dixit radicem contra vomitiones siccata, ut legendum putat Hermolans. Plinij etiam ita reseruitur videtur Cornario: Eadem contra lit vomitiones: siccatur, & in farinam, &c. Et hanc emendationem perspicuè approbat sequens Plinianæ orationis contextus, siccatur, & in farinam cusâ datur, &c. Quod verò dicit radicis farinam in sinigmatate addi, an de eadem Dioscorides intelligat, cum scribit succum cum semine admixtum, ad farinam siccaturam in sole cogi ad sinigmata, dubitari sanè potest. Nam etsi radicem eandem quam Plinius vomitiones concitandi vim tribuit Dioscorides, nullâ tamen adhuc radicis mentione factâ, ejus farinam qui potuit intelligere? At cum ad eum usque locum de Peponis carne tantum tractarit Dioscorides, cum etiam hæc Galeno abstergendi vi prædita sit, magisque semen ipsius, ejus carnis exsiccatæ farina hoc loco accipiendâ videtur, vel *τὸ ἀρκεῖται* simpliciter farina aliqua vulgaris, ut triticea, vel hordeacea, quæ si non ad abstergendum, certè ad passillorum formam effingendam, succo & semini admisceatur, eaque forma illa excipiantur. Quod porò radicis Peponis tribuent Dioscorides & Plinius, Galenus ipsius Peponis carni adscripsit. Hactenus Dalechampius, qui Peponis speciem Citrulum quoque constituit, dicens: Peponis sive Cucumeris species est, qui Citrulus Medicis dicitur, quasi Citreolus, Avicennæ verò Batheca. Est autem Bathec sive Batheca nomen commune ad omnes species Melonum, & Anguriarum. Serapio cum de Peponibus & Melopeponibus ex Galeni sententia dixisset, peculiare de Anguria caput subjecit, quam arabicè Dullaha appellat, in cujus historia & viribus exponendis cum nulla Græcorum, sed Arabum duntaxat testimonia proferat, facillè intellectum est Angurias veteribus Græcis penitus fuisse ignotas. Eam ob causam eos hallucinari, qui Pepones Angurias esse arbitrati sunt, in confesso est.

Fach. iconem nomine Peponis habet, quem nos ex eo proponimus, & genus Cucumeris facit, ut ostensum antehac, ubi ejus verba transcripsimus. ibi sanè multa indistinctè tradita videtur.

Non desunt qui dicant Melopepones Galeni lib. 2. aliment. communes nostros Melones esse. Pepones verò, quos in eo genere Veneti vulgo *Pipone* vocant. Ego autem quamvis dubius sum (inquit Matth.) inclinât tamen animus ad credendum per Melopepones Galerum nostros Melones intellexisse, si modo ipse eorum unquam habuit notitiam. Cum illis porò non mihi facillè convenit, qui Venetas Piponas dictas Galeno Pepones esse existimant. *Πίπων* Græcis, Peponem item Latinis, Manitanis *Batheca*, seu *Batiche*: Germani *Pfeben* & *Melon* & *Melau*: Galis *Melons*. Idem in comm. post. cum magn. fig. vocat vulgari nomine Melones & Pepones, addens

diversas esse species, formâ, colore, & odore. Differentias adhuc speciei meminit, quæ servatur ad primum Ver. In hist. germ. vocat magnos Melones latinè Pepones, parvos verò & rotundos Melopepones. Adhuc Melonum speciem referit ait tenuissimo cortice, erratque toto celo, qui Pepones, vulgares Cucumeres faciunt. Sed errat ipse.

Lob. adv. vocat Melonem vulgi, Cucumerem antiquorum, & Melopeponem Dioscoridis, assignatque varietatem Peponum esse magnitudinis, coloris, & odoris. Inveniri quippe speciem quandam Moschatelinam, quæ vix Colocynthidem aut Arantium superet, odore moschi, sapore delicatissimo. Esse & alteram cortice, carneque albam, sapore etiam per jucundo. Vel hoc uno arguente tantum asserit Melones nostros, sive vulgi Italici Pepones, esse antiquorum (præsertim Dioscoridis) domesticum Cucumerem, sive Sicam fitivam, quia odore eximie fragrantæ, & Cytonei mali, aut Peponum redolentium æmulo restatret vires languidas & reficiat, spiritusque dissipatos revoceat animo lapsis, ut idem Dioscorides author est: eoque Melones, quasi Pomofos, meritis vocatos fuisse à recentioribus Græcis, quèd ori ac stomacho, citibus sint gratissimus, omnium hujus generis.

In Obs. p. 364. dicitur ei Melo vulgi & Melopepo Dioscoridis: in Icon. p. 619. Melo vulgi & Cucumis antiquorum. Brunfels & Trago Melo, ut & Galen. de coll. (cui & Melopepo.) Dodon. in fol. lat. vulgo Melones, Ital. *Mellone*, Hisp. *Melon*. Gallic. *Melon*, Germ. & Bohem. *Melion*, Belg. *Meloen*. *Melion* autem Græcis pomum significat, proinde rectius *Μηλονοπιον* hic Cucumis Dodonæo appellandus videtur, Peponem videlicet Mali odorem referens. Nam hujus fructus odoriferis malis odore sapenumber vicini sunt, subire verò & obscurè moschum redolent, qui idcirco & Moschatellini cognominantur. Galenus hunc pro Cucumi habuisse videtur, qui Græcis *αἰνῖς* *ἡμῶν*, Lat. Cucumis fitivus.

Icon hujus proponitur à Tab. pro Melone, nec Nic. Braun illa displicet: verum sine ratione & imperitè per Nic. Braun pro Melonibus & Peponibus proponuntur icones tredecim, multum inter se differentes, & diversarum admodum plantarum, nec tamen earum ullum traditur discrimen, nec ulla descriptio.

B. phyt. vocatur Melo i. sive vulgaris, mirè fructu varians. Est enim, inquit, nunc oblongus, aliàs contractior rotundioris figuræ, aliàs modè depressus, & c. stilis: subinde major, qualem Tab. & Ger. Melonis hispanici (de hoc nos sciorum post dicemus, nomine pingis, quandoque minor. Cortex alius asper, rugosus & tuberosus: & hic est Peponstrumofus, Lob. adv. aliis lavis: nunc viridis, nunc cinereus, nunc pallidus, nunc varius. Pulpa aliis ruffa, aliis candida, virènsque, quibusdam suavior, quibusdam moschi odore, quorum Dodon. & Cord. [in Diosc. & hist. Moschatellorum Peponum nomine] meminit. Alii qui astiti, alii qui hyberni ad Hiemem perdurantes, Habentur Camerario monte Americi & alij Italici, Patavini item Zatti dicti, & Neapolitani, in quibus semina ad eò tenui cortice reguntur, ut excorticata videantur, idcirco Gymnospermi dicuntur: Sunt denique & Pilosi. Cucumerum genera censentur Pepones & Melones, qui videntur potissimum figuræ & quantitate differre: qui enim majores sunt & oblongi, Pepones dicti fuerunt, qui verò formam & effigiem Mali referunt, Melopepones, quod nomen adhuc hodie in usu est. Sicque ita statui possunt Cucumeris genera, primū Cucumer, de quo aliàs: Secundū Melonū, Tertium Peponum.

HISTORIAE PLANTARVM

Melo, ueni, Tucepl rasto Sicyon, Plinio Cucumis M. Cato. et effigie. Melopepo Galeni: fortè Cucumis antiquorum. Haftenus C. Bauhinus, cui & in pin. Melo vulgaris: Melo, Brunf. Trag. (& Melopepo) Lac Tab. Ger. Pepo, Matthie. Fuchf. Lug. & Cast. Pepo, grandis Melo, Cord. hist. Cucumis Galeni & antiquorum, Dodon gall. Melo vulgaris, Melopepo in Græcia, Guil. Melo siue Pepo vulgi, Cucumis Galeni, Dod. Melo vulgi, siue Cucumis antiquorum, Melopepo Dioscoridis, Lob. Melon vulgo & Pepon, Sicyon Theophrasti, Melopepon Galeni, Carl. Melopepo, Gefn. h. Lon. Lugd.

Deser fru-
ctus.



MELO RETICVLATVS.

Melo reticulatus pedem fere longus, qui crassitudine uterunque utramque manum implet, profundè corniculatus, cortice est ex nitido rubescente, deinde aspero, rimoso, reticulato, cinereo: carne sublutea, siue melina, satis firmâ, sapidâ, subacidâ: medullâ intus fungosâ, albescente: seminibus oblongis, subluteis: aqueo humore, subacido.

Hortulanus asserbat facillè putredinem contrahere, ubi pluvia tangatur, quem propterea magna cum difficultate colit Montbelgardi in horto E. C. maturum medio Augusto.

MELO HISPANICVS.



Inuenimus apud Tab. & Gerardi Melonis hujus Hispanici figurâ, verum nullâ additâ descriptione. Quare si nò sit figmentum, qualia nonnulla proponit, ejus delineationem ij tandem addere poterunt Historiæ nostræ, quibus notum erit Melonis hujus Hispanici discrimen.

P. in suo phyt. & pin. si scripta ejus intelligimus, Melonem vulgarem majorem modicè depressum & sessilem vocavit.

MELO MAGNVS CORTICE

virente, lavi, siue parvo.

Melo capite pueri nuper natu paullo minor, longior non nihil quàm crassior, cortice exter-

nè virente, lavi, lucente, quibusdam in partibus rugas habente asperas, quâ inscriptione: costis duas uncias latis, non admodum clatis. Sub cortice caro latet durior, unciam penè crassa, tenerior paullo, grata admodum, & odorata: licet anni constitutione partim commoda fuerit pro Melonum maturitate: femina sunt valdè parva, latiuscula, alba.

Delatus hic Melo Vesutio, degustatûque mensis Octobris 7. die, in arce Beffordiana, quo nec meliorem, nec gratiorem, & odoratiorem comperimus.

MELO TURBINATVS.

Melo turbinatus primò non multùm largior, quàm manu comprehendi possit, pediculum versus in angustum desinit, ut solent pira. Costas ut cætera genera habet, satis eminentes, unciam politas, latis: in superiori parte cineritias, maculis rubris notatas, & eundem costarum partes depressas, rubentes, pilisque quibusdam asperas. Maturus rugosus non fit, jucundum spirat odorem, color èmque non mutat, & cortice exteriore rubet. caro dura, multa: mollis verò pauca, sed lutea, sapore gratissimo, & dulci: odore grato: pauco aqueo humore imbuta: semen angulosum, maturum in horto E. C. Montbelgardi Septembris principio.

MELO MOSCHATELLINVS,

rotundus parvus, & pyriformis.



T Am Môtbelgardi in horto E. C. quàm alibi Melonis hoc parvum genus provenire observavi, odoris & saporis gratissimi, de quo Lobel. in adv. verba fecit (que ante adscriptimus) & in Icon. p. 640. icone exhibuit pro Melone saccharato.

A Ger. & Tab. ic. & hist. (ubi sola icon) inscribitur Melo saccharinus, ger. Zuther Melonen: A B. phyt. & pin. Melo 2. siue rotundus parvus.

Dantur aurei, parvi, in modum pomorum Atantiorum, Cam. vel ut Casimiri rosei magnitudine. Meminit & Garzias Melonis genus in Hispania, quod Budiecas vocent. Eid. B. pin. Melo 3. pyriformis moschatatus: Melo saccharinus variegatus. Eyst. Nos sicone nostrâ priorem Melonem muschatellinum demonstramus.

MELO LONGVS.

Melonem hunc pulcherrimum antehac nunquam visum observavi Granduille, longitudinis quatuor circiter palmorum, incurvum, ut cornu vaccinum, non ita crassum ut vulgarem Cucumerem, sed multò longiorem, sapore, ut refertur, pulpâ, seminibus, ac etiam foliis idem, cum jam dicto.

Melo

Melo hic albus ita nobis denominatus, Montbelgardii in horto E.C. ex seminibus per eundem E.C. delatis provenit. Erat hic pingendus & describendus: verum in horto nunc in neglectivo gelu, meque absente, id, me quidem adhuc dolente, neglectum fuit.

De loco & tempore Melonum verba facere reliquum est. Melonum igitur & Peponum, ut ante ex Trago constat, magna in agro Norimbergensi copia provenit: nec non in Hungaria. Maturantur autem Augusto plerumque mense. Scribitur teste Dodonæo, locis cultis: tumulos amat, Soli vel maxime expositos, terram verò mediocrem, non minus pinguem, aut stercoreatam. In Germania & Belgio non nisi serò, & cum astrum calens, ac sicca fuerit imperies, ad naturitatem perveniunt. Melones in gale delictis crudos suavissimos habet universa Italia, Galloprovincia, Narbonensisque, & Vasconia: nec non inferior Austria & Pannonia. Cæteris regionibus ad Boream, ut Franciæ, Belgio, & Angliæ agrè, aut insipidiore proveniunt, nec plerumque maturitate consequantur, præ imbrum copia, & caloris inopia. Nos Melonum differentias & genera varia vidimus Monspelij, Baulæ, Lugduni, Genevæ, in Alsatia & aliis locis, quos particulatim non annotamus. Julio & Augusto maturantur.

Vires, quæ Melonibus ex veteribus competere possunt, ante recensimus. Dodonæo frigida ac humida Melonum caro est, difficilisque quam reliquorum Cucumerariorum concoquitur. Quod & Actius testatur, in ventriculo, si diutius hæreat, corrumpit & malignis febribus occasionem præbet. Nos verò nequaquam Dodonæo concesserimus Melones difficiliter concoqui Cucumere vulgari, ipsa carne molliori odorata, contrarii n. scilicet concoctionem minus difficilem, demonstrante. Ipse etiam qui ventriculo labore frigido, & pituitam coacervante, non semel observavi, mihi Cucumetes facile nocere & difficulter ventriculum meum eos concoquere, ræctū diu post eorum eodem respicientem. Melones verò semper sine manifesta comedi noxa. Ne autem Melonum caro per concoctionem in ventriculo vitietur ac corrumpatur, noxamque aliquam facile inferat, solent Viennenses Austriaci, diotiores præsertim (quotannis enim serè non duntaxat domestici, verum etiam externi regnorum adjacentium Melones divenduntur maxima in copia) cum pipere & saccharo eos comedere, vinumque generosum superbibere. Estiantur tamen etiam cum paucis sale & pane. Vocant Melones suo idiomate Bluzer / & seminum Melonum emulsiorem Bluzer muls / h. e. Lac Melonum, præstantissimum in febribus ardentibus remedium. Seminum autem medullam aqua fontana vel alio aliquo liquore congruo prius contulam, per cribrum setaceum emulsiorem angustissimum, aut pannum adinstitutum accommodatum. Seminibus hic Melopeponum & Peponum cremor sobrietibus utiliter ex hordeacea pitana, teste Matthiolo, propinatur, non solum enim refrigerat, sicutique exunguit, sed etiam obstructions tum hepatis, tum valorum expedit, & urinam provocat. Datur tussientibus, tabidibus, & marasmo affectis: atque contra urinæ ardores valde prodest, additis pastillis ex Halicacabo, aut Glycyrrhææ succo, Mannæ, Gummi Arabici, aut Tragacanthæ momento. Sed & magis confert, si seminum Papaveris cremor accedat, baccarumque Halicacabi, & Malvæ decoctum. Ex Melopeponibus in particulari sectis, Ari, Bryoniæque radicibus, & Limonium succo, ac caprino lacte, quod hæc omnia superet additis, aqua vitæis organis, ut vocant destillatur, qua faciem mulieres adornant, & concinnam reddunt.

Tom. II.

MELONES ABDELLAVI

Egyptii.



EX Melonibus Descri. Quosdam à nostris planè diversos Ægyptij habens, quos Abdellavi, dellavi vocant, ad differentiam aliorum quos Chaiar. [Melonum apud Ægyptos genus Alpino sine tunc. B. pin. Melo 6. (5. phyt.) sic e Meloni Ægyptii alterum genus,] nominant.

Quorum usus ad cibum haud multum jucundus percipitur, ceterisque omnibus insipidiotes, ac molliori pulpa observantur. Habent tamen semina, quæ aliis omnibus longe magis ad refrigerandum præstare putant. Quare, omnes ea plus altis in usu frequentiori habent aliorum Melonum semina parvi facientes. Planta à nostris non multum differt, sed fructus fert oblongos, acutos, extrema, & medium valde crassum habentes, Bahobab alibi narratis fructibus proximos. B. pin. vocat Melonem 5. (4. phyt.) sive Ægyptium. Semina. Planta eff. zies. Melo Ægypti. C. B.

MELONES INDICI, AMPLISSIMI.

IN Americæ insula Madagascari, sive S. Lautentij, referente Theveto libri sui de America cap. 23, mirabilis crassitudinis Melones reperiuntur, & tantæ, quantam quis ulnis amplecti possit, coloris rubentis, & in quibusdam albi, alij lutei, salubriores multo nostris, potissimum Lutetianis, cultis in aqua & fimo, magno sanitatis detrimento. Locus. Colore Gu. riaz.

MELONES PERUVANI.

Melone in valle Peruvana tantæ felicitate proveniunt, ut radix caudicis crassitudinem assequatur, & viva aliquot annis in solo vigeat, quæ quotannis Melones profert, cujus luxuries non secus ac cæterarum arborum amputatur: Joseph. Acosta l. 4. c. 19. B. pin. Melo 8. Melo peruvianus.

CVCVMIS VVLGARIS, VIRIDIS & ALBUS.

EX radicibus rectis, multisque candidis capillamentis fibratis, hirtis farmentis, crassisque humifusis, alternatim adnascuntur folia, palmi virius, aut alterius quoquo versum amplitudine, tactu aspera, angulis hederaceis caesa, & serrata, scandentia, Melonum foliis asperiora, & majora, latioraque, è quorum alis capreoli exeunt, & flores (Lob. liliacei, ex lateo pallentes, conniventisque nodu, aut marcescentes Volubilis ritu) quinquepartiti, semunciam majores, duplices: quidam enim decidunt sine fructu, alij producant fructus oblongos.

X 2

utrinque turbinatos, viridanti colore, aut albo-viridantes autem ubi maturi flavescent, semipedem longi sunt, parum ventricosi, angulosi: verrucosis, subnigricantibus tuberculis asperati: cortice teneriore, carne duntaxat, candida, transparente, laxa: sapore non ita grato, ut Melonum, inquit Tragus, sed peculiariter quodam & agresti: femine copioso, pineolis putamine exutis accedens, compresso, angusto, Melonum feminibus aded simili, teste Lobelio, quia angustius [non omnibus Melonibus]



Sapor.

Medulla.

An Sicya Theophr.

Plin. 17. 20.

Cuc. Cul. gares.

Cuc. lon. gus.

An Pepon Diof.

Sicyos Diof. est Melo.

Melopepo Galeno.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

Anguria nolet.

& pusillo apiculo subtus protenso donatum est, di-
scerepet: medullâ lactescente, admodum suavi, &
multi usus officinis.

Iam descripta à nobis planta, Cucumeri scilicet
communis, an respondeat Sicya Theophrasti, consi-
derandum: Eam autem, ni fallor, Plinius miscuit,
cum Sicyo Theophrasti, non distinguens eam à
Melonibus nostris. Eum namque nomine Cucu-
meris comprehendere nostros vulgares facile
credimus, non autem longos illos, qui dicuntur
artificiales. scio enim extare tale genus Cucu-
meris, præter Melonem longum: vidi recurvato
nullo subiecto oleo, ij dicuntur serpentina, de
quibus post. An nostri Cucumeres vulgares à Dio-
scoride Pepones dicantur perpendendum, quamvis
Mathiolus dicat non admittendam eam opinio-
nem, nihil tamen occurrit quod repugnet, nisi ob-
stet Galeni sententia de Peponibus. Indagandum
præterea est, an radix Cucumeris vulgaris vomitum
moveat? Quicquid autem in contrarium afferatur,
conveniunt tamen ea, quæ Dioscorides de Sicyo fa-
tivo pronuntiavit, cum Melone nostrate, ut antea
monuimus.

Allubescunt ea, quæ Dod. in fol. lat. scripto pro-
didit. Passim, inquit, Cucumis pro eo habetur,
qui Græcis σικυος *Sikyos*, i. e. Cucumis sativus dicitur.
Galeno autem non Cucumis, aut σικυος, sed *Melope-
pon* est. Nullius enim fructus Cucumerarij me-
dulla, carove interior editur, sed omnis abijcitur,
excepta hujus carne, quæ cum seminibus estur.
Quod scribit Gal. lib. 2. de aliment. Homines, in-
quit, à carne Peponum interna abstinent, Melo-
peponum autem mandunt: dicitur Belgis *Con-
ommeren*. Sunt qui Anguriam dici velint, sed om-
ninò alius fructus est Anguria. Et hæc Dodo-
nzus. Subjiciam aliorum opiniones, de nostro vul-
gari Cucumere.

Cucumerem luteum, quem Columella Angui-
nam vocat, Tragus ita delineat: In Cucumeris pomò
luteo & oblongo multi prominent undique toruli,
licet formi & colore elegantius sit Melone & Pe-
pone, tamen crassiorum est partium, & cibus non
perinde gratum. atque illa, quippe quod peculiar-
rem quandam & agrestem habeat saporem: intus
candidum, ac acutus seminibus profusus repletum.
folia hujus asperiora sunt majora & latiora. gaudet
mediocriter pingui Solo. Poma admodum oblon-
ga sunt, præsertim si per harundinem flos deduca-

tur. Serapio *Kura* vocat: Hebræi *Kisshaim*, Chal-
dæi *Katruia*, à qua voce *Chathel* Serapiotis non
multum abludit.

Monuimus ante, Fuchsinum vocare Cucumerem
sativum vulgarem, sed confundere cum Anguria.
Non planè discerni posse putat Mathiolus, an
Dioscorides reddat vires ejus Cucumeris, qui pro-
priè Insubribus & Venetis Cucumis dicitur, He-
trusci verò Citrullus, omnibus notissimus, an al-
terius, Hetrusci scilicet qui aliis Italiæ populis Angu-
ria vulgò nuncupatur. Siquidem non ex Diosco-
ride modò, sed nec ex aliis veteribus hæcenus
quæquam repererit, qui Cucumerem, qui Græ-
cis propriè σικυος appellatur, notis ullis representa-
rit. Sed quod Græci σικυος vocabulo Hetruscorum
Citrullum, & Insubrium, Venetorumque Cucume-
rem, omnibus notissimum significarint, facile con-
jici posse credit ex ipso Dioscoride. Quippe quod
Dioscorides asserat Cucumerem silvestrem solo fru-
ctu, à sativo discedere: Huic verò ille, quem He-
trusci Citrullum, alij verò Cucumerem dicunt, per
omnia ressondeat. Non possum igitur, ait, non
liberè pronuntiare, Dioscoridem Citruli nobis vo-
cati, non autem Anguriae vires descripsisse. Quan-
obrem Fuchsius magno errore putat Cucumeres, quos
Citrullus Hetrusci nominant, Angurias esse.
Eadem repetit in comment. cum mag. sig. In hist-
germ. refert quosdam in Bohemia vulgares Cucu-
meres, Citrullus vocare, propter similitudinem cum
parvis Citriis. Sed necdum in epit. eorum admittit
opinionem, qui nobiscum, & verius, nostro qui-
dem judicio, vulgarem Cucumin, Peponem esse
contendunt.

Sed & Corn. ait Cucumim sativum, Græcorum
σικυος & σικυος (quam vocem in masculino & neutro
genere profert) esse: recentiores verò Græcos σικυος
vulgariter vocare: Sic enim Simeonem Sethi habere:
σικυος τὴν ἀγροίαν σικυος, καὶ τὴν καρπὸν ἢ τὴν ἀγροίαν, σι-
γίδα & humidâ secundo gradu. Ex hac autem ap-
pellatione Germanos partim Angurien, & partim
Gurden vocare. Nasci hodie multum per omnem
Scythiam & Sannatiam, & apud Livones Pomum
Rutenicum appellari.

Vide quæ Dalechampius de Cucumere sativo di-
xit, capite de Cucumere, Peponem & Melopepone in
genere ex veteribus & Neotericis. Habes eodem
hoc capite nomina linguarum, quæ prudens lector
licet transfulerit.

Cucumer latinè, σικυος atticè, communis multis
generibus dictio, omnem hanc in Latinis incertitu-
dinem fecit, quod Cucumerem in Græcis ac Latini-
s audientes, ex ea quod nunc est, unum tantum
genus, Cucumer vulgò appellatum, fructu oblon-
go, & maculoso, significari crediderunt: quæ
Græci σικυος nomine, genera multa numerent, quæ
aut cartilagine, aut cute foris obducta, in olereacis
extra terram crescunt, & si hoc quod nunc Cucu-
mis dicitur, illis primum, & supremum genus sit.
atque posteriores Græci σικυος simpliciter dixerint,
Cucumerem vulgatum, quæmque Brassavolus, non
tantum Cucumerem vulgi, sed omnia Melonum
genera, i. e. Cucumeres, Citrulos, & Angurias, com-
prehendi annotaverit: verum per Cucumim absolu-
tè, Anguriam intelligi oportere, quæ Hetruscis Cu-
cumis dicitur: at per Cucumim citrinum, voce hæc
adjecta, nostrum Cucumerem significari, ideo He-
truscis Citreolum vocatum, dimiruvè, à flavo citri
colore: quem in extrema maturitate ostendit. Mat-
thiolus evaginato ense, ac si pro aris, ac focis digla-
diaretur, sub voce σικυος, ex còmuni omnium senten-
tia, Cucumim Latini ex Diof. intelligi contendit:
i. e. Hetruscorum Citrullum, qui illis Cucumis, no-
stratibus sit Anguria. Mathiolus autem etiam probet
Sicyos

Sicyos (agrios addito) erraticum Cucumerem: at nulla adjectione, vulgatum etiam significat, non tamen tollit, plura ex aliis denotare posse, ut secundo sui Coroll. Hemolus facile indicat: præterea Dioscorides alvo & stomacho perquam utiles haberi Cucumeres ostendit, qui quum aded difficilis sine concoctionis, ut etiam secundo die, ex Plinio, consentiente Matthiolo, stomacho immorentur, atque ex Gal. de aliment. facult. cap. 6. suæ substantiæ proprietate, cocti sunt difficiles, prævi que succi, quâ ratione alvo, & stomacho amicentur, non solum naturaliter, sed etiam ex symptomate, doceat obsecro, ait Apollo Rad. i. supra El. Diathod. commune, Matthiolus: nam sic omnia pari modo frigida, alvo accommodata dici possent: quicquid sit nostrum Cucumerem, & Hetruscorum Citrullum, pro Cucumere accipiam.

Cæterum, Anguill. epist. 7. narrat Cucumeres inveniri & virides, & albos, & longos, & contortos, & glabros, ac asperos, omnes notos: Anguillum dictum viridem esse & contortum, & serpentem.

Apud Tab. effigies Cucumeris ex Hispanico semine nati proponitur sine descriptione, non indicato quidem discrimine à vulgari Cucumere, cuius imaginem ibidem quoque habet.

C. Bauh. phyt. & pin. itémque apud Matth. vocavit Cucumerem i. sive sativum vulgarem: Cucumerem sativum Brunfels. Mitth. Fuchs. Dodon. gall. Lon. Cast. Cucumerem, Trag. Ang. Turn. Lac. Fracast. & Tab. Cucumerem vulgarem, Dod. Ger. Cucumer sativum, Cord. in Diosc. Cucumeres sativos & esculentos Lob. adv. & Ic. p. 63. ob. p. 463. Cucumim esculentum: Citreolum vulgo Calsalpini: Sicyon Galeni quorundam, & ejusdem Melopeponem aliorum: fructu maturo subireo: toto etiam albo: toto etiam viridi: magnitudine quoque & formâ vario, longum, recurvum: levem, asperum.

Scitur in hortis: pinguis & aprica amat loca. Julio & Augusto mense fructus edules, cum ipsis seminibus, sed Septembri demum ad perfectam maturitatem proveniunt.

Dioscoridis vires de Cucumere & Pepone posuimus ex veterum sententia, ceu ea quæ circa Cucumeris vires memoriæ prodidit Galenus. Dodonæus eligit virides, nondum maturos: maturi siquidem & jam citrini facti esui hand sunt idonei. Semen frigidum quidem, sed multò minus quàm fructus. Aperiendi vim atque extergendi præterea obtinet: urinas movet: jocineris obstructions aperit: pectori ac pulmone inflammatione laborantibus prodest: contusum, forsiquæ absterforij loco adhibitum, cutis splendidam reddit: Galeno autem non Cucumis, aut *curis*, sed Melopepon est, &c.

Qui calidioris temperaturæ sunt homines, inquit Tragus, aut ab incunte ætate ejusmodi cibus assueti, hiis vesci possunt. At qui frigidioribus sunt præditi ventriculo, si hoc cibo frequentius uti voluerint, facile in febres incidere possunt. Cucumeres intrinsecus ad calidas affectiones usurpantur possunt. Extrinsecus succus cum semine adjectâ fatinâ, siccatus in Sole, cogitur in linigina, quod faciem repurgat, & nitorem affert, sed cum vino illinit oportet: mulieribus hæc medicina convenit. De Cucumere ita cecinit Baptista Fiera,

*Sic nec hæmorrhæis Cucumis, gelidisque Citrullus,
Et tremulis ardore cordis, dore levet.
Ne diuturna tamen sit concommitata cævera
Febri, in aspidus si datur est a cibos.
In bilem, subigique firmis, stomachoque calenti
Gratus erit, medici si sapit arte coqui.*

Vires Angurix sive Cucumeris Simeonis Sethi posuimus capite Colocynthis folio citreoli, sive la-

cinati. Lobelius vulgari Cucumeri vires Cucumeris Dioscoridis adscribit. Miror autem eum in obf. Cucumeri vulgari attribueret vires ex Dioscoride, & Galeno, itémque Agneta Cucumeris eorum sativum in Advers. dixerit, Melones nostros, sive vulgi Italici Pepones, esse antiquorum (præsertim Dioscoridis) Cucumerem domesticum, ac etiam scribat in isdem Observ. quasi sibi contrarius, Melonem vulgi esse Melopeponem Dioscoridis, ibidem Melonis iconem ponens, subjiciensque Peponis vires ex Dioscoride. Cucumer vulgaris, major quidem, decorticatur, ac transversim in orbiculos tenuissimos, quoad fieri amar, distillatur sale aspergitur paropsidæque duplici excipitur, agitando eousque donec aqueus humor majori ex parte eliciatur, deperdaturque. Sic agitati Cucumeris orbiculi, cum Pipere, oleo & aceto comeduntur. Parvi aceto, sale, Pipere & Feniculo quotannis condiuntur: inferuntur etiam quando que Garyophylli: per totum annum conservantur. Mirè, præter cæteras vires, appetentiam excitando, affluant venterculo conferunt.

CUCUMER MINOR, PYRIFORMIS.



CUCUMEREM hunc minorem Ger. & Tabernomontani, sive biteren Cucumerem/ Cucumeribus alis minorem cûsq; similem, nisi pro par esset, inceptè, meo quidem iudicio, Nicol. Braun capite de Cucumere silvestri collocavit.

Bauh. phyt. & pin. vocat Cucumim 4. sive Pyriformem.

CUCUMERES LONGISSIMI.

Cucumis flexuosus, auctore Lobelio, sive anguinus prorsum similis est vulgari flagellis, foliis & clavulis. Nos autem observavimus, ei solia esse minus aspera, quàm in vulgari, quadam etiam subrotunda, parim laciniata, & angulosa, alia magis: fructus longi instar serpentis se contorquentes, albi, quasi canaliculati, & striati, pulpâ albâ, sapore vulgaris semine albo. Ex his liquido constat, hallucinatum esse Lobelium.

Plinius per Cucumeres in fistula flore demisso, mirâ longitudine excrecentes, Cucumeres non stros longissimos in vire videtur, cõsque arte tam longos fieri & quidem è vulgaribus credidit. Ego autè nostros hos longissimos specie à vulgaribus differere, asserere non veror, & tales naturâ, nõ arte esse, quicquid dicat Matthiolus, cui ut in plestiq; aliis suis cre-



Cucumis longus edem.

Icon Cam.

Cam not.

Cuc. oblongus, Dod.

Cuc. flexuosus, Lob.

Citreo-olus anguis modo intortus, Casp.

Mello Fisrentis.

Sicya Theophrasti.

Cuc. anguinus, Tab. C. Bah.

eandem retinuerunt formam, ad eam ut in vite pendentes, anguini modo contorti viderentur. In hist. germ. vocat Cucumeres longos, anguinos, recurvos, sulcatos, albos, asperos, sapore & odore eodem cum vulgaribus: foliis asperis, ut Melonum. Camerarius in hist. germ. Matthioli pingit Cucumeres longos, à longis Matthioli quodammodo diversos, vocatque germ. Ein ander

art langer Gurken / h. e. speciem aliam Cucumerum longorum. Iconem autem ex ipsa planta viva, ut ait, depingi curavit: folia ejus Melonum simili scribit, itaque flores: Cæterum, fructum minus canaliculatum, tuberculis interim inæqualem, vulgaris admodum: sed semen longè minus. Hos imbrum frequentiam perferre non posse, multoque gaudere sole, uti Melones, quibus similes penè forent, nisi differentiam faceret fructus sapor, atque forma. Nos alius discernendum damus, an differat Camerarij Cucumis, à Matthiolino & nostro, quia in epit. simpliciter pro Cucumere Matthioli longo suam iconem proponit. Verùm in hist. germ. dicit quodammodo diversam, & aliam speciem, ut ex recitatis ejus verbis ostendimus.

Dodonæus oblongos Cucumeres artem & culturam primò ut factum produxisse narrat, & crebrò recurvos reperiri, indeque anguinos vocari.

Quem Lob. in Obs. p. 363. & ic. p. 639. Cucumim anguinum, flexuosumve inscribit, tenerà cute, nitore herbido, cum in Advers. incurva fragilitate anguini flexum, & longitudinem, & crassitiem æquare scribit, indeque nomen habere.

De hoc Cæsalpinus ait: Alter Citreo-olus est fructus non absimili [à Citreo-olus vulgè h. e. Cucumere] sapore, qui crudus ante maturitatem carne tenera, & fragili gratus est, sed formà dissimili: crescit enim, quæ cogitur formà, ut plurimum anguis modo intorta pluribus sulcis, vel potiùs striis discurrentibus, simili modò horridus, colore candicante. Florentiæ Mellonem vocant, sed huic minor authoritas quàm Citreo-olus. ejus planta assurgit in pergulas magis, unde fructus pendens, qui si permittantur ad justum incrementum pervenire, crassescunt in longitudine multum, ut Cucubita. Nuper tertium genus [Cucumis Ægyptius Chate, ut opinor, de quo deinceps agendum erit] advectum est fructu cubitali tenerimo, prædicti ergo fructus recenter orti & immaturi gratiores sunt, quàm perfecti & maturi, omnes oblongi figurâ constantes, Cucurbitis longis proportionè respondententes. Cæterum, ex Theophrasti verbis colligere licet, ejus Sicyam, Citreoolum nostrum significare, præcipuè anguis modo intortum.

Tab. Cucumim anguinum, germ. Eschlängen Krübß appellat, minus aptè. B. phyt. & pin. dicitur Cucumis 3, sive flexuosus: Cucumis anguinus & tortilis, Lac. Cucumis anguinus, Arg. Gelm. col. Ingd. anguina, Tab. Ger. Cucumis sativus 2. Casp. Citreo-olus alter formâ anguis, Casp.

Ejus autem speciem haberi ait fructu cubitali. Sic in regno Congiano insignis magnitudinis & suaviter

tatis habent: part. Ind. ou. l. 2. c. 1. Videtur hæc nobis Cucumis Ægyptius Chate. Nec Cæsalpinus delineatio abhorret.

CUCUMIS ÆGYPTIUS CHATE.

Cucumis Ægyptius folia habet minora, albiora, Dese. molliora, ac rotundiora, quàm nostrates, fructus admodum differentes, longiores, viridiores: cortice plano, molli, æquali, sapore dulcior.



Vocant hoc Cucumis Ægyptij Chate, quæ planta à communi Cucumere alia quidè re non differt, nisi magnitudine, colore & mollietate, Alpinus. An est hic Cucumis Cæsalpinus Citreo-olus? Tertium genus, super advectum, fructu cubitali, tenerissimo? An Bauhino Cucumis tertij, sive flexuosi species fructu cubitali. Idem vocat Cucumis Ægyptius rotundus, sive Cucumis Ægyptius rotundus.

Horum ulum corporibus in cibo ipsi tum crudis, tum coctis vescentibus, salubrem esse apud omnes eorum locorum incolas creditur. Sunt enim concocti faciliores. Medici aliqui ibi nonnullis febricitantibus crudos etiam mandendos concedunt, præsertimque peste affectis, quibus Cucumeres hos crudos escitatos summè conducere omnibus (quæ ratione nescit Alpinus author) persuasum sit. Cætos in ardentibus febribus, utiles esse ratione confirmatur, quando refrigerent, atque humectent. In renum & vesicæ calidis morbis, cum lacte coctos Cucumeres multis diebus non sine multa utilitate in cibo sumuntur. Lac etiam ipsorum seminum pro isdem malis per os sumere sæpè solent. Ad oculorum verò, aliarumque partium calidas inflammationes pulpa contusa Cucumerum lacti mixta utuntur. Et ad sedandos podagricos dolores à causa calida concitatos, succum lacte, oleoque rosaceo mistum, partes liniunt, adhibent. Sullatium aquam ad libram ad jecoris caliditatem corrigendam, & ad sanandos renes tum inflammatos, tum à calculis vexatos multis diebus ægros bibere consulant, quibus ipsam satis iis conferre experientia compertum est. sunt aliqui, qui ad hæc eadem mala aquâ stillatitiam lacti eorundem Cucumerum seminum mistâ, uti solent.

CUCUMIS SILVESTRIS SIVE asininus. C. A. P. XI.

Cucumer asininus Seplasis dicitur, Melonis formâ quodammodo refert, sed mollius, quàm Cucumeres vulgares, iis etiam magis incanum, præsertim parte infernâ, vel cinerium, crassius, & alpinus, longis & hirtis pediculis appensum, ex flagellis ramolorum caulium te retibus, striatis & hispidis enatum: flores sævi floribus multis numeris minores sunt, quinquefolij, calathi formâ, colore ex albedo herbaceo, tanullum in diluioem flavescit em decli-



declinante, saturatius tinctis apicibus medium occupantibus: fructus majorem glandem cerri æquat cui & formâ olivar. respondet, superfi-

tulosiad quæstum. Cucumis agrestis, Brunf. Lugd. & Cord. in Dioscor. ubi notat in Dioscoridis capite quædam absurda reperiri. Cucumis anguinus, Cord. in hist. Turn. & Gesn. de coll. Cucumis erraticus nunc Gesl. h. cui & asininus, ceu quoque Tab. Ger. & Eysf. Cucu ner agrestis Brunf. & Lugd. Cucumer silv. Elaterij, Cucumis asininus officinarum, Lob. adv. obs. p. 363. l. c. p. 646. Cuc. silv. asininus C. Bahino. Arab. Chese al-mar, Kate al-herei, & Cherba alhamar. Germ. Wilde Cucumer / Esel Cucumer / & Springs Kürb: quibusdam etiam Pompen / propterea quodd semem & humorem ejaculetur, quemadmodum machina quædam aquam, quam Germani Pompen appellant. Sunt tandem quibus Zgelas Kürb: / quod sonat, Erinacei, sive echini Cucubita. Belgis Wilde Concomeren: Gall. Concombre sauvage. It. Cocumer saluatico. Hisp. Cogombilla amarago. Angli, inquit Lobelius, Noli me tangere. vocarunt, quod nomen tamen propriè aliis plantis quoque debetur. Non immeritò autem Cucumerem agrestem potius dixerunt, quàm asininum aut silvestrem: quia omnium hujus generis plantarum supapte sponte, importunòque ad nodum proven-tu oriatur, circa mœnia, arces, & stabulorum finem, in Italia, & Narbonensi, Provinciaeque Gallia.

Cuc. angu-
do in hist. Turn. & Gesn. de coll. Cucumis erraticus nunc
Cuc. asin.
Cuc. agre-
flu.
Echini Cu-
cubita.
Noli me
tangere.
Cuc. agre-
flu.

Augusto mense se floret, atque subinde Autumno fructum tempestivum producit: in Germania, quod sciam, inquit Fuchsius non nisi sativus provenit. Semel autem sativus pluribus inde anni s' facillè renascitur, teste Dodonæo, non tamè è radice revirescens, sed ex seminibus sparsis proveniens. In plerisque calidis regionibus in rudibus, scabulosis, aliisque incultis locis circa Autumnum fructus maturatur: atque eo tempore ad Elaterium conficiendum colligitur, de quo posthac dicendum erit, ubi & vires hujus Cucumeris recensebimus ex veterum & recentiorum opinione.

Locus & Tempus.

CUCUMERIS SILV. SVCCVS, Elaterium.

Elaterium verum ex medulla plurima Cucumeris silv. & pauca ei herente mucagine medullola non ex ipsis Cucumerulis parandum esse colligitur ex Plinio Cucumim (inquit L. 20. c. 1) silvestrem esse diximus, multò è infra magnitudinem sativi. Ex eo fit medicamentum quod vocatur Elaterium, succo expresso è semine [est è καρπὸς hujus Plinius semen Plin. not. in impetive redd. Dalech.] Cujus causa nisi maturus incidatur, si men exiit, oculorum etiam periculo. [Nam cum exiit à pediculis, ar. m. s. cum emittit, Plin. diluc. qui oculis contectus ladit. Del.] Servatur aut. m. decerptus unâ nocte: postero die inciditur harur dine. Semen quoque cinere [Inge. dicitur hæc D. sc.] conspergitur, ad coherere dam succi abundantiam: qui expressus suscipitur aquâ celesti, atque subsidiis, deinde sole cogitur in passillos, ad magis mortali-um usum. Obscuritates & vitia oculum sanant, & venarumque ulcera. Traditur hoc succo tatis radicebus Vitium, non attingit uvas. b. avibus. Rad. x. autem ex aceto cocta podagris illitur: succo quoque dentium dolori medetur. Auda cum resina impetiginem & scabiem, que pforam & lichenas vocat: parrotidas & panos [in quædam, ut in vasis, & in mites pami similes, sub sanibus & auribus ac ing. ambus. Nonius in Optione.]

Plinius.
in impetive redd. Dalech.
Plin. diluc.
qui oculis contectus ladit. Del.
Plin. l. 27. à
Diosc. dicitur
Sci. sa.
P. i. v. r.

Qui me miserum miserorem reddidit, q' am parus puerum.] sanant, & cicatricibus colorem reddit. Et soliorum succus auribus surdis cum aceto instillatur. Elaterium tempestivum est Autumno. [noni planta Avgu-
stij. ver. fructus autem Septembri peritur. Dal.] Nec ullum ex medicamentis longiore ævo durat. Incipit à trimatu. [Dioscorides in prelogo præter Veratrum mi-

Longo est ævo

nereo-nigricante constat. Colocyntidis non dissimili, sed minore: radicem longam, crassam, albam, paucis adnatis donatam. Lob. lio repens est planta, humilis, non topiaria.

Cucumis silvestris [inquit L. 20. c. 1] solo fructu à sativo differt, multò minorem cum habens, oblongis glandibus similem: folia verò & farmenta sativo similia sunt: radix alba & magna, frutice in totum amaro. Dioscoridi.

Theophrastus Sicyon silvestrem vocat, sativo penitus incomparabilem, sed aspectus tantum similitudinem gerentem: loca argentia quærentem, ex cuius fructu m. dicamen liquatum, Elaterium [Agri-tatorium C. a. a. vertu] vocatum fit.

Cucumim silvestrem (inquit Plin. l. 20. c. 2.) multum esse apud nos, qui Arguinus vocatur, ab aliis erraticus, arbitrantur, quo decocto mures de ejus sparsa medicina non attingunt: est multò è infra magnitudinem sativi. ex eo fit Elaterium succo expresso ex semine, cuius causa nisi maturus incidatur, semen exiit, oculorum etiam periculo. Aliqui in Arabia natum magnificant, mox Cyrenis, alij in Archadia tradunt, similem Heliotropio, cuius inter folia, & ramos provenire magnitudinem Nucis Juglandis semen. esse autem ad speciem scorpionis, caudâ inflexâ sed candidâ, aliqui etiam ab eo scorpionum Cucumim vocant, efficacissimum contra scorpionum istus, & semine, & elaterio, sed hoc genus a lud nos non visum est.

Ceterum, à Theophrasto maximè dissentire videtur Dioscorides: quippe qui Cucumerem silv. solo fructu distare à sativo dixerit. Theophrastus verò sativo penitus incomparabilem pronunciat. Et tanè qui ambos Cucumeres contulerit, magnam invenient in farmentis, foliis & radice differentiam, quicquid hallucinatus dixerit Fuchsius.

Zinnij dicitur Græcorum, est Cucumer silvestris Matthiolo, Arg. Fuchf. & Lac. Cucumis silv. Trago, Lon. Calt. Cam. Dod. gill. & latin fol. p. 178. ubi iconem habet & descriptionem in lib. purgan. med. exhibitam nomine Cucumeris silvestris, nec plura addit, quam in Purgant. historia fecerat. Eandem figuram alibi p. 62. repetit eodem nomine inquit: Hujus aut. m. (intellige M. loris) v. l. etiam superioris (puta Cucumens) silvestre genus est, quem addit, & silvestrem Cucumerem vocat. Nec aliud addit. Quid autem opus erat figuram repetere, quemadmodum in aliis etiam factum. Idem in Lebelij sic. sic, ita ut diversos ejusdem iconis faciunt ti-

grum & album. alia medicamenta, scribit inutilia esse à trimata: Elaterium verò à bimatu ad decennium utile esse deiectionibus. Dalech.] Si quis recentiore uti velit. passillos in novo fictili igne lento in aceto domet. Melius quo vetustius: fuitque jam ducentis annis servatum, ut auctor est Theophrastus. Et usque ad quinquagesimum lucernarum lumina exungunt. [Dioscoridi lucernarum luminibus obiectum facile flagrat & ardescit. Dal.] Hoc enim veri experimentum est, ad motum prius quàm extinguat, scintillae sursum ac deorsum cogat. Pallidum [cum candore n. nihil humidum Dal.] ac lave herbaceo aut scabto melius, ac leniter amari n. Putant conceptus adalligato semine adjuvari, si terram non attigerit. partus verò, si in arietis lana alligatum inscientis lumbis fuerit, ita ut protinus ab exitu rapiatur extra domum. Ipsum Cucumin qui magnificenter, nasci præcipuum in Arabia, mox Cyrenis, alij in Arcadia tradunt, similem Heliotropio, &c. [Herbarij omnes comparant cum sativo. Suscipitur autem Dalech. in autore Græco, unde Plinius hæc sumpsit, scriptum fuisse & cum cucurbitæ, alteri Cucumeri similem esse, Pliniumque legisse in arietio. Quidam tamen Heliotropio similem esse colore scilicet interpretantur.] efficacissimum contra scorpionum ictus & semine & Elaterio, & ad purgandum uterum, alvòque. Modus portione virium à dimidio obolo ad solidum. Copiosius necat. Sic & contra phthiriasin bibitur & hydropisef. Illtum anginas [morbum faucium gravissimum, Plautin Mostell.

In angina ego nunc me velim verti, ut venesica illi Fauces præbeam, atque enicem sceleratam stimularicem. Lucillus apud Nonium. Insuperato abijt, quem una angina abstulit hora.

& arterias cum melle & oleo veteri sanat. Idem eodem libro c.2. Multi hunc esse apud nos qui anginus vocatur, ab aliis erraticis, arbitrantur. Quo decocto sparsa mures de ejus medicina non attingunt. Idem podagris cum articulorum morbis decoctum in aceto, illunt præsentaneo remedio.

Lumborum verò dolori semine solo siccat, dein trito, triginta denariorum pondere, in hemina dato aqua. Sanat & tumores subitos illi cum lacte mulierum. Purgat eas Elaterium. Sed gravidis abortum facit. Suspiriosis prodest. Morbo verò regio in nares coniectum. Lentiginos ac maculas & facie tollit in Sole illtum. Multi eadem omnia satius attribunt.

De Cucumeris silvestris viribus, ejusque succo Elaterio sic inquit Dioscorides: Totus sicut amarus est. Succus foliorum instillatus ad aurium dolores facit. Radix cum polenta imposta, omnem veterem tumorem discutit. Eadem cum resina Terabinthina imposta, tubercula rumpit: cum aceto cocta & imposta, podagras discutit. Ad coxendicum dolorem per clysterem infunditur. Decoctum ejus in dentium dolore colluitur. Arida trita vitiliginos, lepras, impetiginos exterit: cicatrices nigras & maculas in facie depurgat. Succus radicis seliqui oboli pondere minimum exhibitus: & cortex quartâ acetabuli parte, bilem & pituitam purgat, maximum in hydropicis. Facit purgationem circa stomachi regionem. Sumenda autem est radicis scilicet libra, & cum duabus libris vini, præsertim Libyci, terenda: & ex hoc dandi sunt cyathi tres jejunis, tribus interpositis diebus, donec tumor satis contrahatur. Quod verò Elaterium dicitur, ex fructu Cucumerum paratur, hoc modo. Cucumeres qui ad tactum desiliunt electos ac repositos per noctem sit ito. Postridie enbrum non densum crateri imponitur, & ad cultrum lupinum acie sursum conversâ, singulis Cucumeres ambabus manibus præhenso dividito, & humorem per enbrum in suppositum craterem

expiimito, ita ut insuper etiam quod carnosum in ipsis est, & cribro adheret, expimas, quo & ipsum in craterem illabatur. Quam verò totum exprelleris, sicut ipsum subfideri. Deinde in pelvim appositam quæ expressa sunt mittito. Quæ verò secta sunt, in enbro acciata, & dulci aquâ affusâ expressa, ipsa quidem abjecto: humorem verò in pelvi turbatum & linteo conceptum, ad solem exponito. Et quum subsederit, omnem supernatantem aquam unâ cum eo quod concretum superstat, diffundito. Et hoc sæpè facito, donec superflans aqua consistenrit: quâ diligenter guttatim expressis, id quod subsidet in mortarium missum tenito & in passillos efformato. Quidam quòd humor citò resiccetur cinerem cribratum per terram sternunt, & medio excavato, triplex linteo superpendunt, & super hoc Elaterium cum humore fundunt, resiccatum autem in mortario, velut dictum est, tetunt. Alioqui pro aqua marinam affundentes lavant. Alij in postrema lotionem aquam mulsam affundunt. Opium Elaterium esse putatur, quod cum albore humidum est, non grave, lave, gustu amantissimum, & ad lucernam admotum facile ardens. Quod verò prasinum est, asperum, aspectu turbulentum, Ervo & cinere plenum, hoc grave est & viciosum. Quidam ad Cucumeris succum ammiscent amyllum, quo levitatem & candorem censentur. A bimatu porrò ad decennium usque, idoneum est Elaterium ad purgationes. Perfecta ejus potio est obolus: minima semibolus: pueris ætati duo. Amplius potum periculum affert. Movet purgationem sursum ac deorsum pituitam & bilem ducens. Purgatio per ipsum optima est difficultet spirantibus. Proinde si per alvum purgare voles, duplo sale ammixto, & de Stibio quantum ad colorem induendum satis est, cum aqua efformata catapotia Ervi magnitudinè exhibeto. Sorbeat autem insuper aquæ tepidæ cyathum unum. Ad vomitum verò, aqua ipsum diluito & locos sub lingua penitissimè cum pinna illuito. Si verò difficultet vomant, oleo aut unguento itino diluito: & ne dormiant, prohibeto. Ceterum, his qui minimum purgantur, assidue vinum & olum exhibendum est. Vomentes enim restituntur. Si verò vomitus non cessent, aqua frigida, & polenta, & posca, & pomorum fructus, & quæunque stomachum desiccare possunt exhibeantur. Movet Elaterium etiam menses, & in pesto appositum factus cat. Idem cum lacte in nares intratum, morbum regium depurgat: & diurnos capitis dolores summovet. In anginis efficaciter illinitur cum oleo veteri, aut melle, aut scelle taurino.

Cucumeris silvestris fructus ipsius succum, Elaterium vocatum, & non minimè radicis aut foliorum ad medicationes perutile esse ipse quoque Galer us proddit. Elaterium, inquit, menses ciet, & sætem intermit appositum ceu alia omnia amara & subtilium partium, maximè si aliquam habeant caliditatem, veluti Elaterium. Summè siquidem amarum est, leviter calidum, ut ex secundo sit ordine calefacientium. Porrò tale protinus quoque digerendi vim obtinet. Scigitureo anginâ laborantes inungunt quidam cum melle, aut oleo veteri. Rorunt item est regio morbo afflicta sursum cum lacte in nares. Hoc etiam usu dolores capitis sanat. Atque Elaterium quidem ejusmodi est. At radicis succus, ut & foliorum, licet summi vinum habeat, imbecilliores tamen. Sed & ipsa radix ad similem facultatem possidet, abstergit namque, digerit, atque emollit. Porrò cortex eo potentius desiccatur.

Ex Mefues autoritate in comm. Silvij hæc adde. Cucumeres, seu æteriori, fructu ejusdem, sed parvo, asperissimo, amarissimo: cujus perfecti ac præcipue ex eo succi laus

Delectur.

Superfuso.

Plinij lapsus.

Dosis.

Angina.

Articulorum morbi.

Lumborum dolor.

Tumores.

Elaterium gravidis nocivum.

Difsc.

Foliorum succo.

Coxendicum dolor.

Succo radice.

Hydropis.

Motus præparandi Elaterium.

Humor citò resiccetur.

Elaterium.

Dosis.

per per Summè siquidem amarum est, leviter calidum, ut ex secundo sit ordine calefacientium.

Factus cat.

Anginâ.

Galerus.

Temporibus.

Dolores.

Mefues.

Fructu asperissimo, amarissimo.

laus est, secunda radice. Idem fructus jam absolutus, si macerata palleat, viridisque esse desierit, & amaritudine sit eximia, succumque remittat album & sabingum, est calidior. Imperfectus autem tam est noxius ut sanguinem educat. Succus autem exeunte Aestate excipitur, radix sine Veris colligitur. Eadem in medicamenta multum efficacia & celebrat recipitur. Calidus est & sicus ordine tertio: substantia ignea, & terra usque constat. Purgat potenter pituitam vomitu & dejectione, & interdum bilem, si vacuata parata est: serofum [& non serofum, ut Silo legit.] excrementum, etiam & evulsu contumax, atque adeo à juncturis misicè trahit, præsertim succo & radice, ob id earum dolores sanant, ischiadem etiam juvat apertè cataplasmate impositus, vel clystere injectus. Vim namque purgatricem Scammonio proximam ei tribuit Ioannitius. Si enim vacuet immodicè etiam sanguinem trahit. Radices item ejus cum absinthio in aqua & oleo percoctæ, hemiterianam molestam & curatu difficilem sanant, si ipso decocto tempora soveantur, & iidem radices eadem, & herba trita cataplasmate applicantur. Succus quoque ipsius, naribus injectus cum pauco lacte idem efficit. Excrementa enim cerebri evocat, & nasi factorem ab horum putredine ortum perfanat: cephalalgiam quoque veterem, & epilepsiam. Idem cataplasma, præsertim si stercus caprinum addatur, tumores magnos, duros, & strumas resolvit. Succus quoque, & decoctum tum fructus, tum radices hydropem juvat potu (valenter enim aquas serofas vacuat). Scîcterum, & obstructio nem hepatis & lienis. Pulvis radiceis cum melle cicatricem fœdam tenuat, ecchyomota contusionibus succedanea dissipat. Succus radiceis cum farina Fabarum, fœdem faciei & fœditatem cutis illius terget. Radix ex aceto forti alphis affricata, eos delet & lentiginis. Resolvit enim, tenuat, terget, siccat, solvit mollescè, & tartarè aperit obstructa, & ora venarum. Ne ora venarum aperiat & ulceret hic succus, & cum torminibus, & anxia molestia vacet: datur cum Bdellio, vel Tragacantho, vel lacte dulci recenter mullto, aut mulla, & sale: promptius autem purgat cum pauco sale gemmæ & aromatiibus. Succus autem ex fructibus permatuitatem pallentibus elementer sine compressione multà extractus siccat, ut Scammonium & Aloë. Nonnulli inter fecandam ei immergunt aromata nodulo ligata, quem extrahunt, dum siccando cogi incipit: alij aliam mittunt pro scopis variis. Triennio servatur, post sex menses utendus. Noxam autem ab eo corpori impressam delent aqua hordei, mulla, vinum, oleum. Datur succus à granis 10. ad drachmæ unius partem tertiam: Pulvis radiceis à granis quindecim ad drachmæ semissem. Radice hujus multum utuntur præctici Monspelienfes, cujus efficacitatem deprehendas ex unguento Agrippæ, Ciclaminis, & alius etiam internis, ut Anasarca & Ascite.

Rondeletio primùm & post Lobelio ex Plinio conjectura fuit Elaterium verum ex medulla feminis candida plurima (quæ minùs quàm fructus, aut folia ingrata est, quæque præsertim Sole siccata, flammisque admota, tota utendo deflagrat) ex pauca ei hærente mucagine medullosa, & non exipsis Cucumerulis parandum esse. Perquam autem celebre fuit antiquis catharticum, ut de Hippocrate & Theophrasto liquet, Elaterium, quasi dicas exagitantis, turbative diens medicamentum: vehementer namque superne, inferneque alvum citabat, pusilla dosi, nempè oboli, vel scupulo semisse, per se, vel adjecto salis altero tanto, & Sibiij quod colorando satis esset. Probatissimum fuit, lave, non asperum, nec ponderosum, sed album, nec aridum, vel exantum, vehementer amarum, & lucernæ objectum

facile flagrans. Quæ nota leatori plantarum consulto, non rixandi, sed cognoscendi cupido, facile retogunt planè perviam hujus loci in Theophrasto & Dioscoride salebrosi intellectionem: cum namque ex Cucumerulis istis succus effluat admodum tenuis, viridis, aqueus, igneque densatus, inæqualis, nigricans, ac objectus lumini ne utique flammam alens, paucisque annis mucidus, putresque futurus, verisimile Lobelio quidem fuit, vel Theophrasti, vel Dioscoridis Elaterium dici non posse, tum propter illas omnes, jam quas dixit, reprobis notas, tum quia nec durat, nec flagrat. Quare ipse superioribus annis cum in Gallia Narbonensi parasset Dioscoridis & Theophrasti instituto, cutaliterque parandum multis modis: tandem maximam Cucumerulidum copiam colligendam curavit, è quibus super cribro incisis, feminis tuis, & crebrò maribus pressis, medullam sive mucaginem Pillsij similem subter cribrum transmissam excepit, Cucumerulorum eorundem succo affuso, & aquæ fontanæ nonnulli, quò faciliùs gluten remitterent trans cebrum: istud partim Soli sub dio expositum nigricans habuit, partim verò igne aut sub cineribus exsiccatum, albidum & pillum. Vtrumque tamen lucernæ Admotum actutum flammam dabat, & alebat sita pinguedine: quin etiam quale ipsi adhuc in muscolo longè aridum superest, faciliùs uret, cu jusmodi nunquam poterit parari ex sola Cucumerulorum aqua, mucosave carne, ut probè norunt, qui sæpiùs periculum fecerunt. Eapropter Plinius videtur ceteris meliùs & verius ex Theophrasto, aut quopiam alio classico auctore, ad Dioscoridis sententiam accessisse, quum ex fructu, & semine faciendum censet: mirum ut objectum flammæ flagret, quale optimuma tradit Dioscorides: quem fuitm ducem ignavè hinc desierit Senensis commentator, & in suis fugillare videtur, dum contentiosas texti ambages auctoritatum fatragine. Sanè par est, quo dictum modo, commodis, tutiusque purgare, adeoque diutius non putre durare, quia acris virulentusque succus medulla pingui feminis retunditur & mitescit, nec perinde (qua oleaginosum pingue) putrescit: mitior etiam vis in semine & paratio, quæ in Colocythide.

Nunc à Theophrasto maxime dissentire videtur Dioscorides: quippe qui Elaterium dixerit à bimatu ad decennium dejectionibus utile esse. Theophrastus verò idem ducentis annis virtute mirabili servatum esse scripserit. Cordis tandem Aginetæ sententiam magis laudaverit, qui illud probat, quod ad viridem colorem inclinat, Dioscorides verò candidum. Impossibile siquidem contenderit viridem per se succum, eum exsiccatum, candidum fieri. Sed esse & alia quædam in hoc capite absurda scribit.

BALSAMINA CUCUMERARIA. CAP. XII.

EX radice parva, fibrata, semestri pronascuntur viticulae unius aut duorum cubitorum, tenues, striatæ, angulosa, quæ clavicularum ope, quas ad folia singula emittit, peticis se circumvolvitur: folia Bryoniae, vel potiùs Vitis foliis similia, minora, concinnius divisa, bilari virore nitent, penitus glabra, pediculo unciam aut sesunciam circiter longo, annare quodam & acrimonia levi prædita. è foliorum alis flores prodeunt, ex quinque foliolis acuminatis compositi, colore ex albo lutei, flaminibus etiam luteis, quos excipiunt fructus sublongi, qui maturi rubent; vel ut ait Lobelius, superficie, carneque nitentis purpuræ phœniceæ, turbinati, Cucumeris formâ, eodemque modo tuberculis horridis

Balsamina
male.Balsamina
cucumeri-
na.
Cucumer
puniceus.Pomum mi-
rabile.Pomum
Hierosol.
Balsam.Bals. Mo-
mordica.Charantia.
Charantia.Momordi-
ca.

Viticella.

Pomum
Balsami-
num.Cucurbita
genus, Som-
phos Plinij.

cognominar, Balsaminam cucumerinam, aut si ma-
vis nobiscum Cucumerinam vocabis, vel cum Cor-
do Cucumerem puniceum, quo nomine eam in
hist. describit, id quod figura à Gesnero apposita
quoque declarat. Alij, ut Tragus, Balsaminam Li-
gurum Padanorum, Pomum mirabile Gallorum,
h.e. Merueille, & Pommes de Merueilles, nominant;
nonnulli verò Pomum Hierosolymitanum cum
Hetruscis appellant. Balsamine 1. dicitur Arguill.
epist. 13. Trago, ut & Fuchscui & mas. Balsamine a-
lia Gesn. h. Eid. in app. Balsamina Momordica di-
cta; de coll. stirp. Balsamina pomifera herba. Char-
antia Hermod. Lon. Dod. gall. & Jar. Garantia vul-
gè Gallorum, Ges. Charatia Itolorum Fuchso, quo-
niam septimodo in hortis, fenestrisque per can-
cellos opere topiario facile digeratur. Momordica
Matrh. Cast. & Bapt. Sardo: Mamortica nonnullis;
Viticella alijs. Germ. Balsamöpfffel & Balsam-
fraut / h.e. Pomum Balsaminum, & Herbam Balsami-
nam. Balsamina nomen inde accepisse videtur,
quòd fructu ejus, sive pomu in oleo macerato, bal-
sami vice ad vulnera utantur. Italis est *GARANZA*. *Ca-*
TANZA & *GARANZI*. Viderur nobis illud Cucurbitæ
genus esse, quod à Plinio Somphos nuncupatum
legimus.
Bpin. Balsamina 1. (2. phyt.) rotundifolia repens,
sive mas: Balsamina sive Pomum mirabile, Trag.
Balsamina, Marth. Lac. Lugd. & Cxf. alba Gesn. h.
Cucumis puniceus, Cord. hist. Balsamina mas, Cam.

ridis bullati, carne
punicea: semine
Citruil, vulgo di-
cti, copioso, fusco,
longiore; quam
latiore, modicè a-
cuminato, com-
pressoq; & aspero.

Balsamitam esse
multi ignorantes
Apothecarij cre-
dunt, ut etiam Lu-
minare majus in
Martia dicit, sed
non rectè. Cognat-
tà facie Cucumeri-
no generi cum sit,
verius cum Lobe-
lio, qui in Obs.
p. 69. Icon. p. 648.
etiam puniceam

& Ger. Fructus maturus colore variat. modò pu-
niceo, modò luteo rubescente. Balsamina mas fru-
ctu puniceo, & Momordica fructu luteo rubescen-
te, Eyit.

Nou nisi lata provenit: melius ac fecundius in Ita-
lia calidisque regionibus proficit, quàm in Germa-
nia ubi Augusto plerumque mense florere, & nun-
quam, aut tardè & tardè fructus maturefcit. Vbi ve-
rò primò n excaulescere cepit, samentis seu palis
suffulcenda erit, ut illis alligata à ventorum injurià
tuta esse queat.

Obtinent fructus Balsamines, rum & folia exi-
miam resicandi vim cum moderata quadam frigi-
ditate temperiei medix proxima. Vulnera recen-
ditia conglutinare solia impolita feruntur: cum vino
verò assumpta coli, inirestin omnique dolores sopi-
re, & iupus, convulsisque vulter exhiberi. Oleum,
in quo fructus exempto semine, vel insolatus, vel
in calens aqua: balneo decoctus, vel in fimo [male
si m. D. d.] equino maceratus, vulnereum inflamma-
tiones arceat: eadem & facile ac citò unit ac perlatat.

Dolentibus ac ulceribus mammillarum auxiliatur:
uteri exulcerationis ac inflammationis injectum
curare posse existimatur: punctis ac ulceratis net-
vis vulter adhibetur: adversus combustionem, ex
aqua, oleo ve fervente, serro ignito, vel igne mul-
tum coarset: cicatrices extenuat. ramices quoque
hujus unctiores sanescunt, si soliorum pulvis ali-
quot diebus interea exhibeatur. Steriles quoque
hoc fecundas reddi affirmatur, si post balnei con-
verier tis utum parres circa pubem ac uterum isto
inungantur, ac demum viro mulier miscatur. Non-
nulli (irquit Fuchf.) pomum oleo priùs imbutum
aliquot dies insolant, deinde vel fimo, vel terrà tan-
tusper obruant, dum profus intaberit, sic Balsami
vires glutinantis vulnerebus adfiscere pollicentur,
inde tractum Balsamina vocabulum. Quid multa:
in vulneribus sanandis Telephio non inferiores est
se conjicio, hincque Balsaminam appellatam. Ego
verò de ea peculiarem experientiam nullam habeo.
Poterunt itaque alij si lubet earundem virum face-
re periculum. Addit Tragus ex Hermodico: Oleum
ex Balsamina primi generis seminibus exprimi ad
vulnera præcipuum. Alij asserunt poma hæc in
oleo macerari, idque postea vulneribus glutinandis
miscificè prodesse, ita quidem ut si equo nigro auri-
culam præcindas, albo postea equo, cui tisdem sua
præcisa sit, vi hujus olei agglutinare possis. An verò
sic res habeat mihi non constat. Author Pandec-
tarum multa de illa scribit.





HISTORIA UNIVERSALIS PLANTARVM LIBER XVII



SCANDENTES SILIQVATAE LEGVMINOSAE
ALIAEQVE SIMILES, NEC SCANDENTES:
UT TRIFOLIA.

TERTIVS scandentium ordo, est siliquosarum. Suntque haec ille siliqua, qua legumina sinu suo comprehendunt, ut *απυ* quoque dicta, quae tamen si lubet, & *λεβος* dicas cum Graecorum nonnullis, & Phaeolos cum Latinis, & ceteris cum Dioscoride, & *φασόλιος* cum Galeno & plerisque, & *δολιχος* cum veteribus. Est quidem siliqua neque caro, neque lignum, neque cartilago, si proprie loquere: neque temere aliud nomen inueniat, quam membrana, vel cortex: quod duplex: carneum & mollius, exterius superintectum: ac interius durius, quinquam tenue, quoddam nullus edomare queat stomachus. Maximus sine illarum stipatus. Siliquatis adiecit Trifolia, non una similitudine illis affinis, sed nec multiplici varietate illis cedentia.

PHASELVS, PHASEOLVS, PHASIOLVS, DOLICHVS ET
SMILAX HORTENSIS IN GENERE.

CAPUT I



SCANDENTES ergo procedant siliquatae, primumque Phasoli qui tum multitudine, tum elegantia, tum raritate ceteras multum antecellunt.

Distingunt Phaselum [φασέλιον] à Phaeolo sive Phasolo [φάελοσ τοῦ φασόλιος]

Galen. Paul. Cordan. Diosc. Dod. Corn. Matth. Turin. Caes. & passim alij. Sed distinxit & Diosc. qui tamen pro Phaeolo Phasolum legit, ac rursus pro Phasolo, Smilacem hortensem [σμιλαξ ἡορτενσίς] reddit. Quod autem distinguat, id non solum diversa Phasoli & Smilacis nomina sub diversis ac multum à se invicem separatis capitibus, sed discrepantes quoque earundem historias satis superque comprobare arbitror.

Sunt, inquit Gal. de alim. facult. qui Phaselum eundem cum Lathyrō esse dicant: alij autem ipsius speciem. Dolichorum nomen à Diocle quidem scriptum est. scriptum etiam est in libro Hipp. de rat. vi et. Ex istis autem ipsos sic appellare semen plantae hortensis, quam nunc vulgo numero multitudinis bisfariam nominant: quidam enim *λεβος* [siliquas] alij *φασόλιος* [Phasolus] nuncupant, vocem ipsam quatuor sillabis profereutes, eoque modo diversum ab eo, quod tribus sillabis pronunciant, *φασόλιος* scilicet facientes. Quod ad Dolichos attinet, con-

jectare quis possit, eos nominare plantas hortenses, vel ex iis, quae Theophr. 8. de plant. hist. scripsit. Ex eo autem quod ligna longa jubet affigi, posset quis coniectare, ipsam verba facere de iis, quos nunc Phaeolos, & Lobos [siliquas] diximus. Ipse autem id lobos [siliquas] appellat, quod semen leguminum continet. Et sane ipsos quidem Dolichos lobi [siliqua] continent: ob eam opinor causam fructum totum vulgò nunc lobos [siliquas] nominant. Cum Hipp. nullam profus Lathyrī [Cicerula] aut Phaselī mentionem fecerit, suspicari quodammodo possumus, illorum seminum quoddam licere appellare Dolichon. Quod si quis Phaeolos quoque in Lathyrorum [Cicerularum] genera reponat, negare saltē non poterit, quin Lathyrī [Cicerula] in praedicta oratione Dolichi appellari queant. Nam & Diocles in leguminū catalogo Dolichos reponens, Lathyrī verò nomen prætereans, eandem præbet dubitationem. Dicere tamen quis possit & Ochros [Ervilia] & Lathyrōs [Cicerulas] & Phaeolos unum esse genus, verum pluribus appellari nominibus: fortasse autem propter quasdam differentias, quae in ipsis apparent. Verum tamen quod Dolichi non minùs Pisīs nutriant, tum quod æque ac Pisā statim careant, iudicio esse debet, Dioclen Dolichos appellasse, quos nunc Phaeolos nominant. Vocet quisque quo libet nomine, quos nunc vulgò Phaeolos & Lobos [siliquas] appellant, dum sciat ea talem obtinere facultatem, cujusmodi Diocles Doli-

Coniectura Galeni, Dolichos esse Phaeolos.

Lobus Theophr.

Hipp. Phaselis non meminit.

Diocles Dolichos.

Hipp. illu. Paulus.

Dolichis attribuit, ad cuius sententiam Hippocrates prope accedit, cum inquit: Dolichi [Phasoli seu siliqua C. m.] pisus magis per alvum secedunt, minus inflant, & probe alunt. nam ita res habet, nisi quod integros, & etiam virides, una cum suis siliquis ex oleo & garo ut plurimum homines mandant: nonnulli autem etiam vinum adiciant. Et: Phaseli & Ochri semina homines & Foenugrecu n. prius in aqua quoad radicem produxerint, macerantes, ventris subducendi gratia mandunt ante alios cibos.

Diffinitio Paulus.

Paulus etiam de Phafelo, & Phafecolo, quem Dolichum nominat, ut de diversis eodem capite tractat. Ochron, inquit, & Phafelum macerata donec etiam radices succreverint, ex garo ante cibum sumpta, alvum subducunt, ac plus quam Foenugrecum alimenti exhibent. A: Phafelum & Dolichon integracum siliquis viridia comesta, excrementitia magis redduntur.

Diff. Cord. Phasolum quid.

Nonnulli, ut Cord. in Diosc. perhibet, Phasolum à Phasiolo distinxerunt, ita ut Phasolum sit legumen simpliciter tunc vocatum ab Italis Phasiolus; Phasiolus verò idem cum Dolicho. Sed ista non differentiam nullus autor adhuc, neque ipse Dioscorides obtinuit. Quapropter cum videamus, a multis diversas has plantas confundi, distinguam eas, quibus ab invicem dignosci possint. Sunt enim ambae legumina, magnam in foliis, floribus, siliquis, & seminibus affinitatem habentia. Phafecolus igitur nostro iudicio quem Dioscorides hoc nomine recenset, quemque plurimi distinctionis gratia Phafelum, seu ut Itali dicunt, Phasiolum vocant, est Phafecolus vulgaris Italicae, humilis minor albus cum orbita rubente, vel nigricante, caules sine adminiculo surrigens, quam plenius infra describimus. Alter verò, qui Dolichus ab aliquibus appellatur, propriè Smilax hortensis [σουλ αζ κηραία] vel fava Phasiolifera vocatur, idque ad differentiam ab omni alia Smilace. Cordi gravem errorem, qualem phasioliferam, levem vocantis, vide postea de Smilace hortensi.

Phafecolus Diosc. Anatorum. Phafecolus vulg. Ital. cum orbita. etc. Dolichus. Smilax hortensis. Cord. err.

Diff. Dod.

Neque Dodonæo placet, ut quidam existimant, φασίλιον ac φασιολιον idem esse legumen diversis nominibus appellatum, sed fructus diversos ac differentes, veluti Galenus ostenderit. Idem autem suam sententiam ita confirmat. Galenus primum de Phaselis, deinde de Dolicho, qui Phafecolus dicitur disputat: & licet videatur addubitare, quale legumen sit à Theophr. Diosc. Hipp. & pleniusque aliis Dolichus appellatus, tamen Dolichum colligit & resolvit fructum esse in Italia hortensis plantæ; in Caria verò, in agris nascentis, qui formam habeat Lathyris longiorem, ac Phafecolus nominetur. Huic accedit Ægineta de Phafelo & Phafecolo, quem Dolichum nominant, ut diversis tractans. Iam & Phafelus, Italica quidem ac Romæ vulgare fuit legumen: Dolichus verò peregrinum. Nam sationis Phaseli, Columella & Palladius meminerunt. De satione verò Dolichi nemo Latinorum scripsit, utpote qui in Italia rarus fuerit, atque in hortis tantum factus, veluti Galenus innuit, cum subinde plantam hortensem nominans, ac in Caria feri referens; & similiter Dioscorides S. n. lacem hortensem eum nuncupans. Qui etiam scorium, separato capite hanc perstringens, aliam ac differentem Smilacem hortensem sive Dolichum à Phafelo esse, quem Phasiolum; nonnulli λέγοντες ac λέγοντες, latine Sil quam, nuncupant, e videnter commostrat. Quas ob rationes dubium esse nequit, Phafelum trium syllabarum, à Phafecolo quadrissyllabo diversum esse; non minus quam Cicera, Cicercula & Cicera differant, quæ tamen nomenclaturis affinis sunt: ac à veritate recessisse eos, qui unum legumen diversis nodis appellatum esse existimant. Hæcille, qui sibi ipsi aperte contradi-

Dolichus Galenus.

Hortensis planta.

Phafelus Italia legumen.

Dolichum peregrinum.

Smilax hor. Diosc.

Phafelus est Diosc. Phasiolus.

Error multorum.

Dod. not.

cit eisdem Pemptadis quartæ, l. 2. c. 1. dum ait. Cùm apud veteres nullum aliud reperitur, quod Bona simulus esse queat, quam Phafelus, Bonam eandem cum Phafelo esse consequi videtur: quem Græcorum complurimi φασίλιον, Dioscorides φασίλιον, Simeon S. thi φασίλιον nominavit. Habet enim in primis Bona fructum Dolichis similem, at majorem, que major est, cusulinosi Faseli esse Dolichus innuit, diminutiva voce, à similitudine Faseli, φασίλιον nuncupatus. Iam & Bona alta proceraque est, qualem Phafelum esse Columella testatur

Er græcus Attriplicis [at triplicis malè legit Dod.] confurgit Longa Phafelus.

Vulgarem item olim per Italiam fuisse Phafelum, ex libris Columella, Palladij, Virgilij notissimum est, sationis enim ejus & tempus & modus in his docetur: Bona verò hac ætate rihl familiaris. His accedit, quòd minoris Bonæ fructus, Sparti fructus sive Spartij Lobum magnitudine ac formâ & non raro colore, proximè referat: at Spartij lobos Diosc. tradit veluti Phafelos. Phasioli autem quibus Sparti fructus lobi à Dioscoride similes perhibentur, iidem sunt cum Phaselis. quam ob rationem quadrissyllabus φασίλιον & per τριών, à trissyllabo per τριών φασίλιον differre requit. Vides ita contradictionem, φασίλιον [Phafelus] quadrissyllabum, à φασίλιον [Phafelus] trissyllabo differre & non differre. Hanc quidem contradictionem tollemus, si dixerimus φασίλιον quadrissyllabum Dioscoridis, à φασίλιον trissyllabo plurimum ut non differre: differre autem φασίλιον aliorum, seu φασίλιον, qui est Smilax hortensis Diosc. [σουλ αζ κηραία] à φασίλιον plurimorum, qui est φασίλιον & ejusdem, quod Dod. non absque contradictione simpliciter alterit. Phafelum autem non esse Bonam [Fabam] præter rationes infra in cap. de Fabâ adducendas, vel hæc solum id tam manifestè innuunt, & ostendunt atque demonstrant, ut nullus dubitandi locus superest. Nihil simulus, inquit, est Bonæ, quam Phafelus. Sed an illum fugit, quia omnis similitudo claudicat, nec quod simile est, idem numero cum simili dicitur. Adde Phafelus à Bona multum dissimilis est. Phafelus à subpinguia sunt, Phafelus non item: Bona l'equa crassa, carnosa, mollibus seu floccis lanosa & hirsuta sunt; non autem Phafelus: Bonam tegit oblongus dilute virens unguiculul, nec Phafelus: Bona caulis quadratus, Phafelus rotundus. Bona igitur Phafelus esse non poterit.

Cur Dioscorides de Phafecolo agit, & rursus de horten si similitur repetit, si eadem res est Smilax & Phafecolus? Dno traduntur esse genera Phafecolorum, car didum & subsylvum ait Cornarius. Cardidum, quod Diosc. Phafecolon vocat. Cornarius meo iudicio peperam & δεινον quosdam appellare scribit. Sicut etiam falsò à Phafelo separat, quem absurdè λέγοντες [Cicerulam] aut ejus speciem esse credit. Eos autem è Germanis reprehendit, qui Phafecolos, seu etiam Smilacem Welsch, bonen quasi dicas Fabas Italicas, & omissant, siquidem idem faciant, quod in aliis rebus ignotis & peregrinis facere soleant. Omnia enim hujusmodi Welsch voce, ac rei alicujus nomen additè appellant. In Phafecolis tamen hoc gravius est, quod rei ignotæ penitus nomen fingunt. Cæterum Phafecolum subsylvum. Smilacem esse corcludit.

Matth. Phasiolum in deo summa fastigia quoque partiri videtur, in campestre sc. & hortense. Hoc Smilacem hortensem, variis coloribus prædicitum esse ait; illud autem Phafecolum à Diosc. descriptum, car didum ac vulgare in arvis in Italia.

Iis non assentit, inquit Turneus, qui legumen quod milii Dioscoridis Phafecolus tantum eisdem generis esse sicut cum Dolicho Theophrasti, Smilace Dioscoridis, & Phafecolo Galeni. Primo, quia in

Phafelus Bona Dod.

Phasiolus Phasiolus differre. Dod. con. in radice.

Phafelus est Bona, contra.

Phafelus Bona d.

Diff. Co.

Phafelus sum d. generis Corn.

Erronee.

German.

Subsilv.

Phafelus Phafelus est eisdem generis in Smilace toto

toto opere suo non consuevit Dioscorides duobus capitibus longè distitis, de hortensi & siluestri planta eiusdem generis, sed eodem capite, aut ferè proximo agere. Atqui de Phaeolo agit lib. 2. cap. 101. de Smilace hortensi cap. 140. eiusdem libri, quod non fecisset utique si naturalibus duntaxat (vt Matth. velle videretur) differre credidisset. Quæ ratio si nõ valet, nec valebit Matthioli Secacul facietis Eringium, aut laurü Alexandrinã & Hippoglosson esse distincta. Altera ratio est. Dolichus Theophrasti, Smilax Diosc. & Phasiolus Galeni percutunt, neque ad frugem perueniunt nisi adminiculis fulciantur. At Phaeolus Diosc. in Longobardia feliciter satis sine adminiculis ad frugem peruenit. Non est ergo Phaeolus Diosc. idem cum Dolicho Theoph. Smilace hort. Diosc. & Phaeolo Galeni. Postremò ab ipsis dissentio quòd authorities, quas pro se adducunt in nonnullis penitus contra ipsos faciunt. Scripsum est enim ex auctoritate Hipp. apud Galenum, Diocle, & Actium, Dolichos minus esse statulentos, At Phaeoli Diosc. non tantum statulenti sunt, verum statulenti etiam excitant. Galenus quoque eo loco, ubi Dolichos & Phaeolos eodem facit, absque omni dubio duas facit Dolichi species, eodemque modo Phaeoli duas. Cùm enim in principio ferè capitibus dixisset ex auctoritate Theoph. Dolichos putrescere & interire, nisi adminiculis suffulciantur, eiusdem capitibus sine ostendit esse præterea genus quoddam, quod adminiculis non eget, Atque hos ego Phaeolos censéo Dioscoridis, qui multum à Smilace differunt. Phaeolus ergo Diosc. & eiusdem Smilax hortensis duo sunt distincta legumina.

Faeolos Antiquorum nequaquam esse eos, quos vulgò *Faselus* vocamus (Cæsalpini verba sunt) patet ex eo, quòd Aitae seruntur, perficiuntur in Autumno, seruantur optimè incorrupti, & facillimè coquantur. Galenus quoque Phaeolum restatur alium esse à Phasiolis: comedi in Alexandria, &c. Genus candidum recipitur in compositione quadam ad renes, sed eo loco Phaeolus legitur, non Phaeolus. Dioscoridis Smilacis hortensis descriptio partim Faeolos nostrates ostendit, partem siliquæ similitudo cum Fenugræco, partim Turcicos vocatos, cùm seminibus varios colores tradit.

Tria etiam sub genere Phaeoli, specie inter se diuersa cognoscit Manardus legumina, *Phaeolum commune* [Italicum] Phasiolum, quem & lobum vocari ait, & *Eruilium* [Pisa] & *Smilacem*, de quibus singulis separatim dicemus, à Smilace initium futuri.

SMILAX HORTENSIS.

SARMENTORVM longissimorum beneficio Serticas & pergulas proximas, sese iis circumvoluens, conscendit, foliis donata ternis, ex vno pediculo aptis, hederaceorum non angulorum similibus, asperis, satis neruosis, palmo quoque uentus amplioribus: Flores furculo peculiari coherent plures, Pisi floribus multò minores: *Siliquæ* pendiles succedunt, palmum & sesquipalmum longæ, siliquarum Pisorum crassitudinem mediam attingentes, *semina* continentia nouena, vndena, longa, renes imitata: sinu in medio impressum habentia, lænore eximio, colore mirum in modum vario, cinereo, eburneo, luteo, glauco, rubente, omnibusque his inter se mixtis striato,

guttato (Phasioli vulgò appellati) inueniuntur aut omninò niuei, aut nigri, aut flauï, aut purpurei, aut amethystini, aut cærulei, aut rubri, aut lateritii ferè coloris, vel albi nigris venis aut lituris distincti, ac etiam cinerei, & carnei coloris similibus venis insignes, (Clus.) sapor e viscido, leguminoso, nec omnibus grato.



Phasiolus vulgæ artis, C. Bauh. Smilacem hortensem duplicem facit, vulgarem alium, alium peregrinum: vulgarem, alium maiorem, fructu longiore, & renis formam melius referente, qui cõmuniter candidus: alium minorem siliquâ angustiore: distant etiã crassitie & tenuitate. Hic variat floribus & seminibus colore: flores plerumque candidi, pallidi, flauetcentes, purpurascetes, siue amethystini & vt Cordus hist. censuit, floribus colore fructus sequuntur.

Phasiolus vulgæ artis, C. Bauh.

Verum in semine fructuue maior est coloris varietas, sunt niuei, flauï, ex flauo obsoleti, purpurei, rubri, latericei ferè coloris, amethystini, violacei, atro violacei, nigri, intidò purpurei deinde atrii: vel alibi nigris venis & lituris distinctis: item albi purpurascetes, orbibus albis variegati, vel spadicei nigris maculis aspersis: nonnulli incanis, atro colore, vel ab vna parte, vel vtrinque notati. Non minor sanè est varietas in Phasiolis ex America, Africa arque aliis regionibus, procul ab orbe nostro remotis, quam in his quæ in Europa nascantur. Sunt enim maiores, miriores, mirâ colorum varietate inter se discreti. Illorum nonnulli, aut prorsus candidi, aut flauï, aut cinericei, aut fusci, aut atrii, aut rubri, aut amethystini, aut variis coloribus non vno modo distincti: interdum albo & nigro, rubro & nigro, flauo & nigro: sic alius ex flauo & spadiceo simulmixti coloris, at circa hilum candidus: alius roseus, in quo rubri non nihil elucet.

A Dioscoride ita describitur. *Quidam xmasis*, Diosc. restituitur, vt variè illud scriatur. cuius fructus [xmasis, & non semen, vt falso quidam legunt] lobia [quasi siliquula dicas] & à striatur. nonnullis alparagus vocatur, folia habet Hedere [xmasis] similia, molliora tamen: caules tenues & capreolos propinquis fruticibus implicatos, qui eò vique adolefcunt, vt topiarii operis attegias seu canetas opacent, vt tentoria & scenas efficiant, alius. Fructum autem [xmasis] profert Fenugræco [xmasis] similem, longiorem tamen & insigniorem, in quibus semina similia reibus concluduntur, non equalia quidem colore, sed ex parte subfulua.

Quæ sit Smilax ita declarat Aërius. Qui nunc ab omnibus Lobi nominantur, apud omnes Veteres Dolichi & Phaeoli appellabantur, & ab aliquibus Smilax hortensis. Lobi quidem, hoc est, Siliquæ, quoniam præ aliis præcipuè, ex omni siliquarum genere, quæ indumento interte sunt,

Smilax 400 110.

hæ folia vnâ cum filiquis, siue tegumentis suis vt plurimum comeduntur.

Hæc est Smilax lauis & Hermol.

Hermol. docet sentit nobiscum *σμίλλα κηπίαι* [Smilacem hortensem] non eandem esse cum ea, quæ lauis à Diosc. cognominata est: Recentiores cum Aetio Phasiolum à Dioscoride per Smilacem hortensem intelligere non candidum sed rubentem, qui & Lobus & Dolichus dicitur & lat. Siliquula.

Siliquula. Marcell. re. dargatur.

Sed non sapit hæc nostra & Hermolai opinio Marcello, qui tamen ipse, qualis sit Smilax hort. & quibus in regionibus inueniatur, nescit dicere. Sed rationem, ob quam nostram opinionem despicit, ipse perpendit. Patum verisimile mihi videtur, inquit, ad eam altitudinem & frondium copiam posse legumen aliquod augeri, vt scenas & tabernacula vestiens inumbret. Theophrastus si inperisset, intellexisset vtique Dioscoridi eum auctorem fuisse, cur inter legumina Smilacem hortensem in tantum ascendere scripserit, vt topiarum opus efficeret, satis quidem commode ad exprimendum vocis & verbi captum.

Marcell. repreh.

Quare Manardus mentè Marcellum reprehendit dicens: Phaselum esse, qui nunc vulgò Phaeolus dicitur, quem & Virgil. vilem fuisse nuncupat. Quod si animaduertisset Serapio, sub Lubiæ nomine, quod certè à lobo Græcâ voce deflectum est, Phaeolus cum Phaeolis. e. Euilia minime confudisset. Marcellus explodit sententiam quam refert Hermol. non alio argumento, quàm quòd verisimile non videtur ad eam altitudinem legumen aliquod augeri, &c. sed semetipsum proprio gladio iugulat, si quidem ipse Smilacem, quicquid ea sit, in leguminum genere numerandam dicit, ac ipsomet interprete tanto incrementum esse dicit Dioscorides, vt scenas & tentoria inumbret. Fateri igitur oportet, aut verè huius Dioscoridis *σμιλλαι κηπίαι*, non bene à se conuerti, aut Smilacem, quæ ipsomet teste legumen est, adeò posse crescere, vt tabernaculi inlar Solem arceat, atque, vt sequens est, eius argumento, eos, non reuinci, qui Phaeolum pro Smilace intellexerunt. Serapio & Aucenna de Phasiolo nunc vulgò vocato ea prodiderunt, quæ Diosc. de hortensi Smilace. Nuper tamen etiam cognouit veram Smilacem in summam proceritatem ascendentem, grana quoque in siliquis producentè, Phaeolo communi præterquam colore (rubra enim, vel crocea sunt) similia. Multè tamen duriora videntur, quàm communes Phaeoli.

Serap. etc.

Marcell. taxatur.

Smilax Sc. v. ad Manard.

Gorrai. err.

Gorrai. cur Smilacem fruticem hortensem vocat? Quod quæso Smilax cum frutice participat. Frutex à radice caudice multiplici, ramosisque attollitur. Smilax verò legumen à radice foliatum, sine caudice prouenit.

Brunfelsii error.

Gorraum Smilacem vocandam fruticem malè sequitur Brunfelsius.

Marcell. eprob.

Dolichus, qui Galeno & Aeginetæ Phasioli cognominatur, Siliquam Theop. & Smilacem hort. Dioscoridis esse retur Tragus, nec errat: ac aliter etiam Marcellum, si is Smilacem hort. viridem vidisset, pronuntiaturum fuisse existimat.

Lonic. pro Dolicho & Smilace hort. falsò iconem Pisorum exhibet, nec minus verè Smilacem lauem dicit.

Simili errore & Cordus leuem Smilacem eandem statuit cum satiuâ, quam Dolichon etiam appellat Phasioli altera species, inquit is, Phaeolo Dioscoridis, quæ aliqui & in dionis gratia Phaselum vocant. [Phasiolo sc. albo, Italico, vulgari, humili, seu minori cum orbita rubente, vel nigricante] formâ foliorum similis. Circumuo-

luit hæc arbutis & hastis, suntque ex ea cotone. Aestate longiores hæc siliquas fert, propterea ab aliquibus Dolichus vocatur, & fructus eius lobi, quoniam insignes sunt siliquæ, in quibus figurâ Phaselî semina nascuntur, nectantùm candido colore: nam inueniuntur nigro, croceo, ruffoque colore, & mixtis etiam pluribus coloribus simul. Hic Phaeolus, Smilax hort. & satiuâ etiam appellatur: cùm propriè loqui volumus, Dolichum, Smilacem lauem siue facinam, & siliquas eius lobas appellamus. Germaniæ peregrinum fuit legumen hic Dolichus, nunc à plurimis non tantùm ciuibus, verùm etiam rusticis vmbra & ostentationis causa feritur. Læuem autem Smilacem eandem esse cum satiuâ, Dolichus appellatâ, palam fiet, si quis alios auctores de Smilace legat, qui eandem herbam, lenem & satiuam esse iudicant, & duo tantùm Smilacis genera esse dicunt, sc. asperum & lenem, quod in hortis nascitur. Adhæc si vtriusque descriptio & vires in Diosc. considerentur, quilibet iudicabit eandem esse herbam lenem & hortensem Smilacem. Propterea ipse Diosc. errauit, quòd crediderit lenem Smilacem proprium genus à satiuâ haberi. Dioscoridem in hac re secutus est Galenus, qui ait lenem Smilacem asperæ similes vires obtinere, quod falsum est. Nam lenis Smilax terrestri constat substantia, vt omnia ferè legumina: propterea etiam grauiâ & cumulosâ faciit insonnia. Asper verò Smilax longè alio constat temperamento, quod ex gustu percipi potest. Sapore enim nihil commune cum leni Smilace habet. Cùm autem plantarum temperamenta & facultates, ipso Galeno teste, ex sapore iudicentur, necesse etiam est, asperam Smilacem nihil in viribus cùm leni Smilace commune habere, vt Diosc. etiam indicat, qui Smilacem leuem cumulofo in somnia facere dicit, asperam verò contra lethalia venena antidotum esse. Cùm igitur tam breui Galenus lenem Smilacis vires perstringat, & minime verum temperamentum illi assignet, facile colligitur, ipsum nesciuisse, quid lenis Smilax esset. Et hæc Cord. in Diosc. qui in hist. quoque satiuam & leuem Smilacem eandem fieri, ac Dolichum vocat. Lenem autem licet inter Botanicos magni faciâ, nihilominus tamen temerè nimium erroris acculat Dioscoridem & Galenum: nec videmus tantam similitudinè in descriptione Smilacis lenis & hortensis, quam tam facit Cordus: conferatur descriptio seminum & siliquarum, præterea non conueniunt Phaeolo nostro Smilacis lenis flores, nec etiam quod dicitur hanc folia per Autumnum amittere: quemadmodum Smilax phasiolifera in totum perit. Vires etiam non respondent. Quis obseruauit Phasiolos præstare, quæ Diosc. de Smilace laui predicat: nos sæpius comedimus, nec tumultuosè somniamus. Videtur igitur Dedongus non malè sentire addita fuisse cauti Dioscoridis de Smilace hortensi illa verba, *grauis somnia facit*. Audacter enim nullo salutaris accusat Galenum, cui notauerat Smilax lauis, d. ferens à Phasiolifera & Smilace aspera, non solû in figura, sed etiam viribus. Que Galenus scribit de Smilace excusant etiam Dioscoridem ab errore, & demonstrant non idem esse Smilacem hortensem & lauem: ac indicant ipsum & Cordum nesciuisse, quid esset Smilax lauis, & malè confudisse cum Smilace Phasiolifera, ambafque tæpeter vnam & eandem dixisse.

Math. in pronuntiando & determinando quid esset Smilax hortensis, sibi minus confisit. Nunc enim credit illos, à veritate haudqua-

Dolichus cur voc.

Loba.

Est Smilacis sed fals.

Diosc. rur. & lenus.

Smilax Cord. etc.

Diosc. lauis ferens.

Galenus Diosc. dicitur.

quam descivisse, qui dixerint Phaeololum genus priori loco à Dioscoride descriptum, esse Smilacem hortensem. Nunc autem eos putavit nequam hallucinatos esse, qui asseruerint Phaeolos colubini insectos (quos nihil ab hortensi Smilace differre existimat) Dolichos esse Theop. Gal. & Pauli.

Lob. Phaeolus vulgaris, Turcica multicolor Fabas, Smilax hort. Dioscoridis, Dolichos Antiquorum, An Lobos Galeni?

Cardano Phaeolus Turcicus.
 Compilator Tabern. non distinguit Phaeolos, ponit tantum figuras duodecim generum, nullà additâ descriptione: pleræque autem figuræ nil demonstrant: ita consuit historiam.

Catalpinus, qui suam particularem habet opinionem, Smilacem hortensem facit Phaeoli genus peregrinum, quod in Italia feri ait in hottis opere topiario, viticulas verò ferre longiores, admiculis egentes: siliquis breviores, sed latias & falcatas, in stat Siliquæ arboris: semina grandiora Phaeolis Italicis, ac magis depressa, latioraque ac nitentia: colorem alius ex toto candidum in se, qui magis proberitur in eibis: aliis melleum, aliis maculosum: aliis lineas nigras in candido circumagi, Phaeolos Turcicos vocari: hos recentes insuaves esse, perfectos coqui in cibis, ut reliquos, qua in re fallitur. Siliquæ enim recentes coctæ non sunt insuaves, sed gratæ esui, coctæ cum iure carniū, vel butyro recenti, ut verè dixerit Diosc. olerum imodo esui aptam esse siliquam cum semine Asparagi modo elixim. Sed de viribus & usu mox plura suo loco.

B. pin. Smilax hortensis siue Phaeolus vulgaris i. vel maior: Phaeolus, Brunf. Phaeolus, Dod. gal. & Cam. vulgaris (vel Fabas Turicâ multicolor) Lob. Clus. pan. & hist. abus Ger. Smilax hortensis, Brunf. (quoad descriptionem Trag.) (cui & siliqua Theop.) Matth. (& Phaeolus hortensis), Fuchs. Turn. Lac. Cord. in Diosc. Gesn. h. Lugd. Tab. [qui, ut & Ger. fructus duodecim generum pingit] & Cam. Smilax sativa siue lenis, vel Dolichus, Cord. hist. Dolichos Theophrasti. Ang. Dolichus [siue Phaeolus] Dod. & Lon.

Porta Neapolitanus pro Smilacis hortensis siue Phaeoli figura malè ponit Pisi maioris iconem.

Σιλιάκη κωνοειδής & λίσβια Diosc. Σάββας Hipp. Diosc. Theoph. & plensque alius cum Galeno & Aëtio, cui etiam φασολία, nonnullis quoque λίσβια, Lat. Siliqua. Botan. vulgò Smilax hortensis, & plurima ex parte Phaeolus, Arab. Lubia, autore Fuchio Germ. Fafeln / Welschbonen Matth. Streigfäseln / Windbonen malè apud Fuchl. Sprengel bonen / vocavit aliquando Gesn. Grassfäseln / Phaeole / Welsch Erbs / Korb oder ihel / vnd ander viel farben. Belg. Roomschbonen / Gall. Feves peintes, Fasoles, It. Fagiuolo Turchesco, Hisp. Fegones, Angl. Kidneybeans Boh. fasoeli, Hung. Törör borse, Turcicum Pisum.

Smilax quidem nominatur, quòd Smilacis similitudine ascendat & vicina adminicula aut frutices apprehendat. λίσβια autem ac λίσβια à siliquarum magnitudine. Sed verbum Lobia æquiuocationem facit: nam apud Dioscoridem fructum Smilacis significat: apud Galeum verò & Aetium Lobos est Phaeolorum siliqua.

Breuitè hic in memoriam reuocare conueniat amplam Smilacis æquiuocationem. Nunc enim ita vocant, arborem glandiferam. Taxum similem Abieti, genete simplicem, Fraxinum ambigam,

Smilacem asperam, cuius plura genera, Smilacem lauem, vel Conuoluulum maiorem, Smilacem hortensem Dioscoridis, qui Dolichus est Theophrasti, de quo præsens nostra tractatio, Smilacem lauem minorem, quam Helixinem cissampelon cum campanulis vocamus, existimat tandem Tragus Lupulum esse Smilacem asperam. Ipsum etiam Scammium Smilacis læus speciem esse affirmat Dodonæus. Et Gelseminum repens videtur Cæsalpino Smilax lauis.

Smilacem hortensem habui variorum colorum in horto E. C. Montbelg. fatam. Obseruauit Lugduni, Basileæ & passim alibi. Dolichum [siliquam vertit Gaza] ligno longo affixo ascendere, & frugiferam fieri, alioqui viciosam reddi, autor est Theophrastus, idemque innuere videtur Columella scribens:

Et grauis Atriplici consurgit longa Fafelus. Faeolos teste Plinio, serere qua velis terra licet, ab Idibus Octobris in Calendas Nouembriis, Virgilius autem occidente Boote serere iubet.

Si verò Viciamque fereres, vilemque Fafelum, Haud obscura cadens mittet tibi signa Bootes.

Dolichos (ex autoritate Galeni) propter humiditatem copiosiore non reponunt, cuius occasione solent corrumpi. Quod si quis eos quoque securè velit reponere, sicuti Pater ipsius factabat, siccare ipsos penitus oportet. Sic enim hieme tota manent impures & incurrupti, eundem nobis usum, quem Pila præstantes.

Coquitur fructus vnâ cum semine, ut iam antè obiter ex Dioscoride relatum, & velut Asparagus, oleris modo editur. Ciet vrinam & graui somnia facit [hoc postremum peperam à nonnullis adiectum] autore eodem. Nutriunt quidem non minus quàm Pila, Dolichi, consimiliterque flatus expertes sunt, verùm iucunditate, & in alui deiectione illis cedunt, ut testis est Aetius.

Simeon Sethi apud Fuchsum, & Mauritani in primo ordine calidos & humidos esse Phaeolos statuit. Galenus etiam de alim. facult. humidiores natura esse asserit. Reliqua ex Galeno. vide antè. Qui ex iis magis rubri sunt, pergit Sethi, calidiores. Manifesta quoque in iis humiditas, quòd citò putrescant. Humorem generant crassum & pituitosum. Medium locum habent, ut ait Galenus, inter ea quæ facillè & difficulter concoquantur, celeriter & tardè transeunt, inflant & non inflant, partim & multum nutriunt.

Arte alios cibos cum sapâ sumpti, ventrem prouocant. Cum Sinapi oblati, plurimum noxæ deponunt. Albi igitur Phaeoli crassiores & difficilioris concoctionis, ac humidiores sunt quàm rubri. Proprietate autem quadam turbulenta somnia faciunt, sed ad bonam habitudinem corporis conferunt, & vrinas mouent. Et horum decoctum mentes mouet. Porta sibi persuadet Smilacem hortensem suis floribus papilionem ostendere, ac idèd Venerem irritare & augere. Is tamen ut dictum, non Smilacis, sed Pisi maioris iconem exhibet. Sed Smilax fit, flos papilionem refert, ergone Venerem excitat? An quæ consequentiæ necessitas, quæ necessitatis ratio? Vanitas & superstitio. Ait præterea, florem creare ex purpureo versicolore, fructum nigerrimum & rubrum, & propterea flatuosam habere naturam, ægrè perfici, brutâque in somnia parere; nos existimamus eum (ut & Matth.) scripsisse non ex experientia, sed secutum fortè Simeonem Sethi, & suam phantasticam imaginationem. Sethi autem opinio trahit originem ex lectione Dioscoridis prauâ. Nec persuadebit nobis clari-

Locus.

Tempus.

Repositio.

Vites & visus.

Vrinam ciet.

Temperamentum.

Alum.

Corruptio.

Dicoctum. Menfer.

tans, deteriores nigros & rubros Phaeolos albis aut variegatis: coloris enim ratione solâ non existimamus variam esse vim Phaeolorum, licet eandem sententiam tenere videatur Matth. ita scribens: Phasoli exalfaciunt & humectant ordine primo: atqui sului, flauî & rubri albis calidiores sunt. In cibis sumpti inflant, & ventriculo laborem faciunt, semen tamen generant, & veneream sollicitant, & praesertim si cum longo Pipere, Galanga, & Saccharo aspergantur. Id autem valentius praestant, si ex lacte bubulo coquantur, quousque rumpantur. Reddantur in cibo innoceniores, si cum Sinapi, aut Carni semine edantur cornicula dum viridia sunt: & tenera elixantur, & cum Pipere in acetariis edantur. Phasoli masticati & illiti sanant equorum morsus. Adduntur etiam in facis, quibus mulieres faciem concinnant. Aug. Gall. tradit agros impinguare, ac facere vt vermes non rodant frumentum.

Nona.

Semen.

Venus.

Acetariis.

Fucus. Agros impinguit.

PHASIOLVS VIOLACEVS.

CVM Smilacis hortensis in altum se extolentis quæ tentoria & scenas facere potest, vt scribit Diosc. varii coloris fructus passim obseruauerimus, ac etiam ipsi in horto E. C. ex diuersis locis conquisitos coluerimus, eos nunc enumerare fas erit.

Smilacis Phasolisera varia generata.

Descriptio.

Docum.

Stutgardia igitur nobis misit D. Schwartz Phasoli violacei nomine fructum, Smilacis hortensi similem, sed paruum, vt Phasoli Italici sunt, rotum purpureum siue violaceum. excepto umbilico albo lucido. Eundem misit D. Phil. Steph. Sprengerus nomine Phasoli Ægyptiaci. Habui quoque Bassia datum à D. Mart. Chmieletio, cui prouenit in horto siliquis valde longis & tenuibus.

PHASIOLI NIGRI.

LONGA & lenta habet fermenta reliquorum generum instar, quibus perticis & pedamentis (si adponantur ait Clus.) se circumuoluit, & inicitur: alioqui aded infirma, vt humi procumbant, & se spargant: iis innascuntur folia numero terna, longo pediculo inhaerentia, vt in vulgaribus Phaeolis, & eiusdem cum illis amplitudinis, neuosa: sarmentorum nodis vnde prodeunt folia, nascuntur oblongi pediculi, in quibus flores, bini, quaterni, seni, interdum etiam octoni, ex aduerso vt plurimum nascentes vulgarij formâ, hoc est, foris Pisi instar panis formati, coloris purpurascens, seu verus Amethystini: quibus succedunt toridem oblongi teretes lobi, initio virides, deinde maturitate flauescens, in quibus bina, terna, quina, sena, vel etiam octona grana, vulgarij quidem formam referentia, sed minorâ, & coloris, quando matura, nigri.

Descriptio.

Clus. hist. Phasolus, Æthiopici appellatione missus ob nigredinem, vt vestimile est, vel forsitan quoddam Æthiopia prima eius origo. B. pin. Phasolus Æthiopicus vel niger, siue Æthiopicus lobis flauescens fructu nigro.

Phasol. Æthiopicus. Locus & tempus.

Lugduni Batauorum notus, semine ex Italia misso. Floret cum vulgaribus, vel etiam aliquando paulo maturis.

PHASIOLI TUMIDI, NIGRI, splendentes.

IN Kitzckheim vrbe Vvirtembergica, in horto D. Ioan. Lutzij insignis Pharmacopæi obseruati Phasolus nigros, solentes, tumidos, cum paruo hilo albo, ac similes Phaeolis humidioribus minoribus nucis: iis tenuiores sunt violacei. Et hic est fortè Clusij de eam is tertius.

Locut.

Idem Clus. hist. Phasolus 13, ex Itaha misso semine, Phaeoli Æthiopici appellatione, similis nobis prouenit Francofurti.

Floret paulo maturis superioribus, eam ob causam semen faciatis ad maturitatem peruenit.

PHASEOLI ATRO VIOLACEI.

VNT nobis Phasoli non multum differentes à nostris nigris, tumidis, nisi quod videntur paulo longiores & maiores, ac atro violacei, & minus tumidi, splendent vt dicti, eis est hulus, vel vrabilicus albus, non multum etiam sunt dissimiles à violaceis, accedunt fortè ad Clusij Phaeolum 15, initio scilicet purpurascens deinde atrum.

PHASEOLI FVSCI, FOLII CRASSI & pinguis.

PHASIOLVS Clusij 16, ex Guinea delatus suo lobo exemptus, tetra creditus Pharmacopæo Delphensi creuit, ad speculi symbolum, ad palmarem altitudinem, cauliculo satis firmo & rotundo, binaque aut ternas foliorum alas protulit, in quibus, vt reliquis Phaeolis, terna folia, sed valde crassa, & pinguis, longæque minora, Trifoli Alphalitis foliorum magnitudinem non excedentia. Ipse Phaeolus semunciam magnitudinem non superabat, satis densus & crassus, coloris fusci cum spadiceo commixti.

B. pin. Phaeolus Guinenfis 1. fructu fusco spadiceo: Phaeolus peregrinus 16. Clus. hist. Sunt maiores & minores.

PHASEOLVS VVLGARIS ITALICVS HVMLIS, SEV MINOR ALBVS, CVM ORBITA rubente, vel nigricante.

HVMILIS sic describit Matth. Phasoli albi, & magis vulgares, qui passim in campis feruntur, mense Maio, & quando que post mellem sine pedameo per se substituunt, sed in latum sese pandunt foliis hederaceis, maioribus tamen, & maioribus, venosis, toruis, ex vno pediculo prodeuntibus: flores emittit candidos, Pisi maiores, è quibus palmaria cornicula prodeunt, teretia, & in acutum desinentia, primo quidem exortu viridia, & post maturitatem albicantia. In his femina plura, quæ Phaeolos appellamus, continentur, facie quadrupedum renibus similia, alba præter umbilicum qui tantum in iis nigricat. In hoc capite Dioscorides de candidis tantum ac vulgaribus Phasolis differunt.

Non probamus Matthiolum dicere, femina similia quadrupedum renibus, videretur enim mihi non bene obseruasse eorum renes, hæc femina humanis renibus, magis similia sunt, quam illis. Iconem habet Matthioli, non nihil differentem à Smilace, quæ diuersa valde est ab icone Camerarii, quam hic posuit in ep. & hist. pro phasolis: ei enim apponitæ dux siliquæ: in icone autem Matthioli, tum parua, tum magna (quamuis flores, malè pingantur) sunt plures florea & siliquæ: ita vt ad septem ex vno pediculo numerentur. Hinc colligo eam Camerarii non esse Phaeolorum vulgarij, sed alterius generis de quo paulo post. Ipse etiam scribit in hist. se per Phasiolum 4. Clusij non intelligere eum, quem in editione Matthioli proposuerit. Clusius autem vt paulo post dicitur, tradit suam Phasiolum binos flores magna ex parte sustinere, niueum circa hulum nigra macula insignitum, quæ omnia demonstrant Iconem illam Camerarii ab eoa bene positam pro Phaeolo Italico vulgari

sive Matthioli.

Hac eadem censurâ dignus Casp. Bauh. qui in suo renouato Matthioli pro his rhaefolis iconem ponit Cameratii, quod non placet, ob causas iam dictas, & postea repetendas.

In pin. vocat Smilacem hortensem sive rhaefolâ vulgarè 3. siliqua sursum rigente, & rhaefolum paruum Italicum: Phaeolum, Matth. album, Lugd. Phaeolum & rhaefelum, Ang. Cord. in Diosc. & hist. rhaefelum, Cæs. Flore est; inquit, maiore candido papilioni simili, foris in viridi colore pallecente: foliis nullam asperitatem habentibus: sunt maiores & minores: sunt albâ, subnigri, illi maculâ nigrâ, hi albâ notati: est & minor albidus; cum orbita rubente aut nigricante.

An Dodonæo hist. frum. & in fol. Dolichus alius minor [hunc vocat Bauh. in pin. Smilacem hortensem sive rhaefolum vulgare 2. & hortensem minorem: dubitat autem an sit rhaefolus Turneti: aut fortè rhaefoli illi, quos Tral-lianus lib. 7. φασολος μικρός. & lib. 11. rhaefolos Alexandrinos nominat, si modò per Fasolum paruum Dolichos veniat intelligendus, quod verifimilimum videtur.

Lonic. pingit hoc titulo Groß faheln / rhaefelus, rhaefolus & rhaefolus; in descriptione tamen confundit cum eo rhaefolum Tragi, sive risum maius flore purpureo.

Cast. Phaeolus non se attollens, semine albo. Quamvis autè dicit hunc se non attollere, pingit tamen pro eo Smilacis hortensis modo ad pericam volutum.

An de hoc agit BELL. obs. l. c. 3. In Creta Scarus piscis est faxatilis, qui delectatur morâ circa rupes; vescitur etiam parvâ herba, quæ ei placet, & quæ alibi non provenit, quæ occasio, vt Scarus in Creta insula maneat. Incolæ qui norunt Scarum oblectari herba Phaeolorum, in agris ferunt, ac folia imponunt in nassis in mare diluculò (Siliquas pro se referunt) vt alluciant eos, ac capiant, hinc illi nominant Scarobolano. Quod in Scaro melius est, est herba qua vescitur, cuius semper magna copia in eius ventriculo inuenitur. Hos esse credimus, qui à Galeno de alim. vocantur Dolichî, quique in Caria feruntur, figurâ cicerculis longiore.

PAULO dicitur Phaeolus albus, qui cõmpol. renalem ex cicadiis, ingreditur. Manard. l. 1. ep. 4. Phaeolus communis, qui nunc vulgò Phaeolus, què & vilem nominat. Item l. 3. ep. 24. Phaeolus, vel Phaeolus communis.

CÆSALP. Phaeolus, qui vulgò Fasolus, cui semen candidum, maculâ nigra. Plura hac de re videto antè.

Semi in horto E. C. Phaeolorum Italicorum semina, quæ primò vidi Tubingæ, floruerunt Augusto. Patauii frequenter in cibo vsus sum. Matthioli feruntur in agris mensè Majo, & quâdòque post messem.

Diocoridis inflat, & flatus mouet, & agriè concoquitur. Cõctus autem viridis, si edatur, aluum mollit, ad vomitionem aurem idoneus est.

Parant, vt dictum, quoq; rhaefolis multibrem fructum hoc modo: sumunt rhaefolorum abortiu micæ panis triticeî albilissimi, an. lib. 1. Cucurbitam longam, teneram, virentemque vnam, siliquâ prius cucurbita, macerant simul sinitia ex lacte caprino nocte vna, deinde addunt feminum Melopeponum vnc. v. nucleorum rericorum mundatorum vnc. iij. nucleorum Tom. II.

rincorum deliatorum lib. 5. Conterunt per se omnia in lapideo mortario, & deinde addunt pillum columbinum domesticum vnâ cum plumis in particulas dissectum, abiectis tandem intestinis, & omnibus simul miltis, ex vitreo organo; ad hoc parato, in vase feruentis aquæ collocati, aquam distillant, & subinde diuigentur custodiant. Siquidem huiusce aquæ lotione nitorem faciei conciliant, & cuti molliissimum addunt leuorem. Reliquas vices & vsus, sicut & temperamentum iam antè tradidimus.

PHASEOLI TVMIDI MINORES

Magnitudine vulgaris rhaefolis minorè plarumque, nec vt illi, sinuati circa umbilicum. Interim puluinati magis, & tumidiores omni ex parte pro portione sua. Colore niuè sunt, & splendicantes, verustate verò aboleseunt & in eburneum, tandem etiam in pallidum migrant.

Sic describit Clusius: Totâ formâ, & nascendi modo à vulgari haud differt: valdè ramosa enim habet sarmenta, quæ vicinis pericis sese aduoluunt, easque scandunt, oblongos pediculos ex foliorum (quæ semper terna, vt in vulgari, simul nascuntur) sinu prominentia: in quibus bini, quaterni, interdum etiam seni nascuntur flores, ex aduerso semper siti, vulgaris Phaeoli floribus magnitudine & formâ respondentes, in itlò, dum recens aperti sunt; candidi; postea verò pallecentes: quos excipiunt oblongæ, propendentes: vt in vulgari siliquæ, seu Lobi: quina, septena: & plura interdum candidissima, & quasi ex ebore tornata semina cõtinentes, minoræ & tumidiora, quàm albi vulgaris.



Clus. pann. rhaefolus 2. sive minor niuus, sive de Guatimela. Phaeolus Purkirchorianus alter. Ex Hispaniis an. 1585. missus. Frazoles blancas de Guatimela, hoc est Phaeoli albi ex Guatimela (quæ noui orbis provincia est) Verè satus egregiè creuit, & ad frugem peruenit. Idem Hist. Phaeolus peregrinus 2. cui scõnem apponit Clusius, quæ apud Lobelium nomine Phaeoli vulgaris extat.

An Taber. weiße bonen von America. Phaeolus albus Africanus. Quem si compilator per suum figmentum cum capreolis non intellexit, nescio quam plantam intelligat: Phaeolum hunc, accepit cum hac inscriptione: Frazoles blancas de Guatimela.

Satus in horto E. C. Montbelgardi procreuit, sed non maturuit. Iulio floret, fructus Augusto, nonnunquam etiam mensè Septembri, matrescit. Dum Viennæ vixit, semine siliquis amicis communicato Clusio natus, nec antè ipsi conspectus.

Descript. Clusii. Sarmenta. Flores. Siliqua. Semina. Synonyma.

At: Thaeolus albus Americanus.

PHASEOLVS NIVEVS, MINOR,
circa hilum nigrâ maculâ insignitus
ET PVMILO NIGER.

Descriptio
caulis.

Folia.



Lobi.

Semen.

Lobi Americani.
Alubias de Indias.

Lobi Indici.

Icon Clusii transposita.

Phaseoli pumiliones.

Camer. er-
ror.

Phaseolus Brasiliensis Tab. repræh.

C. Bauh. not.

Caret longis
sarmentis,
& breui, firmo-
que caule con-
stat, pedalem
longitudinem
raro excedente,
& in breuissimos
ramos diuiso, ad
quorum folia
quidem superio-
ri familia nas-
cuntur terna nu-
mero, sed bre-
uiori pediculo
inherentia, qui
non purpurascit,
vt in proxime
descripto [Smi-
lace hortensi, si-
ue Phaseolo Ana-
gyridi simili fe-

rè, colore rubescente.] Pediculi ex alis prodeun-
tes, longi, crassifculi, firmi, binos etiam flores
magna ex parte sustinent, formâ, colore præce-
dentis flori simillimos, deinde binos lobos illius
tylhydracis siliquis paullo longiores, & teretes,
in quibus fructus formâ par, sed colore differens,
nam niuus est, circa hilum nigrâ maculâ insi-
gnitus, & quibusdam nigris punctis interdum in
lateribus notatus. Satis præcox hic est, nec ullis
pedamentis eget, cum (vt dixi) breui, firmoque
sit caule.

Clusio descriptionis auctori in Pannon. *Pha-
seolus 4. Lobi Americani minores, siue Pumiliones.*
Item *Phaseolus tertius, Alubias de Indias*, id est, *Lobi
indici.*

Figura Clusii sub dictis nominibus, non habet
binos flores: sed plures, ideo aliâ releganda, &
huc transferenda figura, quæ est sub alieno titu-
lo, nempe *Phaseoli tertii, siue Americani* elatio-
ris, verè enim comperimus in hist. Clusii transpo-
sitam iconem, vbi icon posita sub titulo *Phaseoli
peregrini 4.* cui additæ sunt siliquæ, quæ dec-
tant.

Camer. *Phaseoli pumiliones albi, & nigri*, quo-
rum hi magis, quàm illi alsioli sunt, quamuis
ambo frigiditate nostræ plagæ sæpius à maturita-
te prohibeantur. Intellego autem, quorum icon-
em dedimus in Matthioli editione, & quos Clu-
sius in Pann. quarto ordine proposuit. Existimo
autem ego Clusii *Phaseolum quartum*, diuersum
à Matthioli *Phaseolo* qui in Italia frequens, quâ
ob rem Camerarii figuram ad hoc caput reduco,
& separo à *Phaseolo Matthioli*.

Taber. *Phaseolus Brasiliensis* Vresilgen boehn.
Quantum iudicare possum ex figura efficta
ad Clusii figuram, ad hoc caput referenda i-
con.

C. Bauh. in suo Math. proponit eandem figu-
ram, quam Camerarius, sub inscriptione *Phaseo-
li*. Non autem placet Camerarium, & C. Bau-
hinum iconem eius plantæ, quæ Clusio *Phaseolus
4.* ponere pro Matthioli *Phaseolo* vulgari: diuersi
siquidem, vt antè dixi, quod facile apparebit,
conferenti vtæ anque iconem, nisi dicatur *Mat-*

thioli icon falsa.

Ed. B. pin. *Phaseolus peregrinus 6.* minore fru-
ctus, albo, nigrâ maculâ insignito: *Phaseolus pe-
grinus 4. Alubias de Indias*, Clus. pann. quoad des-
criptionem: & Hist. *Phaseolus albus*, Lugd.

Creuit etiam hic mihi [inquit Clus. Viennæ
anno 1576. donatus à Dodonæo S. C. M. tu n
Medico, qui eius fructum præcedente anno, dum
Pragæ esset, in arcis horto obseruauerat, & le-
gerat.

PHASIOLI PARVI, ALBI, CVM
ORBITA MINIMA, RUBENTE,

HAbemus paruum genus *Phaseolorum* albo-
rum, non tamen candidorum, cum mini-
ma orbita rubente, & paruo hilo albo.

PHASIOLI MINIMI, ALBI,
orbita magna rubente.

Sunt nobis *Phaseoli minimi albi*, minores quàm
Phaseoli cum orbita nigra: nescimus an sem-
per tales [ascriptum erat repertos inter aroma-
ra] iis sanè similes sunt: orbita magna est, sed
rubens, cum hilo in medio albo.

PHASIOLI PARVI, PALLIDO
albi, ex America delati, Lob. liio.



A Lob. in I-
con. pin-
guntur *Phaseoli
parui*, pallido
albi ex America
delati, Idem in
Hist. Belgica
Eringe ghe-
maerbe de bo-
onfenne. Fieri
potest, vt vnus
præcedentium
paruum *Phaseo-
loorum* esse
deberet, *Phaseo-
li parui* ex
pallido albican-
tes ex America
Lobelio delati

B. pin. *Phaseo-
lus Ameri-
canus* vel *Bra-
silianus*

5. minor: *Phaseoli parui* ex America Lob.
Lugd. *Phaseolus Brasiliensis*. Tab. Huius ma-
gna varietas, quare fructus duodecim genera.

PHASIOLI PARVI ITALICI,
NIGRI, CVM MACULA ALBA.

Gener Cherletus attulit nobis ex Italia *Pha-
siolos paruos, nigros*: parte caua hilus par-
uus albus: parte verò superiore, gibbosâ, longa
& lara macula.

PHASEOLVS NIGRICANS HYLO
PROMINENTE

Phaseolus alter, *Phaseolo* vulgari haud distimi-
lis est, sed minor, densior, nigricans, & hy-
lo pro-

lo prominente, & remis formam minimè referente. Clus. apud Monardem. Eadem tradit Lob. in Obs. ex Clusio.

PHASIOLVS LATA SILIQA, FRVCTV EXIGVO NIGRO, VMBILICO CANDIDO.



Vidit Clusius non procul Olyssipone in monasterio quodam Phaseoscoli genus, vulgari admodum simile, ut vulgare putaret: perquam istuc vestigabat opere topiario, flore purpureo: at siliquæ scabrae sunt, breviores & latiores, quam nostrae vulgares, fructus est exiguus, Pisi vulgaris magnitudine, totus niger, nisi qua parte siliqua adherent, quæ candida est: Brasilianis frequentem esse audivit. Clus. apud Monard. & ex eo Lob. obs. & Leon. & Tab. Phasiolus alter Brasilianus. Audiuit Lusitanis apud Brasilianos habitantibus, *Fava braua*, id est, Fabam siluestrem nuncupati.

Phasiolus alter Indicus Clusij: Phasioli genus vulgari simile. B. pin. Phaeolus Americanus vel Brasilianus 2. siue alter, fructu nigro, pisi magnitudine.

SMILAX HORTENSIS, SIVE PHASIO- LVS ANAGYRIDIS SIMILIS FERRE, COLORE RUBESCENTE.



Habet hic Phasiolus oblonga sarmenta, ex singulari caule statim secundum radicem ipsam procedunt, & in multos ramos divisa, læta, obliquè se contorquentia, & humi procumbentia, nisi periculis, aut pedamentis sustineantur, quibus sese circumvolvunt, reliquorum Phaeoscolorum modo: purpurascunt ea juxta alas, ad quas etiam adhaerentur terrena folia, minis ampla superioris folijs, & dilutiore colore virentia, longo petiolo inhaerentia, qui ea parte, qua folia susti-

net, contrarietque, quæ fatentis inhæret, ex atro purpurascit: flores in oblongis petiolis, plerumque bini, magni, Pisi forma, foris ex candido pallescentes, interiore verò parte ex purpura cerulei: his succedunt totidem prælongi lobi, teretes, & quasi cylindracei, in quibus fructus reliquis Phaeoscoli minor, Anagyridis legitime fructui penè similis, rubescentis coloris.

Clus. pann. Phaeoscoli genus, Lobi Americani maiores, Phaeoscolus terris Americanis elavor. Acceptus ex Hispania cum hac inscriptione: *Alubias de Indias*, id est, *Lobi Indici*.

Figura hujus Phaeoscoli, ut mihi videbatur posita erat pag. 723. sub alio titulo, nempe Phasioli Pulchelliani secundi, quod non pertinet, id demonstrante manifestè numerò florum: quæ occasio, ut ad hoc caput reduxerimus ex Clusio suam figuram: in quo nos bene egisse apparet, ex ejus Hist. lib. 6. cap. 41. ubi ponitur pro Phaeoscolo peregrino tertio.


PHASIOLI RVBENTES FIGVRA PENE nostratium cum linea elata.

Pulchro rubente colore splendunt; cortice Defcrip. & circa umbilici ambitum coccineo. Umbilicus niger foeniculi majoris magnitudine, supra quem macula nigra, sulco divisa. Parte opposita, quæ dorsum Phaeoscoli dici potest, linea elatior per longitudinem excurrit, & totum Phasiolum usque ad hilum circumscribit. Nostratis etiam sunt paulò ventriosiores, habitiorisque, ac ad Anagyridem accedunt formæ, & magnitudine.

Acceptimus ab Illustrissima Principissa, & à D. Thoma Platero, Medico Basileensi, qui ex Hispania se importasse retulerat. Considerandum an affines, vel fortè idem, cum Phaeoscolo Clusij Anagyridi simili.

Leon habebitur post cum Phaeoscoli Indici parvi maculati Leone.

PHASIOLI EX GVINEA PALVDANO, spadicei, minimi.



ET hos quoque pulchellos cum alijs multis exoticæ elegantie Clusij. Paludano descriimus. Parvi sunt, Africanos magnitudine vix superantes, splendido laeore, spadiceo, aliàs dilutiore, aliàs obscuriore, plurimum tamen æquabili, colorati, hilum versus nonnihil angulosi: Hylo, qui pro corporeculi modo

dulo sat magnus candidusque modicè, lineati, Pulpa subest cortici callosa, subflava, gustu phaeoscolaceo.

Considerandum an differant, vel quantum à Clusij Phasiolo quinto. Laborat fructu.

Florèt.

Lobi Fructus.

Lobi Americani. Alubias de Indias Leon Clusij traspasij.

Defcrip. Cortice. Umbilicus.

Anagyridis formæ. Elicur.

Defcrip.

Hylo. Pulpa.

An. Phasiolus Indici Laborat.

PHASEOLI AFRICANI PARVI nonnihil albicantes.

Descriptio

Folia.

Floris.

Siliqua.



DE Phaseolorum quoque more scandit & praefens planta; folia terna, minora, trichioraque multo, quam in vulgaribus, paulo duabus vncis longiora, non totam semunciam lata, nervosa; glabra, crassa: flores ex obsoleta quadam fuligine in luridum pallorem languescunt, vix desiccantes: siliqua sesquipal- mum longa, vul-

garibus angustiores, vix cunham lata, grana claudunt nonnihil candicantia, dimidio minora, Phaseolis nostratibus, circa germen fusca.

Phaseolorum Africanorum, parvorum, nomine missi per Carolum Paludanum Ill. E. C. Wirtemb. Accepti etiam cum hac inscriptione: Phaseoli ex insula Diuinae sub Aequatore sita.

Satum huius Phaseoli semen in orto Ill. E. C. Montbelgardi floruit Augusto, & Septembri, quo mense quidem maturuit semen.

Phaseoli ex insula Diuinae Thomae. Locus & tempus.

PHASEOLVS LABURNI, FRVCTVS ex nigro subvirescente, sicut Aegyptius flore luteo.

Descriptio. Sarmen- ta.

Folia.

Floris.

Color.

Floris.



Tenuia habet sarmentata, ex singulari caule itatim proxime radicem enascentia, eaque valde ramosa, cum viridi purpurascencia, quae vicinis periculis & pedamentis sese convolvunt: folia ex eodem pediculo, ut in aliorum Phaseolorum genere, semper terna, longae tamen minores, & trifolii medianthis [quod in umbrosis & ubere gleba nascitur] foliis perquam similia, ex atro virentia circa pediculum purpurascencia: flores in spicae modum congesti, magni, nisi vulgaris forma; & magnitudine ferè, coloris flavi, in oblongo; crassiusculoque pediculo ad foliorum exortum procedente nascuntur: lobos non obscurabam quia flores duntaxat produxit ipsa planta, eosque val-

de caducos propter adventitia frigora: breves tamen angustisque esse intelligebam ab his, qui conspexerant, & terna, aut quaterni grana continere: quae verò accipiebam parva erant admodum, Laburni grana non maiora, utroque tamen mucrone praerumque obtusiore, pulli coloris, seu potius ex nigro subvirescentis.

Clusio hist. P. 156. li. peregrin. genus. Phaseolus 5. Aegyptiacus Patavio missus a Bernardo Paludano ex Syria & Aegypto reduce, anno 1578. qui terrae anno sequenti creditus, crevit quidem, sed serò admodum, deinde perit. E feminibus conseruatis & anno 1582. demum satis, aliquot plantae egregie provenerunt, quarum una florem Septembri duntaxat mense tulit, ac ad frugem minime provenire potuit, ipsa tamen planta Calendis Novembri perbellè adhuc florente: hoc semen A. v. 1582. a Paludano; at deinde ex Italia Aegyptiaci Phaseoli nomine simile accepit. Et forte Phaseolus hic peregrinus Dolichus est Beltonii.

Advertes apud Clusium in pann. iconem quae quae est p. 729. sub titulo Phaseoli quinti Aegyptiaci, non esse Phaseoli, quem intelligit Clusius, sed sub hoc titulo reponendam iconem, quae est pag. 727. sub nomine Phaseoli tertii, Alubias de Indias. In pann. p. 730. est alia icon, cui titulus Phaseolus quintus, huc Aegyptiacus: quam iconem Clusius omnino omisit.

Camer. in hort. Phaseoli Aegyptii à Clusio picti in pann. observationibus sine siliquis quas nos addidimus.

PHASEOLVS INDICVS PARVVS, maculatus.



Escon eadem cum ea qua lib. 111. c. 88. habetur.

Phaseolus est vulgaris magnitudine penè aequalis, utrinque turgidus lucidus, colore pullo, maculis notato, praesertim circa umbilicum, longiusculus, quem portio quaedam alba, extuberans, cingit. Est ex fructibus Illust. Cell. Wirtembergicae.

PHASEOLVS INDICVS, PARVVS rubens, hilo nigro.

Phaseolus parvus, sinuatus, hilo nigro, reliqua parte obscurè rubens. Ill. Ducissa terrae commisit, apud quam visus & depictus, Escon eum praeced. habetur.

PHASIOLO NIGRI, FACIE seminis Peoniae, splendencantes, umbilico albicante. Et

Alter Ægyptius minimus.



Magnitudine & figurâ ad semen Pæoniæ feminæ quam proximè accedunt. Quippe ex rotundo sublonga sunt, nigerrima pulcherrimè, & Saccini nigri, politi instar, splendicanti, eâ tantum parte, quâ adherent, quam umbilicum dicere solemus, albicantia. Existimamus, nisi fallit memoria nos accepisse à

D. Paludano, qui Ill. nostro misit. Perpendat lector, an possit esse idem cum Phasiolo præcedente, latâ siliqua Clusii.

Est mihi præterea minimus phasiolus missus per insignem Pharmacopœum Tossianum Carolum Burgundum Phasioli Ægyptii nomine, qui Piper magnitudine vix æquat, angulosus, sublongus, colore spadiceo, ac ferè nigricante, splendente, umbilico candido, longiutculo, cuius parte opposita impressio sinum efficit.

Eicon eadem cum ea que l. 3. c. 92.

PHASEOLI PARVI EX AMERICA delati, Lobelii, ex fusco purpurascetes.

Lobelio in Ic. & hist. Belg. dicuntur: Elein boontens von America / In latyn Phasioli parvi ex America delati: An Eid adu. Permultæ acceptæ à Naucleris; Fabæ, Phascoluc ex America nouo orbe, æque Hesperia Aphrica allati, qui mixtæ nature videntur, sed propinquioris Phasiolo: nam eorum quidam exiguis, minor multum Phasiolo, ex fusco purpurascit.

Lugd. Phasioli parvi ex America dicuntur. Ego autem, vt verum fatear, quales sint hi Phasioli, nescio, quia eorum nullam inuenio descriptionem, de qua certus sim:

PHASIOLI EX ANGOLI

Paludano, pallidi, variegati, hilo magno, spadiceo.


CL. Paludani munificentia in Naturalium nostro thesauro aliquot horum adseruamus: qui vulgaribus ventriofiores, læues, maculis insigniti, colore varii. Quidam namque obscurè flauescentes, seu melini, dilutiore luteolo conferti: quidam pallidi, & ferè albicantes, pullis maculis insigniti, & horum vbius varietas in colore notabilis. Hilo donantur magno, spadiceo, aut nigricante, à suprema parte, plusquam mediam fructus longitudinem excurrente, minime sinuato, sed eminente. Tanta porro eorum durities, vt ex eorumdem collisione Auclanarum instar sonitum edant: considerandum an aliqui in figura Lobeliana pictorum, nomine

Phaseoli Indici rubri huc referri possint.

Hunc eundem ab Illustrissima nostra Principissa accepimus, qui vna parte latior est, altera angustior, in ceteris cum nostris qui iam sculpti erant, planè similis.

Eicon habetur ante cum Leone phascolorum ex Guinea Paludano missurum &c.

PISVM AMERICANVM COCCINEVM, aliis Abrus, & idem nigrum.



Icon alia Clus. Exot. l. 4. c. 15.

Descrip.

Americanum Pisum coccineum nostrati est minus, granorum Pæoniæ feminæ in morem ex rotundo oblongum, nitidum, misicè durum; cortice tectum vel penitus nigro, vel bicolori, ita vt germinis regio nigricet; reliquæ vel hilari atrò splendeat, vel tritiori spadiceo colore sit tinctum; medullâ insigniter durâ, bifidâ; flauescit, sapore leguminoso. Habemus etiam tota nigra: & alia, quæ colore spadiceo sunt, nihilominus nigra maculâ notati. Quod an naturale ipsi sit, an hoc accidat per vetustatem, experientia obseruatorum istarum rerum curiosum docebit.

Cortex.

Medulla.

Sapor.



Hoc Pisum sic describit Alpinus: Est arbor fruticosa, sarmentosa, volubilis, Lablab modo seipens, ac altius se extol-

Alpini Descrip.

Faba.

Siliquæ semina. Corallioria annua.

Fructus Orob. Descrip. Clus.

lens, latiusque se expandens; foliis vel Tamarindi planè similibus, sed longè minoribus, mouentur etiam ad Solem: occidente clauduntur, totaque clausa manent, quousque Sol denud oriatur, quo tempore rursus aperiuntur. Flores audio ferè Phaseolis proximos, atque siliquas, quæ intus habent semina parua, rotunda rubra, dura, Phaseolis omnino similia, quæ Corallia planè æmulantur. Hic addit Honorius Bellus: Fructus figurâ Phaseoli non est, sed ovali, Orobati grani.

Clus. in suis Exot. aliam iconem proponit sub titulo Viciz Africana, de qua hæc scribit: Eius semina à natis Ba tavis à Guinea redeuntibus

magnâ copiâ subinde sunt allata, & ramulos cum suis siliquis, siue lobulis propendentibus, etiam mihi videre contigit. Sæpe porro istius plantæ femina terræ à me sunt credita, sed maxima ex parte non nata: imò [quod magis mirum] post triennium è terra eruta, ad eò incorrupta reperta, ac si pridè duntaxat lata fuissent. Semel tamen contigit, vt quæ recentia à Cl. V. Honorio Bello acceptam è Cretâ missa, terræ in hœtilli commissa nascerentur quidem: sed plantæ, licet omnem diligentiam adhiberem, vt conseruare possem, breui contabescerent. Prodigant autem illæ, Vicia, aut Lentis modo, duobus duntaxat crassifusculis foliis initiò, ipso videlicet femine bifariam se diuidente, & in folii formante, vrin Leguminibus accidere solet: inter ista vero folia nascebatur cauliculus sustinens aliorum foliorum alas, quæ ex multis foliolis contrario situ semper nascentibus constabant, denis; duodenis, aut pluribus, nullo impari alam finiente, instar Vicia siluestris, aut Lenticule: valde eadem est planta, quæ nisi sulciatur, procumbit, Pisorum instar; inter foliorum alas, quæ sarmentâ aut caules amplectebantur, satis firmi & oblongifusculi exoriebantur pediculi, sustinentes alternis denos, aut duodenos flores, Vicia, aut Lentis floribus [vt arbitror] non dissimiles; mihi enim eos videre non contigit, sed oblongum duntaxat pediculum rescotatum apud honestissimum virum Christianum Porretum, deinde anno 1602. alterum similem mihi donatum ab honestissimo Viro Petro Gareto. Istis pediculis inhærebant deni, duodeni, aut plures pediculi breuifusculi, satis crassi & rugosi, è quorum singulis graciliore, breuioreque adhuc petiolo dependebat siliqua rugosa, spadiceæ fortis coloris, vnciam, aut paulò amplius longa, semunciam lata, illaque aliquantulum plana, mucrone instar humuli curuò, internâ parte albi, in qua continebantur quaternæ, aut quina femina durissima, orbicularis ferè, vel ovalis formæ, profus rubra & nitentia instar corallii expoliti, quum probè matura sunt, summâ autem parte, quâ siliquæ inhæserant, omninò atrâ, & præ leuore splendens. Huic plantæ, Vicia Africane nomen indebam quia ex Africa eius femina semper delata memini. Cl. V. Prosper Alpinus lib. de plantis Ægypti, cap. 21. Abrus appellat, arboremque improprie [meâ quidem opinione] facit, quandoquidem volubilem, L. thlab [quod Phaeoli genus.] modo serpentem, latiusque se expandentem, esse scribit, & radicæ se conuolueat pingit. An Aloyf. Cadadamur Arborea quædam, quæ in regno Senegæ Faxiolos producant rubentes, cum macula nigricante, quæ est illis pro insigni, & à nostris oculus dicitur, alii hilum appellant. Phasioli autem, qui nusquam elegantiores videntur, instar nucis Avellanæ faberrimè facti sunt, dicetes torio aliquo inculptos ac stictatos, ad eò variantis naturæ ars in eis ludit, res visu conspicua,

Gesn. Pifa rubra ex nouo orbe allata. Lobel. Obs. & Ic. Coccineum Americum Pifum; An Orob. species: Pifa ex nouo Orbe delata, non delata, non decepta ex quadam arbore, vt quidam putarunt. Cæsalp. Santali rubri femina. Alpin. Phasiolus ruber, Abrus vocatus. Cam. h. Phasiolus Indicus; vulgò falso Peonia Indica vocatus: inisus est, Ginge & Abrus nomine. Lugd. l. 4. c. 41. Pifum Americum; Pifum coccineum, Americum. Eid. c. 12. Pifum Americum, Indicum. B. pin. Pifum Indicum 2. minus coccineum: Fabrum genus quod Ægyptiis Abrus, part. 2. Ind. or.

Nascentis
modis.
Folia.

Cauliculus.

Cultura.

Flos.

Siliqua.

Semina.

Vicia
Africana.

Alpin. re-
prob.

Pifa rubra.

Coccineum
Americum

Pifum.

Santali rubri
femina.

Phasiolus
Indicus.

Abrus.

c. 4. Et hic maior coccineus nigra maculâ notatus, reperitur. Accepi inquit Honor. Bellus, femina phaeoli ex Iemen, (ex Arabia felici quæ terræ communis felicissimè nata sunt, quæ ab Alpino sub Abrus nomine describi puto, licet ipse fructum non rectè [meo iudicio] descriperit.

Hæc ex Linchot. In vniuersa insula Madagascar, item in China, Phaeolorum genus quoddam crescit, quod Latini Abrus vocant; Malayensibus autem Conduci appellantur, & Iauanis Saga. Perelegantes sunt, parui, rotundi, nigra macula insigniti. Vtuntur iis tantum ad pondera, non ad cibum. Sunt enim sapore perquam amaro: quidam etiam arbitrantur venenosos esse.

Pifum Americum, coccineum, sæpius plantauimus in horto E. C. sed non genuit, sequenti interdum anno reperimus integrum. Frater mihi femina nomine Peonia Indicæ, & Phaeoli Indici atro-rubentis ex Creta. Accepius etiam Luteciâ cum denominatione Bois du Bresil. Plura femina huius etiam Parauio ad nos misit Saxonia. Datum præterea nobis est aliquando nomine Ginge Æthiopiæ, & Abrus Ægyptiorum, à Paludano pro Phaeolo Indico.

Hæc grana coccinea, nigra maculâ insignita; dura admodum sunt, diuque in terra latitant, quorum interdum Camerario prouenerunt rudimenta, instar Pisorum, sed ad frugem planta non peruenit. Semina vetusta nequeunt ulla maceratione vinci, sed recentiora intumescunt intra horas duodecim, vel citius, ac duplè sunt maioræ, colorem autem coccineum vertunt in sordidè purpurascens, quæ si degustare volueris, prehendes saporem Pisi nigri detracto cortice, ad eò sabaceum aliquid resipiunt. Miteuntur ad nos non inibus Ginge & Abrus. Affertent Alpino Phasiolorum gustum habent, Ægypti in iure elixis vesci contueuerant. Sunt verò præ cæteris omnibus concoctu difficiliora, ex quo stomacho maxime infesta sunt, statisque multis conieant & Hypochondriaci valde noxia obsecantur, paruum succum generant. Cæterum, quum diutissimè propter duriciem incorrupta maueant, serico filo trahentia, è collo moniliis instar suspensis, & Armillarum loco in brachiis gestari possunt, ad ornamentum; quod nonnullas nobiles virgines, quibus similia grana donabantur, interiectis paruis vniouibus facere obseruatur, nam non modò corallinos globulos natiui coloris elegantiam prouocant, sed etiam vincunt. Quidam teste Camer. perhibent utiiter adhiberi, in dentitionibus, febribus & spasmus puerorum

PISVM AMERICANVM SIVE

Abrus coccineum maius, compressum, maculatum & non maculatum.

Perelegantes sanè & visendi hi fructus, Abrus coccinei dicti veluti, degeneres esse videntur. Pisi maioris amplitudinem æquant, eamque planè, quam hic pictam damus. Duri sunt, ex rotundo non nihil oblongi, æquabili alioqui ferè circinatione, modicè compressi. Quorum alter miniatore diluatore tinctus, nigra maculâ saturatius rubente lineâ circumseptâ, tertia sui parte in ambitu conspicuus. Alter saturatiore coccineo rutilus, nitidus, & prædicto ventriosior, nullo nigro vestigio notatur: vtrinque verò lineâ pyritormi concolori, acumine versis gemens (quod vtri-

Pifum
Americum

Phaeoli
ex Iemen

Abrus
Alpinus
ror.

Abrus
Conduci
Saga.
vltus.

Am.
Venet.
Locus.

Pifum
Americum
Pifum B.
Siliannum

Dim
lat.
rupra.

Vires
vltus.

Stomac.
nuent.

vtrique exiguū) profero notabilis.

Pro descriptione & pictura mihi amicus noster Iacobus zuingerus qui se accepisse perhibet à Bembo Nobili Patuino. Interna inspicere haud licuit, quia noster non erat fructus. Phaseolaceum tamen esse non ambigimus.

B. pin. Pisum Indicum 1. maius. Variat fructus colore nigro, subfusco, variegato, umbilico commente.



fructus colore nigro, subfusco, variegato, umbilico commente.

PISUM AMERICANVM ALIVD magnum, bicolor, coccineum & nigrum simul, siue Phaseolus bicolor, Anacock dictus.

Fructus hic durus, qui dentibus infringi non potest, resistens etiam malleo, iniectus in aquam subidet instar lapidis, colore miniato ficuti Abrus, eleganti atque splendente, verum mediā ferē parte, in aliis vix tertiā: niger est, compressus, nec exquisitè rotunditatis, sed in oblongum vergens, cā præsertim parte, vbi umbilicus est. Hic diuersarum magnitudinum est, & formæ; magnus, qui Lupini semine duplo ferē maior; mediocris cum eodem æqualis terē, & parvus eodem minor. Est eis omnibus veluti umbilicus sublongus, quā parte adhærebat siliqua, vt existimamus. Apertis cum difficultate medulla est durissima ex albo flauescens: saporem notabilem non animaduertimus. Accepimus à D. Paludano nomine Phaseoli Indici, ab Ill. nostra Principissa, Da. Anhaltina Ducissa Wirtemberg, pro Faba Indica. D. Thomas Platerus exoticarum vestigator solertissimus dedit maiores & minores. Gener Cherlerus in suo itinere Anglico plures etiam attulit maiores & minores. Plantæ Phaseoli Iconem habet Clusius in Pann. vbi malè posita fuerat pro phaseolo Aegyptiaco: nam in Historia ablati phaseolis minoribus infra pictis ponit plantæ iconem pro phaseolos peregrino 1. siue lato albo, cum venis nigris: phaseolos pictos habet idem Clus. vt & Lobelius. Qualia autem sint folia istius plantæ, & qualis stirps, nobis non constat, nec scimus an aliquis annotari.

Lobel. in ic. & hist. Belg. horum meminit nomine phaseolorum rubrorum Indianorum, durissimorum: ac duo fructus ab eo figurè exhibentur, qui etiam describuntur. Londino accipiebat Clus. elegantissimum quandam phaseoli (vt arbitratur) fructum à Iacobo Garcto cuius iconem & breuem historiam, propter venustatem & raritatem lectoris oculis subicere volui, præsertim cum Phaseoli ex Indis Orisentali inscriptionem haberet. Is autem ponticā nuce paulo minor

est, in medio tumidior & puluinosus, lauis, splendens, durus, solidus, in aqua subdens, extrema parte (quā nimirum suæ vaginæ, aut lobo adhæsit) veluti diducto & hianti oculo supernè paulo clariore, & aquilino præditus, duobus duntaxat coloribus constans: superior enim pars ab elatiore rostellæ parte, quasi lineā ad alterius extremitatis infimam in fructu partem obliquè ductā, tota vtrinque atra est, Ebeni nigredine & nitore, inferior verò, omninò aurea, cui admixtam sit pauillum Minii, præmaturi Mali. aurei colorem refert, & vt altera nitet. Eius pulpam describere nequeo, cum confringere noluerim, vt pote qui vnicus sit, inter reliquos exoticos fructus etiam seruandus.

Pingit Clusius duos phaseolos, aut potius vnus duas facies sine planta. Ille verò in pann. duas etiam pingit facies phaseoli modo dicti cum planta, sub titulo quinti Aegyptii: verum ibi obseruandum errore typographico accidisse, vt sub dicto titulo tabella illa posita sit: phaseoli quidem Aegyptiaci icon & tabula est p. 727. sub titulo phaseoli tertii.

Hoc præterea notandum Clusium in hist. l. 6. c. 41. iconem prædictam ex pann. posuisse pro phaseolo peregrino primo, siue lato albo, cum venis nigris: verum abtulit phaseoli siue vici duas facies, quæ iuxta radicem erant pictæ, quæ respondebant nostro riso Americano, siue Anacock. præterea pann. pag. 732. depictum habet nostrum risum, sub titulo phaseoli Indici, nullā additā descriptione: in hist. tamen loco antè citato eam addit. Tandem in Exor. inquit Honeftus vir Walichius Syuctis anno 1599. de nauis quibusdam ex America reducibus fructum Anacock redemerat, cuius usum ipsi ignorabant: Erat autem phaseoli genus binis coloribus distinctum, rubro & nigro.

Item l. 3. c. 3. de hoc fructu sequentibus agit Eruditus vir Simon de Touar Hiltalentis Medicus phaseolorum tertium mihi communicabat, qui erat elegantissimus: illeque duorum generum, maior & minor, & magis orbicularis forma: color in utroque bifariam diuisus, nam mediā ex parte corallii instar rubebat, alterā profus ater erat, lauis & splendens. Similem, maioris videlicet generis, multos ante annos Viennæ Austria accipiebam, eiusque mentionem faciebam l. 6. in ea rariorum plantarum Historia, capite de phaseolo. Vtriusque porò generis anno salutis humanæ 1597 Londino accipiebam ab honesto viro Ludouico Miræo Cl. V. Matthiæ Lobelii Genero, ipsi à nauta quodam ex India reduce donatos, & afferente, in quibus tribus, aut quatuor maioribus in pollinem tritis vt ad vomitum prouocandum: è minoribus autem filo traictis armillas fieri aduersus Epilepsiam gestandas, arbitrati forsitan isdem facultatibus pollere, quibus æonia grana: sed ornatus potius causa gestari existimem, intelligebam autem, ab incolis appellari Anacock.

Taber. phaseolus Aegyptiacus Aegyptische fasefen oder Bonen.

B. pin. phaseolus Indicus 6. peregrinus ex rubro & nigro distinctus.

ANACOCK ACCEDENS PHASEOLVS totus ruber.

Gener Cherlerus ex itinere Anglico & Belgico attulit secum phaseolos de genero

Iconis tractus. Ipsi.

Maiores & minores. Descriptio

risum.

Armilla. Epilepsia.

Anacock.

Phaseolus Aegyptiacus.

(vt existimo) Anacook: sunt enim eiusdem forme, ventriosiores, maiores, quam staphylo-dendti fructus, ferè ouales, inæquales tamen. Color ruber, idem ferè cum Anacook, minus tamen viuus & splendens, nullà maculà nigrà, vmbilicus idem, sed maior, circulus etiam elatus, flauescens: durus est, & in aquam iniectus, fundum petit: hic fortè fuerit idem cum Phacolo Indico rubro Lobelii sine macula nigra, quantum nulla icon eum demonstrat.

Color.
Vmbilicus.

PHASEOLI INDICI RVBRI
durissimi Lobelii, cum nigra macula:
& alterum genus sine macula, al-
terum cum longa tenui macula.

1. Magnitudine & figura sunt fructuum staphylo-dendti, & oris eximii, rubore corallino, inuicta duritiei, altera parte lucente nigram maculam habentes, medullà præditi insigniter durà, sapore non ingrato. His non abhinc figura est secundum genus, paulò tamen maius, & oblongius: nullà nigrà maculà donatum, tantè etiam duritiei, & tam pertinacis, vt à Wenceslao Terceles satum semel in terra minime mutatum latuerit. Tertii generis Phacoli præcedentibus duobus maiores, colore rubro obsoleto, ex oblongo rotundi, utrinque nonnihil compressi, quemadmodum Castanea equina, quibus secundum longitudinem altero latere macula est nigra, longa, tenuis: medulla insigniter dura, sapor amaricans.

2. Phaselus alter ruber.

3. Phaselus ruber cum linea nigra amarus.

Medulla.

Lobel. hist. Belg. Roode seer harte Indianische Boonfens. Icon. Phaseli rubri Indici durissimi.

Nos hoc in loco priorem Phasiolum maculatum referendam esse ducimus ad nostrum Pisum siue Phasiolum bicolorum, magnum alterum.

B. pin. Phacolus Indicus 4. ruber, ex phæniceo croceus, & ex rubro spadiceus splendens. Nos de hoc non agimus.

PHASIOLVS, SIVE PISVM
Indicum, compressum, sanguineum,
Lupini quodammodo facie.

Descript. Magnitudo. Color. Vmbilicus.

Figura ex triangulari in rotundum vergit, ita tamen, vt utrobique ferè sessilis videatur. Magnitudo Lupini albi ferè est. Color corticis sanguineus, læuis, pulchrè splendens. Vmbilicus impressior, albicans, secus quem macula parua, nigricans, conspicitur. Accepimus ab Illustriss. Ducissa Wirtembergica. An idem sit, an tantum varietas nisi Americani magni iam antè descripti, pro certo non affirmamus. Habet tamen cum eo magnam adfinitatem.


PHASIOLVS INDICVS EX RVBRO
spadiceus, splendens.

Descript. Cortex. Vmbilicus.

Vncia trientem non superat, latitudine se-inunciali, modicè compressus. Cortice tegitur inter rufum & spadiceum medio, & ad Tannè Gallis dictum accedente, læui, splendido, vmbilico diluore, utrunque magno, per medià longitudinem eluato. Parte oppositè gibbà: Estque ex iis quoque quos ab Illustrissima Ducissa Wirtembergica dono accepimus.

Eius Escon antè tradita cum Icone Phaseli Indici parui maculati.

PHASIOLVS INDICVS OVATVS,
spadiceus, vmbilico albicante
breuiore.



fam Wirtembergicam, quæ senis, ideoque interius contemplari non fuit datum.

PHASIOLVS SANGVINEVS
ouatus Indicus.

Perlegans & exotica raritate spectabilis est hic phasolus. Vnciam ferè longus est, digiti parui crassitudine, figurà ouatà, colore sanguineo. Hylus latiusculus, atque niger per medianam ferè longitudinem excurrit. Dono nobis dedit D. D. Thomas Platerus Medicus, & naturalium solertissimus vestigator, ex Hispania allatum, ex India tamen primò inuectum esse, retulit. Eundem, cum iam figura nostra esset sculpta, communicauit nobis Illustrissima Ducissa Wirtembergica, itidem (vt ferebat) ex India sibi allatum, qui prædicto paulò compressior, in cæteris planè similis est. Anno 1605, gener Cherleus rediens ex Anglià & Belgio attulit similem fructum, utrinque compressum, vt cunctis visis, durum, splendens, qui iniectus in aquam subito siccabat.

PHASIOLVS INDICVS
ouatus niger.

Phasio Indico sanguineo iam descripto magnitudine, & figura ferè æqualis: colore autem variat. Nam totus niger est, & præ nigredine, atque læuore splendet. Hylus itidem niger, magnitudine, & postu, vt in priori. Estque etiam hic ex fructibus apud Illustrissimam Ducissam Wirtembergicam visis, quem aperire, cum terræ esset creditura, non licuit, ideoque nec interiora, vel saporem addere.

Eius antè habetur cum Phasol. Ind. ou. spadiceo &c. icon.

PHASIOLVS INDICVS FVLVVS.

Nostratibus Phasiolis latior est, vix tamen longior. Color fuluus est, & mustelinus.

Viniblicas magnus & longus, niger in area, ipso fructus cortice leuiter splendescente atque dilu-
tore, & quodammodo ex ruffo albicante consti-
tutus. Etiam hic ex iis est, quos apud Ill. Ducif-
sam Wirtembergicam descripsimus, referauit
pro satione.

PHASIOLVS, LATO, STRIATO,
sive radiato femine: alter punctatus,
cupula atro vircente.

Silique magnæ, late, compressæ. Semina vici-
ciam circiter longa, paulò minis lata, renis
formâ, in terminis regione sinuatâ, nigra, fre-
quentibus albis liris virgata. Huic similia alia
paulò minora, quæ licet radiata, siue virgata,
variant nihilominus dispositione radiorum.
Minoris huius generis, quod pictum in supe-
riore parte nostræ tabellæ paulò minus; quàm sit, misit insignis Medi-
cus Hercules Saxonia primariæ Cathedræ
Patauine Professor, is colore nonnihil var-
riat, qui atro rubens etiam radiatus. Sunt
nobis alia semina, quorum icon infima parte ta-
bellæ nostræ, quæ alba dici possunt, punctis ni-
gris guttata, maculisque rubentibus versicoloria,
a gemine latiore maculâ, ad, & circa extremum
cui capula expansa atro-rubente.



Clusius similem plantam sic describit: Caulis
statim à radice in aliquot oblonga sarmenta
diuiditur, lenta, vicinis stipites & virgula reli-
quorum Phasolorum modo amplectentia: in
singulis aliis terna folia vulgaris Phasoli foliis
similia, atriora tamen, ex eodem pediculo nas-
centia, extremo, (vt in vulgaribus) impari:
ex iisdem alis breues ramuli prodeunt, mul-
tis floribus vulgari haud ab similibus, mi-
noribus ramen, albis, vix in modum conge-
stis, onusti: quibus succedunt oblongæ siliquæ:
seu lobi, vulgaribus multò latiores, continentes
ternos, aut quaternos fructus, planos; communi-
bus Phasolis latiores, albos, sed multis nigris
maculis, siue venis, ab hilo in latitudinem ductis
elegantissimè depictos.

Clus. dicitur Phasolus primus siue Africanus,
Phasolus minor, varius, siue Purkicherianus.
Eò quòd huius fructum D. Purkicherus
primus in Pannoniam intulerit ex Neapolitano
regno delarum, singulisque annis coluerit
& eius genus vt dixi, conseruauit: quam ob cau-
sam apud rei herbariæ illius regionis studiosos,
Purkicheri cognomen indicum, & vt Phasolus
Purkicherianus nuncuparetur, obtinuit. Ante
multos verò annos similem planè mihi missam
memini, Phasoli Africani nomine: & ex Afri-
ga Italos primùm accepisse, verisimile est. Idem
Tom. II.

in Hist. Phasolus peregrinus primus. Item Pha-
seoli peregrini primi genus alterum.

Ponit quod animaduertimus, Clusius in Hist.
postrema, pro Phascolo peregrino primo, iconem
quæ est in Pannon. pag. 229. Phascoli 5. siue Ægy-
ptiaci titulo: verùm ex ea tabella ademit duo le-
mina, quæ infra separatim erant picta; pro gene-
re altero apponit figuram, quæ est in Pannon. sub
titulo Phascoli primi siue Africani: verùm noua
demonstrat, qua inredifferant. Icon autem pha-
seoli peregrini primi Clusii, est nobis in tabella
capitis Phascoli bicoloris, seu Pisi Americani al-
terius, bicoloris: in eo Clusium imitati sumus,
cùm nesciremus diuersam plantam à seminibus
bicoloribus appictis. Phasolum, qualem pinxit
Clusius, radiatum, qui etiam inferiore tabellæ
nostræ parte pictus est, misit Ill. Landgr. Guiljel-
mus, nomine Phasoli Americani: in descriptio-
ne tamen Clusii variare videtur: dicit enim al-
bum cum multis nigris maculis, aur venis: meus
potius dicendus niger cum albis venis.

Phasolus
peregrinus I.
De Iconibus
Phasolis
laru.

Phasolus
ameri-
canus.

Phasolus
Brasilianus.

Tab. repre-
henditur
Okendzier
Locus &
Tempus.

An Tabern. Icon. & Hist. Bresilgen Bonen
1. Phasolus Brasilianus primus. Nescimus, quam
inepam figuram proponat Compiler, quæ huc
referenda videtur, considerato titulo. An Tho-
mæ Hariot in hist. Virginæ Insulæ, Okendzier.

Clusio Georgius Purkicherus Pofoniensis in
Vngariæ Medicus primarius communicauit, eui
ad pergulam, aprico loco satus singulis annis frui-
ctum maturum dedit. Mihi deinde anno 1582. &
aliquot sequentibus, egregiè prouenerunt ali-
quot eius stirpis, quarum nonnulla lobos dede-
runt, qui matura femina protulerunt: interdum
etiam, quos ad maturitatem peruenire posse exi-
stimabam, ob Solis radiorum defectum, spem
meam frustrati sunt. Prouenit nobis in horto Ill.
F. C. Wirtemberg. folio Smilacis vulgaris, ex fe-
mine mæsto, ab Ill. H. Landgraue, cui (vt scrip-
sit) excreuit ad lanceæ similitudinem, sed tantum
horuit; nobis verò ad maturitatem ferè proue-
nit. Ab aliis etiam acceptum semen terræ com-
missum, aliquoties siliquas protulit; sed nunquã
femen maturuit. Si nanciscamur deinceps tem-
pestiuè in vase plantabimus, & sub rectum pro-
ponemus, donec exiliam in calefcere, vt exponi
possit.

PHASIOLORVM INDICORVM
latorum tres species, & Clusii latus:



EST nobis Phasoli Indici nomine à
Doctore Paludano datus, se-
scuenciali ferè longitudine, la-
titudine vici-
li, compressus:
cortice obtre-
ctus flauo, ruffo
colore variè in-
rer sparso, splen-
dente quidem,
sed non vsque
quaque lzui.
Hilum album
est longiuscu-
lum, area obscu-
rè rubrà cir-
cumdatum.
Huic quodam
Z

modo similem vidimus apud Illustrissimam Ducissam Wirtembergicam, sed minorem: quippe longitudine vnciali, latitudine vnciam mediam non multum superante, et dem compressum. Sed color albus erat, rubris tamen maculis interstinctus, cuius picturam ex ipso etiam fructu effictam exhibemus.

Color.

Similiter & tertium quendam apud eandem conspeximus, predicto magnitudine tantum cedentem, quantum is primo loco descriptus, compressum. Sed colore etiam variantem, quippe ex nigro & albo variegatum, ita vt insignis sinus, albicans, punctis fuscis aspersus, totam ferè fructus nigri longitudinem utrinque peruadat.

Locus.

Vt Clusius refert apud Monardem, Londini emit in Mercatorum porticu de Gallo Nauclero Phasioli genus, quod è Brasiliانا noui Orbis prouincia aduectum asserbat. Nostro vulgari maior est is Phasiolus, latiorque, nec minus colore variat: etenim nunc flavus est, aut omnino niueus, modo ater, aut purpureus, aut albis pupureisque maculis distinctus. De simili planta natum referebat, qualis Europea est, nostrumque saporis gratia & leuitate longè superare, si eodem modo decoquatur. Londini satum prouenit vulgari similibus farmentis & foliis, sed ad frugem non petuenit.

Icon.

Videtur nobis Clusius, primum nostrum Phasolum iam descriptum pinxisse, ac fortè eadem tabella album, de quo capite sequenti.

PHASEOLVS NOVI ORBIS
LATVS, TORSVS CANDIDVS SIMILIS HORTENSII AFFINIS.

Descriptio.



Synonyma.
Phasol. ex
Americana.

Americanorum Fabae, omnino alba, valde compressa, non striatibus latioribus & longioribus.

Locus.

Habeo ab Ill. E. C. missis ad Paludano, & deinde mihi cum hac inscriptione: Phasioli Brasiliiani, maiores: ex quibus nos curauimus depingendos cum duobus minoribus Lobelij eadem operà, ac etiam Phaseolos rubros Americanos, striatos, planos.

PHASEOLVS LATVS ALBO EX NIGRO
variis, angustifolius.

Descriptio.

SARMENTA statim à radice habet multa prodeuntia, Purkitcheriani, siue in ordine [Clu-

sio rariorum plantarum Historia] primi Phaeoli modo, quæ, licet eadem ratione vicinis pericis sese circumvoluant, non tamen adeò luxuriant aut altè assurgunt. Ad horum nodos folia enatecuntur terna, vt in aliis Phaeoligenicibus, multò tamen angustiora, Sexti [nobis Phaeoli latioris coloris regularum, cum striis per longitudinem nigris] foliis, quem Colonia apud Hoperti viduà conspicebat Clusius, non valdè dissimilia: ex horum alis emergebat digitalis lögitudinis cauliculi, paruos flores in vna modum congestos sustinentes, albos inuid, sed, vbi fenesunt, pallescentes: iis succedebant planæ, latæ que vaginæ, Primi [Purkitcheriani] lobis ferè pares, breuiores tamen, initò virides, quæ maturæ fuluescunt, semènque continent planum, Primi iam dicti granis minus, sed similibus coloribus albo & nigro varium, nunc in longitudinem extensis nigris striis, nunc confuso ordine sparsis maculis nigris maioribus, aut minoribus per vnitersum Phaeoli corpus: nonnunquam integro fructu nigro, vel exiguis albis maculis confusis, aut dimidià duntaxat ex parte. Florebat Iulio, & Augusto: semen etiam maturum præbere incipiebat Augusto.

PHASIOLI LATI, CANDICANTES
VIRGVLIS NIGRICANTIBVS NOTATI
secundum longitudinem, vel nigricantes: flore albo.

PLURIBVS farmentis assurgit, eiusdem cum peregrino iam descripto, [septimo Clusij] vel cum superiore longitudinis, quæ vicinis palis sese applicant, & eos scandunt: vbi se in ramos duclunt, adnascuntur folia, Primi [Phasioli latioris striato semine] foliis similia, terno numero, sed paulò minora: flores ex alis profert etiam Purkitcheriani, seu Primi, floribus similes, albos, vultate pallescentes, vna instat nascentes: quibus & planæ, vt in precedente, succedunt vaginæ, illis haud maiores, continentes bina, terna, aut quaterna grana, plana, superioribus magnitudine respondentia, non adeò candicantia, sed colore interdum exalbescente, aliquando nigricantibus virgulis secundum longitudinem, vel confusè notata, interdum toto etiam pæne fructu, vt in superiore, nigricante.

Numeratur hic Phaseolus apud Clusium in hist. Peregrinus oitauus seu emissa Pannonicarum stiptium Historià, alter, qui Viennæ Austriz, semine peregrè accepto, ipsi prouenit.

PHASEOLI LATI, MAGNI TOTI
ALBI, EXCEPTIS QUIBVS-
dam radiis.

PHASEOLVM hunc acquirebam, inquit Clusius, semine, quod N. V. Ioannes Boisot ex Hispanià acceperat, mihi communicato, natum, erat verò is fructus Purkitcheriano maior, sed totus albus, nisi quidam radij sparsi varium quodammodo fecissent: terræ creditum semen prodit, creuitq; Purkitcheriani instar, similibus farmentis, foliis, floribus, & vaginis, sed cum Æstas sublequeretur tardior, humidior, & frigidior, neque hic, neque alij, quos seueram, Phaeoli exotici, ad frugem peruenire potuerunt.

Est autem hic Clusij rariorum plantarum Hist. Tertius, siue ordine peregrinus nonus, lib. 6. c. 47. Phaeolus

PHASIOLI LATI, PRORSVS
NIGRI.

MULTI sunt ab vna radice assurgentes rassi, superioribus quidem altitudine aequales, sese circumvoluentes, ex viridi purpurascetes, nodosi, & geniculati, quibus adnascuntur folia, Octavi folus similia, secundum tamen articulationes, quibus connexa sunt, purpurascens: ex aliis etiam prodeunt digitalis longitudinis tamuli flosculos, superioribus magnitudine & forma, respondentes, vna quoque instar congestos, ferentes, sed quorum galea, seu cassis obsoletè purpurascit, bina lateralia folia, coloris sunt floridioris: his succedunt plana, lata, fusca & nigricantes vaginæ, semina continentens plana, Purkurcherianis, siue versicoloribus Africanis minorâ, per maturitatem profusè nigra. Quartus est Clusio Hist. siue ordine Phaseolus peregrinus decimus.



autem continuerat) distinguente predictus: ipsi verò Phaseoli longi, *Phaseoli*, semunciam lati, spadicei coloris & circa hilum fuscum candicantis.

Hunc autem Locus. lobum ab iis, qui recenter è Brasilia aduenierant, redemptum, Viennam Austriae ad me [Clusium] mitterebat, Richardus Garth, anno à nato Christo 1585, cum aliis quibusdam fructibus exoticis, quos sciebat me summa diligentia conquirere.

PHASIOLI LATI COLORIS
TEGLARVM CVM STRIIS PER
medium nigris.

VNDICESIMO Phaseolo nascendi modo & reliquis ferè notis, per omnia ferè similis: sed huius flores Decimi floribus valdè similes, paullo tamen dilutiùs purpurascetes sunt: fructus autem magis dilutè rubedine præditus, tegularumque colorem quodammodo refert, quem rarè per longitudinem nigrae striæ varium faciunt, aliquando autem plurimè totum prædant reddunt. Hoc genus mihi natum semine, quod communicabat Cl. Vir. Ioachimus Camerarius Inclitæ Reipub. Norbergensis Medicus primarius: reliqua fructu ex Hispanijs misso. Clusio ex sex Viennæ natis vltimus, est ordine hist. pl. duodecimus.



PHASEOLVS CAPOTILLO
DEL ALDANA, SPADICEI
coloris.

PHASEOLVS (inquit Clus. Exot.) peregrinus tertius, ab eruditissimo viro Ioan. Castaneda Medico Hispanensi ad me missus anno 1600. cum hac inscriptione: *Capotillo de Aldana*: semuncialis erat magnitudinis, lauis, spadiceique profusè coloris, exceptâ parte lupina, quâ suo lobo adfisse videbatur, durus & solidus.

PHASEOLVS NOVI ORBIS EX
ATRO PURPUREVS, AVT SPADICEVS compressus duum generum.

IN nigro relucet color glaucus aut purpureus, *Color*, longitudo vnciae minor, latitudo semuncialis; germen album, sapor leguminosus, Huius generis politior vnus, maior, minus rugoso cortice, & eo quidem spadiceo. *Sapor*. Ioh. Bauhino dedit Ill. E. C. cui miserat D. Paludanus nomine Phaseoli Brasiliiani.

PHASEOLVS BRASILIANVS
CVM SVO LOBO, FABA SPADICEI coloris, & circa hilum fuscum candicantis.

PRÆLONGVS (ait Clus. Exot.) erat biclobis: nam decem vnciarum longitudinem habebat, vnus autem vnciæ latitudinem, aut paulò ampliore: cartilaginea porò cute testis erat, quatenus dorso neruis à pediculo ad extremum lobum, secundum longitudinem excurrentibus, insignitus, fusci extrinsecus coloris, intrinsecus ex cineraceo candicantis, tenui quadam membranâ singulas Phaseolorum sedes (decem Tom. II.

PHASEOLVS AMERICANVS
MAXIMVS, LOBVS FABA OBSOLETÈ rubente, hilo longo, albo.

CLARISSIMVS Vir, D. Carolus Paludanus dedit Sereniss. nostro Principi, siliquam nomine Phaseoli Americani, ex breui, crasso, ligneo pediculo, palmum longam, vnciam & semis latam: cortice crasso, duro, externè fusco, internè albo. Secundum commissuræ longitudinem, veluti sulci aut costæ laterales duæ: est bivaluaris, & aperta se contorquens, sapore nullo insigni. Membranæ intus spongiosa, inter quas fructus

multi phasiolacei, vngue longiores, coloris obsoletole rubentis, videbantur nondum maturi. Hylus longus, albus, per longitudinem fructus, non eleuatus, neco est candore, qui in Leblab, eo etiam multo est maior: sapor fabaceus. dentibus facile atteruntur.

Sapor.

PHASEOLI RVBRI, AMERICANI, STRIATI, PLANI.

Descrip.

ROTUNDIORES sunt, quam Phaseoli magni, toti candidi, amant rutilantibus lineis striati, Porphyntæ marmoris instar, præcedentibus minores, non nihil rotundi, & plani, maiores, latiorèque Phaseolis vulgaribus: ex quibus aliqui oblongi sunt, subærulei, aut nigri, artificiosè stris albis variegati. Lob. Similes, si non eodem Clus. sic describit: Sarcineta altè etiam affurgentia, similia folia, & flores in digitalibus ramulis vix modo congestos, paruos, octau [Phaseoli lati candidi] generis lobis similes, in quibus semina terna, aut quaterna, plana, dilata rubedine prædita, quæ nigris venis, siue radiolis secundum longitudinem distincta sunt, nonnunquam magnis, vel exiguis nigris maculis confusè aspersa: interdum etiam vtrinque profus, vel altera duntaxat ex parte, nigra, emicantibus sparsim paruis rubentibus maculis, vt ex maiore aliquo *maxima* tornata videantur.

Disc. Clus. Sarcineta. Flores.

Semina

Lob. in hist. Belg. Ror Orenge ghemarbel de Boonen. Leon. Plant. Phaseoli rubri.

An Clus. hist. ex sex Vienaæ natis quintus, alias ordine Phaseolus Peregrinus vndecimus.

Leon. autè habetur cum Phaseolis lati striati &c. Icone.

PHASEOLVS SANGVINEVS, comptellus, vmbilico albo.

Descriptio.

ELEGANTISSIMUM hoc Phaseoli genus, exoticae suæ pulchritudinis exhibet notas. Totus sanguineus est, vulgari Phaseolo latior, multoque compressior. Per ambitum non nihil angulosus. Vmbilico in medio paruo, albo. A quo ad oppositum transectum obicitur, nec nisi Lynceis ferè intuentibus oculis, currunt venula, obfcuriores ex atro rubentes, quarum diuagatione in extremo nihil pulchrius conspici potest.

Vmbilicm.


Fruimur hoc ex liberalitate magni nominis Medici Patavini Herculis Saxoniz, vt & plurimorum aliorum, exoticae elegantia.

PHASEOLVS VVLGARI MINOR ET PLANIOR, SVBRVBO COLORE, foliis angustis.

Descriptio. Folia.


ELEGANS genus Coloniae conspicit angustis foliis Clusius, fructu vulgari Phaseolo minore & planiore, subrubro colore, ex Hispaniis accepto, *Frioles Guatels* appellatione. Quin Dodonæus eius descriptionem in suam novam stirpium Historiam intulerit, non dubitat.

Eidem hist. Phaseolus peregrinus, pericis & vicinis adminiculis sese quoque circumvoluens, cui terna ab vno pediculo folia etiam dependent, veluti Phaseolis, sed singula angustiora multo, ac



similiter nigriora: Siliqua breuior, plantiores, ac magis compressæ, pauciores fructus obtinent

PHASIOLVS LABLAB ALPINI.



Phaseolus niger, Lablab vocatus Alpino de pl. Aegypti est arbor sarmentosa, que

crecit ad Vitus magnitudinem, sarmentisque,

Vitis modo, extenditur, ac expanditur foliis,

figuraque similis est omnino vulgari Phaseolo,

florès ferè bis anno, Verè, ac Autumno,

Phaseolorum floribus aliquatenus similes,

quibus siliqua longæ, instarque Fabaræ latissimæ cernuntur,

quæ semina nigra, Phaseolis planè similia, continent, quorum alia nigra, alia subrubra cernuntur.

Hæc arbor viuut annos centum & amplius, perpetuoque vici. Aegyptiis frequens in cibis, nostrisque non minus suavis. Mulieres vtuntur decocto cum croco ad excitandos menses, præterea utilis ad tussim, & dispnæziam, & ad vrinam suppressam mouendam.

Clus. ab. Il. viro Io. Pinello duo Lablab genera à Prospero illi communicata accepit: vnum videlicet nigrum, vt quod descriperat in Pannonicis, alterum rufum: De Lablab autem quod affirmit Ptolep. Alp. viuut annos centum & amplius, est difficile creditur iis, qui Phaseolorum & leguminum naturam norunt.

Honor. Bell. in epist. ex Cydonia Cretæ ad Clusium Augusto mense scripta. Iulio nuper præterito ex Agypto semina accepit Leplap diuersi ab eo, quem in Pann. Clus. describit, quæ terræ commissa felicissimè nata sunt, maxima suâ voluptate: differt fructu, siliqua, coloreque: nam hic siliquas profert magnas, longas, latas, caulis

longæ, instarque Fabaræ latissimæ cernuntur, quæ semina nigra, Phaseolis planè similia, continent, quorum alia nigra, alia subrubra cernuntur.

Hæc arbor viuut annos centum & amplius, perpetuoque vici. Aegyptiis frequens in cibis, nostrisque non minus suavis. Mulieres vtuntur decocto cum croco ad excitandos menses, præterea utilis ad tussim, & dispnæziam, & ad vrinam suppressam mouendam.

Clus. ab. Il. viro Io. Pinello duo Lablab genera à Prospero illi communicata accepit: vnum videlicet nigrum, vt quod descriperat in Pannonicis, alterum rufum: De Lablab autem quod affirmit Ptolep. Alp. viuut annos centum & amplius, est difficile creditur iis, qui Phaseolorum & leguminum naturam norunt.

Honor. Bell. in epist. ex Cydonia Cretæ ad Clusium Augusto mense scripta. Iulio nuper præterito ex Agypto semina accepit Leplap diuersi ab eo, quem in Pann. Clus. describit, quæ terræ commissa felicissimè nata sunt, maxima suâ voluptate: differt fructu, siliqua, coloreque: nam hic siliquas profert magnas, longas, latas, caulis

longæ, instarque Fabaræ latissimæ cernuntur, quæ semina nigra, Phaseolis planè similia, continent, quorum alia nigra, alia subrubra cernuntur.

Hæc arbor viuut annos centum & amplius, perpetuoque vici. Aegyptiis frequens in cibis, nostrisque non minus suavis. Mulieres vtuntur decocto cum croco ad excitandos menses, præterea utilis ad tussim, & dispnæziam, & ad vrinam suppressam mouendam.

Clus. ab. Il. viro Io. Pinello duo Lablab genera à Prospero illi communicata accepit: vnum videlicet nigrum, vt quod descriperat in Pannonicis, alterum rufum: De Lablab autem quod affirmit Ptolep. Alp. viuut annos centum & amplius, est difficile creditur iis, qui Phaseolorum & leguminum naturam norunt.

Honor. Bell. in epist. ex Cydonia Cretæ ad Clusium Augusto mense scripta. Iulio nuper præterito ex Agypto semina accepit Leplap diuersi ab eo, quem in Pann. Clus. describit, quæ terræ commissa felicissimè nata sunt, maxima suâ voluptate: differt fructu, siliqua, coloreque: nam hic siliquas profert magnas, longas, latas, caulis

longæ, instarque Fabaræ latissimæ cernuntur, quæ semina nigra, Phaseolis planè similia, continent, quorum alia nigra, alia subrubra cernuntur.

caulis color purpureus, ad nigrum tendens, pediculi & netui foliorum eiusdem sunt coloris: flores plures vno petiolo inhaerent. Ab Alpino recte planta delineatur: sed flores valde differunt: nam non in fine caulium, sed e foliorum cauis exeunt longo pediculis plures, quasi spicatum, magni, figurâ aliorum Phaseolorum, sed colore atro purpureo, qui Italicè *Paumazzo* dicitur, Phasiolique ad rubrum tendunt nigris maculis insignitis, longo hilo (at niger) & albo.

PHASEOLVS LEBLAB NIGER ET SPADICEVS, HILO LONGO, ALBO.

EX Phaseolorum genere quoque est, quod *Leblab* barbarâ voce nuncupant. Magnitudine est Phaseoli vulgaris, cortice tegitur spadiceo, læui, saturè rubentibus punctulis asperso. Cuius ambitus partem tertiam cingit hilum eminentem, candidum, decoram elegantiam fructui concilians.

Cl. Paludanus *Leblab* nomine misit fructum, descripto iam figurâ similem, sed planè nigrum, & aliquantò minorem, & ad cuius hili inimum duæ maculæ flauæ conspiciuntur.

Est nobis *Leblab* genus quoddam totum nigrum, excepto hilo, itidem candido, eminenti, ac iam descripto simili, magnitudo prædicto æqualis. Huicque similem habemus alium, colore ruffo, plus minus diluto: est etiam colore serè rubro, nec non colore serè flauo. Dentibus faciliè atteritur hic Phasiolus: sapor eius leguminosus quidem, sed nobis valde ingratus.

Clusius Pannon. & hist. rar. de pingit & describit hoc Phaseoli siue leguminis genus, quod Paludanus misit, cui *Leplap* nomen inscriptum erat, his verbis: Siliqua breuis & lata est, quaternaque grana oblongiuscula, nigra, hilo nihilominus albo, admodum longo, prædita, continens.

Clusio aliquoties acceptum, & terræ, opportuno tempore, creditum, nasci noluit, respiciens fortè regionum Septentrionalium frigidiorum aciem. Sunt nobis siliquæ prædicti *Leblab*, quales pinguntur à Clusio, sicut & semina eorum ex diuersis locis missa, videlicet à Paludano, vt dictum, alia mihi data per D. Iacobum Zvingerum, & fratrem Casparum Bauhinum ex Creta delata. Verùm ea fuerunt simul mixta per incuriam. Basileæ prouenit *Leplap* in horto D. Itelii, simile caulibus & foliis Smilaci & Phaseolis vulgaribus, nisi quod folia multa, quaterna proferat. Gener Cherlerus rediens ex Anglia & Belgio ditersorum colorum *Leblab* attulit.

PHASEOLVS PEREGRINVS ORBICVLARIS, CINEREI COLORIS, TECTVS atrâ tenuique membranâ.

MITTEBAT ad me [inquit Clus. Exot. lib. 3. c. 14.] anno 1600. honestiss. vir Vvillhelmus Parduin Phaseolum peregrinum, qui lobo inclusus fuisse videbatur, planus, vncialis magnitudinis, orbicularis pænè formæ, medio tumidus, atque in binas partes diuiduus, cineræ coloris, atrâ, tenuique membranâ tectus, cui nulum nomen erat inscriptum.

Tom. II,

PHASEOLVS PEREGRINVS ANGVSTVS, NIGRICANS, ALBA, TENVI MEMBRANâ tectus.

PHASEOLVS alter peregrinus, Clusio [etiam in Exot.] missus, anno 1600. per Vvillhelmum Parduin vncialis quidem erat longitudinis, sed angustus, solidus & durus, nigricans, in binas similiter partes diuiduus, tenui quadam membranâ tectus, albâ, quæ in latere vestigium retinebat, quo lobo inhaerisse videbatur.

PHASEOLVS BRASILIANS VMLTIS, SPADICEVS, MAGNVS CVM MAGNO hilo nigro, plurimum ambiente

CASTANEA magnitudine est, orbiculatus, vnciali plus minus latitudine, puluinatus, cortice tectus rugoso, spadiceo, dilutiore, saturatiore, circa hilum verò dilutiore & serè albicante; cuius orbitam serè totam ambit, hilum pululum, culmum latum, sulco medio secundum longitudinem exaratum in principio punctum impressum habens.

Huius generis etiam alium dono accepimus ab Illustrissima Ducissa Vvirmbergica cuius hilum vtrinque emines, veluti crispitas habet simbrias. Anno 1598. Cl. vir Paludanus misit nobis pro Fabis Brasiliensis: quasdam etiam antè habebamus, non recordamur vnde. Icon nostra facta ad iconem, quæ est apud Lobel. in Iconibus, & Clusium apud Monardem. Faba autem facta secundum nostrum fructum.

An *Lobel*. & *Peña* in Adv. de hac aiunt, Faba (vel Phasiolus) quædam latissima & candida, compressæ rotunditatis, ambitu serè vnciam æquat, gustu, concretionè, & Phaseoli similitudine: hæc non deceptam ex arbore Phasiolifera, vt quidam putant, norunt amici quidam, qui seuerunt, legumenque non ita dissimile Phasiolo habuerunt.

Lob. *Öbl.* & *Icon.* Plant. picturam ac descriptionem Clusii exhibet simili titulo *Phaseolus Brasiliensis* à Brasiliensis *Macouba* vocatus, ex cineritio candicans. Tab. *Icon.* & *hist.* *Phaseolus Brasiliensis*; *Brestlgenbonen.* *Hist. Lugd.* *Phaseolus Brasiliensis Clusii.* Qui, cum Olysi ponè esset, quemadmodum apud Monardem perhibet, donatus est Phaseoli genere ex Brasilia Americæ provincie delato admodum recenti, pollicari latitudine, crasso colore rufescente, magno hilo, & parte extremâ veluti festili. Eiusmodi quatuor, aut quinque singulis siliquis prægrandibus continentur, qui recentes ex virentes adhuc tusi & impositi bubonibus venereis curantur.



Descrip.

Cortice.

Alim.

Icon.

Faba latissima.

Macouba.

Phaseolus ex Brasilia colore rufescente.

curtur: flore traditur ex rubro pallefcente: ipse quidem duntaxat iuniorem plantam vidit sibi semine natam, quæ foliis Phafeolo vulgari ferè similis erat, nisi quòd minoræ erant, & auersa parte hirsuta, præsertim tenetiora folia, & extremi caules tenui mollique lanugine fuluescente obsiti. Brasiliam *Macouna* vocant: similes planè, & colore, qui ex cinereo candicans, duntaxat differenter ex Mauritania delatòs idem Clusius vidit.

Colore cinereis.

PHASIOLI BRASILIANI MAGNI
VARIETAS, CINEREA, AVT EX
cinereo nigricans.

Descript.

Color.

Hilum.

Icon.

Locus.

MAGNITUDINE à prædictis non variat, sed paulò orbiculatior, nec minùs pulvinatus, corticeque scabrofiore. In colore & hilo præcipua varietas. Hi siquidem cinerei, aut ex cinereo nigricantes, haud interim secùs ac prædicti circa hilum diluiores. Hilum verò (esquiculum) facillè adæquat, utrinque modicè eminens, quod in illis non apparet: per medium item sulco, vel striâ cauatâ excurrente. Ad hili finem, eâ nimirum parte, quæ sessilis, ex hili proxima striâ transversa, iidemque cauata, tertium fructûs crassitiem exæquans conspiciuntur. Figura prædicti hæc quoque non malè exprimit, si, quæ in hoc speciatim euariant, excipias. Hunc natû sumus ab Ill. C. Vvirtemb. cui Paludanus miserat, ni memoria nos fallat.

Anno 1609. inter ea, quæ Gener Cherlerus adferebat ex itinere Angliano & Belgico, erat modò descripti Phafeoli siliqua, continens fabas tres: hæc siliqua similis erat siliquæ depectæ à Clusio pro lobo peregrino cartilagineo: vnciam quinque longa, duarum lata, colore fusco, cortice non duro, dorso insignita, vt illa, duplici crista cartilaginea & sinuosa. Verùm in eo differens, quòd habeat præter dictas cristas alias multas transuersales, quæ non traduntur à Clusio: nec in eius icone apparent: hirsuta quoque est, internè glabra, non nihil ex cinereo colore lucida, Mea in super siliqua destituitur pediculo, & Fabæ in siliqua pendente ex pediculo maximam partem ambiente eas, instar annuli: bene maturæ videntur, difficulter aperiri possunt, propter firmitatem nuclei, cortex exterior cinereus, vt dictum in descriptione internè niger: nucleus verò externè niger, internè albus, insigniter durus: sapor nullus insignis, nisi quòd videtur ad Fabæ vulgaris saporem accedere.

Horum meminisse videtur Clusius, vt videre est capite præcedenti, cum ait: Macounam ex cinereo candicantem ex Africa Mauritanie delatum vidi.

PHASIOLVS NIGRITARVM
COLORE FVSCO.

Descript.
Lobus.

Fructus

EX GVINEA AVTHORE CLVSIO Exot. de latu fuerat, Februario mense anno 1598. peregrinus hic Phafeolus, cuius lobus, sex, interdum septem, nonnunquam etiam octo, vt mihi referebant, vncias longus, penè binas latus, planus, sinuosus oris, cortice non valdè crasso præditus. externâ parte nigro, valdè rugoso, tumentesque, quâ parte Phafeoli inclusi, internè cinereo, cuspidè longâ & mucronata, dorso satis elato, in quo terni, aut plures fructus, quibusdam veluti



cellulis distincti, vt in reliquis lobis cartilagineis, vel membranaceis magna ex parte contingit, orbicularis ferè in plano formæ, vncialis magnitudinis, coloris fasci, & tanquâ annulo, siue circulo rotum penè ambiente. Ceterim hos lobos mihi communicabat Christianus Porretus Pharmacopæus Leydanus diligentissimus, qui à nautis redemerat. Plures autem huiusmodi Phafeolos non semel; sed aliquoties accepere memini, & anno 1597. & aliquot sequentibus accipiebam, eosque non vnus coloris, & omninò nudos, nulloque lobo inclusos. Quin & non valdè dissimiles anno à Christi natiuitate 1564. Vlyssipone nanciscēbar recentē ex Pernambuco Americæ allatos, spadice coloris tamen illos, & *Macouna* appellatione insignitos, è quibus anno insequente in Belgicam redux, aliquot mense Aprilis tertæ mittebari, quorum vnus duntaxat germinabat; & in binorum cubitorum altitudinem exercebat: sed quam ferens germinasset, ad frugem peruenire non potuit, & præmatura Hiems corripuit antè quàm illum floris etiam rudimentum dare posset. Huius porò, vt natus erat, iconem in tabella expressam olim dabamus scholio ad caput de Fabâ purgatrice; lib. simpl. med. ex Occidentali India delatorum, edito ab eruditiss. viro Nicolao Monarde Hispani Medico, quem tum Latino donabamus. An autem lobo huic simili inclusi fuissent, me latet, quoniam omnes nudos accipiebam: ab iis tamen, qui attulerant, intelligebam prægrandibus siliquis fuisse obductos.

LOBVS CARTILAGINEVS
EX INSVLA MAVRITII, PHASEOLO siue Fabâ nigra.

ANNOTANTE Clusio Exot. inter eas plantas quæ in insula quadam deserta, ad quam quinque Bataicæ naues, quarum Præfectus Wirbradus à Wirvic, anno reparatæ salutis humanæ 1598. appellebant, cui Cygnæ nomen Lusitanos primùm indidisse audio, Bataui verò à principe Mauritio, Comite de Nassau, Mauritii cognomen de dere, nascebantur, vna erat lobifera: nam eius binos lobos inde aduectos, ante maturitatem tamen lectos, biennio post, Wirbrando reduce, ipsius munere accipiebam. An verò planta, quæ similes lobos proferebat, in atborem asurgeret, an leguminis genus duntaxat esset, quosnam flores aut folia haberet, intelligere non licuit, quia ab illis acceptis, neminem eorum, qui in dicta insula fuissent, conuenire potui nec ipsum quidē Wirbrandum, qui lobos per suum famulum ad me mittebat: eam ob causam nullam ipsius plantæ descriptionem dare possum, præterquam laborum.

Erant

Erant porro illi lobi diuersi quidem longitudinis, equalis tamen latitudinis, non valde crasso, sed cartilagineo potius cortice tecti, eoque rugoso, quia immaturi, fusci coloris, breui, ruffaq; lanigine obducto, quam adhuc retinebat in lacunis, vbi atrita & deterla non fuerat, superna, & inferna parte veluti duplici crista sinuosa, & semunciam ferè lata, à pediculo ad mucronem vsque lobi producta, prædito: Phaeoleos autem continebant penè vnciam latis, orbicularis formæ, non tumentes tamen in medio, sed depressos, quia plenam maturitatem nondum erant adepti, in ambitu vndiquaque ferè veluti anulo cinctos, vt plerique similes Phaeoli, valde duros & nigros, nucleo tamen albo præditos, quo recente veluti licuisset, quia ingrati saporis non erat. Istorum autem loboium vnus, quaternas vncias longus erat, tresque Phaeolos continebat: alter ternas duos taxat, & binos Phaeolos habuerat: vterque autem binas penè vncias latus.



tus introspectetur, non item.

Eicor eadem cum ea qua lib. 3.c.68.

PHASEOLVS BRASILIANVS
MAIOR PICTVRATVS: ET
alter diluioie colore.

LOBVS PEREGRINVS CARTI-
LAGINEVS, PHASEOLO EX PV-
nico nigro tanquam annu-
lo cincto.

FIGVRA sunt oblonga, & ad circulem accederent, nisi segmentum, quod parte sessili ad circuli perfectionem requireretur, deesset. Magnitudine precedentibus superiores sunt, longitudine fescunciali, latitudine ab hilo ad sessilem leuiter sinuatam partem, vnciam facillè superante. Nec minus ventriofa videntur, quam prædictæ duæ species descriptæ. *Corticis* color spadiceus, per quem foliacea quadam emblymata sunt sparsa eleganti aspectu. Circa hilum diluioior, & ferè flauescens. *Hilum* nigrum quoque, sed angustius, & vix culmi minoris lantudinem adæquat, aut quàm in cæteris magis eminet. Eadem tamen ratione fructus ambitum comprehendit, sicut in iam descriptis, hoc est, ad partem sessilem vsque. Circa hili extremitate nec caput nigrum, nec striâ tranuersa conspicitur. Maior quoque inter vtrumque hili extremum distantia quàm in prioribus. Hanc habuimus ex fructibus à Paludano datis Ill. C. Wirtemb.

Huius generis vidimus etiam minorem apud illust. Principissam Wirtembergicam, & colore pallidior, seu diluioior, in cæteris ferè iam descripto similem.

PHASIOLVS BRASILIANVS
MAGNVS, TOTVS NIGER,
splendens.

CORTICE obtectus est duro, toto nigro, azui, atque splendente. In cæteris ferè, cum rubro splendente conuenit, sed eo paulò minor est. Hilus etiam totus niger tres seu quatuor partes ambit, ipsoque fructu latior est. Rotundus esset, nisi pars sessilis rotunditatem caueret. Illustissima Principissa Wirtembergica seuit, apud quam videre, describere, atque depingere datum fuit; aperire, vt pen-



ANNO 1599. inquit Clut. vt videre est in Exot. peregrinũ quendam lobum nancisebar, cui similem ante videre non memineram: propterea illius historiam peregrinè natis lobis adiungendam esse censebam.

Quatuor autem vncias cum femisse longus erat hic lobus, binas, aut paulò amplius latus, cartilagi-

neo potius, quàm duro & lignoso cortice constans, dorso in signitus duplici, veluti crista cartilaginea, & sinuosa, ad extremum vsque lobum protensa: rugosus autem erat cortex, & coloris nigri venis, quàm fusci: hec porro ea longitudine esset præditus, tres tamen Phaeolos duntaxat continebat orbicularis formæ, mediâ parte aliqua tulum tumentes, circiter vnciam latis, in ambitu ferè vndeque tanquam anulo cinctos, valde duros, & ex puniceo nigros. Quæ arbor, siue planta hunc lobum protulisset, quæve in prædica nasceretur, intelligere non potui, tametsi omnem diligentiam adhibuerim.

PHASIOLVS SECVNDVS NI-
gutarum, non magnus pro lobi
amplitudine.

ALTER lobus ex Guinea allatus, circiter septem vncias longus, fescunciam latus, quæ

Cluſius redimebat anno 1595. datâ cute teſtus erat, coloris cæternâ parte ex ſuſco cineracei (eiſus dorſum tribus æquus ſecundum longitudinem inſignitum, vt in plerique ſimilibus lobis) internè velut membranâ ſuſcultus, aliquot Phæſcolos continens non valdè magnos, pro lobi amplitudine, nigros, longo hilo ſiliquæ ſiue lobo inhaerentes.

Accipiebat autem hoc breuiorem eodem anno ab amplo viro Simone Parduyn conſule Medioburgenti in Walachriâ Zelandiæ. Et biennio poſt hiſ non diſſimiles à nauis Batauis ex Madagaſcar inſula allatos, Amſtelredami conſpicebat. Traditur hæc hiſtoria Exot. lib. 3. cap. 11.

PHASIOLVS PEREGRINVS
MAGNVS, COLORIS CASTANEÆ,
cum magno hilo, læuis



Deſcriptio.
Cortex.



pulpa in conſpectum ſeſe dat, ſuperficie quidem tenuis rari coloris, intrinſecus alba, dura, ſapore viciæ.

Deſcriptio.
Cluſius.

An Phæſcolus tertius Nigritarum, ex Guinea aduectus, quem Cluſ. Exot. lib. 1. cap. 11. hiſ verbis deſcripſit: Secundo [præcedenti] non diſſimilem, vnicuius cum ſemille longum octo, ſed neruis ſecundum longitudinem in dorſo excutren-



tibus magis eminentibus, interna autem parte nulla membranâ (niſi attuta ſuſſet) præditum, cineracei ex ſuſco coloris, Phæſcolos continentem ſuperioribus maiores, ſpadiciei coloris, nec hilo ad eò longo præditos, vt illi quos honoſtus vii Petrus Gareus, Iacobi frater, Amſtelredamo ad me mirtebat.

An Geſn. epiſt. tertium Fabæ genus ab Adol- Fabo pho Occone muſſum?

Lohel. Obſ. & Icon. Siliqua Phæſcoli Braſiliani. Sed videtur nobis hæc ſiliqua Lobeli non eſſe Phæſcoli Braſiliani: ſed Fabæ, de qua hoc agimus capite.

Iac. Theod. Tabern. Icon & hiſt. Phæſcoli Braſiliani tertii ſiliquæ. Schoten der dritten Bies ſilgen Bonen.

FABA, VEL PHASEOLVS INDICVS
MAGNVS, RYBFR, SPLENDENS.



APPRIME ſimilis eſt iam deſcripto Phæſiolo peregrino magno, coloris Caſtaneæ eundemque dixeremus, niſi color manifeſtè diſtingueret, leui interim quoque interueniente figura atque proportiohis diſcrepanciâ.

Vnicuius vnâ & ſemis adæquat amplitudine, quamvis circinata rotunditatis non ſit.

quippe parte vnâ rotundiore, alterâ latiore, compreſſus, & vnicuius mediâ vix craſſior. Hilum inſigne, ac nigrum, duas ambitus partes comprehendit, reliquâ parte tertîâ hilo vacuâ exiſtente. Cortex rubeus eſt, inſigniter læuis, ſplendens, ac ſubdurûs; quem aperire poteſtas non data ſuit, quòd Illuſtriſſima Principiſſa terræ committere decreuerit, apud quam vidimus, deſcriptum, de-
pinximus.

Eicon eadem cum eâ qua lib. III. cap. LVIII.

FABA INDICA, SIVE PHASIOLVS
MAGNVS, COLORE EX PHOENICEO
CROCEO.

PRÆCEDENTI iam deſcripto figura & magnitudo reſpondet. Sed ſuo colore variat: nam phœnicæus ex croceo, hic ex illo ita emicat, vt cuius luſtrum præualeat non temerè dixeris, concomitante pereleganti læuitate, atque ſplendore quàm in prædicto tamen multò inferiore. Hilum quoque non nigrum, ſed fruſtuli ferè concolor, quàm vis ſaturatus. Dono accepimus ab Illuſtriſſ. Duciſſa Vvitembergica.

PHASIOLVS SIVE FABA ARBORESCENS
ex Guinea, Paludano latiffima, ferè quadrata.

FRVETVS, quem miſit D. Bernardus Paludanus titulo Phæſcoli, ſive Fabæ arboreſcentis ex

Guinea, Purgaticibus noui Orbis Fabis compressior est, trium vnciarum latitudine, acutior ad hilum, opposita parte latus, & tantum non quadratus, longitudo secundum ciliatam: cortex Castanearum corticem crassitudine æquat, ex spadiceo nigricans, oblique striatus, amare scetem substantia

partes diffiliet, & illæ instar cornuum arietis sese contorserant, commodè fieri non poterat: sed ex alio simili iconem in tabella expressam hic subiiciendam curabam.

Eam porro iconem suis natiuis coloribus in charta eleganter expressam, seruata lobi magnitudine & latitudine, mittebat ad me anno 1601. doctiss. vir Franciscus le Clerc Montifaut Medicus Tornacensis, cum vno Phaseolo ex ipso lobo exempto. Lobus autem vnâ vnciâ minus longus erat eo, quem apud Tilmannum conspiciebam: nam eius longitudo nouemdecim vnciarum dicitur taxat erat, latitudo verò eadem cum illo, qui Tilmanni, circa pediculum tamen paulò angustior: color externus sulcus, quem crassiores venæ, siue striæ nigrae, à pediculo ad extremum vsque lobum secundum longitudinem ductæ exornabant, internus color ex spadiceo ad rubedinem tendens: ipse Phaseolus planus, niger, & splendens, illi penè similis, qui in lobo Tilmannico: quâ autem parte lobo adhaererat, paulò angustior illo mihi videbatur, deinde in latum se expandens. Vnde autem hunc lobum habuisset, non adscribebat.

Locus.

Lobus.



claudens, quæ situm iam in superficie contraxerat, penitus verò nigricat, & odorem ingratum spirat.

Eundem fructum do no nobis dedit Illustrissima Ducissa Wirtembergica, sed figurâ paulò variantem. Nam ad ouatam figuram quam proximè accedit, ac prædicto latitudine quidem cedit, sed crassitie superat. Cortex, & quæ intus latet substantia, cum prædicto eadem, sed paulò dilutior, fortè quia maturior: Nam in vniuersum prædicto est habitior. Conferant lectores historiam duarum sequentium Fabarum arborecentium Clusii: ex sanè cum nostris respondere videntur.

FABÆ ARBORESCENTIS LONGISSIMUS lobus, Phaseoli, lati, plani, spadicei.



VALIDE magnuse rat lobus, inquit Clus. Exot. Lugduni Batauorum conspectus apud Hericium Tilmannum Mercatorem, qui diu in Lusitania vixerat, eumque ex Guinea delatū affererat. Nam viginti vnciarū longitudine, duroque & crasso cortice erat præditus, atque rugoso, coloris externa parte nigricans,

et, & fuliginosi, internâ autem ferè spadicei (eam enim videre poteram, quia propter nimiam siccitatem, & calorem in binas partes cum strepitu diffiliet) continens magnos septem Phaseolos binas vncias cum semisse longos, secundum latos, valdè planos pro magnitudine, & minimè densos, coloris ex spadiceo nigricantis, & splendētis. Ipsum quidem lobum libenter in tabella exprimentum curassem: verum quia in binas

FABA ARBORESCENS, SIVE PHASEOLVS LONGE MINOR, PLANVS, RUGOSVS, spadicei coloris, neruo eminentiore.

Lobus haud dubiè inclusus fuerat alter Phaseolus, superiori quidem formâ non valdè dissimilis, sed longè minor, secundum videlicet tantum longus, vnciam latus, planus, rugosus, spadicei quodammodo coloris, neruo, qui eum ambebat, eminentiore, & in binas partes diuiduum esse indicante, vt Fabæ vulgares. Hunc Clusio, quem admodum ipse Exot. lib. 3. cap. 7. testatur, Paludanus ostendebat.

Descript. Phaseolus.

FABA ARBORESCENS, PHASEOLO plano, longo, nigro.



Phaseolū accipiebat Clus. libro & capite modò allegatis, à Cl. V. Paludano, Fabæ arborecentis appellatione; quæ ex Guinea delata esset, & ex simili lobo, qualis Fabæ arborecentis longissimæ, exemptus esse credebatur: erat autem valdè planus, binas vncias longus, aut amplior, secundum latus, eiusdem penè coloris cum eo, qui superiore capite descriptus, minus tamen nigricans, quia forsitan minus maturus, non minus tamen splendens illo.

Similem etiam, sed maiorem, crassiorem, & spadicei coloris nanciscebar anno 1597: in Madagal-

Locus.

Descriptio Phaseoli.

Alibi.

car infula natum, ab eis, qui illo anno ex Iava Amstelredamum redierant.

FABA ARBORESCENS, SIVE PHASEOLUS ONO COLUMBINO FERÉ SIMILIS, EXALBIDI COLORIS.

Descript.



Phaseolus, inquit Clus. Exot. qui lobo inclitus fuisse videbatur: diuisa erat eius forma, nam columbinum ovum feré exprimebat, longior vicia. ambitu lescuicium feré comprehendens, exalbidu coloris, cui flavi quidpiam circa extremâ partem, quæ lobo inhaerarat, fuliginosâ maculâ erat insignitus, laevis alioqui, & splendens, grauis, & ponderosus.

signitus, laevis alioqui, & splendens, grauis, & ponderosus.

FABA ARBORESCENS, SIVE PHASEOLVS NIGER, AD OVVM COLUMBINUM ACCEDENS.

Descript.

Phaseolum quartum (pergit Clus. lobo etiam comprehensum fuisse, non est dubium: illum ad me mittebat anno redemptionis humanæ 1597. ornatis. vir Iacobus Platau, rei herbariæ peritissimus. Erat porro crassiusculus, eiusdem penè magnitudinis cum superiore, totus niger, præter exiguam maculam subalbam, quâ procul dubio inhaerarat lobo, durus autem, & solidus, atque in aqua subdensens.

PHASIOLVS NOVI ORBIS, SIVE FABA PURGATRIX LAUSSIRA, CORDIS FIGURA.

Varietas Naturæ.



Coriæ.

Variæ magnitudinis purgatrices novi Orbis Fabas seruo, aliàs vnciarum duarum latitudine, aliàs lescuicali, vtrahibet orbicularitas feré, latiores tamen paulò, vti sinus paruus, quâ siliquæ adhererunt, cauas, digiti feré crassitudine, modicè compressas, spadiceo, duro, striatq. & lucente cortice intectas:



quod itrus cōtinetur, teste Clusio, album, sinum, & in duas partes natura scissile, vt sunt omnia phaseolacea.apore primū: quali feré sunt omnia legumina, sed illud linguam mordicante, & acris, quos si, ni fallor, vt purgandi facilitate sint prædita.

Fabam iam descriptam reperimus inter Valeradi Dourez selecta, cuius hæc erat inscriptio: Faba purgatrix, vel potius Phasiolus Peruvianus: Sunt nobis tres fructus, vnus sonat, alter nõ, tertius flaccidior, & compressior, qui immaturus videtur, quem habui ab Illustiss. E. C. missum à Bernhardo Paludatio, nomine, si bene recordor, Fabæ Brasiliæ.

Quartum anno 1605. accepimus inter ea, quæ Goner adferebat ex itinere Anglicano & Belgico, magnum, plenum, pulchrum, atro-durum, non foansem, sine nomine. Ad hæc anno 1608. tres alias purgatrices Fabas dono habui ab Ill. mea Principiss. Erant autem duæ nigre, compressæ, vtrinque feré plana, tertia coloris penè castanei, vnâ parte planior, alterâ gibbôla valdè, sinum cordatum minus demonstrans.

An Lobel. & Pena in Adm. de supra dicto loquuntur, dicentes: Phasiolos, siue Fabas perquam raras habemus, quas serunt repertas magnâ copiâ ad Cornubæ littora, & quod non parum mirum, eo loco nullam meminit vllus nauem illam, nullumve naufragium factum, & tamen quotannis nouæ inueniuntur, partim fluitantes, & partim effodiuntur immerse fabulis littoreis, quasi, vt putant Cornubiensis maris Anglici accoltæ, secundis Austris, aut Zephyris è nouo Mundo appulsæ fuerint. Tenebras, nobis quidem iudicibus, effundunt Aduersaria, quæ omnis generis ambiguitates & dubia continuo pariunt. Fabas perquam raras, sed quales rogo, quantas: describere fas erat, nefandum nudis incedere nominibus: nec enim his docetur quid res sit, sed per descriptionem ea tandem intelligitur.

Lobel. Obs. Icon. Plant. Phascoli noui Orbis,

Fabæ purgatrices Clusii. *Clusio* apud Monardem nascitur in insula D. Thomæ dicta, & cordis effigiem, vt vulgò pingi solet, imitatur: idcirco à quibusdam *C. r. D. Thome* nuncupatur. Eius obiter meminit Petrus Ciceri part. Chron. c. 12. Phasiolus maior Fabæ purgatricis nomine missus.

Ceterum silentio minimè premendam idem Clusius existimavit opinionem, quam Nortuagos de hoc Phaeolo habere intelligebat: illos enim prorsus sibi persuasere scribebat doctissimus vir ipsi amicus, matinum esse Phaeolum, atque idcirco in Farris insulis nasci inter Algam, & ex profundo erui, quin & sollicitos ostendete, quibus contineri nungantur, quum tamen nihil aliud sint (nam vnum quem mittebat, conspexit) quam ouorum *Rais* pilcis putamina. Ipsi à forma renes marinos appellant, nonnulli etiam *Bona fortis calenlos*; siue, quòd calamitate à domo possessoris, siue etiam, quòd incantamenta, & nescio quam noxam, ab heri pecore arce re vel propellere, credantur. Similem præterea cum suo lobo proponit capite octavo lib. 3. Exotic. qui non minus crassus erat (vt ex icone, quam suis coloribus expressam, eruditissimus vir Franciscus *le Clerc* Medicus Tornacensis ad ipsum mittebat, coniecturam facere poterat) quàm lobus, qui ex Wingandeaovy relatus, & hoc libro descriptus est: quem quidem lobum videre sibi non contigit, nihilominus eius iconem, secundum eam, quæ ad illum missa, in tabella secunda expressam adpositam hic volebat.

Is autem lobus non erat valdè longus pro eâ crassitudine, quam pictura, quæ ad viuum affabre expressa, referebat, sed quinque vnciarum longitudinem duntaxat habebat. binarum verè latitudinem, & duoque cortice constans, coloris ex cinereo fusci, de crasso pediculo pendens. Binos Phaeolos solummodò continuisse videbatur, quorum alterum cum ipsius lobis iconem ad ipsum mittebat, binas vncias latum, sese unciam longum, sumpta ab hilo, quo lobo adhaeserat, ad infimum fructum mensurâ, planum, medio tamen, aliquantulum extuberantem, lauem, coloris nigri & splendentis, quia perfectam maturitatem adeptus erat, aliàs ex fusco spadiceo: plerique autem omnes, quos videre Clusio contigit (multi certè, & quidem variâ magnitudinis per sæpè sibi sunt conspècti) cordis, vt vulgò pingitur, formam habebant, hoc est, eâ parte, quâ lobo adhaeserat paululum erant curvati, atque propter hanc formam, & quia in insula S. Thomæ (tametsi in aliis etiam Africa regionibus inueniri non dubitem) nascitur, & inde plerumque Phaeoli illi allati, *Cor S. Thomæ* à quibusdam appellatur. *Hec ex Clusio.*

Hos exhibet Iacob. Theod. Tab. ic. & hist. sub titulo: Phaeoli Americi purgantes, *Purgierend Bonen auß America.* Eisdem quoque *Hist. Lugd.* depingit, ac describit, vocatque Fabas purgatrices Monardis. An porro Fabæ vulgaribus similes, quarum meminit Ferdinandus Lopez de Castagneda *Hist. Indicæ* lib. 7. cap. 78. quæ vomitum cient, & alium valenter purgant?

Fabarum purgatricum solum fertile Carthago, Nomen Dei, & in insula D. Thomæ dicta. Sed Clusius in Africa etiam aliis regionibus inueniri non dubitat. Ceterum, vt Monardes præcipit, pellicula illa tenuis, quæ per medium illas intersectat, & caparum tuniculam exteriorem amulatur, vnâ cum cortice abicienda est, alioqui tantâ vehementiâ supernè & infernè purgant, vt in vitæ discrimen sumentem coniciant. Allandæ deinde

sunt, vt illarum actioma in fringatur, deinde in puluerem comminuendæ. Datur hic pulvis vino, aut saccharo exceptus, ad cochlear vnum, deinde haustus vini sumitur. Apud Indos hoc medicamentum celebre est, ob sumendi facilitatem: nam sine molestiâ bilem, pituitam, & crasso humores, multò lenius, & facilius, quàm superiora medicamenta [nuclei pinei cathartici, Auellanæ purgatricis &c.] purgant. Dantur in febribus diuturnis & importunis, in coli doloribus, & articulorum morbis. Dosis esto assatarum (quod cum in hoc, tum in præcedentibus obseruandum est, toreri enim singula præstat) à quaternario numero ad senarium, plurimum, aut pauciorum, pro ægri viribus. Caldè in secundo, siccè in primo.

Sumendi ratio.

Facultates

Dosis assatarum.

Temperamentum.

PHASIOLO NOVI ORBIS, SIVE FABÆ purgatricis latissimæ, variatio longior.

AB hilo, Descriptio

Quod eminentius est, nec sinum facit, ad oppositam partem duos pollices, cum dimidio est latus, longitudo duarum est vnciarum, sic, vt ab orbiculata superiorum figurâ non parum deficiat, color spadicæus, diluitor, lubricitas & nitor, vt videtur, maior, crassities par.



Vnde habuerimus Phasiolus noui Orbis longiotem non recordamur. In eadem opinione, Clusium in Exot. lib. apud Manardum cap. 49. huius meminisse, cum post traditam Faham purgatricem forma cordis, scribit: Illi similes, hoc est; magnitudine, & colore respondentem, sed longiore formâ præditos Phasiolos videre memin.

PHASEOLVS, MAGOVNÆ, SIVE Phasiolo Brasiliano similis.

Phasiolus Macouæ similis, hoc est; spadiceo nigricante, sed planiore, longioreque formâ; hilo non admodum magno, Clus. de fructibus peregrinis. Est autem ipsi, fructus peregrinus secundus, pag. verò 43; Phasiolus Macouæ similis dicitur, cuius ad epistolam Petri de Osma Nicelæ Mo-



Haba de India mylarga.

hardes inscriptam postremâ editione meminit, quique Diuo Maximiliano secundo Gesari ex Hispaniis missus fuit, Haba de India mylarga, id est, Fabæ Indicæ prælongæ nomine. Aqua morsus inum peuit. Jac. Theod. Tabern. Icon. Fructus peregrinus II. Eicon eadem cum ea qualib. III. cap. 46.

PHASICVLVS INDICVS BREVI SLIQVA tumida atque nigra.

Descript.

Inet alia naturalia præcipue raritatis, quæ D. Paludanus Illustrissimo ac Clementissimo meo Principi Duci Vvirmemburgico obtulit, est siliqua hæc Indica, vnciâ latior, longitudine duple, pulvinaris instar tumida, nigra, aut fusca, corticis Cassiæ fistularis in modum, modicis striis, rugosa, lucida. Ex cuius extremo altero eminet pediculi vestigium; Parte verò oppositâ angulus incurvus. Porro hæc siliqua in hypocausto collocata, & colore fauscens, in duas dissinit partes, quæ con- torquebantur instar reliquarum siliquarum leguminosarum; quæ tamen madesacta aquâ, facile in pulvinam figuram extendebatur. Colorê erant intus viridante, ipse verò cortex sibiria claudebatur albicante. Latébant iotus in siliquæ angulo fructus proprio pediculo hæretes, gemelli, nigri, laues, latitudinis parè circinata, compressi, vt cultri dorso non mul-

Color.



Icon.

Descript. Clusii.

tum sint crassiores. Saporem non addo, quod integri fructus terræ fuerint concedendi ab Illustrissima Ducissa. P. cura facta ad ipsam siliquam, sed paulo minor propter ligni formam.

Prædictus fructus à Clusio in Exot. depingitur, ac describitur, sub titulo lobi membranacei nigri. Erat autem hic lobus binas vncias longus, ynam laus, p̄orsus atq̄ coloris tumidus instar lobi Ciceris, nec formâ valdè illi ab similibus, maior tamen, membranaceo cortice satis duro cõstans qui præ siccitate debilebat, & conuolebatur, quemadmodum perit leguminum lobi, seminaque continebat bina, aut terna, nigra, circinata ferè rotunditatis, plana tamen (quod mirum in adeo tumido lobo) formâ non multum dissimili articulis lobi Acaciæ, non adeo tamen turgentis in medio, tenui admodum membrana tecta, eaque etiam nigra. Eum lobum cum aliis quibusdam exoticis, mittebat ad me Amstelredanò Petrus Garetus. Similes postea apud alios etiam videbam.

LOBVS QVADRANGVLARIS.

Descript.

Exoticum, inquit Clusio lib. 3. cap. 17. nec vulgare leguminis genus esse videbatur, semel

dun taxat mihi conspectum, quadrangulari lobo cõstans, quatuor crassioribus & eminentioribus neruis prædito, quadrantem longus, & circiter semunciam crassus, cortice satis denso, pro legumine præditus, eoque oblique striato, coloris ex fusco fuliginosi, septena grana continente quadrangula, in binas partes aliorum leguminum instar diuidua, quæ vetustate duritiem contraxerant. Hæc pauca de eo legumine ex eius notis apparentibus, & manifestis dicere poteram, quæ lectorem boni consultiarum arbitror.

LOBVS MEMBRANACEVS planus, niger.

Lobus hic omnino planus erat, alioqui formâ valdè similis superiori: binarum enim vnciarum longitudinem habebat, vnius latitudinem, extremitas paulò latior erat, color ex atro spadicæus. Willemus Paradyun, ab his qui ann. 1598. ex Guinea redierant, accipiebat, & mihi Clusio Exot.

Descript. Lobum. Color. Lucus.



lib. 3. cap. 16. mutua dabat, vt eius historiam describere possem, quia quum vnicus illi esset, ad se redire volebas, quæm adferuaret: porro maturusne esset, an immaturus, nihil pronũsiare quæo: sed quum lobum esse constaret, nec agitata strepitum ederet, opinio magis inclinât, cum antè maturitatem fuisse lectum.

FABA, CYAMOS LEGVMINOSA IN GÈNERE.



Opes ac diuitiæ Indiarum, Americarum, Africae, aliarumque exterrarum regionum in præcedentibus historiis de Phasolis ad nostras terras apportata fuerunt atque tradite: quid nostris ferat tellus nostris & peregrinis exhibere aggredimur & Cyamo exorisi, quem recentior ætas Fabam appellat, radicè partim est rectâ,

Fabam. Radix.

recta, partim serpente, strumosa, & fibris donata: ex qua caules surguntur duobus cubitis latiore solo altiores, quadrati, inanes; foliis aduersis, caesis, ex oblongo rotundis, ad vnam costam annexis: ex quorum alis flores oriuntur simul aliquotiu notis, congeneribus Pisis similes, quorum supremum solum vngue purpurascens albidum, striis purpurantibus pictum est, duolateralia in medio nigra, in ambitu alba, stamina occultans, colore est albo herbaceo: semen in siliquis magnis, crassis, carnosis, hirsutis, surrectis, oblongum omnibus notum.

Sed veniamus ad ea, quæ de hac Theophrastus alique Veteres scriptis promulgant. Is igitur hist. lib. 8. cap. 1. Numenti prima & maxima geneta duo tradit, alia quippe frumetacea, vt Triticum, de quo lib. 18. Alia chedopa, vt Faba Cicet, de quibus posthac agendum erit, Horum autem omnium generatio simplex, & vna est, quippe ex semine omnia exeunt, nisi quid raro parceque radice profluit. Ex leguminibus quidem Faba maturè serri potest: hæc enim suæ debilitatis gratia radices agere ante Hiemè desiderat. Sunt tamen, qui hæc serè anteant serere, si minus primis fatibus expedire poterint. Legumina quarto die, aut quinto, proueniunt, Fabis exceptis. Hæc enim intra dies plures etiã quam frumetacea exit, quibusdam enim in locis vel in decimo, quinto, aliis etiã vigesimo: hæc enim difficillimè omnium prouenit, & si, cum fata fuerit imber plus æquè successerit, vel prouentu omninò difficillima reddetur. Sed an ea, quæ tempore verno seruntur, celerius exeant, cogitandum. Caterùm germinando eadem ex parte radicem fundit, & caulem, quæ nimirum parte siliquis semen adnectitur, inque ea veluti principium quoddam germinandi haudquaquam obliturum: quod vel ad pendendi formam effigiatum sanè inspicere possit, vt & in Cicere, sed maximè in Lupino: his enim radix deorsum versus, solum verò, & caulibus sursum tendunt. Sed & multis foliis exit Faba, iusque rotundis, qualiter leguminum maxima pars, quæ radice singulari subnixæ, multos superinde ramos ex caulibus gerunt, Fabis tantum exceptis, quæ inter legumina sola potissimum: erecto caule consistit, qui geniculatus est, atque inanis, quamobrem culmus vocatus, ceteris leguminibus lignosior. Quot verò diebus hæc floreat, sic declarat idem Theophrastus: Leguminum floris diutina productio, atque inter cetera Erui, Cicerisque diuturnissima. Inter omnia verò Faba quidem summo deservit, & longissimo tempore floret: quadraginta namque diebus florere prodita est: sed alij, subinde alio atque alio emergente, florere assignant: particulatim enim florere aiunt, alij simpliciter referunt: flos enim spicatus confertim Leguminibus omnibus particulatim emergit. H. s. enim primum pars inferoia floret, quæ cum desierit proxima incipit, atque ita ad supernam itur successu assiduo. Hinc hist. lib. 7. cap. 3. hæc (intellige florendi modo) cum Ocymo comparat, scribens: Ocymum verò particulatim primum incipit, deinde cum ea desitorerit parte, florere superius incipit. Vnde fir, vt diutius istud floreat, quemadmodum Faba. Eam potè diebus quoque quadraginta perfici volunt: ita tamen, vt intra tantundem spatium temporis hæc florere, atque perfici natalit, cum cetera intra dies pauciores consummentur. Nunc in Leguminum genere, colorum, saporumque ratio differentiam facit. Candida siquidem in omnibus generibus

præstant dulcedine, vt Cicet, Faba, & alia generis eiusdem. Quæ, vt omnia Legumina, siliquis adhaeret, & veluti quoddam principium inde obtinet eminens, non concauum, vt Lupinum. Accidit imber post stationem superueniens omnibus præter sit, excipitur tamen ægè germinans Faba, quæ florescens præcipuè madescere cupit: ob id serè eam serere volunt (vt dictum est) quoniam diu floreat: sed postquam destituerit, parum omninò aquæ desiderari affirmant. Consummatio enim iam in vicino est. Hinc forte illud pulchrè subiungitur, quod de e. ul. lib. 4. cap. 14. memoriz prodidit: post si, rem etiam, si adhuc humida, tenellaque afflatu vehementer vexetur, facile perit. Dilatatur enim quod in his tenuissimum est, & conficta in se se expandit. Hanc ex ceteris nouale optimum præstat, quamvis frequens seratur, fructumque serat copiosè. Iam quod cultonibus situ perrecesserit, aquis fluentes huic magis prodesse, quam cælestes affirmant. Apud Philippos cum ventilatur, eius loci vento perflata, si coctu facilis est, fit difficilis. Et hoc sanè mirum, quod cum altis minimè molesta est, tum etiam tellurem raritatis suæ, ac putredinis causa stercoreate putatur. Ob id, quæ circa Macedoniam atque Thessaliam colunt, cum Faba floreat, arua inuertere consueverunt. Vermiculi etiam in Fabis, quæ quidem celerimè in leguminum genere erodunt. Midæ ab aliquibus dictæ nascuntur. Singula namque pro suo humore peculiare animal creant, cum secutis sc. imbribus calor repentinus humorem includit. Sed ita crosus, si credere nonnullis fas est, repleti posse affirmant. Caterùm Midæ, vt aliarum herbarum & fructuum Impes, dum alioienta sua consumperint, pereunt. Igitur ad hæc omnia tractum natura plurimum refert, nec temerè, iam enim cælum diuersum caliditate, aut frigiditytate, aut humiditate, aut siccitate constet: hoc autem fructus reddere, consummareque potissimè patet. Quapropter quibus locis fieri solent, non semper fiunt. Seminibus autem non vis eadem ad germinandum, ac referuandum vitique datur. Quædam enim germinant, consummanturque celerimè, & referuari egregiè possunt, vt Panicum, Milium. Quædam germinant quidem, sed non celeriter, reu Faba, & præcipuè, quæ facile percoquitur. Apud Apollonium maris Ionij Fabam nullo pacto erodi aiunt, ideòque seruandam reponi. Quin & circa Cizicum diu durare potest. Quod autem Faba tardi prouentus sit, causam assignat, crassitiem putaminis ambientis. Si præterea fata impluerit, adhuc multò tardius eam prouenire noster author scribit, quasi terra tunc pauimentetur, solideturque. Tertio, Quod verò Faba, & aliud quicquam ex leguminibus minus fructet, imbecillitati certè tribuendum hoc est. Qua de causa maturius hæc serere solent, vt priusquam (vt iam sæpius dictum) Hiems adueniat, radiceantur. Faba tamen adeò detrimentis multis est, frequenterque, obnoxia, vt quamuis maturè prouenerit, tamen perfici plerumque non possit. Imbecillitatem autem eius vel sensu percipere licet: est enim corpore solido ac inani: nec radice numerosâ subnititur, quas ob res à quauis causâ statim offenditur. Maturè igitur serere Fabam solent, quòd Hiemem anticipare debeat, quòd possit radicari, & simul quia imbrem in flore amet, quia laxa est. Inter legumina autem magis aruginem sentit, tum quia folia vndique gerit, tum quia densa seritur, tum quia fructum terræ proximè gerit.

Fabam
rigatam.

Quomodo
sunt cœm
difficilis
stercorat.

Vermiculi
Midæ.

Duratio.

Causa tardi
prouentus.

Faba imbrè
cultæ.

Maturè se
renda.

Frigo.
Frugis ut
ra præstet
m.

Putrescant enim inferiora potissimum, quoniam minus perfiantur. Interea tamen maxime rara, & fertilis flore, fructusque multoties parit Solo leui gaudet. *Ceterum non minus vilis, quam incunda agitur quaestio, quamobrem Fabae, vt & reliqua semina coctilia, aut incoctilia fiant. Vtrum ratione agri, an aëris, an certae affectionis: & omniāne, an aliqua tantum perdura effici possint. Fabis enim ac lentibus (inquit Theoph. de haul. lib. 4. cap. 13.) id potissimum euenire videmus. Fit sapè, vt & ager aliàs coctilia, aliàs & incoctilia ferat, tametsi eodem modo colatur: & ex continuis segetibus sulco tantummodo arcente, altera incoctilia, altera coctilia profert. Semina quoque aliàs ex incoctilibus coctilia proueniunt, aliàs contra ex coctilibus incoctilia, vt in exortu, germinatione, crassatione, copiā, bonitateque nihil interfit, vtrum coctilia sint, an incoctilia. Ergo de his, & si quid aliud possit huic quaestioni subiungi, primum illud dicendū, quod coctile, & incoctile, ad seruifactionē, resolutionēque atque (vt summam dixerim) ad nostri vltis rationem dici solitum est. Quod enim resoluī facile potest, & cocturā celeriter immutatur, id coctile est: contra quod resoluī, immutarique nequit, vel quit, vel quod aëre mutatur, hoc incoctile est. Tale autem sit vtrumque necesse est, si alterum rarum molleque sit, alterum densum, durumque. Sic enim alterum caliditatem, humiditatemque, quibus resolutio agitur, suscipere valeat, alterum nequeat, sed sua densitate, duritateque indomitum semper resistet. Cū igitur coctile, & incoctile ad hunc modum distingui deceat: animaduertendum, quibusnam rationibus ea ipsa eueniant. Simplex igitur, veraque ratio illa est, quam & inter primas disputationes reddidimus: quod alimentum causā hęc omnia faciunt, i. e. qualitate, quantitateque eius. Sic enim alimentum commutare nimirum potest. Euenit namque, vt quae in locis calidis, stercorosis, tenuibus, Solique expolitis sint, alimentum leue, atque facile habeant: itaque fructum rarum, mollemque praestant. Hac enim de causā non nisi coctilia sunt in Lemno, quia huiusmodi solum est: quippe omnino agrum eiusmodi coctilem quidam appellat, atque in eo coctilia coctilia volunt. Sunt & quae affert Aegyptus coctilia, soli, & aëris causā: calor enim coctilitati, atque omnino digestionem per necessarius est. Quapropter quae stercorantur, vicenis ferme diebus germinant. Quae igitur agro feruenti, leuique proueniunt, his de causis coctilia sunt: contra quae terra frigida, ipsa, lenta, & quasi sigulati, atque etiam praetensi, madida, & palustri exurgunt, omnia hęc incoctilia propter copiam, vireisque alimentum, & densa, duraque sunt, ex permissione tertenz, atque frigida partis. Congelatio enim & condensatio, ex eisdem, quibus induratio fieri solet: ex quo fit, vt locis palustribus, atque praemadidis, inutilia ex toto creentur. Nihil enim remitti in aqua possunt, quamobrem non nisi suum pabulo sunt. Has ferè causas tribuere solo debemus. Sed cū aquae quoque caelestis, & aëris qualitas alimentum augeant: idcirco imbribus incoctilia potius sunt, vt pote cū plūs alimenti, & crudius subministratur. Hoc enim idem propè solum quoque eiusmodi facit, & aër, si ea frigiditate sit, quae non flauis, sed aquatilis quaedam consistit: sic enim coaget, ipsiabitque. Cū igitur cause in hęc digerantur, nihil vt tat, quominus ager etiam idem, aliàs coctilia, aliàs incoctilia ferat, vbi scilicet pluuia, ac caeli conditiones non similes, sed*

aduersae incesserint. Etiam segetum, quas sulcus tantummodo dispergat, altera coctilia facere potest, siquidem solum diuersum sit. Vt enim in metallis, sic & in aruis putandum, venas spatari vicinas, diuersas inter sese, quae suis viribus differentias reddere possint, tametsi aëris idem status seruatur. Itaque interdum segetis quoque eiusdem aliquam talem esse particulam, patitur ratio naturae. Idem eueniet, & si aëris, flatusque frigiditas talis accedat, vt vel totum, vel pars conrescant: quod etiam in corruptione euenire videmus, cū alia diuersa, alia similia sint. & si qua in ipsis seminibus dissimilis habitudo sit. Infirmiora enim facilius affici certum est. Infirmum autem vel natura fieri possit, si quam mutationem receperit. Qua de causā nihil prohibet inter Fabas canlis eiusdem, alias coctiles esse, alias incoctiles. Idem & in eadem siliqua euenit, vt quidam referunt, si verè aunt. Etenim fieri potest, vt alia valida, alia inualida sit. Fabae infirmitatis argumento, vel illud potest deduci, quod sola mutare suum colorem videtur, vt nigra ex candidis efficiatur. Concretionem verò, condensationemque esse vi frigoris, quae incoctilia reddat, testificare illud quoque videtur, quod apud Philippos euenire Fabis solitum est. Flatus enim in eo loco vehementer frigidus est, & Fabae incoctiles plerumque efficiuntur. At si in paleis terrefactis in aëre relinquantur, nihil se mutant, sed incoctiles permanent: cū enim à paleis, tum suo mutuo contactu teguntur, simulque terra calore conseruantur. Contra si exaltentur, sublimisque capiuntur, flatus amplius valet, nulloque tegmine defendente, facile subit, atque coagit: tum enani dispoliat, tunc primum suis paleis, & calore circumplectente desituta, infirmissimae sunt. Magna autem commutatio mouere plurimum potest: sed si postquam tempus praeterit, & quasi firmius sibi iam constitit, diuertentur, nullam offensam ex flatu capiunt. Iam enim & putamen ambiens id robustius factum est. Incoctile autem effici, si diuini relinquantur sub diuio, vt quidam aiunt, ratio est. Plus enim, quam modicum sit, refrigeratur, simulque indurantur. Huic proximum quodammodo est, vt pluuia, quae protinus à satione secuta est, incoctilem reddat: quod enim in pullulando infirmam inuenit, rigere vehementissime facit: quod quidem ad cocturam, non ad exortum nocet. Nec temerè dixerim, eorum alterum abesse, cū vis illa in aliis, propterea eoque alia sit. Tum enim infecundum, & germinis sterile, vel difficulter autè leuicquam redditur, cū in itia generationis vruntur. Ex coctilibus quoque satis, iterum incoctilia fieri, ratio est, nam ab eisdem aduerso modo dispositis, non temerè facilitas percoquendi prouenit. Itaque si aër, aqua, & solum ita se habeat, quidnam cause sit, cur non semina quoque mutantur. Sin autem euenit, vt putamen coctilium remittatur, incoctilium obtundatur, vt quidam aiunt: & altera oscitate colorem suum immutent, altera minus, & solutiora cū demctuntur, coctiliora reddantur [etenim id quoque narratur] nihil absurdum: quippe obtentio illa duritiae concretionis, crassationisque est: quorum nihil inueniatur ab his est, quae sunt incoctilia. Et nihil immutari oris habitudo posse, illius sanè est, quod praeteritum, in domitumque possit persistere: aduerso autem reddi aduersum debet. Minus quoque in inesse resoluī, diuertit, concretionemque datur. Quod enim durum admodum est, resoluī haud facile potest: quod etiam in aetate euenit,

Quaestio qua ratione Fabae coctiles, aut incoctiles fiant.

Quid coctile et incoctile?

Coctile, rarum. Incoctile, durum.

Alimenti causa.

Locus calidus.

Ager coctilibus. Aer calidus.

Terra frigida incoctilia profert.

Locus palustris.

Imbres incoctilitatis causa.

Aer frigidus.

Fabae ad coctilibus, alia incoctilibus.

Pluuia, quae protinus à satione secuta est, incoctilem reddat.

Ex coctilibus quoque satis, iterum incoctilia fieri, ratio est.

rit,

ait, incoctilia fieri quidam dixerunt : sed hoc minus verisimile est : Solis etenim siccitas, et si inspidiora minus, suavia reddat, coctilia tamen nihil minus, sed magis potest efficeret. Ceterum si verum id etiam est, prioribus rationibus nihil repugnat : nec quicquam dissonat, si cum vetustescunt, incoctilia reddantur. Siciora enim sic quoque efficiuntur, tam ex aere circumfuso, quam exhalatione humoris interni. *Celerius quoque, magisque corrumpi, quae coctilia sunt, ratio exigit: duriora enim haec sunt, & proinde magis possunt animalia gignere. Concocta quoque eadem plenius sunt, quod etiam ipsum facit, ut celerius immutentur. Et haec dari praedictis rationibus possunt. Sola autem ex leguminibus, vel etiam ex omni frumentorum numero Fabam & Lentem incoctilia fieri falsò dici existimandum. Sed quod haec maximè experimur propter vsum sicquentem, hinc soli haec incoctilia dicimus. Ceteris item niòli frangentes uti solemus, his autem integris, quae certè non parua differentia est: etenim si attenuatis iis quoque uteremur, non aequè incoctilia esse percipiamus. Ceterum si quis illa tantummodò incoctilia esse contendat, nec istud irrationabile est: sunt enim ceteris fermè debiliora, debile autem facilius affici necesse est. Quod vulgarièr queritur, quàm obrem ea, quae cornu contingit, incoctilia fiant. Numquid istula omninò quaesito sit: lapis enim multò durior est, cui semina saepè occurrunt: & nullo minus incoctilia fient, etiamsi in cornu nihil offenderint, nec bobus aretur. Atque de his satis. Quemadmodum igitur ad coctionem, & omninò ad servationem incoctilia aliquid est, ita etiam ad exortum, germinationemque esse potest. Et hoc enim seminum imperfectio quaedam est, pariterque in omnibus evenit. Verum de his cogitandum amplius est. Validiora, vegetiora, suaviora, insuaviora, atque ad vsum cibarium meliora, deteriora, pro locorum natura redduntur, ut diximus: quòd siciora, spissiora, constantiora quoque procreantur locis montuosis, quàm planis, atque etiam magis, quàm pluviosis. Sunt enim illa spiratiora, & in vegetandis temperatiora: non enim cum semina plurima, crassissimaque eadunt, suavia quoque eadem esse necesse: sed alia opus est habitudine. Sarratio quoque plurimùm conferre ad suavitatem videtur. Iuavat & vegetiora demeti, humore namque vniuerso consumpto, eum ad cibum deteriora, tum minorà efficiuntur. Legumina vetò, ut melius legantur, vegetiora demetunt, arefacta enim defluunt.*

Plurima ex haecenus dictis, quae de Cyamo meò vobis tradidit Theophrastus, Plinius lib. 3. cap. 12. Fabae conuenienter tribuit, sic de iis scribens: Sequitur natura leguminum, inter quae maximus honos Fabae: quippe ex qua tentatus sit etiam panis. Lomentum appellatur farinae a [farina eius CH.] aggrauaturque pondus illa ex omni legumine. Iam vetò & pabulo venalis. Fabae multiplex vsus omnium quadrupedum generi, praecipuè homini. Frumento etiam miscetur apud plerasque Gentes, & maximè panico solidà, ac delicatius fracta. Quin & praesico ritu Fabacia [Fabaca Turn. & CH.] suae religionis Diis in sacro est, praevalens pulmentari cibo, & hebetare sensus existimata, insomnia quoque facere. Ob haec Pythagoricà sententià damnata: ut alii tradidere, quoniam mortuorum anima sit in ea. Qua de causa parentando vitique assumitur. Varro & ob haec Flaminem eam non velci tradit, &

Tom. II.

quoniam in flore eius litera lugubres reperiantur. In eadem peculiaris religio. Namque Fabam vitique è frugibus referre mos est auspicii causis, quae ideo *resina* appellatur. Et auctonibus eam adhibere luctuosum putant. Sola certè frugum etiam ex ea repletur crescente Luna. Aqua marina, aliaue falsa non percoquitur. Virgilius eam per Ver feri iubet, circumpadanae Italiae ritu. Sed maior pars maius alt fabalia mature sationis, quàm trimestrem fructum eius. Namque siliquae, cauleque gratissimo sunt pabulo pecori. Aquas in flore maximè concupiscit: eam vetò deflorunt, exiguas desiderat. Solum, in quo lata est, laetificat stercoreis vice. Idè circa Macedonia, Thracia, etiamque, cum florere incipit, ventent a uua. Nascitur & sua sponte plerisque in locis, sicut Septentionalis O. eam in silis, quas ob id non i Fabarias appellant. Item in Mauritania siliculis passim, sed praedura, & quae percoqui non possit. Nascitur & in Aegypto spinosa caule, quae de causa Crocodili oculis umentes resurgunt. Longitudo caelo quatuor digitorum est, amphissima crassitudo. Nec genicula habet, molli calamo. Simile caput Papaveri, colore roseo. In eo Fabae non supra trinas: folia ampla: fructus ipse amarus, & inodorus Dal. Sed radix perquam lauta incolarum cibis, cruda, & omninò decocta, harundinum radicibus similis. Nascitur & in Syria, Ciliciaque, & in Torone Chalcidis lacu. Circa Philippos Ateram non [Ateramum CH.] nominat in pinguis solo herbam, quae Fabae necatur: Teram non, quae in macro, cum vdam quidam ventus affluit.

Exsarapici sur.

Fabalis

Stercorat.

Locus.

Caule spinoso. Scapuri.

Fabae magnitudinem exprimit multorum fructuum ad eam exillationes. Theoph. Terbinthi semen, magnitudine Fabae esse sibi, similiter & Loti, Vitis Ideae. Taxi deoique fructum, Fabae minorem affumit. Plinius Tithymal. Paralysia fructu, magnitudine Fabae esse ait. His iungit Aristotelem, qui & ipse animal. lib. 6. Fabae magnitudinem expressit his verbis: Pullus ab incubitu decimo die totus perspicuus: oculi capite grandiores, qui Fabis [vrayon] maiores. Et licet Aristoteles ita sentiat, antiquorumque Fabulae, siue Fabellae pusillae sint, tamen non ille nostras è Fabarum censu amouent (inquunt Aduer. Loh.) ut Dodonae placet: sed id nos docent, eorum Fabam fuisse minorem, quàm hodierna, nec tamen specie diuersam, sed congenerem, & potius fructu, magnitudinis, figurà, quàm plantae natura, temperamento, aut lineamentis distare. Nam Theophr. & Plin. Fabam, qualis nostras est, describunt caule recto, & vrico, solamque inter legumina ut plurimùm culmo tradunt, & multis locis Diof. caulem Fabae quadratum dicit, & florem Fabae Perychmeni assent. Sed id euenire, quia variant magnitudine, colore, effigie latiore, compressiore, tereti, rotunda. Et frequentissima hodie Fabae nostra maior, rarè vspiam tamen nisi lata prouenit, serunt quippe in serobillas paxillo depressas. Quare ut non est difficile nosse istam vulgarem Fabam, maiorem, longiorem, minusque rotundam esse, quàm Antiquorum Fabae fuerit, sic etiam Phasiolum, Dolichimum asserere, neutiquam licet per eosdem auctores. Altera Fabae, quae minor, non multùm videtur abelle à Graecorum Fabae, Venetiis vulgò *Faba menada* dicta. Lob. Obs. Fabae maior recentiorum, *Bona* siue Phaeolus Diof. Dodonae. Is etiam meminit Fabae maioris, coloris ex rubro purpurantis. Ic. Pl. p. 57. Tom. 2. Teut. 65. Tom. 2.

Dodonae re. preb.

Faba veterum minoris quidem sed non demersa.

Phaeolus non est, nec Dolichus.

Faba menada.

Quod quidem eorum opinio planè reicienda

Aa

da sit, qui Fabam non esse, sed alterius nominis legumen, nimirum Phaeolum esse prodiderunt, confirmat Hist. Lugd. dum dicit. Dicit mihi quosdam aliquis, paruum, illud nigrum, quod summa Fabæ adhaeret, & quod hulum dicitur, in quo alio legumine, quam in Fabâ nostrâ reperitur? Nam quod in Americo Pisco, Indicône nigrum spectatur circa germinis exitu cauum, atra nota est impressi cortici, non verò laciniosum hulum, quod integro cortice anelli queat; vt in Fabâ. Quæ verò de Fabarum formâ, & magnitudine spatim apud auctores leguntur, & quibus illæ à Fabis nostris differunt, tanti non sunt momenti vt sententiam nostram possint conuellerè. Nam diuersis in terris maiores & minores producuntur, & cum crescere incipiunt, & cum perfectæ sunt.

His adde Had. Iunium, qui etsi Rombertus approbare nitatur, Phaeolum Veterum, *καρηνος*, esse vulgarem Fabam, agrè tamen persuaderi potest, cognitionem leguminis tantopere in vñu mortalium semper habitæ, ita prorsus abolitam, atque ex animis hominum erasam, vt nunc demum velut relictum ab inferis, aliam nomenclaturam reuocare necessum sit, itaque bonâ Romberti veniâ, cum maxima doctorum turba, receptam vbiq; temporum, prærogatiuâ, vocem seruabit, dum omnium consensu veritas obtinuerit. His metitò subscribit Turn. dicens: Nos cum Germanis ab annis multis Græcorum Cyamon Fabam vocamus. Verùm Tragus contrarium probare conatur. *Βόνα* vñtra radicem habet singularem, [vt Fabâ Theoph.] caulis est rectus, quadratus, concauus. [Diosc. de Clymeno cum Theoph. l. 7. c. 2. idem Fabæ tribuit] folia rotunda, flos lugububus notis pictus, [de Fabâ Plin.] semen non conuenit: Galeno multis locis Fabâ rotunda, nostrâ *Bona* oblonga est, nonnihil compressa. Huic obiectioni si respondeo, facildè soluerentur rationes Tragi & aliorum. Haud facildè in his regionibus semen, quale Galenus describit pro Fabâ, inuenias, cuius planta notâ habeat ab aliis scriptas. Quòd si *Bona* nostrâ non sit Fabâ Veterum, ostendat mihi quispiam, quod genus leguminis in Italia, Hispania, Angliâ, Germania, aut Galliâ sit Veterum Fabâ: Tragus Cicerculam veram [siosi incognitam] putat esse Fabam Antiquorum. Sed cum Cicercula non sit rotunda, nec recta surgat, sed obliqua, nequit esse Fabâ. Habet etiam Cicercula folia oblonga, cum Fabarum folia, auctore Theop. sint rotunda. Amatus & Dodonæus, adiuu rationibus Tragi negant *Bonam* esse Antiquorum Fabam, sed quale legumen sit, non indicant. Ita nobis Fabam auferunt, sed nihil ei substituant, quod fecit Tragus audentius, quam doctus. Ex istem duo *Bonam* volunt esse Faselum, Sed *Bonam* non esse Phaeolum, ex ipsius Dodonæi verbis probò, qui scribit Faselum esse Phaeolum Dioscoridis. Sed Phaeolus non nisi adminiculis adiutus surgit: suis tamen viribus stat *Bona* nostrâ, non est ergo *Bona* Faselus. Galen. quoque de alim. fac. c. de Dolichis inquit, Dicere possit quis omnia hæc, Eruias, Cicerculas, & Phaeolos vnum esse genus, verùm pluribus nominibus appellati. *Er paulò post*, de istem scribens, ait, siue hæc, vt dixi vnum genus, siue vnus generis differentia sint. Attamen scribit Theoph. Cicerculas & Eruias, obliquè, non rectâ surgere, instar Fabæ. Siue igitur Faselus idem sit cum Cicercula & Eruiâ siue eiusdem generis, vt scribit Galenus, tum crescet Faselus obliquè, vt reliqua duo, quæ auctore Galeno, solo nomine differunt. Ergo cum *Bona* no-

Radix singularis
Caulis rectus
Flos
Folia rotunda
Obiectio Tragi.

Bona nostra
Faba Serapionis.

Cicercula non est.
Amatus & Dodonæus notantur, & Tragus.

Bona non est Faselus.

stra rectâ surgat, Faselus esse nequit. Præterea inquit Galenus Faselum medium esse inter flatulentas & non flatulentas, At *Bona*, vt ait Dodonæus, citans Dioscoridem, est flatulenta. Cum ergo inter flatulenta & non flatulenta, mediò modo se habeat Faselus: *Bona* autem tam sit flatulenta, vt Cumino addito opus habeat ad flatus auferendum: *Bona* Faselus esse non potest. Miror interim Dodonæum citare Dioscoridem de facultatibus Faselis, cum nusquam eius meminerit, nisi Dodonæus Faselum & Phaeolum pro vno eodemque recipiat. Quod si faciat, miratur sum subit, cur duobus capitibus distinctis de Faselis & Phaeolo agat, si vnum & idem sit. Miror etiam, eum facultates Fabæ Veterum tribuere *Bonæ* Faselis, quas nemo Faselis tribuit, nec tamen Fabæ Veterum nomen etiam nostræ *Bonæ* concedere. Neque enim Galenus, neque quisquam alius dixit Faselum conferre inflammationibus, testiculorum, & mammarum afflicti. Sed & Gal. & Dioscorides eas vires propriè Fabæ Veterum ascribunt. Quare videtur Dodon. inuitus, quatenus Fabæ Veterum facultates nostræ *Bonæ* concedit, *Bonam* nostram facere Fabam Veterum. Ex rationibus supra dictis perspicuum curat, *Bonam* nostram nec Phaeolum esse, nec Faselum. *Iam Tragi & afflictorum eius rationibus respondeamus.* Quod ad Fabæ crescendi tarditatem, non alia mihi videtur responsio opus, quam ipsius Theophrasti: satis enim respondet eodem loco, his verbis: Sed an ea, quæ tempore verno serantur &c. Pimo de radicem multitudine, in responsum est à Theophrastente: Fabam plures non habere radices. Quod ad Fabarum secunditatem Piro memoratam, ascribendum tertè secunditati: vnde Agricola vir sapiens si tribit Veteri pondera & mensuras ex granis & leguminibus non posse restitui, propter eorû diuersitatem ex regionum diuersitate. Quod ex Diosc. adducit de Fabæ rotunditate ex cap. de Iuniperò in nullo emendato codice nec latino, nec græco inuenitur. Si quis textum Dioscoridis secundum Serapionè obiciat, non alio argumento melius probauerim Fabam non debere esse rotundâ, quam ipsius Serapionis verbis, ita scribentis: Quædam reperitur, cuius fructus est paruus sicut Fabâ, nisi quia ipse est rotundus. Videtis hic Dioscoridè, vt citat Serapio, Fabam non facere rotundâ. At enim bæcas Iuniperi minoris paruas esse instar Fabæ, nisi quòd rotundæ sint, non vt Fabæ. Quod ad rationem de Fabarum rotunditate, ex Galeno deducam, respondeo aut Galenum siam Fabam sub legumine aliquo comprehendere, quod nos pro Pisi genere accepimus, quem admodum censent quidam apud Diosc. sub Fabis contineri Pisi, quoniam nulla Pisorum apud Dioscoridem facta mentio: aut certè eius Fabâ in hac nostra Europâ, nisi multum fallor, non reperitur. Plinius Pisi facit quadrata: secundum eum igitur nostra Pisi alba, rotunda, aut sunt Galeni Fabæ, aut Cicera alba, quæ Plinius rotunda alba facit, Cicere arietino minorâ. *Hæcenus Turnerus.* Quâ porò autoritate fretus Fabam tam audacter *Bonam* vocet hæcenus haud constitit, nisi, vt ita dicam, Germanismo sultus, idiomatè que Alematico abusus, vt alius doctor videretur, nomenclaturam nouâ hanc excogitaret. Si *Bona* & Fabâ diuersæ sint plantæ, cur differentiam veram non ostendit cur non vtamque diuersis descriptionibus & iconibus expressit?

Faba (iustit Hermol. coroll. 328.) græcè καρηνος vocatur ad differentiam Ægyptiæ. A. Gelus &

Bona flatulenta.

Dod. res.

Respon ad obie nes T

Diosc non facta emda

bulum.
ramon.
amon.
qui err.

Pytha.
e.

na.
hi.

no.

li.

no.

no.
nec
thio.

no

no

& Festus Fabam etiam Fabulum appellant. Alter Theodorus Teramon, & Ateramon sive Aterâ non apud Theophrastum accipit, pro coctibili sc. & incoctibili, non autem pro herbis ita nuncupatis, vt Plinius. Theophrastus certè alio loco facillè significat, veriore Theodori, quàm Plinii sensum fuisse. Ateramna vulgò legumina Græci vocant, inobsequiosa & contumacia, quod genus seminis etiam Cerasbolon vocatur à Platone superstitiosa origine, quasi sterilia & irrita proueniant, quæ per boum cornua ferendo cecidissent in terram. Interdictum esse Pythagoricum cibo Fabam miscere inualuit opinio contra verum, sed venerem intelligi demonstrat oportere Gellius Totâ Insulari & Liguria recentes Fabæ, vendentium voce, nuncupantur *Baianas*. In Etruria & Latio *Scaphyrtum*que origi em habet eruditam: Nam & *Baianas* Apicius appellat, & *Scapos* Fabarû Plinius.

Scribit Cord. in Diosc. Cyamum Græcos, Latinos *Fabam* vocare, Germanos *Bonen*, de quo non opus sit dubitare. Differre Fabas secundum colorem & magnitudinem. Describit autem in hist. lib. 2. triplicem differentiam cap. 162. *Fabam vulgarem satam, Fabam nigram minorem: & cap. 164. Fabam nigram maiorem.*

Tragus, si quis *Bonen* (Fabas) ad Phasiolos Dioscoridis referat, cum eo minime contenderit. Setapio (ait idem) cap. 116. *Mes*, & fructum eius *Robilias*, nigras habere maculas scribens, videtur mihi, quod verisimilius sit, fabas nostras geminicas intellexisse. Quarum alia [inquit cap. 14.] sunt magnæ, alia exigue, ex his quidem alia rufæ, alia candidæ. Vulgates agrestes Fabæ, tres, aut quatuor, quæ maiores plerûque binæ, drachmæ pondus æquant. Nostræ Fabæ descriptio, quam Germani *Bonen* dicunt, ei minime competit, cuius veteres rei herbariæ scriptores meminere. Phasiolos potiùs, quàm Fabas, sive Cyamos, apud Dioscoridem vocatas sentio. Fabæ apud Auc. *Narbatibus*, Serapioni verò *Hachille* dicuntur, Hebræis *Pol* Ezech. 4. Mirari satis non possum, Barbarum & Manardum, & alios plerisque à Fabis adeò abstinuisse.

Matth. in comm. cum magnis icon. Lat. & Ital. & ep. p. 182. Fabas *rubras* alias asserit magnas, alias paruas, subrotundas alias, alias cõpressas & alias colore albicantes, subrutilas alias, alias subnigras. *Anguillara* tradit solum magnas, paruas rubras, nigras, albas. Gesn. de hort. albas, & rubras. B. L. lon. per Fabam Ægyptiam intelligit Fabam veram, edulem, natam in Ægypto. Videtur illi, Galenum etiam intellexisse lib. de alim. de Fabis communibus, vbi de Ægyptis loquitur.

Fabam denique appellant [vt nobis auctor est Dod.] *πύραρον*, vnde *πυραρον*. Athenensium festa Apollini sacra, quibus *πύραρον* [Fabæ & legumina] coquebantur, à quibus rursus mensis, quo hæc celebrabantur, *πυραρον* nuncupatus est, qui ferè cum Octobri conuenit. Nominantur *πύραρον* etiam testiculi: quòd sint, vt *πύραρον* patendi autores. Ab his Cyamis abstinentium Pythagoram præcepisse plerique interpretantur. Quo symbolo eum detestatû aiunt rei veneræ vsum, non autem esulentarum Fabarum.

Faba fressa, aut fressa *βερβυ* grecè appellatur, aut *βερβυ* & Fabæ fressa farina *βερβυ* *ἀλευρον*. Fabæ Græcis *φασίλιον*. Diosc. etiam Phasioli, Lat. *Faselii*, offic. & vulgò dicuntur, Germ. & Belg. *Bonen* Phaselus maior, aut *Faselus* satius maior. Belg. *Grotte Bonen*. Altera potest dici *Faselii* minores, *petite Fene* Gallicè. *Brabant. Zenssch Boonens* & *Peerden boontens*. Fabam vulgarem non esse Cyamum demonstrat: in Hist. frugum, &

in fol. Bonamior vt plurimùm candida, subinde ex rubicundo colore purpurascens, semidrachmæ sepe numero pondo. Hanc veterum Græcorum *κίβητος*, ac Latinorum *Fabam* esse non solum officinæ, sed omnes passim crediderunt, qua in re à veritate absunt. Dioscorides Ægyptiâ *Fabam*, vulgarem Græcorum magnitudine superare tradit: quæ tamen & ipsa parua est, Bonæque longè minor. Pendet enim Ægyptia Fabæ auctore Galeno semiobolum tantum. Bona verò semidrachmam, i. e. obolos integros tres, sæpè complet. Bona igitur non Fabæ, sed omninò altius nominis videtur, *Faselii* sc. quem Græcorum complurimû *φασίλιον*, ac Diosc. *φασίλιον*, Smeon *Σηθί φασίλιον* nominant. Phasioli autem Diosc. idè sunt cum Phasiolis à Galeno, in lib. de alim. facili appellari. *Bonam* germ. dictam, veterum Græcorum & Latinorû *κίβητος*, Diosc. *κίβητος* esse, dicitur nullus locus superesse videtur. Minor *Bonam* colore alia subalbicans, aut subflaua. Facundum admodum legumen, quod maiore multitudine foliorum & florum, siliquarumque numero superat: alias n. gra. *Brabant* vñ cùm Flandris, Hollandis, Zelandis, ac aliis finitibus vulgò *Peertsboonen* hoc est, *Bonam* equinam, & *Klein boontens* paruas *Banas*, appellans, platrique etiam *Zeusche boontens*, Zelandicæ *Bonas*. Est verò hæc *Bona*, Phasiolus quidam, & potissimum ille, quem Diosc. videtur solum nouisse. His & alijs rationibus, si Diis placet, firmissimis, quibus Dodon. vulgarem, veriorè que sententiam non tantum infirmare, sed funditus euertere frustra se torquet, quid respondendum sit, ex antè dictis clarè elucefcit.

Faba semen est, vt apud Cæsalp. legumis inter legumina maximum, & quòd maus, eò magis in longitudinem depressum est: minora autem tundiora sunt, & modicè oblonga: color alia albicans, alia niger: rubras quoque Fabas ipse vidit. *Fabas*, Theophrasto, Plinio, Varrone, Galeno, Dioscoridi. Plura antè ex Plinio, & Varrone.

Schun. Faba maior, *κίβητος* Diosc. Faba maior satua, *Groffe rote Bonen* / *Zeusche bonen*. Faba minor, sive rubra *Klein rote boonen*.

Pro Faba, Vicia aliquod genus venus exprimit Petr. Crescentius.

C. *Banb.* apud Matth. Faba. *κίβητος* à fertilitate, inter legumina maximum: Sunt vt plurimum candidæ. Sunt nigrae, & ex rubicundo colore purpurascens, & flores aut candidi lituris nigris conspici, aut ex purpura nigrescentes: satua est maior, & minor, Fabillam *Gelbo* & *Fetto*.

Had. lun. Faba fressa Plinio nominatur, quæ contracta est, *βερβυ* Al. *Gewelte Bonen* Belg. *Gestoten* est *gecapte* / *ost gemalen bonen*. Fabæ tunica, *concha Fabæ* Scribon. *Valuatus* Columel. *opercula mentum*. *λέπος, σήμια, πόνος* Nicand. *θήκη* Aristoteli, *λέπος* *λέβητες* Helychio, *λέπος* Apollonio. Gall. *La gousse*. Siliqua, folliculus. Colum. cõcha, *valuulus*, à valuis simili operculaturæ, non autem à vallo, vt Nebriffensis putat. Theca generaliter, quæ vestiuntur legumina. *λέπος*, *καρπίς* Theophrasto. *θήκη* Aristotel. Fabæ oculus.

θήκη Arist. Umbilicus Fabæ, vbi bifores Fabarum valua committuntur. Fabæ scapus, fabalis stipula Onid. *καυ* de *πύραρον*. Al. *Bonen stengel* / *bonenhalum*. Belg. *Boonstroof* / *bonenstangel*. Fabæ *hilum*, Nigrum in summa Fabæ. Belg. *fward* bande *Bonen*. Gal. *Le noir de la Fabeue*. It. *Il nero della Fava*. Hisp. *El negro de la Hava*. *Fabalis* Plin. *Fabago* Cat. *Fabaginum acus*. *κυσθήκη*: quilibet & purgamenta Fabarum. Belg. *fcau* bande *bonen*. Lomentum, satina sabacea, *λέπος*,

Bona non
Faba sed
Faselus.
Bona minor.

Bona equina,
Bona Zelandica.

Faba maximum legumen
Faviscus.

Petr. Crescentius error.

Fabullum,
Faba fressa.

Siliqua.

Faba oculus.

Faba. Germ. *Bonen* mel/ vt & Belg. Gal. *Favine* de *Febues*. It. *Farina di Fava*. Hisp. *Harina de las Hansas*. Conchis Martialis, Iuuenali, *Faba* cum corticibus suis elixa. Germ. *Bonen die man vnz gemelt* Kocher. Belg. *Vngelpelde boonen geecoof* Gall. *Febues bouillies avec l'esforce*. Ital. *Fave bollite con le sue gascie*. Hisp. *Hana cozida con sic correfa*.

Nomina linguar. *Faba* vulgaris, *vicia* & pleiisque Herbariis, Germ. *Bonen*, Belg. *Bone*, Gall. *Faves*, *Febues*, *Fabue*. Ital. *Fava*, *Fabè* verò recentes & virides, *Baccellu*. Hisp. *Hansas*. Ang. *Braves*. Boehm. *Bob*. Hung. *Bab*. Arab. *Hachille*, *Haballe*, & *Bachale*.

Aequiuoca. *Cyami* nomine, *Fabæ* complures apud Herbarios inueniuntur: vulgares quippe, magne, albz, & putpureæ: parua, albæ & nigrae. *Lupinum* eleganter terendit Auicenna lib. 2. cap. 451. nisi quòd illic *Fabam* *Aegyptum* affirmat. Quæ eadem cum *Colocasia* Diosc. à Plinio scorsim traditur.

Locus & Tempus. *Fabam* in locis validis, non calamitosi feri præcipit M. Cato. Tempus assignat Varro, & Palladius. Huic circa septimum Idus Decembris feri potest. Nam post exactam brumam malè seminatur. Illi optimè feritur in *Vitig* barum occasu; & quidem modii quatuor in iugero, sed nonnullis locis paulò amplius, aut minus si enim locus crassus, plüs; si macet, minus; quare obseruabis, quantum in ea regione consuetudo est ferendi, vt tantùm facias, quantum valet regio, ac genus terræ. vt ex eodem semine aliubi, cum decimo redeat, aliubi cum quinto decimo, vt in *Hetruria*, & locis aliquot in *Italia*. In *Sybaritano* dicunt, etiam cum cehesimo redire solitum. In *Syria*; ad *Gerada*, & in *Africa*, ad *Dyrtychium* itidè ex modio nasci centum. Illud quoque multùm interest in rudi terra, an in ea secas, quæ quotannis obrita sit, quæ vocatur *restibilia*, an in veruacta, quæ interdum requirit. Cui *Agrius*. In *Olynthia* quotannis *restibilia* esse dicunt, sed ita vt tertio quoque anno, vberiores ferant fructus. *Licinius*. *Agrum* alternis annis relinquii oportet, aut paulò leuiores sationibus serere, i. e. quæ minus sugunt terram. Dicitur, inquit *Agrius*, de tertio gradu, de naticationibus, atq; alimonis eorum. *Licinius*. Quæ nata sunt, inquit, in fundo alescunt, adulta concipiunt, prægnantia enim sunt, matura paritum poma, aut spicam, sic alia simile ei, à quo profectum est, reddunt semen. Itaque si florem, acerbùm ve pirum, aliudue quid decerpseris, in eodem loco, eodem anno, nihil renascitur, quod prægnationis diem bis habere non potest: vt enim mulieres habent ad partum dies certos, sic arbores ac fruges. *Faba* & legumina in oleariis vasis obrita cinere perdũ in eolumia coætuantur.

adseruatio. Ceterùm *Dodonæo* feritur maior in agris & hortis, fleret Aprilis ac Maio mensibus & particulatim quidem ac diu: fructus Iunio ac Iulio ad maturitatem peruenit. Minor feritur in agris & frequentius apud *Zelandos*. Ego autem *Fabas* vidi florentes *Montspeli* mense *Februario*, & *Florentia* mense *Aprilis* esui aptas. *Geneuæ* mense *Maio* & *Iunio* florentes, maiores & minores, nigras & albas. *Basileæ* itidem obseruam florentes mense *Maio*, & *Iunio* aptas esui, solentibi maiores habere albas & putpureas; vel rubentes, hales etiam vidi in *Wattviler* *Alsatia*; *Montbelgardum* *Basileæ* curam vtiusque coloris adserendas & ferendas in *Horto* Ill. E. C. vultgò solent habere minorem albam & nigram.

Antequam verò *Vites* & vsum aggediamur, scito, quòd *Fabarum* *arrosor*, dicunt, qui in creandis magistratibus sua vendit suffragia; & quibus hinc questus est, *Fabæ* *vicitare* dicuntur. *Fabibus* *vicitare* etiam dicitur de Homine qui sordidus est, & qui pte nimia parsimonia quousci bos esitat, vt impensis parcat.

Iam verò facultates etiam, quas *Fabæ* Veteres tribuerunt, annotandæ veniunt. Hippocrate igitur auctore, *Fabæ* aluum sistunt, & inflant: quia meatus aliud insuper accedens alimentum non suscipiunt. Aluum sistunt, quia toram alimentum facem habent. *Fabarum* putamina [inquit Theoph.] arborum radicibus aut germinibus apposita vitam penitis tollunt: non tamen omnibus, sed iis, quæ nuper profuere, vt pote imbecillioribus, quia suã duritiã, siccitã teque, alimentum partim trahendo, partim arcendo auferunt: alimento enim destituta protinus moriuntur. *Faba* græca (pergit Diosc.) status ac ventos gignit, ægè concoquitur, graui somnia inducit. Tuli tamen comoda est, & carnes gignit, medium inter caliditatem ac frigiditatem obtinens. Cocta verò cum posca, & vnã cum cortice in cibo accepta, dyenterias & alui profusa cohibet. Sed & ad vomitus in cibo idonea est. Minus autem in flatum aquã de coctura diffusã. At viridis, & stomacho magis incommoda est, & magis flatuosa. *Fatina* *Fabæ* tum per se, tum cum polenta imposita, inflammationes ex plaga mitigat, & cicatrices concolores efficit: & mammæ gumfos lacte turgentes, ac inflammationis iuuat, & lac extinguit. Cum melle verò & Fenugræci farina, surunculos & parotidas, & sugillata dicitur. Cum *Rosa* autem, & *Thyre* ac oui candido, oculis proidentes & staphylomata ac tumores ipsorum reprimunt. Eadem cum vino subacta, confusiones & plagas oculorum sedat. *Faba* ipsa sine cortice commanã, ad fluxiones sistendas fronti imponitur. Et cocta in vino, testium inflammationes curat: & ad pubem puerorum imposita, impuberes ipsos diu conseruat. Extent item vitiliginis. Ad cortices *Fabarum* impositi, cutillos pilos graciles, ac tenues renasci faciunt. Cum polenta verò & alumine scisso, & veteri oleo impositi, strumas dicitur. Et ipsorum decoctum lanas tingit. *Faba* decorticata in duas partes diuisa, quã parte ex natura coaluit, ad sanguinis ab hirudinibus eruptiones imponitur, ipsaque cohibet, si secundum semisectam partem apponatur.

Fabæ, vt memorie prodidit Gal. lib. 7. simpl. med. in exsicccando, & refrigerando secundum vtunque ad medium temperamentum propinquissimè accedunt. Caro *Fabæ* paulùm quid abstergentis facultatis continet, sicut cortex nonnihil adstergentis. Idcirco Medicorum nonnulli totam *Fabam* cum oxycrato decoctam dyentericis, cæliacis, & vomentibus, quos *quædam* nominant, exhibuerunt. Porro, vt edulium, flatulenta est, ac coctu difficilis, si quid aliud excretionibus ex thorace & pulmone idonea, vt medicamentum verò, fors imposita, sine molestia desiccet. In podagricis eã sepenumerò vsi sumus ex aqua decocta, & deinde adipi fustulo adtrita. Ad neruorum tum confusiones, tum vulnerationes, farinam eius cum oxymelle imposuimus. Ad eos, quos ex ista iam phlegmone occupauerat, cum polenta. Sed & testinum, & mammarum aptum est cataplasma. Nam hæ partes, cum phlegmone tenentur, moderatè refrigerari amant, maxime cum marmæ ex lacte ipsis concreto phlegmone patientur. Quin lac quoque ab eo cataplasmate

Adagia Fabu.

Vites & us.

Phiamis tenckis, germinis uicina

Temperamentum

Alui ptinum.

Inflammatio plagæ, Manu, nfecta

Oculi p dente.

Pili au

Sanguis ruptio hirsid.

Temperamentum

Caro.

Cortex.

Dysenteria.

Flatulenta.

Podagra.

Nerui.

Phlegmone.

Nerui.

Phlegmone.

mate extinguatur, sicut puerorum pubes farina fabacea illita plurimo tempore glabra permanet. Et lib. 1. de alim. facult. sic inquit: Inflat is cibus quocumque modo apparetur: nec per quamuis longam decoctionem id vitii potest amittere, quod pitanae minimè negatum est: deponit enim per illam quicquid habet fluctulenti. Qui porò affectus singulos cibos sequi natos, animaduertere, & mente consequi volet, quandam totius corporis tensionem, quasi à flatulento spiritu perferentet, maximeque, qui ad huiusmodi esculentum non fuerit assuetus, aut ipsum minus redè coctum assumpserit. Habent autem Fabae non densam, nec grauem, sed fungosam, lenemque substantiam: quae tamen ipsa non nihil absteriora possidet facultatis, similiter pitanae. Etenim manifestè fabacea farina cutis sordes detergere conspicitur. Quod intelligentes mango nes, ac mulierculae, in balneis quotidie hac vtuntur, velut alii nitro, atque aphonitro, & in vniuersum iis, quae abstergent. Illinunt praeterea & faciem hac, quemadmodum pitana: nam quae in summa cute eminent lentes exerit, & maculas velut ex Sole contractas. Huius ergo facultatis nomine in alui quidem transitu diu cunctantur, sicut quae glutinosa, & crassi succi sunt sine vlla abstergendi facultate, qualia Halicam, Tragum, Similaginem & Amylum esse perhibuimus. Cum porò fertulum ex fresa Fabae paratum, quod *ἔρτω* Graeci nuncupant, flatibus non careat, multò amplius integrè Fabae inflabit cibus, quamquam fricta (nam hoc modo aliquando probellariis) flatum deponit, sed tum concoctu perdifficilis, tardoque descensu incommodior redditur, & crassi succi alimentum in corpus diffundit. Quod si viridis, immatura, non dumque arefacta edatur, communè omnium fructuum, quos ante perfectam maturitatem ingenimus, rationem obtinens, corpori humidiorè alimoniam exhibebit, ac proinde maiorem excrementorum vim non tantùm in viis intestinorum: sed etiam per vniuersum corporis habitum producet. Meritò igitur minus quoque nutrit, sed promptius deicietur. Plerique autem hominum non crudas solas Fabas comedentes, vnà eas cum suillâ carne decoquant, veluti olera conseruerunt: ruri verò etiam cum caprina, & ouilla. Alii fabas inflare sentientes, Cepas admiscunt, cum in ollis ex illis pulmentum struant. Sunt qui non simul elixatas, sed cum pulmento Cepas ingerant erudas. In omnibus namque dapibus quicquid flatuosum continetur, per calefactionem, & extenuantia corrigi comparatum est.

Auxiliatur & morbis raba, inquit Plinius: Namque solida fricta, feruensque, in acre acetum coniecta torminibus medetur. In cibo fresa, & cum Allio cocta, contra deploratas tuiles, suppurationesque pectorum, quotidiano cibo sumitur. Et comraanducata ieiuni ore, etiam ad surunculos maturandos, discutiendo se imponitur: & in vino decocta, ad testium tumores & genitalium. Lomentum quoque ex aceto decoctum, tumores maturat, atque aperit. Item liuoribus, combustis medetur. Voci eam prodesse, auctor est M. Varro. Sabalium etiam siliquarum cinis ad coxendices, & ad neruorum veteres dolores, cum adipis suilli vetustate profect. Et per se cortices decocti ad tertias, siliunt alium. Nota est officinis (pergit Corn.) Fabae, cum suo lomento. Hinc forsitan existit & illud Martialis.

Gratum minus erit, scissis nec inutile venenis
Sic clarâ Stephani balnea luce petas.

A Fabis abstinere. Huius ænigmatis varia reperitur interpretatio. Plutarchus enim ad hunc enarrat modum: Abstinentium à tractandis Republic. muneribus, propterea quòd antiquitus in creandis magistratibus suffragia per Fabas vice calculatorum ferebantur. Et rursus dicit ob id damnatas fabas, quòd Lethes & Erebi sint cognomines. His autem quid sibi velit, non satis constat, nisi dicatur Lathyrum & Erebinthum Cicoris genera esse, quae nomina a Letho & Erebo deducantur. Lethes autem Graecis obliuionem sonant, Erebum verò à caligine nomen habere: inauspicatae voces, sapientiae studiosis. Sed idem ad eum in probl. physicam affert causam, cur Pythagoras à fabis abstinendum iussit, nempe quòd omnia legumina spiritum & humorem impurum ingenerent corporibus, atque hanc ob causam ad venerem incitent. In eadem sententia Cicero fuisse videtur, cum scribit ad hunc modum: Iubet igitur Plato lib. 7. de Diuin. sic ad somnum proficisci corporibus affectis, vt nihil sit, quòd errorem animis, perturbationemque adferat. Ex quo etiam Pythagoreis interdictum putatur, ne fabam vescerentur, quòd habeat inflationem magnam in cibus, tranquillitatem mentis quaerenti verè contrariam. Aristoxenus refellit hanc opinionem, affirmans Pythagoram nullo legumine sapientis vsum, quam fabam, quòd is cibus sensum alium subduceret, & laugiret. Porò Gellius, quòd in cibus Cyanus repudiaretur, causam erroris fuisse putat, Empedoclis carmina, qui disciplinas Pythagoricas sectatus est, inter quas versus hic inuenitur.

Ah miseri à Cyano miseri subducite dextras.

Opinati enim sunt plerique *κύνους* legumen vulgò dici. Sed qui diligentiùs, scitiusque carmina Empedoclis arbitrati sunt (Gellii verba sunt) *κύνους* hoc in loco testiculos significare aiunt, eosque more Pythagorae operè atque symbolice *κύνους*, appellatos, quia sint *ἐῖς τὸ κύνει δένει, καὶ ἀπὸ τοῦ κύνει*, ad conceptum efficaces, cauteque conceptionis, & geniturae humanae vim praebentes. Idcirco Empedoclem versus isto non à Cyano [Faba] edendo, sed à rei venereae proluio voluisse homines deducere. Patet ergo quantum à vero aberret Gesn. in explicatione Fabae Pythagoricae, cuius verba haec sunt. Pythagoras interdicto illo, quo à Fabis abstinere iussit, per Fabas oua intellexit, à quibus nimirum non alia ratione abstinere voluit, quam à quorumuis animalium carnibus, par homini fore scelus existimans in aue aut auis ouo peccanti. Itaque eius discipuli quotidianum illud iactabant, *ἴσθαι τε (τα) κύνους ἐδεῖν, καὶ φαλάγγα τῶν κύνων*, quod est, non differre comedisse oua, & parentum capita. Vocauit autem ouum Cyamon, quod quasi *κύνους* [sectura animalis] esset, & conceptum eius intra se clauderet. Apud Aegyptios porò, referente Theone grammatico, tanta est fabarum religio, vt eos neque ferant, neque comedant, imò nec aspiceret fas sit. Quin, Herodoto teste, apud Romanos inter fœnesta habebantur: quippe quas non tangere, nec nominare Diali flammis liceret, quòd ad mortuos pertinere putarentur. Nam & lemurebus iaciabantur, latuis & parentalibus.

Ceterum rabas veneream stimulare voluit etiam Palladius, ita enim scribit: Pauones, cum Idibus Februarii calere incipiunt, rabam leuiter torrefactam in libidinem prouocantur, si eis quinto quoque die tepida praebatur. Sex Cyathi vni sufficiunt. Nunc iam contra pruinam sterces ingeratur Perfico, vel faeces vini, quod maximè pro-

A Fabis cur abstinendum. Respubl. inaepera.

Plutarch. notatum.

Lathyrus. Erebinthus. Lethes. e. obliuio. Erebus, caligo.

Inflatio à Fabis.

Pythagoras abstergeret Fabis.

Cyanus sunt testiculos.

Gesn. not.

Aegyptii fabas videre nlebant.

dest. cum aqua in qua faba decocta est, permixta. M. Catn in bonum cibaria annua in iuga singula sumit fabæ modios viginti. Columella nauseantibus subus salutaris habetur eburnea scobs (salsæ frictio), & faba minutè scæsa commixta, ieiunisque ptius, quàm in pascua prodeant, obiecta.

Fabæ recentes [vt mea fert opinio, inquit Trag.] innoxie sunt in cibo, iis ergo vtentur: siccas operariis relinquentes. Sunt qui ex farina fabarum placentas mellitas conficiant, alii, vt Alsatii, ea in faginandis porcis vtuntur, ad quam rem accommodatissima est, siquidem breui tempore eâ faginatur porci, non aliter, atque armenta Cytulo. Chirugi collectiones & tumores locorû, fabaceâ farinâ in aceto & vappa decoctâ, ac calidâ impositâ, oleoque admixto discutere ac sanare confueverunt: eadem farina vino decoctâ, ac calidâ imposita omnibus tumoribus imprimis conducit, siue in mammis mulierum, siue in locis genitalibus, aut quibuscunque aliis oriatur. Fallopius de thermis cap. Vnum habet præcipuum inter alia, licet sit empiricum medicamentum [in ardore vrinæ] & est aqua extracta è floribus fabarum, vel ex siliquis ipsiis recentibus, ad sex vncias exhibita, per tres vel quatuor horas ante prandium, vel cœnam, addito Syrupo de Liquiritia, vel de Papauere. Idem in eodem casu approbat Baccius de therm. lib. 3. c. 3.

Faba nostra (Adv. loquuntur p. 394.) legumen neutiquam contemnendum, imò tanti faciendum hodie, vt Vere & tota Æstate, multis in regionibus, magnum sit annonæ supplementum, & non parum multa gentes panes ex fabis deplent veterinariæ, etiamque plebeculæ non incommodos: futinâ autem, aut ipsa tota fresa faba pultes lapidas, & placentas conficiant, efficiantque vt de hac nostra faba dictum putemus, quod Antiqui scribunt, fabæ maximum honorem habitum fuisse, vt quâ panis attentatus sit. Bona maior, siue rufelus, quod ad facultates eius attinet, in alimentorum numero (inquit Dod.) non postremo loco, arida vt cætera legumina, decoctâ, & in cibis assumpta: nam recens quidem inflat, & flatus gignit. At rescicata & arida, probeque deinde coctâ, minus aut parum admodum flatulenta est, corpori alimentum mediocre, & illud mediocriter confert: descendit autem cum putaminibus quidem, nec omninò facillè, nec omninò tardè, absque his autem alium constringit, & potentius quidem, quæ rubra est. Farina Bonarum, cataplasmatis præsertim rescicantibus, deficiente fabarum, eius loco hac ætate admiscetur, & non inutiliter quidem. Sicut eius enim temperies parum à medio recessit, ita ad multa utilis est. Talia siquidem medicamenta, auctore Galeno, multis aliis miscentur, ceu materia quædam. Abstergendi autem facultatem fabaceæ farine, Bonarum nõ habet. Cæterum facultate ac temperamento Bonarum minor admodum similis maiori est, non tamen, tam hominum cibo, quàm equorum fagine feruit, ac utilis est. In cataplasmatis, farina huius idem, quod maioris potest. Vt pueri puellæque non pascant (auctore Cardano) lomento fabarum assidue loca ea lauabis: detergit enim atque ita prohibet donec cutis solidetur humore glutinoso. In Dysenteria feliciter dedit panem paruim factum è farina fabaceâ, cui nucem moschatam & bolum præparatum admiscebat, & pistori coquendum dabat. Io. de Mont. exp. ad calculum vesicæ & renem accipit culmos Fabarum, comburit, cineres reponit in faculum, affundit vinum, & ter colat supra cinerem: agro

in balneo dat vncias duas vini, manè & vesperi, quod lapidem mirabiliter frangit. Herc. Saxonia perhibet, Polonos vt ad Plicam [uorbum pilorum] lixiuio fabis alterato. Gonorrhæam virulentam multi curant (teste Jac. Douyncto) vsu caulium fabarum in cinerem redactarum. Caulis deurruntur: cinis in aqua fluuiat 24 horas maceratur, enlaturq; per inclinatio nê: dosi est ad ʒiij. per se, singulis diebus noua maceratio faciendâ est: vsus erit trim dieum tantum. Sal [vt Querc. defenf. Herm. perhibet] siliquarum fabarum in ter alios mirum in modum cauiticus est & vrens, qui tamen ex iustulo iusta dosi exhibitus admodum diureticus est, vt nihilominus viscerum offensionem efficacissimè operetur. Gallinas, si crebrè putamina fabarum edant, steriles fieri testatur Apollonius.

ARACVS FABACEVS, ET FABA Kayrina, cui semina minima.

CAP. III.



Legumen Defectio
plius quàm
cubitale, cuius
caules satis
crassi, angulosi,
inanés, non
hil hirsuti: folia
quaterna, vel
fena, coniuga-
tionibus dua-
bus digesta, co-
stæ adherent
longiuscula,
Fabæ vulgaris
folus similia,
hirsuta, nigri-
cantia, neque
vllum est foli-
um, quod impari-
tatem faciat, pe-
diculus enim,
siue pappus in ca-
ulis.

preolos abit, quibus proxima apprehendit: verum vbi cauli pediculus annectitur, pinnæ adnascuntur binæ, veluti in Pisib: atque ex eodem oriuntur loco flores purpurei, similes serè floribus Vicie, vel Aporæ, quibus decidentibus superueniunt siliquæ mediocriter longæ, magnæ, hirsutæ, quibus semina continentur, Pisi serè magnitudine, grauisimi, & ingratisimi saporis, & odoris, per maturitatem nigra. Flos, quod Dodonæo placet, Bonarum formâ, colore è puniceo nigricans: siliquæ interiori sua parte, albos, mollesque floccos continentes, in quibus semina tria, quatuor, aut quinque rotunda. Erulicæ formâ & magnitudine, subinde paulùm maiora, colore nigra, paruum, candidum vmbilicum habentia, quorum septem, octo, aut subinde nouem semidrachmam pendunt. Substantia horum seminum rarior est, ac mindis dura, solidâue, quàm Bonarum maiorum: dum autem manduntur, fætorum veluti quemdam ingratum excitant.

Anno 1408. Augusto mense in horto Fr. C. Bauhini Basileæ prouenit, nomine Fabæ Kayrina: siue Ægypticæ, Augusto mense siliquæ erant maturæ, semina semina Septembri in horto Montb. Ill. E. C. floruit Maio: flores purpurei quidem

Tametsi.

Aqua è floribus.

Dysenteria.

Cinis culmorum.

Calculi
Plica
Gonorrhæa

Caulis.

Folia.

Pediculus.

Flores.

Siliqua.
Semen.

Substantia.

Fabæ Ægypticæ.

quidem, ed internè striati, singulares, duæ coniugationes foliorum in vno pediculo ac etiam ternæ: saporis ingrati: siliquæ maturæ Iunio, nigre, asperæ: tactu angustiores, quàm in cocco vico Honorii Belli, in iis femina septem, magnitudinis parui Pisi, rotunda, nigra veluti pannus holosericus, velutina vocatus: sapor leguminaeus primò, postea odiosus, & quasi sulphureus, cum tantilla acrimonia.

Huius, ni fallor, fir mentis apud Matthiolum in Diosc. cum magnis figuris Lat. & Ital. Fabam siluestrem, *Fabam siluestrem*, sunt qui velint Galeni lib. 1. alim. Aracum domesticum, qua in re fortasse non malè sentiunt, nec vult eorum sententiæ contradicere. Huic assignat in Epit. flores in purpura albicantes, semen rotundum fabaceo sapore. In Matthioli iconè folia quaternaria, flores & siliquæ singulares. Camerarii autem icon folia quædam habet quaternaria, quædam senaria. Idem in hist. germ. apud Matth. refert, Aracum Galeni velle aliquos Fabam sylv. quum opinionem non in totum rejiciat Matth. In horto tandem, Aracum Fuchsi facit, vt Gesnerus picturæ inscripserit, vulgò Viciam Romanam vocatam Fabæ silu. Matthioli, & Pisi nigro, seu Phaselo Dodonæi cognatam plantam. Ego contra Camerarij mihi planè persuado, Aracum Fuchsi Gesnero non diuersam à Fabâ siluest. Matth. vt etiam ex eius scriptura demonstrare etiam nunc possumus. Quum adhuc anno 1560. morarè Tubingæ cum celeberrimo meo præceptore Leonhardo Fuchsi, prædictam plantam primò vidi in horto eius florentem Angulio, quam mihi denominauit *Aracium*, quo etiam nomine plantam siccam cum descriptione misit D. Gesnero, quum curaret suas plantas pingendas. Aracis Fabaceus collectus Monspeli, quadrifolus est, qui item Tubingæ.

Dod. gall. Phasolus silu. dicitur, gall. *Fene suuages*, & *Fene noire*, Faselus syluestris, & Faselus niger Belg. Wilde Boonen & Swerte Boonen & Moorfens. foute est Cyamos & Fabâ. Idem hist. frumenti siluestris Quæ de Fabâ sparsim apud Theoph. aut alios veteres reperiuntur, multa cum hac Bona conueniunt. Icon placet in latin. hist. in gall. siliquas binas pingebat, non singulares.

Lob. & Pena A. u. fabam silu. præ cæteris credimus delineationem Græcæ fabæ explorare. Tab. & C. Bath. apud Matth. *Fabam silu.* vocant. Lugd. Malè ab Hist. Lugd. eadem planta sub duabus descriptionibus & figuris traditur, duobus diuersis in locis. pag. quidem 451. sub titulo Fabâ silu. pag. verò 472. Phasolus siluestris, siue agrestis.

Gefn. de hort. accuratius perpendendum dicit, an Phaselus siluestris, vel niger à Dodon. dictus Phaselus Veterum sit. Fabamque Veterum esse negat.

Schvven. cat. Sil. fabam nigram appellat. *ni. xhivon d'yeun*, Pisum nigrum, *Schvvarzi boonen*, Wilde Erbsen, *Mohren Erbsen*. Pisum d'yeun.

Prouenit spontè in Apulia campestribus locis, in Narbonensi Gallia, ac Aquitania. Apud Belgarum est legumen, neque alibi, quàm vbi factum est, prouenit. Siccitati bus in Belgio gaudet. imbibus ac hamido celi flara ægrosiusum efficitur, maxime cum in flore est, paucis à latatione diebus exit, citòque extollitur. Monspeli mensè April. florentem & siliquas habentem in itinere verius Frontignianum inueni. Geneuæ ha-

bui in horto meo ex femine misso per D. Zaingerum Basileæ, florentem Maio: sequenti anno ex femine deciduo, item Martio. Basileæ copiosam vidi in prædio D. Plateri. In Italia spontè prouenientem reperi. Montbelgardi habeo in horto Ill. Principis ex femine Sturgardiæ & Argentiniæ misso, per doctissimum Medicum D. D. Melchiorum Sebittium nomine Schvuarzi Erbsen. Semina matura obseruauit Iulio: mihi etiam misa nomine fabæ silv. Matthioli Sturgardiæ, sata April. florebant Iunio.

Sunt, inquit Matth. qui dicant, eandem cum domestica faba vires habere. Nos autem, si Matthiolum eandem plantam per Fabam silv. intelligit, quum hic tradimus, eandem vires, & facultates concedere non possumus, huic enim ingratus est sapor, Hunc quoque si gustasset Schvvenckfeldius, aliter quàm pares cum Fabâ maiore facultates habere sensisset. Apud Dodonæum nullum Bona hæc habet usum.

Vires: Matthioli error.

Schvvenckfeldius, aliter quàm pares cum Fabâ maiore facultates habere sensisset.

ARACVS FABACEVS SERRATVS, ET Cocco vico femine maiorè.



EX montibus Euganeis circa Patavium attulit plantam D. Agerius Med. Argent. Bona silv. Dod. folio serrato nomine, præcedenti similem caule, flore, vt existimo, purpureo Vicia lepium, & siliquæ, quæ, vt illæ, latæ, uncias tres longæ, singulares, ex breui pediculo herentes, in circuitu hirsutæ: in iis sex Pisi numerauimus, qualia me latet, quia non erant matura. In foliis tres coniugationes pulchrè dentatæ, præter alas binas: folia in capreolos desinunt, ad quorum latus præter coniugationum, foliolum vnum solum adest, minus cæteris.

Locus: Bona silv. Descrip. Flor. Siliquæ. Semen. Folia.

Anno 1608. Septembri seimus Montbelgardi, in horto Ill. C. Wirtemb. semen, cuius inscriptio erat: Cocco vico Honorio Bello. Hoc anno sequenti plantam produxerat, quæ florebat Maio: similis autem erat præcedenti Araco fabaceo priori, verum flores bini, omnino purpurei, internè non striati, pictiue in foliis: ternus ordo paruorum foliolorum, quorum quædam planè similia sine serraturis, alia verò cum serraturis: alæ in principio pediculorum cristatæ, vt in Araco fabaceo serrato. Sapor non displicet in siliquis latis numeravi septem grana, sapor in virentibus leguminosus, cum aliqua ingratitude.

Locus: Cocco vico Tempus. Flor. Folia.

An hic idem sit cum serrato nostro considerandum, folia quidem maiora, sed id à cultura accidere potuit. Mensè Iunio siliquæ maturæ, latiores multò, quàm in Fabâ Kerrina, Pisi autem duplè maiora, minis nigra, cum hylò albo: sapor idem.

Ala. Sapor. Siliquæ. Semen.

Tempus.

LUPINVS VVLGARIS SEMINE ET flore albo, sativus.

CAP. IV.

Descriptio.

Caulis.

Folia.



Flores.

Siliqua. Semina.

Sapor.

Radix. Lupini Sui de dicti.

Lupini Germani.

Terram in qua.

Variat secundum regionem.

Lupinus vulgaris sativus est herba, caule mediocriter crasso, ex viridi flavescente, tereti, hirsuto, ramoso: folia alternatim oriuntur, glauca superne, & glabra, inferius magis albicantia & lanuginosa, in quinque, sex, aut septem segmenta radicatum usque teretem, uncias

duas, aut tres longum, incisâ: sapore subamaro, leguminoso: flores ad divaricationem ramorum peculiari furculo enato insident; colore albido, pallidescente, Cæsalpino flos candidans, aut aderuleum vergens, folio vno latiusculo sursum reflexo, lateralibus duobus quartam rostro cauleo [sub quo apices latent crocei] insigne amplexis: sequuntur siliquæ pro florum numero plures simul iunctæ, fabacearum instar furcæ, villosæ, pulposa, compressæ, in ambitu crenatæ, intus glaucæ, in quibus semina quina, sena, septem, membranis dissepita, orbiculata, & nonnihil angulosa, compressa, quæ seorsum adhaerent, cavitatem quandam, veluti umbilicum exiguum habentia, foris alba, intus lutea, sapore amato, radice dura, alba, multifida.

Lupinorum autem appellatio non aliunde ducta videtur, quam quod sicut lupus terram appetit, & in fame terra vescitur, ita Lupinus tellurem, ut Plinius ait, ad se amat, ut quamvis fructuoso solo contactum inter folia, vepresque, ad terram tamen radice perueniat. Lupinus etiam, velut lupus expositus & relictus, dictus videtur potest, ex eo, quod, ut idem Plinius ait, impune iacet, vel detestatus, si non protinus secuti imbres, ab omnibus animalibus amaritudine sua tutus. Duo sunt Lupini genera, Dioscoridi, Plinio & Galeno, sativus & sylvestris. Nos de hoc agemus paulo post. Remedium eius [sativum] ne metentes fugiat exiliendo, ut ab imbre tollatur, ait Plinius lib. 8. cap. 14. Nec vilius, quod feritur, natura assensu terræ mirabilior est: Primum omnium cum Sole quotidie circumagitur, horaque agricolis etiam nubilo demonstrat. Terram amat, terraque operiri non vult. Cætera, quæ de hoc Veteres prodidere, rationi, cultura, loco, tempori, virtus & usus referavimus.

Cæterum, Lupini cognitionem, ut & multarum aliarum plantarum, nonnunquam impedire potest regionum varietas. In Heuturia enim ac quibusdam aliis locis [ut Maranthe observavit] amarissimus est, atque iuncta cum maxime auersantur: in Campania vero medicam aut nullam habet amaritudinem: estque iumentorum ita

gratum pabulum, ut eo per Hiemen vescantur.

Auticenna, Tragi testimonio, Lupinum eleganter depinxit, nisi quoddam falsè Fabam esse Ægyptiacam affirmavit, id quàm à veritate ablit nemini obscurum esse potest. Serapio tria Lupini genera commemorat, vnum sativum & duo sylvestria, vocatque *Tarinus*, & primum genus *Regales*, *Auerroës Tormos*. Apuleio *Thermos urinus*, Lupinus montanus. Dioscoridi *βίσημος*, & *βρεχον* appellatur. A Galeno, ob varias, quibus pollet, virtutes *βίσημος* dicitur. Apud Hebræos *Talitan* vocatur, vide *Aruch* Monstrei.

Nullis pestiferis, auctoritate Matthioli, plantis sitangulatur Lupinus: cum ipse noxias omnes strangulet herbas, quæ illi adnascuntur. A Mauritanis *Tarinus*, seu *Tormus* appellatur.

Lupinum [inquit C. r.] Scigbonen appellat, quasi sic Fabam per antiphrasim & Luporum Pifa, quasi dignum sit illis edulium.

Sed nec ita procul [Lob. & Penâ iudicibus in Advers.] absumt à Fabaceis, & Pbaecoli fructus, quos *βίσημος* Græci vocarunt, quia calidiores cæteris leguminibus essent, aut potius, quod *βίσημος* [calida aquâ] lavarentur, & macerarentur, quo amarorem exuerent tristem & molestum, à quo etiam *λυπηδαῖος*, vnde Virgili Epitheton. *Tristisque Lupini* *Sesifuleis calamus*. Idem Obs. inter alia fabæ siculæ nomen huic tribuunt. Icon. verò Plant. p. 64. Tom. 2. Lupinus sativus.

Norat Hist. Lugd. quod folia huius sub vesperam, Solis occatum veluti præsententia, flaccidâ factâ deorsum vergant.

Illud tandem memoratu dignum, quod *Camer.* in horto perhibet: Lupini albi, inquit, in quorum genere reperuntur maximi, flore antequam aperiantur, subæruleo, intus verò albo,

Plautus nominat Lupinos, Aurum comicum nam in scena nummis ex Lupino factis, præ aureis utebantur Comici. Et nunc etiam in Italia pueri ex his nummos efformare solent, vnde Horatius:

Nec tamen ignorant, quid distent æra, Lupinis. Veluit namque hoc versu significare, illos minime latere, sed scire quantum probati nummi distent à falsis, itemque boni vini à malis. Notabis autem Salomonem Albertum apud Horatium hoc in loco legere *Erna*, pro *æra*.

Cæterum Lupinus sativus omnibus passim auctoribus & officinis Lupini simpliciter dicti nomine innotescit. Græcis vocatur *βίσημος*, *βίσημος*; Germ. *wisch bonen* / *Seigbonen*, *wolffsch bonen*, *wolffsch bonen*; Gall. *Lupinus*; Ital. *Lupino domestico*, *Hisp. Entramucos*, & *Entramucos*. Ang. *Lupines*.

Ne porò, quæ distulimus, hoc in loco neglegamus, ad Veteres revertimur. Lupinum igitur [autore Theop. lib. 8. bist. cap. ii.] ex iis, quæ siliuestria quasi putantur proprietatem quandam tum in generatione, tum in germinatione sortiti plantæ videtur. Nisi enim hoc protinus [licet robustissimum sit, ab area terræ mandaueris, malè proveniet. Atque in totum condi hoc legumen subter terram recusat: qua de causa ne subarantes quidem id ferunt, & sepe si in materiam, aut herbam prædesfam quampiam incidat, eam vi summa impellendo delucit, radicæque terram contingit, & germinat. Et vnum hoc [pergit Plin. lib. 8. cap. 14.] feritur non [aratro] arato. Nihilque aliud nullo impendio constat, ut quod ne serendi quidem gratia opus fit afferre. Protinus feritur

Auticenna

Lupini

Tarinus

Tormos

Thermos

Brechon

Talitan

Faba Fabae

Lupinum

Pifa

Thermos

Epitheton

Aurum comicum

Nominibus

linguarum

Sativus

cx

ex atuo [ex atea Theoph.] ac ne spatgi quidem postulat decidens sponte. Coli non vult, itaque aded non eget fino. Lupinum teste Theoph. Cicere & Eruo, quæ omnium maximè durant, longè diuturnius est. Condi in fino maximè convenit, quoniam in humido vermiculi vmbilicum eius in sterilitatem castrant. Si de passum sit in fronde, in arari protinus solum opus est.

Querit maximè sabulosa, & sicca, atque etiam hatenosa loca. Ex densiore terra rubricam maximè amat. Cretosa tantùm limosaque odit, & in iis non provenit, teste Plinio, Theophrasto quoque perhibente, solum arenosum & vitiosum potius poscit, atque in totum cultus promoveri non vult. A nobis Montbelgardii plantatus in horto E. C. feliciter provenit, sed à muribus devoratur, vt euenit anno 1588. Matthiolo feritur in agris, sterili solo in Hetruria.

Primum omnium feritur, secundum Plinium, nouissimum autem tollitur: vtrumque Septembris ferè mense, quia si non antecessit Hiemem, frigoribus obnoxium est. Ter præterea floret. Apud Germanos quidem (Dodon. loquitur) sub finem Maij; deinde Junio, aut in iudè Iulij: tertiè vetò Iulio, aut Augusto mensibus, si anni tempestas calida siccaque fuerit, fructus sapè ad maturitatem peruenit. Nobis semen maturum factum Augusto, Septembris & Octobri, floret Junio. Genueæ florentem habuimus Iulio, Basileæ etiam Maio. Cæsalpino feritur mense Augusto, ac paulò antè colligitur.

Lupino, iuxta Plinium, multiplex vsus: nam non duntaxat homini, & quadrupedum generi vngulas habenti, communis: sed pinguecere hoc etiam satu, atua, vineaque dixit, ita vt optimi simi vicem repræsentet. Sed ad tertiam rubricam alendam post terrium florem verti debet, in sabulo post secundum. Maceratum autem calidà aqua homini in cibo est. Puerorum ventribus impositum pro remedio est. Bouem vnum modii singuli satiant. Lupini semens, *πυλωχρον* est, inquit Galenus lib. x. Alim. Elixum enim, deinde in aqua dulci maceratum, tantisper dum in hac omnem sibi ingentiam exuerit insauitatem, ita demum manditur cum Gato, ac Oxygato, vel etiam sine his, sale mediocri conditum, non quomodo Hot-deum, & alia, quæ variè apparantur. Lupini dura ac retreftris est substantia: quocirca ipse concoctum difficilis est, succumque crassum gignit ex quo non probè in venis concocto, succus, quem erudum vocant, procreatur. Ceterum cum inter parandum, quicquid habeat amaritudinis, deponat, *πυλωχρον*, qualitatibus, quæ sensu deprehendatur, expertibus, similis euadit. Par igitur est ipsum, neque ad diectionem, neque vt adstringentia ad fluxum ventris cohibendum esse commodum, sed tardè descendere, & difficilè deici, ac petransire. Idem lib. 6. simpl. Lupinus edi potest coctus, multis antè diebus per macerationem amaritudine in aqua deposita, si que tunc nutrimentum succi crassi. Ceterum vt medicamentum ita præparatus, ex genere est emplasticorum. At vbi natua etiam dum manet amaritudo, extergendi, digerendique vim obtinet: interficat lumbricos, tum illius, tum addito melle lectus, tum ex posca potus. Quin & decoctum eius lumbricos eicere potest, tum etiam foris idem tunc persusum, vitiligines, achoras, pustulas, pforas, gangrenas, vlcera maligna iuuat partim extergendo, partim citra mordicitatem digerendo, siccandoque: expurgat iecur & lienem, cum Ruta & Pipere suauitatis gratia, asum-

ptu. Elicit menses, ac factum cum Myrtba & melle impositum. Porrò Lupinorum farina sine mordicatione, digerit. Nec enim liuida tantum, sed & chæradas, & phymata curat: sed tunc in aceto, aut Oxymellite, aut posca coquatur oportet: idque pro agrorum temperamento, & affectus diueritate, quod ex vsu est eligendū. Digerit item, quæ liuida sunt: & quæcunque modo diximus, præstare posse decoctum, eadem omnia efficit & farina. Sunt verdè etiam, qui eam ischiadicis caraplastis modo illinunt. Lupinum factitium notum esse, Diosc. tradit; & eius farinam cum melle delinctam, aut cum aceto potam lumbricos expellere. Sed & ipsos aquà maceratos, si amari adhuc edantur, eadem facere. Et decoctum ipsorum cum Ruta & Pipere potum, idem facere. Vnde etiam splenicis prodelle: & gangrenas, vlcera fera, theriomata appellata, scabies incipientes, vitilgines, maculas, pustulas, vlcera capitis manantia, ipso vtilissimè perfundi ac foueri. Idem etiam menses & sætus detrahere, cum Myrtha & melle appositum. At farinam prægate cutem & liuida. Cum polenta & aqua mitigare inflammationes. Cum aceto verdè, coxendicum dolores, & panos lenire. Strumas dissipare Lupinum in aceto coctum, & impositum. Ita etiam Carbunculos rumpere. Cum aqua verdè pluuiæ coctos, donec succum remittant, faciem depurgare. Cum Chamæleonis nigri radice coctos, ouiu scabiem sanare, si decocto tepido eluatur. Radicem autem coctam cum aqua, & potam, vrinam motere. Edulcoratos tritos, cum aceto potos Lupinos, stomachi aspidium lenire, & appetentiam ad cibum facere.

Seruntur (inquit Matth.) in Hetruria non modo ad alimentorum vsum, sed ad agros impinguandos: Dulcorantur in Italia, ibique frequenter eduntur cum sale. Excalefaciunt & siccant manifestè, abstergunt, appetiunt, digerunt, resoluunt, & attenuant. Cæsalpino teste, Lupini semen aquà calidà præmaceratum; amari tudine demissa, gratum gustui redditur, vt citra aliam coctionem existetur. Quod Theoph. dixit, viridem à nullo animali mandi propter amaritudinem, de fructu intelligendum est: nam hodie etiam pro boui pabulo feritur inter rapas. Lupinifati (vt vult Aug. Gall.) impediunt vermes frumenrum rodentes, & agros macilentos impinguant.

LUPINVS EXOTICVS HIRSVTISSIMVS



Elegantissimum huncce Lupinum Cl. D. D. Felix Plattus *Asper* Basileensis summus amicus noster in pereleganti suo Herbario sicso habet. A quo multùm acceptam plantam hoc loco describere ac depingere par est. Rarum est scabitalis, vix

Menses

Phyma

Ischiad

Lumbrico

Gangrenas

Inflammationes

Carbunculos

Ouinum scabies

Fastidium ad cibum

Temperantia

Theoph. ex plicatur

Agri scab

Folia. Iosissimâ hirsutie byssâ obfit, in ramos brachia-
Flores. atus, qui *folia* longis pediculis harentia emittunt,
 quinquepartita, penitus villosa, foliis Lupini
Siliqua. satiuu aliqui haud multum dissimilia. Ramorum
 summitatibus *flores* insident aliquot caerulei, hî-
 cætes, minores quàm Lupini vulgaris, succedunt
Siliqua. *siliqua* alterno situ posita, penitus villosa, surre-
 ctæ, vniciales, longiores, nec dum fructum con-
 tinentes, breuibz pediculis harentes, ad quo-
 rum exortum alia quædam lanuginosa, præan-
 gusta folia prodeunt.

Huius semen existimamus esse, quod floren-
 tiâ à Casabona magni Ducis Hetruriz hortu-
 lano, nomine Lupini siluestris Candix accepi-
 mus, quodque hîc sua magnitudine appingi cu-
 rauius, maius nimitum & crassius vulgari. To-
 tum luridum est colore, & aliquantum variega-
 tum, compressum, alperum, eo loco vbi umbili-
 cus, exactum.

Locus. In horto Corolocastrensi prouenit Lupinus
 caeruleus, Hispanicus, latifolius, hirsutissimus, quæ
 in dicto horto legimus anno 1608. pulchrè flo-
 rentem. Omnino is respondet iconi huic no-
 stræ. Aiebat plantarum studiosissimus Arnold.
 Gilenius Med. Cand. Castellæ nomine Lupini
 Indici missum, cum illi plantam ostenderemus.

Descrip. Clusius hunc, ni fallor describit, nomine Lu-
Clusius. pini caeruleo purpurei. Natum, inquit, quoddam
 Lupini genus fuit Lugduni Batauorum, semine
 peregrè accepto, creuitque in cubitalem, aut
 maiorem altitudinem, latis firmo scapo & in ra-
 mos diuiso præditum: cui, vt in aliis Lupini ge-
 neribus, inhærebant folia ex vno longo pedicu-
 lo dependentia, septena, aut plura, miolliora ta-
 men, quàm in eo, qui flauum profert florem,
 paullo etiam latiora, longioreque lanugine ob-
 sita: flores extremum caulem, & ramos, tribus
 quatuor, aut pluribus ordinibus ambiunt, ver-
 ticillatim, aut coronæ instar, in orbem dispositi,
 quaterni, & quini, iis qui albi sunt, ferè æquales,
 sed coloris ex caeruleo purpurascens & elegans:
 quibus sueciferunt siliquæ non disparès
 vulgari satiuo, in quibus fructus illo non minor,
 verum alterius coloris. florebat Iulio mense,
 semen Septembri maturum fuit. Cùm anno
 1565, è Lusitania per Baturiam in Gianatense re-
 gnum transfret, meminit februario mense agros
 Lupino confitos videre, cuius flores albi, aliquid
 caerulei commixtum haberent: an huius fuerit
 generis, ignorat Clusius.

Folia. Iosissimâ hirsutie byssâ obfit, in ramos brachia-
Flores. atus, qui *folia* longis pediculis harentia emittunt,
 quinquepartita, penitus villosa, foliis Lupini
 satiuu aliqui haud multum dissimilia. Ramorum
 summitatibus *flores* insident aliquot caerulei, hî-
 cætes, minores quàm Lupini vulgaris, succedunt
Siliqua. *siliqua* alterno situ posita, penitus villosa, surre-
 ctæ, vniciales, longiores, nec dum fructum con-
 tinentes, breuibz pediculis harentes, ad quo-
 rum exortum alia quædam lanuginosa, præan-
 gusta folia prodeunt.

Tempus. Huius semen existimamus esse, quod floren-
 tiâ à Casabona magni Ducis Hetruriz hortu-
 lano, nomine Lupini siluestris Candix accepi-
 mus, quodque hîc sua magnitudine appingi cu-
 rauius, maius nimitum & crassius vulgari. To-
 tum luridum est colore, & aliquantum variega-
 tum, compressum, alperum, eo loco vbi umbili-
 cus, exactum.

Tempus. In horto Corolocastrensi prouenit Lupinus
 caeruleus, Hispanicus, latifolius, hirsutissimus, quæ
 in dicto horto legimus anno 1608. pulchrè flo-
 rentem. Omnino is respondet iconi huic no-
 stræ. Aiebat plantarum studiosissimus Arnold.
 Gilenius Med. Cand. Castellæ nomine Lupini
 Indici missum, cum illi plantam ostenderemus.

LUPINVS LVTEO FLORE,
 semine compresso, vario.

Descriptio. Lupinus luteus insignibus aliquot notis à
 vulgari distinguitur: potissimum autem flo-
 re luteo, aded vt decerptus pro Gen stræ fallat,
Floribus verticillatim dispositus, interposito spatio sæpè
Gensita. duos, vel tres, nonnunquam etiam septem ob-
 seruati verticillos. Odore grato ad Leucoii lutei
Odor. accedente: deinde verò *semine*, quod compresso
semen. forma & magnitudine albo ferè par, colore va-
 rium est, albo fuscoque, maculoso, areolâ albâ ceu
 zonula circa geminis regionem cinctum, sili-
 quis lanuginosis clausum, reliquis planta vul-
 tus, satiuo, seu albo Lupino similis, *folia* digita-
 ta, vtrinque hirsuta: caulis teres, brachiatus, vil-
 losus: radix simplex, recta.

Dodon. Hist. g. ll. & latiora videtur iconi Lu-
 pini siluestris huius, luteum huic representare.
Libel. & Pena Adu. Lupinum floribus Genistræ



Türkischer Veiel. Tab. Geel feigbonen/ Lupinus
 luteus. Casp. Bauh. apud Match. Lupinus
 silu. luteus Germ. Viola Turcica. Semina saporè
 amarissimo. Hist. Lugd. Lupinus silu. Dodonæi.
 Clus. H. st. Lupinus flauo flore.

Lupinus luteus sarpids à me factus in horto E.
 C. prouenit: sed semen non maturuit: florentem
 vidi mense Augusto & Septembri in horto Ge-
 nerosi D. Baronis à Morouie Belfordiz, eius au-
 tem coniunx vocabat Spanisch Veiel. Mensis
 Octobri pulchrè aliquando floruit & semine ferè
 maturo fuit in horto E. C. anno 1594. fatuus Ap-
 pih floruit Iunio quoque; anno 1578. cum D. Guil-
 selmus Landgrauus misisset, sed non maturuit
 ob frigiditatem arni, vt puto. Geneuz habui pri-
 mum in horto, flore odorato Iunio, foliis mino-
 ribus, quàm in vulgari; maioribus, quàm in ca-
 eruleo. Basileæ vidi in horto D. D. Felcis: semina
 etiam matura collegi in horto Generosi E. Baro-
 nis à Polviller. Anno tandem 1597. Augusto
 mense in horto Montbelgardensi plantæ aliz flo-
 rentes, aliæ semine maturo vario effactæ, cum se-
 ptem florum verticillis obseruati. Gen. Io. Hent.
 Cherl. attulit Monpelio, confirmauitque autho-
 ritate Lohelii, scribentis: Monpelii in satius &
 cultis, herbariorumque hortis visitur Lupinus
 floribus luteis. C. Bauh. licet apud multos spon-
 tæ oriatur, apud Germanos tamen hortensem fa-
 cit. In Germania verò prouenit Dodonæus scri-
 pit, etiam sæpè ad maturitatem.

LUPINVS SILVESTRIS, PURPUREO
 FLORE, SEMINE ROTUNDO,
 vario.

Descriptio. EX siluestrium Lupinorum genere est vnus
 caule cubitali, robusto recto, tereti, striato,
 solido, alia satis frequentibus concauo, & ramo-
 so: *folia* Lupini satiuu, nonnihil hirsuta, multo
 minor, in quinque, sex, vel septem radios lon-
 gos, angustos, filia: pediculo harent longo, sa-
 pore ingrato & odioso: flores longâ setis crebri
 agminatim ascendentes, Cicerularum & Pifo-
 rum flores referunt, coloris purpurei: quibus suc-
 cedunt *siliquæ* rectæ, semina continentes parua,
 stigmatis variata, rotunda: radicem potè denutit
 satis profundè, non magnam tamen, glandulis ad
 fibram adnatis strumolam.

Dioscoridis videtur *βίσημος* [Lupinus
 silv.] satiuo in omnibus similis, iunior verò. Quo
 in loc



in loco, autore Cornario, Diofco. dicitur *quædam* pro *maioribus*. Sed declarat rem hanc Plin. lib. 22. cap. 25. Lupini quoque inquit, siluestres sunt, omni modo minores sativus, præterquam amaritudine.

De hoc Matthiol. Ital. cum magnis fig. Lupini silv. floribus roseo colore rufescentibus. Lupinus

agrestis, Ital. *Lupinus saluatico*. Alier apud eundem Hist. germ. Vbi figura notata est litera N. sive E-pitome. Camerar. Lupinus silv. floctulis è cæruleo purpurascens, aut subrubentibus: fructus minuti, colore fordido, vario & non nihil luente aspersi: wilde feigbonē. Idem in horto pavitatem fructus exprimens, Lenti comparat, crassior tamen asitum. De hoc & sequentes.

Casalp. Lupini genus sponte provenit in locis arenosis, brevis: folis angustissimis: siliquis tenuibus, floctulis cæruleis. Tab. Klein feigbonen. Lupinus minor flore rubente. C. Bauh. apud Matth. De Lupino flore purpurascens, latifolio, hirsuto, seu siluestri Dioscoridis, dicitur in historia exhibitâ simul figurâ, prout sponte in loco Gramuntio propè Monspelium provenit, qui luteo altior & ramosior est. Lupinus cæruleo flore angustifolius [cuius iconem proponit ex Tabernam.] folis multo angustioribus, & minoribus, vt figura ostendit, communiter in septem partes diuisis: floctulis quàm in illa minoribus, quibus siliquæ multo minores succedant, vix conspicuâ lanugine hirsuta, quibus femina minuta, rotunda, colore fordido, variis maculis aspersa & amara reconduuntur. Hoc Frater. Ego verò Lupinum purpurascens, quem Monspeli obseruavi, etiam apud nos cultum, latifolium dicere non possum, nec etiam hirsutum, quia ita leuis hirsuties, vt eius mentionem non fecerit Lobelius in sua descriptione, nec etiam Camerarius. Cur separemus Lupinum minorem Tabern. à Monspeliulo purpurascens, consideratâ solâ iconem, non videmus. Nec Tabern. dicit suum Lupinum cæruleum, sed Norisched / subrubrum. An Anguill. Lupinus siluestris Dodon gall. Lupinus est siluestris, cæruleus, & ruber, quem postea in Hist. scum. Lupinus silv. purpureum vocat: in fol. autem Lupinum purpureum, flore ex purpurâ cæruleo, aut subrubente. Lob. & Pena Adv. Obs. & Ic. Pl. p. 65. Tom. 2. Lupinus silv. flore purpureo, & puniceo, fructu minore, guttatis, aut fortuitis asperso maculis pullis, cinericeis & castis. Sed horum Icon cum floribus verticilli modo dispositis non placet, in luteo tantum obseruauit. Clus. vocatur Lupinus flore cæruleo.

Lupinum silv. flore purpureo Monspeli primùm, dein Florentiæ florentem in agris Aprilis mense vidi. A Landgrauio Hassiæ milla grana nomine Lupini cærulei, florem mense Nouembri & Decembri, Montbelgardi Autumno clemen-

Tom. II,

tiori primò produxerunt. Habni etiam Argentina ex horto D. Friderici Meier, quæ satis vix maturare quòd tardius florent, quàm luteus etiam, aut albus. Matthiolo siluestrium Lupinorum innumerè exoriantur plantæ in Hetruria, quæ Maio mense in campestribus visuntur. Lobelio in fatis & culus Gramuntio loco circumiectis non procul Monspelo sæpè occurrunt. Lupinus flore cæruleo (pergit Camer.) crecit sua sponte in Italia circa Viterbium, & Pisam, Neapolim & Romam, ac apud Samnites & alibi. In inferiore Germania, ait Dod. fructus raris ad maturitatem peruenit. Clusius tandem in Gallia Narbonensi inter segetes non procul Monspelo ultra fluium Ledum sponte natum obseruabat.

Dissentiant circa vites Diofco. & Gal. Ille enim hunc eadem, quæ sativum, præstare scribit. Galeus autem amariorem dicit, & ad omnia valentiorum sativo, facultatisque valentioris. De vintibus & vni Lupini silv. ita Plinius nobis scribere videtur. Lupini quoque siluestres sunt, omnimodè minores sativus, præterquam amaritudine. Ex omnibus quæ eduntur, sicco nulli minus ponderis est, nec plùs vitiat. Mitefunt cinere, aut aqua, calidis. Colorem hominis frequentiores in cibo exhibant: amari contra aspidas valent. Vl-

cera atra, aridi decorticatque triti, supposito linreolo, ad viuum corpus redigunt. Strumas, protidas in aceto cocti, discutunt. Succus decoctorum cum Ruta & Pipere, vel in febrî datur ad ventris animalia pellerda, minoribus turgita anorum: pueris verò impositi in ventrem tenuis profunt. Et alio genere tolli, & in defuncto potu, vel ex melle sumpti. Idem amritatem cibi sciunt, fistidium detrahunt. Fatina eorum aceto subacta papulas, pruritumque in balnei illita cohibet, & per se siccat vicera. Luores emendat. Inflammationes cum polenta sedat. Syluestrium efficacior vis est contra coxendicum & lumborum debilitatem. Ex illi decocta lentigines corrigunt: si verò ad melis crassitudinem decoquantur vel sativi, vitiliginis nigras & lepras emendant. In silv. Lupini temine, ait Porta, guttatim & fortuitè asperse macule, pulle & cinere, verè à serpentum designationi satisfaciunt: vnde contra aspidas valet.

Vires & sus.

Color.

Vlcera.

Struma.

Animalia

Ventris.

Farina.

Aspid.

CICERA ANTIQVIS

CAP. V.

Cicera Columellæ bubus Erni loco sicca datur, in Hispania Bætica, quæ cum suspensa mola diuisa est, paulùm maceratur, dum lentescat. Atque ita mista paleis subtritis pecori præbetur. Sed Erui duodecim librae satisfaciunt vni iugo. Cicera sexdecim: eadem hominibus non inutilis, neque inuitanda est. Sapore certè nihil differt à Cicercula, colore tantùm discernitur. Nam est obsole-
tor, & nigro propior, fertur primo, vel altero sulco mense Martio, ita vt postulat soli læticia, quod eadem quatuor modis, nonnunquam & tribus, interdum etiam duobus, ac semodio iugerum occupat. Nos sanè de hac Cicera penitus nihil, quod dicendum occurrat, apud alios inuenimus, quàm quòd à Cicere ouino, teste Cornario, sit diuersa.

ffat.

Sapor.

Satis.

CICERA IN GENERE

CAP. VI.

Cicercis duo fastigia summa licet Diofco. Gal. & Plin. constituant, attamen Theophr. qui hos

B b

tempore multum antecessit, aliter longè sentit, ita siquidem scribit.

Ephedros [Cicer] magnitudine, & sapore, & odore [*καὶ τῆς ἰσχυρίας, καὶ τῆς ἰσχυρίας*: succis & coloribus] & formâ plerasque differentias ostendit, ut Arietinum & Columbinum. Candida inter omniâ dulcedine præstant.

Columbinum

Satiuum.

Porro summa illa duo genera *satiuum*, & *siluestre*. Satiui quidem differentia aliquot.

Dioscorides satiui alterum genus Arietinum appellat. Siluestre, foliis satiui simile dicit, aut odore acri [gravi, Plin.] seminè differens.

Plinii differentia.
Arietinum
Columbinum
Venerium.
Cicerula.

Plinius differentias Ciceris plures sumpsit etiâ à magnitudine, figura, colore, sapore. Est enim, inquit, arietino capiti simile, unde ita appellatur, album, nigrumque: est & Columbinum, quod alij Venerium vocant, candidum, rotundum, læue, Arietino minus; quod religio perungulis adhibet. Est & Cicerula minuti Ciceris, inæqualis, angulosa, velut Pisum. Dulcissimum autem id quod Eruo similitum: firmissimum quod nigrum, & rufum, quàm quod album. Patet ergo & Plinium duobus hæc fecisse Ciceris genera, Arietinum, & alterum Columbinum, quod & Venerium dicitur: *εὐστραίου* id, nempe Eruium Theophrastus vocat, quod his declarat: dulcissimum autem id quod Eruo similitum.

Columella
differens.
Punicum.
Feleni
differens.
Graminum.

Columella hoc Punicum appellauit, qui & ipse duo Ciceris genera tradidit, inquit: Cicer Arietinum vnum vocatur, & alterum Punicum, quod toto mense Martio feri potest. Tandem Galenus quoque duorum generum meminit, Arietini videlicet & Eruii [*εὐστραίου*]. Ita namque scribit Alim. lib. 1. cap. 22. Cicera nigra exigua, in Bithynia maximè prouenientia, Arietinaque ipsa nuncupant. Item simpl. 6. Erebinthus [Cicer] legumen est flauosum. Quod verò Arietinum appellatur, &c. At alterum Eruium appellatum, Erebinthus sc. agræstis, ad omnia efficacior domesticus est, hoc est tum calidior, tum sicciior, quantò & acrior & amarior.

Cesalpini
differens.

Theophrastus (autore Cesalp.) Arietinum & Columbinum differre scribit. Actius & Columella quoddam Orobizum cognominant, Eruo simile. Dioscorides satiui & siluestre tradidit inter satiua, quoddam Arietinum. Siluestre genus videtur significasse Theoph. cum dixit quoddam odore differre: & Actius Orobizum hoc idem videtur appellasse, nam ei vim tradit, quæ profectò Ciceri satiui per se non inest, nisi cū Eruo admisceatur, ut Diosc. adinuertit. Est ergo Cicer silu. Hæc Cesalp. sed malè. Nam apud Theoph. pro Columbino, ut vertit Gaza, legitur *εὐστραίου*, & pro odore in versione Theop. Gaza, legendum colore. Dioscoridis primum existimamus idem, cum Orobizo Theop.

Cesalp. &
Gaza not.

Plinius, teste Cornario, Cicerulam contextui suo inseruit, Cicerque dixit, imprudenter sanè duas diuersas res confundendo: de Cicerula sub Lathyro dicitur. Cur Cicer præterea Serpillum à quibusdam appelleretur, videre est ex Matcello hist. n. g. lib. 28.

CICER ARIETINVM.

Defect.
Caulis.
Folia.

SVa vi surrigitur Cicer, caulibus hirsutis, durioribus, ramosis: *folia* pinnata, hirsuta, clauicularum expertia, quorum singularia haud malè foliis Ononidis comparaueris, denticulata, siue serrata: ex quorum alis flores emicant singulares, colore purpurascete, vel albo: *siliqua* te-



retes; factæ semina, Piso à quali, colore albo, ruffo, aut nigro, cuius capiti appositum corniculum: sapor ad Pifa accedit, vt & radix.

Cord. in Diosc. Est quoddam genus rufum, quoddam candidum, quod Columbinum dicitur, & tertium nigrum, quod priuatim Arietinum appellatur. Describit hoc in

Cordi
rentia.
Ruffum
Candidum

Colum

Nigrum
ruffum

Hist. cui Gesn. figuram ex Trago addit.

Trag. Cicer, Germ. Syser Erweissen. Ruffum germ. Noth Syser. Nigrum, Schwarz Syser. Album, weiß Syser. Auc. lib. 2. cap. 132. nigri meminit Ciceris. Omnis Ciceris species ad Pifa referenda nobis videtur. Erebinthi appellatione (meo iudicio) à Diosc. comprehensa lib. 2. cap. 95. Serapio cap. 80. Cicera *Chempis*; alba, *Karfenne*, nigra verò *Chabes* nominat.

Fuchl. Tria præcipua sunt Cicerum genera, album, rufum, & nigrum. Nos ex iis tribus nigri tantum picturam damus. Differunt potissimum in floribus: hoc enim, purpureos, album verò candidos flores producit.

Corn. Cicer alterum Columbinum, quod & Venerium dicitur Plinio, est, quod *εὐστραίου* [Eruium] Theoph. dixit, & Columella Punicum appellauit. Nostri *Richern* corrupta voce Latina dicunt. At verò Cicera à Cicere omninò differunt. Officinæ etiam hodie Cicer rufum, ac nigricans albo præferendum sciunt.

Cornari
differens
Colum
Venerium
Orobizum
Punicum
Ruffum

Matth. in Diosc. In Cicerum genere habetur candidum, quod & Columbinum vocatur. Est & rubeum, Venerium dictum. Habetur item & nigrum, cæteris minus, quod Arietinum appellant. Eadem tradit Matth. in post. com. Italicus, quo in loco & milius pingit & describit.

Matth.
ferentia

Anguil. Ciceris species tres, albi, ruffi, Arietini. Albi duplexes, Arietini & Eruii, à se inticera tantum figurâ differunt. Vnum simile capiti arietino, alterum poslum, vt Eruium, id demonstrat Gal. lib. 9. de comp. med. l. loc. Arietini meminit etiam Hippoc. Ruffi, duæ etiam species, Arietinum & Eruium. Niger simplex colore tantum differens.

Dod. Gall. *εὐστραίου*. Lat. Cicer Arietinum, offic. Cicer. Idem de frum. postea describit, floribus aut candidis, aut ex purpura rubescentibus, seminibus colore aut candidis, aut ex subrubente purpura nigris.

Dod. di
rentia.

Lonicerus duas habet figuratas, quamuis vna sufficeret.

Lob. & Pena Adu. Cicer satiuium Arietinum Dioscoridi. Offic. Cicer rubrum; color albus quibusdam: alia obsoletè nigricant, plurima ex fusco purpurascunt. Obl. Cicer satiuium Atietinum. Ic. Pl. Cicer Arietinum Diosc.

Cesalp. Cicer semen propè testiculis simile, colore aliis ex candido pallescit: aliis rufius: aliis niger. Erebintho Græci vocant.

Camer.

Camer. Ept. Cicer. Item horti, C. ceres albi, putreisci, & nigri.

Tria quoque tria constituit genera. Arietinum, Nigrum, & Columbinum, vel Venerium, quod non meminit le vidisse.

Cicer, Cicer Arietinum, Cicer sativum Hist. Lugd. E. p. 10. Germ. Ziser / Bircher / Ziser: Vndt Käser Erbs. Belg. Ciceren. Gall. Ciche, & Pas ciche, & Paix Pechu. It. Ceci. Hisp. Grauanco. Arab. Chemps, Hamos, seu Athamps. Angl. Ciche. Boh. Cyscuu. Hung. Bagoly ch borsó / Bubonis Pisum.

Ciceris rubri à nobis sati in Horto E. C. Montbelgardi, facillè proueniunt, si eos non inueniant mures, qui autè colligunt, tempore pluuioso facillè corrumpuntur. Habent etiam Ciceris flore & semine albos, quorum femina missa Sturgardia: Aptili sata, florere Iulio. Geneua etiam mihi missi sunt rotundi flauescetes, omnium quos videris, minimi, politi, qui sati prouenère cum flosculis albis, florentes Augusto: Geneua alioqui frequentes, satis magni, augulosi, & copiosi, Monspeliin esu vulgares. Geneua, Lugduni, & Basileæ, Ciceris magni, flauo, rufescentes vel nigricantes, flore subpurpureo, frequentes in hortis. Cicer nigrum recepi ex Anglia missum per D. Gargillum, & Sturgardia. Seritur Vere, autore Matth. appetente, pingui solo, & maturefcit Æstate, demetitur arefcenctibus siliquis: nam si citius extirpetur, semen tugosum euadit. Dod. In Italia, Hispania, & Gallia passim in agris seritur. Fuchs pullo, crassoque solo gaudet. Floret Iunio & Iulio mensibus, atque subinde in siliquis semen producit.

Cicer, vt placet Dioscoridi, sativum alio commodum est, vti nam ciet, status gignit, bonum colorem inducit, menses & fetus educit, & lac gignit, Cataplasmatibus modo imponitur, maximè cum Eruo coctum, ad testium inflammationes & fornicarias verrucas. Cum Hordeo verò & melle, ad scabiem, vlcera capitis manantia, impetiginos & cancrofa, ac maligna vlcera. Alterum porò ipsorum genus Arietinum appellatum. Vtrumque ciet vti nam, si decoctum ipsorum cum Rosmarino detur, ad morbum regium & hydropem. Lædit autem & vesicam exulceratam, & renes. Cætera, quæ Diosc. de curatione verrucarum prodidit, tanquam supersticiosa & magica hæc à nobis commemorantur. Sunt autem hæc: Contra myrmecias & acrochordonas iubent aliqui noua luna earum capita eminentia sic singulis Ciceribus tangere, deligataque in linteolo femina illa post se abicere, vt acrochordones decidant. Non admodum consuetum est, autore Gal. Alum. vrbani hominibus ex Ciceribus pulcre conficere, à rusticis verò nonnunquam vidit parari: quemadmodum & ipsorum farinam cum lacte elixari. Non enim vt Fabæ & Pisi possunt continui, vt ex ipso sativo pulmentum, quod *épyrède* dicitur, fiat. Apud multas autem gentes mos est Cicera in aqua elixa mandere: nonnulli verò nuda ipsa sola, alii sale medico condientes, sistant, nostrates verò ex siccis calcis quiddam farinæ simile facientes, id ipsis aspergunt. Est autem Cicer edulium non minus, quàm Fabæ, salulentum, sed valentiùs nutrit, quàm illa. Ad venerem autem incitat, creditumque est etiam semen generare, vnde quidam equis admixtissimè ipsum exhibet. Inest præterea Ciceribus facultas abstergeredi maior, quàm Fabis, adeò vt quidam ex ipsis calculi in renibus constantes manifestè conuincant. Nutriet autem cum de Fabis ageremus, sermonem

Tom, II

fecimus omnibus immatris fructibus communem. Eadem porò & de fixis Ciceribus audiuisse exillima, quæ de Fabis fixis diximus. Quandoquidem fixa omnia statum quidem deponunt, verùm difficilè coquuntur, & ventrem magis sistant, crassiorque succi alimentum corpori exhibent. Quæ præteriam dicta lib. 6. simpl. tradit, hæc ferè sunt. Cicer ventri commodum, cienda vti nam idoneum, laesi generando aptum: prolicit verò & menses: porò, quod vocatur Crium, hoc est Arietinum, cæteris efficacius vti nam prouocat: decoctum eius calculos tenum confringit: alterum verò Cicerum genus (vocatæ autem Orohæum) eadem vi pollet, puta atrahendi, agerendi, incidendi, extergendi. Sunt enim calidi & modicè humidi, participes item sunt amaritatis: cuius vi & lenem, & iecur, & renes expurgat: plorasque [Gerard. addit & lepras] & lichenas extergunt, tum abcessus post aures prouenièntes (*napòndes* Græci vocant) & testes induratos discutunt: tum etiam vlcera, quæ Cacoëthe vocant, cum melle sanant. Quorum vti nam in cibis idem supra docet. Nigra autem sunt ea, & exigua, in Bithynia præcipuè nascenctia, Arietinaque vocata. Huius ex aqua decoctum potare præstiterit. Vescuntur & videntibus adhuc Ciceribus homines, ante adeptam maturitatem, quemadmodum & Fabis. Cæterum de viribus Ciceris Plinius agens, etiam silu. generis meminit, velut etiam Galenus fecit & D. osc. quem ita declarat: Cicer & silu. est foliis satiuo simile, odore graui. Si largiùs immatur, aluis soluitur, & inflatio contrahitur, & tormina. Tostum salubrius habetur. Farina vtriùsque vlcera manantia capitis sanat, efficacius silu. silis. Comitiales & iocinorum tumores & serpentium idus. Ciet menses & vti nam grano maximè. Emerdat & lichenas: & testium inflammationes, regium morbum, hydropicos. Lædunt omnia hæc genera exulceratam vesicam & renes. Gangranis vtiliora cum melle, & his quæ Cacoëthe vocantur. Verrucarum in omni genere primà Luna singulis granis singulas tangunt, eaque grana in linteolo deligata abiciunt post se, ita fugari vitium arbitantes. Nostri præcipiunt Arietinum cum sale discoquere, ex eo bibere cyathos duos in difficultatibus vti nam. Sic & calculos pelli, morbumque regium. Eiusdem foliis, sarmentisque decoctis in aqua quàm maximè calida, in morbos pedum lent: & ipsum calidum, tritumque illitum. Columbinum decocti aqua, horrorem tertianæ & quartanæ minuere creditur. Nigrum autem cum G. illa dimidio tritum, oculorum vlcibus ex passò medetur. *Hæc ille.* Cicera difficulter concoquuntur, inquit Simeon Antiochenus, & excrementa gignunt. Venerem stimulant, magisque quàm Fabæ nutriunt, obstructions tollunt, & menses educunt. Habent saliam simul, & dulcem qualitatem, & ob falsuginem ventrem mouent, propter dulcedinem autem vti nam. Inflationes quoque faciunt, & lac gignunt extergendique facultatem obtinent. Nigra medicamentosam vim habent: vti nam enim vehementissimè mouent, & calculos tenum, & vesicæ frangunt. Nullum verò legumen sic, vt Cicera, præcipuè autem nigra, & parua, lapides frangere potest. Id verò magis eius rus: quod tamen vesicæ morbis supra cætera legumina officit. Cicera verò rubra calidiora, & crassiorum sunt partium, quàm alba. Omnia autem vti nam ducunt. Madesacta nocte vna in aqua, & sumpta, lumbricos eiciunt, sed qui vitur, sexiciunet horas oportet. Imposita vt cataplasma

Menses.

Calculos.

Pfora.

Parotid.

Vlcera.

Inflammata.

Gangranæ.

Obstru. 2.

Lac.

Esmb. 1.

Tumores.
Scabies.

Dioscor. &
Galenus no-
tantur.

Reicitur o-
pimo Tragi.

ma parotidib. molliunt & discutiunt tumorem. Farina horum acero subacta, & scabiosis inuncta prodest. Ius eorumdem idē riticos iuuat, & vrinam albam reddit. Oportet verd̄ iis neque ante cibum neque pōst vti, sed in medio. Tragus dicens cicetis in aqua decocti ius calculum pellere, meliūs placet, quā qui euidenter frangere affirmare non erubescunt, inter quos est Diosc. & Gal. Si tanta vis est cicerum, maximē Bithyniensium, vt euidenter frangat calculos, pretiosiores erunt auro & careris omnibus lithontrypis: nullum enim existimamus veraciter dici posse frangere calculum, nec etiam si fieret, euidenter id appareret. Cur porō Tragus primum decoctum effundat, condatatione eget. Matth. non reicit primum decoctum, quia ita scribit. Puerperis conserit in aquam insalsam: manē bibitum, ita vt post sex horas nihil comedatur, lumbricos ex intestinis eiicit: prouocant, abstergunt, attrahunt discutiunt, incidunt, & flatūs excitant. Farina ex Intybi stillantia aqua decocta & illra, iocinoris tumores resoluit, & serpentum moribus medetur.

Cicer silu. satiuo simillimum esse dicit, sed folia non denticulata, & siliquis minores, rotundioresque, plantam verd̄ in vniuersum hirsutiorē, atque asperiorē. Cicer autem, de quo hīc agimus, non est hirsutius, neque asperius satiuo, neque etiam simillimum, icon quoque Marthioli non tale demonstrat: suspicamus eum eiusmodi imaginariē scripsisse, in com. siquidem non describit.

Cicer silu. Camer. Epit. Matth. Eidem in horto, fructu tamen nonnihil differens, quia maior & oblongior.

Cicer silu. herbatiōrū aliud, Lob. & Penā Adu. folliculis Coluteæ, quod longius videtur recedere à Diosc. silu. Cicere. Marthiolus huius picturam mentionemque ridiculē inculcat in Indice, non describit. Osheru. & Ic. Pl. Cicer silu. Herbatiōrum. Cicer silu. ad [Gefn. horti] Dalech. Lugduno misit. An Anguil. Cicer siluestris.

Cicercis silu. quemadmodum à Matth. depingitur, fructum, aliquando ad Dodon. Cl. Cortusius misit. Odor autem herbæ qualis sit, competum Dod. non habet: is autem si fuerit, quod dubio procul. Videret eidem in Hist. cicer hoc silu. primum magis quā reliqua cum silu. cicere conuenire.

Cicer siluestre Matth. Petrus Turn. Angl. mihi Heidelbergæ attulit, dicens radicem crassam, dulcem, saponique Glycyrrhizæ habere. Plantam siccam D. Agenus dedit, & semina, quæ per me facta in horto Ill. E. C. Iulio mense floruerunt. Gigatur, vt Hist. Lugd. scribit, in salueto salueto, quod Rhodanus alluit prope Lugdunum.

CICER SILVESTRE MVL-
TIFOLIUM.

Descriptio.
Radix.

Folia.



Cicer silue-
stre mul-
tisfolium, pe-
renni radice,
crassa & dulci
donatum est:
ramos bicubi-
tales & aluo-
res profert;
stiliatos, tor-
tuolos, conca-
uos: folia hir-
suta, pinnata,
satiui cicercis
positu, sed
longiora, an-
gustiora, nec
per ambitum
crenata, ad Lē-
tis maioris folia
propius
accidentis, ni-
si in obtusum

& subrotundum in utro nem desinerent, subdulcia: coniugationes multæ, ad tredecim suppurati, ex foliorum alis pediculus palmaris exit, rigidulus, spicam breuem sustinens florum subluteorum, quibus racematum cohærentes succedunt folliculi breues, ventriosi, hirsuti, semina continentes, autore Dod. exigua, dura, plana, splendētia, gustu Phasioli.

Flores.
Folliculi.
Semina.

Icon.

Matth. no-
tantur.

Dolemus iconem nostram depictam nobis absentibus, ex iconē, quæ non placet, quæ est apud Lobelium, ac ex non bona deteriorem factam.

Cicer silu. i. Tab. Icon. wilder Zisererbs. Cicer Matth. in Hist. Lugd. & Cicer silu. i. Dalech. Sed hīc duas icones vnius plantæ exhibitas existimo. Cicer siluestre Matth. Clusio exili candicante flore.

Cicer silu. omnibus serē notum esse, Matth. in Diosc. quidem scribit, ast nec describit, nec depingit. In post. com. cum mag. icon. & Italicis ponit figuram, sine descriptione. Idem in Epit.

CICER SILVESTRE MAIUS
THALII.

Cicer silu. maius, scribit Thalius in Harc. Silu. conuenit fermē cum eo, cuius Matth. iconem exhibet, nisi quod folia non sint rotunda, ita vt Icon Marthioli habet, sed oblonga, nigra, hispida, non dentata (quam ipse quoque notam in suo requirit, Lenticula foliis similia. Sunt & costæ, quibus folia inhaerent, Marthioli plantæ costis longiores multo, pluribus in idem folius præcinctæ. Caulibus vitigineis humi reflectitur, brachiatis, ac latè expansis. Flores profert in densa spica conseritum conglomeratos, Lenticulæ similes, luteos, quos subsequuntur membranæ vesicæ, agminatim cohærentes, subflauæ, pilosæ in acutum mucronem prominentes, minores siliquis cicercis Arietini, quibus conduntur parua siliqua plena seminibus rotundis, paruis, flauescētib. similibus fermē Loti satiuū sex inibus.

Vocat autem hanc speciem maioris nomine, quod eiusdem duæ aliæ species reperiantur, quarum altera mediam magnitudinem obtinet, altera longè minor est.

Misit mihi ramum pro cicere Thalii Cl. D. Doldius, quod an ab antè à nobis tradito diuersum, dicere non auisim: tredecim in eo coniugationes foliorum: flores planè similes videntur: verum foliola apparent longiora, quàm de monstrat Icon Camerani: verum ea varietas pendet fortè à cultura, talem habeo collectam Argentinæ in horto Frid. Meier: non sunt tamen hispida, quod de suo prædicat Thalius, vix apparent pili, quemadmodum etiam in præcedenti.

De hoc autem hæc Doldius scribit. Hanc pro cicere silu. maiore Thalii agnosco, omnia respondent, excepto eo, quod vesicæ dicat habere agminatim

Folliculi
Coluteæ

Cicer
herbari-
um.

Locus
Temp

Folia.

Caulis
Flores

Vesicæ

Siliqua
Semina

Inscrip-
tatio.

Variet

minatim coherentes, subflauas: cum huius sint nigrae, neque vesicæ filiculae inesse intelligere possum, sed ipsæ filiquæ agminatim iunctæ, vesicæ singulas referunt, semen subflauum, compressum. Serpit longè, folia dulcia sunt, & radix, vt ad Glycyrrhizas silu. referri possit.

Prouenit, auctore Thilio, Cicer silv. mains. locis pratensibus, Minus autem, quod duplex, in montibus Hærcinæ adiacentibus, ac meridiano Soli expostus nascitur.

CICER SILV. TRIFOLIUM.



Digitalem demittit radicem, singularem aliquando, aliàs in paucas fibras diuisam, lignosam, dodrantalem, quæ terrâ versus in plura capita, squammatâ diuidi incipiens, ex singulis vnum, vel plures tollit caules cubitales, & in ramos aliquando subdiuisos, linquēcentes, hirsutos: pediculis autem longis

trifolia hærent coniunctim folia, maiora quàm fatui Cicers, rotunda, hirsuta, circumquaque serrata: flores Cicers, medioeriter magni, quos filiquæ excipiunt binæ ferè, ex vnico longo pediculo, vniâ longiores, hirsutæ.

Cicer silv. 2. Tab. Ic. vñd. Zifererbs 2. Cicer silv. verius, è Sabaudorum finibus. Non abs re quis coniecerit, inquit Lob. Obl. illud Diosc. silv. esse: flores purpurascunt, semina Cicere multò minorâ. compressa, & potiùs Cicerculæ similia. Item. Ic. Pl. Cicer silv. verius. Cicer silv. Dodon. in fol. al. terum, quod ad iconem, tertium, quod ad descriptionem. Ponæ tandem in Baldo, Cicer silv. al. terum Dalech.

Genear. prouenit in monte Saleur.

OCHROS IN GENERE.

CAP. VII.

Ochri (Eruilæ Corn.) Pisif magis fecedunt, minus inflant, & probè alunt: ex autoritate dinini Hipp. de diat. lib. 2.

Theop. Ochrorum meminit, vnien tantum in loco. Hist. sc. lib. 8. cap. 3. dicens: Legumina alia oblongiori sunt folio, vt Ochros (Cicera.) Caulis autem procidens.

Multò plenius de hoc egit Göl. alim. lib. 1. 25. cap. Ochron [scilicet Eruiliam vertunt] homines, quemodo & Fanugræcum, prius in aqua, quoad radicem preduxerint, macerantes, ventris subducendi gratia mandant, ante alios cibos, garo insingentes. Succum autem, cum coctus est, atque in corpus distributus, habent copiosioris alimentum, quàm Fanugræcum. Atque in Alexandria iu- Tom. II.

uenem quandam nouit arti Medicæ deditum, qui per annos quatuor singulis diebus solis his pro obsonio, vtebatur, Phaleolus, dicit, Fanugræcum, Eruiliam, & Lupinos. Attingit autem interdum & Oliuas ex Memphis, & olera, & paucis fructus, eos, qui citra coctionem manduntur. Propositum enim ei erat, ignem nunquam accendere. Omnibus certè illis annis sanus fuit, nec vlla in re habitu corporis, fuit detecit, quàm ab initio. Mandebat autem fructus huiuscemodii cum garo felicet, oleum aliquando solùm ei adiciens, nonnunquam etiam vinum, aliàs acetum, interdum verò salem tantum, sicut & Lupinus. At de salubris quidè victus ratione in lib. de tuend. sanis, copiosè tractauimus: tractabimus autem postea etiâ summatim in opere hoc. Nunc autè iis, quæ de Eruiliis & Phafelis dicta sunt, id quom addatur, hæc ædulia medium quodammodo locum obtinere inter ea, quæ succum bonum, aut prauum, generant, inter concoctu facili & difficilia, tardè & celeriter transeuntia, flatulenta & flatûs expertia, partim & multum nutritia. Nullam enim efficacem habent qualitatem in statunrundam, quæ acres, aut acerbos, aut salios, aut amaros, aut dulces habent sapos. Et cap. 26. Lathyrus [Cicercula] substantiâ Ochris (Eruiliis) & Phafelis similis. Tandem cap. 28. Ochros (Eruilia) Hipp. Diocl. Ceterum vide plura sub Phaleolo & Dolicho Veterum.

Theodorus (Cæsalp.) Eruilium vertit id quod Theophrasto Ochris vocatur, quamuis aliquando Cicerum vertat, quasi putauerit idem esse, Eruilium, & Cicerum, & Ochrum.

PISVM IN GENERE, EX Veteribus & Neotericis.

CAP. VIII.

Pisum, quantum quidem ex Theophrasto colligere licet, oblongum producit folium, caulem verò humi procidentem. Huic morbus, vt omnibus feminibus, ob alimenti, calique temperiem euenit: videlicet cum plus, minùsue est, vel etiam cum non tempestiue humescit. Sic enim & vermes Ciceri, Cicerculæ, Pifoque in nascuntur, & eruca. Pisum omnium maximè fragile est, nam & rubiginis est oportunissimum, propterea quòd folia habeat numerosa, & radicem imbecillam.

Ceterum, quemadmodum Dioscorides Fabam, cuius vires in dicat, non describit: ita quoque nec Pisum describit, nec eius meminit. Vnde turpiter errant, qui Cicer arietinum Dioscoridis censent esse Pisum vulgare, quòd germanicum Erweissen sohn accedat ad Erebinthum: necnon ii, qui putant Pisum, Germanis Erbe dictum, Eruil esse Latinorum & Orobum Græcorum, vocabuli similitudine adducti. Nihil enim probat vobum ista similitudo in linguis tam distitis. Ita enim Puilegium Polium fuerit, inquit Turnerus, quia Germani Poley interpretantur. Ieiunum ergo & infitum apparet esse eiusmodi omne argumentum, à nudo nomine petitum, nisi descriptio & facultates conueniant: at descriptionem & vires Pisi cum Orno & Erebintho non conuenire suis dictis est locis. Erebinthus, auctore Theophr. in terram non procedit, sed obliquè surgit, Pifa autem in terram eaduca sunt. Ergo. Pisum folia habet longa, Erebinthus non item, Ergo. Galenus de Cicere arietino, & Pifo, vt de duobus diuersis leguminibus, duobus distinctis agit capitibus.

Correçio.

Theod. err.

Pisiformis morbus.

Rubigo.

Error multum erratum Non est Cicer arietinum.

Non est Eruilium.

Plinius quoque vno capite Cicera à Pisis separat. Erebinthus itaque, laudè Cicer, non est Pisum. Orobium Theoph. obliquè cretete affirmat, At Pifa nostra cuiuscunque generis, sunt *ὄροβιον* & *ὄροβιον* [humi strata.] Galenus etiam scribit omnia Orobi genera, planè esse amara, At omnia Pisorum genera, planè dulcia sunt, sine omni amaritudine, Ergo. Cæterùm, verba Plinii de Pifo, non in dubium vocant, ancipitesque faciunt, an ei cognitum fuerit, necne Pisum. Ita enim inquit: Cicercula minuti Ciceris, inæqualis, angulosi, veluti Pisum.

Eruilium vulgò. Mes Almes Almelis.

Legumen, quod Eruilium vulgò vocant, teste Manardo, non est id quod Arabes *Mes*, vel *Almes*, vel *Mesfe*, neque id, quod *Amelic* vocant. Auicenna asserit *Amelic* esse Erbum. Quoddè verò Erbum Auicennæ (Orobion Græci appellant) nos Eruum, sit tam ab Eruilia nostra, quàm *Mes* Auicennæ diuersum, clarum est: Eruilia oculum non habet. Scribunt præterea Auic. & Isaac in cortice *Mes* esse ponticitatem, [ita enim ipsi appellant saporem acerbum *ερεβόδον*] linguam adstringentem, qui sapor ab Eruilia alienus. Eruilia quoque non sunt Pifa: scribit enim Plinius, Pifa habere angulos, vt Cicercula, quos in Eruilia nostra non videmus. Quoniam nomine hæc ses ab Antiquis cerfecatur, quam Eruiliam Plinii voce nonnulli, vel parim ab ea defleendo *Rouilliam* vocant, *Pisaretos* Veneti, *Rodiones* alii, hoc operosus est valdè iudicare. Sunt tamen quæ ipsium mouent, vt credat Eruiliam esse id, quod Theoph. & Diocles *Dolichon* vocauerunt, & Galeni tempore Phasiolus. vel Lobus dicebatur, & à Theodoro Siliqua appellatur: quamquam Siliqua existimanda est aliud legumen iuxta Latinos Auctores. Eruilia scilicet inter legumina edi ab hominibus siliquas simul cum semine, nemo est qui nesciat: cum & crudæ aliquando ab otiosis, & coctæ à nobilibus, confecto præsertim ex iis delicato quodam pulmento, libentissimè mandantur, aliorum leguminum siliquis in cibum iumentorum proiectis: Si igitur, Eruilæ sunt Dolichi, quis ambigit malas esse, & esum harum prohibendum fuisse vulnerato prope genu. Hæc Manardus existimans Eruilium esse. Pisum. Sed falsam & infirmam eius esse opinionem quotidianus ostendit vsus. Hodie enim non vnus solus planta siliquæ eduntur, sed duarum, nempe Pisum vulgatum, cuius variæ species, & Smilacum hortensium, siue Phaseolorum dictorum vulgò. Sed dicere quispiã poterit [autore eodem] de Phasiolo i.e. de legumine, quod Latine dicitur Eruilia, sub Phasioli nomine scripsisse Dioscoridam.

Rouillia.

Dolich. Phasioli. Siliqua.

Manard. not.

Eruilia. Phasiolus. Diosc.

Orobium non est.

Quod ad Orobium attinet, Mundella in exam. simpl. med. Ant. Musæ Brass. cum existimat nequaquam Eruiliam esse posse domesticam, quæ Ianuario mense seritur, & paxillis quibusdam postea in herens, eosque scandens, fructum parit, de qua Manard. l. b. i. sed Eruiliam, quæ Ferrariensisibus *Ruione* dicitur. Quicquid autem illud est, certum est nullo modo Orobi facultates Eruilæ conuenire posse, cum quia Orobium grauedinosus traditur à Diosc. & sanguinem per vrinæ meatus, si, vt ille & Galenus aiunt, largius sumatur, euocans, tum quia in cibus eius vsus damnatur, tanquam ingratus, amarusque est secundum Galenum. Satiua verò Eruilia Brixianis lingua ipsorum vulgari *Rouillia*, nostris at tem Veronen-sibus *Bisi* appellata, neque amara est, sed potius dulcis, & ad cibum homini non tantum non damnata, sed satius, & quæ plurimum come-

dentes oblectare possit. Sanguinem verò per vrinæ ductus, quod quidem aut Mundella videtur, *Psium* & *Psium* aut aliunde accepit, nunquam ciete visa est: neque capiti grauitatem adfert, vt ex iis, qui eâ creberrimè vici consueverunt, manifestum est. Quare plurimum hallucinantur Pharmacopole, qui Orobi vice Eruiliam altilem seruant, eamque pro Orobo vendunt. Præterea quis vt quom suspicari possit in Eruilia hæc nostra illam secundæ sedis exiccationem inesse, quæ in Orobo ad curandas gangrenas pollet.

Psium ἢ *Psidium* Græc. Pisum Latin. dicitur. Officinis hoc nomine notum. germ. *Erbs* oder *Erbsen*. Gall. *Pois*. Sic autem à Pifa, loco, in quo copiosissimè nascitur, nominatum est, inquit Fuchs. Hist. c. 240. Duo apud nos genera Pisorum repetuntur. Vnum in aruis caducum, humi setpens, quod genus Germani *Blein felder Erbsen* nominant. Floris, vt pote vulgaris, picturam haud damus. Flori papilionis forma circa vrbilicium, granis rotandis, & vt Plinius lib. 18. c. 12. ait, angulos multos, inæquales, habentibus: mirari laus non possum, vt de plantisque in picio otta sit, vt Pisum nostrum legittimum esse dubitauerint. Scio autem esse, qui legumen hoc, quod hodie passim Pisum appellatur, putent esse: cicer Aretinum: quorum serentiam probare non possum, quòd Plinio teste, cicer Aretinum non sit dictum, quia valuit effugere aeterni cornu exprimant. Alii non placet Fuchsum determinari florem & seminum in Pisis non ostendere.

Cicer Aretinum.

Pisum, sic enim vocant vulgò, sed perperam, *Pisum* in Germania tria satua genera celebrant, quæ genera *Græci* *Tragus felder Erbsen* / *Bletz Erbsen* / *Erbsen* & *Pfal* oder *groß garten Erbsen*, dicit. *Pisum* *albo* *flora* *agrestia*, flore candido: Ex his nonnulla repuntur, quæ sububricant, vbi deocta fuerint, floribus veluti rosei coloris comantia. In terlegumini-genera vix vllum vitatus est Pisis, præsertim verò agrestibus, quæ nullo admiruculo sulcata, humi serunt potius decumbunt. *Omnia Pisum genera aliofola sunt, Hiernique impatientissima.*

Pisi nomen huic legumini vno consensu imponunt omnes. Manardus statuit Phasiolum & Dolichum. Ego cicer Aretinum Diosc. esse iudico, quod ille lib. 2. cap. 59. sub Erebintho describit, quæ vox cum germanica appellatione *Erbsen* siue *Erbsen* satis conuenit. Hebraei siue Thalmudistæ potius, *Par Kedan* vocant.

Atahe, quod tetam, Phasiolorum haud meminere, nisi fortè *Mes* ad eos pertineat. Peregrinus Phasiolos tertio loco à nobis descriptos. Serapion. *Mes Roullas* esse iudicamus.

Duas figuras habet Lonicerus cum his titulis, *Groß oder Blogerbeyß* / & *Blein* oder *felde Erbsen*. Item *Erbsen* Græcis, vnd Latinis Pisum; magna dicuntur *Groß Blogerbeyß*, *groß garten Erbsen* / *felde Erbsen* / *parua Föld Erbsen*. Variæ sunt species colore, magnitudine, & figura, satia & siluestres. Et Paulò pòst aliam Pisorum figuram ponit sub hoc titulo, *Blein* / *fäseln* / *Dolichos*: cum tamen in descriptione longè aliam plantam intellexerit. Ihidem in prima descriptione ex duabus plantis, nempe Phaseolo Itatorum, & Phaseolo Tragi, vnam fingit descriptionem: omnia pro suo more confundens. Pisorum duas habet figuras Matthiolus sub titulis Pisi maioris & Pisi minoris: sic duas Pisorum faciens differentias: traditque Dioscoridem de Pisis non scripsisse, ac præterea Brassanolum credidisse Eruiliam, quæ Theoph. Gal. ac Paulo

Pisum.

Ochros appellatur, legitimum esse Etuum, & minus vicinitate deceptum.

Piscolus vulgò Cæsalp. teste, appellatur semen candidum. & rotundum: flores colore alius rubente, aut vario, cui in siliqua pauciora insunt grana, grandiora & rotundiora: cui plura, eadem minorata, & magis farcta. Græci Phasiolos & Phaeolos appellant, vt Galenimaduertit, alios à Phafelo: Siliquas lobos appellant, vnde & ipsi Phasiololobi, id est, siliquæ dicuntur: eodem Dolichos appellari testatur apud Theoph. Hippoc. & Dioctem. Siliquam apud Theop. Theodorus vocat. Dioscoridi Phasiolus, Plinio Faeolus vocatur.

Pisa à Pisa loco (inquit C. Bauh.) vbi olim copiosè nascebantur: quæ diuersorum generum sunt, maiora quæ hortensia, cuius fructus dum virides rotundi, rescicati angulosi sunt: colore candido, aliàs fardido: hæcque duplicia, vel sine folliculis comedantur, vel simul cum folliculis, & leptoloba dicuntur: sunt quadra: sunt minora, quæ vel hortensia, & ramis affixis in altum scandunt, & ramulare Pisum dicuntur: vel in agris feruntur, & humi serpunt, & sunt alba (quæ maiora & minora) vel viridia, vel cœulea, quæ rariora, vel ruffa, quæ nostris cinerea dicuntur. Est Pisum proferum, vbi plures siliquæ si ul inunguntur: sunt ipsa Americana rubra, sunt & fluctria, de quibus omnibus in Historia.

Tiçors, Pisum, Germ. Erbs. Gall. Pois: It. Pisello Pifo: Angl. Drasc. Boh. Erach: Hung. Dorfo.

ra, nunc rotunda; nunc quadratâ, interdum flaua, rubra, & virefcentia.


Cæterum Pisorum, siculo iam à nobis propositum, Erulæ nomine meminisse exitumatus Mundellam & Manardû: de hac nos antè, Klein oder feldt Erbeis/ Pisa flore albo, minorata alba, Fuchl. Pii vnum genus in aruis caducum. Trag. Veldt Erweyssen, Pisa agrestia flore candido.

Dolichum non sunt illud Pisorum genus, vt rectè contendit Mathiolus, quod Aufonius vulgò dicitur *Rouiglione*, Tridentinis verò *Erbeis*, vt Manardo placet. Quandoquidem hæc sub Ochri nomine, tam Galenus, quàm Pinus descripsit. Idem in com. cum mag. figor. Pisum minus duum generum statuit, album & cinereum, quod Erulam vocant quidam, Ananienfes & Trid. nani Arabis, alii *Rouiglione*, atque *Tragum* perperam putasse Pisum cicer esse Aretinum. Et in com. Ital. cum mag. fig. *Piselli minori il semen bianco* & *l'altra heretino*. In Epit. Cam. Pisum minus, quæc. *Arum unger*. It. *Pisello minore, duum generum, album & subnigrum*. In Hist. germ. *Kleine feldt Erbsen*. Pisum minus. Flores albi. Hæc varis in locis Matth. quem miror vni minorum Pisorum suorum tribuere modò colorem cinereum, modò subnigrum.

Meminit Cam. in horto in genere Pisorum vulgariam & siluestriam. Huc tandem quoque refero Tabic. & Hist. Pisum minus 2. Sic *Kleine feldt Erbsen*, quamvis Compilator nihil certi de eo scribit.

Ex Pisis, paruis, albis Montbelgardi agri conferuntur, vt etiam in horto Ill. E. C. V. in Bedfordia adhuc in horto in fine Aug. lib. Apricis gaudet locis, autore Fuchio, frigora n. n. que impatientissimum. Tepidum itaque locum, & celum frequentis humoris desiderat. Iunio & Iulio mensibus floret, & subinde etiam semina in valulis profert.

PISA POTISSIMUM VVLGARIS, parua, alba, siue aruensia.



Generali quadam notione Pisa circumscriberis, quorum differentias petet studiosus lector ex synonymis. In genere ergo hoc legumer, sicuti alia, brevis durationis, tenui est radice, fibrosa: caules fistulosi, alienæ opis indigi, & nisi palis sustentetur procidui: folia genicula aduerso situ ita complectuntur, vt

ab eo transdigi videantur: quanquam in adnatis furculis, eorumdem sit pinnata dispositio, eo quod furculi superest, in capreolos teretiles, quibus proxima quæque accipit, abeunt: flores ex geniculis pediculo nudo insident, forma ad Genistæ flores accedentes, sed colore albo, vel purpureo, vel ex albo virefcente, vel variegato: sili. quæ iis succedunt, biræferè, cylindracea, pensiles, bifores, & carnosâ pulpa, minus tamen multâ, quam in Faba, in quibus reclusa ad commissuram anteceduntur pisa, aliàs maiora, aliàs mino-

PISI PVLCHRA SPECIES folio anguloso.



Pisi varietatem in horto Frederici Meien; quem Argentinæ colit, collectam dedit D. Agerrius. Cuius viticula, quam vulgari multâ tenaciores, denticulatoresque apparent: ad foliorum originem foliola bina, lata & Aphaces Dod. folis quodanmodo amulantiâ, obtusiora, ima vtrimque parte angulosa,

quasi ferrata. In pediculis verò, qui in capreolos desinunt, quaterna tantum foliola hærent geminâ oppositione. Pisi vulgaris minora, plerumque etiam denticulata. Flores singulares tenuibus pediculis hærent quam in his multâ.

minores, rubelli in secca planta: quibus singulis
singula succedunt siliquæ.

PISA PARVA VIRIDIA.

Pisa viridia, minora, rotunda, eiusdem valde
magnitudinis cum Pisis ex purpureo variegatis,
ni minora, quaterna, vel quina vna in siliqua,
coloris ex albo viridis, unicoloria, dempta ea
parte, quæ siliquæ adherent, quæ pars nigricat, in
foliis discrimen non animaduerto.

Pisi tertia species, Dod gall. fructu albo, aut viridi; interdum cinereo, aut nigricante. Græcè *ὄξυς* Plin. Eruliam; Gal. *Pois*, Germ. *Erweyssen* Belg. *Erweten*. Ital. *Rouglione*, Venetis *Pisarel- li*. Idem in fol. & Frum. Pisum minus, flores vt plurimum candidi, aliquando tamen ex purpura obscuro: semina vt plurimum luteo, subinde viri-

Ochras. Eruliam. Rouglione. Pisarella.

renti colore. Græcè *ὄξυς* à luteo ochræ colore quem interior fructus medullâ refert. Plinius & alii Latini auctores Eruliam, Recentiores ac Officina passim Pisum, & Pisum minus nōninant: propter similitudinem cum Piso, licet fructus rotundus, & non angulosus, quale, Plinio teste, Pisum est. Mirum Dod. in post. omittere Pisa alba, & alios colores. Figura sui Pisi minoris est cap. præcedenti sub titulo Pisi maioris. In sum. hist. figuram eandem habet pro Piso maiore & pro Piso minore. Quid existimem de Pisi figura, quam olim posuit pro mediocri & minore Piso, dictum sub comoso, quod non bene distinxit nec historiam, nec figurâ à cæteris, quamvis minoribus magis conueniat.

Pisum peregrinum [ait *Ca. sisp.*] & in Italia sem-
men Piscolo nostro paruo in cæteris simile, sed
colore viridi etiam cum perfectum est, diuque
durat incorruptum. Piscolus viridis appellatur:
foliis paulò oblongioribus: floribus purpureis.
Theoph. folium ei tribuit oblongius, Plinius ead-
em confirmat: frigidis impatientissimum, idè
in Italia non nisi verno tempore seritur. Serapio
ait Oculum habere pupilla in albo nigra. Galenus
Pisis substantiam tradit similem Fabis. Ast nos
in nostris Pisis viridibus, non animaduertimus
folia paulò oblongiora, nec flores purpureos.
quam obrem iterum diligentius erit consideran-
da huius Pisi planta.

Lob. & Pena Adv. Obs. & Ic. Pl. Pisum minus
ex luteo virefcens. Mirum non meminisse Lob.
Pisi albi. Sui Pisi minoris figuram bis ponit hoc
loco. pro minore & antè pro maiore.

Pisa minora viridia mihi prouenerunt Montbel-
gardi fatâ in horto Ill. E. C.

PISA MINORA EX PURPUREO
variegata, Vicis similia.

Parua hæc sunt, nec Vicis multò maiora, in
quibus tamen puncta quædam ex cineritio
purpurea conspiciuntur, vt in vicis vulgaribus, à
quibus idè non ita facillè distingui possunt. Her-
ba verò, caulis, vt siliquæ, multum à Vicis vulga-
ribus differunt, quia angustiores, rotundiores,
nec hirsuta.

An Dod. gall. Pisum tertium colore interdum
cineritio. An Matth. in Diosc. cum mag. fig. Pi-
sum minus cinereum & in Ital. *Seme beretino*.

Prouenit mihi in horto Ill. E. C. etiam eo-
dem loco culta, quo cætera Pisa & Vicia, eodem-
que etiam tempore matura.

Desct.

Loggs.

PISA MINORA, RVBRA, VARIEGATA.

In agris cum aliis Pisis albis hoc Pisi genus non
rarò ipse collegi. Est autem formâ & colore ma-
iori simile, flore purpureo, semine variegato.

TRAG. hist. germ. *Das Flein geschlecht* Fas-
seli. Quidam volunt Arabum *Mes*, aut *Almus* esse
Pisum. In Auc. scriptum est *Meisse*. In Serap. *Mes*
& *Roullie*, existimò intellexisse die *Fleine braune*,
feldt *Erweyssen* aut nostras Fabas germanicas
aut tertium genus peregrinum Phasiolorum. Et
Hist. lat. Phasiolorum secundum genus.

Camet. hort. Pisa rubra, Trago Phaselus (mi-
nor.)

Phaselus minor.

PISA MAGNA, RVBRA, VARIEGATA.



Hominem magnitudi-
ne multum excedit hoc Pisi
genus, florum fert purpureum
in medio, & in latiori parte ro-
scum, in superiore siliqua ma-
gnæ, succulæ, Pisa intus valde
magna, non rotunda, vt mino-
ra, sed angulosa, vel potius com-
pressa, pulchri coloris, variega-
ti ex rubedine & albedine, cor-
tice, crasso vbi coquantur, à

Desct.

Flor.

Siliqua.

Coriæ.

Germanis magni sunt in cibo.

Cam. hort. Pisa rubra, Italica, grandia, Phæo-
lus Trago. Tab. 20. & Hist. Pisum quadrarum
Plini *Fasel* Eibsen. Trag. Hist. germ. *Faselen*.
Diosc. lib. 2. cap. 99. *caulos*. Si quis etiam velit
Ciceris non reluctaboi. Idem in Hist. Lat. Phasio.
li, *Faselen*.

Paulus Phasiolos, Dolichos cognominat.
Diosc. tamen si cognouisset Phasiolos Dolichos
quoque Græcis cognominari, ex Theoph. vtique
& aliis id indicare potuisset. Existimamus ergo
Phasiolos esse eos, quos Germani *Faselen* vo-
cant. Si quis tamen ad *Ciceris* referat, cum eo mi-
nimè contenderim. Phasioli differunt maximè in
eò à Piso maiori hortensi in geniculis, qui inter
folia & ramulos visuntur non planè purpurei
apparent, quod in nullo Pisorum genere depre-
hendendis: flores non albi, vt in Pisis, sed in ante-
riore quidem sui parte rosei coloris, in posteriore
verò purpurea saturata: semina habent rotundòs
angulos: alia quidem spadicæ: nam plura eorum
sunt genera. Tragus pro Phasolis exhibet figu-
ram, quam pro Piso quoque ponit.

Lob. & Pena. Adv. Pisum angulosum horto-
rum, quadrarum Plini, semine ferrugineo, & rus-
so colore, videntur angulosa Plini Pisi. Obs.
minor. An Pisum angulosum horrorum, sit quadra-
tum Plinii? Pisum maius Dod. Peiperam Ci-
ceris arictinum Tragi. Hist. *Arneias*.

Label. non distinguit Pisi, vt Tragus, nec di-
stincta

Pisum quadrarum.

Ciceris.

li, Faselen.


stinè de Pisis scribit. Figura, quam habet, est pagina sequenti pro Piso minore.

Lonicer. confundit hoc Pisi genus cum Phasiolo Italorum.

Dod. gall. Huius Pisi mentionem facere videtur. Item de frument. & in fol. vbi figura cum inscriptione: *Pisi maioris alta icon.* Sed iam ostensum Dodonæum non exactè distinguere Pisa maiora.

Pisa magna rubra variegata colimus in horto Ill. E. C. Montbelgardi, colunt etiam alij. Basilæ & Genæ vidi. Montbelgardi Iulio matura quidem, & Augusto adhuc florentia.

PISA MAIORA. ALBA.



Pisa alba maxima, Pisis vulgaribus sunt similia, flore nunc purpureo, nunc albo; semina quidem alba, non autè ita angulosa, siue compressa vt illa: maiora quam sint Pisa comosa, nec ita rotunda.

Fuchf. hist. Pisum alterum germ. Groß garten Erbsen. Item Ic. Pisum maius, Groß

Erbs. Fuchf. non scribit an cultum intelligit: si illud curauit depinger dum, quod suspicor, non placet quod in generali descriptione Pisi dicit, florem circa umbilicum purpureum: non enim omnia Pisorum genera partem habent purpuream.

Lob. & Pena Adv. Pisum vulgatius maius. germ. Erbsen / Angl. Pease Erbsen. E quodam vrbis Pisa inrer Aflam & Olympum montes sita Pisum allatum, & dictum volunt, græcè *λευδοβ* quasi dicas oui vitellum: flore est figuræ Papilionis. albicante, sui medio purpureo: quibusdam Germaniæ locis spontè germinat. An Lob. benè distinguat Pisa, iudicent lectores. Pisum maius album nihil habet in floris sui medio purpureo: optatim etiam annotatum locum Germaniæ vbi spontè proueniat. Ic. Plant. Pisum vulg. maius.

Dod. gall. *Pois ramiers: gall. αἰὼν* & *λευδοβ*. Pisum. Brabant. *Groote Ervten* / *Roomsche Ervten* / quibusdam *Groote Ervten*: hæc species verum Pisum descriptum à Plinio & Antiquis: in hist. frug. ostendit, non esse Faselum aut Dolichum. Flores purpurei: semina sicca, angulosa & cinerea [græcè] Figura, quam Dod. ponit, est Fuchfiana, nec mihi videtur bene describere, neque distinguere Pisa maiora: quar quam in Hist. gall. potissimum tradere videatur, Pisa maiora, varia. Idem in Hist. lat. frug. & in fol. Noster, inquit, vulgè *Roomsche Ervten* & *Groote Ervten* / aut *Stoof Ervten* appellant, ac Latine Pisum Romanum, aut maius. Theophrastus & alij Veteres Græcè *λευδοβ*, Latine Pium. Plurique etiam

λευδοβ, sed parum proprie. *Lecythos* siquidem non peculiare aliquod legumen, aut frugis genus, sed pulmentarium ex leguminum farinis est, vt Gal. lib. de Euchymia & Cacochymia testatur. *Hæc Dod.* cui flos candidus cum purpurea nota circa umbilicum. Apparet Dodonæo non bene notas differentias maiorum Pisorum ex descriptione: pro maiore figuram habet Pisi minoris Lobelii, quanquam apud Lobelium etiam posita sit pro maiore: ea ponenda erat capite sequenti, vbi figura maioris P. si non bene possit pro P. minore. Addit præterea Dodonæus etiam hanc figuram cum inscriptione: *Pisi maioris alta icon*, quæ conuenit cum P. vario minore.

Tab. icon. & Hist. Pisum minus i. Klein Erbsen *Tabern. nat.*

Quam Tab. compiler ponat suo more indistinctè figuram sub prædictis titulis sine descriptione, quòd referam nescio, nisi hoc loco ponam.

Lonicerus quoque huius Pisi meminit, non tamen describit, picturam tantùm ponit.

Math. pluribus in locis de hoc agit. In com. in Doct. cum mag. fig. Pisum maius. Pisum rotundo & candido semine: flore papilionis figura, circa umbilicum purpureo. Idem in Ital. com. cum mag. figuris. *Piselli maggiori*, i. e. Pisa maiora: fructu albo, flore in quibusdam albo, in aliis purpureo. Item in Epit. cum add. Cam. Pisum; Græcis *μαῖον*; Ital. *Pisello* & *Biso*. Alterum maius semine rotundo & candido. Flores umbilico tenus purpurei & quandoque in vniuersum candidi. Tandem Hist. germ. Pisum maius flore cæruleo [sic] s[ic] f[er]at aut albo: errant qui Cicer Arretinum volunt, *Groß garten Erbsen*. Nec Math. videtur bene distinguere Pisa: maius semine candido, nihil habet purpurei in flore.

Pisa alba maxima Basilæ, Genæ, Montbel. gardique vidi Iulio matura, ea habemus in horto Ill. E. C.

PISVM ERECTIVS COMOSVM M.

Erectius vulgari Piso, caule firmiore, crassiflore, potissimum parte superiore, striato, inanis, suâ vi assurgit: ex intervallis foliorum alas, costâ mediâ, cui annexûr, in tortiles capreolos abeunte, producens, sed nullo flore, nullo fructu, præterquam in summo caulis fastigio, quod floribus albis, numerosis, in orbem politis densè stipatur, quos siliquæ vulgato satiuo eadem radiatâ serie comantes, excipiunt, geminæ, aut tergemine eidem pediculo appensæ. Pisa continentes alba, satiuus vulgatis minora paulò orbiculata, ad arvensia accedentia: permixtis pinatis folijs, quam in reliquo caule minoribus, radix fibrosa vt in cæteris.

Camer. hort. Pisa atro-carpa. Compiler Tabern. Ic. & Hist. ponit figuram sine descriptione, hoc titulo: *Pisum proliferum. Büsch Erbsen.*

Iconè Tabern. assumpsit C. Bauh. apud Matth. pro P. maiore, quod non placet.

Trag. Pisorum genus *Kloz Erbsen* & *Pfalz* floribus albis. Dod. gall. Pisum 2. flores plerumque albi: fructus rotundus, etiam siccus. Dodonæus videtur innominato Trag. ex eo suum genus secundum facere: figura, quam ponit nomine Ochris ex *Eruilla Ppis moyens* & *petris*, huic plantæ non conuenit, sed potius minori: An Pisum comosum, flores alterius coloris habeat, præterquam albi, nescio. Dodonæo non fuisse notum hoc Pisum, & noluisse citare Tragum, satis demonstrat omnium in postremis hoc Pisi genus

scriptis. Verùm alienis se ornare plumis, hoc ei commune.

Locus & tempus.

Pisum, quod comosum voco, antehac mihi non visum, Scutgardia missum, & à me in orto Principis plantarum, ad altitudinem hominis non excreuit, maturuit cum cæteris Iulio. Anno 1594. missa per D.D. Schwartz / cum hac inscriptione: Pifa magna, quorum plures siliquæ vno pediculo, seu caudice continentur. Sata April floruerunt Iunio

PISA SINE TVNICIS DVRIORIBVS IN SILIQUA MAGNA ALBA.

Descr.

Pisum album ramosum in magnam altitudinem excreuit, siliquæ albæ magnæ, sine duriori tunica, totæ mandi possunt. In cæteris vulgari Pifo correspondet.

Cam.hort. Pifa leptoloba, quæ simul cum folliculis comedantur, cuiusmodi Lohel. memorat è Vilda Lituania oppido allata.

Locus.

Habui ego in Sulz vrhe Alsatiæ ex orto nobilis viri à Pfaffenlap munere vxoris eius Clare à Rinack, quæ in orto Ill. E. C. sata prouenerunt Montbelgardi sæpius, ac aliis in hortis.

Vires & vsus.

De Pifo maiore anguloso, aliàs sordido, agens Dod. has ei facultates assignat. Pisum veluti Hipp. tradit, minùs Fabis inflat, per alium autem magis secedit. Galenus, Pifa cum Fabis totâ substantiâ quandam habent, inquit, similitudinem, eodemque cum Fabis modo sumantur: his duabus tamen rebus ab eis discrepant, tum quòd non equè ac Fabe sunt flatulenta, tum etiam quòd detergendi facultatem non habent: ideoque segniùs quàm ille per alium secedunt. Idè de Pifo minore, colore luteo subinde virente: Facultate & viribus Pisum istud Fafelo simile est, nullam efficitricem qualitatem insignem habet, & medium quodammodo locum obtinet inter ea, quæ boni ac prauis sunt succi: multùm ac parùm nutriunt: facillè ac difficillè concoquuntur: tardè & citò descendunt: flatulenta sunt ac flatùs expectra, veluti Galenus lih. de aliment. facult. de his, & Fafelis scriptum reliquit. Mart. Rulandus in Balnear. lih. 1. classe 3. cap. 1. ad scabiem, lepram, vice ra, & omnia cutis vitia, balneo vitur sæpius experto, ex Pisis cum folijs Quercùs in aqua fluuiali decoctis. Idem eiusdem operis. lih. 1. classe 3. cap. 4. ad achoras, &c. Pisor. Miiii. decoq. in liq. aquæ: horum iuri admiscetur tantundem lixiui fortis, & facta ebullitione refeructur vsui. Caput eo laetetur quotidie ante cibum, & mox siccetur. Sunt, qui scribunt, autore Matthiolo, Pisorum iure hansto purgari puerperas, & lactis copiam augeri, auriginosos sanari, & aquæ intercuti succurri. Sed procul dubio de cipuntur, quòd hec haud possit præstare, quòd refrigeret & siccet. Verùm errandi ansam cæteris præbuit Tragus, quippe qui perperam putarit Pisum Cicer esse arictinum. Errorè hunc debent diligenter vitare, qui suis puerperis Pisorum ius propinant: quin etiam iis, qui sumplerunt purgatiuum medicamentum extergendi ventriculi gratia. Nulla enim Pisis inest absterforia facultas, vt docet Galenus. Idcirco Pifa dimittantur (inquit Saxon.) & in eorum locum Cicer, Faba, Lupini, aliaque id genus absterforia addant Poloni in balneis ad Plicam tollendam. In Germania, teste Trago, nullum in culinis frequentius legumen habetur Pisis, tam diuicibus,

Curtis vicia

Achora.

Trag. v. p.

quàm pauperibus familiare: cum radice Petroseolini decoctum, in cibo puerperis vtilissimum est: nam eo iure per vrinam superflua multa purgantur, præsertim si decocti ioni Macis & Rosmarini quid addicatur. Adfert quoque lactis copiam, nede facillè colligi potest, Pifa, boni [vt vocant] nutrimenti esse. Breuiter citra periculum in omnibus ferè morhis iure decocti vti possumus, neque hic curò, quid alii assenserent, aut negent. Hortus ad dysenteriam pestilentialem scribit Pifa [Erbfen] nocua: cæteriùm, inquit Schola Salernitana de Pisis,

Sunt inflatiua cum pellibus arguè nocua,

Pellibus ablati, sunt bona Pifa faris.

Turnerus tandem ornatus, quotquot ventriculorum, aut lenem habent flatibus obnoxium, nimium Pisorum vsus, quacunque ratione preparatorum esse fugiendum suadet, nisi addatur Anisum, aut Cyminum, aut Mentha, aut aliud ali- quid *szogon*. Obquiritur puluetem Menthe pul- ti Pisorum addanti

PISVM GVINEÆ ALBVM, siue Cicer.

EX his alia, Ciceribus De scriptis

& Pisis nostratibus patia, alia maiora, omnia ex rotundo nonnihil oblonga, seu niedaque superficie, vnicolori, flavescente, nisi quòd gemen album, zonulâque modò obliqua, modò, recta, latior, nunc angustior dilutius flaves- cit. Sapor idem qui nostratibus Pisis, quemad- modum & consistentia.



Idem Pisum adhuc siliquæ suæ inclusum dono accepimus ab Illustri. Ducissa Wirtembergica. Magnitudinem siliquæ, quæ minus Pisum continet, sua proportionali magnitudine docet pictura. Maiores habet Ill. Principissa. Cæteriùm singula siliqua singula continet Pifa. Siliqua autem non dura est, sed qualis ferè cæterarum, per ambitum compressior, & velut cristata, colore extrinsecus ex ruffo & flauo mixto & variegato: extrinsecus scabra, intus lauis. Ista Pifa misit Cl. Paludanus Ill. C. prædicta, nomine Phafoli Guineæ, nobis verò anno 1598. utulo, Cicerum Indico- rum.

Tertius lobus (inquit Clus. Exot. lib. 3. cap. 16.) paucis ab hinc annis ex Guinea inserti cepit ab Hollandis & Zelandis, qui exercendi mercimoni grati illuc comment: illum autem Ciceris genus esse arbitrat Clusius, eam ob causam Cicer Nigritarum appellabat. A varis porrò ipsi communicabatur, à Cl. V. Paludano videlicet, Wilhelmo Pardyne, & Francio Pennino. Erant autem hi lobi parui, semunciam magnitudinem

Phafoli Guineæ Ciceris dict.

non excedentes, tumidi: mucrone, hami penè instar, incuruo: rugosi foris, & ex spadicco fusci coloris, internè candidantis, & laeues: eos vnicum semen continere obseruabat, quasi orbiculare, *se. G. In si.* minoris Pisi modo, non vnius tamen coloris, nam vel prorsus album, vel omninò nigrum, vel rubens, vel interdum etiam *varios*, ex albo & rubro variè distinctum.

PISVM BRASILIANVM FLAVESCENS
area fusca germen cingente.



Piso Guineæ & persimile, magnitudine par, aut etiam maius, irident ex rotundo oblongum, cortice flavescente: verùm Brasilia- no huic germè candidum maius est, figura ouata, cuius circumscriptiõne cingit vndique area latiuscula coloris fusci. A germinis verò parte vna per vniuersum fructus ambitum zona quædam

candicans apparet, manifestum diuisi Pisi, sicut nostratis, argumentum.

Phasioli Brasiliani nomine misit D. Paludanus ad Ill. E. Comitissam, ex cuius ego dono habui. Idem misit anno 1598. nomine Ciceris Indici.

PISVM BRASILIANVM PHOENICEVM
& nigrum.

A Cl. Paludano hoc nobis est, Ciceris Indici nomine: Piso Brasiliano magnitudine super, Ciceri æquale, aliàs ferè phœniceo, aliàs nigricante læuore conspicuum, non tamen rotundum, sed angulosum: hilo candido, fusca area circumsepto, à quo vtrinque elauata quædam extenditur costa, fructui concolor. Hoc idem nobis missum Stutgardia, per Ill. nostram Principissam D. Sibillam Anhaltinam, Ducissam Wirtemberg. & per hortulanum Ill. C. W. pro Faba Ægyptia duorum colorum: phœnicei, & nigri. Gener Cherlerus rediens ex Anglia & Belgio anno 1605. attulit coloris phœnicei & rubri, in cæta in aquam fundum petierunt: dentibus facillè confringuntur: nucleus albus in duas partes finditur: sapor nostrorum Pisorum.

Icon cum præced. habetur.

PISVM INDICVM VARIE-
gatum.



Magnitudine nostrum Pisum maius variegatum æquat, verùm rotundius paulò est, colore ex rubro & albo variegato, alba maximè area circa vmbilicum existente: qui magnus satis ac penè fuscus, cuius parteri oppositam rubram striam albæ perriadunt. *Icon eadem cum ea quæ lib. III. cap. XII.*

Celsi

PISVM INDICVM QVODDAM
rotundum, fuscum.

In descripto Pise paulò maius est, orbiculatus, & à perfecta rotunditate non ita multum abscedens: colore obscuriore, & propè fusco, obscurè maculatum, summo tenus area albicante insignitum. Vitis ac depictus apud clementissimam meam Ducissam Wirtemb.

Celsi

PISVM INDICVM MAIVS NIGRVM

Pisi Indici magni genus ab Ill. Ducissa Wirtembergica datum, Pise vulgato duplo maius est, penè orbiculatum, nigrum, parte quâ vmbilicus est, compressa, per cuius medium costa elatior descendit.

PISVM INDICVM VMBILICO
eminente.

Pisum Indicum quoddam esse facies arguit & figura: cicere paulò maius est, sed orbiculatius, coloris pulli obsoleti, maculis subcinereis, aut candidantibus distinctum. Vmbilico parte superiori eminet, quod in aliis Pisis non obseruatur. Etiam huius vsuram & picturam impertiuic Ill. Celsi Wirtembergica. Huius vt & trium immediatè præcedentium Icones habentur antè, sub titulo, *Pisum Brasilianum flavescentis, &c. Et Pisum Indici variegatum.*

PISA INDICA FOLIS LONGIVS CVLIS

Pisi Indici pictura ex viva planta à nobis exprimitur. Hoc neque Pisorum cæterorum, nec etiam Phasiolorum modo excreuit, sed folia profert multa, rerna, longiuscula, magna & parua, ex longis pediculis hærentia: Floruli minij,



LATHYRVS SIVE CICERCULA in genere.

CAP. IX.

Folia
Caulis
Vermes.

Substantia
Locus.

Vfus vsq[ue]
explantis.

Lathyrus non
venimus
Diocles nisi
nominis O-
chris.

Cicerula.
Cicer.
Lathyrus.
Blisus err.

Leguminū folia, vt scribit Theophrasia oblongiora sent, vt Lathyrus [cicerula.] caulis verò humi procidens. Huic & vermes innascuntur, quum priusquam fuerint resiccatæ dies intermiserunt accedunt.

Lathyrus (cicerula) inquit Gal. substantiâ quidem Ochris [Eruius] & Phafelis est assimilatus. Vtuntur autem his, vt plurimum in nostra Asia rustici, & potissimum in Myria & Phrygia, non modo quemadmodum in Alexandria, & aliis plerisque vrribus, Ochris [Eruius], & Phafelis, sed etiam, vt phacoptisânâ parantes. Succum autem habent Phafelis & Ochris [Eruius] facultatibus quidem consimilem, sed consistentia crassiorem. Ob eamque ipsam causam plis aliquantò, quàm illa nutriunt. Aracos semen est Lathyrus [cicerula] semini consimile, fueruntque nonnulli, qui putarūt ipsum non esse generis à Lathyro [cicerula] diuersi, quando quidem & vñs ipsius, & facultas Lathyrus [cicerula] facultati est adsimilis, nisi quòd Araci duriores. Sunt quoque qui Phafelū eundē cum Lathyro [cicerula] esse dicant: alii ipsius speciem. Diocles Ochris [Eruius] & Lentis, & Ciceris, & Orobi mentionem faciens, Lathyrus [cicerula] nomē prætennit. Dicere quis possit Ochros, Lathyros, Phafelos, vñ esse genus, verum pluribus nominibus appellari. Est & cicerula, auctore Plinio, minuti ciceris, inæqualis, angulosi, velut Pisum. Cicerula etiannū magis in aluo proficit. Cicerula, ait Columella, quæ P. fo similis est, mense Ianuario, aut Februano seri debet, læto solo, celoque humido.


Cicerulam, inquit Cornarius, Columellæ Plinius quasi tertiam ciceris speciem recenset, quòd illi suum esse sinimus. Nam vera cicerula est, quæ à *alio* Græcis dicitur: cicerulam insuper cicer dixit, & duas res diuersas confudit.

Cæterum, cicerula diminutiuum videtur à cicerâ, non ciceræ, alioqui diceretur cicerulam.

--

mixta foliorū principia: labor manifestus nullus. Pisa Indica anno 1602. satâ talia mense Iunio erant, qualia iconē in præsens exprimus.

LATHYRI MAIORIS SPECIES
flore rubente, & albido minore, dumetorum, siue germanicum.



Germanicæ Lathyro longissima sunt flagella, adubitos aliquot porrecta, angulosa & inembranulis acta, in varios ramos diuisa: *folia* ex pediculis palmo longioribus, longa, venosa, & acuta, bina iuncta pediculo, inter vtumque in capreolos abeunte, proxima sulcra amplexuros, flores longis tenent pediculis, *Flor.*

Pisum amulū, rubentes, minores quàm Narbonensis Lathyrus: *folia* tuba, angusta, penè rotunda, grana continent minora quàm Vicia satia, quædam oblonga in Lathyro, siue cataputa minore, nigricantia, rugosa non nihil & miculosa. *Hilus* mediam partem seminis occupat: *sapor* leguminosus: *radix* tubæ perennis, loi gæ digito crassior, singulis annis germinans. Eadem est, ni fallor, quam reperi, colore parua albo, ac non nihil ex luteo pallido.

Trag. in hist. lat. pingit sub titulo *Röcheren* non tamen benè simpliciter ponitur, videtur enim tradi ab illo in hist. germ. sub titulo P. li. silu. *wilde Röcheren* & *Pogels wickhen*, breuiter terminis describens, dicit: Recentiores legumen, quod nos Pisum Græcotum interpretati sumus, Eruum & Orobum non sine errore nuncupant.

Apud Fuchium eadem icon est sub his nemibus Erui nulli, & siluestris Orobi, gall. *l'esse noire*, *Er.* & x descriptione autem Fuchii, quæ serè nulla, non possum iudicare quam intelligat plantam, non distinguit suum satiuum Eruum à siluestri, nisi colore seminis. *Icon*, quam ex Fuchio repræsentat, non ramus, benè conuenit cum nostro Lathyro germanico, à nobis iam descripto.

An Eruum Gu'landini, quod *Mochum* in Italia nuncupari sentit? sed plantam, quam Matth. pro Eruo ex Fuchio supponit, Mochum esse pernegat. *Mochum* Eruum esse verè dicit Matth. interim tamen Mochum ignotam sibi plantam statuit, quando non Mochum, sed vagam aliam stirpem pro Eruo picturâ exprimit.

Apud Cordum in Hist. non benè ponitur icon ex Trago, pro Phaleolo ipsius Cordi.

Eruum officinis, inquit Matthiolus, Orobus Græcis, vulgò *Mucho*, Arabibus *Herbum, Keifens*, siue *Kersens*, Italis *Eruo*, Germ. *Eruen*, Hesp. *l'ernos*, Gall. *Er.* Eruum frequentissimum in Heuerna nascitur, ac sentur. Figura Matth. non malè conuenit cum Lathyro magno, flore minore germanico, vel cum Lathyro maiore anguloso folio flore maiore. An descriptio competat iconi considerandum. In posteris com. suam omisit effigiem, relinquens verba, quæ posterat, & aliam surrogans nomine Climeni latiore folio.

Dodon.

Dodon. vocat Lathyrum silueftrem, floribus rubentibus, negatque esse Eruium quod perperam plerique aliquando crediderunt. *Loniceri* defcriptio non placet, videturque Lathyrus species confundere, dicens: *Sichern*, *Græcorum* Lathyrus, Latinis cicercula, aut Pisum *Græcorum*,

An *Lobel.* & *Penæ* sit Cicercula altera considerandum: an *Phaseolus* *Diosc.* Nonnulli *Phaseolum* suspicati sunt. Ego, vt verum fatear, *Lobelium* non intelligo, hæc descriptio videtur posse conuenire cum Lathyro *Narbonensi*, nec demonstrat qua in re differat à sua *Lathyride* *Narbonensi* quam negligenter describit, non demonstrans flores.

An *Camer. horti*, Lathyrus siluestris alius angustifolius, de quo sub Lathyro maiori flore.

Hist. *Lugd.* Lathyrus satiuus angustifolius, quem *Erui* nomine depinxerat *Math.* priore commentariorum in *Dioscoridem* editione, id est, in hoc genere, quod latioribus est folius *Math.* *Clymenum* esse vult, *Cord.* *Eruium* fatiuum, *Trag.* *Pisum* *Græcorum*. Et *Lathyrus* silu. *Dodon.* *Eruium* fatiuum *Fuchsi*: flores rubescunt: semen vt in *Lathyro* fatiuo compressum, inæquales habet angulos, verum minus est, & durius, & colore in atrum degenerante. Malè assumpti *Hist. Lugd.* pro suo Lathyro iconem *Marthioli*, cui non sunt siliquæ latæ: absque iudicio præterea dicit *Lathyrum* silueftrem *Dodonæi* esse *Eruium* fatiuum *Fuchsi*. *Pisum* *Græcorum* *Tragi* non est *Clymenum* *Marthioli*, sed *Lathyrus* anguloso semine, cuius figuram non habet *Tragus*.

Clus. in *Pannon.* *Clymenum* *Math.* sive *Lathyrus* *Dodonæi*, vel *Eruium* fatiuum *Cordi*. Item *Hist.* *Lathyrus* silu. *Dodon.* *Clymenum* *Math.* *Eius* duo genera latifolium & angustifolium. *Lathyrus* *Dodonæi*, nostro quidem iudicio, diuersa est à *clymeno* *Marthioli*, quamuis eius sit species. *Eruium* fatiuum *Cordo* esse non potest, diuersum indicante ipsa voce fatiuum. Icon quidem, quæ appositæ est *Cordi* *Phaseolo*, est eius plantæ, quam intelligit *Clusius* pro *Lathyro* *Dodonæi*, ni fallor, quamquam icon in post. *Hist.* *Exot.* non sit huius *Lathyrus*, sed *clymeni* *Math.* *Lathyrus* igitur angustifolius *Clusii*, est nosster germanicus, de quo hoc loco agimus.

Eruium, *Cesalp.* loquitur, quod vulgè *Rubiliam* vocant, tanquam *Pisecolus* siluestris est: vendunturque eius grana recentia, aliquando pro *Pisecolis*: deprehenduntur autem, quoniam decoctione rufescunt, & duriores permanent: cum perfecta sunt, nigra redduntur, sed decorticata, pallida sunt: gracilior eorum siliqua: folio consistat bipartito, angusto, digitali sermè longitudine, medio capreolo, flore purpureo, qui geminis in longo pediculo est: caules fert *Pisecolo* similes: oritur spontè inter segetes. Quoddam genus in siluis nascitur, pluribus in eodem pediculo floribus, roseis: siliquis tenuibus, nigris. *Plinius* modò *Eruium*, modò *Eruiam* vocat. *Theodorus* *Eruium* vertit id, quod *Theophrasto* *Ochros* vocatur, quamuis aliquando cicercam vertat, quasi putauerit idem esse, *Eruium*, & cicercam, & *Ochrum*. De *Ochro* *Theoph.* & *Gal.* De cicercam mentio est apud *Columellam*, qui *pabuli* potius generibus, quam leguminibus eam adnumerari testatur: nam bubus datur *Erui* modo. *Hæc Cesalp.* Sed, vt verum fatear, non dum asserere possum, de quibus plantis scribat: *Leobores* igitur considerent, an fortè intelligat *Lathyrum* nostrum maiorem gem. & *Narbonensem*.


Eruium, a *autore* *Anguill.* hodie & *Antiquis* di-

ta dixer. Hodie in Italia *Bononiensibus* *Rouariis* *Parauis* *Erbezzia*. Ast perquirendum quæ planta dicatur *Bononiensibus* *Rouariis*, & *Parauis* *Erbezzia*, & an contineat nostrum *Lathyro* magno, *Geniu*, vel *Narbonensi*.

Lathyrus maioris speciem flore rubente *Montebelgardi* habui in horto *Ill. E. C.* à me satum: pro- venit copiosè in dumetis inter *Chastan.* & *Lapideum* limitum *Month.* viâ versus *Charmont*, & in monte vitium *La Chanx*: aues semina perquirunt & siliquas perforant, vt ea deuorent: abundat etiam circa *Beffordia* castellum in sepibus, præterea inter *Mendiere* & *L'Isle*. Inuenti aliquando vno miliari à *Basilea* prope *Brenzsch*, in monte *Marchionum* *Badensium* mense *Augusto* cum siliquis & floribus prope *Murimont* in vitium colle, quem desertunt, abundabat mense *Augusto* siliquis serè matris in dumetis. Inter *Colmarium* & *Polueller* anno 1595. 9. *Iulii*. Prope *Thanz* mense *Augusto* obseruavi cum flore suo rubente eode nanno: *Iulii* 4. inter *Colmarium* & *Slestadium* obseruavi *Lathyrus* magri speciem à præcedente non differentem, quod adhuc animadu- uerterim, nisi florum colore albo: cæterum in aruis & inter duneta prouenit, inquit *Fuch.* *Læto*, ait *Dodon.* pinguique agro circa eorundem margines prope sepes, dumos, ac seneceta cna- scitur, quæ capitulo suo apprehendens confendit & superat.

Logus
Tempus

LATHYRVS MAIOR LATI-
folia, flore maiore purpureo;
cior.



Nos-
trati
liue ger-
man. *Lathyro*
omnibus pat-
tibus specio-
sior, membra-
neis alis, ve-
nolis, secun-
dum caules
prolixos ap-
tis: folia bina, *Folia*
neruosa, rigi-
diora, in ob-
tusum rau-
cronem desin-
nentia, vnciam
circiter lata,
pediculo mè-
brano in cir-
ros facessen-
tè adnætan-
tur: flores sin-
gulari appendice, dodrantali interdum, nitenti-
tur, multi iuncti, magni, purpurei, & colore gra-
to, quos sequuntur siliqua, vncias tres longæ, aut
etiam maiores, vix semunciam latæ, non nihil
compressæ.

Matthioli in *Diosc.* *clymenum* dicitur, licet quæ planta sit *clymenum* in Italia nondum potuerit inuestigare: proponit tamen figuram plantæ, quam *D. Cortulus* ei misit, quæ satis repræsentare videtur *Lathyrum* maiorem, latifolium, absque tamen vlla descriptione.

Lathyrus *Narbonensis* (aiunt *Lobel.* & *Penæ* *Adu.*) latiore folio, valde verisimilis est, à *Lathyridis* cataputæ granis, quæ *Oro* hinc similia *Diosc.* dicit, nomen factum. In *Narbonensi* agro fre-

clymenus

Flori.

Siliqua.

Cataputæ granis.

quentior etumpit ea, cui latiora, superne a cura, bina, neruosa, per intervalla oriuntur folia, sic & aemulatione auriculari lepusculi arretarum, aut Bupleuri Herbariorum. Item Obs. Lathyrus Narbonensis latiore folio, Anglis Eichelunge/ clymenum Matthioli, Etuum fatium cordi, Pisum Græcorum Tragi, Adu. 398. Ic. Plant. Lathyrus latiore folio: Figura Lobeli melius conuenit cum Lathyro maiore, angustiore folio. Pisum Græcorum Tragi, quod descriptionem attinet, differt à Lathyro Narbonensi, vti etiam figura Lathryi germanici. Etuum Cordi fatium, est Lathyrus fatium, non clymenum Matthioli, nec Pisum Græcorum Tragi, quod antè monuimus. Lobel. nimis obiter hanc plantam describit, nec demonstrat discrimen inter hanc & Lathryidem suam, & cicerculam secundam, Nec placet quoddam Lathrydem hanc, non potius Lathryum vocet; Lathryis enim dicitur de cataputia minore officinarum.

Lobel. notatur.

Cultura.

Clos. not.

An Thalis Lathyrus silu. maior, seu purpureus, caulibus quadratis. Hist. Lugd. Lathyrus fatium latifolius: Clymenum Matthioli. Camer. horti, Lathyrus silu. latifolius, Clymenum Matth. flos dilute rubellus, imprimis elegans est. Planta ipsi pedamentis fulta, satis altè surgit, ideoque topiario operi commoda est. Clus. Pannon. clymenum Matth. siue Lathyrus Dodonæi. Item hist. Lathyrus silu. Dod. clymenum Matth. duo geneta, vnum latifolium. Sed diximus antè Lathyrum silu. Dod. diuersum à clymeno Matth. Icon ab eo proposita, eadem est cum Lobeliana. Verùm per genus Lathryi latifolii ego intelligo clymenum Matthioli.

Scribit Pona in descript. montis Baldi, Etuum fatium Cordi, Pisum Græcorum Tragi. Matthiolus pro clymeno pingit, nos autem dicimus tres diuersas plantas.

Clymenum Matth.

C. Bauh. not.

Casp. Bauh. apud Matth. clymenum Matth. Lathyrus, siue cicercula Dod. Lathyrus latifolius silu. Lugd. cicercula Cæsalpino. Ego aliter quàm frater C. Bauh. sentio: separo enim Dodonæi Lathyrum à clymeno Matthioli. Cicercula Cæsalpini esse non potest, quod satis demonstrat descriptio: tribuit enim ei siliquam latam & breuem, semen album, quæ non competunt clymeno Matthioli.

Locus & Tempus.

Lathyrus maior, purpureus, repertus à nobis verno tempore in itinere Monspelio versus Perouse in sepibus, inter Valentiam & Viennam in agris. Florentem insuper vidi Argentinæ in horto D. Friderici Meieri Iulio, & Augusto, & Septembri. Iac. Gargillus Scotus misit mihi ex Anglia eam, cui latiora folia, cum hac inscriptione: *cicercula purpurea maxima Anglica.*

LATHYRVS MAIOR NARBONENSIS ANGUSTIFOLIUS.

Locus

Descriptio.

Yen. Flor. et.

Hanc Lathryi speciem cum longioribus & angustioribus foliis, Monspelii obseruaui, vnde etiam similem attulit Gen. Cherlerus p. m. *Folia* huic sunt bina cum capreolo in medio bifido, vt in latifolio, folia ad originem pediculi foliati & laciniata quaterna, quorum duo maiora, & alia minora duo, quæ inuisè facilliter in nostra icone expressa: *flores* magni, ex longo pediculo, latifolio similes figura, & flore purpureo.




Camer horti, Lathyrus alius angustifolius à puore tantum hac notâ discrepans, & facillimè Hiemis, sæuam tolerans.

LATHYRI SPECIES LVTEA.

Lathryi quædam species nobis visa fuit primùm anno 1608. florens Iulio in horto D. Friderici Meieri, cuius semen ei missum fuerat pro segetum semine. Similis alioqui Lathyro silu. Narbonensium flore rubente, vel albo, folia enim habet bina, longa, ex quorum medio capreolus in aliquot partes superne diuisus proliet, flosculus luteus diuisus à nostrate. Lathyro siluestri luteo dumerorum, cui flores sunt simul in vno pediculo iuncti: folia etiam sunt minora, & tota planta multò maiore, ramifloræque, quatenus hucufque obseruare potuimus.

Locus temp. Sem. rura. Flor. Folia.

LATHYRVS LVTEVS SILV. DVMETORVM.



Ex radice repente, angulosis fistulosisque flagellis late se propagar, infirmis tamen & humi pronolutis, ni sustineatur bicubitalibus & altioribus: *folia* quædam calamos pinnatis alis amplectuntur, alia extremis adnatorum insident, bina, opposita, vt Lathyro fistulâ hirsutâ, vel cicerculæ breuiora, inter que tortiles capreoli enascuntur: *flores* cæteris Lathryis similes, ex longis pediculis parui, lutei: siliquæ succedunt glabræ, quæ maturæ nigra striatæ, interdum non nihil incuruæ. Semina parua sex, vel septem, penè rotunda, lucida, non variegata

Def. Rad. P. m. Flor. Sem.

negata, sublutea.

De hoc Dodon. agit in Hist. dicens : Terræ glandibus simile quoddam legumen. Huius meminit & Traqu. Hist. germ. vocans wild fechern mit gelen blümen. Et Hist. lat. nomine Pisi silv. Græcorum flore luteo & vogels wiesen. Advers. Aracum appellant, & Ciceram luteo flore : & Ochræ vicium quorumdam.

Thalio in Haryana, dicitur Lathyrus silv. floribus luteis.

A Gesnero de coll. stirp. fit Aphacæ, vel vicæ, aut potius Orobi species, floribus flavis.

Tab. Ic. & Hist. viciam appellat, Geel wiesen / Cicera. Vicia, Gall. Vesse. Belg. vitfen. Magno sanè errore Lathyro luteo Compilerator accommodat nomina Viciæ simpliciter dictæ : denominati non describunt.

An Casalp. hunc intelligit, quando ita scribit : Aracus exilis est planta, dodrantis altitudine : foliis Cicerculæ : flores fert luteos : siliquis longiores, tenuiores, rotundas, & nigras, in quibus semina rotunda, nigra & scabra : oritur inter segetes, gracili solo.

Aratus, inquit Theophrastus, in Lente nascitur : semen scabrum & durum. Galenus idem testatur ex Lente, inquit, degenerat : semen ineptum cibis, alibi inquit. Quod Aracon vocatur in Asia silvestre quoddam rotundum, ac durum, Eruoque exilius, in fructibus cerealibus repertum, quod seligentes proiciunt. Alibi Aracus ab eodem vocatur, semen Lathyro simile, aded vt multi putarint, ab eo nequaquam genere diuersum esse, quandoquidem & visus ipsius omnis, & facultas Lathyræ facultati similis est : nisi quod Araci duriores sunt, minusque facili elixantur, & idè concoctu difficiliores. Hæc Casalp. ex quibus pauca quedam conueniunt cum nostro Lathyro luteo.

Lathyrus flore luteo Montbelgardii in horto Ill. C. Vvirtemb. spontè & planta flore natus Julio : passim etiam circa lepes, & in pratis, vt in ferarum horto E. C. flores adhuc Augusto cum siliquis. Obseruavi copiosam circa Beffordiam, Basileæ mense Aprilis & Maio, ac Iunio extra portam lapideam. Lugduni au bois de la bonne Allemande florens Martio. cum radice nodosa. Genevæ in pratis, sicut & Montpelii. Quidam volunt Erui genus, quidam cicerculam silv. Fuchsius præceptor meus, cum apud illum esset, Lathyrum, Frater Casp. atalite Patavio nomine cicercis Latinarum. Passim, inquit Thalio, locis ædvis ac pratensibus prouenire intutus sum.

LATHYRVS SILIQVA
hirsuta.

Radice est singulari, tenui, annua : angulosis caulis, cubito longiores sunt : folia bina Lathyræ eius, quæ flore albo, & rubro est : at storum purpurascensium pediculi longi sunt, sesquipalmes aliquando, licèt & vix palmares interdum existant, in quorum fastigiis plures dispositi flores, qui delapsi siliquas relinquunt, longiores, quàm in Lathyro flore albo, rubroque, angustioresque, verùm breuiores & latiores, quàm in maiore germanico, sescunciam ferè longas, nõ totam semunciam latas, hirsutas, asperas : semina comprehendentes maioris germanici feminibus similia, minora, ruffa, vel nigricantia, rotunda, imperisicè crispata.

Dodon. suum Aracum sic describit : Similis Tom, II.



Lathyro Aracus est, caule enim, folisque, cum omnino refert : flores habet ex rubra purpura in puniceo inclinantibus, siliquas paulo minores atque in his grana angulosa quoque & Lathyræ similia, sed minora, durioraque, minusque compressa, colore obsoleta, nigroque proxima. Rarum & hoc etiam legumen,

quod neque ab aliis, quàm rei herbariarum studio scitur.

Gal. lib. de Alim. facult. Aracum appellari scribit & posteriorem nominis syllabam, per x, in Aristophanis Hæcadibus, notatam inueniri, ad diffidentiam videlicet alterius Araci, per x, qui cerealum frugum vitium est. Latini Ciceram nominant.

An Anguill. Aracos & Aracis. In Italia Mochæ, Aracis, in Græcia hodie Araca?

An Adv. Aracus, aut cicera. Quamvis, inquit, distinxerit Galenus Aracum citra aspirationem scribendum, ab Aracho aspiratione scribi solito, vitiumque & exitium quoddam istud posterius Lentium & aliorum leguminum dixerit, tamen vtrumque videtur ab indole sui cognati leguminis quasi in spurium abiisse. Est enim prorsum cognatus & similis, fortassis idem ille Aracus, quem quidam cicerculam alteram volunt : nec abs re, cum eius grana fordidius nigricantia inter Pifa, Orobos, & Vicias pullulent, a quibus videntur degenerasse. Quod idem Columella affirmare videtur, quando nihil sapore, sed tantum colore à cicercula distidere, eoque cicera vocari assentit. Tandem Obs. & Ic. Plantæ Aracus, aut cicera, Ital. Mochæ, Adv. 398.

An hist. Lugd. cicera, cuius icon ex Lobelio proponitur, descriptio autem ex Dodonæi Arace siue cicera. Verùm nos dubitamus an Lob. eadem intelligat plantam.

Lathyrum sub quâ hirsutâ repertum in agris Char- Locis mont, necnon versus Chesney circa agrorum Tempus. limites : item versus Andincourt florentem Iulio & semine maturo Augusto. Transfuit in hortum Montb. Ill. C. Wirtemb. vbi in magnam excessit altitudinem. Lugduni quoque vidi. Frater C. Bauh. obseruauit Basileæ. Hunc etiam conspexi, ni fallor, florentem Genevæ Maio & Iunio. In ducatu Wirtemb. propè fontem admirabilem Augusto, & in horto Frederici Meier Argentinarum.

LATHYRI SPECIES QVÆ
ERVILIA SILVESTRIS DON-
donæi.

Angulosos, aliarum Lathyrorum instar, et ad- Descri-
les profert cubitales & bicubitales, quibus, nullo intercedente pediculo, amplexicaulia ad-
C c 3

Totus.



Flora.

nascentur folia, oblonga, modò simplicia, modò in capiteoloe abeuntia, non rarò non tantum in nos degenerantia, nouam foliorum sobolem è lateribus, aut mucrone, iucundo naturæ lusu, parientia: flores ex foliorum sinu prodeuntes, singulares, & breuibus pediculis hærentes: siliqua vnicijs duas longæ, semenciam latiores, secundum longitudinem pinnatæ, quibus quina, sena, plus minùs continentur Pifamolina, & obscurâ quadam flauedine, non exactè rotunda, sed ex mutuo compressu vtrinque sessilia, lineâ quadam albicante media longitudine prædita: magnitudi- dine Pisi albi vulgaris, cum quo magna similitudo: idem quoque sapor.

Matth. in Diosc. cum magn. figuris Latin. & Italicis, *Arachis niger*. Planta, cuius imaginem expressimus, Arachum secundo loco à Galeno descriptum, & Theophrasti per omnia refert. Matthiolus suo more proponit solum iconè sine descriptione: ea icon accedit ad Eruliam siluestrem Dodon. non tamen placet flores ex longis pediculis plures pingi: in Epitome dicit caulem subasperis, siliquas Pisi minores, in quibus semen asperum, rotundum, pullo colore, quæ non respondet nostre plantæ. Cam. & C. Bauh. alias icones habet, in quibus flores melius dispositi & appicti: considerent lectores, an in descriptione epitomes Matth. non idem eueniat quod in figura, nempe mixtam, & confusam ex duabus plantis.

Dodon. gall. dicitur Erulija silu. *Pois sauuaige* flores albi, siliquæ rotundæ, semen rotundum: Pisis simile, minus, amarum, viride, durum admodum siccum. Herbarii serunt in hortis: Pisorum quarta species videtur, Pisorum siluestris species nominatim ea, quæ Erulia syluestris Hermol. Barbaro dicitur. Eidem de frum. Eruliz silu. siliquæ Lathyri similes, minores, in quibus rotunda semina, Erullis minora, & duriora, colore sublutea, sapore subinde subamara. Rarum & peregrinum legumen, quod quæ à studiosis herbarum tantum ac rarò quidem in hortis feritur. Eruliam, siue Ochroon siluestrem appellauimus alio destituti nomine. A veritate recessit Matthiolus, qui legumen istud Aracum & quidem nigrum fecit, plus huic similitudinis cum legitimo Eruo est. Item Hist. colore sublutea, aut nigra, sapore subinde amara. Huius leguminis cum Eruo, si non idem, affinitas maxima, & tanta quidem, vt pro Erui succedaneo citra errorem haberi queat, atque omnibus medicamentis eius loco adhiberi. Suspecta nobis est descriptio Dodonzi, cui pro ratione stat voluntas, qui variè, prout voluit, & ipsi placuit, semen descripsit.


Lib. & Penz Adu. Ochrus silu. siue Erullia. Siluestris indolis, velutique degeneres à Pisis, Ochrisque Erulliz, quasi eruendæ & eiciendæ

dicitur, rariùs nisi in hortis Septentrionalium Herbariorum hodie feritur: iuxta tamen sepes, vias, in Linguagotia spontè reptat imbecillioribus viticulis, membranula triplici, aut duplici secundum longitudinem veluti pinnatis, ima folia oblongiora & latiora, in clauiculas desinentia ferentibus: superne foliola verè partim in plura & minora diuiduntur, partim etiam clauiculis donantur candidis, & interdum purpureis, flore & siliqua cicercule, cui admodum similis. Item Obl. *Ochrus silu. siue Erullia Adu. Cicer Oroboides quercu. a.* *Flora. siliqua. cucu. a.* Ic. Plant. *Ochrus siue Erullia, Teut. 79. Tom. 2.* Lobelius in Obl. proponit figuram Dodonzi. Dubito an proueniat in Linguagotia, siquidem inibi non obseruauit quod ait de foliis, quæ superne è in plura & minora diuiduntur, dubium mihi mouet, quia non respondet figuræ: si ipse non posuisset figuram Dodonzi, suspicatus fuisset, eum tradere Lathyrum flore albo, quæ Monspelii prouenit in segetibus, vbi etiam quædam flore rubente.

Geneæ prouenit mihi in horto, à quo tempore præterire triginta anni, quibus nunquam, vifa, donec anno 1601. ex femine dato per D. Fridericum Meierum nomine Ochri Dodonzi in horto Montbelgardensi Ill. E. C. fata excreuerit, quæ tandem Augusti mensis principio exaruit semine maturo.

LATHYRVS ANGVLOSVS
semine.

Angulosus, ptolixis satis caulibus præditus, in aramos multos diuisus: folia pediculo hærent latiusculo, duobus ad exortum appendicibus, caulem cõplectentibus: sunt ea verò gemina, oblonga, acuminatâ, glabra, striata, inter que profiliens pediculi reliquum in tortiles abt. clauiculas, quibus proxima apprehendit: ex pinnatarum appendicum sinu pediculi exeunt singulares, florem gerentes vnicum, maiusculum, al-



bum, quem excipit siliqua lata compressa, semina, claudens angulosa, candida, radix fibrosa, gracilis.

Quidam vocant; inquit Tragus Knesern / cicer Arietinum, alii columbinum, per nos quidè licet, verum dicitur Pisum Græcorum veterum: dicitur enim Plinius lib. 18. c. 12. Cicerculam habere angulos vt Pisum. Idem in Hist. Lat. Pisum Græcorum satinum quod quidam Eruum & Orobum non sine errore nuncupant. Icon, quæ est apud Tragum, non est Lathyri satini, sed maioris siluestris.

Officinis & Græcis apud Lonicerum Orobus, Latinis Eruum, Germanis, Fuchsis

Fuchfio *ERUUM album*, & *fatuum*, *deser.* Græcis: floribus candidis, vel in candido carnuleis, aut puniceis: Verùm is nimium obiter describit, non distinguens fatuum à siluestri, nisi solo seminis colore. Quidam apud Fuchfium in *Hist. Lugd.* ni impressa an notat, cicerculam magis videri. Idè de comp. med. Orobum, aut hodie non cognoscitur à nostratibus Pharmacopoeis. Non enim est hoc semen, quo pro eo aliquot annis vti cœperunt: Ochri enim semina sunt.

Fuchfius, præterea teste Matth. in Diosc. hallucinatur in suo plant. volumine, Cicerculam vulgò vocatam, fatuum Eruum esse existimans: et si omnes rei herbariæ periti à Galeno Lathyrum appellari non dubitent. An Cicercula Anguillara à Theophrasto *advers.* in Italia *eserchea, esera* & *manaroba* vocata.

Eruum album ex Italia *Gefn.* appellat, quod *Italica Mocho* in *Heturia* dictum sit, quorum utrūque [quoniam summa illa a maritima quam Orobo, i. e. Eruo, tribuit Galenus, caret.] an verus sit Orobus dubitari potest. Eruditi quidam, vt Fuchfius, ni *Gefn.* fallatur, pro cicercula accipiunt.

Phasiolus minor est, vt vult Cordus, qui ab aliquibus angulosum Eruum appellatur. Flores eius candidi, & semina colore candida. Radice tuberculis exiguis plerūque plena. Ast Cordo icon alterius plantæ ex Trago non benè ad data.

Bellonius scribit in Alexandria *Ægypti* abundare genus Pisi, quod Græci vocent *advers.* Veneti *Mauverette*, Romani *Cicercula*, Galli *des Sars.*

Cicercula prima Dodonæo gallico, *advers.* cuius flores albi, semen quoque album, angulosum, Columella & Palladio Cicercula. Lathyrus non est Eruum, vt quidem existimant. Idem lib. fram. & *hist. lat.* in folio. Dodonæus olim posuit iconem Fuchfii, quam etiam nos proponimus pro Lathyro, siue Cicercula. In post. *hist. lat.* eam exhibuit pro Araco, siue Cicera, quod non placet: non tamen displicet noua icon, quam in lat. ponit pro Lathyro, siue Cicercula.

Lathyridem Narbonensem alteram constituunt *Aduersaria*, angustiore gramineo folio, cui ibidem enata in vdis, folia admodum angusta, graminea, venosa, & mucronata, bina, è pediculo in tortiles, capillaceasque clauiculas desinentes, Catanance [leguminea] ferè sunt: defluxis albidis, & luteolis floribus succedit siliqua compressior, duplò breuior, latior superiore [Narbonensi] latiore folio, vbi grana angulosa, pusilla, Pisi, aut Erulix sapore. *Obs.* Angustiore gramineo folio Lathyrus *Adv.* 398. Lobelii descriptio non conuenit, eo quòd non distinguat à sua Lathyride latiore folio, cui nimis similem facit: icon demonstrat eam, quam nos hoc capite tradimus an florè luteolo extet, sub indice his est, miror etiam Lobelium albedo flore dicentem, & non albo. Illud præterea notandum, quod dicit semina pusilla, qualia fortè in spontanea, non item in fatua. Quæ causa sit vt in Iconibus Plantini, omittatur icon proposita in obseru. me fugit. Malè tandem Lathyrus Lob. & Penæ dicitur, cum Lathyrus dicendum erat.

Cicerculam vocat *Cæsalp.* scribens, semen esse alterà parte depressum, quasi effigie cunei: cortice leuissimo, albo, aut nigricante, aut vario, in siliqua breui, & lata: plantam autem breuiorem Eruiho, humi procumbentem, multis ramis: folia simili modo bipartita, & angusta, breuioraque: flores purpureoscentes: serigracili folio: caput ten-

tare, & officere luminibus.

Cæterum Cicerculam hanc refert frater C. C. Bauh. Bauhad Clymentum Matthioli, cui penitus assentiri non possum, vt suo capite dictum.

Græcis *advers.* dicitur (quemadmodum apud *Hist. Lugd.* legitur): Latinis, vt Columella & Palladio, *Cicercula*: Gallis *des Gesles*: caules habet angulosus: flores candidos: siliquas latas: semen album, latum, compressum, inæqualiter angulosum. Hunc Erui nomine depinxerat Matth. *Hist. Lugd.* Matthioli quam proponit *Hist. Lugd.* nullo modo conuenire potest, siliquæ enim non sunt latæ.

Lathyrum Dodonæi Camer. horti appellat, flore purpureo, & alterum albo. Pifum angulosum vulgò tam à viticularum, quàm seminum angulosi dictum. Orobum Fuchfii, Phasiolum minorem fatuum Cordi. Cicerculam vulgatem, fatuam, flore albo Clus. in *Hist.* nominat, cicerculam Plinii & Columella, *advers.* Lathyrum, Gall. *Cerres* & *Pois cerres*, appellant: Patiens *des Sars.*

Seui in horro Lathyrum flore albo Montbel. Locus gardi semine Sturgardæ in horro Ill. Ducis collecto. Semen maturum fuit Augusto. Montpellier vidi in fegetibus florentem Aprili, annua est herba. Sturgardæ autem in horro Ducis obseruati florentem Iunio, flore omnino albo, ac etiana partim albo, partim rubente, qui quantum disserat à sequenti, hæreo.

LATHYRVS FLORE RVBRO, & alius albo.

Flore & foliis proximè accedit ad Lathyrum *Deser.* flore albo, inter fegetes Montpellierenses obuius: *flos ruber*, quales *siliqua* & *semen*, iam non succurrit. Aprili florebat Geneuæ in horro.

Idem fortè cum precedenti, sed colore varians.

An Dodonæi gall. cicercula minor, *advers.* Aracus, Lat. Cicera flore rubente. Item *Hist. fram.* & in fol. Similis Lathyro Aracus est, caule *ceræ.* enim, folisque eum omnino refert: flores habet ex rubra purpura in puniceum inclinantes, siliquas paulò minores: atque in his grana angulosa quoque & Lathyrus similia, sed minora, durioraque, minusque compressa, colore obsoleta, nigroque proxima.

Rarum & hoc etiam legumen, quod neque ab aliis, quàm rei herbariæ studiosis feritur.

Gal. lib. de aliment. facult. *advers.* appellari scribit, & posteriorem nominis syllabam, per *z*, in Aristophanis *Holcadibus*, notatam inuenit: ad differentiationem videlicet alterius Arachi, per *z*, qui ce realium frugum vitium est. Latini *Ciceram* nominant, quòd videlicet cicercula similitudinem habeat, atque solo potissimum colore ab eo diffideat. Cicera, inquit Columella, sapore nihil à cicercula differt, colore tantum discernitur: nam est obsoletior, & nigro propior. Item Palladius: in Martio, nunc cicera feritur, quæ distat à cicercula solo colore, quo sordet, & nigrior est.

Est porò & alius Aracus, florè, stultaque candidis, cæterum magnitudine & formâ feminis, reliquisque omnibus, priori similis, quem non Aracum, sed Lathyrum minorem esse, fortè quis dixerit.

Lathyro similis est cicera, vt *Hist. Lugd.* quæque tradit, caule & foliis. Flores habet ex rubra purpura in puniceum inclinantes. Hanc Lathy-

rum Hist. ex Dodonæo tradit, & ei adaptat iconem cicerae, quam Lob. posuit pro Araco, aut cicera. Verùm hæremus dubiū, an Dodon. & Lob. eandem tradant Aracum.

LATHYRVS QVÆDAM, QVIBVSDAM
Ægyptia Aracus.

Aracum
Ægyptiæ
Caulis.
Folia.

Flores.

Aracus Ægyptius Lathyro albo similis, infirmus, clauicularum ope bacillis iuxta depactis sese implicat, caulibus angulosis, quibus membranula secundum longitudinem adnata: foliis culmum latis, acuminatis, crassifusculo pediculo adnexis, binis, striatis, inter quæ capiteoli oriuntur: ad basim autem pediculi duæ veluti alæ & flores ex longo petiolo in flexu singulares infident, Pisi floribus æquales, supremo folio lato sursum expanso, foris carneo, intus cæruleo, excepta infimâ orâ rubente, colore prædito, alis duabus foveis coccineis, macula cærulea medium pingente, intus cæruleis, excepta angusta purpurascente orbita: carina ex herbaceo albicat: siliquis latâ, selunciam longâ, compressa nonnihil, insigni sulco fimbriato altiùs exarata, seminibus continent bina vel terna, magnitudine Lathyræ albi, angulosa, ac ferè quadrata, à crassiori latere ad oppositum deuexa, & in angustum compressa, coloris infuscâ, minutissimis maculis anthracinis conspectâ, gustu Pisorum dulcescente, & dentium attritu substantia qualis Pisorum æquabili.

Cicerula Ægyptiaca, a autore Clusio, à satua vulgari non valdè differt, floris color diuersus, in hac internè elegans, cæruleus, foris ex cineraceo purpurascens: grana frequentibus maculis nigris insignita. An Bellonio cap. 19. Obs. lib. 2. Grecis vulgò Lathyræ?

Existimo Clusium eandem nobiscum tradere plantâ, quam si icon non in omnibus respondeat videatur, folia enim breuiora & latiora, quàm in nostro albo, vel Ægyptiaco.


Est nobis in horto Ill. E. C. missus per Dom. Ioach. Cameratum pro Araco Hispanico, florens Iulio & Iulio. Redditus etiam nobis à D. Iacobo Zuingero Basileæ eodem nomine. Missus præterea pro cicerula Ægyptiaca per D. Scholtzium. Argentinæ obseruatus in horro D. D. Melch. Sebizii, & Frid. Meieri cum flore & siliquis Augusto. Adhæc D. Doldius misit Norimbergâ siccam plantam nomine Araci Camer. & Lathyræ Ægyptiæ, ascribens: flos pulcherrimus candidus, cæruleis lineis aspersus, quandoque cæruleus cum puniceis: semen angulosum, lacum, & maculosum: caulis membraneus, folia opposita, & diuarticantia. Clusio primùm hæc planta nata Viennæ Austria, semine in Ægypto collecto, & Constantinopoli misso: flores tulit Iunio & Iulio, atque etiam in Septembri: semen maturum fuit Augusto, & Septembri. Francofurti etiam singulis annis prouenit ex femine communicato.

LATHYRVS FOLIO TENVIO.
re floribus rubris.

Descriptio
Radix.

Flores.

Hæc aliàs est cubitalis, aliàs vix palmaris, radice tenui fibrosâ: coliculi crebri, per quos folia tenuissima, longa, Caryophylli holostei, vel graminæ: flores rubri, pro plantæ proportionem magni, similes Lathyro flore rubro: eadem sortè fuerit cum modò dicta, foliis tantùm ludè.



Hanc Gener
Cherlerus attulit
Monspelo, nomine
Lathyræ graminei,
cubito multò altio-
rem: siliquis latis,
in quibus femina
tria, quatuorue,
Orobiciformati
magnitudine, vel
Vicia luteæ, penè
rotunda, apertata,
fuscis maculis
obsita, hilo lineis
fuscis picto.

An Lob. icon.
Lathyrus angustior
gramineo folio?

Quâ itur Monspelo Frontignanum reperimus, locis ficis & siluestribus mense Aprilis florentem. Cusdam docto viro videbatur hæc esse Araci species, vocarique vulgò gallicè *Arrouce*.

Locus
tempus.

CATANANCE IN GENERE.

CAP. X.

Catanance [*catanance*] altera folia habet longa, inquit Diosc. velut coronopodis: radicem tenuem, iunctam capitula [*catanance*] Dod. ex vet. exempl. *Nobis* [*catanance*], veritè siliquis, veluti Eruum] sex, aut septem: in quibus semen simile Eruo. Ceditur hoc siccatum ad terram, & milui exanimati vnguibz simile euadit. Altera mali parui magnitudinem habet: radicem magnitudine Oliuæ: folia & figura, & colore similia foliis Olex, mollia, per tetram strata & fissâ: semen in virgis paruum, multis partibus perforatum velut cicer, puniceum. Catanancen Thesaliam herbam qualis sit, Plinius vt describat, superuacuum ducit: cum sit vltus eius ad amatoria tantùm. Illud non abs re est dixisse, ad detegendas Magicas vanitates: electam ad hunc vsu coniecturâ, quoniam arefcens contraheret se ad speciem vrguum mylui exanimati.


Ceterùm cum Catanance prima ignota adhuc omnibus ferè rei herbariæ professoribus existat, si quando in plantam incidat, cui omnes catanances nota respondeant, caue, inquit Marantia, turberis, quòd non sena aut septena, sed alio quopiam numero capitula habeat: nam si hunc numerum, quia à Diosc. illi constituitur, necessariò illi adesse tibi persuadebit: fortasse enim nunquam assequeris.

Catanances nomen Cornarius ex vi & coactione impostum arbitratur. Galenus & posteriores Græci de hac herba siluerunt. In catanance altera mali magnitudo suspecta est.

Scribit Dod. hist. in fol. *catanance* in quibus semina, catanancen ferre Diosc. scribat, non capitula, sed siliquis hoc loco interpretari debere: nam catananche *catanance*, veluti Orobum habere, Dioscoridem asserere: at Orobum non capitula gerere sed siliquis.

catana.

CATANANCE LEGUMINOSA quorundam.



Catanance leguminosa dicta, Lathyridium familiae congener leguminis est, tenuibus, ramosis caulibus, quibus nulla apta membrana: folia & longitudine graminea, interdum angustiora pediculis desistuntur, venosa, acuta: flores tenuibus pediculis insident ex foliorum sinu ortis, palmum nonnumquam longis: sili-

liqua uncias tres longa, plus minus angusta: grana decem, duodecim, aut plura continent nigricantia, rotunda: radice nititur inutili.

Vocat D. Agerius Lathyrum angustifolium, ipse in huius radice observavit Orobanchem. Dubitant Advers. Eruum silv. Herbariorum, sitne κατωρβαν, sive Amatoria, aut Necessaria, non bulbosa Vnguimilua Diosc. Quasi necessitate inconcussa, & fatali adgeret ad amandum, Catanancem vocant, quasi amoris illicium necessarium. Plinius: eiusque coram cordati viri, consilio figuras harum taceant: nec Diosc. vires, sed historiam duntaxat alienam citat. Quodpiam genus leguminis fuisse hanc descriptionem ostendit, cui non male quadrat ea herbula, quae Lagopi angustifolii foliis visitur. Alteram catanancem ciceris nomine non noverunt. Dubium idem movent Obl. & Ic. Plan.

Genera provenientem intuitus sum catanancem leguminosam, quemadmodum & prope Schweghauser in Sincovia. Et quia folia graminea foritur, facile ab olitoribus euellit, ideoque radix eius annua non est, licet anno sequenti ex semine deciduo sponte regerminet.

Hae, teste Lebelio, in hortis Herbariorum Iulio & Augusto siliquas fert: visitur etiam in agris littorum maris Septentrionis.

LEPORIS AVRICULA Caesalpini.

CA P. XI.

Leporis auricula vulgo appellatur, autore Caesalpino, herba multis ramis, humi stratis: Foliis indivisis, praeter longis, instar leporinae auriculae: stoculis luteis in summis ramulis, vt Securidaca: siliquas fert longas, tenues, hirsutas, inuicem implicatas: seminibus distantibus: provenit laeto solo.

Dioscorides Clymenum vocat: ei, inquit, caulibus Fabae, quadrans: folia Plantaginis: folliculis supra caule inflexis, vt Polyporum Citri: proba-

tissimum est e montibus: celebratur succus ad sanguinem sistendum.

Plinius clymenum, a Rege quodam appellatum scribit: vnum quidem foliis Hederae, ramosum, articulis praerinctum, graui odore, feminibus Hederae. His intelligit, quam alibi Periclymenum vocari diximus.

Alterum Graecorum sententia, Plantagini simile, caule quadrato, folliculis inflexis, vt Polyporum Citri.

ISOPYRON VETERIBVS.

CA P. XII.

Isopyron aliqui Phasiolum vocant, vt nobis autor est Diosc. eod quod Phasiolo simile sit, & in summo folio pampirum ferat [dicitur ad πάπυρον γάρ Dalinquit quidam ad κερύον legum]. In summo caule sunt capita, tenuia, feminibus referta, similibus Melanthio in gustu. At solum Aniso simile est. Huius semen cum aqua mulla potum dolores circa thoracem, & iussus sedat. Conuenit etiam sanguinem spuentibus & hepaticis.

Hae paulo aliter Plinius ita refert: Isopyron vocant aliqui Phasiolum iuxta veteris codicis lectionem. Nam vulgata exemplaria Phasioli vocem non habent, Corn. quoniam folium, quod est Aniso simile, in Phasioli pampinos torquetur. Capitula sunt in summo caule, tenuia, plena feminis Melanthii. Contra tussim & cetera pectoris vitia, cum melle, aut aqua mulla, item ieiunio vtilissima.

Galenus Isopyron, aut Phasiolon, semen amarum & acerbum habet. Proinde extergit, & secat crassos humores, simulque contrahit, ac adstringit corpora. Et ob id rectiones spuentium ex thorace adiuuat, & hepar repurgat. Et sanguinem spuentibus non aduersari sed ipsos insuper adiuuare creditur. Nam propter mixtam temperiem conuenit videtur, etiam ad contraria. Ignotum est hodie omnibus, quod sciam Isopyron, inquit Corn.

ISOPYRON CAESALPINI.

Semen est simile Erulio, atrum, rotundum, Squod dum viride est, coquitur, vt Pileolus, sed perfectum negligitur: eius planta sponte provenit inter segetes, caule ferè simplici, cubitali, procumbente in terram, nisi admicula habuerit: folia fert non diuisa, vt ceteris leguminibus contingit, sed integra, ternorum digitorum latitudine, in tres capreolos desinentia: florem in alis foliorum fert luteum, siliquam Pileolo, teste Caesalp. tenuiorem.

Aliqui, vt Diosc. notat, Isopyron, Phasiolo appellat, nonnulli verò, vt Plin. perhibet, Fascoion vocant.

PISVM SILVESTRE.

CA P. XIII.

Tres, quatuorue singularum foliorum coniugationes costae aptantur in capreolos desinenti: sunt ea autem Capparium foliis aequalia, modo leuiter acuminata, obliquis venis striatae



Pisum silv.

ex alē sinu surculus longus enascitur, thyrsum comosum gerēs, flouum, Vicia maiorē paulō: siliqua succedunt Pisi aruensis pares, nōn nihil compressæ, glabra, semen claudentes. Foliorum magna similitudo cum vicia maxima siluatica, sed firmiora & magis polita.

Cam. horti vocat Pisum

Cluestie Pannoniū, in Fraconia alicubi darmgichfradit. [Tabern. verb. icon. Pisum siluestre, wylberbsen. Pisum siluestre, de quo aiunt Adversaria, in Heluetia, & superiore Germania, non lecus ac Phaselus siluestris [Galega verna] obuiam se dat peregrē cuncti. Quidam in suo vnius paginæ rariore stirpium libello, affirmat in laxis littoreis, nulla terra oportis, tantam segetem Pisorum spontē enatam in Anglia Suffolcia inter Ostorclūm & Alburnum, etiam Autumno 1555. vt mille hominibus suppeteret.

Locus

Hoc Pisum diu sicum habui sine nomine, nescio vnde: verū anno 1591. Tossanus Carolus doctus pharmacopæus Burgundus eius semina intulit nomine Pisi Indici, quæ Plantæ in horto Ill. E. C. & hortulo meo Montbelgardi, nec primo, nec secundo anno florem protulerunt. Pisum siluestre Clusio primū conspicit ultra Drauium flumen in Pannoniā, iugis arei Greben vicinis, anno 1579. copiosē inter saxa nascens: vnde postea Ill. Heros Balthasar de Battyā, qui Clusium in eam prouinciam deduxerat, maturum fructum illi adferri curauit. Subsequente deinde anno aliis locis Viennæ vicinioribus observabat, veluti in siluoso illo monte supra Gumpstkirchen, item supra Posonim. & in Leytenberg. Floret Iunio, semen maturum sic Iulio.

Tempus.

APHACE IN GENERE ET EX Veterum placitis.

Cap. XIV.

Aphaca differt ab Aphaca quæ olus item est, vt Aphaca differt ab Aphaca: item ab Aphaca arbore.

Aphaca differt ab Aphaca quæ olus item est, vt Aphaca differt & ab Aphaca, quæ arbor. Aphacam Theoph. modō leguminū generi, modō inter olera connumerat, & vt verum fateatur Hermolaus, idem; an diuersum genus sit, serē ambigit. Sed Aphacam [teste Corr.] Plinius ita describit, vt Dioscoridem exprimat, aut certē eum autorem, vnde Diosc. transcripsit. Meminit Aphacēs aliquot locis Theophrastus, sed in his ambiguos reliquit Lectores, an de olera, aut frugibus loquatur. Strangulari certē Aphacas à Secundaca lib. 8. hist. palam dicit Gal. lib. 1. aliment. Aphacen cum Vicia, quam Diosc. apud Afianos vocari dicit, coniungit. Et quamuis Theoph. Aphacam non inter legumina, sed inter Cichoracea describat, ait Casalp. attamen videtur aliquando etiam eam inter legumina recensere, vt cum in-

Gal.

quit, celeriter perit, vt Dolichus, eius siliqua leuiter lata: in Aphacis nascitur Secundaca: serō inter legumina seritur, sed in his videtur aliquam speciem Lentis significare. Gal. Secundacam non in Aphacis, sed in Phacis [Lentibus] nasci scribit. Aphacem autem tanquam Vicia finem tradi ad bruta in pabulum colligi solitam à rusticis.

Plinius Aphacen vocat, vt ab altera Aphaca distingueret, quæ inter cichoracea reponitur. A cichoracea tandem frutex [Vicia] parus est, autore Diosc. nascens in aruis, altior Lente, tenuibus foliis, quæ verō in ipso nascuntur siliqua: maiores Lente, semina continent tria, aut quatuor nigra, [in cod. Basil. 1557. dray, pro 1557. dicitur] Lente minorā. Aphaca, inquit idem, tenuia admodum folia habet, pusillo altior Lenticula est. Siliquas maiores fert, in quibus terna, aut quaterna semina sunt, nigriora & madiora, & minorā Lenticula. Nascitur in aruis. Aphacæ & viciae seminum figura non est rotunda, veluti Fabarum, vt Gal. tradit aliment. lib. 1. cap. 36. sed aliquid latior, quoniam modo Lentium. Cæterum Vicia nomen apud nos quidem est tritium, eoque solo neminatur. Attici verō vicia, aut Fabam appellant.

Aphacæ semina, antequam Diosc. vim habent adstringentem, vnde alii, & stomachi fluxionem suscipiunt, si fricta, & fresca Lentis modo coquantur. Naturam ad spissandum Plinius Aphacæ tradit efficaciorē, quam Lenti. Reliquos autem vsus eodem. Hanc quoque cum ipsis siliquis integram plantam rusticis reponunt, vt bruius pedibus sint pabulo. Per fumem tamen quoddam noui, ait Galenus, qui hanc quoque comederint potissimum Vere, cum etiam virent, quemadmodum Fabas, & cicera esse, se consueverunt. Sunt autem non inuaua modō, sed concocta etiam diffilia, alutimque inhihent. Perpicuum ergo est quod, cum natura sint eiusmodi, alimentum, quod ex ipsis distribuitur, haudquaquam boni succi, & crassum, ad succum melancholicum gignendum idoneum, seu de Lente dicitur. Verū illi quidem multa bona insunt, his autem nihil bonorum illius adest. Idem Gal. 6. simpl. Aphacæ, inquit, vim habet adstringentem, quemadmodum Lens. Sed & similiter vt Lentis, editur, & agrius quidem, quam illa, concoquitur, sed validius siccat. Caliditate quoque moderata participat.

VICIA VVLGARIS SATIVA. Cap. XV.



Annua. Est planta Vicia coli solita, caulibus cubitalibus & proceribus, angulosis, striatis, hirsutis, cauis: foliorum coniugationes decem, aut duodecim costæ adherent longæ, tandem in tortiles clauiculas, quibus proxima attriv adminicula, desinunt: vncialis, aut

paullò minor, angusta, per extermum lata, hirsuta, eadem interdum alternatim rachi alligantur, ex vniuersiufque costa *stos* aliquando enascitur vnus interdum plures] quem *siliqua* excipit quadrantalís & longior, vnciam ferè lata hirsuta, *semina* claudens Piliis aruensis paria, nigricantia, compressa.

Brüñselho *Eruum*. Inuenit Hermol. è Recentioribus, qui viciam esse Aphacem existiment. Ast cum Marc. Virg. non facillè Aphacem ratiocinetur aliquis Viciam notissimam omnibus frugem esse: & si congener, aut similis illi sit, siluestrem existimandam esse.

Tragus in Hist. germ. vocat *wiecken*, aut Viciam *Koswiecken* / *Großwiecken* / *Zam vnder felderwiecke* / Lat. *Eruum*, Auc. *Erbum* & *epobor*, cui opinioni tamen resistit *Manardus*. Is autem dicit *Orobum* Græcorum, *Eruum* Latinorum, & *Almelis* Arabum esse *wiecken* in *Virgilio Vile*, in *Scrap. Heisterne* & *Kesler*, aut *Kesler*. Hæc *Tragus*, qui meo iudicio Viciam satiuam & maiorem vocat, picturam autem eius non exhibet.

Vicia maior, inquit *Gesn.* *Isstschier wie Erbs.* *Fuchl.* Vicia & *Eruum*, quo *Officina* non sine magno errore pro *Orobo* vtuntur. Hunc *Germ. wiecken* simpliciter, vel cum adiectione *Zam wiecken*. Gall. *Vesse* vocant, de qua *Varro*. *Effigies* *Fuchsi* minus conuenit: videtur enim composita ex *Vicia* multiflora, & vulgari satiuâ, folia enim similia *Vicia* multifloræ; flores autem vulgari; quam ille, qudm ei *Tubingæ* coniuerem, vocabat *Aphacem* maiorem: nos *Vicia* satiuæ vevriorem figuram iungimus.

Quibusdam, vt *Dodon.* placet, *Os mundi* dicitur, Belg. *Vtsfen*, nec est *Eruum*. Idem de *Frument.* & in *sol.* *Vicia*; de qua *Varro*. *Gal.* in *Asia Pergami* *Elaton*; ab *Atticis* verò *epobor* aut *vobor* nominari ait. *Officina* præterque *perperam* *epobor*, ac *Eruum*.

Theoph. *Aphaces* legumini nis meminit: hæc autem *Vicia* nostra conueniat, considerandum est. *Dodon.* gall. habens iconem *Aphaces* *Fuchsi* pro *Vicia* & pro *Aracho*, meritis in post. eam reiecit, tanquam ex duabus compositam.

An *Anguill.* *Vicia* nigra? *Lob.* & *Penz Adv.* *Cicor.* *Vicia*, de qua *Varro*. *epobor* *Atticis*. Item *Obs. Vicia*, *Angl.* *fidye* / Belg. *perperam Orobus*. *lc. Plant. Vicia* *Teut.* 33. *Tom. 2.*

Cordo in *Diosc.* *Orobum*, *Eruum*, omnes passim *Germ. wiecken* / sed errore seducti: est *Latinarum* *Vicia*; & *Græcorum* *Aphace*, selt *Basia*.

Figuram habet *Lonicerus* sub titulo *Zam wiecken* / *Böswiecken* / quæ *Vicia* non videtur.

Existimo *Matthiolum* in *Diosc.* per *Aphacem* intellexisse plantam, de qua hoc loco agimus, quamvis viciarum genera confundat, vt etiam earum nomina; & icon eius aliam plantam denotate videatur, quæ vt *Fuchsi*, ex variis plantis composita est: nec se corripit in post. com. *Italicis*. In *Hist. germ.* huius plantæ *Historia* confusor, quia *Aphacem*; *germ.* *wild wiecken* vocat, i. e. *Viciam siluestrem*. *Figuram* eandem habet, quæ olim pro *Aphace*. In *Epit. Matth.* cum addit. *Cam.* simpliciter dicitur *Bislor*; *Vicia*, *Ital.* *Vicia*. *Mibi* quidem *Camerarii* figura placet: ast *Matthiolo* patrocinatus, nullam attulit ei lucem, nec patrocinatus est.

Clus. Pann. *Vicia vulgaris satiuâ*. Item *Hist. Vicia*. Hic *Veram* viciam expressimus (inquit *Hist. Lugd.*) *Matth.* autem nomine *Aphaces* depinxit, quam *Gal.* cum *Vicia* coniunxit. *Hist. Lugd.* intelligere *Viciam* vulgarem satiuam non

dubito, verum quicquid sit veram non exprimit: nam *Aphacæ* pictura *Matthioli* est *Vicia* inter frutices prouenientis.

Vicia secunda *C. Bauh.* apud *Matth.* siue angustiore folio, *Vicia Matthioli*, *Vicia vulgaris satiuâ Clusio*, *Aphaca vera* *Lugd.* *Arachus* *Dod. gall.* *Cracca* primum genus *Dod.* in *fol.*

Matthioli figuram *Frater* retinet, quæ falsa: sunt enim appensæ siliquæ foliis: an *Matth.* intellexerit satiuam viciam, non abs re ambigitur: ei enim *Vicia* semen est minus, quàm in *Aphaca*: præterea in *Vicia* vtraque, tum satiuâ, tum silv. folia non sunt acuminata. *Vicia* satiuâ non bene meo iudicio dicitur angustiore folio: multæ siquidem silv. *Vicia* sunt magis angustiore folio, quàm satiuæ. *Hist. Lugd.* habet quidem *Matth.* figuram falsam, sed per eam non intelligit *Viciam* satiuam. *Dod.* *Arachum* vocans, de silv. *Vicia* loquitur, non de satiuâ, nec etiam figura eius *Fuchsiana* conuenit cum satiuâ, aut silv. *Dodonæ* in *hist. Lat.* *Cracca* primum genus, non est *Vicia* satiuâ, sed silv. *Saturæ* laudabilem figuram posuit p. 521. pro *Vicia*.

Vicia, auctore *Casalp.* semen est nigrum, aut maculosum, Lente rotundius: flores purpurei, aut in caruleum vergentes. Differunt semina inuicem, crassitie, rotunditate, amaritudine: amarior, quod tenuius est, & rotundius: huius siliquæ breuior & aspera.

Vicia vulgaris satiuâ copiosè in agris *Montbelgardensibus* seritur, & potissimùm circa *Blaumontium*, vnde *Montbelgardum* adfertur; pro pabula *Columbarum* eis gratissimò, quum interea *Gallianæ*, vt mihi affirmatum, non facillè iis vescantur, anates verò, si comedant, moriantur. *Semina* matura *Iulio* & *Augusto*.

VICIA ALBO SEMINE

*M*itisco foliorum lusa penè imponat alicui; veluti *Proteus* aliquis, vt eadem non eadem putari possit: ex his enim alia ferè rotunda, alia longa, & angusta: *stos* vnicus, vel geminus, multâ purpurâ pictus, qua in re à *Vicia*, *Aphace* dicta, sciungitur, breui pediculo hærens: *siliqua* diuersæ quoque, seminibus copiosis (nouem etenim grana in vna numeravi) grauidæ, albis penitulis, aut subpurpureis variis, aut vitore pallentibus, ad *Pisorum* viridium minorum (quæ magnitudine quoque adæquant) figuram, palloremque accedentibus: à quibus tamen sciunguntur, quod quæ siliquæ adnectuntur, non, vt illa, nigrescant.

Huius meminit *Tragus* in *Hist. germ.* sub nomine *weiss wiecken* suspicaturque *Fabam Veterum*. Idem in *Hist. lat.* *Eruum* candidum vocat; conicitque esse *Fabam Veterum*. Inter *Ciceris* *Arietini* genera reperitur quoddam coloris pallidi. Hoc genus *Eruum* (quod *germ.* *weiss wiecken* vocant) *Pisum* esse prodiu ertore qui iudicare possent: sed neque ad *Pisa*, neque ad *Orobo* commodè refertur potest. Hoc *Eruum* *Fabas* esse eas, quarum *Veteres* seorsim sub *Cyami* appellatione mentionem fecerint, suspicatur *Tragus*. *Anguill. Vicia alba*.

Habui *Montbelgardi* in horto *Ill. E. C.* *Adhæc* propè *Beffordiam* repertu in agro satam cum *Pilis*. *Argentianæ* *Iulii* principio dedit *D. Agerius* plâtam virentem cum siliquis delatam ex *Moltæheim* nomine *Pisi gallici*, ita nominantibus *Iesuitis*, qui semine eius vescuntur.

Arachm.
Cracca.
C. Bauh.
Variis
1801

Locus & Tempus

Folia dupli-
cia
Flos

Siliquæ

Locus & Tempus

VICIA VYLGARIS SILVESTRIS
femine paruo & nigro frugum.

Semen.


Siliquis.

Aphace.

Vicia.

Matth. si-
gnatum.

C. Bauh.



A Vicia fa-
mine potissi-
mum differe
videtur; quod
admodum paruum & rotundum, copiosum (ad octona eximere memini) in siliquis angustioribus, longioribus, magisque teretibus, quam vicia sepium, minus hirsutis & ferè glabris, quæ sicæ nigrescunt.

Aphace altera Manard. (de qua Diosc. & Gal.) inter legumina reponenda: Vicia ad eam similis, vt eius nomen etiam hodie adhuc apud rura retineat, & silu. Vicia dicatur quæ in agris sapsissimè spontè nata videtur.

Trago in Hist. lat. Vicia minor, & Vicia tertium genus. Idem Hist. germ. *Das Erut wickeln* gescheht: potest comprehendi sub Orobanche aut Erui angina Theoph. Hoc licet non pingatur à Trago, descriptio tamen, & iam dicta nomina huic referre cogunt.

Viciam minorem appellat Gesn. Vogel wick eius siliquæ subrubræ, antequam maturescant sâben wick.

Math. in Diosc. nomine Vicia nostram Viciam vulgarem silu. femine paruo intelligere videtur: nulla tamen descriptio commoda, figura accedit iconi Fuchsi, quod folia atinet: siliquæ cum floribus appensæ foliis, figmentum certè: quidam vidit tale aliquid in genere Viciarum. In post. com. Ital. nihil certerit: dicit errare eos, qui hanc Viciam Aphacem putent, vt olim dixerat. In hist. germ. idem figmentum habet nomine Vicia & wickeln. Qui eius patrocinium suscipit, nihil hic patrocinatur. Aphaca Vicia species, quam nostri (ait Corn.) vogels wickeln, & wild-wickeln appellant.

Casp. Bauh. qui Viciam vocat apud Matthiolum. falsam eiusdem figuram retinet, ac satiuam vulgarem esse: cui cur assentiri non possim, antè dictum.

Dod. gall. *Arachon* & Arachum Galeni lib. de alum. faculi, dicit, & nominat gallicè *Vesse*, aut *Vesse sauvage*, Belg. *Roef*. Idem hist. frum. & in fol. Cracæ primum genus. Hoc vitium Græcis *Arachon*, Gall. *Vesseron*, quasi Viciolam, aut Viciastrum, Germ. *Wild wick* & S. Christoffels *Brant* / *Brabantis Croc*. Ruellius etiam *Craccam* appellari refert. Fuchl. *Aphacem* appellat. Matth. verdè *Viciam* fecit, sed vterque à veritate recessit.

Figuram Fuchsi habebat olim Dod. quam merito in postremis reiecit: an Aphacè Fuchsi, sive eius Cracæ, vt vult, dubito, figura non indicat: non portò descriptio conueniat, iudicent alii.

Lob. & Penz Adu. *Aracis*, sive *Aracca* & *Cracca*. *Aracca* maior. *Vicia* silu. Semina non compressa, vt *Vicia* & *Aphacæ*. Item Obl. *Aracis*, Gallis *Croccique*. An vera *Aphaca* Diosc. Dalechampio?

An Anguil. *Aphaca*, Patauinis *Vicioue*, & *Cesetone*.

Aphacæ, Cordo *Vicia* est, quæ spontè in aruis nascitur, quàm Germani *Seldwickeln*.

Loniceri figura, quam sub his nominibus proponit, *Wild wickeln* / *Seldwickeln* / S. Christoffels *Brant* / Græcis *Aphacæ*, vulgè *Vicia* siluestris: non conuenit *Vicia* vulgari minori.

Hist. Lugd. *Aphaca* vera, *Vicia* *Matthiolum*. *Aphacæ* rectè fortasse dicitur legumen, quod *Matthiolum* nomine *Vicia* exhibuit. Hist. eandem nobiscum *Viciam* intelligere facile existimo, verùm figura *Matthiolum* falsa, non bene conuenit.

Abundat in agris *Montbelgarden* sibus eandè, Locust. ni. abbat memoria, florentem reperi cum suis floribus purpureis passim in segetibus circa *Montpelium* mense Martio, Aprilis, & Maio.

Huic affinis, si non eadem, angust. simis folia ac tenuissimis, longiusculis, flore pulchro, purpureo, à me reperta, cum essem *Montpelii*, inter saxa, quæ iter *Frontignanum* mense April. Frater C. Bauh. similem *Basileæ* collectam misit. Dedit nobis D. *Agerius* *Viciam*, ex cuius radice erumpit, vt in *Cistis*, & *Ledo*, *Orobanchæ* caerulea.

VICIA SILV. QVASI INCANA
flore albo.

Mltos ex eadem radice, quæ perennis est, Descrip. Mprofert *ramos*, teretes, striatos, ped. les, etiam cubitales interdum, quos ambiunt foliorum, R. 101. ale, quemadmodum in *vicia* vulgari satiuæ, & siluestri, sed densiore lanugine obductæ, & quasi Floreb. incanæ: capreolis, quibus, vicino gramini se implicat, extremam alam occupantibus: flores in Floreb. supernis foliorum alis, terni plerumque, *Vicia* vulgari floribus persimiles, candidi coloris, superiore tamen folio, obsoleti coloris venis inter- Siliquis. ne distincto, inferiore foliolo eiusdem planæ floribus succedunt siliquæ, seu vagina planæ (quantum videlicet ex illarum rudimentis colligere licuit) *Vicia* vulgari siliquis similes: radice fibrosa est, tuberculisque vt *Leguminum* pleræque radices viuaces, donata.

Clusio dicitur *Vicia* silu. albo flore, tam in *Pannonia* nonicis, quàm in post. Hist. siue genus piuum. Hungaris *Waryw borso* / hoc est *Cornicis Pisum*, nuncupatur.

Nascitur in aruis desertis apud *Chyztreg* oppidum in *Pannonia* situm. Maio mense florentem anno 1579 Clus. duntaxat obseruabat.

VICIA SILV. FLORE ALBO ALIA.

Viciam siluestem flore albo in *Austria* collectam dedit nobis D. *Agerius*, ea videtur similis *foliis* *luteæ*, pilosæ: *stios* in sicca pallidus apparet: siliquæ principium, quod adfuit, latiusculum, pilosum.



VICIA

VICIA LVTEO FLORE SILV.




EX vna radice numero-
si, iisdemque flexuosi exeunt
cauliculi, angulosi, in alas alternatim diuisi:
quibus folia haerent Viciae fatiuae
similia, dena, duodena, plus minus, quorum
costa in tortile clauiculam terminatur. Alarum
foliorumque commissuris flores singulares,
ex brevissimis pediculis pendent, speciosi
satis, ex luteo pal-

lidi, quibus siliquae succedunt vulgatae Viciae
siliquis breviores, habitiores, crassiores, latioresque,
albâ hirsutie pubescentes, in quibus semina
quaterna, aut quina, sulca, maculata, aliquantum
angulosa, compressaque: sapore leguminoso.

Montspelii obseruavi mense Martio & Aprili.
Montbelgardi mense Maio: semen maturum
lunio. Quotannis ex semine deciduo repullulat, ac
totam Hyemem perfert.

VICIA SEPIVM PERENNIS.



PROPE sepem
prouenit, caule duorum,
triūmve cubito-
rum longitudi-
ne, foliis non
multum à foliis
Viciae vulgaris
fatiuae ablu-
dentibus, subinde
me variantibus,
in tarsu dispositis
per coniugationes,
quales aliquando
in vno folio tredecim
numeraui, quan-
quam soleant
multo etiam
paucioribus
constare: singula-
ria folia à Vicia

fatiua eò potissimum differunt, quod quâ parte
costae adhaerent, latiora sint, indeque sensim
attenuentur in mucronem sicut & quaedam
rotunda saepe reperiantur] minus hirsuta, sapore
fatiuo, viscido, flores vnicò pediculo rudent
habent in nostra Fuchiana icone, è calyce
purpureo; vnicolores, non bicolores, vt in
Vicia fatiua & siluestri vulgatiore: quamquam
intentionem quandam, & remissionem
coloris in partibus floris est obseruare:
siquidem folia eius inferiora
latiore purpurâ tincta sunt, & penè nigricant:

superiora dilutius purpurascunt. Siliquarum
infigne discrimen: tam feliciter siquidem
florum vbertatem vna durtaxat, aut altera
siliqua excipit, minor, multoque breuior,
latiuscula interim & compressa, glabra,
non vt fatiua hirsuta, per maturitatem
nigra, praeter nigredinem penè luccens,
semina claudens Pisi sapore, medullâ
luteâ, formâ variâ, modò longiora,
interdum sulcae de qua aut altrifecus
compressa, non exactè rotunda,
plus quàm dimidio sui siliquae
adhærescentia, intercedente apophysi
longissimâ, vt in Lathyro maiore,
minora quàm Viciarum fatiua-
uarum, coloris albi, punctulis
discursantibus, quantum haecenus
obseruare licuit: radix perennis,
reptans, Aristolochiae clematidis
instar, fibris multò minoribus,
dulce quid [aliorum leguminum
de more] respiciens.

Trag. germ. sub titulo *Wass ander wiesen
gras wâche/ wald wiesen /* & Orobi silv.
Lepium Viciam pingit. Latinus verò,
nomine alterius maioris Viciae
generis, & Vicia maioris silv. An
autem in descriptione, & inter
nomina sit secundum gentis,
dubium mouet, quod ait, semen
grandius, quàm in fatiua,
quod haecenus nondum
obseruauit.

An Gesn. de hort. Vicia floribus
rubicundis, eidem de coll. stirp.
Aphace Fuchsi, genus Viciae
siluestrius?

Apud Tabern. dicitur *Cracca maior*,
wycfen. Graec. *dodon*, Vicia, & *Cracca*,
Arab. *Apaki*. Ital. *Aphaca*. Belg.
Croci. Boh. *wicfen*. Quam bene
autem Tab. distinguit nomina
Viciarum, facile peritioribus
constare poterit.

Fuchsi dicitur Aphace, & vulgò
Vicia silv. & Os mundi. *wild wicfen*
germ. Aut S. Cristoffels *Frut.*
Gall. *Vesse saunage*, aut *Vesferm*.
Figura Fuchsi satis commodè
exprimit Viciam nostram, aut
descriptio minus placet. Dodonaeus
olim suae Viciae Fuchsi
accommodat, quamuis aliam
plantam intelligeret, quod in
Hist. sum. & in folio demonstrat,
vbi suae Viciae veriotem
figuram apposuit.

Aberrant tandem, qui censent
Aphacam nihil à Vicia differre
vt ostendit Galenus.

Plinius Dioscoridis Aphacam ad
verbum retulit, inquit Matth. *ἀραξ*
Graec. Lat. Aphaca & Aphace.
Arab. *Apaki*, *afaki*, siue *Albaki*. Ital.
Aphaca. Germ. *wild wicfen*, &
Vogelsticken. Figuram eandem,
quam Fuchsi pro Aphaca habet
Matthiolus, verum descripto non
placet. In post. com. Ital. & Hist.
germ. eandem figuram proponit,
non demonstrans de qua planta
loquatur. In Epit. tandem Matth.
cum add. Camer. alia Aphacae
species nuncupatur. Viciae
sepium figuram aliquam fortè
ponit Lonicerus, sub dictione
wicfen quamvis de ea non
loquatur in contextu. Multum
etiam differt Vicia silv. Lobelii
Obs. quamuis eandem faciat
C. Bauh. apud Matth. dicens:
vicia latere folio, Aphaca
Matth. *Vicia maior silv.* Trag. *Vicia silv.*
Lob.

An potèrò Clus. Pannon. & Hist.
Vicia plurimum in Belgica
vesperibus se implicans?

Minimè tandem gentium Vicia
vera cum Aphace Matthioli, quod
Hist. Lugd. placet, conuenit.
Diximus enim antè figuram
Matth. non congruere cum Vicia
fatiua, est namque Vicia quam
sepium perennem vocamus.

Copiosè prouenit in sepibus &
pratibus circa Montbelgardum,
nec non spontè in horto Ill. E. C.
florete Aprili mense. Circa
Beffordiam quoque florentem
obseruauit in sepibus Augusto,
& in fine eiusdem mensis cum
semine deciduo.

Siliqua

Semina

Orob. silv

Aphace

Cracca maior
or.
Tabern. n.
natur.

Os mundi

Xominò
linguâ
M. ar. v.
natur.

C. Bauh.
not.

Hist. Lugd.
error.

Locus &
tempus

Basilica & alibi quoque à me obseruata est.

VICIA SILV. LUTEA CVM
galea fusca.

Locus.



Vicia sil-
uestris
nomine dedit
mihî ramum
D. Agerius, col-
lectâ circa Bo-
noniam, cui
tribuebat florê
luteum cum
galea fusca: in
licca sanè in-
feriora labra lu-
tea apparent
& nescio què
obscurum colo-
rem habet,
flores maiores,
quàm lutea à
nobis descri-
ptæ, bini ex
breuibus pedi-
culis iuxta fo-

Folia

Folia

Siliqua.

lium, vti in illa: folia verò diuersa, quinque tan-
tùm coniugationes supputauit, foliola breuiora,
latiora, ad foliola Vicia sepium perennis accen-
dentia, paulò rotundiora tamen, folia desinunt
in capreolos: siliqua etiam quamvis nondum ma-
tura nobis videbatur, attamen ad modò dictæ
Vicia siliquam, eam suo tempore accessuram,
colligere haud difficile fuit.

VICIA MULTIFOLIA CVM
latis siliquis.

Folia



Flores.

Siliqua.

Vicia singularis etiam, primò valdè hirsuta, pos-
tea minus, sed tamen aspera, vnciam vnam & se-
mis breuiores, & vnciam semis ferè latæ, in iis
grana quinque obseruauimus, cuius sint coloris:
vel magnitudinis, dicere, non possumus, quia
immaturo.

HELENIVM ÆGYPTIVM EX
genere fortè Viciarum.

Planta gracilior, quàm sequens, in asperis &
petrosis nascitur: dodrantalibus caulis e-
rectis: foliis ab radice longioribus sequenti, ruli-
là ferè diuisurà, in caule autem crebris diuisu-
ris, gracilioribusque: sifoculis fert veluti in capi-
tulis rubentes: & exiguas ac breues siliquas fol-
liculis inclusas: radice nititur tenui, colore bu-
xæ. Huic & sequenti non ab simile videtur He-
lenium Ægyptium apud Diosc. descriptum ex
sententia Crateæ.

LUPINVS SILV. ITALORVM
rusticorum, Casalpal. dictus.

Planta hodie à rusticis [Italici] Lupinus siluestris
vocat: oritur prope flumina præcipuè in
maritimis: caulibus humi repentibus, cubitalibus,
circa radicem subruhentem: folia fert diuisa Len-
tis modo: folioli sc. coniugatum in pediculo dis-
positis, colore, & figurà Lupini, infernè candi-
cantibus, supernè virentibus: flores in racemulis
oblongis, colore sanguineo siliquas vaginà inclu-
sas, tenues, asperas, interceptas, ac depressas quâsi
Lentes, iniucem hærentes: eâ pinguescunt iumê-
ta, & à morbis curantur.

VICIA MULTIFLORA PEREN-
NIS, NEMORENSIS, SIVE DV-
metorum.

Perantonomasiæ floridæ nomen meruit hæc
Vicia, quippe quæ velut iubam, numero sissi-
mos confertissimè, eodem vergentes, paruos, ceru-
leos, aut purpurascens flores Vicia proferat,
spicæ amulos, in furculo peculiari ex alatum si-
nibus orto: folia angusta admodum, acuminata,
hirsuta, in alam digesta, Vicia vulgaris fatiæ fe-
rè instar, in agro l'quali diori nata, costæ extre-
mum in capreolos abit quemadmodum in Vicia
& Lentibus: caules bicubitales, striati, in ramos
fatis rectos diuisi.

A Clusio ita describitur:

Cubitalibus est ramis, striatis, lentis, infirmis,
& humi, nisi capreolis sese sustineant, procum-
bentibus, obliquè, modò in hanc, modò in alte-
ram partem, secundum aliorum alas, in flexis, è
quibus frequentes plerumque ramuli enascun-
tur: siliorum ala oblongæ, tenues, deorsum incur-
uæ, seu nutatæ, & in binos capreolos desinentes,
duodenis, vicenis, vicenis senis, aut pluribus, in-
terdum oblongis, angustisque foliolis surrectis;
& ex aduerso nunc æqualiter, modò in æqualiter
nascuntibus, prædictæ sunt: sifoculi elegantes, Vi-
ciæ silu. albo flore, quâsi incanæ floribus formâ
non dispares, minores tamen, & Astragali mon-
tani (Clusio Onobrichidis quartæ) sifoculis propemodum
respondentes, coloris ex cæruleo pur-
purascens, viceni non nunquam, aut plures, spi-
cæ instar in oblongis nudis ramulis, ex superio-
rum alarum sinu exeuntibus, nascuntur: deinde
vncialis longitudinis siliquæ exiguum semen
continentes: radice tenuis, latè serpens, & sub tel-
lure se condens, singularis annis nouos, frequen-
tiorque ramos proferit.

Est apud eundem Pannon. Vicia silu. spicata flore: & Hist. post. Vicia silu. Pannon. z. Hungaris Waryw borfo [Cornicis Pifum] quoque dicta, [omne namque silu. Vicia genus ita nuncupant] quæ plurimum à Belgica, vepribus se implicante distert.

Trago germ. die sinffft wickl Aphace Diof. germ. S. Christoffels Kraut. Lat. Os mundi. Quibusdam Schwarz lusen. In Lit. autem, Vicia silu. altera, Vicia alia in dumetis, Vicia quinta, Vicia postrema, quæ in dumetis nascitur, à Dod.

Dod. gall. Vicia secunda silu. prima quæ potest vocari Arabungall. Vesse saunage. germ. wild wicken Belg. wilde Witsen. Item frum. & Hist. in fol. Nostri wilde wigen, hoc est, Viciam silu. aut germanicam, non in propriè G. legam silu. aut germanicam quis ipsam nominat, nam Galegæ quædam species videtur.

Gesf. de Lunatis, Trago Vicia genus in dumetis nascens. Et de coll. slip. Vicia quædam silu. floribus cæruleis. An eadem ibidem Vicia quædam species [an Aphaca]

Tab. ic. & Hist. Aracus, Vicia, Aphaca. Vogels wicken.

Viciam multifloram habemus in horto Montbelgardi C. W. in medico, & serarum, passim etiam abundat in dumetis & pratis. Obseruauit Basileæ florentem Iunio & Iulio, Boffordia prope castellum etiam in pratis, & Montpeli cum flore Maio in segetibus prope Castellneuf. Aliquando Gesnero plantam siccam cum descriptione misit, sine nomine. Frater C. Bauh. attulit ex horto Patuino nomine Antbillidis primæ Dioscoridis Guilandino.

VICIA PARVA, SIVE CRACCA MINOR CVM MYLTIS SILIQUIS BIRFUTIS.



Ex radice cæuili & inuolu, quadrati, tenues, & infirmi exeunt colliculi importuna alarum uerbentate luxuriantes: folia Lentis foliis paria, læuia, pinnata, rard sibi mutad rel pondertia, ad medium reruum annexa, ad septendecum, qui in tortiles capreolos variè paritos facelles s segetem infesto cõ-

plexu arripit. strangulat, excrefcens interdum ad tres cubitos: ex foliorum alis hinc inde enatis pediculis flosculi insident racematim, quatuor, vel quinque, eodẽm spectantes, passill. ex a'ho subpurpureo, quos siliqua excipiunt semuncialis, birfute. quæ um singul s bina grana insunt Vicia sepium minoræ, rotundiora, mag sma. ulata.

Trag. germ. das Hain wickig wicken: potest à mprehendi tab Orobinche, aut Erui angina Diof. & Theophrasti. Idem. in Lat. Omni in Tom. II.

minima Vicia, quartum & genus. Tragi Viciam minimam, quòd referam non video, nisi sit Cracca minor.

Tab. ic Cracca minor Klein wild wickelen Hist. etiam Vicia, Aphace & Aracus.

Loh. & Pena Arachum vocant, siue craccam minimam: & Aracum, siue craccam minorem, habentque figuram Dodonæi, acunt que in Aduersariis quatuor granula continet in siliquis, quòd nondum animaduerti, sicut nec etiam Dod. qui bina tantum in illis deprehendimus. Dicitur autem Dod. g. H. Vicia silu. z. Arachi species I. Hist. verd frum. & Lat. in f. l. Cracca alterum genus, Brab. inis Groc.

Abundat in agris, etiam in horto Ill. E. C. à me fata, quæ se propagat semine deciduo quorandis. Frater C. Bauh. attulit Patuino pro cereere silu. Corrusi, his Basileæ obseruauit, & Geneæ florentem & siliquas habentem uidi Iunio & Iulio. Montbelgardi florentem & semine maturo Augusto.

Cracca minor.

Arachis.

Locus.

Tempus.

VICIA, SIVE CRACCA MINIMA species cum siliquis glabris.



Est præcedenti re-
nietior, foliis similibus intercedunt, tamen rarioribus, pediculo tenuissimo, longo, ex foliorum alis nato: silis innasatur vpicus, suane purpurescens, sepe vel duo, vel tres, quem sequitur siliqua, præcedentis craccæ siliquæ par glabra, torosa, duo, tria, aut etiam quatuor grana continens.

Defect.

Hanc sicut Loh. & Pena considerunt cum Dodonæi cracca alicui genere, de quo antè.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. & passim in agris floret Iulio mense, semine maturo Augusto. Hanc & Geneæ quorundam obseruauit in agrorum limubus.

Locus & tempus.

VICIA SILVATICA MAXIMA PISO siluestri similis.

Omniu Viciarum, quotquot hæcenus videre licuit, maxima est, multorum cubitorum, foliis ad Vicia sepium folia accedentibus, multo maioribus, & Piso siluestri respondentibus, sefcuncialibus, vnciam latius, modicè obtusis: flores luteuli cuiusdam longissimi extremum occupant numero si, purpurescens. subsequen-
tibus siliquis pari cum Pisorum magnitudine, compressioribus, latis, glabris: radix crassa, nodis intercepta, reptatrix, caulium complurimum propagine fertilis, perennis.

Defect.

Folia.

Floret.

Meminit huius Tab. icon. & bist. credimus, & hoc quid in titulo Pisi silu. minoris, Klein wild Erbsen.

Pisum silu. minus.

Locus



Viciam gl-
taticam autē
reco Vicia
genus hoc à
me olim re-
pertum pro-
pe Tigurum.
Hæc mihi
prononit
Montbelgar-
di in horto
Ill. E. C. Ean-
dem copiosè
reperi circa
fontē admi-
rabilem Bol-
lensem cum
flore & sili-
quis mense
Augusto, &
veniendo
Rheinfeld in-
ter Weil & Basileam cum siliquis Nouembri.

ter Weil & Basileam cum siliquis Nouembri.

VICIA ALIQUA.

Descriptio.


IN ramorum cacumine flores congestos possi-
det, Polygalis Gesneri pares, nec ab simili fi-
gura, sed colore cæruleos: *silia* pinnata costæ
annexa, Viciae solis longitudine parva, angusta:
costa extrema in capreo los desinit.

Nobis attulit Gener Cherlerus, vbi collegerit,
non recordatur.

VICIA SILV. CVM LENTIS
siliqua.

Caulis.

Folia.



D Odran-
talē ha-
bet *caulem* gra-
cilem, angulo-
sum, glabrum,
ramosum *silia*
duarū, triūm-
ue vnciarum,
causi effigie,
singularia,
cracæ minima
folis non ma-
iora, per extre-
mum obtusā &
veluti cordata:
costæ extremū
in tortiles cir-
rhos abit: ex
alq̄ sinu enatus
pediculus vnci-
alis *florem* ge-
nit vnicū, Len-
tis flori similem, quem excipit *siliqua* vnciā lon-
gior, *semunciam* lata, glabra, compressā, duo,
aut tria claudens *semina*, orbiculata, Lentis ma-
ioris.

Pictor noster malè pinxit *silia* acuta, quum
sint cordata quodammodo.

Nemausi in Gallia Narbonensi collectam mi-
hi attulit Gener Cherlerus.

VICIAE PARVVM GENVS, FOLIO
longo.

Locus.

Whitalem Monspelio allatam dedit ramum
Frater C. Bauh. angulosum, foliis alatis, costā



in capreolos
facillente: sin-
gularia *silia* fe-
scuncialia, &
duarum vnciarum,
aminea
vix culmū lata,
in acumen desin-
entia: *flores*
li longo furculo
peculiari he-
rent, multi, ob-
blōgi: sequuntur
siliqua cracæ
minotes,
nonnihil longi-
ores.

VICIAE PVLCHRVM GENVS MVL-
tisolium, siue Galega species
quibusdam.



C Ostrē lon-
gea in ca-
preolum desin-
entū alligan-
tur *silia* interdum
viginti, in
acumen desin-
entia, glabra:
florū idem po-
situs ex longo
pediculo, pau-
ciores, vt ani-
maduertere
adhuc licuit,
paullō maiores
singuli, quales
ferè Viciae fe-
pium, purpu-
rascentes, nisi
fallat sicca plā-
ta. Ramosa est
hæc Vicia.

In *siliis* siccis nullum manifestum animaduertimus
sapore.

Argentinq̄ anno 1595. habui ex plantis siccis D.
Agerii, qui postea anno 1600. dedit nomine Ga-
legæ aliculus ex monte Apennino.

VICIA, QVAE PITINE ANGVIL-
LARÆ, LATA SILIQUA, FLO-
re luteo.

P Itine Anguillare dicta, legumen est, ex radi-
ce tenui & annua *caules* plures proferens
angulosos, cubitales, dodrantales, & sesquicubi-
tales, ramosos, tenues, imbecilles, nec nisi ca-
preolorū ope, quibus se proximis circum voluūt,
humo surgentes: *silia* ex intervalis bina, opposi-
ta, cauliculis sine pediculo adnascuntur, triquetra,
Helixines cissampelli, lævia, tenera, striata, sursum
plurimque spectantia, & caulem veluti comple-
xa, ex quorum alis subinde rami prodeunt, foliis
itidem vel sitis, nec non claviculae tortiles, iudem-
que pediculi duabus vnciis longiores, quibus
singulis singuli insident *flores* lutei, Lathyrū lutei
floribus



floribus similes, quos *siliqua* excipiunt viciales, aut *lesunciales*, *latiuscula*, modicè *falcata*, compressa, in quibus sex, septemve *semina*, *Lentibus* minora, non ita compressa, sed paulò rotundiora, quæ modò nigricant, modò rubescunt, modò variegata videntur.

Hæc est illa, quam *Dod.* *palsim* *describit*, *Aphaca*, & *Aphacen* *Diosc.* & *Plinio*, ac *Galeno* dictam scribit. An autem nomina *Italia* *Vicioni* & *Ceserone* quæ *Lob.* & *Pena* in *Adv.* & *Obf.* huic plantæ tribuit, conueniant dubium mouet, quòd *Anguillara* ea alteri adscripserit. Nunc si *Gesnero* fides non abroganda, malè *Anguill.* *arum* ex *Theoph.* conuertit. Pitine namque pro *Serpillo* corruptum apud *Theoph.* esse vocabulum, obseruauit primò *Gesn.* quod idem postea, ad plantam siccam, quam ei inter alias *Monspeliacas* transmisi, annotauit.

Aphaca, *Camer. horti* teste, seu *Pitina* *Theoph.* depingitur à *Dodon.* *Lob.* & *Lugd.* *Lugd.* quidem hæc vocabulis: *Orobanche*, *legumen*, aut *leguminis vitium*, *describit* *Theoph.* *Gal.* & *Plinio.* *Aphaca* *Dod.* quam *Theod.* in *Theoph.* *Eruãgam* vertit, alii *Eru* anginam. Sed dicam liberè, hæc planta non placet pro *Lugdunensis* *Orobanche*, *Cæsalpini* sententiam potius approbaram, qui *Cuscutam* *Orobanchen* putat. Eius tamen opinionem, & eorum qui eam sequuntur, apprime recipio, qui *Aphacen* statuit: *Theophrastus* enim scribit *Securidacam* in *Aphaca* nasci, quasi fatua sit *Aphaca*.

Cælap. porrò hanc vocat *Aphacam* flore *luteo*, *Diosc.* *Gal.* & *Plinii.* *Aphacen*, cui *semina* *madidiora*, & *minora* *Lenticula*; per *madidiora* verò significare videtur, *lubricum* *lentorem*, qui peculiaris est in *Aphace* *feminibus*. Dicitur à *Tab.* *Elatine* *tertia*.

Quotannis *femine* *deciduo* se propagat in horto *Ill. E. C.* aliàs spontè *Montbelgardi* copiosè prouenit inter *segetes*. *Monspeli* obseruauit, nec non in *Italia*, vt *Bononia*. *Basileæ* *floritem* & *siliquas* habentem *mensè* *Maio*. Hanc *Geneur* vocant *Pesèrè*.

VICIAE FOLII ARACVS
Anguillaræ.

Aracos *Galeni* prouenit inter *segetes* *foliis* *similibus* *Viciae*, sed *angustioribus*. *Flos* est *coloris* *ruffi*, & *semen* *simile* *Eruo*, verùm caret, inquit *Anguillara*, *nomine* *vulgari*.

An non fortè à nobis sub alio nomine tradita, *Lectores* inuestigent.


Tom. II.

LENS.

CAP. XVI.



Lens maior.



De *Lente* hæc scripsit *Theoph.* *Lenti* *caulis* in *latus* tendit. Hæc *præarida* sine *ullo* *odore*, maxime inter *legumina* *fertilis* est, & *summum*, quæ *semen* *serunt* *pussillum*. *Lentem* porrò *scitius* in *leguminum* *genere* *sera* *fatio* est] vt *trahelcat*, *paxillo* *demitunt*.

Inuenio apud *authores*, inquit *Plinius*, *æquanimitatem* fieri *vescentibus* eâ. Hinc *Rhodig.* [vt *Dalech.* *notat*] *lentos* *dictos* *vult* *patientes*, *lenses*, *minimè* *iracundos*, *quamuis* & *pigros*, *incuriosos*, *legnes*, sic etiam *vocent*. *Genera* *Lenti* in *Ægypto* (*pergit* *Plin.*) *sunt* *duo*, alterum *rotundius*, *nigris*que: alterum *sua* *figurâ*. Vnde *vario* *vsu* *translatum* sit in *Lenticula* *nomen*.

Hinc etiam *Martialis* *rem* *exiguam* & *fere* *nul-* *lius* *momenti* *significare* *volens*, ita canit:

Accipe *Niliacam* *Pelusia* *munera* *Lentem*
Vilior est *alica*, *carior* illa *Faba*.

Cæterùm, inquit *Tragus*, *Lens*, quæ *Theoph.* *Lent-* *tis* *vulgaris*, seu *agrestis*, *granâ* *alia* *sobruffa*, *alia* *Trago*.

Legumen Deser. *Caulis.* hoc in *fit-* *mis* *caulis* *hum* *proster-* *nitur*, nisi in *propinquo* *ha-* *beat* *eu* *ca-* *precolorum* *am-* *plexu* *innitens* *se-* *se* *erigat*: *ra-* *dux* *it* *dem* *pu-* *illa*: *solia* *pu-* *nata* *Vicia*, *mi-* *nora*, *hirsuta*: *Flora.* *flore*, *purpura-* *floret.* *scunt*, *vel* *albes-* *cunt*: *siliqua* *Siliqua.* *brenes*, *com-* *pressa*, *semina* *Semina.* *dno*, aut *tria* *continent*, *cir-* *cinata*, *com-* *pressa*, *colore* *albido*, *vel* *sub-* *nigro*, seu *sul-* *co*, *parua*, *val-* *de* *læua*, *quæ* *cortice* *demp-* *to* *in* *duas* *par-* *tes* *lundan-* *tur*.

Est & alia *vulgari* *Lente* *omnibus* *par-* *tibus* *specio-* *sior* & *maior*, [ob id dicta *meitum* *maior* *Lens*] *herbâ*, *foli-* *is*, *flore* *albo*, *siliquis*, vt & *smine*, quod *Lentis* *vulga-* *duo* *aut* *tria* *ris* *gtana* *fac-* *ile* *æquat*.

Equanimi- *tatem* *pa-* *ru.* *Lenti* *qui* *dicuntur.* *Genera* *duo* *Plino.* *Exigit* *no-* *ment.*

Differentia *Trago.*

ex luteo pallida, nonnulla ex cano nigricantia apparent: humidâ verò cali tempestate profusè nigra euadunt. Serap. *Hader*, Hebr. *Astach*, Chald. *Lamina*, aliàs *Thelescha*. Lens satiuâ maior & latior. Lentis vulg. granula haud temerè supra quatuor in filiqua. Lentes in Vicia degenerant.

Lonicer. pingit, dicens: *Linsen* vocari Græcis Phace.

Dodon. notatur.

Dodonæo in fol. additæ duæ sunt Icones: vni titulus *Lens*, alteri *Lens minor*, cum tamen duatum in descriptione non faciat mentionem. Sed *ollâ*, quod dicitur, *Lenticulam attingit*. Quemadmodum enim olla fictilis Lentem amate videtur, ac velut vltro ventre ad Lentem: ita Dodon. ad exhibendum absque descriptione figuras vehementer propensus, ac velut ad id natas, duas nullâ additâ descriptione proponit.

Etymon.

Lentem ex Etymi vi dictam esse *Cornario* videtur, quâsi lens dicta sit, lenitatisque significationem habeat. Nec Germanos aliter *Linsen* appellare, quàm velut *Linde*.

Nomina linguarum.

Phaxos Græcis [autor est Matth.] eadem quæ *Lens* Latinis. *Hader* Arab. *Lentubia* Ital. Germ. *Linsen* / Hisp. *Lenteyas*, Gall. *Lentille*, Boh. *Sfocowice*. Et quod Matth. omisit, Belg. *Lensin*, Angl. *Lentiles*. Idem in post. com. Ital. duas facit species, minorem albam, cineritiam paulò maiorem. Et Hist germ. Lentem maiorem, & minorem.

Lal. notatur.

Aduersaria nomenclaturam dictam, non tantum non habent, sed nihil in super addunt.

Anguill. præter iam recensita nomina, *Lente* in Italia dici perhibet. Frustra denique mihi videntur à Lob. Obf. & Ic. Pl. duæ poni figuræ: præterea magis vulgarem existimo minorem, quàm maiorem.

Gefnet. cum Cordo contentus nonominibus vulgaribus, vt & Tabic. & Hist.

Lentem Italicam *Cam*. horti grandiozem dicit, & candidiorem vulgari.

*Lentes in Aracum-
fari.*

Lentes in Aracum mutari obseruauit Marantha.

Lens Cæsalpino semen est candicans, aut ruffescens, flosculis candicantibus, vel purpurascantibus: differunt amplitudine seminis, & exilitate: probatur latum & candidius, ruffum & paruum deterius est: perfectum Græci Phacon vocant.

Casp. Bauhin. apud Matthioli. Lentium genera duo habet, maius & minus. Gerard. Creat lentils Lentem maiorem, minorem verò *leise lentils* appellat.

Locus & Tempus.

Cælum amat, inquit Plin. sicum, solum autem tenue magis, quàm pingue. Lens floret Monspelii Aprili, Lugduni, Genex, & Basileæ frequens. Montbelgardii eâ conseruntur agri. Maior ex semine Sturgardiâ misso prouenit, Aprili floret, Iunio & Iulio maturescit. Lens vulgaris seu agrestis, autore Trago, solo gaudet medicriter pingui, soletque appetente verno tempore seti, erumpit è terra instar Vicia. Lens satiuâ non ita pridem è Lotbaringia ad me allata. Teste Schv. calidiore solo, & sudo profertur gaudet. A Cæsalp. seritur locis aridis.

Vires & vus.

Lens si assiduè edatur, ex Dioscor. autoritate visum hebetat, agrè concoquitur, stomacho incommoda est, in flat eum, & intestina: alium autem sistit, si cum cortice edatur. Præstat, quæ faciliè coquitur, & quæ dum maceratur, nihil nigri remittit. Vim habet adstringentem. Vnde aliud sistit decorticata prius, & diligenter cocta, pi-

mâ in coquendo aquâ diffusâ Nam primum ipsius decoctum alium sistit [summy Cod. Basil. non *summy*, vt videtur Corn. legitur contra Gal. mentem:] Inducit lens grauiâ somnia, ad neruosa, & pulmonem, & caput incoxia modâ est. Melius autem suum opus perficit ad alui fluxiones, addito ad ipsam cum aceto intybo, aut Portulaca, aut Beta nigra, aut Myrti bacis, aut Malicorio, aut Rosi ficis, aut Mespilis, aut Sorbis, aut Piris, aut Palmulis Thebæicis, aut Cotoneis Malis, aut Cichorio, aut Plantagine, aut galbis integris, quæ post coctam abiciuntur, aut Rhoë, qui obsonis inspergitur. Oportet autem acetum diligenter cum ipsa coquere, alioqui alium perturbat. Tringinta Lentes decorticatæ ac deuoratæ, ad stomachi subuersionem proficiunt. Lentis etiam Podagram, cocta cum polenta & imposita. Cum melle verò, sinus glutinat, crustas rumpit, & vlcera repurgat. At cum aceto cocta duritias & strumas disiccat. Cum Meliloto verò, aut Malo cotoneo, oculo rum & sedis inflammationes curat rosaceo ammixto. Verùm in maioribus sedis inflammationibus, & magnis sinibus, cum Malicorio, aut Rosi aridis decoquitur, ammixto etiam melle. Ad nomas gangrænicas similitur, aut ammixtâ etiam aqua marinâ, Ad pustulas autem, & herpetas, & sacrosignes & pernioles, velut antea dictum est. Cæterum ad mammas lacte turgentes, & lacte in ipsis in grumos coacto in aqua marina cocta, & imposita commoda est. Plinius visum eius medicum ferè velut Dioscor. habet. Lens optima inquit, quæ facillimè coquitur, eaque, quæ maximè aquam absorbet. Aciem quidem oculorum obtundit, & stomachum inflat, sed alium sistit in cibo, & magis que discocta cælesti aqua: eadem soluit, minus decocta. Crustulas vlcerum tumpit eaque, quæ intra os sunt, purgat, & adstringit. Collektiones imposita sedat, maximè que exulceratas, & rimosas. Oculorum autem epiphoras cum Meliloto, aut Cotoneo. Et paullo post: Ad sedem cum rosaceo aut Cotoneo. In his, quæ actus Aracum exigunt, cum putamine Punicæ, melle modico adiecto. Et rursus: Propter dissolutionem stomachi tringinta grana Lentis deuorantur. In cholericis quoque & dysenteria, efficacia est in tribus aquis cocta in quo vsu melius semper eam torere antè & tundere, vt quàm tenuissima detur, vel per se, vel cum Cotoneo, aut Piris, aut Myrto, aut Intybo erratico, aut Beta nigra, aut Plantagine. Pulmoni est inutilis, & capitis dolori, neruosisque omnibus, & selli nec sono facilis. Ad pustulas vtilis, signi que sacro. Et mammis in aqua marina decocta: in aceto autem duritias & strumas disiccat. At Galeno teste, Lentes adstringunt quidem, sed non validè, & caliditatis & frigiditatis in medio consistunt, & secundo ordine siccant. Proinde corpus quidem ipsarum siccant, & ventrem sistit. Decoctum verò propellit. Quapropter etiam prior aqua diffunditur, cum cohibendi gratiâ fumuntur. Et rursus: Nemo ex Lentibus panem facit: aridæ enim sunt, ac friabiles, corticemque habet adstringentem, & quæ ipsorum est veluti caro, crassus est succus, ac tettei, austeram qualitatem habens exiguam, cuius cortex multæ est particeps. Succus verò in ipsis est adstringenti contrarius. Quocirca si quis in aqua Lentes coxerit, deinde aquam sale, aut garo, aut cum ipsis oleo conditam sumperit, potus is alium deicit. At ex his coctis Lentibus, ad eum modum, quem diximus, paratus cibus scilicet habet succo contrariam, vt quæ ventris fluxus

licet, stomachum, intestina, & totum denique ventrem corroboret. Quamobrem celiacis, & dysentericis, cibus est accommodus. Lens verò decorticata, ut illam adstringendi vehemētiam, & ea, quæ ipsam consequuntur, amittit: ita magis nutrit, quàm quæ cortice spoliata non est: verum succum crassum ac paruum gignit, tardè que comeat, non tamen alui fluxus desiccatur, uti ea cui cortex non est ademptus. Aegineta quum suberit: pustula euaserunt [à morsu viperæ] ipsas lescit, ita ne excoriet, deinde multà aquâ fouet, Lenticulam coctam cum melle obducit, dum confanescant. Considerandum sanè, an consultius sit applicare Lentem, quæ adstringit, morsu viperino: veror ego quidem adhibere, ne venenum intrò repellatur. Qui igitur Aeginetæ subscribit, is cum illo Lenticulam angulo tenet [negotium, quod fieri nullo pacto potest, tentat] siquidè Lens angulis caret. In caliditate & humiditate, inquit Scythen kè medium tenet, desiccatur tamen ordine 2. valenter quoque adstringit, ventrem fistit. Decoctum verò prouocat, inflat, lenit, glutinat, extinguit, purgat, discutit.

Sed in Lente unguentum [in Lenticula fabulam] Cæsalpinus narrare videtur. Ineptè enim vili legumini mirandum esse dicit adscribit, qui minimè congruit, nec in tempore adhibetur. Dum enim Diocor. & alii Lentem & oculorum acie hebetare, stomacho grauem esse, intestinis noxiam, nervis, pulmōni & capiti inimicam, & turbulenta insomnia gignere, scribunt, is ex Arabum sententia decoctum eorum ad febres pellicentes, quas lenticulares vocant, laudat, quia exanthemata in illis erumpentia, Lenticulas representant. Sed cum plura inter se dissimilia confundere, quis non videt? Eum mehercè imitatur, qui mentionem inducit visis cuiuspiam aut nihili vel hominis, ve laterius rei, aliis de egregijs verba facientibus, in quem adagium hoc quadrat, in Lente unguentum.

Cæterum, mera aut egregia nulla de Lente, minutum enim est, ac vile legumen. Prouerbium autem est, Mira de Lente, apud Græcos dici solitum, quoties res humilis & pusilla splendidis excomitis, magnificisque laudibus attolleretur.

Porro, Dives factus iam desit gaudere Lente. Pauperum siquidem ac tenuium cibus est: quæ fastidit simulatque lautior fortuna contigit. Prouerbium in eos est, quibus ad vbetiorem conditionem euectis, fastidio sunt ea, quæ prius inopes boni consulebant. Dixit hoc Aristophanes in adolescentem, qui cum pauper haberet consuetudinem cum anu, nactus diuitias, cepit illam fastidire. Et licet dictum sit Lentem esse pauperum cibum, non tamen conuenit ut eadem ad fastidium interentur, ne Athenæi trimeter prouerbialis obiciatur:

Te Lens Deus corripit & fortuna Lens Sed de his satis. Nam Zenonum est & Lentem coqueret, id est, Sapiens est, in re minutissima se artificem declarare.

OROBVS SIVE ERVVM IN genere.

CAP. XVII.

Mvtant semina & pro temporum ratione vt leuiores, facilioaque reddantur: vt si [?] Eruum, quis Vere sciat, facillè, gratumque Tom. II.

exit, non graue, quemadmodum si Autumno feratur. Flois inter cætera legumina, diutina productio est. Huic porro quemadmodum Ciceri & Fabæ, primum pars inferna floret, quæ cum desecrit, proxima incipit, atque ita ad supernam itur successu assiduo: qua de causa multoties Eruo, auulsà semen ex ima parte defluxisse cer nitur, valente adhuc omnino, herbæ aque supernâ. Calem habet in latera magis dispersum. Numeratur inter ea, quæ omnium maximè durant. Strere inter radicias consuevere contra papillones [?] Scitur aliis maturius, sic tamen, vt non proflus ante Ver. Candidum in omnibus generibus præstat. Et licet semina eius siliquis, Cylindratibus inclusa proueniant, attamen non interseptâ, sed quasi inuicem contingentia constant. Fructus rotundos Gesn. esse dicit, modo Pipetis, quod apud Theop. nondum reperio.

[?] Erum] inquit Diosc. parus frutex [?] omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in valulis [?] habet.

Apud nos (Galeni verba habet) semen quoddam siluestre, rotundum, ac durum, Eruoque exilus in fructibus cerealibus repertum, quod Arachum nominant

Erui, quod Plinio facillè concesserimus, non operosa cura est. Hoc amplius quàm Vicia tuncatur. Nascitur & Phalangon in Eruo, bestiola Aranei generis, si Hyems aquosa sit.

Eruium autem, si Columella credimus, latrat loco macro, nec humido, quia luxuriâ plerumque corrumpitur. Potes & Autumno feri, nec minus post brumam Ianuarii parte nouissimâ, vel toto Februatio, dum ante Calendas Martias, quem mensem vniuersum negant Agricola huic legumini conuenire, quod eo tempore satum pecori sit noxium, & præcipue bubus, quos pabulo suo cerebrosos reddat, quinque modis iugerum offeritur.

Cicera bubus Erui loco fresa datur in Hispania Bætica, quæ cum suspensa mola diuisa est, paululum aqua maceratur, dum lentescat. Atque ita mista paleis subtilit pecori præbetur. Sed Erui decoctum libræ satisfaciunt vni iugo, Cicere sexdecim, eadem hominibus non inuulis, neque iniucunda est. Sapore certè nihilo differt à cicercula, colore tantum discernitur. Nam est obsoleter, & nigro propior, seritur primo, vel altero sulco mense Martio, ita ut postulat soli letitia, quod eadem quatuor modis, non nunquam & tribus, interdum etiam duobus, ac semodia iugerum occupat. Erui russi meminit Actus, cuius autoritatem confirmat Hermolaus, dicens: Eruium, Herbūm, aliud candidum, aliud ruffum.

Erui præter notas à Diosc. ei attributas, hæc serè addit Marantha: Eruium semen habet Paralii Tithymali, aut catanances primæ: magnitudine Æthiopicis feminis, aut Lithospermi, aut Dorycnii, aut Lathyridis. Ex hac descriptione facillè deprehenditur error multorum, qui varias plantas, pro Erui ostendunt: quarum nulla descriptio aridet: cum omnes semen habeant longè maius semine Lithospermi, aut Æthiopicis: nam vel ipse Theoph. Orobis semen minus Sambuci acinis esse asserit, quod cum Diosc. consentit.

Orobis plurimis qui angulosus, quem duplicem faciunt. Matth. in primis com. proponerebat iconem pro Erui, quæ mihi videtur esse Lathyris, quam Germanicam voco flore rubeante.

Brassauolus credit Eruiam, quæ Theoph. Gal. ac Paulo Ochros appellatur. legitimum esse Eruium, nominis vicinitate fortè deceptus.

do feru... Floret in gura tem...
Calem...
Vsu... Delectat...
Culin...
Locus...
Tempor...
Vsu...
Eruium...
Herb...
Catan...
Milt...
Matth...
Eruium...
Erui...
Erui...
Erui...

Nec ad stipulandum is est, teste Math. qui Eruciam Pisi genus, Eruum esse contendunt.

Hallucinatur Fuchsius, qui cicerculam vulgò vocatam, Eruum satiuum esse credit.

Hunc eundem errorem committit Turnerus, dicens: Ego Orobum Fuchsi cicerculam esse putò, quam Galenus Lathyrin vocat.

Eruum videtur Cornario, altera Vicia species esse. Nolsti enim, inquit ille, maiorem & minorem Viciam latinà voce paritè corruptà, distinguunt. Officinà peregrinum ab externis petitum Orobum habent in vsu: quum tamen verus Orobus etiam apud nos proueniat.

Cornarius se opponit Turn. cum ait, Galenus, Paulus & Aetius, nulli Eruo omnem auferont amaritudinem, In Eruo autem Fuchsi, eam nulla sit penitè amaritudo, Erutum esse nequit. Quin ipse Fuch. de compos. med. testatur eos omnium maximè errare, qui pro Eruo seu Orobo Vicia silu. seu Aphace vtantur.

Vires & v-

sus.

Farina

Farina otobina ad medendi vsus conueniens. Capiti onerosum est, inquit Diosc. aluum est turbat. Sanguinem per vrinas trahit. Boves autem pinguefacit, si coctum apponatur. Præcedentia non legit Otiba. autore Matthiolo. Præparatur Erui farina hoc modo: Habitiora & candida grana deligito, & aqua permiscendo respergito: ac vbi sufficienter combibere fueris, tum demum torreto, donec cortex disumpatur & decidat. Deinde molita, & tenui cribro extracta reponito. Est Erui farina aluo commoda, vrinam ciet, bonum colorem inducit. Ast veticior eius vsus, in cibo, aut potu, cum torsionibus torminibus, sanguinem per aluum & vesicam ducit. Purgat autem vlcera cum melle. Lentignes item, & maculas Solares, itemque alias, & totum corpus. Sifit etiam nomas, & duritias Lacuna ex vet. cod. ac gangranas. Mollit quoque duritias in mammis. Et ferina vlcera, & carbunculos, & sauos emarginat, ac rumpit. Cum vicio subacta & imposta, canum, hominum, & viperarum morsus sanat. Cum aceto verd, vrinæ difficultates, & tormina, & ad egerendum contentiones tenefimos sedat. Commoda est & his qui alimentum ex cibo non percipiunt, nucis magnitudine sicca accepta cum melle. At Erui decoctum assuam, perniones, & pruritus in vniuerso corpore fouendo sanat. Hæc Diosc. quem Plinius ita declarat, vt ex ipso transcripsi se videri possit. De Eruo, inquit, quædam in mentione eius diximus, nec potentiam ei minorem Veteres, quàm Brassicæ tribuerunt. Contra serpentium ictus ex aceto, ad Crocodilorum item, hominumque morsus. Si quis Eruum quotidie ieiunus edat, lienem eius assuam certissimi Auctores affirmant. Farina eius varos & maculas cuius toto corpore emendat. Serpente vlcera non patitur, in mammis efficacissimum. Carbunculos rumpit ex vino. Vrinæ difficultates, in flauorem, vitia iocinotis, tenesmus, & que cibum non sentiunt, atropa appellata, costum, & in nucis auelanæ magnitudinem melle collectum, deuoratumque, corrigit: item impetigies ex aceto coctum, & quarto die solutum. Panos in melle suppurate prohibet impostum. Aqua decocti perniones, & pruritus sanat fouendo. Quin & vniuerso corpori, si quis quotidie ieiunus biberit, meliorem fieri colorem existimant. Cibus idem hominis alienum. Vomitiones mouet, aluum turbat, capiti & stomacho onerosum. Genus quoque degtauat. Sed madefactum plurius diebus miscit, bubus, iumentisque vtilissimum. Siliquæ

Vlcera.

Lentignas.

Partumculi.

Anim. alium

morsus.

Tenesmus.

Liensum.

Var.

Maculas.

Colorè cor-

poris com-

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

modat.

eius virides, prius quàm indurecant, cum succo caule, folisque contrita, capillis nigro colore inficiunt. Cæterum Eruum medicaminis vim obtinere, epistolis D. Augusti (qui per hoc curatus) memoria extat.

Boves tum apud nos, ait Galer. ut. tum: pud alias plerisque gentes Eruum prius in aqua dulcoratum pascuntur. homines verd ab hoc semine proflus abstinent. Est enim insuausissimum, & prauisucci. In magna tamen fame, quemadmodum Hipp. quoque scripsit, necessitate coacti ad ipsum non nunquam accedunt. Nos verd ad eundem modum, quo Lupinos præparentes, Otobis cum melle vtuntur, ceu medicamentis crallos thoracis, ac pulmonis, humores expurgantibus Porò inter Otobos alii minus sunt medicamentosis, qui ad flatum, aut pallorem recidunt. Qui verd cocti his fuerint, & in aqua idem dem dulcorati, insuauitatem quidem deponunt, sed vnà etiam cum ea abstergerdi & incidendi facultatem, vt sola in eo relinquatur terrestris substantia, quæ alimentum fit, quod citra insignem amarorem inficcandi vim habet. Et hæc traduntur in lib. de Alim. simpl. vt & sequenti: Orobus desiccatur quidem excessu secundo intèro. calefactum autem primo. Porò quatenus amaritatis est paticeps, eatenus incidit, extergit, atque obstitutiones expedit. Cæterum si sumatur copiosè, sanguinem per vrinas euocat. Idem de Antid. Candida Erui farinam admiscet Scilla: nam que candida non est, amara supra modum esse confuevit. In Dorulus de comp. med. Vitat hanc non solum in dolore capitis, per consensum stomachi oborto, sed omnibus aliis etiam circa caput obortis affectionibus. Articulos etiam dissoluit.

Animaduertendum præcipit Matthiolum, quod candidum Erui semen Dioscorides elegerit, Galenus tamen candidum pallido, ac rufescente, longè miris præstat scribit. Eaptopter & Brasfaulorum Galeni rationem minimè habuisse: cum sibi ex Dioscoridis tantùm sententiâ persuaserit, album Erui semen in medicamentorum vsu, tam rufum, quàm pallidum viribus antecellere. Sed de hisce Matthioli commentariis, nostrum quoque, si animus est, percipito iudicium: Galenus quidem Erui candidam farinam Scilla admiscet, ast solum eam ob rationem, quòd candida supra modum amara non sit, tamen nostrum iudicio si talis esset, amaritudinem in Scilla trochiscis haud augetet: ipsa enim Scilla est valdè amara: Ad hæc ignoro, cur præferat albam, si alia viribus antecellat.

Nunc quis non cum Marantha irridendos censet qui Eruum se nunquam potuisse cognoscere asserunt: propterea, quòd in nulla planta (etiamsi delineationi respondere videretur) vim educendi sanguinis per vrinam animaduertent, nam vel huius rei nunquam periculum fecerunt vel si facere aggressi sunt, non ita vt decet, sunt experti: Vnicè erim exhibitione, pauca quantitate contenti, esse dum hunc exposcebant, non considerantes Diolcoridem velle, non nisi largis in cibo, aut potu assumptum id efficere.

Quæseram tandem ex Gelsnero, quid de Eruo sentiret. Miror equidem, respondit, Galer. um in trochiscis Scillinis, Erui loco panis micam eis addi iubere: cum hæc dulcis, Eruum verd (ipso teste) amarissimum sit: adeò vt vel totam Theriacam suo sapore amaro inficiat. Ego pharmacopolis nostris suasi, vt Diolcoridis vulgaris radicem (id est

Thora
Pulm
Orobis

Temp
ment


Ani
ueit

Aut
iudi
de f
Erui

Erui

est Fraxinella] Erui loco potius quam panis medulla ponant: nam & amara ea radix est, & vim contra venena ac pestem non vulgarem habet. Inter legumina præter Lupinum, nullum adhuc amarum inueni: postet autem Erui loco etiam Lupinus, præsertim siluestris, vt pote amariot, siccorque accipi.

OROBVS SIVE ERVVM
multis.



Cauliculi huic Orobob quadrati, tenues, multis alis concaui: folia ad nerulum palmarem annexa Lentis, vix tamen exadè ex aduerso respondentia: siliculi & ex alis, & ex coliculis, Lentis, albi, infimo folio maculâ fuscâ notato: siliqua tenues, Cylindraceæ, longitudine circiter vnciali, articulatis

torulis, in quibus semen rotundum (angulosum redditur vbi siccum) leguminoso duntaxat gustu.

An semen, quod iam afferunt pro Orobo Sicculo, quodque Fuchs. de comp. med. Cicereulam potius arbitrat: An Orobus, species leguminis in Creta proueniens, quo Lob. Obs. vitur, & adhuc nomine gallico caret.

Matth. in com. suis in Diosc. editis sibi mentis constat, ita enim in prioribus scribit: Eruum officinæ Græcorum more Orobum appellant. Ceterum, quod ex Alexandria, Syriaque, Venetias conuehitur, aliud semen representare censet, quam Erui, quod frequentissimum in Hetruria nascitur, ac scribitur. Folia mittit Eruum, quod vulgè *Moch* vocant, Lathyri, vel Cicercule vulgè vocatæ æmula: florem Pisorum modo, admodum rufescentem: siliquas formâ teretes, ac oblongas, in quibus semen, colore in aliquibus pallido, in nonnullis candido, in quibusdam verò rufescente. Ignorandum non est, quod et si Erui ab agricolis serantur, habetur tamen inter spontè nascentia: namque & per se inter legetes frequens oritur. Verum cum à paucis cognoscatur, illud inter viciâ species annuerant. Idem in Epit. edita anno 1571. scribit Eruum duum esse generum, candidum, & rufum: Galenum verò tertium addere, pallidum. Orobum esse plantam sarmentosam, foliosamque, humi procumbentem, ramis sese implicantibus, foliis parvis, longiusculis, lente minoribus: flores edere paruos, subpurpureos, & quandoque candidos: siliquam Pisi breuiorem, gracilioremque, in qua rotundum concludatur semen, conclusa inter granum & granum siliquâ. Proponerebat primum iconem Lathyri, representantem nostram Lathyrum maritimum flore rubente, siue nostram germanicam

valdè differentem à planta, de qua hoc capite scribimus: In Epitome verò omittit, & reponit aliam iconem satis commodè experimentem nostrum Orobum angulosum. In com. cum mag. ic. anni 1583, meliorem habet: omittit autem ea, quæ in præcedentibus scripserat, ponitque sequentia: Non diu est, quod legitimum habetur & fertur Eruum, iam vbique in Italia. Alterum quoque vidimus Erui genus, quod Creticum vocant, nostrati ferè simile, sed minuiore semine, & siliquis gracilioribus. In com. Ital. cum mag. ic. anni 1583, quæ sunt ante modò dictam editionem anni 1583, eadem tradit: verum ibi duas habet icones, priorem similem modò dictæ, sub titulo *Erui*: alteri inscriptum est, *Orobo di Cantia*. In Hist. germ. Iconem comment. cum mag. fig. habet, vbi etiam *des Cret* & Eruum. Sed vti dictum sibi contrarius videtur Matth. nec fortè scit, quid scribat. In primis enim com. & Epit. statuit Eruum frequentissimum in Hetruria nasci, & vocari *Moch*, ab agricolis serri, per se inter legetes frequenter oriri. In post. com. omittit nom. n. *Moch*, ac non diu esse asserit, quod legitimum habeatur, & feratur: nihilominus tamen in iisdem post. com. retinet verba antè citata, quod agricolæ serant, quod spontè frequens oritur, & inter viciâ species numeretur. Præterea plantæ, quam in post. com. exhibet pro Orobo, quæ eadem cum nostro Erui, non inest auaritudine, quæ eo autore requiritur in Antiquorum Erui.

Camer. ad Epit. Matth. iconem nouam ex Gesnerianis, vt puto, sub titulo Erui apposuit.

Orobus hodie si Angullaræ credimus, in Abruzzo vulgaris, retinet nomen antiquum corruptum ex *Erui*, ac vocant *terno*.

des Erui Dod. gall. Cicet fatuum, Columbinum, Venereum, & Orobizum [*des Cret*] Lat. Cicet erullum, non est Eruum, vt multi Neoterici putant, qui Thetiaca, & alius medicamentis indunt: Ethoc idem affirmat Hist. Frumentorum.

Orobus, inquit Gesn. à Græcis dictus est Eruum, quod ad Thetiaca compositionem requiritur. Legumen est multis capreolis, siliquis secundum semina interceptis, ita vt in futuris coniuncti panes: semen lonis altum, intus rufescit. Facile prouenit. Circa Lugdunum [unde semina accersit] agros eo conserui audio. Inuenitur & siluestris: sed non in Germania, quod sciam.

An Eruum Guiland. in Theone, quod in Italia *Mochum* nuncupari cum Matthiolo sentit, eum hic tamen interea *Mochum* ignotam sibi plantam statuat.

An qui vulgè, *Casalp* autore, in Etruria *Moch* appellatur, serunturque in alpihus ad pabulum brutorum: Planta in totum similis cicercule tenuioribus foliis: seminibus simili modo angulosis, candicantibus, vel nigris, minoribus, & in sua siliqua magis factis, asperioribusque: hæc columbis gratissima est ad fecundandum. Dioscorides Orobum vocat. A Theodoro apud Theoph. Eruum conuertitur. Sed & Plinio Eruum, Galeno autem Orobus dicitur. Si *Casalp* eundem nobiscum Orobum intelligit, comparatione cum cicercula non placet.

De hoc Lob. & Pena Adu. Cicet orobum tantoperè simile est Narbonensiu Orobo: Dioscoridis latine Ciceri eundem fecit Orobum vulgatum & receptum officinis Dodonæus. Orobus receptus Herbariorum. *Robus*, color rubeus Antiquus fuit, qualis in russis bobus, & Orobis creuitur: Hodie nihil panè ab illo dudum dicto

Matth. silic. capreolis.

terno. Cicet erullum non est.

Locus.

An Moch.

Orobus Robus.

diffidet receptus in officinis Italicis & Norbonensibus. Orobus semine & siliqua præsertim, nisi quia huius altero tantò minor est, compressior, nec vno loco, sed variis ex alarum geniculis, secundum summum & imum caulis exorta, pendula, alioqui terna & quaterna claudit semina, Cicere minorà multò, tangenti hebetius angulosa, & vno latete aliquantum acutiora, gustu Lentis, folio & sicie Pisi, Lentis, aut Vicie: ramosis, spatiosis, luxuriantibus, caducis serè ramulis: minus tamen est ^{in vno loco} hic, quàm Cicet Orobrum, & satium, minusque ingratus gustanti: nec enim nostro ingenio conuenit, stirpium vel figurarum, vel qualitates, plumbea. Lesbiarum ad nostram sententiam exigere, aut hæceterè, vt nimis multi fãcitant: sanè par est alterutrum horum leguminum, verum esse Orobum, cum è tam multis nihil penitus similius occurrat.

Nomina. Ital. *Macho*. Hisp. *Ternuo*, & *Ternuos*. Prouincialibus *Kres*, quasi *Eruum*. *Mochus*, siue *Cicer satium* Diofcoridis Dodonæo. Idem Ic. Pl. Toni. 2. pag. 72.

Mochus.

C. Bauh

Siluestre

Locus & Tempus.

Item Obi. Orobus receptus Herbariorum. Ital. *Macho*. Hisp. *Ternuo*, & *Ternuos*. Prouincialibus *Kres*, quasi *Eruum*. *Mochus*, siue *Cicer satium* Diofcoridis Dodonæo. Idem Ic. Pl. Toni. 2. pag. 72. C. Bauh. qui duas icones proponit, quæ paulò meliores nostrâ emptitiâ, quæ nobis non placent, apud Matth. ita scribit: Orobus, *ὄροβος* quibusdam *καρὰ τὸ ἐπιπέδον ὑπὸ τῶν κοίλων*, quòd eo boues vescantur, & saginentur: *Eruum* Lat. quod satium est, & siluestre. Satium, vel maiore siliquâ, & semine, vel graciliore siliqua & semine: rursus qui maiore semine, candido est, aut pallido, aut rufio: Siluestre, varium est. Hic tantum de satiuo. *Lorobus satiuus maiore siliqua* C. B. *Orobis & Eruum*. Matth. Cord. in Diof. Gesn. hort. Cast. Lugd. *Orobus receptus Herbariorum* Lob. *Eruum verum*, siue *Orobus* Camer. Tab. *Cicer satium* Dod. gall. *Mochus*, siue *Cicer satium* Dod. in fol. II. *Orobus satiuus minore siliquâ* C. B. *Orobus Creticus Matthiolo* (in cuius editione postrema, & iconibus, figura non habetur) & Lugdunensi.

Orobus Matthioli Genex in horto nostro proueniebat facilè, virens adhuc Decembri ex semine deciduo, florens Maio. Lugduni quoque habebam. Basileæ frater C. Bauh. Montbelgardi ex semine sturgardiâ misso, & sato, Aprilis & Iunio floruit: semèn maturum Iulio. Honorius Bellus ex Cydonia Cretæ misit, hæc addit inscriptione: Orobus *ὄροβος* siue *ὄροβος*, quod rustici ferunt singulis annis, & boues eo saginant Antiquorum mote. Nos non videmus, quæ in re differat à semine, quod nunc existimatur & perhibetur Orobus: est enim serè triangulare cum vmbilico nigricante: color totius ex albo cinereo: sapor leguminosus, & Pisiformis. Huic simile paulò maius legumen misit Araci nomine: sapore & formâ non differens, sed colore serè glauco. Nascitur Hispaniæ & Italiæ compluribus locis. In Germania verò, ac Belgio [si vera Dod. perhibet] non nisi in hortis, & à paucis ferunt. In glaucosis affatim oritur. *Aduers.*

OROBVM CICER LObelli.

Cicet Orobrum Theoph. ab Orobo nigtedi-
one tantum distans. Difficile tamen sit statuere quodnam sit Diofcoridis domesticum primum nam nouum, quod hic damus, tanro pere simile est Norbonensium Orobo, siliquâ præsertim, vt ægros nos reddat, esse illud, quod dulcissimum &

Eruo simillimum à Plinio dicitur: sed ambigimus iam, si ne idem istud cum Diof. satiuo: cui eundem fecit Orobum vulgatum & receptum officinis: doctus & perbonus scriptor Dodonæus, qui nondum hanc nouisset.

Norbonæ & Gallo-prouinciæ plerique satis per messes flauet hæc, *culmo* assurgens scisquepedali, geniculato lateratum, quasi in obliquum flexo, leuiter striato, fistuloso: *foliis* in imo nervulo prælixo hærentibus, Lentis, aut Araci: à medio item ramulis donatur, & foliatis pediculis: & iuxta summos alarum geniculos complures confertæ *siliquæ*, vno serè exortu nixæ, lete tangunt & stipant, cylindricæ, vnciam longæ, rectæ, teretes, inter transuersa pusilla interualla foras protuberantibus singulis quasi torulis, ternis & quaternis, articulatum distinctis: ipsa intus *semina* nullâ membranâ distincta. Pisum Arietinum sermè æquant, obtusè triangula: Orobo duplò maiora, colore alba, pallida, & subfulua, non ingrati saporis Cicere aut Pisi.

Cicet orobum Theophrasti Lob. & Penæ Adu. & Ic. Pl. Obi. autem *Cicet orobum* Adu. p. 400. *Cicercula* Plin. F. Pennini.

OROBO SIMILIS LATHYRVS Cretensis Honorii Belli.

Emen, quod misit nobis Honorius Bellus ex Cydonia Cretensi, huius inscriptionis: Lathyrus, *λαθυρος*, dicens à rusticis quotannis ferri: Hoc sanè Orobo antè dicto, vel Araco Cretensi ab eo missis, simillimum est: adè vt nullam discernimen admaduertam, nisi in colore, quæ medijs est inter Orobum & Aracum ab eo missum: sapor idem cum Pisiformis. Satium Montbelgardi in horto Ill. C. Wittemb. prouenit.

OROBO SIMILIS ARACVS Cretensis Honorii Belli.

Misit nobis ex Cretæ Cydonia Honor. Bellus semen, quod ita inscripsit: Aracus, *ἀρακός*, à rusticis quotannis feritur. Id sanè vix differt ab eo, quod misit pro Orobo: triangulare enim, vel quadrangulare quoque est, paulò tamen maius, & colore ad glaucum accedente: sapor leguminosus, qualis Orobo, & Pisis. Si prouenerit fatuus, obseruabimus qualia folia & flores.

ARACVS VETERIBVS.

C A P. XVIII.

Aracus tes serabra & dura in Lente videtur, autote Theoph. qui Arachidnam ipsi similem scribit. De hoc Gal. inquit: Aracos Aristophani in Holcadibus. Semen hoc Lathyro [Cicercula] semini est adsimile. Fueruntque nonnulli qui putarunt, ipsum non esse generis à Lathyro [cicercula] diuersi: quandoquidem & vsus ipsius omnis, & facultas, Lathyrus [cicercula] facultati est adsimilis, nisi quòd Araci sunt duriores, minusque facilè elixentur. Quæ causa etiam est, cur Lathyrus [cicerculis] concoctus sunt difficiliore.

ARACHIDNA

ARACHIDNA VETE-
RIBVS.

CAP. XIX

ARachidnae radix, eiusque, quod simile est Araco, &c. Pars ipsa carnosa radicem simplicem, et assam, alius infigendam mittit, ceteras vero, quibus insidet, fructus tenues, ac summo celsite coherentes agit: loca at enosa pouissimum amant: neutrum folia gerit, neque folis quicquam simile, sed quasi binorum fructuum, partibus inter se appositis, facunda potius extant, quod mirum profecto est. Et haec apud Gazam Theophrastus testatur, cuius textum Honorius Bellus corruptum suspicatur, ut mox videre est, sub eius Arachidna.

ARACHIDNA, AVT POTIVS
Aracoides Honorii
Belli.

DE Arachidna Cretica, cuius plantam siccam, & semina ad nos misit ex Crete Cydonia, haec ad nos perscripsit Honor. Bellus: Planta omnino noua est, & nullum Botanicum huc vsque vidi, qui earum plantarum genus aliquod descripsit, quae *ἀραχιδνα* à Theophrasto vocantur, licet Caelalp. Dentariae speciem Arachidnam faciat, quae cum Theophrasti Arachidna, meo quidem iudicio, nihil commune habet.

Planta autem nostra, cum vtrinque fructus ferat, id est, & infra, & supra terram, merito mihi Arachidna, aut potius Aracoides vocata videtur. Et licet Theoph. lib. 1. cap. 11. Arachidna, aut id, quod Araco simile est, foliis cetera affirmet, tamen textum corruptum esse, merito quis dubitare potest. Nam cum Theoph. stirpem similem

Araco describat, necesse est similitudinem harum esse, aut floris, aut fructus, aut foliorum. Aracus vero duplex ab Auctoribus habetur, vnus Lathyro similis, qui inter Lentescit nascitur, & graece per x scribitur. Alter vero per y teste Galeno i. de alim. fac. c. 27. Siliquescit quoddam semen rotundum, ac durum, Eruoque exilus, quod & Theoph. l. 3. c. 8. affirmat, asserens: quod Aracus in Lente oritur, res scabra, & dura. Cum autem planta nostra, caule, foliis, & lobo similis sit Lentescit, semenque durum, & Araco non dissimile ferat, Orobo, Lathyroque minori, fructumque sub terra circa radices, & in caule gerat, merito Aracoides dicenda videtur. Et ea Theop. verba, quod folia non ferat, ad Arachidnam Aegyptiam potius referenda videntur, quam ad Aracoidem

nostram, quam ita describo. Herba est dodrantalis, foliis leguminosis, Lentis, vel Viciae, minoribus, obtusis, cordatis. Vitiulis tenuibus, quorum extremis flores haerent purpurei Viciae. Circa radices sub terra fert siliquas paruas, Lenticulae similes, in quibus modo vnum, modo binae semina, rotunda, nigra, in altero vero non nigrum, sed Orobo simile. At quos fructus in caule proferat, pluribus occupationibus praepeditus haecenus obseruare non potui.

A rusticis *ἀραχιδνα* [agrestis Lens] vocatur. Inter segetes & legumina inuenitur, negligiturque, idcirco vobis radices tantum fructum mitto. Mitto etiam Orobi semina, Araci, & Lathyri, ut horum leguminum in hac insula nascentium differentiam commodè obseruare possitis. Haec ille.

Nostra hic restat obseruatio. Nigrum semen Viciae satiuae simile est, dentibus durum attritu: sapore Pilorum: medulla alba. Album vero simile formam, sapore, & duritiâ: eius figuram ex planta sicca, quam misit, parandam curauimus: facta enim non prouenit.

Iconem quoque Clusii, quamuis falsa videretur, delineandam curauimus. Proponit autem illam Exot. lib. 4. c. 16. quam ita describit:



An Theophrasto Araco *ἀραχιδνα* Non minus admirabilis est huius plantae natura, quam eius, cuius rariorum plantarum Hist. l. 4. cap. 52. Arachidnae appellatione meminimus: propterea illam esse suspicabar, quam Theoph. lib. 1. Hist. pl. cap. 11. Arachidna coniungit, & *ἀραχιδνα* esse, fructumque supernè inferno mino-

rem ferre, scribit, tamen si folia, aut quidpiam foliis simile habere neget. Quem sequutus est Plinius.

Itius plantae semen cum suis siliquis, tam supernis, quam sub terra latentibus in Crete lectum, ad me ante aliquot annos Honor. Bellum mittere memini, quod à me fatum, & quibusdam eius amicis communicatum, nulli est natum, an ob nimiam vetustatem, ignoro. Eam ob causam eius historiam, ut auebam, in meum librum euulgatum inferre non potui. Quum vero Io. Pona anno 1693. semina mitteret in Lugduno-Batauae Academiae hortu ferenda, inter quae nonnulla à Bello communicata cognoscebam. cum illis integram huius plantae stirpem, siccitate proflus contractam reperiebam, quam, vbi aliquot horis in aqua maceratam explicassem, ut commodius describere possem, exprimentam curabam.

Statim porro à radice haec planta in plures ramulos diuiditur, semipedalis, aut dodrantalis, ad summam, longitudinis, tenues, angulosos: quos alternis ambiunt exiguorum foliorum alae, Lenticulae, aut Araci foliorum alis similes: ea folia extimâ parte latiuscula, & quodammodo cordis (vt

Descriptio
Folia.

Flores.
Siliqua
Semina.

Agrestis
Lens.

Aracorum
obseruatio.

Icon. Clusii.

Araco
ἀραχιδνα.

Locus

Descriptio
Ramuli
Folia.

vulgò pingi solet) formam imitantia, per mediũ, secundũ longitudinem, neruo secla, qui extimã foliorum partem nonnihil superat: nascuntur autem in singulis alis ex utroque latere quaterna aut quina, vel ex aduerso fita, vel inæquali serie, ipsa verò extrema ala in capreolum desinat, & sese conuoluit, vt in Lenticula, & Vicia. Illius formam non conspexi (quem Lenticulæ, aut Araci flori similem esse autumo) sed siliquas duntaxat in alarum sinu nascentes, latiusculas, unciam longas, aut paulò ampliores, fuscas, nonnihil villotas, mucrone incuruo & quasi hamato præditas, continentes bina, aut terna semina nigra, rotunda, non angulosa, vt Araci, quæ maturare dissiliunt: radicem habebat Lenticulæ, aut Araco similem, è cuius capite summã quasi tellure plures paruas, tenues, albas fibras quaquaersum spargebat, è quarum singulis dependebant singulares, interdum geminæ, siliquæ breues, & rotundæ, extrema parte in curuum mucronem desinentes, tenellæ, & candicantes, continentes vnicum, vt plurimum semen, nonnunquam [quæ maiores] & alterum, rotundum, illo non minus, quod siliquæ in plantæ ramis nascentes proferunt, sed albicantis, aut subfusci coloris. *Hæc Clus.*

Radis.

Siliqua

Semen.

Icones.

Siliqua sub terra non crescit.

Arachidna Cretica, an potius Aracoydes Theoph. verò *Arachidna* Hon Belli, cum suis fructibus, inferno sc. & Iuperno. Hæc Pona in descript. montis Baldi ex semine inferiori crescit, & in hoc obseruauit, & vnica radice duos diuersos cauculos, & folia oriri, vt ex eius figura patet.

Postquam ipsam plantam ab Honor. Bello acceptam, in qua nullos obseruauit capreolos, descriptissem iam, atque icone propriã effigiatam proposuissem, Pona, sicut & Clusius etiam iconem exhibuere. Clusius igitur iconem, additis ex Pona figurã floribus, expressam quoque damus.

Cæterum, consideratã plantã, quam Pona nobis misit, & collatã cum ea, quam accepimus ab ipso Honorio, quamque curauimus depingendam, obseruatã etiam descriptione Clusii, non possumus nobis persuadere illas siliquas, in curuum mucronem desinentes, sub terra crescere, aut vnquam creuisse: ramos in icone cum siliquis longis plantæ alterius censemus, ceu Vicia alicuius: si quis haberet plantam integram, cum vtrisque siliquis in caulibus & radicibus, & videntem, saltẽm communicaret, rem gratam faceret, tollereturque nobis suspicionem nostram, iconem quippe per incuriam ex duabus plantis compositam.

CHAMÆBALANVS LEGUMINOSA.

CAP. XX.

Stymon.

Descri.

Caliculus.

Folia.

Floribus.

EX radicis argumento Chamæbalanon, quasi terrestris glandem dicas denominatũ: siquidem ex filis tenuibus, longissimis, pendulæ sub sunt glandes, crassiusculæ, oblongæ, pulpã candidã, dulci, non nisi alta fossione inueniende: vnde in firmi emergunt caliculi, sed longi, cubitales, vel maiores, rariosi, humi procumbentes: in quibus obsetuare est bina ferè folia, eaque subaspera [si credamus Math.] ex aduerso sita, Vicia familia, vnciam circiter longa, reliquo pediculo in capreolos abeunte: flores leguminosi, Pisi, plures congesti, priuato inhaerent



surculo, putrescit, Matth. olio punicæ, & odorat: inde siliquæ oriuntur.

Apios Ruellie, & Iphis, alis Chamæbalanos Rom. radix sili. Plinio & Theoph. etiam Apio.

Ruellie veram Ichniada inuenisse putat, inquit Cord. in Diosc. sed fallitur.

An Cordo Ornithogalu flore purpureo, quod ait se ignorare, an à Diosc. descriptum?

Notatum à quodam apud Cord. Arachidna Theoph. quoddam Erdnuss interpretari: & alibi Turneri Apion Fuchsi, Astragalum facere. Verũ Cord. eo capite nec Apion Fuchsi tradit, nec Astragalum Turneri, nec historiam Chamæbalani nostræ leguminosæ de qua hic agimus.

Trago hist. germ. pingenti, vocatur Erdnuss Sebrot. Lat. *Panis porcinus, Nux terra, Ficus terra, Erdseigen, Erdwandel.* A quibusdam Arabiis Auicenna, & Buchu maris Serapionis, & Matam terra, aut Cyclaminum Di. scidem habetur cum Erdnuss. Sed aberrant, quomuis M. Virgil. Florentinus, & Peothus id existimant. Is (Tragus) dicit esse Raphanum sili. qui in Theoph. dicitur, & in Diosc. dicitur: vocat Chamæbalanum terrestris, Akeri & Grund Eschel.

Tragus in Hist. lat. non reprehendit Marcellum Virg. & Peothum: sanè si Marcelli verba considerentur, quibus ait, radice subduli, peccori gratum esse Cyclaminum, quis possit suspicari de hac radice loqui: verum si cõserat, quæ paulò post dicit: vidimus nos aliquando cyclamini radice globosam, & latitudine amplissimi panis, ex qua folia erumpent, & inter folia flos pediculo potius, quàm caliculo. Planè concludet Marcellũ ibi de vera Cyclamino locutum, & nõ de Erdnuss, quomuis malè dixerit peccori gratam Cyclaminum.

Apios quoque Fuchsi dicitur, Erdnuss Erdseelen Gall. *Rane Rayfort*, aut *Ciche sauage*, quæ nomina gallica non placent. A Dod. gall. Belgis Erdnoten & quibusdam Nüssen met steerten. Neotericis Chamæbalanus, & glandes terrestris. Quidam docti Astragalum existimant à Diosc. descriptam: ab aliis Apios. Item Hist. lat. vbi quoque figura. Belg. Erdseelen, & Nucis caudate nominant quidam *zauaal, dross, Terre glandes.* Er de frum. cum Apio non conueniunt, Astragalosimiliores sunt.

Quibusdam, inquit Corn. in Diosc. Ornithogalon ea radice rectè dicitur, quæ à nostris Erdnuss & Sebrot, & Erdseigen vocatur. Alii interim ad Cyclaminum referunt. Alii rursus Apio esse volunt. Quod autem Apios non sit, vis eius purgatoria obstat. Considerandum potè, an Cornario sit Astragalus, & Ius astragalitis, Erdmoren. de quo scribit in Diosc. lib. 4. cap. 52. De quibus agemus titulo de Astragalo Veterum, vbi etiam Astragali æquiuocationes.

Arachidna

Raphanum sili.

Tragus

Sebrot.

Fuchsi

Glandes

refra.

Apio

Cyclamini

Apio

Apios Lonic. vulgò panis porcinus, Sc wbro/ Nux terræ, Chamæbalanus.

Apion, cuius picturam damus (inquit Riff. in Diosc.) Fuchsius falsò *Beidel fern* & *Erduß* / *Seiw brot* / siue *Schweinbrot* appellauit, nominibus scilicet rebus aliis dicitis, vt Cyclamini, & Ornithogalo: quo nomine germanico, siue gallico, hodie appellatur, scire nondum potui. *Hæc Riffius*. Nobis autem iudicibus, germanica nomina huic plantæ meliùs conueniunt, quàm Apios nomen.

Sententiæ Ruellii de Apio, Matthiolus haud subscribendum iudicat: siquidem Apios falsus, & non verus, vt crediderunt, Fuchf. Tragus, & Lonicerus, Ital. *Noci della terra*, hebet figuram propriam. Sulpicatur Lusitanum pro Astragalo eam plantam accepisse, quæ Fuchfio, & quibusdam ex recentioribus, Apios Diosc. esse creditur: sed magnas inter has plantas differentia.

Amatus potro, quantum videt, Tragopogonum putat, quàm Fuchfio Apios admentitur. Germani plantam hanc, Terræ nucem appellant. Sed quam habeat cum Tragopogono cognationem, is sanè nullam videt.

Non placent Winckeri verba, qui *Erduß*, Apium vomitorium vocat.

Nescit Baccan. an Ruellio credendum, qui dicat Apion familiare herbam. Apud Cam. hort. Apios Fuchfii, Astragalus aliorum. Chamæbalanus *Erfeßnuß* Tab. ic. & Hist. Apios, Herbam esse, dicit Fauardus. Apios quorundam, Apios Herba Hieton. Bock. Eidem & Fuchfio radix siluestris: ipsi viderint, inquit Geln. Fuch. Roef. *Erdimandel* / Apios, Arachyda, Ficus terræ. Theop. Golius & Amatus Apion nominant simpliciter.

Astragalus Turnco, non est Apios. Quare erant Amatus, Trag. & Fuch. Et rufus. Astragalus circa Coloniam nominatur *Erdeßelen*. Belg. *Erduutte* / Germ. *Erduß*. Angl. *Deese* & *earthnt* / à foliis Pisi, aut Ciceris, & radicibus Nuculæ terrestris similibus. Est reliqua omnis descriptio conueniret Dioscoridis, tamen in humidis quibusdam locis quia radicem comperit parum admodum adstringentem, dubitare cepit: at rursus cum in locis siccis manifesta adstrictione præditam animaduertit, nihil amplius cubitauit Turnerus, quin verus esset Astragalus; est Fuchf. contendat esse Apion. Descriptio Astragali Dioscoridis, conuenit cum planta, quam Turnerus exhibet, in omnibus, quantum indicat excepta radice: tota enim radix non est Raphani radicis similis, est glandulosus tuberculis sit donata, vt species quædam Raphani. Quem autem exhibet Matth. folia habet rotundiora, non tam longa, & serrata, vt Cicerum. Expendant docti, camque eligant, quæ descriptioni optimè quadrat.

Fuchfii Apios longè abest à legitima *Mutz* tardz / autorib. Aduers. Anglis & Germanis. An autem Terræ glandes, siue Pseudo-Apios Germanorum Astragalus Diosc. Germ. *Schwartz* *Rettig* / Raphanus niger. Item Obs. vbi figura, *Terræ glandes*. Perperam Ornithogalon & Apios Cordo. Belg. *Mus caudatus*. Et Ic. Pl. *Terræ glandes*. Ego quidem vbi Cordus Apion dixerit, quod Lobel. perhibet. haud inuenio. Est & apud Hist. Lugd. figura, sub titulo *Apios Fuchfii*. À Thelio in Haec. *Astragalus aruenfis*, seu *Chamæbalanus* appellatur. *Glandes terra, vel terrestres* Clus. vocat, Hung. *Fodi monyaro*, hoc est, terrea auellana. Dicit C. Bauh. apud Matth. esse *Pseudo-Apios* Matthioli, Autumalfe quosdam

Matthiolium Astragali nomine in prima editione exhibuisse. Apios Fuchfii, & Tragi *Horro* Luf. *Terræ glandes*, & *Erduß* / *Erdeßelen* appellatur. Sed cui cognita Apios satis apparet, quantum discrimen? quam contrariæ facultates?

Ex Burgundia accersitam in horto Ill. E. C. Locus & tempus, Montb. plantauit: postea reperi in agris non longè à pago *Charmoncy*. Montbelgard & Burgundiones vocant *des Maguffens*. Basileæ reperi extra portam lapideam in agris supra collem quæitur Binnigam, ad dextram, florentem Iunio, flore rubello, profundè radicè perquisitū fodiendo priusquam reperi. Qui radices perquirent, caueant ne perfringant tenues radices à quibus pendet bulbosa. Patauii vidi in horto D. Cortusii, & Geneuæ copiosè in vineis extra portam à S. Gerualdo denotatam.

Serit & radice (inquit Dod.) potest, sed radice tenuis perficitur: vna enim glans fata in plures breui tempore multiplicatur. Secus aruorum margines multis in Brabantia locis gignitur. Floret Iunio & Iulio. Post mensem est odinatur & colliguntur radicem glandes. Pseudo-Apios Matthioli floret Iunio mense præcipuè: Passum nascitur vbi que in Bohemia in campis & præsertim in vineis.

Vidit Ruellius per inopiam frugum nutri pauperes hanc radicem vesci. Pastores quandoque his nucibus vescuntur: Ceterum experientia didicit Tragus, nauas, & vomitiones illas cedere, aliàs eius indicio planè innoxie sunt. Sed vereor ne Tragus, qui putabat *Erduß* esse Apion, sibi etiam persuaserit, eas & vomitiones cedere. Adhæc Terræ glandes, quod Dod. asserit, coacta, ac in cibo sumpta, difficiliss, quàm Rapa, aut Pastinaca, concoquuntur, sed alimentum tamen non minus, quàm Pastinacæ subministrant: minus quàm ille inflant, tardius descendunt, ventrem etiam adstringentes, Cruda difficiliss concoquuntur, & aguis descendunt. Temperamentum autem obtinent calidum quidem mediocre, sicum verò paulò intensius, cum non exigua vi adstrictoria, vnde etiam non solum ventris fluxum, sed & sanguinis flores, præsertim ex vtero, aut per vesicam, reprimunt. Hæc Tragus Chamæbalano vires assignat. Quarum quædam ex Astragalo adscriptæ videntur. Dixit enim Dod. glandes istas aluum constringere, non secus ac Astragalon. Radices sunt (inquit Lob.) neutiquam purgantes, imò ab opihonibus esitari solita: mirari suimus Augerium Ferrerium libello de lue vener. hanc radicem sibi, aliisque adeò veram esse Apion persuasisse, vt profiterianus sit, se præparatas, ministratasq; illas rapulas veneris egrotis dedisse, adque lotiones & somenta vsurpales: monuisse potuerunt illius primæ qualitates alimentosa, & ignaua potius, quàm medicata. Saporem illis subdulcis, glandis, aut Castaneæ adstringens, ac vti Castaneæ tardius conficiuntur; flatulentum, suauem tamen, succum creant. Veneris incentiuæ sunt. Sanguinis vteri, renum, & ventris fluores compefcunt. In Bohemia, vbi abundant multi comedunt Castaneæ modo. Et licet edantur ad satietatem, teste Matthioli, mouent quidem nauasem, sed non euacuant per aluum. Nunc autore Cam. horti, ex huius floribus aquam destillant quidam, quæ ita rosaceam ementitur, vt pro illa non raro vendi soleat.

Satio. Cnl
sua.

Vires & vi
sua.

Nauasem

Temperamentum

Veneris

Agd.

ARACI, VEL APIOS LEGVMINOSA species Tossiano Carolo.

CAP. XXI

Descriptio
Caulis.
Folia.



Caulis est cubitali, vel maiore, tenui, glabro: Folia ex intervalis quaterna vno pediculo nixa, duarum, triumue vnciarum longitudine, culmum lata, in acutum mucronem desinentia, striata, viridantia: flores extremo surculo heret, quinque, vel sex congesti, pediculis mediocriter longi, magni, Galege vernæ, colore

purpureo præditi, vel ex purpureo ad incarnatum vergente, cælesti, pulchro, scribebat qui mittebat: radix ad Galege vernæ radicem accedit. Pictor ordinem foliorum non bene expressit, qui erat pingendus, qualis est in Orobo pannonico, radice bulbosâ Clusii, quem æmulari videtur.

Radix.

Icon.

Arachm.
Apios.
Locus

Carolus Tossianus stirpium diligentiss. indagator ascripsit huic plantæ: *Arachi*, vel *Apios Fuchsi* species.

Ex *Champagnole* Burgundix planta tum sicca, tum virens in horto Ill. E.C. plantanda missa anno 1590.

ASTRAGALVS QVIBVSDAM Aracho Tossiani Caroli similis.

CAP. XXII

Locus

Flor.
Radix.
Caulis.
Folia.



EDIT notabilis D. Agerius leguminosam plantam, nomine Astragali, collecti in editioribus pratis circa Bononiâ cuius flores, vario constat colore, albo quippe, luteo & leuiter rubescente. radix bulbosâ, vni cubitali, angulosa: folia duas, tres, quatuorue coniugationes habent, quæ Arachi foliis longiora sunt, de cate

ro eis valde similia, sed non in capiteolos desinentia: florum pediculi palmo minores, angulosi, in quorum extremitatibus flores plures, quales Lathyro siluestri germanico, vel luteo: iuxta principium foliorum, & pediculorum appendices acuta.

OROBVS QVORVNDAM radice bulbosâ, flore albo.

CAP. XXIII.



Raciles apromit cauliculos, erectos, firmos, angulosos, pedales, & cubitales: folia per intervalia, vni costæ inhærentia, quaterna plerumque ex aduerso sita, erecta, angusta, trium ferè vnciarum longitudinis, guttu aliquantulum acido initio, deinde amarumculo, rulis capreolis prædita, quod caules

fatis firmi, adminiculis non egeant: flores in longis nascuntur surculis spicæ intar coge sit, florum Pisi, aut Vicix formâ, leni, aut octoni, candidi coloris: deinde oblongi lobi nigricantes, prioris lobis [Astragali maioris Fuchsi] pares, semine nigro, interdum etiam maculoso, pleni, qui per maturitatem cum strepitu dehiscentes semen abiciunt: radicibus nititur quinis, aut senis, minimi digiti longitudine, crassiusculis, Asphodeli, aut Peoniae seminæ minoris, oblongis bulbis secè similibus, minoribus tamen, foris nigris, intus albis.

Est Orobus Pannonicus Clusii [cuius descriptionem proposuimus] tertius, albus primus, siue Asphodeli radice.

Inuenitur magnâ copia in pratis non procul Walterstorf / Mairpach / Medeling / & thermis Badenibus Austriæ vicinis. Obseruabam etiam in montosis ultra Danubium locis, ad cæduarum siluarum margines.

Floret cum superioribus [Galega minore vernæ, & Astragalo maiore Fuchsi] semenque perfcit lunio.

GLYCYRRHIZA.

CAP. XXIV.

Est stutex, autore Diosc. virgas habens longitudine duorum cubitorum, circa quas folia densa, Lentisco similia, pinguis, & ad tactum glutinosa. Flor est Hyacintho similis. (Sed hoc, inquit Marantha, ad colorem solum refert debet, figurâ enim Staphydis Agriæ floribus similes sunt.) Fructus magnitudine pilularum Platani: asperior

asperior, qui *siliquis* habet instar Lentis, fulvas, paruas [Matth. exempl. *πίπης μαύρας*, i.e. fulvas, longas.] Radices longæ sunt, buxi coloris [Ca. *πίπης ἰσίδης*, fuluo colore] Genianæ modò, subacribæ, dulces quæ expressæ succum reddunt *πυλῶν* *ἴσιν*. Hæc addit Lac.] Lycium.

Plinius, qui Glycyrrhizon inter spinosa foliata numerat, foliis eius aculeatam mordacitatem inesse scribit, & à quibusdam Adipson appellari, Hist. lib. 21. cap. 15. Et *rursus*: Sunt qui est Acanon Eryngio adscribant, spinosam, breuemque, ac latam herbam, spinisque latioribus. Alii Eryngem falsè eandem putauerunt esse, & Glycyrrhizam, quare subiungi eam protinus refert: Et ipsa sine dubio inter aculeatas est, foliis echinatis, [Plin. malè legit, *ἐχίνου*, pro *γίνου*, Lentisci] pinguibus, tactuque gummosis, fuscicola binum cubitorum altitudine, flore Hyacinthi, fructu pilularum Platani magnitudinis.

Nascitur plurima in Cappadocia, inquit Diosc. & Ponto. Esse præstantissimam vult Plin. in Cilicia, secundam in Ponto, radice dulci, & hanc tantum in vsu. Capi eam Vergiliarum occasu, longam, ceu Vitem, coloris buxi. Melioremque nigram & lentam, quam frigidam.

Facit succus, auctore Diosc. ad arteriæ asperitatem, quem linguæ subditum eliquare oportet. [Meum exemplar addit Matth. habet *πυλῶν* *ἴσιν* *ἰσίδης* *μαύρας*, medium autem inter caliditatem.] Conuenit & ad ardorem stomachi, & ad thoracis ac hepatis affectiones, scabietimque vesicæ, & renum affectiones, cum passo potus. Idem sitim eximit sub lingua eliquatus: & vulneribus commodè illinitur, & ad oris affectiones manducatur. Quin & decoctum radicum recentium ad eadem facit. At radix sicca in puluillum detrita pterygis vultu in spargitur. Quædam [ait Plin.] exiguo gustu famem ac sitim sedant, conferuntque vires, vt Glycyrrhizon, Hippacæ, & butyrum. Quoddam sitim, famemque sedet, Adipson idè quidam appellauerunt eam, & hydropicis dedere, ne sitirent. Idè & commanducata stomacis est, & vlcibus oris insperfa sæpè & pterygis. Sanat & vesicæ scabiem, renum dolores, condylomatata, vlcera genitalium. Dedere eam quidam potui in quantis, ʒij. pondere, & pipere, hemina aquæ. Commanducata sanguinem ex vulnere silit. Sunt qui & calculus eâ pelli tradiderunt. Glycyrrhizæ, siue dulcis radicis succus Galeno in primis vtilis est similiter, vt eius fructicis radices, dulcis, simulque leuiter adstringens. Proinde asperitates lenire potest, nec modò in arteria, verum etiam vesicæ scabra, idque temperatæ moderate. Quocirca fuerit sanè natura eius familiaris nostræ temperatæ: nam tale monstratum est esse dulce: sed cùm adstrictio quædam coniuncta sit, vniuersum eius temperamentum quantum ex caliditate & adstrictione est, tepidæ potissimum caliditatis fuerit, quam proximè accedens ad symmetricum. Potrò quoniam temperie quoque est humidum, id, quod modicè est dulce, iure sanè etiam sit congruens medicamentum est, nimirum modicè humidum, simul & humanâ naturâ frigidus. Refert Diosc. radicem siccam ad leuorem redactam, pterygiorum, seu vnguium oculorum, idoneum esse illitu temedium.

GLYCYRRHIZÆ DIOSCORIDIS

ECHINATA NON REPENS.

VT minoris nota, ita minoris hodiè vsus Dioscoridis Glycyrrhizæ, cui, non vt vul- Tom. II.



gata, radi- Resid., ces tenues, citacumquaque, repentes, sed crasse, latè, re- claque depa- cta, simplices, brachi longi- tudine ac cras- sitie, buxi sin- quit Dod.] lu- teiue intus co- Colori, loris, foris ra- rd æternis, sed tamen quan- doque nigri- cans, minori- verò dulcedi- nis gratia, (Dod. ait dul- ci sapore cum Saporis, austereitate

quadam) stolones autem plures, virgulæ, hominis proceritatem subinde assequuntur: folia Lentisci, maiora acuminata, coniugatum rachi al- ligantur, viroris saturati & tactu non nihil glutinosa: flores è florum alis exeunt parui, cærulei: sequuntur fructus ex pluribus oblongis siliquis echinatis glomerati, ad inum coherentibus, quorum singulis singula insunt.

Summitatem Glycyrrhizæ echinata appingit Matth. vulgari Glycyrrhizæ repenti. In Epist. ani- ni 1571. peremerit descriptionem Dioscoridis. Qua de re consules caput proximè sequens.

C. Bauh. apud Matth. Glycyrrhiza echinata siliquis. Dulcis radix Matthioli in compendio. Glycyrrhiza Matth. in mag. figuris. Et hæc Fra- ter, cui non concedo Matthiolum hanc intellexisse pro Glycyrrhizæ. Et hoc satis demonstrat radix in eius icone, præterea ipsemet fatetur pri- mum pilulas: adde illum scribere suam frugifera copiosè in Germania provenire in Bambergico agro, quis autem nescit Glycyrrhizam vul- garem radice repente, ibi crescere, & non echin- atam, vt vult. C. Bauh. Nec est eaigitur quo- que, quæ à Cæsalp. traditur.

Nunquam potui, inquit Lacuna, in Italia, nec alibi videre fructum nostræ Glycyrrhizæ ordi- natæ, donec mihi Dodonæus demonstrauit ramulum collectum Antuerpiæ in horto Guillielmi Andrea: omnia exemplaria Diosc. sunt corru- pta, legendum in siliquis provenire grana similia Lentiscæ. Fieri tamen potest, vt reperiat aliud Glycyrrhizæ genus cum siliquis similibus Lenticulis, quod nobis describit Dioscorides, à me non visum, nec etiam ab vllò alio, quod intellexerim. Apud Lacunam in margine, quidam notat, Glycyrrhizam cum fructu spinoso non producere radicem longam, vt cætera. Propo- nit autem Lacuna ineptam figuram, ramuli si- quidem non bene expriment Glycyrrhizam echinatum. Nec nouit discerni inter hanc & fe- quentem.

Nunc Glycyrrhizam Italicam ad descriptio- nem Dioscoridis melius accedentem à Con- denbergio aridam cum fructu echinato missam accepi.

Dod. gall. Glycyrrhiza vera, Glycyrrhiza Diosc. Et Hist. in fol Glycyrriza vera Diosc. officinis & vulgò incognita.

Glycyrrhiza echinata (aiunt Lob. & Pena) siquæ est stentis, vt Matth. sibi re verà certis esse audi-

Colori

Saporis

Stolones

Folia

Flores

Fructus

Semina

Matth. nos

Glycyrrhiza echinata siliquis

C. Bauh. not.

Diosc. restituitur.

Icon Lacu- na inepta.

Glycyrrhiza incognita

Matth. re- prebi

tionem postremis commentariis prodiit, tres forent Glycyrrhizae species: nobis quot notæ, tot frugiferæ: Ac primum Dioscoridis dulcis radix, cuius vsus officinis rarior. Dedit Valer. Dourez Glycyrrhizam spinosam Anthiochenam, sed nihil nisi siliquas vidimus. Et Obs. Glycyrrhiza echinata Dioscorid. Scythicæ & Callisichur. Germ. Süßholz/ Süßwurtzel. Ang. Licorea. Gall. Raigalisse, & Raiglice. Hisp. Regalicia & Regaliza. Ital. Regalizia, quæ nomina vulgaria quàm hene huic Glycyrrhizæ tribuantur iudicent Lectores.

Glycyrrhiza
echinata.

Lebannar.

Antiochena, quam à Valerando acceperunt, non est mihi diuersa ab echinata, qualem facit Compil. Tabern. dicens: Glycyrrhiza echinata Diosc. Süßholz.

Lob. meminit etiam alterius, quam non inat spinosam Anthiochenam. Glycyrrhizam echinatam Diosc. Anglicè hedgehogge licorice nominat. Glycyrrhizam veram Dioscoridis Schvvenckfeldius.

Locus &
tempus.

Semina & siliquas sæpiùs habui, seminãuque, sed non prouenit, præterquam semel Montbelgardi vbi tertio anno echinos produxit: semen autem maturum factum Octobri: excreuere magni caules bicubitales: radix crassa, magna. Planta hæc, (teste Lob.) in hortis Germaniæ, & Belgicæ, tantùm voluptatis causâ colitur, lo ngèq; vulgarè dulcedine, & gratiã vincitur. Flores, inquit Dod. Æstate, Autumno pilule cum siliquis perficiuntur. Vere herba regerminat, nouosque caules producit. Hieme siquidem cum caulibus folia intermoriuntur, radice interim viuace.

SCYTHICE RADIX VERTENS.

CAP. XXV.

Scythices natura haud ita cognita hodie, quemadmodum aliarum radicum dulcium. Imò cum raris in terris etiam olim propagaretur, haud mitum si pauca ab Autoribus tradita hisce etiam temporibus extent.

Scythica
Theoph.
Locus.

De hac autem ita scribit Theop. Dulcis autem etiam Scythica [*Συθική*] & quidam eam *δουρορκεν* vocant, nascitur apud Maiotim. Vtilis ad anhelitus [*ἀσθμα*] tussim siccam, atque in totum ad thomacis affectus, & ad vbera in melle. Potest & sitim fedare, si quis in ore reneat. Quæ de causâ tum eâ, & Hyppace Scythas vnde decim & duodecim dies durare credunt.

Scythica,
Plinio.


Sed hæc paulò clariùs, Plinius ita tradit. Inueniunt herbas & vniuersæ Gentes. Scythia primum eam, quæ Scythice vocatur circa ærotiã [Mæotidem Corn.] nascens, prædulcis. Aliam [prædulcem aliàs Corn.] vtilissimã [vtilissimamque] ad ea, quæ spasmata [asthmata] vocant. Magna & ea cõmẽdatio, quod in ore eam habentes, famem, sitimque nõ sentiunt. Idem præstat apud eisdem Hippice [Hyppace Corn.] dicta, quod in equis quoque eundem effectum habeat. Traduntque his duabus herbis Scythas in duodenos dies durare in fame, & siti.

Hyppace
Equestris.

Cæterùm, Hippacem apud Theophrastum, Gaza Equestrum vertit, quasi radix esset dulci radici par, ad abigendam sitim famemque: Sed casum equinum, inquit Gesnerus, non radicem, aut herbam esse, Dioscoridis Pliniique testimonio constat. Herimolauus vnã literã discernit, sic vt Hippice herbam, Hyppace casum designet. Et

Hyppace apud Theoph. legitur. Quare non probatur Gaza, qui Equestrum transtulit. Sed in hoc etiam errauit Gaza, quod sitim tolerare vertit, vbi græcè simpliciter *δουρορκεν* [vitam agere] legitur: vt intelligamus Hippacem cibi loco, Glycyrrhizã verè sitis remedium esse. Apparet etiam Plinium errasse, qui vtriq; Hyppacæ & Glycyrrhizæ, vtrumque seorsim attribuit remedium.

GLYCYRRHIZA RADICE REPENTE, VULGARIS, GERMANICA.



Armentosa Radix. Radices longè latèque, implexu vago reptant, colore buxæ, foris nigricantes, sapore melleo cui sipes multum dulcedine cedit, subhirsutus, nonnihil purpurascens: folia in alam Fraxini instar disposita, quorum singularia minuta, per ambitum integra, atrouerentia, modicè viscosa, dum adhuc tenera: fa-

pore acerbis, & subacido, Trago autore, Dictamno vulgari aut Ciceri sunt similia: flores racemosi, purpurantes, Dod. dilutè cœulei, singularibus trifolii bituminosi floribus persimiles: hos excipiunt siliquæ glabræ, in quibus semina parua.

Dulcis radix, huc Glycyrrhiza, autore Cordo, eadem est cum Scythica. Errauit Plinius, quod dicit sine dubio inter aculeatas esse Glycyrrhizã, foliisque eam echinatis [aculeatis] describit. Decepit Plinium duorum istorum vocabulorum similitudo *γύρα* & *γύρα*. Nam facilis est ex vno in alterum lapsus.

Γυρρίτζα, inquit Tragus, Latini radicem dulcem: nostri Liquiritiam, & Glicoricam vocant, Serapio autem *Sus* nminat. Dioscorides ei varia attribuit nomina. Theoph. Scythicam appellat. De hac radice dulci legatur gal. & Auic. & Constant. Mirari satis non possum cur aculeatis plantis glycyrrhiza à Plinio annumerata fuerit, & echinatis foliis descripta. Hinc necesse est, vt dicamus Plinium folia glycyrrhizæ nequaquam vidisse, aut asperas illas, quas diximus, siliquas intellexisse.

Sed miratur Tragus Plinium, qui ipse interim haud mirandus solidum, sed potius omninò reiciendus. Pingit enim siliquas hirsutas, ac asperas tradit, quod ego non obseruaui, quasque ab eo vifas non credo: sed in Diosc. duntaxat legisse, & iconi suæ falsò appinxisse. Nec præterea assentior Glycyrrhizam Pabergenensis agri esse eandem cum Diosc. Glycyrrhiza, de qua antè egimus, cui siliquæ glabræ, non verò hirsutæ, vel aculeatæ, quas pingit, id quod etiam testantur Dodonæus.

Fuchs, qui Scythicam Theoph. quoque statuit & *δουρορκεν* à quibusdam vocitari tradit, non describit, sed malè descriptionem Diosc. huic attribuit

but, quia plantæ, quam iconem proponit, non conuenit.

Sed quid de hac Matth. intelligamus. Dulcis radix, ait, quam Græci Glycyrrhizam, & Officinæ græcum nomen corruptipentes, vel potius Barbaros secutæ, *Liquiritiam* vocant, & Hetrufci vulgò *Regolitia*, planta est paucis non cognita. Sed non possum non valde admirari Plinium, quòd Glycyrrhizam inter aculeatas numerarit plantas. Sine controuersia dici potest Plinium Glycyrrhizam minime nouisse: Cuius erroris causa illud faciliè esse potuit, quòd sui potius Græci codicis fidem secutus fuerit, quam rei veritatem, in quo fortasè facili, lubrico que Librario- rum non aduertentium lapsu *εχίνου* pro *σχινο* scriptum legebatur: vel quòd græcæ lingue non exactè peritus, vocabulorum, uocum: que similitudine deceptus in hoc errauerit. Hac huiusmodi opinio adeò firmiter veritati coheret, vt faciliè in quoque, deprehendi possint à veritate deficere, qui credunt Glycyrrhizam olim spinis fuisse præditam, sed mangonio longi cultus edomito rigore spinarum aculeos amisisse, & tandem mitigatam esse: cui enim etiam, que hoc auro spontè per se nascitur, nullibi aculeata spectetur. Hac ille, cuius icon non representat Glycyrrhizam Diosc. ea enim est radice Gentianæ, fructu asperiore: Matthioli verò, radice est reptante, siliquã glabrã. Plinius non errauit, vt ille ait, ob imperium lingue græcæ, aut latinæ, quam multò melius intelligebat ipso, cuius peritia [non dicam ignorantia] in lingua Græca, & Latina, qualis fuerit, satis nota plurimis est. *Addit adhuc in com. cum mag. ic.* Glycyrrhizam re vera duum esse generum: vnam frugiferam, alteram verò sterilem. Frugiferam [quam describit Diosc.] fructum proferte pilularum Platani magnitudine. Hanc primùm ad se misisse Io. Hesiun Medic. Norimberg. Nec antea vsquam à se videram. Et hæc eadem com. Ital. cum mag. quoque icon. ascribit, sed vtrobiq; ineptam ponit iconem, relicta meliori, confundens duas plantas: priori namque suæ iconi denit summitates, & supra pnnit fructam echinatum Glycyrrhizæ Dioscoridæ. *Falsò etiam* scribit eam, quæ pilulas fert, non longè à Norimberga prouenire: faciliè crediderim ei missas pilulas Norimberga ex horto aliquo, in quo culta fuerit particulam. Frustra tandem aliquam Glycyrrhizam sterilem dicit. *Vtimum* falsam habet eandem figuram, iconum p. 31. ex duabus plantis compositam. Dioscoridis etiam descriptioni præter veritatem addit radices samentosas, quod postea figmentum penes confusam descriptionem in Hist. germ. repetit.

An Anguill. de hac agit, quando scribit: Glycyrrhizam, quam descripsit Diosc. (non) habemus in Italia, verùm inuenitur versus Thraciam que flores edit glomeratos, spheræ instar, quibus superueniunt siliquæ spinosæ: radix nostrati similis omnino. Sed intelligere velim Anguillam, si pet Italianam, eandem, quam nos, intelligit, falleretur: enim in radice, quæ differt ab ea quæ spinosas fert siliquas, quæ non reperit.

Glycyrrhiza læuis à Lacunã vocatur, Castill. *Regaliza*, aut *Orosifz.* Catal. *Regaliza*, Port. *Regoliz*: cui non bene perfectum fuit discrimen inter Glycyrrhizam vulgatam, quam pingit pro læui, & echinatam, de qua scriptum, Dulcis radix communis, Glycyn hiza.

Glycyrrhiza communis, aut Glycyn hiza germanica Dod. gall. Edem in fol. Glycyrrhizæ vulgaris. Hanc etiam esse, inquit idem, palam est Tom. II.

Officinæ corrupta voce *Liquiritiam* vocant. Theoph. *σχυρικήν ρίζαν*, & vt ait, nonnulli *εχίνου* vocant. Plin. Scythicam herbam. Et verè *εχίνου* hæc siue multum dulcis, hæc dici potest; est enim omnino dulcissima, & quam altera Glycyrrhiza dulcior. Scythicæ, à Scythiæ regione, in qua gignitur, nominatur. Potest & hæc *αδύνη* contra aspirationem & *αδύνη* propriissimè nuncupari: ex quo siquidem gustu famem & sitim præcipuè sedat.

Lobel. & Penæ Glycyrrhiza siliquosa, communis, quæ dulcedine echinatam viuicit.

Glycyrrhiza, quæ vulgò corruptè *Liquiritia*, suffrutex est (autore Cæsalp.) cuius radices sunt prælongæ, digiti crassitudine, laementosæ, intus flauescentes, serpunt in terra, virgas ferentes multas, bicubitales, lignosas, annuas tamen: siliquæ breues. Dioscorides fruticulum inquit esse. Theoph. Scythicam vocat. Plinius folia tribuit ei echinata, pro Schino [Lentisco] Echinum legens. Quæ Glycyrrhiza Cæsalpini non ea, quæ echinata, vt voluit Casp. Bauhinus.

Proponit Tabern. confusam & figuram, & Tabern. dicit descriptionem, dicit enim siliquas asperas.

Sic & Gerardi figura non bona, potissimum quoque si spectes siliquas, quæ vix diuersæ pinguntur à Dioscoridæ Glycyrrhiza: siliquis figmentum ex Tab.

Schvv. in cat. Sil. Glycyrrhizam vulgatam, & radicem dulcem Francicam vocat, *Lactifritz* Silesis, *Gemein* Susholtz.

C. Bauh. apud Math. Glycyrrhizam alteram siliquosam appellat, quæ quibusdam malè iteitis censetur.

Glycyrrhiza radice repente, vulgatis, germanicæ, à nobis dicitur, Germ. *Susholts* / & *Sußwurz*, Belg. *Suythoÿt* & *Calcestr*: aut *Calcehichoit*. Gall. *Riglice*, *Rigolisse*, & *Regolisse*. Ital. *Regolitia*. Hispanis verò *Regaliza*, & *Regalitia*, Gerard. *Hed gchogge Licorice*. Anpl. *Licorea*: Boh. *Leforic* / Polon. *Lafrycia*. Hung. *edos gyoker*.

Glycyrrhiza [inquit Fuch.] multæ, nec ignaua [frugifera Matth.] aliquot Germanicæ nostræ locis, Bâbergenis præsertim agro, producit. Et hodie nusquam ferè non feritur in hortis: his, quæ semel comprehendunt, tam pertinaci fertilitate coheret, vt vix vnquam possit radicibus extirpari, tam restibili sæcunditate regerminat. Audio & Fullaci in Catinthia prouenire: & illic etiam in Franconia Bambergæ, in agris coli: tertio, aut quarto anno effodi, hoc modo: sulcus longus, nempe per totum agrum ducitur, duos ferè pedes latus: profundus tres, aut quatuor dodrantes: sic maiores radices eximunt, reliquunt minores. Iulio mense, teste Trago, appetente, stoculi prodeunt. Tam folia, quam caules Hieme quotannis pereunt, quo fit, vt quotannis radice omnia hæc nouo pullulacere necesse habeant. De dulci radice Germania gloriari potest, in primis verò Bâbergenis ager, qui vnicus totius Germaniæ satis Glycyrrhizæ suppeditare potest. Abundat hæc (autore Matth.) Apulia, præsertim Gargand monte, vnde quotannis succus in passillos condensatus ad nos conuehitur, & radicem, quàm plurimum. Vistur etiamnum in viridariis, pluribus locis in Italia, non modò ad spectaculum facta, sed ad medicamentorum vsum. Pleiadibus occiduis [inquit in Hist. germ.] radix colligitur. Nascitur & in nostro hortulo [ait Gesn. horu] in quò duobus, aut tribus annis absque flore, & fructu caulem edidit tricubitalem ferè, quarto primùm

Scythicæ vocat. de. Alimus. Adipura.

Glycyrrh. siliquosa.

Plin. error.

C. Bauh. nor.

Tabern. dicit. plex.

Gerard. r. præb.

Synonyma linguarum.

Locus.

Satur.

Collectib.

Tempus.

Plurimum radice plantatur

anno flosculos, & siliquas ostendit. Hæc cum scuberem ad cubitos quatuor excreuerat, decem, aut pluribus (aliquot enim releueram) ab vna radice caulibus sub finem Iunii mensis: neque dum tamen flores ostendebat. Prouenit autem plurimum plantata radice. Folia tactu glutinosa sunt, & leuiter subolent nescio quid aromatici Calami ferè, sub noctem præsertim: quo tempore folia omnia demittuntur, interdiu verò surguntur. Idem de coll. stitp. inquit, floret Iulio, & semen fert Septembri. Communis, nullis non nota, pergit Lobel. quæ ex Hispaniis Londinum, Antuerpiam & Lugdunum defertur, & vili vbique locorum distribuitur, non paucis Galliarum Narbonensis locis multum spontè oritur, etiam prope *Latesa* oppidum. Iunio, & Iulio siliquas fert. Schuuenkfeldio Augusto & Septembri floret. Habebam ego Montbelgardi in horto Ill. C. Wirt. allatam Stutgardia, & Lugduni ex fasciculis Francofurti missis. His ita hæcenus dicta, addit Dodonæus: Frequens est in Hispania, & Belgarum horti hac non deficiuntur. Rarius autem in Germania ac Belgio floret, ideoque etiam sterilis à nonnullis, sed temerè, credita: cum tamen floret, sub finem Æstatis floret.

Vires & Ylva.

Viribus antea ex Theoph. & Plinio sub titulo Scythice enarratis, adiungamus eas, quas Tragus Matth. & Dodonæus in præfenti testantur. Quare præstantissima hæc, nobilissimaque planta secundum commentariorum suorum librum, Tragus concludit, dicens: Non solum radix hæc vna cum succo extracto magni faciendæ, verum etiam suo modo vtilior, commodior, & salubrior ipso Saccharo esse mihi videtur, ita quidem si altero ex his catendum mihi foret, Saccharo sanè, quam Glycyrrhizæ carere mallet. Pro illo namque mel vstipare possem, quemadmodum & Veteres non Saccharo, sed melle prætereaque medicamenra temperasse legitur. Saccharum equidem, sicut & alia aromata, ad officinas & diuitum culinas spectare potius videtur, qui verò tenuiores sunt fortunæ, melle, & dulci radice contenti erunt, & plus commoditatis inde, quam ex Saccharo & aromatibus percipient. Nemo enim ignorat amara, & Saccharum stim excitare, quam dulcis radix & succus eius restinguunt. Dolendum est autè tam præpostero nos præditos esse iudicio, vt noxia expetamus, salutaria respuentes: id quod in ægris, præsertim verò febricitantibus comperimus, quibus confectionibus Saccharo aliisque aromatibus permixtis, sanitas non confertur, sed auferitur, sitisque non adimitur, sed additur, quæ tamen aliis & commodioribus medicamentis restinguenda erat. Sed vt ad Glycyrrhizæ vires propius accedamus, Matthiolum inspicimus, & Dodonæum. Cæterum autem quandoquidem hæc radix dulcis est, temperatè quoque calida & humidata est. Cortex eius amaritudinem quandam tamen habet, & calidioris est qualitatis particeps, sed hunc abradere oportet: Huic autem magis recens, & succo plena radix, quam arida. Vtilis est ad rauedines, tussis, difficilem respirationem, perineumoniam, pleuriticam, sanguinisque ac puris sputationem, phthisim, & ad omnes thoracis morbos, exasperata lenit, inflammationes sedat, acrimoniam, & falsilaginem humorum mitigat, temperatque: crudiores humores concoquit, & spui exitum facilitatem promouet: vlcera expurgat in eclegmate, vel alio quouis modo sumpta: aut aliquandiu mansa, succo sub lingua detento. De-

Temperamentum & Virtus.

Unguentum

colum eius renibus ac vesicæ exulceratis confert: vrinæ stilliticio medetur, acin vniuersum omnibus malis occurrat, ab acris, falsis, & mordacibus humoribus excitatis. In quibusdam monasteriis Hollandiæ (addit Hist. gall.) ex succo Liquiritiæ & aliis aromatibus paruos panes efformant, qui tussi prolixi frigide & iniusteratæ, & aliis similibus pulmonum & thoracis affectibus.

Decidua Humi salfi. Turbida

FOENVM GRÆCVM SILVEstre, siue Glycyrrhiza siluest. quibusdam.



Crassa radice nititur, cubitum, & leuicribitum longà, albo sapore dulci: ramus vimineos, per terrâ spargens, tres aut quatuor cubitos longos, atque etiam interdiu longiores, teretes, glabros, fractu contumaces: folia instar Glycyrrhizæ disponuntur, coniugationibus quatuor, quinque, aut sex, vno im-

Defec radice Sapor Rami. Defec. Folia

pari aliam claudente, quod tamen non est perpetuè, sunt ea verò, si singula seorsim contempseris, Pili siluestris foliis similia, supernè ex viridi glauca & glabra, infernè ex viridi flauescencia, ac hirsuta: sapore eo, quem radici inesse dicebamus: ex foliorum portè alis pediculis circiter palmaris enascitur, qui leguminaceos crebros flores ex flauo pallentes sustinet: siliqua non minus floribus frequentes, incuruæ, dorso sulcata, vnde si nemum auferas, ex duabus compositæ videntur, quarum singula suis membranâ dissipiuntur, semen claudentes Fœnugræci, minus, lucidum, cui sinus insculptus.

Color Saporum & Virtus. Semen

Fœnugræcum siluestre Tragus nominat, Lotumque syluestrem, à Diosc. descriptum, quam & Trifolium minus, & Lybicam vocet, perpetuam esse iudicat.

Synon.

In partu simili modo Lonicerus, qui Lotum trifolium, aut Lotum campestre appellat. Ger. Steinwicken/ aut wild fœnugræc/ & wild bockeforn.

Dodonæo est Fœnugræcum silu. Tragi, & Recentiorum, & hæc in Hist. frum. In sol. autem Fœnugræcum silu. 1. Belg. Wildt fœnugræc/ Germ. Wildbockeforn.

Lobel. & Penz. Adu. & Ic. Pl. Glauz vulgatis, Obl. insuper Fœnugræcum silu. Tragi Angl. Scæ Trifoly.

Gesn. Glycyrrizam silu. eam herbam putat: quam Dod. Iconum suarum lib. 2. p. 36. pro Hedyfato pinxerit. Quod an verum sit videndum. in hist. gall. id non facit.

Glauz. garin. Glycer.

Cordo, cui Polygonon dicitur, Gesn. addit figuram ex Tragi lib. 2. cap. 5. vbi etiam annotatum, Polygonon, Cordi quidam non rectè Hedyfarum

dysarum, neque melius alii Fœnugræcum silu. nominant. Glycyrrhiza siluestris.

Clusius, à quo Glauz vulgaris, & Glycyrrhiza silv. Gesneri dicitur, scribebat olim apud Acoftam, Herbam mirafam multis notis conuenire cum Polygalo Cordi, cuius folia noctu interdum contrahantur, ac spinis careat caulis, nisi pro spinis sumere libeat, tenues illas & mucronatas appendices sedi foliorum alatorum inhærentes. Hanc tamen opinionem lib. Exotic. Cluf. omisit. Vocatur Hungaricè Penz leuculeu/ edôa siu, h.e. Numularis dulcis herba.

Habeo à me satum Montbelg. in horto Ill. E. C. Fœnugræcum silu. Tragi, folio Glycyrrhizæ. Multis hoc odiosû est, ramis nimirum se nimium spargentibus. Genææ proueniens obseruauit prope collè *La Bassie* mense Martio, & florens Junio. Lugduni abundat, vbi Dalechampius Glycyrrhizam silu. vocabat, quod nomen non displicet, dulcis enim est herba. Basileæ vidi extra portam Lapideam inter spinas. Item eundo Bernam inter *Morat* & *Morges* mense Iulio prægnans semine. Inter Basileam & Leurach cum suis siliquis instar cornu effigiatis, multis simul mensis Augusti principio. Item iuxta Castellum Bedfordiense semine maturo Augusto. Inuenitur à Clusio in siluis, pratorum marginibus, vmbrosis, atque etiam in pratis apertis.

FOENUGRÆCO SILVESTRI
Tragi in quibusdam accedens
planta.



Palmari est altitudine, caulibus donata teretibus, hirsutis, stictatis, crassiusculis: folia Tribuli terrestris paria, perquam hirsuta, conuolutim costæ, duum vnciatum, ex caulibus geniculis orta, adhærent: indidemque flores copiosi dimidiati venticillum efficietes, parui, palliduli, quorum vnicuique succedit siliqua hir-

suta, in acumen desinens, in duas partes lindi facilis, quarum vnaquæque suis vndique membranis conuoluta, semen continet copiosum, Fœnugræci satiu, minus: radix duum vnciarum, simplex, gracilis.

Hæc planta in multis accedit Stellæ leguminosæ, de qua postea.

Circa Monspelium ad Episcopi Monsp. Castellum, lapide circiter vno ab vrbe distans, in loco arido, vix vnam, aut alteram obseruauit, atque collegit Gener I.H. Cherlerus.

HERBA MIMOSA.
CAP. XXVII.

Inter ea, quæ anno 1809. Gener Cherlerus ex Angliæ reportabat, erat *Herba mimosa*, de qua Tom. II.

hæcille. Herba, semen, & ramulus Herba mimosa, per D. Cargillum missa, cui tradiderat D. Ga-
retus, qui acceperat à Comite Comberlandio, *Locus,*

Icon Ac. silv.



qui collegerat in insula, quæ cepit in America, quæ vocatur S. Ioan. de Porte Rico. Sunt autem eius ramuli tenues in partes diuisi, in quibus creberrimæ & tenuissimæ, veluti spinulæ, non tamen pungentes, ad Mûlicæ ramulos accedunt: ipsi verò ramuli sunt conglomerati, abundantes seminibus, quæ adhære videntur illis veluti

Delct. ramulorû.

Semen.

spinulis, ea aliquid cum Lente simile habent, verum minora, & minus orbiculata, in acumen desinentia, compressa nonnihil, & in medio parumper tumescientia, dentibus attritu facilis. Constant membranâ tenui, fuscâ, & minimo nucleo internè albo: saporem nullum animaduertimus:

Iconem Acoftæ dudum sculpendam curaueramus, anno scilicet 1506. sed quia veriorem Clusii, quæ cum nostro ramulo, semine, & herba congruit, agnosimus: eam parandam censuimus. Dicitur autem Acoftæ in lib. Arom. Italicè edito, *Herba Melle*, *Herba Delicata*, & in versione Clusii *Herba mimosa*, vbi sequentia de ea leguntur. Inuenitur in quibusdam [Africa] hortis, planta quinque palmorum longitudinis, vicinis arbutillis, aut partibus incumbens, tenui caule, eleganti viriditate prædita, nec admodum rotundo, per interualla exiguis, & pungentibus spinis, foliis superioribus hand abimilibus, Filicis faminae foliis minoribus. Gaudet humidis & petrosis: manu-
Icones.

que admota senescit & marcescit, remotâ verò pristinam viriditatem recipit, sed non celeriter ideoque *Herb. vna*, & *Mimosa* dicitur. Naturam habet plurimum ab arbore tristi differentem: nam singulis noctibus Sole occidente senescit & siccat quodammodo, sic vt contabuisse videatur: oriente verò Sole vigorem denud recipit: quantoque Sol magis feruet, eò magis viret, totoque die folia ad Solem conuertit. Odore & sapore est Glycyrrhizæ: vulgoque ab indigenis folia manduntur aduersus tussim, ad pectus repurgandum, & vocem clariorem efficiendam: renum etiam doloribus vtilis esse censetur, & recentia vnlhera glutinare.

His Clusius (qui olim apud Acoftam hanc multis notis cum Fœnugræco silu. Tragi conuenire dixit, & nunc in Exot. hanc suam opinionem omittit) addit: Multarum (presertim in leguminû genere) folia, noctu se contrahere, & comprimere solent. Herbae porrò Mimosæ appellatione ad me mittebatur sicca planta à lac. careto extremo Octobri, anni 1599. quam ab Ill. Comite de Comberland ex Insula D. Ioannis à portu diuitem nancupata, reduce, si cili cum terra impo-

Icones.

Herba Melle. Herb. Delicata. Loc. Desct. Pæon. Canalis.

Locis.

Mimosa quare dicitur. Natura.

Odor, & Sapor. Vires. Tussis. Renum dolores. Vnlhera. Faug. cum silu.

sitam recepisse scribebat, conseruare tamen non potuisse. Huius verò iconem, quàm commodè fieri potuit, ex illa sicca exprimi curabam, vt eius historię ex sicca etiam planta concinnata, addi posset.

Descript.

Radix.

Cauleculi.

Frax.

Ramuli.

Capitula.



Constat autem ea planta, quæ prostrata sicca, & foliorum expers, singulari radice, non crassa quidem illa, sed dura & lignosa, rarisque fibris prædita, à quaterni, aut quaterni cauleculi exhibent breues, qui statim in aliquot tenues virgas, & humi procumbentes in ambitu se spangebant, ad singulos nodos, frequentes, longas, tenuesque fibras agentes, instar ramorum Periclymeni vulgaris, qui per terram diffunduntur: erant verò cubitalis longitudinis illæ virgæ, interdum ampliores, teretes, lentæ, quibusdam spinulis latiusculâ basi eas insidentibus præditæ, quemadmodum in Rubi ramis videre licet, minoribus tamen, rarioribus, minusque firmis: ex rursus in alios graciliores ramos diuidebantur, frequentioribus spinulis obfitos, quorum nodis inter binas appendiculas alternis exoriebantur tenerissimi ramuli suis foliolis obfiti, quæ numerosa serie quâdam, & pari vtrinque numero, in ala nata erant, nullo singulari aliam finiente, tenella admodum, & virentia, non dissimilia Acaciæ foliolis, quæ (dum primum prodibant, tenui, incanaque lanugine pubescebant, vt ex ramis suis paruulis ramulis, & foliolis onusto, quæ ad dederat, deprehendere poteram, quique fibras aliquot adnatas etiam retinebat. Adiunxerat & bina capitella, quæ, in ea planta nata, ab Illustri supra dicto Comite accepisse scribebat, cum aliquot ramis sua folia adhuc retinentibus. Constabant ea capitella à multis, tenuibus, angustisque & spinosis veluti foliolis, inter quæ latebant semina orbicularia, plana, nigra, in medio nonnihil tumentia. Flores à me conspecti non fuerunt, & haud scio, an allati fuerint. Vtrum porro huius plantæ virentis, & adhuc in terra hærentis, folia, manu admotâ, marcescant, vt scribit Acolta, eiusque rei causâ nomen fuerit inditum, ii referre possent, qui plantam virentem & crescentem viderunt, atque æritam capsæ impofuerunt.

ASTRAGALVS VETERIBVS.

C A P. XXVI.

Descript. Diosc.

Astragalus [ἀσραγάλος] inquit Diosc. est parvus à terra frutex [βαμύριον] solis & ramulis similis [ἐστὶν ὅμοιος] Ciceri: flores sunt purpurei, patui: radix subest rotunda, velut magnus

Raphanus [ῥαβδάνος] Lob. & Pena Adv. Colum. [ῥαβδάνος] propagines habens solidas, nigras, duras, velut cornia inter se implicatas, gustu adstringentes.

Variat nonnihil à Diosc. lectione Plinius, breuiter ita scribens: Astragalus folia habet longa, incisuris multis obliquis [Columnæ incisuris multis superfluum videtur, & legendum obliquis] circa radicem caules tres, aut quatuor foliorum plenos, florem Hyacinthi, radices villosas, implicatas, rubras, præduras.

Gal. lib. 1. c. 1. secund. loc. medicamentum ad caluescentes habet, quod recipit Iridis Astragalitidis, siue, vt alii, Illyricæ sextantem. In quem locum ego (inquit Corn.) in com. med. annotauit, videri mihi Iridem Astragalitidem eandem esse cum Astragalo simpliciter appellato, eod quod huius radicem soliditas, & vires, Iridis Illyricæ soliditatem, ac vires respondeant, ad vetera vlcera explenda, ac repurganda. In ea senentia adhuc sum & habet Iridem Astragalitidem etiam Aëtius libro tert. cap. tert. Potest itaque Astragalus, Iridis appellari, & additione Astragalitidis declarari. Astragali appellatio talum significat, quod radicis figurâ, & soliditate talum resert. Nostris putatur ea esse, quam Erdmören vocant. Sed sædi erroris in simulare licet Cornarium, qui, vt aliquid noui, & minimè vulgaris in lucem eaderet, sibi persuaserit, ne dicam lembus idearum forams inxerit, Astragalum, & Iridem Astragaloidem, eandem esse plantas. An præterea per Erdmören intelligat Chamæbalanum quorundam, considerandum. si eam intelligit, radix non est similis magno Raphano, vt is in Diosc. legit.

Conuenientius adhuc nomen, & Etymon, quàm Cornarius, Columna tradit. Seminum, infic, forma [ἀσραγάλος] plantæ huic nomen indidit Astragalus: ἀσραγάλος quidem talum, & talorum significat, quorum formam & vltim huius plantæ semina referunt: tereti formâ quidem sunt in superna, infernaque parte plana, vel acetabulorum more concava: possent etiam ita appellari à ruberosa, carnosane forma radicis compressâ, & melius à multitudine fibrarum nodosarum ad similitudinem flagelli, vnde ἀσραγάλος ἄσραγος à Pollice dicitur. Diosc. plantæ habitum similem Ciceri fecit, non folia Ciceri similia: florem Hyacinthi, coloseum intellige.

Ceterum Astragalum volunt aliqui, vt Turnerus, quem antè, hoc libro 17. tradidimus, titulo Chamæbalani leguminosa, hanc fortè etiam intelligit per Erdmören antè dictam Cornarius. Necdum constat, quæ planta sit Astragalus Matthioli, nisi sit Hedysarum clypeatum per pictorem accommodatum descriptioni Dioscoridis. Adhuc Astragalitidè Iridem galeni & Aëtii non existimamus esse eandem cum Astragalo, & Erdmören/ vt putauit Cornarius.

Astragalus maior dicitur à Fuchio. Astragaloides autem, & Astragalus filu. Thalia & alus. Non desunt præterea, qui Astragaloidem recte caulem, hirsutum vocitant. Alii verò Astragaloides Ciceri Ponz, Onobrychin quorundam purpureo flore. Alii Astragalum Monspelicam. Quidam Astragalum quendam montanum Astragalum monrano candidiorem. Nonnulli Astragalum Syriacum appellant. An Astragalus fortè lanuginosus Baticus. Astragalus Dioscoridis quibusdam. Habetur & Astragalus siluaticus vernus à quibusdam, & gallega nemorensis vernus, de qua pauillè post.

Credetur tandem Astragalus Columnæ, gallega nemorensis

Plinius. Folia.

Flos. Radix.

Ira. Astragalus.

Corn. gustur.

Astragalus maior.

Chamæbalanus. Iridis. Hedysarum clypeatum.

Astragalus ciceri.

Onobrychin.

Astragalus montanum.

Astragalus syriacum.

Astragalus baticus.

Astragalus siluaticus.

Astragalus nemorensis.

nemorensi valde similis, si non idem.

Nascitur (teste Diosc.) locis vento expositis, umbrosis, & niuosis. Multa in Memphide Arcadia. Aft contra [autore Plinio] legitur, in Phoenice Arcadia in petrosis, apricis, & iidem niuilibus. Ita etiam Paulus habet Galenum secutus. Quum itaque hi omnes *ey quare* legant, inquit Corn. etiam in Dioscoride rectam lectionem esse, *ey quare* apparet: & non *ey quare*, velut quædã exemplaria habent: maximè cum nulla sit Arcadie Memphis,

Colligitur exitu autumni, quum folia amiserit, siccat in umbra.


Radix, vt Diosc. tradit, in vino pota aluum fluidum sistit, & vrinas mouet. Facit & ad vlcera vetera, arida inspecta. Sanguinem quoque cohibet. Tunditur autem difficulter ob suam soliditatem. His addit Plinius: Vis ei ad spissanda corpora. Vrinam mouet repetitillo liquore, sicut pleraque quæ aluum sistunt. Sanat & dysenterico in vino rubro tusa. Eadem ginginarum supurationi vtilissima est foru. Galenus fruticem huic paruum, radices habet adstringentes asferit, proindeque ex iis esse, quæ non ingenerosè siccant.

ASTRAGALVS ROMANVS, SIVE
Hedysarum clypeatum siliquã asperã.

Ramis est cubitalibus, bicubitalibus, & tricubitalibus concauis, procumbentibus, glabris, crassiusculis, multis ex radice statim ortis: per quos alternatim ferè nascuntur folia palmata, & ferè dodrantalia, alæ instar hærentia, quinque, aut sex coniugationibus, extremoque folio impari, constantia. folia singulatia, Glycyrrhiza foliis quodammodo similia, paullo breuiora, latioraque, & glabra, exceptis marginibus, breuibus pilis ornatis, sapore nullo manifesto, nisi tantillum adstringente: ex alarum sinu prodeunt sicuti singulares, qui in spicam digestos ferunt flores, amœnos, Genistæ, sed rubentes: è quibus siliquæ, compressæ, asperæ, ternis, aut quaternis, aut quinis seminibus orbiculatis, clypeoli effigie locatis, complures videntur.

Icones factæ sunt binæ. Prior demonstrat folia præcipuè, & flores: altera verò siliquam, & semen. Illa rursus facta est ad plantam siccam delatam à genere meo Cherletò nomine Astragali Romani quorundam, hæc autem ad Iconem Plantini, cum nostra siliqua, & semine.

Falluntur (inquit Dod.) qui Onobrychin alteram ad Securidacæ genus referre student. Falluntur & ii



Alia uon



qui Helenium esse Aegyptium Dioscoridis uolunt, quod esse nunquam potest, cum odorata non sit.

Hedysarum alterum clypeatum, & Helenium Aegyptium quorundam à Lobelio. Obs. dicitur. Hedysarum Icon. Plantini. Pona in Baldo vocat Hedysarum alterum clypeatum. Camer. hort. cognominat Securidacæ clypeatà à Lobelio,

Hedysarum clypeatum.

ac Dod. descriptam, Onobrychin 2. Dod. Nec descriptam, qui uelint Helenium esse Aegyptium, quod non conueniat, siquidem radix sit rubra. Hedysarum alterum clypeatum Lobeli, quod in horris Belgicis alatur, hist. Lugdunensi cognominatur. Helenium Aegyptium, cuiusque speciem quidam dixerunt, alii uero appositè Hedysarum censuerunt.

In hortis Belgii Dodonæo conspicitur interdum contigit. Pona uerò in horto montis Baldi. Morbegardi in horto E. C. satum aliquoties mihi prouenit, & primo quidem anno flores protulit Septembri, & Octobri, qui non maturuerunt. Argentinæ tamen apud Fridericum Meierum Septembri maturum obseruauit, qui mihi indicauit à se obseruatam, hanc plantam in pratis Senensium cupiosè prouenientem, quam equis pro pabulo exhibeant. Perit Hieme, ni reponatur. Hanc attulit Gener Cherletus collectam in via Romana Viterbam uersus. Florentiæ item in horro magni Ducis Hetruricæ.

Locus & Tempus.

Vius.

ASTRAGALVS MAT-
thioli.

SOMNIO herclè vexabatur Matthiolus, cum Astragalum quendam in agro Tridentino, in uallis Ananiensis montibus sibi prouenientem olim imaginaretur, siquidem in post. com. istius. Astragali figuram omisit quasi fictitiam. Nos enim suspicamur illi quondam aliquam plantam, nomine Astragali demonstratam, quam postea per pictorem Dioscoridis descriptioni aptarit (pictoribus enim omnia licet, vt licuit apud eura in aliis plantis) Ea uerò planta fuit fortè Hedysarum clypeatum, quibusdam dictum Astragalum, vt antè indicatum. Retractauit hinc mentis & Hist. Lugd. in vltimis suis editionibus sententiam suam de Astragalo Matthioli. Siquidem consilium fisci botanici, aut uinolenti, nec cogitatum sapientis, sed opatum quilibet audentis certò percipiebatur. Quamuis autem Astragali figuram apud Matth. C. Bauh. ex secunda commentariorum editione proposuerit, attamen ignorare se fateatur qualis sit planta, etsi non desint, qui eiusdem Pseudo-Apium esse censent.

Matth. mor.

C. Bauh.

ASRAGALVS MAIOR
Fuchito.

Descriptio.

Astragalus
maior.
Radix.
Caulis.



QVam mihi olim D. Fuchsius cum apud eum Tubingę esse Astragalum maiorem dērominavit, radice est satis longa, & crassa, dulci: caulibus rectis, cubitalibus, striatis, angulosis: foliis Viciarum modo disposita, nouem, vel vndecim: interdum vnguibus longiora, aliā multo minora, ex ro-

Flores.

Siliqua

Eryum.
Orobanch.
Descript.
Clusii.

Flores.

Astragaloides.

Locus & campus.

tundo oblonga, ad costam vnā adnexa, subcærulea, quæ exsiccata nigrescunt: flores ex pediculis longis, satis magni purpurei, ex eodem pediculo plures, formā Viciarum: quibus succedunt siliquæ longæ, teretes, admodum affines plantæ, quam paullo post describam, quibus multa inter se similia, quædam diuersa.

Commemorat hæc Clusius his verbis: Eryum siue Orobus rei herbariæ studiosis, Pannonicus purpurascens secundus, folia habet sena, octona, interdum decem vni costæ hærentia, Lenticulæ foliis haudquaquam maiora, tenella, viridiaque, gustu amicante, calidiuiculo: flores purpurascente colore, qui vetustate in cæruleum commutatur: radix in diuersa tendens. Icon apud Clus. in hist. post. quemadmodum etiam apud Lobelium, optimè exprimit plantam, quam nos descripsimus: in Pannon. errore typographi pro Orobo Pannonico secundo pag. 738. male ponitur icon Trasi.

An Lob. Obs. sicut & Ic. Pl. Astragaloides altera Herbariorum. Huius figuram habere videatur Lonici. sub nomine Feldmeisen: quæ cuius non sita, de qua in contextu loquitur. C. Bauh. frater, qui Patanio misit, et hæc nomina adscriptit, Glycyrrhiza Gesneri, Aphace Cortusio: verum vbi Gesn. ita vocari ignoro. Astragaloides simpliciter à Dod. scribitur, eiq̃ue flores ex cæruleo purpurei, minores quàm Vicie conferuntur, siliquæ verò teretes, oblongæ, nigricantes, in quibus semen Vicie minus, non rotundum, ac globosum. Nonnulli, inquit is, Eryum sili. vocant.

Inueni Genevæ mense Iunio in colle la Bastie florentem: item mense Maio. Argentoræ vidi in horto P. Frid. Meieri cum siliquis Iulio. In Belgicis hortis aliquando videre meminit Clusius, & Aphace nomine à rei herbariæ studiosis appellari. Sed multo tempore. Dod. teste, durat, Hiemis, frigorisque patiens. Ad hortos Belgii allatum, peregrinum est legumen. Innio ac etiam tenuis floret, siliquæ interea perficiuntur.

ASTRAGALOIDES, SIVE ASTRAGALVS
siluaticus. Astragalo magno Fuchsi, vel
Chamæbalano leguminosæ
affinis planta.



CHamæbalano similem voco, cui ex radicibus longis, quasi repentibus, varièque implicatis, partim tenuibus, partim tuberosis, Chamæbalani Dodon. perquam similibus, nisi è tubenbus plures capillares fibræ prodirent, externè nigris, internè albis, sapore subdulcibus, caules exsurgunt multi, pedales, angulosis, folia aliquate-

nus Chamæbalano similia, sine capreolis, glauca, & ferè nigricantia, oblonga, obtusa, neruosa, ex breuibus pediculis, quaterna vel sena, præter foliola, quæ ad pediculorum exortum sunt: flores Pisorum ruherentes, quibus succedunt siliquæ satis longæ, teretes, ex pediculo non admodum longo, in quibus semina mediocriter magna, lurca, sapore siccè Pisorum, quæ se contingunt utrinque compressi.

Ab Astragalo maiore Fuchsi differt, cui folia ex vno pediculo plura, & breuiora: differt etiam caulibus: qui breuiores. & radicibus.

Thalio in Harc. Astragalus siluaticus, apud quem Camerarius scribit, dici vulgò Christianus würg; alius Cicer montanum nuncupari, describit à Cordo sed à nullo, quod sciat, depingi.

An Ruell. Astragalus, qui à Diosc. describitur, frequensque est apud suos. Rura, inquit, nostra montanum, vel rusticum Cicer nominant: Cicerulam esse dicerent. Vulgus non nusquam siluestres Cerras [cicerulas] vocat. Astragalum itaque Ruellius agnoscere visus est, vel Cordo teste: cui cum ratione est adhibenda fides. Germ. dicitur Knollen Traut. Idem in hist. describit Astragali nomine quo in loco Gesnerus annotauit Christian würgell & Knollenwürgel ab aliquibus Cicer montanum appellari.

Mense florentem Aprilis, prouenientem verò cum siliquis obseruavi mense Octobri in monte Rossberg prope Masnunster & locis vicinis, in siluis & dumetis. Item circa fontem Admirabilem in ducatu Witt. inter vepres.

ASTRAGALVS RECTICAVLIS
hirsuta.

ANonymum quandam ramum inter siccas meas adferro, rectum, cubitalem (alioiorem fuisse sicca insinuat) rigidum ac firmum, totum pilis candidantibus ac lanuginosis oblitum, crebro sulcorum vestitu præditum. Ea costæ hærent quindecim communiter, ordine & posita vt in Galega, minora, angustiora, tota villosa, in acumen



men desinentia, sapore amaro, flores longo pediculo infident trifolii patensis, hiantes, pallidi, in glomerem congesti, ex villosis calyculis prominentes. Hæc ubi locorum nactus sim, nõ recordor. Elegans tamẽ tur, raritas, tum varietas, figuram merebatur, & nomen ali-quod.



Lobel. & Pena Aduerſar. Obſ. qui Caput gallinaceum Belgatum vocant: An Onobrychis Dioſcoridiſ? Polygala vera Dalechampi. Onobrychis Dodonæi. Dodonæo autem gallico, Onobrychis quædam, & hinc ſpecies ſecunda. Item in ſol. & de frum. Onobrychis Dioſc. Plin. & Galeni Geſnerõ de hort. Glauca, vel

Synonyma
Caput gall
Belgarum.
An Onobry-
chis?
Polygala
vera Das
le. b
Glauca.
Polygalum
Rheicum.

POLYGALON VETERI-
bus.

Cap. XXVIII.

Polygalon Dioſcoridiſ frutex [*πολύγαλον βαυβίος*] eſt paruum. Palmi altitudine: ſiſta habens Lentis foliorum ſpecie: guſtu ſubacriba [moderate auctera Galenus: Plinius autem vitramque ſpeciem generis appellatione comprehendens, guſtu adſtrictõ dixit. Habet enim, inquit Corn. *το εὐραίοις ſpecies, τὸ δὲ ῥηέον, καὶ τὸ σπυροῦν*]. S. d. herbarum periti [pergit idem Corn.] hodie & de hæc ambigunt. Quidam Pimpinella ſpeciem eſſe volunt, quam Klein Bibernel dicunt. Alii eam eſſe volunt, quam Creuſtblum, vocant. Sed quum hæc trium generum ſit, iuxta triplicem florem, Polygalon eſſe volunt eam, que album florem habet. Reliqua duo genera, & purpureum florem habens, & od exruleum ad Glauca, de qua ſuo loco agemus, referunt. Florem Polygalæ neque in Dioſc. neque in Plinio Corn. reperit, ideoque nihil pronunciat. Contendunt præterea nonnulli eſſe Geſneri Polygalon, alii verò Polygalon minus ſaxatile, quidam porro Polygalõ affine Caput gallinaceum.

Folia pota lac gignere creduntur, teſtibus Dioſc. Plinio, & Galeno. Quare in iſtis calidum & humidum prædominantur, talia enim eſſe oportet ea, quæ lac gignant.

Onobrychis Dodon. Er in append. Polygalium Rheicum. Hiſt. Lugd. Polygala multorum, quibusdam Onobrychis. Tab. ic. & Hiſt. Onobrychis, Baznenſopp / wildtheffenfrant. Cluſ. Onobrychis Dodonæi, quæ brabantis & Hanſſammekens, id eſt, Cruſta gallinacea cognominatur. Pona in Baldo nominat Polygalum Dioſc. Dalechamptio, Lobelium imitatus, Geſnerus tamen fuit primus auctor huius appellationis, quicquid ſcribat Lobelius.

Cruſta gal.
linacea.

Polygalon Geſneri diligens ſimplicium indagator Leonhardus Rauuuoſſius prope Arelatam in Pronincia menſe Maio collegit. Vidimus nos hanc florentem menſe Aprilis, in monte Apennino. Genus ab indar in pratis iuxta Arne & Noloſodichium. Polygalon in peregrinatione Rhætica Cuneæ reperi flore albo, ut eſt ebat Geſner non recordor autẽ an iſtis notis à præcedenti differat. Montbelgardi prouenit in horto ex ſemine in Britoia collecto. Cluſ. ſicut & Pona in Baldo gramineis locis, ficcionibusque pratis naſci perhibent. Sed & plerique ſuperioris Germaniæ locis exit, inquit Dodonæus. In Bohemiæ agris ſecus ſerobes, per quas pluitia delabitur aqua, Onobrychis frequens eſt, apud Brabantos & Flandros ab herbarum ſtudioſis in hortis ſubinde ſeritur. Auguſto cum flore & fructu reperitur.

Locus &
tempus.

Curiæ Rhætorum [ſic enim Pontiffella inibi narrabat] plurimi ſunt prata, in quibus hæc prouenit, multum enim ex eius eſu lactis vaccis & cæteris animalibus copiam contingere pro indubitato creditur.

Viſta.

POLYGALON GESNERI.

POLYGALVM MINVS
ſaxatile.

Multarum notarum argumentum Polygalon indigitabat Geſnerus herbam, è radice medio crater craſſa, longa, cortice obreſcã nigro, intus albã, ramos proferentem multos, palmares, vel etiam cubitales, robentes: è quibus orti pediculi ſiſta coniugati diſpoſiti ſunt: nec, Lentis inferioris magis albicantia, & pilola, ſuperius viridã magis: ſummis ramis ſpica in ſidet florum Vicia, vel Aphaces aut Lentis. ſed coloris purpurei è calyce pilolo: ſequuntur ſemina conceptacula ſubrotunda, modicè compreſſa, ſpirulis aſperata, & per ambitum gibba, criſtam ſerratam membraneam erigentia.

Tota quanta eſt, vix palmum ſuperat. Radice la candida eſt, longiuſcula, modicè pro plantulæ modulo craſſa, diuiſa in capita, paucis fibris donata. Ex qua ſiliola ſtatim emergunt coſta hærentia, repanda, capitis gallinacæ, ſed obtuſiora, latioraque, pilis candidis obſita. Coliculi graciles ſunt, conſimilibus foliis veſtiti, ſupernè diuiſi: quorum extremis ſloſculi inſident luteoli, aut palliduli hiantes, exigui, pauci, Aſtragalorum poſitu, nec in ſpicam abeuntes, vt in Polygalõ Geſneri, capitula ſequuntur exigua, rotunda, ali-quot apiculis ſupernè donata.

Deſcriptio
Radix.
Folia.
Coliculi.
Floſculi.

HISTORIAE PLANTARVM.

Locus & Tempus.



Hanc plantam attulit gener Cherlerus, colle Ram circa arcem Episcopi Montpelienfis in locis incultis, asperis & saxosis, Iunio mense.

radice mox germinant, alia per caules, trium plerumque vnciarum longitudine, foliis coniugatum dispositis constantia, duplo minoribus, quam Polygali Gesneri, acuminatis, vtrinque hirsutis, & argenteo splendore subinde micantibus: foliorum per ramos pediculi longiusculi squamulas habent appositas, rubentes.

In fabuleis & campestribus ad semitas prope montem Lupi Montpeliesi meruit gener Cherlerus. Existimo me eandem vidisse anno 1594. apud Fratrem C Bauhinum.

POLYGALO GESNERI AFFINE Caput gallinaceum.

Radix



Caules.

Flora.

Proxima magis radice, & caulis scula, lignosam, & in fibras, filamentorum instat, ductilem, lentam, fractuque contumacem, foris nigricantem: intus albam, simplicem aliam, aliam multitudine, & in numerosa capita diductam ex quibus densa pullulat foliorum cauliumque seges: caules autem palmares, aut etiam

dodrantales, tenues, subhirsuti, ad medium vsque foliosi, caetera nudi, spicam gerunt vnius, duarum, aut trium serae vnciarum, floribus congestam purpureis Polygali Gesneri, quae tamen hic in latum diffunditur per extrema, non autem in metæ formam fastigiatur: floribus etiam adhuc non omnino delapsis succrescunt siliqua, Accaciae siliquarum quodammodo formam, unico, aut duobus peltatis orbiculis consistens, quodam veluti isthmo loculos determinante, quod si vnicum est conceptaculum, breuem mucronem profert (id quod etiam in extremo, ubi plura sunt, obseruare licet) margine alias aequali, nec cristato, vt in Polygalo Gesneri, umbone protuberante propter contentum semen, Craccae minori par, nigricans, roridumque, nisi quippiam, vncinuli instat, inaequalitatem faceret: singuli porro orbiculi praeter tunicam semen integentem, extrinsecus reticulatum habent obductum plexum, circa oras haerescemem, alias liberum, spinulis mitibus asperatum, radiis rectis, in margines exprotratis: folia quaedam à

ONOBRYCHIS IN GENERE.

CAP. XXX.

Onobrychidi Diosc. folia Lenti similia tribuit, attamen paulo longiora: caulem vero palmi altitudine: stem puniceum [rubentem Plin.] aditum paruum [exiguam & gracilem Plin.] Verum non satis constat (inquit Ryff. & Corn.) quae herba sit. Quidam enim Herbarii Rutae siluestris speciebus annumerant. Corn. quidem Onobrychidem & Onopordon, vnam herbam esse putat altero nomine à crepitu, altero à ruditu asini ducto. Et fieri potest vt vtrumque accidat asino, ex herbae usu, vt & pedat. & rudiat. Cur autem in hac abierit sententiam, Plinius ipsum mouit de vtriusque viribus non multum diuersa tradens. Onobrychidis igitur nomen plurimum plantis attributum est, in primis Polygalo Gesneri, Astragalo Montpeliano, Hedyfato clypeato, & Meliloto 5. Tragi. Est & Clusio planta dicta Onobrychis flore purpureo, subcaeruleo alia, tertia pallida, montana quarta, ac demum quinta peregrina. Galegam porro volunt esse quidam Onobrychin. Hanc Calpurnius similem Capragini [galega] scribit, flore scilicet rubente, Coralli modo, siliquis nigris, longis. Simili modo & alteram, latioribus foliis, flore purpureo. Visa tandem est aliquibus Onobrychis Polygala Tragi, & Onobrychis 4. lutea Dalech. Vltimo sunt, qui Auicularium Sylui Onobrychidem vocent.

Nascitur in humidis, Diosc. autem [circa fontes Plin.] & incultis locis.

Ceterum vim habet [inquit Diosc.] herba trita imposita, tubercula dissuadendi, cum vino vero pota, vtriusque stillitidum sanat. Cum oleo illita, sudorem mouet. Sed haec Plinius. Siccata in farina modum, & insperata vino albo, strangurias finit. Aluum sistit. Succus eius perunctis cum oleo sudores mouet. Et haec lib. 24. c. 16. Sed rursus lib. 27. cap. 12. de Onopordi [quod idem Corn. cum Onobrychide facit] viribus non multum diuersa tradit. Onopordon, inquit, si comederint asini, crepitus reddere dicuntur. Trahit vtriusque, & menses. Aluum sistit. Suppuraciones, & collectiones discutit. Hoc autem postremum etiam de Onobrychi Diosc. in sibi adscriptis dicit. Galeo Onobrychis rarefaciendi, ac discutendi vim habet: prouindeque folia eius, virentia etiamnum, illita ad morem caraplastinatis, phymata digerunt: arefacta vero, si cum vino bibantur, stragulant.

Quin etiam sudores elicit cum oleo inuncta.

ONOBRICHIS QVIBVSDAM
purpureo flore.


Alis multicaucubitali superat longitudinem, ramis teretibus, hirsutis, medullâ fungosâ factis: *folia* Lentis, longiora pauld, hirsuta, denis, aut duodenis pinnatim vnicollâ adnexis coniugationibus, impari vno numerû claudente: *flores* purpureo-violacei, Trifolii

formâ, in spicam sextantalem comosam dispositi, pediculo insident Spithamam logo, hirsuto.

Hanc sic describit Clusius: Cubitales plurimumque habet caules, multos [si vetusta sit planta] rotundos, duros, humi procumbentes, in quibus frequentia folia, Lenti similia, angusta, hirsuta, seu lanugine quadam obducta, quindena subinde, & totidem alia ex aduerso vni costâ hærentia, vno impari extremam alam occupante, gustu amaro, & ingrato: ex alarum cauis oriuntur ramuli similibus foliis septi, ex quibus dodrantes exeunt pediculi, striati, ferentes multos flores, Trifolii florum æmulos, oblongiusculos, eleganti purpurâ nitentes, inodoros, confertos, & velut spicam trium interdum vnciarum longitudinem æquantem efficientes, nonnunquam etiam longiorem, præsertim quando in semen abeunt, quod bifidis, breuibus, tergidiusculisque vasculis continetur, exile, nigrum, durum, sapore ingrato, vt alia legumina: Radix illi magna, longa, dura, in obliquas nonnullas fibras sese spargens, & subinde ad cauliculorum exortus, recentes fibras agens, viuax, & perennis.

Onobrichis prima, flore purpureo Clusio. *Onobrichis Clusii prima* Tabernam. *Onobrichis Pannonica prima Clusii*, seu, vt ego dicerem, [ait Pona in Bald.] *Cicer asragaloides*.

Mense Iulio Argentinz in horto Frid. Meieri florentem obseruauit, sicut & in Pfortzeim in horto Pharmacopæi D. Gtiemingeri. Habui & sicam à D. Agerio colorem referentem. Frequentem inueniebat Clusius ad Danubii ripas supra Posonium apud Petronellam oppidum [quod nonnulli, ex loci situ, ruderibusque antiquis Carnuntum Veterum esse coniciunt, à Plinio numeratum inter Pannoniæ vrbes, quodque se modò subditum agnoscit generoso Domino & libero Baroni: ad Vnuerzagt] ad viarum margines, & frequentissimè toto illo itinere ad Badentes thermas tendente, multisque aliis circa urbem Viennam Austriæ locis, tam citra, quam ultra Danubium.

ONOBRICHIS QVIBVSDAM SVB-
cæreulo flore.

Mltos ex eadem radice promebat altera vniuersos cauliculos, pedales, nunquam non etiam longiores, humi fusos, crebris nodis distinctos, & in his alata *Folia*, hoc est tredecim, quindecim, septem, & decem, aut pluribus & oblongis foliis vni costâ in herentibus constantia, extremo

semper impari numerum faciente: prodeunt deinde ex alis tenues pediculi, seu virgule, *stilos*, in spicam confertos, ferentes, Pili, aut Vicia florum formâ, sed longe minores, colore dilute cæreulo, vel ex cæreulo purpurascente: his succedebant exiles *siliqua* quasi duplicata, continentes pusillum *semen*, renis formâ, nigrum: *radix* minimi digiti crassitudinem ferme æquabat, dura, lignosa, contorta, obliquè se spargens, & altè sub terra se condens, rarisque fibris donata, quæ summâ parte in aliquot capitâ extuberabat, è quibus singulis annis nouos cauliculos fundebat.

Onobrichis subcæreulo flore, siue *Onobrichis secunda Clusii*, qualiter & Tabernæ vocatur.

Rara est, nam paucas duntaxat plantas inueniebat Clusius publicâ viâ secundum orbitas, inter Schwetzer & Gersdorf infra Viennam Iulio florentes, & non procul à Znaim Moratiæ oppido, dum Pragim, & inde per Germaniam proficisceretur. Etiam in hortum translata florebat toto Iulio, & subinde semen perferrebat.

Siliqua
Se-men
Radix.

Locus & Tempus.

ONOBRICHIS QVIBVSDAM
flore pallido, vel
Polygalon.

Sesquicubitalibus assurgit tertia *ramis*, rectis, *Folia*, firmis, duris, viridibus, in quibus *folia* Lentis, siue Vicia siluestris, longa, angusta, duodena, aut quindena, & totidem ex aduerso, eidem costâ hærentia, vno etiam, quod extremæ costæ insidet, impari, lanugine obfita, gustu ingrato & amaro, deinde nonnihil acri: *ramuli* extremo caule ex alarum sinu prodeuntes, palmares, striati, in dodrantes spicas, *stilos* Trifolii florum æmulantium, oblongiusculorum, pallidorum desinunt, quibus impressi nigricantes quidam radii: his succedunt *siliqua*, prioris siliquis similes, mucronata, duobus valvulis constantes, in quibus *semen* Fœnogræco penè simile, sed minus & nigrum: *radix* crassa, dura, lignosa, longa, aliquot



fibris donati, candidans, perennis.

Onobrichis pallido flore, vel vt Tab. Onobrichis Clusii tertia. Sunt autē mihi stirpis reliquæ cū hac Gclneri, propria manu, inscriptione: Polyg. in luteo vico, quod lac pecori auget, folia ei quæ Rata capreæ Italorum ferē: Huius Polygali siliquas appini figuræ Clusii.

Locus. Valde rara & hæc est, duobus duntaxat locis Clusio conspecta, ad Hamburgum videlicet vrbem, duobus supra Poseniam (vulgo Dreeburg) milianibus, & ad oppidum Fischmuntz ad Fitcham flumen situm paullo supra quàm in Danubium se exonerat, publicè viâ, vnde singulares plantas singulis locis duntaxat eruebat florentes Miuo mense.

numerosâ floribus denique, qui in Securidaca & minores, & alterius coloris.

In icone nostra, radicis maxima pars est, petrus cortice detectus, qui euellendo in terra remanet.

An Rauu vóllius hæc de planta scribit, èt in Itinerario suo de pulchra specie Afragali, circa Halepurn cum paruis folijs Hedyfari proueniendi tractat.

An Hlk. Lugd. in append. Astragalus folijs paruis Hedyfari, siue Securidacæ, aut quomodo quidam pronuntiant Securidacæ?

An Anguillare Astragalus, quem Diosc. dicit in Arcadie Memphi prouenire? Verum nulla Memphis reperitur in Arcadia, sed in Ægypto. Astragalus hodierna Græcæ folijs est ordine dispositus, vt in Cicere sed inuisi fetraus. Rami humi sparsi sunt: flores eleganter ex cœruleo & purpureo mixti. Radicem talo porcino admodum similem dicas facie externa, fibris atque pilulis stipatam, duramque. In montibus Euganeis similis prouenit planta, quam semper hanc ipsam esse sibi persuasit. Sed hanc nostram eandem esse cum Anguillare Astragalo nolimus adituere.

Mirum, quod Clusius, qui in Hisp. Astragalum Montspeliensium cum siliquis insexis, & duplici serie semen continentibus, subfulum & rotundiusculum agnouit, in sua postrema Hist. pro eo, Securidacæ minoris iconem posuerit: discrimen poterat ex tenui radice, in icone quam exhibet colligere. In Astragalo enim radix crassa.

Eodem errore la, si sunt Lob. & Pena, qui non antea uiderunt Securidacam minorem, diuersam esse ab Astragalo Montspeliensium. Ita siquidem legitur in Aduert. Securidacæ minor, Astragalus Montspeliensium. Legumen floribus purpureis, semen subrotundum, subfulum est simile Galegæ, vel Araci, quam Securidacæ. Idcirco præceptores nostri Montspelienses huius speciem esse inscribantur. Astragalo propriam astruebant, quod nos etiam referendam duxissemus, nisi Raphani radix, & adstrictoria, ceteraque facultates decissent. Quare nulla stirps, quæ explenda descriptioni satis sit, vsquam sese dat. Non ea quam in cellulis Lugdunensibus prope Tremm & in horto Patauino. Radix certè dissuadet: nam Senensi licuit pictoris operâ nobis illud, et idem nunc illum stilus picture postremò pudit. Et Obs. Astragaloides Herbariorum, Astragalus forte Matthioli, vel antedemum Polygala eisdem circa vibiculam Tremm Lugdunensibus Gallie cum Valerando Dourez, & nonnullis alijs peritis herbarum exploratoribus diximus. Cauliculos spithameos, & pedales erigit. Folia Cicris, aut Galegæ, sed minora: flosculi ex pallido puricant, aspectu incundi. Radix crassitie digitum æquat. Item Ic. pl. Astragalus forte Matthioli, vel iam demum Polygala eius. Meritò igitur præceptores Montspelienses Securidacam minorem negabant quæ multum, vt iam ostensum, ab hac differt, quod non animaduertit Lobelius, qui pro Astragalo Securidacæ minoris Dodonzi figuram ponit, ac Astragalum Montspeliensium dicitur. Semen huius Astragalus, teste Clusio, rotundiusculum, Securidacæ uero minoris, simile est Securidacæ & quadratum. Figura quoque mala, nec placet, quod separet Lugdunensem à Montspeliensi, nec etiam, quod suspicetur Matthioli Polygalum, à qua non parum abest. Nec tandem astimatum cum Astragalo Matthioli conuenire.

ASTRAGALVS MONSPESV-
lanus.

Descriptio:

Radix.



tuorūc digitos longa, vt nisi quis profundè sciat, multas esse plantas existimet: ex quibus prodeunt caules, simplices, concaui, rubentes, vix palmares, folijs vestiti breuibus, in mucronem exarctis, pilosis, amarescentibus, crebris, sic vt ad costam vnâ adveha foliola viginti & vnum supputarim: in vngularum extremitate fl. vermiculi, non multum floribus Polygali Gclneri dissimiles: in purpureis, interdum albi, non in spicam digesti, sed conglomerati, Trifolij floribus similes sed maiores: quibus succedunt siliquæ, duas uocias longæ, in curua, rubentes, teretes: Diff. ita de uridaca minore, folijs pumò quæ mucronata, non obtusa: radice dein crassa

Caules. Folia.

Florer.

Siliquæ

Securidacæ recuræ siliquæ (inquit Cam. in Hist. germ. Matth.) reuocant in memoriam par-
 uam herbam à Gesnero depictam, & Polygalam
 dictam: fortè est Polygala autoris depicta in suis
 lat.com. quamuis ex figura eius nihil certi con-
 cludi possit. Idem in Epit. Polygalam vocat. Sed
 audiat Camerarius de his certiora scientem. Fi-
 gura ex Gesnero posita, si cta est ad plantam
 Monspelianam olim à me ei missam, quæ adhuc
 penes me est nomine Astragali Monspelien-
 sis: nunquam aminaduerti Gesnerum fecisse Polyga-
 lam, antequam autem ille curauit pingendam
 plantam, de qua hoc in loco agimus, habebat Poly-
 galam foliis nonnihil similem & floribus, sed
 siliquis longè diuersam. Verùm, quum teste Ca-
 mer. ex figura Mattholi non possit concludi, quæ
 eius Polygala fuerit, quis approbabit eum in
 Epit. pro Matth. Polygala exhibere plantam de
 qua verba facimus, non parum tamen ab ea diffe-
 rentem.

Polygonon Mattholi, quod Hist. Lugd. plaect,
 siue Astragaloides Lobelii, aut Anthyllus clauic-
 ulata, radicem edit nigram, lignosam, fibratam,
 dimidium pedem longam, superne in multa ve-
 luti caulium principia diuisam, crassiuscula, lami-
 nulis corticosa, ex quibus folia multa exeunt, hu-
 mi strata, longa, ex folioliis composita, Lente si-
 milibus, vtrinque ordine ex aduerso digestis.
 Flores in cacumine nudarum virgularum emi-
 cant, oblongi, lutei: deinde siliquæ Lentis similes,
 nigrae, ex quarum vertice tenuis villus exoritur,
 capreolo, clauiculaque similis. Suspicio Anthyl-
 lidem Dalechampii non diuersam à nostro Astra-
 galo, quamuis quaedam videantur minùs conue-
 nire, nempe color floris, qui fortè visus in planta
 sicca, cum multi flores exsiccati, lutei videantur.
 Capreoli, qui traduntur & depinguntur sunt
 fortè in Astragalo, vbi flos excidit, & tunc sili-
 quæ minùs curuæ: de hisce tamen iudicent Le-
 ctiores.

An Casalp. Astragalos humi strata, similis He-
 lenio Ægyptio [de quo antè inter Vicias] foliis
 numerosioribus, tenuioribusque: floribus simi-
 liter sanguineis racematim in summis ramulis, si-
 liquis autem corniculis similibus, rubentibus: ra-
 dice crassa, ac lignosa, superne in multos ramos
 inuicem diuisa, vnde germina erumpant.

Figura à Compilatore Tab. [titulo Polygalæ
 Mattholi 4. creutzblum posita,] multa habet si-
 milia cum Astragaloides herbariorum Lobelii, va-
 riata tamen est, & fortè confusa, vt dictum, cum
 Polygala Mattholi, & altera, quæ vulgaris dicitur,
 siue Tragi.

Ceterum, quam Polygalam censuit Matth.
 [inquit C. Bauh. apud eundem] eandem Lugd. &
 Tab. sub ipsius nomine posuere. Verùm Castori
 Astragalus dicitur, Lob. Astragaloides herbario-
 riorum. Secundo, Astragalus Alpinus à Cam. in
 locum Polygalæ Matth. substituitur. Astragali
 Monspelienisum nomine à Clusio proponi vide-
 tur, & in Hist. Lugd. Astragalus purpureus vo-
 catur. Displicet nobis icon Tab. falsa, à Fratre pro
 Polygala Mattholi posita, à qua multum differt.
 Lobelii Astragaloides mihi idem videtur cum
 Astragalo Alpino proposito à Fratre. Astragalus
 insuper ei dictus Alpinus, quem secundo
 loco, suo Matth. appingit, est ex meis plantis
 sicis, vt antè dictum. Astragalum autem purpu-
 reum Hist. Lugd. alium puto.

Crescit fecus vias in itinere Narbonam versus,
 prope Gigar vno à Mospelio miliar: quo loco flo-
 rentem vidi mense Aprili. Visus mihi Bononiæ
 Tom. II.

quoque in monte: item inter Sasul & montem
 Gibbi, vnde acceritur Petrolcum. gener Cherle-
 rus attulit flore albo collectam Nemausi.

ASTRAGALVS QVIDAM MONTANVS,
 vel Onobrichis alpis



Multa folia
 promittit ab
 eadem radice,
 Lenticulæ, aut
 Tragacathæ fo-
 liis proxima, v-
 ri similiter co-
 stæ inhaerentia,
 molliora tamè
 viridia quidem
 illa, sed lanugi-
 ne quadam ca-
 dicante pubes-
 centia, lento
 primum gustu,
 deinde nonnul-
 lam amaritudi-
 nem relinquen-
 te, postremò
 liguam velli-
 caute: nascun-
 tur inter folio-

rum alas cauliculis, serè dodrantes, supini, exiles,
 quadam lanugine obduti, aliquot sossulis on-
 tli, Viciæ silv. aut Lenticulæ florum magnitudi-
 ne, colore ex caruleo purpurascente: quos ex-
 cipiunt siliquæ pusillæ, geminis cellulis constan-
 tes, semine (quod cum adhuc maturum non es-
 set, probè non potui obseruare) plenæ: multas
 ex eadem radice, quæ longa, crassiusculaque est,
 & obliquas fibras agit, propagines, & ramulos
 dodrantes, humi fusos, in latera emittentes.

Astragalum hunc quorundam montanum,
 Clusius Onobrichidem quartam numerat, quam
 si quis non inter Onobrichides, sed inter Astra-
 galos referre malit, Astragalus est ipsi Alpinus.
 Onobrichis est Tah. Clusii 4.

Crescit in summo Sneeberg iugo, atque in Et
 scheri summis scopulis, quibus duobus locis flo-
 rentem, & siliquas iam formantem Augusto Clu-
 sius eruebat.

ASTRAGALVS MONSPELIANO CAN-
 didior, & Onobrichis quorundam.



Astraga-
 lus hic
 multa cum
 Monspellula-
 no habet
 communia, à
 quo tamè dif-
 fert: folia mul-
 ta candidiora,
 interdum lon-
 giora & ma-
 iora: pili lon-
 giores: caules
 non multum
 maiores: qui-
 bus insident
 flores multi
 purpurei, si
 benememini
 multo plures,
 quàm in A-
 stragalo Mòs-
 Fi

Folia

Gustus

Cauliculis
 Flosculis

Siliqua

Radix

Onobrichis

Locus &
 Tempus

Descri.

Folia

Flores

Defcri. Clu-
fis.

Folia.

Cauliculi.
Flosculi.

Radix.

Astragalus
purpureus.
Locus.

Tempus
Locus

vis.

pellulano, conglomerati, densâ pilorum lanugine hirsuti.

Similis, si non hæc ipsa planta videtur ita describi à Clusio: Hispani aliam [supple plantam] proponunt, Astragali facultatibus quidem respondentem: sed formâ radicis minimè. Nam tamen folia Ciceris, aut Lentis, pusilla habeat tota canentia: cauliculos breues, duros, & in his flosculos Pisi formâ, pusillos, congestos, & purpureos, summis pediculis inhaerentes: radix tamen magna ex parte singularis, & nihil commune cum Astragalo habens, omnino repugnat.

Hist. Lugd. Astragalum purpureum Herbariorum quorundam esse tradit, qui in Iurâ montium saxosis collibus proueniat, radice grandi: foliis Ciceris siluastris, villosis, gustu adtingentibus: flore ex albo purpurascente. An Lob. & Penn. Adm. Astragali permissis pusilla planta palmaris, quam, dum in collibus quibusdâ Gallo-Provinciæ essent, sublegerunt, elegantiam nequaquam spectant indigna: radicibus namque propriè lignosis, implexis, corticosis, denso exortu numerosos producentibus cauliculos, fruticantes, duros, sed breues, vix binas, aut ternas vncias excedentes, & foliola emittentes pusilla Lentis, Astragali, aut potius Tragacanthæ, quam tota refert rigidiuscula incana hirsutie: flosculis luteolis, aut albidis, Ornithopodii gustu præseco & æquè duro. Onobrichis quorundam. Sed Plac. Onobrichin etiam esse censet, discrepet tamen historia. Lusitani *Herva de S. Lorenzo* nuncupabant.

Genex collegi in monte *Salene* florentem mense Iuno. Celscit etiam vt Clus. testatus est, in vineetorum, & agrorum marginibus locus vias per Lusitaniam & Hispaniam, floret Apili.

Siccata huius in chabano puluerem vulneribus & vlcenibus vtiliter inspergi asseuerare quosdam legitur apud eundem Clusium.

ASTRAGALVS SYRIACVS.



Flos.

elegantia, magnitudine & rubore ornatur acerrimissimo.

Hanc exhibent Ic. Pl. eodem nomine, quem admodum & Hist. Lugd. quæ & descriptionem Obl. proponit. Astragalum Syriacum, Syriacum Ciceris Tabern. vocat.

Astragalus
Syriacus.

An Clus. Pannon. Onobrichis peregrina, rara plâta, quam Londini vidit in Io. Richwiphar-

macopei regii horto, cui folia mollia, incana lanugine pubescentia, vt Tragacanthæ legitur, folia, & eodem modo costæ inhaerentia, quindena & plura, interdum etiam vicena quina, vno extremam costam occupante: cauliculi tamen in hac oblongiores sunt fusco cortice testis, lenti, fractu contumaces, humi fusi, & plerumque nudi, qui extrema parte frequentes ramulos suis alutis foliis oauis profurunt, & in vnciali, villosoque pediculo multos flosculos in caput, & globum congestos, Tragacanthæ floribus proximis, candidantes, deinde membranaceas siliquas, Erui siliquulis minores, & Dorycnii vulgariter nuncupati, siue Hispanici, valvulis pares, singularia femina Fernogtæco similia continentes. Si quis verò hanc etiam non inter Onobrichides, sed inter Astragali congeneres plantas, cum quibus magnam similitudinem habere videtur, referre malit, Astragalus peregrinus esto.

Alepo Syriæ suam plantam Lob. primum habuit, postea in vrcis pensilibus D. Brancionis Melchioris Italo semine enatam sit. Clusi florebat Iulio & Augusti initio, quæ flores & semen, semine Londino misit: protulit.

ASTRAGALVS FORTE LANUGINOSUS, Bæuicus.

CAP. XXX.



CVbitales, Caut am- pitiores sunt huic Astragalo caules, nisi imi caules ferè digiti crassitudinem æquant, pætagoni, siue angulosi, duri, subrubentes, & lanuginosi: folia lanuginosa, & incana, in longa costa ex aduerso semper inter se opposita, veluti in Vicie & Ciceris foliis, gustu primum adstringente, deinde fetuido, flores copiosi, Lupini, aut Fabe vulgaris florum æmuli, secundum oblongos ramulos, seu virgas ex alarum sinu prodeuntes nascuntur, serie quadam digesti, albi omnino, sed antè quàm aperiuntur, & explicentur, ex luteo foris nigricantes: fructum serè dicitur (nam florentem duntaxat obleruaham, ait Clus.) in lobis, qui gustatus, fauces, os, & linguam inflammatione torquet: radix pro stirpis magnitudine amplissima, brachialis nonnunquam crassitudinis, palmaris verò longitudo, deinde in binos aut tres ramos diuisa, foris nigra, rugosa, intus candida, dura & lignosa, ingrati saporis, quæ arefacta, cornu duritie superat. Cæterum Astragali nomine, licet multæ plantæ hodie insigniantur, nulla tamen meo iudicio, ad Dioscoridis descriptionem propius accedere videtur, quàm hæc quam Lusitani *Alfabecca* vocant, Bæuici autem

GATAVANCILLOS

Garrulancibus, hoc est, Cicer exile. Si facultates etiam, quas ex eius temperamento contrarias deprehendere licet, non refragarentur, legitimum Astragalum esse confirmarem, cum cuius historia plurimis notis conuenit. Videtur porro ea esse, quam Amatus, Apocynon facit, & Lusitanis *Astragalus decan*, id est, Lupinos caninos vocari ait.

Primum hanc plantam collibus quibusdam supra Vlyssipponem, quos Tagus fluuius alluit, inter vepres obseruabam, atque mense Decembris cruebam anno 1564. deinde sub exitum Ianuarii insequentis, siluosis locis non procul Hispani, dum Gades proficiscerer, florentem inueniebam. Phaseoli nouum genus in epistolis Honorii Belli respondet Bætico Astragalo. Nobis autem hanc opinionem non placere, indicabimus sub sequenti Poræ Phaseoli genere nouo.

Lobel. Obser. & Ic. Pl. Astragalus Lusitanicus Clusii cognominatur, vt & Tabernæ, qui insuper fletu Spanisicæ cicern vocat, & Alphabeticam Astragalus fortè Clusii Hist. Lugd.

ral arbor posset commodè sequi, si non iam collocata esset antè inter arbores siliquosus, quò etiam posset referri Fabæ aliæ & Phasioli Americani.

ASTRAGALVS DIOSCORIDIS quibusdam.



Astragalo Dioscoridis apprimè similis plantula (inquæ Rauuolff) humilis: radice longâ, purpureâ, ad Raphani crassitiem, longitudinemque accedente, masculis fibris donatâ, quæ vel ipsâ radice citius nigrescunt atque indurantur: Harum aliæ deorsum vergunt, sursum aliæ, curuitate coronatâ, sapore dulci cum modica siccitate. Coliculos erigit aliquot, vix digitatos, radici concolores, terram versus reflexos, quibus adherent nouem, aut decem foliola Lentis, aut Otobi, Inter quæ flores emergunt violacei: quos sequuntur verruculi tumidi, quorum aliqui Coluteæ ferè æquales.

Descriptio.
Radix.
Caulis.
Folia.
Flores.

Astragalus Diosc. Christian worgel & Astragalus vetus Dioscoridis Rauuolffio. Astragalus Diosc. vulgò Christiana radix. Depicta radici non dedit proportionem, quamuis exigua sit planta, minor tamen longè apparet in iconè quàm in viuâ.

PHASEOLI NOVM GENVS foliis Lentisci.

C A P. XXXI.


Noua prorsus & elegantissima etiam hæc est planta (inquæ Honor. Bellus in epist. ad Clul. ex Crete Cydonia) quæ apud me nondum nomen inuenit, sed interim ob similitudinem quandam feminis, quam cum Phaseolis habet, Phaseoli nouum genus vocare mihi liceat. Ad sesquicubitalem assurgit altitudinem, modò simplici caule, modò pluribus stolonibus ab vna radice prodeuntibus, digiti minimi crassitudine: folia illi pinnata, h. e. longo pediculo vtrinque herentia, semper contrariis petiolis, Lentisci æmula, sed mucrone obtulo, vt Securidaca folia: è foliorum cauis, siliquis fert rotundas, pollicari crassitudine, tumentes, & multo aère plenas, colore rubras, in quibus continentur sex, aut octo semina ad luteum tendentia, compressa. Phaseoli figura: quos flores proferat, compertum mihi non est: nam eam spontè nascentem in Spagia insula aduersus Matonem Peloponesi sita, frequentissimam inueni anno 1592. dum Venetias petebam, mense Aprili, quo tempore siliquæ ad maturitatem nondum peruenerant: à nauis grana cruda libentissimè edebantur, græcèque *Lupinos siliuestres* vocabant, licet nihil cum Lupinis commune habeant: huius plantæ semina his diebus ex eadem insula ab amico accepi, quem, vt colligeret, rogaueram: nam insula habitatoribus caret, & non nisi aduersis ventis à trirēibus petitur, & à piratis: eam ob causam semina citius habere non potui.

Sed ad hæc Honorii Belli scripta, Clusius sequentia tradit: Valdè respondet hæc planta (nam ea etiam semine misso mihi nata, anno 1597.) Bætico Astragalo, quem inter Hispanicas plantas descripsi, ac quantum quidem ex eius facie conicere licet, superiorem Hiemem in horto pertulit, & nouo Vere denudè germinauit, nullum tamen floris specimen adhuc dedit: nescio an proximo anno (si per Hiemem conseruare potero, perenni enim est radice) dahit. Ego quidem haud possum mihi persuadere Phaseolum exoticum Belli eundem cum Clusii Astragalo: descriptiones namque & vires nimium dissident.

Phaseolus peregrinus, vt fortè eiusdem generis, C. Tom. II.

GLAVX HISPANICA.

C A P. XXXII.



Ternis, aut quaternis à radice assurgit cauliculis, dodrantem altis, gracilibus, incanâ lanugine pubescentibus: foliis serie quadam secundum costâ longitudinem vtrinque digestis, siue ala foliorum illos vestiente, Onobrichidis, aut Astragali prioris [Onobrichidis quibusdam flore purpureo] jini modum, mollioribus tamen, supernè virentibus.

Cauliculi.
Folia.

modum, mollioribus tamen, supernè virentibus. Ff 2

Flor. bus, infernè canà lanugine obfctis, gustu nonnihil amaro: *flor* extremo cauliculorum fastigio innascentur confertus, capituli, spiczue breuiores & obtuse instar, Glycyrrhizæ vulgaris florum formâ, & colore perquam similis: *radix* candicans est, & exilis, quæ, an viuax sit, asserere nequeo.

Radix. Græcis *glauz*, perinde atque Latinis appellatur hæc planta: quæ appellatio, si quibusdam minus probabitur, permittant quæso Glaucem Hispanicam à Clusio (cuius & descriptio proponitur) tantisper, nuncupari, donec magis aptum nomen inuenerit. Nullâ adhuc inter eas (ait idem in Hisp.) quæ Glaucus nomine à recentioribus describuntur, magis ad amissim Diosc. descriptioni respondentem inueni. Cæterum Glaucem Diosc. Clusii, Lobelius Obl. ne sibi quidem inspectione notam fatetur. *Glauz* Clusii Schiæli *Fraus*, Tabernæ. Antillis altera Lenti similis Dod.

Glauz Hispanica dicitur. Cur autem *Glauz* Hispanica dicatur, ratio redditur, quia nusquam alibi, quàm ad ripas fluminis Thormis Salmaticæ alluentis, paulò infra eam urbem à Clusio obseruabatur, nomine vulgari carens, mense Iunio: verùm is locus procul à mari distat iuxta quod Dioscorides *glaucem* nasci tradit.

Glauz Hispanica dicitur. Locus. compis.

ONOBRYCHIS CÆSALP. FLORE
rubeate, Corallii modo, similis Galegæ: Et alia flore purpureo latioribus foliis.

Locus. Flor. Siliqua.

Onobrychis similis Capragini, breuior, in Omonibus riguis nascitur: flore rubente, Corallii modo: siliquas nigras fert, longas, vt Vicia. Altera latioribus foliis constat, rarioribusque, flore purpureo: siliquis similibus. Dioscorides *silia* ei tribuit Lentis, longiora paulò: *caulem* dodrantalem: *storem* puriceum: radicem parua: in vliginosis & incultis. Plinius circa fontes eodem modo describit.

GALEGA.

CAP. XXXIII.

Radix.

Folia.

Flores.



Surculis, ex foliorum alis exortis, iubam longam efficietes, colore albo, vel ex al-

violaceo: *siliquæ* teretes, tenues, oblongæ, in siliquis *semen*.

Corn. non satis constare dicit, quænam hæc sit Onobrychis, & Ruta silv. speciebus Herbarios quosdam annumerare scribit.

Dod. gall. Fœnugræcum à quibusdam siluestre dictum, aliis verò Glaucem aut Polygalam vocatam, nullam cum Galega similitudinem habere scribit. Sed hanc Italos Galegam, & Rutam caprariam, non nullos etiam corruptè Gralegam nominare asserit.

Hier. Frac. Florio *Herba gallica* vocatur. Helicis *Lauanese*.

Gesnerus aut dicit in Italia *Castracæ Lauanna*, *Thorina*, vel *Taurina*, *Marcantica*, *Sarracena*, *Capragina*, *Herbanesa*, Fœnugræcum siluestre, & teste Brassauolo, *Giarga*.

Quidam Onobrychim Veteribus nuncupatum esse iudicant, alii Glaucem, nonnulli Polemonium esse volunt, alii Polygalon, sed non tam Matth. quàm Dioscoridis singularum descriptiones repugnât. Gesnero qui cum Lob. Obl. Galegam vocat, (quasi Gallicam) appellatur Ruta Capraria Italorum: nam & *Regalicum*, & *Galenii herba* quibusdam dicitur, vel *Galega*, aliis *Taurina*, & *Martanica*, ab aliis *herba Necla*, vel Fœnugræcum silv.

Cardanus eius meminit, sicut & Monachi in Mes. qui in Italia [autore Manardo] à quibusdam Gyarcam vocari scribunt. Brassauola *Giarga*, & fortè eadem fuerit, quam Marc. Empit. Cicharbam vocat, miscens aliis quibusdam medicamentis ad caput pruriginosum & vlcerosum. Martanica verò an fortè à Marte dicitur? Nunc teste Agricola Rutam agrestem, vel Caprariam, nonnulli Polemonium Dioscoridis vocant, cuius sententiæ est Leoniceus & Manardus. Alii tamen hanc herbam Sarracenicam censuerunt appellandam. Sed ridiculum est, Rutam caprariam, seu Galegam, quam nonnulli Onobrychin eredunt, pro Polemonia ostendere. Et cum videant illi boni vin hanc nusquam in montibus, asperisque inueniri, vt de Polemonia docet Dioscorides, sed pinguibus locis atque humectis: iniquum hoc mirum non esse, quandoquidem plantæ variis locis nasci consueverunt, quod & nos admitteremus cum Marantha, si vel vnam ex aliis notis corroborare videremus.

Non facile adducor[is] Matth. Jv credam, quæ madmodum censet Brassauolus, eam esse Polemoniam, quam nostrum Hetruriz vulgus appellat *Lauanese*: alii verò Galegam, alii Rutam Caprariam nominant, & Ruellius *Herbam Glaucem*, quædam verò *Lauaniam*, quod propè riuos aquarum nascatur, vbi manus lauantes Rustici, hac planta saponis vice sibi sordium lutum abstergunt: sed Glaucis faciem nõ representat: Ruellius hallucinatus.

Caprago [autore Cæsalp.] vulgò appellatur, alibi Galega, in Hetruria *Auanese*: flores habet cæruleos, vel purpureos: siliquas nigras, Viciâ breuiores. Ruta Capraria, & Galega Italorum, quorumdam *Lauanese* Hist. Lugd. Fœnugræcum silv. Grigrauth / *Fledentraut* Tabern. Galega vulgaris, quam nonnulli *Rutam* Caprariam, *Fracasur*. Onobrychin, *Clusii* Pannon. Galega *Poniz* & *Camer. cui* & *Ruta capraria*.

In vliginosis locis, serobum aggeribus, in montibus, & denique passim prouert, teste Matthiolo. Cæsalp. siquentem asserit in aruis frugiferis: florere *Ætate*, perfici Autumno. In Pannonia omnium abundantissimam vidit inter Muram

Onobrychis. Ruta silv. Fœnugræcum silv. Glaucus. Polygalum. Ruta capraria. Gralegam. Herba Helica.

Polemonium.

Regalicum. Galeni herba. Taurina. Herba cl.

Gyarcam. Giarga. Cicharbam.

Polemonia.

Herba Sarracenicam. Polemonia.

Lauaniam.

Locus. compis.

gam & Draum flumina, paullo supra eorum confluentes. Cæterum per me fata in horto E.C. Montbelgardi primo anno caules protulit, & per Hiemem multis duravit annis. Scilicet maturum obseruavi Septembri. Spontaneam reperi in Italia inter Patauium, & Vincentiam, & inter hanc, & Villanouam, & circa fossas vrbis Patauinæ, in montibus Euganeis Februario germina prorudentem, inter Veronam & Castellanc, inter Ferrariam & Bononiam: Geneuæ habebam in horto Ianuario virentem: vidi in hortis, Tiguri D. Gesneri, Tubingæ D. Fuchsi, Bernzi in pluribus, Basileæ D. Felicis Plateri, & Fratris C. Baulini.


Succus herbæ Pœnigræci silu. datus à Bayro, in cochleari, liberabat pueros ab Epilepsia, expellebat vermes, quod postremum etiam ipsa bullita in patella herba cum oleo & semine Lini super umbilicum ligata præstabat. Hanc magnifaciunt (pergit Matth.) nonnulli suis experimentis nixi, non in odò aduersus pestilentiam, & lethalia medicamenta; verùm etiam contra ferarum omnium quæ dentibus, aut aculeo venenum emittunt, tum morsus, tum ictus, in quem vsum herbæ tum eius succum bidendum præbent, ac etiam emplastri modo vulneratis partibus imponunt. Laudant aliqui succum, se sequi citè pondere, haustum pueris comitali morbo vexatis. Succo & semine Camer. vermes quoque necat. Decoctum in aceto paratum cum Theriaca, & Tormentilla ac Cardobenedicto, teste Ingrassia plurimùm valet in peste, & febribus malignis cum petechiis. Quorum omnium quoque restis est Dodonaus qui contra venena assumpta eandem landat. Celsipino tandem autore, Galegæ succo tumentes ob venenum boues sanant, in iuso in os. Quidam aquam distillatam in peste exhibent.

qui Thucii dicitur, quum essemus Geneuæ. Nascitur hæc in asperis (ita legitur in Lugd.) montibus, non in eorum quidem salebris, aut præcipitiis, sed in ipsis enliminibus, si qua vda planities illis occurrat.

Efficacem [apud Lugd. Hist.] esse aiunt contra venena, lumbricos, morbum caducum & pestem, non minùs, quàm Galegam alteram. Sed vereor ne hæc imaginariè scribantur, & non per experientiam: quam ob causam nulli consulerim temerè eà vtendum. Dolemus nos, quum virentem haberemus non diligenter à nobis descriptam, ac saporem annotatum, quem debuerat obseruasse, qui vires adscripsit. Animaduertant alii.

Vires & Vitis.

GALEGA NEMORENSIS verba.



Vires minus Galega siluatica, pedem altos habet caules, cum incipit flores, foliaque satis angusta, & mollia, postea maiores, angulosos, ex radicibus multiplicibus, fibrosis, nigris, perennibus, numerosos surgentes: in quibus folia ex duabus, tribusue coniugationibus composita, quorù singularia Parietariæ foliis paria, vnciam, aut fescunciam lata, vncias circiter tres longa, in longum mucronem desinentia, tribus secundùm longitudinem decurrentibus costis, bina quoque foliola caulem, foliorumque pediculos amplectuntur veluti pinna: flores in longo pediculo veluti spicati, sex, vel septè, aut octo, quales leguminibus, purpurei primum, postmodùm cærulei, quos siliquæ excipiunt, vncias duas longæ, nigra, in quibus femina rotunda, exigua, interdum verò oblongiuscula, amaricantia. Radix quotannis iterum pullulat.

Tempus Causit.

Folia:

Flores:


Siliqua.

Pennis.

Orobis silu.

Astragalus aphaca. Hist. Lugd. nor. Phasolus siluanus.

GALEGA MONTANA Dalechampi.



Cvbitalis planta est Galega Dalechampi, montana dicta, caule striato, ex quo per ex interualla orti pediculi, longitudinis mediocris quinque, senâue annexo deno agmine sustinent foliorum coniugationes, quæ Galegæ vulgò notæ solis, quàm simillima: flores in peculiari appendice spicam amulantur, colore prædicti luteo pallescente, figura florum Genistæ quoque: radix subest multiplex, ruberosa, & longissimis fibris donata: siliquas, quas mihi obseruare non licuit, testatur Dalechampi esse nigras, feminibus plenas Lenticulæ similibus.

Galega montana Dalechampi Hist. Lugd. & Pona in Baldo.

Inuenimus nos in monte excelso & nuoso, Tom. II.

Camer. inter figuras in sine horti, Orobis Siluaticus vernus, sicut & Thelio in Harc. qui præterea vocat, Orobum Cysiosphyllum. Georg. Amilius Theologia doctor, contendebat Astragalus speciem esse, vocabatque Astragalum siluaticum vernum, Laurent. Hiei. Aphaces speciem ex aliorum sententia faciebat, Aphacem siluestrem nominans.

Hist. Lugd. [cuius figura non placet] Phasolus siluarum, & Phasoli tertium genus dicitur, quod Dalech. in siluis compererit. Galenum aiunt Lob. & Pena Adu. Phaselum à Dolichone discernere, Pliniumque videri cum inuuisse, & Maronem per Faselum. Ea verò, quæ dixerint, de Phasolo potius accipienda, quàm de Phasolo. Idem videri Columellana intelligere. Sibi verò videri Phaselum esse, quod dant

huius operis extremo. Phafelum à Phasiolo diuerfum. Plinio, Maroni, Columellæ, Dioscoridi

Cluf. in Pan. est Orobus Pannonicus, purpureus, primus. Idem in fol. ait: Erui, siue Orobi nomen apud rei herbariæ studiosos obtinuit Orobus Pannonicus i. Folia ei fena, octona, aut plura, vni costæ adnata: semen internum, rotundum & exiguum, nonnunquam verò oblongiusculum. varium: radix per interualla extuberans. Tota planta calidiuscula est.

Pona in Baldo, Orobum i. pann. Clufi vocat.

Schv. in cat. Sil. Orobum flu. vernum. Arachum latifolium Dod. wald eruen waldwi & cten.

Locus & tempus

Inueni Genevæ in colle la Bassie sub arboribus florentem mense Aprili & Maio. Item Montbelgardi inter arbuta. Obseruavi & Bononiæ, vbi Orobum vocat. Copiosè nascitur, autore Clufio, in montana illa silua Leitenberg supra Mandersforff similiter supra Medeling & omnibus montanis illis siluis quadam serie productis à Danubio ad Alpes: variis item Pannoniæ locis. Floret Aprili, atque etiam Maio: semen autem profert Iunio.

Vires & usus

Semen amaricat (inquit Schv.) & calidiusculum est, & absterforiæ facultatis.

GALEGÆ NEMORENSI VERNÆ valdesimilis, si non eadem.

Radix.



Radix colore fuscâ, intus pallido, multas nodosas fibras, duras, longas, implicatas habens, in quorum medio, sinibus, & extremo inueniuntur veluti bulbi conerescences, quibus radix se propagat: Inueniuntur etiam aliquando [Mui mensis sine inueni inquit Columnn.] quadam carnosa, crassa, purpurascens,

fuccosa, dura, læuia, vt Dioscorid. ait, dici possent, nec aliud quicquam representare videntur: quæ tamen se non explicant, sed ita abundant superfluè. Caules tres, quatuorue emittit tenues, quadratos, Ciceri similes, parum è terra se attollentes, inque ipsam inclinatos, ex quibus per interualla, vt in Cicere, posita sunt folia, pedicellis bidentia, primò bina, dein quaternaria, bina ex opposito, postea quina, postremò ternaria ex opposito intercursum, formâ ad Rusci folia accedentia, maiora verò, duplo longiora, teneriora & læuia, ad nouella Hederæ folia accedentia: pedicelli autem, quibus insunt, in imo ubi cauli hærrent, singuli aunculas habêt, vt in Cicere & similibus leguminosis visitur: auriculas bina illa folio la pedicello, & caulis geniculo hærentia intelli-

Caules.

Folia

go: in summo verò veluti aculeum, sed mollem. Inter foliorum verò petiolos & caulem, viticulae exeunt dodrantem longæ, in terram nutantes, ex quorum medio ad summum vsque viginti fere insunt flores, primùm coaceruati, deinde Vicie modo dispositi, formâ & colore eidem similes: sunt enim purpurei exterius, in medio carulei, interius verò lutei, colore vario ornati. quibus biantibus, ex illorum vasculis exeunt filiquæ tenues, quatuor digitos longæ, primùm virides, siccatæ verò rufescentes, vt etiam semen, in terram deuectæ, seminibus refertæ, formâ, vt dixi, diaphanioribus. Radix dura est, difficilique tundi, vel rumpi potest etiam siccatæ: sapore adstringente, gustu verò satuo, odore terreo, veluti langi.

Ceterùm Columna plantam hanc à se longis, vt vides verborum ambagibus depictam Astragalus (Astragalum) Diosc. Plin. & Galeni (vt quæ eorum delineationi respondere videatur) proclamare non veretur. An verò eius Astragalus idem sit cum Galegæ vernæ valdè dubito: maior namque humerus florum quàm vnquam obseruatum: in foliis præterea non depinguntur, nec describuntur nerui, ad plantaginem accedentes: adde, Clusium quoque diuersum facere.

Astragalus secundus à Clusio siue Alpinus inferibitur, cuius iudicio nulla planta ad Dioscoridis descriptione propids accedere videtur quàm quam in Cantabris, Helnetiorum alpidibus, atque etiam Pannonicis obseruabat, ramulis aliquot ex vna radice prodeuntibus, gracilibus, interdum surrectis, vt plurimum autem procumbentibus, foliis Ciceris foliorum initar, in alâ ordine dispositis, sed rarioribus & longioribus, nec in ambitu serratis, sed valdè accedentibus, ad Orobi primi (Galegæ nemorensis vernæ) folia: flore Vicie, aut Ciceris flori simili, ex cæruleo purpurascens, cui succedunt lobi Arachi siliquis ferè pares, in quibus semen continetur: radix est tuberosa, nigra, dura, cui propagines adnascuntur sarmentosis radicularibus hærentes, vbi similes, sed minores. Sed miror Clusium non posuisse huius Astragal. descriptionem capite de Orobo pannonicis [Galegæ vernæ purpureæ nemorensis] cum quo tanta similitudo: quæ obsecro similitudo Astragalo Columnæ cum Cicere, verè orne Clusius miris benè interoretatus sit, suum Astragalum Alpinum, siue H. St. H. sp. secundum, quem cum esse existimat, quem Fab. Colum. hoc in loco, pro legitimo Dioscoridis Astragalo, exhibet: multum differentem à Chamæbalano, seu Glan-dibus terre stribus.

In montibus (inquit Columnn.) vallibus, locis vmbrosis, & Sale illustratis ventosis oritur, hinc vbique. Floret Maio, & Iunio mense perficitur. Nascitur, ait Cluf. in montibus, quos dixi, vento perflatis, & apertis.

GALEGÆ NEMORENSI VERNÆ SIMILIS FLORE albo.

Pro Orobo Pannonico Clusii albo 2. collecto in montibus Tyrolensibus plantam dedit nobis D. Nicolaus Agerius, cuius filia similia Galegæ vernæ, in quibus discrimen manifestum, quòd non trineuaria secundum pediculorum principium, nulla pinna: flores mihi videntur minores: id notandum in ea planta, quæ vpicæ fuit, caulem in suprema parte diuisum fuisse, in foliorum

GALEGÆ N. MORENSI VERNÆ SIMILIS multiflora, flore purpureo, & albo.



foliorum, & in alium longum pediculum, in cuius suprema parte erant plures flores, iuxta diuersionem verò siliquæ, prouenire incipientes.

Clusius autem suum Orobolum ita describit: Aliquot ab vna radice prodeunt caules cubitales, striati, recti, folia alternatim proferentes pennata, quaternis foliis fa-



Insignis Botanici & Med. Argent. D. Agernus obtulit nobis nomine Oroboli latifolii, coloris albicantis plantam, collectam in horto Bononiensi, cui magna similitudo cum Galegâ vernâ: siliqua constans duabus, vel tribus coniugationibus, quæ paulò breuiora videntur, nec trineruâ, ad principium pediculorum alarum, vti in illa: florum

Orobolum latifolium.

Locum Felcia.

Desc. Clus. R. imm.

Semen. Radix.

Locus & Tempus.

pediculi longi, in eorum summitate flores plurimi (multè enim plures quàm in illa) minores, in utramque partem conuersi, non in vnam tantum, vt in prædicta.

Hanc in fallor, Clusius his delineat: Multis ex eadem radice fundit ramos, pedales angulosos, & ad singulas foliorum alas, modò in hanc, nunc in alteram partem inflexos, humique vterque plurimum diffusos, folia in singulis alis quaternaria, aut senaria, vni colicæ inhaerentia, bina semper ex aduerso sita, nullo extremo in partem numerum faciente, Oroboli Pannonici primi [Galegæ nemorensis vernæ] foliis parè similia, sed dilutè virentia: flores oblongis virgulis ex alarum cauis prodeuntibus innascuntur, numerosi, in comam flexi, pusilli, quatuor folioli, vt reliquorum leguminum flores constantes, hoc est, superiore latiore, sursumque reflexo & expanso, binis minoribus ad latera, quatuor inferiore cauo, & quodammodo carnato, coloris purpurei: oblongi, lobi mucronati, Vicæ lobotum parè æmuli, rotundiores, & magis teretes, maturitate rufescentes, semen continent orobaceum oblongiusculum, albicantis coloris: radix dura, lignosa, multis fibris in diuersa tendentibus donata, viuax est, & singulis annis frequentiores caules profert.

Orobolum Venetum primum purpureo flore, & Orobolum Venetum alter sive secundum, qui foliorum duntaxat & ramorum, colore differt, qui ex viridi pallescit, & floribus, qui prorsus sunt albi, Clus. Orobolum Venetum primum, & alter Clusii: seu purpureus, & albo flore, Pona in Bald.

Cum in Belgica, tum Viennæ nata è semine Venetiis misso nomine Oroboli. Floret Maio.

SECURIDACA FLORE LVTEO, SILLIQUA LATA OBLONGA.

CAP. XXXIV.

EX radice statim multos emittit caules, cubito longiores, ramosos, procumbentes, folia lauia, lentis maioris, sensim lateſcentia, sex, octòve coniugationibus, ad costam anno-



Semen.

Hedyfarum
Pelecium.
Desc. Diosc.

Pelecium.
Plinius.
Desc. Plinii.

Securina.
Scalig.
Plin. notantur.

Locus.

Antiquis
num Hedy-
fari genus.
Neoterici
quibusdam
duo.
Hedyfarum
maius.
Plinius err.
At arch. not.

& hinc aggeribus veluti fossim intercipientes, geminum conceptaculum, rufforum, quadrangulorum membranaceis distinctorum.

Semen sicut Cræsalp. est apud nos peregrinum, omnium amarissimum, veli vel minimum eius degustetur, iagens amaritudo sentiat, depresso est, quadrangulâ figurâ, ancipitem se-ruum præ se ferens, colore rubro; exeat & pallidum: flores fert luteos, in longo pedicula plures, in orbem dispositos: siliquas digitales, depressas & aduncas.

Dioscorides Hedyfarum & Pelecium vocat, fruticem minutis foliis, Cæci similibus: siliquis verò cornicula referentibus, in quibus semen solum, quod ancipitem securim amuletur [vide & nomen accepit,] gustu amarum.

Idem serè Plinius habet. Pelecium in segetibus diximus nasci, fruticosam cauliculis, foliis Ciceris. Semen in siliquis fert corniculorum modo aduncis, ternis, quaternisve, quale Githi nominamus, amarum, stomacho vitale. Est herba [tradit sibi] quæ Lentem emecat, & hoc quidem complexu suo: vocatû que Securidaca, quam Græci à similitudine Pelecion nominant.

Apud Theophrastum Gaza Securina vocat, & in Aphacis nasci scribit: quo in loco Scaliger in Phacis legendum præcipit. Sed peiperam & Plinius loco proxime citato, & Scaliger apud Theophrastum quædam (lentem) pro *α' φάκην* (Vicia genere) legerunt. Is enim ipse, vt & Dioscor. in segetibus nasci scribunt. Theophr. etiam Securidacam in Aphaca gigni, & Aphacam à Securidaca strangulari prodidit. Adde Theophrastum etiam hac in re Plinio refragari, qui Aracum rem duram & scabram in Lente nasci tradidit, non Securidacam. Nec contrariatur, quod Galenus Lentem in Securidacam degenerare testatus fuerit. Aliud enim est, degenerare in aliud, & inter ea nasci.

Dioscorides igitur, Plinius & Galenus vnium tantum Hedyfari, Pelecii, siue Securidacæ meminissent. Matthiolus autem cum Neoterici aliquibus duorum fecere mentionem, maioris scilicet & minoris. De maiori ita Matthiolus: *Hedyfarum* Diosc. Galeno & Theophr. Plinius deceptus Securidacâ Lentem complexu strangulari scripsit; & *α' φάκην* pro *α' φάκην* legit & vertit. Hæc Matthiolus, qui non descripsit suam figuram saltim. Olim in icone malè positæ erant siliquæ, singulares ex brevi pediculo, quas in post. com. reti-

ner, quibus insuper adaptauit flores dilutè purpureos, non tamen annectauit, vbi terrarum eiusmodi colorem obseruauerit. Ego quidem semper luteos offerdebam, & decerpebam. Et quanius Dod. olim Matthioli Securidacam dicebat non multum ad Dioscoridis descriptionem accedere: postea tamen in re herbaria doctior factus suam mutauit sententiam, Hedyfarumque primum appellauit.

Ceterum Pelecium, Securidacam, & Hedyfarum Gesneri hort. dixeris, qualiter & Cræsalpinus appellat. Plinius, inquit is, eâ Lentem strangulari, Galenus verò Lentem in Securidacam degenerare, testantur. Verum me iudice, non est possibile tam diuersam plantam, quam Cræsalp. describit, quæ eadem cum nostra Securidaca, posse in Lentem degenerare: scribit enim Theophr. de caus. pl. Mutationes enenire putandum, vt aliquid similitudinis faciant, non vt omnino speciem expriment alienam: igitur aut non est Securidaca Galeni, aut Galenus errauit.

Hanc tribus in locis triplicibus insigniuit nominibus Hist. Lugd. liberalissimè quidem absque duce. Et primum quidem, inquit appellari Latinis Securidacam, vel vt Turnerus, legendum censet Securidacam. Hedyfarum maus, siue Securidacam Matth. Item Hedyfarum Dodon. Et rursus, Hedyfarum Dod. Hisce vides auream esse libertatem. Aurea est: sed non quæ propter Republicam herbariam, ast potius insulupl explendi gratiâ suscepta fuerit: tres siquidem vnium plantæ figuras Historia proponit, quarum prior ex Matthiolo falsa quod annotare debebat scieris ille Censor H. st. Lugd. C. Bauh.

Hedyfarum, siue Securidaca maior, autoribus Lob. & Pena Adu. Ancipitis Securiculæ amulo femini ferur accepta *α' φάκην*, siue Securidaca, vox, quam etiam *α' φάκην*, ob suauolentiam vocarunt. In Obs. & Ic. Pl. eadem nomina leguntur. Figuram porrò in Obs. & Icon. quod concernit pulchre representant Securidacam, de quâ hægimus, non item descriptio, in qua inter alia flores describuntur purpurei, quales nunquam videre contigit.

Nellus insuper semen aptius Veterum securim, Clusii iudicio, re fert, quæ ab omnibus Hedyfarum (*α' φάκην*, *α' φάκην*) legitimum censetur & Securidaca vera.

Hæc à C. m. Securidaca maior nominatur, & *α' φάκην*, à Græcis, fortè per antiphrasim, cum semen sit amarissimum. A C. Bauh. apud Math. Securidaca siliquâ ol longâ *α' φάκην*, *α' φάκην*, Hedyfarum Matthioli, Ital. *Hedysarum*, & Securidaca, Cam. Lob. & Peræ Securidaca maior. Geiman. gros pfeilsiden.

In Germania (id annotante Dodon.) inculta provenit, floret in hortis Maio & Iunio mensibus. Sed in Hispania aliquot locis inter segetes spontè nascentem Clusius obseruauit, vulgarissimam porò hæc esse scribit per vniuersam Pannoniam, Austriam, Stiriam, Morauiam atque Bohemiam, eam in pratibus in agris, & secundum vias. Florere Iunio, interdum tota etiam Æstate: semen maturum esse Iulio, & Augusto. Variæ etiam interdum floris colore, qui vel totus candidus sit, vel exalbecat, vel intensius purpurascat. Notant item Adu. eam in aruis & segetibus, quas rapidi torrentes ex Alpibus Tauernis præcipiti alluunt, plerumque vastant, & ad Cœuacum via, satis multam oriri, leguminisque modo serpere & fertilitate resistibili, sese reparare. Securidacam flore luteo, siliquâ latâ ha-

Pelecium

Hist. L. reprob.

C. Bauh. not.

Hedyf.


Lob. m.

Locus temp.

et habebam in horto. Vidi Basilicam in horto D. Fesl. Plateri florentem adhuc & siliquis ferentem Septembris, Montbelgardi verò etiam Augusto.

Stomacho in potu vitale Hedyfarum [aureo Diosc.] Additur & in Antidot. Cum melle verò subditum ante coitum spem partus adimere creditur. Hedyfari quoque meminit Galenus simpl. med. 6. sic inquit: Hedyfarum, aut Pelecinus. Huius fructus semen colore rufum est, vtrinque anceps, tum gratum est stomacho, & viscerum obstructions expurgat. Idem præstant totius fructus ramuli.

SECURIDACA ALTERA, sive minor.



Lignosa, simpliciter radice, & candida nititur, ex qua emergunt caules, striati, cubitales, aliquando vix duas uncias longi, filia pinnata Securidacæ maioris, minoræ, per extremam oram latefcentia, sæpè & siliqua, flores singulares, pediculi fastigio ordine ascendentes insident ex luteo pallidi, quibus succedentes siliquæ, vt minores quàm Securidacæ prioris, ita multo magis incuruæ, parum abest quin vtrinque finis coitu circulum efficiat, torosiores, quàm Securidacæ iam dictæ, & propemodum rotundæ: in quibus geminus granatum crassorum, quadrangulorum, ruforum versus, intergerinâ membranâ dissectus.

Securidaca minor, Astragalus Monspel. Præceptores nostri [aiunt Lob. & Pena Adv.] Securidacæ speciem inficiabatur. Senensi licuit pistoris operâ nobis illudere. Addunt iidem in Obs. Hedyfarum alterum Dod. Huius altera differentiâ in vireto Morgani, Hiemis, cœli, & Soli nostri patientissima. Item Ic. Pl. Tom. 2. p. 27. Iconem habet Hedyfari alterius Dodonzi. Verùm, quod monuimus, Securidaca minor Matth. aut Dod. diuersa est ab Astragalo Monspeliensium.

Apud Dod. gall. titulo, *Securidaca Latinis*, quibusdam Pelecinon, Græcis ἡδύσαρον, effigies mala: in Hist. antem lat. titulo Hedyfari alteri, bona. Ait Gesn. Pelecinus falsus Goldenbergio, pingitur à Dod. Tom. 2. sponte que apud nos nascitur. Ast vellemus eum annotasse vbinam terrarum in Germania obseruauit, si intelligit eundem nobiscum Pelecinum. Nos nunquam obseruauimus.

Hedyfarum, siue Securidacam minorem appellat Matth. & Cam. hort. & Epit. Matth. Astragalum Monspeliarum, Clusius. Verùm diximus cap. de Astragalo Monsp. non bene pro eo à Clusio poni Securidacæ minoris iconem.

C. Bauh. apud Matth. Securidaca filiqua falcata.

Hist. Lugd. quæ duas icones vnus plantæ proponit, Hedyfarum minus Matthioli, & Hedyfarum alterum Dod. inscribit.

In hortis raris Genevæ & Montbelgardi mense Maio florebat, & siliquis proferebat, Hiememque perferebat.


Hist. Lugd. repræb.

Locus & tempus

SOLEA EQUINA.

CAP. XXXV.

Soleæ equinæ dictæ herbulæ radice alba, paucis donata fibris lignescit, Matth. gracilis, quatuor digitorum longitudine: à qua statim plures proferuntur caules, palmares, aut dodrantales, angulosi, striati Matth. vnde folia exeunt Securidacæ minoris pinnam digesta, & per extremam oram latefcentia, leuiterque in corculi morem fissâ: hinc, ex sinu videlicet foliorum, flosculi exeunt lutei, singulares, quos siliquæ etiam excipiunt singulares, nullo pediculo, tres circiter uncias longæ, culmum latæ, non nihil incuruæ, compressæ, artificis naturæ rarum spectaculum, dorsum his cœtinuum, opposita pars sumbriatis sinibus laciniosa, vel vt Matthioli ait, siliquæ oblongæ, pressæ alterâ parte, incuruæ, incisuris diuisæ, & foraminum rotundorum speciem referentibus: proeuncente



trinque foraminum orificio. Semen lunatum, bicorni pro contenti seminis figura, numeroque, totidem equinæ soleæ simulacra representat.

Serra cauillo, Lunaria Alchymistis, si denominanda mihi esset (inquit Matth.) pro arbitrio, vocarem Securidacam minorem. Italis *Serra cauillo* sic appellatur, quod equis calceos ferreos calcata extrahat.

Chymistis Lunaria minor, quibusdam Securidaca etiam nuncupatur. Hanc ego plantam Securidacam montanam appello, cum non paruum videatur habere cum minori Securidaca cognationem, tum facie, tum viribus: *Hætenus Matth.* Ego autem malim dicere, vocari *Serra cauillo*, à figura Soleæ, siue ferri equini quàm à vano, vt quidem existimo, rumore, qui tribuitur etiam alteri plantæ, ipso Matth. teste.

Cæterò, Ferrum equinum, *Ferro de cauillo*, Itali vulgò nominant, vt notat Gesn. hort. & Dod. de frum. cui tota insuper amara est, & Hedyfaro naturâ affinis.

Lob. & Pena Adu. *Ferro cauillo*. Ferrum equinum. Soleam equorum refrigerentem fabulati sunt. Quidam nomen Lunariæ affinxerunt. Hæc illi, qui describunt.

Cam. in Epit. Matth. posuit iconem *Serra Ca-*

Radii

Caules

Flosculi

Siliquæ

Semen

Lunaria

Alchymistarum

Serra cauillo

Lunaria minor

Matth. rari

citur

Ferrum equinum

Solea equorum

ualli, quæ partim conuenit, quod siliquas attinet, cum Ferro equino: partim autem videtur esse alterius plantæ, quam consueui nominare, Soleæ, vel Ferro equino similem, de qua mox.

Medica
Hedysarum, siue Ferrum equinum Tab. Medicæ species Cast. Dur. Sed ad Securidacam [ait Cæsalp.] reduci posset & ea, quam vulgò vocant *Sferra cauallò*, alii Lunariam, oritur in montibus, in totum minor Securidacæ.

C. Bauh.
C. Bauh. apud Matth. iconem Sferra cauallò ponit, quæ non respondet nec descriptioni, nec iconi Matthioli: scribit enim Matth. folia cordis faciem referre: quæ non referunt folia iconis iam dictæ: idem accidit Camerario. In nostra iconem radix pro portione plantæ crassior picta, & foliuli omitti.

Icon Locus.
Soleam equinam vidi Patauii in horto D. Cortusi: spontaneam reperi inter Nemaufum & Valentiam tedeundo Montpelio florentem & siliquas habentem mense Maio. Prouenit Montbelgardi in horto E. C. semine per hortulanum Magni Ducis Hetruriz Florentiæ mihi misso.

Tampus
Nullum, quod Matth. sciat, habet in Medicina vsum, quamuis non desint herbarii, qui eam in potionibus vulnereum addunt. Chymistæ hac tantùm ex argento viuo argentum purum fieri fabulantur.

Chymistæ rum error

ORNITHOPODIO AFFINIS, VEL POTIUS SOLEÆ, VEL FERRO EQUINO, HERBÆ.

Radix
Longissima radice, nigricante, lignosâ, subdulci, licet sit vbi & pluribus nitatur radicibus: viticulas producens multas, palmo longiores, interdum dodrantes, & cubitales, ramosas, tenuës, subrubentes, in quibus *folia* Lentis pinnata, paulò quàm Ornithopodii maiora, non continuâ vsque serie, costæ ad caulem vsque adhzrentia, vt in Ornithopodio Dodonæi iam dicto, cum costæ, quæ caulibus adnascitur, sit aliquotusq; foliis vidua, vt in Ferro equino,

Folia
subamara: flores octo aut nouem in ramulorum extremis, coronæ instar radiatum penduli, colore & effigie Meliloti, quam nobilem vocant, quibus succedunt *siliquæ*, crebris internodiis interceptæ, aduncæ, in acutum desinentes, siliquis Ferri equini similes (in quo ab Ornithopodio dicto dimittit, cuius siliquæ Scorpij caudam æmulantur, teretes) minores tamen, minùsque incuruæ, nec ita latæ, in quibus semina incurua, oblonga, rubra.

Flores.
Siliqua.
Semina.
Hedysarum
Hedysarum minus Geel Steinvicken Tabern.

An Ornithopodium?
An Geferus hanc intellexit de hort. pro Ornithopodio Dodonæi, ait enim Ferro equino



cognatam videri herbam, Dodonæi Ornithopodium.

An eadem de coll. stirp. Meliloti filu. species humilis, binis è regione foliolis, cuius lutei flores, suauem quandam & ferè lactis odorem referunt: in prato infra turrim in horto floret Maio, & Junio. Siliquas curuæ, & vnguium specie profert Iunio adulto. vel in fine Junii.

Confundit meo iudicio Cam. apud Matth. in Epit. præsentem hanc nostram plantam cum *Sferra cauallò*: duas siquidem hoc titulo plantas depingit, Soleam scilicet equinam, & huic affinem.

Montepeli proterit prope patibulum, florens Aprilis & Maio. Basileæ vidi cum flore Iunio. Geneæ passim viret Februarii principio, floretque Maio. Montbelgardi frequens est. Gener Cberlerus collegit circa Wasserfa.

Locus.
Color.
Semina.

LUNARIA RADIATA ROBINI.

Misit ad nos Luteciâ Regis Gallorum insignis Botanicus Robinus, amicus noster, Lunariæ radiatæ siliquas plusculas, formâ & exoticâ elegantissimas. Vnciani longitudine vix superant, colore sunt ex rubro subcinereis, vtrinque dentatæ, neruo per medium corrente distinctæ: in quibus gemino versu semina continentur exigua, compressa, Lentis colore, ac rotunditate, verùm multis numeris minora, leuiterque sinuata, sapore, quantum ex sicco deprehendere licuit, minimè notabili, aliquo tamen modo ad leguminosum accedente.

Semen commissimus terræ Montbelgardi in horto Ill. E. C. Wirt. quem colimus. Mense verò Aprilis prouenit & floruit Iulio, siliquasque produxit. Radix longa cum aliquot fibris, cauliculos plures profert angulosos: in ramulos subdividuntur folia dodrantalia: Viciarum, ac Securidacæ minoris modo disposita, in quibus foliola multa, sibi inuicem apposita, nonnihil cordata ultra 29. supputauimus: desinunt in vnicum foliolum sine capreolo, vt Securidaca dicta, cui valdè similis: inter superiora folia exoritur pediculus longus, in cuius extremitate flosculi hiantes, quales ferè in dicta, vel in Vicia, quæ Cracca minor dicitur, rubelli, plures simul: sequuntur siliquæ, quales descriptæ, recuruæ, septem supra vnum pediculum supputauimus: folia sapore sunt subdulci.

Securidacæ peregrina, quam Clusio misit Iac. Antonio Cortusio, significans missam à Cl. V. per Gregor. Honorio Bello, qui eam nascentem obseruabat in sco.

Siliqua.
Color.
Semina.
Radix.
Caulis.
Folia.
Flosculi.
Securidacæ.
per Gregor.



in scopulis apud Sebenicum Illyriae urbem. Ipse Cortufus acrisperat *Scolopendra leguminosa*, vel Hedyfarum peregrinum, quod postremum nomen aptius illi conuenire videtur. Hæc Clusius, qui nondum in lucem ediderat suam iconem eum nostram parandam curassemus.

MELILOTI MAIORIS QUARTA species Trago.

Cap. XXXVI.

Quarta Melilotus Tragi licet foliis, tenuif. simitque virgis & adnascens, nec non longa radice, floréque luteo & multiplici tertix [Medicæ silu. flore luteo] respondeat: tamen *stures* huius maiores, & magis crocei apparent, quo nomine à supenor[tertia] differre videtur. Est & aliud discerniculum, & cetius quidem, quo inuicem quarta hæc à tertix Meliloti species discerni queat, nimirum forma silquarum, quas hæc Melilotus gignit, ex vno flore plerumque ternas duntaxat aut quaternas, digium longas, vngui- bus avicularum similes, terete seminio Orobo haud dissimili refertas. Germ. *Vogelwicken* dicta, fortè Serapionis Melilotus, nam descriptio satis quadrat.

Quemadmodum autem & Dodonæus, qui Trifolium corniculatum vocat, & Frater, cui & Trifolium 54. dicitur, nullam huic plantæ lucem afferunt: ita nec ego, qui adhuc diuinare non possum, an sit mihi nota. Si Tragus locum, ubi proueniat, à nota set, ibi posset perquiri.

MELILOTVS QVINTA Tragi.

Vitaci radice reptat multis adnatis variè se propagans: fibris aliquot donata, crassitie radicum *Coruoluuli maioris*, lignosa candidaque matrice facta, sapore amicante: hinc emergunt longissimi *caules*, crassitudine cum radice pari, striati, intus conuati, ramoli: *folia* pinnata, Securidacæ pinguiuscula, atro-virentia, octo aut duodecim foliorum coniugationibus constantia, impari vno extremam alam claudente: ex foliorum alis pediculi producuntur palmates, & breuiores, angulosi, quibus pendulae impositæ sunt *coronæ florum* Securidacæ, quorum folium supremum purpurascens sursum explicatur, lateralia bina in album languescunt, carina penitus albet, sub rostris atro-purpureo stamina occultans argentea: flos interdum totus albet, solo carina: rostris purpurascente: *siliqua* succrescunt vncias duas, aut tres longæ, angulosæ, tenues, ctebris notis articulatae, semine longo, mediocriter amaro.

Tragus Hist. Ger. die fünffte stein wicken/pulchra Lotus campestris. Idem in lat. Meliloti maioris quinta species.

Fr. C. Bauh. attulit Patauio nomine Aphacæ maioris Cortufi. An Casalp. Alterum genus. Securidacæ, quod in siluis grandioribus oritur: ramis tenuioribus, siliquis in star Meliloti vulgaris, & femina intus habet oblonga, subalbida: flosculos simili modo, in orbem dispositos, albos aut subrubentes.

An Hist. Lugd. In pratis & terrarum ægeribus gignitur Loto Ennaphyllo non dissimilis: foliis eodem ordine collocatis, sed non perpetuo no-

uenis: flore simili, sed purpureo: semine isdem corniculis incluso.

Hedyfarum Scorpiuron, aliis Onobrichis, Cam. hort. *Vogelwicken* / Melilotus tertix, & Serapionis Trago, Lonic. qui fallitur, non enim Trago tertix est, sed quinta. Ornithopodium quoddam maius, Dod. Hedyfarum purpureum, Dürpüt braun *Pelstchen* / Tab.

Montbelgardi pluribus in locis, à me etiam plantata in horto floret Iunio, & Iulio, suo repertu molesta. Basileæ etiam & Sturgardiæ copiosè obseruauit. Obseruauit & Clus. maximè viuacem vulgatissimam, per vniuersam Pannoniam, Austriam, Suiam, Morauiam, atque Bohemiam, eum in pratis, tum in agris, & secundum vias, florentem Iunio, & interdum tota etiam Æstate: semen maturum Iulio, & Augusto. Pennas suam crescere aibat agro Geneuensi non procul à Ponte tremulo, inter dumeta.

Locus & tempus.

POLYGALO GESNERI SIMILIS planta.

Palmam alta, alatis donata fibris Polygali Gesneriani, multè tamen minoribus, hirsutis, ad Astragali Mompeliani *folia* accedentibus, siue magnitudinem, siue etiam figuram respicias, nisi obtusiora essent, paulloque longiora: *flores* extremo fastigio caulium hærent, multi pro plantule modo, rostellis adhuc rubro apparente caduci enim erant, positi serè florum, quinta species Meliloti maioris Tragi.

Descriptio: *Folia*.

Flores.

Hanc in peregrinatione mea Rhætica cum D. Gesnero in Rhætorum monte Albula reperi, florentem Iunio. *Locus & tempus*

SCORPIOIDES LEGV. minor.



Radice *Radix*. Radicem habet Scorpioides leguminosa longam, tenuè, simplicem, in capita aliquot subinde diuisam: ex quibus non tantum prodeunt *caliculi* palmates, & setiquipalmates, hirsuti, verum etiam *Flores* folia, que Ornithopodii foliis æqualia, exigua, hirsuta, acuminata, & nonnihil incana, pinnatim digesta in coniugationes decem, aut plures ad costam adnectuntur: quanquam & ex ipsis caulibus consimilia quoque folia oriuntur: *flores* extremis ramulorum hærent coarctati, Ornithopodi floribus haud absimiles: quibus superueniunt inortæ *siliquæ* sensim attenuatæ, modicè compressæ, striatæ.

Loeb. & Pena Adu. & Ic. Pl. Tom. 2. Scorpioides leguminosa.

SCORPIOIDES LEGVMINOSA
altera.

Viticuli. Notabili hæc tum à Scorpioide leguminoſa Herbariorum, tum ab Ornithopodio diſſerentia diſcrepat. *Viticuli* hæc quidem, vt iſta emitte, læues, cauos, dodrantaes, aut maiores, in ramulos diuiſos: Sed *foliola* ordine vtrinque ad coſtam aggeſta, pauciora, anguſtiora, rariuſque diſpoſita, & quoad figuram ferri equini folioliſ ſimillima, quippe quæ cordata, ferè notabili neruo donata ſunt. *Pedicellorum* extremis *ſtoſculi* hærent ſingulis gemelli, ſtupi, cum Ornithopodii *ſtoſculi* tam figurâ, quàm magnitudine apprimè conuenientes. Quibus gemella ſuccedunt *cornicula* multiplici diſcrimine quoque à diſta Scorpioidis ſiliquis variata. Tercia quippe ſunt, ac recurua, minimè tamen compreſſa, ſicut illa, ac proinde multò anguſtiora, gracilioraque, glabra: nullis interim nec ſtris, nec lanugine donata, obſcuris tamen quibuſdam articulis diſtincta: quæ *ſemen* continent exiguum.

Locus. Hanc primò nobis exhibuit D. Agerius diligentiffimus Botanicus, in agro Neapolitano lectam prope *Fundi* iuxta vias inter Scillas, ex qua & deſcriptionem, & figuram datus.

STELLA LEGVMINOSA.

CAP. XXXVI.

Viticuli Cortuſi.*Folia**Floſculi*
Semen.

noſo.

onyma. Num eademſcitum Stella illa decantatiſſima herba, Hibernis celebrata, humi depacta, fides eſto [inquit Lob. Obſ.] penes illos qui viderunt, & referunt. Cæterùm Stellam leguminoſam, ſiue Arturo Cortuſi depictam quoque exhibent Ic. Pl.

Stellam leguminoſam Lobelii vocat Hiſt. Lugd.

Chariff. Frater C. Bauh. oſtendit mihi anno 1607. plantulam plurimùm accedentem Stella leguminoſæ, ſi non eandem, folia Lentis candidantia accedunt Aſtragalo candidiori. Multùm etiam ſimilis plantulæ Monſpelienſi, cui titulum ſecimus, Fæ nigræco ſily. Tragi in quibuſdam accedens plantula.

ORNITHOPODIUM FLORE
fluſcente.

Ornithopodium Dodonæo dictum *radice* puſilla *Coliculus* promit plures, dodrantaes, tenues, & in ramos diuiſos: *folia* pinata per coſtam cotam ad eius vſque cum ramis aut caulibus conuexum diſponuntur, dimidio minorâ quàm Lenticulæ: *ſtores* leguminoſi, fluſcentes, plures in vnus ſurculi ſaſtigio



ſimul iuncti *pediculi* perquam breuib: *ſiliquæ* perinde copioſæ, pedem auicula digitarum exprimentes, teretes, quarum ſingulæ Scorpii caudam referunt, nodis quinque, aut ſeptem diſtinctæ: *ſemina* Dod. ſena, ſeptenauè, minuta, rotunda, Napi, aut Rapi ſimilia continentes.

In figura ex Fuchſianis hic appoſita maximè diſplicent ſiliquæ. Et quamuis ſinu litudinem aliquam habeat in foliis, melius ramen placet Dalechampii figura, poſita pro Ornithopodio tiberolo.

Vocari poteſt, inquit Dodonæus, Ornithopodium, Brabantis Vogeloeet / Gallis *Pied d'oifeau*, Lat. *Auis per*, licèt nullum nomen, quo appellari poſſet, habeat, niſi ſit Polygala [*μαργαριτης*] Dioſcoridis, vt nonnulli exiſtimant. Ex Arachidium quoque eſt numero. Verùm Geſnero Fetto equino Italorum cognata videtur. Sed vereor, ne Geſn. deſcribat, & intelligat aliam plantam, quàm Dodonæus: quia Ornithopodii Dodonæi ſiliquæ & foliorum diſpoſitio non ita reſpondet Fetto equino, vt plantæ quam deſcripſimus: ſiliquæ enim huius, caudam Scorpii imitantur, quatuor, aut quinque ſunt articuli, non incurui, qui non exprimentur in mala noſtra figura.

Ornithopodii autem, ſiue *Pedis auis* elegans varietas oritur, vt annotant Lob. & Pena Adu. marginoſis herbis Ginnuicij Regiæ, ad Tameſim flumen, non procul Londino: vix tota binos, aut ternos ſuperat pollices: ramulis in terram ſparſis, exilioribus, & crebrioribus, venuſtiſ ordine poſitis, quàm ſuperior, [Polygala Geſneri] quæ non aliis ab iſta natalibus gaudet. Idem in Obſ. Ornithopodium vocant Polygalam Dioſc. Dodonæo, qua in re Dod. detrahunt, cum id non aſſerunt, ſed dubiè ex aliorum exiſtimatione proponat. Ictandem Pl. dicitur Tom. 2. Ornithopodium perpuſillum. niſt. verò Lugd. Ornithopodium Dodonæi. Item: Puſillum Ornithopodium Penz.

Data nobis eſt hæc planta, à D. Petro Turnero inter ſtirpes Anclicanas. Naſcitur [inquit Dod.] in aruis, ſegete poſſiſſimè demeſſa: reperitur & locis incultis, veluti in collibus, præſiſque ſiccis & apricis, ac ſecus vias, aruis verò nata minithopodium penz poteſt anterior.

ORNI.

ORNITHOPODIUM TUBEROSVM Dalechampii.

Radice donatur multiplici huc illuc fusâ, tenuibus fibris capillata, crebris tuberculis nodosa, duris, rotundis: cauliculis multis, humi

ferè sparsis, aut paululùm extantibus: foliis Vicæ, minoribus, in singulis ramulis ex aduerso dispositis numero imparibus: flore in summis ramulis ex albo rubescente: siliquis exilibus, curuis, ferè ternis, velut articulis quibusdam distinctis: minuto semine.

Nascitur in aridis & sabulosis.




Hetnariam quidam vocant, quia omenti & intestini prolapsui mirè auxiliatur sumpta & admoda. Item experimentis constat totius plantæ decoctum ac puluerem, renum calculos frangere & eiecere.

ANTHYLLIS PRIMA QVIBVSDAM, flore luteo, foliis Lente minoribus.

Quædam (Lunaria) gracili solo nascitur, tenuibus ramulis, dodrantalibus, sparsis: foliolis candicantibus, Lente minoribus: foliis luteis, aduncis, vt vulgare Melilotum: quidam Anthyllidem primam putant: at sapor non inest falsus. Cæsalp. l. 6. c. 33.

POLYGALON CORTVSI.

Ita mihi olim denominabat Patavii Nobilis Cortusius, plantam, cui crasse, lignescentes, duræque radices, dodrante longiores, nunc simplices, nunc multifidæ, intus albæ: quæ statim plures e-



mittit virgulas lignosas, dodranteales, aut breuiores, humi stratas, quibus coniugum hærensilia, vt plerumque notent, similia Ornithopodio quorundam, nisi essent breuiora, & rotundiora, solidiora,

spissiora, & magis alba, saporis adstringentis, neruo vno secundum longitudinem prædita: flores ramulorum nudorum extremo insident lu-
Flor;

Floribus, vt Ornithopodii iam dicti, vel Polygalæ Valentini primæ Clusii: semina item consimiliter in siliquis longis, crebris internodiis interceptis.

Polygalâ, cuius imaginem in Ital. & magnis figuris appinximus, misit ad me [inquit Matth.] Veronâ Calzolarius. Quæ an legitima sit, pro certo decernere non ausim, quod tam pauca eius tradantur notæ, facilè ramen adducor, ad credendum legitimam esse, & præsertim cum ipse Calzol. scribat multiplici sibi experimento constare, huius plantæ vsum lac in mulieribus copiosum efficere. Cam. in Histor. Germ. reliquâ
Cam. not.

Matthioli figurâ non vndique spernendâ, ponit aliam ex Gesneto à Polygalâ Matth. differentem. Matthiolus autem non descripsit Polygalam suam, contentus pro suo more solâ figurâ. Qui porro patrociniū eius suscepit, non bene patrociniatur illi, sed figuram ex Tabern. apponit malam. Polygalâ Matth. 4. Creûtblum, non nihil differt [inquit Tabern.] à cæteris, floribus planè
Matth. reb.

similibus, foliâ etiam conuenient, nisi breuiora essent paulò & latiora. At Compilerator cotrumpit figuram Matth. vel Astragalum Lobelii, posteaque ex figura sua falsam descriptionem concinat, nec bene Creûtblum dicit: ea enim amara est planta, Matthioli autem non amata, sed adstringens: flos etiam durescus, nempe luteus. Quæ obsecro conuenientia, aut similitudo foliorum? consideratis etiam Tabern. figuris, vni folia Lini, alteri folia leguminum, cum multis foliolis ex vno pediculo. Lobelium Adu. quo argumeto Senensis Polygalam legitimam vindicet, piget referre: vocatur autem ab ipso in Obf. Astragaloides nethariorum, Astragalus Matthioli, vel iam demum Polygalâ eiusdem. Verùm Lob. non nouit Polygalam Matthioli, quæ multum differt ab Astragaloides ei dictâ, cui flores tribuit ex pallido puniceantes. Astragali quoque figura apud Matth. partim ficta, partim etiam aliena, de qua suo loco
Compil. x. atur.

An Histor. Lugd. Lotus enneaphyllos Dalechampii, radice firmatus breui, subnigra, valdè fibratâ: cauliculis edens multos, per terram sparsos, vel supra terram paululùm extantes: folia Loti, in singulis pediculis nouena: qua ex causâ Enneaphyllum cognominarunt: flores luteos in terra congestos: semen paruum in corniculis longis & gracilibus: ac qui pratis & terrarum aggeribus gignitur. Descriptio sanè hæc Dalech. cum nostra planta conuenit, si radicem demas, fortè Dalechampio non fuit delata integra planta.
An Lotus Enneaphyllos?

Genevæ in horto nostro tota Hyeme virebat, florebâtque Maio. Hanc olim inueneram primò in Rhætiæ monte Nombre: Postea verò è montibus quibusdam Episc. Basil. transtulit Montbelgardum in hortum Ill. E. C. V. Viri.
Locus & tempus.

POLYGALA QVIBVSDAM.

CAP. XXXVIII.

Polygala nostra Lenticulæ foliis & facie frasionibus, pusilla, & tenera planta, in Gallia Prouinciæ pascuis montosis prouentu multo feritur, siliquis suis luteis, minores Cytisi, aut Araci, siliqua & semine minutis, quæ lætis augent prouentum, gregi & armentis, Lob. Polygala nostrâ
Descriptio
Locus
G.

Lob. & Penz. Adu. & Polygala Diofcoridis, Obf. Anguill. mot.

C. Bauh.

Lob. & Penz. Adu. & Polygala Diofcoridis, Obf. Polygalæ nullum fcio (ait Anguill.) vulgare nomen: planta est fimilis Lenti: fed craltior: ei flos luteus, cum tenui filiqua. Seminatur in Pro- uincia & datur animalibus: prouenit etiam in Ita- lia in montibus Bononiensibus, & in Samniti- bus, fiue ABRUZZO. Lobelius fimilem ponit cum Anguill. descriptionem, qui ambo fele rifiu expo- nunt, cum nenter vulgare nomen addat: nani fi feritur, vt aiunt, multo proeuentu non poteft ef- fe innominata. Hanc porò eandem fufpicari cum Polygala lutea [vt frater C. Bauh. facit] non poffum: quia Polygala lutea à vulgari colore folo diftat, quod an aduerterim, cui folia non respondent Lenti, nec vires conueniunt ei attri- bute à Diofc. Aliquando fufpicatus fum Anguil- laræ Polygalam, eandem cum Cortufi, & Mat- thiohi Polygala, vt eum cultura, de qua feribunt, mihi adhuc incomperta, dubium mouet.

GLAUCE VETERVM.

CAP. XXXIX.

Diofc. defcr.

GLAUX (Γλαυξ) inquit Diofc. Cytifo [cod. Bal. γλαυξ] aut Lenti, fimilia habet folia, quorum infernæ partes albidiores, fupernæ vinde funt: ramulos per terram producit [κλωνία ἢ ἀπὸ γῆς. Marc. ἀπὸ γῆς legendum cenfet quinque, aut fex, tenues, palmi altitudine à radice: flores Leucoïo fimiles, fed minores, purpureos. Hæc ita tradit Plinius. Glaux antiquitus Eugalafton vocabatur, Cytifo & Lenticulæ folis fimilis, auerfa can- didiora: rami in terram ferpunt quini, fenæ ve, ad- modum tenues à radice: fofculi purpurei ex- eunt. Plinium Glaucium cum Glauce confunde- re feribit Cornarius: dicitque Glaucem herbam Officinis & Herbariis, efle hodie ignotam. Diofcoride & Plinio autoribus inuenitur iuxta mare.

Defcr. Plini

Plin. mot.

Locus.

Vires & vfu.

Lac.

Hæc cocta eum farina hordeacea, & fale, & oleo, atque fic abforpta, lac in mammis extin- ctum nutritibus reuocat, Diofc. A cuius lectio- ne recessit Plinius, feribens: Coquitur in forbi- tione Similaginis, ad excitandum vbertatem la- ctis: eamque qui haufert, balneis vti conue- nit.

GLAUX LEGVMINOSA Herbariorum.

Defcriptio Caulis Radix. Folia.

Flos.

Glaucæ.

Locus.

Caulis affurgit rotundo, pedali radice, exili, fingulari, nitente, à qua ftatim folia erumpunt Ocyroidis, aut Halimi, albida, glauca, ob- longa: è medio autem caule aliquàmulta exeunt minora, minutim, Lentis modo, aut Viciæ diuifa. In fummo caule pallido, conftitit flauent, aut puniceæ flores, congefti in glomerulum, ex calyculis multis conftitutum, obfidentibus fquam o- fis folliculis, acerofisque veluti glumis, vbi femina. Tota planta lato afpectu. Glaucæ, vel Glaux quædam leguminoſa Herbariorum floribus purpureis, Lob. & Penz. Adu. Aft dicant, qui funt Herbarii illi, qui memine- runt: quæ obſcuro fimilitudo Ocyimi, aut Halimi, Lentis, aut Viciæ? Iuxta agrorum, viarumque margines obu- iam fele dat in Francia, Anglia, & Belgio, iuxta autores.

TRIBVLVS TERRESTRIS.

CAP. XL.



PROlixam latis agit radicem, fibris capillaribus donatam: coliculus emittit plures, palmares, aut etiam dodranta- les, ramis multis diuifos, albican- tes, per quos folia pinnata Lenticulæ, in- cana, pilofa: res pediculis in- fident, è ſinu foliorum ortis, lutei, parui: quibus ſucce- dunt muricata capitula, ſpinis maifulculis ha-

rentia, ad Spinachiorum accedentia, ſemen continetia.

Tribulo (Theoph. tradente) peculiare eſt, quòd integumentum ſuctus aculeatum gignit, genera. Vnum, ſolum Ciceris [ἐπιβρυχιδες] habet: Alterum ſpinofis eſt folus. Humi iacent ambo, & quaquaerſum ſei è diſperguntur. Serius germinat, qui folia ſpinofa habet, & circa villarum ſep- ta prouenit. Semen præcocis [Tribuli] Seta- mo [σπινωιδες. Plin. arenaceum, ἀμυγδές] ſimile, Serotini verò rotundum, nigricans, ſiliquâ clau- ſum. Cæterùm Tribulus ſpinofa planta eſt, ac an- nicalis, qui iuxta ſolum aculeatum, altero quo- que ſolo conditur. Hic porò vel ſemine acule- leigero conſtat: habet enim in ſemine aculeum: Qua de cauſa id quoque proprium ei (vt ſic lo- quar) præ omnibus licet vtiq; adnotare. Ad hæc ſolum iuxta aculeum gerit.

Tribulo terreſtris [inquit Diofc.] foliis qui- dem eſt Portulacæ [ἀπὸ γῆς. Lob. purat legen- dum Araci] ſimilibus, at tenuioribus: viticule verò [μακρὰ, Vetus Cod. Lacun. & Orib.] per terram ſparſæ, in quibus ſpinæ ſunt rigidæ, præ- duræ: iuxta amnes & rudera naſcitur. Græca ve- rò Diofc. verba ſic habent: τὴν κλωνίατα μακρὰ. καὶ γῆς ἐπιβρυχιδες. ἢ παρὰ αὐτοῦ ἀκωνίτιον περιφρα, quæ ſic reddit Ruellius: Viticulis in terra ſtratis: ſpi- nis ſecundùm folia rigidis, quæ Ruellii verſio non ita aridet, vt Cornarii, qui legit: & ſamen- ta per terram ſparſa: & in iſtis ſunt ſpinæ æcebræ: ſi quidem illud, ἢ παρὰ αὐτοῦ, non videtur referri, ad ἐπιβρυχιδες.

Tribulo proprietates [ait Plinius] quod & fru- ctum ſpinofum habet, & ſecundum ſpinam ſo- lum. Eius genera duo. Vni Cicerulæ [Theoph. Ciceris, ἐπιβρυχιδες] folia. Alteri, aculeata. Hic & ſerius floret, magiſque ſepa obſidet villarum: Semen ei rotundius, nigrum, in ſiliqua: alteri a- renaceum: [alii Acanaceum legunt vulgata ex- empl. σπινωιδες, Hiſt. Lugd.] Lolium & Tribu- lum, & Carduum, Lappamque non minùs quàm Rubum, inter frugum morbos potius, quàm in- ter ipſius terræ peſtes numerauerim. Et hæc de Plini ſententia.

Sed Tribulum fugibus infestum esse, vel ex Virgilio manifestum est, nam ita canit:

*Lappaque, Tribulique, in erque mœntia culta
Infelix Lolium, & steriles dominantur Avena.*

Tribulus Theophrasti, Veneticus vocatur *Easapia*, inquit Anguillara, Tribulus terrestris (autore Bellon.) vulgò in Creta vocatur *Arriuolo*. Tribulus sacrarum literarum, in Gallia non prouenit.

Esse [ait Clus.] Diosc. *τρίβυλον χερσαίου*, Tribulum terrestrum affirmare non velim: sed optimè quadrare videtur alteri ex terrestribus Theoph. descripto, *αερίον* videlicet, tamen hic non sit valdè præcox, locis saltem vbi obseruabam. Hisp. *Abroyos* appellabant: folia sunt subacri gustu, cum quadam adstrictione: fructus quinquepartitò diuisus (quatuor spinis singula diuisura constant) in quo toidem semina: radix interdum minimi digiti crassitudinem æquat.

C. Bauh. in Matth. Tribulus terrestris folio Ciceris, Theoph.

Soliti erant (vt Adu. annotat) proicere hosti murices infestis aculeis armatos: quos quia protererentur, *τετρακτες* nominabant: vnde huic siliquæ plantæque muricata Tribuli nomen. Senensi duo Tribuli. Alter, quem Pisis à Cytino mistum scribit. Alter, Dioscor. foliis Portulacæ quem in Veneto littore vidit. At quidam peritus locorum illorum & herbarum Italus nobis dicebat Senensem illum prædictum Commentatorè nunquam nisi aridum, aut pictum vidisse vulgatissimum Tribulum, eoque describere nesciuisse: deinde Portulacam marinam illic frequentem pro Tribulo Portulacæ foliis accepisse.

Τετρακτε *χερσαίου*, Tribulus terrestris dicitur [inquit Hist. Lugd.] quòd siliqua, plantaque muricata sit, It. Tribulo terrestre, Arab. simpliciter Tribulus *Hafab*, siue *Haserk*, Hisp. *Abroyos*, & *Abrolyhos*.

Terrestris autem Tribulus [*τετρακτε* *χερσαίου*] dicitur [teste Dod.] ad differentiam alterius in aqua nascentis. Est autem duplex *φυλλοειδης* (spinoso folio) & *αερίον* [præcoquus.] Cum *αερίον* autem Theoph. hic magis conuenit, quem & terrestrum Theoph. Tribulum, non omninò abs re, quis nuncupauerit. Dioscorides enim, qui vnius terrestris tantum meminit, hunc omisit. Suum siquidem Tribulum, non Ciceri, sed Portulacæ, similia tradit habere folia, ac tenuiora, & *κλιματω*, siue tenuiores, tenerosque ramulos, per terram stratos, in quibus spinæ acerbæ & duræ. Qui certè Tribulus *κυλλοειδης* magis similis est, quam *αερίον*, siue præcoquo.

Ceterùm, Tribulus terrestris Veterum & Recentiorum, Calcitrapa à quibusdam esse censetur.

Ad aruorum semitas, in quibus Melopepones Salmanticæ seruntur, sequentissimè proueniens reperiebatur Clusius, hortulanis valdè molestum, & exosum, quoniam fructus eius [qui per maturitatem facile de planta decidit] firmis aculeis pedes illorum nudi grauiter offunduntur. Florebat isthic Iulio, semen verò Augusto & Septembri maturum. Meminit etiam olim Monspeliano agro obseruare, sibi ipsis serè vrbis mœnibus inter oliueta, vt & Lohel. qui dicit: Videas pratenses, puluerulentas, & sabulosas planities maritimas Adriatici, Thyreni, & Gallici Mediterranei maris isto Tribulo itineranti infestas & propemodum imperuias. In Lio Venetæ postremum insulæ sabuletis, cuius Pharmacopæorum

Tom. II.

notissimum dicebat Italus, eoque minimè Pisis accensendum. Hunc vidimus nos, flores & semina ferentem mense Augusto, in fossis circa Monspelum prope muros exedificatos à Papa Urbano. Montbelgardi prouenit in horto Ill. C. Vvitt.

Adstringit & refrigerat: estque omnis inflammationis cataplasma. Cum melle verò feruida oris vlcera, & tonsillas, & putredines in ore sanant, & gnignas. Exprimitur & succus ex eo ad oculana medicamenta. Fructus ipsius viridis potus, calculosis prodest. Drachmæ quidem pondere potus, & impositus commotis à vipera particulatim opitulatur. Commodus est etiam ad lethalia medicamenta, cum vino potus. Decoctum reserpsum pulices necat. Ceterùm, qui ad Strymonem fluuium habitant Thraces, viridem quidem herbam equis in pabulum dant, fructum verò, qui dulcis est, & probè nutrit, in panes effingunt, ipsoque pro pane vtuntur. Hæc ita Plinius tradit. Succus ex hoc colligitur ad oculorum medicinas. Est enim refrigerantis naturæ, & idèò vtilis contra inflammationes, collectionesque. Vlcers per se erumpentia, & præcipuè in ore, cum melle sanant. Item tonsillas. Potus calculos frangit. Thraces, qui ad Strymona habitant, foliis Tribuli equos signant. Ipsi nudo viuunt, panem facientes prædulcem, & qui contrahit ventrem. Radix castè pureque collecta, discutit strumas. Semen adalligatum, varicum dolores sedat. Tritum verò, in aqua sparsum pulices necat. Galeno teste: Dominatur in hoc terream frigidum, quod adstringens etiam alibi ostenditur. Et propterea ad inflammationes, dum adhuc generantur, & omninò ad omnes infusiones commodat. Fructus, qui tenuium partium est, calculos in renibus atterit potus. Et quamuis Galenus Dioscoridem sequutus terream & frigidam qualitatem huic tribuat Tribulo, Salmaticenses tamen eius decoctum, ad pituitam, crassosque humores incidendos, & euacuandos felici successu clysteribus iniici prodebant, teste Clusio. Nullius hodie commodi, nisi Afinis, quibus pabulum est. Lob.

Vires & vltus.
Inflammatio:
Oris vlcera.
Siccitas

Panicum
fructus.

Oculi.

Radix strig
174

DE LOTO IN genere.

C A P. XXXXI.

IN genere de Loto verba facturi, hanc duplicem agnoscimus. Est enim & *Lotus arbor*, de qua Historiæ libro 2. diximus: & *Lotus herba*, de qua nunc agemus. Quæ auctore Theoph. in pluribus formis est, & sermè ceu æquiuocis: Huius enim species plurimæ sunt, differentes & foliis, & caulibus & floribus, & fructibus.

Lotus arbor

Lotus nomen
æquiuocum
est.

Lotus [inquit Diosc.] quam aliqui Trifolium vocant, folia habet terna, Loto arbori similia. Censendum autem est, Matthiolo teste, Dioscoridem Trifolii huiusce folia, Loto arboris comparasse foliis, non quòd terna folia Loto, perinde ac Trifolio, ex vno pediculo exeant, sed quòd vnumquodque per se Trifolii Alphatidis solum, Loto arboris solum referat. Ceterùm in caule tantùm [auctore Theoph.] soliat Loto.

Lotum porrò satiuam, & silu. ægyptiam, Arabes indifferenter vocant *Handachcha*, *Garch*, & *Tibuf*.

G g 2

LOTVS SATIVA VETERIBVS.

CAP. XLII.

Lotus sativa Trifolium. Vires & Oculorum morbi.

Error quorundam.

Temperam.

Aequivoca

Lotus sativa.

Melilotus vulgaris. Alleluia.

Ab aliquibus [infit Dioscor.] Lotus sativa [Lotus sativa] nuncupatur. Nascitur in hortis. Succus inde expressus (de... cod. Bas. & Dalech.) & ad mel ammittus, argema, nubeculas, albugines, & quae pupillis oculorum tenebras affundunt, depurgat.

De Loto herba sativa, eadem sane, quae Dioscor. habet, prodit Plinius: Loton (ait) qui arborem putant tantum esse, vel Homero auctore coargui possunt. Is enim inter herbas subnascetes Deorum voluptati, Loton primam nominavit. Foliis autem Plinius attribuit ea, quae Dioscor. expresso succo hic adscripsit.

Lotus, inquit Porta, radice & fructu croceis est: Plinius radice lanas, pelles & cortices tingere dixit, sed Dioscorides capillos rufare.

Lotus sativus, auctore Galeno, quem aliqui Trifolium nominant, modice extergentem vim habet, atque ita etiam siccitatem. Verum in caliditatis & frigiditatis coniugio medius quodammodo est, & temperatus.

Sed Loti tandem sativae, siue vrbanae inspicimus aequivocones. Passimigitur Lotus vrbana vera & legitima, sativa Lotus habetur. Est vero nobis Lotus haec, Lotus corniculata glabra & hirsuta minor, de qua suo loco. Sunt qui existimant eam plantam esse Lotum vrbanae quam vulgares Herbarii & Officinae falso Melilotum appellant, quorum ego opinionem non improbo, inquit Senensis Commentator.

Non desunt etiam e Recentioribus, quorum opinionem tuetur Gesn. in suo libro animalium, qui putant Lotum sativam esse Trifolium illud, quod in pratis passim, atque alibi etiam provenit, sed errant, auctore Matth. cui Lotus vrbana reiecta priora est Melilotus vulgaris, odorata.

In tanta Dioscor. brevitare, inter tot Trifolias herbas difficile est statuere de Loto vrbana. Matth. censet, ait Turnero, Melilotum vulgarem esse Lotum vrbanae. Amatus autem Alleluia esse iudicat. Ferrarienses vero viri docti, diversam ab utraque Lotum vrbanae ostendunt. Ea primo obitu Trifolio acetoso persimilis est. Sed Trifolium acetosum in silvis tantum provenit & incultis: Haec vero in hortis tantum. Trifolium acetosum nihil habet, quod caulem referat: flores enim pediculo insident a radice statim orto, candidi, triplo maiores floribus eius quam pro Loto vrbana exhibeo. Haec autem caulem habet breuem, cuius summo flores insident duo, tres, plures, paucioresve, lutei, sapore aedo Trifolii acetosi. Hanc potius Lotum vrbanae opinor, quam vel Alleluia, vel Melilotum. Ut enim Melilotus non est esculenta, ideoque nec in hortis duntaxat reperitur, pro Loto vrbana potius, quam illa dux habenda est. Bis mihi visa est, semel Ferrariæ, semelque Clavennæ.

LOTVS SYLV. VETERVM.

CAPVT XLIII.

Lotus silv. quem Liby.

Observavit Diosc. Lotum silv. (Lotus silv.) quem aliqui Lotum vocant, plurimum in Li-

bya nasci: caulem ferre bicubitalem, aut etiam maiorem: alas habere multas: folia Loto Trifolio similia, quod in pratis provenit: semen simile Fenograeco, sed multo minus, in gustu medicatum.

Ceterum, diuersas apud diuersos hoc nomine donatas comperies plantas. Matthiolus licet nondum audeat affirmare, an Lotus siluestris, quam copiosam hoc in capite in Libya gigni tradidit Dioscorides, nascatur in Italia, Herbam (ait) quandam sapiens vidi, ac legi in incultis & pratis, nascentem foliis Trifolio amulsi & eadem descriptionem suam repetit ex Dioscoride, cum additione florum luteorum, qui non conveniunt plantae depictae, cuius icon representat nostrum Trifolium rectum, hirsutum valde. Abstulit adhuc in post. com. iconem priore Matth. cum descriptione, ponens pro Loto silv. Loti sativae, annuae, flore caeruleo, & figuram, & delineationem.

Cesalp. tandem, Lotum silvest. Diosc. quam & Theoph. inter odoratas recensuerit, vulgo Trifolium, & corrupto vocabulo Tripulis vocari scribit, flosculis luteis, & candidis. Quoniam ergo sit Lotus silv. Diosc. haud est promptum dicere Turnero, cum ea, quam ipse credit Lotum silv. florem habeat caeruleum pallidum.

Vim habet calefaciendi, leniter adstringentem, depurgantem maculas faciei, & a Sole provocatas, si cum melle illinatur. At si per se tritus, aut cum Malvae femine, ex vino, aut passo bibatur, vesicae doloribus opitulatur, ut nobis auctor est Diosc.

LOTVS CORNICVLATA GLABRA

& hirsuta minor.

Nigro cortice radice, lignosa, multiformi parvula, coeuntibus in vnam portionibus longissima euadit, raris fibris donata, reptans, sapore subdulci, & adstringente: virgulae tenues humi ferè procumbentes, brachiatis foliis sustinent ex intervalis, terna Trifolia, aut quina, quorum duo in inferiora cauliculo adnascuntur, pilosa, sunt quae nullos aut paucos pilos habent, acuminata, pinguis, adstringente sapore praedita: flores densè tanquam in umbella stipati, Genistae floribus similes, lutei: quorum supremum solum reliquis latius, rotundiusque, sursum flexum, foris, intusque lineis putpularibus striatum, infimum sursum quoque mucronem spectans, apices luteos continens, ipsumque vtrinque geminis foliis, tanquam alis coerectur, quibus delapsis cornicula, siue filique tenues subnascuntur.



Trifolium est C. Baub. so. siue corniculatum glabrum & minus, seu Melilotus.

Locus. Deje. D. Acqui. Marth. Trifolium rectum. Lotus silv. Lotus silv. flore caeruleo. Trifolium odoratum. Melilotus vulgaris. Vesicae doloribus.

Deser. R. ad. Sapor. Folia. Sapor. rec. Trifolium. Melilotus. raphyl.



Lotus pentaphyllos. Cæsalp. *Melilotus vulgò appellatus,* cuius flores officinæ pro Meliloto Antiquorum substituant, quâus autem iis, præter colorem croceum nulla qualitas legitimi Meliloti insit. Tabern. *Trifolium siliquosum minus,* Flein schœrenflee.

Trag. in Hist. germ. *Edeler steinz*

Flee Dasz sibentgeschlechr potest esse Serapionis Melilotus, non tamen malè conuenit cum Hedy sarò Diosc. quod Pelecinum vocat, & quorundam Securidacam. Nostris Herbam flauam, & Herbam leporinam vocant: quidam etiam Unser frauen schüßlin esse volunt. Hanc idem in Hist. lat. nasci tradit in agrorum limitibus & secus itinera, hoc quidem titulo: *Aliud quoddam Meliloti genus, Melilotus nobilis, Meliloti septimum genus.* An insuper eodem Hist. germ. Lagopus, hâsenfuß / quem Diosc. non describit, nec etiam Gal. Aginetæ, & Plin. ex denominatione tamen, vt etiam offendit Apuleius, apparet herbam similem pedi leponis, nullam igitur nouit plantam præter flores quosdam à genere Trifolii, & Loti, quæ planta auf dem Gaw vocetur hâsenfußlin: existimat autem verum *lagopus* Antiquorum, dictum Dioscoridi Lepnris Cyminum, & Lepotinum pedem: *Hâsenflee.* Hanc suspicamur nos Lotum vrbanam Matthioli.

Lotum pentaphyllum Gesn. dixerit herbam, quâ imperiū quidam pro Meliloto hæctenus abusi sint: inodoram proflus, *Gêlt Tubenröspfle/* cuius species duæ sunt. Matthiolum Lotum vrbanam nominare non probauerit, sed Lotum Fuchsi putarit.

Meliloti alterum genus, Fuchsi. Melilotum germanicam vocauit, quòd in Germania pro vera Meliloto sit vsurpanda ob adstrictionem. Hanc suam autem opinionem stabilire nititur antiquo manuscripto Herbario, qui hanc pro Meliloto pingat. An de hac Ruell. sciens in pratis herbam, quam officinæ *Andachocam* & *Coronam* vocant *regiam.* Sed an Lotus sit vrbana non audeat asserere, quòd à Diosc. non describatur. Sunt tamen inquit, qui verum Melilotum defendant.

Nulla certè hæctenus Matthiolo scilicet obtulit planta, cui Lotus vrbana meritò subscribi possit: hæc est, inquit is, vera ac legitima Lotus latua. Sunt tamen alii, qui existimant, eam plantam Lotum esse vrbanam, quam vulgares herbarii, & officinæ Melilotum falsò appellant, vt potè quæ foliis constet Trifolii effigie, nascaturque non in pratis tantum, sed etiam in viridatiis & hortis. Verùm horum sententiam eur planè probeam, aut refellam, nihil equidem habeo, cum in suâ potiùs opinione duci, quàm rationibus, aut auctoritatibus niti videantur. Inclinat tamen animus ad credendum, quòd ita, vt illi rentur, facillè esse possit. quando quidem vulgaris Melilotus &

in hortis prouenit, & folia Trifolio proxima profert: quin & omnibus notissima est herba, quemadmodum Lotum vrbanam olim fuisse, apertè in nuii Diosc. qui eam vt triualem non depinxit. His illud accedit, quòd in hanc vsque diem proprium ferè seruauerit nomen, eo tantum aucto ex Loto in Melilotum: vnde postea facillè factum esse potest, vt eadem legumina Meliloti locum occupauerit. hæc ille: Qui sub titulo Loti vrbane ponit iconem Loti nostræ circunculatæ glabræ, quam Melilotum quoque officinarum nominare videtur. Verùm hanc suo more non describit. Et licet retineat in post. com. cum mag. fig. maiorem verborum prædictorum partem, omiſſa tamen in his iconem, vt & in Epit. aliam reponit, Trifolii scilicet odorati, sub eodem Loti vrbane titulo.

An Lotus silu. An Amato Lotus silu. Trifolium silu. Offic. Melilotum: Hisp. Luit. Melgus: & Ital. Gal. Melilot. Germ. Guldenflee oder Steinflee

An trifolio fl. linc. An trifolio Lotus silu. Nomina linguar.

An Brant. Tom. 3. Rhaph. 14. Trifolium 7. flore luteo, Latinis *Leporaria* vocatum? *Lotum silu. non tamen Dioscoridis* Dod. gall. vocat. germ. *Wildenflee/Steinflee/Edelsteinflee* Vogels wiesen / Unser frauen schüßlin. Gall. *Tressle sauuage iaulne* Belg. *Steenclâeren/ & Gelfteincclâeren* wilde clâeren, & quibusdam *Meliloti species.* *Vogels Dirsen.* Quidam, aitiple, Meliloti speciem putant, idèd vocatur latinè Melilotus silu. aut Melilotus germanica.

Trifolium corniculatum primum, similitudinem maximam habet [eodem teste in fol. & de frum.] cum Serapionis, & Iſaaci Meliloto, quam *Alchilè* siue *Melich* vocant.

Lonic, *Melilotus germanica,* & *Herba flaua,* Loti silu. 5. species.

An Lob. & Penæ Adu. *Melilotus coronata:* Non de nihilo erat, quod quidam persuasi fuerunt, illam Lotum, quæ scicioribus pratis & viarum marginibus lætatur, Sertulam esse campanam, aut saltem pro Meliloto esse vtendam. Plebi gallicæ *Corona regia* dicitur, indidemque Romanis *Sertula* fortè dicta. Eà Pharmacopœi, Galli præsertim, plurimum vtuntur aquè tute atque Meliloto. Nusquam non Angliæ, Galliæ, Belgiæ, frequentissima siliqua Loti siluestris. Item Obs. *Melilotus coronata, Trifolium corniculatum* Dod. *Melilotus germanica* Fuchsi.

An de eadem loquitur pag. 500. *Melilotus Adu. Sertula campana & Corona Regis.* Angl. *Melilotus* It. *Melilote,* & *Trifoglio cauallino.* Hist. Lugd. *Lotus satina* Martb. Hort. Camer. *Melilotus nostra* germ. Hort. Lus. *Trifolium siliquosum, Melilotus nobilis* Tragi.

In pratis prouenire solet, ac etiam collibus siccis. Genetæ duas species obseruauit: Hirsutam florentem Maio & Iunio cum siliquis, quam matrem voco. Glabram alteram, aut saltem pilos habentem paucos, florentem Septembri scilicet vias Montbelgardi & Basileæ, quam sceminam nomino. D. Agerius attulit ex Italia, cuius radici adhæsit Orobanche parua.

LOTI CORNICVLATÆ MAIOR species.

Est altior multò quàm vulgaris, caulis enim cubitum, ac etiam scsq; cubitum altioribus assurgit foliis per ramos tribus ex vno pediculo, vncialibus circiter, duobus itidè pediculi ex

An Lotus silu.

An trifolio fl. linc. Lotus silu. Nomina linguar.

Meliloti species.

Trifol. corniculatum

Melilob germ.


Locus & tempus.

Mar.

Famici.

Descriptioj Canlis, Felia.

Flores.



Siliqua.

Locus pentaphyllus. C. Bauh. non

An Meliloti species.

Locus. Locus.

pectibus caulem cōplexis : flores peculiari-
bus furculis & in summo caule in orbē
congesti, maiores, lutei, foliis quihuldam
coronæ subie-
ctis : sequuntur
siliqua nume-
rosæ, vnciales,
& seiscuncia-
les.

Est C. Bauhi-
no *Trifolium* si-
sive *corniculata*
maius &
hirsutum : *Lotus*
pentaphyllus maior, medicē

hirsuta Gesnero. *Meliloti vulgaris alia species foliis subhirsutis* Celsalpino. Nobis autem non facil-
facit C. Bauh. differt enim Celsalpini *Melilotus*
altera, à *Lotus pentaphyllo*. Ea siquidem Celsal-
pino breuior est *Lotus corniculata*, & siliquæ in-
curuæ sunt, quæ non conueniunt *Lotus* maiori
corniculata, de qua hęc agimus : præterea *Melilo-*
ti vulgaris alia species Celsalp. in veteribus æ-
dificiis nascitur : nostra autem inter vepres, & spi-
nas, in sepibus.


Trago fortè vocatur *Meliloti quarta species*,
Sed *Dierte Blee / Vogelwechene*, quæ Serapio-
nis *Melilotus* esse possit. Ego tamen non ausim
asserere Tragum intelligere *Lotus* corniculatæ
maiolem speciem, quamuis id suspicer, & eam
Lonicerus quoque suâ figurâ demonstrat. Est
Trifolium corniculatum Dodonæo tertium, de quo
Tragus. Gesnero *Lotus altera maior hirsuta & ere-*
cta, gustu adstringenti.

In Dumetis & sepibus provenire, solet inter
Montbelgardum, & *Souchant*.

LOTUS CORNICVLATA SILIQVIS
singularibus, vel binis, tenuis.

Descriptio.
Radix.

Caules.



culcus exit singularis tenuis, vnciales & longior.
in cutis cacumine, flos luteus, hians, ex caly-

cibus hirsutis : siliqua pletumque singularis [ra-
tissimè binæ] vnciam longa, teres, semine copio-
sissimo, ad vicenarium ferè numerum, tenui;
Portulacæ pari, ruffo, rotundo, sapore legu-
minoso tersata.

Hanc attulit Gener Cheilerus ex Gallia Nar-
bonensi.

DE MELILOTO VETERVM
in genere.
CAP. XLIV.

Sertula campana, teste Theophrasto, viridis
Squidem nihil : aut siccata plenius olet, & plus
temporis odorata durat.

Melilotus [Meliolotus] optimus est Atticus, & qui
in Cyzico, & Chalcedone provenit, quique Cro-
co simillimus [Crocus] Crocum referens, Corn.]
& odoratus est. Nascitur & in Campania circa
Nolam, in luteis languescentem colorē vergens
[Meliolotus] & infirmo odore. Sed vocem *μυρική*, meli-
lino colore reddidit Cornarius. Nihil enim aliud
(inquit) vult ea vox, quàm coloris similitudinem
in *Meliloto*, ad *Malum Cotoneum*.

Cæterum *Meliloton Sertam Campanicam* Cato
dixit : *Celsum Sertulam Campaniam*.

Ita & Plinius l. 21. c. 9. qui appellationis etiam
rationem reddit, quòd sit in Campania Italicæ
laudatissima. Græcis in *Sunio* : mox *Chalcidica* &
Cretica, vbiunque verò asperis & siluestribus
nata. Coronas ex hac antiquitùs factitatas, indi-
cio est nomen *Sertulæ*, quod occupavit. Odor
eius *Croco* vicinus est, & flos. Ipsa cana placet,
maximè foliis breuissimis atque pinguis-
simis. Et eiusdem libri c. 11. *Melilotus* vbi que nascitur, lau-
datis-
sima in Attica, vbiunque verò recens, nec
candicans, & *Croco* quàm simillima : quanquam
in Italia odorator & candida.

Sertulam ergo Romani veteres dixerūt, quòd
flos eius coronamentis dicitur sit, & quia ex ea
antiquis coronæ & sertæ factitatae sunt : *Cor. nam*
autem *regiam*, quoniam luteis floribus supernè
coronetur.

Duorum portò generum *Melilotum* Auicenna
facit, vnam videlicet lutei floris : alteram can-
didæ. Auicenna autem *Meliloton* eandem cum
Dioscoridis Meliloto esse de viribus ac facultati-
bus amborum testimonium in fine adducendum
ostendet.

De *Meliloto* hæc Serapio. *Alkselmelich* [Al-
chilemelich, corona regia, Ysaac Eben amram]
est herba, quæ habet folia rotunda, viridia, & rami-
culi eius sunt subtiles multum, & folia rara, &
fructus habent vaginas, subtiles, rotundas, sicut
virgæ puerorum paruulorum, & sunt in eis grana
pauca, glauci coloris, rotunda, minora granis
Sinapi. Et quod de ipsa administratur, sunt illæ
vaginæ, cum eo, quod est in eis ex granis.

Hodie verò non omnes Autores eundem ha-
bent *Melilotum*. Quidam enim, teste Cordo,
humistratam *Trifolii* speciem, quæ luteos habet
flores, pro *Meliloto* accipiunt, sed malè. Neque
recens enim, neque sicca aliquam odoris boni-
tatem habet : *Melilotus* verò fragrantissimum
habere debet, præsertim eius succus. Propterea
hunc *Diosc.* cum *Samplicio* inter alias odoratas
herbas describit. Il tamen melius faciunt, qui
Streintlee appellatam *Loti* sive *Trifolii* speciem,
pro *Meliloto* accipiunt. Odorata enim est val-
dè, præsertim quæ luteos habet flores : hi siccati
melius etiam olent. Dicitur hæc à nobis *Trifo-*
lium

lium odoratum, siue Melilotus vulgaris. Tragus etiam Melilotum 7. seu nobilem, siue Meliloti exiguae speciem alteram, & quae quidem ab aliis Melilotis Serapionis accenseri, ipsius tamen iudicio non male ad Hedyfarum, aliàs Securidacam, & Pelecinum stuticem dictum, referri potest, pro Meliloto recipit.

Gefnerus ait Loto pentaphyllo imperitos pro Meliloto abulos. Fuchsius, Meliloti alterum genus, quod Melilotum germanicum vocat, pro vera Meliloto, ob adstrictionem, vsurpandum censet.

Matthiolus Lotum vrbanam, quam & Melilotum officinarum falsam affirmat, nominare videtur. Pro vera Meliloto, Melilotum vulgi, cuius flores officinae pro Meliloto Antiquorum substituant, quamvis praeter colorem croceum, alia nulla qualitas legitimi Meliloti in sit, agnoscit. De his singulis agemus sub Loto corniculata glabra & hirsuta, minore.

Dicit quoque Gefn. Melilotum veram Tiguri in aruis, alibi que locis arenosis praecipue flore luteo, & alteram speciem albo nasci, eamque vulgus Trifolium aureum appellare. De hoc agimus sub Trifolio odorato, siue Meliloto vulgari.

C. Bauhinus Meliloti vulgaris speciem aliam Casalpini habet, quam nos Lotum corniculatam maiorem facimus.

Melilotum porro Aegyptiis dictam Alchimelech, Melilotum verum potius, quam Lotum vrbanam, aut Sertulam campanam dici putat Alpinus. A nobis Melilotus Aegyptia inscribitur.

Melilotum veram, eam esse plantam tradit Matth. cuius flores Germani colligant, ac pro Meliloto passim vtantur, quemadmodum & Bohemi, consultius fortasse, quam Itali. Vocatur haec Melilotus falsa dicta, à nobis Trifolium odoratum, seu Melilotus vulgaris odorata flore luteo.

Melilotum adhuc alium vulgo appellatum, si liquas ferentem incuruas, multi legitimum Melilotum putant; sed haec, inquit Casalpinus, forte ad Melilotum Serapionis reduci potest. An hic Medica nostra silu. surrecta?

Theophrastus Loti nomen æquinoctium esse ait, cum eius genera plura sint, inter quae & illud recensetur, quod Melilotum vocatur, sic enim Casalpinus legendum censet, non Melias sitos, quod Gaza Mel stugum vertit.

De Meliloto Graecorum non inter Trifolia, autore Casalpino, quaerendum est. Serapio tamen inter Arabes Melilotum intelligere videtur Loti genus, quod Trifolium Balsaminum appellatur, inquit enim Herbam esse foliis rotundis, &c. Putauit autem id à Diosc. Melilotum vocari, colore croci, odoratum. Hanc tradimus esse Lotum odoratam, annuam, flore caeruleo.

Herba S. Mariae optime conueniunt, quae de Meliloto traduntur, tum apud Dioscorid. tum Plinium, & Auicennam. Et haec nobis est Mentha Saracenicæ, siue Costus hortensis, de quo H. n. lib. 15.

Niviarum Graecis, Latinis melilotus, Serra & Serrula campana, aliis Corona regis, Germ. Et cinn. Flec, Belg. Wastloet / Gall. melilot, Ital. meliloto & Trifolio Cauallino, Hisp. Corona de rey, Angl. Melilote.

Hodie probatissima, legitimaque Melilotus, si Hist. Lugd. fides habenda, non modò in multis Campaniae locis, sed etiam in Gargano Apuliae monte prouenit.

Tom. II.

Melilotus, auctore Dioscoride, vim habet adstringendi, in inflammationemque omnem emolliendi, praesertim oculorum, vuluar, sedis ac testium, si ex passo decocta imponatur, addicto interdum oui luteo affato, aut Faenugraeci farina, Lini semine, aut Tritici polline, aut denique capitulis Papaueris, Intybove. Sanat & recentes meliceridas per se cum aqua, & vlcera manantia in capite cum terra Chia, & vino, aut galla inuncta. Stomachi dolorem in vino decocta itemque cruda cum aliquo ex antè dictis leuat. Dolores etiam aurium cum passo mitigat succus ex ipsa cruda expressus & instillatus. Denique capitis dolorem ex aceto & rosaceo irrigatus lenit. Meliloto, si Plinius vera dicit, oculis medetur cum lacte, aut cum Lini semine. Maxillarum quoque dolores leniuntur: & capitis cum rosaceo: item aurium è passo, quaeque in manibus intumescent, vel erumpunt. Stomachi dolores in vino decocta, vel cruda, tritaque. Idem effectus, & ad vuluas. Testes verò, & sedem prociuum, quaeque ibi sunt vitia, recens ex aqua decocta, vel ex passo. Adiecto rosaceo illinitur ad carcinomata. Deferuefcit in vino dulci. Peculiariter & contra Meliceridas efficax. Sed animaduertendum vulgatos codices falsò habere lacte, pro luteo oui: diserte enim in Diosc. *ἰὸδ ἀπὸ τοῦ οὐ*, legitur. Copiosior autem, vt Galenus ait, in Meliloto est substantia calida, quam frigida (primi videlicet ordinis calida & sicca, Dod.) habet etiam quiddam adstringens, sed & discuit, & maturat. Vtraque tandem Auicennae Melilotus odorata est, & nonnullae amaritudinis particeps, ac simul digerendi facultatem cum nonnulla adstrictione habens. Quòd porro in Meliloto, vsum sibi vendicent siliquae, & semina, quae in eis continentur, ex autoritate Isaac Eben amram apud Serapionem iam constat. Ex quibus facile est coniecere, inquit Matth. non esse mirum, si emplastrum, quod de Meliloto Officinis dicitur, saepe Medicos fallat, cum in id legitimi Meliloti seminis farina nunquam recipiatur. Quod autem Diosc. Melilotum tradit adstringentem & malacticam vim habere, sciendum est, ait Dod. eam non habere propriam, sed quatenus in inflammationibus, aut aliàs collectos humores discuit ac digerit: nam eatenus, quod durum est ac tensum, emollit, quae proprie non emollitio, sed digestio, & per halitum discussio est, cuiusmodi facultatem *ἰα φαρμάκων* Graeci nominant.

Vires & vltus Inflammatio

Melicerida: Vlcerà capitis, Stomachi dolor. Aurium d'or.

Plin. corrig.

Temperat.

Vfus siliquarum & seminum

Emplastrum

Disc. expliat. Malactica via

MELILOTVS AEGYPTIA ALCHIMELECH vocata.

Super terram expansa planta est, parua, modice repens, serè nihil aut parum in altum se artollens: foliis Trifolii siliquosis, minoribus tamen, floribusque paruis, multis, longis, racemi modo ordinatis, croceis, odoratis, à quibus promanant siliquae paruae, obliquae: semen continentes minutum, rotundum, subnigrum, declinans ad rubrum, odoris non omnino expers, sapore stiptico, cum aliquo amarore.

Descriptio

Folia. Flores.


Siliquae. Semen.

Melilotum autem, Aegyptiis dictam Alchimelech, Melilotum verum potius puto (inquit Alpin.) quam eam plantam, quae Lotus vrbana, aut Serrula campana dicitur.

Synon.

Huius plantae semina tantum apud Aegyptios in vsu sunt. Quae putant il quoad calorem & stringitatem esse temperata, sed siccare, resoluere, ac stipticitate roborare, ex quo ad hepatis tumo-

Vires & vltus Temperam. Hepatis tumo.



Flouitis

Vteri strangulatio

Menfese Ventriculus debilis

res ipforum v-
lus apud illos
est frequentif-
simus: quoniã
line aliqua re-
laxatione di-
gerit & refol-
uit. Ad omnes
quoque dolo-
res, qualcun-
que corporis
partes occu-
pantes, fomen-
tis ex ipforum
decocto vtun-
tur, maximè ad
pleuritim, pe-
ripneumoniã,
& ad hepatis,
coli, & ventri-
culi dolorem:
quibus dolore
vexatis, ipforum decoctum ad libram bis in die
calidum bibunt. Mulieres quoque vteri stran-
gulationibus, flatibus, ac doloribus eo subue-
niunt, præsertimque ex eo etiam in fessioibus
paratis, quæ etiam Pœnugraci, Liniq; feminis-
bus, parata, & Camomeli floribus, efficacius ad
illus, & aliarum partium duros tumores admini-
strantur, atque ad euocandos menses reten-
tos. Ad roborandum ventriculum: & aperiendas
obstructiones venarum decocto summè proficuè
vtuntur.

LOTVS SILIQVOSA FLORE PVSCO

tetragonolobus.

Descriptio

Radix

Caulis

Folia

Flores.

Siliqua

Semen.



Circa con-
trouersiam
longè pulcher-
rima est hæc
Lotus, simplice
radiculâ, pau-
cisq; fibris
donatâ, nitens:
ex cuius capite
complures o-
riuntur caules
cubito longio-
res, interdum
seppates, tere-
tes, huius in a-
liquot alas di-
uili, procum-
bentes ferè.
folia ex certis
internallis ter-
na iuncta, reli-
quis duobus
semper caulem

amplectentibus, vt in Loto siliqvsosa lutea Mon-
speliensium, vel Loto corniculata, sed longè ma-
iora, hirsuta: flores ex foliorum alis, Pili quid-
em formâ, minores, holosericum coccineum,
vulgè dictum faturum. prouocantes: siliqua sel-
quirit. etiam circiter longæ, angulosa, crassifuscu-
læ, quatuor membranis, ceu sagittarum alis ap-
positis donata: in quibus continentur semina
magna rotunda, subflaua, quæ dentibus resiliunt,
sapore Pili.

Lotus pulcherrima tetragonolobus, flore ru-

berimo. *Pisum rubrum* quorumdam Camer. hort.
& Iconum. Lotus siliqvsosus rubro flore, *Pisum*
rubrum O. ling. ri: Semen eius missum Lupini
nomine, licet eius planta Lupino prolix sit dis-
similis: *πυραυανολοβ* nonnullorum, & *πυραυανολοβ*
ο, quem non minus, aptè tamen *πυραυανολοβ* in
πυραυανολοβ fortitan appellare liceret. Aliquoties
ex Italia missum semen *sandalida* appellatione,
Clusio. *Anthillidem* [inquit Anguill.] vocant in
Candia eiusdem. An autem Anguillara hanc in-
telligat asserere non ausim, quia non describit.
C. Bauh. *Trifolium* 60. siue *Siliqvsosum rubrum*.
Ante plurimos annos eum ex semine à me fa-
cto planta in horto E.C. Montb. prouenit, Lo-
tus siliqvsosa, flore fusco denominata descripta-
que fuit, nec antè à me visa, nec à quoquam de-
scripta. Floret Julio, semina matura Augusto. An-
nua planta est. Semina eius missa E.C. ab hortu-
lano Ducis Florentiæ anno 1594. cum in scriptio-
ne *Semina Sandalida* Candiæ.

LOTVS SILIQVOSÆ ALIQVOMODO SIMILIS, Coronopus ex Cod. Cal.



Herba
Stella, si
fides iconi ha-
benda, quæ in
codice Cæsa-
reo reperitur, Descrip-
tione longè differens
planta est à
Coronopo.
Depingitur e-
num in hæc Co-
ronopus, te-
nuibus ac viti-
culosis cauli-
culis, ex recur-
uis cornuorum
pedum digitos
referentibus
siliquis, vt ipsa
figura ostendit.
Cæfareani
autem veteris
Locus

manu- scripti codicis fidem, nobis [inquit Dæd.]
asseruit Bern. Paludanus, qui huiusmodi Co-
ronopus, qualem icon exprimit, à se visum ac
reperit haud longè à Tripoli, & ad radices
montis Libani nobis coram narrauit.

Sed inter nothas Coronopi voces hæc ascribun-
tur. *Νύμφη* [Harenaria] & *ἄσπις* [sanguinaria]
C. Bauh. *Trifolium* 57. facit, & Coronopus ex
codice Cæfareo Dodonzi vocat.

LOTVS ORNITHOPODII siliquis.

VNica ex radiculâ, albâ, duriusculâ, paucis
fibris donatâ, *coliculis* exeunt aliquot, te-
retes, in aliquot ramulos ex sefunciâ inter-
uallo diuisi: ex quorum geniculis folia hærent
quina, quorum inferiora duo superioribus tri-
bus magnitudine cedunt, nullo sapore manife-
sto prædita. Extrema *slofenti* occupant lutei,
quales in Loto corniculata glabra, nigris lineis
striati. Quibus succedunt *siliqua*, ex vno geni-
culo duæ, tres, ac plures, sefunciam, aut ad
summum vacias duas longæ, falcata, compres-
sa,



sa, atro-purpurea, *femina* extuberantias pulchrè exprimentes. Nobis in vnica siliqua ad 14. femina animaduversa.

Lutus alia peculiaris Camer. hnt. Ic. verò Lotus peculiaris siliquis Ornithopodi. C. Bauh. phyt. *Trifolium* sive *Trifolium* siliquis Ornithopodi.

Gener. Cher-leus atulit

Basilèa florentè cum suis siliquis mense Augusto D. Zvingeri in quo semen maturum collegit Septembri. Vidi etiam apud Fratrem Notimberga missam.

LOTVS · SILIQVOSA LVTEA
Monspelienfis.



VT fibris multis oblitam habet radicem, quæ alioqui crassa, lignosa, longa: ita plerum aliquando capitum: folia Loti corniculata, quina, quorum duo cauli adnascuntur, maioratque simul coheret, iam dictæ Loti folia magnitudine vincetia: stipes vnicuique cauliculo in cacumine vnicus, magnus,

luteus, quatuor striis ad latera donatus, ex longo calyce erumpens: siliqua lucretit vnica fecundam longa.

Trifolium genus, à siliquarum magnitudine Monspelianis Lotus *pratensis* siliquosus cognominatum, Clustus. *Trifolium* C. sive *siliquosum* Lotum C. Bauh. phyt. Lotus *trifolium* *pratensis* siliquosa *Monspelienfium*, siliqua, quam Foenugræci maiore, sed reatà, & superius retusa, quibusdam secundum longitudinem impressis striis, Foenugræci flauescens semen, dum maturuit, dissiliente & ostendente, Lob. & Penæ Adu. & Icon. Pl. Quorum figura non placet. In nostra verò sculptor appendicum folia malè præcidit sculpendo. Tab. icon. & Hist. Trifolium siliquosum Schortenslee: & rulum Lotus *trifolium* siliquosa *Monspeliana* Schortsen Steinklee Von Mompelct. Sed vel hæc dux figure vnus plantæ duobus diuersis in locis [quæ à diuersarum plantarum essent] à Compilatore

Taberna posita, palam omnibus faciunt, eum instar nocturæ cæcutire, vt qui imaginariè herbarum figuras, quò plures aliis nouisse videatur effingit.

An porro Polygala Cæsalpini? quæ in maritimis nascitur, similis vulgari Meliloto: latiore folio, molli: flore singulari, in summis ramulis grandi, pallido: siliquam fert longam, & quadrangulam, exiguis feminibus, gustu adstringente.

Genezæ toto anno in horto virens nullo flores protulit, quæ aliàs passim inibi inuenitur florens in pratis mense Maio, etiam Aprilis Monspelisuli, ac quoque Junio Curiz Rhetorum. Basileæ vidi florentem Septembri anno 1595. in horto D. Chemletii. Frequens est autem Clusio, in omnibus Pannoniæ, & Austria pratis, sed Narbonense paulò durius videtur, quod idem quoque asserit C. Bauh. qui non longè à Bruct/ quæ, itur ad Themas Helueticas, collegit.

An Polygala

Locus: tempus


TETRAGONOLOBO LOTO
similis siliqua.

APud Ill. nostram Principem piæ memoriæ inter fructus peregrinos visa hæc siliqua, uncias duas longa, fimbriis ornata quatuor, vt Lotus siliquosa flore fulco: quæ [vt solent legumina] ita conuoluta & contorta erat, vt comòde minus exprimi potuerit. Plum, quod continebat fuit ferè quadratum, rubrum, magno umbilico albicante notatum.

Descriptio

Semen.

TRIFOLIUM ARGENTATVM,
floribus luteis.



Basii huius singularis, lignosa, gracilis, caules fudit palmares & longiores, tenues, hirsutos: folia terna altera parte argenteo nitore splendètia, pilosa: altera verò viridantia: flores cacumini caulium heret magni, lutei, hirsuti, è laciniato villosulo calyce.

Defect. Radix.

Folium.

Florif.

Trifolium 34. Synonyma: siue *asperum* Narbonense luteum.

C. Bauhino phyt. An Lotus *asperior* fruticosa siue *Narbonensis incana* Lob. Obs. & Ic. Pl. Lotus *asperior* fruticosa Lobelii, Hist. Lugd. Lotus *Narbonensis incana* Grauelech wilcar Steinklee / Tabernæ.

An Lotus fruticosa

Locus. & Tempus

In via Monspelio Frontignianum versus, & in monte Seti floret mense Aprilis.

TRIFOLIUM RECTVM MONS-
pellulanum.

TRifolium hoc etiam nonnulla cum Trifolio Descripto, albo Dodonæi habeat compunia, haud dif-

seculter tamen discernitur, caules habet rectos, robustos, bicubiales, ramosos, minus teretes, quam iam dicti Trifolii, imò non nihil angulosos, glabros penitus, aut parum hirsutos: *folia* quina, bina minora, cauli apposita ad pediculorum exortum, reliqua tria extremo hærent pediculo, maiora, quibus folia Trifolii illius albi magnitudine cedunt & rotunditate, superant verò lanugine: *floræ* confertim conglomerati priuatis surculis ex foliorum sinu ortis, corollæ instar penduli, albicantes, inferioris folii rostellis atropurpureo: *siliqua* in orbem radiatæ, numerosissimæ, tenues, 24. interdum, omnium pediculis mediocriter breuibus, in surculi caput coeuntibus, vnciâ breuioribus, teretes, glabræ, fuscæ, *seminibus* refertæ nigricantibus, papauerina æquantibus.

Lotus silv. Diosc.

Lob. & Penz Adv. Lotus silv. Diosc. cuius caules numerosi, bicubiales, à radice lignosâ, fibrosâ: *folia* terna, mollia, rotunda, fusco virore, læua: *floræ* lutei: *vaginulæ* numerosæ, teretes, rubentes, nitidæ, intus semine sinapi pari, cinericio colore. Sapor, qui leguminum quorundam & medicatus. Item Obs. *Lotus silv. Adv. Hisp. Trebol. Sauiage.*

Lotus Libyca.

Hist. Lotus Lugd. p. 509. Libyca Dalech. siue Lotus silv. flore ex albo subrubente, qui cum Loto Diosc. maximè congruere videtur, ita scribentis: *Silv. Lotus*, quam aliqui Lybicam appellant, plurima quidem in Lybia gignitur (sic enim ex græco legendum: *λατὸς ἄγριος, ὃν ἡ γῆ τοῦ Ἰβου* *ἡγεῖται, ἐστὶν αὐτὸ καὶ τὸ Ἰβου*, non vt vertit Ruell. Lotus silv. quam Trifolium minus appellant, absurdè, qui enim planta cubitalis & sæpe maior, ac ob id Trifolia omnia magnitudine superans, Trifolium minus rectè dici posset: caule bicubitali, & sæpe maiore, alis multifoliis, Loto Trifoliz pratensis similibus (non vt Ruell. interpretatur, folis Trifolii pratensis.)

Ruell. reiectus.

Montpelii (inquit Clus.) Trifolii genus reperitur, cubitale aut amplius, & quodammodo fruticans ad læuam pontis Iunenalis, quâ ad Granatensis flumem iter est, ad Ledi fluminis ripam

Oxytriphyllo Lotus silv. Cynisus.

quod nonnulli *Oxytriphylon* Scribonii nuncupabant, aliqui *Lorum silv.* nec desuerunt, quin ter Cytisi genera referrent. Similem potidò, si non eandem, apud Granatensis obseruabam, cubitali altitudine, & multis ramis præditam, per quos secundam nodos, & ramulorum diuercationes sparsa erant terna semper folia, vni petiolo inherentia: flores summis ramis nascebantur, pusilli, candicantes, in globum quodammodo congesti: quibus succedebant cornicula, siue lobi, semen exile, rotundum, nonnunquam oblongiusculum, continentes. Eius autem plantæ duplex erat genus: vnum, candidioribus ramis, & albâ radice: alterum, caule & ramis ex albo purpurascens, similiter & radice, quæ ramena in quibusdam plantis magis rubere videbantur: Granatensis quidam Medicus Lagopum esse volebat, refragantibus tamen notis.

Oxytriphyllo duplex.

Ioannes Placa Professor in Academia Valentina [in quo regno sequentem obseruabam] *Perenipisanam* Arabum vocabat, eamque duplicem faciebat: primam, humidis nascentem, Granatensi similem: alteram, montanam lanuginosamque. Granatensis Mauriani *Enziuar* suâ linguâ appellabant, & ex vtriusque radice, quæ satis crassa, & magnæ ad restrictionis particeps est, præsertim autem ex rubescente, terapium conficiebant ad dysenteriam vtile. Huius semen ex Italia missum

Perenipisana Arabum.

Lori fruticoso nomine, & natæ ex eo plantæ. *Et hæc Clusius.*

Enziuar.

Lotus fruis. vesaj.

Nobilitate & doctriâ insignis Medicus Iac. Vtenhofius misit Montpelio nomine *Trifolii Scribonii*. C. Bauh. phyt. *Trifolium* 46. siue rectum Montpeliensem flore rotundo.

Montepelluli prope aquas. Semen missum Florentiâ per D. Iosephum Cafabonum nomine Trifolii fruticosi Candiz, satum Montbelgardi id horto Ill. C. W. prouenit: erat semen minimum nigrum in parua & tenui siliqua: nos referuamus in olla Hieme reponenda. Ad ripam (ait Hist. Lugd.) Ledi amnis haud procul Montpelio in stagnum maximum defluens visitur. In Angliâ vdis.

TRIFOLIUM ALBUM, RECTUM hirsutum valdè.



Multis hoc Trifolium ex eadem radice stolonibus, rectis, cubitalibus, & bicubitalibus fruticatis, gracilibus, lignosis, teretibus, hirsutis, & ramosis: *folia* canâ lanugine pubescunt, terna, quorundam subrotunda, potissimâ a priora & parua, cum paruis duabus appendicibus: superiora in obtusorem mucronem desinunt, & ex iis quorundam maiora, ad quæ appendices etiam magnæ, ita vt sint quinq; folia, sapore insigniter citra morsum vllum, aliamve asitiam qualitatem adstringente: *floræ* extremis ramulis emicant plures iuncti, positu patulo: singulorum forma, quæ Trifolio Asphaltio, sed color candidus, ex calyce valde hirsuto & viroso: iuxta calyces & flores soliola longa, breues, crassiusculæ supereniunt *siliqua*, coloris spadicei, forma sterconis magni muris caudati: *semen* in iis flauescens.

Lotus siluest. quam copiosam in Lybia gigni tradidit Dioscor. an nascatur in Italia non animum [inquit Matth.] affirmare. Equidem herbam quandam sepiùs vidi ac legi in inculis & pratis nascentem folis Trifolio æmulis, bicubitali caule, quàm plurimis adnatis, luteis floribus, è quibus cornicula prodeunt semine plena, Fœnugreci, modo, odore non ingrato. Sed an hæc sit vera Lotus silv. nondum comperit. Ceterùm turpi erroris notâ inurendus est Matthiolus, vt qui figuram absque descriptione proponit, habet is quidem descriptionem, sed ex Diosc. repetitam, addito luteo florum colore, quam inpositr. com. simul cum figura demit, & substituit Lotum satiuam pro syluestri. Eius pattonus omisâ priore figurâ Lotum etiam satiuam suppositum non factâ mentione prioris iconis. Figura igitur, quam olim exhibuit pro Loto Libyca in multis conuenit cum nostro Trifolio, albo, recto, hirsuto. Alia species est Medica, siue Trifolii peregrini Dodonæo gall. quam aliqui Glaucem [itali s

Deser. C. let.

Folia.

Sap.

Floræ.

Siliqua Lotus Lybica.

Notat. Mark.

G. B. 48.

[talis Gesu. hort. in append.] existimant, alii Anthyllidem, Polygalam alii. Verum Dodonæi iudicio maiorem videtur habere similitudinem cum Oxytriphyllo, à Scribonio descripto. Idem in hist. stum. & in fol. Trifolium candidum vocat: quod studioforum plerique Glaucem, alii Cytisum faciunt, nonnulli herbarii Oxytriphylon. At Scribonii Oxytriphylon à Trifolio bituminoso non differt. Cytisus frutex est. Cum Glauce autem similitudinis quoque nihil, aut exiguum habet.

Lob. & Penæ Oxytriphylum alterum Scribonii, & herbariorum, quorum Icon displicet: siliquæ enim longiusculæ, quales solent esse in Trifolio recto Monspeliano.

Trifolium autem, de quo hic agimus, Valer. Dourez Oxytriphylon Scribonii Lurgi vocabat, uti comperimus eius manu adscriptum. Missum etiam Monspelio per Nobiliss. virum D. Jac. Vtenhouium Medicum, cum hac inscriptione. *Trifolium candidum Dodonæo*. Inter meas plantas Monspellanas inuenio me adscriptis. *Pes leporinus, Glaux quibusdam*. Dedit plantam siccam D. Rentzius, hoc titulo: *Dorycnium Casabona Florentia & in horto Bemb.*

Frater attulit nomine Loti siliquosa collectæ in via Monspelio versus Frontignanum, ei in Phytopinace dicitur Trifolium 62. siue siliquosum villosum. Cur autem hoc Trifolium ei dicatur 62. non videmus, potius erat dicendum 47.

Lotus sili. Matth. appellatur ah Hist. Lugd. An Cæsalp. Glaux, quæ in asperis nascitur, præcipue maritimis?

Generæ nobis in horto prouenit. Abundat teste Lobelio & Pena Monspelii iuxta Gramontiam siluam. D. Agetius attulit ex Italia cum Orbanche adhærente radici.

TRAGOS DVPLEX CÆSALPINO.

Post Trifolia, Medicam, Lotum corniculatam, Glaucem, Polygalamque, Cæsalp. Tragum ponit, eamque duplicem tradit, ita scribens: Tragus in maritimis nascitur: ramulis multis ab eadem radice procumbentibus in terram, lignosis, tenuibus, dodrantalibus: *foliis* pusillis, nigricantibus: in cacumine *strobilus* candicans fert: & *fructus* Glauci similes, sapore vehementer astricto. Alterum genus in totum grandius, bicubitali altitudine: *foliis* Glaucis, latioribus, vtrique sapor acerbus, tum *foliis*, tum *fructui*, qui velut grana Tritici asseruata, & in aculeum, infirmum tamen, definit. Dioscorides hoc nomine vnam numerat: inter fruges alteram, quæ & Scorpius vocatur, in maritimis nascens, pusillus frutex in terram procumbens, oblongus, non magnus, dodrantalis, aut maior: folia autem non habet: in ramis veluti acinos pusillos, rufos, magnitudine Tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente, numerosos. Plinius inquit, Herba Tragos, quam aliqui Scorpion vocant, semipede alta, fruticosa, sine foliis: pusillis racemis, rubentibus: grano Tritici, acuto cacumine, & ipsa in maritimis nascens: alibi eandem Tragion, & Scorpionem vocat, vepem sine foliis, racemis rubentibus ad medicinæ vsum. Sed quod sine foliis traditur, repugnat prædictæ plantæ: At suspicor hanc conditionem adiectam esse propter æquiuocationem, cum Scorpio Theophrasti, quam Theodorus Nepam ve rit, cui nulla folia, nisi spinæ pro foliis habeantur, vt in Asparago, quod Plinius significauit cum de Tra-

gio [Trago] dixit, vepem esse sine foliis, non enim Tragos spina est, sed hoc Nepæ Theophrasti conuenit. Hæc Cæsalpinus, qui quas plantas tradat pro Trago perquirant Lectores. Quam dicit strobilos & fructus ferre similes Glauci, Trifolium album, rectum, hirsutum valde, iudico, Dodonæo Trifolium candidum dictum, de quo præcedenti capite locuti sumus.

Considerandum an primus sit fortè, quod Monspelientes Dorycnium vocant. Nostrum Trifolium rectum Monspellanum dicerem. Tragum secundum Cæsalpini, si responderet fructus, siue feminis descriptio: planta alioqui multam habet affinitatem cum eius Glauce. Neuter potèd Tragus cum Trago Diosc. conuenit, & Plinii, qui bene representatur Hist. n. lib. ii. per vnam marinam, vbi Tragi æquiuocationes.

ABSVS FOLIIS TRIFOLII. CAP. XLV.



Et herba palmarum magnitudine, vel aliquantò maior, foliis Trifoliis, sed rotundioribus, quateris singule ale appennis. Flores paruos, albos, & semina Piri seminibus proxima ferens, quam Prospero Alpino de plantis Egypti, cap. 31. teste, incolæ sermone vernaculo Absus vocant.

TRIFOLIUM HALICACABVM, SIVE veficarium. CAP. XLVI.

Caulis fundit cubito longiores, villosi lanugine obductos, in ramos alternatim ortos, diuisos: *folia* terna, non rarè quaterna, sena, aut septena, hirsuta, ita certè vt extremum folium longè reliqua magnitudine excedat, Oleæ folio maius: ex alarum ortu procedunt pediculi, quorum cacumini insident *strobili* lutei, parui: quibus succedunt insignis magnitudinis turgida vesica, fusca, lanuginosa, semina claudentes duo, teste Dod. Cicer. silua.



Folia septena, hirsuta, ita certè vt extremum folium longè reliqua magnitudine excedat, Oleæ folio maius: ex alarum ortu procedunt pediculi, quorum cacumini insident *strobili* lutei, parui: quibus succedunt insignis magnitudinis turgida vesica, fusca, lanuginosa, semina claudentes duo, teste Dod. Cicer. silua.

Dod. error. terum, Dodonæo missum ab Alphonso Paucio, Acad. Ferrat. Professore. Sed non placet pro hoc apud Dod. poni iconem Ciceris silu. trifolii, ni forte error Typographi, qui posuerit alterum pro tertio.

Dorycnium Inuenitur [inquit Anguill.] planta admodum similis Dorycnio: verum quom nesciam an sit somnifera, non possum illud certò statuire.

Trifol. Hal. cacabum, cu Vesicarium Camer. *Trifolium Halicacabum*, seu *Vesicarium* vulgò dici ait, aliis vetò Cicer. silu. quibusdam etiam, ac satis ineptè Dorycnium. Folia plerumque quaterna, vel quina gerere, vt Loto annumerandum videatur.

Latus C. Bauh. phyt. *Trifolium* 55. siue *Vesicacabum*. Scribit Clus. Trifolii quoddam genus, satis amplius foliis pro plantæ exiguitate, à magnis & membranaceis vesiculis, quibus semen suo pericarpio continetur, appellari.

Locus & tempus. Montbelgardi prouenit mihi in horto Ill. Ex. C. V. Virt. ex semine Francosurto allato, quod adhuc Octobri floruit, & semina protulit.

VULNERARIA RVSTICA.

CAP. XLVII.

*Descr. Radix**Caulis**Folia**Sapor**Flores*

Radix longa, recta, lignosa, sapore leguminoso: caules dodrantes, teretes tenues, hirsuti, nonnihil rubentes: folia pinnata, Galegæ, pinguiuscula, infernè hirsuta, modicèque canescencia, supernè ex luteo virescencia, sapore subdulci & subacri, at que in extremis ramis floribus subiecta sunt, lata

sunt, digitata, oblonga, membranacea: flores in ramulorum fastigio glomerati, luteoli, odore nullo excellent: quorum singuli ex vesicula lanugine argentea, villosa emicant, parui, folio supremo reflexo, sub quo lateralia duo parua, quartum minimum rostrata stamina lutea continentem amplectuntur.

Synon. & Nomina Dod. dicitur gall. *Anthyllis prior*, *Anthyllis magna*, ad *Diosc.* *Anthyllon*, *anthyllon* & *anthicellon* Plinii. *Glauciola* quorundam, à nomine *Glaucæ*, quia *Glaucem* existimant, quamuis non sit vera *Glaux*. Eadem in fol. *Anthyllis Lenti* similis, ab *Auic. Zabara* vocata: qui sic describit.

Zabara Auic. Herba humilis: cauliculi dodrantes: folia Lentis modo, ex pluribus formata, vtraque verò mollia, renui lanugine incanescentia: flosculi in cauliculorum fastigiis lutei, complures, veluti in umbella coniuncti, post quos siliquæ paræ, in quibus semen exiguum, radix tenuis, dutiuscula. Hæc ille, cuius icones propositæ respondent nostræ vulnerariæ rusticæ, verum discrepat eius descriptio, & multò magis gallica. Nec conuenit ea planta cum *Anthyllide* *Diosc.* quod fa-

*Dod. errore**Anthyllis Diosc. nō est*

cilè animaduertent, quibus nota erit planta, cuius picturam exhibet *Dod.* Quænam obsecro similitudo cum *Lente*, qualem in *Anthyllide* requirit *Dioscorides*.

C. In. de hort. Vulneraria Consolida, aut *fideri*. *Vulneraria*, cognomine *ruffica*: quidam Germani inquit simpliciter wänd fraüt in Bernensium agro Gadhel nominant.

Lob. Obl. Anthyllis leguminosa Belgarum, Anthyllis prior *Dod. Glaux quorundam.* Ic. *Pl. Anthyllis leguminosa Belgarum.*

Hist. Lugd. Lotus larifolia Dalech. cui flos *Lotus* priusquam aperiantur subrubentes, cum reclusi sunt lutei. Semen paruum in breuius siliquis. *Anthyllis quorundam maior.* Item alibi *Anthyllis prior* *Dod. Siphodius* aliquid peritici habuisset stirpium, non possuisset figuras & historias vnius plantæ in diuersis locis.

Tab. Lagopodium flore albo weisser *Bartsenflee.* Er ruffus, *Lagopodium* flore luteo, *Geeler* *Tab. Bartsenflee.* Sed *Compiler Tab.* non demonstrat vbi obseruauerit flore albo, nec etiam describit vt oporteat.

Clus. anthyllis leguminosa flore luteo Lobelii, cuius genus purpurascens flore *Fertaria* accipere meminit.

Ponæ in Baldo Glaux Guilandini & Belgis Anthyllis leguminosa.

Vulneraria rusticam, siue *Panaces Chironium læue* denominatum *Gelnero*, & *vulneribus* admodum commendatum, vidi *Geneuæ*, *Lugduni*, & passim in *Germania* flores mense *Mai*: *Montspeli* vidi flore purpureo mense *Martio* delatam ex montibus circa *Gargen*. *Gener Cherlerus* attulit ex montibus supra *Apenninum* in pratensibus quibusdam *Iunio* collectam, flore [vt ait] sanguineo, vel rubro, & ex *Gottardo* flore exquisitè albo. In *Aridis* quidem [vt refert *Hist. Lugd.*] inacris, & sabulosis prouenit, & agrorum marginibus, *Lob. teste*, *Luteriani* agri, *Narbonensis*, *Germaniæ* & *Angliæ*. *Brabantis hortensis* est. *Dod.*

TRIFOLIUM IN GENERE.

CAP. XLVIII.

Trifolium, Triphyllon Græcè, siue Triphyllon plura complectitur genera, [aitunt *Monachi in Mel*] & species & differentias.

Multa sanè [teste *Brunfels.*] Trifoli sunt genera, quorum septem in recepto sunt vsu. Tametsi porro plura passim in pratis ac viridariis Trifoli inueniantur genera, omnibus planè nota, non tamen de his, vt placet *Matthiolo*, tradidit *Diosc. cap. de Trifolio*, sed de eo tantum genere, quod à bituminis odore *Asphaltitis* dicitur, de quo etiam scribit *Gal.*

Innumerabiles auctore *Trago* Trifoliorum inueniuntur species. *C. Bauhinus* verò septuaginta sibi notas tradit.

Trifolium tandem, tradente *Brunfelsio*, pratense olus est, & futuræ tempestatis prænuncium. Notum est etiam, quando album *Trifolium* abundè flourerit, sequenti anno, futuras esse aquarum inundationes. *Sophocles* venosum esse putat, nam in eo serpentes inuenies nunquam. *Fracast. de cont.* *Trifolium* omne ad contagiones valere scribit.

Nos etiam complures plantas Trifolii nominæ do-

ne donatas numeravimus; noquimus. At sane inter se longe distantes, si vel radices solum, caules, folia, flores, & fructus, saporem etiam eorundem & gustum, locum item & tempus, vires denique, temperamentum, & usus, trutinam non vulgari pensivimus. Numeravimus autem sequentes. Foenugracum, Foenugracum silu. Dalechampii. Loti genus edule, *legu. 2. 677* Hon. Bello dictum. Trifolium Aphalites, siue Bituminosum à Diosc. traditum. Et aliud huic planè simile, sed inodorum, siue non fecundum. Trifolium item Americanum. Pro Trifolio insuper bituminoso & Oxytyphyllo quidam exhibent Lotum sativum nobis existimatum; Trifolium odoratum Fuchio. Corn. Lonicero. C. Bauh. Trifol. Caballinum Gesf. Balsaminum Cælapino. Nouimus & Trifolium 48. C. Bauh. de quo nos sub Loto silu. ex codice Cæsareo. Trifolium odoratum Matth. quod est Equinum Dodonæo, Vrsinum Trago. Aureum Gesnero, nobis Trifolium odoratum, siue Melilotus vulg. odorata, flore luteo & albo. Trifolio huic præcedenti, siue Melidoto vulg. odorata affinem folio angustiore. Trifolium Italicum folliculis rotundis C. Bauhino, quod nos appellamus Melilotus magno semine, rotundo, rugoso. Trifolium Italicum siue odoratum Italarum Gesneri, à nobis Trifolium Italicum inscriptum, siue Melilotus Italica corniculis incurvis. Est & Triphyllon Securidacæ genus. Ad hæc Trifolium præterse, cum quo Amatus confundit bituminosum siue Aphalites. Et aliud maius purpureum, brevius & longius spica. Maius purpureum Clusii, siue maius secundum. Acre & maculatum, quod in ad præcedentia, vel sequentia, referri possit, nondum nobis certè constat. Alpinum Rheticum Astragaloides *Montanum aliud, minus, Thalis purpureum*, varians flore rubro, & albo. *Stellatum purpureum Monspeffulanum. Angustifolium spicatum. glomerulis Perfonatis Cherleri.* Paruum rectum, flore glomerato cum vnguis. Capitulo glomerato, rigido. Præterse album, siue mas. Maius albo flore incanum Clusii. Præterse, flore albo, minus, & femina glahrum. Paruum album Monspeffulanum, pilosum cum paucis floribus. Albo incarnatum spicatum, siue Lagopus maximus. Idem flore albo. Angustifolium Hispanicum, siue Lagopus angustifolius, flore dilute rubente. Trifolium quibusdam quod vulgè Lagopus dicitur, nobis verò Lagopus trifolius quorundam. Trifolium caule nudo glomerulis glabris & membranaceis, & Lignosum cum glomerulis. Cum glomerulis ex caulium geniculis. Cum glomerulis tomentosis secundum caules. Folliculaceum, siue Vesicarium minus, purpureum. Paruum quoddam, siue Lotus præterse purpurea, Dalechampii. Præterse luteum mas, flore minore, semine multo. Saxatile hirsutissimum, siue argenteum. Pellatum Creticum. Trifolii genus procerum Gesnero est Medica vera, à nobis dicta Medica maior, erectior, floribus purpureis. Nouimus & Trifolium, quod cognominatur Medica silu. flore luteo, & rufo. Trifolium cochleatum marinum, aliis Medicam marinam vocatam. Medicam scutellatam, Dodonæi Trifolium cochleatum primum. Trifolium 19. siue scutellatum C. Bauhino, quæ nobis Medica orbiculata. Cochleatum 2. Dodonæi, nobis autem Medica echinata glabra, cum & sine maculis nigris. Trifolium 20. siue cochleatum C. Bauhini, nobis Medica magna turbinata. Echinatam magnam hirsutam,

siue Medicam echinatam magnam, hirsutam. Cochleatum fructu duro spinoso C. Bauhini, siue Medicam nostram hirsutam echinis rigidioribus. Tortuosum quibusdam dictum, siue Medicam minorem Gesneri: an nostram Medicam echinatam hirsutam. Echinatam aruense secundum C. Bauhini, quod nobis Medica echinata minima. Coronatum, siue Medicam coronatam partum Cherleri. Trifolium siliqua falcata C. Bauh. siue Medicam nostram lunatam. Trifolium 29 Trifolio siliqua falcata simile C. Bauh. siue Auriculam mutis & leporis Cam. Trifolium halicacabum, seu vesicarium. Corniculatum glabrum & minus C. Bauh. vel Lotum corniculatum nostram glabram, seminam: & hirsutam, marem. Corniculatum maius & hirsutum C. Bauhini, quod Loti corniculati maior species à nobis appellatur. Lotum corniculatum siliquis singularibus, vel binitis, tenuibus Cherleri. Si quosdam luteum C. Bauh. quod Lotum siliquosam luteam Monspeffulanum vocamus. Siliquosum rubrum eiusdem dictum à nobis Lotus Siliquosa flore fusco tetragonolobus. Trifolium 57. C. Bauh. quod nominamus Loto siliquosa aliquomodo similem Coronopum ex codice Cæsareo. Trifolium siliquis Ornithopodii C. Bauh. de quo agimus titulo, Lotus Ornithopodii siliquis. Trifolium argentatum floribus luteis. Trifolium rectum Monspeffulanum flore rotundo C. Bauh. hoc nobis Trifolium rectum Monspeffulanum. Trifolium asperum Narbonense luteum C. Bauhini. Candidum Dodonæi, quod nos album, rectum, hirsutum valde dicimus. Acetosum, siue acidum flore albo & purpurascens, quod Oxys appellatur. Acetosum flore luteo, à nobis Oxys lutea nuncupatum. Trifolii maioris & fecidi nomine, semen Anonidis non spinosè, purpureo flore, Clusio missum. Aculeatum Creticum. Hepaticum, siue Trinitatis herbam flore cæruleo, multis aureum dictum. Hepaticum flore albo. Hepaticum flore rubro. Hepaticum flore pleno. Trifolium palustre. Fragaria certè, si Tragum sequimur, *Trifolium dicimus.* Porro Foenugracum silu. nobis nominatum, Lotum silu. iudicamus Diosc. quam & Trifolium minus nuncupat Tragus. Sed inter Trifolia etiam recensetur, Melilotus 5. Tragi. Ceruinum aquaticum Gesneri. Adulterinum. Bassi harsilce Aretii & Iosephi Simleri de albis. Nuce fruticea & Trifolium apud Diosc. de Maiorana quoque dicitur, quemadmodum & de Medio. De Orchide [albo, calcari longo] & staphide agria Monachis in Mel. & de Satyrione Fuchio de comp. med. Tulipa demum quibusdam, Camer. hor. teste, Triphyllum Satirium vocatur. Trifolia tandem arbores & frutices traduntur Hist. n. g. tom. 1.

chinata magna hirsuta Medica lunata Auricula mutis & leporis Cam. Lotus corniculata glabra & hirsuta Lotus corniculata minor spec. cies Lotus siliquosa flore fusco tetragonolobus Coronopum ex cod. Cas. Lotus Ornithopodii siliquis Trifolium rectum Monspeffulanum Trifolium album rectum hirsutum Galde Oxys Anonis Fragaria Foenugracum silu. Trago Maiorana. Medum Orchis albus calcari longo Tulipa Arbores fruticea

FOENUGRÆCVM

CAP. XLIX.

IN Trifoliorum classẽ cooptandum meritò Foenugracum, vel ob *folia* quæ terna, maiusculata, crenata, modò oblonga, modò latiora quàm longiora, supernè virentia, infernè glauca: tota planta inquit Cæsal.] femicubitum non excedit, estque ramosa. *Flores* ex foliorum sinu exeunt Lupinorum floribus pares, subcandidi: *siliqua* siliquis palmares & sesquipalmares, brevissimis pediculis hærenti falcata, muctone tenui, longo, inani

Hh

Themen semen flavescens, odoratum, inæquale, inferiore earum parte continetur ferè quadratum, Castalpin. teste, odore quodam, cum decoquitur medicato, succumque reddens glutinosum, seminis Lini modo: *radix lignosa*, singularis.

Nominata Tella. *Thēris*, & inter Diosc. teie & taneas appellationes *Thēris* [forte *Thēris* vt Plin. Jalis *Thēris*, *Thēris* alius, alius *Thēris*, alius *Thēris*, Romanis Fœnugræcum. Aegyptiis autem *Thēris* dicitur. Sed maior pars Græcarum appellationum à siliquarum est similitudine sumpta: hæc siquidem corniculis similes sunt. Coracitis quidem simpliciter à cornu dicitur. *Thēris* enim cornu significat. Sic Agoceros à caprino cornu quemadmodum à bubulino Buceros, quod nomen Theophr. huic plantæ indidit. Fœnugræcum porro, quod Diosc. *Telin* vocat, Plinius Siliicam dicit. Columella à bique alio attributo Siliquam, Varro Siliulam.

Epiceron Caterum Loto sili. semen simile Fœnugræco [*Thēris*] Diosc. adscribit, sed multò minus: folia verò circa ramos Loto similia, trifolia, sed minor, & maius dorsum habentia.

Carphos Boton Scribit Hermol. in Diosc. Epiceron ab Hipp. vocari, quoniam semen habeat simile corniculis. Inuenio (inquit porro) & Carpum in nostris, & Græcis Autoribus vocatum. Item Carphon, quasi flosculum, Diosc. quoque dixit Boton vocatum: quidam Lobon (siliquam legendum) non Loton credunt, Ego & Lotum dici posse video. Plinius Anonim similem Fœnugræco, Diosc. Loton scenariæ, aut Rutæ faciunt, vt æstimare liceat, Lotum scenariam cum Fœnugræco eandem videri, aut persimilem.

Lotum fanaria Sed quid de hac re Corn. Quod Plinius inquit, Fœnugræcum Carphos vocari dicit, videtur etiam Diosc. agnoscere, si *Thēris* [*Thēris*] & non *Thēris* legatur. Buceras autem, & Agoceras appellationes sunt Hippocraticæ, velut Galenus in glossis testatur, & lib. de alim. vbi quomodo in cibum veniat, exponit, Non modò Telin, inquit, sed etiam Buceras, aliqui verò Agoceras, nominant hoc semen, Nostri hodie cibum Fœnugræci ignorant, sed medicum vsum retinent officinæ, maximè Chirurgorum, qui partim Latinâ voce corruptâ appellant, partim ad Græcæ vocis similitudinem Bockshorn nominant. Vulgus tamen Sibengercit vocat, quomodo alii Lotum fatinam appellant.

Synonyma Linguarum Dodon. Tragus, Lonic. & Cordus, singularis præter hæcenus recensita nihil asserunt, quemadmodum etiam Anguillara, cui Fœnugræcum fatinâ dicitur: Gesn. & Castal. Est siquidem hodie adè notum Trifolium Fœnugræcum, attestantibus id Lob. & Penâ Adu. vt qui Lotos norit, neminem latere possit, quodd duntaxat differte videtur siliquâ, quâ maiore est, magisque adunca, & acution stylo. Item Obs. & Ic. Pl. Fœnugræcum.

Satio Siliqua, teste Plinio, scarificatione feritur, non altiore quatuor digitorum sulco, quantoque peius tractatur, tantò prouenit melius. Rarum dictu, esse aliquid, cui proste negligentia. Satum

Montelgard: Fœnugræcum in horto E. C. facile prouenit. Genevæ, & non longè à Montpelio, vbi copiosè à multis feritur, vidi flores No-uembri, & ex semine deciduo virens totâ hyeme ad mensè Ianuarium, quo mensè quoque florebat Lugduni in horto Pharmacopæi Verdau. Florens præterea obseruati Aprilis principio, & cum siliquis Maio.

Siliquis, vel Fœnugræco, vt refert Benzo, abundat regio Peruana, ita vt vinum etiam inde conficiant, quod bihunt.

Farina Fœnugræci molliendi & diffundendi vim habet. Trita verò cum aqua multa cocta imposita, ad internas & externas facit inflammationes, Cum nitro verò & aceto trita imposita, splenem minuit. Decoctum ad inaccessus commodum est, in muliebribus affectionibus, cum inflammatione, aut præclusionem vteri consistunt. Expressus ab ipso in aqua cocto succus, capillos & furfures, & achoras, manantia capituli vlcera repurgat. Cum asferino ad pe pessi vice apponitur, molliens ac dilatas locos circa vterum, Viride Fœnugræcum cum aceto, debilibus & exulceratis locis commodum est. Decoctum verò ipsius ad egerendum inanes alui contentiones, & od graueolentes egelliones dylen-tencas prodest. Quod autem sit ex ipso oleum, id cum Myrto ex capillis repurgat, & cicatrices in pudendis extertit Diosc.

Vis eius [inquit Plin.] siccare, mollire, dissoluere. Succus decocti seminarum malis pluribus subuenit, siue duritia, siue tumor, siue contractio sit vuluæ. Lotu & irfuso prodest. Furfures in facie externat. Spleni addito nitro decoctum & impositum medetur. Item ex aceto. Sic & tetionon decoctum. Diodes difficilè patientibus [instante partus tempore Dalech.] semen eius dedit acetabuli mensurâ, tritum in nouem cyathis sapæ, vt cum tertias partes bibulissent, calidâ lauantur: & in balneo sudantibus dimidium ex relicto iterum dedit, mox à balneo reliquum, pro summo auxilio. Farinam Fœnugræci cum

Hordeo, aut Lini semine decoctam aqua multa contra vuluæ cruciatus subicit. Item impositum imo ventri. Lepras, lentiginis, Sulphuris pari portione mistâ farina curauit. Nitro ante præparatâ cute, Sæpulis die illinens, perungitque præcipiens. Theodorius Fœnugræco miscuit quartam partem purgati Nasturtii acerrimo aceto ad lepras. Damion Fœnugræci semen acetabuli dimidia mensura cum sapæ & aqua nouem cyathis ad menses ciendos dedit potu Nec dubitatur, quin decoctum eius vtilissimum sit vuluis, interaneisque exulceratis, sicuti semen articulis atque præcordis. Si verò cum Malua decoquatur, postea addito mulso, potus inde ante cætera vuluis, interaneisque laudatur. Quippe cum vapor quoque decocti plurimum profuit. Alatumque etiam graueolentiam decoctum Fœnugræci semen emendat. Farina porrigines capitis, furfuresque cum vino & nitro celeriter tollit. In hydromelite autem decoctâ addita xungia genitalibus [tumentibus, in flammâ Dalech.] imedetur: item pano, parotidi, podagræ, chitragræ: articulis, carnisibusque, quæ recedunt ab ossibus, aceto verò subacta luxatis. Illinitur & lieni, decocta in aceto, & melle tantum. Carcinomata, subacta ex vino, purgat: mox addito melle persanat. Sumitur & fortitio è farina ad pelius exulceratum, longamque tussim. Diu decoquitur donec amaritudo definat: postea mel additur. Est ex calefacientibus manifestè (Galenotalem.

Tempore

Vires

Virid. augr. Deco.

Inflam. stione

Aff. di. Lieber. Capu.

Virid. augr. Deco.

Virid. augr. Deco.

Virid. augr. Deco.

Virid. augr. Deco.

Virid. augr. Deco.

autore) eundem vltum ad cibum exhibens hominibus, quem Lupini : prælumunt enim ipsum ex garo, ventris subducendo gratia. Et ad hoc multò magis idoneum est, quam Lupini, vt quod ex propria substantia nihil habeat, quod difficile egrediatur. Editur etiam cum aceto & garo, vt lupini. Et cum vino, & garo, & oleo, plarique Fœnumgræcum edunt, vt Lupinos. Quidam etiam cum pane edunt, & satis hoc ipsius obsonii est, minùs quidem ventrem subducens, sed neque capnt tentans, quemadmodum id quod cum garo editur aliquorum capita tentat: neque stomachum subuertens: quod in quibusdam efficere Fœnumgræcum solet. Succus ipsius cum melle sumptus, ad omnes prauos humores, qui in intestinis habentur, subducendos, est accommodus: suo quidem lentore leniens, calore autem dolorem mitigans. Quòd autem absterforiz facultatis sit pariceps, intestina etiam ad excretionem instigat, sed parcius ei mel est admiscendum, ne mordacitas exuperet. In diuturnis verò thoracis citra febrem affectibus, pingues cum eo palmulas elixare oportet, vbi autem succum ipsum expressum copioso mellis miscueris, ac rursus super carbones ad medietatem crassitiam coxeris, tum de mum longè ante cibum vt. At lib. 3. simpl. Fœnumgræcum, inquit, calidum est ex secundo ordine, siccum ex primo. Et propterea feruentes inflammationes exacerbant: minùs autem calidas, & in scirrhum induratas discutienti curat. Sed hæc Galenus,

Ceterum feminis decoctum maceratis in eo linteolis, & fronti adhibitis, oculorum fluxiones auerit, & non solum capillorum pediculos (Milben) extirpat, si caput hoc ablusum, sed etiam efficit vt pulchriores, & longiores euadant. Semen clysteribus adicit Tragis, quibus aduersum tormina ab exulceratione orta vsurpat.

Germina, teste Prospero de Pl. Ægypti cap. 41. mox à feminibus erumpentia, ex ipsiusque statum profilitentia plebei comedunt, præferuntque mulieres pingue fieri cupientes: per urbem multas massas tertæ plenas feminum recenter productis germinibus vendendas ii ferunt.

Sciendum porò vnguentum ex Fœnumgræco quod præparatur, & nõ à Telo insula, nomèn habet, à Diosc. præparari, quod recipit Fœnumgræci lib. 5. olei lb. nouem: Calami lb. j. Cyperi lb. ij. quæ simul ad dies 7. in oleo macerantur, ita vt ter quotidie commoueantur. Deinde excolantur, & reconduntur. Alii pro Calamo Cardamomum: pro Cypero, Balsami lignum simul macerant. Quidam oleum antea his spissant, & postea Fœnumgræcum in ipso macerantes excolant. Hæcenus Diosc. Plinius autem aliter hoc vnguentum, aut corruptissimè, præparari prodidit, qui dicit: Telinum sit ex oleo recenti, Cypero, Calamo, Fœnumgræco: consentiens quidem hæcenus cum Dioscoride: sed quod addit: Meliloto, melle, & melino, Maro, Amaraco: Corn. ad Telinum pertinere non putat: & quædam exemplaria pro melle & melino, habere mello, nullà certà significatione: & melinum recipi in Telinum, satis absurdum esse. Hodie bene parari posse, sed non haberi. Ceterum vim ei tribuit Diosc. molliendi abscissus, & maturandi, ac concoquendi. Maximè autem conuenire ad omnes circa vterum duritias. Infundi etiam ægrè parientibus, quum excretis antea humoribus loci obaridi fuerint reddet: itemque ad sedis inflammationes. Vtiliter etiam infundi, frustra ad egerendum nitentibus. Fursures quoque & achoras Tom II.

detergere. Et ad ambusta & perniones cum cera. Maculas etiam Solares deterere, & medicamentis ad faciei nitorem inducendum paratis misceri. Eligendum esse recens, & quod Fœnumgræci odorem non admodum referat, & manus purget, & in sapore dulcedinem cum amaritudine repræsentet. Tale enim esse optimum.

FOENUGRÆCVM SILVESTRE

Dalechampii.



M Inus est satiuo, caule tamen do drantali interdu m: folia geit terna, & inter hæc flores per totum caule: corniculatas siliquas multò breuiores, scilicet, recuruo, vacuòque & tenui mucrone donatas, quàm in satiuo tamen latiores, semina quidem continentes minus

Descriptio
Caulis.
Folia.

Flores.

Siliqua

nus: radicem longam, lignosam, sirculosam.

An de hac Anguill. ait: Fœnumgræcum silv. quo in multis locis vtuntur pro Meliloto: Hist. Lugd. Fœnumgræcum silv. Dalechampii.

Gener Chelidius attulit Monspelio collectum in via Frontigniana versus Balleruch, florens Maio & Iunio, Iulio siliquas ferens.

Locus & tempus

TRIFOLIUM, SIVE LOTVS HIERAZUNE, EDULIS, SILIQUOSA.

CAP. L.



Trifolium, Trifolium, aut Loti genus est edule, si non. Bello credimus, in foro enim eius siliquæ, antequam dure scere incipient, venales teperiuntur, à pueris & feminis libentissimè eduntur, succosæ sunt & dulces, Pisi recentis gustu: multos, tenues caules à radice profert, folia trifolia, angusta, crassiuscula, aliquantulum

Folia.

Flores.

mucronata, terna semper sibi coniuncta: flores luteos Pisi, quibus succedunt siliqua rotundæ

salcare, ac pro ratione plantæ, magna; inter segetes inuenitur, & in marginibus agorum frequentissimè, herbaque omnibus nota est. Huius semen Altragalo Monspeliensium non multùm abfimo Clusio videbatur, quod cum aliis ab honorio acceptis terræ commiserat, sed non natum erat & illi, & mihi; habebam enim ego à chariss. Fratre C. Bauhino, quod ab eodem honorio nomine *hieracium in Creta* acceperat. Continebatur autem in siliquis corniculatis, vncialibus, semicirculi inftar incuruis, geminis, còcauà parte canaliculatis, pedicello paruo in foliatum exitum, corniculorum extremum capiente, dependentibus, denso sarctu, paruum, leuiter compressum, quale serè Fœnugraci, sed minus, sapore dulci. Color tum siliquæ, tum seminis ex ruffo obloletus.

hieracium, seu hieracium Cretica, Belli. Lotus Cretica, Calsp. Bath.

TRIFOLIUM ASPHALTITES
sive bituminosum odoratum, & non odoratum.

Locus

Folia

Odor
Tactus
Flores.

Seemen

Huius Trifolii Varietates

Trifolium Asphaliticum acutum odoratum.
Trifolium Asphaliticum Lotus Aegyptus.
Handachochia.
Oleum

Trifolium Asphaliticum



IN fruticem exerescit Trifolium bituminosum, cubitalem & sesquicubitalem, virgulis rigidis, incanis, ac etià nigricantibus, striatis: folia tertra, per primam adolefcentiam rotunda, mox oblongatur, in acuminatum mucronem desinentia, incana itidem & hirsuta, odore bituminis fastidioso, tactu glutinoso.

fo. flores non planè glomeratim congesti, sed oblongiori capitulo dispositi, colore purpureo-violaceo, quorum singuli vnum folium latius furrigunt, duo lateralia replicant: quorum complexu quartum comprehenditur apiculos luteos continens: ex calycibus oblongis, striatis, villosis: seuen rigrum, asperum, hirsutum, in cuspidem deiniens foliaceum, eiusdem cum reliqua planta odore, Calsp. sapore medicato. Congener huic, totoque aded vultu idem iamdiu color, excepto eo, quòd folia quidem odore omni penitus destituta sunt: flores verò suauiter, licet obscure, redolent.

monachi in Mes. Trifolium Asphaliticum, siue acutum, aut odoratum, præsens Trifolium appellant. Matth. autem Trifolium Asphaltite, & rursus lib. 4. c. 109. Lotum Aegyptiam, quam, vt & reliquas Loti species, Serapio Handachochà indifferenter nominat, & è cuius semine Oleum exprimitur, Mauritanis ad articulorum dolores expetitum. Neque enim fieri ex vulgaris Trifolii semine, vt quidam aberrantes existimarint, sed ex omnium Lotorum semine, & ex eo tantùm Trifolio, quod Asphaltites Græci vocant. Idem

hist. Germ. Trifolium Asphaltites, hartzflœ vocat.

Cast. Dur. Trifolium bituminosum. Bellon. Obs. Trifol. cognominatum Menianthes.

Dodonæus Trifolii huius meminit his verbis: *Trifolium*, & vt Dioscor. scribit *ἑρτελεσμον* Græci nominant, præterque *Μηρανθῆ*: alii *Asphaltion*: nonnulli *κίτριον*: Nicander etiam *τριφυλλον*: Romani Trifolium acutum, aut odoratum: nostra aras Trifolium bituminosum. Auicenna Trifolion est, non autem, vt quidam existimant, Handachochia. Sub Handachochia siquidem nominè Auicenna Dioscoridi Lotos dictas comprehendit. Describit Trifolium istud etiam Scribonius Largus cap. 163. Mirum hinc quòd olim legebat apud Diosc. *ἑρτελεσμον*, nec mentionem faciebant vilam Oxytriphylly Scribonii.

Lonic. describit & depingit, primo anno prouenientem plantam dicens: Lotus, quem Diosc. describit, simpliciterque Lotus nominat, ex alius præcipuus est, diciturque Græcis Trifhyllon, Lat. Trifolium, Dioscor. etiam Asphaltion [*hartzflœ*] ab odore, & Oxytriphylion, ac Menyanthes. Hæcille, qui describendo Diosc. secutus, ait habere folia similia Loto arbori.

Gesl. de hort. Trifolium quoque simpliciter vocari scribit, & Asphaltites [bituminosum] quod cum adustum sit, Oxytriphylum etiam dici mereatur: quamuis hoc aliqui Veterum [vt Plin.] specie distinguant à duabus aliis eiusdem generis speciebus.

Trifolium Asphaltion Turn. Angl. vocari tradit Pidge trifely Clauën.

Lob. & Pena Ad. describunt ac dicunt, Asphalticum seu Menianthes Diosc. Idem Obs. Trifolium Asphalticum siue bituminosum, & Trifolium odoratum Plinii, quod synonymum in le. Plomiserunt.

Camer. hort. Trifol. bituminosum. Gal. lib. de Ther. ad Pison. de hoc Trifolio Asphaltite, siue Hyacinthino. Matth. in epist. Galenum negligentia arguit in legendo Diosc. lib. 3. cap. 106. Ex Sophocle tamen & Simo Medico Plinius idem prædidit, & Aboali cap. 697. cum errore floriss, id quod Scaliger animaduertens exoter. exerc. 153. dist. 10. inquit, hoc non casu, sed sapientis cuiusdam cogitatu productum ad experimentum fuisse. Sed Iul. Alexandr. respondet, librum illum haudquaquam à Galeno fuisse editum, & ob id non esse opus aliquo defensionis genere. At de his inferius agemus.

Hist. Lugd. vnius plantæ duas figuras exhibet: sub titulo Trifolii Asphaltitis, vnam quidem rotundis foliis, alteram verò longioribus.

Tab. communia nomina retinet. Asphalticum Trifolium, inquit Marantha, quod in Campania insignem bituminis odorem habet: in Hetruria transplantatum, nullum profus spirat: quod in causa fuit, vt ibi pro Asphaltite non haberetur.

Textor de peste vulgò Trifolium scetidum nominat.

Trifolium bituminosum Calsp. Dictamnium ab incolis Iluæ propter vites aduersus venena celebratas nuncupari scribit, & à Dioscoride Elicion, quod nos hæctenus apud Diosc. non legitimus.

Casparus Bauhinus Trifolium Bituminosum *ἑρτελεσμον* *κίτριον* & *ασφαλτικόν* nuncupat: ac apud Matthiolum hæc scribit: folia, quæ ante caules prodeunt, rotunda sunt, vt figuræ Matth. minores ostendunt, cum verò caulescit, & adulta est, acumi-

Trifolium
Trifolium
Oxytriphylion
κίτριον
ασφαλτικόν
Trifolium

Lotus

Trifolium
Asphaltion

Folia
arbori
Trifolium
simpliciter
Oxytriphylion
loto

Asphalticum
Menianthes

Galenum
liber

Galenum
liber

Hist. Lugd.
not.

Trifolium
bituminosum
Trifolium
scetidum

Dictamnium
Elicion

Galenum
liber

acuminata redduntur, quare neutquam binæ figuræ retinendæ, vt fecit Herbarii Lugd. auctor, alterum rotundis, alterum longioribus foliis nominans, idcirco vnâ figurâ exprimere volumus. Et rursus in animad. in Hist. Lugd. ait: prior figura prius producta folia exprimit, altera verò cum & rotunda & longa exprimat, seruanda erat, reiecta priore. Nos huic animaduersioni ita respondeimus: Si Matthioli prior icon falsa erat, poterat reici, vel retineri, monendo falsam eam esse: verùm cum non sit falsa, sed bene exprimat nuper natam plantulam, & iam dudum sculpta esset, cur Typograpus Rouillius nactus perfectiorem & plures partes exprimentem, non curasset etiam sculpendam, & vtramque proponendam? Ea etiam quam exhibet C. Bauh. imperfecta est, non enim exprimit prima exeuntia folia, nec posset per eius iconem nouam nouella plantula agnosci, cum ille voluerit vnâ figurâ, vtraque exprimere folia, eccur non fecit, & ita minus mancam habuisset iconem

In agro Lucensi, circa Lunam & Carram di Massa, & vniuersam Hetruriam notissimum. Hyemis frigora apud nos, insit Camer.) fert. Semen ex Italia allatum, terra que mandatum plantam profert foliorum odore bituminoso, Italice nihil vel parum inferiorem. Semen itidem sapore Italicum refert. Sin autem, semen in Germania educate plantæ rursus ferit, statim sapore & odore producta planta deficit. Et vlt hinc patet verissimum illud esse, quod Porta prodidit, è variis nimirum terræ qualitatibus in quassillis varia herbarum genera exoriri, natali solo, colloque familiaria. Sic tophacea terra Asphaltites Trifolium producit, vide mons Neapoli imminens tophaceus, à Galeno Trifolinus dictus est, ex huius Trifolii copia. Nascitur, Hippocrates non huius, sed Hippitatos apud Dodon. ait, locis fragosis, vt Ruellii conuersio habet. In Belgio ac Germania, nusquam suâ sponte, sed in hortis tantummodò satum prouenit, vbi Iulio & Augusto demum mense floret. In maritimis, Cæsalp. teste, nascitur gracili solo, copiosum in Ilua. Ego verò florentem obseruavi mensibus Octobri, Aprili, Maio, & Iunio Monspelii circa Castellneui. In horto præceptoris Fuchsi Tubingæ, & Tiguri apud Gesnerum. Patauii virentem Decembri. Basileæ in horto D.D. Fœl. Plateri, & Theod. Zvingeri florentem mense Iunio, & Septembri cum semine maturo, ob loci sortassis humiditatem: ibi non fert Hyemem, nisi reponatur, nec primo anno caules producit: floret Augusto. In Creta nihil vulgatus.

Semen & folia, auctore Dioscor. in aqua pota, pleuritidi, vtrinq; difficultati, morbo comitiali, in principio aquæ intercutem, his, quæ vtero strangulantur, auxiliantur. Ducunt etiam menses. Exhiberi verò debent seminis vnc. iiii. foliorum vnc. iiii. Opitulatur etiam commorlis à bestiiis venenatis folia trita: cum aceto mullso pota. Quidam narrant totum decoctum fruticis & radicis, & foliorum, si commorlis à serpentibus affundatur, dolores eximere: Verùm si ea aqua, quæ quis curatus fuerit, alii, qui vlcus habet, affundatur, ipsum eadem pati, quæ illi, qui commorli fuere. Quidam etiam in tertiana febre, folia, aut semina tria cum vino bibenda exhibent: in quartana quatuor, velut quæ circuitus febriles exoluant. Ammiscetur etiam antidotis Trifolii radix. At Veteres alii, quod Dod. testatur, non radicem modò, sed & semen ipsis admiscuerunt vt ex plurimis compositionibus. lib. 2. de Antid.

Tom. II.

apud Gal. videre est: Theriacis, videlicet Ælii Galli, Zenonis Laodiceæ, Claudii Apollonii, Eudemii, Heraclidis, Dorothei, & Heræ.

Trifolium Plinius scit credi præualere contra serpentium ictus & scorpionum, ex vino aut posca, seminis granis viginti potis: vel foliis & rota herbâ decoctâ: serpenteque nunquam in Trifolio aspici. Præterea celebratis auctoribus, contra omnia venena pro antidoto sufficere 25. grana eius, quod Menyanthes appellatur, tradit. Multa alia præterea in remediis eius scribit. Sed ipsum contra sententias eorum grauisissimi viri auctoritas mouet. Sophocles enim Poëta venenatum id dicit. Simus quoque è Medicis, decocti, aut contriti succum, insufum corpore, eandem vredines facere, quasi percussis à serpente tradit. Ergo non aliter vtendum eo censuerit, quàm contra venena. Fritassis enim & his venenis inter se contraria erit natura, sicut multis aliis. Item animaduertit semen eius, cuius minima sint folia, vtile esse ad custodiendam mulierum cutis gratiam, in facie illitum. Ita Plinius.

Et hanc sententiam Simi Medici à Plinio adductam [inquit Corn.] habet etiam Galenus in lib. de Ther. ad Pison. Trifolium, inquit, herba quæ Hyacintho similis est, quum Veris tempore prægnans sit, & semen agrestis Cnicus simile habet, si quis tunc ipsam valde decoquat: Deinde morsum phalangii, aut etiam viperæ, eâ aquâ perfundat, sanat ipsum, & statim doloris exortem efficit: Si verò quis in alio non commorlo, sanum locum eodem fomento perfundat, eundem sensum, & eodem dolores, omnes commorlo similes inducet, vt hic effectus reuera admiratione dignus sit, eandem herbam & morsum sanare, & sanum locum bestiarum venenatarum modò male afficere. hæc Galenus. Nec alia est Dioscoridis sententia. Non enim de eadem numero aqua, Dioscoridis verba accipienda sunt: nam hæc res nihil miri exhiberet: sed de ea, quæ eadem specie est, quæ contrariam vim in commorlis, quos lædit: non sine admiratione ostendit. Impudenter itaque Galenus damnatur, velut qui Dioscoridis sententiam non intellexerit, ab his, qui ipsi parum intelligentium stupiditatem hac parte declarant. Gratiam autem habeo pro Galenipatrocínio aliis, qui librum illum inter spirituos referre mallent, quàm pati, vt Galenus hic ex cæcitate dicitur. Siue autem genuinus, siue spurcius Galeni liber sit, non propterea à viro docto, qualis Mæth. videri ambit, tam frivole stupiditatis, aut ignnrantie stigmatem notandus, sed potius fideliter, quod equidem verè ingeniosum virum decet, excusandus fuit, vt qui non simpliciter locum sanum dixerit, sed duntaxat à dicto morsu liberum, quod Galenus his verbis innuit. Sanum locum in non commorlo. Nec locus simpliciter sanus medicamentum tale quod requirit.

Plinio sub- scribit Gale- nus.

Serpe-
ntium
ictus

Plinio sub-
scribit Gale-
nus.

Nec dissen-
siunt à Dio-
scorido

Galenus de
senso contra
Mæth.

Mæth. vt
preb.

Mæth.

Hippocrates [ait Dodon.] Trifolium non solum menses prouocare, sed & factus cum sumptum, tum appositum expellere tradit: Mulier, inquit, si ex partu non fuerit purgata, Trifolium in vino albo bibendum dato, hoc etiam menses educit & factus. Et alio loco: Idem etiam (de Trifolio scribens) appositum menses erumpere facit, & factum eiicit. Cæterum Trifolio, quod Asphaltion Galeno dicitur vis calida & sicca, vt bitumini, vtrinq; tertio ordine, proinde potum laterum dolores ab obstruente iuuat, & vnam, mensesque prouocat.

TRIFOLIUM AMERICANVM.

Descriptio.

Caulis.

Folia.



Trifolio bituminoso simile quoddam reperitur, quod caules fert à radice còplures, rotundos, ramosos, in latus declinantes: folia in singulis pediculis terna, colore in virore subnigra, figurà rotundiuscula, primis & è radicibus exeuntibus bituminosi Trifolii, formà, colore, & odore quoque quadantenus similia, latiora tamen & per ambitus magis crenata, flores in summo ramulorum exeunt, exigui, subcandidi, spicatum digesti, fructus inde rotundi, aliquantulum plani, Aphaces (Viciz latà siliquà, flore luteo) à nobis (inquit Dod.) descripta semini ferè similes. Radix in plures diuiditur.

Flores.

Fructus.

Caterùm Trifolii bituminosi speciem odor grauis, & eius odori haud multum dissimilis, Dodonæo ostendere videtur.

C. Bauh. phyt. Trifolium in. siue Americanum. Tab. Trifolium Americanum Indianischer fleck. Ita & Lob. Obs. & Ic. Pl. & Cam. hort. Hist. Lugd. & Dodonæo Trifolium ex America in Belgium illatum est, vbi Iulio & Augusto floret. Cæsalp. Trifolii quoddam genus latifolium ex America allatum, odore ingrato.

Locus.

Nos Trifolium Americanum primò vidimus Basileæ in horto D. D. Fælic. Plateri. Eius semen Stutgardia accepimus, ferendum Montbelgardii in horto Ill. C. Vviri.

ARBOR TRIFOLIA INDICA.

CAP. LI.

Descriptio.

Caulis.

Folia.



Haud quicquã curans admi- nicula, per se rectà surgit, caule, vel si maus, trunco, quadrato, breuissimis pilis hirsuto: foliis ornata quorù priora exciderant, patre inferiore quoque hirsutis, ternis, angustis, Trifolii bituminosi, ex longo pediculo, saporem manifestum

non animaduerti.

Sata in horto Ill. Prineipis, palmã non multum altior erat Iunij principio.

LOTUS SATIVA, ODORATA, annua, flore cæruleo.

CAP. LII.

Planta est cubitalis, & sesquicubitalis, caule recto, gracili, striato, non nihil angulato, multusalis concauo, inani: folia Meliloti vulgaris, terna iuncta, pinguiscula, per ambitum crenata, longiora quàm lauiora, sapore acriusculo: floribus verò glomeratis, pallidè cæruleis, Trifolii pratensis vulgaris æmulis, minoribus, præcipuè ex pertinaci odoris suauitate quaesita est gratia: quos echinata excipit oblonga capitula, semine miliaceo fuluo referta: radix gracilis, simplex, alba, paucis aucta fibris, rectà ferè demittitur.

Lotus sativa Cordi, Camer. hort. & ad Hist. Matth. Lotus odorata, aut sativa peritus stirpium.

Matth. in com. in Diosc. cum magnis iconibus tam lat. quàm italiciis, & Hist. germ. Lotus silv. siue Lybica, an nascatur in Italia, non audet affirmare, quòd non meminerit, à se ibi eam vspiam visam, Verùm in Bohemia copiosam admodum provenire, floribus in capitulis cæruleis, vocari germ. wilder Steinklee / & Sibengerzet. Et in Epit. ab Arabibus handachocham nominari. Et hæc Matth. Vbi verò Lotus hæc Matth. Spontanea, vel silv. de qua hoc capite agimus, comperiatur nobis nondum constat, nec scimus eut non potius dicatur sativa, quàm vulgaris Officinarum Melilotus, siue Trifolium odoratum vulgare. Olim Matth. dicebat se sæpè vidisse herbam quandam floribus luteis, de qua dubitabat, an Dioscoridis esset. Iconem etiam proponebat: nunc illam plantam reicit, & silentio planè præterit, quasi nunquam vidisset, vel falsa commentus esset: hic silent, silent etiam eius glossatores & patroni.

Castori Lotus silu. sed malè nostro iudicio. Dod. λωτός ημερ. Diosc. & nonnullorum opinor. nuncupatur, Latin. Lotus vrbana, & Lotus sativa, quibusdam Trifolium, nunc & Trifolium odoratum, Gall. Trefle odoriferant, Germ. Sibengerzet / Belg. Scüen gheride cruyt. Fuch. his addit, Officinis simpliciter Trifolium dici. Tragus hoc depingit & describit, dicens.

Scribon. Larg. (Oxytriphylli nomine) plantam hanc depingit. Germ. Sibengerzeyt appellat, propterea quòd singulis diebus septies odorem habeat & toties etiam amittat, quamdiu in horto creuerit. Decerpta autem & exsiccata odorem suum perpetuò retinet, qui certè pluuiosa temporis constitutione, & tempestate imminente multò vehementior est, sic sanè vt totas ades odore suo compleat, quo nomine tempestatum nuncia, German. verò wetterfräut haud iniuriã dici possët.

Sunt porò qui præter omnem rationem huic nostro Trifolio peregrino, Nardi nomen tribuant. Ast Latine aliter appellari non potest, quàm Trifolium acutum & odoratum. Spitzger vnd wolrichender fleck quo de Diosc. lib. 3. cap. 14. Cognominatur à Nicandro in Thera. cis Menianthes & Tripetalon, à Dioscor. verò Cnicion, Asphaltion Oxytriphylon. Columellæ denique lib. 6. cap. 16. Trifolium Symoniarum.

Quotics

Quoties in Galeno, Plinio, Rhase, & Nicolao, Trifolii mentio habetur, toties Trifolium odoratum hoc intelligendum, quemadmodum Manlius rectè docet.

De odorato Latifolio scripturè & Arabes, Serapio cap. 9. & Auic. lib. 3. cap. 343. apud quos hæc illius nomina leguntur: *Handachocham, Lythos, Garchib, & Thuff.* Quod si scripta horum examinauerimus, deprehendemus Trifolium odoratum, domesticam illis esse Handachocham, pratenſe vero siluestrem. Et hæc *Tragus*, cui si verum Trifolium bituminosum cognitum fuisset, hanc plantam nunquam existimasset *Asphaltion* Dioscori. Plinii, Galeni, & aliorum, vt Scabonii. Lectores igitur admoniti sint, ne fideant viribus à Trago huic plantæ tributis, quum sint Trifolii bituminosi: Oxytriphylly quoque nomen non malè conuenit Trifolio bituminolo.

Hist. Lugd. pag. 506. Trifolium odoratum alterum, siue fatium. Et pag. 508. Lotus silu. altera Matthioli. Sed & nimum rudis in re botanica, confarcinat Hist. Lugd. si vellem plantarum cognitionem habuisset, non duas vnus Trifolii figuras pro diuersis exhibuisset.

Plinius Loti fatiæ folijs, Corn. teste, ascriptis, quæ Dioscor. expresso succo attribuit. Officinæ Trifolium odoratum vocant, wolricheiden hæc, alii sibe ngerzeit appellant, quod septies in die odorem mittat.

Consusè sanè Lonic. hæc describit, qui modò Trifolium odoratum, & Lotum fatiuam: modò Trifolium acutum, Plinii Asphaltion, Arabum Andachocham, Officinarum simpliciter Trifolium cognominat.

Gesn. de hort. quam olim malè Lotum silu. esse putabat, nunc Lotum fatiuam, Herbam cascadeam Zigerkraut, Stündkraut appellat. Item Trifolium caballinum in Italia plensque vulgò vocatur. Aliis etiam Triphyllon, Trifolium, & Trifolium minus, Sibengezeit interpretatur, sed falsè.

Robert. Const. apud Amat. in Diosc. Cytisus, Trifolium odoratum esse non potest [vt vult Amat.] quia Trifolium odoratum Herbariis, vt Lonicero, nihil aliud est, quam Asphaltion Plinii, & trifolium Dioscoridis, quod singulis annis emoritur. Ecur stirpium peritus (si diis placet) non obseruauit aliam etiam plantam dici trifolium odoratum, qualis est Matthioli & Amati trifolium caballinum, quod multùm à Loniceri trifolio odorato differt, nempe, quod nostra Lotus fatiua est: malè etiam, vt antè dictum, vocat Asphaltium Plinii, & trifolium Dioscoridis.

Quam rectè porro Anguill. Lotum hunc, in Flandria, & Hispania Balsamum dictum, siluestrem vocet, intelliget is, qui titulum huius capituli vel obiter inspexit.

Mich. Neand. in Physicis, trifolium *Οξυτριφυλλο*, aut *Ασφαλτων* vocat, aut confundit trifolia, nec bituminosum bene olet, quod asserit.

Loti alterum genus peregrinum apud nos 1 talos [inquit Cæsalp.] trifolium balsaminum vocant, ob odoris vehementiam, qui spirat è semine, flore non in spica, sed in rotundis capitulis cæruleo. Serapio hoc intelligere videtur per Mellotum, inquit enim, Herbam esse folijs rotundis, &c. putauit antè à Diosc. ita vocari colore Croci, odoratum. Lob. & Penz, Hortorum odora Lotus, est verior Diosc. Germ. *Sibengezeitkraut.* Belg. *Scüengreyden claiser of fruyt.* Cum arboreis, frutices, & alijs specie, sato Tom I.

cie, fructu, & floribus differentes plantæ Loti dicantur, quapiam bonitatis commendatione, potiùs quàm inter se conuenientia, videtur hæc nomenclatio huic trifolio attributa, quasi quòd cæteris trifolijs excelleret, inque paradisi & lationibus locis otiretur, dictum foret trifolium *λάττω*, siue volupte, & voluptas, à verbo *λάω*, vt sit adlusum ad *λατορδωτος* Vitisleos, & Epithetum apud Homerum, qui vocat roscidum Lotum, Deorum lubescentiam. Proinde coniectura plena fert, veram vrbanam illam, verè dicti Lotum, quæ domi hodie colitur, decerpiturque. Et Obs. Hortorum odora Lotus, Perperàm Trifolium *Asphaltion* Diosc. Fuchſio. Lotus fatiua, siue trifolium odoratum alterum Dodon. Lotus silu. Anguill. & Marth. An Mel Frugum Theophrasti? Angl. *Gardenclaiser.* Hisp. *Trebol Real.*

C. Bauh. phyt. trifolium 45. siue odoratum, vel Lotus hortensis. Quibusdam *λαττω* Theophr. 7. hist. 14. Mel frugum Gaza vertit.

Ponæ in Bald. Lotus siluestr. Anguillaræ & Matth.

In hortis tantùm habui, vt Genevæ ex semine deciuo, florentem Maio & Octobri, virentem Ianuario. Sicuti Lugduni quoque Baileæ, & Montbelgardi quotannis se renouabat. Dodon. authore floret Iunio, Iulio ac Augusto in hortis cum in superiore, tum in inferiori Germania, in Italia, Gallia, ac alijs regionibus fertur, nec spontè prouenit quod Anguillara restatur. Et licet in Baldo reperitur, tamen & ibi primùm sata fuit.

Extractus, ait Diosc. succus addito melle oculorum argemas, nubeculas, *λευκώματα* [albugines vocant] & quæ pupillas oculorum obfcurant, expargat. Vim aurem mediocriter conueniendi, & resicandi possidere Gal. ait, & in caliditate, frigiditateque coniugatione mediam quodammodò, ac temperatam esse. Quæ certè facultates, id attestante Dodonæo, in hoc odorato trifolio conspicuæ sunt. Nostri, pergit Dodon. oleum in quo folia, florèsque odorati huius trifolii macerata, recentia vulnera glutinare tradunt, & ad puerosum enterocælas, bubonocælaque plurimum commendat. Interponitur & arida herba vestimentis, quæ ne à tinea rodantur, defendere putatur. Dodonæus (nescio inquit Cam.) quibus rationibus adductus, existimat haberi posse pro Oxytriphyllo Scribonii, ad venena & morbos pestilentes commendato. Frequentissimè fertur apud Heluetios propter quoddam casei secundarii genus, Claronensem vocant, quod hac potissimum herba condire solent. Vide Gesn. de operib. la. Eius olei vsus est ad corroborandos nervos. Et hæc sua Camer. ex Gesnero desumpsit, qui malè horti sui Medici Dodonæum citat, cum Tragus eadem scripserit, nec vnquam Dod. horum meminerit trifolium hoc in vino decoctum, vt vult Matth. Ger.

melle aut saccharo præparatum; & epotum emollit ac dissoluit omnis generis apostematà, lenitque dolores. Conducit etiam vtero indurato. Cum vino dulci verò, farina seminum Lini, seu Fœnugræci, capituli que Papaueris sunt somniationes, & cataplasmata, vteri, intestini recti, pudendorum tumoribus calidis aptissima. His adiuuant quidam oui luteum, aut oleum commune. Cum gallis autem & creta incoctum, & illitum manantia capitis vlcera sanare traditur. Cum vino coctum & stomacho applicatum dolores sedat. Aceto tandem, & oleo rosaceo permixtum, & admotum, mitigat dolorem capitis

Volupe. Trifolium

Roscida Lotus

Deorum lubescentia

Trifolium Asphaltion

Lotus siluestris

Angl. Gardenclaiser

Hisp. Trebol Real

Locus Tempus

Vires & Virtus

Oculorum vitia

Temperata

Oleum

Vulnera

Doct. reprobata

Caseri

Nervi Camer. test.

Apostematà

Tumores pudendorum

Vlcerà capitis

Cancer
Fulfit lap-
sus.

Macula fa-
cies

Folia.

Elascula.

Semen.
Radix.

Melilotus
maior.

Trifolium
vrsinum.
Genus du-
plex.

Lotus silu.

Melilotus
j.

Aqua decoctum, & oleo rosaceo ammixtum can-
cro medetur. Succus florum expressus, obscuri-
tati visus succurrit. Calidè in aures insuffillatus,
dolores sistit. Perperam adhuc Fuchsius, Hist.
Lugd. hoc notante, trifolii Asphalutis vires o-
mines à Diosc. assignatas, huic trifolio attribuit.
In Belgio, concludit Anguill. & Hispania mulie-
res ex eo oleum parant, quod maculas faciei ab-
stergit, & vtile est matri & calculosis.



TRIFOLIUM ODORATUM SIVE MELLI-
lotus vulgaris flore luteo.



HOminis p-
ceritatem
allegatur, multis alis ru-
bescentibus, trifolio bitu-
minoso nō dis-
similibus: folia
trifoli praten-
sis, vel potius
Loti sativæ,
crenata: stescu-
li in ipica dig-
gesti, foliorum
numero & fi-
tu, vt in Geni-
stæ floribus,
sed valdè exi-
gui, odore sua-
ui, mellito, co-
lore plurimum
luteo, rariùs al-

bo: succrescunt veluti vascula parua, nigra, ma-
gnitudinis Lentis, ex breuibz pediculis, contin-
entia semen luteum, paruum, veluti cornu con-
tortum: radix crassa profunda, plerumque caulibus
productis, pereuns.

Figuram huius Meliloti malè posuit Brunfels.
meo quidem iudicio, nomine Fragariæ. Vulgaris
& maior Melilotus, auctor Tragus, ad Melilotum
Dioscoridis lib. 3. cap. 41. refert, quam ille Zoode-
tem, & Orthanon cognominat. Marcellus &
Manardus Sertulam campanam vocant, Cato
Sertam campanicam, Auerthoes Alchihamelech
hoc est, Coronam regiam appellat. Quibusdam
Trifolium vrsinum, germanicè Berenflee di-
citur.

Cæterùm, huius Meliloti duplex est genus:
Vnum, quod florem spicicum profert lutei colo-
ris, & alterum, flore quidem etiam comans spi-
ceo, sed candidi coloris, quod in Hist. germ. Groß-
gemein Steinflee mit weissen blümlen, Melio-
tum maiorem candido flore nuncupauimus.

Corn. Lotum silu. vocat, de qua Plin. vt etiam
de Lybico nihil habeat, quamque officinæ ex
Meliloti generibus faciunt, ac Groß Steinflee
& Gilden Steinflee vocent. Et sanè, inquit,
Meliloti appellatio, Lotum refert. Et quia nul-
lam præ se fert gustu adstrictionem, inter Meli-
lotos Fuchsi quidem iudicio, rectè connumerari
non potest, idè Saxifragiam luteã, Steimbred
appellatur, dicens: perperam eum officinæ non-
nullæ pro Meliloto vsurpant.

An Monach. in Mef. dist. 11. cens. 328. Trifolium
maximè odoratum, quod vulgò Romæ Tribu-
lum (quasi Trifolium) appellatur, quodque largè
mulieribus, & alius venditur. Ad hanc dubitatio-
nem quid Matthiolus? Trifolium, inquit, odora-

tum, Romanis & Hetrusci vulgò vocant Tribulo.
Hoc equi auidissimè in pabulum suum sequun-
tur: vnde factum est, vt quidam Trifolium equi-
num appellauerint. Florem editalbum, atque
eniam alicubi luteum. Item in com. cum magnis
fig. & in Ital. Lotus vibana: quam eam Trifoli
odoratam plantam esse cenfeo, quam antea Cy-
toidum facebamus, quamque Ronæ vulgò Tribulo
dicunt, & alibi in Italia Trifoglio cauallino, sob cau-
sam dubio procul iamam dictam. Germani hu-
iusce flores colligunt ac pro Meliloto passim v-
tuntur, quemadmodum & Bohemi, consultiùs
fortasse, quàm Itali. Huius Trifolii odorati ne-
que Dioscorides, neque Gal. quod sciam, quic-
quam meminerunt. Non desunt, quid velint
esse plantam, Theophr. Mel frugum appellatam,
quam ipse recenset inter Loti genera. Et iust.
germ. nominatur Lotus vibana, sicut & in Epit-
one: etiam eum addit, Camerarii, & Melilotus
falsò dicta. Hæulle. Qui pro Loto quondam vr-
bana, Lotum corniculatam exhibebat, mutans
nunc sententiam, nec causam indicans.

Ad eundem modum, Senensem fortè secutus
Cast. Dur. Lotum satiuam vocat, quod mini-
mè congruit.

Amat. profectò ad aliorum errores obseruan-
dos mediocriter oculatus, ad suos ipsius talpis
cedos: sic enim clamat. Qui herbam Mauram,
Flauram, vel plantam Leonis dictam, Trifolium
esse putarunt, omninò hallucinati sunt, quum
herba Maura illa dicta, Trifolium odoratum,
Dioscoridis Cytusus sit. In dignoscenda liqui-
dem Cytuso herba multi decepti sunt, ignoran-
tes, quòd vera Cytusus ea sit herba, quam vulgus
Trifolium odoratum, Itali Trifolium caballinum
nominant. Ex quibus palàm sit Amatium ipsum
in dignoscenda vera Cytuso, talpis caciorem ef-
se: Trifolium namque hoc odoratum Cytusus
Dioscoridis non est, quod ex lectione historiz
vtriusque manifestum euadit. Adhæc icon huius
plantæ apud Amatium est lib. 4. cap. 1. sub titulo Lo-
ti siluestris.

Dodonæus Syluam plenam speciebus huius
Meliloti profert: dicitque vocari à quibusdam
Trifolium odoratum: Tr. caballinum: Tr. vrsinum:
Melilotum germanicum: Melilotum officinarum: Cy-
tissum Veterum: Melilotum Auicennæ: Melilotum Ve-
terum: Sertulam campanam, & Coronam regiam.

Malè Lonic. meo iudicio hanc plantam bis
pingit lib. 5. ac primùm quidem cap. 93. nomine
Meliloti Dioscoridis. herbæ regiz, ac Meliloti lu-
teæ. Et rursum c. 94. sub Meliloto alba.

Gesl. de hort. Melilotus vera flore luteo, &
albo: vulgi Trifolium aureum.

Lob. & Penz. Adu. Melilotus germanica &
gallica. Obs. Melilotus germanica, quo nomine
& in Ic. Pl. Tom. 2. p. 43. appellatur, Melilotus
lutea, & alba Auicennæ, Trifolium odoratum
Dodonæi.

Lotus silu. Cæsalp. quæ vulgò Trifuli, & cor-
rupto vocabulo Trifuli vocatur.

Cam. hort. & ad Hist. germ. Matth. Trifolium
caballinum dicitur, quod Bononienses loco verè
Meliloti vsurpent: & Melilotus vulgaris, que po-
tius Lotus sit.

Hist. Lugd. duas icones vnus plantæ ponit.
Primam, p. 507. cui titulus, Lotus satiuæ altera
Matthioli. Melilotus officinarum: Hæc opinio de
Loto nititur duntaxat opinione, non rationi-
bus. Et alteram, p. 511. quæ inscribitur Melilotus
vulgaris, siue Trifolium odoratum Dodonæi.

Thalium Hærc. Trifolium odoratum i. Dod. seu

Tribulo
Cytis
Diosc
ignora
Mellif
gum
Matth
ror.
Diosc
sus.
Dodon
specie
bus
loti
Lonic
Melli
Diosc
Herba
gia.

Melilotus vulg. flore tam citrino, quam candido.

Tablic. p. 407. & Hist. p. 206. Lotus silu. flore albo, neisser: oder wilder Steinflee. Item Lotus silu. 2. precedenti in omnibus similibus, exceptis radicibus magis fibrosis, & spinis caulium. Et rufus Ic. p. 510. & Hist. p. 211. Melilotus vera, Lotus vrbana, Melilotus vrbana, nobilis coronata. Sertula regia. Sertula campana, quibusdam Melilotus laxifraga, & lutea. Arab. *Alabile lene-lich*. Ital. *Melilotro*. germ. *honigflee*/ *gemcin* oder *groß Steinflee* / *Schülein* & *Unser leiben frauen schuchlein*. Passim prouenit, tota Estate ferè floret, flore albo & luteo. Compiler Tab. cui tanquam imperito indulgendum, proponit tres icones vnius plantæ, & nomina tum latina, tum germanica inter se confundit, nec vllam descriptionem exactam exhibet, ac falsè vnam ex suis Melilotis dicit spinosam.

Iconem duplicem Theod. Dorst. habet, sed Melilot non conuenientem

Gefn. de coll. stirp. Trifolium odoratum, quod Math. Cytisum facit, omnino est Lotus. At licet hæc dicat Gefn. ego tamen hanc pro cytiso apud Matthiolum non inuenio.

C. Bauh. apud Matr. & in phyt. Trifolium 43. siue odoratum, seu Melilotus offic. flore luteo, & albo.

In fluuiis, & fluminū ripis prouenit, Cæs. Egø observauit montepelii. Basileæ etiam florentem Ophobii inter horraum Xenodochii & propugnaculum. Copiosè quoque mense Iunio & Iulio ad ripam fluuii Birsæ. Genezæ passim Iunio mense. Adhæc prope Aspath, vnde in hortum Ill. E. C. transituli flore, albo: floret Augusto. Eadem copiosè prouenit inter Sulz & Bollenwiller. Genezæ abundat iuxta *Aruæ* fluuium.

Romæ mulieres Trifolium hoc distillant, pro suffumigiis, & aliis variis odoramentorum lasciuiis faciendis, Monachis in Mel. autoribus. Scit Matth. eius succo oculorum nubecculas deleti. Vsurpatur tota planta vnguentariis, quod odoratam aquam ex ea faciunt, in qua chirothecas macerant, ac lauant. Utuntur [inquit Dodon.] hoc vniuersæ Germaniæ officinæ in omnibus medicamentis, ac compositionibus, pro Veterum vera Melilot. Odonata siquidem est, & nonnulla amaritudinis particeps, ac simul digerendi facultatem cum nonnulla adstrictione habet. Hinc igitur emplastris & cataplasmatibus digerentibus, ac resoluentibus, nec non concoquentibus, tum & acopis omnibus vtiliter admiscetur. Ex huius tandem floribus [teste Cæs.alp.] per distillationem extrahitur aqua, quæ per se quidem nequaquam grata est, at aliis odoratis ammixta, valde gratum & perseverantem odorem spirat.



MELILOTVS MAGNO SEMINÈ rotundo, rugoso.



crenata, nonnunquam & integra: *slofculi* meli- ni, vulgaris Meliloti, veluti in spicam digesti, suae volentes: pericarpia Pisi magnitudine, rugosa, semen modò vnum, modò duo continent.

Camer. inter icones Melilotum hanc depingit, vocatque Italicam. Cui inscriptioni in horto addit, vocari & Melilotum veram, in Maris autem incolis hodie *Malatro*, in Romano agro *Coronellam*, ad imitationem Antiquorum, qui Romæ Sertulam campanam nominabant. An Anguill. Illyricotum *Ditelina*? C. Bauh. Trifolium 54. siue Italicum, folliculis rotundis, quod Norchus, à D. Io. Ostyvaldo Loti vesicariæ nomine habet.

Sata in horto E. C. floret Iulio, semina profert matura Augusto & Septembri, quo mense apparuerunt plantæ: nouellæ ex semine deciduo. Semen huius misit Tossanus Carolus pro Melilotto Hispanica:

semen continet. Aded coactæ breuitatis reperitur interdum, vt palmum non superet, *radice* prolixa, & simplici, cuius picaturam exhibemus.

Vbi collegerit, aut vnde attulerit Gener Cherlerus p. m. non occurrat.

D Vorum canbitorū altitudinem allequuntur, *radice* simplici, rectâ, lignosâ, albâ, gracili: *caulis* angulosus, purpurascens, rigidus, læuis, arcto tubulo peruius, plurimis ramis brachiatus: *folia* tri-gemina, pediculis rubescentibus appenduntur, supremo margine rotundata, leuiterque

Melilot. It. ratica. Melilotus vera. Malatro? Coronella. Ditelina. Trifol. Ita? Lotus 54? caria.

Locus: Tempus

MELILOTO VVLGARI NOSTRATI affinis, folio minore & angustiore.

Angulosos & prolixos caules profert, minores quàm vulgaris Meliloti, diuisione parifolia itidem tergemina, odorata, sed non parum tum longiora tum angustiora, quàm nostratis vulgaris, per ambitum crenata: *flores* lutei consimiles spicati, sed singuli minores: pericarpia circularibus luteis rugosa, singula vnicum

TRIFOLIUM ITALICVM, SIVE
Melilotus Italica corniculis
INCARUIS.

Trifolium



folia

florae

Siliqua,



legum

gura Meliloti Syriacae, & nostra figura displiceat, alterâ icone propinquis ramum ex Lobelio, qui in tabella simpliciter cum magis recurvis sil quis est. Siliquam etiam ex nostra Syriaca separatim, & ramum cum flore eius, quae praeceperit Basilex: in Syriaca, quod monuit Lobelius, siliqua videtur magis curva, falcata. In Italica porro, quod ait idem Lobelius, esse minus falcatas propter degenerationem, asserere adhuc nequimus.

Melilotus,
nota
Trifolium Italicum,
Cornu regiae
Cornu.

Cornu dicit, notam officinis Melilotum herbam & Germanis dicit welscherlee [Italicum Trifolium] quibusdam etiam Coronam regiam. Vetum nescimus in quibus officinis fuerit Italicum Trifolium in usu eius tempore.

Melilotus, Italica

Fuchs vocat Meliloti tertium genus, & Italicam Melilotum, maioris, ut loquitur, discriminis causâ, quam optimam & legitimam arbitrat, scribens ex Italia in Germaniam delatam, flore luteo, odorato, femine in lil qua lunata.

Tragus, not.

Quamvis autem Tragus iconem eandem habeat cum Fuchsio, nomine Meliloti maioris, cuius alia passim species extet, non tamen videtur de eadem planta scribere: siquidem Meliloti

Præcellens est Trifolium, trium, quatuorve cubitorum, & altius interdum, alis multis brachiatum, iisque crassis satis & firmis: folia terna ex brevibus pediculis, Meliloti germanicæ haud multum dissimilia, oblonga, serrata, glabra: è quorum sinu pediculi exeunt palmares, in cacumine comantibus onusti floribus Meliloti Syriacæ luteis, odore fragranti & pertinaci: quos siliqua sequuntur falcata, vniciales, compressæ, striatæ, gemino versus alato pendula.

Fuchsiana nostræ signa non placet, qualem habet Tragus & Dodonæus, qui eam in postrema hist. eam retinet. Ne ergo lectores existiment, nos velle eos prius figure

huius aliam speciem, ne dicam passim, sed hæcenus nullibi, extare animaduerti. Quam ob causam puto illum intelligere Medicæ speciem per suam descriptionem, de qua alio loco.

Geneser appellat Trifolium odoratum in Italia sic dictum, & iudicat Lotum siluestrem, & non Melilotum. Dodonæo Gall. olim vera Melilotus, quæ vlturaretur Romæ, & in Italia, ideoque Melilotus Italica vocata sit, Germ. Italiasche/ aut Römische Melilot, Gall. vray Melilot. Alibi tamen aduersus Fuchsium dicit cum vera Meliloto non per omnia communicare. Fuchsius, inquit, Melilotum Italicam [welschen steins fleck] nuncupat, & cum vera Meliloto conuenire existimat: cum qua tamen non per omnia continet. Siliquæ sunt recurvæ, in quibus semina parua, ac forma Gemis: radicibus firmioribus, longis, tenuibus & fibrosis: è varium & mutabile caput!

Melilotus Syriaca, omnium, quas nouerunt Pena & Lob. huius familiar, optima & elegantissima, quæ è Syriaca Alepo ferri cæpta. Patavii sata, quasi soli fatini oblita, non nihil corniculis minus falcatis, lanatis, & ignauiore odore degenerat. Hanc Obs. describit melilotum Italicum & Patavinum. Trifolium corniculatum alterum Bod. Ic. Pl. Tom. 2. pag. 43. melilotum Italicum & Patavinum. Et precedenti pag. 42. melilotum Syriacæ odoram, melilotum, serratam campanam. & coronam regiam. Miramur nos Lobelium non meminisse Meliloti Italice, cuius mentionem facit Matth. & alii plures, quæ non primum anno 1562. ferri cæpit ex Syria, & degenerauit in Italia, ut Lob. ait, sed longè antè extabat in Gaugano monte, teste Matth. cuius recordatur Fuchsius, anno 1540. Licet porro Lob. lib. Ic. Pl. duos proponit icones, non propterea facimus duas diuersas plantas, quandoquidem ipsemet dicit Italicam & Patavinam ex Syriaca degenerare.

Hist. Lugd. melilotus, siue Sertula campana nuncupatur.

Thal. Harc. Trifolium corniculatum alterum D. d. meliloti maioris certia species Tragi. Figura quidem Tragi, non descriptio autem, Meliloti Italice correspondere videtur, quod Thalus non animaduertit.

Casp. Bauh. phyt. Trifolium 44. siue odoratum corniculis reflexis. melilotus siue Sertula campana Matth. ic. p. 440. melilotus Syriaca odora Lob. part. 2. p. 42. Item Trifolium 52. siue corniculatum 2. melilotus maior Tragi. melilotus Italica & Patavina. Non sciendum erat C. Bauhino Trifolium 52. sed dicendum prout 45. vel 44. Nam & Matthiolus de Italica differens, non separat à Meliloto Tragi, quod iconem attingit.

Is autem in Diosc. vocat melilotum legitimam, seu odoratam, Sertulam campanam, Arabum Alchilemelub, Hilp. Coronam de Rei, vbi figura deest, quam ponit in com. cum mag. fig. & Hist. Germ. welsch steinflee: Boh. Bomaucæ, cognominat. In Epit. verò cum Cam. glossis sigerfräut appellat, quod nomen non placet, cùm alterius plantæ sit.

Vidi Montpelii & Basileæ in horto D. D. Iacob. Zvingeri. Portione nomine Meliloti veta ex Syria Val. Dourez, pulchrâ & integrâ monauit Frater. Probatissima [quod Matthiolo nemo negarit] legitimaque Melilotus non modo in Campaniæ pluribus locis, sed etiam Gargano Apuleiæ monte prouenit. Cuius semen in tenuibus corniculis inclusum nuper Venetia asserri cæpit. Testantur hoc Adu. quæ dicunt: E Syria-

Trifolium
ratum.
sui filio.

Melilotus
Gera
Fuchs

Locus

Melilotus
raunna

Melilotus
riaca
Lob. re

Lob. er

Sertula
pana

Thal.
Trifolium
odorat

C. Bauh.
not.

Melilotus
legitim
M. asser

Locus

Trias Alepo ferri coepta fuit, & coli superiori-
bus, nec antea, annis 1562. & tertio, cuius etiam
culei referti Venetiis, in Martinelli ad Ange-
lum officina, prostant: exiliior, odore Meliloti
Germanicz, vel Gallicz, sed multo fragrantiore,
acin decenniu perdurate. Sata Patavii, degenerat.

SECURIDACEÆ GENVS TRIPHYLLON.
CAP. LIII.



Pedales ha-
bet, graci-
les, sed robu-
stos caules, fo-
liis donatos
ternis simul
iunctis, per ex-
trema latiori-
bus, crenatis,
quibus, veluti
ad caulium artic-
ulos, medio-
eribus inter-
uallis distan-
tes, silique sal-
cata verticilla-
tim apponun-
tur, Meliloti I-
talicz siliquis
pares, dena, aut
duodena, canlem
coro-

nantes, semuncia longiores, graciles, striatæ.
Dalechampio dicebatur Securidacæ genus.


Describit hoc & depingit Hist. Lugd. titulo
Hedydari minimi, cuius radix tenuis, brevis, can-
dida, filios luteus, circa caulem copiosus: semen
ruffum, bipenni simile.

An Dodon. Hist. frum. & Lat. in fol. Fœnugra-
mæ silu. alterum, recentiori ztati Fœnugra-
mæ legitimo similis, flores perpusilli, siliquæ te-
retes, tenues, paruulæ, oblongæ, tres, quatuorve
simul, in quibus semen exiguum.

An Lob. Obs. p. 502. Et ic. Pl. Tom. 2. p. 45. Fœ-
nugram silu. Herbariorum?

In agro Monspelienfi & nemore Gramuntio,
crefcit, Hist. Lugd. In Hispania plerisque incul-
tis locis spontè exire Dod. accepit. ortis hic in
Belgio [ait Lob.] duntaxat quibusdam reperit-
ur, ex Hispania delato semine.

LOTVS SYLV. EX CODICE
Czfareo. CAP. LIIII.



Depingi -
tur caule
recto, foliis
Trifolii, & è si-
nu horum, pe-
diculis flores,
deinde siliquas,
proferentibus,
quæ tenues
sunt, & quàm
Fœnugraci mi-
nores, vt ima-
go ostendit.
Huiuscemo-
di autem silue-
stris Lotus ha-
ctenus inco-
gnita latet, &
non nisi in ve-
tusto Biblio-
thecæ Czfareæ

codice reperitur, annotante Dodonzo.
Hist. Lugd. Lotus silu. ex codice Czfareo, sicut
& C. Bauhino, cui Trifolium 48. quoque dicitur.

TRIFOLIUM PRATENSE, ET LOTVS
pratensis Veteribus, & in genere.

Licet de vulgatissima Loto, Trifolio pratensi,
Veteres particulatim nihil prodiderint, nec
Dioscorides de hoc caput proprium conscripse-
rit, nihilo tamen minus hanc non penitus sicco
pede transit, sed de hac l. 4. c. 107. egisse videtur,
cum ait, siluestris Lotus quam Trifolium minus
appellant plurimum in Libya gignitur, caule bi-
cubitali & saepe maiore: alis multis: foliis Tri-
folii pratensis, &c.

Oxytriphylon (inquit Scrib. Larg.) foliis, &
specie, & numero similis communi Trifolio, nisi
quòd huius pleniora sunt, & sicut eius duorum
pedum interdum, aut etiam amplior conspici-
tur, & odorem grauem emittit, quorum nihil cir-
ca pratense Trifolium inuenitur.

Nostri (inquit Corn.) Herbarii Trifolium
flee vocant, & tria eius genera agnoscunt, quæ
florum colore discriminant, purpureumque, ac
album, & luteum appellant, quæ pratensia sunt.

Alter sanè de Trifolio pratensi Tragus scri-
bit, dicens: Hoc inter omnia Trifoliorum gene-
ra, quæ sanè multa sunt, non solum formâ, sed
& vtu notissimum vulgo habetur. Eius duo exi-
stunt genera, colore duntaxat florum, & magni-
tudine differentia: hoc enim album, illud purpu-
ream fert florem, hoc maus, illud exiguum
censetur.

Sed Trago contrariatur Fuchsius, dicendo,
Tria apud nos pasim in pratis prouenientia
trifolii inueniuntur fastigia: quorum primum:
à floribus purpureis, Trifolium pratense purpu-
reum. Germ. Braun wysenflee, Gall. Trefle pur-
puree. Alterum iudem à floribus suis candidis,
Trifolium pratense candidum, Germ. weyß wy-
senflee, Gall. Trefle blanc, Et tertium luteum,
Germ. Geel wysenflee, Gal. Trefle jaune appel-
lauimus. Quod ad folia ipsa attinet, non admo-
dum differunt: quoduis enim horum generum
tribus constat foliis, quæ in primo sunt latiora
& herbacea, in secundo autem longiora & an-
gustiora, magisque pallescentia, candicantiaue,
in tertio sunt minorâ & rotunda, atque ad Fœ-
nugraci folia accedentia. Sunt qui hoc genus
Lagopum esse putant.

Ceterum [ait Matth.] Trifolium pratense in I-
talia trium est generum, foliorum & florum di-
ueritate differentium. Primum foliis exit subro-
tundis, & amplis: maculosis, longo pediculo
nitentibus, obsequioso, flexilique: floribus in
capitulis sabpurpureis, aut albicantibus, in cau-
liculorum summitatibus emicantibus. Nascitur
in pratis & herbofo solo. Secundum cauliculis
a surgit lentis, obsequiosisque, foliis in vnoquo-
que pediculo ternis, variâ tamen facie perinde
ac bituminosum: namque quædam, quæ ad ra-
dicem sunt, Acetosii Trifolii modo, quod Oxy-
vocatur, tria ex vnicò pediculo emergunt, ac
cordis faciem quadantenus imitantur, cætera ve-
rò longa sunt, & in cacumine acuminata, vt in
Asphaltite: flores in capitulis sunt illi purpurei
in flocci modum. Prouenit spontè in pratis, &
viridariis, & herbofis locis. Tertium, vt primum,
circinatis, sed breuioribus foliis. Distant & flo-
rum color, quòd in vno flores albicant, in alte-

Trifolium

Trifolium coturnac

Trifolium pratense Cornar. differentia

Tragi dif ferentia

Fuchsi dif ferentia

Folius

Lagopum

Matth. dif ferentia

ro rubescant, in tertio lutei spectentur. Pratenſe Trifolium tempeſtates prænuntiat. nam [vt Plin. eſt autor] in hortefcit, & folia contra tempeſtatem ſurgit.

Idem. error. Aduerſaria Trifolii pratenſis triplicem varietatem perhibent, aſt diuerſos colores non oſtendunt.

Cæſalp. porro Trifolium pratenſe vocat, quod in ſænalibus campis, & inter ſegetes ad pabulum iumentorum ſecatur, in firmis caulibus, aut ſtratis in terram, aut procumbentibus: cuius multa differentiæ, magnitudinis, & paruitatis, tum folioſum, tum caulium, tum fruſtulis.

*Turn differe-
rentis* Turn duplex genus tantùm agnoui, dicens: Eſt Trifolium quoddam vulgare in pratis naſcens, flore vel albo vel purpureo.

*Eucharis
erronea* Induſtinus & Euchar. de Trifolio Hec, Triphyllo ſleiſtblüm, Triblar/ heymſchẽnſlee / & wildenſſee ſcribit, non demonſtrans quodnam intelligat, vires etiam confundit, ac pro Trifolio poſita icon, Oxios, ſive Trifolii acidi.

Trifolii in pratis naſcentis, inquit Amatus, tria genera paſſim videntur, alterum foliis rotundis, & magnis: alterum verò acutis: tertium foliis quoque rotundis, ſed minoribus, quæ omnania floribus lacteis, quandoque rubris, nonnunquam verò purpura ornantur. Hæc. in idem Trifolium pratenſe à colore triplici triplex numerat, candidum, purpureum, & luteum.

*Nomina
linguarum* Græci τριφυλλιον ἢ τριφυλλοκαλλιανον γράφουσιν, & non raro λωτὸν τὸν ἐν χορτοκαλλιανον nominant: Latini Trifolium pratenſe dicitur: Ger. dreypfar Hec/ wiſenſlee; & ſleiſtblümer, Belg. Claiçyrn. Angl. herbe treſfolie. Gall. Treſfle, Triolet, & vetere eiuſdem Genus lingua, Trifumarum, vt tradit Marcell. Scriptor antiquus. Ital. Trifolio. Hiſp. Treuol. Hung. Lo here.

*Locis &
tempus.* Naſcitur in pratis, vnde etiam nomen naſtum, ac paluſtribus locis, præſertim iis, qui ſubinde, fluuiali aqua rigantur. Floret Maio & Iunio, ac reliquæ deinde ætatis maxima ſæpè numero parte.

*Vires & v-
sus* Haud dubiè mediocriter concoquendi & exſiccandi vim poſſidet, vt non temerè quidam ex Recentioribus Herbariis tradant Trifolia pratenſia albo muliebri proſtuo mirificè conſerre. Eadem etiam inflammationibus impoſita, eas concoquunt, & ad maturitatem perducunt, Fuchſius. Trifolio pratenſi nihil vtilius pecori veterinariæve ſaginandæ. Id etiam inter palati irritamenta recensent Lobel. & Pena. Refrigerat, exſiccatur partium tenuitate: inflammationes cataplaſmate, ventris tortiones, cæliacoſq; dolores iniectione mulcet, ac exſiccandi & mediocri concoquendi vi menſtruis albis mederi proditur, Lobelius. Aſt conſiderandum an vires à Fuchſio & Lobelio attributæ Trifoliiſ vulgaribus conueniant, ſaltem non conueniant purpuraſcenti, ſive rubenti maculato: folia enim guſtu acria, vt paulò poſt dicemus. Semen & flores ex aqua muſſa, aut vino decocti & ebibiti, vel clyſtere iniecti, in teſtinarum roſiones ac dolores ſedant, & viſcidos, lentosque ad hærentes in teſtibus humores educunt. Ex aqua verò decocti, & ex oleo admoti, duros emolliunt abſceſſus. Ex ipſa verò herba, cataplaſma vtiliter inflammationibus imponitur. Volunt nonnulli Trifolium flore purpureum comestum aut ebibitum, menſes prohibere. Album verò prouocare. Paſcuntur herbam cum boues & iumenta, tum vtiliſſimè vituli, & agnelli. Flores apibus grati ſunt, de his enim vt de Thymo molliſ-

Temperã.

*Semen et
flores.* *Iniectione*

*Abſceſſus
inflammã-
tis*

cant, Matthiolus. Sunt qui Trifolii pratenſis ſuccum, miris laudibus efferant ad oculorum nubes, albis quidem maculis in foliis notati, ad albas, nigris autem ad nigras, Hort. Luſ. Succus in vniuerſum ad cicatrices & vulnera commendatur. Eadem penè obtinet facultates, quas Fœnungæcum, ſed non perinde vſitatum.

*Oculorum
nubecula.
Succus
Vulnere*

TRIFOLIA MACVLATA ET ACRIA.

CAP. LV.

Quandoquidem adhuc minis nobis conſtat, quomodo Trifolium maculatum, & acre, à vulgari & ſequentibus ſi diſtinguendum, ideò caput particulare hoc eis tribuimus, donec diſcrimen meliùs innotefcat. Ex maculis igitur, quæ ad certam claſſem referre ambigimus, primum ſeſe offert Hemorrhoidum, de quo Geſn. horiti, quod circa Lugdunum videtur, ſpecies alia Trifolii pratenſis, maculis nigris. Post hoc eſt & altera ſpecies maior, in collibus & aruis Tiguri frequens, acri guſtu, vt abſceſſu tertio calida videri poſſit. Sed quod ſit Geſneri Trifolium acre, mihi non adeò competum eſt. Frater etiam quod intelligat, me latec. Refert ad Cluſianum poſt dicendum. Trifolium, vt diuinantur Aduerſaria, pratenſe purpureum & album prætalunt, ſæpiùs guttatis & ſcælcatis ſuperficie foliorum maculis. Meminit & Cæſalp. Trifolii maculati, albo flore, à dicendis alieni, de quo ſortitan agimus titulo, de Trifolio albo, glabro, minore, ſæmina.

*Trifol. h.
moribod*

*Trifolium
acre*

*Trifol. g.
tatis ma-
culis*

*Trifolium
maculatis*

Vſus

Trifolium guttatis maculis (inquit Lob. Obſ.) Euphraſie nica ocularibus decoctis & collyriis noſtra ætas feliciter commiſcet.

TRIFOLIUM PURPUREVM VVLGARE.

CAP. LVII.



ECui igno-
tum prato
vulgare iſtud
Trifolium, cui
ex radice craſ-
ſiſcula, ad-
ultiore ſerè, digi-
tali, fibrata, vi-
ticulæ tenues,
ſtriata, partim
hum repunt,
partim ſurri-
gantur; ſub-
hirſuta; ſed de
trium foliorum,
nunc rotundo-
rum, aliàs ob-
longorum, in-
terdum ſpicu-
laris lineis al-
bis notato-
rum, nonnun-
quam obliquis candidantibus ſtris virgatorum,
numero poſitæque notius: Flores autem glome-
rati modò rubent, modò alben, odore non in-
ſuau, guſtanti ſiccitatem offerentes: anno 1607.
menſe Iunio obſeruau Trifolium vulgare pur-
puraſcens in arca paſſim arcis Montebelgard. in
horto & extra urbem habere maculata folia: ma-
culas autem eſſe albicantes, ſemiceulares, ad
cordis

Deſcrip.

Radice

Folia

Flores

cordis formam non nihil accedentes, & folia aliquamdiu masticata acria esse.

Brunsfels. Herb. germ. Trifolium primum, Gemein Hec / Sryblat & Fleischblum à colore rubente instar carnis ad sumum exsiccat. Et Tom. 3. Trifolium maius ubi perperam pro Trifolio purpureo vulgari, apposita icon Melampyri.

Trifolium pratense Fuchsius & Trago. Trifolium simpliciter pratense Lobelio & Tah. quibus addit Thalius vulgare, & alterum flore rubro. Flore purpurascens Lonic. dicitur. Capitulo florum purpureis Gesnero. Purpureum, Lobel. & Penn. Adv. Cæsalp. Camer. Hort. Lus. C. Bauh. cui & Trifolium, i. in phyt. nominatur.

Passim in pratis provenit. Vide paulò antè vires, titulo: Trifolium pratense, & Lotus pratensis, Veteribus, & in genere.

TRIFOLIUM PURPUREUM
maius, folio & spica longiore &
beruore.



AD cubitū & sesquicubitum exercebit caulibus crassiusculis, valentibus, variè diuaticatis: in foliis subinde ludit, interdum femineiam vix excedunt, subrotunda, frequentius oblonga, acuminata, trium vnciarum femineiam latitudine, concinè per ambitū crenata, admodum venosa, crispata, trigemina, pediculo nixa in vaginam valdè laxā pinatam, trium vnciarum, aut longiorem, caulem completentem, desinente, flores rubentes in spicam palmarem & maiorem, satis crassam disposito, sex calycibus in pinnas longas, tomentosas, dissectis.

Tragus vocando Cytisum insigniter labitur. An Hort. Lus. Trifolium montanū pur-

pureum? Clusius in Pannon. describit & Iconem exhibet cum spica breui. In post. verò hist. cum spica longa. Describit & depingit Lonicerus ex Trago, quem citat, & Cytisum silv. Com. II.

lumelle facit, à Dioscor. diuersum: quamuis imple non norit. Lobel. Obs. Lagopus altera, an Cytisum Tragi, & Trifolium magnum Cordi. Dodon. Lagopus maior alter. C. Bauh. phyt. Trifolium 32. siue spicatum, siue pinnata.

Observatum à nobis florens Iunio prope Locus & Champé Geneuæ, & Basilæ in hortu D. D. Fuchsius Plateri. Inuenitur, autore Clusio, non modo in Hamburgensi Pannoniæ monte, & ibi vno Prellenberg, sed aliis etiam Pannoniæ, & Austriæ, Stiriacque montibus, alpibusque pratis & siluis. Floret mensè Maio & Iunio.

TRIFOLIUM MAIUS CLVSII
secundum, non album, sed
rubrum.

TRifolio maiori albo non valdè dissimile est alterum genus, vel amplitudine, vel si ma folia tamen paulò angustiora, & crassiora, qui confectum nascuntur, spica, eaque summo caulis fastigio inhatens, sine vilo petioli vestigio, & quasi inter folia latens, cui plerumque adhaeretur alia breuior, rarissimè tertia: florenti vtridifferunt colore, qui non albus est, sed ruber, & odore, cuius sunt expertes: radices, partibus radiciferè par.

Clus. in Pann. & in sol. Trifolium maius 2. vno maius purpureo flore. C. Bauh. Trifolium 32. siue montanum purpureum maius. Trifolium altera species & maior in collibus, Gesn. hort. Et, maius secundum Clusii, sine icone: variat, folio acuto non crenato, & obtuso crenato.

In Hamburgensi monte & aliis Pannoniæ & Austriæ montibus, Alpibusque pratis, praesertim sicciorebus Viennæ vicinis, tum pariter in Moravia & Bohemia siluis copiosè inuenitur.

TRIFOLIUM MAIUS TERTIVM
purpureum Clusio.

MAiore multò exercebit altitudine, quam plerumque cubitalis est: caules etiam habes crassiores, nodulos: folia ex singulis geniculis alternatim prodeuntia, longa, striataque, dorso magis eminente & elato, laxā quadam veluti vaginā in binas appendices desinente, caulem amplectentia, deinde ternā numero ex eodem petiolo nascentia, superioribus duplò longiora, illis tamen non minùs dura, & per oras denticulata, gustu non nihil adstringente: huic spica oblongior, & maior, elegantissima tubrorum flosculorum è caulis hispidis emergentium serie composita: radicem habet superiorum radici similem, viuacem & singulis annis plures caules proferentem.

Clus. Pannon. Trifolium maius 3. seu maximum flore purpureo. Tragus Grossen geyfflic / & Cytisum appellauit. Lobelius alterum Lagopum nuncupasse videtur. Hæc is, qui in rariorum Hist. post. non ampliùs Tragi Cytisum facit, nec mutati consilii rationem assignat.

TRIFOLIUM MONTANVM
minus Thallo, purpureum.

REnioribus constat cauliculis, & foliis acutè mucronatis, & capitulis etiam, estque flore quandoque purpureo, quandoque candido.

Trifolium montanum minus

Thal. Trifolium aliud montanum, etiam satis vulgare, foliis oblongioribus, acutè mucronatis, minus. C. Bauh. phyt. Trifolium nonum, seu purpureum minus, variat flore albo, & rubro.

TRIFOLIUM ALPINVM RHETICVM
Astragaloides.

Descriptio



Non ita Nobuium albi, quàm summis montium iugis hoc Trifolium, cui radix crassa, longa, in plura capita aliquando diuisa, terram versus comosa, substantià albi, dulci: ex qua pediculi germinant longiusculi, inâ parte vaginam imitati, folia tria, oblonga, vncialia, aut sextantalia, angusta, acuminata, glabra, nbi quis venulis intertexta: inter hæc iurgunt caliculi nudi, enodes, vix foliorum cacumen attingentes, quorum salsigio insident glomerati flores, magni, rari, purpurei, semina Cræcæ minoris, compressum in siliquis lemnicalibus, foliaceâ vaginâ textis.

Flos. Semen

Trifol. alpinum

C. Bauh. phyt. Trifolium 42. siue alpinum minus flore luteo. Io. Pona in Baldo, Trifolium angustifolium alpinum, radice sapore subamaro. Planta admodum rara & perennis, florum colore purpureo, admodum venusto.

Locus & tempus

In Rhetia in monte propè Burmium inueni, florens mense Iunio.

TRIFOLIUM STELLATVM PURPV-
reum Monspell.

Descriptio



Bipalmes, quon planè surrectos, quosdam etiam in terram prociuos fudit ex gracili lignosâ radice caules, totos densâ lanugine obfitos. foliis terna longis nixa pediculis, cordata, tantillùm per oras superiores crenata, penitus hirsuta: florum glomerates diuilli, coloris purpurei, perquam villosis constant calycibus, quorum pinne

Caulis Radix.

Folia


Flo

quàm villosis constant calycibus, quorum pinne

diductæ radiatam stellam repræsentant. Multa habet communia cum Trifolio ex albo incarnato, cui folia non cordata.

C. Bauh. phyt. Trifolium 35. siue stellatum, quod multum similitudinis habet cum Lagopo maximo Lebellii, at diuersum est.

Prouenit Monspellii circa pastulum, vbi florens legitur mense April. Montbelgardii in hortu E. C. ex femine deciduo pullitatis.



TRIFOLIUM ANGVSTIFOLIVM
foicatum.



Commu- C. Bauh. phyt. Gramen 121. siue Alopecurus minus. Item Trifolium 39. siue spicatum angustifolium. Lob. & Pena Lagopus altera angustifolia. Hist. Lugd. p. 432. Alopecurus graminea Dalech. Er p. 442. Lagopus altera angustifolia.

longitudine, aut maior, ex floribus purpureis congesta, in calycibus lanuginosis, pinnas quinque protendentibus.

C. Bauh. phyt. Gramen 121. siue Alopecurus minus. Item Trifolium 39. siue spicatum angustifolium. Lob. & Pena Lagopus altera angustifolia. Hist. Lugd. p. 432. Alopecurus graminea Dalech. Er p. 442. Lagopus altera angustifolia.

Ahundan inueni inter Monspelium & Lugdunum, florens menselunio.

TRIFOLIUM ALBO-INCARNATVM
spicatum, siue Lagopus maximus:



Satis proli- Satis prolixa radice donatum est, gracili, fibrata, caules plures dodiantales, & cubitales, hirsuti, simplices: foliis ex piloso pediculo, vaginâ suâ breui, hirsutâ, caulem complexo, terna, subrotunda, latiorè, quàm longiora, crenata, non cordata, spica duarum aut trium vnciarum floribus constat albis, dilutâ

Locu- tempus

Descrip

Gram- ne Al- ros m- Trifo- catum- 432. p- 442. p- Alope- Locu- Temp-

Descrip

dilatâ purpurâ remittit, ex calycibus admodum villosis, in pinnas quinque desinentibus. Semen maiusculum, subrotundum, lucidum, pallidum, accedens ad Meliloti vulgaris: saporis Pisorum.

Lob. & Penæ Adu. Obl. & Ic. Plant. *Lagopus maximus folio & facie Trifolii pratensis.* C. Bauh. phyt. *Trifolium 36. siue spicatum flore subrotundo.* Dod. in fol. *Lagopus maior folio Trifolii.* Hist. Lugd. *Lagopus maxima.*

Genetæ observati in pratibus prope fluvium *Arve* florens Maio: vt & alibi: Annuâ est planta, ex semine deciduo, siquidem maturo Julio & Augusto. se conseruat.

TRIFOLIUM ANGVSTIFOLIUM HISPANICUM, siue *Lagopus angustifolius* flore dilatè rubente.



Lagopi maioris genus, semine ex Hispaniis accepto natum, cuius iconem ad Clusii mirtetab Jacobus Platea vld vnicum fert castem gracilem, & satius firnum, nodis quibusdam distinctum, & in aliquot ramos diuisum, nascentibus ad singulos nodos, pediculis, satis laxâ sede caulem & ramos ample-

ctentibus, quorum extremis terna insident folia, vt in trifolio albo incarnato, non orbiculata tamen, sed longiuscula, & angusta, carinata, siue dorso elatiore, canescentia instar foliorum vulgaris *Lagopi*: summum rami desinunt in longas calculorum spicas, è quibus emergunt *stipuli* vulgaris floribus similes, & serè concolores, hoc est, dilatè rubentes.

Lagopus angustifolium Hispanicum Clus. obseruare meminit Salmanticensi agro, dum in ea vrbe vivebat, ad vinetorum ageres.

LAGOPVS TRIFOLIIVS QVORVMDAM. CAP. LVII.

Nomen ex argumento spicæ indeptus est, quæ molli villo, cineraceo, purpurascens, leporinos pedes imitatur, *stipulus* albidis & minutis, Scorpioidis, tantillum prominulis, quos *semen* excipit exile, sulum: coliculi palmum, aut sesquipalmum alti: vel etiam spithamei, ramosi, toti canâ lanugine pubent, in quibus hirsuta *Trifolii folia*, vnciam circiter longa, culmum lata, sapore subadstringente, strenuè siccante: *radicula* subest exilis, lignosa, tortuosa, candida, fibrata.

Nostri [inst Corn. Jad Græcæ vocis imitationem] *hasenpörslin* vocant. Aliqui *Farsenflæ* [scilicet *Trifolium*:] Nam huius genus quoddam esse videtur. Apud Hipp. Galenus *Lagopyron* exponit, quæ appellatio, *Triticum leporis* significare videtur. Trago, & *ultima meliloti*.

Tom. II.

tus, alba, & *Locus campestris* dicitur. *Lonic. de-* pingit & vocat *pedem leporinum* & *trifolium humile* *Lagopus* [teste Dodon. gall.] à quibusdam dicitur *Leporis caminum*, *pès leporis* & *trifolium humile*.



addit idem in Hist. frum. & in fol. vocari à nonnullis *lagopyron*.

Hippocratis. At *Lagopyros* non *Trifolium*, sed *Triticum* similis. Iob. & Penæ Adu. *Lagopus genuinus Antiquorum.* *Lagopyrus Hippocrati.* Item Obl. & Ic. plan. *Lagopus Pes le-*

poris. *Lagopus* *Trifolium humile.* Error quæ ruidata

Lagopyrus Hippocr.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

poris. *Lagopus* [inquit *Lacuna*] *Trifolium* annuerata planta, *Herbarius Trinitatis* dicitur. Dubitat *Matthioli* an Germanorum vulgè *Lagopus* legitima sit: Sed quæ tanti dubii necessitas? cur affirmare non audeat? Apud *Amatum* pro *Lagopo* quidem pingitur, verum alia herba, nempe *Tiinitatis*, ibi eo describitur. *Brunfels.* nihil singularis adscribit, sed vulgata retinet nomina.

Hist. Lugd. Lagopus vulgaris Matthioli. Item *Lagopus vulgaris Fuchsii.* Sed cur frustra *Lugd.* contra *Philosophum* entia multiplicat? Cur duas figuras vnus plantæ ponit? Infinitas hac ratione ne dicam *Botanicus*, sed quibus tonforis discipulus icones appingete possit. *Tabern.* *Lagopodium* vocat.

C. Bauh. phyt. *Trifolium 38. siue spicatum humile,* seu *Lagopus.*

Aegyptios Germ. hasenfließ, hasenflœ pötlin, Farsle, & *Farsenflæ.* Belg. *hasen Doortens.* Gall. *pie de lieure,* Castil. *pie de lebre.* Portug. *pe de lebre.* Ital. *pie de lepre.* Hisp. *pie de lebre.* Angl. *hasen foote.* Boh. *Sagecunoha.*

Genetæ viget mense Iunio & Iulio cum flore, *Basilæ* adhuc Octobri in arvis, *Montbelgardi* quoque, ac spontè in horto E. C. Augusto. Non parum huic est adstrictionis: siccitatis verò tantum vt mirum feminis profluuo laborantibus præstet præsidium *Lobel.* Aluum sistit si cum vino bibatur, aut in febris ex aqua: adalligatur & ad inguinis inflammationem *Diosc.* Replet caua. Sunt, inquit *Matth.* & Germanis, qui ea videntur ad detergendam sitim in dysenteria.

TRIFOLIUM GLOMERVLIS PERSONATA: Cherleri.

In humum reclinat palmares caules quos à reptante radice emittit, plures, hirsutos, floribus vestitos ternis iunctis, per extremum latioribus, pilosis: vnicuiusque coliculi fastigii capitulum hæret vnicum, maiusculum, in Personata modum glomeratum, & aristis longis, sed lanugine quadam albicante intertextis, horrens, *stipulus* inter aristas apparentibus paruis, purpureis, basin autem amplectuntur terna folia, magna, squammatim incumbentia subeuntiaque, lata, albicantia, per margines purpurascencia, similibusque striis virgata, & c.

Locus cam. pèstris.

Lagopus, Trifolium humile.

Leporis caminum.

Error quæ ruidata

Lagopyrus Hippocr.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Locus:



TRIFOLIUM PARVVM RECTVM FLORE
glomerato cum vnguiculis.

Descriptio:



neis appendicibus imâ parte amplexis, nixa, breui-
bus interdum, præsertim in summis ramis, hæ-
rentia: flores tum summo caulium fastigio, tum ex
eorum lateribus glomeratim coherent minuti,
vnguiculum auctula imitati, ex calycibus maius-
culis, glabris, striatis, per extrema denticulatis,
duris.

Locus &
Tempus.

Nemausi agens Cherlerus ex locis hispidis &
saxosis euulsi, vbi rarius occurrit. Maio floret:
ingruente æstu, vt alia multa factisic & exci-
catum abit.

TRIFOLIUM CAPITVLO GLOME-
rato rigido.

Descriptio:

Tenuem singularem habet radicem, paucis
fibris donatam, ex qua surgunt caules a-
liquot, dodrantes, subhirsuti, atro rubentes
variè diuiccati: folia terna, longiora, quàm
bellati maioris, tantillùm hirsuta, oblonga, per
extremum rotunda, Lagopi Fuchsi similia: cau-
lum fastigia ornant capitula singularia, glome-

quid Garyo-
phyllatæ aqua-
tica florum
foliis simile
habentia.

Monspeli
in squalidis &
sticis locis circa
Episcopi castel-
lum collegit
Gener Cherle-
rus eidem nuf-
piam alibi vi-
la.



TRIFOLIUM CUIVS CAULES EX
GENICVLIS GLOMERVLOS OBLON-
gos proferunt.



fata, compa-
ctiora quàm,
maioris, Boto-
natiz pa-
ria, sed Barda-
na echinorû
asperitate his-
pida.

C. Bauhin.
phyt. Trifolium
40. siue globoso
flore vocat, de-
pingens hoc
inter Icones
sub numero 6.

Attulit Fra-
ter Monspe-
lio, vbi obser-
uauit copiosû,
flore habes
patuû luteum
Maio circa
Castellum.
nouum.

Locus &
Tempus

Est in quo
Trifolium
hoc cum Tri-
folio paruo,
recto, glome-
rato flore cõ-
ueniat: Est et-
iam in quo
manifestè dif-
ferat. Tenuè
hoc, sed dur-
am & ligno-
sam agit radi-
cem, quæ plu-
res quidem vt
illa emitit
furculos, sed
pedales, tere-
tes, rigidos,
pallidè viren-
tes, & ad sin-
gula genicula

Descriptio

recuruos. Folia quàm in illo altero tantò maiora,
longiora, trigemina, neque cordata, neque fetra-
ta, longiusculis pediculis insidentia, qui ex mem-
branca quadam articulos vestiente appendice
prominent. Geniculis porò capitula etiam obli-
ga denso flosculorum purpureorum agmine sti-
pata insident, quatuor, quinque, aut plura, sed
pro singulis geniculis singula, quorum calyculo-
rum nullis striis donatorum apices recurui, rigidi
interim in acutum fuscunt mucronem, nec ta-
men ita durum, vt spinosum auisim dicere, nullis
item denticulis præditum.

Dedit Frater C. Bauh. qui à Genero
Cherlero accepit Nemausi in incultis
rupetis col-
lectum.

Locus

TRIFOLIUM GLOMERULIS TOMENTOSIS pet caulium longitudinem.

Angulosi & glabri caules: folia terna iuncta, parua, ex oblongo rotunda, glabra, crenata, pediculo donata ferè vnciali, cuius exortu adnata gemina pinna maiuscula, ex lato mucronata, caulem complexu suo comprehendit, indidemque *stipulæ* minuti, palliduli, glomerati oriuntur, quos se-



quuntur glomeruli folliculorum tomentosorum, candicantium, concolorumque. in quorum singulis semen vnum pusillum, rufescens, nitidum, apophysi veluti donatum, quemadmodum in Faenogreci semine animaduertimus.

Ex Iqualdis Gallo-provinciæ quibusdam locis collegit Gener Cherlerus mense Iulio.

TRIFOLIUM FOLLICVLACEVM, SIVE Vesicarium minus purpureum.

Humi fusos producit ex tenui, simpliceque radice caules dodrantes, foliis ornatos ternis, paruis, per extremum obtulis, circumcirca crenatis, pediculo longo appensis: è quorum sinu exit pediculus vncià longior, flores sustinens in orbem glomeratos, paruos, nitentes, quos membrani ex-



ciunt *triverti*, satis laxi, bicorni fastigio dehiscentes. Hæc pulchella planta se per terram spargit, degustata nullum habet manifestum saporè.

De hoc Clus. in Hisp. & hist. post. agit, vocans *Trifolium pratense Salmanticum*, Hispanorum *Trebol de prados*, & simpliciter etiam *Trebol*, quòd ipsi & cætera Trifolii genera sic appellent. Ceterùm folia huic tribuit in ambitu quoque serrata. Quæ occasio, quòd figura Clusii minus placeat, quòd talia in eius pictura non exprimantur, nec folliculi, in quibus semen exile, subrusum, contineri scribit, benè appareant. C. Bauh. phyt. *Tribolium* s. siue *pratense folliculatum*. Lob. Obs. & Ic. Pl. picturam, Clusii descriptioni, vt & nostræ, Tom. II.

mindis commodam habet. Clusii, namque sine crenis proponit: vocat autem *Trifolium pratense Salmanticum*. Tab. *Trifolium hispanicum*.

Ex femine è Belgio misso Genevæ mihi pronenit: floret mense Aprili, estque semen maturum Iulio. Clusio autem totà Æstate floret.

TRIFOLIUM CAULE NVDO GLOMERULIS glabris: Et aliud paruum cum glomerulis, lignosum.

Ex radice crassiuscula caules exeunt simplices, nudi, glabri, pedales: in glomerem florum purpureorum fastigiati, subiectis foliis, exilibus, viridantibus: sequuntur *triverti* folliculorum numero respondentis, laxiusculi, squallidi, veluti nervulis intertexti, albididi, è quorif orificio adhuc



folliculorum prominent reliquæ: *folia* tergemina, glabra, subrotunda, ferè vncialia, pediculo hærent palmari & sesquialinari, è radice.

In vis quibusdam haud ita frequentem, quæ *Locus* & *Nemaus* ad *Guri* pontem pergitur, obseruauit *Tempus* atque decerpit Gener Cherlerus Iunii initio florens adhuc, sed & vel tunc glomeratum.

TRIFOLIUM PARVVM QVODDAM, SIVE Lotus pratensis purpurea. Dalech.

Descriptio

Lotus pratensis purpurea [inquit Hist. Lugd.] radicem gignit gracilem, candicantem, paruum capillatam: *cauliculos* multos, ferè pedales, furculosos: *folia* Loti nunc terna, nunc quaterna, exigua: *flores* in ramulorum vertice copiosos, purpureos. In pratis & humidis locis nascitur.



TRIFOLIUM PRATENSE ALBVM à Fuchio depictum, siue mas. CAP. LIIIX.

Folia huic hirsuta, oblonga, venosa, crenata, terna ex longo pediculo appensa, per *caules* cubitales, simplices, plures ex radice crassiuscula, inque plura capita interdum diuisa: exorti *flores* glomerati, albi, Trifolii pratensis, purpurei, alio-

qui similes. Genevæ variisque aliis in locis observati florentem Augusto, Septembri & Octobri.

TRIFOLIIS AFFINE, QUADRIFOLIUM PHÆUM LOBELII.

CAP. LIX.

Descriptio:

Quadrifol. hortense. Locus quadrifol. Tab. notatur.



Lobel. Obs. Quadrifolium phæum & Ic. Pl. Tom. 2. p. 33. Quadrifolium phæum fuscū hortorum. C. Bauh. phyt. Quadrifolium hortense album. Tab. Lotus quadrifolia Diebleterichster Steinflee. Est mirum dici Quadrifolium, quum in figura Lobelii etiam sint quina.

TRIFOLIUM MAIUS ALBO FLORE INCANUM CLUSII.

Descriptio



Ternis, aut quaternis interdum asurgit virgis aut cauliculis, pediculis, firmis, rectis, teretibus, circa quos nascuntur rara folia, oblonga, angusta, dura, nervosa, carinata, & dorso clatior, terna semper ab vno exortu procedunt ut in reliquis Trifolii generibus, incana, in ambitu veluti dentata, ab radice frequentiora & maiora: flores extremis ramulis, in quos cauliculi separantur, inhaerent parvi, frequentes, conferti, & spicam quodammodo formantes, albo colore, & non nullo odore præditi: radix viua minimi digiti crassitudinem æquans, fusco & dæso cortice recta, longa, aliquot fibris donata.

Clusio cuius descriptionem proposuimus, Trifolium maius primū, seu maius albo flore. C. Bauh. phyt. Trifolium to. siue montanum album.

In pratis siccioribus Metropoli Austriæ Viennæ vicinis, tum in Moravia & Bohemia floret Maio & Iunio.

Trifol. album.

Locus & tempus

TRIFOLIUM PRATENSE FLORE ALBO MINUS, & SEMINA, GLABRUM. CAP. LX.



Contra. Descriptio. Cuori est habitu quàm mas, cauliculis brevioribus, infirmis, per terram sparsis, per quos folia terna, parva, rotunda, glabra, retusa: flores glomerati, minores, ex longioribus appèlli pediculis, coloris albi. Hoc ni fallor, Montebeldardi quadrifolium, & quinque foliū reperitur. Ex hoc genere sus-

pitor paruum, maculans foliis, flore albo, reperitur ad fontem admirabilem in Ducatu Wittembergico: Maculatum etiam est Iulio circa Montebeldgardum. Passim ac spontè provenientem variis in locis observavi.

TRIFOLIUM PARVUM, ALBUM MONSPESSVLANVM PILEOSVM CVM PAUCIS FLORIBUS.

Trifolio nostrati pratensi albo respondet, sed multò minus est, foliis pilosis, floribus albis, duobus plerumque aut tribus simul iunctis: pumila est admodum planta.

Montepeli hoc legimus florens mense Aprili.

TRIFOLIUM PRATENSE LVTEVM MAS, FLORE MINORE, SEMINE MULTO. CAP. LXI.



Apud Alem altitudinem & cubitalem excrevit hoc Trifoliū, caulibus tamen non penitus surrectis, quos à radice albā, minimi digiti crassitudine, fibrosa, sapore leguminoso Pisorum aut Fabarum, euulsu difficili, promittit plurimos, hirsutos: folia hirsuta Trifolii pur-

purei & albi: flores, parvi, lutei, ex multis stoculis minimis, formā (si parva licet componere magnis) Geniste alicuius, aut Coluteæ, congesti, globululum exprimentes, quibus succedunt semina multa, Meliloti officinarum quodammodo similia.

Melilotus

Melilotus minor, Serrula campanica, & Heiner scitlicke Brunfels. melilotus exigua, Trago: medica Dodonæo: Trifolium aruense, Tabern. Trifolium luteum: Gesnero: Saxifraga lutea, Fuchsio. Meminit tantum Trifolii lutei Matthiolus, nec distinguit nisi colore à cæteris. C. Bauh. in renouato addit iconem.

Cæterum, nomina linguarum vſitata, ſunt Gall. Trefle petitiaune. Germ. Geelflee / Geelwifentlee & Klein ſteinflee / Belgicè Cleynſteen Clauern & Cleyn geel Clauern.

Geneuz florens vidi Maio, vbi virebat Hyme: Baſileæ Octobri: Lugduni, & Montbelgardi etiam ſpontaneum.

TRIFOLIUM PRATENSE LUTEUM, ſemina flore pulchriore, ſiue Lupulino.



Cum Trifolio pratensi luteo mari multa habet communia, radicem exilem, duram, cauliculos graciles, hirsutos, folia trigemina, neruola, florem luteum, ſed magnitudine & ſingularium floſculorum formâ differentem, duplè enim & triplè maiores huic ſunt glomeruli. Lupulorum capitula imitati,

minores, contrarioque ſitu ſquammarum, quarum vnaquæque criſtata ſupremum conſtituit floſculorum ſoltum, reliqua tria ſinu ſuo occultans. Huius porò Trifolii pratensis videntur duæ ſpecies: minor paſſim proueniens: altera magna & robuſta ad cubiti altitudinem ſurgens, cum pulchris magnis floribus, in qua femina parua lutea animaduerti. Pulcherrimum hoc Trifolium pratense luteum, magnum & robuſtum, ſeminam uoco.

An forſè Brunfels. Leporina? Thalius trifolium luteum alterum lupulinum, & vulgò lupulum ſiluatium appellat. Caſp. Bauh. phyt. trifolium 4. ſiue pratense luteum, capitulo Lupuli. hort. Luſ. trifolium aruense luteum, lupulinum. Geelwifentlee / wifer frauen hopffe. An Tragi, Meliloti genus 8. & penult. Lonic. Tragus imitatus huius meminit, ac uocat Lagopum, pedem leporinum, & trifolium humile.

Speciem maiorem inueni in margine agrorum montis Roſſberg prope Malmunſter, florentem Octobri, Minorem aliqui ſequentem Montbelgardi, Montpelii & Geneuz. Frater C. Bauh. collegit Baſileæ in pratis.

TRIFOLIUM SAXATILE HIRSVTISSIMUM, ſiue argenteum.

Svb hoc nomine apud Fratrem obſeruauimus ſplantulum, cuius radix dura, lignola, cortice Tom. II.


ueſtita rufo, cuius figura reptionis ſuſpicionem iniicit: ſupernâ illâ parte in maiuſculos diuariatatur trunculos, plures cauliculos ex radice multiplici erigentes, ſed palmâ breuiore, quos folia Trifoliorum ritu digeſta ueſtiunt argentea, mollicella, albicantia, breuiſſimis nixa pediculis. Ex quorum ſinâ glomerulum molliſſimorum, piloſorum, ſuaueſcentium ſtipatu congeſtum prominet, quod ex floſculis fatiſcentibus compoſitum arbitramur.

C. Bauh. phyt. Trifolium 41. ſeu ſaxatile hirsutiſſimum, quod in helueticis iugis & caulibus ſummis legit.

Trifolium saxatile hirsutiſſimum.

TRIFOLIUM PELTATUM CRETICUM. CAP. LXII.

Quod apud Fratrem obſeruauimus cum inſcriptione Trifolii odorati Cretici, & apud D.



D. lat. Zvvin-gerum, cui aſcriptum erat Maſſaria, Radiculâ eſt tenui, longiuſculâ, ſibris donatâ, quæ cauliculos ex ſe promit duas; treſve vncias altos, glabros, folia exigua, quæ longiuſculis inſident pedicellis. Floſculi quini plûs minus cauliculo ſummo inſcuhunt congeſti, pallidè luteoli: quos ſiliquæ excipiunt com-

Deſcriptio Trifolio odoratum Creticum.

Maſſaria

preſſæ, laticuſculæ, ſimile ſemen ſed exiguum, ac vix vnum aut alterum complectentes. Hæc, referente Fratre ex teſtimonio Honorii dum teneræ ſunt, recentèſque, dulciſſimæ, eſuique aptæ ſunt: at vbi induruerint, amariſſimæ.

C. Bauh. phyt. Trifolium 27. ſiue peltatum Creticum. Item apud Matth. Trifolium 8. ſiue Peltatum Creticum.

MEDICA IN GENERE.

CAP. LXIII.

EXTrifoliorum, & eorum quidem, quorum valuulæ cochlearum modo intorquentur, genere & Medica eſt. Hæc n atales ſuos ipſo nomine fatetur, locumque vnde uenit; vocabulum indicat. Externa olim Græciæ [inquit Plin.] à Medis eſt aduecta per bella Perſarum, quæ Darius attulit. Hinc Gentile nomen obtinuit. Similis eſt Trifolio, caule, foliſque geniculatâ, quicquid in caule aſurgit, in folio contrahitur. Hæc paulò aliter Dioſc. tradidit. Madon recens nalcens ſimilis eſt trifolio in pratis nalcenti. Verùm in progreſſu folia contrahuntur, & caules trifolio ſimiles producit, in quibus accreſcit lemen, Lentis magnitudine, ſiliquulæ modo intortum.

Arinali

Plinii teſtiſ

Dioſc. teſtiſ

Alfaſa, Alfaſa, Alfaſa, Alfaſa.

Medica ab Hiſpanis uocatur Eruaye, Alfaſa, Alfaſa, Alfaſa, voce forſè diductâ ab Alfaſaſar.

Ces. *Alis-
suar.
Andarocca.*

Nomina
linguarum

Aequiuoca

*Saxifraga
lutea.
& Const.
not.*

*Error quo-
rundam.
Laburnum.
Cytium.*

Duratio

*Tempus se-
rentis*

quam Auicenna simul cum nomine *Cor* & *Aris-
tiscar* lib. 1. exprimit: licet lib. 3. capite de tremore,
vbi oleum de Andarocca multum laudat, videatur
eandem per Andaroccam intellexisse. Gallis
Saintsain, & *Foin de Bourgogne*, & *grand Treffles*,
Picardis *Foignasse*, Germ. *Wichflein*, oder *bürgün-
disch betw. hülflüter*. Sub *Medicæ* nomine, quæ
nobis verior videtur, & vt existimamus, per
Hermol. Marcellum, Gesnerum, Math. Amatum,
Bacchan. Dodon. Clus. & Cæsalpinum recepta
est, & à nobis *Medica maior erectior florib.
purpureis dicitur*, hæc occurrunt æquiuoca. *Medica
sibt. lutea & ruffa. trifolium cochleatum
marinum, alis Medica marina. Medica scutella-
ta. Medica orbiculata. Medica echinata glabra
cum maculis nigricantibus, & sine iis. Medica
magna turbinata, Echinata magna, hirsuta, hir-
suta echinis rigidioribus, Echinata hirsuta, E-
chinata minima, Coronata parua Cherleri,
Lunata, Lunata similis siliqua, de qua sub Au-
ricula muris Camerarii. Medicæ nomen quo-
que, quantum perpetam, & apud imperitos for-
tissimum cognitionis herbarum, teste Dodonzo ob-
tinuit trifolium pratense purpureum. Olim tri-
folium candidum, dicebatur *Medica tertia* Do-
donzo, quæ opinio in postremis reiecitur. Nos
de hoc agimus sub titulo, trifolium pratense al-
bum. trifolium quoque luteum, Trago dicitur
Medica Dioscoridis, & apud Dod. *Medicæ* spe-
cies. Porro *medica Tragi* non est *Saxifraga lutea*
Fuchsii, vt vult Rob. Const. apud Amatum. Est
hæc nobis *Melilotus vulgaris*. Quæ verò sit *Medica
Cornario*, quam dicit à vulgo *Medicorum*
vocari *Bursam pastoris*, & à vulgo Germanorum
deschenfraüt, inquirendum.*

Apud Euch. Roels. *Lonicerum & Rysium*
ineptè ponitur icon Laburni pro *Medica*. *Cyti-
sum Matiboli* à Cortufo missam, non *Cytium*,
sed *Medicæ* speciem esse [inquit Hist. Lugd.] au-
tumant periti herbarii: hæc vocatur à nobis *Cyti-
tium candidum siliqua incuruâ*. Ad hæc *Medica
speciem* putant *Fetrum equinum dictum*
Gesnero, quod nos *Soleam equi* inscripsimus.
Medica etiam de *Helenio* dicitur in script. *Dio-
scor. de eo hist. n. g. l. 25. de Medio* quoque *Medica
traditur in spur. Diosc. de eo hist. n. lib. 20.*

Tanta dos eius [inquit Plin.] vt vno satum
amplius quam tricenis annis duret. Plinio con-
trarius esse videtur Palladius, qui semel satam
decem solum annis permanere scribit. Cæterum
Medicam diu durare, vel Plutarchi testimonio
comprobatur, similitudinem ex hac in libello
contra Epicurum desumentis egregiam. Sicuti,
inquit, herba *Medicæ* semen multis flexibus,
& per ohliquum terræ innascens, ob asperitatem
multo tempore perdurat, ita dolor vnicinos &
radices disseminans: carniq; implicatus adha-
ret non diem modò, aut noctem, sed annos &
aliquot lustra, ægrè aliis doloribus tanquam cla-
uis violentioribus expulsus discedit.

Locus, in quo *Medicam* proximo Vere sa-
turus es, autore Columellâ & Palladio circa Ca-
lendas Octobris profcindendus est, & is tota
Hyeme putrescere permittendus. Mense autem
Februario, iterandus est, & purgatis lapidibus
diligenter occandus. Et tandem circa Martias
Calendas, subactò sicut in hortis, solo, forman-
dæ sunt areæ pedibus 10. lata, & 50. longæ, ita
vt eis per semitas aqua inmisceretur, & facillè pos-
sint ex vtraque parte runcari. Tunc iniecto an-
tiquo stercore in Aprilem mensem (hoc enim
tempore *Medica* serenda est) reseruentur, para-

ta. Singuli cyathi feminis occupant locum la-
tum pedibus quinque, longum pedibus decem.
Sed mox ligneis rastellis obruantur iacta
semina, quia Sole citius comburantur. Post fatio-
nem fertò locum tangi non licet, sed raris li-
gneis frequenter herba mundetur, ne teneram
Medicam premat. Prima messis eius tardius fiat,
vt aliquantum semen excutiat. Cæteræ verò mes-
ses quàm volueris citò peragantur. Vbi secueris,
sæpius riga. Post paucos dies, cum fruticare ce-
perit, omnes alias herbas runcato, ita & sexies
per annum metis, & annis decem poteri t-
nere continuis.

De *Medica*, inquit Varro, in primis obserues, Locus,
vt ne in terram nimium aridam, aut variam, sed
temperatam semen demittas. In iugerum vnum,
si est naturâ temperata terra, scribunt opus esse
Medicæ sequimodum: id seritur ita, vt semen
iactatur, cum frumentum seritur. *Medica* porro,
vt Theoph. tradit, sæpius diminuta, tonsaque
melior, sapidiorque euadit. Sed ne hinc sterco-
ratio prodest, quin potius stercoreis & vrinæ cau-
sâ perit, vt quidam dixerit.

Medicâ nutrire boues lactantes, vt plus con-
tineant lactis, iubet Sorion in Geoponicis, item-
que Varro, Columella & Palladius. Aristoteles
contrâ hist. animalium inquit: Pabuli genus ali-
ud copiam lactis extinguit, vt *Medica* herba, &
præcipuè ruminantibus: aliud auget, vt *Cytium*
& *Eruum*. Qui in Hispania rem obseruarunt
[vt notat Camer. horti] vbi quotidianus eius vsus
est, teferunt nullo cibo tam viridi quàm arida
prius magisque letari, saginari, & pingue fieri
iumenta, pecuque omne: parcius tamen dari,
quoniam inflet, & multum sanguinem creet,
quem deducere postea necesse sit, annotante
Virgilio Marcello. *Medica*, inquit etiam
Varro, obicitur modicè, ne parum, aut nimium
faturentur, vtrumque enim ad corpus alendum
inimicum. Fieri itaque potest, vt lactis abundan-
tix conducatur, modò non ad fatietatem vsque
perbeat, id quod etiam Plinius vetat, alioquin
nihil mirum Aristotelem vera scribere, & vniuer-
so in sanguinem, adipem, & carnes, alimento re-
ducto, non superesse, quod in lac conuerteri de-
bebat. *Agrium* sterco-
rat, ac aded est suauis: ac
nutriens, vt pecus arcere necesse sit, ne v' dis-
rumpatur, aut sanguinem detrahare oporteat.
Animalium vitis plerisque medetur. Ad ratiem
mularum, vt Columella prodidit, nulla res tan-
tum, quantum *Medica* prodest. Semen, vt tra-
dit Diosc. siccatur incendi saporis gratiâ condi-
tanco salu admiscetur. Viride, quibus refrigeratione
opus est, illitu suffragatur. Herba totâ pro
gramine vtuntur in, qui pecora alunt.

**MEDICA MAIOR, ERECTIOR, FLO-
ribus purpurascens.**

Aldequam luxuriat obsequioso fœnore Deser-
cultorem fouens, canibus, ut numerosis,
ita prolixis: folia terna oblonga, per extre-
mam oram, quæ obtusa est, ctenata: flores copio-
si velut in spicam digesti, purpurascens: si-
lique cornu captini instar contortæ, in quibus
semen minutum & candidum: radix subest lon-
ga, tenuis, & lignosa.

Hanc tradit Hermol. dicens: Imperitiâ vulgi
Medica vocari cepit. Semen eius sub dente Pha-
seoli recentis saporem præsentat. Propter altitudinem
radicum huius reliquæ herbae intercunt, sine ipsius damno.

Ex Hispania [inquit Marcell. Vitg.] integros
herbæ

herbæ; quam inibi Medicam censent, cum suo semine caules afferri nobis curauimus. Siliquam non licuit videre &c. miramur autem nos ei allatos caules cum suo semine, & siliquas non etiam adfuisse.

Medicam appellat Ruell. ex aliorum sententia *Fœnum Burgundense*, quod rura *Fœnaciæ* dicant. At etiam Mircellum magis eius cognitionem obliterasse. Gesnero *Medica vera*, Clusio *sarina & legitima*. Anguill. *Medice species*. Medicæ quoque meminerunt Matth. Lacuna, Amat. Bacch. Lob. Pandect. Cæsalp. Camer. Hort. Luf. & alii.

historiæ Lugd. Confarcinator imperitus stirpium omnia confandit: descriptio quidem competit Medicæ, de qua agimus hoc capite. An item Dodonæi icon, dubitamus. Quia Dodonæi & historiæ, & figura dubia: hic præterea nullum certum ponit discrimen inter Medicas, sed suo more commiscet. C. Bauh. phyt. *Trifolium* 30. siue *siliquâ cornutâ*. *Medica Dod. gall.*

hæc quondam, Hermol. Marcell. Virgil. Aug. Gallo, & aliis testibus, plena erat Venetiæ, sed pridem per

Gotthos perit, referuata autem in Hispania, inde nudum in agrum Neapolitanum, quasi postliminio introducta fuit. Cæterum, Tiguri primum apud D. Gesnerum, cui, ut ipse perhibet, ex semine peregrino prouenit, deinde Basileæ in hortis quibusdam florentem mense Iunio & Iulio, vidimus. Genææ agros eâ confertos obseruauimus, quos aliquoties in anno refecabant ad impinguandos equos. Circa Burmiæ in Rhetia sponte prouenire reperi. Montbelgardi in horto meo & Illustrissimi Principis de semine mihi prouenit, ac multis durauit annis.

De huius viribus & vti iam supra in genere pertractauimus.

MEDICA SILVESTRIS.
CAP. LXIV.

Medicæ siluestris genus est, radice crassiusculâ lignosâ, sapore subdulci, virgulta emittente cubitum longa, vel etiam longiora, teretia, striata, glabra, in multis, lentos furculos subdivisa: folia de more tereta, angusta, oblonga, supremo margine veluti corrola: *stipulæ* furculorum fastigijs conserti, globuli ferè modo insident, crocei, quibus delapsis *siliqua* suboriuntur contorta, compressa.

Taber. *Lens maior repens*, *Groß friedende linsen*. Icon Tabernæ quidem placet, est non nomina, quæ huic in eum dubio procul sinem adscripsit, ut nouitate placeret, non aliis, sed sibi ipsi.

C. Bauh. phyt. *Trifolium* 31. siue *frutescens, luteum*

At nos in hac herba nihil fruticosi obseruauimus, existimantes hanc plantam comprehensam esse sub *Trifolio* 30. siliquâ cornutâ, flore luteo.



In sepibus Locus & segetibus tempus. prope Montepellium & Lunel, mense Maio & Junio reperitur cum flore luteo, variisque aliis in locis tum à nobis tum ab aliis reperta fuit. Calida est in secundo gradu, subacris, sapore scilicet nitroso,

tenuiumque partium Gesn.
TRIFOLIUM COCHLEATUM MARI-
num, siue *Medica marina*.
CAP. LXV.



Quantum est, totum villosâ, incanâque lanugine obductum est: caules pedales, ac etiam cubitales, ramis frequentibus brachiatis: per quos folia ex breuibus pediculis tereta, parua, obtusa, frequentia, sapore nullo manifeste, flores multi simul congesti, lutei, *Trifolii* lutei ferè similes: *siliquæ* orbiculares, in se contortæ, *radix* crassâ, cubito longior, tenera, gustu quodam ingrato, saluginoso, & amariante. Gesn. hort. *Trifolium marinum*.

C. Bauh. phyt. *Trifolium* 24. siue *Cochleatum maritimum*. Guilandinus *Trifolium album*, & *Cochleatæ*. Cicer sacerdotale vocabat: alii *Cytisum marinum*. Lob. & Pena Adu. & Ic. Pl. T. 6. p. 38. vti etiam Tabern. cum Camer. hort. & icon. Medicam marinam: Eius autem figura facta est ad plantam siccam, à me [I. Bauh.] Gesnero missam, & anno 1580 collectam, quæ adhuc diligenter inter siccas meas coaceruatur: Quamuis nec Gesneri, nec nostri hæc meminerit, sicut in pluribus aliis.

Dalechampus hanc depinxit, vocans *Anthylidem* priorem descriptam à Dodonæo, cuius opinionioni assentiri non possum, nisi dicam non diligenter ab ipso neque descriptam, neque depictam. Clusius, à quo parum aliquando absuit, quin

Viret

Descriptio

Trifol. maritimum.

Album sacerdotale. Cytisus marinum; Medica marina


C. Bauh. not.

Dalechamp; Anthylid

Medicam marinam, Helenium Aegyptium Crataei [Diosc. cap. de Helenio delectum] esse sibi persuaderet, eo quod multas habeat notas, adhuc hodie nihil affirmat. Casalp. Trifolium quoddam genus, in incolis praecipue maritimis proveniens, cuius fructus Tubuli modo, &c. vide ante sub Trifolio pratensi in genere.

Veneris floret ad maris litus Mense Maio, & etiam Septembri. Clusius, qui Marinam Medicam vocabat quod Medice sit similissima, & in maritimis Mendiet praeterim obiectis nascatur locis, provenit, inquit, passim in Hispania, & Gallia Narbonensi. Inveniebam etiam in Oceano Etorre, ad Tago fluminis Ostium, ad D. Ioannis propugnaculum nondum tunc absoletum, & Caycays, sub Olyssipone Decembri florentem anno 1564. Floret aequo Estate & Autumno, & subinde semen profert.

Descriptio:



Crobustos hirsutosque habet caules, eosque erectos: folia ternaria, maiuscula, latiuscula, acuminate, subtus hirsuta, circumquaque crenata: flores pauci, lutei, quos, vel tantum instar cochlearum sequuntur augular, turbinatae, veluti è scutellis quatuor, aut quinque compositae, ut inferior maior superioris conuexum suo cavo excipiat: radix lignosa simplex.

Ad hanc nostram Scutellatam Medicam, quemadmodum & ad sequentium aliquas videtur referri posse una è Medicis Turneri, qui sat distinctè de his ita scripsit: Medicae notas, praeter eas, quas recensent Diosc. & Plinius, has observavi. flos est luteus: ex tribus foliis medium longiore pedicelo semper visitur, simulque cum Sole occidente conuolvitur, oriente expanditur. fructus per maturitatem cochlearis, cornu caprini ferè instar, nisi quod voluminum finis non promineat extra circinatum orbem: idem aliàs laevis, aliàs hirsutus, aliàs denique spinosus. Maxima Medicae folliculus, & plurimum laevis: Minoris hirsutus aut echinatus: semina ferrugineo simile tum colore, tum figura.

Fructus cochlearis

Dodon. notatur Trifol. cochlearis

Nobis videtur Dodonaeus Trifolium cochlearium primum pro Medica, quam hoc loco tradimus proponere, quamvis icon non bene eam demonstret.

In icone etiam Lobelii & Penz Adu. huius Medicae portio quadam exprimitur, licet non bene ab aliis distinguatur, nec describatur. Aliud quoque in titulo Lobelii & aliud in icone, quam etiam Plantinus assumpsit Tom. 2. pag. 17. quae tres Medice seminis varietates promittit, & duas tantum ostendit, scutellatam videlicet, & turbinatam.

Hanc autem non posse Veterum Medicam ef-

se, satis ostendit Plinius, scribens de eius longi duratione, quae non cadit in annum Medicam scutellatam, & similes.

Historia quoque Lugd. consarcinator contusè de hac scripsit, proponens in sua tabella (cuius titulus, Medica siluapuri, fructu triplici & duobus) cochleas nostrae Scutellatae, sed non describens, nisi id faciat his verbis: obliquis voluminibus sinuosum. Duæ præterea tantum fructus differentiae in eius figura conspiciuntur, cochlearum nempe scutellarum, & turbinum: cum tamen titulus triplicem & duersum promittat. Meminit is demum Trifolii cochleari folliculo foioso, sed in icone nihil tale demonstrat. Ve autem ventatem non faciamus exilem, facemur vades eius perpetui. Medicas non distingui, Medicamque surrectam flore ceule cum abis confundi, ac quidem cum ea, quam siluestrem huiusmodi vocat: Laudabile proferò dicitur imperitum stupium haec nunquam tractasse.

Compiler Tabern, qui Medicam Anglicam vocat, English Schyden Fleec / salsam habet figuram, & ad eam conuinnatam descriptionem. Trifolium cochlearium, seu Medicae species Poenae in Baldo, C. Bauh. Trifolium 18. siue cochlearium fructu latiore acuto.

Passim provenit Monspessuli, maximè in segetibus, Vere florens. Montbelgardu in orto E. C. floret Iunio & Iulio, fructu maturo Augusto, ac deciduo, quotannis se propagat, modò Hiems non sit feruor.

MEDICA ORBICVLATA.



Subest ei v. Describitur in his folia ternaria, maiuscula, latiuscula, acuminate, subtus hirsuta, circumquaque crenata: flores pauci, lutei, quos, vel tantum instar cochlearum sequuntur augular, turbinatae, veluti è scutellis quatuor, aut quinque compositae, ut inferior maior superioris conuexum suo cavo excipiat: radix lignosa simplex.

orbiculis, altero alteri imposito constantes, magnitudinis ferè vnguis, vbi maturuerunt, nigricantes, semina continentes ruffa, plana, sed recurua. C. Bruh. phyt. Trifolium 19. siue scutellatum fructu latiore, folio obtuso. In montibus Euganeis, vt & Monspeli colligitur.

MEDICA ECHINATA GLABRA, CVM MACVLIS NIGRICANTIBVS & sineis.

Bicubitales per terram spargit caules glabros & in iis folia ternaria, glabra, per extremum latiuscula & serrata, quorum quadam cordis effigiem nonnunquam exhibent, quam cum plàta primò provenit, asperse macula nigricantes repraesentant. Flores lutei, parui, duo, aut tres: filiqua

filiquis cochleatæ, partim compressa, mucibus per margines horrida.

C. Bauh. phyt. Trifolium 22. siue cochleatum maculatum. Medica Arabica Camer. Et sequentes, Trifolium 27. siue cochleatum fructu nigro hispido. Trifol. cochleatum alterum Dod. Medica folio leuco spinoso Lobelio. Hec ille. Nos tamen Medicam Camer. Arabicam diuersam à Lobelii Medica spinoso folio, & Dodonæi Trifolio cochleato altero, asserere non ausimus. Nimirum sunt breues Dodon. & Lobelius.

Ceterum, Trifolium cochleatum alterum (inquit Dodon.) gallicè *L'herbe aux Limaçons* vocatur, quod plerique Recentiorum Medicam indicant, quamuis cum descriptione Medica non conueniat. Est enim Medica Arabica (stelle Camer. hort.) foliis ctenatis macula insignitis. Lobel obsl. & ic. pl. Tom. 2. p. 37. sub Medica folio spinoso, figuram Trifolii cochleati alterius Dodonæi habet. Medicam porò Arabicam Hort. Luggerm. Arabis (s) Schneckenfleece vocat. Meminit huius, ni fallor, Casalp. sub Trifolio pratensis in genere.

Genex mihi in horto mense Maio vigebat: Argentinx D. Melchioti Sebizio cum floribus & filiquis hispidis, foliis glabris non maculatis, Iulio.

MEDICA MAGNA TURBINATA



Cubitalis & sesquicubitalis caules emittit, hirsutos, multis ramis fissos, foliis tergeminis, hirsutis. Trifolium pratensis purpurei panibus, aliis veluti triquetris, per oras incisus, quorum pediculi longiusculi, pinnis caulem ambiunt: flores parui, lutei, pediculo haerent vnciali, & sesquicubitali, quos sequuntur fructus

turbinati, sex aut plurius circumuolutionum, ac tunc commissuram, duri: vnaquæque spiram gemino denticellorum ordine calata est, medium secante zonula perpetua: semen compressum, renis instar sinuatum, Foenugraci semini par, aut etiam paullo longius. Annua est planta.

Lob. & Penz Adv. Medica, cui filiqua Cupressi figura, cuius portio quidem aliqua, sub titulo Medice, tres seminis varietates ostendens, exprimitur, alii non placet icon. Hæc etiam à Plantino Tom. 2. p. 37. proponitur.

C. Bauh. phyt. Trifolium 20. siue cochleatum fructu compresso oblongo. H. Lugdunensis, inquit, vna figura tres exprimit differentias, vt & Lobelius. Si Frater triplicem hanc differentiam ostenderet, ipsi fidem haberemus, nos duplicem duntaxat obseruamus, scutellam sc. & turbinatam.

Mnntbelgardi in horto E. C. ex semine per D. Christophorum Schvartz Sturgardià missò, & Aprilis tertia mandato, floruit Iulio.

MEDICA ECHINATA MAGNA hirsuta.



Folia huic subrotunda, postmodò nonnihil acuminata, & serrata, terna vni pediculo innixa: caules ad duos, tresve cubitos per terram sparguntur, flores multo, coarctati ex longo pediculo, lutei: filiquæ simul aliquot coherent, spiritus duabus, aut tribus, vel etiam quinque, ferruminata, breuissimis veluti spinis obtusis, exasperatæ. Genex in horto mihi prouenit. Echinus, qui paruculatum in tabella hæc est pictus, sequentis Medice est.

MEDICA HIRSVTA ECHINIS RIGIDIORIBUS.



Per terram se expandit cubitalibus & longioribus caulis. Folia parua hirsuta, & per extremam oram lata: stipes lutei: echini cochleati, parui, & seiè singulares, longis salsque deque vergentibus rigidiusculis spinis horret; non admodum densis: conuolutiones sunt tres, aut quatuor.

In figura nostra emptitia spine nimis breues & crebre, idem in tabella præcedenti, melius erant exprimentia.

An Lob. & Penz Adv. Medica filiquis spinosis? C. Bauh. phyt. Trifolium 21. siue cochleatum, fructu duro, spinoso. Medica filiqua spinosa Adv. quam Lob. ic. Tom. 2. p. 37. sub Medica pingit. An autem Lob. (vt equidem C. Bauh. vult) intelligat eandem Medicam nobiscum, asserere non ausimus, quia paucis tantum verbis spinosa meminit. In iconum quoque tabella, in qua Lob. tres Medicas dicit se tradere, nullam video spinosam. Fratrem eandem nobiscum intelligere existimam. Ponæ in Baldo Medica spinosa folliculo. Cast. Durantes pro Medica pingit cochleatam spinosam. An Camer. hort. Medica annua, semine minuto, hirsuta?

Mense Septembri ad mare reperi Monspelii.

Locus & Tempus

MEDICA ECHINATA HIRSVTA.

Descriptio



Cassius. Caulis est & prolixa, sed singularis radix, alba: caules multi, tenues, per terram sparguntur, dodrantales, & cubitales, striati, hirsuti: folia terna, subrotunda, ad trifolium pratense luteum accedentia, nullo notabili sapore percipienda, pilosa, albescentia, maxime parte inferiori: flores parvi, lutei, simul aliquot congesti, eodemque modo simul coaceruata ex eodem pediculo longiusculo, capsula, Piso non maiora, conortis helicibus constant, globosa, quatuor, aut quinque, atque etiam plura, mollibus spinulis echinata.

an Trifol. rotundifolium? Tribulus Trifol. echinatum An Lotus? Locus & tempus.

Hist. Lugd. Tribulus terrestris minor repens Dalechampii. C. Bauh. phyt. Trifolium 26. siue echinatum arvensis manus. An Lob. Obs. Lotus Italica altera? Floret & semina fert mense Aprilis & Maio. Passim provenit maxime inter segetes prope patibulum Montepessulani Frater C. Bauh. invenit prope Perou in litore maris. Hanc eandem habuit Geneva in horto.

MEDICA ECHINATA, MINIMA.

Descriptio



Hec est caulibus circiter pedalis, vel minoribus, tenuibus, quos ornant folia terna, Medice echinatae foliis similia penitus, parva, hirsuta: flusculi pusilli, lutei, multi simul congesti: sequuntur eiusdem pediculi fastigio herentes quam proximè, glomerati echinuli muricati, tres, aut quatuor, vel quinque iuncti, Orobigranum non maiores: radices tenues.

Tribulus Trifolium Medica

Locus

Hist. Lugd. Tribulus minor rectus Dalech. C. Bauh. phyt. Trifolium 26. siue echinatum arvensis secundum. Cam hort. Medica pusilla capsulis echinatis. An Ponzæ in Baldo, Tribulus filix Dalech. In pratis provenit Geneva ad Nosodochium. In arenosis & sabulosis locis Dalech. legit. Ex ne-

more prope Lipsiam, & ex Rosendal vocato, Camer. acutib.

MEDICA CORONATA CHERLERI, parva.



Petalibus pedonata est caulibus, tenuibus, subrubentibus: è quibus alteratim ex longis intervalis siccantibus exant singulares, viciales & longiores, qui extremo mucrone ternos, quaternosve gestant echinulos, Tribuli terrestris viciales Hist. Lugd. Verum singuli viciales sunt, aut seque-aleat

circumvolutione constant, vtrinque denticulata, gemellam coronam imitant, echinus sustinent: furculo ad exortum huius pediculi herent tergemina folia, hirsuta, aliquando subtrubia, fere cordata, in ambitu ctenata, tam exigua, ut simul omnia dimidiatus vnguis digiti minimi facile possit tegere.

In saxosis, aridis, & squalidis Gallia Narbonensis, maxime verò in collibus inter Nemausum & Vietum observant & legit Cherlerus: etique vna ex rarissimis plantulis.

MEDICA LUNATA.



Ata, L. compres. sa, pollicis vngue maior siliqua, ad Annulam muris Camerarii accedens, sed speciosior & maior, striata, in circuitu longiuscula spinulz, Crisam galli non male exprimit.

Lob. Obs. & Ic. Pl. Lunaria radiata Italorum: Medica lunata, siue filicata. Casp. Bauh. phyt. Trifolium 26. siue siliqua salcata. Consecrator Hist. Lugd. non distinguit Medicam silu. alteram lunatam seu salcatam, à cæteris Medicis. Cæterum pulchrum semina misit Clariss. D. Cortusius nomine Medice Alaphalaga. An porro, Catal. Trifolii quoddam genus, cuius siliqua valde læta, de quo sub Trifolio pratensi in genere. An Cast. Dur. in fine Medica lunata

AVRICULA MVRIS CAMERARII.



Inquilina nobis planta est, quam Anricula muris nomine proposuit Camerarius, radice nixam parua, colore buxco, sapore dulci, ex qua caules pedales circiter, numerosi, supini, in terram reclinantes, teretes, hirsuti: folia alternatim & caulibus exeunt, medio crassa, rigidiuscula, ta-

quidem ordine, ut extimum impar sextuplo ferè coniugatum disto- sit in alam foliis maius sit, principio angustiore, medio ampliore, denique in mucronem desinens: sapor viri- que aliquid feruidi: flores, cuiusmodi leguminibus, parui, crocei, hirsuti, viridantibusque foliis ambi- ti: silique lata, compressa, similes Medicæ lunata, sed paulò minores, in se conuoluta, hirsuta. semen claudunt figurâ renis, alterâ parte gibbosum, alterâ sinu incisulo cauum.

C. Bauh. phyt. Trifolium 29. Trifolio siliquâ falcata simile. Camer. hort. Auricula muris, à semine, & Auricula lepòris, à foliorum figurâ appellata.

Anno 1597. mensè Augusto floruit in horto Montbelgardensi E. C. ex semine partim misso per D. Hoensfetter Medicum, partim in horto D. D. Martini Chemicòci Basileæ, maturo, mensè Septembri. Annua est planta. Cæterum, ubi spontè nascatur, ignotat Camer. nisi fortè in Creta, vnde semen Epithymo immixtum desertur.

Saporem non nihil feruidum habet, siquidem Camerario credendum, ac diutius commandata, saluam prolicet. Liqueor stillatius dulcis est primo gustu, postea verò non nihil linguam vellicat, fortè putridis viceribus, si quis periculum faciat, non incommodus.

OXIS, SIVE TRIFOLIUM ACIDVM, flore albo & purpurascente. CAP. LXVI.

Est Trifolii annueranda planta, quæ à vulgaribus Herbariis Panis cuculi vocatur, vel quòd Cuculus auis eâ vescatur, vel quia hæc erumpente Cuculus vocem suam edere incipiat, in officinis autem Trifolium acetosum ab acido sapore, ac à Plinio Oxys eadem ob causam. Ex crassiusculâ squammatâ, alba, vel ex albo rubente radiculâ longâ & crebrâ pendent fibrâ albicantem, indidemque emergunt pediculi infirmi, tenues, rotundi, palmares & longiores, terria gerentes folia, latis magna, latiora quàm longiora, cordata, hirsuta, ex viridi flauentia, sæpè reflexa, vt capitum ad pediculum coi-

Tom. II.



tus turbina- tam reddat formam, sapore acido: inter hæc alia surgit pediculi, florem singuli sustinentes, vnicum, magnum, albicantem, striatum, tene- rum, sulcatus pentagonus, quo attacto semen exilit rufum nucleo Persici simile, striatum.

Brunfels. Trifol. acet. Tom. 3. cum Colym. Mathiol. Cast. Dur. Histor.

Lugd. & Thal. Trifolium acetosum, & herb. ger. Trifolium 5. Oxys, autore Dodonæo, Alimonia vulgi Alexandro Benedicto. Lob. & Penæ Adu. pusilla videtur Lotus.

Oxyn autem Plinii nunquam ad Lotos pertinere, doctè Gesn. existimauit. Patet igitur vel hæc Lobelium memoriâ lapsum.

Anguill. non vult affirmare Oxyn esse speciem Trifolii acidi. Cordus, qui describit, dicit Oxyn Alleliam vocari. Ruell. Oxys Plinii, vulgò panis cuculi dicitur, & Herbariorum Trifolium 4. quod acidum nominant. Clus. Hisp. Oxys vulgaris.

Trago si non refragandum, fieri potest, vt sit Oxys seu Oxytriphylon apud Dioscoridem. Possit etiam dici siluestris Acetosa, seu Oxalis wild saur ampffer | Sunt qui Luyulam & Baehael nuncupent. Vide Messem, Matth. Syluaticum, Leonh. Gilbertum, & Jac. Manlium super vng. Marciaton. Oxytriphylli quoque nomen apud Dioscor. videtur eidem Hist. Germ. super fluum & pertinere ad Gauchpsee, Trifolium acidum. Hæc ille, cui si notum fuisset verum Trifolium bituminosum, ei reliquisset nomen Oxytriphylon, quod non malè conuenit.

Adstipulatur nobis Cornærius, dicens: Oxytriphylon cum Oxynihil commune habet. Oxym Plinii crediderim esse Trifolium acetosum dictum. Hinc malè videtur Cæsalpino Plinius per Trifolium alterum, acuto folio Oxytriphylon intelligere Trifolium acidum, quod alibi Oxym vocat.

Nec desunt, Monachorum testimonio, qui per Triphylon intelligi putent Trifolium acetosum, Allelia nuncupatum. Fracast. Luyula, fortè Oxys Plinii.

Trifolium autem acetosum differt sexu. Fæmina [inquit Cam. in Epi t. Matth.] flore albo, venis purpureis distincto. Mas totus purpureus, rarus inuentus.

Tab. Oxys & Trifolium acetosum floribus lacteis.

C. Bauh. phyt. Trifolium 13, siue acetosum vulgare. Variat flore lacteo, purpurascente & luteo. Hæc Frater, qui quo Autore dicat vulgare Trifolium acetosum flore esse luteo, me latet. Ego nunquam me audire aut meminisse, aut quemquam scribere obseruauisse. Paulò post quidem scribam de luteo, sed differente à vulgari.

Fuch. Roess. pro Allelia, Pane cuculi, seu Trifolio cuculi, iconem Trifolii albi exhibet. Ver.

K k

et autem Oxyos icon est pro Epirhymo malè posita, malè quoque Trifolii tirulo vbi potius ponenda est dicta icon Trifolii albi.

Ceterùm Oxin Plinii, siue Trifolium acidum, quidam existimant Oxytriphylon Dioscoridis, non sine insigni errore. Oxytriphylon enim & Oxytriphillum, de Trifolio bituminoso Veteribus dicitur. Nec minus bene Lotum satiuam quidam putauêre Trifolium Asphaltites & Oxytriphillum. Nobis hæc est Lotus satiuâ, odorata, annua, flore cæruleo. Malè quoque quibusdam Scribonii Oxytriphylon : dicitur nobis Trifolium rectum Monspellianum. Pessimè tandem à nonnullis pro Oxytriphyllo altero Scribonii habetur, de quo nos sub Trifolio albo, recto, hirsuto valdè.

Linguarum Nomina.

Locus & Tempus.

Virus & virus Enterocela Eurora compassatis nuncia. Temperamentum Ventriculi ardores Aqua Febris acuta Succus Erysipelas Faucium calida, flu. xia Affectus cordis & Ventriculi Pora crebra.

Conserua Pessis

Defici

Ὀξύς, ὀξυτέρας ὀξυς, Oxy, Oxy Pliniana, acetosella, Oxalis minima, Trifolium acetosii, acidum, panis cuculi, & Alleluia. Gall. Pain de cocu. Germ. Saur: Büsch: Gauch: & Guckgäuch: Klee & Haselklee. It. Hasen. Ross. & Büschampfer. Nid. ch: Gauch & Guckgäuch: brot, Guckelauch / & Gauchlin. Belg. Cocoutsbrot. Arg. Wod saur. Hung. Alleluia fin.

Oxy flore albo obseruauit Geneuæ semine maturo Iunio. Parauit cum siliquis Decembri. Bononiz al burgo di S. Catharina. Basileæ copiosè Augusto circa Dornach in montibus. Frater autem C. Bauh. in monte Moutets. Ceterùm opacis plurimum prouenit locis prope sepes & itinera. Iac. Gargillus inuenit flore purpurante prope Newbaüs que est ultra paruum Basileam in Marchionatu: nos autem inter Bessfordiam & Raupach in dumetis florens Martio. Montbelgardi passim flotens Aprili, vitens Augusto.

De eius viribus hæc Plinius. Oxy datur ad stomachum dissolutum. Edunt & qui enterocelen habent. Obseruasse autem sese scribit Fuchsius, atque adeo multorum experientia cognitum, quod eius herbæ copiosi flores crebras illius anni pluias, & aquarum inundationes certò portendunt: pauci contra, siccitatem. Tota planta, auctore Matthiolo, refrigerat Oxalidis modo. Quare deuorata, sitim & ventriculi ardores extinguit. Iectur refrigerat & cor roborat. Stillatia huius aqua datur vtiliter potanda acutè febre laborantibus, sed multò magis praestat succus ex faccero potus. Illinitur idem per se erysipelatis & inflammatis locis: osque eo colluitur, cum lingua, palatum, faucesque calidâ fluxione laborant. Placet autem Triphyllon Alleluia dictum ad affectus cordis, vel ventriculi potèdis & otis eius, commendari. Propter temperamentum quod ex sapore proditur, non autem propter cordis figuram, vt Porta vult. Siquidem multa sunt, quæ talem figuram habent, nec cardiaca comprobantur. Displicet quoque quod laudet propter rectas, longas, & rigidas vaginulas ad serpentum morsus. Quis enim consulat, vt applicetur planta adstringens & refrigerans morsui serpentum? non inuenio Plinium aliquid tale de Trifolio acido scripsisse. Suspicio Portam confundere cum modò dicto Trifolio, Trifolium Asphaltites. Præ cæteris demum, teste Io. Bokelio, ad pestem laudatur conserua Trifolii acetosi verno tempore cum Saccharo præparata sumpta manè ad Castaneæ quantitatem.

OXYS LVTEA.

CAP. LXVII.



Serpendo S per tertiam spargit coliculis palmares, aut si squipalmares graues: filia tenuissimis rixa pediculis terna coherent minora quàm Oxyos vulgaris, magisque per exitumum sita, cotulum [vt vulgò pirgi solet] expressus effigiantia hirsutiora, ex breuibus pediculis à coliculo prodeuntibus

dependentia: gustus acidi: floris forma stellata eadem, sed color luteus: quem cornicula, siue stique seie vnciales sequuntur, sulcum spectantes, crassiuscula: foliose ex quinque loculis constituta, quæ vbi ad maturitatem peruenerit leuissimo tactu semina plurima, parua, ruffa, vel flouea C. Bauh. aspera exiliunt à lateribus: oculis quamprimum conuenientibus, vt ne appareat siliquas distillare. Radix longiuscula, gracilis, fibrata.

Huius Trifolii his meminerunt nominibus (Oxy, siue Trifolium acetosum flore luteo) Clusius Dodon. Cam. Tab. & Lob. qui præterea Obs. Oxyn luteam corniculatam reperit, & Oxyn luteam Clusii, cum Hist. Lugd. inscribit. C. Bauh. phyt. Trifolium 12. siue acetosum corniculatum luteum, qui antè vulgare luteum quoque dixit, quasi ab hoc diuersum, ita vt duo genera faciat. Ponit is iconem in renouato Math. vbi vocat Trifolium acetosum flore luteo Castori.

Vmbrosis quibusdam circa Hispanii locis nascitur. Apud Belgas, atque aded in olim solo facta prouenit, quin & semel facta, postquam florere cepit tota deinde æstate flores producit, & semen fert: I lnta tamen omnes, vt Clus. dicit, Hiemis inclementia pereunt, sed & semine decido renate si rigida Hiems subsequatur plerumque corrumpuntur, proliisque genus interit, frigidioribus præsertim regionibus. Hæc Clus. Ego quidem cum Monspellii essem vidi flore luteo mense Iunio, & postea Octobri florentem circa Gangem. Heidelbergæ copiosè in horto D. Sprægeri, & Basileæ D. Zvingeri, vnde in hortum Montbelgardensem transfusi, in quo se quotannis semine propagauit.

TRIFOLIUM ACVLEATVM CRETICVM.

Arum est hoc Trifolium Cretæ munus, cui Defeculium in ramos alternatim oriundos, creberimos, angulosos, denudè in minores ramulos diuicatos, humique fusos, striatosque diuiditur, vbi que verò quæ rami, sicutiq; diuiduntur, duo exeunt pediculis breues, oppositi, singuli folia terna, parua, oblonga, in acumen spinosum desinentia, glabratque sustinentes: nidemque diua-

Defeci

Oxy Trifolium luteum lutea culata p. m. Trifolium luteum luteum C. Bauh. v. c.

Locu Temp

Defeci

que diuaticationibus subsunt adunci, rigiduli,



mordaces deorum spectantes aculei: superius verò ex ipso ramorum cotu pediculus exit breuis, cut ex calyce vitidante emicans insidet flos amœnus, magnus, putpuro-violaceus, Lysimachie speciose similis, è quinque foliis compositus, medium obsidentibus apicibus luteis: siliqua

Dodon. Limonium verum Cordi, oder vasserweisen mangolt, quodd nempetriguis pratis & consimilibus locis gaudeat, à quibus Limonio suum apud Græcos nomen antiquitatis obtigit.

Tragus idem Limonii pratenis nomine describit, sed apparet ipsum incidisse in locum, vbi stirps hæc florifera quidem fuerit, sed floribus eius absque fructu intercedentibus, vnde ipse existimauit, nullum herbæ huius fructum profus esse.

Compiler Tabern. duas exhibet figuras, nec ostendit quain redderant præter magnitudinem. Hort. Lus. *Trifolium palustre fibrinum castoris, Biberflee/lüngentlee.* Dodon. Gall. *Isopyron* vocatum est à quibusdam, teste Dioscoride, *rhafolom.* Item in sol. *Faselus hircinus*, aut *Bona hirsuta*, Belg. *Boixboonen* Hatch. in Enchir. quoque *Limonium* vocat, verum confundit cum eo *Pyrolam.*

Lonic. *Limonium, limonium pratense, & Beta sive uestru.* Hæc ille, qui nomina solum absque descriptione ponit, ideòque confusè nimis capite de *Pyrola* duas figuras ponit.

Lob. & Pena [qui in Adu. quærunt, *Trifolium paludosum, sitne potius Isopyron, quàm Melanrhui species?*] scribunt, cur huic Trifolio, a quatuor vocato, quod potius *Isopyron*, Matthiolum *Isopyron* Melanthium quoddam prætulit, vix coniectari licere.

Ceterum, Gesnemi eorum opinionem non probat, qui plantam hanc *Limonium*, aut *Dioscoridis Isopyron* esse affirmant. *Isopyron* siquidem Diosc. Anisi folio constat. Lotus siquidem is, forsitan est palestris *VViofellii.*

Hist. Lugd. *Menianthes palustre Theophrasti.* *Isopyrum* Dodonæi, cuius sententia, tum *Dioscoridis*, tum *Plinii* auctoritas, maxime refragatur. Hist. Lugd. duas proponit icones. Priori titulus est modò dictus. Altera verò, *Menianthes palustre Dalechampii* inscribitur.

Nascitur viginosis ac palustribus locis, sterili ac macro solo, aquarum tamen affluxu semper madefcente, extra aquam citissime flaccescens. Primò vidi Tiguri florens Maio, postea Geneuz semine maturo Iulio.

TRIFOLIUM HEPATICVM, SIVE TRINITATIS HERBA, FLORE CÆRULO.



Hic plantæ Deser. folia sunt ex longis pediculis triquetra, auersâ parte Matth. Cyclamini modo subpurascentia, superiore verò albis quibusdam maculis respersa: caulis ex radice tenuis, florem in cacumine sustinens stellatum, cæruleum: semen colore non diuersum, oblongum: radices tanues, plurimæ subrubentes.

Græcis & Mauritanis [in Hist. Legd.] inco-

quatuor, aut quinque, costis canaliculatis, latiusculis, ad mucronem turbinatum cœntribus constant, semine in singulis contento lato, ruffo.

C. Bauh. phyt. *Trifolium 33.* siue spinosum Creticum cœruleum, quod in horto Montbelgardensi apud Fratrem Io. Bauhinum legimus: accipinus etiam à Laurentio Rosenau nomine Trifolii spinosi, semper virentis ex Candia, Cysti flore. Clut. in posth. Hist. vocat *Trifolium spinosum Creticum*, Honorio Bello, Orbitochorto, dubitatque an Tribulus terrestris Diosc. sit, aut saltem genus aliquod. Sed nota Dioscoridis, nohis quidem iudicibus, videntur melius respondere iam recepto Tribulo terrestris: siquidem Trifolio Cretico non sunt folia tria ad præterea, qualia requirit Dioscorides.

Casabona præfectus horti Ill. Ducis Florentie ex horto eius Pisano misit Stutgardiam semen hanc in inscriptione: *Orbitochorto*, Trifolium aculeatum, flore Cysti, rarissima planta Candia. Sata Montbelgardii in horto Ill. Princ. mense Aprilis, prouenit ex semine mihi misso Lutetiâ à Robino, floruit principio Iulii. Nata quoque erat Moguntiz in Reuerendissimæ eius Celsitudinis horto, semine ex Italia quidem misso, sed ex Cretâ accepto.

TRIFOLIUM PALVSTRE.

Geniculata radix, longa, alba, profusum incedit fibris subinde demissis, firmata, pediculi inferius latiores vaginæ instar, dodrantaes, tria habent annexa folia, magna, fabaceis formâ & magnitudine respondentia, læuia, inter hæc caulis surgit cubitalis, læuis, gracilis, virens, thyrsum gerens florum, ex albo purpurascentium, qui Dalech. priusquam dehiscant candidi, nonnunquam subrubentes ac rotundi: cum reclusi in quina folia diuisi, oblonga, tenuissimis & candidis filis, veluti lanugine, siue pube quadam elegantissimè crispata, folliculi inde parui, rotundi, siue rotunda capitula aut vascula, in quibus semen Helianthemi simile, ex fusco flauescens: amari gustus.

C. Bauh. phyt. *trifolium 16.* siue palustre. *Isopyron* Diosc. quorundam, aliis *Menianthes palustre* Theoph. 4. Hist. 11. *Mensislarum* Gaza vertit. Thallio Harc. *Trifolium palustre, seu castoris, Isopyron*

Hepatica
Elymen
Herba Tri-
nitatis Ger-
de.
Varietas.

gnita videtur fuisse, hæc quæ hodie ab Herbariis. Hepatica, dubio procul quodd Hepaticos tuet, & herba Trinitatis, à foliorum figura nominata est. Huius flores colore variant, aliàs cœrulei, aliàs purpurei, & quandoque niuei. Non nunquam etiam seha [florum] maiora, maculis, notullisue variegata speantur.

Balaris.

Dodon. gall. hepatica, Et Lat. trifolium aureum. Baptista Sardus, inquit, Trinitatem, & Trinitatis herbam, [re & Itali apud Gesn.] nominat. Sunt qui *herba* esse suspicantur, quam Trifoliam herbam esse Hesyeh. scribit: Sed Balaris descriptione non extante, nihil desiniri potest. Cæterùm Trinitas à Cordo Epimedium redditur. Iis autem (inquit Trag.) qui hanc herbam Lichen esse statuunt, assentiri non possum. Omnes empirici eam Hepaticam esse statuunt. Germanis Edel leberfräut, Hepatica nobilis, Hieron. Braunsch. Gildenflee, trifolium aureum vocatur. Ego quoque [sic & Lonc. Matth. germ. & Cast. Dur. p. 464. appellat. hic præterea pagina sequenti 465. Trinitatem nominat, atque ita duas figuras & descriptiones vnius herbæ ponit,] vocabo trifolium aureum seu magnum.

Epimedium
Lichen non
est.

Lob. & Penz Adu. hepaticum trifolium, siue trinitatis: Obs. quoque Hepaticum Trifolium hepatica & Trinitas herbariorum. Epimedium Tragi Cordo. Gesn. Hepatica terrestris, & aurea flore cœruleo & rubro Tabern.

Hepatica
nobilis.

Camperarius, cui in horto, Trifolium Hepaticum flore cœruleo dicitur, scribit apud Matth. Trinitatem inueniri flore rubente, & interdum albo [maculosoque Cæsalp.] Tardius autem eas florere, quàm cœruleam. Hoc ita confirmat Clus. Planta quam nonnulli Trifolium nobile [Edlen flee] vel aureum, & Hepaticam trifoliam, appellant, flore, vel est cœruleo, & præcior: vel ad cœruleum tendente, & terius flouens.

Hepaticum
Trifol.
Trinitas
Herbar.
Hepatica
terrestris.

C. Bauh. phyt. trifolium 14. siue Hepaticum. Pingit Brunfels. sub Hepaticæ [hyrsfle] titulo, vocatque ex Hieronymi Herbario, hepaticam tertiam, & Trifolium aureum. Brunfelsium reprehendit Amatus dicens, Lagopus, herbam illam, quam Trinitatis appellant, esse, credendum est: Hæc herba Trinitatis, Pseleponis dicitur, & à Brunfelsio inter Hepaticas reponitur, qua in re nulla præstanda fides. Sed miror Amatum Trinitati tribuere cubitalem cauliculum, ac dicere alia in descriptione, quæ non multum conuenire videntur: hæc etiam non nascitur in segetibus, quod Diosc. tradit de Lagopo. Brunfels. quoque non ex se, aut ex autoritate Hieronimi, bene vocat Hepaticam. Robert. Conf. apud Amatum, Altetam herbam Trinitatis, pied d'Alexandrie ou d'Alouette vocat, quæ Lagopus Lusitano, Matthiolo absque nomine cap. de Trifolio. An autem Robert. congruè tribuat ei nomina gallica, mihi nondum constat.

Hepatica
trifolia.

Trinitatem vulgò dictam flore cœruleo Brunfels. inter Hepaticas numerat, licet non inueniam (ait Matth.) inter Græcos antiquos, aut Arabes, qui eius meminere.

Brunfels.
taxatur.

Cæsalpinus Triada seu Trinitatem ab Hermolao, & aliis quibusdam Toram & Tauram appellari scribit. Nos id apud Hermolaum nondum legimus. De Tora agitur lib. 34. vii quoque de Anthora, quam à nonnullis Hepaticam auream, & Trinitatis herbam nuncupari Thalins in Hæc. tradit. Alia porò est herba Trinitatis nomine donata, vocaturque Viola tricolor à quibusdam etiam Tacca, de qua suo loco

Lagopus
Pseleponis.

Hepatica, hepatica nobilis, aurea, trifolia, Trinitatis.

Amat. re-
prob.

Rob. Conf.

Tora, & Tauram.

Viola trico-
color.

Nomina
Linguarum.

Hepatica, hepatica nobilis, aurea, trifolia, Trinitatis.

tas, Trinitatis herba. Trifolium hepaticum, nobile, aureum. Germ. Leberfräut, Edel: Vnnd Guldens Leberfräut. Edel: Vnnd gulden flee. Belg. Edel: Vnnd Guldens lebercruyt. Gall. hepaticque. Boeh. yarruif troglysi.

Offendi Trinitatem variis in locis. Cæterùm, loca quærit vlginosa, & opaca, hinc in frutibus frequens.

Probatum maximè à recentioribus Medicis ad vulnera glutinanda, tam foris illita, quàm intus: item ad enterocelas, in quem vsum puluerem dimidii cochlearis mensura ex vino anthero propinat. Tota planta decoquitur in vino eodem ad columellæ, saucinique inflammationes. Refrigerat enim, siccatur & roboratur. Quare aduersus intemperies calidas, & inflammationes hepaticas, & febrium calores perutilis.

TRIFOLIUM HEPATICVM FLORE albo.

Quoniam autem in Trifoliorum historia verfarum [inquit Clus.] obiter etiam meminisse hoc loco libuit hepaticæ Trifolia flore albo, quæ Belgici horti alunt munere Alphonsi Panti Fertantensis Medici, qui eam nobis Mechliniam misit. Hanc etiam non solum Viennensis agro sed omnibus in siluis Pannoniæ & Austriæ interioris spontè nascentem obseruabam. Nam Viennensis saltus omnes hepaticas, præter eam, quæ pleno est flore, alit. Nos in montanis Sabaudæ Syluis etiam vidimus.

TRIFOLIUM HEPATICVM, SIVE Trinitatis herba flore rubro.



TRIFOLIUM HEPATICVM FLORE pleno.

Virguro cæruleis multiplicibus floribus stipatam elegantiam peregrinam, præclaro D. Io. Brancioni, doctissimum p. m. Alfonso Pancius Ducis Ferrar. Medicus misit: cæteroquin folia, radix, cum superioribus haud absimilia.

Lob. Obs. & Ic. Pl. Tom. 2. p. 35. Hepatica trifolia polyanthos. Clus. Pannon. Trifolium nobile polyanthos cæruleo flore, quod Pancius Mechliniam misit. Item in sol. ait: Post meum Viennæ discissum, inuenta est apud arcem Starberg Mag.

Locus
Vires
vius
Pulue
Enteroc
Fauce
Tempo
mentu
Inflan
tionis
Locus
Defec
Defecit



Mag. Dn. de Heulenstein in siluis illis, quæ ab illa arce ad niueum montem extenduntur, etiam illa Hepatica trifolia, quæ flore czruleo est, & pleno. Taber. *Hepatica aurea multiflora*, gessit gulden Leberfrant. Camer. ad Hist. Matth. *Trinitas flore plena.*

EPIMEDIUM QVORVNDAM. CAP. LXVIII.



Pro Epimedio ostenditur hodie planta, pulchra sanè & nostris oris rara: *radix obliqua* agitur, nec alè demersa, gracilis satis, sed longa, lignosa: hinc surgunt *pediculi* dodrantales, atque etiam cubito altiores, tenuis, politis, rigiduli, in renos *surculos* diuisi, quorum singuli sursum

internos alios diuiduntur, ita vt vnicuique *folium* hereat unum Hederaceum, ex rotundo oblongum, rigidulum, acuminatum, neruosum, auersâ parte glaucum, superius ex viridi pallefcens, iuxta *pediculum* pinnis duabus subrotundis, quarum altera alterâ longior, donatum, circum circa mitibus *denticellis* crenatum: *pedicularis* quidam ramus pauld infra primam ramorum diuisionem palmaris aut dodrantalis in ramulos diuisus, quorum vnusquisque plures gerit *flores*, priuatis periolis hirsutis nixos, quatuor foliis purpurantibus constantibus, quorum medium occupant *apices* lutei.

Epimedium nominat Anguillara, dicitque Dioscoridem in eolapsum, quod putet carere flore & semine. Aduers. Lob. & Penæ *Epimedium* quoque tradunt, suspicanturque Epimedium hoc esse *Epipetrum*, vt Plinius legisse videtur Theophrasto memoratum, non autem vt vulgò legunt Epimetrum. Epimedium (inquit Dod.) appellatur: sed legitimum affirmari nequit. Diosc. enim *florem* & *semen* ei esse negat: Plinius etiam nunquam florere refert. Hist. Lugd. Tabern. & Camer. Epimedium. In mon-

tibus Liguria planta proueniens dicitur Casalpino.

Observauit Patauus in horto Iesuitarum, D. Cortusii & Triuefani, Ferrariæ in monasterio S. Dominici à l'angeli, in montibus Euganeis inter balneum Aponense & Arqua, vbi Gener Chertelus etiam obseruauit copiosè florens Martio & Aprili: Stutgardia florens Maio, in horto Ill. E. C.

ANONIS, SIVE RESTA BOVIS, vulgatis, purpurea & alba, spinosa. CAP. LXIX.



Longè lateque *radice* spargit albidas fractu perqucontumaces, ramis verò lignosis, simplicibus & frequentibus stuticat, cubitum vnum, aut alterum longis, tenuibus, rotundis, hirsutis, tuberculosis, lentis, spinis longis & rigidis armatis, interdum verò nullis, piliisquam decidant *folia*: *folia* spi-

nis serè proximo ortu, incondita, sublonga, Ciceris singularibus foliis simillima, nigricantia, hirsuta, in ambitu crenata, sapore leguminoso, tactu glutinosa, odorataque: teste Casalpino, *flores* Coluteæ, sed colore purpurascete, albo, vel carneo: *siliqua* parua rotundum *semen* continent, *Vicia* formâ & sapore.

Oprandum esset, vt omnes Antiquorum descriptioes, qui de Medica materia, aut de plantis aliquando egerunt, tales essent. Felicitissimè si quidè vnus omnium Theophrastus *anonymus* hanc expressit, scribens: Ononis in ramis aculeata est: annuam fert frondem, Rutæ folio similem, quam toto caule profert, facitque tota veluti coronæ formam per interualla disposita: *florem* minutulum, & in *siliqua* non vndique septum edit. Nascitur pingui & glutinoso solo, præsertimque in segetibus, atque cultis: quam ob rem aratoribus inimica. Nec facillè perit, cum semel alto & pingui solo hæserit. Descendit enim quamprimum, & quorannis regerminat per latera se spargens: iterumque in interiora terræ nitens descendit, sequenti anno copiosius nascitura. Eruenda rora extirpandaque penitils est: Quod, cum terra imbribus maduerit, egisse oportet. Facillè enim tunc tota perit. Si quid enim ex ea reliquum fuerit, ex eo iterum renouatur. Estate germinare incipit: Autumno autem incrementi sui finem habet.

Anonis (inquit Diosc.) quam aliqui Ononida [Anonis] vocant, ramos habet dodrantales & maiores, fruticosos, multis geniculis præditos, & qui alas multas habent: capita rotunda: *folia* parua, tenuia, velut Lentis, ad Rutæ, aut Loti prærens *folia* accedentia, subhirsuta, odorata, non iniucundi odoris. Muria conditur antè quàm spinas producat, estque cibo gratissima. habent ras

Descriptio

Erronim
figura
epimedium
anonymus
Anonisa

Folio Rutæ.

Ononida

Lori prærens
siliqua

mi spinas acutis, instar spiculorum, solidas. Radicem verò habet albam calefacientem & attenuantem.

Spinosorum genus

Spinosorum [ait Plin.] Tetianum aliquod genus Ononis. In ramis enim spinas habet appositas: folio Ruta simili: toto caule foliato in modum coronæ. Secatur aratro (vel, ut legendum censet Turnebus, sequitur arata) frugibus inimica, viuaque præcipuè. Idem multò post. Anonin quidam Ononida malunt vocare, ramolam, similem Fœnugræco, nisi fuiticosior, hirsutiorque esset, odore iucundo post Ver spinosa. hæc Plinius cuius potterem sententiam reprehendit Matthioli. Etenim non post Ver Anonis spinosa redditur, sed in Autumno, id quod experientia ipsa comprobat.

Fœnugræco similis. Plin. repreh.

Diosc. explicatur.

Cæterum quod Diosc. ait habere folia, ceu Lentis, ad Ruta, Pratenisive Loti herbe folia propriis accedentia, alterum ad figuram, alterum ad quantitatem, ut vult Marcell. referendum est, nec aliter legi & intelligi potest.

Anonis Ononis

Anonis [inquit Ruell.] Dioscoridis dicitur. Theophrastus & Galenus Ononim appellare maluerunt. Ononim Dioscoridi. Loto fœnatiæ, seu pratensis similem. Plinius Fœnugræco, fecerunt, nullo tamen insigni, vel notatu digno discrimine. Nam fœnatiæ Lorus, pratensisve folio Fœnugræcum videtur amulari. Cæterum licet Diosc. vnum tantum Anonidis genus descripserit, Marantha tamen hæc tum purpureo, tum candido flore conspexit.

Etymon.

Anonis & Ononis non Latins folium, sed & Græcis vocatur, qui licet duas, non vnam descripsisse plantam videri possint, vnam tamen eandemque vtraque appellatione indicasse eos pro comperto omnibus est. Anomis quidem à non inuivando, quod nullam vilitatem præbeat, dici videtur. Siquidem aratoribus inimica est, viuaque nimis fruges opprimat, & suis aculeis nocet, nisi quis ex aduerso nomen inditum putauerit. Ononis autem vt apud Hermol. Photion vult, quod vna se se terentes ad illam scabientesque iuuet: vel quod in ea se volutantes spinis eius dorsum libenter afficiunt & scabent. Vultus Herbariorum Arrestam bouis, vel Restam bouis Ochsensbrey: quod in opere arantes boues sistat & impediatur, nominare solet. Ruelli Sueffiones vernaculi Bugraues appellant, quod bubulcis grauis fit: alii Bugraues, quod d. promisso mucrone spina tigeat. Nonnulli Remoram aratri, quod altis & duris radicibus in agris aratrum remouetur, appellant. Sunt qui acutellam, quod suis spinis ingredientium pedes pungat. Galli Arrestebaus, Germ. Ochsensbrey & Ochsensbrey, quia crebris inter folia aculeis, haud secus quam instrumentum hoc quo mulieres linum carminant, & à crassiore purgant stappa, horreat: vel, quod ligone ad aculeatam hæc herbam eruendam & extirpandam, cum in altum acta sese propagant, opus sit. Equites germani Stralfraur Vrinalem, aut Vrinariam] quod decoctum eius inieciere nequeuntibus equis offeratur.

Arresta Vel Restam bouis.

Remora aratri acutella.

Vrinalis.

Lonic. repreh.

Cæterum, Ononis, siue Anonis passim à nostris Batauis traditur ac depingitur. Verum è cunctis Lonicerus & mald. dos. ribit, & deteriorem exhibet iconem.

Aquilegium spinosum.

Egyptium Cypria.

Andernacus in libello de baln. in formula remedii ad renum affectus, præteribit Aquilegium spinosum, si nõ intelligit Anonidem, nescio quid velit.

Angullara, Crateux Egyptium existimat nihil aliud esse, quam Ononidem multis existimatam, que Restam bouis dicitur. Idem postea ait, se

non posse dicere Restam bouis, aut Bugrage, esse Diosc. & Galeni Ononidem. Itane sibi ipsi Anguill. constat, vt tam breui oblitus verborum suorum contrarium asserere audeat? O labilem hominis memoriam!

Aduers. eos increpant, qui Arrestam bouis Officinariam, Anonidem negant. Cæsalp. scribit Ononidem, quam quidam [Io. Maria Bonard. de miner. Mundi] Bonagam, alii Bulimacram vocant, solam inter suffrutices Trifolios aculeum gerere.

Bonard. limacia

Nomi. lingua

Aduers. & Anonis, Græc. vt Latinis Anonis & Ononis, Remora aratri, Restam & Arrestam bouis, acutella, herba vrinalis, Aegyptius Crateux Anguill. Ger. Stralfraur / heckelstrait, wertsensstrait / Wagen speer, heubchel / & Ochsensbrey. Belg. Stralfrauyt / prangwoerel. Gallis Arreste-beuf, Bugraues & Bugraues. Gallobelg. Bouvrande, quali bubulam. Ital. Bognabo, Bauga Balonaba & Anonide. Hisp. Barreue beey. Garribies, narillos, & ga: hnos Angl. Lamorthe; & pen yunc. Boh. Gesslice. Hung. Zglitze. Polon. Oglica / siue Lisfogian.

Locus Temp.

Anonis flore purpureo passim reperitur, præcipuè in Sægetibus atque cultis. Floret Æstate. In Ducatu tamen Vitiemb. circa Bol & Fontem admirabilem abundantem Augulo, Sc. ptembris, 2. Octobri. Anonidem flore albo misit mihi ex Burgundia Follinus Carolus, quam plantauit in horto Ill. E. C. Monthebardi.

Vires. ius.

Muria conditur [authore Diosc.] antequam spinosa sit. eibus gratissima. Quæ contumendo condendorum tenerum succulorum adhuc in Creta durat, vt Bellon. sentit. Radix exalfacit & extenuat. Huius cortex ex vino potus vrinam ciet, & calculos comminuit: idem vlcera in crassitate emarginat. Radix decocta in posca, dentium dolorem collusione mitigat: decoctum eius potum hæmorrhoidis sanare creditur. Quæ potissima decoctum eius & c. Onchafus non habet, neque Plinius, qui ex Dioscoride hæc aperte transcripsit: Estur etiam inuria condita. Recens verò margines vlcera erodit. Radix decoquitur in posca delon dentium. Eadem cum melle pota calculos pellit. Comitibus datur in Oxymelte decocta ad dimidias. Ononis, inquit Galenus, radicem habet tertio ordine exalfacientem. Cortex ipsius maxime vsui est, qui habet aliquam vim extergendi, ac incidendi. Vnde non solum vrinam ciet, sed etiam lapides atterit. Eadem facultate etiam crustas breui remouet. Vtuntur ipso etiam ad dentium dolores, coctum in posca colluere iubentes. Tradit Matthioli Anonidis radici vim maximam inesse ad rennum calculos comminuos, expellendosque, præsertim obstructis vrinæ meatibus, multorum testimonio iam comprobatum esse, qui calculo laborantes, cum corticum radicis puluerem tantum è vino diutius bibissent, pristinam sanitatem recuperarunt: nouissimeque sefe ait, qui huiusce radicis puluere duntaxat multis mensibus sumpto, carnosum tunicem abstumpsit, & sanatus est, cum à Medicis solâ sectione, vitioneque curari posse decretum esset. Erodontum huius radicis puluere callosi ac indurati vlcera margines. Decocta in posca, dentium dolores mulcet, si decocto os colluatur, præsertim cum punita redundat. Eiusdem decocto solo, putant quidam sanari hæmorrhoidas. Id verò certum est idem decoctum potum summpere ad icinoris & vaporum insarctus valere. Corticum recentium eiusdem radicis libræ quatuor minutim concisæ in vini Creuicilibris octo macerantur: deinde

Radix Cortex dicitur. Coler. Doler. Hano. da.

Vlcer.

Comit. morbi.

Temp. ment. Vrin.

Rennum culi.

Cortex radicis.

Carn. rane.

Hæm. saru. Aqu.

in vi.

in vitream metam coniciuntur, ex qua in calentis aquae balneo colloata elicitur aqua, quae epota semilibrae pondere, non solum reus à calculis liberat, & vinam prouocat, sed etiam vesicam, & eius ceruicem à glutinosis extremis obsessam expedit. Ceterum, quod Veteres hanc herbam, antequam spinosa fieret, muria condierint, factum est, quia in cibo sumpta fatidum oris halitum emendare tradebatur.

Anonis spinosa lutea.

Anonidem spinosam luteo flore habeo collectam in Aetia, quae minor vulgari purpurea & alba.

Matth. in Dioscor. & post. comm. Ital. Anonis flore aureo.

ANONIS LVTEA NON SPINOSA, DA-lechampio Natrix.



Anonis vulgari similis est, virgulis cubitalibus in frequentes ramos fissis, spinarum expertibus. folia terna coherent, oblonga, hirsuta, per extremum crenata, viscosa, odorata, sapore nullo evidente: flores longis natuntur pediculis, Anonidis spinosae purpureae maioribus, lutei, conferti:

siliquae viciales, te retes, hirsuta, semen colore pullo, inquit Camer. Herba tota est hirsuta, & pinguis, odorata, sed hircinum quiddam olet.

Camer. in Egit. Matth. figuram ex siccis meis plantis D. Gese. missis sub his nominibus ponit. Anonis lutea, montana. Natrix alia. An Bellon. de Plin. Creta prouenientibus, Vera Melilotus odorata, crescens in collibus herbosis, similis ferè Ononidi? Lob. & Pena Adn. vocant Natrixem Plinii Herbariorum, & describunt distinguentes ab Ononide lutea. Huius forsatsè meminit Matth. cum ait: Anonis interdum constat flore aureo, sed quibusdam in locis aenleis vacat.

De hac ita Caesalp. Diosc. Cicer. silu. tradit, odore grani. Hoc genus videtur significasse Theophr. cum dixit inter ceteras differentias, quoddam odore differre: & Aëtius Orobiazum hoc idem appellasse videtur: specie Ononis [vnde quidem Ononim laeum appellant] flosculos fert & siliquas exiliore Cicere, & femina in his parua & rotunda, sub flaua: tota planta constat odore valde medicato, Theriacam imitante, vnde vulgò Theriacaria herba vocatur, laudata ad vermes, enecandos. Quod Caesalp. flosculos dicit Cicere exiliore, non conuenit cum nostra Anonide, cur idem floris colorem non tradat, nos tacet. Ononim luteam non spinosam (inquit Hist. Lugd.) sunt qui Melilotum maiorem, Melilotum silu. pinguem, & Natrixem Plinii cognominent. Et haec, quòd non solum radix euilla, sed &

herba tota virtus hirci: aut, vt aliqui exponunt, bituminosum & granem fetorem redoleat. Ceterum hoc in Piceno (ait Plin.) à feminis abigunt, quos mira persuasione Fatuos (Faunos alii) vocant: ego species limphantium hoc modo animorum esse crediderim, qui tali medicamento iuuantur.

Dodon. Anonis flosculo luteo. Clusius Anonidis nostra hirci seòdè meminit: Anonis mitior, non spinosa, siue secunda, flore luteo [praesertim si in hortis colatur] purpurea aded similis, vt ab ipsa antequam flores explicentur nisi diligenter in ter se conferantur (vix discerni queat: paulò tamen pinguior deprehenditur, nec aded grauiter odorata: praeterea vbi spontè nascitur candidior est: eius item flores, qui lutei sunt, breuiori spica nascuntur.

Scribit Ponain Baldoperperam Anonidis luteae multos pharmacopaeos pro vera Meliloto vti.

Anonim luteam non spinosam Monspeliensis arenosis collegimus, & quidem florentem Augusto & Septembri, Aprili & Iunio. Hanc alias vidi Eslinga in horto Volmarii pharmacopolae. Genuae copiosam iuxta Arne vltra flumem circa superiores partes florentem Iulio. Frater C. Bauh. misit cum hac inscriptione: Natrix Monspelsuli, prope Buttonet campus referretur: Item in Castelnau, quibusdam Melilotus vndeofus: floret Iunio. Frequentem obseruauit Clusius in Galia Narbonensi, tñ in Hispania & Lusitania florentem Iunio, & Iulio. In aridis, glareosis & sabulosis pignis tradit Hist. Lugd.

Eadem teste aduersus omnia venena prodesse & adnotam & sumptam experientia comperitum est.

ANONIS NON SPINOSA PURPUREO FLORE.



Alut Si-
lesiac
prata Anonidis quoddam genus à vulgari diuersum, quod ab aliis minimè obseruatum Clusius in Pannon. existimat. Multos hoc annuatim ex radice dura, lignosa & perenni fert siliquas cubitales, rotundos, lentos & vimineos, firmos tamen & admodum ramosos, mollique lanugine obductos: multa siliqua alternatim caulem latè basi amplectentia, interdum singularia, plerumque autem terna, ex eodem pediculo prodeuntia, molliora & ampliora, quam vulgari: summae virgae & rami desinunt in oblongam spicam florum vulgari quidem similitum, sed colore magis sanguineo, siliquas deinde persimiles vulgari, quemadmodum & semen fert. Tota planta lento quodam humore grauiter & hircinum olente obsita est, Fraxinella ferè odore, & nullo aculeorum yallo munita.

Vocatur autem haec à Clusio tam in Pannonia

Ateliloti
vera.

Locus &
tempus.

Vires.

Descriptio

Anonis m-
triar
Trifolium
fretulum
Ononis sine
spinis

quàm post. Hist. Anonis non spinosa, siue mitior prima, flore purpureo, cuius semen è Silesia ci-
millum Trifolii maioris & fatidi nomine. Dedit nobis D. Agerius Ononidem purpuream sine spinis, collectam in Sclauonia, ea nostrati spinosæ alioqui similis, nec respondens: con- Clusii.

TRIFOLIIS AFFINIS ANONIS
pusilla glabra frutescens Cherleri.

Descriptio

Lignosis, palmaribus & breuioribus fructat
surrectis, subrubentibus, tenuibus, glabris, quos *salsa* stipant crebra, tergemina, glabra, viridantia, circumcirca crenata, oblonga, Medicæ nostratis foliis quadantenus similia: ex quorum sinu prodeunt, per totos ramos *stres* maiusculi conformatione leguminosorum, lutei, calyce in quinque segmenta flore longiora, acuta, ex rubro nigricantia, diuiso: succedunt siliquæ turgidæ, nigricantes, glabræ, Græcæ minimæ minores, semina quatuor, aut quinque sinuata continentes.

In figura nostra folia sunt eiusdem ferè magnitudinis cum ipsius natalia foliis.

Circa Monspeliam in rupetis & squalidis collegit, & ad nos attulit Gener Cherletus. Floruit aurea Maio, & pauld post siliquas tulit, aliis subinde atque aliis pro stientibus stoculis.

TRIFOLIIS AFFINIS ANONIS
minima hirsuta Cherleri.

Descriptio.

PAti cum lutea minima glabra surgit altitudine, lignosâ, duraque & albicante, dimissâ radice, in multos ramulos hirsutos, rubentes, vel incanos hirsâ: *salsa* terna, angustiora, longiora, per extremum duntaxat crenata, alioqui casuræ ignara, hirsuta: calyces per ramos crebri, magni, pilosi

modum, in quinque longas aristas delincentes, pediculo contorto, deorsum terram spectantes, capcellis suis *stres* complexi paruum, ceterâ al-



Locus & tempus

Descriptio.



bidum, ostello ferrugineo. Tota est tactu viscida.

In rupetis Monspeliacis & Nemaufinis vtcunque obtuam animaduertit & collegit Cberlerus.

FRAGARIA FERENS FRAGA RVBRA & alba.

CAP. LXX.

AD Trifolia accedit vel *siliorum* numero Fraga-
garia, fert enim in singulis pediculis terna, sed Rubo minora, venosa, hirsuta, per ambitum serrata, superius viridis, inferius autem albican-
tia, *cauliculum* palmi altitudine, ramulorum & hirsutum, *stres*

Ranunculo minores, in quia folia sectos, candidos, *fructum* globosum, inaequalem, per maturitatem rubrâ, odoratum, sanguineo, dulci, vinoso, gratissimoque succo prægnantem, *seminibus* multis & exiguis abundantem, radicem fibrosam, capillarem, oblongam, subrusam, perennem, gustuque adstringentem.

Maximâ sui vel insuetæ vel negligentia notâ Brunfels. Tom. 3. Rhapl. 14. pro Fragaria Mellilotum vulgarem exhibet. Ita vt mento à quolibet in dubium vocari possit, an Fragariam vulgatissimam herbam aliquando viderit.

Præter fraga rubra & alba, Camer. teste, reperitur aliud genus, inter hæc coloris mediâ, seu flauescens, maius multo & rotundius, quod vulgò Bröslung dicunt, tardiusque mature scit. Possent vocari fraga serotina.

Tabern. Trifolium fragiferum. Herba quæ fraga fert [ait Hist. Lugd.] Fragaria ab uerbis nominatur, quæ quomodo à Græcis appellata sit, nondum constat. Fragariam autem ex quinque foliorum genere esse quidam arbitrantur, quod falsum. Sunt etiam, qui Rubum Idæum non spinosum esse putant, quorum sententiam non improbat Cronemburg. & Fuchsius, quibus non subscribunt Lob. & Dalechampi.

Apuleius Græcis *strawberry* appellari scripsit, quod si verum est, longè alia est à Comato, quæ ex Dioc. Galeno & aliis describitur. Fuchsius tamen vidit codicem manu scriptum, in quo hæc verba: *Comaron Græci, Romani Fragum*. Quicquid sit, ex numero Mororum esse constat. Græci Comaron appellantur, ob fructus arbotis eiusdem nominis. *Fragaria* à verbo frago, quod odorem reddo significat, nominata est.

C. Baub. phyt. Fragaria 1. vulgaris. 2. fructu albo. 3. hispida foliis. 4. bis fructum ferens,

Fragariæ, vt Cæsalp. notat, fructus differentia paucâ, in figura, & magnitudine: nam quædam rotunda sunt, vt Arbuti fructus, quædam oblonga,



Locus

Defect.

Brunfels.

Fragaria
rind.
Trifol.
giferum

Quinquaginta
lium.
Rubus
dans.

Morua
Fragaria
guâ dicit
C. Baub.
differen-

Tabern.
diff.

longa. Quoddam genus in Alpibus Bargeis visum est bis in anno fructificare, Vere scilicet & Autumno: eius fructus modicè compressus & stricinus est, sapore Rubi Idæi. Plinius Fraga tantum meminit in Italia. Non autem idem est, quod apud Scrapionem Frage, de quo H. n. lib. 15. post Pipet. Apud Theoph. Chamabatus Humiribus vocatur, malè. Diosc. inter genera Pentaphylli intelligit, inquit Cæsalp. quam opinionem postea refutabimus.

Cæterum, Fragaria meminerunt Fuhs. Lob. & Pena Adu. Obs. & Ic. Pl. Tragus & Gesnerus. Qui duo præter tubum & album, singulare genus tradunt, quod herbeer appellant. Cronenburg. cum Cordo, cui Gesn. ex Trago figuram addit, Fragulam vocant.

Cæterum, legisi, si nõ neglexisti, Fragariam serere in singulis pediculis terna folia, nec plurà, licet asserat Brasavolus in Veronensi agro nasci Fragariam, cui quinque pediculo infunt folia, quæque fraga gignat, in cibus gratissima.

Ἡ ἀγρίαν τριφυλίαν. Had. tun. herba appellatur, Fragaria vulgo, & Fragula, germ. Erdbeer fraut Gallis Fraiser, Ital. Fragaria & Fragole. Ipsi fructus Virg. ac Ouidio fraga, Seruio Mora terrestris, Germ. Erdbeer Belg. Erdbeysen/ Gall. Fraises, Gallo-Belg. des Chapirons, Ital. Fraga Hilp. Miez-gado, Maynera, Angl. Strawberry, Bohem. asody, Hung. Epöry.

Passim in montibus, non raro in conuallibus, in siluis, ac aliis similiter aliquantum umbratis Fraga gignuntur: proficiunt & in hortis. Viret toto anno herba: Vere latius fibris suis expatiatur, ac deinde floret: Iunio, prius ac tardius fructus maturi sunt.

Coqui, autore Trago. ex Fragis pulcriculas utilissimas conficiunt, quæ ob refrigeratorium vim inflammatione laborantibus reuulsus quam sanis exhibentur. Aqua è fragis destillata præstantissimo est remedio internis quibusvis icoris & pulmonis, aliisque totius corporis inflammationibus, siueque resinguerde: ad eadem Fraga ipsa faciant. Leprosi, quibus nihil calet sanguis, faciesque plurimum rubet, aquâ fragorum destillatâ longo tempore vitam ac valetudinem tueri possunt, si bis aut ter quotidie illam bibant mensura trinum ligularum. Aqua fragorum destillata, pari ratione bibita, cor confortat, vitia thoracis expurgat, morbum arquatum discutit, sanguine purgat, & emendat. Herba Fragariz tuxta succus malignis & calidioribus vulneribus apprimè conducit: nam glutinat ea, & ad sanationem perducit. Aqua Fragorum vlcibus oris & anginae auxiliatur gargarisato. Eadem facies ruborem & maculas tollit, collutu. Vlcera tibiurum hac aquâ ablui & purgari debent, lincolisque in ea madesactis semper illis imponi: nonnulli ad oculos collyria ex Fragis conficiunt, nam sal illis admiscunt, posteaque destillant: alii Fraga cum sale, æneo vase, recondunt, ac per octiduum cella vinariz committunt, quoad in viridem aquam mutantur: eâ postea ad oculorum suffusiones vtuntur. Succus igitur Fragorum expressus ad multa vitia, visum primis, vt Camer. notat, & retentæ vrinæ, Longo tempore asseruatur, vitæque virtute acquirit. Decoctum ex herba & radice diutius usurpatum cum passulis ictericis prodest. Stillatitia aqua manantem sanguinem sistit.

Serapio (inquit Fuchs.) Fragariam calidam & siccam in secundo ordine tradit. Alii frigidam & humidam in primo: Nonnulli [qui tamen pror-

fus meo iudicio hallucinati videntur] in tertio ordine scribunt. Ego folia ipsa gustu modicè esse amara, & adstringere deprehendi, vt siccam esse hac ratione, & minimè humidam oporteat. Folia, flores, fructus, & radix adstringunt. Differunt tamen inter se, quòd folia potissimum recens nata, plurimum in se habeant aquæ substantiæ; parum verò adstringant: ad eò vt verisimile sit de his locutos esse, qui frigidam & humidam in primo ordine Fragariam staturerunt. Est enim eorum temperies ex terrenâ essentia, & aquæ tepidâ. Fructus immaturus frigidâ terreâ substantiâ præditus est, vt frigidus & siccus hoc nomine dici mereatur. Maturus autem non parum siccitatem temperati calidi, qui dulcis est, modicamque adstrictionem habet, ita vt calidus & siccus dicitur veniat. De fructu itaque intelligendi erunt, qui Fragariam calidam & siccam esse affirmant.

Experuntur tandem in cibus Fraga (inquit Cæsalp.) quorum gratia & coluntur in hortis. Refrigerant & humectant, pichrocolis conueniunt, & siticulosi, sed copiosiore cibo caput tentant, & inebriant: eorum succus incipientibus inflammationibus commodus, præcipuè gutturis; vetustate vires acquirit efficaces ad oculorum suffusiones & ad faciei vlcera: Aqua destillata prouocat menstrua. Herba adstringenti sapore constat & subamaro, ad calculum utilissima, & lienosis, hepaticisque. Ad calculum fraga matura in phialam aquâ ardente optima plenam conuicito, post horas 40. circiter, colato, & rursus noua in eandem aquam ardentem inuicito, ac sic relicto optimè testâ & munita ne quid expiret. Prima autem fraga quæ post colatam superant, per lintheum validè exprimere poteris, & expressum eum liquorem seorsim seruare. Cùm vti voles, ter aut quater in mensè cochlearium plenum sumes manè & addes puluerem de Saccharo cando. Gratum, probatû, efficacissimumque hoc remedium est, quod ultra 20. annos calculo confecti, præ cæteris omnibus, quæ innumera eis diuersi medici præscribere, Gesnero commendauerunt.

In cibus exi-
peruntur.
Temperia
mentum

Inebriant
Succus
Cautus.
Oculus, sic
cic.

Menstrua.
Herba Cal-
cine.

FRAGARIA NON FRAGIFERA, VEL non Vesca.



subtusque canescentia, ex hirsutis pediculis duas vncias longis, ad exortum gemina, vtrinque

Frangaria sterilis, vel potius non vesca; radice nititur lignosa, satis crassa, cortice ruffo, adstringente obducta, multis hinc inde enatis fibris capillatâ, sarmen- tis suis per terram serpenti- bus tenuissimarum fibratum productione denuò radices agens: folia hu- mi sula, tripartita, in ambitu serrata, molli lanugine suprâ

Coliculus
Flos
Calyx
Semen


Fragaria
filu
Sterilis

Locus &
tempus

mucronata membranulâ eleganter alatis: coliculus teres, hirsutus, vno aut altero folio tripartito stipatus, sextantalibus, flosculum sustinet pulchellum, candidum, inodorum, quinque foliolis constantem, ex calyculo decem mucronatis, hirsutis folliculis donato: in medio staminula plurima: semina ex capitulis, Pentaphylli aliquantum similibus.

Lob. Obl. fragaria fluestris minimè vesca, siue sterilis. Geln. hort. Fragaria species sterilis. C. Bauh. phyt. Fragaria sterilis.

Fragaria sine fructibus vesca: Montbelgardi in orto Ill. E. C. flor. Martio & Aprili.



PENTAPHYLLON SIVE QVINQUEFOLIUM Veteribus.

C A P. LXXXI.

Non scandit quidem Pentaphyllum, nec ceu Fragaria, trifolium est, sed huius inftar serpit, ac similia folia, nec fructum valdè dissimilem, aded vt non nunquam à quib. dat confundantur, profert. Quæ ratio est, quòd hunc ei demus locum.

Dioscoridi
lèisò valdè
illustratur

Quinquefolium (itaque describente Dioscor. ramos fert, sarmentitios, tenues palmi altitudine, in quibus est fructus *εἰς δὲ ὅ κατὰς*: Folia habet Mentha: *ἡδὲ ὅμοια*, similia quinque in singulis pediculis, rarò plura, per ambitum ferræ modo fissi: florem cum pallore iubentem, auri specie *ἀχρὲ λευκῆ, χρυσοειδῆς*) Radicem subrubram, & longam, veratro nigro (*ἐλατόρου μὲν*) crassiorem.

Theophr.
sive Pentapetes

Πενταφυλλόν, aut πενταπέτα (vetroque enim, inquit Theophrastus, appellatur nomine) radix cum effoditur, rubra, siccata verò, nigra & quadrangula (*τετραγώνου*) existit, habet folium Viridis (*βίαιου*) parum quidem, ast colore simile: creticit & perit cum vite (*τῆ ἀμπέλου*) Folia omnia quinque, vnde & nomen: caules verò super terram (*ἐπὶ γῆς*, quam particulam Theod. omisit) tenues mittit, ac internodiis (*κνήμας*) crebris constat.

Quinquefolium
Plinius
Chamaezelum
Chamaemelum

His similia Plinius tradidit. Quinquefolium nulli ignotum est, quòd etiam frago gignendo commendatur. Graeci vocant Pentapeles. siue Eamszelon (vel vt alii Chamaezelum, Hist. Lugdun.) siue Pentaphyllum. Quum effoditur rubram radicem habet, hæc inarefcens nigrescit, & angulosa. Theoph. legit *τετραγώνου* quadrangula sit. Nomen à numero foliorum habet. Et ipsa herba incipit & definit cū vite. Hæc quidem ex Theophrasto mutuata esse constat (licet mentio eius non fiat) præter illud, quòd gignendo fraga etiam commendari scribit. Nec hoc obscurum est, & ambiguum, vt Hemolaus, Cornar. Matth. in post. com. Ital. & Hist. Lugd. somniant. & ante hos Leoniceus, qui errasse in hoc Plinium maximè credidit, quòd Quinquefolium etiam fraga ferre dixerit Pentaphyllum, atque Herbam fraga ferentem pro eadem accepisset, ac Pentaphylli notas, simul ac vires, eidem herbe, præter Pentaphylli nomen, adscripsisse censuit. Nam quæ herba etiam fraga gignendo commendatur, & nulli ignota est, inquit, non quinis, sed trinis duntaxat constat foliis. Existimarem quidem in re tam nota, esse codicis potius, quàm Plinii errorem, ac pro Pentaphylo, Trifolium legi oportere, nisi alia nomina subiungeret, quæ sunt Pentaphylli propria. hæc ille. Verum triplicin errore versari Leoniceum, sequentibus rationibus Colliniucius perspicuum

Theoph.
sive
sicutur

Plin. not.

Plinius testis
non est ob
scuro, si
nonnulli so
mniant

Plin. not.

Leonice
scripsit
error

fecit. Primum quidem, quòd Quinquefolium illam esse arbitratur, quæ in hortis, & agrorum limitibus, tum semitis, viisque passim conspicitur, quæ quidem vulgò, & Quinquefolium, & Pes corinus dicitur. Hanc enim Quinquefolium esse, de qua hic loquimur, affirmasse illum præterque constat: cum de nostra hac defensione, deque sua accusatione sermo fortè incidisset: auulsumque terrâ ramusculum (nam & in hortis res agebatur) ostendisse, dixisseque illum Quinquefolium esse, in qua Plinius tam euidenter errauerit. Deinde, quòd per impentiam, herbam fraga ferre nullam posse credidit, nisi eam, quæ trina folia habet, quamque meliùs Trifolium dici adseuerat, & quam docti, vulgusque, Fragariam noscunt pariter & appellant. Tertio, quòd folium quid sit, quoque modo accipi oporteat, in saluberrimæ herbe descriptione, parum intellexisse visus est, quas rationes postquam variis sulciuit aliis, concludit tandem verum esse autorem Plinium, & calumniatorem Leoniceum.

Pes corinus non

Leonice luminis

De ratione nominis Pentaphylli annotat Marcellus. Non Pentaphyllum (*πενταφυλλον*) tantum vocari suâ ætate Theophrastus dixit, verum [*πενταπέτα*] etiam, factò ab aliquibus nominis a pennis auium, vt credidit Gaza: vt autem nos opinamur, quia in quinque folia se pandit & extendit. Fecit eadem etiam foliorum formâ, vt *pentatomon* (*πεντατόμων*) in quinque partes diuisum (diceretur). Sic à Dioscor. inter nomina, *pentadactylon* [*πενταδάκτυλον*] quòd vt in hominis manu quinque sunt digiti, sic in ea planta totidem foliorum diuisiones, *ψευδοστίννον* [*ψευδοστίννον*] quoque dictum, quòd Apium mentiarum, sitque illi in foliorum sectionibus quadantenus simile. *Calliperaton* [*καλλιπέταλον*] à foliorum pulchritudine, (*καλλιπέταλον*) à foliorum duritie, vt & *ἑλατόρον*. Quæmadmodum & in his [*ἄσπυατος* & *ἀλαφραῖον* & *πυράκωνιον*] latere ex figura, aut viribus eius aliquam rationem verisimile est. Vocatur & *θυμάκων*, Manus Martis. his addit *hermol. Pentaphyllum & Pentapteron* in Theoph. *Quinquefolium* & *Quinquepennam* Theodorum conuocasse. Etium hanc *Hermuborantem* (*Mercurii herba*) vocari tradidisse. *Egyptios* etiam *Dissiphi* cognomine, *Dacos Drocita*, & Italos *estlertum, Solutum & Thebotin*, quamquam corrupta putet nomina. Nam & *Therumbros* & *Theonestron* *Dissiphi* quoque dictam idem Hermolinuunt.

Pentatomon

Pentadactylon

ψευδοστίννον

Calliperaton

Xylopetalon

ἑλατόρον

Mercurii herba

Dissiphi

Dacos Drocita

estlertum

Solutum

Thebotin

Therumbros

Theonestron

Dissiphi

Mercurii herba

estlertum

Sexta decima herba (inquit Albert. Magnus de virt. herb. à Chaldeis *Carrulin*, à Græcis *Quin-Therabium* *quiesolium*, à Latinis *Serpentina* vocatur, & secundum Alexand. Imper. herba *Mercurii* dicitur, à *liator* *quiesolium*, à *Calipendulo*. Nec sibi pugnat Theophrastus, & Dioscorides, licet sibi de radice & folio agens, addiderit, Quinquefolii radicem effossam, siccatamque nigrescere. Nam hoc à Diosc. ided dictum non est, quoniam satis fore sibi credidit, si qualis ea esset cum foderetur, dixisset. Adiecit etiam vitigineum Quinquefolii folium esse, non quantitate, sed colore & formâ, quòdque naturam Vitis sequeretur. Sed illud videndum etiam quomodo hic Menthe, ille Vitis folio Quinquefolium esse dicat, quæ malè inuicem comparari posse videntur: quemadmodum & floris color in pallido albus, simul & auri flauo color dici. Hoc tamen non adedè difficile vtilium. Videmus enim aliquando in pallore hominis, vtrumque colorem illum.

Nascitur, auctore Diosc. in aquis locis, & Locus iuxta canales æaque ductus.

Est autem multi usus, eodem tradente. Potest enim radice decoctum, ad tertias deductum, si ore contineatur, dentium dolores sedare. Putredines etiam in ore, si colluatur, sistat. Et arteriarum asperitates, si gargarizetur, eximit. Alio quoque fluenti, & dysenteriae opitulatur. Arthriticis item, ac ischiadicis, si bibatur. Eadem cocta in aceto trita, imposita herpetas cohibet: strumas discutit: duritias, tumores, arteriarum dilatationes, aneurysmata appellata, abscessus, ignes sacros, pterygia in digitis, condylomata, & scabies sanat. At succus radicis tenera, ad hepatis & pulmonis affectiones facit, & ad lethalia medicamenta. Folia bibuntur cum aqua multa, aut vino diluto, & modico pipere, ad febres per circuitum repentis, in quartana quidem quatuor ramulorum folia, in tertiana vero trium, in quotidiana vnius (2r, vnum). Auxiliatur etiam comitialibus pota ad 30. dies. Sanat item breui morbum regium foliorum succus ad aliquot dies triu cyathorum mensura potus. Vulnera quoque & fistulas, folia cum sale & melle imposita sanant. Opitulatur Quinquefolium etiam herniae intestinorum: & haemorrhoidas sistit potum & impositum. Secatur & ad lustrationes ac purificationes adhibetur & purgandis domibus, [Plin.] Qui reliquum usum medicum sparsim pro occasione exponit, plane prout Diosc. habet, omnia tradens. Galenus Pentaphylli radicem fortiter siccare dicit, sed minime arem esse. Et idem etiam multi usus esse, quemadmodum & alia omnia, quae tenuium partium sunt, & siccata citra mordacitatem. Est enim & haec radix, siccandi vi praedita ex tertio ordine, manifesta caliditate minime participans. Idem scilicet loc. c.9. Quinquefolium tradit ab aliquibus Eupatorium vocari, eiusque radicem in vino coctam dentium dolores leuare: hoc autem etiam Diosc. tradit. Haec herba, si Alberto magno superstitiose illi credis cum folio trifolii inhumata, generat serpentes rubeos & virides, de quibus si fiat pulvis, & ponatur in lampade ardente, videbitur ibi copia serpentum. Et secundum Alexand. Imper. radix sanat plagas & duriciem, trita & emplatrata. Amplius scrophulas diluit velociter, si succus eius bibatur cum aqua. Sanat etiam passiones peccoris seu dolores, si succus eius bibatur. Soluit etiam dentium dolores, si succus ore teneatur, aciones oris curat passiones. Et si quis secum deferat, opem dat & auxilium. Amplius si quis vult à rege, vel à principe petere aliquid, copiam dat eloquentiae, si secum eam habeat, & obtinebit quod voluerit, videbunt etiam in lithiasi & dysuria succus eius habitus.

PENTAPHYLLUM SIVE QUINQUE-
folium vulgare tepens.

Non secus ac Fragaria, flagellis suis cubitalibus & bicubitalibus, terebinibus, hirsutis, rubentibus serpit: folia minorā Fragaria, quinque-partita, magna, hirsuta, singulis segmentis, in ambitu altis in ciliis serratis; pediculis quadrantalibus & maioribus, gustu viscido: flores Potentillae, lucei, quinque foliis constant latiusculis, apicibus in medio croceis, quinque foliis virentibus in pediculis singularibus, palmo longiori fastigio insidentes: capitula superueniunt exigua, minutis seminibus repleta, quae cum pericarpio spoliuntur, acetabulo florem tegente proteguntur. Radix longa, crassitudine interdum di-



gitali, colore rubro, sapore adstringente & exsiccante, exsiccata quadrata euadit.

Synonymiz
Camer. Quinquefol.
hort. Pentaphyllum repens & vulgare. Fuchs. Quinquefolium maius luteum. Lob. & Per. Obs. Quinquefolium sine Pentaphyllum vulgare. Ic. Pl. p. 690. icon sub fallo titulo

[Pentaphyllum maius flore subluteo, interdum albo] eius enim titulus est p. 689. Pentaphyllum, Quinquefolium vulgare: ubi icon non conueniens, & transposita: est namque Pentaphylli recti maioris.

Ex quatuor Pentaphylli generibus, quae in Italia videntur, inquit Math. primum à Diosc. historia nihil prorsus dissentit. Radix huic tubrubsens, licet id neget Brafsauius, quod alijs, vt mihi eam effodienti, verum esse deprehenditur. Sed contingere potuit [ait Apollo] hanc notam Ferrariae deficere, vlginoso fonte loco: vocatur Quinquefoli prima species & maxima. Hinc autem mirari subsit, pergit Math. Manardum Ferrariensem virum alioqui doctrinā insignem: quippe qui tam facile sibi persuaserit, id legitimum esse Quinquefolium, quod Graeci Heptaphyllum, officinae vero, herbarios quae vulgus, Tormentillam dicunt. Siquidem haec septem ex vno tantum cauliculo profert folia. Pentaphyllum vero quinque, vnde & illi nomen. Hoc radices Elleboro similes habet, crassiores tamen; oblongas: illa vero admodum breues, stumosas, simulque in vnum compactas globum. Gignitur haec plerumque in incultis, siticulosisque locis, in altis praesertim montibus: illud vero in campestribus, & prope aqua ductus, & in riguis. Quae sane omnia aperte declarant, haec in re Manardum caecum iussisse. Ceterum, nunquam admiratus sum Plinium in hoc (in quo tamen à Leonico, vt arbitror, immerito reprehenditur) quod lib. 25. cap. 9. tradiderit reperiri Quinquefolium, quod Fraga gignendo commendetur: Quandoquidem Quinquefolii genus est, quod à quibusdam Diapensia vocatur, in cuius summis cauliculis capitula spectantur fragis non dissimilia. Haec ille, qui asserit, Plinium non huic Quinquefolio, sed Saniculae Fuchsii, quam Diapensiam nominat, fraga attribuisse. Cum tamen Quinquefolium vulgare parua veluti Fraga potius, quam Sanicula, aut Diapensia habeat. Idem in post. comm. Ital. eadem dicit, ait Leonico non reprehendit, imò potius eum sequitur, ac cum Leonico ait se mirari satis non posse; Plinium dixisse, Pentaphyllum notum ex eo, quod fraga ferat: ipsum Quinquefolium contrarium demonstrare. Trago Pentaphyllum tertium, maius & vulgatissimum, quod officinae hodie verum Pentaphyllum dicant esse. Et licet hanc ipsam plantam Tormentillam esse statuatur potius, quam Pentaphyllum Diosc. &

Math. dist. ferentia.
Radix rubra contra Brafsauius.
M. uard. error.
Heptaphyllum, seu Tormentilla, non est Quinquefolium.

Leonico error.

Quinquefolii genus.
Diapensia.
Math. non tam.

Pentaphyllum maius.
Vulgatissimum.

Non est Tormentilla contra Trago.

Theophrasti, contrarium tamen cenſeo, quod ante quadraginta circiter annos, quum Geneuz publicè præſſè præparatiõni Theriaces, quã apparatus pentuſ. & diligentiff. Pharmacopæus Valerian. Doure affinis noſter, contra doctorum Medicorum & Pharmacopæorum ſententiã aſſerui, Termentillam non reſpondere antiquorum Pentaphyllo, ſed vulgare Quinqueſolium, & poſſiſſimũ ex nota, quam tribuit ei Theoph. quam nõ legerat, Doctiff. vir D. Sarracenus ſenior, radices videlicet ſiccatas, quadratas exiſtere, quod non conſpicitur in Tormentilla.

Sarrac. no-
tatur

Lenic. error.

Lonicl. 5. cap. 273. editionis anni 1573. Fruſtra vnius herbæ duas figuras habet cum inſcriptione Pentaphylli.

Icon erant-
poſita.

C. Bauh. 4. hyt. Pentaphyllon; ſiue maius repens. Brunſell. Pentaphyllum luteum minus. Thal. Harc. Pentaphyllum maius. D. d. gall. Pentaphyllum luteum maius. Item in H. il. lat. in fol. Quinqueſolium alterum, humilius cuius radix reſiccata, quadrangularis cernitur, ut à Theoph. ſcriptum: quod conuenire poteſt cum nigro Hippocratis: Figura ſub alieno titulo eſt, nempe Quinqueſolii maioris, quum verus tutulus ſit Quinqueſolium alterum vulgare. Schv. cat. Sil. Quinqueſolium officinarum. Cluſ. Pentaphyllum vulgare. Tabern. Pentaphyllum Dioſc. Brunſell. germ. nomine Pentaphylli minoris exhibet figuram Pentaphylli maioris repentis, ſed non admodum concinnam.

Brunſell. no-
tatur

Error quo-
randum

Tumerus (licet vnicum faciat Dioſcotides, alii verò quatuor, quorum Saniculam, vnum faciunt genus, abſque omni quidem ratione), tres inſignes nouit differentias. Quinqueſolium vulgare paſſim nalcens, Secundum multũ nã uſus, in paluſtribus proueniens, & locis aqua innundantibus. Quod an ſit paluſtre Cordi, dubitamus. Et tertium, quod videtur nobis Fragaria ſtenilis. Pentaphyllum, ſiue Quinqueſolium vulgare Germ. Fünffingerkraut & Fünffblat / Belg. Vyffvingerbuylt / Gall. Quineſucille, Ital. Cinqueſoglio, Hiſp. Cmes en rama. Angl. Cencſoly & Sync. Sinder große. Boh. Penlyſtet / Hung. Kõz de leucid ſiu.

Nomina
linguatum

Locus

Paſſim prouenit Lugduni, Monſpelii, Beffordæ, Montbelgardi, nec non ſpontè in horto E. C. vbi obſeruauimus cl mata eius deſcendere per murum ad pedes octo, vel plures, quærentia terram, & radicantia: Geneuz abundat florens Ianuario, Baſileæ adhuc Octobri, inter portam cineritiã & lapideam iuxta vias & hortorum margines, in aquarum ductibus & riguis.

Tempus

Vires & v-
fus
Soda frigi-
da
Epilepſia.
Sudores
Dyſenteria.
Cancer.
Tempera-
mentum:

Succus per nares attractus curat Sodam frigidam, Baius. Decoctum inſtar Ligni Indici paratum vtiliter exhibetur in epileſia. Sudores ciet, Thom. Eraſtus. Radix & poſſiſſimũ extractum ritè paratum in dyſenteria commendatur. Radix ex aceto decocta cancro exulcerato adhibetur: Camerarius. Siccæ eſt temperatũ, quare vrinque corpori prodeſt, maximè contra aliu fluxiones omnes. Herba Pentaphylli cum melle & aqua cocta, vlcera omnia ſanat, gingiuis medetur, arter. & ſcabritias gargarifatu & elluſione curetur. Aqua deſtillata inſdem pollet viribus. Cocta in aceto ſerpentia vlcera cohibet, ſiſtularum, inquit Tragus, & cancri, aliaque manantia & putrida vlcera. Aqua deſtillata tremulas manus iuuare traditur, ſi ex lapidè abluantur, ita tamen vt per ſe riuſus ſiccantur, non enim panno ſiccare oportet, quod aliàs in ablutione manuum ſacimus, Tragus. Citra morſus deſiccet, minimũ caliditatis habens, penetrat, adſtringit, alui profluuiis, Dyſenterie, inteſtinorum pro-

Aqua
Vlcera

Tremula
manus

Tempera-
mentum

lapſui, igni ſacro, & vulneribus remedium conueniens. Bibitur contra febrium circitus. Succus ſoliorum continuis diebus potus, regium morbum ſanat. Puluis Quinqueſolii ad vmbra exſiccatus, potus cum vino, optimus eſt ad dolentes ventris.

Ignis ſacro
Febrium
Succus
Puluis

PENTAPHYLLVM RECTVM.



ſequipal-
nari ac fe-
rè pedali alti-
tudine perele-
gans Penta-
phylli genus
eſt nobis rec-
tum, ſiue cli-
matis à vulgari
multũ diffe-
rens, cuius ra-
dix craſſa, pro
plantulæ mo-
dulo, ruſſa,
& ſubnigra, li-
gnoſa, adſtrin-
gens, cortice
ſquammato
teſta: ſiliæ ex
longis pedicu-
lis exerit quin-
quepartita ſu-
pernè ad medium vſque ſetrata, non illicilis pilis,
longiſculis, ac tatis obſita. Inter quæ in binis,
quas habemus, plantis, cauliculus ſurgit ſin-
gularis, ſiliis veſtus ex longo interuallo, lon-
giſculiſque pediculis adhaerentibus, qui ex biſi-
do ſollolo, ſeu vaginã quadam emergunt: circa
ſuprema breui pediculo hærent. Summitas in ra-
mulos aliquot diuancata ſi ſectus ſulinet, quan-
tũ in ex ſiccis apparet, croceos, Pentaphylli vul-
garis, è villoſis calyculis ſoliaceis emergentes, in
quorum medio villi tomentofi, decidantibus ſo-
liolis etiam manuſiſtis in conſpectum ſe-
dant. Vnde naſti ſimus hanc plantam non re-
cordamur.

Deſc.

Caul

Figla

PENTAPHYLLON ALPINVM SPLEN-
dens, aureo flore.



Plehra
Pentaphyl-
li ſpecies, in
multa capita
diuſa, in qui-
bus multæ
ſquammatæ
dices multæ,
ruſſæ, è qui-
liſ ex vncialibus,
aut longioribus
pediculis ſiliola
quaquaueſũ
denſo agmine
panduntur,
Tormentilla
ſerè ſicæ, me-
dia parte ſe-
rata, pulſa &
ſerè ſicæ,
a quot

Doſc.

aliquot pilis, vix ac ne vix quidem conspicuis in quibusdam partibus obfita. *Coliculi* aliquot palmares, summotenus diuisi *filiculos* sustinent pulchre luteos (quantum quidem ex sicca iudicare licet) foliis latiusculis constantes, in quorum medio *flamma* saturatiora ac ferè crocea. Eadem, certè aut non multum differens videtur, quam describit Clus. sub nomine *Quinquefolii* tertii his verbis: Ex radice fibrosa & nigricante, ramos promit humi se spargentes, & subinde oblongas alias fibras agentes: qui summo capite, multa folia proferunt. *Pentaphyllo* vulgariori ferè similia, in quinque profundas fissuras diuisa [quarum singulae inlar vulgaris *Quinquefolii* per oras serratae sunt] molliora tamen, aliquantulum inco- na & splendens, adstringens gustus: ex ho- rum medio cauliculi exeunt palmares, multifidi, qui pro stirpis exilitate satis magnis floribus præditi sunt, eleganti & planè aureo colore, mul- tis in tus croceis staminibus: semen aliorum *Pen- taphyllorum* more, in Fragi rudimentum conge- stum, fuscum, exile.

Clus. Pannon. & Hist. in fol. *Pentaphyllon* au- reo flore, siue *Quinquefolium* tertium, cui no- men *Pentaphylli alpini* aureo flore indidit. C. Bauh. phyt. *Quinquefolium* 6. siue minus, re- pens, luteum, alpinum. Schvv. cat. Sil. *Quin- quefolium alpinum* splendens.

Datum nobis hoc *Pentaphyllon* ab Agerio in Stiria collectum. Dono etiam accepimus à D. Jac. Zwingero. Crescit [inquit Clus.] in summis Austriacarum Alpium iugis, quæ tamen herbosa sunt, & sub Iunii finem floret, in hortis autem Maio.

PENTAPHYLLVM MINVS MOLLI lanugine pubescens, flore luteo.



Multa exe- runt ab vna radice capi- ta ramosa, hu- mi fusa, aliquot foliis *Penta- phylli* vulgaris & elatioris for- mæ similibus prædita, hoc est, quæ quinque foliolis in am- bitu serratis, mollique lanu- gine pubescen- tibus constant, sed non, vt illa [præcedens] incanis, gustu in initio exsiccan- te, deinde non- nihil linguam

vellicante: ex iis captibus prodeunt dodranta- les interdum cauliculi, similibus sed minoribus, foliis ornati, gestantes in summo multos flores lu- teos, elegantissimos, quinque foliis, vt superio- rum, constantes, medium florem occupantibus multis luteis staminibus: semen in caput, & veluti Fragi rudimentum congestum, fuscum: radix lō- ga, dura, satis crassa, foris nigricans, & tenuibus fibris donata est: sed & rami illi humi fusi ple- rumque fibras agunt, & vicina loca occupant.

Clus. Pannon. & in fol. *Pentaphyllon* 4. siue repens minus, flore luteo. Prima species. Cuius Tom. II.

figura in Penn. transposita est sub alio titulo, nempe *Quinquefolii* quarti secunda specie. Camer. hort. *Pentaphyllum* Bavaenicum, in campis asperis, circa Monacum se quens. Pannonico 4. *Clusii* non absimile. C. Bauh. phyt. *Quinque- folium* 4. siue minus repens, luteum primum.

Nihil illo vulgariùs secundum vias, locis siccis & nudis Pannoniæ, Austria inferioris, Moraviæ, & Bohemiæ. Floret incipit ineunte propemodum Vere.

Icon in 7^o non. trans- posita. Pentaphy 2. Bavaenicum

Locus Tempus.

PENTAPHYLLON PARVVM HIR- sutum.



Radix do- natu r cras- sa, longè, ni- grà: foliis par- uis hirsutis, ex pediculis dia- rum vnciatum longis: cauli- culis multis, hu- mis, quatuor vel quinque vnciatum: flo- ribus luteis.

Descriptio

Descriptio Clusii

Clusius suum sic describit: Cui præcedenti nascitur, atque etiam floret, minus tamen sic- quens, humi si- militer fuscum, cuius cauliculi

non virent, sed purpurascent, & graciliores sunt, folia angustiora, magis v. llosa, & illorum ora al- tius serrata: flores etiam magis aurei: in catens conueniunt.

Clus. Pannon. & in fol. *Quinquefolii* quar- ti siue *Pentaphylli* repentis minoris aureo flore, 2. species. Cuius figura quidem bene competit huic nostro *Pentaphyllo*: sed in Pannon. trans- posita est sub titulo *Quinquefolii* 4. prima spe- cies.

Synon.

Icon in 7^o non. trans- posita.

Trago *Pentaphylli*, siue *Quinquefolii* minimi genus, sub initio Aprilis florens, sine caule, fo- lis per terram sparsis, flore luteo, instar Anse- rinæ. Tragi quidem descriptio conuenit non autem figura. C. Bauh. phyt. *Quinquefolium* 5. siue minus repens luteum secundum. An Thal. Hæc *Pentaphyllum* minus, sustulitescens, quod radice constat lignosa, multifida, denso foliorum agmine, brevioribus caulibus digitali longitu- dine, minoribus foliis, locis aridioribus. An Ges- ner. de coll. *Pentaphyllum* minus, quod locus apricus & siccis nascitur, præcipuè collibus, floret Martio, aliàs etiam Septembri. Schvv. *quin- quefolium* vernum minus Taberna. In collibus siccis & secus vias. Aprilis occurrit in Silesia. Dod. gall. *Pentaphyllum* luteum minus. *Quin- quefolii* tertia species *Apollini* rad. 1.

Trago nota: tur.

Quinquefo- lium Ger- manum.

Passim prouenit, vt versus la Crotte Mont- belgardi: Bessfordiæ versus Castellum vidi flo- rens Septembri, & copiosè en plein Palais, flo- rens adhuc Nouembri.

Locus Tempus

PENTAPHYLLVM MINVS FOLIO subtus albicante.

Radix lignosa minimi ferè digiti crassitudine, quæ in fibras tenuiores abiens, longè latè-

Descriptio

que vagatur, cortice nigro obducta, sapore adstringente, ramulos emittens complures, etiam palmares, humifalios, in alios ramulos seditulos, hirtatos & nonnihil rubentes: in quibus folia, que pollice texeris, quinquepartita, singulis seg. natis circa mucronem leuiter incisis, superiùs v. renata, inferiùs albicantia: *stipuli* parui, lutei, quinque foliis constant, apicibus multis luteis medium occupantibus, subsunt ante in flori quina folia hirsuta, foris viridia, intus ad luteum vergentia, quibus interiecta totidem foliola dimidio minorra, viridantia.

Icon.

Figura nostra Fuchsiana non in omnibus placet: folia enim paulò acutiora, ad latera nimium ferrata.

Synonyma

An Camer. hort. Pentaphyllum minus?
Fuchsb. Quinquifolium i. siue minus, quod Pentaphyllo luteo haud dissimile est, non tamen passim, vt illud, quinque folia obtiners. Hoc cum non haberet aliud nomen Fuchsb. quo ipsum appellaret, inter Quinquifolii genera commemorare solent: Gall. *Quinquifolie petite*, Germ. Klein fünf fingertraut. Sed vt verum fatear. Fuchsio non fuit notum Quinquifolium, quod pingit. An Lob. & Pena Adu. Pentaphyllum minus luteum, omnium minimum, rarissimum sibi sibi pratis & herbis mucosis occurrit, vbi Tormentilla, radice non sese defixis ramulis propagante, foliis quæ terram spectant, albican-
tibus.

Math. 1607. p. 16b.

Math. Pentaphyllum, siue Quinquifolium tertium, folio paulo, subalbido, per terram repens. Hec ille in Dioc. & com. Italicis, quem quandoquidem in Hist. Germ. longè aliam ponit descriptionem & diuersam admodum figuram: quid de Pentaphyllo minimo scriberet, nesciuisse existimo.

PENTAPHYLLI MINORIS MAIORIS SPECIES SOLO SUBTUS ALBICANTE.

Descriptio

ESemih. Pentaphyllum quoddam nescio vbi ab aliis a seorsum multò maioribus, quam in præcedente, ex longis pediculis diuertentibus & quinque foliolis, ac multis septenis, oblongis, extremis subrotundis, serratis, subtus albican-
tibus: *caulis* palmariis, in summitate floribus luteis multis, ex brevibus pediculis. Radice nigra, longa, cum fibris crassis.
An à præcedente in totum differat, asserere non audeamus, locus, in quo creuit, varietatem forsitan induxit, icon quam portauit, est ex emptiis, non bene exprimens, folia enim nimium acuta.

Trag. 16. 24. 167

Tragus figuram habet sub titulo Quinquifolii exigui: ea non competere videtur vlli statum descriptionum, & folia minus esse acuta,

responderet nonnihil huic nostro Pentaphyllo. An Thal. Pentaphyllum medium, medio modo se habens, quoad folia inter maius & minus.

PENTAPHYLLVM RECTVM MAIUS.



NEc minus Deatrene adtingit huiusmodi, quam vulgaris lupini, multis adnatis autem, rubescens: *caules* cubitales & maiores, plures, duri & rigidissimi, teretes, subrubentes, villosi, circa summum in sinuque alas, modò longas, modò breues diuisi: *folia* hirsuta, Alceæ ferè similia, varian-
te diuisurâ

quintupli, septuplici, singulis legumini pro- fundè serratis, flores odore Agrimonie, Quinquifolii lupini: alicuius instar, colore luteo intensiore, diluore, & albo interdum.

Lob. & Pena Adu. Pentaphyllum album & purpureum par omnibus procerus & speciosus, &c. Item Obs. Pentaphyllum maius flate subluteo, interdum albo & rubio. Et Ic. Pl. p. 690. Pentaphyllum maius flore subluteo, interdum albo. Figura est transposita p. 690. Pentaphyllum album & purpureum. Hec ille, qui obsecutus est in Obs. siquidem eandem facit plantam album & rubrum Pentaphyllum, cum subluteo, siue nostro, de quo hic agimus in iconibus autem separat, notam proponens figuram, quasi album & purpureum differant à subluteo. Lectores igitur rem diligentius examinent, & considerent, quæ de Pentaphyllo albo cum radicibus bitholis scriptus ex Schvvenckfeld.

Dodon. Quinquifolium 2. maius. Potentillud esse, quod Hipp. lib. de vlcer. commendatur, & altius dicitur. Figura est transposita sub titulo non suo, sed Quinquifolii alterius non vulgaris.

Gesl. app. hort. Quinquifolium luteis floribus rectum, non serpens V. Voysello. C. Bauh. phyt. Quinquifolium 8. siue rectum luteum. Tab. icon. p. 119. Quinquifolii Theophr. maius, Grosse geel fünf fingertraut. Idè p. 120. habet aliam figuram, Quinquifolii Theophr. albi, weisse grosse fünf fingertraut, quæ an diuersæ plantæ, considerandum, icones sunt valdè similes. An Schv. cat. Sil. Quinquifolium, siue Pentaphyllum verum maius, 5. Camer. hort. Pentaphyllum rectum maius.

Observauit spontaneum in Alsatia, sicut & Montbelgard in orto Ille. C. vbi habuimus aliquando flore albo. Genevæ in horro fatum primo anno flores non protulit, florebat Maio vt Lugduni & Hiemeu perferetbar. Basileæ apud D. D. Felic. Platerum Ianio & Septembri flores videbam.

Loco temp

PENTAPHYLLON RECTVM MAIVS tenuius, villosius, Pannonicum.


Collegit D. Agerius in Pannonia Pentaphyllum nostrum recto maiori simile, cubitalibus & maioribus tenuioribusque caulibus, longis pilis hirsutis, non ita firmis: folia per caules, longos habent pediculos, dodrantes, longis etiam pilis hirsutis, ad principium duæ pinnae, foliorum instar, tenues, simplices, vnciam circiter longa. diuiduntur autè folia in sex vel septè portiones, profundè serratas, quales in prædicto, sed minores, villosiores, candidiores: rami diuiduntur in tenuiores ramulos, qui desigunt in capitula minima, quorum calyces minores, cum longis pilis, candidiores: Cuius coloris sint flores, nos latet.

PENTAPHYLLVM SIVE QVINQVEFOLIUM MAIVS radice bulbosâ, flore albo.

Radix eius [autore Schvv. cat. Sil.] longa, subrubra, cui sæpè annascuntur bulbuli Filipendulæ modo. Flores Maio, semen fert Iunio, & Iulio, in agro Vratislauensi. Vocatur Weisssünff Fingerkraut.

Consideres velim an hoc Pentaphyllum sit simile Pentaphyllo recto maiori, quod flore albo ludit [quo etiam colore] obseruauimus, quodque nostro iudicio exhibet Tab. vt antè dictum: perpendendum etiam an sit quod Lob. icon. p. 690. pro Pentaphyllo albo & purpureo ponit, de quo scripsimus prædicto loco.

PENTAPHYLLVM RECTVM, FOLIIS profundè sectis, subtus argenteis, flore luteo.



In numero-
sa capita di-
uiditur radix
rubens, ligno-
sa, satis crassa:
è quorum sin-
gulis caules re-
cti tolluntur,
rigidi, robusti,
dodrantes &
u bitales lan-
guine albâ
penitùs obdu-
cti, quâ derasâ
rubri apparèt:
folia partim
è radice lon-
gis pediculis
appensa oriû-
tur, partim è
caule, subtus
penitùs inca-

na & villosa, superiùs viridantia, in quinque primarias laciniâs breues diuisa, quarum vnâqueque profundè cursu subsecatur: caulibus scapus in multos diuiditur furculos, quibus flores insident satis magni, lutei, è calycibus laciniatis, albidis, lanuginosis.

An Lob. Obs. Pentaphyllum petraeum Muto-
ni, caulibus Tornaco proximis frequens. C. Bauh.
Quinquefolium 7. siue folio argenteo: exiguum
alterum Tragi, luteum minus Fuchsi. Tragi qui-
dem, vt antè diximus, descriptio cõuenit, ast ico-
nem eius, vt Fuchsi, ad aliam plantam refero
Tom. II.

Tab. icon. Quinquefolium petraeum maius.
Gross Stein fünf fingerkraut. Schvv. cat. Sil.
Quinquefolium petraeum maius argentatum
Tab. siue 10. quo officina nõ rectè pro verò vtur.
Sed cur Schvv. non adiecit, in qua regione
hunc usum obseruauerit. Volmario, cum Es-
sige esse dicebatur Pentaphyllum rectum.

Math. in post. com. Ital. picuram ponit sine
vlla descriptione sufficiente pro Pentaphyllo, si-
ue Quinquefolio 2. & Pentaphyllo albo. In hist.
germ. Pentaphyllum album, siue tertium. Quia
autem nec secundo in com. Ital nec etiam tertio
in Hist. germ. respondet, ei non bene notum hoc
Pentaphyllum fuisse constat. Adde nos sote albo
nunquam offendisse. Quare nobis meliùs sensif-
se videtur ad Hist. germ. Camer. qui Pentaphyl-
lum minus, cui in Epit. flores luteos tribuit, al-
bum à foliis albis, & non à flore [vt Matth.] nun-
cupari feribit.

Thal. Harc. Pentaphyllum canum, Gesn. de
coll. Pentaphyllum erectum magnus, candidum
subtus, tribus aut amplius è radice caulibus, flo-
rens Iunij initio.

Obsernari Montbelgardi in muris quorun-
dam hortorum circa La Croce eundo versus pati-
bulum ad sinistram, florens adhuc Augusto.
Lugduni Maio. Geneva virens Aprili & florens
Iunio. Basileæ, vt è quadraginta annis, in cat. pl.
Bas. annotant, abundat inter portam lapideam &
cinericeam, florens Iulio, item in itinere versus
Krenzack Octobri. Ceterum, Schvv. teste, in Sile-
sia, vbi vulgaris notitiæ, passim in aggeribus, &
secus arua, macro & arenoso solo fructat, & Au-
gusto floret.

PENTAPHYLLON VEL POTIVS HEPTAPHYLLUM flore rubro.



Valde
prolixas
habet radices,
& secundo
reptatu luxu-
riantes, ruben-
tes, lignosas,
fibus capillari-
bus aliquot
donatas: folia
quina, aut se-
ptena Penta-
phylli vulgari-
s, sed non eò
ordine sita,
verum ceu in
alam disposita,
subtus inca-
na, hirsuta,
supremâ partè
viridantia,
profundè per
ambitum serrata, pediculo non admodum longo
nixa, cuius inuam in vaginam amplam degenerat,
caulem amplectentem: caulibus flores gerit mag-
nos, rubentes, è quinque, aut sex foliis compo-
sitos, cum concoloribus apicibus, & turbinato
capitulo, fragi emulo:

Iconem exhibemus Cordi, qui Pentaphyllum
palustre vocat, & cuiusdam heptaphyllum Plin-
ii fragiferum.

Lob. & Penæ Adv. Pentaphyllum purpureum
Icon. Pl. Pentaphyllum rubrum palustre. Thal.
harc. Pentaphyllum palustre, Plinii fragiferum
existimatum, quod consimilia quidem capitula,

flore deperdito. Fragaria proferat. Et quia in eadem planta huius generis, folia tam septena, quam quina uero pediculo inhaerentia simul sepe conspicuntur, vnde & pro hexraphyllo quoque haberi possent. Item cum aliis Tragus obseruauit, qui describit tertio loco inter fraga.

Quinquefol. aquaticum. Quinquefol. palustre rubrum. Pentaphyll. rubrum. Locus & Tempus.

Tab. ic. Quinquefolium palustre, siue aquaticum, wasser sunffingerkraut. C. Bauh. phyt. Quinquefolium 9. siue palustre rubrum. Dod. gill. Pentaphyllum rubrum. In fol. Quinquefolium 4. cuius flores obscure rubetes: Gesn. hort. Quinquefolium palustre, floribus purpureis.

Planta nam in hortum ill. E. C. Montebelgardii attulit ex Mesgari Danigon, ubi pluribus durauit annis: repta non parum se multiplicat potissimum nisi humiliori sit loco plantata, profert etiam semen. Mense Martio in palustribus Ludisibus vidi reliquias siccas. Tigrum obseruauit circa lacum Kartzense. Insignis Medicus D. Leonhard. Doldius scribit ad me, circa urbem Norimbergam frequentissime prouenire cum foliis septem, aut sex potius quam quinque. Virginosis, inquit Schvv. Silesia putridis montium delectatur locis, ad piscinas & paludes fruticans. Iunio floret.

Vires & v. sus.

Adstringit tota herba praesertim fructus, ait Camer. Hinc teste Schvv. potum sanguinis profuuiis medetur.

PENTAPHYLLOIDES SVPINVM.

Descriptio.



Folia plurima, pediculis longis, ex radice crassifucula, longâ, multorum capitum, annectuntur coniugatum, singula serrata, ad Geranii supini folia accedentia: caules cubitales, inanes: numerosos gerunt flores, paruos, luteos, ex breuihus pediculis: succedunt capitula parua, Fragis immaturis similia

Pentaphyll. supinum. Tormentilla facie. Quinquefol. fragiferum repens.

Lob. Obs. & Ic. Pl. Pentaphyllum supinum Tormentilla facie. Hoc, teste Clusio, non nihil affinitatis cum Anserina Tragi, seu Potentilla Fuchsii, habere videtur. Tab. icon. Quinquefolium fragiferum repens, Kriechende Erdbbeer sunffingerkraut. C. Bauh. phyt. Quinquefolium 13. vel Quinquefolio simile repens. Dod. in fol. Quinquefolium tertium repens, siue supinum. Addit fragiferum Schvv. quod in Dod. non legimus.

Quinquefol. serpens.

Locus & Tempus.

Collegi florens Augusto Argentinx in horto D. D. Melchior. Sebizii: Frequens in agro Viennensi Clusius, in extremis pratorum marginibus secundum siluas: In Silesia Schvv. in locis montium graminosis.

Descriptio.

PENTAPHYLLOIDES ERECTVM. Radice praeditum est plorum capitum, crassifucula, lignosa, cortice saturatius rubente,



strenue adstringente pediculis plusculi prodeunt palmares, quorum extremo connectuntur terna folia, hirsuta, serrata, Fragariae xmulia, longè minorâ, rursusque eadem costæ vna aut altera consimilium foliorum coniugatio, quò longius à superioribus illis absint, nunciù:

inter hæc caulis nascitur cubito altior, hirsutus semel atque iterum, quinis iunctis foliis insignis, superius in ramulos aliquot diuiscatur, qui multos flores gerunt, albos, Pentaphylloides lupini duplò maiores, subiectis radiatis foliis viridantibus, hirsutis: floris umbilicum occupante capitulo frugum serente, vt in ceteris Pentaphyllis quod constat seminibus oblongis, serratis: huic (existimo) accedente cultura, folia multò maiora, folus coniugatum septenis aut quinis ad costam annexis. Palmaræ aliquatenus similibus, inter que fortuita intercedunt folia quaedam minorâ, veluti in Agemonia: pediculus interdum cubitalis.

An Clus. Pannon. & hist. in fol. Pentaphyllum seu fragiferum, Plinio fortitan non incognitum? Casp. Bauh. phyt. Quinquefolium 14. suo Fragiferum. A quo etiam accipi nomine Fragariae alterius seu silu. Cortuso, & Potentilla Recentiorum Guilandino, qualiter etiam denominabat doctus Medicus D. Hochstetter Pfortheim. Schvv. cat. Sil. Quinquefolium fragiferum erectum, Stehend / oder Aufrecht sunffingerkraut.

Nascitur in Leytenberg locis umbratis in media silua supra Manderstorf sita, quo loco duntaxat aliquot annis Clus obseruauerat. Nascitur in Pannonia, inquit Clusius, non modò in siluis arduis, sed etiam graminosis campis. Floret Maio, fructus paulò serius maturet, effluntque semina, quemadmodum in reliquis Quinquefolis. Supra Peterstorf etiam in siluis secundo serè à Vienna militari obseruatur.

Herba, radix, & semen, vt Schvv. perhibet, sic. Facili candi & adstringendi vim obtineat.

PENTAPHYLLON ALBVM.

EX radice multis fibris donata, pediculi plures exoruntur, palmares & sesquipalmares, tenues, angulosi, hirsuti, folium singuli sustinentes, quinquesidum, superne glabrum, viridè que inferne argentea lanugine villosam, cuius segmenta singula carinata serè, quædam longiora, quam minimum, alia minime serrata, in obtusum mucronem desinunt, quam in Tormentilla argentea longiora, superna parte virore non ita obscure, nec ita glabra: ex apycibus hirsutis: flores peculiatus quoque pediculis



diculis longiusculis infident, Fragaria, colore perinde lacteo, staminulis in medio luteis: sapor herbae glutinosus. Camer.hort. Pentaphyllum albo flore, maxime conueniens descriptioni. Hipp. lib. de vlcenib. In Hetruria vocatum Pentaphyllum argenteum. Fuchl. Quinqu



riuntur cauliculi exiles, & tenues, dodrantes, humi procumbentes, in summo ternos, aut quaternos flores proferentes, Pentaphyllo vulgari similes, sed profusus albos: quibus excussis, apparet calyx lanugine obductus, semen continens planum, seminis Ranunculi ferè æmulum, in rudimentum stagi congestum: radix crassiuscula, nigricans, in ambitu sese diffusit, & multis fibris hirsuta est. Clusio descriptionis auctori, Pann. & in fol. Quinqu

quefolium, siue Pentaphyllum maius candidum, Groß weiß süßfingerkraut / Gall grande Quinquette blanche.

Trago, Pentaphyllum 4. seu verum ac nobile, cuius nomen nullibi cognoscere potuit, quodque [si Diis placet] ὄρχηδον, florem in candido pallidum habere testatur Dioscorides. Hæc ille, cuius descriptio non competit descriptioni Dioscoridis, pingit autem sub titulo Quinquifolium Tragi des Βότκα süßfingerkraut Lob. & Pen. Adu. Pentaphyllum album. Taber. icon. Quinquifolium siluaticum. Casp. Bauh. phyt. Quinquifolium 1. siue album maius.

Mathiolo non fuisse ootum demonstrat tanta variatio quæ in eius descriptionibus. variis in locis exrat: quinimò in Hist. nò dicit flore esse albo, ac plàtã aliam proponit. A dextris nobis stat Camerari. ad nist. Germ. asserens, descriptiones Mathioli non conuenite cum suis figuris, nec decere vnã figurã diuersas comprehendere plantas.

Gesn. Quinquifolium, siue Pentaphylli species minor, floribus albis. Thal. in Harc. Pentaphyllon, Lupini folio: in ericetis quandoque & virgultis. Dod. gall. Pentaphyllon album. Schvv. cat. silu. Quinquifolium siluaticum flore albo Math. Pentaphyllon 1. Clusii.

Copiosum à me visum Sturgardie in horto Ducis, vnde quoque missum. Montbelgardi curauit plantandum in horto Ill. Ex. Cels. Cæterùm, Schvv. in Silesiæ siluarum vmbrosis ac humidis locis vigere obseruauit, cui vitum fides adhibenda, dubito: nam Camer. in Epit. Math. in saxis ingentibus, & saxosis locis, an per consequens in lictis nasci scribit.

Adstringit, siccatur, roboratur, repellit. Radix subtilem est partium. Ea omnia præstare potest [si Mathiolo credidimus] quæ Pentaphyllon vulgare repens, quo tamen adstringentior est.

Clusio descriptionis auctori, Pann. & in fol. Quinquifolium, siue Pentaphyllon 1. seu maius albo flore: cuius meminerit Anguillara, his verbis. Pentaphyllo ὄρχηδον, de quo Hipp. lib. de vlcenib. quamuis eò nomine &c. verùm in eius descriptione multa sunt, quæ non videntur coouenire, cum Pentaphyllo albo 1. Classii. An porrò Pentaphyllum album Clusii, diuersum sit ab eo, quod cum Trago, Fuchsio, & ali tradunt, cuius descriptionem iam antè dedimus, asserere non audeamus: non separaremus, nisi diceret Clusius, se duntaxat scribere, quæ à nemine adhuc euulgata sint. Schvv. non separat. Considerandum etiam an Anguill. Pentaphyllon non sit potius argenteum, flore muscoto.

Prouenit, auctore Clusio, non otiodò in colle illo nemoroso supra Manderstorf oppidulum tepidarum aquarum scaturigine nobile: sed etiam in omnibus illis montosis siluis, quæ à Danubio procurrentes, ad Alpes vsque pertingunt. In siluis item supra Nemethyvyvar, & Zollock, ipud Entzestorf, & plerisque siccioribus pratis, vno ab vrbe Vienna miliarium: in Morauia præterea, atque in montibus vltra Drauum amnem, Pannoniã interamni. Floret Aprilis & Maio, interdum denudò Autumno.

Locus Tempus

PENTAPHYLLVM FOLIIS INFERNÈ & SUPERNÈ INCANIS.

Folia obseruantur duntaxat terrena, confertissima, superiori parte crenata, supra, subtusque cinericea, candicante lanugine obducta, pediculis ornata breuissimis: cauliculi duarum vnciarum gerunt flores singulares, mauiusculos, candidos, ex calycibus internè externèque hirsutis dependentes: globus sequitur pilosus, albidus, pilis quibusdam nigricantibus, aut ruffis præditus: radix crassa, lignea, nigricans, vel atro rubore perfusa: ex qua plura capita squammata, ex reliquis, vt existimamus, pediculorum foliorum Veterum conspiciuntur.

Cæterùm, misit nobis olim Pentaphyllum hoc nostrum, p. m. D. Becchius Medicus Basileensis, idque nomine Quinquifolii albi Hippocratis. Clus. verò Pannon. & in fol. suum vocat Pentaphyllon 2. minus, flore albo: quod fortè describat Lob. in Adu. Suo tamen tribuit flores Fragarum.

PENTAPHYLLON ALBUM I. CLVSII. CAP. LXXII.

Multa folia habet, Quinquifolio vulgari similia, in quinque partes vsque ad pediculum diuisa, in ambitu minimè serrata, vt illa, sed extremis duntaxat foliorum oris, subtus incanã quãdam lanugine pubescentia, gustu inintò gummoso & emplastico, deinde nonnihil amaricante: aliquot sub his exo-

Descriptio Quinquifolium album Hippocratis

Clusii not.

ria floribus magnitudine non inferiores, quod eodem nomine, quo Lob. suum vocavit, insigniri possit, Pentaphyllum minimum & petraeum. Cùm tamen Lobeli diuersum sit à Clusii, quia flores muscosi.

An Gesa. hort. app. Quinquefolii albis floribus species quaedam in locis montium nascens: C. Bauh. phyt. Quinquefolium 2. siue album minus.

Locus

Nosttum à prædicto D. Becchio collectum in Baldo. Suum eruebat Clus. inter saxa & scopulos, summis Austriacarum & Stiriacarum Alpium iugis. Floret sub finem Iulii, interdum etiam Iulio & Augusto, prout iuga illa maturius, aut ferius à niuib. sunt libera.

Tempus

PENTAPHYLLVM, SIVE POTIVS HEPTAPHYLLVM argenteum, flore muscolo.

Descrip. tio



Radicem habet crassam, longi-
gulculam, si-
bratamque, ex
rubro nigri-
cantem, nunc
singularem, nunc
in multa
capita diuisam:
pediculi pal-
mates circiter,
argenteà lanu-
gine obducti,
folia sustine-
nt, in quinque,
aut septem se-
gmenta, vt
plurimùm, di-
uisa, per extre-
mum serrata,
subtus argen-
teo nitore splen-
dentia, mollique
villo tecta, su-
perius atro-virentia,
glabra: caules
dodrantales
& maiotes, tenues,
& aucus foliis vestiti,
ramosi,
muscosos, confertos
gerunt *flusculos*,
Alchimilla
modo, singulos
quaternis foliolis
virentes, foris
incanis, hirsutisque.
Adstrictionem
aliquam percipi-
mus in foliis.

peracri tamen sapore prædita, ex tuberosà radice
prodeuntia, gracili, septem, aut octo nihilo-
minus vncias longo pediculo subnixa, in quin-
que profundas, & ad pediculum vsque ferè per-
tingentes laciniis diuisa, nervo singulas lacinias
à pediculo ad summum mucronem secundum
longitudinem secante, & venis quibusdam ab
eo nervo in latera excurrentibus prædita. *Cau-
lemne* & flores profert, mihi incomptum, ait
Clus. sed *radix*, quæ, vt dicebam, tuberosa in-
stat radicis Tormentillæ, & solida, parte externà
aliquantulum fusca, internà verò alba, & cuius-
dam acrimoniæ particeps, duorum aliorum fo-
lorum, quæ abrupta, vestigia adhuc retinebat,
plenaque, & aliquot sibris donata erat.

Pentaphyll.
petraeumTormentil-
laArgentaria
petraea.
Herba stel-
la species.
Pentaphyllo
petraeumHeptaphyllo
montanum
Argentaria
montana.
Tormentil-
la alba.
Leontopodium
stellaria
argentea.
Argentaria
petraea.
Alchimilla
minor.
Argentea
Heptaphyll.

Lob. & Pena Adu. [vt & Ic. Pl.] Alpinum petro-
trosum & minimum Pentaphyllum cognomina-
tur, quod quidam Tormentilla annumerant, cui
multùm sanè simile est: flosculi candidi interdum
& purpurascentes. Gesn. hort. Argentaria
petraea, quæ videtur species Herba stellæ à qui-
busdam dicte, ob radiatam foliorum speciem.
Bergsinuaw, Steinsinuaw. An eadem de coll.
Pentaphyllum petraeum, in faxis iuxta aditum
fodinae ferrariæ in monte supra *Sergans*, vbi plan-
tae erant paucissimæ, florebantque Augusto?
Gesn. cùm apud eum essem vocabat heptaphyl-
lum montanum, & Argentariam montanam. Ille
lib. de Lunaribus in descriptione Montis fracti ait,
Argentariam, speciem herbae stellæ, siue pedis
leonis. Tormentillam albam vocabat Dalech.
Bened. Aretio Heptaphyllum montanum, &
Schaffsuppen. C. Bauh. phyt. Quinquefolium
12. siue heptaphyllum alpinum sericeum, & quo-
rundam Leontopodium Dioscoridis. Camer. in
Epit. Matth. Stellaria argentea, vel Argentaria
petraea, vel Alchimilla minor, & heptaphyllum
montanum. Item horti, Argentea heptaphyllos

montana. Taber. icon. Pentaphyllum petraeum
minus. Item pag. sequenti 124. Quinquefolium
alpinum, heptaphyllum Clusii. Clus. Hisp. he-
ptaphyllum flosculis candidis [virentibus.] Tor-
mentilla candida nist. Lugd.

Locus.

Lobelio occurrit in celsioribus montium iugis,
gelidisque cauitibus, quales sunt Sabaudiam,
in Austensi valle, & Neobona ad Calcans, hor-
tique DEL, ardua, & in verticibus editissimis
Mindenii. Gesnero in faxis, vel locis saxosis
montium helueticorum. Clusio in Pyrenæis iugis
apud Cantabros, florens Maio, in Alpibus
Alobrogum ferius. Nobis in montibus Gere-
uæ propinquis. Montipeli in cacumine montis
Esperon mense Octobri.

PENTAPHYLLVM INDICVM.



Descrip. tio

In sportulis
[autore Clus.
Exot. J. D. Nico-
lai Coli Medi-
ci, anno 1601. ex
Orientali India
adducebatur
Amstelred. ardu.
Pentaphylli In-
dici planta, cum
duabus aliis e-
iusdem generis,
formâ quidem
proorsus simili-
bus, magnitudi-
ne verò nonni-
hil differentibus.
Singulae porro
plantæ bina duntaxat
habebant folia,
eaque tenella,


peracri tamen sapore prædita, ex tuberosà radice
prodeuntia, gracili, septem, aut octo nihilo-
minus vncias longo pediculo subnixa, in quin-
que profundas, & ad pediculum vsque ferè per-
tingentes laciniis diuisa, nervo singulas lacinias
à pediculo ad summum mucronem secundum
longitudinem secante, & venis quibusdam ab
eo nervo in latera excurrentibus prædita. *Cau-
lemne* & flores profert, mihi incomptum, ait
Clus. sed *radix*, quæ, vt dicebam, tuberosa in-
stat radicis Tormentillæ, & solida, parte externà
aliquantulum fusca, internà verò alba, & cuius-
dam acrimoniæ particeps, duorum aliorum fo-
lorum, quæ abrupta, vestigia adhuc retinebat,
plenaque, & aliquot sibris donata erat.

PENTAPHYLLI EFFIGIES, LEVCAS
quibusdam.

C. AP. LXXIII.

LEucaem putant ex plantis habeo Valer.
Doutez. *radix* crassa, nigra, squammata, in
capita diuisa: tota à oqui planta, quæ vncialis,
aut selescualis, amerieo tomento obducta:
folia plerumque terna, Fragariae modo, minora,
magis villosa, candidioraque, serrata.

Lob. & Pena Adu. testibus, non penitus ni-
hil



TORMENTILLA.

CAPVT LXXIV.



caulem ambientia, Pentaphylli, hirsuta, sed diuisurâ septemplex: flores parui, lutei, Quinquefolii. In huius coliculo observatur aliquando adnatum tuberosum quoddam excrementum, concretionem Pomorum quercinorum, in cuius antris stabulantur vermiculi, seu teredines.

Tormentilla verò [quemadmodum a. p. l. s. prodidit] à septenis foliorum diuisus, heptaphyllon [vel vt hermol. Septifolium] quoque vocatur. Eadem in Quinquefolii specie reponitur, ob folia quippe duo iuniora, quæ tam exigua sunt, vt in foliorum numero à quibusdam repouenda non videantur. Et hinc fortè factum, vt Brassauolus hanc Plinii Pentaphyllon suspicatus sit, vt & Mandardus, quem propterea cæcutiisse Matthiolum dixit. *æc ille*, qui Matthiolum reprehendit eo loco, cum tamen ipse in dolis, ac versutis, & non Matthiolum, quem suo nomine metitur, magis quam in comitate confidit, inquit enim Tormentillam Quinquefolia, siue Quinquepeta Theophrasti tam aperte respondere, vt nulli magis: Nempe hunc in modum cum inter cætera dicitur 9. de nisi. pl. c. 14. Quin-

Tom. II.

hil sentiunt, Valerandus & alii, qui plantam hanc incanâ Pentaphylli effigie, intuiti, Leucadem censent. Tabern. ic. Argentina Mōpeliaca, melsch Sibib. f. r. A. Admodum inuentu rara, nec nobis lecta, nisi prope Allobrogum denixa, plantæ in arida, glareosi.

quefolium crebris internodiis constat, vt ne hylus quidem huic deficiat, nisi & duo folia excipias, quæ & certè ob eorum exiguitatem in numero foliorum recensenda, non videantur. Quæ postrema apud Theophrastum reperiri, nunquam vel somnauerimus. Cæterum, quum hæc absolute pronunciet Apollo, ei hinc errandi, aut verius Matthiolum suggillandi, ansam facilè iniuria, inuidiaque suppeditant.

Germani] inquit Trag. lib. 1. cap. 171.) hanc plantam Tormentillâ à Latinâ voce derivato nomine nuncupant, alii Birkwürtz, à Betula, quòd in iis siluis, quæ magnâ copia Betulas producant, & hæc luxuriat, nonnulli Birkwürtz, aut Rôthel würzel [sanguinariam aut rubricam radicem] vocant, eò quod Dysenterias, & vitia intestinorum curet. Dicitur & Bistorta [Cæsalp.] à nodis nimirum radicis quibus intorquetur, vt ca, quæ priuatim Bistorta dicitur (nam est procul dubio prima Pandectarii Bistorta species) & à plerisque Ferula. Ego autem puto nomine Pentaphylli insigniendam. Idem cap. sequenti ait Tormentillam nobilissimâ Pentaphyllon Theophrasti & Dioscoridis esse statuo. Quod verò ita sentio, Theophrasti me mouet descriptio. Tandem lib. 2. c. 37. Miror (inquit cur Alex. Bened. Sparganion nominet. hæc ille. Quod autem Tormentilla Theophrasti Quinquefolium non sit, solâ Theophrasti autoritate refellit, vt iam sub Pentaphyllo vulgari docuimus. Male igitur sentiunt Tragus, Gesn. Michael Hamelbergius, Valeriola, & alii, qui Tormentillam, Pentaphyllon esse existimant: hæc enim septena folia habet, rarò pauciora, præter id, quod teste Maranthi, alia nota non respondent.

Quærentibus potèd Lob. & Penâ in Adu. & Obs. an Tormentilla, vel heptaphyllon. Chryfogonum Dioscoridis sit: scitè, nostro iudicio Dodon. negatiuè respondet, dicens. Tormentilla fruticis modo haudquaquam, vt Dioscoridis Chryfogonum attollitur, nec flos eius similis est Coronati Verbasci floribus, vt Chryfogoni: ergo Tormentilla Chryfogonum non est.

Nominatur verò Tormentilla (vt Lob. & Penâ notant) quia tormentum cruciatumve dentium sanissimum placat, atque venenatarum quarundam rerum compescit furorem cruciantem. Meminit & Hermol. Tormentilla, quodam esse scribens, qui ad Saxifragam referant.

Græcè *ἑπτάφυλλον*, Septifolium, Latinè vulgè Tormentilla nominatur, Germ. Birkwürtz, Rot heilwürtz & Tormentill / Gall. Ang. & Belg. Tormentille, Ital. & Hispan. & Hungar. Tormentilla, Boh. *Watrzyf*

Obscruauit passim Basileæ, Montpelii, & Geneuæ in pratis, vbi folia prorumpent Martio, florebat Maio, Iunio, & Iulio ibidem audiui Rhizotomum vocantem *Manor*. Nemoribus (ita tradente Hist. Lugd.) opacis, montosis etiam, siccis macilentisque locis gaudet. Serò & æstatè floret.

Tormentilla omnibus vulnerariis potionibus, emplastris, & vnguentis adiungi potest nam vetera & putrida sanant vulnera, sus, vino, vel aqua decocta, collutione & inspersu. Est & in omnibus medicamentis, quæ aduersus venena & pestem componuntur, adhibenda. Est potèd radix potenter resiccans, & ex eorum quæ tertii sunt ordinis, numero, & partium tenuium: caliditatis quàm minimum tenet, adstringentis facultatis particeps. Herba autem & radix simul tusa ac imposita sanant

Tormentilla

Birkwürtz

Locus

Sanguinariæ radice

Bistorta

Pentaphylli Theophr.

Sparganion Tragi error

Gesneri Hamelbergii Valeriola &c. lapsus

An Chryfogonum

Tormentilla in Suedet.

Saxifragia

Nomina linguarum

Locus Tempus

Vires & v. sus

Vulnera abscissa

Venenæ Pestis

Teperant.

Herb. & radice

durities & tumores, & collectiones iuxta aures subnatas, coxendicula dolores sedant, cuius fluenti scabiei medentur, nec non & matricis, aliusque id genus affectionibus, maximè verò hoc efficiunt, cum ex aceto imponuntur. Nec inuenias aliam radicem, quæ dysenteris & lienteris, aliusque quibuscunque alii fluxionibus coëscendis aptior sit. hinc ad has affectiones ex ea pastilli, pulueres, electuaria, potiones, & faculi conficiuntur. Opiliones etiam hac radice agrotantibus omnibus subueniunt. Succus radicis & herbe recentis expressus manè & vesperi temporibus illitus, vertigini medetur. Idem potus veneno omni in cibo, siue potu hausto resistit, sicut & pesti, nam per sudorem venenum expellit. Potest etiam manipulus herbe & radicis vino decoqui, ac decoctum ad eadem calidum bibi. Vituliter etiam emplastra & vnguenta succo tormentullæ conficiuntur. Radix cum herba vino per noctem, inque balneo Mariæ distillata, ad omne venenum vituliter quoque propinatur. Eadem aqua cum Tutia preparata, vel Succino albo, oculis instillata, distillationibus illorum medetur. Aqua & succus secreta mulierum medicina est, ad sistendos menses. Sicca radix in puluerem redacta, singulis vicibus aduersus pestem, omneque aliud venenum drachmæ pondere siue in potu exhibetur. Eadem ex vino rubro pota dysentericis succurrit. Verùm obseruandum est, si febris Dysentericæ coniuncta sit, vt puluerem illum ex aqua, in qua candens dialybs extinctus fuerit, aut ex aqua Tormentullæ distillata, drachmæ pondere exhibeas, idque bis per diem. Sunt qui radicem cum albo ovi admixtâ dimidiâ nucæ Myristicæ & tantundem fatinæ Auenæ, subigât, ac in ferreo cothleari super carbones lentè decoquat, subinde vertentes placentulam illam. Fluxiones misticæ cohiberi aiunt, si quis quotididè vnam talem placentulam deuorauerit. Alia proinde ratio has placentulas, & quas, quibus cholera, fastidia & vomitus excitat, profuenit hæc est. Accipe puluerem radicis Tormentullæ, & cû albo oui subige, deinde verò super laterem candentem decoque & recorde. Quod si quis prædicto morbo laborauerit, ei huius placentulæ partem drachmæ pondete contusam, ex aqua Balsaminæ propina.

POTENTILLA SIVE ARGENTINA.
C. A. P. LXXXV.

Descriptio.



EX radice palmaris & longiore, tenui, subadstringente, siue promit Agrimoniaz, pinnata in tercedentibus paruis foliolis) quorum singularia in ambitu serrata, supernè glabra, infernè candicante hirsutie vestita, Cæsal. foliorum sectio-nibus renouit, maxime Quinquifolij referentibus, sic

ciore & adstringentiore sapore, quam radix callicullos nudos spargat, qui more Fragariæ radicat in summo dixi in terram, ac folia gerunt: alios cauliculos inter folia attollit simplices: quibus flores infident grandifoliuli, Pentaphylli, quinque foliis constantes, lutei: fructus similis, grandifolius.

Quo nomine Græci & Latini hanc herbam appellent, à nullo, quod Fuchs, sciat, adhuc proditum est. Recentiores quidem Potentillam, ab eximius viribus, quibus pollet, vocant: nonnulli Agrimoniam siluestrem, ob formæ affinitatem, quam cum vtroque habet, nuncupant: Dicitur & Argentina, siue Argentilla, ab argenteo foliorum splendore: Germani verò Gensericus [Anserinam] quòd hæc anseres in cibo delecentur, appellant.

Posset inquit Tragus, Anserina hæc, quoad formam attinet, non ineptè Eupatorium dici. Posset & Gressgärt [Millefolium maius] appellari. Nam singula eius folia instar pinnæ auium pulli, sed maioribus in castris dissecta apparent, quoad reliqua Millefolio non dissimilia, Millefolium itaque maius Latinis dicitur, nam & hoc nomine à Diosc. insignitur, tamen si qualem nomina, quæ eo capite commemorantur, ad alterum Millefolium pertineant, quod Stratiotes vocatur. Ea sunt Stratiotice, Achillion, Supercilium Venens. Hæc ille, qui describit, & bonam figuram exhibet, verùm nomina commiscet: est enim neque Eupatorium, neque Millefolium.

Quidam [vt i. citat Hist. Lugd.] Stephano melidem Plinii esse coniectantur vitem ex aqua sanguini fluet: ut per nates, sic dictam, quòd coronis melrus eius flos iunctatur.

Ceterùm [teste Lob. & Per 3, qui in Adu. Obs. & in Pl. Argentina vocant] tan-topere est hæc sicut Agrimoniaz, vt non raro in uulceribus Agrimoniam se collegisse ratas fallat: discernitur autem re tota viticulorum.

Gesero hort. dicitur Argemone altera: & in cat. pl. Thaliotum Herbatior. siue ætatis. Quod tamen Argentina non est [attestante Cordo in Diosc.] licet hoc opinetur Ruellius & Anguill. Potentilla 2. opinidè à Fuchs. & Matth. depicta.

Hæc Lun. nominatur Argemone, lugubria Plinius, Agrimonia siluestris, Anserina, Argentina, Potentilla, alpinum Erica, & quorundam Salutaria. Germ. Gensericus/Grensing, Belg. Siluerchuyt/Blief hollandis, Gall. Argentine, Bec d'oye. Ital. Argentina, hung Lud passit, Anserum gramen. Boh. Stambrit aut Gussy Naydlo.

Obseruati passim florentem Maio, Iunio, ac Iulio. Frequentem scribit Cæsalp. in Germania, circa semitas & loca aquosa, potissimum iuxta flumina, quorum nulla amantior, frequentior, ne alumina. Amat virginosa. Æstate, dum floret, legi debet.

Quum folia eius & radix [inquit Fuchs.] adstringant, temperamento à Pentaphyllo [Millefolio Trag legit] nihil differre videtur. Quare hæc, potissimum autem radix, ex tertio ordine desiccatoræ est, minimumque euidens caliditatis habet. Et tunc utroque mitem in modum, qui hanc humidam esse statuunt, nullâ aliâ moti ratione, quam quòd in humidis locis proueniat: quasi verò Naturium aquaticum, haud obstantè quod in aquosis nascitur, non etiam in tertio desiccet ordine. Debuisset certe illis ab hæc sententia deterere non leuis illa adstrictio, quæ certissimus est siccitatis index: adstringentia enim, Gal. lib. 4. simpl. c. 6. teste, terrena sunt de crassa corporis consistentiâ. Adstri-

Tumores.
Febri.
Scabies.

Dysenteria.

gucur.

Febri.
Emplastr.
Aqua.

Oculi.
Menstr.
Puluis.
Pastill.
Dosis.
Dysenteria.
Obseruatio.

Placentula.

Fluxiones

Cholera.
Fastidium
Vomitus.

Poten.
Ende.
Agri.
sila
&
nacet.
cur.
Arger.
Argen.
Ende.
rima
&
Eupa.
rimo
salum
ius.

Traga.
preb.

Steph.
melis.

Agri.
alpin.

Arger.
Thali.
Gosa.
Ruell.
Nomi.
Linge.
Ingru.
Plini.

Locu.
Temp.

Temp.
nente.

Error.
eundem.



hirtus, alia cauli, pediculo aut breui, aut nullo adherent, interceptaque folii continuitate, reliquo pediculum ambiunt, vt ab eo perforentur: ceterum, folium ad Maluam accedit, ex luteo virefcens, infra hirsutum, in octo, aut nouem angulos obtuso s, seu plicis diuisum, in singulos angulos singulis neruis à pediculo prodeuntibus, concinnè in ambitu crenatos.

Hæc vulgò Herbariis, Pes leonis [Leontopodium] & planta leonis, à foliis instar leonini pedis latis, & rotundis nominatur: minimè verò est Dioscoridis Leontopodium, id quod Brunfels. Eucb. & Cornarius volunt. Notum est [inquit Corn.] Leontopetalon officinis & herbariis, & ab ipsis corruptè Para leonis (Leuentap) appellatur. Sed erronea admodum est hæc opinio. Quandoquidem Alchimillæ descriptio cum Dioscoridis Leontopodii delineatione [teste Dorst.] minimè conuenit, De Leontopodio scribimus Hist. ngl. 31. vbi & eius æquiuocationes assignamus.

Euch. præterea vocando Alchimillam, Artinellam, Leucopedion, Plantam siue Pedem leonis, Leontopetalon diuersarum plantarum nomina confundit.

Brunfels. ait eos non perperam agere, qui Dentem leonis, Leontopodion & Leontopetalon Dioscor. nomen, quamuis descriptio non quadret. Sic vult, sicut et Brunfels, cui pro ratione nouitas placet. Qui tamen non Dentem, sed pedem legisse debebat. Horum autem opinionem de Leontopodio & Leontopetalo; nobiscum reiciunt, Fuchs. Matth. & Dodonæus.

Nec audiendus (monente Matthiolo) Brunfels. in suo Onomast. Dodon. Lob. & Pena Adv. & Hist. Lngd. qui Stellariam vulgò vocatam Leontopodium esse scribunt, id quod ex amborum plantarum descriptione constat.

Quod verò Hier. Brunsch. Sinaw, græcè Alchimillam, Artinellam, & Leucopedion vocari scribit, apud quem Græcè inuenierit ista nomina non reperio.

Dicitur autem Alchimilla; quòd Alchymistarum præconiis celebrata sit, *Alchymista* græcè *Alchimilla* seu *Alchimilla* siue *Alchimilla* Cordo, à Germ. Chirurgis Sanicula maior, quòd sit illi, tum facie, tum viribus admodum affinis.

Pes leonis, siue *Alchimilla*, Germ. *Sinaw* / *Nomina* *letwen fûß* / *oder letwen rapen* / *Gross Sanicel* Belg. *Sinawe* / *vnser frauen mantel* / Gall. *Pied on Tape de Lyon*, Ital. *Pie de Leone*, Angl. *Ladies mantel*.

Astrictoria igitur & exsiccatoria vi pollet. Quare Recentiores fluxionibus & puncturis oculorum prodesse; recentia vulnera glutinare, & excedentia sanare, mulierum mensura compescere, artus & membra confirmare, rectè tradunt: nam id ipsum posse adstrictio, quæ in hac herba haud modica est, abundè docet. Et cum habeat Quinquifolii temperamentum, eius etiam facultates obtineat necesse est. Dentium itaque dolorem finit, excedentia oris vlcera sanat. Dysentericis & alui profluuiis, coxendicis articulorumque doloribus subuenit. Sanguinis eruptiones sistit, aliæque, quæ à Diosc. Quinquifolio attribuantur, potest. Quòd verò adiciunt, hanc etiam humbricos exterminare posse, id minis re- & faciunt. Ea siquidem facultas, non huic, sed illi inest herbæ, quæ verè Tagetes dicitur. Proinde non sine magno errore, Potentillam cum eo confundunt. Anserina cum aqua & sale decocta, acis exhibitæ, qui ex alto deciderunt, auxiliatur, vt quibusdam apud Tragum videtur, sanguinem concretum dissoluendo. Verùm hoc illi nequaquam probatur. Herba vino decocta & pota torminibus, & dorâ dolore laborantibus subuenit, mulieribus, quæ albis profluuiis vexantur, conducit, nam adstringit haud secus atque Pimpinella Italica. Aqua Anserinæ destillata rubentibus oculis utilis est, si linteolis in ea mactatis imponatur. Hac ratione maculas quasvis extergere, fluxiones & dolores sedare dicitur. Experimento egregio didicit Io. Agricola Potentillæ succum vnâ cum puluere Colchici vulgari mariscis ani mederi. Viribus eximius pollet [aiunt Adv.] ad frangendum calculum, interiora vulnera & vlcera maligna, & dysenterias, viscera roborando, similiter Agrimoniz: cuius potius, quam Tagetes, temperamento exsiccatæ, siue calore moderato est, sed astrictioris superat: multum sanguinem grumosum potu dissoluit. Hanc inditiam pelui, frigidâ aquâ semiple- nâ, & operculo oclusâ, destillare, siue vapores in concatum operculi subuehere, quod sublimare vocant, serunt. Huius stillatiam ad lentigin- nes, pannos & niaculas, fuscumque colorem Sole contractum delendum, Anglæ mulierculæ adhibent. His addit Hist. Lugd. Datur vtiliter potui sanguinem reicientibus. Herba sicca farina ex sua ipsius stillatâ aquâ pota, albas vteri fluxiones sistit, sed valentiùs addito Corallo & E- bows ramentis. Sunt qui ad enterocelas præferunt, tum in cibis, tum in potionibus. Etenim vlcera sanat præsertim pudendorum, & quæ oris partes erodunt, firmat commotos dentes, & laxas gingiuas, si in aceto decoquatur, & os sæpè colluatur. Dentium dolores mulcet, prolapsam columellam restituit, addito Aluminis momento. Barth. Cyrrichter in sect. pract. lib. 1. cap. 2. ad dolorem capitis à sanguine & bile, Anserinam ex aceto ros. & sale, primò pedibus apponit, & si non cessat, succum cum aqua rosacea temporibus applicat.

PES LEONIS SIVE ALCHIMILLA.

CAP. LXXVI.

EX radice minimi digiti, aut pollicari crassitudine, plurimis fibris donata, strenuè adstringente & desiccante: caules lurgunt aliquot tenues, teretes, hirsuti, ramosi, dor- drantales & cubitales, quibus insident sossuli

herbidi, vmbellatim congesti, quorum linguli, octonis constant foliis, maioribus quatuor, totidemque minoribus, alternatim positus, in quorum medio apiculi lutei: semen in uâ luteum: Papauerino simile: folia, alia statim à radice exortitur, longis, sel- gupalmari- bus, pediculis

Sev. 7.

Folia.

Leontopodium. Planta Led. nis cur. Leontopodium Dioscoridis non est. Error quod yundens. Leontopetalon Para leonis.

Euch. notat. cur.

Brunfels. reprob.

Stellaria non est. Passarum lupus.

Brunsch. Sinaw.

Alchimilla græcè. Dioscor. seu Dioscor. Driscor. ar. Sanicula maior.

Nomina linguarum.


Iocus & tempus Montbelgardi in horto plantata feliciter provenit. Eam prope Masinunster, Geueux, Balilex & Florentie vidi virentem Martio, & florentem Maio. Matth. vt plurimum in montibus prouenientem obseruauit, præsertim in pratis & pascuis, erumpentem Maio & florentem Iunio.

Vires & vltus. Folia & radix adstrictione vehementi participant, atq; aded exsiccant. Recentiores, teste Fuchfio, idipsum in secundo efficere ordine tradunt. Quare vulneribus glutinandis aptissima est. Decocto enim ipsius lauantur vultus omnia vulnera. Linteum quoque in eo madefactum illis commodè imponitur. Mulierum mammas inensè laxas linteum decocto eiusdem intinctum & impostum, duras solidasq; efficit. Decoctum denique hoc epotum, interanea vulnera, rupturasque glutinat. Et quod dictum mirum est, tanta eius plantæ in glutinando vis est, vt ramicces intellinorum, in pueris potissimum, sanare possit. Herba & radix vulnerariis potionibus adiunguntur, puluicibus, emplastris & vnguentis: Sic & foha tumoribus & vulneribus imposta, dolorem sedant, inflammationemque tollunt: idem efficit aqua destillata: nam calorem extinguit, & ab inflammatione defendit, & sanguinem sistit: sistit & alba mulierum profluvia, facitque ad conceptionem, superfluas humiditates siccando. Succus eius potus comitialibus subuenit. Arida puluis in suo ipsius decocto, aut stillatitiâ aquâ sumptus, ramicces intellinorum, potissimum in pueris sanat. Datur idem puluis ex vino, aut iure, cochlearis mensura, quindecim aut viginti diebus, iis quibus adempta sit concipiendi facultas, à nimia vteri humiditate, ob quam iniectum semen contineri non potest.

AGRIMONIA SEV EVPATORIVM,
CAP. LXXVII.

Descriptio **Caulis.** **Folia.** **Flores.** **Lappula.** **Radix.** **Deser. Dioscor.**

Caulis vt plurimum erigit singulatam, cubitum & sesquicubitum altum, hirsutina: folia palmam longa & longiora, ex quatuor ferè foliolis vtrinque pinnatim sitis, circumquaque serratis, extremo impari, multis minoribus interiectis composita, sapore subdulci, cum quadam adstrictione: flores suauolentes longâ serie alternatim scapo adnascuntur crocei, quinque foliis constantes: quibus succedunt lappula pulpâ albâ, dulci, plenæ: radix in nigrum vertit, et alia, sapore adstringente donata.



Eupatorium (descendente Diosc.) herba est è ceteriorum genere (epurandus, sive uulosa potius quàm scuticosa, non enim fruticat, quæ vno tantum scapo surgit) vnicum profrens thyrsum, tenuem, lignosum, rectum, nigrum, hirsutum, cubitalem, aut etiam altiorum: folia ex interuallis filla in partes maximè quinque, aut etiam plures, Quin-

quefoli aut Cånabis potius folis simili: sunt & subnigra, & terræ modo in extemitatibus diuisa (legendum Græcè *trichomanes* ferræ, non *troues* *stis*, Illic modò incisa: quamuis si sic legatur, non mutatur sententia, sunt enim Illicis foha ferræ modo incisa Hist. Lygd. ex Corn.) Semen è medio caule enascitur, subhirsutum, ita deorsum nutans, vt etiam siccatum vestibus inhaereat.

Similiter Plinius inquit: Eupatoria quoque regiam auctoritatem habet, caulis lignosus, nigricans, hirsuti, cubitalis aliquando & longioris: foliis per interualla Quinquefolii, aut Cannabibus, per extemitates incisis quinquepartitè, nigris & ipsi, plumosisque radice superuacua.

Ex his cetero delineationibus patet, hanc nostram Agrimoniam, verum esse Diosc. Eupatorium. Hoc tamen reuocat in dubium Cæsalpinus diuersis in locis. Ac primum quidem lib. 8. cap. 4. dicens: Galenus Eupatorio facultatem tribuit incidendi, quæ non videtur inesse Agrimonie. Facit & difficultatem, quod scribit Diosc. lib. 6. vbi ad epotam Mandragoram præcipit excitandos à sopore ægrotantes olfactoriis, inter quæ Eupatorium in primis nominatur, quasi vehemens in eo sit odor, qui nequaquam Agrimonie inest. Idem lib. 12. cap. 16. Eisdem facultates, tum Auicenna, tum Melues tradunt Eupatorio: inquit enim Auicenna, Eupatorium est ex herbis aromatis: idem non videtur esse Agrimonia, cui præter adstrictionem nullus conspicuus inest sapor, neque odor, neque amaritudo. At Cæsalpino iure merito sese opponunt Tragus, Fuchf. Cordus, Robett. Const. Dodon. & Feid. Imp. quorum opiniones ordine recitabimus. Maio itaque mense [inquit Trag.] radix Agrimonie, dum adhuc tenera est, odoratissima apprehenditur. Quod cum ita se habeat, non malè Agrimonia Eupatorium Antiquorum esse statuitur. Hæc nimirum ea est planta, de qua tot & tam variæ, Veterum, præsertim verd Arabum, extant sententiæ. Quidam enim ex his asserunt Eupatorium habere foha familia Cannabibus, aut pentaphylli, quorum quidem sententia maximè probanda videtur. Alii, inter quos præcipuus est Auicenna, dicunt, folia habere Cannabis, odoratum esse, floremque ferè Nymphææ similem, atque in hac sanè descriptione, nihil desideratur, nisi quod ad florem attinet. Habet enim Agrimonia nostra florem multò magis exiguum, quàm Nymphææ. Quòd si verd colorem citreum vtriusque plantæ, non totam substantiam contulisse Auicennam diximus, tolerari vtiq; sententia eius potest. Nam altera Nymphææ species luteum profert florem, sed Eupatorio longè maiorem. Tertius Arabs, Melues nimirum, Eupatorium ita describit, vt statuat, illud foha habere Centauræ minoris. Est autem posterior hæc sententia, manifesto cum errore coniuncta, nisi tu verba Melue aliter interpretens, ne vpe vt dicas, Eupatorium serrata habere foha inquit Centauræ maioris, aut flosculos illius, substantiâ & formâ cum Centauræ minoris conuenire. Hoc igitur pacto descriptiones Arabum admitti debent, nec à Græcis dissentiant. Reliquum igitur est, vt quoties Eupatorii in autoribus sit mentio. Agrimoniam hanc intelligamus. Quòd verd Barbatum hanc, Ferrariam minorum, Concordiam, Marmorellam, & Scelam vocant, quæ nomina partim Sanicula tribuenda videntur, nihil impeditum fuerit, præsertim scientibus eam herbam verum esse Eupatorium,

Disj. iustur
Plioi
Agrim. Seruon. patorum. Dubium
Resp
Errat. succ
Ferraria. Conco. Marm. la. Scel. Eupat. gndg. ab

Hep. ad
um Hepa
itis Incul
rum maius
afat. Olib
arda.
Apu
um Coni
mpus A
lei Error.
notundam

ab Eupatore rege, qui illud primus inuenit, nominaum, Hepatorium autem, & Hepatitis, & Inuolucrum maius, quod iecori potissimum medeatur, à Dioscoride cognominatum. Serapio autem Hepatorium suum vocat *Cafat*, vel *gafit*, seu *gafil*, Auerrh. *Olibarda*.

Nec desunt, vt & hoc annotemus, qui cum Apuleio Eupatorii vocem Marubium tribuant, & alii quidam Coniæ: verum nec ipsi quodnam verum esset Eupatorium, assecuti sunt. Proinde præfactâ quadam ac immedicabili cæcitate, captos esse eos iudicat Fuchsius, qui hanc verum & genuinum Eupatorium esse, ex notis, quæ ad amulsum, nullâ reclamante, conueniunt, non animaduertunt.

Nullus, inquit Cordus, verum Eupatorium cognouit, præter eos, qui hodie Agrimoniam vocant herbam, Eupatorium vocant, vt fecit Agricola. Nam reuera Eupatorium est ea, quæ nunc falsò Agrimonia vocatur, qui error Dioscoridis etiam ætate fuit. Dudum de hac scripserunt Leonicenus, parens meus, & alii plures, quibus etiam Ruellius subscribit, Germani, *Sermeng*, & *Leberfletten* vocant. Eupatorium Græcorum est nostra Agrimonia, inquitur, Amat. Robert. Const. & Dodonæus.

In veteri versione Oribasi, teste Dodonæo, de simpl. Agrimonia, Lappa inuera vocatur, quod semina lappatum inter aspera dorsum dependant.

Eupatorium Græcorum & Arabum F. Imperato quoque vulgaris est Agrimonia, dicitque odoratum Diosc. Eupatorium repetiri in monte *Matefe*. Scribit etiam Casl. Dur. Eupatorium Dioscoridis odoratum repetiri in monte *Caprarda*.

His adde C. Bauh. dicentem phyt. Eupatorium siue Veterum, Agrimonia dicta, Eupatorium Diosc. est aliorum Græcorum: & Eupatoria Plinii: quibusdam Argemonia in aruis nascens. Item: Eupatorium siue odoratum. Quæ tamen satis mirari non possum, cur hæc duo Eupatoria separet. Diosc. vnus tantum meminit.

Cæterum, inquit Corn. In errore versantur adhuc hodie officinæ, vulgus Herbariorum & Medicorum, qui in Diosc. cap. de Eupatorio, Argemones nomen ad Eupatorium transferunt, quos sequuntur, qui Eupatorium, *Argemeng* / ant adhuc corruptius *Odermenig*. [Agrimoniam] appellat. Corruptè quidem eo loco, *intra raudis artemonias*, legitur, cum legendum sit, quamuis etiam corruptè, *artemonias*: vnde quosdam errore seductos Diosc. dixit, qui Eupatorium Argemonem vocarint. Verum nobis hæc correctio suspensa est, quia Angullara ait, Eupatorium, siue Agrimoniam hodie in Græcia Artemisiam vocant.

Quid tandem Lob. & Penæ in Adu. qui Eupatorium Melue esse idem cum nostra Agrimonia negant, respondendum sit, ex hæcenus in medium alatis, satis superque constare abittor. Vocat idem Obs. & Ic. Pl. Eupatorium Græcorum & Dioscoridis Agrimoniam officinarum. Nec sine errore Theod. Dorst. Eupatorium, Agrestem Saluam Barbarorum vocat.

Eupatorium, vel *ηπατοειδης* & *ηπατις* Græci: Lat. *Eupatorium*, siue *Hepatorium*. Offic. *Agrimonia*, Germ. *Odermenig*, *Byndwurt*, *Leberfletten* *Agrimonien* Belg. *Agrimonic* / *Leuer cruyt*. Gall. *Eupatoire*, *Agrimoine*, Ital. *Agrimonia*, *Hisp. La Agrimonia*, & Angl. *Agrimonic*, Boh. *Ksperyck*, & Starck, Hung. *Aproustorian*.

In satorum & viarum marginibus, & circa sepes & in pratis passim prouenit. Ætate floret. Basileæ quoque Septēbri & Octobri florere obseruatur. Genææ prorumpentem vidi Aprilis principio. Autumno semen maturum est. Maio mente colligenda & siccanda, quæ in medicos vsus eligitur.

Locus & Tempus

Huius folia, autore Diosc. cum adipe suillo veterè trita & imposita, vlcera, egrè cicatricem recipientia, sanant. Herba verò ac semen, si cum vino bibantur, dysentericis, hepaticis, & colicis Trag.] & à repulibus he suis commorhis opitulatur. Galenus *υδροδιωτικας* easdem facultates exponit. Eupatorium herba ipsa renpium partium, incidendi, extergendique facultatem citra manifestam caliditatem obtinet. Quare obstructio nes iecoris expurgat. Inest itidem ei & adstrictio quædam, per quam robur visceri addit. Hodie, attestante Trago, Eupatorio frequentissimè, non sine magno ceterè commodo, ad reponenda luxata membra vtuntur. Aqua distillata potu tussim emollit, piuitam crassam incidit, morbum arquatuna expellit, febri laborantibus conducit, tinas ventris enecat. Exulcerationibus oris, aliisque vlceribus si vulneribus, & ex illa colluuntur, & purgentur, succiuit. Radix exsiccat & moderatè adstringit, quare intemperiem ferè omnem corrigit, obstructiones aperit. Præterea decoctum dilutumue colore limpidio vini gilui placet. Hinc in vino rubro sriptico decocta pntredinem vulnerum & vlcerum abstergit, si ea lauauerit. Eadem contusa & vulneribus malè agglutinatis superligata denuò aperit. Autore Rondelet. Agrimonia cum aceto forti emplastri modo imposita verrucas tollit. Notatu dignissimum, si verum, quod scribit Timoth. Rosselius Agrimoniam cum veteri axungia porci applicatam extrahere spinas. Ioannes Schenck. Obs. Med. [ex autoritate Diosc.] gangranam ex mortu hirudinum, Helidæum Agrimoniam contritâ, emplastri modo impositâ, curasse scribit.

Vires & vsus
Vlcera
Dysenteria

Temperamentum

Obstructio nes iecoris

Luxata membra
Tussis
Morbus arquatuna
Febri Tinnis
Vulnera

Gangranai

Serpule Eupatorie

GARYOPHYLLATA VVLGARIS
flore paruo luteo.
CAP. LXXVIII.



FRAGRANTISSIMUS Caryophyllorum odor, quem radix spirat fibrosa, ruffa, rotati plantæ nomen indidit, canle cubitali, hirsuto, tenui, in alas diuiso: cuius flores luteoli Tormentilla, quibus succedunt echinata, glomerataque capirula, longis arstis horrida: folia hirsuta, nonnullam cù

Descriptio

Handwritten notes in Latin script, including the word 'garyo' and other illegible characters.

ap
m
arom
rum
aria
is Arge
ia.
st. odo
not.
r non
rum.

avis
ase
dio

msia

ouy
narum

Agrimonia similitudinem habent.

Brunfels. quam Tom. 3. Rhap. 2. Caryophyllatam vocat, eandem in 4. herbam Benedictam nominat.

Reprehendit Matth. Syluaticum quòd parùm rectè tradiderit, dicendo, Lagopum eam esse herbam, quam Herbariorum vulgus Caryophyllatam appellet.

De hac Veteres, quod Matth. sciat, nihil memorie prodiderunt. Nisi fortasse fuerit Geum, cui Plin. lib. 26. cap. 7. radículas assignat ternas, nigras, bene olentes. Verum autem sit Geum Plinii vulgaris hæc Caryophyllata Lob. & Pena Adu. quoque dubitant.

Sic & Trag. de hoc dissidio nihil iudicat, sed Nardum siluestrem vocat, quam quidam Sanamundam nominant.

Eadem repetit Dodon. gall. & Gesn. Qui præterea Auantium, & Oculum leporis, atque Geum, Caryophyllatam vocari tradit, id quod ante cum Antonio Musæ Brassaulo quoque placuit.

Caryophyllatam vulgi Caxalp. nuncupat, cui apud Plinium inter Argemonias numerari videtur, cuius ait, radix Thus redolet.

Hist. Lugd. Caryophyllata Matthioli, & Caryophyllata vulgaris, qualiter & Clusio dicitur.

Taber. icon. & Hist. Caryophyllata, & Herba Benedicta, quam quidam Lagopum, alii Eupatorii speciem volunt, sed errant, inquit, Plinius vocat Geum, & Scalig. Getiam. Item Caryophyllata 4. siluatica, flore luteo. De hac quarta plura vide sub nostra aquatica, dubius enim sum, quòd referri debeat.

Camer. Epit. Caryophyllata. Item horti Caryophyllata vulgaris: Et rursus: montana similis vulgaris, elegantior tamen & maioribus floribus prædita.

C. Bauh. phyt. Caryophyllata 1. siue vulgaris. Caryophyllata 2. siue vulgaris maiore flore, fortè Fuchsi. siluestris.

Gerardo, Caryophyllata, VVallonum Gloria filia.

Baccharis. [vt vult Corn.] officinis ignota est, sed Herbariorum vulgus Herbam Benedicti, siue Bened. vocat, aliqui etiam Chirothecam nostræ domi, æ, vnser framen hendschuch, appellant. Verùm Benedicta non videtur nobis respondere cum Bacchari Dioscor. nec nomen Chirothecatam placet, quòd fortè Digitalis sit, hinc autem non esse Diosc. Baccharem, vt nonnulli suspicantur, descriptio plantæ, quæ non conuenit, vt Monachi in Mes. testantur, comprobant.

Sed vt liberè dicamus, quod sentimus: Minimè, cum Fuchsi, Caryophyllatam, Dioscoridis Lagopum credimus, dicimusque eorum sententiam, qui Geum Plinio dictam velint, periculo vacare, quòd eadem scilicet vtriusque radicibus insit.

Cæterùm, Fuchsius Caryophyllatæ, seu Herbe Benedictæ siue Sanamundæ vulgò appellatæ duo genera animaduertit, hortensensem, flore minore, & siluestrem flore maiore, magis ad croci colorem accedente. N. s. Fuchsi duas figuras apponimus, quia sculptæ iam erant, quamuis nullam differentiam demonstrent, nec discrimen à Fuchsi positum in iis obseruare possumus.

Caryophyllatæ figura malè apud Euchar. Carduo benedictò appingitur.

Caryophyllata qualiter Græcis & Antiquis

Latinis nominata sit, nondum compertum. Est autem ab odoris suavitate, quam radices de se præbent, nominata. Vulgus herbam Benedictam, à diuina sua efficacia, & Sanam mundam appellat.

Germani Benedicten würg, Belgi & Brabanti Caryophyllate, Gall. L'herbe beniste, Resise, ou gall. et, Angl. Licena, Boh. Benedyft, Hung. Vadszef rus,

Vidi spontè prouenientem non longè à Monspelio, Basileæ mense Octobri inter propugnaculum & portam cinericeam, intra vbera ad muros & propè portam lapideam, & alibi florentem Maio & Iunio, cum flore & semine Augusto, Patauii virentem in quodam horto Decembri, & in horto D. Musali Ianuario, Florentiæ in horto D. Nicolai Ferrariensis, Lugduni passim, Geneue virentem mensis Februarii principio, & cum flore Maio. Cæterùm, Matth. teste, gignitur in montibus, & in vis iuxta septa, quòd mitum in modum sepius opacis gaudet. Vulgans in Germania, inquit Tabern. in terra firma, & humida, vmbroso loco, in hortis prope muros, in sepius & dumetis: transfertur in hortos propter summam vtilitatem.

Geum Plinii medetur non modò pectoris doloribus, & lateris, sed & cruditates discutit iucundo sapore. Recentiores & peruectus etiam herbarius, annotant Fuchsi, calidam & siccam esse in tertio ordine statuunt. Folia sanè in gustu non mediocrem adstrictionem ostendunt, vt & itidem radix. Eadem luto & sordibus eluta siccat, & umbre acetii resperfa, arcas & vestes iucundo commendat odore. Decoctum huius sumitur ad perniciosas concoctiones, sedandosque coli dolores. Manuscriptes Herbarius facultatem habere dissoluendi, digerendi, & obstructiones tollendi scribit. Tomentum item ex vino decoctionis eius mentes ceter. Contra venena tritam cum vino sumptam valere. Concoctionem præterea roborare, dolorem ventriculi, & intestinorum à frigidityte aut floribus ortum decoctam in vino sanare ait. Mirificè etiam ad interna vulnera huius herbe decoctum confert. Externa verò ex eà collui debent. Acetariis etiam folio expetita herba. Eadem Tragus sic tradit.

Vitis huius radicis vulgaris est, vt vere in vinum imponatur, quòd optimo ac iucundissimo & odore & sapore commendat. Hoc vino cor exhilarari & obstructions iecoris aperiri, nec non frigiditate & crassis humoribus affectum stomachum iuuari multi testantur. Radix Benedictæ vino decocta ac calida pota, dolorem ventriculi, & intestinorum à frigiditate, aut flatibus orrum, sedat. Vinum in quo radix Benedictæ decocta fuerit, purgat & mundat omnia vulnera, cuiusmodi sunt fistulæ & carcinomata: idem sedas maculas extert, si illo facies aliquando singularibus diebus abluatur, maximè verò in primis diebus puerperis. Caryophyllata, inquit Matth. non est viribus inefficax, argumento quòd eius radices mansuetum: Caryophylli spiritent odorem: Eà Recentiores vtuntur potè ad thoracis interna vulnera. Quin & eius succum admittit ærugine, cuniculosis, cor tumacibusque vlcibus, vtiliter iniungunt. Eadem alibi spiritus recreat, & frigidum roborat cerebrum. E-pota prodest cæliaci, dysentericis, sæmularum profusibus, & cruenta exuentibus. Tam intus sumpti, quam foris illita enterocæcis auxilio est. Temperamentum ei excalesciens, & exiccans,

Herba benedicta, siluatica, notat. Lagopus non est.

Geum Plinius

Nardus silu. Sanamunda. Amantia. Oculus leporis.

Eupatorii species non est. Getia

Gloria filia. Baccharis

Cornu duplex (ap. Mus.)

Lagopus non est. Geum Plinius est

Fuchsi diff. gerda

Fuchsi. mor. Isoria

Euchar. error. Caryophyll. gymna

Herba benedicta, dist. a. Nomin. lingua

Locus: temp.

Vitis: vltus Temp.

Colic.

Acetariis

Vuln.

Vinum

Fistula. Fida. curia

Vlcera

Cereb.

Enter.

vt ma.

manifesto sunt indicio eius radices : quippe quæ gustu odorata, adstringentesque deprehendantur. Quibus qualitatibus non modò attenuare, discutere & adstringere valent, sed etiam roborare. Menfes, ut arcesatur Lobel. & sanguinis grumos propellit, obstructiones reserat, venenis aduersatur. Radix huius, ut tradit Tabern. in cibo, & potu, & medicamentis quocunq; modo sumpta, cerebro succurrit, spiritus, vitales recreat, omnibusque oculorum vitis subuenit. Radix masticata oris fetorem emendat. Eadem ieiunè commanducata, corroborat, & ab omni contagio præseruat. Ex herbâ & radice, in balneo Maria destillatur aqua ad eisdem vltus idonea. Similiter & vinum ex radice paratur, & Conferua. Radix colligenda Martio.

Auantia montana flore luteo, caule vlnam alto. C. Bauh. phyt. Caryophyllata 6. siue Alpina lutea, cuius flos licet communiter luteus sit, inuenitur tamen & purpureus & albus. Gerard. Caryophyllata montana.

Planta hæc, quam Gesnero in peregrinatione Rhetica Caryophyllatam alpinam nominauit, reperta in monte Braulio, florens Iunio, vt & alibi. In summis etiam [autore Clus.] duntaxat iugis montium Pannonicorum, nec in omnibus tamen, sed inter gramina, vel sub fruticibus nascitur. Iunio floret, Augusto semen maturum est. Reperitur [teste Matth.] in Bohemiæ montibus, è quibus Albis fluuius, oritur.

Iisdem cum altera pallet viribus, sed præstantioribus. Radix non solum excalescit, & siccatur, sed etiam cohibet, ac roborat.

Locus & Tempus Vires & vltus

GARYOPHYLLATA MONTANA
flore magno, luteo.



Folia Caryophyllata montanæ & palustris vulgarioris respondent, sed multò minorâ, vncialia, multa per terram spatiosa, villosa, nonnihil laciniata, per extremum rotunda, serrata: inter hæc surgit coliculus, sex circiter vncias altus, foliis paruis, & in profundas oblongas laciniâs fissis,

etiam summo flos insidet magnus croceus, concolorum staminum congerie medium occupante, ex calyce hirsuto in laciniâs mucronatas, alternatim maiores minoresque cælo: radix satis crassa, nigra, fibrata, valdè odorata.

Gest. hort. Geum tertium alpinum Matth. in Diosc. eum mag. fig. Gaiophyllata montana, cui flos aureus, radix odore Caryophyllorum, & gustu adstringente. Lob. Obs. vi & Ic. Pl. Caryophyllata maior rotundifolia, & Garyophyllata montana Matth. qualiter etiam Hist. Lugd. inscribit, dicitur: Quandam, inquit, Caryophyllatæ raram & perelegantem speciem, Italo semine ortam, nihil dissimilem à Septentrionali rotundifolia impertiunt Coldenbergius; nisi folio quadruplo maiore, & radice crassiore digitum æquante, minusque fibrosa foret. Si Lob. eandem cum Matthiolo cuius figuram exhibet intelligit præcedenti descriptione, miror eum non meminisse coloris.

An Anguil. Caryophyllata alpina. Clus. Pannon. & in fol. Caryophyllata montana 2. Caryophyllata alpina aureo flore, à Matth. Caryophyllata montanæ nomine descripta: pictura tamen non valdè feliciter expressa. Camer. in Epit. Matth. Caryophyllata montana, Ital. Garofinata saluatica. Item hort. Caryophyllata alpina altera, à Pennæo floribus albis reperta, in monte Lupo Gallia. Tablic. & hist. Caryophyllata montana Berg Benedicteu wurt; Berg Mâglinfrâuit. Tom. II.

GARYOPHYLLATA AQUATICA
flore rubro striato.



Radice fibrosa minima, extrinsecus rubente nonnihil, intus albâ, sapore adstringente, & subdulci, eadem caules profert multos interdum paucos, aliquando cubitales, sactos, hirsutos, nonnihil rubentes: ramulorum summis subinde etiam prinatis pediculis, breuibus, hirsutis, rubentibus,

nonnihil nutantibus flores insident, paruli, Alpinae floribus ferè equales, striati, non multum elati, & supra calycem parum admodum se proferentes. extrâ purpurei in tenuis, intus dilutiis; odore grato, ex foliis quiliis, à tenui principio sensim in latum se diffudentibus, intra quorum septa apices multi, crocei, echinatum capitulum obvallante insidet autem flos quasi calathio patulo rubente hirsuto, in quinque laciniâs hirsutas, totidemque ligulas in laciniarum spatia distributas diuiso: folia Caryophyllatæ vulgaris foliorum formâ, sed longè maiora, alia à radice statim orta; alia in caulibus, pediculo sextantali, sapore cuni radice compati.

Camer. in Epit. Matth. vbi noua figura, Caryophyllata aquatica. Item hort. Caryophyllata palustris.

Hist. Lugd. Caryophyllata montana Dalech. radice inodorâ, fatique gustus: foliis Caryophyllatæ similibus: flore luteo, lineis pluribus distincto. Aquosis locis gaudet. Quæ Dalechampi Caryophyllata, si non eadem cum nostra, saltem critilli valdè similis. C. Bauh. phyt. Caryophyllata 3. siue aquatica, nutante flore. Item Caryophyll. 4. siue aquatica 2. Et rursum, Caryophyll. 5. siue montana Dalechampi. Ad hæc Caryophyll. 7. siue alpina minor. Et tandem apud Matth. Caryophyllata aquatica.

Cam. in suo Matth. Caryophyllata 3, vel Geum aquaticum Gesneri Clusio, floribus pallidis, sub-

Dalech.

Caryophyllata montana.

Geum aquaticum.

purpureis, aliquando multiplicibus, magis rubentibus, aliquando sanguineis.

Clus. Pann. & in fol. Caryophyllata 1. siue alpina nutante flore, radice impensè adstringente, odore niucundo: floribus quinque vt plurimum foliolis, nonnunquam senis, aut septenis, suauiter tubentibus, constantibus. Item Caryophyllata 3. siue Geum aquaticum Gesneri: cuius iconem suis coloribus depictam ipsi communicauit Pennæus, quam ex Gesneri depicto herbario se desumpsisse fatetur. Flores huic sunt sanguinei coloris, duum generum: nam alter flos multiplici foliorum textura & serie constat, alter simplici, vtriusque medium, quemadmodum in aliis Caryophyllatis, occupante villosâ congerie. Iconi fuit adscriptum Geum aquaticum flore simplici & multiplici. Tabern. hist.

Herba benedicta silu.

Caryophyllata 4. siue siluatica, Herba benedicta silu. wild Benedicet würz & wald Garasel/ radice simili vulgari crassiore, minus fibrosâ, odore multò minore: foliis paruis similibus Hedete terrestris, pilosioribus: caule cubitali, rotundo: floribus pulchris, luteis, rarò pluribus, quàm tribus in vno caule, sequitur floccus albus. Prouenit copiosè in S. Petri silua inter S. Remig. & Lâuterbürg, abundanter reperitur in Brabantia prope Mechliniam in silua, non longè à domo aquatica Bûrgenstein. Radix habet exsiccantem & adstringentem saporem. Gesn. hort. Geum 2. rituale, Caryophyllata & Benedictæ species. Trago Benedicta silu. Lob. & Penz. Adu. Septentrionalium rotundifolia papposo flore Caryophyllata: radice non perindè Caryophyllum aut Nardum halante, vt vulgaris: flore speciosiore, & coliculo pallidiusculo. Quæ descriptio non in omnibus placet, colorem enim non tradit. Figura quæ alioqui satis bona, exhibetur eodem etiam titulo, Icon. Pl. p. 694.

Geum rituale. Benedicta silu. Caryophyll rotundifolia.

Lob. nec.

Locus Tempus.

Florentem in horto mense Aprilis & Maio, ex montibus allatam Geneuæ habui, semen decidit mense Iunio. Crescit auctore Clus. mediâ ferè

Montium regione locis vdis & riguis, sub arboribus. Floret isthic Iunio: in hortos translata Maio, aliquando etiam maturius. In Brabantia siluosis conterminis Mechliniæ, & in Northmannia frequens, in Anglia verò plurima, teste Lobelio.

GARYOPHYLLATA PENTAPHYLLÆA.

In Rheticiæ Alpibus non procul Clauenna, hanc Primum nacti, putauimus [aiunt Lob. & Pena Adu. Jesse Tormentillæ, aut Pentaphylli speciem: verum radix Geranii fibrosior, forisque rubiginosa, paruum quid suauè redolens, Caryophyllatam testatur. Quinetiam erigit caules pedales, cui hærent folia quinquepartita, ambitu serrata, Pentaphylli aut Tormentillæ, flore luteolo pallentè, itaminulis lanuginosis, croceis, papposis, minoribus Caryophyllato.


Lob. & Penz. Adu. & Ic. Pl. Alpina Pentaphyllæa Caryophyllata. Cæterum, Lobelius prædicto titulo duas diuersas proponit figuras: Prior quidem in Adu. pingitur, sine pilis, & tantum cum foliis quinque. Posterior verò tota pilosa est, & septifolia, quæ sanè effigies non malè conueniæ videtur cum Ranunculo nostro montano albo, hirsuto.


Tabern. Ic. & hist. Caryophyllata 3. siue alpina, quinquefolia. Sed & Tabernæ figura longè à Lobelii diuerfa, est enim tota glabra, licet ipsa hirsutam esse scribat. Nos igitur propter figurarum varietatem Lobelii & Tabernæ, nullam proponimus. Casp. Bauh. phyt. Caryophyllata 8. sine quinquefolia maior. Item Caryophyll, 9. siue alpina, quinquefolia minor, quæ foliis sit quadruplò angustioribus quàm prior, totaque minor & tenerior, in monte Fractò proueniens, cui Cast. Durant. pag. 197. Caryophyllatam montanam non ab similem pingat. Gerard. hist. Angl. Caryophyllæa montana alpina pentaphyllæa.

FINIS LIBRI DECIMI SEPTIMI.

HISTORIÆ









HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER DECIMVS OCTAVVS.

FRUMENTACEA, GRAMINEA, HARVNDINEA, IVNCEA:

Producã ad Colophonem Arborum, Fruticum, & Suffruticum historia, tempus est ut ad herbarum historiam accedamus. Maximam hinc opus natura, Frumenta ordiemur, & cibos suos homini enarrabimus, facerique cogemus, ignota esse pleraque, per qua vivat. Fruges, inquam, Cereales, in cibos potius, quam medicinam cedentes, non a Cerere, ut Poeta negantur, repertas & excultas, sed ab ipso totius universi Creatore in ipso Mundi exordio productas: subinde eggente eas, & usibus affatim ministrante Tellure, loco præcipuis orbis regionibus proventu. Post Frumenta, & inter ea, & de Graminibus dici cogit Botanicus ordo. Quippe etiamsi Frumenta non sint, sunt tamen pecudi, quod frumentum homini. Adde quod plura eorum sunt Frumentacea. Sed & forme similitudo, & quoddam illarum quedam in hac abeant, inter illa de se dici possunt. Et quid propius ad Gramina accedit, quam Lunæ & Harundines. Ut & hinc venia sit hac illis adiacentibus, & equi studiosorum; ac Historia nostra compendio consulentibus.

TRITICVM VETERIBVS ET IN GENERE.

CAP. I.



Tradidimus priori libro, quæ de Leguminibus dicenda videbantur, nunc ad Frumentacea, quæ, teste Plinio, non eadem vbiq; neque vbi eadem sunt, iisdem nominibus occurrunt, devenimus. Sunt autem ea, quæcunque geniculato culmo, & arundinaceis constant foliis, semênque panificio, & pulitibus aptum in spicis aut iubis producent. Horum quidem omnium quamplurimis terris commune, & nobilissimum est Triticum.

Huius (ut author est Theophr.) genera plura notantur, cognomina ex locis sortita, ut *Africanum*, *Ponticum*, *Thracicum*, *Africanum*, *Aegyptium*, *Sicilianum*: quæ & colore & magnitudine, & specie, & proprietate inter se differunt. Quædam vel aliunde cognomina sortiuntur pro suis viribus, tum aliis, tum vel maximè, quæ ad cibum pertineant, ut *Canchrydias*, *Stelengis Alexandrinus*. Nec verò ab te fuerit, si illa quoque pro differentiis capies: & aliud *ptæcox*, aliud *serum*: & aliud autem amplum multumque reddens, aliud ieiunum quoddam parumque ferens: & aliud spicam grandinam effundens, aliud parvam: & aliud diu in folliculo manens, aliud aptum brevi absolui, ut

Africanum: & aliud culmo tenui constans, aliud *Ex diversis* castillo: quod etiam ipsum *Africo* datum est. *Craç. habitus*. Ilo tamen & *Canchrydias* dictum consistit. Item aliud tunicis paucis, aliud multis vestitur, ut *Thracium*: & aliud vnicalamum, aliud multicalamum, & magis minusque. Adde etiam si quid aliud his, aut prædictis ratione virium proximum sit: eiusmodi namque differentiæ naturaliores profectò apparent, quibus trimestrium annumerari genus par est, & bimestrium, & si quid intra pauciores dies valeat consummari. Et in *Eubæa* genus quoddam intra quadraginta dies *craç. fari*, perficique posse affirmant, idemque firmum esse, ac ponderosum, nec modo trimestris leve: quamobrem famulis id præberi inquitur, etenim nec multum in hoc sursum esse volunt. Igitur genus id celeritimum quidem ad consummationem, sed inuentu rarissimum est. Et bimestria verò quædam habentur, quæ ex *Sicilia*, & in *Achaïam* aduecta sunt: sed hæc paucum reddunt, parumque sæcunda habentur: quanquam cibo facilia, & iucunda sunt. Nascuntur & alia quædam genera in *Eubæa* & præcipuè apud *Cariæ* stum. Trimestria verò permulta, & vbiq; habentur: leuia hæc & parum sæcunda, & vnicalamum sunt, atque in totum infirma.

Tom. II.

II

Dele. Sur.

Leuissimum igitur Triticum, quoad simplici ratione agerelicet, *Ponticum* est: ponderosius ex his que in Græciam aduehi solent Sculum datur, sed eo ponderosius, quod Bœotia fert: quod inde afferunt, quod athleteæ, qui Bœotie ternos semilextarios vix possint consumere, cum Athenis fuerint, facillè quina consumunt: leue satis, & quod in Laconico agro conficitur. Horum igitur causa in terris, cœloque intelligi debet. Nam & Asia vltra Bœotia quodam in loco, ad eodè grande frumentum fieri tradunt, vt nucleis Oliuæ suæ equiparent magnitudine grana singula. In Pillo-tis autem dictis ad eodè firmum nasci affirmant, vt si quis plus comederit, distumpatur necesse sit: & Macedonum ita plerisque interisse aiunt: Absurdum sanè, & leuitati trimestrium ablonum, quod in Pontico euenit: Vetus enim durum admodum est: hybernum autem molle est: leuitate enim molle plurimum differt.

Nova ma- gnitudo.

An ex re- gionibus generis con- sistenda.

Celi quali- tatis, diuer- sificem gen- erat.

Plinius.

Genera prima duo. Hyberna. Aethi- a.

Sementia Dal. quia?

Triticum Italicum.

Bœoticum Sicilicum. Africum. Thracicum. Syriacum. Aegyptium

Reliquum est, vt propriæ naturæ causa detur, quam in pluribus differentias recipere magnas, cum in exortu, consummatione que, tum in propriis speciebus videmus, cum magnitudinis atque paruitatis & figuræ. Adde copiam paleæ, & incommoditatem ratione vfas cibari hominum. Forfitan & generâ generis efficiunt, vel omnia, vel certè aliqua: assimilant enim sibi ipsis quodam modo, & aut differentiam aliquam generis partunt, aut etiam minus vtile reddunt, vt Triticum Thracio euenit. Fit enim multis cum tunicis, seròque prouenit: quod utrumque vis sanè frigidis facti. Quæ de causa ceteris quoque agris, Thraciæ illud satim maturè, serò erumpit, ac augetur: & quod maturè apud alios feritur, serò apud alios exit. Conseruando enim velut natura effecta est. Nam & quod in Asiatico agro Aciplyngangis vocato habet vim distumpendi, quodque magnitudine nuclei est, agri proprietate, naturæque vires eiusmodi fortuntur: nec aliud translata seruari in eodem mutabilia possunt. Nec minus locum habet in ceteris, si quis cum agro, celi quoque aduertat qualitatem. Hinc enim fructuum diueritates exultant, imò hinc sterilitates sequuntur, cum planta in alieno agro nequeat hospitari. Hæc Theophrasti. quorum multa transcripisse videtur Plinius.

Frumenti ipsius, inquit, totidem (duo vt frugum) prima sunt genera, per tempora satûs diuisa. Hyberna, quæ circa Vergiliarum occasum [No- uembrem] sata, terrâ per Hyemem nutriuntur, vt Triticum, Far, Hordeum. Aethiæ quæ Aestate [Mio] ante Vergiliarum exortum seruntur, vt Melum, Italia duntaxat ritu. Alioquin in Græcia & Asia omnia Vergiliarum occasu seruntur. Quædam autem vtroque tempore in Italia. Ex his quædam & tertio, Veris scilicet. Aliqui *erna*, Mlium &c. appellant. *Sementia*, autem Triticum &c. Et in Triticis genere pars aliqua pabuli est quadrupedum causâ sata, vt Farrago. Sementia autem interpretatur Dalechamp. quæ primo & potissimo sementis tempore. nempe circa Vergiliarum occasum, quod *sermo* [sementem] vt ait Theophr. antonomastice Græcia vocauit, terræ mandantur. Triticis, (pergit Plinius) genera plura, quæ sece- rentes. Italico nullum equidem comparaue- rim candore ac pondere, quo maximè discernitur: montanis modò comparatur Italia agris exterâ, in quo principatum tenet Bœotia, deinde Scia- lia, mox Africa. Tertium pondus erat Thracio Syri- oque, [deinde &] deinde Aegypto, athleta- rum cum decreto, quorum capacitas iumentis sim- ilitis, quem diximus ordinem secerat. Græcia &

Ponticum laudant, quod in Italiam non perue- nit. Ex omni eadem genere grani prætulit [Can- chrydiam, Stelengyn, & Alexandream Theodra- conion, & Iteleparit, & Sclunusium CH.] Dra- coniam, Strangiam & Selenusium, argumento crassissimi calami: ita pingui solo hæc genera assi- gnabat. Leuissimum & maximè inane, seu tenuis- simi calami in humidis feri iubebat, quoniam multo egeret alimento. Hæc fere sententiæ Ale- xandro Magno regnante, cum clarissima fuit Græcia, atque in toto terrarum Orbe potentissi- ma, ita tamen vt ante mortem eius annis ferè 145. Sophocles Poeta in fabula Triptolemo fru- mentum Italicum ante cuncta laudauerit, ad ver- bum translata sententiâ.

Et fortunatam Italiam frumento [carere] canere candido.

Quæ laus peculiaris hodièque Italico est. Quo magis admittor, posteros Græcorum nullam men- tionem huius fecisse frumenti. Nunc ex his gene- ribus quæ Romam inuehantur, leuissimum est Gallicum, atque è Chersoneso aduectum: quip- pe non excedunt in modum vicenas libras [sili- quæ granum ipsum pondere Turn.] si quis granû ipsium ponderet. Adicit Sardum selibras, Alexan- drinum & trientes: hoc & Siculi pondus. Bœoti- cum totam libram addit. Africum & dodrantes. In transpadana Italia scio vicenas quinas libras satis modios pendere: circa Clusium & (Senas Dal.) senas. Lex certa naturæ, vt in quocunque genere pani militari tertia portio ad grani pon- dus accedat: sic optimum frumentum esse, quod in subacta congiug aquæ capiat. Quibusdam gen- eribus per se pondus, sicut Balearico: [quod modio Vet.] modo tritici panis pondo xxx (xxxv Dal.) reddit. Quibusdam in binis mistis, vt Cy- prio & Alexandrino, xx. propè libras non excedentibus. Cyprium fuscum est, panemque nigru- facit: itaque miscetur Alexandrinum candidum, redduntque xxv. pondo. Thebæicum libras adici- cit. Marina aqua subigi, quod plerique maritimus in locis faciunt occasione lucrandi salis, inutilissi- mum. Non alia de causa oppotuniora mor- bis corpora existunt. Gallie & Hispanie frumen- to in potum resolutu, quibus diximus generibus, spumantia concretâ pro fermento vtuntur. Quæ de causa leuior illis, quam ceteris, panis est. Dif- ferentia est & calami. Crassior quippe melioris est generis. Plurimis tunicis Thracium triticum vestitur, ob nimia frigora illi plagæ exquisitum. Eadem causa & trimestria [& trimestre Dal.] in- uenit, detinentibus terras niuibus, quod tertio serè à satu mense & in reliquo orbe meritur. To- tus hoc Alpibus notum, & hyemalibus prouinciis nullum hoc frumento lætius. Vnicalamum præ- terea, nec vsquam capax: feriturque non nisi ten- ni terra. Est & bimestre circa Thracium sinum quod quadragesimo die, quam satum est, matu- rescit: niuiumque, nulli frumento plus esse pon- dens, & siccaturibus carere. Vtut eo & Sicilia & Achata, montosis (montuosus CH.) vtraque par- tibus Eubææ quoque circa Carystum. In tantum in- fallitur Columella, qui ne trimestris quidem prop- rium genus existimauerit esse, cum sit antiquissi- mum. Græci trimenon vocant. Tradunt in Bæ- tis grana tantæ magnitudinis fieri, vt singula spicas non stras æquent.

Quod verò dixit Plinius: Est & bimestre &c. Theophrastus aliter habet. Scribit enim esse Tri- tici genus trimestre celerius maturefcens, vt in Eubæa quod intra quadraginta dies perficitur. Esse & trimestria, quæ ex Sicilia in Achaiam trans- portantur,

portantur. Est & eiusmodi in Eubœa, maximè in Carysto. Præterea à Theophr. diffidet, cum ait, Tradunt in Bactris grana tantâ magnitudine fieri, vt singula spicas nostras æquent, cum Theophr. scribat, In Asia trans Bactra ad eò grande gigni frumentum, vt nucleo Oluæ par sit magnitudine.

Nunc, eodem Plinio autore, frumenti genera, non eadem ubique (vt diximus) neque vbi eadem sunt, iisdem nominibus. Vulgatissima Far (Triticum muticâ spicâ secundum peritiores) quod adoretum Veteres appellauerunt, Siligo, Triticum. Hæc plurimis terris communia. Arinca Galliarum propria, copiosa & Italiae est. Aegypto autem ac Syria, Ciliciaeque & Asia, ac Græciæ peculiariæ Zea, Olyra, Tiphe, Aegyptus Similagine conficit è tritico suo, nequaquam Italicae patem. Qui Zeâ vtuntur, non habent Far. Ex omni genere durissimum Far, & contra hemes firmissimum. Patitur frigidissimos locos, & minus subactos vel aestuosos, siccitèsq.ue. Primus antiquis Latio cibus, magno argumento in adoretis donis, sicuti diximus. Pulte autem, non pane, vixisse longo tempore Romanos manifestum, quoniam inde & pulmentaria hodiè que dicuntur. Et Ennius antiquissimus vates obsequio nis famem exprimens, osam eipuisse plorantibus liberis patres commemorat. Et hodie sacra pifica atque natalium pulte fitilla (pulte fitilla M. fitilla est.) conficiuntur; vtiderique tam puls ignota Græciæ fuisse, quàm Italiae polenta. Tritici semine audius nullum est, nec quod plùs alimenti trahat. Siligenem propriè dixerim Tritici delicias: candor est, & sine virtute, & sine pondere, conueniens humidis tractibus, quales Italiae sunt & Gallia comata. Sed & trans Alpes in Allobrogum tantum Memoriorumque agro pertinax, in ceteris ibi paribus biennio in tritico transfit. Remedium vt grauissima quæque grana eius serantur.

Dioscorides duo duntaxat Tritici genera proponit: alterum recens, perfectè maturum, & colore luteo: alterum *εραμιαίνον*, id est Trimestre, quod ab aliquibus *οντάριον* appellari dixit: hac voce etiam Trimestre significante. *Τηρες* enim significat *εραπιδέ τὰ έρα*, id est, hoc ipso anno, quod Dores *οντες* dicunt, vnde *οντάριον* *πρωτος* est, vt exponit Galenus, *ο έρα τος έραμιαίνον* *οντες*, *οντες*, *ο έρα τος έραμιαίνον*, hoc est Triticum huius præsentis anni, nempe vere satum.

Prima & vtilissima, inquit Columella, sunt hominibus frumenta Triticum, & semen adoretum. Tritici genera complura, ait Columella, cognouimus. Verùm ex his maximis serendum est, quod Robus dicitur, quoniam & pondere, & nitore præstet. Secunda conditio est habenda siliginis, cuius species in pane præcipua pondere deficitur. Tertium erit *trimestre*, cuius vsus agricolis grauissimus. Nam vbi propter aquas aliæque causam matura satio est omissa, præsidium ab hoc petitur. Id genus est siliginis. Reliquæ tritici species, nisi quos multiplex varietas frugum, & inanis delectat gloria, superuacuae sunt. Adorij autem plerumque vidimus in vsu genera quatuor, Far, quod appellatur *Clusinum* candoris nitidi. Far, quod vocatur *Ventriculum* rutilum, atque alterum candidum, sed vtunque maioris ponderis, quàm clusinum. Semen trimestre, quod dicitur *Halicastrum*, idque pondere, & bonitate est præcipuum.

Spica, autore Varrone, quæ mutica non est, in tritico & ordeo tria habet continentia. *Granum*,

glumam, *Aristam*, & etiam primitus spica culm oriatur *Vaginam*. *Granum* dictum, quod est intimum solidum. *Gluma*, qui est folliculus eius. *Arista*, quæ vt acus tenuis longa eminet è gluma. Proinde vt grani theca sit gluma, & apex arista. Arista & Granum omnibus serè notum, gluma paucis. Itaque id apud Ennium solum scriptum scio esse in Eumeri libris versis, videtur vocabulum eymon habere à glubendo, quòd eo folliculo deglubitur granum. Itaque eodem vocabulo appellant fici eius, quam edimus, folliculum. Arista dicta, quòd areleat prima; granum à gerendo, d enim feritur, vt spica gerat frumentum, non vt glumam, aut aristam gerat, vt Vitis feritur, non vt pampinum ferat, sed vnam. Spica autem quam rustici, vt acceperunt antiquitas, vocant *specam*, *Speci*, & à spe videtur nominata. Eam enim quòd sperant fore ferunt. *Spica mutica* dicitur, quæ non habet aristam. Aristæ enim quasi cornua sunt spicarum quæ primitus cum oriuntur, neque planè apparent, in qua sublatent herba, ea vocatur vagina, vt qua latet conditus *gladius*. Illud autem summa in spiciam matura, quòd est minus quàm granum, vocatur *Fris*, quòd in infima spica ad culmum stramenti summam, item minus quàm granum est, appellatur *Vtrumcum*.

Hermolaus parum ex alis, parum ex sua obseruatione hæc habet. Triticum & latuum & siluestre, cultu annorum trium interit. Degenerare Triticum in Hordeum, ex eodèque nasci pede vtunque fabulosum existimatur à Theophrasto. Triticum multis integitur tunicis: eiculmus altior quàm Hordeo: spica quoque remotior à folio, palea suauior, mollior, succosior: spicæ verò in conditæ explanatæque. Culmus spicam sustinet, quæ & *spicus* & *spicum* à Cicerone dicitur in Arato: spica, granum & Arista, quæ vt acus eminet è folliculo siue gluma. Sunt porò Aristæ partes in spica prima, quæ à Græcis *antherices* dicuntur, & *antheres*. *Stipula* sunt folia culmum ambientia: est autem *culmus*, idem quod & calamus. Quod minus est, quàm granum, vocatur *Fris*: quod verò ad culmum cacumina in firma spica geritur, minus item quàm granum, *Vtrumcum* appellatur. In Tritico marcescente gurguliones gigni, vt etiam Cantharidem constat. Tritici multa discrimina: Sitanion vocatur, genus id Siliginis trimestre, frumentago dictum Theodoro, differens castitudine furculorum. In nomine sunt *Assyrium*, *Aegyptium*, *Ponticum*, *Thracium*, *Siculum*, *Africanum* quòd facile absoluitur folliculo: Thracium verò multas habet tunicas. Habetur & cachrys, siue canchrys, culmo crasso, quod etiam Africo tribuitur. Ponticum leuissimum, Siculum ponderosum, ponderosius Bæotium. Ponticum & Aegyptium sine Lolio nascuntur, item Siculum, præcipuè Agrigentinum. Cum Siculo melampyron nasci perhibent alii, sed innocuum neque Lolii modo graue, capite tentans. Nominatur & Alexandrinum, oblongo semine, quod fortasse idem cum Aegypto, & Calymno. Dracontias & Sclenusium, & Stengias crasso euncta calamo. Iam aliud trimestre, aliud bimestre. Sitanium idem esse video cum trimestri, fatium Poricè vocatum, & Atticè titinoa; quasi purum. In trucleatro Plauti Etanio pro Sitanio legitur mendosè. Euboicum intra diem quadragelimum à satù mcutur, firmitate ac pondere præcipuum, non vt trimestri leuitas, ob id ciatio pani vile: nam & furfuri parum habet, inuenturatum. Bimestria in Achiam è Sicilia primùm venère, parum fecunda, sed cibo facilis & iu

Gluma, *Arista*, *Vagina*, *Speci*, *Spica mutica*, *Vagina*, *Gladius*, *Fris*, *Vtrumcum*, *Hermol*, *Triticum*, *Sitanion*, *Stipula*, *Spicus*, *Spicum*, *Arista partes*, *Culmus siue calamus*, *Triticum maris*, *Cachrys*, *Sitanium*, *idem cum trimestre*, *Plauti aratur*, *Bimestre*.

cunda. Olynti & in Eubœa apud Cerinthum genus effoditur terræ, quâ triticum oblinentes, quid seruant. Trimestria vbique sunt, verùm inutilia, & infirma singulari calamo. In Asia quodam loco trans Bactra frumentum nucleis Oliuæ par nasci referunt. In Pissotis tam firmum, vt multos Macedonum largiore vsos eo saties peremerit. Omni frumento nocent imbres in flore. Item iam planè crassato, triticum plus quàm hordeum vlgine comæat in Lolium. *Camatias tritici genus*

Ruellius Ruellius qui suam historiam ex Theophrasto & Varro, Columella & Plinio, Galeno & Hermolao congeffit, ait speciatim vnum apud Gallos tritissimum esse genus, macrum, triste, Hordei similitudine, cuius granum folliculo non facillè deglubatur, nullis tamen arstis vallatum, quod Vere non feratur. Sermone vernaculo, *Succursus gentium*, siue *Scurge*, dicitur, cuius agricolis vsus propè nimis cum annanæ præmat penuria. Dicit adhuc, Trimestre, quod Græci Trimenon, vel Sitanium vocent, totis Alpibus notum esse, & hycem illius pronunciat, nullum hoc lectius. Vnicalamani præterea Gillos *Martio* vocare, quod Martio situm tertio hinc mense maturescat.

Cordus Cordi verba haudquaquam negligenda ducimus, præsertim quod videantur ad dicta Veterum intelligenda non nihil facere. Ea autem sunt hæc:

Robus Siligo Sunt Tritici species, *Robus* & *Siligo*. *Robus* vocatur de sius, solidius, & ponderosius. *Siligo* rarius, & leuius pondere: sed candidius Triticum.

Semestre, Trimestre, Hyemale, Siligium Est & alia Tritici distinctio: *Semestre* & *Trimestre*: illud ante hyemem, hoc verò initio Veris feritur, quare alterum *Winterweize*, id est hyemale Triticum: alterum *Sommerweize*, id est aestiuum Triticum, Germani vocant. An verò idem sit Robus cum semestri, neque negare, neque affirmare auctum. Credimus tamen, haud sine causa, non differre Robum à semestri, nam à Semestri non distinguunt id Auctores, neque Columella cum species Tritici recenset, Semestris meminit, sed Robi, quasi idem cum eo crediderit & ipse. Quemadmodum quoque Robus Siligini præfertur pondere & magnitudine, ita etiam Semestri Trimestri, quod & Sitanium dicitur, & Siliginis species existit.

Triticum Germaniæ triplex Tragus triplex Germaniæ Tritici genus describit, quorum primum *hybernum* censet, alterum æstiuum dicit, tertium *non vulgare*, nec vbique notum scribit, de quibus separatim tractabimus. Constat, inquit, Triticum omnium frugum fertilissimum esse, si quidem cultura sua minimè destituatur. Legimus eni n, vno ex grano Tritici triginta aut quadraginta quandoque spicatos culmos exiisse. Sed hanc fertilitatem terræ bonitati & culturae diligenti ego adscripserim. Huc nimirum respexit Seruator noster Iesus Christus, cum in parabola ad populum, sementem quæ in bonam terram cecidisset, aliam, quidem cenuplum, aliam verò sexagecuplum, aliam denique trigecuplum fecisse fructum dicit. De Triticio Tritico Plinius peculiater meminit, quod illud à satione quadragesimo die maturetur. Sed hæc Plinius ipse non vidit, at potius legit in Veterum scriptis, tum aliorum, tum præsertim Theophrasti, qui l. 9. Hist. plant. cap. 3. in Mela sata intra triginta, aut quadraginta dies meti scribit, rursus verò in Chalcia Rhodiore Insula locum quendam esse aded præcoquem & fertilem: vt hor-

Feracitas terra bonitatis & cultura adscribenda

Plin. not.

deum satium in eo, cum in aliis fereretur locis, meteretur, &c. Hæc verò quæ tam à Plinio, quàm Theophrasto, prædicantur, credere, quàm experiri malumus. Nostrum certè Triticum hybernum, nouem mensibus in agris moratur, quod non solum omnes norunt agricolæ, sed & Plinius & Varro testati sunt. Aegypti septimo à satione mense fruges suas horreis committunt, vnde frumenta illorum iurè Septimestria dici possent, atque talis fertilitas nostro solo negata est. Idem de Sitanio quod nostri *Ameliforn* nuncupant iudicium est. Hoc quia tertio postquam satum fuerat mense, horreis apud alias Nationes recondi fertur Trimestre Dioscoridi nominatur. Apud nos quinto demum mense maturatur, vt omnes norunt. Tanto interuallo fruges alio quæ alio solo procreant inter se distant, vt vel hinc appareat, suum cuique frumento tempus in singulis regionibus deputatum, frugesque pro diuersitate terræ alio atque alio gaudere cælo.

Fuchsius quoque tria summa genera Tritici eos obseruare dicit, qui frumentanæ rei periti sint. *Primum* quod Robus, Germanis simpliciter *Weizen* nominatur. *Secundum* quod Trimestre & nonnullis Sitanium, Germanis *Ameliforn* dicitur, haud dubè non aliâ ratione, nisi quod ex hoc genere Tritici amyllum optimum conficitur, *Tertium*, quod non vndiquaque notum. Atque alterum non differre à primo, nisi quod spicam multis arstis vallatam, & in duos versus dispositam obtineat. Sed consideratione dignum, an Triticum Sitanium à primo differat tantum arstis: Montbelgardi enim obseruo in agris nostris vulgare triticum spica mutica & arstis vallatum: si intelligi idem Triticum cum *Ameliforn* Hier. Tragi, quod suspicor, is plerimum fallitur, hoc enim est ex genere Zeæ. Minus non separatur, nisi per Molendinum, de quo sub titulo Zeæ Ver-
næ.

Dodonæus triplex quoque Tritici genus tradit, Robum Columellæ, Siliginem Plinii, & Sitanium, quod Trimestre vocant.

Triticum aliter ex Dalechampii sententia, qui sua Veteribus accommodare studet, Hist. Lugdunensis diuidit, vt eius duo summa sint genera vsu frequentiora. Vnum *candidum*, vulgò Gallis *Blé blanc* nuncupatum: alterum *rufum*, Veterum *rouge*, quasi *maître*, vulgò *Blé rouge*, Columellæ Robus à flauo colore quem Rubeum primò syllabâ productâ, & Rubem Veteres appellauerunt, Græci *Zebeis*, vnde Seruio Nitedula, mus agrestis robeus, & in illud Vergili, *Sanguineis frontem muris*, &c. Robeus color Diis attributus, & in Veteri inscriptione, vt Prator cui hæc regio fortè obuenerit, liturum se sciat, aliusque quis magistratus, Volcanibus x. Cal. Septemb. omnibus annis, vitulo robeo, & verre. Rursus Tritici candidi rufisque duæ sunt Gallis notæ species. *Vna* cuius spica arstis habet, *altera* cuius spica mutica est, id est arstis caret, auctore Varone. Priorem nulla peculiari appellatione Galli designant: posterio-
rem *Blé mutet* vocant, quasi Triticum muticum. Quod autem spica arstis vallata sit, vel idem careat, quidam frugis & naturæ proprietati, quidam agri conditioni macri, pinguis, tenuis, crassi, stercoreati, minimè lætificati tribuunt. Triticum enim candidum aiunt in pingui, crasso & stercoreato agro spicam muticam ferre, in macro, tenui, & non lætificato arstis horridam. Adiciunt quidam cæli statum quo leges adolescit: humidior etenim spicam arstis carere, siccior arstis muniti. Addunt alii & ventorum flatum, quoniam si ve-
hementior

hementiores irruant, aristas decutiunt: si leniores spirauerint, aristas spicam collisū non frangunt. Sunt & qui legetis densitatem raritatemque nonnihil ad id valere putant. Nam densiores segete, spicas muticas, tariore, cum aristis prodire. Ex candido Tritico panem lauiorem, quàm ex rufo pistotes fieri asserunt, sed leuiorem, & quiminius alat: atque in hoc genere muticum aristato præterunt, etiam si mutici granum gracilius sit, & minus: plus enim farina à mutico reddi, & futuris parum: farina verò minus ab aristato, & futuris pluitimè. Præterea mutici farina candidissimam esse, ac niueam, aristati nigriorem, ac sordidiorè. Candidum Trincum, Latinorum Siliginem frugem esse, Veterum scriptorum testimonio confirmari potest, qui Siliginem Tritici genus faciunt, & vt Triticum nostrum candidum, candore ac leuitate cæteris generibus præstare literis prodiderunt.

Duo Tritici genera celebrat Cotnarius. Et prius quidem (quod Columella Robum) tum simpliciter wtzen (Triticum) tum winter wtzen (Triticum hyemale) posterius (quod Columella Trimestre, *τριμηναιον* Diosc. Trimenon Plinius dicit, Aestuale) Sommer wtzen vocat, sicut etiam reliqua frumenti genera iuxta leminationis rationem, winter & Sommergetreyde (Hyemalia, & Aestiuaria frumenta, appellat. Potest, inquit, Setanium (Trimestre) Triticum horum dici, quum vere seminatum, æstate metatur: Columella Robum probat, quo Autore, nullum (sicut multi credunt) natura trimestre semen datur. Quod quidem Columella dictum teprehendit Plinius. Sed non videtur factis considerasse id, quod Columella subiungit, Sed sunt nihilominus quedam alius potiora, quæ sustinent veris tepores &c. Tertium Tritici genus ignotum & neglectum arbitrat, eò quòd Columella dixerit, species eius in pane præcipuè, pondete defici. Et tepetierit cap. 9.

Nec nisi tanquam oprabilis fallat siligo.

Triticum nihil est fertilius: hoc ei natura tribuit, quoniam eo maxime alat hominem: vepote cum è medio, si sit aptum solum, quale in Byzacio Africæ campo, centeni, quinquegeni modii reddantur. Misit ex eo loco Diuo Augusto Procurator eius ex vno grano (vix credibile dictu) quadraginta paucis minis germina, extrantque de ea re epistola. Misit & Neroni similiter ccc. xli. stipulas ex vno grano. Cum centesimo quidem & Leontini Sicilia campi fundunt, aliisque, & tota Boeicia & Siptimis Aegyptus. Fertilissima Tritici genera, ramosum, aut quod centigramum vocant. Cæterum, ob summam Tritici in Asia fertilitatem, Imperatores Romani, attestante Virgilio, qui ei Prouinciæ præfuerant, aut in ea res gesserant, Africam signabant capite obuoluto pelle elephantii capiti detracta cum promulcide, adiecta spica & subdito aratro cum cultro. Sed & ea soli fertilitas Siculos ad omne deliciarum genus sic effudit, vt omnibus voluptatum generibus præter modum addicti forent ac dissoluti. Hinc Platoni Siculæ mensæ, vt & Italica, & Thesalæ, lautissima ac maxime opipata, quemadmodum & Asiana. Macrob. 7. Saturnal. Modum eum feruat, qui sui potens est, & in mensa Sicula, vel Asiana. Brod. c. 33. lib. 5.

Græcis *τροεις* vocatur, quasi *τροεις*, pro *τροεις*, *τροεις* *τροεις*, secundum Etymologicum. Hebræis *Chittab*, vel *Chittab*, Columella Robus, si Trago credimus. Arab. *henta*, *henta*, *hanta*. Germ. *weyzen* / *Alfatis*, *Born*. Belg. *Terwe*. Angl. *wet*.

Tom. II.

Ital. *Fourmento* & *Grano*. Hsp. *Trigo*, Gallis generis vocabulum speciei tribuentibus, *Froument*, voce ex frumento Latino deslexa. Sed frumentum apud Latinos Tritico latius patet. Hinc plerique etiam *far* frumentum appellant. Høng dicitur *Buza*, Boh. *pisseuce*. Significat verò Triticum generaliter omne frumentum quod ex spicis tritum, ac trituratione repurgatum est: in quo significato, ait Dodonaus, Iunscōsultus nonnunquam hac voce vitur, vt si de verb. obligat. propriè tamen idem cum eo est, quod Græcis *τροεις* est.

Solo pluuio atque frigido semina conueniunt ad Tritici sicut & cæterorum frumentorum fructificationem, quòd aperta & rara substantia sunt: soluta enim hæc sunt. Verùm (vt simplicius agam inquit Theophr. de caus. plant. lib. 3. cap. 26.) Solum pingue Tritico accommodatius est, largius enim callo suisque alimentum expolcit. Triticum trimestre solo tenui melius fit. Alimentum enim subministrari modicum eo potest, hoc est leue leui. Africum & Dracontias appellatum, & Strangias, & Selenusium, letum exgunt agum. Hæc enim vberius succos hauriunt. Argumentò calamus est, quem cæsam gerunt. Ad summam, quodeunque huiusmodi sit, solo stetgali aptè committitur. At si aliquod genus tunicis multis contegitur, ceu Thracium, hoc solo hyberno conuenientius dabitur, frigus enim huic nihil efficere potest. Rarum, solutumque, ceu Canchrydias vocitarum, agro pluuio sefendū profectò est, quippe eum alimenti capiam id quoque desideret: quamobrem & culmo cæssis exurgit. Et in cæteris verò semper ad alimentum referenda ratio est: nunquam tamen ratione aëris prætermis-

Locus, tēpus, satio, cultura, & id genus alia.

sa, etenim solum apicum & ad summam sefernum, infirmioribus commodius est: contrarium validioribus, lutosum siccis & patuo alimento contentis. Sic Triticum solo pluuio vberius quàm hordeum geritur, & omnino contra imbres validius est: fert idem etiam solo non stercorato copiosius. Ratio, quòd suo naturali colore pleniùs concoquere possit, & si num non requiratur, quoniam in se habeat quòd ex simo acquireretur. Ad summam, Triticum robustius est, & maturius feritur, & locis frigidis magis committitur. Robur autem ferere, caloris planè interest naturalis. Quin & quòd tunicis inuolutum pluribus sit, fit vt tutius maneat: quapropter solum, quod longo intervallo temporis colitur, Triticum magis quàm hordeum fert, Triticum enim alimentum eius soli validius magis vincere potest. Omnino [vt simplici ratione dicam] publicæ ac summæ differentiæ illæ sunt, agri natura, seminum firmitas, infirmitasve, atque aëris habitus: qua de causa hæc considerari vbi que necessarium. Frigora subsecuta omnibus in locis vtilia sunt: sic erim sata pleniùs radicanur, canchrificanturque ita, vt ineunte vere haudquaquam modica magnitudine careant, sed præcipuè in bonis. Austinum enim atque omnino ferenum tempus celeriter edit, aruginemque fortificat. Quæ densè fuerint seminata, spicam priùs effundunt, quàm quæ rariènt, quòd altera largius radicanur, & multiplicius deorsum seindantur, quia locus superest, altera pronius sursum excurrant. Tritico atque reliquis, quæ spica pusilla, infirmaque sunt, anceps satio datur. Sunt enim in singulis generibus alia præcocia, alia serotina. Quamobrem alia prosperant, alia differunt. Triticum etiam quod hyeme feritur, quia numerosa radice fit, vixitque suas ad lera-

dicandum p̄timum intendat, multitudinem cul-
ni educit, est enim multicalamum: trimestre
contrā paucis radicibus, paucisque culmis confi-
sit, qua de causa sursum continuū nititur, atque
celeriter consummatur: quod enim minus est,
perfici facilius potest. Hinc etiam alterum largē
fructificat, alterum parcē: & alterum facili, alterum
grauē est. [vr antē iam diximus] cū plus alimen-
ti, & turbulentius trahat. Excursus quoque rati-
one properē agit, cū in condens radicibus
haud multū reratur temporis, vt pote pau-
cis. Qualitas quoque temporis plurimū fauet,
nam & radicofum illud, si eo tempore oberatur,
velocitū enascetur, & in culmos spargetur paucio-
res, & spicam parua, atque paucis fertilem ge-
ret: & trimestre, si maturē seratur, frigus tolerare
non potent suz causā imbecillitatis. Sed mirum,
atque diuersum eueniet, si quod tempore bre-
uiori conficitur, graue, fastidiosūque sit: vt
Aenenses de eo referunt, cuius cura a quinoctio
delegata est.

Catonis apud Plinium sententia est, in agro sic-
co & non herbofo, nec umbrato Triticum feri.
Non transeundum est ex frigidis locis semen in
calida, neque ex aruocothus in ferotina: idque
in contrarium præceptē quidam falsā diligentia.

*Tritici in
singulis in-
geribus
quoniam
serendum.*

Serere in iugera temperati soli iustum est Tritici
aut Siliginis modios quinque. Farris aut Serminis
(quod frumenti genus Plinius ita appellat) decē.
Eū & alia distinctio. In denso, aut cteroso, aut v-
lginoso solo, Tritici aut Siliginis modios sex: in
soluta terra nuda, & sicca, & lata, quatuor. Mac-
cies enim solimior, nisi rarum culmum habeat,
spicam minutam facit & inanem. Pingua arua ex
vna feminis radice fructum numerosum fundunt,
densamque segetem: raro semine emittunt. Ergo
inter quatuor & sex modios pro natura soli, a-
lu quinque non minus feri, plurēque præcipiunt:
item in confito, aut cliuoso, vr in macto. Huc
pertinet oraculum illud magnoperē custodiendū,
segetem ne defuges. Adiecit is Accius in Praxi-
tico, vt fereretur, cū Luna esset in Ariete, Ge-
minis, Leone, Libra, Aquario. Zoroastres Sole
xii. partes Scorpionis transfresso, cūm' esset
in Tauro. Sequitur huc delata & maximē indi-
gens cura de tempore fruges ferendi quæstio, ma-
gnāque ex parte ratione siderum cōnexa. Quam-
obrem sententias omnium, in primis ad in per-
tinentes, exponemus. Hesiodus, qui princeps om-
nium de agricultura præcepit, vnum tempus fe-
rendi tradidit à Vergiliarum occasu. Scribebat e-
nim in Boeotia Helladis, vbi ita feri diximus. In-
ter diligentissimos conuenit, vt in alium quadru-
pedūque genitura, esse quosdam ad conceptū
impetus & terræ. Hos Græci ita definiunt, cūm
sit calida & humida. Virgilius Triticum & far
è Vergiliarum occasu feritubet: Quo fit, vt horum
siderum aliorūque exortus & occasus digerendi
sint in suos dies. Sunt qui & ante Vergiliarum
occafum feri iubeant, duntaxat in arida terra, ca-
lidiſque protineis. Custodiri enim semen corrup-
pente humore, & à proximo umbræ vno die erū-
pere. Alii statim ab occasu Vergiliarum sequi im-
bres, à septimo ferē die. Aliqui in frigidis ab æ-
quinoctio Autumni in calidis feriis, ne ante hye-
nem laxarent. Inter omnes autem conuenit cir-
ca brumam ferendum non esse magno argumen-
to. quoniam hyberna femina, cūm ante brumam
nata sint [sata sunt M.] septimo die erumpant: si
post brumam, vix xl. Sunt qui properent, atque
ante autem, septimam ferentem sape decipere,
ante autem, septimam ferentem sape decipere,

rendum, quam malē in Autumno. Atque vbi fuerit
necesse, inter Fauonium [Spirare is incipit circa
7. aut 8. Februarii. Lugdunenses vocant, *Le uent
suillet*, quodd arborum folia eliciat.] & vernum æ-
quinoctium. Quidam omiſſa cœlesti cura, vt nu-
muli, temporibus definiunt. In Græcia & Asia
frumenta omnia Vergiliarum occasu feruntur.
Quædam autem vtroque tempore in Italia. Ex his
quædam & tertio, Veris scilicet. Varro qualiter
nouenis diebus fruges absolui tradit, & mense
nono meti. Frumenta cūm deſloruere, crasseſcūt,
maturanturque. In Aegypto septimo à fatu men-
ſe frumenta inेतunt.

Triticum erumpit die plurimū septimo, cras-
ſeſcit autem, inquit Theophrast. maturaturque in-
tra quadageſimum, quum rarissimē octauo
ab fatu mense plurimā parte metatur, Aegyptiis,
vt aiunt, septimo. Varro quindecim diebus in va-
ginis esse dicit, quindecim florere, & quindecim
areſcere. Triticum pergit Plinius, quo feriū
merit, copioſius inuenitur: quo celerius verō,
hoc specioſius ac robustius. Lex aptissima, ante-
quam grauum indureſcat, & cūm iam traxerit col-
lorē. Oraculum verō bidū celerius melleſe facere
potius, quā bidū feriū. Siliginis & Tritici etiā
ratio in area horreōque. Far quia diſſiculter ex-
cutitur, conuenit cūm palea ſua condi: & stipula
tantūm, & arillis liberatur.

Sed de mutatione Tritici in formam alienige-
nam, in Lolium, & vice versa, & ex femine in A-
uenam, mirandum sanē est. Aqua Tritico flo-
renti obest. Vermem maximē etiā sentit in rade-
dice, ea nimitum humefacta. Euenit verō vt Tri-
ticum bestiolas ita gignat, quia dulcius est: qua
de causa palea quoque huius ſuauior. Vermis ge-
neratus in eo, vbi alimentum aſſumpſit, quod in
culmo est, spicam aggreditur, & vel totam erodit,
vel alteram partem.

Ærugo, quamuis frumentorum commune vitū
ſit, tamen magis inſeſtat Triticum, quod tunicis
integitur pluribus, & folium spicæ gerit proxi-
mum, vnde frugem ſuam effundit: reſider enim
in eo humor putrefactus, qui eruginem creat. Ad-
de quodd spicam gerit erectam, denſiorinque.
hinc enim humor minis potest deſluere: quæ
causa spicam aliquantūm inclinari melius est.

Triticum perit ex nimio ſtercore, si non im-
bres ſecuti ſunt. Quo circa Solo plurius, crebra &
largior ſtercoratio commodior est. Sticulis at-
que gracilibus inodica prodest. Hyeme ſicca &
ſuda, Vere pluuioso & humido ſæcundam ſe-
getem esse monſtrat hoc carmen veteris Poætæ a-
pud Feſtum.

*Hyberno puluere, Verno luto, grandia farræ Ca-
mille metes.*

Expresſit & Virgilius hanc ſententiam his ver-
ſibus,

*—hyberno larissima puluere farræ,
Luris ager, villo tantūm se-Mæſia cultu
labat, & ipſa ſua miratur Gargaræ melleſe.*

Triticum non penitēs exſiccari patitur, quod ad
reddendam lanam melius minis arefactum pu-
tatur. Quæ de causa in aceruo componi aſſolet: ſer-
videtur enim in aceruo crasseſcere potius, quā
attenuari. Triticum puluerulentum putreſcit ce-
lerius: & quod in domiciliis opere teſtorio leui-
gatis conditum: quoniam id caloris plus ſentiat,
Puluis enim calidus est, vt pote ſiccus, vr illimen-
tum calis calorem ſuſceptum vti que ſeruat. Nam
& cūm vniuerſum, aliumque acernatum est, pu-
trēt: ſic enim plus caloris exoritur. Triticum
magis Mordeo & leguminibus durat, quia calidius
est

est, & tunicis pluribus tegitur. Triticum in spica nondum messum durare maximè potest. Connexa est ratio, ut nobis auctor est Plinius, frumenti seruandi. Horrea operosa tripedali crassitudine, pariete lateritio, exadificari iubent aliqui. Præterea superne impleri, nec afflatus admittere, aut fenestras habere vllas. Alii ab exortu tantùm aestiuo, aut Septentione, eaque sine calce construi, quoniam sit frumento inimicissima. Alibi contra suspendunt granaria lignea columnis, & persilari vadique malunt, atque etiam à fundo. Alii omnino pendente tabulato extenuari granum arbitrantur: & si tegulis subiaceat conferuere. Multi ventilari quoque vetant. Carculionem enim non descendere infra quatuor digitos, nec amplius periclitari. Columella & Fauonium ventum confecte fumento præcipit: quod miror e quidem, sicissimum alicui [sicissimum Vet. sicissimum locum quatenus Dal.] Sunt qui rubeta rana in limine horrei pede è longioribus suspensa, inuehere inbeant. Nabis referre pluriatim compesuitas condendi videbitur. Nam si parum tostum atque robustum collectum sit, aut calidum conditum: inimica ignasci necesse est. Diurcitatis causæ plures. Aut in ipsius grani corio, cum est numerosus, aut luçi pinguedine, qui pro humore sufficit tantùm, aut a matitudine. In tuitico maximè crescunt animalia, quoniam spissitate sua conalescit, & fursure crassè velitur. Quidam ipsùm Triticum diurcitatis gratia aspergant amara, mille modios quadrantati. Alii Chalcidica, aut Carica Creta, aut etiam Absinthio. Est & Olynthi, ac Cerinthi Euboræ terra, que corrumpi non sinat. Nec serè condita in spica læduntur. Viliissimi ad nobis seruaturan ferobibus, quos sirus vocant, ut in Cappadocia, & in Thracia. In Hispania & Astica, ante omnia ut sicco solo fiant curant: mox ut palea substernatur. Præterea cum spica sua conduntur [condantur Dal.] ita frumenta, si nullus spiritus penetret, certum est nihil maleficum nasci. Vatro auctor est, sic conditum Triticum durare annis quinquaginta.

Horreum loci sive Triticò destinatus, aqua salsa ante omnia conspergitur, scopisque optimè exterius siccatur, sic enim Tuitici conseruatiõni magis erit idoneus, Orobri tepositu in Ianuario agitetur nouilunio. Ideam fiat mense Martio tertibus postmens septimanis. April quoque, sed semel tantùm in nouilunio. Toto Maio intactum relinquatur. Sequentibus verò mensibus reliquis singulis semel tantùm, idque sicut antea in Nouilunio & Sole feruente ventiletur. Quod si fortè vermiculi & gurguliones generantur, asperso sale, betuleque scoparum furculis siccis impositus arcebis: sic frumentum ab horreorum spatoribus atque æconomis celebris Monasterii Massouienis in Sunchouia frumenti feracissima in plureis annos conseruari solet. Cum vescaremur in Ducatu VVirtemburgi in pago Wolffenbürgen Nürtingensis præfectura hoc literis mandatum inuenimus. Anno 1590. Maii mensis 25. die, tam seua, violentaque tempestas coorta est cum horribili procella ventorumque turbine, & tremenda nubis secundissimæ ruptura, nimborumque effusione, tantaque grandine, ut calmos frumentaceos in æquis ferè omnes grandine comminuerit humi que strauerit. Interea tamen clementissimus Deus sua illa paterna benedictione rursum de æter affluit, ut frumenta eei culmi ab ima vique radice, maiori quàm prius, cum arborum copia, nullaque interueniente fatone, de

Tom. II.

nouo progeminauerit, tantoque vberior successit frugum præuentus, quanto maior calamitas agros prius attegerat, agros enim nouales, requietos sive planè præ se ferre videbantur. Hanc igitur tempestatem tanta messis subsequuta fuit, ut post nouenas septimanas tam diræ grandini succedentes, optimas fruges in horrea coegerint, idque non illic solùm, sed aliis passim in locis pluribus illius tractus aruis contingisse certum est.

Optima porò è Triticici generibus ad secundæ valetudinis vsum habentur, inquit Dioscorides, quæ recentia & perfectè adalta colorem luteum referunt: hæc sequuntur trimestria, quæ nonnullis Sitania nominantur. Itaque cruda illa in cibo sumpta teretes lumbricos gignunt: commanucata verò & imposita commotus à rabioso cane auxiliantur. Confectus eorum similagine panis plenius alit, quàm cibatus: qui verò sit è trimestrium farina, leuius alimentum præstat, facileque in membra digeritur. Farina eorum cum Hypocryami succo cataplasmatis instat imponitur aduersus neruotum fluxiones & intestinotum inflaciones: lentigines autem ex aceto mulso tollit. Furfures in aceto decocti [vulg. exempl. emittunt è Indis] & calentes adhibiti lepras emoluant, suntque contra omnem incipientem inflammationem vtile & accommodatum cataplasmata. Cocti verò cum Rutæ decocto luxuriantes turgentis sive mammæ [*σπαργάνης* Vet. codex teste Lacuna habet *σπαργάνης*] compescunt, & morsus à vipera, torminosi que conueniunt. Farinaceum fermentum, calcificum extrahendique vi præditum, priuatim in plantis pedum extenuat, & tum alia tubercula, tum etiam fistunculos ex sale maturat atque aperit. Porò è Sitania Triticici farina, contra venenatosum ictus ex aceto aut vino commodè imponitur. In glutini verò modum decocta si delingatur sanguinem reicientibus [*αιμακτονωδης* Vet. *αιμακτονωδης*] opitulatur. Contra rufum & exasperatam arteriam cum Menthi & Butyro decocta efficax est. Ipsius autem Triticici pollen si ex aqua multa aut hydroleo decoquatur, omnem discutit inflammationem. Sed & panistum crudas, tum etiam coctus ex aqua multa impositus, in inflammationem omnem demulcet: quippe qui pluriatim emolliat & quadratenus resigeret, maximè verò si herbis, acerbis quibusdam ad id accommodatis admisceatur. Vetus autem panis & aridus tum per se, tum quibusdam admixtus, alui profusua sistit.

Recens verò muria maceratus & impositus, lichenas inueteratos sanat. At gluten [*κλεμα* H. &c.] Hæc verba ad capitis vique calcem non leguntur in alteto codice manuscripto. Goup.] quod è Similagine aut polline [*η ψηλας*, vulg. *η ψηλας*] conficitur ad glutinandos libros, sanguinem reicientibus prodest, si liquidus ac tepidum cochlearis mensura sorbendum exhibeatur. Ceterum, que in molendo crassior sit ex Zea & Triticici farina, ex qua puls fit, Crimnon [*κρυμνον*] appellatur. Abundè autem nutrit & facit conficitur. Quæ verò ex Zea maximè prius tosta fit, alium magis adstringit.

optimum quod è timelsti paratur Triticico, natione Creticum aut Aegyptiacum. Conficitur verò ex Tuitico eiusmodi puro quinquies die, ac si fieri potest, etiam nocte, aqua persuso: atque vbi emollitum fuerit, tenui aquam citra agitationem effundi oportet, ut ne simul vilior succus excludatur. At vbi molissimum euasille consistit, diffusà aqua pedibus calcari

optimum quod è timelsti paratur Triticico, natione Creticum aut Aegyptiacum. Conficitur verò ex Tuitico eiusmodi puro quinquies die, ac si fieri potest, etiam nocte, aqua persuso: atque vbi emollitum fuerit, tenui aquam citra agitationem effundi oportet, ut ne simul vilior succus excludatur. At vbi molissimum euasille consistit, diffusà aqua pedibus calcari

optimum quod è timelsti paratur Triticico, natione Creticum aut Aegyptiacum. Conficitur verò ex Tuitico eiusmodi puro quinquies die, ac si fieri potest, etiam nocte, aqua persuso: atque vbi emollitum fuerit, tenui aquam citra agitationem effundi oportet, ut ne simul vilior succus excludatur. At vbi molissimum euasille consistit, diffusà aqua pedibus calcari

optimum quod è timelsti paratur Triticico, natione Creticum aut Aegyptiacum. Conficitur verò ex Tuitico eiusmodi puro quinquies die, ac si fieri potest, etiam nocte, aqua persuso: atque vbi emollitum fuerit, tenui aquam citra agitationem effundi oportet, ut ne simul vilior succus excludatur. At vbi molissimum euasille consistit, diffusà aqua pedibus calcari

optimum quod è timelsti paratur Triticico, natione Creticum aut Aegyptiacum. Conficitur verò ex Tuitico eiusmodi puro quinquies die, ac si fieri potest, etiam nocte, aqua persuso: atque vbi emollitum fuerit, tenui aquam citra agitationem effundi oportet, ut ne simul vilior succus excludatur. At vbi molissimum euasille consistit, diffusà aqua pedibus calcari

optimum quod è timelsti paratur Triticico, natione Creticum aut Aegyptiacum. Conficitur verò ex Tuitico eiusmodi puro quinquies die, ac si fieri potest, etiam nocte, aqua persuso: atque vbi emollitum fuerit, tenui aquam citra agitationem effundi oportet, ut ne simul vilior succus excludatur. At vbi molissimum euasille consistit, diffusà aqua pedibus calcari

optimum quod è timelsti paratur Triticico, natione Creticum aut Aegyptiacum. Conficitur verò ex Tuitico eiusmodi puro quinquies die, ac si fieri potest, etiam nocte, aqua persuso: atque vbi emollitum fuerit, tenui aquam citra agitationem effundi oportet, ut ne simul vilior succus excludatur. At vbi molissimum euasille consistit, diffusà aqua pedibus calcari

optimum quod è timelsti paratur Triticico, natione Creticum aut Aegyptiacum. Conficitur verò ex Tuitico eiusmodi puro quinquies die, ac si fieri potest, etiam nocte, aqua persuso: atque vbi emollitum fuerit, tenui aquam citra agitationem effundi oportet, ut ne simul vilior succus excludatur. At vbi molissimum euasille consistit, diffusà aqua pedibus calcari

optimum quod è timelsti paratur Triticico, natione Creticum aut Aegyptiacum. Conficitur verò ex Tuitico eiusmodi puro quinquies die, ac si fieri potest, etiam nocte, aqua persuso: atque vbi emollitum fuerit, tenui aquam citra agitationem effundi oportet, ut ne simul vilior succus excludatur. At vbi molissimum euasille consistit, diffusà aqua pedibus calcari

optimum quod è timelsti paratur Triticico, natione Creticum aut Aegyptiacum. Conficitur verò ex Tuitico eiusmodi puro quinquies die, ac si fieri potest, etiam nocte, aqua persuso: atque vbi emollitum fuerit, tenui aquam citra agitationem effundi oportet, ut ne simul vilior succus excludatur. At vbi molissimum euasille consistit, diffusà aqua pedibus calcari

optimum quod è timelsti paratur Triticico, natione Creticum aut Aegyptiacum. Conficitur verò ex Tuitico eiusmodi puro quinquies die, ac si fieri potest, etiam nocte, aqua persuso: atque vbi emollitum fuerit, tenui aquam citra agitationem effundi oportet, ut ne simul vilior succus excludatur. At vbi molissimum euasille consistit, diffusà aqua pedibus calcari

Vies.

Nona.

Morsus canis rabidi. Panis.

Farina. Neruorum fluxiones. Lentigines.

Furfures. Lepra.

Mammæ turgentis.

Farinaculi.

Hamorrhoides. Tussis.

Pollen. Inflammationes.

Profusua alui. Lichenas.

Crimnon.

Amylum.

opprect. deindeque insusâ aliâ teri. Tandem in-
natantes in tures in cunctulo tollendi: reliquum
verd' colo tranuendum, ubi que vt excolatum
fuit. Super tegulis nouis ardentissimo sub Sole
ficcan densâsi que oportet. Namque si paul' per
ydum manserit, acefcit. Porro contra oculorum
fluxiones, cæca vlcera, & pustulas efficax est. San-
guinis etiamnum teiectiones potu colibet, & ex
asperitas fauces lenit: lacti quoque & obsonis
admiscetur. Paratur & Amylum ex Zeamacera-
ta clotaque ad vnam aut alterum diem, & massæ
tuticeæ in modum manibus sabacta, tandemque
seruentissimo in Sole, vt dictum est, exiccata. Sed
huifino li Amylum ad vnum medicum ineptum
est: ad reliqua verd' idoneum.

De Tritice, eiusque farina, idemque panis & pa-
leæ arque Amyli [iuxta veteris codicis quidem
lectionem] vsu passim hæc Plinius lib. 22. cap. 25.
Siliginis grana combusta & trita in vino ammi-
neo, oculis illita epiphoras sedant: tritici verd' fet-
ro [eâ industrâ conficitur oleum è Tritico à me-
dicamer tariis] combustis, quæ frigus viserit,
præstanteant sunt remed. o. Farina Tritici ex aceto
cocta neuotum contra ditionibus, cum tofaceo
verd' [rosâ verd' Dalechamp.] & fico sicca myxtil-
que decoctâ suffutes tôllis gugarizatione pro-
funt. Sextus Pomponius Pratorii viri patet, Hi-
spanæ citioris princeps, cum horreis suis venti-
landis præfideret, correptus dolore Podagræ,
merit in Triticam sese super genua: leuati que
siccatas pedibus mirabilem in modum, hoc pos-
sè remedio vsus est. Vistanta est, vrecados ple-
nos fecet, (Acetus Tritici defollos & sepultos:
quâ situâ rusticos Triticum furati solitos Gal-
senbit cap. 14. de Nat. fac.) Paleam quoque Tri-
tici calidam imponi tam cum in commodis expeti-
ti iubent, quæque decoctæ sunt aqua foueri. Zeæ,
ex qua alicum heri diximus, efficacior etiam hor-
deacea videtur, trimestris mollior. Ex vino tubro
ad Scorpionum igitur repida, & sanguinem ex-
creantibus: item arteriæ. Tussi cum caprino fe-
uo aut butyro. Amylon hel erat oculos, & gula
inulæ, contra quàm creditur. Item sistit ælium,
epiphoras oculorum ic h bet. & hulesra sarati ite
pustulas & fluxiones sanguinis. Genas duras e-
mollit. Datur cum Opio, his qui sanguinem re-
cieerint. In vesicæ verd' dolore femubeta Amyli
cu rono & passit ibet quis iuffernefacta, à bal-
reco. Panis [panis facultates attiga Dioscor. l. b.
2. cap. 10.] hiciple, quo viuatur, innumetas per-
è continet medicinas. Ex aqua & oleo aut tofa-
ceo melle collectiones: ex aqua mulla dentias
valde mirgat. Datur & ex vino ad discutiendâ
que pressu gi opus sit, & si magis curatium,
ex aceto, adu. rhus acutus pinnat si miones, quas
Græci rheumatismo vocant, stem ad percussâ lu-
xata. Ad omnia autem hæc fermentatus (non
quidem fumentatum [E. uerbu] autopyron dicit
vult Plinius sed ubi dicitur id esse neficium è si-
rina minimè castata, simul & fermentatum ad ea
remedia commendat) qui vocatur autopyros, vti-
lor. Illi iure & paronychia, & callo pedum in
aceto. Vetus aut bapcticus panis Amomius M. r.
etl. ad vsu diurnitateu excoctum vocat buc-
cellatum. Brod. cap. 11. 4. vau mudi 2770 Lucanus) in-
fus atque iterum coctæ, sistit ælium. Vocis siu
diolos [aut quidam vus, aut eos qui cleros vocem
cuntur], qui canoram, siuem, plenam, lepem
vorem suis modulationibus adhibere maxime nu-
runtur & student.] & contra distillationes, sicca
esse primo cibo, vtilissimum est. Sitianus

Siliginis grana.

Triticeæ farina vsus.

Tritici palea.

Amylon.

Genas duras.

Rheuma.

Paronychia Calli pedum.

(hoc est è trimeſtri) incussa in facie; au-
desquamata cum melle apuſſimè curat. Candi-
dus ægris, aqua calida frigidaue madefaetus, leuif-
ſimum ebam [intrinſum panis vocat Celfus lib. 1.]
præbet Oculorum tumon ex vino imponitur. Sic
& pustulas capitis aut adiecta atrida myrto. Tre-
mulus panem ex aqua esse ieiunis statim à balneis
demonſtrat. Quin & granitatem odoram in cu-
biculari vitus emendat, & vini, in saccos additus.
Pistura verò non omnibus facilis: quippe & Her-
turia spicam feris roſti piſente pilo præ-
ferrato, fistula serrata, & itellata intus denticulata,
vt niſi intenti piſoni, & concidantur grana, ferrò que
ſtrangantur. Maior pars Italix ruidò vitat pilo
ròtis erian qua aqua vesfer obitet, & inolat. De
ipſa ratione pilèdi [pinlendi] Magonis proponen-
tur ſententia. Triticum ante perfundi aqua multa
iubet, postea eualli [vt vti alu legunt euallati,
vallo suo eiici, ac excludi, deglubi, gluma corti-
cè que suo spoliari] deinde Sole ſiccatum pilo re-
peti.

Lib. 13. cap. 7. explicat ſententias Dioſcoridis de
Amyli, his verbis: Amylum fit ex omni Tritico
ac Siligine, ſed optimum è trimelſtri. Inuentio
eius Chio inſule debetur: hodie ludatiſſimum,
inde eſt appellatum ab eo quòd ſine mola fiat.
Proximum è trimelſtri quodam inuimè pondero-
ſo tritico. Mideſcit dulcia aquà ligneis vaſis, ita
vt integratur [intragatur CH.] quinquies in die
murat. Melius ſi & noctu, ita vt miſceatur pa-
titer emollitum, priùs quàm aceſcat. Lineo aut
ſportis ſiccatum tegule inſunditur illuz fermento,
atque ita in Sole denſatur. Poſt Chium maxi-
mè laudatur Creticum, mox Aegyptium. Probatur
autem leuitate ac laeuore, atque vt teceus ſit,
iam & Cato ni dictum.

Paleatum quibus plures Gentium pro ſæno v-
tantur eodem Plinio lib. 13. cap. 30. teſte, peſſima
ex Tritico præterquam iumentis opere laboran-
tibus, Culmum faxoſis locis, cum inaruit, baculo
ſtangunt ſubſtitu animalium. Si Palea deſecit, &
culmus tenetur. Ratio hæc, maturiùs deſecit, mu-
ra à diu reſperſus, dehinc ſiccatus in manipulos cõ-
uoluitur, atque ita pro ſæno hubus datur. Sur t
qui accendat in aruo & ſtipulas magno Virgiliu
præcorio:

[ſæpe etiam ſteriles incendere proſuſit agros
Acq; leuem ſtipulam crepitantibus vtre flammis.]
Summa autem eius ratio, vt herbarum ſemen
exurit.

Galenus auctor eſt Triticum vt medicamer-
tum foris impositum primi eſſe ordinis excalfa-
cietium, tamen nec teſſicare, (Plin. Sexti Pomp.
hiſtoru Triticum ſiccare oſter dicit) nec humeſta-
re manifeſto poſſe: habere verò etiam quiddam
legionis, obſtrentiſque nature. Porro, quod ex
eo conficitur Amylum, eo tunc ſigidius eſſe, tum
ſiccus. Quod verò ex pane fit cataplaſma, vim
habere magis digerentem, quàm quod ex Tri-
tico ninarum eſt. & Salem & fermentum panis
adur eſta habeat, quippe cum fermentum
vra habeat attrit: herdi digerendū ea qua
in alto eſtident. Glutino tandem, quod ex Simi-
legure & pollice Tritici fit, idem Galenus meatus
oblucendi ac cereo: quod vim attribuit, qui-
buſum que partibus impositum fuerit. Aſt con-
ſiderandum an Amylum ſiccitatis ſit Tritico, & an
ne in panis ſumadus: quòdoquidem cortex &
huſur ab eo ſeparatum, quod videtur ſiccus ſari-
na. Præterea perpendendum an Amylo ex ma-
ceratione in aqua roni primatur humiditas. Ve-
riū. Solis calore ea impreſſa & acquiſita humidi-
tas,

Di

10

A. 2. 7.

Cr. 11

Gal. Ti. mu.

Gal. ma. cin.

Gal.

tas,

tas, forteque etiam naturalis resoluitur, & ea ratione ficcus redditur. De quoque autem panis ex Tritico generibus, Galenus purissimum dicit esse Silignitena, id est, siliginum. Et hoc est quod etiam Plinius dicit, E Siligine lautissimus panis, pistinarumque opera laudatissima. Deinde semidaliten, id est, similagineum, ex Similagine Tritici farina. Et mox distinguit vocabula, semidalim quidem Græcam vocem esse asserens, Siliginem verò non item. Nimirum hanc Græcos à Latinis accepisse, sicut Semidalim à Græcis acceptam Latinis in Similagine conuerterunt. Maxime igitur, inquit, nutrit Siligneus. Deinde Similagineus. Tertius est medius, syncomistos & Autopyrus appellatus, cui nihil furfurum decessit, sed ex toto Tritico constat. Quartus est sordidus, magna ex parte è furture constans. Et postremus omnium furfuraceus totus.

Farina crassior ex Zea & Tritico Germanis nota est, inquit Cornarius, & ex ea pultem faciunt modò crassorem, modò tenuiorem, vt forberi possit. Vnde Galenus dixit *καλόν η τὸ ἐξ αὐτῶν ῥοσῆμα, πῶς τῶν*. Vocant autem nostri (Triticum) eò quòd arenæ speciem referat. Idem Galenus crassum Triticeæ, & ex Zea farina partem, Crim non esse dixit, & magis quàm polentam nutrit, sed ægrius concoquit. Vnde videri possit in Dioscoride legendum esse, non *ἐξ αὐτῶν*, quod facillè conficitur reddidit, sed *ἀναστρέφεται*, vt accipiatur quæ non concoquitur. Sed graue hoc malum esset, & priuatiua particula non respondet ei quæ difficultatem significat. Itaque recta est *ἀναστρέφεται* vocis lectio: & Galeno *ἀναστρέφεται* vox comparatione ad Polentam dicta est. Apud Hippocratem sapè habetur, *τὸ ἀπὸ τῶν κριθῶν ὀξύ πικρὸν*, & aliquando simpliciter *τὸ ἀπὸ τῶν κριθῶν πικρὸν*, vt cremor farinae crasse accipiendus videatur. A veteris codicis de Amylo lectione Pliniana, vulgata sic euariat, *Datur cum uerbis qui sanguinem retinerent*: Sed Opium, vt quod concoquat, & dolorem eximat, apertis videtur legendum. Deinde tribus ouis, mensura passis significatur, quod accipiendum est, quantum trium ouorum euacuat teste capiunt, vt hoc cum ouo & A nyl semuncia feruet factum, à balneo sumatur. Potest tamen fieri vt cyathis vox decurtatè scripta cypericis, & ita pro uera lectione, passis cy. tribus, falsa supposita sit, passis tribus. Amylum nostri partim corrupta Græca voce Amydum vocant: partim Brassica & Stereæ, quod in femininum vsu pleps inducendum, ea & inalbet, & firmet.

Cur Triticum homini in cibo facilius sit, quàm cæteris animalibus quauquam validioribus, quorum multa eo satiata intereunt, docet Theophrastus de caus. plant. cap. 10. lib. 4. quæ huc transcribere nimis longum est, & præter institutum. De Tritici præparatione ad consistendum vinum, sic inq; Aquam vitæ, consules alios. Nos in Allacia sepius bibimus vinum, quod solent cum Tritico parare, ac *περὶ τῶν κριθῶν* vocant: Mustum autem iniecto paulo critico decoquant aliquandiu, indurmanet vinum dulce & generosum ad maluiticum accedens, quod præstantius aiunt secundo anno.

lata ortos, foliis gramineis donatos: spicam verò in summo culmo palmarem circiter, muticam aut



brevibus admodum aristarum rudimentis donatam, ac etiam longis, in qua granâ flauescentiâ, turgidula, oblonga, sulcata, superiore parte hirsuta, triplici glumarum, quas tribulorum, verberere deponit, vallo clausa sita vt gibbus duabus, sulcus vnâ muniat.

Fuchsius.

Fuchsius dictum, à primo Robo sc. [ita vulgare vocat] non differat, nisi spicâ multis aristis vallata, & in duos versus dispositâ. Ego, vt antè monui, obseruaui Montbelgardi in agris vulgare Triticum spica mutica & aristis vallatum: si intelligit idem Triticum cum Amelhorn Hier. Tragi, plurimum fallitur. Hoc etiam est ex genere Zeæ vernæ.

Triticum Brunfels. in 4. Gesn. hort. & de coll. Cord. in hist. Dod. [qui Triticum dicit spicam vt plurimum muticam habere, interdum tamen aristis cinctam] & Tab. siue Robus, Colum. & Dod. Gall. Tritici primum genus Trago, Fuchsi & Lon. Triticum spicâ muticâ Hist. Lugd. & Ger. Triticum aristis carens Cæs. Triticum r. siue hybernum aristis carens C. Baub. pin. cui videtur Siligo Veterum; quam Plinius Tritici delicias vocauit. Siligo spicâ muticâ Lob. Obs. pag. 14. Icon. plant. p. 25.

Synonyma

Prouenit in omnibus ferè habitati ac culti Orbis regionibus, à quibus & complura eius notantur genera, cognomina ab ipsis natalibus sortita, quæ colore, magnitudine, specie & proprietate inter se differunt: testis Theophrastus. Latum autem pinguiusque solum Triticum postulat, idque magis apicum & siccum, quàm riguum. In siccò enim, vt Columella refert, melius coalescit: in humido vero ac viginoso degenerat, & post tertiam sationem in Siliginem, hoc est, lauius & candidius Triticum conuertitur: quæ tamen & rursus in Robum, id est, præstantius Triticum biennio transit, si in conueniens solum translata, grauissima eius grana serantur: author Plinius. Seritur frequentiùs Autumno: interdum Vere, Autumno satum per hyemem in herba est, & plunibus culmis attollitur, & frequentioribus radicibus firmatur. Æstius, mensibus vtrumque ad maturitatem peruenit, Dodonæo referente.

Locus

Degeneratio.

Fuchsius passim prouenit Triticum primi & secundi generis: floret Iunio mense: in Iulio autem metitur.

TRITICVM VVLGARE, GLVMAS TRIVRANDO DEPONENS.

TRITICVM CVM MVLTIPlici SPICâ GLVMAS FACILÈ DEPONENS.

Vulgare Triticum culmos habet proceros, trium cubitorum altiores, ex radice capil-

Radicem fibrosam, culmum geniculatum, foliaque eum vulgaris vsus Tritico habet com-

Descriptio



Blé qui truche.

rusticis *Blé qui truche* appellatum, ob spicâ sc. eius in alias fillam, plurêque minores adatas veluti ramos spargentem: *trucher* enim in ramos diuidi Lugdunenses Colon: dicunt: Triticum ramosum, Centigranum vocatum & Triticum fertillissimum Plinio.

Synonyma Casp. Bauhin. pin. Triticum 4. siue spicâ multiplici: Triticum ramosum Plinii, spica ramosa Cæsalp. Tritic 5. species, & *Grandel graspo*, i. e. frumentum racemosum Angullare: Triticum multiplici spica Lob. Ic. p. 26. & Germ. *Blé qui truche* H. Lugd. Triticum typhimum multiplici spicâ Tabern. Triticum racemosum Porta: spicis modò paucioribus modò pluribus, ita ut Mart. 24. spicas vident.

C. Bauh. Considerandum quantum differat ab hoc Triticum Casp. Bauhin. pin. tertium, siue rufum hexastychon, Tritic rufi genus aliud H. Lugd. An color facit differentiam à nostro coloris albisissimi.

Locus & Tempus Tritic pulchrum genus hoc, spicâ multiplici, quod primum Heidelbergæ vidi, mihi datum ab insigni Pharmacopœo Sprengero nomine Siliginis, satum feliciter prouenit Montbelgardi in Horto Ill. E. Cui valdè infesta sunt aues.

TRITICVM RVFVM, GRANO MAXIMO, Far siue Adoreum Veterum putatum.

Descriptio Tritic rufi præter Aristatum & Muticum H. Lugdunensi multa alia sunt genera, pro diuersa locorum natura, sitûque. Haud procul Lugduno in pagis monti alto, siue Aureo propinquis, Tritic genus colitur, quod incolæ vocant *Blé rûne*, & *gros blé*. Spicam fert muticam, granum maximum, sed ad conficiendum panem minus utilis. Ex eo decorticato puls fit cum lacte, in cibo rusticis gratissima: quamobrem illud ad eas delicias non segniter colunt. Sunt qui Far, siue Adoreum Veterum esse putant, ex cuius pulve Romanos du victitales Plinius hiers arte prodidit.

Casp. Bauhin. pin. Triticum 2. siue rufum grano maximo.

TRITICVM RVFVM HEXASTYCHON.

Descriptio Aliud Tritic rufi genus est *ἑξαστύχον*, Galli vocant, *Froment à six quarres*. Quidam, ut circa pagum Ericum in Allobrogibus, *Blé riguet*, qua-

munia ad spicæ facillimum discernimen, quo in hoc præter quatuor illos versus aristatos, qui in summa spica solitari, circa medium complures vndique sibi adiungunt, multiplicatione congectione in ventre crescunt: granum etiam multò candidius & delicatius. H. Lugd. p. 376. Tritic rufi genus, Lugdunensibus

si rigidum Triticum, quod rigidissima firmissimaque spica fit, sex ordinibus distincta, cilm in aliis quatuor tantum reperiantur.


Tritic rufi genus hoc aliud H. Lugdunensis sine icon. p. 376. vocat in pin. C. Bauh. Triticum 3. siue rufum hexastychon.

TRITICVM DICTVM FAR CLVSINVM Dalechampio.

Far Clusinum Dalechampio, aduectum ex Italia, & in agro pingui satum creuit ad hominis altitudinem, vel etiam procerius: caule sex gemculis distincto: foliis eodem: radice quinque vel sex, fibrosis: spicâ palmum longa, prælongis aristis horrida, folliculis amplis, densis, multiplicibus, granum ambientibus longum, exile, profundius lacunatum, arandum, quod vix exculpitur, ac euoluitur.

Sed & Far pro omni Frumenti genere à Veteribus usurpatum fuit. Hinc Far triticum pro Tritic, & Far hordeaceum pro Hordeo, & Far adorem, pro Farre apud Columellam lib. 8. cap. 5. dicitur. Videtur & Plinius lib. 18. cap. 7. Far pro Faris farina, siue pulve, siue grano decorticato, accepisse, vbi Populû Romanum farre tantum è Frumento trecentis annis vsum fuisse, è Verrio tradidit. Porro decorticati Faris gram crassior farina, ex qua pulvis fiunt, Græcis *ἑξαστύχον* dicitur. Lat. *Simila*, Gall. *Froumentée*, quibusdam Italico nomine usurpato *Semoule*, quasi Simila. Dioscorides tamen ex Zea quoque, sicuti ex Tatico crimon fieri testatur, atque etiam ex Olyra.

TRITICVM CINERICVM MAXIMIS arstis donatum, trititando glumas deponens.



Speciosum videntæque magnitudinis est calamus proceris, geniculatis, foliosis: aristâ maximâ, ferè se sequipalmari, duobus granorû ordinibus compactâ, glumis hirsutis, cinericis (vnde nomen) in longissimas asperissimâque aristas desinentibus, quibus tribuli verberare in area facild excutiantur semina.

Trago Triticum tertium siue aristas longiores & asperiores proferens: Triticum paniculatum: Germanis *Weizen folben*: aliis Triticum italicum, h. e. *Welscher weizen*: Tritic genus Typha fortè cognominandum: Triticum, quod apri syluestres raro degustant.

Fuchii Tritic tertium genus. Hoc in hist. non vndiqueque notum ait, geniculâque habere quaternâ, aliâs præcedenti s. i. e. secundo trimesin, siue Setanio, de quo sub Tritic vulgaris. J per omnia propemodum simile esse: in Affatia & agro Tubingenû gigni.

Dodon. Gall. inscribit Typham cerealem, Gall. *Meteil*, Belg. *Roouische terwe*. Figurat autem habet sortè ex Trago: an bonam iudicent alii. In Frugum Hist. & Lat. in fol. sub Tritici typhini titulo pingit, ac ait: Reperitur frumenti quoddam genus, grano & culmis Triticum referens, quod culmos quidem habet breuiores ac tenuiores, spicam verò aridis longis & duris Hordei similitudine munitam, granum autem durum, densum, colore fultum, Tritico minus, quòdque facildè de glutinis suis exterritur.

Nascitur in quibusdam Hispaniis, ac Insularum Fortunatarum agris: Phalaridis enim semini, quòd illinc aduehitur, permixtum reperitur: unde collectum atque in hortis satum, eà, quàm scriptum est, forma prodit. Suspiciari quis posset, semen hoc Typham esse, cuius Theophrastus & Galenus meminerunt. Sed cum Typha granum, multiplici folliculo inclusum, difficulter deglubatur, huius autem facildè, Typha propriè esse non potest: licet tamen ex Typha natum, & degeneratum esse possit, nam quòd ad reliquas notas attinet, ei simillimum est. Inter ea enim quæ Tritico ac Zeæ similia, leuissimum est, tenui ac simplici culmo assurgit, vt de Typha Theophrastus scribit. Semen eius paruum quoque est, & exile, densum item & coactum, atque colore quàm Triticum magis ruffo, vt Galenus de Typha scriptum prodidit. Iam & spica aristas habet longas ac duras, quas Typha esse ex Veterum plerisque locis manifestum est. Quæ omnia tam magnam huius frugis cum Typha similitudinem ostendunt, vt plinè non aliud, quàm ex Typha Triticum, ac Typhanum quoddam Triticum esse videatur. Nam & Typha, auctore Theophrasto in Triticum transiit, si pista ac purgata, feratur Radioni autem consentaneum videtur Triticum ex Typha natum similitudinis plurimum cum ea retinere, non secus ac Triticum ex Zeæ genitum, quòd culmo spicæque Zeam refert. Huic non admodum dissimile videtur, quòd Hieron. Tragus *Wälschweizen*, hoc est, Triticum Italicum aut Roma u. cognominat: nam & huius spica aristas habet longas & asperas, est tamen culmis, spicis, atque granis maius, spicas etenim habet pleniores, rotundiorèque quàm Triticum, semen verò pulcherrimum atque Tritico simile, vt Tragus refert. Seritur frequer tuis in Alfatia, rariùs in aliis Germaniæ regionibus, idque locis potissimum montosis, præsertim vbi a pri fruges depascuntur, nam ab hoc vno ferè abstinent, quòd durioribus eius aristis offendantur.

Quandoquidem autem Dodoneus, cuius verba hæcenus recitauimus suam priorem corrigit sententiam, nec authenticum tradit discrimen inter Typham cerealem, typhinumque Triticum, idèò vtriusque descriptionem hoc capite comprehendimus, sicuti & Lobelii Obs. p. 14. & Icon. pl. 26. Triticum aristas circumuallatum, quia tantum proponit figuram Dodonæi Latini: necdum separamus cum Casp. Bauhin Phyt. à Tritico tertio Tragi, donec demonstreret harum plantarum differentiam. Sed ipsemet in postremis [pin. scil.] vnam eandemque esse concludit. Triticum 9. siue Typhinum simplici folliculo, inquit, est Tritici tertium genus Trago, Fusch. & Lon. Triticum Matthiolo, Lac. Cast. & H. Lugd. p. 377. Typha cerealis Dodon. Gall. Typha Dodonæi, & Typha Fuschii, Hist. Lugd. p. 392. Triticum aristas circumuallatum Lobel. & Ger. Triticum aristas munitum Cæsalpino. Cæterum plura obseruè dixisse hoc in loco videtur nobis C. Bauhinus, Imprimis au-

tem Triticum Match. Lac. Cast. & Hist. Lugdunensis p. 377. exhibitum, ad vulgare referendum ducimus, idèòque ab hoc separandum. Deia cum mirari sinit, quòd Triticum aristas circumuallatum Lobelii, [quòd hic Triticum typhinum Dodonæi esse perhibet] ad Triticum suum 9. iam memotatum refert, itèmq; rursus ad decimum, quòd typhinum simplici folliculo Hispanici cognominat, & Triticum typhinum Dod. & Hist. Lugdunensis, quæ Dodonæi figuram cum historia habet, nostro iudicio ad hoc caput pertinentem. In eo præterea hallucinari videtur, quòd Tragum frumenti genus, spicà cærulea H. Lugd. p. 377. à Tritico suo nono diuersum dicat, & Triticum 4. faciat, siue Triticum aristas longioribus spicà cærulea. Triticum *Loca* vocatum alterum Lob. Icon. Triticum nigrum peregrinum Tabern. Triticum laudum Gerardi. Cæterum, Tragus frumenti genus spicà cærulea H. Lugdunensis, in Sebastianis, vulgò *Bugey* (Allobrogum Sabaudianorum gens est, nunc Oeno ac Rhodano fluminibus clausa, olim longius patens) Tragus gas frequentissimus est: incolæ scrutatis præcis nominis veltigibus *blé Turquet* vocant. In montosis aridis, & ventosis locis nascitur, & absque noxa nebulas, pruinas, gelicidia, aliaque cæli iniurias in montosis locis frequentes tolerat, ventisque agitata firmissime granum retinet. Spica cum maturat, aristas densas horret, & cæruleo colore nitet, contra quàm in aliis frugum generibus, quarum spicæ fluescunt. Haud nullum alimenti præbet. Est apud varias Gentes multiplex varietas frugum, quarum numerum, nominumque ancipitem significationem persequi difficillimum foret. Et hæc H. Lugdunensis, de Trago Frumento, cuius figura pro Tritico cineritio melius placeat quàm vel icon Typhæ Dodonæi, vel effigies Typhæ Fuschii, p. 392. frustra repetita. Reprehendit autem Hist. Lugd. cap. de Typha Dodonæum his verbis: *Téps* Lat. etiam Typhæ & Typha dicitur, à Ruelio, Typha cæleas cognominatur: quoniam planta aia inter arundines locis humidis prouenit, quæ Typha nominatur. Theophrastus inter ea quæ Tritico & Hordeo similia sunt numerat Typham, subiungitque esse omnium leuissimam, simplici culmo assurgere, solo tenui contentam. Mnesitheus Typhas tertio loco post Triticum & Hordeum numerat, item & Diocles. Sed Mnesitheus Olyram & Typham eandem rem esse putat, quem ob id reprehendit Galenus lib. 1. Alim. vbi eius de Typhis panibus & Typha, oratio scripta habetur. Typha autem Galeni quamnam nostrarum frugum speciem referat, ignorant plerique docti Herbarii. Dodoneus Typham appellat eam frugem quam Gallis *Meteil* vocari putat, Germanis *welsche weizen* & *Koos sçhererwe*, id est, Triticum Italicum, aut Romanum. Fuschius eam pro tertio Tritici genere depinxit. Sed fallitur Dodon. Neque enim Galorum *Meteil*, non vbiq; noti, seu peregrini Tritici species est, sed partim ex Tritico, partim ex Secali miscellanea seges, quam Lugdunenses vocant *de la Mesle*. Calamo, geniculis, spicà aristas vallatâ Olyram Typha refert, nisi quòd spicas habet longiores & asperiores, rotundiorèque & in vnum magis coactas. Semen folliculo vnicò includitur, grano Tritici simile. Fruges hæc cortice & aceribus purgata Zeæ modo in Triticum dedit, quòd & de Typha Plinius scripsit. Hæcenus Hist. Lugd. quæ Tritici cineritii quatuor imagines proponit.

Quid tandem C. Bauh. per Triticum 8. siue Ty- *Trig.*

TRAGUS
FRUMENTI:

H. LUGD.
ICONES 4.

Dod. lat. p. 392.

plurimū mul-
tiplex folli-
culis.

phnum multiplici folliculo, Typham inter frumentacea Theoprafti, Thypham Galeni, Typhen Plinii intelligat, & an huc referri possit, aliis de iudicandum relinquimus.

TRITICVM SPECIOSVM GRANO longo.

Descriptio Speciosissimum Tritici hoc genus, haecenus nobis nondum obseruatum ex hortu Stuchardino accepimus, quod satum in hortu Montbelgardensi in spicam exiit spica Tritici vulgati longè maiorem, sex aut septem vnciarum altibus dorantibus, pedibus plūs minūs. Glumae vnciales ferè, granum oblongum & vnciae oriente & quàm vulgati duplo ferè longius continet, è glumis faciliè separabiles, in quo cum vulgato & cinereo conuenit.

Triticum
grano lon-
go, Hist.
Lugd.

De hoc, nisi fallat inscriptionis vicinitas, apud H. Lugdunensem hæc scribuntur. Circa Matiscodem in humidissimis Sebustiarum tractibus deterrimum & frigidissimū Tritici genus prouenit, grano longo, exili, subato, multis glumis vestito. Rustici vocant *Long gran*, id est, longum granum, famèque vel egestate compulsi panem ex eo conficiunt. Alii subus & gallinis edendum obiciunt. Ad Buzam Thraciam fruges hæc videtur accedere.

Casp. Bauh. in pin. Triticum 5, siue femine oblongo, cui congener dicit Frumentum *Sourgeon* Ruedii.

TRITICVM SYLVESTRE, AGRIO- stari Cretensibus.

Locus

Descriptio

Agriostari quod Triticum sylvestre significat, auctore Hen. Bello. frequentissimè in Creta inuenitur, negligiturque. Herba est Tritico similis, folia & caules tritici ferens, spicasque aliquantulum alperas, nigriores, & aristas breuiiores, eius grana minora sunt Tritico satiuo, & altera parte obtusa, ita vt scalis grana potius quàm Tritici emulentur. Hæc semina nulla alia causa tibi mitto, nisi vt tibi competere sit, non in sola Sicilia Triticum orti sylvestre, quemadmodum Poëta tradiderunt: & quod non absque ratione Cretenses Triticum primò à Cerere in Creta inuentum fuisse sibi persuaserint, quemadmodum Dioscorus Siculus in sua Bibliotheca l. 6. scriptum reliquit.

Clusio na-
ta.

Felicissimè & abundanter Clusio nata erat hæc planta, sed antè quàm caules proferre inciperet, ab eo cui repurgandi horu curam dederat, pro inutili herba euulsa & abiecta fuit, licet serie quadam & ad notam, quemadmodum fata erat, nata.

ZEA IN GENERE, EX VETERIBVS & Neotericis.

C A P. II.

Zea duplex
Diosc.

Diosc. de his
Scriba.

Zeam Dioscori, duplicem facit. Alteram enim simplicem: *ζέα* alteram Dicocon [*δίκων*] appellat: quòd in duobus putaminibus siue folliculis grana bina coniuncta [coniunctum semen, Cotn.] ferat. Hordeo autem potentiùs nutrit, ut idem tradit, & ori grata [*ὄρι*], Cotn. tamen [*κότων*], h. e. stomacho commodam, ex Galeno legendum asserit] est: sed panificia ea cò-

secta, minùs quàm ex Tritico nutriunt.

Est verò Spelta Dioscoridis quidem dicocco, si Dodonæo non refragandum, quæ Theoprafto & Galeno Zea. Hic autem Zeam vniuersa sua facultate, in medio quodammodo Tritici & Hordei esse, in lib. simpl. med. scribit. Quare ex illis cognosci posse iudicauit Cotnarius magis alere panes ex Zea factos, quàm hordeaceos: & minùs quàm triticeos, & insuper stomacho commodam esse. Nam in Græcis non vocem [*ζέα*], h. e. ori gratam, legendum esse præcipit, sed [*σπelta*], i. e. stomacho commodam: Et hæc esse Galeni l. 1. de aliment. lectionem ait.

Porrò, antiquissimæ præsi Latinorum, teste Dodonæo, Zeam siue Speltam, Far nuncupauerunt, vt locupletissimus testis est Dionysius Halicarnassus. Nominabant [inquit] præsi Romani sacras nuptias, vocabulo suo *σπelta*, quia coniuges vescerentur eodem Farte, quod nos Græci [*ζέα*] dicimus: idem asseruit Aclepiades apud Galenum, xij. titulus lib. 9. ita scribens: [*σπelta*] [*ζέα*], id est Fatris, quod [*ζέα*] appellant. Appellatur verò Far istud Latinis quoque *Ador*, *Adorei* & *Semen Adoreum*, ac à Posterioribus propter sturgis præstantiam, peculiari nomine *Semen*. Hoc è populum Romanum tantillum, è frumento 300. annis vsus, Verrius tradit. Genera huius Columella quatuor scribit: *Far Clusinum* candidissimum: *Far* quod vocatur *Venniculum* tutilum, acque alterum candidum, sed vtrumque maioris pondens, quàm Clusinum: Semen trimestre, quod dicitur *Halicastro*, idque pondere & bonitate præcipuum. Ex his cum Halicastro conuenire Spelta posset, si trimestris esset, ac Vere legeretur, verùm cum Autumno feratur, Venniculo albo magis similis esse videtur. Nam veluti Venniculum, sic & spelta, pondere præstat accèdida est. Et hæc Dodonæus.

Ceterùm qui Zea vntur (Plinii verba sunt l. 18. cap. 8.) non habent far. Est autem hæc Italiæ, in Campania maximè, semènque appellatur. Hoc habet nomen res prædara, vt mox docebitur: propter quam Homerus [*ζέα*] dixit: non vt aliqui arbitrantur, quoniam vitam donaret. Amylum quoque ex ea fit, priore crassius. Itè cap. 10. apud Græcos esse Zeam scribit, ita dicit eam, cum sit degener, redire ad Frumentum, si pista feratur, nec potius, sed tertio anno. Cap. 11. Zeam in Africa degenerare refert. At & alibi Zea granum pulcherrimum esse, quàm Tritici. Lib. 22. cap. 25. Zea medicinas prosequitur, de quibus alibi dicimur.

Apud Galenum Mnesitheus panem ex Zea ne minem assatum comesse citra sanitatis dispendium posse tradit. Quod si quis, ait, si pani non assauerit, etiam si minimum sumpserit, ægrotabit. Est enim grauis, & concoctu difficilis. Qui verò regionem incolunt vehementer frigidam eo semine coguntur nutriti, ipsiūque ferere, quòd frigoribus perstrenuè resistat. Hæc Zea de qua ex Dioscoride & Plinio diximus, conuenire non possunt, neque Zea Theoprafti, qui eandem quam Dioscorides Zeam intellexisse videtur: sic enim scribit. Inter ea quæ Tritico hordeoque sunt similia, vt Zea, Olyra, Typha, Avena, & Aegylops, Zea est firmissima, copiosissimèque sturgificata, multiplicem altamque radicem effundit, calamo multiplici crassoque assurgens. Fructus autem est leuissimus, & cunctis animalibus admodum iucundus. Deinde subiungit. Sunt autem hæc duo, Zea scilicet, & Typha Tritico simillima. Herodorus verò, alius Zea meminisse videtur,

videtur, eum scribit: tritico hordeoque plerique videntur. Apud Aegyptios autem his in victu uti summum dedecus putatur. Vtuntur autem Olyris, quas alii Zeas cum z nominant.

Zeam Germanis notam esse, & quidem simplicem, *μοιδοκαρ*, tuncel appellari, *δίκανον* verò speltam vocari, testatur Cornarius. Zea igitur, & *ζεα* Græcorum, Latinorum Zea, quibusdam annotante C. Bauhino, idem cum Olyra est: sed horum sententiam haud dum probandam censemus: sicuti neque tragi qui Far Clusinum Columella credidit. Lobelo in Aduer. videtur typhà cerealis. Ast ab aliis melius Frumenti peculiaris species, quæ Latinorum semen est, statuitur. Semen autem Latini à substantia frugis appellantur. Eius hodie differentia plures habentur. Zeam, Speltam vulgò vocari scribit Dodonæus: Germanis Speltz, nonnullis verò Tincfel, & Tincfel-Forn, Belg. Spelte. Gall. *Espeautre*: Itolorum plerisque *Pirra furra*: Hetruscis *Bada*. Insubribus *Alga*, quasi Alica. Hebraeis, *Kuntha*.

DE CHONDRO ET HALICA SIVE ALICA.

CAP. III.

Chondrus & *άλικ* ex factitiarum rerum numero sunt, teste Cornario & Dodonæo. Fit autem utraque ex Zea, & Chondrus quidem ex Zea Dicocco, Dioscoride auctore. Theophrastus & ex Hordeo sylvestri bonum fieri Chondrum tradit.

Galenus Chondrum ex Tritici genere esse ait, quod nihil aliud sonat, quam ex Triticeo genere ipsum confici, non quod Tritici aut alterius frumenti aliquid genus sit, veluti nonnulli perperram sibi persuaserunt. Non enim frumenti aliquid genus, sed res planè, ut diximus, factitia.

Galenus & aliorum Græcorum Medicorum interpretes *χόνδρος*, Latine Halicam sive Alicam interpretantur, Chondrum omnino idem cum Halica esse putantes, qua in re, non parum à veritate recesserunt. Chondrus siquidem & Halica differunt, veluti aburde vnus pro multis, Paulus Aegineta non vno ostendit loco: aut videlicet de vtriusque scotism agents, & suas cuique vires ac facultates tribuens, ut lib. 1. cap. 7. & 62. lib. 3. Different autem hæc inter se, non quidem toto genere, sed quodammodo, veluti genus & species, aut potius ut vnus generis duæ species. Non Halica sive Alica, Latinis ac Plinio generalis est nomen, Græcorum cum *χόνδρος*, tum *άλικ*, ipsis peculiariter nominatam, sub se continens. Est enim vna Halica ex Zea, quæ semen appellatur, propria quidem ac genuina, quæ à Plinio lib. 22. res Romana esse fertur, Magni Pompeii tempore nondum in vsu. Hæc à Paulo Aegineta Græcè *άλικ* dicitur, & à *χόνδρος* ipso præparationis modo differt, non enim gypso & arena veluti hic repurgatur, sed creta candorem perfectionisque suam assequitur. Est verò & altera Halica, ex Zea in Africa degenerante, cognomento adulterina, Græcorum Chondro similima: gypso siquidem & arena, veluti Chondrus perficitur: licet tamen Halica quidem ex degenerante, Chondrus verò ex Dicocco Zea, fiat. Nam præparandi ratio apud vtriusque nationes consimilis, eandem esse rem prorsus ostendit, quemadmodum & ea dissimilis

Tom. II.

res diuersas. Non enim tam species frumenti, quam præparandi consciendique ritus ac modus considerandus. Frumenti enim aliqua diuersitas, speciem rei factitiæ non videtur mutare, modò in præparandi ratione nihil varietur. Siquidem ex Zea & Hordeo Far: ex Zea & Hordeo sylvestri Chondrus: ex Hordeo & Tritico pitifana confici possunt.

Qua autem ratione Chondrus conficiatur ac præparetur, in libris de Agricultura, siue *χόνδρος* *πρωτος*, Constantino Imp. dicatis à Cassio Dio: yfio Vicensi, docetur his verbis: Zea tunditur & in seruentem aquam iniicitur, ac premitur, deinde gypsum album tulum cribratum, & arenæ albissimæ ac subtilissimæ ad gypsum pars quarta paulatim admiscetur, donec Zea probè repurgetur. Præparetur autem in canicularibus diebus: na acescat. Postquam verò rursus rotus per purgatus fuerit, per cribrum densius excutiarur.

Optimus est Chondrus, qui primum excussus est: secundum locum habet, qui succedit: deterior autem tertius est.

Halicarum verò præparationem Plinius lib. 28. cap. 11. tradit. Halica fit, inquit, ex Zea, quam semen appellauimus: tunditur granam eius in pila lignea, nam lapidis duritiâ conteritur. Nobilius, ut notum est, pilo vinctorum pœnali opera, primori inest pyxis ferrea, excussis induruntis, iterum isdem armentis nudata conceditur medulla, ita sunt Halicæ tria genera, minimum, ac secundarium, grandissimum verò aph. *ρεμα* [*αφαιρνη*] appellant: nondum habent candorem suum, quo præcellunt, iam tamen Alexandrinæ præferuntur. Postea mirum dictu, admiscetur creta, quæ transit in corpus, colorèmq; & reneritarem adfert.

Deinde paulò infra: Halica adulterina fit maxime quidem ex Zea, quæ in Africa degenerat. Pinunt cum arena, & sic quoque difficulter conterunt vtriculos, sique dimidi modii mensura, posteaque gypsi quarta pars inspergitur, atque ut cohesit farinario cribro subcœnunt. Quæ in eo remansit, exceptitia appellatur, & grandissima est: rursus quæ transit, acetiore cernitur, & secundaria vocatur: item cribraria, quæ simili modo in tertio remansit, cribro angustissimo, & arenas tantum transmittente. Alia ratio vtriusque adulterandi. Ex Tritico candidissima atque grandissima eligunt grana, & semicocta in ollis, postea arefaciunt. Sole ad initium, rursusque leuiter aspersa molis frangunt. Ex Zea pulcherrimum quàm ex Tritico fit granum, quamuis id Alicæ vitium sit, candorem autem ei pro creta, lactis incocti mixtura confert. Cæterum de ipsius vtilitate lib. 22. cap. 25. ita ait. Alica res Romana est, & non pridem excogitata, alioqui non pitifanæ potius laudes scripsissent Græci. Nondum arbitror Pompei Magni ætate in vsu fuisse, & ideo vix quicquam de ea scriptum ab Asclepiadis schola. Esse quidem exitum vitium nemo dubitat, siue eluta denur ex aqua mulla, siue in sorbitiones decocta, siue in pultem. Et paulò post. Pitifanæ quæ ex hordeo fit, laudes vno volumine condidit Hippocrates, quæ nunc omnes in Alicam transeunt. Nec dissonant ab his quæ Galen. 1. de aliment. prodit. Ex genere Tritici inquit, est Alica, quæ multum alit, & viscosum succum habet, siue in aqua sola cocta, accipitur ex vino multo, aut vino dulci, aut etiam adstringente: proprium est enim vnumquodque vsus tempus: siue cum oleo & sale condita. Iniicitur etiam aliquando acetum ad ipsam, & dicunt Medici ita præparatam, chondropitifanæ factam esse conditu-

Mm

sam. Qujdam verò ex Alicæ Pusana [*χώρα ἐστὶν ἐν τῷ Ἰόνῳ*] agrum nutritum esse dicunt. Aliqui verò Venerum, velat Dioscles & Philotimus, prisanam triticam [*τῆσδε τῆσδε τῆσδε*] ita præparatam Alicam [*Chondrum hoc modo apparatusum*] appellant. Et vno quidem horum modorum, eo videlicet qui prior est, Halicam etiam coqui ac edi apud Roman. solum Martialis in xenis hoc dist. ostendit.

Nos Halicam, nullum poterit tibi intrere diues, si tibi voluerit intrere diues, eme.

Alimentum optimum. Temperamentum.

At idem Galen. sump. phar. Alicam, inquit, est etiam alimentum optimum, quemadmodum etiam Triticum, sed non est huius loci de alimento distinguere. Verum ut medicamentum meatu obducendi vim habet. In temperamento verò similis est Tritico, plus viscosi quàm illud habens, quo etiam magis quàm illud alit. Et est velut materia quedam idonea ad suscipiendum acetum, & aquam marinam, & muriam, & alia huiusmodi quæ vehementer siccant. Quapropter quidam ex his quæ multum siccant, ipsam esse putauerunt. Est autem ex his quæ magis concoquere possunt, quemadmodum & Triticum, quæ minimè siccant. Verum ob siccantium pharmacorum mixturam, id quod ex ipsis compositum est siccandi vi præditum, multos medicos fallit, vt ad ipsam Alicam referant siccandi causam, omnis his quæ sunt amixta. Et hætenus quidem Cassii, Plinii & Galeni verba, ex quibus manifestum est, Halicam à Chondro differre, & Chondrum cum secunda Plinii Halicæ conuenire, vtamque item rem facturam esse, & non peculiaria frumentorum genera, Dodonæo attestante. Sed ex iis quoque clarum fit, monente Cornario, etiam ex Tritico Alicam fieri: & tum res eiusmodi facturas, nomina inter se commutare, tum pro ipsis naturalibus nomina factitiorum vsurpari & vicissim.

Videtur porò Alica Latinis ab alendo appellata esse, sicut Græcis *χώρα* ob excellentiam, id est, *granum* dicitur. Vtuntur tamen etiam Græci medici iuniores Latina voce *ἀλική*, pro Alicæ. Et aliquando *χώρα ἐστὶν ἀλική* conueniunt dicunt.

Cæterum *χώρα* auctore Dioscoride, potentius quàm Oryza & alit & aluum cohibet, sed stomacho longè vtilior. Decoctus in aceto illitusque, leptas tollit, & vngues scabros pellit, ac incipientibus agilopiis medetur. Eius decoctum dysentericis dolore vexatis insusum idoneum est. Chondrus, uti Paulus lib. 1. tradit, egregiè nutrit, & glutinosos parit humores: verum puls ex eo confecta nocet, quoniam quamprimum crallescens incocta permanet. Probatum magis *χώρα* ipsius ex integro Chondro benè decocto, expressus Pusanae similis: *ἀλική* in cæteris Chondro quidem respondet, sed aluum magis adstringit.

DE ATHERA, ET ΚΟΨΑΛΑ SIVE GLVTINE.

CAP. IV.

Athera quædam

Athera sorbitio est, inquit Dioscorides, *ἀσπις* *ἀσπις* *ἀσπις*, i. e. veluti pulcicula liquida infatibus conueniens: comoda etiam ad cataplasmata. Fit autem ex Zea tenuissimè molita. Apud Belgas verò non ex Zea tantum, sed ex quavis etiam priorè farina coquitur: veluti, Secalis, Hordei, frequentissimè autem Tritici, cum tenui ceruiffa vel alio liquore permixta, Plinius etiam ex Olyra facit. Est autem edulium, quod citò concoquitur, facillèque nutrit, infantibus idcirco & senibus conueniens: interiora tamen viscera non-

nihil obstruens. Datur capite dolentibus, ex tenuissima Secalis, vel Hordei farina: dolorem enim sopit, & somnum clementer conciliat.

Athera crassius & solidius est gluten, & Græcis *ἀσπις*, ex Similagine & farina Tritici, quo charta glutinantur. Quod propter eam, quam habet obstruendi vim, sanguinis excretionibus prodest.

In vtriusque medio *ἀσπις*, siue puls, est solidior quidem ac spissior Athera: liquidior verò Glutine, & minùs Glutine, plus autem quàm Athera viscera obstruens. Athera, aut potius pulvis genus est, edulium, quod Galenus ex multa Tritici farina lacti permixta fieri scribit, quo hac ætate Belgium, ac vniuersa inferior Germania frequentissimè vitur. Cibis boni succi & multi alimenti, sed eos qui ipso assiduè vtuntur offendens. Nam in hepate obstructions parit, & calculos in renibus gignit autore Galeno.

ZEÆ SIVE SPELTA.



CVlmo foliisque Triticeæ respondet, spica palmaris aut sesquipalmaris, aliquando mutica, interdum aristis circumuallata, longioribus brevioribusve, gemino granorum versu, vel ita dispositis granis, vt alternatim vnus principio medium alterius respondeat, glumis pertinaciter hærentibus, nec tribuli ictu semen relinquens, quo nomine à Tritico vulgari distinguas licet, alioqui glumis & tunicis exuta grana vix internofcas.

Dodon. gall. Zeam hanc pingit sine aristis. H. s. Lugdunensis contra p. 385. Zeam duplicem exhibet, modò non. Casp. Bauhin. pin. Zea 2. siue dicoccos vel maior: *ζέα δίκοκκος* Dioscor. Zea Theophrast. & Galeno. Zea, Brunf. Cordo in Dioscor. Lon. Ger. Spelta prima Trago. descr. Secunda, Eidico. Zea dicoccos, Matth. Gesn. apud Cordum. Zea altera Matth. Lac. Cast. Zea primò genus Fuchf. Turn. Zea, Romanis veteribus semen, nunc Spelta Dod. gall. Zea vulgò Spelta, Far antiquiss. Ador posterioribus, & Semen Adoreum. Dod. Typha Ang. Far primum Cæf. Zea maior seu dicoccos Lugd. pag. 385. Zea ador, Tab.

An Lob. in Ic. plant. p. 27. Robus, siue Triticum Insulanis Gallo-Belgis Loca vocatum. Ibi liquidem nulla alia figura pro Zea. Scio fratrem Casp. Bauhinum à Zea diuersam statuerè, & in pin. Triticum 7. facere, cognominarèque Triticum aristis longioribus spica alba, Triticum typhinum Ger. quartum Tabern.

In multis Italiæ, Galliæ & Germaniæ locis prouenit. Nasctur quacunq; solo, etiam humidiore, quoniam folliculum, vt ait Columella, quo continetur, firmum ac durabilem, aduersus longioris

gioris temporis humorem, habet. Læto tamen pinguique solo melius proficit. Seritur vt Triticum, Septembri vel Octobri mense: Iunio floret, Iulio autem maturitatem consequitur, demetiturque.

ZEA VERNA, ZIMMER.

Triticum quod vulgus VVirtembergicum Zimmer vocat firmos habet calamos, tres cubitos altos, quatuor, quinque aut sex geniculis



donatos: folia plusquam semunciam lata: spica verò duorum est versuum, sibi mutuo æqualiter resp. ondentium, aristata, in singulis autem versibus ordines duo feminum maiusculorum, quæ glumæ inuoluunt valide, aliàs albicantes, aliàs quasi ferrugine infectæ vel rubentes, binæ quidem vniquæ, extrema

verò, externa tantum parte.

C. Bauh. phyt. Triticum 2. altissimum siue *Zeam* vocat Diofcorid. s. Tritici genus alterum Tragi. Triticum trimestre Cordi, Olyra Dodonæi gall. Item Triticum 3. siue amyllum, Spelta secunda Tragi. Et rursus Zea 2. siue dicoecos Diofcoridis, Spelta 1. quoad descriptionem: 2. quoad iconem Tragi. Ego Dodonæum se corrigentem sequor, nec Diofcoridis Triticum existimo: nec hoc Cordus trimestre vocare videtur. Iam nec Amyllum Triticum, à Tritico altero Tragi separandum: quin nec Spelta secunda Tragi eadem est eum Amyllo Tritico, quod eadem cum Zea altera. Eid. pin. Zea tertia, siue amylla, vel zeopyrum Amyllum: an Far halicastro trimestre cognominatum, Col. Triticum secundum Trag. Fuchl. Lon. Olyra, Dod. gall. Lugd. Triticum trimestre Cord. Amyllum frumentum & Far halicastro, Dodon. Frumentum vel Triticum Amyllum, Tab. Triticum amyllum, Ger.

St Fuchlus per Tritici secundum genus, Sitanium scil. de quo cap. de Tritico, hanc Vernam zeam intelligit, malè, meo iudicio, eam haud differre ait à Tritico, nisi quoddam spicam multis aristis vallatam, &c. obtineat.

Dodon. gall. Olyram Plinii esse statuit, negatque Siliginem. Latinus zeæ generibus accedere haud perperam dixit Amyllum Germanis dictum frumentum, *Zimelforn*, altissimum, siue trimestre genus. Addit Tragum & Fuchium trimestre Triticum esse existimasse: sed cum granum habeat glumis conditum, ex Tritici generibus esse non posse: inter Farra autem citius reponendum fore, inter quæ Halicastro fortè sit futurum, quoddam teste Columella, vere feratur.

Io. Mathardus Med. Halzæ Sueuerum vocabat

in Ind. suarum plant. mihi missarum, *Typham*, Frumenti genus, *Zimmer*.

An Lob. Ic. plant. p. 27. Triticum, *Loca* vocatum alterum, & Triticum lucidum Gallo-Belgarum: Non me latet quidem aliam esse opinionem Fratris, eumque separare à tritico altero Tragi, ac facere triticum 4. in pin. siue Tragum frumenti genus spica cærulea Hist. Lugdunensis, quod ad triticum cinericum retulimus.

Anno 1596. mense Augusto obseruati inter urbem Rotemburgum & Nideravv fontem acridum tritici genus hoc, quod mihi denominarunt *welsche Korn*, an bene, nondum mihi constat. Inueni eodem mense etiam inter *Birchen* urbem & *Bol*: ferunt verno tempore, circa festum Diui Georgii, tardè metunt, scilicet primum Septembri.

Locus & Tempus.

ZEA MONOCOCCOS, BRIZA QVIBVS DAM.



Culmis surgit gracilibus & sesquicubitalibus. læto solo maioribus, foliis angustis: spica summo culmo sedet frigosa, sed pulchra, triticum quatuorve unciarum longitudine, semunciam lata, compressa, duplici contexta versu granorū, quos glumæ simplices arctè circumgunt, in aristis asperas desinentes Ra-

Descriptio

dix fibrosa: Icon nostra planè displicet: iam scilicet emimus.

Dod. Gall. inscribit Brizam, vocans eam Germ. *Bryza* *Blicken* / *S. Peters Korn* / *Frumentum Sancti Petri*, & *Ein Korn*, Monococcon: suspicatur autem Gallicè, *Ble localar* ou *Frument localar*, id est, Frumentum locale Ruellio dici, Farrisque speciem esse, non verò zeæ, vt quidam putarint. Lat. de Frum. & in sol. subtili Frumenti monococci huius figuram exhibet [hanc & Lobel. habet in Obsl. pag. 10. Ic. plant. p. 31. Brizæ, Monococci recentiorum & Dodonæi inscriptione.] ac addit *Tunefel*, ac *Sinfelforn* à quibusdam etiam appellari. Suspiciaturque Frumentum rubrum siue locale Ruellii, *Frument rouge*, & *Frument localar* esse zeam monococcon. At hic apertissimè falli Dodonæum docet Dalechamps in hunc modum: *Ble localar* Gallis, triticum est, quasi Localare sic dictum, quoddam multis tunicis tanquam oculis inuoluatur. Id barbati Frumenti genus Farris speciem Ruellius esse vult In concauis, inquit, tractibus Galli ferunt: & qui facilè sentiunt rubiginem: nam, vt credunt, nec pruinas, nec æuginem extimescit. In perfatis & excelis quamuis bene conualecat, sationem tamen ibi damnat. Farris speciem esse negat Dodonæus in stirpium Historia, quoddam Farris spicas muticas esse putet. In frumenti Historia similitudinem quandam fortasse habere ait, cum Far-

Bryza
Dod. Gall.
Frum S.
Petri Mo-
nococo.
Frum. localar.
Far, non
Zea.

Dod. lappes

re venticulo rutilo. Idem Zeæ genus esse negat in Historia stirpium. At in Frumentorum Historia scribit non temerè Scriptores nostri temporis ad Zeam referre, neque perperâ *Ζαῖν*, id est, simplicem Zeam Dioscoridis existimare. Ruellius *Brizam* quoque non longè distinde credit ab ea fruge quæ Gallis *Secale* vocatur, ex quo panis fit ater quidem, sed tecens non insuavis, ab eaque *Bizi* panis in vulgus nostrum manasse putatur extritâ literâ: *Bizum* enim panem nigrum vocamus.

Synonyma Casp. Bauhin. phyt. & pin. Zea 1. Briza dicta, vel Monococcus germanica: *Ζαῖα ἁπλοῦς*, quod simplicis grani sit, Diosc. Spelta prima, Trag. ico. secunda Ed. descript. Zea Ang. Zea simplex, Mitth. Lac. Cotd. in Dioscor. Zea alterum genus, Fuchf. Frumentum locale, Ruell. Siligo, & Zea alterum genus, Tur. Briza. Dod. gal. Adu. Lugd. Monococcus Lob. Ger. Monocoon, frumentum barbarum, Far venticulum rubrum, Col. Zea Mnesitheis fortè, Dod. Spelta vulgò, Cæl. Zea species prima, Cast. Zea monococcus, Tab. minor & monococcus Lugd. Si, vt frater antè scripsit, Triticum amylen est spelta secunda Tragi, quomodo erit Zea simplex, siue *Ζαῖα* Dioscoridis: Trago enim Amyleum Triticum, est spelta secunda, duæ sunt plantæ diuersæ.

C. Bauhin. dor.

Locus & Tempus Nasctur asperis & montosis plerisq; Germaniæ locis. Autumno cum reliquis frugibus feritur, ferrius tamen ac subinde Septembri demum mense maturalescit. Ex Monococco panis confectus, ater est & hominibus ingratus.

OLYRA AC TYPHA.

C. A. P. V.

Olyra Diosc.

Arica Gallorum Plin.

Arica eadem cum Olyra Plin. Error quorundam.

Mnesitheis opinio reprobata.

Olyram Zeæ genus facit Dioscorides, sed aliquantò minus quàm illam nutrire, & ex ipsa panes, crassiorèmq; fatinam, eodem modo fieri refert. Plinius Atincam Galliarum propriam, & Italia copiosam esse dicit. Et rursus, Ex Arinca dulcissimus panis, ipsa spissior quàm Far, & maior spica, eadem & ponderosior. Rarè modius grani non is libras implet. Exterius in Græcia difficulter: oh id iumentis dari ab Homero dicta. Hæc enim est quam vocat Olyram, Atincam itaque eandem cum Olyra Plinius facit. Nec reperitur apud ipsum id quod quidam scribunt, Olyra Græcis, Latinis Plinio autore, Siligo. Quare isti Olyram cum Veterum Siligine confundunt. Quæ autem fuerit Siligo, & quòd ea hodie ignota sit, concludit Cornar. Hodie tamen Siliginem putari, & appellari eam quæ Olyra est fatetur, sed nullo Veterum autore. Olyram itaque esse affirmat eâ, quæ vulgò hodie Siligo appellatur, quam Germani *Rosten* vocant, & quibusdâ locis Fori per excellentiam, hoc quidem nexus argumento, quòd ex hac magna ex parte per omnem Germaniam vulgares panes fiant, vt & ex typha, quam deteriore alyquantò, Olyra speciem statuit. Sed quæ sit in his differentia, ex Galeni verbis, quæ inferius adscriberè da, cognoscendum.

De Olyra ac Typha ex Theophrasti & Galeni præcipuè sententia, hunc ferè in modum disseruit Dodonæus. Olyram ac Typham Mnesitheus idè frumentum, vtroque nomine appellatum existimauit, sed eius opinionem Galenus reprobat, Diocli ac Theophrasto accedens: qui Olyram ac Typha distinguunt. Theophrastus Olyram ac

Typham inter ea quæ maturè feruntur, ac Tritico similia sunt, enumetat: & Olyram quidem ait, Zea ac Bromo molliorem ac infirmiotem, Typham verò omnium leuissimam: nam simplici culmo asurgit, & solo tenui contenta est: nec, vt Zea, pingue lætümque desiderat. Vtramque præterea scribit multiplici folliculo includi ac Typham vt Zeam in Triticum mutari solere, si pista feratur, idque non protinus, sed tertio anno. Plinius Olyram Latinis Atincam dici asseruit. Recentiores Typham, cognominant cerealem, ad differentiam nempe alterius Typhæ, quæ in paludibus enascitur, de qua suo loco. Typha semen, Galenus ait, corticem extrinsecus veluti Olyra ac Hordeum habet. Quod verò ad colorem naturalem attinet, in Hordeis quidem ac Olyris est albus, in Triticis verò subflauus: Typhæ autem vel Triticis sunt flauiores. Quin & harum corpus coactum est, ac densum, quod fortassis ad seminis paruitatem non nihil adfert momenti. Est enim id Tritico longè exilius, quantum non desint, qui ipsum quoque in Tritico numero ponant: velintque id semen esse, cuius Homers meminit, cùm Hæctorem equos suos alloquentem facit his verbis:

Τὴν δὲ ἀετρίαια μάλιστ' ἐχέει τρυφήν.

Hoc est, Triticum enim vobis prædulce fetebam. Aiunt enim Typham paruum Triticum esse, eamque equos sine noxa mandete, verum autem Triticum non absque noxa. Nec absurdè certè Typham quis exile Triticum vocauerit, cùm ei, & colore, & densitate, & caliditate sit abimilis. Vtrumque autem semen (inquit Galenus, qui Mnesitheum miratur, quòd quomodo Olyra à Typhis differant, ignoret.) Olyra videlicet ac Typha in Asia est frequens, & potissimum in regione, quæ est supra Pergamum, adè vt rustici ipsi panibus ex iis factis semper vtantur, propterea quòd Triticum omne in oppida compottent. Olyrinis sanè, si modò ex bonâ Olyra fiant, post Triticis saltem sunt præstantissimi, secundi autè ab his sunt Typhin. Quod si Olyrini ex vitio lo semine sunt facti, Typhini non erunt eis inferiores. Calidi verò panes ex laudatissima Typha facti Olyrinis longè sunt præstantiores: asseruati verò deteriores se ipsos euadunt. Cùm enim mascula eorum sit terax ac ductilis, densatur maiorem in modum: & maxime cùm negligenter parati fuerint, adè vt qui panem huiusmodi, post vnum aut duos dies, ac multò magis frequentes aliquot, comederit, putaturus sit litum venticulo suo inesse. At calidus adhuc cùm est, ab ipsis etiâ vrbani expeitur, ipsùmque cum calido quodam mandunt, quem vernaculo nomine *Ζεφ' ἀλάττης* appellant. Porò hæc quoque tenerum esse oportet, & ipsum panem in calorem chibani adhuc retinere. Qui certè hunc in modum est paratus, non rusticis modò, sed vrbani quoque hominibus in deliciis habetur. Qui verò taurum, quatuorue dierum est vel ipsis rusticis manditur insuauis: præterea concoctum est difficilior, ac tardius per alium subducitur, quæ calido nimis accidunt: qui tamen ab Hordeaceo, quod ad deteriorè attinet, multum relinquitur: non tamen in eo adè, vt Miliaceus, est vituperandus. Quin etiam corpus admodum, dum calidus est, nutrit, vt penè Triticeo syncomisto par sit. Congeritur autem in panes Typhæ semen repurgatum, omnique vsui accommodatur: nam & ex aqua manditur, haud aliter ac vocatum à rusticis *ἀπὸ τρυφῆς*, hepemate, quod alii *ἀπὸ τρυφῆς* nominant, iniecto: non nunquam etiam cum sale estatur.

Cæterum

Ceterum Olyram mediam inter tritici & Hordei naturam possidere, & aethere habemus Galeni 8. simpl. med. tam vt nutrimentum, quam vt medicamentum.

Galeni porro differentiam inter Olyram & Typham etiam Germanos obseruasse, ideoque eos, optima ex Olyra panes Schoemocfen appellasse, prodidit Cornarius.

Et de Olyra, atque ei simili typha haftenus: nunc eius factitia sequuntur, quae apud Veteres in vtu esse solebant, & sunt inter alia, Far & Tragus.

DE FARRE FACTITIO EX VETERIBVS

CAP. VI.

DE Farre factitia disturi, Dodonzi historiam ad vnguem obseruabimus. Far, inquit, aliàs naturale frumentum, quod Graecis, vt ostendimus, *Zeia* & *Zeia* appellatur, aliàs res factitia, actisque & non natura opus: de illo superioribus capitibus, de factitio verò modo.

Fuisse autem istud apud Veteres illos Romanos, quos pulte Farracea, non pane, longo tempore vixisse Plinius scribit, ex Farre frumento factum, non enim ipsum & iugum & rei factitiae communi indat. Quod ind. translatum est, ad cuius frumenti granum, ab utriculis quibus conditur, eo modo, quo Archigenes Far conficit tradit, repurgatum, & aequè in partes confectum. Nam & Far Hordei, Palladius vino conspersum, Phasianorum pennis prunis diebus dati praecipit: & Plinius in Aegypto ex Olyra Far conficit scapum reliquit. Modum autem conficiendi Farris, Archigenes apud Aetium Sem. 19. ostendit: *Sitru*, id est, stramentum, aut in illico tempore aqua madefacto, indeque extractum ac in pilam contentum, veluti Pisanam à cortice repurgato: vbi verò corticem exuerit tollit, & in sicco sicato: deinde manibus tritam, donec penitus à cortice fuerit mandatum, crassissimè mola, ita vt granum vni nō quatuor aut quinque partes reddatur, & siccum assuaro. Purè factitum istud Far, praesertim ex zea siue Farre frumento, plerique nostrae aetatis idem cum Chondro aut Alica esse existimant, similitudine quadam eorum induci: Chondro etenim simile est, non tamen idem idem, veluti ipse Archigenes ostendit, quando Far Chondri modo coqui scribit. Differentiam horum preparationis modus efficit. Chondrus siquidem gypso arena adlita (vt paulò post dicetur) purgatur: Far absque his cum aqua sola. Differt verò etiam ab Halica, Far etenim antiquum, quo Romanorum vetustissimi vixerunt, Halica verò, vt Plinius ait, res noua aetate Magni Pompeii nondum cognita, cui non solum aqua, sed & creta candorem tenentis in eoque confert. Differentiam praeterea horum etiam ostendit Trallianus lib. & cap. 8. vtrisque, vt diuersis vtens, & eorum inter se comparationem faciens. Quod autem Germani ac Sibirici Frisii, Hollandi, Batauique ex Hordeo & Avena conficiunt, Farri simillimum est, ac eius quoddam genus: Germani *Grüpen*, Hollandi *Gort* appellant, & ex hordeo quidem *Grüpen* / *Grüpen* gort / ex Avena verò habere *Grüpen* / *Grüpen* gort.

Ceterum Farque de zea factum est, facultate Chondro aut Halica quodammodo simile est, nutrit ea de causa valenter, sed tardius descendit, &

gruisque concoquitur. Vtus tempore, vt Archigenes tradit, Chondri modo coquitur, & à sanis in cibo sumitur. Pro agris verò variè apparatus, & epithematis quoque admiscetur. Ex hordeo autem vel Avena Far leuius est, minusque alimenti adfert. Est & Far apud Aërium cognomento Clusinum, non naturale aliquod Far, verum pulque quaedam Farracea, de qua Martialis Epigrammaton lib. 13.

*Imbue plebeias Clusinis pultribus ollas,
Vt satur in vacuis, dulcia iuxta bibas.*

DE TRAGO.

CAP. VII.

TRagus, vt Dioscorides ait, Chondri similitudinem ac figuram gerit, res quoque factitia. Fieri eum, Galenus in lib. de aliment. facult. ex nobilissima Olyra ait, cum, vt docet, fuerit excorticata: in Comment. verò lib. primi, de ratione vinctus in morbis acuris *ex Zeia*, hoc est, ex zeis, quarum vtique Olyra species est. Cassius Dionysius Tragum ex frumento conficit Alexandrino. Plinius lib. 8. ex tritici semine Pisanam modo, in Campania duntaxat & Aegypto fieri tradit. In Aegypto autem, cuius ceteroctrina ciuitas Alexandria, Olyra facilis fertilitique: eiusdem lib. cap. 10.

Ex his igitur patet omnia frumentorum genera, ad Pisanam modum decorticari ac preparari solita, & illius, & tuam, & eius frumenti, ex quo parantur, appellationem habere: Alicam item & Chondrum, & Tragum similiter in se confundit: quum iuxta Galeni verba, Tragus etiam ex zea fiat, ex qua Dioscorides Chondrum & Alicam facit: & non solum res factitiae nomina inter se communia habent, sed etiam cum suis natiuis confunduntur, teste Cornario. Quod igitur Dioscorides dicit tragum figuram Alicae similem esse, sed multò minus quam zeam nutrire, Cornarius ita accipiendum statuit, vt tragus aequè vt Alica ex zea, eadem etiam figuram fiat, sed quia paleas non probè ab ea depurgentur, ideò minus aliat. Ceterum, videtur ipsi quod *Zeia* apud hippocratem lib. 2. de Diet. à Trago diuersa non sit. Proinde in sua translatione hunc locum sic reddidit. Trygis, id est, tragus siue Olyra, lenior est tritico, & quae ex ipsa sunt, similiter vt ea quae ex tritico parantur, & magis per aluum secedunt.

A Chondro autem, & Alica, & materia, sed potissimum ipsa preparatione differt: Chondrum siquidem, gypsum & arena perficiunt. Halicam creta emundat, Tragus solè aqua maceratus excorticatur.

Eius conficiendi modum Cassius tertio de aegreul. lib. sic docet. Frumentum Alexandrinum appellatum, maceratur decorticaturque, & in Sole calido siccatur, deinde idem rursus fit, donec ei pelliculae & quicquid fibrosum est in frumento delabatur. Appellatur autem tragus iste, subinde cognomento frumentaceus, ad discrimen eiusdem nominis, & animalis, & herbae: non quod naturale aliquod frumenti genus sit. Nam vt Veterum Aetiorum testimonis abundè constat, res factitia est.

Trago autem Galeno aethere, plerique vtuntur, primum eum in aqua decoquentes, deinde ea effusa, aut vinum dulce, aut mellis manumun-

Tragus quid.

Confassa inter Alicam, Chondrum, & Tragum.

Trygis, id est, apud Hippoc.

A Chondro & Alica differentia.


Conficiendi modus.

dentes, superiniiciunt & nuces pineas aqua pramaceratas, donec plurimum intumuerint: multò tamen minus quàm Zea, Dioscorides ait, nutrit, eò quòd multùm palearum habeat. Quare etiam agrè conficitur & aluum mollit.

SECALE

CAP. VIII.

Descriptio



Secale vulgarium frugum culmos tollit altissimos, eòsque rigidos, non sine foliis, quæ prima germinatione rubescunt, spicâ ferè quadrata, fuscâ, aristis concoloribus horridâ, grana Triticeis longiora, strigosiora, & intentius flavescentia aut fusca, gluma exterior ex qua arista producit, altera par-

te denticellis rigidiusculis armata est, interior tenuior, caridior, leuis. Vtilagini obnoxium est, rarè formæ, sefunicia aut vncias duas longæ, triquetra, colore foris ex spadiceo nigricante, intus cinericeo, modò incuruæ, duritie ferè cornea, sapore subdulci insuaui.

Olyra Veterum. Cordus in Diosc. ait quod si frumentum hoc, non fuerit Olyra apud Veteres, se ignorare quid sit.

Farrago. Dodon. gall. refert quibusdam Farraginem dici, non tamen veram esse, ut quæ nil aliud quàm Hordeum sit, concludit. Duplicem autem statuit, maiorem & minorem. In Hist. Frum. & Lat. in fol.

Maior minor. meminit Autumnalis & Aestiuæ, ac inter alia Brizam esse putat, cum tamen pro Briza olim longè aliam habuerit plantam. Verba eius hæc sunt: Plinio Secale est, de quo lib. 18. cap. 16. sic scribit

Briza. Rarum dictu, esse aliquid cui profit negligentia, id autem quod Secale & Farrago dicitur, occurrant tantùm desiderat. Secale Taurini sub Alpibus Asiæ vocant, deterrimum (sed veriùs aterrimum) & tantùm ad arcendam famem vile, secunda, sed gracili stipula, nigriti i triste, sed pondere præcipuum, & ramen sic quoque ingratißimum ventri est: nascitur qualicumque solo cum centesimo grano, ipsamque pro latamine est.

Secale. Quæ Plinij verba frumentum Noë ac rogge dictum, cum Secali conuenire satis communstrant. Dicitur autem id, ut Plinius tradit, etiam Farrago, verùm non secus, quàm Far, Hordeum, Arena, Triticumve, subinde Farragines nominantur, quando videlicet iumentorum, pecudumque pabulo cedunt.

Farrago siquidem, quam Græci *ῥαῖον* appellant, generale nomen est, ad omnem viridem segetum herbam, quæ pabuli causa seratur. Seritur ea, excrementis Farris prædensa, admixtâ aliquando & vicia: eadem in Africa fit, ex Hordeo: Plinius. Atque inde Farrago quòd *ῥαῖον* sit ferro

cælum, aut quòd primùm in farracea segete seti cæptum, Varrone auctore dicitur.

Ex Hordeo Farraginem facere docet Columella: Farraginem ait, in restibili stercoatissimo loco, & altero sulco serere conuenit. Ea sit optima cum Chanterini Hordei decem modis iugerum obferitur, circa æquinoctium Autumnale, sed independentibus pluuiis, vt constata rigatâque imbribus, celeriter prodeat, & confirmetur ante hyemis violentiam. Nam frigidibus cum alta pabula defecerint, ea bubus cæterisque pecudibus, optimè defecata præbetur: & si depalcere serpius volens, vique in mensem Majum sufficit. Quod si etiam semen ex ea volens percipere, à Calendis Martiis pecora depellenda, & ab omni noxa defendenda est, ut sit idonea frugibus. Similis satio Alienæ, quæ Autumnofata, partim cæditur in fœnum, vel pabulum, dum adhuc viret: partim semini custoditur, iam & ex Tritico Farraginem fieri Plinius quoque testatur. Et in Tritici, inquit, genere, pars aliqua pabuli est, quadrupedum causa sat: vt Farrago. Absyrtus etiam *ῥαῖον* id est, Triticeam Farraginem, equalis maximè probat: ea si non adfit, *ῥαῖον*, quam Eumelus iis refert, post trimatum dari solitam. Hoc modo & Secale Farraginis genus est, quando videlicet pecudum iumentorumque per byemem pabulum efficitur. Recentiores Roggam Siliginem ferè interpretantur: quæ in re quantum hallucinantur satis apertum est. Nam Siligo candidius ac leuius Triticum est, ac tritici, vt inquit Plinius, delicta, ex qua lautissimus panis & pistrinarum opera lautissima fiunt, at Secale nigrum est, & ex eo panis ater, pauperum non lautiorum, mensis ac cibis dicitur.

In non dissimilem errorem lapsi videntur, qui Noë cum Olyra conuenire autumant. Olyra siquidem candida est, ac vtriusque multis continetur: Secale verò præter quod nigrum est, glumis nullis implicatur. Ruellij conjectura plus verisimilitudinis habet, qui Secale à Briza non longè distidere credi scribit, atque inde putari nomen *Brizæ panis* in Gallia vulgus manasse. Panis siquidem ex Secali fit grauis, firmus, concoctu non facilis, qualem ex Briza fieri Galenus tradit, & hunc migrum ex Secali panem, extrita litera *ῥαῖον* Gylli nuncupant, sic vt ab inuicem non distidere existimari possint, nisi Secalis granum nudum foret, Brizæ verò glumis implicatum, quod hæc inter se distere manifestè ostendit.

Quod verò Brizæ semen glumis implicetur, ex his videtur colligendum: tum videlicet, quòd eam Typhæ perisimilem Galenus scribat, quæ multiplici folliculo conditur: tum etiam quòd membranofam substantiam panis ex ea factus habeat, ex ipsorum nempe folliculorum admixtione, contra planè quàm Secalinus, qui Triticeo syncomisto membranas ac furtiuas vel pauciores vel non plures habere comperitur.

Secale autem vt medicamentum, Tritico in calefaciendo ac digerendo potentius est. Panis ex hoc aut fermentum, promptius ac citius abscessus maturant & rumpunt, quàm ex Tritico facta. Farina consufana, diuturniores capitis dolores lenit, in lenteo capiti circumligata.

Porrò Secale proximum inter frumenta à Tritico Triticeisque seminibus locum habet. Panis ex eo factus, lentoris atque obstructis naturæ non nihil obtinet, diffculter concoquitur, ac ventriculo grauis est, præsertim si furturum expers fuerit. Nam consufaneus, qui simul omnia recipit ac ex tota farina concinnatus est, si probè coctus bene-

benèq; fermentatus fuerit, minùs lentus est, non admodum agrè conficitur, citòque descendit: nondum tamen Tritico syncomisto par, quo gratior & concoctu difficilior etiamnum est. Alimentum autem corpori solidum, ac firmum præstat, nec mali succi, si ex bono frumento coctus fuerit, ex malo autem frumento & corrupto paratus, prauos & corruptos succos ingenerat, & diuturniores morbos procreat, veluti morbum, Germanis Scorbutic aut Scorbutic, dictum. Admifectur huic non rarò Triticum, vt leuiorem gratiorèmq; panem efficiat, qui Secalino puro minùs grauis ac lentus est, & teneritudinem suam Triticeo diutius retinet.

ma Lobelus in Adu. Secale distinguit in vernum, & autumnale. Tragus in hybernum & æstiuum: asserit autem esse Olyram Theophrasti & Dioscoridis, Siliginem Veterum ac Secalem, nec non Triticum secundum Columellam. Fuchsius contra, eos magno in errore versari scribit, qui hoc Frumenti genus Siliginem esse existimant.

Secale C. Bauhinus, duplex ait, stationis tempore & magnitudine destinatum. Secale quidem Hybernum vel maius [quod primum in phyt. secundam autem in pin. est:] dicitur Siligo, Brunf. Lon. Veterum & Secale Trag. Secale Matth. Dod. Gall. [quibusdam Farrago, non tamen est vera Farrago, quæ nihil aliud est quàm Hordeum] Fuchf. Lob. Tab. Ger. Secale & Farrago Plinii, Dod. Tiphæ cerealis & Tiphæ Theophrasti, Portæ. Vernum vel minus [quod 2. phyt. in pin.] est Siligo æstiuæ, Trag. Secale alterum, Lugd. Rogga siue secale æstiuum, Dod.

Germani *Rocken*, & *Roskenforn*: Belgæ *Rogge* vocant: Galli *Seigle* & *Segle*: Itali *Segala*: Hispani *Centeno* & *Sentena*.

Nascitur cum in Germania ac apud alias Nationes plurimas, præsertim Septentrioni subiectas, tum in Belgio omnibus ferè agris tam sterilibus quàm latis, veluti in Brabantia campania, quæ hoc frumentum, licet arida ac sterilis, feliciter proignit. Qualicumque enim solo provenit, quantumvis rigenti, gracili, aut arido, fecundior tamen ac leniore melius præstantiùsque. Scriitur Autumnò, quod & latus, item & Vere: Aestiuum, altero gracilius, paucioribus culmis, spica breuiore ac tenuiore, granòque leuiore. In Pæsautani Principis & Abb. Murbae ditionib. obseruati spicam Secalis inusitatae magnitudinis, verum multorum granorùmq; supra formem vulgarem copiosiorum, è glumis spontè dehiscentibus, vel citra trituram, excidentium.

mine. An Plin. lib. 18. cap. 17. de hoc intelligendus, dum scribit: Inter vitia segetum & luxuria est, cum onerata fertilitate procumbunt: alii volunt Plinium intelligere id, quod Theophr. 8. hist. quædam uariarum, insanam foliorum luxuriam, vocauit.

Cæterum de Secalis matre hæc dixisse videtur Thal. Reperitur in Hircania Festuca tertiarum seu gramina nemoralis species media, radicibus genicularis, minoribus, densa capillaceorum cirrorum congerie præinctis, foliis pluribus, angustis, palmo longioribus, parum pilosis, culmis cubitalibus & longioribus, interdum bicubitalibus, crassioribus, minoribus verò iam memoratae speciei, paulò tamen tenuioribus quàm festucæ nemoralis maioris, propè radicem bina ternæve genicula habentibus, reliqua autem serie [qua vique, in summum fastigium prorsus destituitur geniculis] iubatam spicam continentibus, oblongam, sed primæ speciei tenuiorem, rariorem, vtriusculis tamen eiusdem paulò maioribus constantem, necita splendens, vt in illa. Spica vbi defloruerit, frumenti alicuius genus imitatur, vt potest Secalem, vel aliud simile. Frequens est in montibus aridioribus passim, ac secus vias. Videtur verò hoc genus vitium esse Secalis. Ac, sicuti fississimè in Secale nostra accidit, vt arista quædam, postquam flores deciderunt, ac semina iam augmenta suscipere incipiunt, vitium aliquod in granis contrahant: fortè maior succi copia, quàm ad graniustum alimentum opus est, attrahitur, vt ita necesse sit, corticem adhuc tenerum rumpi, & ita internam substantiam in maiorem molem augeri, ac à feruore Solis & ambiente in circumferentia sua affici. Tunc enim videmus quædam semina longius ex suis vtriusculis seu glumis protendi, ac in inediocrem etiam crassitatem exoroscere, nigriùsque colorem foris contrahere, intus candida farina densioris matris constantia. In Thuringia vulgò vocatur vitium hoc genus mater Secalis, *Roskenmutter*. [Vtuntur etiam eo ad sistendum sanguinem.] Eodem, inquam, modo vitium id anno 75, in hac festuca Secalina obseruauit. Reperit enim in montibus quibusdam Stolbergæ huius plures spicas, non vnum eiusmodi vitiosum granum oblongum, nigrum, continentes, sed plura, eaque maxima ex parte in corniculi modum recurua. Verùm tempore florescentiæ ipsius anno illo copiosæ erant pluuie & postea succedebat calor Solis feruidior. Porro si quis singula velit ad amussim examinare, facillimè differentia maioris & minoris esset reperiri, solum modò discrimine in spica vel longiore vel breuiore constituto.

Locus & tempus.

Descriptio

Secalis mater.

SECALE LATIFOLIA C. BAVHINI.

Culmis Secali primo siue latifolio [vt in pin. vocat] in prodromo descripto, exurgit candidantibus, rotundis, stratis, quibus spica palmum longa, crassa, arista longissimis, & vt in vulgari tenuissimis denticulis exasperatis armata, infidet: folia habet cubitum longa, vnciam lata, & per marginem leuiter exasperata, grana non vidimus, spicam & folia ex horto Nobiliss. Contareni, Senatoris Veneti, habemus.

SECALE LUXURIANS C. BAVHINI Quid?

Secale 4 siue luxurians [vt in pin. ait] est Clauis-Siliginis Lon. Secalis mater, Thal. ut. de gra Tom. II.

SECALE NACHANI GARCIAE.

CAP. IX.

Nachani Garciae sementis nigrae & minutæ, sapore fecales, conficiendis panibus aptæ, etiam meminit is, teste Clusio, qui naufragium Natus Sancti Benedicti nomine, quæ paulò supra Promontorium Bonæ spei ad scopulos allata est, descripsit, atque Sinapi similem esse, sed nigriorem, cuius farina in panes orbiculares subacta, vescuntur tota illa Aethiopiæ ora maritima, præsertim inter A.S. Christophori, & cum qui à S. Lucia nomen accepit.

Sinaps fr. mli.

Synonyma

C. Bauh. pin. Secale 5. siue Secali affinis peregrina, Nuchani Garciae, Secales peregrinum genus n. Lugd.

VSTILAGO.

CAP. X.

Descriptio Egetum siue frugum, præsertim spicarum, Smaximè Auenæ & Secales, Dodonæo Auenæ & Tritici vitium est. Vstilago [epitvms, Rubigo vertit Gaza apud Theoph. 8. hilt. cap. 10.] vbi in spicam abit culmus apparere solita, si pluuia madens incerti Solis sentiat feruidiores radios: culmo, foliove neutquam degenerante, sed granis in fuscii fuliginosum pulusculum commutatis, qui vel solus



vel salius, liquorëve subactus, eiusmodi colore curam in hiet. C. Bauh. pin. triplicem Vstilaginem nominat. i. Vstilago fecales. Vstilago, Triag. Dod. [cui Auenæ ac Tritici propriè morbus] Lon. Lob. Lugd. [cui præsertim Auenæ pestis est.] Vstilago fecalina, Tab. II. Vstilago hordei, Vstilago polytichi, & Vstilago hordei dytichi, Lob. icon. Vstilago hordeacea Tab. III. Vstilago Auenæ: & Lob. 160. Vstilago Auenæca, Tab.

De Vstilagine cœnoscia Theoph.



Plenilunio gignitur.

prodit. Rubigines sumentacea magis, quàm Leguminosa: & inter sumentacea hordeum magis, quàm Triticum sentit, & inter hordea aliud plùs, aliud minùs, sed præcipuè dixerim achilleis. Nec segetum situs, naturæque parum refert: tractus enim excelis, perflatique, i rubiginem nullam, aut minimam sentiunt. Concaui & flatibus nullis expositi contrà frequentissimam habent: gignitur hæc plenilunio. Libro autem causar. 3. cap. 27. sub æruginis [vt Gaza inter prætare] nomenclatura de eadem sic scribit: Semina quoque ad fertilitatem idonea, & vitia quæ accideri solent, haud ignorare oportet. Locis enim cauis & à flatu silenibus segetes æruginè infestantur: aufugiunt hoc vitium quæ stant non erecto, sed paruo cacumine. Quamobrem spicam inclinari iule est, vt imbres decendant, nec rores excipi possint.

Infestantur magis quæ longæ sint: manent erectius latae ac breues: quo fit, ut istæ æruginem sentiant. Iuuat & multò à foliis spicam distare, humori enim in foliis magis concipitur. Itaque si propinqua sit, tangitur statim: si remota, non æquè inicitur. Quamobrem hordeum achilleis vocatum, æruginosum, tam nigrum quàm candidum est, spicam enim gerit erectam. Contrà genus, quod etæocritium vocamus, quia incuruat, ab æruginè innocuum est. Segetes vento expositæ minùs æruginè infestantur, motus enim humorem discutit. Nam & cum post imbrem flatu secutus, & non deinde succellerit, æruginè minùs conflitit. Flatus enim humorem deicit, & Sol paululùm immoratus nullam putredinem conficit, sed priùs quàm quicquam emarcescat, humor totus assiccatur atque absimitur: æruginè autem quædam putredo est, nec putridum esse quicquam potest sine alieno calore. Triticum plenilunus potissimùm æruginè capit: ratio in calore est, quo etiam noctu Luna putrefacere potest. Infirmitiora, fragilioraque sunt omnia [vt simpliciter loquar] alba quàm nigra, tam in plantis, quàm in animalium genere. Igitur quod semina locis conuenienter eligi debeant, plenisque rationibus constat. Morbi autem [vt in summa dixerim] omnibus ob alimenti celique temperiem eueniunt: videlicet cum plùs, minùsve alimenti præbetur, aut ærimmodicè humidus, siccusve est, vel etiam cum non tempestiuè humescit.

Cælestè frugum vinearumque malum, nullò minùs noxiom rubiginè dixit Plinius lib. 8. cap. 17. Frequentissimam autem hanc in rosido tractu, coruallibusque ac perflatum non habentibus: E diuerso carere eò ventosa & excelsa. Capite 23. hæc subdit. Plerique dixerè rorem inustum Sole acri, frugibus rubiginis causam esse, & carbuncul vitibus. Quod ex parte falsum arbitror, omnemque vredinem frigore tantùm consistere Sole innocuo. Id manifestum fiet attendentibus. Nam primùm omnium non hoc euenire, nisi noctibus & ante Solis ardorem, deprehenditur, totumque Lunari ratione constat: quoniam talis iniuria non fit nisi interlunio, plenæve Luna, hoc est prævalente: vtroque enim habitu plena est, vt sæpiùs diximus. Sed interlunio omne lumen, quod à Sole accepit, celo regerit. Differentia vtriusque habitus magna, sed manifesta. Namque interlunio æstate calidissima est, hyeme gelida. E diuerso in plenilunio æstate gelidas facit noctes, hyeme tepidas. Causa euidens, sed alia redditur à Fabiano, Gracis que autoribus. Aestate enim interlunio necesse est cum Sole nobis proximo circulo currat, igne eius cominus recepto candens: eademque interlunio abijt hyeme, quando abcedit & Sol. Item plenilunio æstiuo procul abeat aduersa Soli: hyeme autem ad nos per æstiuum circulum accedat. Ergo per se rosida quoties alget, infinitum quantum illo tempore cadentes pruinas congelat. Ante omnia autem duo genera esse cælestis iniuriæ meminisse debemus. Vnum quod temperates vocamus, in quibus grandines, procellæ, cæteraque similia intelliguntur, quæ cum acciderint [vis maior in frugibus & terræ iuctibus diuina Vlpiano dicitur. ff. de damno re. secto. l. fluminum] vitium autem. Eadem calamitosa tempestas. ff. de loc. & cond. l. ex conducto, eod. titul. Causa exponit *rub. hietm.* Porò calamitosam grandinem à darnonibus immutari scribit Theophr. cap. 9. lib. 5. causi] vis maior appellatur. Hæc ab horridis syderibus exeunt, vt sæpiùs diximus, veluti Arcturo, Orione, Hoedis. Alii sunt

sunt illa, quæ silente cælo serenisque noctibus fiunt, nullo sentiente, nisi cum facta sunt. Publica hæc & magna differentia à prioribus, aliis rubiginem, aliis vredinein, aliis [Caniculam legit Turnebus cap. 23. lib. 24. Aduersar. eamque interpretatur syderationem & carbunculacionem, quâ facta assantur, & ad sterilitatem castrantur, cum caniculainfana messes coquat, æstuosoque imperu suo omnia torreat.] carbunculum appellantiibus, omnibus verò sterilitatem. Et hæc Plinius, de quibus earumque causis fufius capite sequenti, 29. se. scripsit, quæ hic subdere nimis tædiosum foret foret.

Cæterum nascitur Vstilago Aprili & Maio mensibus, cum cæli tempestas crebrè inconstans, aliàs nimbofa, aliàs serena, feruens fuerit, tunc enim spicæ humore madide, a Solis feruore corumpuntur, ac quodam modo, vt aiunt, aduruntur.

HORDEVM VETERIBVS ET NEOTERICIS IN GENERE.

C A P. XI.

Dioscorides vnus duntaxat Hordei meminit: Dat Theophrastus lib. 8. hist. cap. 4. plures eius differentias & genera recenset. hordeum, inquit, latiori folio quàm Triticum conditur, nec tunicis integitur, sed nudum consistit: hoc enim omnium maximè caret tegumento. Quin etiam culmus breuior hordeo, quàm Tritico est, & spica minùs discreta à foliis emicat. Palca quoque insuauior, quæ ex hordeo, quàm quæ ex Tritico, vt pote quæ minùs succi retineat, & durior sit. Ad hæc hordeum à Tritico differt, quòd hordeum in versis spicatur, triticum nullo versu conditum est, sed æquale vndique constat. Genus totum ad genus tales ingerit differentias. Rursus eorum vt triticum in plura genera ipsis etiam fructibus, & spicis & reliquis formis atque etiam viribus affectionibusque discreta, diuidi sanè potest. Est enim in hordei genere aliud binis versibus, aliud ternis, quaternis, cumque plurimum tenis, est enim vel huiusmodi quoddam genus. Quod verò pluribus constituitur versibus, hoc semper ferè spissius, positiusque arctius constat: Magnam & Indicum differentiam facit, quandoquidem ramis natum sit brachiari, vt proposui. Et spicæ verò aliis grandiores, rarioreque constant: aliis minores, frequentiorisque, & aliis distantiores à foliis, aliis proximiores, vt achilleis cognomine. Et hordeorum ipsorum aliud rotundius, minùsque: aliud oblongius, maiùsque, atque in spica rarius. Item aliud candidum, aliud accedens ad purpuram, quod & farinam reddere copiosius creditur: & contra hyemem, & flatum, & in totum contra cæli mutationes candido validius esse videtur. *Hæc genus Theophrastus.* Hordeum autem ad purpuram accedens, in India Occidentali, semine ex Hispania delato, fecundius & vberius nascitur, vt habetur in Hist. Ind. Occid. parte 9. cap. 31.

Columella lib. 2. cap. 9. hordei duo genera tradit. Est, inquit, hordeum, quod rustici hexastileum, quidam etiam Cantherium appellant, quoniam & alia animalia, quæ ruri sunt, melius quàm Triticum, & hominem salubrius, quàm malum triticum pascit. Nec aliud in egenis rebus magis inopiam defendit. Seritur soluta siccaque terra, & vel præualida, vel exili, quia constat arua segetibus eius marcescere, propter quod pinguisimo

agro, cuius nimis viribus noceri non possit, aut macro, cui nihil aliud committitur. Altero sulco seminari debet post æquinocetium media ferè sementi, silato solo, si gracili maturus. Iugerum quinque modii occupabunt. Idque vbi paulum maturuerit, festinantius quàm vllum aliud frumentum demetendum erit. Nam & fragili culmo, & nullà vestitum palea granum eius celeriter decedit, iisdemque de causis facilius teritur, quàm cætera. Sed cum eius messem sustuleris, optimum est noualia pati anno cessare, si minùs stercore saturare, & omne virus, quod adhuc inest terræ, propullare: alterum quoque genus ordei est, quod alii distichum, galaticum nonnulli vocant, ponderis & candoris eximit, adeò vt tritico mistum egregia cibaria familiarè præbeat. Seritur quàm pinguis, sed frigidis locis circa Martium mentem. Melius tamen respondet, si clementia hyemis permittit, cum seminatur circa Idus Ianuarias. Iugerum sex modios postulat.

Palladius Ordeum galaticum, quod graue & candidum ait, serendum præcipit locis frigidis circa Martias Calendas. Cantherium verò Octobri, macrè & sicca terrâ, vel multum pingui.

Plinius lib. 13. cap. 7. Hordeum inter frugum genera recensens, frumentum constituit hybernum, vt quod circa Vergiliarum occasum (Noeumbri) satum terrâ per hyemem nutriatur. Multis radicatur fibris, sine ramis: erumpit à primo fatu die septimo. Ex eo autem alterum caput grani in radicem exit, alterum in herbam, quæ & prior floret. Radicem crassior pars grani fundit, tenuior florem, fructus spicis conuenitur, muniturque vallo aristarum quadruplici genicula hordeo sunt octona, nec ante dictum geniculorum numerum conceptus est spicæ, qui vt spem sui fecit, quatuor aut quinque tardissimè diebus flore

re incipit, septemque tardissimè deflorescit. Hordeum vtrumque [distichon & polytichon: vel nudum quod *γυμνὸν*, & gluma sua vestitum, intelligit Dalech.] & quicquid in stipula est, in cacumine vnum folium habet, & quidem scabrum, vt reliqua: cum defloruit, crasse sit, maturatque cum plurimum diebus quadraginta: In Aegypto sexto à sui mense metitur, in hellade septimo, in Peloponneso octauo. Hordeum maximè nudum: ei calamus humilior, quàm Frumento, atista verò mordacior. In arca exterritur. Leuisimum ex frugibus hordeum: primum ex omnibus frumentis seritur. Indis fatuam & syluestre, ex quo panis apud eos præcipuus. Spicæ quædam [Distichi hordei.] binos ordines habent: quædam [polytichi.] Cantherium Colamella vocat, Dal.] plures vsque ad senos. Grano ipsi aliquot differentie, longius, leuiusque, aut breuius, aut rotundius, candidius, nigrius, vel cui purpura est. Vltimo ad polentam, contra tempestates candido maxima infirmitas. Hordeum frugum omnium mollissimum est: feri non vult, nisi in sicca & soluta terra, ac nisi lata: ex omni si mimento minimè calamitolum, quia tollitur antequam Triticum occupet rubigo. Hordeum sarculo [hordeum sarculo, legit Turnebus c. 24. lib. 1. Aduersar. quod non cibatis, vt Triticum, sed loculis seratur, & foris vendatur. Alii legunt, seculo, quia *φικέλω*, id est, alendis pascendique animalibus gratum. Columella cap. 9. lib. 2. hordeum altero sulco seminari tradit. Ex illo autore videtur hæc linea transcripta. Sarculo, interpretor, terra leuissimè mota, & tantum suspensa, vt sit farriendo.] feri dicunt, propterea celerrimè redit, ferilissimumque: quod in Hispania Carthagine Aprili mense collectum

Granum
decidit,

Hordeum
alterum
Galaticum.

Sationis
tempus
Palladio.

Frugum
hybernæ
Plinio.

Hordeum
distichon
plex.

Leuisimum
ex frugibus

Differentia

Mollissimum

Atissima
calamitosa

Ferilissimum

est, hoc fertur eodem mense in Celtiberia: eodemque anno bis nascitur. Rapitur omne à prima statim maturitate festinantius quam cætera. Fragili enim stipula & tenuissima paleagranum continetur. Hordeum festuca enecat (pergit c. 17.) quæ vocatur ægilops: Catonis sententia est, feri in nouali & in aruo, quod restibile possit fieri, & loco temperato. cap. 24. Virgilius inter Equinoctium Autumni & Brumam feri iubet. Serere in iugero temperati soli iustum est modios decem.

Hordeum absque seruine, & cortice. Cardanus refert in Atholia Scotiz regione Hordeum absque seruine produci: in Cappadocia verò sine cortice.

Hordeum salutare hominibus, mortale iuis canibus. Aristoteles de mirab. author est circa Scythiam & Medorum dictam Thraciz regionem, locum esse viginti ferè stadiorum spacio, qui Hordeum producat, quo homines vescantur: equi verò & hoes abstineant: imò sues etiam & canes excrementa hominum, qui mazam aut panem ex Hordeo illo comedent, auersentur, tanquam mortis periculo.

Genera duo Ruell. Hexastichum. Ruellius ex rusticorum obseruatione Hordei duo genera memorat, hexastichum, quod quosdam cantherinum appellare refert, quod folliculo castratum enascatur: Gallos, qui hoc ferunt, mundum vocare ait Hordeum, quod spontè granum glumâ concidar, cùm in reliquo non nisi ægrè deglubatur. Alterum distichum statuit, quod Galathicum nonnullos nominare scribit, ponderis & candoris eximij, aded vt Triticum mistum egregia cibaria familiarè præbeat. Alibi tamen Oryzam Hordeum galathicum ab aliquibus appellari tradit. Ad hoc genus reducendum putat trimestre quoddam Hordeum, quod gallicè *Securigeon* dici narrat, quòd tebus ad egestatem adductis, cùm annonæ premit penuria, plebem alar & famis noxa vindicet. Errare autem eos addit, qui secundum hoc genus Oryzam esse interpretentur. Nominat & Eteocithon genus Hordei quod tutum à rubigine fir, quoniam incuruum nascitur. Cæterùm, Hordeo plures fenis spicarum versus Theophrastum secutus, falsè denegat. Cui potro spica folio perquam proxima est, amplitudinis & crassitudinis maioris, & ob id propensius obnoxium arugini, hoc Achilleis à Theophrasto, & Achilleas ab Hippocrate cognominari contendit. Omnia autem eo capite confundit.

Mundum.

Distichum.

Trimestre.

Error aliquorum.

Eteocithon.

Ruell. halucinat.

Achilleis.

Genera duo multis.

Maisus.

Maisus.

Dod. diff. ventis forte septem.

Corn. Tragus, Fuchsus & H. Lugd. Hordei duo genera assignant, quæ in hunc modum discernunt. Maisus, polyticum dicitur, Germ. *großgersten* / Gall. *Orge a plusieurs rans*, quia in multis versus spicatur. Sunt enim ex hoc genere, quæ spicâ tribus, interdum quatuor, nunc sex, nunc octo versus distinctam proferunt. Alterum Distichum, vulgare sc. & exiguum. Germ. *Hein Gersten* / Gall. nunc *Poinle*, nunc simpliciter *Orge*, nunc *Orge à deux rans*, quòd sc. in duos duntaxat versus spicatur. Hoc vere, illud ante Hiemem fertur.

Dodon. Latinus in Hordei genere, quod pluribus versus spicatur, *maisus* appellat. Quod sex versusum *gersten*: Cantherinum hoc Columellæ ait, Aliud duorum versusum, *securigeon*, Columellæ Galathicum, Germ. *futer gersten*. Quod magnum & plenum, spicamque gerit erectam, Hippocratis, arugini obnoxium: quod verò incurratur, *securigeon*, ab erugine minus in se statui. Meminit præter hæc, & hordei trimestris, *Securigeon* gallicè dicti: item & hordei Gallicæ mundi, *grano nudo* quod *securigeon* Galen. de alm. facult.

esse suspicatur.

Vniuersæ Europæ, & multo vñ notissimum Lobelius, Lobelius in Adv. variate scribit magnitudine, colore, spica, gluma, versus, statione, proventu, & vtu. Nam, vt ait, culmis procerioribus è grano pleniore, maiore, coloreque rubello prouenit. Sed insignior differentia est in glabre, nuditate vegeti. Siquidem oritur hordeum, aut follicello pertinaci adhaerit granum sepiente, aut leuiore gluma & exuta facili, cuiusmodi est illud genus quod nudum vocatur vulgò. Notissimum nostras quod à lementis occasione in Autumnale & Vernum diuiditur. quippe illud pinguius veruato, vel restibili mandant, eoque corpulentius maiusque stipula & spicâ euadit. Vernum verò, vt minore perficitur spatio, sic minus granum minusque alens è graciliore tum stipula tum spica promit: proportionem quadam cum Siligine trimestri. Alimenti & medicatis cibus plurima commendatio: deglubitum maxima vi vanum fertur hodie è Germania superiore in Belgicam, Angliamque Septentrionales plagas, omninò glumis nudatum quod *mundatum* vocant, Reliquæ Galliæ officinæ ligneo pistillo affusa feruida pauca, mortarioque inditum, hordeum leniter tundendo tunicis paleæ exuunt, mundumque vocitant, ad pitlanam, sobitunculas, aliasque pulcillas, ægus non parum accommodas factitandas. Est illud mansu suauis, albidum, pellucidum, & transparentius, minusque vtrumque quam tunicum viscidum, minusque vel calidum, vel pingue. Eoque pleureticis & Hepaticis multò vtilius. Nam potionibus diurnis diturnisque temetis, cuiusmodi Galliz quædam pars inferior aut Germania, Russia, Flandria, Anglia, Hybernia, Moscouia, Noruegia, & Suecia potat, cæteraque gentes ad Septentrionem, non exurit: sed triduum integris granis maceratur ad *Stauty* confectioem. Vt in *Byera*, *Zytha*, *Curmi* & cæteris temetis latius dicturi sumus.

In Aduersariorum altera parte Hordeum distinguit in distichon & polytichon. Hoc iterum diuidit in Autumnale & Vernum. Nominat præterea Hordeum spica mutica, Borealibus Britannis *Barly* simpliciter vocatum, quod nunquam vidit.

Casalp. de Hordei differentiis agens, nobis admodum obscuris apparet. Hordeum, inquit, semen est in medio crassum, & rotundum, vtriusque extremis in acutum desinentibus, cortice potius quam folliculo inclusum: adhæret enim semini, vt cum labore auellatur: ponuntur femina in spica nulla alia protergente membrana, ided nuda videntur vt Speltæ: & similiter in aristam desinunt, longum, & asperam, aliquando bis versus, vt vnicum vtriusque semen ordine procedat: longissima spica, quod genus *Ordeolam* vulgò appellant: in montibus & locis frigidis, factam breuiori grano, ac rotundiori, candido, quo pro Farre vntur. Ad hoc genus referri videtur de quo albi ait, qui Zea vntur non habent Far per Zeam intelligit, quæ in Campania semen appellatur, ex qua fit alica. Alterum genus Hordei similem spicam scriptipaulò hreniorem, granis tenuibus, vtriusque alternatum ad latera inclinantibus, vtn in spelta, in montibus Lucensibus *Scandallum* vocant, ex qua panes fiunt reliquo Hordeo meliores: sed iumentis noxia est: nam alium turbat. Galenus fortè hæc genera Hordei inter Olyras recensuit. Diotocordes Tragus inter fruges (nam & alia est Tragus inter herbas medicas Scorpius cognominata) Chondro fini-

leu

lem figura tradit &c. Plinius Tragus externum esse semen ab Oriente inuectum Oryza simile. Hordei aliud genus est, crassius, in spica breviori, rotundiorique, quibus ordinibus, raro quaternis, aliquando senis, quo maxime vtuntur ad iumentorum nutrimentum, & rustici ex eo panes faciunt: primum metitur inter fruges, magnum in penuria suo praecoci aduentu afferens adiumentum: huius quoddam genus est, cui cortex sponte abscedit, vnde *Hordeum mundum* vocant, quod facilloris concoctionis est, & succulentius in Pisanâ conficienda. Plinius hordeum glabrum vocat in Bœotia & Aphrica. Et Galenus hordeum nudum in Cappadocia corticis experts. Theophrastus hordeum describit latiore folio quam Triticum.

In India quoddam genus Hordei sylvestris est, ex quo Chondium bonum faciunt. Dioscorides vnum tantum genus ponit, quod candidum purumque est.

C. Bauh. pin. Hordei quatuor species assignat, Polytichum sc. hybernium & vernum, Distichon, & Causiticum. Nos septem eius differentias mox infra describemus.

Κεῖθ Græcis, Lat. *Hordeum*, Hebræis *Schevab*, Arab. *Xahar*, Germ. *Gersten*, Belg. *Geerste* Gall. *Orge*, Ital. *Orzo*, Hisp. *Cenada*, Anglis *Barly*, Bohemis *Gešmen*. *Κεῖθ* porro ἀπὸ τοῦ δραστικῆς, quod eo reperto & in vsum recepto glandibus spreto, à brutis homines distincti sunt. Artemidorus nobis author est Hordeum molestiam atque laborem significare: quia difficulter molatur, pinfatūve, neque facile in ventriculo concoquatur, à natūrique subigatur.

De hordei, eiusdem Pisanæ, farina, Polentæ, Zythi, atque, Cumi, vinibus, & vsu sequentia Dioscoridem prodidisse reperimus. hordeum optimum est candidum & purum, sed minus quam triticum alit: pisanâ tamen ob cremorem quem inter coquendum reddit, plus alimenti præbet, quam polenta ex eodem hordeo facta. Est autem illa efficax contra acrimonias atque arteriarum asperitates & exulcerationes: ad quas itidem conuenit triticea pisanâ, quæ quidem & plus alit & potentius vias mouet. Lactis verò vberitatem præstat, si cum feniculi semine decocta sorbeat. Urinam porro ciet hordeum, absterget, flatulentum est, stomacho aduertatur, & oedemata concoquit ac maturat. At verò ipsius farina cum ficibus & aqua mulla decocta, oedemata & inflammationes discutit: quin & duritias concoquit cum pice, resina & simo columbino. Cum melioto verò & papaueris calycibus, iis dolorem eripit qui ex latere dolent: aduersus intestinorum inflationes, cum lini semine, fenogrecæ & ruta imponitur. Strumas cum pice liquida, cera, impubis pueri vrina, & oleo ad concoctionem perducit: & cum myrto, aut vino, aut pyris sylvestribus, aut rubo, aut malicorio aliu profluuiâ sistit: podagricis inflammationibus cum cydonio malo aut aceto prodest. Decorticata in acri aceto malignatis in modum, quod ex eadem hydrelæo subacta conficitur, & calens apposita, leptis medetur. Farine verò cremor ex aqua cum pice & oleo decoctus, puri mouendo accommodatus est. Ille idem ex aceto elicitur, si cum pice coquatur, contra fluxiones articularum prodest. Ceterum hordeacea polenta cohibet aluum, inflammationēque mitigat. Ex hordeo Zythum paratur, quod quidem vias cit, renes ac neruos tentat, sed meningas potissimum offendit: inflationem parit, viciosumque succum creat, & elephantiasin inducit. Ipso verò maceratum ebur obsequiosum,

& operi tractabile redditur. Fit & ex hordeo potus, quem Cumi nominant, eoque sæpenumero pro vino vtuntur, verum dolore capitis infert, prauimque succum gignit, ac neruos lædit. Parantur & similia potus genera ex Tritico quem admodum in Iberia Occidentali & Britannia.

Ceterum in Dioscoridis exemplaribus capite de hordeo ad finem de polenta pro ἀλετρον falso legitur ἀλευρογ. Et hoc vel ex Plinio patet, qui pafim de hordeo, eiusque farina, & palarum vsu ac medicina sic disseruit. Antiquissimum in cibis hordeum, sicut Atheniensium ritu Menandro autore apparet & gladiatorum [Athletarum, hīstriorum, Comædorum, nomine continentur gladiatores, arenarii, mirmillones, secutores, tetarii, pugiles, pancratiastæ, xyfici, pantomimi, palæstritæ. Nusquam porro legitur Athenis, vbi Menander vixit, atque ad eum nec in Peloponneso tota, nec in Hallide gladiatorum spectacula edita fuisse: quamobrem legendum hic quidem diuinant, & pistorum. Chiffleus tamen legendum putat, Calgatorum, id est, gregiarum militum; quod illis, si quid peccassent, ignominia causa, pro Tritico daretur Hordeum. Festo hordearium æs, quod equo Romano dabatur pro hordeo emendo, quo equum aleret. Fierunt & gladiatores equites Galeno 3. secundum genera, Lipsio in Saturnalib. Andabatæ, quibus ex publico dabatur hordeum, quo nutrentur equum, vnde fortassis dicti sunt Hordearii, quamuis Plinius de hominum cibatu videatur magis loqui, quam iumentorum. Sed quid si legas, & Equitum cognomine, qui Hordearii vocabantur. Fierunt enim Romæ equites gladiatoribus antiquiores. Dal.] cognomine, qui Hordearii, [nunc Studiosos, idiotæ sic appellare solent, C. Bauh.] vocabantur. Polentam quoque Græci non aliunde præferunt. Pluribus hic curiosam hordei præparandi rationem ex Pherecrate recitat, Eustachius his verbis, τὰς κεφαλὰς δὲ πύσσει, tundere, pinferere, φούρον, torrete: ἀποβρίστην, incerniculo cribrare, aut corbe: αἰεὶν, aqua rursus aspergere: ἀλέσαι, molere: μάζαι, manu subigere: ἀγθίνας, adendâ apponere.] hæc modis Græci persusum aqua hordeum siccant nocte vna, ac postero die frigunt, deinde molis frangunt. Sunt qui vehementius tostum rursus exigua aqua aspergant, siccantque prius, quam molant. Alii verò vitentibus spicas [nam ita melior polenta fit] decussum hordeum recens purgant, à puluere, lapillis, & id genus reliquis sordibus. Madidumque in pila tundunt, atque in corbis eluunt, ac siccatum Sole rursus tundunt, & purgatum molunt. Quocunque autem genere præparato, vicenis hordei libris, ternas seminis lini, & coriandri felibras, salisque acetabulo, torrentes ante omnia miscent in mola. Qui diutius volunt ferare, cum polline ac fursibus suis condunt nouis fictilibus Italia sine perfusione tostum in subtilem formam molit, iisdem additis, atque etiam milio.

Panem ex hordeo Antiquis vsitatum vita damnauit, quadrupedumque tradidit refectibus Pisanæ [ππισανῶν Athen. lib. 10. dictam vult ἀπὸ τοῦ πησῶν & αἰεὶν, à tundendo & madefaciendo. De Pisanâ idem author hunc griphum recitat: κεῖθ ἐσθλοῖς ἰγροῦται γελῶν πῖς, Hordei decorticati & tui cremorem bibe.] unde vsus validissimus saluberrimusque, tantoperè probatur. Vnum laudius eius volumen dicitur Hippocrates, è clarissimis Medicinæ scientiâ. Pisanæ bonitas præcipua Vticensi. In Aegypto verò ea est, quæ fit ex hordeo cui sunt bini anguli [ex hordeo disticho, cui sunt bini ordines, vt mox loquetur, & versus.] In Bati-

Cumi

Plin. anis. quassim ci. bu.

Plinij lectio suspecta.

Hordearii. Gersteris.

Polenta pluribus sordibus.

Panis.

Prislanæ delecta.

Hordeum

Palea

Pisendi farina

Farina Cuscae

ca & Aſiæ gerus. ex quo fiat, hordei, glabrum [*Hordeum* Græci. Dal.] appellat Turannius. Apud nos hordei farina & ad medendum vtuntur. Mirumque, in vſu iumentorum ignibus durato, ac poſtea molito, offiſque humana manu demiffis in aluum, maiores vires, torſoque corporis fieri. Palea ex optimis: ſtramentum verò nullum comparatur. Meliorem etiam Polentam fieri tradunt, ſi non excoctâ maturitate tollatur. De ipſa ratione piſendi, Magonis proponitur ſententia. Hordeum anrè perſundi aqua multa iubet, poſtea equali, deinde Sole ſiccatum pilo repeti. Huius ſextario viginti ſpargi duobus ſextariis aquæ. Paleam calidam imponi ramicum incommoſis experti iubent, quæque decocta eſt aqua ſoneri.

Hordeaceus panis Eruſia aut Cicercula olim fermentabatur. Farina ex Hordeo & cruda & decocta colleſtiones impetuſque [humorum fluentium impreſſiones & incurſus] diſcutit, lenit & concoquit. Decoquitur aliàs in multa aqua, aut ſiſco ſicca. Ad iecinoris & iſores eam cum poſca concoqui opus eſt aut cum vino. Cùm verò inter coquendum diſcutiendumque cura eſt, tunc in aceto melius aut in ſacæ aceti, aut in cotoneis pyriſue decoctis. Ad multipledatum [Scelopendrarum] morſus cum melle, ad ſerpentium in aceto, & contra ſuppurationi, ad extrahendas ſuppurationes [Galenus lib. 2. ad Glauc. cataplaſmate ex hordeacea farina parato diſcuti poſſe tumores ſuppuratos pollicetur, ſi exiguum pus eſt, ſi cuti vicinum, ſi tenue] ex poſca addita reſina & galla. Ad concoſtiones verò & huleera veteta, cum reſina. Ad duritias cum ſimo columbarum, aut ſiſco ſicca, aut cinere. Ad neruorum inflammatioes aut inteſtinarum, vel laterum, vel vitilium dolores, cum papauete aut meliloto, & quoties ab offibus caro recedit. Ad ſtrumas cum pice & impubis pueri vrina. Cum oleo & fenogreco contra tumores præcordiorum, vel in febribus cum melle vel adipe vetuſto. Suppuratis triticea farina multò lenior [ad concoquendum humore, & dolorem mitigandum aprior.] Neruis cum hyoſcyami ſucco illinitur: ex aceto & melle lentigin.

Polenta à farina hordei diſtat.

De Polenta genethus in ſugum loco ſatis diximus, locorum ratione [quoniam eo loco de Hordeo tractaretur, & eodem loco etiam conueniebat de iis quæ ſunt ex hordeo ſermonem haberi.] A farina hordei diſtat eò quòd torretur, oh id ſtomacho utilis. Aluum ſiſtit, impetuſque rubicundi tumoris. Et oculis illinitur, & capitis dolori cum menta [melle aut aliqua reſig. ex Colunell.] aut alia reſrigerante herba. Item pernionibus & ſerpentium plagis, item ambuſtis ex vino. Inhibet quoque puſtulas. Farina in pollinem ſubacta, vim extrahendi humoris habet: ideò & cruore ſuffuſis in facias vſque ſanguinem perducit, efficaeiſ in ſapa. Imponitur & pedum calidauſque. Nam cum oleo vetere ac pice decocto polline, condylomata, & alia omnia ſedis vitia quàm maximè calido mirabilem in modum curantur. Pulte corpus augetur. Farina, qua charta digeritur in panibus quæ recedunt ab offibus, & eruptionibus pituitæ, muris araneis morſibus. Idem aſperſo ſale ac melle, candorem dentibus, & ſuauitatem oris facit. Eos qui pane hordeaceo vtuntur, morbo pedum tentari negant. Nouemque granis ſi ſurtineulum quis circumducatur, ſingulariter manu ſiniſtra, & omnia in ignem

abiiciat, conſeſtim ſanari aiunt Hippocrates, multò plura de piſſana in libro de ratione victus in morbis acutis, qui liber de piſſana inſcribitur, quàm ipſe Plinius, à quo citatur, prodidit, his verbis. Rectè omnibus ſtumentaceis eduleis præfertur in morbis acutis. Laudo ſanè eos qui iſlara prætulerunt. Nam lentor ipſius lenis eſt, & continuus, & incundus, & lubricus: ea verò moderatè humida ſitum admitit, & facilè eluitur, ſi fortè & hoc opus ſit: & neque adſtrictionem habet, neque malam turbationem, neque in ventre intumefcit. Inrumit enim in coctura, quàm maximè tumefcere ſolet. Quicumque igitur piſſana in his morbis vtuntur, nulla die vaſta vacua fieri permittant, vt ita dicam, ſed vtantur & intermittant, ſi non ob id medicamenti, aut inſuſi per Clyſterem vſum, intermittere oporteat. Et qui his quidem in die cibum capere ſoliti ſunt, eis bis danda eſt. Verùm ſenſim progreſſu factò, ſi fieri poterit etiam his bis detur, ſi ſanè opus habere viſum fuerit. Piſſanam porò ex optimo Hordeo factam eſſe oportet, & quàm optimè coctam, & præſertim, ſi non ſolo ſucco vti velis. Nam vrà cum reliqua piſſanæ virtute, lubricus lentor facit vt Hordeum decorneatum non lædat. Nulquam enim adhæret, neque ſecundum thoracis reſtitudinem moram habet. Lubrica verò maximè eſt, promptiſſimè ſitum eximit, ſaciliſimè concoquitur: & debiliſſima eſt optimè cocta, quibus omnibus opus eſt: *Hæc Hipp.*

Quoquo modo Hordeum paraueris inquit lib. 1. Alim. Galenus, nunquam corpus caleſcit, ſed variè pro modo præparationis humefcat ac ſiccatur, quandoquidem Polenta ex ſiſco Hordeo facta, ſiccatur præcipuè cœntur, piſſana verò humefcat præcipuè quum vt decet, parata fuerit, hoc eſt, cùm in coctione quamplurimum intumuerit: poſtea igne lento per multum otium in clylum, ſiue cremorem fuerit redacta. Acetum ei tum admiſcerur, cùm planè intumuerit. Cùm verò cocta exaſtè fuerit, ſub edendi tempus ſalem tenuem iniicere oportet. Oleum autem ſi initiò ſtatim iniiceres, coctioni nihil nocueris. Aliud tamen nihil eſt miſcendum, niſi velis anethi, aut porri quippiam, idque initiò ſtatim immiſcere. Video autem piſſanam à coccis omnibus peſſimè præparari: In mortario namque crudam iſſam tundentes, non ad ignem coquentes diſſoluant. Sunt qui Amylum etiam iniiciunt, vt per coctionem in cremorem copioſum videatur eſſe redacta. Talis certè piſſana meritò maximè eſt eſt ſtatuola, & concoctu admodum diſſicilis. Quæ verò in piſſanæ rectè præparanda prætermiſſa, ea nunc adicere oportet. Crudam piſſanam aliquandiu in aqua præmaceratam, deinde in mortario iniectam, manibus terere conuenit, aſperum quidpiam manu tenentibus. Vſque eò autem terenda, dum qui in ſuperficie eſt cortex, ſit abiectus: iſ enim quo veſtitur, ceu tenui tunica, non totus inter pinſendum abiicitur. Quapropter & præmaceratur, & in mortario tunditur. Quod ſi non quicquid eſt accis deciderit, elixa piſſana magis quidem deterget, nullam autem aliam noxam accipit. Peſſima eſt piſſanæ præparatio, cùm vbi cocci crudam iſſam in mortario cum aqua contuderint, deinde parum coxerint, ſapam iniiciunt. Quidam cum his meli quoque & cuminum iniiciunt, cinnum quemdam verus quàm piſſanam parantes. Verum que rectè præparata eſt, vtilitates quas memorat Hippocrates tum ægrotis præſtabit. *Hæc Galenus de piſſanæ facultate tradidit.*

Piſſana

Pisana autem à verbo Græco *πῖσαν* nomen accepit, quod tundere & decorticare significat. Hoc primum quidem generale nomen est frugum omnium decorticatarum, tufarumque, & cum diuersarum frugum generibus copulatum, alia atque alia pisana genera significat. At simpliciter, & sine adiectione posita, hordeum excorticatum, ob eius præstantiam tantum significat. Hac autem, vt ex variis Galeni locis, quorum nonnullos ponemus, colligi potest, hoc modo fiebat: hordeum in aqua maceratum dum extumescat, in Sole siccatur: mox in pila ligneo pistillo tantisper tunditur, dum corticem exuat. Hoc in aqua lento igne coquitur, donec succulentum reddatur. Galenus, quod sciam, aquæ & hordei mensuram non exprimit. Oribasius vni parti hordei decem partes aquæ miscet. Paulus vni parti Pisana quindecim partes aquæ.

Eius parandæ modum tradit Didymus in Geopon. Cassiani: hordeum maceratum tunditur, & in Sole siccatur, sicque reponitur: inpergitur deinde quod ex ipsa est tenuius, quoniam eam conseruat. Ea humidior sumpta maximè nutrit. Vni parti hordei decem partes aquæ iniiciuntur, & sal felatus ipsi inpergitur. Fit etiam ex Tritico Pisana eodem modo.

Hodie Medici Hippocratis, Galensque Pisana non vtuntur, sed eius vice hordeum integrum suspensa mola decorticatum, quod *Hordeum mundum* vocant, tantisper in aqua decoquant, dum pulvis speciem referat: deinde tundunt, & tenui incerniculo percolant, saccharum addentes, & modò cum saccharo Amygdalarum dulcium cremorem, aut feminis Melpetonum, aut feminis Papaueris, modò aquam ex rosis stillatitiam pro variis scopis & varia morborum ratione. Nostro tempore, inquit Dodonæus, rarè aut nunquam horum [quorum Galenus meminit, acetis scilicet, olei, Anethi, aut Porri.] aliquid addit, sed saccharum ferè, & aqua è Rosis albis stillatitia ei admiscetur, & subinde Amygdala aliquot amara, vt palato gratior fiat: aut seminum Melonum vel Cucumeris nonnihil, præsertim quando impensius refrigerandum, aut somnus eà conciliandus est. Admiscetur ei & nonnunquam Amygdalarum dulcium *πυλῶν*, siue succus (Officina lac Amygdalinum vocant) præsertim cum aluum liquidiores cohibere vtile est.

Fit & hodie à Phatmacopœis potio, quam Pisana *πῖσαν* vocant, Galli *Tisane*, cum nec Pisana sit, nec Pisana cremor, sed eius tantum tenuis decoctum, ipsius substantiæ parum, aut nihil retinens. Fit enim ex hordeo mundato, Glycerhiza, & visis passis. Qua ratione parata potio vtilis est iis qui inflammatione pulmonis, partiumque respirationi seruientium, vel renum, vesicæque exulceratione laborant.

Porrò, eodem Galeno authore, hordeum non eandem cum Tritico facultatem habet. Siquidem hoc palam calefacit, illud verò non modò non calefacit, sed quoquo modo ipso vtare, siue panes ex eo feceris, siue pisana coxeris, siue polentam, vim quandam refrigerandi habere videtur. Dissidet præterea à Tritici natura succi specie, quem vtumque ipsorum gignere consuevit. Siquidem Triticum crassum ac lentum, hordeum tenuem, & nonnihil detergentem succum in nobis creat. Panes omnes hordeacei Triticeis minus aunt, qui tamen ex præstantissimo hordeo conficiuntur, minus à Triticeis in eo superantur, qui verò ex laxo ac leui, panibus furfuraceis respondent. Panes quidem ex hordeo sic laxo citissimè

per aluum subeunt, quod reliquis etiam manifestum est, si cum Triticeis eos contuleris. Sunt autem non modò Triticeis, verum etiam Olyrinis, & multò adhuc magis Typhinis friabiliores, nihil in se lentoris, vt illi habentes. Ex quo perspicuum est, exiguum corpori præbere alimentum, & potissimum si facti ex peiore hordeo fuerint. Idem rursum: hordeum primi est ordinis in refrigerando & exsiccano: habet etiam paululum abstersionis.

Polentam verò (quam Græcè *ἀλαριον* propriè vocat, quam *λαριον* etiam de omni alia præsertim rudiore farina impropiè dicatur) ex recenti hordeo mediocriter friso laudatissimam fieri scripsit, cuius si copia non sit, & ex alio ipsam confici. Cum autem polenta omnis rectè facta boni sit odoris, eam esse suauè olentissimam, quæ ex optimo ac recenti hordeo, & quod aristam non admodum siccam habeat, est confecta. Compluribus autem per sanitatem morem esse eam sapæ & vino dulci mulsòque committis, nonnunquam etiam sola aqua conspersam, æstate duabus, tribusve ante balneum horis bibere, dicerè que ferute se hoc potu sit liberari: si autem cum vino austero fuerit pota, ventrem desiccate. Polenta Gentes quasdam pro pane vti, idque rusticos in Cypro facere, tametsi frumenti plurimum metant. Veteres militibus Polentam præbuisse. Romanos tamen milites ipsius imbecillitatem damnantes, eà non amplius nunc vti. Exiguam enim corpori alimentum dari, priuatis quidem, & omni exercitatione abstantibus, satis multum: iis autem qui quoquo modo exercentur, minus quàm satis est.

Ceterum, cum Polenta hordei frisi farina sit, vt ex Plinio & Galeno diximus, Aëtius non dissimilem huic rem descripsit, sed *Cubbu* appellat, quod nomen à nullo alio usurpatum fuisse meminimus: Ex eorum, inquit, quæ tumores cohibent numero, est & id quod Byne appellatur. Est autem hordeum madefactum quod germinet, vna cum enatis ligulis costum, si tritum pro cataplasmate imponatur. Hoc nomine Aëtius indicat hordeum ad Ceruisiam conficiendam præparatum, quod *Maltum* vulgò appellant, Germani

Ceruisia autem, ad cuius decoctionem illud conficitur, Germanis *Byre*, Gallis *Biere* dicta, parum à *Byne* distat. Laudatissimum fit *Maltum* mense Martio & Aprili. Qualitate sicca præditum est, maiore quàm in hordeo, frigida multò remissiore. Nam empyreuma quod illi ab afflacione diutinaque coctione accedit, siccitatem eius auget, frigiditatem verò non solum minuit, sed & caliditatem quandam ei imprimi.

Quare Galenus cum scribit hordeum, quoquo modo quis eo vtatur, siue Pisana coxerit, siue polentam fecerit, vim quandam refrigerantem retinere, id de Malto intelligere non potuit, quod partim ipsa germinatione, partim longiore coctione magis à natura sua recessit quàm polenta, quæ vel ex crudo nondumque maturo hordeo, vel in aqua macerato tantum conficitur. Absterget præterea multum hordeo vehementius, tum quia farina minus, glumarum plùs habeat, tum ob empyreuma, quod abstersionem coniunctam habet. Ventris torminibus, aliisque similibus ex frigida causa doloribus *Maltum* subuenit, tostum seruensque in sacculo appositum. Polenta multò plùs hordeo desiccatur, inquit Galenus, aluum etiam cohibet authore Dioscoride, & inflammationes mitigat. Tamen in vulgatis Diosco-

ridis exemplaribus legimus, τὸ δὲ εἶδος αὐτῶν ἀλλοτριῶν, &c. d est, farina ex his alium silit, inflammationes mitigat, vt de farina hordei de qua multa prius dixerat, hæc etiam intelligantur. Sed exemplaria falsò ἀλλοτριῶν pro ὄρνιθων habere contendit Cornarius, vt ex Plinio intelligere licet.

ἀλλοτριῶν
falsò pro
ὄρνιθων

Omelysis
quid

Galenus quoque scribit polentam multò magis quàm hordeum siccare. Sed quoniam ad τὸν ἀλλοτριῶν, id est, polentæ discrimen, ἀλλοτριῶν, & composita voce ὄρνιθων, dicta esse videtur, quid ea sit etiam hic explicandum. Polenta igitur hordei tostii farina est: ἀλλοτριῶν Galeno, & reliquis medicis Græcis, cruda hordeacea farina est: ideòque Plinius, Polentam à farina hordei distare, quia totretre, ἀλλοτριῶν cruda hordeacea farina est nulla alia re admixta. Id ex eo perspicuum fit, quod vbi que in eius vsu res & liquores exprimuntur, quibus ea farina excipi, & cum quibus subigi, parari, & coqui debeat. Quare falsum est ἀλλοτριῶν semper significare crudam hordeaceam farinam aqua & oleo subactam, quod in εἰσαγωγῆς libello Galeno falsò attributo legitur. Neque solùm cruda hordeacea farina per ἀλλοτριῶν significatur, sed etiam Triticea. Quapropter nonnunquam ei vocem addicunt, quæ certam farinæ speciem indicat. Galenus κατὰ τὴν ἀλλοτριῶν ὄρνιθων ἀλλοτριῶν. In cataplasmate verò vtere hordeacea cruda farina. Quin & sola hæc vox ἀλλοτριῶν Hordeaceam crudam farinam significat, vt paulò post, ἢ τὴν ἀλλοτριῶν δι' ἐξυμλιῶντος γαλακτός. Aut cruda Hordeacea farina cum Oxymelite apparatus. Idem alibi ἢ τὴν ἀλλοτριῶν καὶ τὴν, ἢ πικρὴν ἐν γαλακτῶν εἰς ἀλλοτριῶν. Aut cruda Hordeacea farina, aut Triticea, in passò cocta. Neque solùm ἀλλοτριῶν de cruda Hordeacea farina, aut Triticea vsurpatur, sed vniuersè de omni cruda farina. Galenus καὶ ἀλλοτριῶν ἐπιπυθῆναι, τὸν δὲ καὶ τὸν ἀλλοτριῶν, ἢ δι' ἀλλοτριῶν, ἢ τὴν ἀλλοτριῶν, ἢ καὶ μέγιστον ἐν τῶν. Quin & omelysis ex cruda Hordeacea farina imponenda, aut ex farina seminis lini aut scæni-græci. Et hæc de Hordeo, eius farina, præparata & polenta ex Veteribus dicta sunt.

Maza.

Maza demùm ex polenta humido aliquo permixta & subacta conficitur. Et aliqua quidem, cum sola aqua subigitur; alia verò, aut cum vino aut cum oleo, aut cum melle aut cum aliquot horum permixtis. Cum aqua autem eam subigi, præter quod ex libro Hippocratis de diæta secundo satis euident fit, testis quoque est Xenophon sexto περὶ δίας Cytii, vbi hic concione conuocata, milites luos ad aquæ potione dhortatur, & à consuetis non admodum recessuros ostendit, εἰ δὲ σπῆς, ἐπὶ σῆς, ἀποστραστῶν, &c. id est, Etenim qui polenta vititatur, Mazam aqua permixtam edit, & qui pane vititur, panem aqua subactum. Subigi verò Mazam, & cum vino, ex Hippocratis libro de intern. affect. apparet, vbi in hepatico morbo, cui suffocatio accedit, & similiter in coxendiculi dolore, eam quæ vino dulci subacta est non edendam consulat. Idem mazam oleo & melle quàm maximè subactam, in typho quodam eodem libro exhibendam præcipit. Helychius verò μάζαν interpretatur, polentam aqua & oleo permixtam.

Et à principio, Athenæus ait, popularem cibum ex Alphis, Mazam Veteres vocarunt, ipsamque præparare μάζαν dicebant, postea verò necessarium victum, ob intemperantiam varietate distinguentes, studiosè que paulatim immutantes, nomen ipsum Maza in μαρτίαν commutarunt, ita appellantes omnem cibum magnificum; κατὰ τὸν δὲ ἐν verò ipsos cibos præparare dixerunt. Atque inde fortasse, quæ ex Amygdalis & Sac-

charo placentæ conficiuntur, in officinis Masse-
panes, hæc ætate adhuc nominantur.

Porro Maza, vt Galenus ait, panibus Hordeaceis agriliis concoquitur, magisque ventriculi flatu implet, in quo etiam si diutius manferit, turbationem excitat. Citiùs autem subducitur, si commixta diutius fuerit ac subacta. Quòd si mel quoque addatur, citiùs etiam ob id ventrem ad excretionem incitabit.

Zythum porro non simpliciter ex Hordeo præparatur, velut Diosc. ait, sed ex Hordeo torrefacto, ac eo modo præparato, quo Bynen præparari Aëtius docuit. Quapropter qui ζύθον ἀλφίτων πύσιν exponunt, dum ex polenta potum Zythum esse dicunt, propinquius rem designant, quàm qui scribunt, ζύθον εἶναι τὸ ἀπὸ κελῶν γαλακτός, quum neque vinum sit, sed potius quo vini loco quædam Gentes vtuntur: neque ex Hordeo simpliciter, sed torrefacto præparetur. Id demum crassiflorem in modum molitur, & certa mensura in aqua coquitur, donec omnis ex illo vis in aquam exoluatur, in qua rursus ad certum tempus & modum, flores Lupuli, quem Plin. lupum salictarium dixisse videtur, incoquantur, atque ita Cereuisia in amplum vas per colum transfusa refrigerari, & per se seruari sinitur, donec sacibus ad fundum demissis clara euadat: quo factò va sis picatis excipitur, alicubi etiam resinatis: & postquam rursus per se deseruit, bibitur. Quibusdam locis etiam triticum eodem modo paratum, ad hordeum certà mensurà addunt, & eodem modo coquant. Et talis Cereuisia ex tritici caliditate minùs frigida putanda est, quàm quæ ex hordeo solo conitit: quod nunquam secundum vllum præparationis modum calefacere, Galen. r. aliment. dicit, sed in Polenta siccate, in pifana verò humectare. Proinde in libello de conuiuiis veterum Græcorum, & hoc tempore Germanorum, omnia Cereuisiarum genera in communi refrigerare dixi, inquit Cornarius, alia plùs, alia minùs, pro Hordei, ex cuius cum aqua parantur natura. Et addidi, hæc de causa excogitatum esse, vt Triticum ad Hordeum in Cereuisiis parandis addatur, quò moderata Tritici caliditas, Hordei frigiditatem contemperet. Et ad eundem modù scripsi lib. de peste. Cereuisia etiam si omnis natura frigida sit plùs aut minùs, pro Tritici in aliquibus locis ad hordeum, ex quo cum aqua coquitur, admixtione: tamen & frigiditas, & flatuositas, & malitia ipsarum emendatur lupuli capitulorum ac florum in cocturam additione. Vnde contingit vt quantò minùs de lupulo habeant, tantò sint Cereuisiæ deteriores. Et hæc non tantùm rationem & experientiam, sed etiam Galenum sequutus scripsi. Hic enim lib. 6. simplic. pharmac. maximam in Zytho partem frigidam, & aquosam & acidam esse dicit, vt qui malos humores, & flatus gignat, velut ex putredine factus: quàmquam Hordeo ipso Zythum acriorem esse asserimet, & in acrimonia aliquid calefaciens habere. Si cui tamen Cereuisiam calidam suapte natura esse, & in Hordeo qualitatem innatam permixtam esse, & Cereuisiam per accidens, non aliter ac vinum, refrigerare placet: huic ego suam sententiam iucundam esse sino, & vt eà affirmatur indulgeo: Nec pro mea tuenda amplius quid afferam, quàm sicut Galenus scripsit, hordeum nunquam secundùm vllum præparationis modum calefacere, sed in polenta siccate, in pifana verò humectare: Ita etiam in Cereuisia, quæ ex quadam polentæ specie paratur, non ad caliditatem, sed ad siccitatem, mutationem fieri, & hæc tamen

tamen aqua fa ipsius maxima parte dilui ac temperari: nisi nimium aded tostum fuerit hordeum, vt inde & sapore, & odore contracto, bibentes Cereuisiam conquiri cogat, quod ipsos siccet ac torreat, velut non raro audire contigit. Nemo vero auditus est, qui ex Cereuisiaz potu calefcere se conquestus esset. Et hęc de communihodie parandę Ceteuisiaz modo intelligi volo: qui an quondam eiusmodi fuerit, merito ambigitur. Itaque sicut Galenus de aqua hordei, id est *mod. hordei*

potu, ab Hippocrate præscripto dicit, manifestum esse hunc litim eximere, sed præsterat, inquit, ab ipso dictum esse, quomodo parare hordeum oporteat, num simpliciter madefacere, aut veluti hi qui nunc zythum ex ipso faciunt, aut alio quodam modo: ita profecto præsterat etiam ipsam Galenum parandę Cereuisiaz modum descriptis, vt certius de ipsius temperamento iudicare possemus, sed velut omnibus notum præterit illud videtur. Et dum ex putredine factum dicit, illud intelligendum nobis exhibet, quod Aëtius de *Byne* prodidit, quod sit hordeum madefactum, quod germen emisit, quod *cymam* etiam vulgus nostrum appellare solet, & deinde vnā cum enatis ligulis: ita autem cymas siue gemina vocat: tostum est. Ergo itaque nullam Cereuisiam calidam esse sentio, sed aliam minus aliā frigidam, velut dixi. Acrimoniam, tamen in ipsis vt vitum, aliquid caloris habere, & hordei tosturam præsertim nimiam siccitatem inducere: quæ tamen aqua ipsius maxima velut dixi parte diluit. Quin & frigiditas Cereuisiaz, multo ipsius potu corrigitur, vt etiam ex potandi velut exercitio, Cereuisiaz potores incalescant, non quodd ab ipsa Cereuisiaz natura vllus calor ipsis accedat. Plin. lib. 22. in fin. vbi de frugum vsu medico egisset, ex iisdem, inquit, sunt & potus, zythum in Aegypto, Cælia & Ceria in Hispania, Cereuisia & plura genera in Gallia, aliisque prouinciis, quorum omnium spuma cute m foæmarum in facie nutrit. Nam quod ad potum ipsum attinet, præstat ad vini transit mentionem. Quibus verbis & Cereuisiaz potum in totum damnat, & natales illarum locos, & nomina in his diuersa indicat, quod ipsum etiam Dioscoricis, qui etiam *Curni* appellatum, & ex hordeo paratum potum proponit, cuius vsus vini loco sit. Et hic igitur potus non fuit alius quàm insignis aliqua eius temporis Cereuisiaz species, quæ sicut etiam hodie multæ, & caput, & neruus, & oculos læsit, & prauos humores genuit. Et tales potiones etiam ex Tritico fieri adhuc hodie in Hispania audimus, & in Anglia scimus, quæ magna ex parte è Tritico parantur, non multo lupulo adiecto, vnde etiam albidiores sunt, quàm quæ cum multo lupulo coctæ fuluiores euadunt. In inferiore porro Germania Cereuisiam non *Byne* vocant, vt in superiore & media, sed *Cont*: & simpliciter modo paratum, simpliciter *Cont* dicunt, duplicato verò, dupel *Cont*. Vnde non malè mihi diuinasse videtur Erasmus Roterod. cui lib. 4. Epigram. Græcorum sub titulo *εις ιασην*, in epigrammate Palladæ, *διζυθον* pro duplici isto zytho patriæ suæ familiari accipiendum esse visum est: melius meo iudicio, quàm qui pro vocibus *διζυθον* & *διζυθον*, corrigendum arbitrantur *ζιζυθον* & *ζιζυθον*, & de ziziphis fructibus accipiunt, quos iuiubas Officinæ vocant.

Porro quod Dioscoricis de zytho dixit, *ζυθος* & *ζυθος* *εις ιασην* & *εις ιασην* & *εις ιασην* & *εις ιασην*: & nos reddidimus, sed & ebur zytho maceratum tractabile euadit: hoc Plinius non de ebore, sed de animali ele-

phante intellexisse putatur, dum lib. 8. cap. 7. sic ait. Capti elephantum celerrimè mitigantur, siue, vt vulgata exemplaria habent, mitigantur ordei succo. Ego tamen ebur Cereuisia macerari ab his qui pectines, & denticalpia, atque alia instrumenta ex illo faciunt, cognoui. Nec de zytho aut Cereuisia dixit Plinius, sed de hordei succo, qui alio modo ex illo parari potest, vt non ad hunc Dioscoricis locum respiciens id dixerit, quem de ebore, non de elephante animali dicere, credo his qui per experientiam testantur, & Plutarcho, qui id confirmat in libello qui inscribitur, An malitia sufficiat ad infelicitatem. Quod verò elephanti sine inducere zythum Dioscoricis dicit, id etiam in vino Syctice læpetic.

Maltum à Recentioribus nuncupatum, Dodonæo teste, ex hordeo quoque fit. Nam ipsum hordei granum est, primum donec intumuerit aqua maceratum, quod deinde germen emisit, ac postmodum cum ipsis germinibus siue enatis ligulis resiccatum est. Resiccatur autem frequentissimè ignis calore, quem ad hoc constructus fornax per exigua spiramenta admittit: raro verò absque ignis subsidio, idque non nisi æstiuis mensibus vigente æstu, cum in tabulato, eminentiore loco perfato, tenuiter sparsum, septies per diem vertitur. Nostri *Mout*, Germani *Malz*, Recentiores *Maltum* voce à Germanis mutuata appellat. Aëtius Græcus Medicus, hordeum hoc modo præparatum *βηλα* nominat. Ad Bera siue Cereuisiaz decoctionem conficitur, & laudatissimum quidem Martio & Aprili mensibus. Qualitatem habet siccam quidem hordei intensiorem, frigidam verò multò remissiorem, præsertim quod ignis calore tostum ac resiccatum est, nam *επιμοσυν*, quod illi ab affatione diutinæque tostione inheret, siccitatem eius intendit, ac frigidam non solum remittit, sed & qualitatem quandam calidam ei imprimat. Quod verò æstiuis caloribus resiccatum, minus quidem calet, tamen & ipsum hordeo calidius vel sola germinatione redditur, quæ absque leui quadam putrefactione, ob alienam humiditatem, non succedit. Putrefactione autem caliditatem multis accedere, satis notum.

Galenus lib. de aliment. facult. hordeum ait; quoquomodo quis eo vtatur, siue pisanam coxerit, siue polentam fecerit, vim quandam refrigerantem retinere, verum id de Malto non videtur intelligendum, quod vel germinatione sola, deinde & tostione, si accesserit, magis à natura sua recessit, quàm Polenta, quæ vel ex crudo nondumque maturo hordeo, vel in aqua macerato tantum, vt diximus conficitur. Abstergit præterea & *Maltum* hordeo potentius, minus lentoris habet, cum quia farinæ minus, Siliquarum verò plus habeat, quàm crudum hordeum: tum ab inherente illi non nullo calore, partim à leui illa corruptione, partim ab empyreumate, qui absterfionem coniunctam habet. Ventris torminibus aliisque similibus ex frigida causa doloribus *Maltum* subuenit, tostum seruensque in sacculo appositum. Cataplasma ex *Bynes* farina tumoribus hydropicorum vtiliter, Aëtio teste, imponitur.

De Bera siue Cernisfa.

Beta ex Malto, & Lupuli salicetati floribus, modo, proportionèque certis, aquæ dulci permixtis, coquitur: & simplicissima quidem ac propriissima talis est. Proxima, quæ Triticum, Zeam, aliàsve fruges, vnā cum Malto hordeaceo admittit. Quæ verò præter fruges, herbas, semina, flores, arbor-

*Maltum**Maltum*
*Mout**Qualitate*
*sicca & frigida**Vites*

mata, aut alia huiusmodi caput impletia, ac ebrietatem inducentia, à frugum natura aliena, permixta habent, compositæ quædam Bera, siue Ceruisiæ sunt ac medicatæ, ab hordeacea, Triticæve Bera & sapore & qualitate dissidentes.

Nominat. Nominant autem huiusmodi ex frugibus potum cum Germani omnes, tum Britanni reliquæque Septentrioni subiacentes gentes, communi quidem ac patria voce, *Biere* siue *Bere*. Latina autem passim *Ceruisiam*. Veteres verò ex hordeo potum variis nominibus appellarunt: & *βίβρον* quidem *βίβρον*, id est. Vinum hordeaceum, ex hordeo omnem compositum Græci. Eundem Aristoteles, Athenæo teste, *βίβρον* dixit: alii *βύβρον*: veluti Sophocles in Triptolemo, & Hecateus in Eutopæ periodo, ubi *Προνος βύβρον* ait bibere, ex hordeo, *βύβρον* verò ex Milo & Conyza. Hellanicus tamen non solum ex hordeo, sed & ex radicibus fieri *βίβρον* asserit: Bibunt, inquit, ex radicibus *βύβρον*, veluti Thracæ, ex hordeo, Aegyptii hordeaceam potionem, *βύβρον* siue *βύβρον*. Theophr. ait, appellant. Idem testatur Plinius lib. 22. Ex frugibus, inquit, potus, *Zythum* in Aegypto, *Celia* & *Ceria* in Hispania, Ceruisia & plura genera in Gallia, aliisque Prouinciis. Quos lib. 14. nominibus quidem aliis, sed ratione eadem confici tradit. Diodorus Siculus, Zythum non in Aegypto solum, sed & in Galatia quoque fieri asseruit. Tanta est (inquit de Galatia scribens) aëris frigiditas, vt neque vinum ea regio, neque oleum, producat, quare coacti homines potum sibi ex hordeo componunt, quem appellant Zythum. Dioscorides vnum hordeacei potus genus zythum: alterum *Curmi* nominat.

Phoucas Zythi. Simeon Zythi ex posterioris ætatis Græcis, huiusmodi potionem Arabico nomine *φουκας* vocat, alii *φουκας*, siue *φουκας*: Arabibus tamen, Phoucas non ex hordeo tantum potus est, sed etiam, veluti Rhafis scriptum reliquit, ex pane *Heueri*, hoc est, Sumilagineo, Mentha, ac Apio compositus: ac, vt Hah Abbas testatur: quædam etiam Phoucas ex pigmentis, aut ex malorum puniceorum succo conficitur. Hæc autem omnia siue similia sint genera, diuersis appellata nominibus, siue proprietate aliqua discrepantia, cum Beta siue Ceruisia nostra in eo conuenire possunt, quòd ex hordeo ac frugibus componantur, preparatio: omnis tamen modo, vel alia qualitate aliqua ab ea fortasse differant. Nam si zythum, vt Galenus ait, lib. de facult. simpl. medicam. ex putredine proveniat, aut ex frugibus fiat aqua madefactis, donec resoluantur in liquorem vino similem, veluti Hermolaus Barbarus in Corollaris scribit: ac acre malique succi sit, renes & neruos tenet, quæ à Dioscoride ac Galeno quoque ei attribuuntur, cum Beta siue Ceruisia nostra nequaquam conuenire potest. Nam Beta ex fruge non fit putrescente, multò minus ex eà in liquorem resoluta, sed ex hordeaceo Malto, vt diximus, coquitur, ab omni putredine asseruato. Est & Beta per se suavis, dulcis, ac boni omnino succi. Quæ certè Bera à zytho, cum conficiendi modo, tum facultate dissidere ostendunt. Vni autem zythum non eo, quo Galenus, aut Hermolaus tradunt, conficitur modo, sed ex hordeo ac Tritico fiat leuiter tantum putrefactis, ac à natura sua commutatis, vt Theophrastus scribit, zythum & Beta simillima sunt. Nam hordeum in Malthum transiens, leuiter quodammodo putrescit, & à natura sua recedit. Verùm tum Galenus, Dioscorides, & qui deinceps eorum sententiam ac doctrinam insequuti sunt, minus rectè zythi facultates cognouisse videbuntur. Propter idcirco hanc et tenim putrefactionem siue mutationem, hordeum, aut ex eo potus, mali succi statim fieri non potest, non minus quàm Polenta, quæ ex non recente hordeo, sed ex maturo & sicco in aqua macerato conficitur. Siquidem & tunc leuiter quodammodo hordeum computrescit, humoremque alienum imbibit, veluti dum Malthum futurum est. Polentam tamen hanc ob causam, neque Galenus ipse, neque Veterum quisquam, mali succi fore asseruit, sed contra omnem boni odoris, suauolentemque esse, sicuti & Malthum ritè confectum est. Zythum autem, siue *βύβρον*, ex hordeo & Tritico conficitur leuiter putrefactis, Theophrast. lib. de caus. sexto, ubi de saponibus agit, his verbis tradidit. Nonnullos verò, ait, naturam commutantes, & leuiter putrefaciunt, in succo cogimus, ad bibendum idoneos, veluti qui vinum ex hordeo ac Tritico conficiunt, quod in Aegypto *βύβρον* appellatur.

Cæterum vt ad temperiem Bera veniamus, pendet ea ex qualitatibus eorum, ex quibus componitur. At materies eius, vt diximus, sunt, aqua, Malthum hordeaceum, subinde Triticum aut zea, & Lupuli salutaris flores. Aqua quidem simplex cuiusmodi ad Bera decoctionem sumitur, frigida est & humida: Malthum enim exigua caliditate resiccatur & abstergit: Triticum ac zea temperatè calida siccatque sunt: Lupuli flores securò ordine calefaciunt, resiccantque, caput tenent, vrinam mouent, abstergendi quoque, ac aperienti potentia præditi. Faciunt hi ad Bera cum sapore, tum duritatem, fruges verò aliamentum materiam huminisstant.

Ex horum autem varia & inæquali mistura, diuersa Bera genera, dissimilibus qualitatibus prædita, sunt. Tenuis quædam, potentes alia, rubicunda, siue nigra hæ, candida illa, amara pleraque, dulciores nonnullæ. Quæ frugum plurimum admiscerunt, potentiores sunt: quæ minus tenuiores: minimùm tenuissima. Ex hordeaceo Malto, diutius tolli, rubicunda, & præsertim si diutius decoctio accesserit: præcipua autem parte ex zea ac Tritico confectæ candida sunt, lenescensque tenue & aquosum vintum substantia tenuitate quodammodo referunt: amariore capiteque citius tentantes, Lupuli flores copiosius incocti efficiunt, dulciores eorum parsimonia: fruges enim ex se dulcedinem conferunt. Inter has tenuissima, frigida quidem est & humida, superante in ea aquæ qualitate ac substantia, non tamen altius caliditatis expeis. Potentiores caloris plus habent, cuius etiam vi atque potentia, in vasa condita non secus ac mustum fluctuant ac effervescent, minus tamen quàm mediocriter vinum calidæ, à quo non solum temperamenti caliditate, sed & tenuitate substantia superantur. Calefactio siquidem Bera clemens mitis que est, Alimentum autem præstant illa quidem exiguum, aut nullum, hæ verò copiosius, copiosissimum potentiores: omnes prohi succi, si ex bonis frugibus & bene decoctæ fuerint. Crassiores circa præcordia aliquantisper hærent, tardèque descendunt: candida, tenuiores & citius digeruntur: amara absterfione alium leniunt: medice, medio se modo habent.

Compositæ Bera, quæ videlicet præter fruges ac Lupulum, & alias quædam herbas, vel flores, semina, fructus, aromata, similiaue recipiunt, pro qualitate eorum quæ admiscerunt, varias qualitates ac facultates obtinent, subinde etiam noxias. Recens Beta quæ nondum subsedit, non secus ac mustum

mustum, vicia complura gignit: inflationem parit, alium conturbat, calculum procreat, ac vniq̄ sepe numero stillicidium excitat: foris tamen admota, nervosarum partium dolores sopit, si dulci calenteque ea foucantur: præstat ad hoc recentissima, & cui nondum Lupulus incoctus est, ac inter omnes potentior. Acida nervos & renes tentat, ventriculum conturbat, ac vitiosum in corpore succum gignit. *Acerum* quod ex Biera conficitur, vini aceto minis acie, minisque potens est, nec partium adeò tenuium. *Haltenus Dodonæus.*

De Biera siue Cereuisia diuersa compositione, Lobelius in Aduerfariorum altera parte sequentibus verbis egit. Vniuersa Britannia ad hordei præparationem quam *Mauch* siue *Malt* vocant, solo ferè hordeo spica mucilâ vitium, idque polysicho ad Cereuisias Britannicas suauissimæ & optimas præfert, quæ qualibet Septentriionales bonitate longè superant. *Mauch* autem inhi paratur, hoc qui sequitur modo. Hordeum maceratur aqua biduo & tribus noctibus: deinde effusa aquâ in horreum acernatur loco ventis minis permio, quoad germen perpullillôque radicem citros & pullulationes (quæ hyeme tardius, vere & æstate biduo aut triduo,) emiserit. Mox prius quam incalcescat sulcatim dispersum, sequispalmarum densitate, ter quaterve die & nocte subuertitur aperto aëre: quod octo vel nouem dies continuo iterando perficitur. Tandem in tabulato percluso, igne subdito vel aptato fornaci vimineo, texto calatho acuminato, & superstrato hordeo, igne lento è palea, cremis vel arido ligno admotio fornacis ostiolo, sequispalmarum intervallo ab imo interposito, exiccatur, quoad molis strangi queat, sicque extostum *Mauch* in fornacis capacitatem deicitur: quod ex qualibet hordei mensura ad quartam partem accrescit, & antiquum bonitate, in zytho componendo, nouum præcellit.

Biera siue Cereuisia, Nortmannis & Gallobelgis *Biere* & *Ceruise*, Anglo-Britannis, & Germanis, & Belgis *Bier* dicitur, compositio, recipit Malthi mollis leniter contriti modios Britannicos octo, cui superfundæ aquæ fluuialis limpidioris feruentis, in qua aliquot manipuli fursuris Triticeï incocti fuerint, quantum satis implendo dolio Aureliano aut Aquitanico & semisse. Exactè mixta, infusa calidè per septem horas: deinde foraminulo palea aut duplicato fundo apto subterfiant. Id quod transmissum est [Belgis & Anglo-Brit. Wort vocatur] recoquitur semihoram, sequispalarum, vel aliquot horas, vt melius conseruetur, adiectis vnc. 12. florum Lupuli salictarii: mox longo latèque lacu, vel depressis labris vix pedem altis, perfriuerantur. Et huius decocti frige facti libris octo vel decem fermenti siue facis Biera vel Alæ potentioris libra aut sequispalarum adduntur, exactè agitanda, loco tepidioris permiscuntur, stragulis operiendo, sensimque reliquum liquorem, vt commodè fermentescant, affundendo. Quibus absolutis transfcolantur: vasa adimplentur: demumque fermentatione absoluta, exactissimè decluduntur. Eisdem Maltho nouam affundunt feruidam, transfcolant, eoque Cereuisiam tenuem concinnant.

Variis è frugibus, Tritico, hordeo, zea, Auena fit Malthum, quod ratione conficiendi, Biera colores immutat. Triticum & Polystichum, supra coctum & excoctum potissimum, rubicundam & subfuscam Cereuisiam efficit. Hordeo disticho, Auena, zea, tritico, commixtis quinvis vel

senis libris fatinæ fabacæ, albida & limpida rediditur. Malthi hordeacei partes duæ aut tres, Auena & Tritici ana pars vna, fumuntur: fatinæ fabarum quantum Tritici quarta pars, aquæ quantum satis, pro tenuitate, & efficacia Biera futura.

Cereuisia, à Cere dicitur, siue *Biera* Teutonice & Anglo-Britannice omnium suauissimæ & saluberrimæ, calidioribus regionibus vtilissimæ & conuenientissimæ, parandi ratio exactissima & largissima, Anglo-Britanno vernaculo, à C.D.I. Coys Plantarum peritissimo accepta: recipit Aquæ fluuialis [densiores, pinguiore, stagnantes aut puteales aquæ ex terræ argillosæ venis manantes, limpida putealibus scaturiginosisque ad pinguiore concinnandas Cereuisias longè vulgi opinione, præferuntur. Fontanas tamen ex scatebris emicantes, & fluuiales fluentes cum Lobelio eligeremus, sanitati tuende, auctâ frugum dosi] Galones 40. feruescat, sine tamen ebullitione [In quibusdam regionibus ebulliunt aquam ante Malthi infusionem & macerationem, superaffusa Galoni mensurâ vnâ aut altera frigida, ne illic Malthum excoquantur aut supra modum conseruescat, excandescatve, crustulâque retortidas contrahat.] In parte eius tertia [Hæc obseruantur quoties Malthum retorsit. Conuenientissima est alioqui feruidior aqua, Maltho minus arido, aut humidior.] infunde & macera [Experientia constat Malthum commodè immitti aquæ, quàm aquam Maltho affundere. Lobel. Intodium vnum optimi Malthi, molis vt ut triti: sine conseruescere per horam integram in cupa aut paulò plùs: tempore hoc exacto, liquor Wort Britannicè & Belgicè vocatus, percolatur in vas commodum, foraminis cupæ fundi obice, vt mox dicitur, referato. Et inter colandum, feruescat alteram tertiam aquæ partem, modo supradictò, & percolato liquore horæ spatio, affundatur. Si autem maiorem Cereuisiæ quantitatem parare velis, eamque potentiorè, primam colaturam feruescat, [affusa Maltho percolato secunda feruida aqua] additis vncis quatuor florum Lupi salictarii, per totum tempus iterate in fusione secunde Malthi, hoc est, horæ aut sequispalarum spatio. Colantur deinde per fetacum & in lacu refrigerantur. Wort non excedat pedis altitudinem in lacu, ætate potissimum, hyeme superare licet, quo refrigerato æstivo tempore, [hyeme tepidulo] sume huius colati Wort sufficientem bonam quantitatem in vas conueniens, prædictæ pedalis aut sequispalaris altitudinis exceptam, cui lib. 8. aut vnc. 8. optime spumæ, siue fermenti Cereuisiæ, Britannicè *Yeast*, Belgicè *Gyst*, & Gallicè *Gy*, diluti & permixti in alio vase siue vrceo, triplici aut quadruplici mensura prædictæ colaturæ Wort: fermentescere sinito, donec ebullitione & effluentiâ vrceum superet, effundaturque in vas colati Wort vocati, liquoris. Post Spumarum fermenti in vrceo permixti effusionem in prædictum colatum liquorem, in quo vrceum conditus est, ebullitione & fermentatione totum colamen spumis vndantibus operiens, affundè sensim, ne ebullitio interpellatur, reliquum colatum liquorem, & permisceantur. His peractis, sine iterum conseruescere, donec sublimè plùs satis efferantur spumæ [elevantur siquidem pedali sæpe mensurâ] & potus saporem similem colati liquoris acquirat, nullo tamen modo acrem, quia Cereuisia citius a corem saperet. Vasis demum impletis & post sublimationem oclusis, conseruetur Cereuisia. Doliare vas in quo Malthum infunditur, capacitatis sit Dolii Aureliani, plùs minùs, pro ratione quan-

Cereuisia
Teutonice

vitatis Bieræ futuræ, duplici fundo donatum, vtroque maiusculo foramine perusto. Longior & validior fultis, stramine, aut sæno tortili circumvallatus foramina permeat, sed in unum fundi foramen arctius, obicis vicem supplens, referans & claudens, ad liquamentum (wort vocatum) percolandum, & in alta vasa traiciendum. Superior autem fundus sit multis foraminibus peruius. Vinctis cistis longioribus, cilicii loco, Malchiliquamem separant Belgæ. Si tenuem cupis Cereuisiam, (quæ vulgò zikiuo tempore delectatur) vtrumque primum & vltimum commisce colatum liquorem siue liquamentum: feruefac addita f. q. horum Lupi salictarii, ex arbitrio: & omnia perage, vt dictum priùs. Tertiam & vltimam aquæ feruentis partem superfundito Malcho, ad omnium tenuissimam Cereuisiam: maceretur per duas horas: & eadem vt priùs præstat.

Cereuisia tenuis.

Cereuisia Martia.

Cereuisia Martia vegetans, maxime in alens: per hibernam, in annum & diutius perdurans, recipit Malchi recentis molis tritici modios 12. Auenæ Modium semissem, pisorum aut Fabarum & Tritici tritorum, ana tantumdem, Aquæ q. f. implendis tribus dolis Aquitanicis aut Burdegalesibus: duobus vegetante Cereuisia, & vno viribus tenuiore. Feruefac tertiam aquæ partem modo supraddictò: infundantur donec aquæ pars secundæ tertia efferverit, & infusioai sit parata. Tum primo Malchili liquamento percolato, & in aliud vas & refrigeratorio lacu traiecto, exactè simul percoctis sine defecatione ex lib. 4. Lupi Salictarii: optimèq; tandem per semihoram depuando percoctis, & in refrigeratorio lacu traiectis, iterum affundatur Malcho secundus liquor siue Liquamen wort vocatum, quoad tertia altera pars aquæ efferverit, quod horæ aut circiter spatio perficitur. Hac ratione aquæ efficax erit illud secundum wort ac primum: Denique vltima aquæ tertia parte feruefacta, detracto liquore, affundatur Malcho tertiæ & vltimæ vice ad ignauioris Cereuisiæ præparationem. Martia efficacissima Cereuisia ante sex menses non est portionibus apta. Perfrigerato primo liquamine wort permiscetur lib. duabus Spumæ Cereuisiæ, & vuc. r. pul. Caryophyllorum: Exactissimaque fiat fermentatio citato modo.

Primæ nobilitatis Anglorum Ala suaui & vinei saporis portio, recipit liquamenti Malchi vernaculè wort, libras ducentas, florum Lupi salictarii M. 2. quò Malchi dulcè & inspidum saporem exuant. Percoctis & transmissis sensim commisceantur [vt suprà monuimus] facis Bieræ vel Ale libras tres, & Grant Anglorum (Belgæ Waerbier vocant) libras sex vel octo. Graüt autem sit hoc qui sequitur modo: Farinæ Malchi lib. 6. vel octo: aquæ feruefactæ lib. 12. vel 13. que agitata & probè sexies die remixta temente camino, stragulis operto, & palca condito, nitido vase tamdiu macerantur, donec Serapii lentorem assequantur. Tunc igne, sedulo verlando ne vrantur, ad pulvis solidioris crassitiem percoquantur. Reconditur etiam hodie, per ebullitionem siue fermentationem adhuc spumans in lapideis phyalis, oris angustioris, subterno operculo exactissime oclusis, & decussatim funiculo, ne exiliat, vt sæpè fit, arctissimè ligatis. Sapore admodum vinoso, gratissimoque, palatum & nares feriente: Non desunt qui Cereuisiam, eadem lege & ratione vini instar asseruant.

Anglorum Ala.

Ala Anglorum à priuati cradit. Siderur.


Quantum ex prisca Plinio & Dioscoride coniecturam facimus de Zitho & Curmi portiones

Cereuisis nostris proximas, nec dubiè designasse videntur: præsertim Alam, quæ vini vicem antiquitus supplebat Britannis: quorum ipse Dioscorides meminit, referens nialum succum gignere & neruos rentare: quibus idem quod nobis, euenisse potuit, potissimum plebi & Anglo-Britannicæ rusticæ turbæ, cui adgula delectamenta potentiorum Alamè cauponariis expetenti, inexcusabilis quaestus gratia, illà ex Malcho luxuriosæ aquæ vice macerato, imponitur, sic enim magis compositam & grano potiorum ementitur; caput ferit, letamque opilionibus, colonis & nauderis stultitiam conciliat. Nec desunt nonnulli in explebilibus nummorum vasti homines qui Bieræ pro Lupuli floribus camini fuliginem substituunt, aqua salia malchum macerantes, vt eo plus sitiantur Bieræ, quò plus sint potæ. Harum potionum & consimilium assiduo usu incommoda Dioscoridi memorata percipiuntur: quæ non possunt sine hepatis & viscum summo dispendio assumi, Cerebis & neruis inde affectis & sanguine exusto, sit tuberculorum in facie & naso, vt in elephantiorum, eruptio, inde apud Anglo-Britannos in hunc vsque diem locus peritro elogio, *Assistit sibi faciem & nasum rubrum, tuberosum commendatoris Ala.* Maxima igitur in Cereuisia varietas; pro ratione, quantitates frugum, amixtionis, compositionis, varias qualitates sortita. Germanis & Belgis Gentiana, Bacce Lauri Zeduaris, Gagghel/ Helenium, Lauendula, Salua Hormini flores, Cuculus siue Cueubalus Indanus, [quem insanum seu furiosum Solanum faciunt] Chamæpytis, Coriandrum & consimilia unà cum Lupulo incoquantur.

Limpidior, vegetior, benè defecata Bieræ, cuius quidem faciendæ rationem docuimus, vt calidioribus innotescat regionibus, & penuriâ vini, eius vicem supplere possit, suaui & salubris est portio, alimentum bonum præbet, modò probè & ex optimis frugibus paratur & percoquatur. Tenuis autem quæ grani minus, plus aquæ recipit, humectando refrigerat, minusque alit. Ac inde malum succum gignit: renes, neruos & caput, tentat: tormina, inflationes intestinorum, quemadmodum & recentior epora, stillicidium vrinae, crassum succum, calculum renum & vesicæ patit. Luteriana crassa, dum recens pessima. Additur Lupulus Bieræ vel Ale duplici ratione: cum ob laporem & conseruationem, tum quia crassum succum Zithon procreare literis prodatur, cuius erratum & noxam emendaret, aperiendo abstingeret, per vrinas crassa pituitosæ excrementa venarum, renum, vesicæ, citra magnam calfactionem educeret: docemur enim à Mesuro in Syrupo è succo Lupuli & Byzantino, alijque Neotericotum compositionibus Lupulum, non secus ac Fumariam, sanguinem purgare & defecare, eiusque ebullitiones compescere: iccoris intemperiem calidam, internoque fetores, febresque biliosas & pituitosas acere: Quem eundem effectum præstant turiones siue Alparagi vere erumpentes, cibo & acetariis. Floribus tamen, quia temperatè calidi, secus euenit, vt de coriandro monuimus Aduersariorum pagina 314. Quod caput feriant, è Cereuisia non reiciendi; neque illis causa rheumatismorum & articulorum defluxionum, vt nonnullis doctis Anglo-Britannis perplectat, attribuenda: sed potius ingluuies, crapula, mollicies, blanditiis, & gylæ oblectamentis quibus sunt dediti, acerbere debent: quia Ala ipsa potentior, sine eis aut.

eis, aut Lupulo paxillo concinnata, non secus ac vinum, abditissimas permeat cerebri membranas, eademque infert incommoda. Lupuli flores non nocent qualitate, sed quantitate, quemadmodum vinum & optima quævis temeta.

HORDEVM DISTICHVM.



Betuiore culmo est Hordeum, quam vel Triticum vel Secale, foliis latis, spica longis asperisque horret arifis, quæ singulæ è singulorum granorum capitibus exe-runtur; grana verò gluma tenui simplici clauduntur, quam nullà tritura deponunt, nisi vel molarium confrictu, aut facculi asperioris, calidà prius macerata, aut deni-

que pilâ. Cæterùm quod hic distichon nominamus, duos habet granorum versus, quibus tamen interiecta & aliorum rudimenta, sed quæ nihil sūt aliud quàm inuiles glumæ.

Gefn. coll. & hort. *Hordeum*. Trago *Hordeum alterum* siue exiguum. Dod. gall. *Hordeum paruum* latin. *Hordeum distichum Galaticum* Columella. Ruell. *Hordei alterum* genus: ad hoc reducendum putat trimestre illud *Hordeum* Gallis *Secourge* dictum: erroris autem eos accusat, qui genus hoc *Orizam* asserant.

Lobel. in Advers. *Hordeum*, (nonnullis visum *Siligo Vernum*. Obf. p. 15. *hordeum minus* Vere ferendum, *Hyemis impatientissimum*. Eid. Adu. altera parte, *hordeum distichon*, Gallobergis *Pammelle*, Germ. *Hein gerst*, id est, minus hordeum, siue Britannis *Borealibus Common barley*: Martio, Aprili, & initio Maij duntaxat feritur, hyemis quippe & frigoris impatientissimum: vniuersâ sui parte gracilius, cubitum & sesquicubitum raro superat.

C. Bauh. Phyt. & p. in. *hordeum* 3, siue distichon: quod spicâ binos ordines habeat. Plin. *hordeum distichon* Galaticum Columella. *hordeum Cantherinum* Ruellio. *hordeum minus* Trag. *hordeum distichum*, Fuchf. Tur. Dod. in Diosc. Lob. Lugd. cui & æstiuum & trimestre minus. *hordeum* binis versus Matth. Cam. *hordei alterum* genus, Caf. Keisb. Germ. *Sommer gersten / winter gersten / Flein gersten*. B. Zoomer gerst. Gall. *perit orge* & *orge mûde*, *orge à deux raves*. Ital. *orzo*. H. Cenalla. Angl. *Barly*.

HORDEVM POLYSTICHVM.

CAP. XIII.

Inconditi & multi sunt Polystichio seminum versus, quorum si quis ordo, ad Hexastichum accedunt.

Tom. II.

Trago germ. *hordeum* alterum siue polystichum: Lat. *Hordeum* siue maius, quatuor, sex & octo versus. Ruell. *hordeum* binos, ternos, quaternoque, item & quinos spicarum versus continens. Lobel. Obf. p. 15. *hordeum polystichum*, Autumno ferendum, Eid. p. 19. *Siligo Tragi*, *Olyra Dioscoridis*: In Advers. *Olyra*, *Siligo Tragi*, seu *Far candidum*, *Olyra* quæ *Zea Herodoto*, *Triticum amylenum*, non *Siligo* vel *Setanum*, vt nonnulli putarunt. Existimo *Lobelium* nesciuisse quid scriberet, quia *Tragus* non eandem constituit plantam *Siliginem* & *Far candidum*, sed diuersas: nec etiam demonstrat quam plantam intelligat. Dod. Gall. *hordeum* quatuor vel plumbus versus. *Hordeum maius*: Lat. *hordeum polystichon*. Tabern. *Hordeum* polystichum hybernum. Hoc hordeum bene representatur effigie *Lobelij* in Icon. plant. p. 28. exhibita, sub inscriptione *hordei*.

C. Bauh. pin. *hordeum* 1. [ita etiam phyt.] siue polystichon hybernum. *Hordeum Brunfelsii*. Marthiol. Lac. Gef. hort. Lobel. Dodon. Lon. Cast. Caf. Ger. *Hordeum maius Tragi*. *Hordeum polystichum*. Fuchf. Tur. Dod. Gall. [cui & *hordeum cantherinum*.] Lugd. Tab. *Hordeum primum* Ang. *Hordeum secundum* hycmale, Cord. in Dioscorid. *Polystichum* dicitur quia in multos versus spicatur: est enim differentia in spicarum forma, magnitudine & granorum numero: quoddam binos, quoddam ternos, quaternos, quinos, cùmque plurimum senos versus habet: sic aliud rotundius & minus, aliud oblongius & maius, aliud candidius, aliud nigrius.

Keisb. πολυστήν, Germ. *Wintergersten / Grosse gersten*. Belg. *wintergersten* / Gallis, *grosse orge*, *orge à plusieurs raves*. Nomina linguarum

HORDEVM HEXASTICHVM
POLYCHRYM.

CAP. XIV.

Betuiore sed thoro fior Hexasticho spica, senis granorum versus constans, inter quos & palca inutiles breui mollique acuta donata intereurrunt: at solidiorum granorum gluma in valentulam, asperam, longamque arifam faciecit.

An Cordo in Diosc. *hordeum* sine tunica, *hordeum Italicum* & *Romanum*, hord. hexastichum: si glabrum suum, de quo in Hist. tractat, intelligit, cur vocat *Hexastichum* quod non magis siue tunica, quàm distichum erat appellandum.

Ruell. *hordeum hexastichum*, *Cantherinum* quorundam. Trago, *hordeum* cum sex ordinibus. Dod. Lat. *hordeum* sex versus, *ἑξαστήνην*, *Cantherinum* Columella.

C. Bauh. pin. *hordeum* 2. (& phyt.) siue polystichum vernum. *Hordeum* senis versus. Marth. Cam. *hordeum* Septentrioni notissimum πολυστήνον, Lobel. Obf. *hordeum polystichum vernum* Lob. Icon. *hordeum polystichum æstiuum*, & *hordeum* trimestre polystichum Tabern.

As hordeum sine tunica Cordo:

HORDEVM DICTVM GERMANIS ORIZA.

CAP. XV.

Quanquam culmo, foliis, geniculis, cum hordeo vulgari conueniat, ex spica Descriptio
N n 4



tamen euidens
cuiuslibet differe-
men, est enim
lato-compressa
duobus ver-
sus constans,
granorum hor-
deaceorum,
habitiorem,
paleaceo corti-
ce, grano ad-
herente clau-
sorum, quorum
singula in lon-
gam asperam-
que aristam de-
sinunt: inter
geminis hocce
versus duo alij
versusq; id est,
quater gemini
intercedunt, pa-

leacci, nullum granum continentes, mollicellis
& breuib; aristis donati.

Columella
Far candidum Tra-
go
Trag. re-
prob.

Hordei genus hoc, Germanicam Oryzam Tra-
gus appellavit, iudicavitque nihil aliud esse,
quam Columellæ Far candidum, Tragum fru-
mentaceum Dioscoridis. Habet autem lib. 2. cap.
2. figuram ineptam sub titulo candidi Farris.
Celsus ubi de Faris & Trago, quod nomen, ut &
ipsa figura, non videtur ad dictum caput per-
tineret. Cap. 22. vocabat Farris genus & Venucu-
lum album.

Zea genus
Dod.

Dodonæo hist. Frumentum & Lat. in sol. consen-
tancum videtur ad Zeam referre Oryzam Ger-
manicam à Trago nuncupatam. Tragum autem,
Farris speciem & Tragum cerealem existimantem,
reprehendit, ut qui veritatem assecutus non sit.
Tragum namque rem factitiam asserit, ac subdit:
Olyra autem magis similis Oryza hæc Germani-
ca est, quæ à Dioscoride Zeæ generi adscribitur;
aut Plinii Santalo, Farris Gallici specie, nitidissi-
mi grani: illic Brance, ait Plinius, vocant: aut
certè Farri Clusino, quod fortè idem cum Plinii
Santalo est: utrunque enim candidum, & Clusi-
num, à Clusio dici potuit: oppido transpadanæ
Italia, quæ aliàs togata Gallia nominatur. Si
quid repugnet, quominus hæc Oryza, vel Clusi-
num, vel Olyra sit, sola vtrique erit vernalis satio.
Nam Olyra & Clusinum Far, ex hybernis semen-
tibus sunt. Ad eò certi, de plerisque frumentaceis,
definiri nihil potest: cum propter Veterum i-
pso-rem breuitatem, cum frumentorum appella-
tiones, aut diuersas, aut sepe numero, confusas
eandem rem aliis aliter subinde appellantis.

Santalo
Plin.
Aut Farri
Clusino
similis.

Frumenti
barbati ge-
nus.
Dod. re-
darg.

Ruellius Farris Gallici, siue Frumenti Barbati ge-
nus quoddam esse ait, cuius gramen candidius,
ac spica minoribus aristis circumuallatur, quam
Locularis, quod, inquit, Clusinum putatur: illud
autem an simile sit, vel idem cum Oryza Germa-
nica, expendendum est. Hæc Dodonæus, qui præter
sententiam Tragi, Oryzam Germanicam Zeæ
speciem facit: quam obrem cum planta ei inco-
gnita fuerit, eius de nomenclaturis opinionem
probare non possunt.

C. Bauh. pin. Zea 5. (3. phyt. ubi est Zeæ genus,
Oryza dicta) siue Zeocytion, seu Oryza Germa-
nica: ut & Trago (cui & Tragum cereale & Far
gallicum, & frumenti barbati genus Ruellii vide-
tur. Olyra Aduerf. Far, Celsus ubi de Faris, Cast. Ty-
pha Theophrasti, Tab.


Locus &
Tæpus.

Semen habui primò Sturgardia nomine Keiß-
famen, quod farum in horto Ill. E. C. Monbelgar-
di descriptam produxit. Oryza Germanica, quæ
ex æstiuarum, siue trimestrium numero est, dicitur
apud Mediomatricas cum aliis trimestribus
seminibus lætissimis agris coli.

Tradunt Oryzam Germanicam in cibo vsur-
patam aluum emolliere, rursus Oryzam illam pe-
regrinam, aluum supprimere. Vtilis autem ger-
manica ad multa culinæ opera, laudaturque præ-
ferriim ad pultes, ob albedinem: cibus admixta
ori grata est: cum lacte oryzae modo decocta, pro-
bè alit, teste Dodonæo.

HORDEVM NVDVM, SIVE
Gymnocrithon.

CAP. XVI.



Hybridam
dicam Gym-
nocrithon, cu-
ius spica Hor-
deaceam imita-
tur, horrido a-
ristarum barbi-
tio: at verò gra-
na ruffescentia,
vtrinque acuta
vnâ facie sulca-
ta aduersâ par-
tis mucrone
germen longius-
culum ostentâ-
tia, gluma sim-
plici obuoluta,
leui etiam digi-
torum attritu,
faciliùs quam
Triticæ, exi-
liuifit: quis au-
tem versusum ordo obseruari possit, quatenus ii vi-
deri possunt: porro folium latum, multum, cala-
mos amplectitur.

Trago, qui tertiam Speltæ speciem asserit:
Xyd. hoc. h. e. Halica, & Far adorum Columellæ
esse videtur, eiusdemque Venuculum rutillum,
quod Germ. Kern vocat. Dodonæus contra Far-
ris speciem esse negat, nec cum Chondro aut A-
lica, ut pote rebus tacticis conuenire statuit. Zeis
autem annumerat, Zeopyrumque quoddam esse
pronunciat, grano nudo. Suspicio ego Dodo-
næo minùs fuisse cognitum hoc Hordeum nu-
dum, quæ de eo scribit desumpta sunt ex
Ruellio & Trago: placet tamen figura quæ Cor-
do in hist. cap. de hordeo glabro apposta est cum
hac annotatione, Dodonæus, à quo hanc imagi-
nem inuatuati sumus, Zeopyron vocat, & ex Gale-
no Gymnocrithon, i. e. Hordeum nudum. Per-
pendendum autem an Cordus hoc etiam intelli-
lexerit, per hordeum sine tunica. Si hoc intelli-
git, eum autè quoque monuimus, non placet vo-
cari Hexastichum. Cantherium putari dicendum
Ruellius, quòd folliculo castratum nascatur. Hor-
deum nudum vocant Galli.

Caspar. Bauhin. pin. Zea 4. siue Zeopyrum
(sic etiam in Phyt.) seu Triticum-speltum, quod
naturam habeat Tris. Celsus ubi de Faris, & Zeo-
pyron Galeno: Hordeum alterum Anguil. Zeo-
pyron Dod. H. Lugd. & Tabern. Zeopyrum siue
Triticum-speltum, Hordeum nudum vulgò voca-
tum Lob. in Adu. p. 8. Obs. p. 18. Ic. plant. p. 30. Hor-
deum glabrum Cord. histor. hexastichon, hodie
hor-

hordeum sine tunica, Cord.in Diosc. Hordeum nudum Gesf. hort. Ger.mundum, Cæs, hordeum *γυμνόν* Cam.

Satum Vere in horto Ill.E.C.Montbelgardi, semen maturuit Iulio, & paulò citius quàm in Orzyza Germ.

Scratur plerisque Germaniæ locis ad pistrinam & culinaram opera, in quibus hordei vsum præbet.

HORDEVM MVRINVM.

CAP. XVII.

HOrdei fibrosi radiculis & foliis donatum, culmos erigit cubitales, multò tenuiores, spicas quoque breuiores, aristis mollioribus armatas, glumà tenui, quæ nullum gramen tegit.

An de hoc Plinius lib.22.cap.25. Est herba phœnicea Græcis appellata, Latini verò hordeum murinum. Hæc trita è vino pota præclarè mentes ciet. Ex quibus apparet annotante Dalechampio, hæc aut prorsus diuersam esse à rhœnice Dioscoridis, aut apud Plinium legendum mensis cohibet. rhœnix enim Dioscoridis in austero vino pota manantem vluu sanguinem sistit & alui profusum.

Trago Germ. hordeum alcerum, das ander Straß. Verum hordei vitium: Lat. Lolium tertium. Tabern. hordeum spurium (& Gerardo) Aristida, Gerstenvalb, Basiaert gesien. Lob. in Ada. p. 7. Obs. p. 8. l. p. 30. hordeum spontaneum spurium, vulgò *Soucrion*. Turn. & Cæs. h. ord. murinum: Dodon. Lat. hordeum aut Triticum murinum, vulgò *Muysc* Corn. Anguill. holcus plini, Aristida abortum. n. Lugd. Gramen hordeaceum, n. holcus plini p. 427.

Genea (vbi, vt & alibi, passim proueni:) quibusdam *Carcellan* nominatum fuit.

Graminis Loliaci tertium genus Tragi, quod hordei ipse vitium esse asserit, Thalium duplex facit: Maius bicubitali culmo in montibus, longiorique spica: Minus culmo & spica breuioribus, in collibus aridioribus, aliisque asperis locis, ac secus vias. hinc C. Bauh. phyt. Gramen 109. siue hordeaceum minus, plinio *Holcus* à trahendo dictum, eò quòd arti stas à corpore educat: ob id *Aristidam* quidam vocant: Item, Gramen no. siue hordeaceum maius. Eid. pin. Gramen hord. siue montanum, vel maius: Item Gramen hord. siue minus & vulgare.

HORDEVM VRENS NOVÆ HISPANIÆ.

CAP. XVIII.

Narrat Nic. Monardes ad se perlata esse cum aliquot aliis plantis ex Hispania noua, femina huius plantæ, quæ *Cenadilla*, id est, hordeolum, istic vocatur, à similitudine quam cum hordeo nostrate habet, in spica & vaginulis, quibus semen includitur, sed minus, & Lini femine neustiquam maius, verum longè aliis facultatibus præditum.

Orzada nouæ hispaniæ Monardi & Castori. *Cenadilla* Monardis Clus. hordeolum Monardis n. ist. Lugd. p. 1907. hordeum 4. siue causticum, propter similitudinem huc relatum Casp. Bauh. pin.



Aliis liqui- Vires dem ab hordeo facultatibus præditum est. Etenim nunquam auditum est aliquam aliam plantam adeò vrente & caustica vi præditam: ita vt vbi cauterium necessarium est in gangrænis, & impuris, putridisque vlcera, eodem præbeat effectus, quos non modo sublimatum, sed etiam ignis præ-

Cauterium

Vlcera.

stare possit. Etenim vermes in vlcerebus necat, putridaque vlcera expurgat, puluis eius sensim inpersus, maiore minoreve quantitate pro vlcere magnitudine, adhibitis præferuantibus quæ in huiusmodi remediis vsurpari solent. Itaque cum eius facultates infringere voluere, puluerem stillatitio liquore rosarum aut plantaginis excipiunt, linumque aut ellychnium eo intinctum vlcerebus & gangrænis imponunt: deinde sarcotica medicamenta adhibentur pro perici Chirurgi iudicio. Eadem ratione vsurpatur in animalium malignis vlcerebus, quibus plerumque infestantur.

GRAMEN BVLBOSVM EX ALEPO.

CAP. XIX.



EX oliuari- Descripta bus, multis lacris, tunicis vestitis, bulbis pendent, fibræ robustæ culmi pedales crassiusculi, foliis insignes, angustis, palmariibus, scapo gerit spicâ hordeo murino similem, palmari minorem, glumis densis, longis, calamo appressis, sursum spectantibus, in breuem aristam singulis deimentibus.

C. Bauh. phyt. 22. Gramen bulbosum ex Alepo Synonyma quod solum vidimus siccum inter plantas. Gramen 8. siue bulbosum ex Alepo, siccum apud Fratrem visum. Plin. Gramen nodosum à radicis forma: 5. siue bulbosum ex Alepo.

Gramen bulbosum Alepi habui à Valerandò Dorzo nostro.

AVENA ALBA ET NIGRA.

CAP. XX.

Descriptio



HAud ita facile & promptum ex radiculis fibrosis, culnis geniculatis, foliis gramineis distinctim; at in panicula euidè rissimum, quo à reliquis frumētaccis sine negotio distinguitur licet, quæ subeinfar tremulis staminibus explicata, glumis geminis laxioribus hiantibulque, gemina grana oblonga, alba,

nigra, suis item aliis glumis, corticibulque duris haud distheuler cedentibus, nisi molendino, inuoluta, quorum granum alterum habitus aristas habet laterales, grana suis durioribus glumis delecta villosa sunt.

GAZA NO-
SANA.

Theophr. 2. hist. cap. 9. interea quæ Tritico & Hordeo similia ait, Auenam (Cespeo. Ridiculè hic omnia à Gaza translata.) recenset: sed radice numeroiore constare asserit, & multis dispersi crumis, ac veluti siluestre quoddam & immite semen multiplici tunica integi.

Diosc.

Dioscorides Auenam (Cespeo) tum calamo, tum foliis Tritico assimilata, sed geniculis ab eo distinguit. In cacumine verò dependentes veluti parvulas locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur.

Plin.

Plinius lib. 18. cap. 10. Bromon inter externa recenset, ab Oriente inacta, Oryzæ similia: alibi inter vitia segetis Auenæ græca (non silvestris, quam sterilem Virgilius vocat. Avena græca, Bromos: Avena cui semen cadit, Ægileps. Dal.) Auenam rursus vocat Frumenti vitium, & Hordeum in eam degenerare scribit, vt postea fusius dicitur. Cæterum, Auenæ semen maximè nudū tradit, in quo aduersari videtur Theophrasto, inquit Casalpini, qui Bromon multiplici tunica regi testatur, & alibi, inquit, Auenam maximè natura operuit, vbi græcè Crocos legitur, quam vocem Auenam vertit Theodorus, sed Bromos legendum est. Sed Plinius nudum vocauit: quoniam membrana in maruritate dehiscens maximè nudum ostendunt semen, proprio tamen cortice intectum, vt Hordeum & Spelta. Galenus frequentissimam in Asia ait, & potissimum in Mysia. Tertium autem genus Ægileps vocatur, manifestè quidem à Theophrasto Auenam vertit Theodorus; siluestre quoddam & immite, quod magis in Hordeo nascitur, terram vehementer extenuat, & multiplici tum calamo, tum radice constat, folio piloso: cultis melius erumpit: & solum frugale desiderat, & coli exposcit, sed deleri conrumax: cum annis alternis nascatur: non enim simul prouenit ex omnibus seminibus, sed partim anno primo, partim se-

cundo: semen continuum, & bifidum cernitur, vt eius vna pars prius nascatur, altera posterius anno sequente. Dioscorides autem aliam videretur describere Ægileps nomine.

Corario Bromos est Avena sariua, & non sponte proueniens, neque ex Hordeo degenerante producta. De bromo, inquit, Plinius ita scribit, vt & ipsum inter vitia segetis ponat, & cum Ægilepe confundat, & tamen eadem quæ Dioscorides de ipso prodar. Germani Bromum Auenam albam, Ægylopa, Auenam nigram & barbata appellat.

Idem alibi, Ægileps herba est, quæ Latine Avena silu, dicitur, & erraticæ, & barbata, & nigra atque satua, ea sc. quæ inter frumentum vt pote eius vitium sua sponte prouenit, atque Hordeo in eam degenerante fit. Differt à Bromo, qui Avena frumenticia est, sariua, pura, & quam albâ Germani vocant. Quum porò Diosc. l. 2. de Bromo egerit, falsè de eo in quibusdam græcis codicibus lib. 4. post Ægilepa repetitur, ideoque hic remouendus erit. Huc usque Cornarius. Eiautem notam fuisse Auenam nigram vix dum credimus. Satua siquidem non est: sed aquè plena ac ipsa alba; eodem etiam modo colitur multis locis, nec deterior, interdum etiam melior, & grano maiore. Nobis præterea videtur cum reineri nimis hoc loco Theophrastum erroris accusasse. Differt enim Ægileps Theophrasti ab Ægilepe Dioscoridis, cui non conuenit Avena nigra. Sed à Cornarii sententia alienus quoque est Dodonæus, duas Bromos constituens, vnamque frumentaceam, alteram verò herbam faciens. Et differunt sane etiam Dioscoridis descriptiones.

Tragus Auenam duplicem agnoscat, sariuam sc. & siluestrem. Sed ita rem tractasse viderur, vt quænam ambæ sint, obscure admodum dixerit, nec facile extricari sit. Theophrastus (inquit cap. de satua) tria frumenti siluestris genera recenset, Bromò scilicet, Auenam, Ægilepa, & Lolium. Dioscorides verò indifferenter hoc frumenti genus nunc Ægilepa, vt lib. 4. nunc Bromon nominat, videlicet lib. 2. vbi de Avena frumento peculiariter agit. Germani Habern vocant, nonnulli alii, videlicet impostores illi mendici, qui vt scilicet homines decipiant, propria lingua confinxerunt, quam vocamus *Beiterwelsch*, hoc est Mendicorum Stadicorum Italicum, *Spiriting* ab acuto semine dixerunt. Serapioni *Dausir* dicitur, cap. 25. De siluestri inter vitia frugum, ita differit: Lolii primum genus in quibusdam aridioribus pratis, & collibus, nec non stramineis domorum tectis, prouenit culmo, stipula & spica, Auenæ haud multum ab simile, fructus exers, quare lepidè Plautus in Milite dixit.

Mirum est Latio vixisse re tam vili Tritico. qui senarius in proterbum tandem abit, quo notantur lusciosi & cretucientes, vide Erasimum in Chiliadibus. Hoc Lolii genus Plinius proculdubio intellexit, cum libro 18. cap. 17. scribit. Primum omnium frumenti vitium est Avena. Nam & nos Germani id vitii habern hoc est Auenam dicimus, sed non simpliciter, ad differentiam enim frumenti Auenæ appellamus *Gauchhabern* vel *Neußhabern*, hoc est, Cuculi, vel Murium Auenam. Hæc Virgilio *Sterilis* avena nuncupatur, Dioscoridi *reivis*.

Magna est autem inter doctos controversia, quidnam sit Avena, quid Bromos, quid demique Ægileps, de quibus ingentia volumina conscribunt.

C. Bauh. pin. Avena 1. siue vulgaris ita quoque phyt.

Phyt.] seu alba : Avena Brunfelsi, Matth. Fuchf. Dodon. Turn. Amat. Lac. Lon. Aduerf. Cat. Tab. Lug. Avena sativa & prima Trig. Avena vesca, Adu. Lobel. Obs. p. 19. l. c. p. 3. Ger. Avena frumentum, Cord. in Dioc. Avenæ prima species, Ang. Avena mitior & sativa, Cas.

Avena, Græcis ἄραβις, forsan à βραβία quod cibū significat, & ἀραβία & Dioc. Ger. Habern/Boh. Ganere. Gall. Avoine. Ital. Biava, Avena, Vena. Hisp. Avena & Avena. Anglis Veres/ Vres & Habier.

Cæterum, Avena calamina, est tibia vnde rusticī plerumque cantare consueverunt. Matt.

Domina multorum vocat Avena tibiam.

Virg. Ecl. 1.

Sylvestrem tenui musam medietatis Avena.

Avena item est, culmus & stipula: Virgil.

Segetes vanae (vacuæ) elusit Avena.

Adhæc est Avena herba segetes necans: Virgil. Ecl. 5. & Georg. 1.

Inselix Latium & steriles dominantur Avena.

Synmachas : Nec rubigo segetibus obsuit, nec Avena fruges necavit. Steriles tamen Avenas aut secundum sicut Italia Virgilium dixisse vult Horatius Grammaticus quod in Thracia fructuosæ sunt: aut ad discretionem earum quæ feruntur.

Avena quoque terram extenuat : in hordeo nascitur: Triticeo inimica est. Primum omnium Frumenti vitium Avena est, inquit Plinius, & hordeum in eam (nusquam hoc Theoph. sed c. 1. lib. 4. caus. Triticum & hordeum sola in Lofium degenerare scribit] degenerat : sicut ipsa frumenti sit inquit quippe cum Germania populi ferant eam, neque alia pulve (eam hodie quotidiano usu frequentissimum Germani vocant Sabernus) vivunt. Soli maxime ælique humore hoc euenit vitium. Sequentem equam habet imbecillitas seminis cum diutius retentum est terrâ, prius quam erumpat. Eadem est ratio, si cariosum fuit cum terretur. Prima aut statim eruptione agnoscitur: ex quo apparet in radice esse causam. Est & aliud ex vicino Avena vitium cum amplitudine inchoata granum, sed nondum maturâ, prius quam roboretur, corpus, afflatu noxio casu & maneat in spica: euenit quodam abortiuo.

Terram paucis annis exhaustam Avenam, scribit etiam Virg. Georg. 1.

Vrit enim Lini campum segetes, vrit Avena.

Loca amat rigua. Vere sata, sub finem æstatis maturefcit.

Bromi semen vtile est ad cataplasmata, quemadmodum & hordeum, sed & pulcem ex ipso faciunt quæ aluum sistit. Succus autem ex ipso, à tussie nobis, commode forberur, Dioscoride & Plinio autoribus. Bromus est cibus inuentorum [inquit Galen. a. alim.] non hominum. nisi forte in extrema fame, ex hoc semine panes facere cogantur. Extra famem verò ex aqua coctum editur cum vino dulci aut sapa aut vino mulso, similiter vt Typha. Caliditatis autem satis patricaps est similiter vt illa, etiam si non similiter durum sit vt illa. Quare etiam alimentum minus corpori exhibet. Et alioqui panis ex ipso factus insuavis est, non tamen ventrem supprimit, aut impellit, sed hac parte medium obtinet. Item simpliciter: Bromus est quidem vnum ex frumenticis [inquit legendum forte pro Bromus] sed vt medicamentum similem hordeo vim habet. Impositum enim siccat, & discutit moderatè & citra mordacitatem. Est etiam frigidior paulò temperamento & aliquid astrictionis habet, vt etiam alii fluxionibus proficit. Quod verò Plinius ait Germanos auenacem pulcem edere verum hodiè; est: sed quod nò alia pulve vivunt saluum:

Nostri [Cornarij verba sunt] ex Bromo Avena farinam crassiorē instar Crimini faciunt, quam cum aqua coctam addito butyro edunt aut forbent. Et ex farina tenui pulcem parant. In Saxonia, magna farina illa, crassior & velut Crimmon apparatus, omnibus ferè obsoniis aspergitur, vna cum sale & simul coquitur. Prudens æconomus & ouorum recentium cupidus, Io. Collerus, mense Ianuario gullinis Avenam tostam exhibuit, vt citius & frequentius oua parerent, quod experimento comprobauit.

AVENA NVDA.

CAP. XXI.



Minus pertinaciter glumis hæret Avena nuda granum, haud dissimili argumeto sic appellatur, atque hordeum nudum, non enim habet durum corticem, vt Avena vulgaris, sed plures glumas, tunicasque tenues, paleaceas, potè autem granum ipsam habitus est, & ex albo siluicentibus, quodammodo simili

Descriptio

le Avena: quæ contra Fuchiana minus placet. Avena nuda Leb. in Aduerf. pag. 9. Icon. p. 72. Dodon. Tabern. Ger. & C. Bauh. qui tertiam facit.

Descriptio

ÆGILOPS QVIBVSDAM ARISTIS RECURVIS, SIVE AVENA PILOSA.

CAP. XXII.



Folia sunt Avenæ solis æmula, spica verò, si que alia eius generis Cerealiū, admodum speciosa, pedalis, rariùs tamen, glumis stipata. Hæ quippe alia bina, alia terina, longis & trinum vnciarū pediculis hærent, perquam elegantes, glumis vtrinque munite oblongis, lucentibus, striatis, pallidè partim virentibus, partim virentibus, latioribus quam in vulgari Avena, cui similia grana intus bina communiter, rariùs singularia, fuluo ac penè ruffo colore prædita, pilis hærentibus ac pulchrè, Byssi instar, lucentibus, oblecta, quæ ferè Avenæ granis longiora sunt. Secas quas ariste excunt gemellæ, longæ, duarum aut trium vnciarum nuntantes atque incurvæ, vti crura

vti crura

locustarum sylvestrium, rigidiuscula. Spica Auenae spicam pulchre amulatur: nam in eius modum ex granorum, vti conicere est, pondere, pedicellorumque subtilitate, ita pendulae arque tremulae haerent glumae, vti nec pendulas nec turreas quis simpliciter dicere queat.

C. Bauh. phyt. Gramen 106. sive Festuca sterilis tertia: Eid. pin. Gramen Festuca 13. sive Festuca utriculis lanugine flavescentibus, *Aristol. Diosc. Theophr.* (vbi Gaza Auenam vertit) Gal. Orisab. Aegin. Hordeum festuca, seu Aegilops. Plino. Aegilops Bromoides Belgarum, Lob. Festuca, prior Dod. Auenae tertium genus sylv. Car. Avena sylv. seu nigra Thal. Aegilops Dodonaei, inter Aegilopem & Bromum media, Lugd. Aegilops sexta, Bromoides 2. Tabern.

Reperitur in Germaniae ac Belgii agris. Sunt autem faculrates incognitae, et nondum exploratae vires.

GRAMEN CVM LOCUSTIS parvis candidis pilosis, semine auenaceo. CAP. XXIII.

Descriptio



Inter nostras plantas siccas obseruamus gramen, nec scimus ubi collegerimus, ei sesquicubitalis calamus, tenuis, genicularis, foliis septis renuibus palmaribus; spica summo culmo vnica sexantalibus, minimum diuisa, glumarum binarum paruarum complexu semen semper continet vnicum Auenaceum, minus nitida lanugine oblitum, quali quatuordecim feminae sunt praedita, radix obliqua genicularum incedens.

Clusius sub inscriptione Graminis montani Auenae semine, sic in pann. & hist. describit: Elegans mihi videtur alterum genus Graminis montani spicati, cubitalibus culmis constans, renuibus, genicularis, qui palmaribus angustisque foliis septis, summo fastigio desinunt in tenuem oblongamque & nutantem spicam, in lanuginosis glumis, grana nuda Auenae similima ferentem: radix tenuis est, multique oblongis fibris praedita, singulis annis antequam serpens, vti Spartae & Iunci.

Clusii figura quam assumpimus minus placet. Tabern. Ic. & hist. (vbi 18.) Gramen auenaceum habet Graef. Casp. Bauh. phyt. Gramen 40. sive montanum auenaceum lanuginosum. Eid. pin. Gramen auenaceum 7. sive montanum lanuginosum. Hordeum distichon Gerar. icon.

Locus & Tempus.

Nascitur secundum vias, in montanis vmbrosisque Pannoniae, Austriae, & Bohemiae: semen autem Iulio mense maturum obseruabat Clusius.

GRAMEN LOCUSTIS RVBRIS. CAP. XXIV.

Descriptio

Calamos habet cubitales & altiores, graciles, genicularos, foliis multis palmaribus & ses-

quipalmaribus fere glabris stipatis, spica summo culmo sedens duarum triumue viciaria, longitudine iubae aliquatenus similes, glumae rubentes Auenaceis similes, miticae tamen breuiores, crassiores, leues, tremulis petiolis appenduntur: radices fibrosae, a capite vno pendulae, in obliquum aguntur.

C. Bauh. phyt. Gramen 41. sive auenaceum non lanuginosum, aliquid cum gramine montano spicato Clusii Pann. p. 717 similitudinis habens: Eid. pin. Gramen auenaceum 2. sive mont. auenaceum locustis rubris: 71. in prod.

Variat caule leui in montosis: in ducentis humidis foliis cauleque subasperis.

C. Bauh. qui mihi misit, scribit Iulio & Augusto reperiri in montanis vmbrosisque circa arcem Badenwilam in Marchionatu & Nidensei Basiliensium. Nos autem obseruauimus circa s. Hippolytum & s. Ursae. in rupibus, florens Maii principio.



GRAMEN AVENACEVM, RARIORE grano, nemorensis, Danicum.

Icon.



Sesquipedali & bipedali, gracili, nitido, lucido & tremulo culmo, superne bicoloriore, rarioreque, Auenacea gluma ornate. Radix summo caespite, Graminis canini quadrantenus, sparsa; sed villis longioribus annexis: foliis superioris sylviarum aueniacei Graminis descripti in Scirpionibus notis.

ftris, exilioribus, vti tota planta. Casp. Bauh. pin. Gramen auenaceum 3. sive locustis rariis.

Fagineis siluis montosis, non procul a Cronenburgo, vuidolo solo collegit Lobelius.

AEGILOPS VETERIBVS ET IN GENERE. CAP. XXV.

Aegilops Dioscoridi herbula (*Bertricum*) est folia Tritico (τρυγίς) similia habens, sed moliora

lori, & in fummo capite suis inclufa folliculis [hec omittit Corn.] femina duo aut tria, rubra, e quibus ariste velut capilli exeunt. Sed quid impedit, inquit Marantha, Aegilopen quaterna vel etiam plura in fummo capite habere femina: etiam si Dioscorides dicat bina, ternaria illi inesse.

Hordeum enecat Festuca, ait Plinius, quae vocatur Aegilops, quod poculorum aegilopas sanet, folio Tritici.

Plinium Aegilopen Auenam graecam vocare, & Festucaginem a Gaza reddi, legitur apud Hermod. Coroll. 752. & Io. Agricole cui praeterea Aegilops Diofcor. est Avena sterilis Virgilij.

In Aegilope [inquit Leon. in Plinij errata apud Brunfels. tomo 2.] nescio an magis accusandus sit Plinius, qui in rebus adeo vulgaris, quibus nomina Latina non deerant, Graecis utendum censuerit: an potius quoniam de eisdem herbis graeca appellacione monstratis illa affirmat, quae sensus falsa esse deprehendit. Ex Theophrasti verbis, quorum magna ex parte sententiam Plinius, de vitis frugum agens, exprimit stultit, facile ostenditur Pliniani erroris in Aegilope, origo. Postquam enim Theophrastus fecerat de Orobaech mentionem, quae amplexu suo Eruan strangulat, subdit eandem esse Aegilopi, quam Auenam Gaza conacrit, interrimendi rationem, idem subiunxit Plinius, hordeum enecat Festuca quae Aegilops vocatur. Cur autem Aegilopem potius quam Auenam eodem loco dixerit Plinius, eam rationem affero, quod cum Graeci duo Auenae genera facerent, Bromum sc. & Aegilopen, hoc vero discrimen nemo reddidisset in Italia, ob id Plin. lib. 8. cum Auenam inter vitia frumenti collocasset, paulo post de Festuca quae vocatur Aegilops, edisserit: non quod nesciret Auenae id esse quoddam genus, vt nonnullos canillari inquit Brunfelsius, in Scil. innaeus &c. Plinium in meo libello non rephendi quod nesciret Aegilopen esse quoddam Auenae genus, sed ob id, quod eodem capite modo Graeca, modo Latina voce in eodem Auenae genere vt voluerit. Nam quod Plinius lib. 8. Auenam esse frumenti vitium & hordeum in eam degenerare, hoc idem Theophrastus lib. 6. de plantis & Galen. lib. 2. de alim. de Aegilope etiam testatur. Quod vero etiam paulo post Plinius ait de Aegilope hordeum necari, id ipsum Theophrastus lib. 5. de causis plant. licet alio modo quam Plinius Aegilopi tribuit. Alterum quoque fastigium Plinius, si non eodem capite: saltem libro, aliquando Bromon, aliquando Auenam nominat &c. Cur Plinius Aegilopem circumligando se hordeum dixerit interimere, non scirem reddere rationem cum nulla Auenae species, quae id faciat agnoscat, sicuti neque Lolij &c. Sed cur Plinius in his apertis erroribus tam operose defenditur abs te Brunfelsi vbi Plinius Aegilopis naturam peruertit &c.

Pro Plinio aduertis Leoniceum stat rando ph. Coliniucis, sed an Plinium sufficienter defendat, Lectorem liberum esto iudicium. Aegilopem, inquit, quae sylv. Avena sit, quis vnquam vidit vel iuuenata vel homines velci? Tum Avena Tritici & hordei vitium est: quod duodevigesimo volumine docet Plinius. Aegilops vero (vt eodem loco Plinius) hordei morbus est proprius non vitium, & hordeo innascitur, quod quinto quoque & vigesimo volumine refert (populo etiam teste) duo esse Auenae genera. Frugiferum vnum: sterile autem &c. Dioscorides quoque de

Tom. II.

Avena, Aegilopéque scorsum tractans, diuersas illas esse indicauit. Non Bromi quidem duas species, 2. volumine cum referat, secundum a Romanis Auenam vocari: tum 4. volumine Aegilopen quoque a Romanis Auenam dici affirmat &c. Aegilopis femina maiora (quam Auenae) nigrae &c. Si Dioscoridis & Plinii scriptis & rationibus, & rei ipsius euidentiâ, diuersa esse monstratur, [Aegilops & Avena] quis Leoniceum non errasse defendit, qui Plinii doctrinam taxare non sit veritus &c. Lectorem erit examinare an Plinium sufficienter defendat Pandolphus.

Theophrastum non nunquam, vt lib. 5. caus. Aegilope pro inani Avena, & lib. 8. pro herba hordeum enecate, hic tamen corrupte Aegilopa legit Plinium vero Festucam vocare, in eademque distictione vagari. nunc frugem, nunc herbam facientem, testatur Rob. Constant. in Lexico.

Aegilops herba est quae Avena Latine dicitur, sed ea quae sua sponte prouenit, atque hordeo in eam degenerante sit. Virgil. steriles Auenas dixit. Differt Aegilops a Bromo, quod Bromos Avena frumentitia est, satua, pura, & quam nostri albam vocant. Aegilops autem ex hordeo degenerante, & inter frumentum sua sponte prouenit, vt pote eius vitium, & alia etiam enascitur, & Avena sylvictris, & erraticae, & barbatae, & nigrae, & fatua a nostris appellatur. Coniungit tamen Bromon cum Aegilope Theophrasti & ipsam in hoc sequatur Plin. Quam autem lib. 2. de Bromo egerit Diofcor. lib. 4. post aegilopa falso suppositus in quibusdam Graecis Codicibus habetur, & a nobis remotus est, inquit Corarius. Nobis autem non videtur ita temere erroris accusandus hoc loco Theophrastus. Is enim nostro iudicio diuersam tradit Aegilopa a Dioscorideae, vt facile est colligere ex eius verbis lib. 9. cap. 9.

Ceterum quoniam hodie sit stirps Aegilops, inter auctores non conuenit. Est enim gramin quoddam Matthiolo, quod Aegilopem existimat. Est Festuca prior Aegilopis species Dodonaeo: nobis Aegilops quorundam aristis recuruis sine Avena pilosa. Habet Tragus Lolium secundum, Aegilopem Galeni, quod Gramen gra. Mentholgardicum inscribitur. Aegilops Narbonensis & calidarum regionum Lobelij. Gramen quoddam tremulum a nobis describetur, quod est Aegilops vera Plinij, Trago. Gramen nodosum suspicatur auctor Hist. Lugdunensis Aegilopa Plinij. Hordeum murinum cognominat Aegilopa Schuencck f. Triticum fecale an Aegilops, Bichanelli. Aegilops dicitur de Avena tam alba, quam nigra. Aegilops Bulbi genus Plinio lib. 19. cap. 5. Hoc cuiusmodi sit, nondum certe reperire licuit. Aegilops Dioscoridis Brunfelsio in sua Exageu, est Consolida regalis, de qua lib. 25. Hist. n. Aegilopa Dioscondis, quidam aurumant Aquilegiam, descriptam lib. 10. Sed decipiuntur. Est porro Aegilops ex Quercuum genere, quae Cerrus cognominatur. Hist. Lugd. per Aegilopa intelligit forte Fagum sepium.

Aegilops Graeco, & Lat. Aegilops, Germ. Taubhaber/wild vnd wnschhaber, haber, Gerstentatter, & Theod. Gollo in Onom. Aegilops recte von der Gersten/Dinstre in dem Gersten. Gallis, Une sorte d'auoine nulle aueron, ou aueron, Auoine sale: Auoine sterile, Auoine sale: adhec Rusticis Gallis Auron, quafi auenago vel auenulatin Gallia Celtica, Coquete.

In Hordeo non nisi post annum a semine suo nascitur.

Herba cum farina impedita sanat Aegilopas, & duritias discit: succus seruatur ad eadem.

Plin. nat.

Avena steriles.

Bromos differt ab aegilope.

Theophr. & Plinius re darguunt.

Diofcor. corrigitur.

Aegilopae Gramen aegilops forte Matthiolo. Aegilops quorundam. Gramen gra. Mentholgardicum. Aegilops Narbonensis. Gramen tremulum. Gramen nodosum. Hordeum murinum. Secale: Auenae Bulbi genus.

Consolida regalis.

Aquilegia. Quercus Cerrus. An Fagum sepium.

Nomina Linguaru

Tempus

Vires.

farinæ ammixtus, ac siccatus, auctore Dioscoride. Plinio, Aegilopas sanat herba eodem nomine, semine contrito cum farina permixto, impositoque, vel succo: exprimitur hæc de caule, foliisque prægnantibus, demptâ spica vt in trimestri, digeritur in pastillos. Aegilopi Galenus uisendi vim attribuit, id quod ex gustu cognosci scribit: leniter enim quodammodo acris est, imò etiam ex eo, quòd induratas inflammationes & aegilopas sanat.

GRAMEN SIVE AVENA STERILIS.

CAP. XXVI.

Descriptio **Q**uemadmodum spontanea pleraque fatis strigiosiora, ita & lucæ fontis Avena, fatiue & colini crassitie & altitudine cedit, cæteroque ei fatis similis, iubâ glumis, mollicellis breuium aristarum fetis, verum semine aut nullo aut crasso, strigoso.

Locus & Tempus. In pratis circa admirabilem fontem in Ducatu Wirtembergico Augusto mense florens.

ÆGILOPS BROMOIDES IVBA purpurascens.

CAP. XXVII.

Descriptio **V**alidis sed fibrosis fundatur radicibus. Las emittens plures, bicubitales, v. d. tr. s., longis internodiis distinctas: *folia* Auenæcis longiora, ridicula, angusta, subhirsuta, potissimum quâ â culmis abscedunt; vagina liquidum culmum complexa glabra est, iuba purpurascens diuisa. Inter glumas longæ, graciles, auenacis strigiosiores iuba emicant: quâ verò perfoli glumis committuntur flauescens villus circumnascitur.

Locus. In Gallia Narbonensi tam inter segetes, sed raro, quàm ad squalidas aruorum margines collegit Gener Cheilerus.

LOLIUM QUINTUM TRAGO, Hordei granis, aristis non admodum multis.

CAP. XXVIII.

Lolii s. genus exiguis & oblongis Hordei granis, sed aristis non admodum multis, nec asperis armatum, Tragus Bromon Dioscoridis esse iudicauit, ac præterea eorum sententiam improbandam censuit, qui caput illud apud Dioscoridem ceu supposititium pronunciarunt atque dânarunt. Adductus, vt ait, autoritate Theophrasti, tria Lolii genera describens. Sed quam consequentiâ necessitas: Theophrastus tria describit Lolii genera, ergo hoc quintum est Bromos Dioscoridis.

Tragum notatur.

C. Bauh. phyt. *Gramen* 140. siue *Festuca sterilis altera*; Eid. pin. *Gramen Festuca* 2. siue *Festuca auenacea sterilis humilior*. Bromos herba graminei generis Thalii.

PHOENIX VETERIBVS.

CAP. XXIX.

Phoenicis nomine hic non intelligimus arbo-rem illam, de qua lib. 3. cap. de palma egimus.

sed herbam, de qua Dioscorides, hæc scripsit. Phoenicea herba [*φαίνιξ*] quam aliqui Rhun, alii Anchinopa vocant, folia quidem hordei, at breuiora & angustiora: spicam verò Lolio similem, & ramos circa radicem senum digitorum ac septenas octonasque spicas. In aruis tectisque recēs illitis nascitur. Vim hanc habet in austero vino pota, vt alui profluuium, erumpentemque ab vtero sanguinem, vinarumque largiorem fluxum sistat. Tradunt & nonnulli in puniceo vellere amuleti instar adalligatâ, sanguinem supprimere.

Est & herba Phoenicea appellata à Græcis, à nostris ordcum marinum. Hæc trita ex vino pota, præclare ciet menses. Ita Plinius lib. 22. cap. 25. An verò eadem hæc sit, quæ Diosc. Phœnix, illud maximè ambiguum facit, quod menses illam ciere dicit: quum Diosc. Phœnix sanguinem sistat & alui ac vrinæ fluxum cohibeat. Galenus de Phœnice herba sinit.

Paulus Phœnix, inquit, quam alii Rhun vocant herba est Lolio similis. Vim habet adstringentem. Potâ in vino austero omnia fluida sistit.

Phœnix esse videtur, quam Germani inquit Cochenbarn appellat. Sicut enim Aegilops inest Auenæ, & sterilis Avena dicitur, nullis Cochenbarn: ita Phœnix Ordei inest, & sterile Hordeum apparet. Et propterea Phœnix dicitur Aegilops, aut potius Anchinopa Dioscoride vocatur.

Guilandinus de Papyro affirmat falli Hermolum, Ruellium Marcellam, & qui eos sequitur Machiolum (Rylium adde, Lobelium Dodonaum, & alios) quòd omnes perhibeant Phœnicem, p. Gllam Dioscoridis herbulam, dici à Plinio Phœnicem, & Hordeum marinum, decepti nominum similitudine.

Cæterum, pro Phœnice herba, varia à variis exhibentur plantæ. Est nobis Phœnix Lolio similis. Phœnicem Tragi suspicor Aegilopen Matthioli. Phœnix, Leo, Carduus færox, quid:

PHOENIX LOLIO SIMILIS.

CAP. XXX.

VT est eorum genus ferè quæ segetis nomine veniunt, ita & hoc vitum capilatam fibris radiculam habet culmis coactioribus plurimum, sesquicubitum nonnunquam altis, perquam tenuibus rarisque geniculis donatum; *folia* Triticeis angustiora, palmum aut sesqui-palmum longa: *spica* Loliacea ex atro virescens aut rubescens, glumis alternatim ex culmi fastigio ortis, subieco foliolo, lunpero inuili, non mordaci: *stipula* frumentacei albi.

Lolium 2. Trago das Vier Queckengraß / Lolium exiguum, Smetzel / Spelzen / Dort / quibusdam S. Petreeforn, & Wildemüchel / Ker Wild haber / Gefn. coll. stir. Eid. in cat. Ein freutem der Wertsien gleyd. Zungen helmer, & Waldreher / Lobel. Tabernforn / Meuffforn / & Müllergersien / March. germ. Belg. Mynseforn: C. Bauh. phyt. *Gramen* 140. siue *Festuca auenacea sterilis humilior*. Bromos herba graminei generis Thalii.

Phœnix Marth. Turn. Lacun. Dod. (cui & Lolium marinum) Cast Cord. Lon. Cas. Lugd. & Lob. Obi. p. 21. Ic. plant. p. 34. Hordeum marinum, Guil. Lob. Tab. Graminis Loliacei 4. genus Tragi, Tal. Lolium rubrum Ger. Gramen Loliaceum 3. siue angustiore folio & spica: *φαίνιξ* Diosc. Ordi, à seminis colore phœnicco, Herba phœnicca

siacea & Græcorum, Hordeum murinum Romanorum Plinii, C. Bauh. pin.

Nascitur in aruis, secus vias, & in ædificiorum cæcis: in Italia, & Gallia frequens, & vbiq; ferè obuia: reperitur etiam in Vbiotum & Eburonum finibus. *Eam proximè sequens Icon non malè representat.*

LOLIUM GRAMINEVM SPICATVM
CAPVT TENTANS.

CAP. XXXI.



Stipulas habet cubitū vnū, duos, tres, & ve altas, striatas, paucis nodis articulatas, foliis amictis gramineis, in spicam ferè spithameam desinentes, figurà peculiari, siquidem alternatim ex culmi lateribus grana terna aut quaterna, & quina, in paruis aristas desinentia, rubentia, triticis strigiosiora,

glumis adherentibus clausa, pedicellis breuibus connexa, pusille spicæ forma, exeunt,

Figura Lobelii in Obs. p. 22. Ic. plant. p. 35. titulo Lolij & Tritici temulentii melius placet, quàm nostra, quæ iam facta erat.

C. Bauh. pin. *Gramen loliaceum*. siue spicâ largiore. *Asp. Diof. Arist. Theoph. Gal. Orib. Ægin. Act. Zizaniæ Constant. Zizania Arabum. Lolium & Aero, Plinio. Lolium Ruell. Marth. Gef. cat. Ama. Cordo in Diof. Tur. Dod. Cæf. Cast. Lugd. Taber. Lolium & Triticum temulentum Aduers. Lob. Lolium verum, Gesn. hort. Lolium album Ger. Frumentum satuum, Lon. Variat: communiter aristas habet, sed sine aristas quoque Bononiæ obseruatur. 2. Eidem Gramen loliaceum latifolium spicâ angustiore, quod sic describitur: Gramen loliaceum latifolium spicâ angustiore: Ex radice alba, arundinacea, fibrosa, culmi aliquot bicirales exurgunt, foliis paucis, latiusculis, oblongis cincti, quorum summo spicæ angusta, vncias quatuor vel quinque longa, Phœnici vel hordeo marino similis. Balthææ circa Cliben, longioribus & breuioribus foliis varians reperitur.*

Lolium autem esse *Asp. Græcorum*, non est ambiguum, etiam si plinius diuersis locis, tanquam de diuersis agat. *Asp. porò* vocarunt Græci, teste Lobelio, vt coniectura fert *Asp. vñ Asp. thæ*, quod est effert & attolli, vel sursum rari: rapitur quippe in cerebrum Lolii vapidâ nocua aura, atque dementiæ affinem tenebrosam vertiginem, temulentiamque efficit. Quo quidem maleficio vel infimæ plebeculæ notum, & inuisum plus satis est, præsertim Galloprovinciæ, Narboniæ, & passim in reliqua Gallia vbi *Turayæ*, quasi cbriosa vel inebrians vocatur. Quippe etiam in

Tom. II.

Nortmannia, Belgio & Anglia, non solum panimixta farina, sed multò magis Cerecalibus portionibus, *Ale & Byere* addita, & seruata, torpore & temulento veterno cerebrum opprimit, & opacat, reliquaque membra torpida reddit. At foris ad motum, eiusdem ex axungia depositum cataplasma, eadem pellit incommoda, dolorèquè diuturnos artuum & pericrani soluit.

Spica similior nulli quàm Phœnici, vt scitè Dioscorides monet: eoque qui alterutram norit, ambas nouerit. Granum in dura tunica: stipula, radix, & reliqua Tritici, vel Secalis sunt: eoque ea in opinione, qui ex Theophrasto est Senensis, vt hæc Theophrasti pestis, rursum in Triticum redire solita sit: verum dixit, ita ineptum & physices imperitum se prodit, quum de Hippocrate Historiam, è Plinio exemplum sexus humani mutati, adducit. Quippe neque ad rem facit hęc sexus mutatio, & in plagis sexuum distinctio non vera, sed metaphorica & figurata doctis meritis censetur: igitur res vera, ratio improba. Nullus enim non nouit hic defectuè Lolium à Tritico, nec in fœminam abiisse, sed in vitium quoddam, aut aliam segetis speciem; calidius enim & ficcius est Lolium reliquo quolibet frumento, improbum alendo, præsertim homini, Tritico autem planè contrarium natura. Hoc enim homini salubre, veterinarie autem nex plerumque. At Lolium hęc, vci neque alitibus gallinis nocet nihil, illi tamen plurimum, quare specificæ differentiæ sunt, non maris aut fœminæ, vt blaterabat Commentator. Quin etiam Lonicerus Germanus Boranicus minime bonus:

Commentator Senensis.

Lonicerus qualis Bonanicus. Nomina linguarum

Dicitur & *Asp. Græcè*: Arab. *Zizania & Sceylem*: Germanis *tualsch*, cum in Hordeo nascitur: in Secale verò *trespe/trafsendorf*, & *tracedorp*, Cordo. Vocatur & *fühweizen*, hoc est, Triticum vaccinum, & *Lülch*, corruptè Lolii Latine voce. Belg. *Solich*. Gall. *juraye*, ou *juraye*, & *luille*. Ital. *Loglio*. Hisp. *yoyo* & *zozania*.

Nascitur in aruis cum Tritico ac Hordeo, se locut: minibus ipsorum corruptis, ac in deterius, vt galenus ait, permutatis, & solo quidem præsertim vliginoso per cæli, mensibus potissimum hybernis, tempestatem humidam.

Lolium molitum vim habet emarginandi ac *Viret* circumscribendi nomas, & putredines, & gangrenas, si cum raphanis & sale imponatur. Impetigines feras, & lepras cum sulphure vino & aceto curat. Cum stercore verò columbino, & Lini femine coctum in vino, strumas dissoluit, & quæ agrè maturantur, rumpit. Cum aqua multa coctum ac impositum, coxendicum morbo laborantibus prodest, addita volenta, aut myrrha, aut croco, aut thure. Idem suffitum conceptus adiuuat, authore Dioscoride. Plinius lib. 18. cap. 17 Lolium, inquit, non minus quàm Rubum, inter frugum morbos potius quàm inter ipsius terræ pestes numerauerim. Et paulò post. Aeræ granum minimum est in cortice aculeato. Quum est in pane, celerrimè vertigines facit. Aiuntque in Asia, & Græcia balneatores, quum velint turbam pellere, carbonibus id semen iniicere. Et libr. 22. cap. 25. Aerina farina magis cæteris purgat vlcera vetera, & gangrenas. Cum Raphano & sale & aceto lichenas. Lepras cum sulphure viuo. Et capitis dolores cum adipe asferino imposita fronti. Serumas & panes concoquit cum fimo columbino & Lini femine decocta in vino. Et ibidem inferius. Quin & ipsæ frugum pestes in aliquo sunt vsu. Infelix dictum est à Virgilio Lolium: Hoc tamen molitum, & ex aceto coctum impositum.

q; sanat impetigines, celestius quò sapius mutatu est. Medetur & podagrae, aliisque doloribus cum Oxymelite. Ratio hæc, Aceti sextario vno diluuntur mellis vncia duæ. Iustum est ita temperatis sextariis tribus, decoctæ farinae Lolii addere vsque ad crassitudinẽ, calidumque ipsum imponi dolentibus membris. Eadem farina extrahit ossa fracta. Atque hæc est veteris codicis lectio. Et sanè Plinius neque integrè, neque distinctè medicamenta à Dioscor. præscripta expressit: quanquam etiam Dioscoridis lectio noui satis probè sit distincta. Cornarius ita distingui ac coniungi debere censuit, vclut hic reddidimus, maximè ea quæ postrema habentur, vt lichenidicis cum aqua mulla coctum, & ad ðita polenta, aut myrrhã, aut thure impostum Lolium molitum prodesse velit: & deinde ipsum solum suffiri, & non cum aliquo ex his quæ præcedunt, quæ concoquendæ coxendicium affectionis gratia, commode in cataplasma Loliaceum ammiscerentur: Insuper verò ad suffitus adhibentur. Desiccatur vt Galenus lib. 6. de simpl. medic. facult. & ex calcificat efficaciter, vt propinquum sit acris, magis quàm Iris: sed non est perinde vt illa subtilis essentia, veriam multũ ab hac deficit. Secunda, hoc, ponat ipsum quispiam in principio tertii ordinis exaletacientium, secundi verò in fine exiccantium: *Lolium*, autem frugibus, ex quibus Cereuisia coquitur, permixtum, ebrietatem citò excitantem eam reddit: idem potest panis copiosus additum. Nocet verò & oculis, caliginem ipsi adferens: quod & Ouidius Fastorum lib. 1. scriptum reliquit:

Et caveant Lolus oculus viriantibus agri.
Atque hinc natum videtur prouerbiũ: vt *caculenties Lolio vulture* dicantur.

GRAMEN GROS MONTBELGARD.

CAP. XX XII.

Descript.

Calamis est cubitalibus, no dosis, in quibus folia graminea, summũ stipulã spicæ complures in lubæ fornam conspiciuntur, tenuibus, asperis pediculis appensè, vnciam circiter longæ, binis versibus compositæ, granis nouenis, aut paucioribus, vix vnquam pluribus, Secales paribus, formã aliiis, rubris, canaliculatis, duris, gluma bifori hirsuta in breuem aristam (quæ postremæ glumæ geminæ) desinente conclusis; radices multæ, capillares.



Festuca altera Dod.

Dodonæus hanc plantam sic describit: Altera Festuca, quæ propriè Secalis vitium est, culmis foliisque Secale refert, culmos obtinet Tritico Hordeum tenuiores, in quo-

rum summo veluti effusæ pendente iubæ, Auenæ propemodum similitudine, sed breuioribus, arctiusque coniunctæ. Semina oblonga, sunt, longitudine grani Secalini, sed angustiora, tenuiora, leuioraque multò, quæ membranulis siue utriculis paruis continentur, & quibus cum in area teritur, concidunt.

Germani *Sort* & *Lilch* vocant: Brabanti *Orand*: Latine Festucam alteram non male quis dixerit. Nam inter ea quæ frugum similitudinem gerunt, illasque interim infestant, minimum ac leuissimum est granum: Festucis ea de causa similitimum.

Gramen hoc, quod Tragus lib. 2. cap. 25. pro Lolio gerit. *Sort* dicto describit, nullo modo existimo fieri ex mutatione Hordei & Tritici: multò minùs idem esse cum planta, quam pingit pro *Sort* & Lolio. Hordeum, Triticum, & *Sort* Tragi annuæ sunt plantæ, non repentes: ac præterea spicis inter se multum diffident. In eo etiã aberrasse videtur, quòd Aegilopa Galeni, sed non Dioscoridis, esse crediderit, sed potius *Aspa* eiusdem, & Zizaniam Auicennæ.

Sed & Dodonæus (perhibente Gesn. hort.) Aegilopem fecit *Sort* germanicè dictam, eamque lib. 2. imag. pro Lolio pinxit: circa finem verò eiusdem libri, se emendans, Aegilopem nuncupauit & pestem Secalis esse dixit. Refert idem Gesner. Tragus hanc plantam tertio inter Loliam loco describit, qua in re non parum hallucinatur: nam secundo, ni fallor, loco traditur.

C. Bauh. pin. dicitur Gramen Festucæ i. siue Festucæ gramineæ glumis hirsutis: Lolium 2. Tragus at r. icone Aegilops & Festucæ, Dod. gall. Gesner. hort. Bromos, Lac. altera, Ger. Bromos sterilis altera, Lob. Obs. p. 21. Ic. plant. p. 33. & Hist. Lugdunensis Lolium Lon. Festuca altera Dodonæi Gramen murorum Dalech. Lugd. Festuca graminea, Tal. Phœnicis altera species, Eid. Simphonium, Bromos herba, Tabern. Variat spicis, quæ aliquando quasi in fasciculum comprehensæ, & Phœnix altera est Thalii: aliquando dispersis: sic aliquando glabris, aliquando hirsutis & propriè Secales vitium est.

Propriè Secalis vitium est: cum aliis enim frumentis, aut non rarissimè reperitur: succrescit, veluti & alia huius generis, per imbres frequentes: anni hyemisque constitutionem elementem ac tepidam.

GRAMEN SPICA HIRSVTA,
ad Gramen du Gros accedens.

Summus culmus spicæ insignis est duum triumque vnciarum Triticeæ simili, magis diuulsæ, glumis multiplicibus, hirsutis, aristis mollicellis, perbreuibibus, nec essari dignis: folia per stipulam lesqui cubitalem angusta, villosa, candicantia. Radices crassæ, dura, fibras crassiusculas habent appensas, perennes.

Nemauit inter Triticum præcipuè obseruauit & collegit Genet Cherlerus.

GRAMINI MYRALI DALECHAMPII
simile, si non idem.

AD Gramen du Gros Montbelgardenibus dictum non nihil accedit: a quo natalibus aliisque quibusdam notis differt: nascitur enim in partibus, culmis multis cubitalibus & altioribus,



bus, foliis ad genicula non ita dissimilibus, sed hirsutis & ferè canescentibus; iuba eundem habet cum gramine *du gro* positum, cuius partium textura itidem distichos, spicas breues imitata, aristis mollibus breuibus, glumas etiam molles, striatas, armanibus, tantillum hirsutas, squammatim incumbentes, strigosiores, & semine crassas. Radix capillari- bus fibris contex-


ta est. Nisi figuram paratam habuissemus meliorem exhiberemus.

Figura Hordei murini Tabern. optimè conuenit nostro Gramini, sed cætera nomina, ut phœnicis & Lolii non item, exilitimo præter autoris sententiam figuram plantæ quam non intelligat appositam. Prater Casparus attulit ex Italia nomine Cynopis Theophrasti & Canarie.

Genevæ obseruauit & in valle Griesbachiana ad thermas acidas: Patauit provenit, nec non Babilæ & Montbelgardii.

ÆGILOPS MATTHIOLO FORTE.

C A P. XXXIII.



Folia graminea, angusta, hirsuta, hirsuta: culmi plures, cubitales, geniculati, tenues, paniculam ferunt singuli multifariam diuersam, cuius portiuncula squammatim è pluribus glumis compactiles spicam paruum mentuntur, locustis Auenæ non multum dissimiles, aliàs singulares, aristis do-

nata mollibus, longis.

Lobel. sic describit: Bromos, siue Auenæ sterilis, ab Auenis vesca, vsu quidem diuerso, sed genere & figura non diuersa: vtriusque enim vt nomen sic facies, & natales eadem. Sed minore gracilioræque pedali stipula, apiculique stamineis delicatioribus, minimè mordacibus, comosa effigie, semen ferè euanidum, in tunicis ferè vacuis.

C. Bauh. phyt. pag. 23. Gramen 104. siue Festuca sterilis.

Tom. II.

Trago fortè Lolij i. genus est, quod rlinium lib. 18. cap. 17. per primum omnium frumentum vitium, Auenam intellexisse asserit: Virgilium verò per Auenam sterilem, & per phœnicem Dioscoridem. Vocat germ. *Gäuchhabern* & *Maüßhabern*, hoc est, Cuculi vel muriam Auenam.

An Math. in prior. Comm. *Ægilops* siue *Festuca*, Ananienis ruri vulgò *Squala*. Arabib. *Dausir*, *Dalsfir*, *Dufana*, *Dauser*, siue *Dusser*: Ital. *Egillapa*. In post. comm. similem habet figuram sine descriptione pro *Ægilope* prima, olim vera existinata, vt ait, Italicanomina adimens. Vide ut ergo *Leëvres*, qualiter se extricunt ex *Matthioli scriptis*.

An Ægilops Matth.

Tabern. icon. p. 134. & Hist. p. 666. *Ægilops* i. Auenæ fatua. *Cersien* / *Wald* *Gäuchhabern*, *haber* *gras*, *ayrae*, *Festuca*, *Festucago*, *gaza*, *Bromos* sterilis, Virgilio Auenæ sterilis i. georg. Plinio *Hordeum* *festuca* l. 18. cap. 17. Ital. *Squalo* & *Squal*. Gallis, *Lauron* & *ayron*. Angl. *Dranch* & *wile* *orca*. Fland. & *Brabantis*. *Dranch*. Spica *Hordeo* similiore, nisi minores essent, nec ita aspera, sed molliores.

Ægilops i. Auenæ fatua Tab.

Dodon. Gall. *Cela* & *ma*; Bromos herba, & Auenæ herba. Gall. *4. er. n. n. aut aueneron*. Eid. Hist. frum. & in fol. Lat. Bromos herba Auenæ & *Ægilopi* similis est, habituque ipso syluestris quadam Auenæ, multiplicibus enim geniculatiquè culmis, foliisque eam refert, licet vtriusque tenerioribus: iuba rarior, aristas asperiores, longioresque habet: radice firmatur copiosa ac tenui. Nominant eam greci *βρωμος μάω*, id est, Bromum herbam, ad differentiam Auenæ, quæ grecis quoque *Cela* & *ma* aut *Cela* & dicitur.

Bromos herba. Dod. Gall.

Lobel. in Adu. notat falsò primam dici *Ægilopen* apud *Matthiolum*, & Bromon esse. In Obs. p. 20. figuram Dodonti habet nomine Bromi, vocans p. 11. *Festucaginem* *gaza*, Italicorum *Vena vana*, id est, Auenam castam, & *Orz*, saluatico, & denum *Ægilopen* alteram, non primam *Matthioli*.

Matthioli: Bromus Lob.

C. Bauh. pin. Gramen *Festucæ* 7. siue *Festuca* *Auenæ* sterilis clatior *Cela* & *ma*. Diosc. aliis *Cela* & *ma* ad differentiam Auenæ. *Festucago* *gaza*. Lolii primum genus, *Trag.* def. *Ægilops* prima *Matthioli*. altera in comp. *Ægilops* Lac. vera *Cers.* hort. Bromos, & Auenæ herba. Dod. Gall. *Festuca* & Auenæ græca, Lon. Auenæ sterilis, Adu. Thal. Bromos sterilis Lob. icon. Ger. Bromos herba, Dod. Lu. d. Auenæ græca Cæf. *Ægilops* i. & Auenæ fatua Tabern.

Gramen Festuca C. Bauh.

Herba natura sua in totum syluestris, Aestate Maio mense fecus vias in pratibus, agrorum marginibus & segetibus reperitur.

Locus & tempus.

GRAMEN TENVIFOLIUM HIRSVTUM, BARBA ÆGILOPI OLIM Matthioli.

C A P. XXXIV.

Radices tenues albæ, è quibus enatorum culmorum pars ima nodosa, satis profundè in terram depacta, festucis siccis comata, vt in *Nardo Indica*: folia *dodrantalìa*, angusta, hirsuta, potissimum quæ calamos ambiunt, angustiora multò quàm sint *Ægilops Matthioli*: calami hirsuti, geniculis nigris distincti, iuba diuisa, vt in *Ægilope* glumis crassioribus ex pediculis robustioribus, rubentibus, cum aristis multò breuioribus.

Descriptio

An Dodon. Lat. in fol. Gramen pratense, sine descriptione.


Lob. & Pena aduers. p. 2. Gramen minus (sic in 1c. p. 1.) istud quidem quod fundit montanus, incultus, & aridior aget, vt pabulo gratus & vtilius velleri, sic muled delicatius, minus & semine efficacius est. Ex succincta hac Lobelii descriptione nondum intelligo quam plantam intelligat: suspicor figuram demonstrare à nobis descriptam, non tamen assero. Tabern. icon. Gramen minus, & Hist. vbi Gramen 4. Graß. Figura Tabern. videtur facta ad imitationem figure Lobel. vt Dodon. Scio fratrem Gramen minus Lobelii & Tabern. ad aliam plantam referre. Genus provenit, alii que in locis observauimus.

Locus.

PANICVM VVLGARE, PVNICEVM, & spica diuisa. CAP. XXXV.

Panicum vulgare.

Descriptio



Panicum panicum.



composita, in quibus semen Panic vulgaris copiosum. glutinâ etiam non alia, sed arifis, quæ inter grana plurimâ cinicant purpurascentibus: fo-

lia arundinacea, frequentia, vaginis longis caulem involuunt, adeoque & inferior vagina superiore excipit, tactu aspera. Est mihi quoddam Panicum spica infigniter diuisa, cuius figuram, nouam exhibemus, sicuti Panicum Panici punicea, alias vti paratæ erant proponim? pro vulgari.

Panicum spica diuisa.



È frumentis quæ Hieme in herba sunt, verò tempore in culmum geniculatum & concuum fastigiat Panicum, quod pro indiuiso [Constant. legit, tantum pro indiuiso: exponitque sine diuisione, in commune, communiter. Quo genere loquendi vsus est Cato cap. 137.] & paruis auibus expositum est. Indefensum quippe membranis continetur. Est verò à Paniculis dictum, cacumine languicè nutante, paulatim extenuato culmo penè in furculum, præcæsis aceratur granis cum longissima pedali obba. Diocles Medicus mel frugum appellauit. Hac Plin. lib. 22. cap. 25. Dioscorides refert Panicum alios Melinen appellare, & frumentaceis seminibus, Milio simile. Et hæc est fortè occasio, cur Tragus inscribat Miliun agrictæ seu exiguum Klein oder volder Hirs / quod alii Panicum, Germ. feuch & Heidelseuch appellant. Indicauit porò & Typham, à paniculata iuba nominandâ.

Ruellium, Panicum in Italia Melicam vocari scribentem hallucinari refert Matthiolum in prior. comm. vbi ἐλευθερον à Græcis appellari ait, Arab. Dochon: Italis Panicum: Germ. Pfemich/heidel-Pfemich pray, fuchschwaus i. e. cauda vulpina: Hist. Panicum, & Panicus Gallis Panicum. Meminit in post. comm. l. 1. cum mag. fig. Panic pedali longitudine panicula: tradit & aliud, mammosas ferè paniculas gerens, & semen racematim profertens copiosiore prouentu: addit colore paniculas variare: nam quasdam candicare, alias rufescere, plures flauescere. In It. asserit Panici genus quoddam semine luteo, & aliud albo: figuram ponit qualis nostra ad panicum facta. Cæterum errandi occasione præbuisse videtur Ruellio nominis Melicæ cum ἐλευθερον, sicut uelutis vicinitas, quæ fecit vt Panicum & Sorghum inter se confuderit, & Melicæ descriptionem cum Panici miscuerit. ἐλευθερον ἢ ἐλευθερον dictum videtur quasi Melicam quidpiam: ἐλευθερον verò, forsitan ab ἐλευθερον, quod est inuoluo.

C. Bauh. pin. Panicum 1. siue Germanicum, siue Panicula minore: Paniculum Fusch. Tur. Dod. Cord. Syn. Geln. hort. Lon. Lob. Obs. p. 24. 1c. p. 41. Cas. Cam. Tab. Ger. Variat paniculis albis, flauis & purpureis: semen album, luteum, rufescens: Dioscorides frumentaceis, Gal. leguminibus iungit. Eid. Panicum 2. siue Italicum, siue panicula maiore. Panicum Marullo, Hermolao, Ruellio, Matthiolo, cui & Domesticum: Anguil. Carl. Portæ. Panicum

fatum, Lugdunensi. Panicum vulgare, Cluf. Hist. Panicum aliud Indicum, panicula villosa, Lob. Ic. p. 41. Panic Indici spica Dodon. Panicum Indicum. Tab. 6c.

Plinius lib. 18. cap. 7. recenset Panicum inter frumenta aestiva, ea sc. quae aestate ante Vergiliarum exortum feruntur. Cap. 26. Extremo ergo hoc tempore Panicum satio est. Iustum est hoc seri maturato Hordeo, atque etiam in eodem aruo. Estque signum illius maturitatis, & horum satioris commune, lucentes vespere per arua Cicindele. Ita appellant rustici stollantes volatus, Graeci vocant verò lampyridas, incredibili benignitate natura. Cap. 17. Panicum in frigido & aquoso prout serendum, postea in calido agro. Pestem à Panico sturnotum passerumve agmina, abigunt herba, cuius nomen ignotum est, in quatuor angulis segetis defossa: mirum dictum, ut omnino nulla avis intret. Cap. 10. Panicum aquis minime gaudet, cum in folia exit. Venat id inter vites arboreque frugiferae feri, terram emacrarit hoc fatu exilimantem.

Panicum Dioscorides Milio simile dixit, eodemque modo in panes subigi: eosdem habere usus: minus tamen & mitrire & adstringere. Panicum Gallia quaedam, praecipue Aquitania vitum, inquit Plinius lib. 18. cap. 10. Sed & circum padana Italia addita faba, sine qua nihil conficiunt. Pontice Genes nullum Panicum praefereunt cetera. Item lib. 22. cap. 25. Panicum effectus habet quos Milium. In vino potum prodest dysentericis. Similiter his quae vaporanda sunt, excofactum imponitur. Sicit alium in lacte caprino decoctum, & bis die hauium: sic prodest & ad tormina. Colu. Panicum pinitum, & enolutum surfure, sed & Milium quoque, pultem, panis inopia, maxime cum lacte non fastidendam praebet. Galeni sententiam exinde aliam, ubi Milium minus alium colubere dicit, quam Panicum, suo loco adscribemus. Ceterum ei contrariatur Dioscorides, quod & ego inquit Corn. ita se habere credo. Verum G. simpl. phar. ita de Panico scribit, Panicum quod & Melitum vocatur, ex leguminibus est simile Milio, & specie, & viribus parum abens, & siccandi vi praeditum. Sicit etiam ventris fluxiones, quemadmodum Milium. Si verò extrinsecus impositum fuerit, siccet & frigefacit. Quo loco in *ἡσπέρων* legatur, quod Diosc. dixit *ἡσπέρων* *ἡσπέρων*. Indiscriminatim enim *ἡσπέρων* Galenus etiam *ἡσπέρων* vocat, alioqui enim *ἡσπέρων* appellari dixit illa cerealia femina, ex quibus panis non fit. At verò quod Plin. dicit, Dioclem panicum mel frugum appellasse, non aliud est quam expositio vocis *ἡσπέρων*, quae melleum quid significatur.

Porrò, licet apud Hist. Lugdunensem legatur nullum hodie Panicum nec officinis, nec panificio esse usum, quòd, cum siccum admodum & macilentum sit semen, parum admodum praebet alimentum, idcirco auiculis obicitur. Clufius tamen perhibet magni per vniuersam Germaniam, Vngariam, & Bohemiam Panicum vsum esse: etiam in alimentum cedere ac pulres ex eius semine deglutato fieri non ingrati saporis.

emittens culmos eoque medulla alba factos, foliis donatos ad singula genicula arundinaceis: iam verò cylindraceas spicas, non in summo tantum culmo gerit, ut nostrate Panicum, verum etiam è nodis & alis foliorum aliam spicarum sobolem parit, quae ut longitudine cedunt nostrati, ita crassitie vincunt, pilosae: In his semen stipatum denso Panicum nostratis, subcaeruleum, Milio par-



ab vna parte, quae adhaeret secundum longitudinem striam donatum, leue, gemellum ferè, ex pediculis vincta longioribus, pilosis, glutinis inuolutum.

Panicum Americanum.

Cluf. plantam nostram ita describit: Est praeter Panicum vulgare genus aliud ex Peruviana provincia primum in Europam illatum: habet autem id culmos longè

crassiores, firmiores, altiores vulgari Panico, & planè harundinaceos, ut quos humanam altitudinem attingere, interdum etiam superare plerumque viderim, crebris geniculis & veluti articulis praeditos, & lanugine obfatos: folia harundinacea è singulis articulis prodeunt, longa, lata, dura. Melicæ foliis non valdè dissimilia: inter quae prodeunt è geniculis alii veluti breuiiores culmi, similibus foliis obfati, desinentes in spicam digitalis longitudinis, nonnunquam breuiorem, & duntaxat pollicarem, densè compactam, & equalis propemodum vbique crassitudinis: femina oblongiusculis gracilibusque petiolis innixa profertentem, & capillaceis veluti glutinis inclusa, quae extrema parte è glutinis prominente, ctassiora, magis rotunda, & quasi orbiculata sunt, leuia, subcaerulei coloris, qui in calidioribus regionibus magis satur est, raro tamen vel in Germania, vel in Belgica (in illis enim prouinciis sepe terrae mandati eius femina ex Hispaniis accepta) ad plenam maturitatem proueniunt: radices eius fibrosae sunt, validiores & maiores, quam in vulgari Panico.

C. Bauh. pin. p. 27. *Panicum 3.* siue *Indicum* spica *Synonyma* obtusa caerulea. *Panicum caeruleum Indicum*, Adu. Lob. icon. Cam. Tabern. *Panicum Indicum* Dod. Ger. siue *peregrinum*, Lugd. *Panicum Americanum*, Cluf. Hist. Pannicula est subcaerulea, in calidioribus regionibus magis satuta. Panicum nomine & Phalaridis Aethiopiae accepimus huius *Plantae Aethiop.* semen.

Figura Panicum Indici Dodon. de frum. & in fine Hist. Flor. ac in fol. Lat. satis comoda si semen pingretur duplex ex vno pediculo: descriptio an quadret Panico haeo.

PANICI AMERICANI SESQUIPEDALIS SPICA.

CAP. XXXVII.

PANICVM COERVLEVM SIVE INDICVM.

CAP. XXXVI.

Orghi altitudinem assequitur Panicum Indicum, similiter ex fibrosa valida radice multos Tom. II.

Huius Panicum Americani spicam crassam valdè firmam & bene compactam, non vbique Descriptio

tamen æqualem, sed paulatim & sensim extimã parte gracilescenstem, sesquipede longiorem, nec tamen integram ad me mittebat (inquit Clusius) Londino Iacob. Gareto anno 1592. à Nauclero quodam Anglo ex sua navigatione reduce empram, cuius semina, non multò maiora mihi visa, quàm illius Panic Americani, cuius modò memini, cæteroque prorsus familia: nisi plura



simul iuncta, & hispida glumã inclusa, breui pediculo inniteretur: illius stirpem nascentem videre non licuit, nam serete neglexi, quia vetustate nimis reliccatum existimabam, spicam tamen in lignea tabella Francofurti exprimebam curabam à perito artifice, vt hoc loco infererẽ, digna enim mihi videbatur, cuius aspectu alii etiam fruere videntur. Proximẽ autem sequente anno scribebat

ad me N.V. Carolus de Tassis veterediorum Antuerpiæ Præfectus, ipsi natus istic plantas semine quod ab eodem Gareto acceperat, non valdè dissimiles illis, quæ iam à multis in Belgicis hortis sunt conspectæ: nec dissimiles etiam spicas siue paniculas protulisse.

Cum hac spica eandem attulisse generum Cherlerum redeuntem ex Anglia 1605. existimamus, eamque à Iacobo Gareto peritiss. Pharmacopœo datam, minorem tamen præcedenti. Est autem tantum palmaris, quia nondum inatura vt iudicamus, ea repræsentat aliquomodo plantaginis spicam aut Piper longum, vtraque parte gracilior: crassitudinis circiter calami ordinis, constat veluti squamis pulchrè ordine sursum tendentibus, scapus diducitur in plurima fractu mediocriter continuata fila: Color pallens, obscurior, sapor nullus manifestus

Synonyma C. Bauh. pin. *Panicum* 4. siue *Indicum spica longissima. Panic Americani spica grandis vel sesquipedalis*, Clus. Hist. *Panicum Aethiopicum ex Guinea*, Clus. hist. ap. ad lib. 5.

PHALARIS.

C A P. XXXVIII.

Descriptio **C** vulmo adolefcit sesquicubitali, Hordeaceo, quatuor aut quinque geniculis nodoso: foliis Hordeaceis, radice habitiore, vnicuique culmo, qui ex vna radice plures pronascuntur, spicæ singulæ insident, sesquiunciam aut vnciam longæ, turbinatæ, foliaceis glumis striatis squamatis scandularum ritu compactiles, equarum sinu treinula flosculorum pallidulorum filamenta promuntur, iisdemque postea locellis semen reconditur lubrico nitore Milii, forma Lini, sed magnitudine suppar.

Phalaris Dioscorideæ caliculos emittit à tenuibus ac nullius vsus radicibus numero-



fos, bipalmes, geniculatos; culmis Zeæ similes, graciliores tamen ac sapore dulces, folia itidem Zeæ (*ἰχθυόειρα δὲ ἢ γλυκία τῆς γένουσι τῆς φύλας δὲ ἕραια τοῖς τῆς Ζεῆς*). Coclusa habentur in vet. cod. itæque apud Orbasium, at in vulg. exemplarib. desiderantur) semen vero Milii magnitudine, candidum & oblongum.

Phalaris thyrsum habet longum, tenuem, ceu calamum, in summo flore inclinatum: Semen simile Sefamæ. Ita Plinius lib. 17. cap. 12. non ad eò consonè Dioscoridi, quanquam sanè de eadem herba dicere videatur.

Cornarius Phalaridem officinis ignotam dixit: & sub diuinatione Herbariorum positam, qui eam inter Milium & Hordeum nasci putent, nomine Germanis adhuc ignoto. Quidam tamen verum Milium Solis esse asserunt, quod Officina minus appellant.

Apud Tragum Phalaridis figuram aliqui posuit sub titulo Phalaridis Dioscoridis, Sals 7. Quecsten Grass: interea Tragus hanc plantam non describit eo loco, nec eam intelligit.

Lonic. huius descriptionem exhibet sine descriptione.

Matth. in prior. com. Phalarim eam suspicatur quæ in syluestrium frugum geoere, à quibusdam recentetur, ad eò vt non delint etiam, qui hanc apellant Syluestre Milium, semine Milii ferè magnitudine. In post. comm. vbi pictura, omittit Milii sylv. nomecu quasi olim confuderit cum Phalaride.

Videtur Gesn. hort. Phalaridis speciem vnam siluestrem admittere, at alteram satiuam.

C. Bauh. pin. an *Melia altera Theophrasti, Phalaris Diosc.* Trago icon. Phalaris Matth. Ang. Tur. Dod. Cord. Gesn. hort. [cui & *Canariensis semen*] Lon. Lobel. Cæsalp. Cast. Cam. Lugd. Tabern. Ger. *Phalaris herba*, Gesn. catal. *Milium alterum* Theophrasti Dalech. in Plin.

Peregrinum hoc semen Belgio est, auctore Dodonæo, insertur autem ex Hispaoia ac Fortunatis insulis. Seritur Vere: sub finem Aestatis maturefcit. Non modò è Canariis facchatinis & Hispaniis, sed etiam Narbonensi agro, via ad Magallonem prope segetes ad pontem, Phalaridem veram, eiusque enatum semen feliciter in Belgio & Anglia habuimus ait Lobelius: quò Institores Canariis philomenis pluraquam faccharatas & mellissuas cantilenas modularibus alendis venum aspottant feminis magnã vim. Nos variis in hortis colimus semine maturo Augusto.

Herbæ ruse succus, Dioscoride dictatore, ex aqua aut vino expressus ad vesicæ cruciatus utilissimè bibitur. Semen quoque cochlearis mensura ex aqua potum, ad eadem est efficax. Plinio calculos frangit semen, potum ex vino vel aceto, velcum melle & aceto. Idem & vesicæ vitia sanar


fanat, Galenus Phalaridis herbæ & succum & semen, & folia pota ad vesicæ dolores opitulari, vel eius quæ tenuium partium quid & calidum habet, credi testatur. Alimento esse, & nonnulli panes pinifendos curare, escitarque ad calculum farctusque vesicæ, perhibet etiam Lobelius.

PHALARIS MAIOR SEMINE NIGRO
C. BAVH.

Phalaris 2. siue maior semine nigro: *Cunentis*, Melitenium incolis: granum in Melita frequens, Canariis infulis familiare, Massilia nomen, nigrum, oblongum, à Milio simile, quo Canariis passeris præcipue nutriunt: ex grano aliquando à Dalechampio sato natum, referente C. Bauh. in pin.

PANICVM SYLVESTRE DICTVM, ET
DENS CANIS. I.

CAP. XXXI X.



Gramen sylvestre quibusdam dictum, radices habet renues frequentissimas, eoque nomine euulsu difficilis: culmi plures palmares, atque etiam dodrantales, geniculis paucis articulati, oblique articulatur, oblique erigitur, aut per terram repandi reclinantur: denuoq; actis radiculis artol-

luntur: singulis calamis, singula insident spicæ Panici, minores, asperæ, versibus adherentes; per maturitatem rufescentes, breuib; pungentibus aristis obseptæ, inter quas semina parua Panico minora. Folia graminea, albicantia, hirsuta, asperæ, partem culmi cui vagina amplectentia.

Fuchius, cuius icon hic assumpta displicet, vocabat Phalaridem Plinij, hanc quam Genevæ nominant *Panicere*, quasi vacuum Panicum. Ego ramen non puto Phalaridem Plinij ad hoc Panicum referendum. Sed crediderim potius cum l. 18. c. 17. intelligere per Herbam albam Panico similem, occupantem arua, pecori quoque mortiferam. An Ruell. lib. 2. cap. 18. Herba specie frumentum, folio Tricici &c. in arvis nascens. Frumentum ruri caudati frumenti nomine notum? An eid. lib. 7. cap. 32. Holoostium, Denticulus canis Ruri, cramen molle Herbariorum nonnullorum?

Cordus in Diosc. Ruellium reprehendit, ut qui sibi non conftet, quòd Holoostium à callis, Denticulum canis appellari scribit: Quòd idem rursus alibi cramen, alibi Coronopum, Dentem canis esse dicat. Sed an Cordus ritè mentem Ruellij perceperit, dubito, & an animaduertit, nomen Dentis canis à callis aliquot plantis similibus tribui, ut huic & duabus sequentibus,

An Rhegino in exerc. Alopecuros, Panicum agreste, non Frumentum caudatum, Lat. Cauda vulpina, Herba Tritico similis scholasticis? An orth. Frumentum caudatum, malis Alicopecuron aliorum?

An Casalp. Alopecuros vera si particularim floretet, Panicastrella vulgò vocata, Panicum sylvestre fortè dicendum?

An Trago Lolium 7. quod Phalarim Dioscoridis esse putat? An Thal. Phalaris silu. maior, spicis asperis, lappaceis vestibus adherentibus.

Lonicero pro Phalaride Dioscoridis describitur, sed non depingitur. Figura enim quam pro Phalaride exhibet, est alterius plante.

Math. in comm. cum mag. fig. habet descriptionem sub Panico sylvestri, quæ conuenit huic nostro Denti canino primo paniculæ simplici, non item figura, quæ Panici est paniculæ sparsæ, aut diuisi.

Lob. in le. plant. pag. 13. tom. 2. est Panici effigie cramen simplici spica. Tabern. Ic. & Hist. cramen panicum seu d. grass. H. Lugd. p. 412. Panicum sylu. aliud Dalechampio, quæ fortasse fuerit Herba alba Plinii. Quidam tamen esse volunt eiusdem Scriptoris lib. 22. cap. 25. Miliariam herbam, quæ Milium necat, & trita, cornuque infusa podagras umentorum sanare dicitur. Magis tamen placet eorum sententia Dalechampio, qui Alb. in herbam esse putant.

C. Bauh. phyt. Gramini 94. siue Panicum sylvestre, *Synon. G. Bauh.*


simplici spica, vel stilium sylvestre, Lolium 6. Tragi. Eid. pin. Gramen panicum tertium siue spica simplici: in quibusdam. Lolium sextum, Miliaria herba Plinii, Trag. Panici effigie cramen simplici spica, Lob. icon. Panicastrella, Casl. Panicum sylvestre aliud. Dalech. Herba alba fortasse Plinij, Lugd. cramen panicum primum. Tab. Gramen cyperoides spicatum, ceter. icon. Variat: aliquando enim spica oblonga: aliquando breui & rotunda.

Inuisa Oloribus herba, annua quidem: oritur aestate: semen maturat Augusto: perit Autumnò. Passim obseruatur. Has ei vires adscribit Tabern.

GRAMINIS GENVS QVIBVSDAM GALLIS

Dens caninus 2. siue Panicum sylu. paniculæ diuisa.

CAP. XL.



Calamos è Descriptis radice fibris compluribus crassiusculis constante, quæ locis humidis emittit duos tresve cubitos altitudine æquant: Folia Arundinacea in acutum mucronem desinant, iubam explicat palmarem & sesquipalmarem sabrubentem, aut è rubore nigricantem, crebris spicis

compositam, denso granulorum Paniceorum, glumis mucronatis, subhirsutis, nunc muticis, nunc aristatis, idque interdum in eadem planra inclusorum, stipatu confertis, libero tamen costae dorso, ut in gramine Mannæ.

An Oryza spec. Cord. An Cordo in Diosc. Oryza species, germanis Schnader nuncupata, Sesamum non absque errore putatum.

An Melis a Ang. An Anguill. Milium secundum, Milium siluestre Galeni, cuius meminit lib. 2. de antid. forte Ischamion Plinii?

An Trago Lolii sextum genus, Miliaria Plinii. Match. in com. cum mag. fig. ritulo Panici silu. ponit figuram paniculæ sparsæ, quæ videtur exprimere plantam primùm prouenientem, & loco humidiori, carentem aristis; descriptio autem conuenit Panico silu. paniculæ simplici.

Multò aptius Ischamionis hitorie Plinii quadrare visum est Clusio Milii genus hoc silu. & supinum, ut vocat, quàm Panico siluestri.

Dodon. frum. & in fol. lat. (vbi Panicum palustre a nonnullis vocari ait) figuram minùs bonam ostendit. Ad Graminis autem genus, siluestre hoc & spurium degenerque frumentum, cerealium seminum vitium, Gramen mannæ alterum, referendum ipsi visum fuit.

C. Bauh. phyt. Gramen 92. siue panicum siluestre sine aristis: panicum sylu. Matthioli, &c. Item, Gramen 93. siue panicum silu. cum aristis, per omnia priori respondens, nisi quòd spicæ vtriculi in oblongâ aristam desinunt. Rursum, Gramen 95. siue panicum sylu. spica aspera: Lolium 7. Tragi: Panici effigie gramen aristis circumvallatum Lobel. icon. p. 14.

Panicum silu. de quo hic agimus spicâ singulari non obseruauimus. Quare tres species non facio. In eadem enim planta interdum obseruo spicarum vtriculos desinentes in aristam, alios eadem destitutos, ita ut lus naturæ hac in re negari non queat. Euenite autem cum dicimus ratione soliatque ætatis. Hinc porrò Lolium 7. Tragi non refero. Si quidem spicæ longæ, asperæ atque lappaceæ, vestibus adhaerentes sunt, quas in hoc Panico spica diuisa non obseruo. Sed implemet in pin. (vbi non ampliùs tres, sed duas solum species facit) Lolium 7. Tragi, & Panici effigie Gramen aristis circumvallatum Lobeli separat.

Gramen Panicum 1. siue spica diuisa, inquit, est Panicum silu. Matthioli: Lob. in Adu. p. 15. Cast. Cam. H. Lugd. Tab. & Gerardi: Panicum Herbariorum siluestre Lobelii. Obs. p. 25. (vbi perperam Lolium Cordo) Ic. plant. p. 42. tom. 2. Gramen alterum mannæ Dod. & Hist. Lugd. Milium silu. & supinum, Clus. hist. Panicastrella species Cæsalp. An Milium silu. Ischamion, Anguill. spica subinde singularis, non rarò multiplex, eaque modò herbaecci, modò atrorubentis coloris est. Item Gramen panicum 2. siue spica aristis longis armata, Panici effigie Gramen aristis circumvallatum Lobelii, Ic. Plant. p. 14. Gramen Panicum Ger. secundum Tabern.

Nos nondum separamus ab inuicem, ob iam adductam rationem. Illud duntaxat monendum censuimus, ex Lobelii figuris eam meliùs placere quæ exhibitæ est apud eum p. 14. quæ & à Mathiolo pingitur.

Locus Passim prouenit, nonnunquam palustribus locis delectans: hortis odiosa & molesta herba. Frequens est [inquit Dodon.] iuxta agrorum ageres, in hortis & alibi: repetitur non modò in

Germania & Belgio, verùm & Italia, Gallia, & aliis Europæ prouinciis.

GRAMINIS GENVS DENS CANINVS rertius, siue Gramen primum, vel Galli crus.

CAP. XXXXI.

Culmos ex radice fibrosâ plures promit, tribus quatuorue articulis nodosos, subinde etiã ramosos, subrubentes: folia Triticeis breuiora, latiora, hirsuta, culmos longiucula uagina inuolunt: uba singulis infidet culmis palmum aut sesquipalmum longa, quatuor, quinque pluribus setis comata, quarum alteri parti



secundum longitudinem è bifori gluma siccis purpurascens adnari, aersâ parte nuda sulcata, semen iisdem glumis conclusum panici graminis longius. Ruellius lib. 1. cap. 62. Theophrasti, Plinii, Dioscoridis Coronopum ait, à Leoniceno primò vulgari nomenclatura declaratâ, & eum censere dici Capriolam, Sanguinariam: Oritores Gallos vocare Denrem canis: Hanc generibus Graminis Plinium assignalle nobis exprimentè eandem esse, quam Græci Coronopum & Romani Gramen vocarent aculearum. Quod autem Leoniceni Capriola Coronopus Dioscoridis sit (cuius sententiæ quoque est Monardus) negat Matthioli in Diosc. lib. 2. cap. 123. Verùm eos aberrare non putat, qui dicunt Sanguinellam siue Capriolam esse aculeatum gramen Plinii Dactylon vocatum. Neque itquam se legisse ait, expressisse Plinium (ut Ruellius testari videtur) Gramen hoc aculeatum, esse Coronopum. Graminis huius semen, germanos Simelday, hoc est, celestem Mannam, Selauos verò Cornicis pedem appellare. Et hinc factum esse, ut quali certò crediderint, quod Leonicenus ab iis fortè seductus, puraret hac plantam Dioscoridis coronopum. Lib. 4. c. 28. vocat gramen aculearum Plinii, Hetruscorum Sanguinellam & Capriolam. In post. comm. cum mag. fig. distinguit lib. 4. Gramen Mannæ à Sanguinella tantùm ratione: ait enim gramen Mannæ multis in germaniæ locis ferri. Ceterùm, nec in spontaneo, nec in culto hoc gramine, crassam radicem, qualem Matth. pingit, obseruauit. Melius placet Camerarii figura in Egit. germ.

Aculeatum Plinii gramen esse negat Dodon. Lat. his verbis: Ad graminis genus referendum videtur & hoc Gramen Mannæ primum, siluestre, spurium, degenerque frumentum, cerealium seminum vitium, quod plerisque Italiæ & Germaniæ,

mania locis incultis sua sponte exit, reperitur & in Bohemia sylvestre, apud quos tamen & in agris feritur, veluti & in Gonticensi agro & Carinthia, ut Matthiolus refert, apud Belgas peregrinum, non nisi farum provenit. Germani *Zimelzau*, id est, Cæli rorem appellant, Matthiolo ea de causa *Manna* gramen, Mylisylyvestre ac spurium quoddam videtur genus. Creditur à Leoniceo ac Ruellio *Capriola* ac *Sanguinaria dicta*. Sunt qui velint *Plinij* gramen aculeatum esse, sed quia eius omnino brevis descriptio, affirmari nihil potest. Multum autem à veritate recedunt, qui *Coronopus* esse existimant. *Coronopus* siquidem, ut Dioscorides ait, per terram reptat, & foliis est fissis: huius verò culmi erecti aspergunt, & folia harundinacea nequaquam in partem finduntur, quæ *Manna* gramen non esse *Coronopus* eundem ostendunt.

Clusius in eo hallucinari reprehenditur, quod *Ischemon* *Plinij* (ita nostram hanc præsentem *Isipem* in Hist. inscribit) quod *Milij* genus sylvestre & supinam facit, in humidis nascens, foliis aspera lanugine obfusa, *Panicum* sylvestre *Matthioli* esse, sibi imaginatur.

Lobel. in Adu. p. 7. sub *gramine hirsuto nemorosum*, huius meminit vocans in *farum*, gramen aliud *Recentiorum*, *77. cap. 2.* *Plinij* *Scopenti* pag. 4. vocat *Ischemon vulgare*, *Crus galli*, *Dactylon* *Plinij*, & *Aculeatum*, *Sanguinellam* & *Capriolam* *Italorum*, Frustra autem hic querit an sit *Scirpus* *Tragi*. *Matthiolus* etiam, meo quidem iudicio, immerito reprehendit, quod vulgè in *Sanguinariam* cum *gramine Manna* eandem existimant, cum potius congeneres, quam eadem sint.

Necdum sanè mihi conlat, cur *Tabern.* gramen *Manna*, hoc est *Mannegrass* / *himelzau* à suo *Ischemo*, sine *gramine sanguinario* primo separet. Vocat hoc *germ. Blatzgras* / quod insigne sit adversus hæmorrhagiam sanguinis remedium. Illud in hist. duplex facit, scilicet *farium* & spontaneum. Veteres autem huius non meminit esse decernit: dici verò *Neotericis* gramen *Manna celestis*, *gramen esculentum*, *gramen cereale*, *Capriolam*, & *Herbæ Capriolam* & *Sanguinellam*. *Boh. Rosa*, *Vandalis* & *Sclavonibus* pedem *cornicis*, h. e. *frax. fass*, vocatur tamen & *hancbein*, hoc est, *Crus Galli*.

Geln. cat. *Coronopus*, *Capriola* vulgò dicta. *Eid. hort.* *graminis* species, *Sanguinaria* *Auicennæ*: Item, *gramen album* seu *hirsutum*, *Manna celestis* *Matthioli*.

Ceterum ad hoc caput sub vno & eodem titulo referimus *C. Bauhini* in phyt. *Gramen* 86. 87. & 91. quia nondum intelleximus, an reuera differentes sint plantæ, vel an culturâ tantum varient. *Horum* 1. vocatur in *pio. Gramen echinatum & aculeatum* 3. siue *album capitulis aculeatis* *Italorum*. *Gramen aculeatum* *Matth.* *Cast.* & *H. Lugd.* pag. 435. 11. inscribitur *gramen dactyloides* siue *Ischemon* 4. siue *gramen dactylon* folio latiore, *Sanguinaria* *Comitis Neuenære*, *Tragi*, *Canaria* *Plinij*, & *galli crus Apulei*, *Anguill. epist. 12.* *Coronopus* *Leoniceo*, *Ischemon* *Geln. cat.* *Clus. hist.* & *Tabern. Ischemon vulgare* *Lob. in Adu. pag. 4.* *Obs. pag. 12.* *icon. plant. p. 24.* & *Gerardi*, *Ischemon* *Plinij*, *Clusii* *Hist.* quoad iconem, *gramen Ischemon* *Plinij*, *H. Lugd.* siue *Dactylon* pag. 426. Variare hoc dicitur species, plerumque quinis & senis, raro quaternis, rarissime ternis. Illi appellatur *gramen Dactyloides* siue *Ischemum* 8. siue *gramen Dactylon esculentum*, *gramen Manna* *Matth.* & *Castoris*, *gramen aculeatum*, *Sanguina-*

ria, *Capriola*, *Leon. Ruell. Ann. Frumentum German. Schwander*, *Orizæ* species, *Cord. in Dioscor. gramen album* seu *hirsutum*, *Gesl. hort. Manna celestis Germanis*, *Eidem gramen Manna esculentum*, *Lobel. in Adu. Obs. pag. 13.* *Icon. plant. pag. 24.* & *Ger. gramen Manna primum*, *Dod. Tabern. gramen aculeatum* 1. *Plinij*, *Thal. graminis genus, quod in Germania feritur* *Cæsalp. gr. men Manna prius* *Matth.* & *prius* *Dod. Hist. Lugdun. pag. 414.*

Annua est planta etiam hortis valde odiosa, Locus & Dens caninus sylvest. tertius, qui Iulio apparere tempus incipit. Ab hoc satius, quem priuati gramen *Manna* vocant, non nisi culturâ differre videtur.

Cacumina pueri naribus inferunt, extrahuntque ut sanguinem eliciant, & hinc ab effectu *Herrufci* vulgò *Sanguinellam* vocant: in germaniæ locis feri ac coli audio [inquit *Matth.*] non minori cura, quam cætera frugum & leguminum genera. siquidem eius semine frequenter videntur in cibis, quod in iure carniū pinguium decoctum non minorem cum palato inear gratiam quam *Oryza*: cui ego facile præposuerim: ita pila autem ipsum tumid. re oportet, ut à suo resistat putamine. Huius in acetariis hæcenus nullus est usus, licet *Gesner.* in cat. hoc asserat. Nunc an tales & tantas vires contineat, quantas perhibet *Tabern.* fides penes ipsum esto.

Vires & n. fus.

GRAMEN DIGITATVM HIRSVIVM.



Dereni radi- Descriptio

ec & firmamitur, ex qua cul nos emittit cubitales & bicubitales, tenues, tubentibus geniculis nodolos, frequentius singulares, aliàs ramosos: folia tres quatuorve uncias longa, angusta, & raris longis pilis hirsuta, subinde tubescens: statim à radice partim, partim sed minorâ (exceptâ vaginâ) ex culmis oriuntur, panicula iubata, quatuor aut quinque species comata, graminis *Manna* similibus, minoribus purpurascens, molli lanugine villosis, ex glumarum mucrone arista molli rassa prominente, strobilorum staminula saturatiore purpurâ tinguntur.

Est hoc *Tabern. Ischemum secundum*: *C. Bauh. phyt. gramen* 89. siue *Dactylon 3. species villosis*: *Eid. pin. gramen dactyl. ides* siue *Ischem. 5.* siue *Dactylon angustifolium species villosis, tribus* 6. 7. & 10. *varians*.

Synonyma

Basilicæ frequens ad pomerium Albanum & Locus: alibi locis fœcis & squalidis.

MILIVM.

CAP. XLII.

Descriptio



mis comprehensâ, grana lubrico lauore lucida, parua, colore sepius fuluo, vel aureo, rariùs albo, rarissimè striato, radices crebræ, fibrosæ, validæ, albicantes.

Synonyma cum nominibus linguar.

Græcis, vt Dioscoridi, Galeno (qui secund. de antidot. Milii siluestris mentionem facit) & aliis *μύλιον*, & non vt Straboni *μύλιον* dicitur, à numerosissimis & minutis granis Ficuum, quæ *μύλιον* vocantur: Hippocrati iuxta Galeni glossam *μύλιον* & non *μύλιον*, ut vult Hermolaus: Arab. *Ieuers*, *Seguers*, & *Gtauers*; secundum verò Serapionem *Dorb. n.* Hebr. *Dôchan*: Latinis vt Plinio, Brunfelsi, Trago, Matth. Fusch. Turn. Dod. Cordo in Diosc. Lac. Lon. Lob. Obs. p. 24. sc. p. 29. Gesn. coll. Cast. & Tabern. *Milium*, à miliari summa sc. Felto, quasi millesimum granum ferat. *Milium vulgare* Lob. in adu. & Gesn. hort. *Milium commune* Anguillar. *Milium nostras* H. Lugd. p. 409. *Milium aureum & album* Cam. *Milium* i. siue semine luteo, vel albo C. Bauh. pin. *Milium* Dioscoridis, Theophr. & Plinii, Cæsalpino.

Nomina linguar. *Melina* i. *sepré*. *Farina mellea*.

Germ. *Hirz*, & *Hirz*: Belg. *hirs* & *Milie* Gall. *Mil* & *Miller*: It. *Miglio*: Hisp. *Milhe*, & *Mijo* Angl. *Myle*: Boh. *Proso*.

Varro Milij nomen ineptè à Græco deducit, melinen id vocari dicens: nam Diosc. & Galenus per Melinè Panicum intelligunt. Farinam miliaceam, seu fractum Milium sunt qui *Scrutum* vocari putent, in Horatij versu illo.

Vilia vendentem tunicato scruta popello.

Sunt tamen & aliæ scruti appellationes. Nostra autem stat sententiâ scruti nomine vetera & corrupta fermenta, pannos veteres, vestimenta quoquo modo deprauata, vasa dimidiata, supellectilemque tandem quamlibet præfractam, significari, id quod docet Lucilius apud Gellium, his verbis: *Quid ni?* & scruta quidem vt vendat, scrutarium laudat.

Miliaria auct.

A Milio, *miliaris aues* dictas esse, quòd ad hanc frugem turmatim se conferant, eaque vescentes saginentur, placet Varroni. Porrò quamvis Cenchridi aui nomen videatur Milium indidisse, eam tamen miliariam non esse certum est, cum cenchridem, vt refert Plinius, accipitrum generis

Græci faciant, quàm Latini *Tinniculum* à voce & sono, vocant; Galli verò *Quercerelle*, vulgò bene cognitam, quòd in altis urbium turribus nidificet.

Plinius lib. 18. cap. 17. docet quomodo Milium muniendum sit à vermibus & passeribus, dum ait: Reliqua femina [Milij & Panici, intelligimus] Cupressi foliis tuis si misceantur, non esse vermiculis obnoxia, nec si interlunio ferantur. Multi ad Milij remedia, rubetam noctu aruo circumferri iubent, priùs quàm sarrjatur, defodique in medio inclulam vase scitili: ita nec passerem, nec vermem nocere, sed erucendam priùs quàm metatur, alioqui amarum fieri. Quia & aruo talpa contacta femina vberiora esse. Democritus succo herbe, quæ appellatur aizoon, in regulis nascens tabulifve, latinè verò sedum aur digitellum, medicata ferri iubet omnia femina. Vulgò verò, si dulcedo noceat, & vermes radicibus inhaereant, remedium est, amurca pura: ac sine sale spargere, deinde sarrire. Si in articulum feget ire coeperit, runcare, ne herbe vincant. Peltem à Milio atque Panico sturnorum passerumue agmina scio abigi herba, cuius nomen ignotum est, in quatuor angulis fegetis defossa: mirum dictu, vt omnino nulla avis iniret. Mures abiguntur cinere mustela, vel felis diluto, & semine sparso, vel decoctarum aqua. Sed redolet virus animalium eorum etiam in pane. Ob id felle bubulo femina attingi vitilus putant. Rubigo quidem, in vima fegetum pestis, lauri ramis in aruo defixis, transit in earum folia ex aruis. Luxuria fegetum castigatur deute pecoris in herba dumtaxat: & depascæ quidem vel sepiùs, nullam in spica iniuriam sentiunt. Reconsarum etiam semel, omnino certum est, granum longius fieri, sed inane cassumque, ac fatum non nasci. Babylone tamen bis secant, tertio depascunt: alioquin folia tantum ferent. Sic quoque cum quinquagesimo fœnore melle reddidit exilitas soli: verum diligentioribus cum centesimo quinquagesimo. Neque est cura difficilis, quàm diutissime aqua rigandi, vt prapinguis & densa vbertas diluatur. Limum autem non inuehant Tigrisque, sicut in Ægypto Nilus. Nec terra ipsa herbas gignit. Vbertatis tamen tantæ sunt, vt sequente anno spontè restibilis fiat feget, impressis vestigio feminibus: quæ tanta soli differentia ad monet terræ genera in fruges describere.

Milium potèd leuem, solutamque desiderat terram, nec in sabuloso solum sed & in arenoso quòque proreuit, modò vel humido solo, vel riguo solo: nam siccum cretosumque reformidat, vt ait Columella. Ante ver commode ferri non potest: quoniam repotibus maximè lætatur. Vltima tamen parte mensis Martij commodissimè terræ committitur. Plinius milium inter frumentum quòque genera verna connumerat, & eo Campaniam præcipuè gaudere tradit. Milium Theophrastus refert siccitate sua diuturnum esse: idem plus annos centum durare, si quòd ventus & ætæ non perueniant, condatur, auctor est Varro.

MILIVM SEMINE NIGRO
SPADICEOVE.

SEmine Basileâ misso facillè mihi prouenit in Shorto E. C. Montbelgardi, in quo ex semine decido quotannis renouatur. Non est hoc illud milium nigrum olim Romam allatum ex India cuius Plinius lib. 18. cap. 7. meminit.

Milium

Milium 2. siue *femine nigro* C. Bauh. pin. est milij nigri species apud. Orisabium, Ang. *Milium femine nigro & lactore iuba* Lob. Obl. *Milij alterum genus e colore nigro deterius*, Cæf. *Milium inuā subinde coloris nigricans*, Dod. *Milium nigrum* Taber. Cam. Ger.

Hoc quod in Argouia Bernatum frequenter feritur, à vulgato differt folijs latoribus, caule non adeò alto, jubā sparsā & minore, femine aliquidantū majore & rotundiore, & ad pultes conficiendas altero longè vtiliore.

Milio (cuius adhuc apud Nigratas in Aphrica magnus est vsus) nonnunquam in pane vintur, vigente frugum penuria, inquit Galenus, panis tamen ex eo exigui est alimentī, & refrigerans. Constat insuper præaridum, & instar arenæ friabilem esse: nihil enim in se habet pinguitudinis, & lentoris. Iure ergo alium humidiores exiccat. Agricola: huius farina cocta, admisto adipe suillo, & oleo vescuntur. Panem etiam & pultem ex Milio fieri testatur Plinius, cum scribit. Milio Campania præcipue gaudet, pultrēque candidam ex eo facit. Fit & panis prædulcis. Sarmatarum quoque gentes hac maximè pulte aluntur: & cruda etiam farina equino lacte, vel sanguine & cruris venis admixto. Hæc puls etiam germanis hodie in vsu est, cum lacte cocta butyro addito, & saccharo plerumque asperso. *Alibi Plinius*. Panis, inquit, multifarīe & è Milio fit, & Panico rariū. Sed nullum frumentum ponderosius est, aut quod coquendo magis crescat. Goppo panis è modio redeunt, modiusque pulvis ex tribus sextariis madidis. Panis ex Milio conficitur, inquit Columella, qui antequam refrigerat, sine saltidio absumi potest. Sed quamuis panis ex Milio nisi in magna reliqui frumenti penuria non fiat, ait Galenus, tamen is dum recens est, vt scribit Matthiolus, & à pistore rectè paratus, vt Veronæ fit, & ita calidus, vt è furno excipitur, denotatus, sua quadam suauitate placet, & à multis expectitur. Cùm verò obduruit, planè ingratus est. Siluicola: Tridentini sola pulte Miliaea quam vulgò *Polenta* vocant, aluntur, eam cum lacte edentes. Sed carbonarios opilionēsq; Tyrolensē quum pereuntaretur Lobelius, nam vera scripserit Matthiolus, nimirum eos solo Miliaeco pane, vel Polentā lacte incoctā vesci, eum ridebant. Milium, inquit Dioscorides, in panes eodum modis ceteris frugibus alit: sicut pulve sua alium: vrinam cit. Torretur Milium, feruēsq; in sacco ponitur, vt torminibus, reliquisque doloribus, si ægra pars foueatur, auxilio sit. Milium Galeno primo ordine refrigerat, exsiccat verò tertio exoluto, aut certè secundo intenso: habet etiam paululū tenuitatis. Ex hac tum consistentia, tum temperatura instar edulij comestum planè inter omnia frumentaeca minimum conferit nutrimenti, sed & ventrem siccat. Porro foris impositum in facculis, idoneum est fomentum iis quæ citra morsum exsiccati postulant, & cataplasmatīs modo illitum exsiccare potest. Atamen admodum friabile est. Proinde difficile est eius in cataplasmatīs vsus. Idem alio in loco fomenta ex Milio in capitis dolore laudat, quòd, vt ait Hippocrates, leue ac lenè sit Milium. Sic enim ille scribit, fomentum siccum ex sale ac Milio torrefactis, ac lanceo masupio exceptis accommodatissimum. Etenim leue ac lenè Milium est, quod Plinius leuissimum ac mollissimum esse dixit. Milio sinitur alius, discutiuntur tormina, in quem vsuum torretur antè. Neruorum doloribus, & aliis feruens in sacco imponitur, neque a-

liud vtilius, quoniam leuissimum mollissimumque est, & calorī capacissimum. Itaque talis vsus eius est ad omnia quibus calor profuturus est, farina eius cum pice liquida serpentium, & millepede plagis imponitur. Hæc Plinius. Milium igitur ad flatūs repellendos fomentum est optimum, præsertim si cum sale comixtum fuerit. Quin & præstantius redditur additis chamæmeli floribus. Milium medicamenta & carnes, si in eius acervo sepeliuntur, à carie & putredine diutius vindicant.

VVeck. in Antidot. spec. Syrupum ex Milio componit, quem Ambrosij cognominat, laudans eum in febribus, vt qui sudorem prouocet, & sitim extinguat. Recipit autem Milij excoriciati quantitatem conuenientem, deoquoque donec crepet: dein recipit vnc. v. vel circa, eius iusculi bullificatis, & infundit vini albi odoriferi vnc. ij. & sic calidum dat patienti ac bene eum cooperit, & sic mirum in modum sudaturū promittit. Sed mihi magis probatur sententia Montagnanæ consil. 393. de thermis, qui ait se expertum, Milium ex lacte insigniter sudorem compescere. Dioscorides enim alium adstringere scribit, & Galenus ex eo panem frigidum esse. Matthias à Michou de Sarmatia Asiatica refert Tartaros bibere Cereuisiam ex Milio confectam, vocarēque *Buzam*, Rutenos verò *Braham*.

Lubet coronidis loco memorabilem historiam à Milio petitam subnectere quam Th. Zuingetius in methodo similitudinum, ita recenset. Tartarorum princeps Amorabecus ad Lazarum Seruic Despotam missis Legatis, ad transitum in Vagariam petendum, mulum Milio onustum adiunxit, & coram Despota saccos exonerari voluit, vt innumerabiles Tartarorum copias esse significaret. Despota in tertium diem responso delato, Gallos interea, capos & gallinas fame excruciatas magno numero in effusum Milium emisit. Qui cùm paruo temporis spatio totum absumpsissent: ad Legatos conuersus, Renunciate ergo Regi vestro, inquit, quantumuis innumerā Milij grana ei adsint, tamen neque nobis edaces gallos defuturos. Cui quidem voci omen adfuit. Tartari enim facta irruptione, à Seruis magnā strage repressi fuere.

MILIVM LUCIDVM ARGENTEVM
EX CAIRO.

C A P. XLIII.

Vulgari Milio magnitudine cedit, magisque rotundum, in acutum umbilicum terminatur, tenui argenteo valdeque lucido cortice, & à medulla leui tractu separabili, Medulla Milij vulgaris, alba, insipida ferè, dentibus friabilis.

An hoc intelligit C. Bauh. in pin. per Milium, siue Sabæum: *Millo* frumentum in Guinea paruum. Milij forma, sed dulcius, ex quo panem & vinum conficiunt in Regno Sabo: ad Clus. curas post.

Româ ab amico quodam acceptum attulit Ge. Locus neri H. Cherlerus nomine Milij ex Cairo.

SORGHIL. C A P. XLIV.

Sorghii peregrino nomiae dictum multos ex fibrosis radicibus emittit culmos homine pro-

teriores robustos, et alios, geniculatos, medulla albo farctos, foliis stipatos arundinaceis: fastigia eorum in tubam effunduntur



Panicum Italicum Tragus.

Milium Italicum Nomina linguaar.

Ruell Lap.

Melica Aucth.

Milium Indicum Pinn.

Sorgi Fuchf.

Fuchf. rar. & Milium sa.

germ. Welsch hirtz, h.c. Milium Italicum, quodd ex Italia in Germaniam adnectum sit, nominavit. Aliis tamen Sorgi semen appellatur, h.c. Sorgi semen. Belg. Sorg fact: Gall. *blé barbu*, ou espece de Paniz, aut cum h. al. *Sorgi* vel *Sorgi*: Hetruscis *Sagina*: In subrib. *Melega* & *Mielega*, teste Matthiolo, qui Ruellium, panicum in Italia Medicam appellari scribente, apertè hallucinati demonstrat. Sed Ruellio fortasse errandi occasione pravit nominis Melicæ & *Melica* siue *Melica* vicinitas, que fecit ut Panicum cum Sorgo, & huius descriptionem cum illius descriptione confuderit. Fungus est genus tam forma, quam proceritate arundinem referens, aded ut campi, in quibus ad maturitatem usque adoleverit, arundinetæ representare videantur. Eius tamen calamus, non, ut vulgarium arundinum, inanis est, sed sacchariferarum arundinum modo, alba farctus medulla. Panicula, quas ad Cybelis pomorum magnitudinem summis proferunt culmis, quædam cum maturitatem senserint, in nigro rufescunt: quædam verò nigredinem in vniuersu contrahant, granis compositibus onustæ. Deperditur granum à rusticis, moliturque in farinam, & inde in agrestem cogitur panem: etsi in Hetruria potius ad Columbarum, gallinarumque feratur saginam, quam ad hominum alimentum. Hoc Plinio lib. 18 ca. 7. Milium est Indicum, quod tamen non animaduertit Ruellius alioqui maximus Plinii sectator. Plinius enim sic habet. Milium intra hos decem annos ex India in Italiam inuectum est, nigrum colore, amplum grano, arundineum culmo. Adolefcit ad pedes altitudine septem, prægrandibus culmis, lobas vocant, omnium frugum fertilissimum.

Fuchsius, qui peregrinum hoc genus Fruerenti, *Sorgi* vocat, ait ignorari quo nomine Veteribus sit appellatum, nisi Farris genus sit, quod in Gallia rubrum & barbarum frumentum nuncupatur. Certe tamen nihil affirmat: nam Panicum etiam referre, quamuis magnitudo repugnet, admittit.

Dodon. gall. Panic speciem quidem esse suspicatur: aut Farris genus; contra Fuchsum, negat. Et hinc ait in Hist. Lat. Frumen. & in fol. Melica siue Sorghum, Lusitanis *Milium Saburum* ap-

pellatur; nonnulli tamen Panicum peregrinum, aut Indicum cognominant, id ipsum videlicet ex Panic genere esse existimantes; quorum certe opinio probabilior est, quam eorum, qui illud inter Farris genera reponunt. Cum farre siquidem similitudinem nullam, cum Panic verò aliquam habere potest. Conuenire & cum eo Milio videtur, quod Neronis principatu ex India in Italiam inuectum est.

Videtur Cæsalpino Milium Indicum esse ex genere Calunagrostis, id est, Graminis arundinaceæ. Nos eorum sententiam probamus, qui Milium Indicum Plinii esse concludunt.

C. Bauh. pin. *Milium 4. siue arundinaceum subrotundo semine, Sorgo nunciatum*: *Milium quod ex India in Italiam inuectum nigro colore*, Plinio. *Panicum Dioscoridis & Plini*, Tragus. *Milium Indicum* Matth. Fuchf. icon. (cui & Sarracenicum) Gesn. hort. Cord. Hist. Guilland. Lugd. Cast. def. *Milium Indicum Plini*. Ang. Cam. *Milium aliud*, Amat. *Panicum Indicum*, Gesn. hort. & Cor. hist. *Sorgi* Fuchf. Dod. gal. (cui Panic species videtur,) Lón. *Sorgi & panicum Indicum* Gesner. coll. *Sorghum* Gesn. hort. (cui & *Mais* in Cardam.) Tab. (cui & *Panicum locale*, Ger. *Sorgo melica* Italorum Lob. Obs. p. 24. Ic. p. 11. *Sorgo* Insularum, Bellonio. *Melica siue Sorgum*, Dod. *Melica* forè à Melinc: *Sagina* aliis à saginando, Calunagrostis Dioscoridis ex hoc genere videtur, Cæs. var. at feminis colore, quod aliis rufum, aliis plenius nigricat: habetur & album & luteum, quod. *Sorgum* fructu rubro & fructu albo, Fyft.

In hortu Ill. E. C. sæpius pronenit, verum semen non maturuit. Solum amat pingue & humidum. Gignitur in Italia, Hispania, & aliis calidioribus regionibus. Ex æstiuis sementibus est: Autumnio maturefcit.

Semen Panic sapore & temperamento simile est. Legitur à rusticis, molitur in fatinam, cogiturque subinde in panes, sed friabiles, & parum alimenti subministrantes. Hetruria tamen potius ad columbarum gallinarumque saginam ferit, quam ad hominum alimentum. Ex huius Milij Indici culmorum medulla fit medicamentum ad strumas præstantissimum hoc modo. Ex decem culmorum huius internodiis extrahitur medulla, quæ cum sponsia noua integra, rubentique conburitur. Hac in puluerem teruntur additis pipetis nigri granis duodecim. Huic pulueri admiscetur triticæ farinæ vncia. Deinde omnia ouo recente excepta in placentam conformantur, quæ sub feruentibus cineribus coquitur. Et in sex partes diuiditur, quæ Luna decretescente alternis diebus strumoso dormitum ituro edæde præbentur, nullo addito potu. Idem altera & tertia Luna repetitur. Hoc medicamento multos curatos esse scripsit Matthiolum. Idem auctor est flores qui ex rubris huius Milij Indici paniculis excutuntur dtachma pondere ex rubro vino haustos rubra facinarum profliua sistere, quemadmodum albos flores ex paniculis albis exceptos albos vteri fluores cohibere. Idem dari vtiliter dyntericis, & aliis fluxionibus alui affectis. Idem quoque præstare granorum putamen, oui vitello probe decocto exceptum, & à icjunis deoratum.

SORGHUM ALBUM, MILIUM Indicum. Dora. CAP. XLV.

Sorghum iam dicto simile hoc Milium Indicum Dora, foliis constans harundinaceis, prælitis & ge

& geniculatis culmis, effusaque iubâ, sed semen eius multo, maius, rotundius, & candidum, in glumis hirsutis contentum, differentiam manifestam constituit. Ab Arabibus, teste Bellonio, *Areman* appellatur. Apud Auiennam tamen e. 31. *Areman* non Melica, sed Zea est, si interpreti fides non est deroganda.



Huius particulatim meminisse Rhassem & Scorpionem, Arabicoque antiquo nomine *Drom* vocasse, testem habemus Rauwolfium studiosum nostrorum socium, qui etiam *Gener. Scorpionis* titulo nobis id eum indicauit.

Anticipatam hinc Coldenbergius pro *Mili* Americano & *Milio* Aethiopico: Florentia Ducis Hortulanus pro Sorgho albo Candia. Matthiolo in post. com. ut dicitur *Miglio Indico* pro *genio*, hoc est, *Milio* Indicum nobilius. Dodon. Lat. *Melica candida*. C. Bauh. pin. *Milium* s. sine arundinaceum plano alboque feruere. Sorgho simile granum. *Heremia Arabum*, Bellonio. Dors, Rauwolfio. *Milium Aethiopicum*, Porta. An *Milium* album in Regno Congo, quod *Milium Congo*, id est, semen Congianum vocant, Hist. Ind. Oriental. part. prim. l. 1. c. 1.

Sorgho hoc album in Cilicia ac Epyro ferri, & illic à se reperit scribit Bellonius: ibique panes ex ea coquit. Dodonaeus priori Sorgho sapore & temperamento simile constituit.

LACHRYMA IOBI MULTIS, SIVE MILIUM ARUNDINACEUM.

CAP. XLVI.



Tom. II.

Lachryma Iobi cuius donata est cubitum vnum aut alterum altis, geniculatis: folia autem habet Turcici. Frumenti, cubito subinde longiora, vncias duas lata: quibus minora sunt illa quae in ramis nascuntur, ex quorum alis petioli emittant, quibus transdiguntur singulis grana, ut plummum

singula, rariùs bina, leuoris politissimi, nitida, ante maturitatem hauescentia, matura ex candido rubescentia, duritie lapidea, Cicer aequantia, superiore parte turbinata, vnde exit inanum glutinarum spica mutica. Pro duabus nostris Iconibus (quas iam sculptas enim) appositis, vellemus vnam esse solam melius depictam. Tragus

Lachryma Iobi Icon altera.



Iconci vocat Lithospermum maius, Grossen Steinsamen, aut Milium Solis maius, Grossen Nachschaff, iudicatque esse Lithospermon Plinij, quod lapilli eius magnitudine Ciceris, quos gerere dixit libr. 27. cap. 11. vulgari nostro Lithospermo, attribui non possint.

Fuchium errorasse scribit Matthiolum, quod in lib. de comp. med. tradiderit platum

hanc arundinaceam esse Lithospermi genus: eamque opinionem confutat in Apologia, quam aduersus Anatum, quem secutum ait Fuchium, scripsit. Genuinum, inquit, Dioscoridis Lithospermon eam memorat esse plantam, quae globulos illos (lachrymas vocant) mittit, quibus vntur funiculo traictis ad numerandas preces. In quo manifeste peccat, quoniam Dioscoridi Lithospermon planta est foliis Oleae longioribus, latioribusque, ac mollioribus humi accubantibus ramulis rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iunci, lignosis, in quorum cacumine bifidi exortus caulicorum speciem exhibeant, foliis longis, interque parum in semine rotundum Erui parui (vt Oribasius & Serapio ex ipso Dioscoride transcribunt) magnitudine, nascaturque in asperis. Quae omnia in planta lachrymas illas ferente desiderantur. Siquidem haec folia profert harundinacea, quemadmodum & culmos per intervalla geniculatos, in quibus semen Orobo duplo grandius visitur, quae quantum cum Lithospermi notis habeant similitudinis, ipse videat. Adde etiam quod Lithospermon in editis, & asperis locis per se sponte nascatur. Lachryma vero vocata non nisi lata proueniat, erectis omnino calamis non humi repentibus, vt scribit Plinius. *Halsenus Matthiolum*, erroris accusans Fuchium, quod hanc plantam Lithospermi genus dixerit. Verum ipse potius reprehendendus est, vt qui falsam figuram pro Lithospermo maiore exhibuerit. Certum est quidem Lachrymam Iobi, non conuenire descriptioni plantae à Dioscoride traditae. Sed Fuchius non dicit esse ipsam Lithospermon, sed Lithospermi solum genus, licet Anatus eius fuerit opinio, qui *Diocoridius* Graece vocauit, & Lat. Lithospermon, *Lachrymam*, *Lachrymam Mariae*. Lachryma vulgo *Simentem*: Arab. *Call*: Germ. *Merien trähen*: Clus. vocat Gall. *Larmes de nostre Dame*. Hisp. *Lagrymas de Moysen*.

Geltrus & Dodonæus videntur concedere esse Lithospermi speciem, si seminis duram substantiam respicias: aliàs roto genere à Dioscoridis Lithospermo differre perhibent.

Lithospermi Plinii Lobel.

Lobelius tamen in Adu. pro Lithospermo Pliniano describit, notatque Plinium, quod utrumque Lithospermum in vnam constaret descriptionem. Eius verba sunt hæc: Plinij si quis exactius textum perpendat, & cum vtroque compareret Lithospermo, facile animaduertet utrumque ab eodem designatum, sed (qui illi penè fatalis lapsus, ut de Chrysanthemum monuimus) in vnam descriptionem constatum. Primum *Delonvigi*, id est, Iouis Triticum indicat Triticeis, aut harundineis similem, aut congenerem: herba quinquecualis, foliis Rutæ duplo maioribus, ramulis surculosis, crassitudine Iunci, quæ ex vtriusque delinatione mixta sunt. Sed post addit lapillos magnitudine Ciceris, duritie lapidis, candore & rotunditate margaritarum, cauernulas habent quæ pediculis hærent: quæ postrema prorsum Lachrymæ lobæe quadrant, nequiquam Dioscoridis Lithospermo. Quod licet illi quamplurimis in agro Romano locis videre: haud sanè tam stupenda mirabilitate, si vulgò cognitum Milium Solis intellexisset: eoque dicit, sibi non hærentem, sed vultu vifam plantam in Italia crescere, pura hortis. In Creta optima, nimirum natiuo solo, quin tantus decor veluti candicantibus margaritis: cateraque mihi verba, nequiquam deformi & tristi Lithospermo congruunt, sed Lachrymæ lobæe longè hilarioris & iucundioris aspectu, quibus intus inest semen (ut idem dicit) & subus cauernulæ, nequiquam communi. Murit hic raptodius Senenlis, & superius in Fuchium inepit.

Synonyma

Casp. Bauh. pin. *Lithospermum* 1. siue *arundinaceum*, sortè Diosc. & Plinij. An *Cox*: Theophrasti, 1. hist. 16. *Lachryma Christi*, Trag. Geln. hort. *Lithospermum maius*, Trag. Geln. horr. cui & fruticosum. *Arundo Lithospermos*, Geln. hert. *Lithospermen primum*, Lacm. *Arundinaceum* Lugd. *Lachryma lobæ*, Adu. Clus. hisp. & Hist. Dod. Lob. Obs. p. 26. Ic. p. 44. (ubi & Lithospermon & Diospyros Plinii) Cam. Cast. Eyst. *Lachryma vulgò*, Caxl. Eidem *Lithospermum* 2. siue *maius*, Matth. Lac. Cast. Lugd. quid?

Loca

In hortis Italiae ac subinde etiam Belgii seritur, peregrinum siquidem est, aliunde illatum. Galloprouinciae & Narbonensis vireta præferunt Carnobiorum, nondum intestinis bellis effluentibus euerfa, hanc planam sedulo colere solita erant, seminis lapidei causa, ex hoc enim maturo, & in aqua feruenti intrincto globulos precatorios, ut vocant parant. In horto E. C. farum multoties prouenit, sed semen nunquam maturuit.

Vires.

Est etiamnum, si expertus hæc scribit Lobelius, ad calculum renum, & vesicæ saburram, polline & decocto præsidium vulgatum.

Dioscoridi Oriza frumentorum species est, in palustribus & riguis, quæ mediocriter nutrit, & aluum sistit.

Indi apud Plinium lib. 15. cap. 7. ex Oriza oleum facere dicuntur. Idem lib. 18. cap. 7. ait, Italicè maximè quidem Oriza [Oriza quidem maximè ut Itali gaudent, subintelligit Indos Dalechampi. Alius legit, Italia &c. Casalp.] gaudent, ex qua prisanam [Prisana Oriza ea est, quæ in omnibus locis venalis prostat, & *Ris* dicitur.] conficiunt, quam reliqui mortales ex Hordeo. Oriza quidem, folia carnosa, Porro similia, sed latiora: altitudo cubitalis, flos purpureus, radix gemmæ rotunditatis.

Aristobulus apud Strabonem tradit Orizam in aquis clausis [conclusam Dodon.] stare, factis areolis quibusdam, eamque esse altitudinis cubitorum quatuor. Multi fructus, multarumque spicarum esse: circiter verò Pleiados occasum, emundari ut spelram. Nasci etiam in Bactriano agro, & Babylonio, & Susio, & in inferiore Syria. Megillus scribit eam, ante pluuia feris, confusione tamen & irrigatione indigere, & clausis aquis irrigari. Bosmorus (Herimol. in Diodoro Bosphoron corruptis exemplaribus inuenias) quem Onesicritus ait in veneratione esse, minor est Tritico, & inter amnes nascitur, torretur autem cum in area excutitur, sed iurant ne prius eum ex area moucant, quam igni concoxerint, idcirco ne semen exportetur. Indi potum ex Oriza conficiunt, sicut ex Hordeo. Cibus magna ex parte Oriza forbilis est.

Galenus 8. simpl. med. Orizæ adstrictorium quidpiam adscribit, quare mediocriter ventrem sistere ait: Et hinc 2. de alim. hæc subdit: Semine Orizæ omnes in sistenda aluo vtuntur, ipsum eodem modo quo Alicam coquentes: difficilius tamen quam Alicam conficitur, & minus alit, & vrique in edendi suauitate ab ea quam plurimum vincitur. Eadem est & Aetii & Aeginetæ de Orizæ facultatibus sententia.

Actuarius lib. 2. de spiritus animalis nutritione cap. 5. auctor est Orizam edulium esse modicè calidum ac siccum, & alibile, & meatus obducens: remporis autem intervallo sumptam, nihil sanè corpori molestiæ afferre.

Simeoni Sethi *Oriza* est prima distantia calida, sicca verò secunda: satis habet nutrimenti, sed difficilis est concoctionis. Alba ergo Oriza cum fir, modicè sistit aluum: rubra verò cum est, magis propter siccitatem adstringit: cum lacte verò apparata, bonum habitum bonumque colorem afferit, genitali femini adicit.

Oriza nostra vulgaris, quæ præcipuè existimatur Theophrasti, Dioscoridis, Galeni, Aetii, Pauli, Actuarii, & Simeonis Sethi, alba & rubens traditur, quæ quidem auctoritate necimus, nisi ex Sethi, qui fortè per rubram intelligit, cui torrendo rubedo accidit.

Oriza verò rotundà radice Plinii diuersa à nostrate Lobelio, qualis considerandum, ex eius verbis, quæ post adscribemus. Habetur quoque Dioscoridæ species, *Oriza* Cordo & Rysio dicta, quæ tradita est cap. de Gramine manna. Est & Oriza germanica Trago quæ Hordei genus.

Per prisanam aliqui intelligunt Orizam, quæ vulgò corrice nudata venalis habetur
C. Bauh.

ORIZA VETERIBVS.

CAP. XLVII.

Theophrastus 4. Hist. cap. 5. Orizam porissimum in India feri perhibet, Zeæ similem, pistamque ranquam Alicam, concoctu perfacilem reddi, aspectu Lohis similem: starèque magna parte temporis in aqua: effundere non spicam, sed veluti jubam modo Milij atque Panic.

ORYZA

CAP. XLVIII.



Oryza quæ solet in varias Europæ partes distracta ex Italia, sed deglubita, grana habet minorâ Hordei granis deglubitis, sublongis, latiuscula, alba, lucida, dura, quæ dentibus faciliè atteruntur, stridorè que quendam reddunt, dum masticantur, sapore grato: macerata multum elongantur, & ve-

luti crispantur. Inter Oryzam, quæ adfertur, sunt quedam grana cute flavescente testâ, pulchrè cancellata.

Matth. sic describit herbam: Oryza folium profert arundinaceum, carnosum, porraceo haud ab simile: culmam cubitalem & sæpe maiorem, geniculatum, Tritico crassiorè, sitiorè que, in cuius fastigio iuba oritur, siue spica in ramulos diuisa, in quibus semen vtrinque impari exortu provenit, corrice sublauro, rectum, aspero, veluti striato, cui figura, quod gluma excussa candidum est.

Lobel. in Adu. descriptioni Matthioli contrariatur: In arida, inquit, hexovosa, sed rigidula spicatum alterno sic usunt grana, sublauro folliculo, acutis seu argulosis stris in longitudine donata: quo cum sibi superne herentibus aristis mordacibus, exura gena, candida, pellucidâ, dura & multò pellicibus graviora, atque candidiora quous præstantissimo Tritico siliginco. Culmi hordeacei sequicubitales & cubitales, radix Tritici: at folia potius Milij aut Hordei quàm Porri (ni multum labat memoria) visa.

Hernol. qui testatur Oryzam Hordeum galaticum quosdam vocare, quia graue sit atque candidum, miscet quæ Theophrastus scripsit de Oriza cum Strabonis verbis.

Oryzam frumenti genus vulgus gallicum detractâ priore literâ *Rizom* appellare refert Ruellius, qui duo reperit genera tradit, vnum grano candido, quo plurimum gallia vescitur, decocto cineribus calidis, non nisi peruncto pingui iure. Alterum grano rubente, quod Plinius cubitali demonstrat altitudine, &c.

Marcellus quoniam Oryzam notam omnibus dixit, idè eam describere inutile & inanissimè tantæ fore duxit. Nos Oryzam ipsi Marcello in mensam illatam per patinariam suppellestem, quàm in agro nascentem vido notam potius fuisse dixerimus, non enim, vt tradit ipse, inutile fuisse illam descripiam ab eodem, eam non ita passim eius notitia in exteris regiones, & procul ab Italia distinctas dimanarit, illicque innotuerit, vt falsè eam omnibus notam esse ipsemet persuasum sibi habuit, quare ipsi planta ex solo

Tom. II.

natali vliginosa perita fuisse describenda, cum alij sint qui duo vel tria Oryzæ genera statuunt, alij verò Hordeum cognomento galaticum esse velint.

Eandem olim Matthiol. verbeatur censuram, quam Marcellus, cum dixit adè omnibus in cibus familiarem esse & frequentem, vt nulla proflus explanatione in ea describenda sit opus. Sed eam tunc ceu ignotam plantam describere non potuit, quod satis apparet ex priorum comment. iconè, quam in post. comm. mutauit: præterea ipsemet imperfectè eo modo quo diximus, plantam descripsit, quasi prouenientem non obseruauit.

Erronea est opinio Eucharj Roessl. Oryzam, Far candidum situentis. Sed & eorum sententiam minime probandam ducimus; qui Typhen Plinij esse dicunt. Alij Olyram & Oryzam eandem esse crediderunt, sed falsè quoque.

Ineptè Bruafellius Oryzæ descriptionem pro sua venditat, cum sit Plinij, quem allegare debebat.

Cum Oryza nostris ex India in alias terras transferatur, & multis Europæ locis seritur, cõtendit Cord. in Diosc. necesse sequi aliam quoque Oryzæ speciem inueniri, quæ etiam in Europa spontè nascatur, quod sc. Diosc. simpliciter palustribus locis Orizam nasci dixerit, nec adiecerit peregrinæ alicuius nominis. Nos contra argumentum Cordi nullum existimamus, nec necessarium. De eius Oryza spontanea scribimus sub titulo Graminis manna & Dente canis.

Ryff. in Diosc. Oryzæ figmentum ponit, nunquam à se visæ.

Dod. Lat. descriptionem Plinianam assumit radice gemmæ rotunditatis, quâlis tamen neu apparet in iconè Dodonij, nec aliorum.

De Oriza Plinij hæc Lob. in Ada. Vt Semen ex India primum fuit allatum, sic & indidem nomen ascitum videtur: Matthiolus sequutus videtur eos, qui ex Plinio Orizam hodie ignotam, radice Gemmæ rotunditatis, flore purpureo, folijs carnosis porri similibus, & latioribus, altitudine cubitali, cum nostrati vulgata Oriza in seicite confuderunt. Hæc ille, quem optassemus descripsisse femina illa munere accepta. Si duo Orizæ extant genera, Plinium ea non distinxisse clarum fit ex eius verbis, mentionem non facientibus duorum generum.

Orizam suo cortice spoliata ad nos deferri putat Riolanus, quod in eius cortice venenatum quid sit. Seri procul ab vrbibus quod eius Hos malè oleat. Eam calidam esse & siccam, mediocrem habere vim adstringendi, idè que in clysteribus dysentericorum parum torrefactam à Medicis vsurpari: crassum succum gignere, venasque obstruentem si quis frequenter vtatur: ex ea cum lacte cocta, jejunijs tempore, parari Oryzatum. Sed mirari fabit videntem Riolanus habeat, quod de cortice Oryzæ venenato scriptum reliquit, si Strabonis locum à nobis aduclum consulisset, longè aliter sensisset: præterea miros nos tenet, cur ob florem eius malè olentem procul ab vrbibus ferendam eam iudicauerit, si namque Theophr. Dioscoridem & Strabonem adiuisset, fuisse ijs in locis vbi colitur, meliorem longè veriorè que ei rei causam fuisse deprehendisset, neque enim hæcenus apud vllum Veterum Rectiorumque legisse nos meminimus quicquam vel de cortice venenato, vel etiam de flore olido.

Guiland. in theone ridet præclaram illam O-

P p 3

Matth. not.

Eucharj. error.

Bruafell. ineptus.

Argumentum Cordi nullum.

Figmentum Ryff. & Dod.

Riolani ineptus.

Oryza Matth. situentis.

ryzam, priori à Matthiolo volumine expressam, etique Holci apud Plinium nomen adscribit, dicens eam seq. edit. Fallopio monente, in melius esse mutatam.

*Dimerficus
sionus.*

Lacuna ait Orizam optimè cognitam esse in Hispania, præcipuè Valentia. Gualth. Ryfium pingere similem Burtæ pastoris; Matthiolam similem Hordeæ: Illam si bene recorderetur, non proferre spicam, sed paniculam veluti Milium. Quandoquidem autem ibi non proueniat, se perfectam figuram dare non posse.

*Non videtur
Lacuna.*

Lonic. scribit prouenire solo limoso, ad altitudinem vineæ, folia ei esse longa, florem rubrum vnde paratæ peræ, in quibus inueniatur rubrum aut album Risum. Is ridiculam figuram proponit, qualem Risus, & similem descriptionem plantæ non visa, & sibi planè incognita.

*Porta no-
catur.*

Porta sibi imaginatur Hordeum distichum, siue Galaricum; Hordei genus alterum Columelle & Palladii, Theophrastum & Dioscoridem Orizam vocare. Mirum autem eum non obseruare Hordeum Columelle feri locis frigidis, non autem aëolis: quoniam non cõperimus Orizam locis frigidis prouenire, sed calidis: parum ei noram plantam, Orizam fuisse, id etiam indicat, quòd floris non meminerit.

Synonyma

Dicitur C. Bauh. pin. *Oriza*, siue *Italica*, ad differentiam Germanicæ, de qua inter Zeas. *Oriza*, Brunf. Math. Arg. Tur. Cor. in Diosc. Lac. Dod. Lob. Lon. Cas. Cast. Cam. Tab. *Oriza peregrina* Trago. *Hordeum Galaticum Columelle*, Hermolaus, Ruell. Amat. & Tab. centioere.

*Nomina
Linguar.*

Oriza Latine, Græc. ὄριζα, Theophrast. ὄριζα. Diosc. Germ. Reiß, Belg. Nys. Gall. Riz. in Ris. It. Ris. Phil. Arab. Arz seu Arzi. Angl. Sic. Boh. Rýze, in India Orientali, si diarium nauriticum veta recenset, dicitur *Ten Tumbara*.

Locus.

Locis ex antiquis antè descriptis annectamus, quæ de his recentiores prodiderunt: Grapald. in Lex. scriptum reliquit apud Italos (Parmenses) nuper feri coeptam esse: [Scratur autem mense Martio] & aquis clausis irrigari. Itane feri coepit nuper Oryza, ut Grapaldus ait, in Italia: quandoquidem Plinii tempore Italia ea maximè gaudebat, & Horatii. Rei rusticæ authores Latini (quod quidem meminimus, inquit Bruyer. culturam Oryzæ minimè persecuti sunt, credo quòd eam parum familiarem, nec hominibus admodum vilem existimarint. Etenim haud dubium est, eam ab externo orbe inuictam, Indiarumque terræ populis cibum vulgarissimum & gratissimum esse. Hodie feritur quibusdam Italiae locis. Quin & in Gallia nostra Lugdunensi rentauerè quidam eam excolere, frustra tamen: nam & parum latè prouenit, & impensa maior, quàm ex eius prouentu utilitas sentiebatur. Vidi ipse plantas Lugdunensis Oryzæ: foliis carnosis, Porro similibus, sed latioribus, altitudine cubitali, flore purpureo, radiceque gemmeæ rotunditatis. Sic enim Plinius Oryzæ plantam depinxit. Si Bruyerinus vidit Orizam Lugduni, cur non describit, sed ponit Plinii suspectam descriptionem. Hac ætate in Fortunatis Insulis & Hispania prouenit vt Dodon. testatur: vnde in Belgium, pista ac Pisanæ modo repurgata, adfertur. Apud nos (Porta loquitur) in Salernitano agro, & alibi maximo prouentu, patenti uia planitie, quam tamen curpis, & illicibus, & fluuiis ductis, quoties opus est rigamus, alioqui nullam, aut castam segetem latura. Notissimum illud Afix & Europæ, sed vnius duntaxat generis mihî [Lobellii verba sunt] visum in prouincia Narbonensi & Hispania, sed

maximo prouentu in agri Mediolanensis depressis, & patenti planicie vdi agri, quem tamen curpis, & illicibus à flumine è lacu Maior vocato ductis, crebrius quoties opus viderint, rigat: alioqui nullam aut castam segetem laturum, vt mirum sit tam siccum & exsiccum granum, tam paulatim & humentem optare fundum, bonum alimentum: & lautum suggerere, etiamque valetudini prodesse posse. Huius messis serotina est circa æquinoctium autumnale, quippe maturefcit æstiuis solibus multis: eoque Septentrionalis, ramentis humentes magis, respuit tractus, vt pote aliosolus &c. Vna in Longobardicis & Hetruscis campis latissimis & vlginosis, atque in Prouincia Gallia. Camerario referente in aquis locis aliquoties Norimbergæ prouenit. De huius cultura consule Augerium Gallum.

Quæ Veteres prodiderunt de viribus vsuque Oryzæ, illa omnia reperient lectores, in antè adductis Antiquorum testimoniis. In cibus Oryza admodum est familiaris, concoctaque facilius euadit, & ori gratior, vbi ex lacte bibulo, aut amygdalarum cremore, aut carniuum pingui iure decocta fuerit. Datur utiliter in cibus dysentericis celiacis, & diarrhoea affectis, præsertim vbi prius torrefacta in lacte, in quo igni calculi fuerint extincti, decoquatur. Sunt, qui Oryzam quoque dicunt genitale augere semen, in babulo lacte decoctam, additis saccharo & Cinnamonio. Oryzæ decoctum vtiliter dysentericis infunditur, ac etiam potandum datur. Farina bellè quidem Cataplasmatis admiscetur repellentibus: mamma-rum incipientes inflammationes arceat cum Rosis, & Anthemide decocta, & illita: Haëtenus Matthiolus; Certum est (subdit Bruyer.) Oricenis populos, Indiaque potissimum Oryzam in panes cogere: ex hisque nonnullos Triticum quidem ferere, sed cibo abdicare, panificiaque ex eo facta: quippe sentiunt ingratiissima ventri: & contumactissima coëctioni, adèd & teneris (ut inquit ille) assuescere multum est. Sunt apud Indos insulae, quæ aliarum frugum expertes, Oryzam vbererrimè fundant: potus suos ex ea consueunt saccharo aromateque vario cõditos, quibus faciliùs occyusque rentari capta aiunt, quàm vini vel potentioris haustu. Theophr. Oryzon appellauit peregrinum, initio semen, ex Indiaque delatum, simile Zeæ, aspectu Lolii, magna parte temporis residens in aquis Milii modo ac Panicis, effundens iubam &c. Hoc elegantiorum mensas subit variis paratum modis. Rura quoque nostra, nulla celebrant lactura conuiuia, quæ non ornentur Oryzæ cibaribus. Quibusdam prima mensa apponitur ex iure gallinaceo, aut iuculo alio pingui, Croco addito ad commendandum [vt reor colore, & conciliandam saporis gratiam. Quippe alioquin gustatu insuauis sentitur: alii ex lacte parant, aut ex succo amygdalarum dulcimum, croco adiecto. Sed hæc parandi ratio præcipuè vsurpatur, quibus carnis usus cautum est, & secundis adhibetur mensis. Culinae saccharum quandoque simul coquant: quandoque verò paropsidibus impositam eo aspergunt. Vulgi perualit animos opinio, obefiores heri ea frequenter vescetes. Quòd obrem tum in aula, tum in præclaris vrbibus, scimus quasdam scæuinis graciliores, nulliusque (ut sic dixerim) succi, Oryzæ cibo frequentius vti. Quod ita demum existimant ratum, si solum ex lacte, & largiori saccharo assumant. Sed id esse falsissimum clarissimis medicorum sententiis, constat. Quippe inter *dispergenda*, ab omnibus refertur, hoc est, ea quæ leuiter alunt, & *dispergenda*, id est,

quæ difficulter in ventre coñficatur. Plurimum & optimum alimentum fufficit probè lacti incoctus faccharo & amygdalo noitratis Oryza pollen (inquit Lobel.) coque sanguinem & semen arget, quod non dubius animi ille Senenſis efferret in Mauritania vel Hispania egiſſet, vbi etiam ex Oryza macerato lacte frumento, deſtillant liquorem, limpidum primò, deinde oleoſum habent, nec parum ſuauem, nec minùs exhilarantem ſpiritus & incibriantem, quàm ipſum (quo illi abſtinent vel carent) vinum. Etiam eius pabulo mirè delectantur & dociles ſunt Aphri Elephantes. Camer. in hotto : Difficile non nihil coquitur, & toſta quidem adhuc magis, ſed ſic ventrem cohibet. In Iſpania ex farina huius & gallinarum pectoribus elixis & inciſis, cumque lacte & faccharo lento igne coctis, & ligneo instrumento validè ſubactis tumidum cibum, quem album vocant, parare ſolent, eſtque plurimi alimenti ſed paulò craſſioris. Solm. obnoxio Eryſipelati (Roſtauff) præſcribit Oryzam, quæ inquit ſanguinem increaſtat & minus efficit fluxilem.

Vini ex Oryza meminit Aelianus : Diarium nauicum, & potus ex Oryza & melle cocti, & Aquæ ardentis ex Oryza deſtillatæ. Acosta etiam Oryzæ aceti. Ad immodicam, inquit, euacuationem Canarini Caranibolas fructum vnum viridem edunt, vel Aceti Canarini hauſtum ſumunt, (quod nihil aliud eſt quàm aqua decoctionis Oryzæ vno aut altero die referuata donec accedat, Canarini aceti vires præbens, & medicum vſum præſtans) & ſi proſtitutum non ceſſat agris caput frigida abluant.

ORYZA INDIE ORIENTALI PECULIARIS C. Bauh. quid?

CAP. XLIX.

Oryzæ peculiare genus, Regina Patenſis, Hollandis obrebit, vt habeatur in Ind. Orient. par. 8. ſed quid? Oryzæ ex India originem traxiſſe, & per vniuerſum ferè orbem diſſeminatam eſſe, in 6. part. Ind. Orient. ſcribitur. Hæc præcipua omnium Indiæ Orientalis locorum annona eſt, part. 7. Ind. Orient. cap. 39. Hinc Indiſ loco panis eſt, ex ea placentas parantibus, ex qua in China potum faciunt, quem in Peru *acuan* vocant: in Iaponia vinum, quod Iapenſes *Aracle* nominant: & in Pegu, Aquam extrahunt, quæ cum aqua vitæ certat: part. 7. Ind. Orient. cap. 36. Distinguunt in Oryzæ optimam, quam *Giraſil*, & in vilioſiorem, quam *Chambafil* Indi vocant. Linſcot. part. 2. Ind. Orient. cap. 37. & par. 4. cap. 6. In ſumma, Oryzæ vſus, vniuerſis propè nationibus, non minùs quàm frumentum familiaris eſt: vt de China, Iaponia, Philippinis, & maxima Indiæ Orientalis parte ſileam, etiam per Africam & Æthiopiæ vniuerſam, Indiſque Occidentalem, cibis vſitatiffimus eſt. Sic & Europæi, qui panes ex frumento habent, Oryzæ, obſonij vice, cum lacte aut aqua decoctâ vtuntur.

TRITICVM INDICVM.

CAP. L.

Noſtro duntaxat Frumento aſuetis oculis, rari ſpectaculi eſt quod Turcicum indignant Triticum, culmo digitali, quinque aut ſex Tom. II,

pedes alto, crebris articulis geniculato, rigido, medulla alba dulci ſarcto: *ſilua* arundinacea, hirsuta, venoſa, duas aut tres vncias lata, culmi ſtagitium in *ſpua* plures iubatas facieſcit, quarum ſingulæ ſcorum conſiderata, Triticeis ſimiles, muticæ ſunt, ex quarum glumis *Hoſculi* ſtamini emicant, colore granorum ſubſecutorum colorem varium prænuſciantes, quæ in his tamen ſpicis nulla vnquam naſcuntur, vt ad apparatus tantum, quaſi *ſegetis* comparare videri poſſint: namque ex culmorum geniculis & foliorum ſinu, multiplici inuolucrorum membranarum



ſtipatâ obduti cylindri craſſiores enaſcuntur aucto aut decem verſibus granorum conſtantes, quorum vnicuique mollis arilla; doctantè longa adnata, ſic vt ex omnibus cincinnis & vngua caput exteſcens, metaxan, quæ corinas nondum ſenſit, ex primæcedentibus autem arillis grana quo diximus

ordine digeſta, Piſis facie proxima, mira colorum varietate ludant, tota alba, purpurea cærulea, lutea, & quocunq; denique modo horum miſtio excogitari poteſt, quæ contracta contritaque in farinam abeunt candidiſſimam: radix ſubest Milij.

An Athen. diſp. lib. 3. c. 15. hoc Triticum Indicum intellexit, cum dixit:

Nasitur Aonia i bebis ſimil apta farina: Et Typha, multiſque locis, ſed grana videntur vtuam.

An Auati Leri in America ſua, vbi ſcribit cap. 9. Mulieres Americane cum acuto ligno plantant duas ſpecies craſſi Milij nempe albi & rubri vulgò in Gallia dicti *bled Sarrazin*: ſylueſtr. hominibus, *Auati*, ex quo farinam parant quod exiſtimo (ſicut in prima editione hiftoriæ meæ alter ſenſerim) idem eſt cum *Maiz* Indianorum in Peru quod deſcribit Hiſt. & c. Indiæ lib. 1. cap. 215. Calcondiles in Bello Turcico lib. 3. c. 14. ſcribit in quibusdam Indiæ Orient. Milium ad quindécim cubitos altitudinis. An Eid. Milium præratum *Auati* dictum

An Theu. Amer. cap. 77. Milium craſſum, Piſi inſtar magnum (hoc eſt, vt in Gallia antarct. interpretatur *Mil gras comme pois blanc & noir*) diuerſorum colorum: culmis Sacchari modo, tres aut quatuor ſpicæ, quarum vna perpetuò maior altera, ferentibus? An Nic. Nicol. Milij genus magnum, *Maith* Tripoli dictum.

Dodon. Gall. vocat *Milium Indicum* Plinii, & cum Fuchſ. *Frumentum Turcicum* item cum Lonic. (cui etiam *Typha magna*) *Frumentum Aſiaticum*: Gall. *Blé de Turquie*, aut *Blé Sarrazin*. Belg. *Torekthoren* Dodon. Lat. ait ex Aſia inuectum credi, atque inde Turcicum frumentum nominat: non tamen ex Aſia, aut Oriente ſed ab Occi-

An Auati Leri?

An Milium craſſum Tybue.

Synon. Typha magna.

dente, & ex Fortunatis aliisque America vicinis infulis, ac ex ipsius America nonnullis prouincis affertur, ibidemque *Mazzeum* siue *Mazzeum* nuncupari, praesertim quod candidi sit grani. Idem refert Cordum Triticum, Baetrianum facere, sed ratione, aut occasione non probi.

Frum. Indicum.

Match. in post. com. It. ait male vocari Frumentum Turcicum, esseque dicendum Indicum, quod allatum sit ex India Occidentali, & non ex Asia, aut Turcia, vt Fuchsius crediderit. In Epit. cum add. Camer. vocatur *Frumentum Indicum*, Indorum *Mahiz* seu *Murze*. It. *Grasso* siue *Tormento Indico*. Boem. *Tüctzen* & *zto*.

Marchiolus redarguit Iob. in Adu. dicens: Milium Indicum (ita in Obl. p. 24. Ic. p. 19.) Plinianum seu *Mais* Occidentalium, Frumentum Turcicum, vulgo Flandris, Tur. *Östören*: Frogum maxima & perquam specios. huc nostris oibis inquilina, inde à Nerouis principatu in Italiam inuecta, iaque nostra aetate magis oblectationi quam Panificio fata & culta, Turcicumque frumentum, vt vulgo tum doctissimo Fuchio nuncupata est. Quem tamen perbonum doctorem, cum alias non semel, tum hic potissimum immerentem lapsus inculat Cömentator Senensis: quod illud Milium perpetam Triticum appellarit, utpote non ex Turcica allatum, sed ex Occidentalibus Indiis primum aportatü. Atque cum huius delineationem, proceritatem & fecunditatem scite Plinius adumbret, cuius aeno nulli Europaeorum nota fuit aut peruia Occidua India, perpetam illius tempore primum allatum fuisse commentatoris Chronographia statuit: quare rectius nancieri qui ex Asia Turcica magis, Indiis finitima addoxerunt Turcicum vocarunt.

Frum. Asiaticum.

Turcicum frumentü, quod Germani *Welsch Korn*, huc Italicum (ita enim omnia peregrina appellare solent) vocant, iure equidem Typham magnam dicendum putant Tragus. Quia verò è scriptis Veterum nullum nominis huius testimonium adduci potest: idè Triticum magnum, & Asiaticum frumentum vocauit, germ. *Türckisch foru*.

Trit. Baetrianum. Milium Indicum.

Gesh. Coll. stip. appellauit frumentum Turcicum Fuchii. De hoiis tamen Panicum rectius cognomento peregrinum vocari opinatur. Idem rursus, Triticum Indicum, & Baetrianum nominat: In cat. pl. Milium Indicum in Italiam Nerouis principatu connectum: *зиззер индин Туркеш* / *heydisch*, oder *Judisch* form: Milium Sarracenicum.


TRITICVM PERVVIANVM album longum.

C A P. L I.

Descriptio **M**inimè vulgaris notitiæ est in tanta tamque fecunda Tritici Peruvianae varietate, species hæc ita fecernenda, quod semen habeat vulgari duplo longius, compressum, & ea parte qua sinuatum nonnihil est, candidum.

Frumentum Indicum historia C. Bauh.

De Frumento Indico absolutiorem C. Bauhini in pinace tractationem hic subditam, legere vt non graueris, amice lector, rogatus esto. Est in Canaria frumenti varia genera habeantur: ut tamen potissimum apud Indos quadruplex est: *Primum Malsum Indicum*: secundum *Mais*, quod Triticum ipsorum est: *tertium*, quod *Mangete* indigant: *quartum* est *Oryza*, que in Regno Cöginano *Mazze di Manputis*, id est, semina Lusitanicæ,



at Malaicenses *Bras* appellant: & tres posteriores species delineate in 6. parte historie Indice Orientalis figura 14. proponuntur.

I. Frumentum Indicum, seu Milium hæc spicas habet oblongas, ex granulis colore semen Cannabis æmulantibus, compositas, formam nonnihil oblongis, vtriusque folliculis sine aristis carentibus inclusis, insar Dipfaci herbe, quod tritium mensum spatio succreuit: dein absconditur, in terram mentis spatio deponitur, vt Solis calore probe exiccetur & percoquatur: tandem spica à culmis recedantur, in fasciculos collectæ domum deportantur, stramine operiendis, vel muniendis adiliis, destinato. Hoc Frumenti genus optimè est: quod rictum & comminutum, candidissimum apparet, ex quo facili labore panis pinfitur, cum admodum molle sit, & attritu itatim, massam conficiendis panibus aptam, præbeat. Et hoc Frumenti genus, semper habuerunt, etiam ante Lusitanorum aduentum: hist. Ind. Orient. part. 6. cap. 30. *An ferner* quod Congiani Lucum vocant, Cannabis grana, nisi quod paulò sit maius, referens, quod mola manuaris, subactum & pistum panem præbet candidum, Triticeo non inferior: Hist. Ind. orient. part. 1. lib. 2. cap. 1. *An Arundinis* genus granum terens, nostro Seali aut Frumento simile, quod de cocum est, aptum: Insulæ Virginæ Hist.

II. Frumentum Indicum grano Auellanæ magnitudine, folia habet angusta, & tenuia, sed in tantam altitudinem quemadmodum, certum, non exurgit: ex ramis frumentum illud insar Nucum Auellanarum dependet, quod aristæ habet cum Tritico siue *Mais* continentes, colore rubicundo: grana cute renella inuoluta, putaminibus includuntur, & peculiaribus quasi loculis ad modum granorum in Malo punice, ab inuicem distincta: seminat in agris quemadmodum Frumentum verum, potissimum in Africa, & quidem in peculiari quodam loco, qui nomen etiam situm inde obtinuit: & Æthiopicis *Mangetta* / *Batauis*, *zain* dicitur; part. 6. Ind. Orient. cap. 38.

III. Frumentum Indicum *Mais* dictum. An Triticum Baetrianum Plini lib. 13. cap. 7. Frumentum Arabicum quod *Mais* nominant, in Hist. Ital. Triticum Indicum siue *Mais*, quod Lusitani apud Nigritas primò seminarunt: in Hist. Ind. Orient. part. 6. cap. 31. *Pogonum*, Virginæ indigenis. *Auati* fructus, ex quo Brasiliensi potum *Manu* coquunt: Stad. part. 2. Americ. cap. 17. Milium amplum, Triticum Sarracenicum, Barbaris *Auati*, quod idem cum Indorum *Mais*, & Triticum Peruvianum Lerio part. 2. Americ. cap. 8. Milium *Abram*, id est, Siligo Turcica in Baly. part. 3. Ind. Orient. cap. 40. Frumentum Asiaticum: part. 7. Ind. Occiden. Milium Brasiliatum part. 3. A.

3. Americ. Milium in florida, part. 6. Ind. Occid. Differentia notanda, cum duo genera, ad sex vel septem pedes, tertium ad decem in Virginea excrefcant. Sic alterum crassius & rotundius, vt quod e Lucais tollitur: alterum subtilius & aridius, quod *Morochen* appellant. Granum hoc magis protentus est (his enim Martio & Junio ferunt: part. 2. Ind. Occid.) cum in Peru ex vno grano 600. signantur: at in Virginea mille & quinquaginta, & interdum bina millia reddat. Si quidem spica vel vna, vel binæ, ternæ, vel quaternæ, & singule spicæ quinquies, sexies & septies centena grana in Virginea contineant: apud Americanos, singuli calami tribus quatuorve spicis o-mnisti adolciscunt, quarum singule, grana centum & amplius pendunt. Sic grana alba, rubra, flaua, cærulea in Virginea sunt. Fruugum omnium communiſſimum Indiæ Occidentalis locis, in Peru, noua Hispania, Guatimala, Chile, & vniuersa terra firma, in Insulis verò non item: sic & in Indiæ Orientalis aliquibus. Hoc Indi communiter cum primo commiscunt: & ex hoc solo panem *Arepas* nominant, & porum *Chicha* (potus subacidulus *Cici* dicitur: part. 9. Ind. Occid. addit.) Indis vocatum, vt fortissimum, quod in Peru *Sera* dicitur. An hæc herba quæ in Brasilia aliquando fenes vitilia contegunt, cuius folia duorum digitorum latitudine, paulum incurua, in longitudinem excrefcunt, veluti calamus qui spicam Milij siue *Triticij* Sarracenicij contegit: Lerio in Brasil. cap. 7. Hæcenus ex Hist. Indica: subiticiamus Recentiorum nomina. *Triticum frumentum*, Træg. (cui & *Typha magna*) Fuchs. *Frumentum Indicum*, Matth. Lon. *Milium Indicum Platanum*, Ruell. Gesner. Ad. Lob. cui & *Mays* Occidentalia n. *Milium Indicum*, Dodon. (cui & frumentum Asiaticum,) Turner. Lac. Geln. car. *Frumenti cærua species Turcica* dicta, Ang. *Triticum* *Balkanum* sine *Indicum*, Cord. Histor. Geln. hort. *Frumentum Turcicum*, Dod. Geln. hort. (cui & *Panicum peregrinum rectius*,) Tab. Ger. *Triticum Indicum* Fuchsij & Matth. Lugd. *Maizum*, Monardi. *Maiz*, *Triticum Indicum* potius quam frumentum Turcicum dicendum, cum non ex Asia, sed ex India primum sit allatum, Cam. *Maiz Indicum*, *Panicum Indicum*, Cæs. *Mays*, quod nulla specie cum Milio, quod Plinius ex India in Italiam importari scribit, conuenit, Ioseph. Aosta. Hist. Ind. lib. 4. cap. 16. Variat apud nos floribus colore purpureo, rubeo, luteo, aliquando pro ratione fructus futuri: granorum in colore quatuor præcipue genera habetur enim granis rufescentibus, nigricantibus, crocantibus & subalbicanibus.

Frumentum Ind. *Mays* dicitur alterum. Milium Indicum magnum aliud, Lobicon. Milium Indicum, Cæs. Frumentum Indicum, Tab. Frumentum Asiaticum, Ger. Hoc cum spicarum colore variet, idcirco Tabern. spicas sedecim, Gerardus verò duodecim pingit, quæ colore sunt vel simplici vel mixto: simplici, albo, luteo, auro, violaceo, spadiceo, nigro: mixtis coloribus, albo, spadiceo, & cæruleo: cæruleo, albo, nigro, partimque punctis spadiceis mixto: albo, violaceo, luteo cum punctis spadiceis: rubro & spadiceo: auro & albo: cæruleo, luteo, albo, & punctis cæruleis aspersis: denique cæruleo, luteo, violaceo & albo.

V. Frumentum Indicum *Mays* dicitur minus. Huius Tabern. meminit, quod priori altitudinem tantum mediam attingat, cuius spicæ non ad culmorum latera, sed floribus succedant, colore albo, rubeo, spadiceo, luteo, atrorubente, & alio: quando mixto.

Ceterum, Germaniam propemodum Arabiam felicem Tragus appellat, posteaquam non solum domesticis abundet stirpibus, sed etiam peregrinis, inter quas Triticum hoc frumentum connumerat, quod terram probe stercoreatam & pinguem expetit, frigoris & pruinarum impatientissimum: feritur Martio aut Aprilis mense, nec nisi sub finem Augusti & initio Septembris ad maturitatem peruenit: primo autem exortu, non multo aliter quam Milium erumpit.

Quidnam hoc frumentum in Medicina posset, nondum satis constat. Quia autem dulcedinem & lentorem quendam grana gustu præ se ferunt, haud dubie idem cum Triticum habebit temperamentum. Cum porò idem cum Triticum habere videatur temperamentum, eadem etiam obtineat facultates necesse est. Grana itaque teruntur in candidissimam farinam, quæ in panificia sabinæ cogitur. Panis tamen ille lentoris quidam & obliuiscens naturæ habet. Hinc est quod in Asia & Turcia illius nullum in cibo vsum esse, nisi cum annonæ premitinopia, dicunt. Quidam ex farina pulces parant, adhibito lacte, quod & reliquis frugibus familiare est. Ceterum foliorum recentium succum refrigerandi facultatem obtinere tradunt, hinc ad erysipelata vtilem admodum esse coniciunt. In nutriendo, subdit Dodonæus, frumentum hoc, Triticis omnibus, ipsoque non solum Secali, sed & hordeo longè citius inferius. Panis ex eo apparatus mediocriter quidem candidus est, absque furfuribus concinnatus, sed durus ac siccus, veluti biscotus, nihilque lentoris habens. Concoctus eas ob causas diuicilis, corporique nullum aut omnino exiguum alimentum præbens: tardè descendens, ac alium constringens, veluti ex Milio, aut Panico factus.

DE GRAMINE SIVE AGRESTI VETERUM SENTENTIA & Neotericorum dubia.

CAP. LII.

Dicitur *ma*, herba à Theophrasto, quod omnium herbarum frequentissima sit. Hac tamen voce etiam quæcumque alia herba indicatur. Quare magis propria significatione ab aliis grecis *ἀγρας*, & *ἄγριον ἀγρον*, ab agris, quod in iis prouinciat appellatum est. Gramen à Latinis à gradiendo, quod geniculatis ramulis mirifice serpat: vel à germinandi fecunditate, quod citò crebras multaque à se radices nouas (paruat, agatque. Arab. vt Serapione cap. 119. *The l & Negil*: Auic. & Rhase *Thil* & *Tithagra*, ab aliis *Vagen*, *Negen*, *Negien*, *Kel*, *Negil*, *Nagien*, *Phegem*, *Teil* & *Teid. ken*. Egyptiis *Aufsi*: Afis, *Iebal* & *Ebal*. Germ. *Gras*: Belg. *Gras*: Gall. *Gramen* & herbe: Ital. *Gramigna*, *gramagne* & *gramine*: Hisp. *gramenha*, *grama*, & *grama verua*, & olim *Apurua*: Cretenſibus, *Agroſti*, Vallachis *Cotia* & *Cotia*: Hung. *Ponye*: Boh. *Daye* aueb *Trawa*. Veneribus Grecis etiam *ἀγρον*, aut vt Apuleius legit, *ἀγρον*, *Ναυρίδιον*, *ἀναγρον*, & *ἀναγρον*, hoc est, Aigicon, Aigichum, Asphyllum, Alfeolum, Vniola, Amaxitis, & Hæmaticum.

Frumentum Indicum
Mays mays
ma.

In Germania
uia qua loco est
tempore sit
ferendum.

Vires;

Vfus in pane
ne est panis
ficus.

Succus foliorum
recentium.

Nepha
Theoph.

Agroſtis
Gracis.
Gramen.
Lat.

Nomenclaturæ:

Dioscorides quatuor Graminis genera facit, de quibus ait : Gramen [*ἀρουνίς*] vitriculas per terram repentes, quæ à suis articulis radices spargunt dulces, internodiis distinctas: folia acuminata, dura, lata, ceu arundinis parvæ, quibus boves & iumenta pascuntur. Huius trita radix & imposita vulnera glutinat. Ipsius autem decoctum epotum, efficax est aduersus tormina, vrinae difficultatem ac vesicæ vlcera, & calculos frangit. Arundinaceum gramen priorè maius est omni ex parte. Iumenta porrò in pabulo sumptum necat, maximeque quòd in Babylonis regione fecus vias nascitur. Quod verò in Parnasso monte gignitur gramen, densius fructicat, foliis hederaceis, flore candido & odorato, semine paruo, non inutili: radicibus quinque senisue, digitali crassitudine, candidis, mollibus, dulcibus, ac robustis, Quarum succus si in vino cum pari melle ac myrrha dimidio, Piperisque ac thuris tertijs portionibus decoquatur, præstantissimum fiet ad oculos medicamentum. Id verò in ærea pixyde reconditur. Radicem autem decoctum eadem quæ herba ipsa præstat. At semen vehementius vrinam impellit, vomitioneque & alui profusioa sistit. Natum porrò in Cilicia gramen, quod indigenæ Cinnam appellant, boves inflammât (faginat) si eo vitentur, si lapè pascantur.

Gramen ipsa in inter herbas vulgatissimum, geniculatis sepep interodiis, crebroque ab his, & ex cacumine nonas radices spargit. Folia eius in reliquo orbe in exilitatem fastigiantur: Parnasso tantùm Hederaceæ speciei, densius quàm vsquam fructicat, flore odorato, candido, que iumentis herba non alia gratior, siue viridis, siue in foeno siccata, quum datur aspersa aqua. Succum quoque eius in Parnasso excipi tradunt propter vberitatem. Dulcis hic est. In vicè eius in reliqua parte terrarum succedit decoctum, ad vulnera glutinanda: quod & ipsa herba trita præstat, tueturque ab inflammationibus plagas. Decocto adijcitur vinum & mel, ab aliquibus & thuris, & piperis, myrrhaque tertij portiones. Rursusque coquitur in æreo vase, ad dentium dolores, & epiphoras. Radix decocta in vino, torminibus in datur, & vrinae difficultatibus, vesicibusque vesicæ, & calculos frangit. Semen vehementius vrinam impellit; alium vomitioneque sistit. Ita vetus codex Plinii lib. 24. c. 19. Et sunt sanè eadem quæ etiam Diosc. habet. Verùm subijungit de aculeato gramine trium generum, quod Diosc. non habet. Et tandem addit, Camelos autem necare traditur in Babylonis regione, id quod iuxta vias nascitur. Hoc autem *κατακλυσιον* Diosc. vocat.

Galen. Galeno graminis radix moderatè frigida est & sicca, habet modicum quid quod mordet & tenui partu est. At herba in primo abscellu frigefacit, sed moderata est in humiditate & siccitate. Semen autem reliqui graminis debile est. Eius verò quod in Parnasso nascitur siccandi vim habet, tenuium partium est, & subadstringens.

Caput in Galeno de gramine duplicat. *Αρουνίς* denique caput in Galeni exemplaribus duplicatum legi auctor est nobis Iul. Alexandrinus. Quare surreptitium esse suspicamus est primum, vel certè superuacuum.

Αρουνίς (Lob. & Pén. Aduersaria auspicantur, quasi Agrestis dicereur planta nec satina aut ferenda, Græcis scitè nencupata fuit: ut pote que ruri vbique spontè quouis anni cardine, oculo, solo & sidere lauritur: eius namque perennis proventus, feracitatis restibilis, nec minus immentè utilitatis, quantum toto orbe extat terrarum, vi-

rore ornat ameno, & veluti gradatim sese propagando amicit decore, vnde Latinis Gramen deflexum putatur. Triticeo generi, vt cognata, & similis, sic perinde varia & nobilitate proxima. Quin differentie magis conspicua è radice, spicata coma, folio & flore sunt duccnda: quas etiam cunctas partes & differentias (quia varias Tritici species æmulantur, deque mutua inter se collatione facilius discernuntur & discuntur) aptius forte diximus nominibus & notis quamque suis, vel minimas quasque profsequi, quas natura pecori quidem vescendas, sed homini vni non modò vtendas, adeoque priùs cognoscendas, peperisset. Nullum enim vel despiciatissimum illius operum, nostrâ, id est, mortalium Philosophantium, indignum cognitione & admiratione ducendum, summus Philosophus in libro De partibus animalium luenter docuit, cuiusque alumnus Theophrastus in Plantarum historiis.

GRAMEN NODOSVM.

CAP. LIIII.



CVmos habet tres cubitos altos, tenuis, ad quorū nodos folia oriuntur culmū ad alterum ferè nodum inuoluentia, quæ inde dilatata abscedunt, sefcūciam ferè lata, palmum longa, glabra: panicula bipalmaris, glumis constar auenacis, aristata parua mollicella donata, è quibus flosculorum saturatè

purpurascentiæ tremula filamenta librancur, radices bulbis cauenatis, tuberosis, creberrimis fibris longis capillatis: siopore partim subacido.

Dodonæus à erectis geniculis ac tuberosis radicibus nobis *Enopograss*, id est, nodosum gramen appellat. Addit unum apparere ex Marcelli verbis, nodosum hoc Gramen apud Veteres pro gramine propriè dicto habitum fuisse.

Hist. Lugd. duas huius plantæ habet figuras. Primam quidem, quæ nullo modo placet, sub hoc titulo: *Cata Myconi*: hoc lepores magnoperè delectari, nodoque eius radices effodere dicuntur. Quibusdam *τὰ ἔγρησιε*. Gladioli species videtur esse, nisi Sisyntichium. Altera figura est sub inscriptione Graminis nodosi.

Lobel. in Hist. Belg. vocat *fnobelastrich* est *Elsterauchdgras*. Tabern. inoder oder *fnoben gras*.

C. Bath. phyt. *Gramen 97. siue nod. si in auenacæ panicula*: Lid. pin. *Gramen n. d. si in 1. siue auenacæ panicula*: an *Ægiops* bulb. genus, Plin. lib. 19. cap. 5. *Gramen vel auenæ si in genus*, Gæler. coll. *Gramen bulb si in d. si in*, Adu. Lobel. Obs. pag. 1. Icap. 2. Lugd. cui & Gramen nodosum, sub aha figura. *Gramen tuber. sum*, siue *nod. si in*, Cam. Gramen

men bulbosum Tabern. *Gramen caninum nodosum*, Ger. Agrosteos alterum genus. Parauij vbi sponte proenit, quidam vocabant Bromon: Volmarus misit Stutzgardia pro Gramine Dioseoridis.

Nascitur in fegetibus, locus agrorum marginis, & in collibus inter alia Gramina. In saltibus Thuringiæ vbique se offert. Sed, authore Lobelio, rarius aliquantò istud, minùsque plerisque Europæ regionibus vsu cognitum: Lemano. a. & Laufannæ finitinis atuis & fegetibus plurimum. Frequentissimum etiam Sabaudia & Angliæ.

Saporis amarj & acerbi sunt radices, quare valentiùs obstructions expedire & vrinam citere aiunt, quàm vulgare. Herba, inquit Marcellus, quæ gramen dicitur, nodorum 27. ex vino ad medias decocta & expressa atque colata, potiùs strangurioso ex vini cyatho vno mixta data, ad eò potenter succurrit, vt vbi sine tormento vrinam facere cœperit, dari non oporteat: sed febricitantibus ex aqua sola dabitur. Ex quibus verbis apparet, nodosum istud gramen, apud Veteres pro gramine propriè dicto siue Agrosti habitum, & aduersus calculum & vesicæ morbos commendatum quoque fuisse. Recentior ætas nunc huius, modò illius indifferenter, pro graminis radicibus vtitur.

GRAMEN HIRSVTVM REPENS, SPICA SIMPLICI, MOLLI.

Importuna luxuries est radicem albentium, nitidarum, geniculatarum, sapore subdulci, quibus in immensum se propagat: folia longa, hirsuta, mollia, vaginâ longissima culmum nodosum, tenuem, cubitalem, obuoluunt, panicula mollis, contractior, palmum circiter longa, ex viridi purpurascens.

Hoc gramen abundat in vitibus Montbelgardii: florens Iunio, & Iulio.

GRAMEN CANARIVM, LONGIVS, RADICATVM LATIORE PANICULA.



Huius canini graminis haud à vulgato gramine medicato dispar natura, quod eruitur ex arenis, siccis glareosis sabulosisque ambulacris, vicinisque locis iuxta nouum Medicum hortum Nobiliss. Baronis Edwardis Zouchæ: habitatoribus corpulentioribusque dulcioribus radicibus, latio-

ribus sparsisque acerosis paniculis, cætera haud absimilia.

C. Bauh. pin. *gramen caninum 3. siue longius radiceatum minus: gramen canarium longius radiceatum latiore panicula minus.* Lobel. Ada. parte altera.

GRAMEN CANARIVM LATIORE PANICVLA MINVS.

Latiore item paniculâ glareosis, obsoleto & linculto agro hoc Canarium gramen minus quandoque occurrit, reptantibus, ciliatis, granulatis, prætenuibus radicibus graminis Canarij vulgaris gustu non dissimilibus & efficacitate paribus: coloris ex fusco albidis: foliis verò sesquiuncialibus, iuxta radicem pluribus, paruis & angustis: in spirhamis autem tenuibus cauliculis iuxta genicula tribus, rarò pluribus.

C. Bauh. pin. *gramen caninum 4. siue longius radiceatum minus: gramen Canarium longius radiceatum latiore panicula minus,* Lob. Aduers. parte altera.

GRAMEN REPENS OFFICINARVM FORTE TRITICEÆ SPICÆ ALIQUATENVS SIMILE.

CAP. LIV.

Procerum est gramen, interdum tribus cubitis altius, sitis è longi vagina, glabris, interim tactu alperis. Spica in nudo culmò intidet duorum versuum, cum Triticea nonnihil commune habens, sed omnibus modis strigiosior cum aristis breuibus subrabens, searine oblongo, fusco. Radices pro graminum ratione crassiusculæ, longè reptantes, sapore dulci, prædite sunt. Hoc gramen repens Officinatum non admodum malè representare videtur Eicon quæ post cap. 58. traditur, sub titulo Graminis repentis cum panicula Graminis Mannæ.

Lobel. in Adu. dicitur *Gramen canarium Medicatum officinarum*, Germanis, *Gras*, Angl. *Curly gras*, Ital. *gramigna*, Gallic. *dent de chene*. In Obs. p. r. *gramen caninum medicatum*: In Ic. p. 20. *gramen canarium*.

In descript. Aduers. nihil video quod repugnet nostro graminis, nec etiam in figura: nisi quod spica non in totum respondet: nescio an negligentia pictoris, vel quod planta sit diuersa, adix optimè conuenit: illud tamen non placet quod scribunt Aduers. figuram esse apud Dodonæum, pag. 345. & Matthiolum pag. 999. Figura Lobelij similis est Dodonæi figuræ, si iubam haberet & non spicam: descriptio etiam in eò differt quod Dodon. dicit suum gramen non spicam, sed iubam ferre. Lobelius autem in Aduers. ait spicam ferre: magna præterea differentia inter gramen Matthioli & Dodonæi ac Lobelij, Matthioli figura nec radice, nec spica similis: quinimò saltim existimo radicem, si vera fuisset, non mutasset in postremis commentariis.

Nos subiungimus nostro Gramini officinarum Dodonæi gramen, imitati Lobelium & fratrem C. Bauhinum: quamuis nostrâ non habeat iubam sed spicam vt Lobelij, contra sententiam Dodonæi vt iam dictum. Lectorum igitur erit considerata.

Gramen Dodonæi huc referendum;

an nostrum Gramen, Lobelii & Dodonaei idem sit, nec ne.

An Tragus lib. 2. cap. 35. hoc gramen intelligit, cum ait: Inter omnes fruges in humidioribus agris, nec non cum annus fuerit pluviosus, Lolium infelix dominatur, quod sane nil aliud est, quam singulare vitium, & quasi abortus omnium frumentorum. Cum namque in satione, & quando in spicam sese attollit, pluvius continuis obruitur, fieri non potest quin vel semen profus suffocetur & puctilagine corrumpatur, aut in Lolium ac vitium quoddam degeneret. Est vero huiusmodi vitii vel Lolii fructus nihil aliud, quam palea inanis. Quosque iam dixi animaduerti potest in humidioribus hordeo constis agris, in quibus frequenter Hordeum vel in Lolium transit vel certe deorsum fertur tota seminis vis, id quod hinc accidere contineat, quia hordei caput alterum, & crassius quidem in radicem exit, alterum vero in culmum. Iam cum pluviosa fuerit anni constitutio, inferior grani pars nimio humore obruta facillime luxuriat; attracta ad se omni torius grani vis, ita, ut illa in radicem duntaxat se exerat, vicillim vero in totum spoliatur superior. Atque hoc pacto radix se longe lateque per terram diffundit, & non solum ex semine nullus fructus expectari potest, sed & agri ipsi peste caedendo corrumpuntur, vitianturque, ut nihil indutius agricola subinde eius nodi corruptelas agorum sustulerit, culturaeque diligenti emendauerit, hinc inde sese spargat, ac vndique culmis suis in altum emergat. Ac licet & culmum & spicam ostendet, nihil tamen fructus subsequitur, manetque nil nisi vacua, & inanis palea, quod sane haud immerito male habet agricolae, quare iure Virgilianus ille Mopsus hisce verbis conquitur.

An Lolium secundum Trago.

Ipsa Palea agros, atque ipse reliquit Apollo. Grandis saepe quibus mandauimus hordea sulcis. Infelix Lolium, & steriles dominantur Aeuens.

Haecenus Tragus. Lectores autem considerent annon Lolium s. siue Quecken dictum, Agricolis molestum, non sit idem cum nostro gramine, & an Tragus in sua descriptione non confundat duas plantas: an verissime perenne illud gramen odiosum agricolis possit generari ex annuis illis stirpibus, Triticis & Hordeo, plantis etiam valde differentibus suis spicis.

Trago nota- fatur.

Figura Graminis Mathioli in priorib. comm. quod primum Dioscoridis ait, & passim in Italia frequens, mihi videtur falsa, quod radicem attinet, quae valde crassa pingitur: si tamen esset vera, non videretur eius gramen respondere descriptioni Diosc. qui ait *αιμαυρα*, *επισηρα*, *ποδον* *επισηρα* *επισηρα* *επισηρα*, quae verba cum forte non obseruasset primum Mathiolus vel eius scriba: pictum gramen aliquod cum radice crassa: penituit tamen postea Mathiolam & mutauit radicem, & repentem appinxit, quod satis demonstrat priorem falsam, nisi etiam secunda sit falsa: miror igitur apud Mathiolam in postrema eius editione per Bassium, sculptam de nouo figuram, per ipsum Mathiolam reiectam, & vt magis falsa redderetur, additam veluti iubam, quam quidam suspicantur esse Graminis xerampelini, uel, vt nos vocamus, Gramen cum spica molli rubente: praestitisset eius emendatam, vel, corruptam postremam, curare sculpsentam, aut, quod magis placuisset, cum annotatione

Mathioli figura falsa.

ne figuram Bassii iam sculptam apponere. Camerarius ad Hist. Matthioli Germanicam omnino, diuersam posuit figuram Graminis, quod non videtur posse conuenire cum icone Graminis Matthioli, nec priore, nec secunda: de ceteris nescio: Matthioli postrema Graminis figura, quod radicem attinet, nostro gramini respondet, an idem intellexit ignoro.

Tabern. ic. & hist. Gramen caninum seu canarium s. Hundts gras/ Eidem histor. Gramen s. Canaria Plinii, Herba cynagrostis, Dens canis, & Gramen medicatum, quia multis locis utiliter in usu à Medicis pro Gramine usurpatur. Tabern. habet figuram Lobelii: si ei nota n, cur hoc s. non iungit primo, & secundum facit, ac discrimen certum ponit, quo possit distingui à primo.

C. Bauh. phyt. Gramen s. siue Officinarium, Canariaium Lobel. Gramen Dodonæo: Eid. pin. Gramen caninum. s. siue *arenense*, siue Gramen Diosc. Gramen Ruell. Dod. Cord. in Diosc. Cast. Gramen Dioscoridis, Gesn. hort. Gramen canarium medicatum, Adu. Lob. Gramen caninum, Tab. Ger. Gramen vulgare, Lugd. Graminis forte Diosc. species maior. Thal. Caninum autem vocat ad imitationem Plinii, cui Canaria, quasi à canibus inuenta, quæ fastidium deducunt, vomitum cum pituita reicientes: hinc Cynagrostis alius: & a foliorum primo prodeuntium forma, quibusdam Dens canis dicitur.

Passim spontè prouenit: floret Julio & Augusto, in aruis & satis, non pratis, vt plurimum, frugibusque haud parum incommodum: eoque semen facturi raris Septembris, etiamque primo vere manibus runcandum praecipiant Coloni.

Lobelio tota planta magis vesca creditur, dulcis & frumentacea vlibusque Medicis receptissima, praestitum radix, quæ referat viscerum fastus & renum, citra calefactionem, lumbricosque huius stillatitia interimit, nempe pabulo humorum putridorum fraudatos.

GRAMEN CANINVM VINEALE Casp. Bauhini.


CAP. LV.

Radice est alba, tenui, repente, geniculis distincta, ex quibus fibrae capillares in terram defiguntur: culmos habet tenues laues, geniculatos, in terram reclinatos: ex quorum geniculis singulis, folium, duas, tresue vncias plerumque longum, angustum, atrociens prodit: culmorum summo panicula breuis, parumque expansa, ex paruis glumis composita, insidet. Apud nos in vinearum vis, solo aliquantulum duriore, circa aestatis initium reperitur, Gramen hoc caninum s. in pin. siue vineale, primum in prod. descriptum.

GRAMEN CAMERARIi repens.

Radice adipiscitur longam tuberofam, sed aequalem, articulis praecinctam & hinc inde reflexis, non tamen profundius radicatam, filamentis constantem pluribus. Saum protrudit hæc ab vnoque articulo culmum continuè se inno-

& multiplicans. Folia longa, acuminata, dura, arundinis instar parua lata. Calamus duarum ferè spithamarum altus, admodum angustus, & tenuis more staminis, tribus, quatuorve nonnunquam articulis præditus, spica superiori parte profert patulam, quæ paruum continet semen. Folia cum radicibus sapore habent dulcem, cum adstrictione quadam & acredine.



Camer. ad Matth. Germ. & epit. ponit figuram nomine graminis & Reesgrass.

Tabern. Hist. pag. 636. gramen primum Cuiusdam grass aut Reesgrass pag. 644. gramen Dioscor. germ. Kinde grass Cuiusdam antiquum est germanicum vocabulum adhuc in vtu Saxonibus & Septentrionalibus germanis, significans, Kinde, id est, Bouem. Potuisset Tabern. diligentius describere gramen suum, quandoquidem Dioscoridis primum n facit, & iconem non dat. An sit idem cum eo, quod pingit Camerarius, considerandum.

rimum est, nonnunquam etiam rubeus, non infrequenter prodit, radicibus tenuioribus, cirrosis, coliculos emittens recuruos, humi prostratos, tenues valde, teretes, geniculis frequentibus interceptos, ad quæ primum folia prodeunt palmatis longitudinis, stricta, deinde etiam inter hæc folia & ipsorum geniculos singulos densè prorumpit plurimorum, paruorum, oblongiusculorum ac strictissimorum foliorum cæpes, ad quorum inferius tuber, quo ex geniculis prorumpunt ipsa, noui citri emergunt, qui demù in musco comprehendentes, nouarum plantularum origines existunt.

C. Bauh. pin. gramen caninum s. siue supinum paniculatum folio varians : graminis 1. Dioscor. species Thalij. Synon:

GRAMEN CANINVM SVPINVM PANICULATVM dulce C. Bauh.

EX radice oblonga, capillata & nigra: folia Descriptis Epauca, læuia, viridia angusta, vnciarum rium vel quatuor longa, prodeunt: inter quæ calamus tenuis, internodiis distinctus, foliis paucis oblongis cinctus, parte inferiore supinus; mox palmum longus, erigitur, & paniculam tenuem, albam, glumis exiguis douatam, sustinet: agris Londinensibus vdis gaudet, vnde D. Lobelius, graminis dulcis nomine misit. Synon: gramen hoc caninum 6. in pin. siue supinum paniculatum dulce.

GRAMEN REPENS CVM PANICVLA Graminis Mannæ.

CAP. LVIII.

GRAMEN PARVVM REPENS PVRPVREA SPICA.


CAP. LVI.

GRamen canarium in cultis quærenti, occultum passim copiosè gramen istud, supinum, sparsis per terram culmis, radice sub terra huc illic vagante, vulgaris graminis canini in modum: spica purpurâ splendet, diuisa: filia graminis præcensis parui. Radices fibrosæ. gratum hoc ouibus est gramen Lobel.

Lobel. in Ic. plant. & Belg. hist. pag. 21. Gramen caninum supinum, Belg. Ligghende peyen-grass. Tab. Ic. gramen caninum supinum 2. Legendes händte grass. Eid. hist. gramen 6.

C. Bauh. in Phyt. gramen 2. siue Caninum supinum : graminis primi Dioscor. species minima, Thalyo. Quod verò Thalyus hanc ipsam non intelligat, declarat C. Bauh. in pin. vocans, gramen caninum 7. siue supinum minus.

Dum generum folia & culmos profert. Primum enim lentis, longisque ad cubitum vnum aut alterum coliculis solidis, crebrò geniculatis, læuib, caducis nascitur, qui vbi terram attigerint, statim per fibras è nodis dimissas, comprehendit, radicaturque: atque ex iisdem geniculis folia mutuo amplexu stipata surgunt: breuia, angusta, hirsuta: deinceps adultius culmos producit erectiores veluti superiorum ramos, pedales, tenuiores, foliis amictos longioribus, hirsutis, & rarioribus geniculis interceptos, quorum summitas in spicas finditur, quatuor, quinque, sex, spicis graminis Mannæ similes, sed minores, concinniores, imbricatas, non tamen circumcirca, perinde vt iam dicto gramine, cui pars spicæ interior nuda, hoc discrimine interim, quod ea pars e ramini Mannæ sulcata sit, in hoc verò in costam elata, sterculos fert arrobentes: Radice nititur geniculata, reptante; subdulci, alba.



les, sed minores, concinniores, imbricatas, non tamen circumcirca, perinde vt iam dicto gramine, cui pars spicæ interior nuda, hoc discrimine interim, quod ea pars e ramini Mannæ sulcata sit, in hoc verò in costam elata, sterculos fert arrobentes: Radice nititur geniculata, reptante; subdulci, alba.

GRAMINIS PRIMI DIOSCORIDIS species minima Thalij.

CAP. LVII.

SE nunquam attollit, sed geniculatis ramulis iuxta Dioscoridem serpit, ac ex internodiis suis, & ex iplo etiam cacumine creberrimè nouas radículas iuxta Phinium spargit, ac ex iis nouarum plantularum exortus exhibet. Hæc passim in Hærcynia, & etiam Stolberge in pratis vlginosis ex musco terrestri, qui candidus vrplu- Tom. II.

Ischamum Plinii, male.

Sunt qui Ischamum Plinio lib. 25. cap. 8. nuncupatum esse putent: quorum sententiam probare non possum, inquit Clusius in Hist. Quod si verò ad Pliniani Graminis vllum aliud genus referenda est hæc planta, aculeatum illud potius erit, cui, quod in acumine aculei sunt plurimum quini, Dactyli nomen inditum esse ait lib. 24. cap. ultimo. Nemo autem legitimi Graminis (ita vocat in Hist. post.) iconem exhibuit, quod in magna Europæ parte, præsertim per Hispanias & Gallias crescit, cuius antequam stirpium in Hispaniis obseruatarum historiam euulgarem ob illius tum elegantiam, tum vsum, cognitu dignum erat, illius descriptionem & iconem do. Pedalibus assurgit culmis, rotundis, purpurascensibus, geniculatis: è quibus angusta promit folia, in acumen fastigiata, dura: ipsi culmi, siue calami, in quaternas aut quinas desinunt paniculas, mixti ex atro purpureoque coloris: radicibus firmatur longis, nodosis, geniculis interceptis, candicantibus, subdulcis cum quadam adstrictione saporis, quæ longè lætæque serpentes, sibiinde plurimis locis germinant, nouosque culmos & folia proferunt.

Gram. aculeatum Plinii.

Gram. leuissimum.

Descriptio Clusii.

Synon:

Lobel. Obs. p. 12. Icon. Plant. p. 23. figuram Clusii habet, ac Gramen alterum inscribit. Anguill. epist. 12. & 14. Gramen roti Italiae notum. H. Lugd. Gramen vulgare Dalechampi. C. Bauh. phyt. Gramen 38. siue Gramen Dactylon secundum folio arundinaceo. Idem in pin. Gramen Dactyloides siue Ischamum. 2. siue Gramen dactylon folio arundinaceo matius: aculeatum fortè Plinii: Gramen Ang. Clus. & Cels. & dicitur. Hoc variare scribit, & Gallicum foliis nonnihil villosis; Germanicum verò foliis esse glabris, & cauliculis minus et ceteris tradit.

Locus:

Hoc gramine nihil vulgariùs totâ Hispaniâ & Gallia in aruis, vineis, atque etiam in maritimis, in quibus multò lætius & vberius crescit: nam eius radices, interdum digiti crassitudinem æquâtes eructe meminit Clusius.

In Horto E. C. cultum per plures annos mansit, tandem frigidioris soli impatiens perit.

GRAMEN CRVCIS SIVE Neiemelmfalib.

C A P. LIX.

Descriptio



Gramen quoddam nascitur, exile, radicibus serpens albis, geniculatis, dulcibus cum aliqua acrimonia, communi Gramini proximis, digiti altitudine geniculati ramuli assurgens, foliis communi Gramini similibus, minoribus, ramuli habent quatuor Ischemi spicas, vel Graminis sanguinarij similes, perfectam erucem figurantes, quam æquè

miles, perfectam erucem figurantes, quam æquè

omnes vno modo formant: ex quo ipsum Ægyptij Neiemelm vocant, quali dixerint, Gramen crucis: in quibus sunt semina minutissima, seminibus conumunis graminis similia.

Alpino descriptionis auctori dicitur Neiemelmfalib Ægyptius, C. Bauh. phyt. Gramen 90. siue dactylon Ægyptiacum: Eid. pin. Gramen dactyloides siue Ischemum 1.

Maximum vsum semina apud omnes habent, ad eos scilicet, qui tum renum, tum vesicæ calculi laborant, atque ad frangendos lapides in vesica concretos. Quod genus morbi ibi est familiarissimum, & quasi endimium ex causis alijs narratis. Mulieres radicis decoctum tum ad pueros variolis, atque morbillis correptos maxime sequuntur, tum ad se ipsas, ubi cupiunt intercepias menstruas purgationes rursum euocare. Sunt aliqui qui pro secreto auxilio habent decoctum, ex seminibus modicè contusis paratum, ac adiuvanda exanthemata in febribus pestilentibus quas peticulas nostri appellant. Ad vsu quoque vulnerum & vlcera non paruùm, apud eos, tot herbæ, præcipuè radices habent vsum. Aiuunt radicem frigidam atque siccam esse, tenuissimamque partium, quamobrem non desunt multi qui ad mouendum sudorem eius decocto familiarissimè vtuntur.

GRAMEN SCOPARIVM. Ischemi Paniculis Gallicum.



Speciosus situs, Ischamum Gramini cognatum videretur in Adu. parte altera Lobelio; è cuius prælongis, præternibus rigidisque cubitalibus & longioribus radicibus cirris cocinatur scopula illæ vulgatissimæ nitentis comæ conciliatrices, frictionibus capitis accomodatissimæ & vltatissimæ.

Figura ei graminea, Ischemi vulgaris, gracilis culmus, rigidus, geniculatus, cubitalis; in quaternas, quinas, vt plurimum senas, & plures elegantissimas lucidas spicatas caudicellas Ischemo Gramini similes, fastigiatus. Foliis item non dissimilibus, gustu Graminis, dulcioribus. Copiosè prouenit in Gallia, sabulosis vicinis Castrî Insulari locis vocitati (vulgò *Chasseau de l'Isle*) prope Aureliam, collegit amicissimus vir Georgius le Seigneur, Pharmaceutices, & Rei herbariæ callentissimus, quo gramine me donauit Londini, Anno 1601. quique quotannis Angliam nouis & rarissimis ditat Plantis.

C. Bauh. pin. Gramen dactyloides siue Ischamum 6. siue Gramen dactylum scoparium: Gr. scop. Ischemi paniculis Gallicum, Lobel. Adu. parte 2.

GRAMEN SPINIVM ACVLEATVM

C A P. LX.



BReibus fibris radicatur: ramos verò terra apprimat in orbem, multos, palmares & sesquipalmares, aliquando pedales, aliquos verò duntaxat vnciales, rigidulos: ad quorum genicula, vtriculi instar, folium stitiatum glumas numerosas conglomeratas, squammarum foliacearum còplexu comprehensas claudit,

deinceps in mucronem rigidum & acutum, vnciacalem & breviorē, rectā in latus protensum definit, extremo verò cauli huius generis plura folia & vtriculi glumis grauidi, echinati aliquid ostentant.

Camer. ad Matth. hist. Germ. & Epit. *gramen aculeatum*, Italis *gramigna spinosa*. Græcis *σπινος* & *ακυλεατος*. H. Lugd. *gramen aculeatum* Matthioli.

Gener Cherlerus attulit collectum ad vias Romanas, asperiores præsertim, sicciorisque: Matthioli. verò in Epitome ait provenire inter rudera, & in muris vetustate collapsis.

Viresque easdem habere, quibus pollget primum Graminis genus.

GRAMEN PRATENSE VVLGARE
spica ferè arundinacea.

C A P. LXI.



Capillari - bus fibris totum occupat cespitem, glabris, viridibus, tenellis foliis amictas emittens stipulas, quarum summa comantes latè diffusa panicula mollicellæ insigniunt: pilorum, aristatumque expertes, accedentes tamen quodammodo ad arundinem. In hoc Gramine insignis varietas ratione lo-

ci, & potissimum in magnitudine spicarum.
De hoc Lobel. in Adu. Est quàm quod notissimum *gramen pratense* dictum, vulgò notum, & Tom. II.

Fœnum quando aruit vocatum, exilioribus radicibus cirris seu pullis capillamentis & creberis cespitem summum fugens, humumque perreptans & tegens, densissimo & numerofo foliorum triticeorum stipatu: culmos pedem & cubitum altos furrigens, tenues, geniculatos, leues, lanosa, sparsa, & magis harundinem vallatoriam imitante, spica fastigiatum.

C. Bauh. phyt. *gramen 7.* siue *vulgare*: Eid. pin. *gramen pratense paniculatum 2.* siue maius, latiore folio: *παι* Theophrasti, *gramen vulgò cenicum*, Træg. icon. *graminis genus* Dalech. in Diole. *gramen pratense maius vulgariū*, Ada. *gramen pratense vulgariū* Lob. in Obs. pag. 9. & Hist. Lugd. *gramen pratense primum* Dod. *gramen* Lon. *commune*, Thal. *gramen alterum & vulgare*, Tabern. *gramen pratense*, Lob. in Ic. Ger. An per *Chulem* Garzias hoc Gramen intellexit? Clusius not. ad Garz.

Huius femine in horreis è spicis excusso & collecto vntur compures Medici ad obstructions viscerum, calculum, potu: ad motique ad diffusionem pertinacium tumorum, & flatuum, tamen Oiticinis vsu ignoto. Ast hoc non sine periculo, quia non faciliè separari potest, ab aliarum herbarum feminibus.

GRAMEN PRATENSE PANICVLATVM
maius angustiore folio, C. Bauhin.

C A P. LXII.

EX radice capillacea, rufescente, folia capillacea, quadam brevita, quadam palmum superantia, prodeunt: inter quæ culmi tenues, geniculati, cubitum superantes, vno alterove folio bteui cincti, in quorum summo panicula leuiter expansa, vncias quatuor longa, quæ ratione loci, strigiosior vel latior.

Gramen hoc pratense paniculatum, siue maius angustiore folio C. Bauh. in pin. 10. in prod.

In praris & dumetis ad ripam VVieffæ itaminis Bassiæ reperitur.

Huius simile ad *gramen* prædictam inuenitur, potissimum radicibus capillaribus, vt ex caulium numero, paniculis, & in iis glumis longioribus varians.

Descriptio

Locus

Varia pe-
nicula &
glumis
longioribus

GRAMEN AGRORVM LOB.
C A P. LXIII.



Agrorum Auenti spicam diximus, quòd spicam habeat latam, comosam, pansam, & à ventis communiter in alterum agitatum latus. Foliis alioquin & radice magnitudine ferè æquale est segetum Gramini. Iuba cæterum Miliaci Graminis Iubæ haud abimilis est. Hac Lobelius. Quibus addit Tab. Ra. Qq 2

Descriptio

dicem habet paniam, villosam: folia longa, angusta, nec acuminata: culmum, quam cetera harundinacea, magis tenuem.

Synonyma Lobel. in hist. Belg. p. 5. & Plant. Ic. p. 3. *Agrorum venti spica*, & *Gramen agrorum*, larioire, arundinacea, comola panicula T. p. 5.

C. Bauh. phyt. *Gramen* 19. siue *segetum*, panicula arundinacea: Eid. pin. *Gramen paniculatum aruense* 4. siue *Gramen segetum*, panicula arundinacea. *Gramen liliaceum* 8. Tragi, Thal. *Gramen equinum*, forte Gesneri, Cam. *Agrorum venti spica*, Lob. icon. *Gramen pratense* 3. Dod. *Gramen harundinaceum aruense*, Tab. *Gramen arundinaceum*, Ger. Variat panicula flauiscente & spadicea. Don. lar. *Gramen pratense* tertium duntaxat vocat nec describit: An idem cum aliis, an ipsi non cognitum? Sed non diuersum ab aliis esse constat ex iam adductis. Ipsi vero non visum patet; si namque vidisset, utique descripsisset, nec contentus solo nomine fuisset.

Locus Inter agrorum segetes reperiri Lob. notat & Tabernamontanus.

GRAMEN MILIACEVM LOB.

CAP. LXIV.

Agrorum venti spicæ simile est admodum, ac. alio & radice, sed panicula miliacea.

Synonyma Tabern. icon. & hist. p. 639. *Gramen miliaceum*, hirsengraß. Item p. 642. *Gramen* 13. in aruis campestribus siccis proveniens. Lob. in Ic. p. 1. & hist. Belg. p. 6. hirsengraß / Saetgraß, Miliaceum graminæ: sic & Gerardo. Dodon. Lat. *Gramen pratense* 4. sine descriptione. Camer. *Gramen perenne miliaceum* in siluis non procul ab vrbe nostra ad montem S. Mauritii. C. Bauh. Phyt. *Gramen* 21. siue panicula miliacea: Eid. pin. *Gramen miliaceum* 1. siue Gramæ siluaticum panicula miliacea sparsa.

GRAMEN MONTANVM.

panicula miliacea sparsa, C. Bauh.

Descript. **E**X radice fibrosa, rufescente, folia pauca, angusta, vncias quatuor vel quinque longa, vna cum culmo tenuissimo cubitali, vno alteroue folio vestito, exurgunt, in cuius summo panicula sparsa, ex locustis minutissimis composita: in monte Crenzacenli provenit: hoc Gramen miliaceum 2. siue Gramen montanum panicula miliacea sparsa, in pin: 50. in prod.

GRAMEN ARVNDINACEVM


panicula miliacea C. Bauhini.

Descriptio **E**X radicibus fibrosis albis huic Gramini miliacco 7. in pin. 51. in prod. siue arundinaceo panicula miliacea, vnus & alter culmus cubitalis exurgit, quem parte inferiore folia arundinacea vnciarum trium cingunt ad partem supernam duobus nodis distinctam, folia duo angustiora, longioraque vestiunt: in cuius summo panicula trium vnciarum, Millii panicula similis: in agris Patauinis reperitur, & à Gramine miliaceo à Lobelio proposito, planè diuersum est.

GRAMEN CAPILLATVM.

Descriptio **P**lures ex fibrosis radiculis tollit culmos cubitales, bicubitales & altiorem, aliàs ex viridi in

luteum pallentes, aliàs rubentes, geniculis interceptos, foliis glabris, palmariibus, aut dodrantalibus donatos, luminum cacumen in iubam explicatur pedalem circiter, atque arundinaceam: panicula ex interuallis radiatim disponuntur, nunc flauiscentes, nunc viridates, sæpè rubentes, in tenuium pediculorum staminulis, theculis pusillis femè claudentes minutum, subfulvum, acetemolli capillari & obtutum ferè eludente in extremo donatum.



Tabern. icon. Sy

& hist. p. 638. *Gramen segetale* siue aruense paniculatum, Ackerstrauß groß Kornstraußgras: Et p. 642. *Gramen* 9. Lob. Ic. p. 2. *Segetum Gramen panicula speciosa*: Eid. in hist. Belg. p. 5. *Veldegras* ost forengras met schoone seer wytghespreyde arens wort: in Latèin *Segetum Gramen panicula speciosa*, larioire: pulchrum est, panicula valdè lata, nascitur in agris inter Hordeum & frumentum, tam in Anglia, quam Belgio: radix fibrosa, ex qua culmus nascitur sequecubitalis, non sine foliis Miliaceis, cui innascitur lata speciosa panicula, eo ferè ordine quo scapus Plantaginis aquatica.

C. Bauh. Phyt. *Gramen* 18. siue *paniculatum segetum*: Eid. pin. *Gramen paniculatum aruense* 3. siue *Gramen segetum altissimum panicula sparsa*: An Gramen caule geniculato Thalii?

Geneæ & in Ducatu Wirtembergico ad fontem Admirabilem inter Aucnam mense Augusto & Julio floret. Montbelgardii etiam abundat in agris.

GRAMEN TENVIFOLIVM

magis sparsa panicula.

CAP. LXVI.

Obseruatum mihi Gramen culmis ferè iisdem cum sequenti, ac geniculis aliquot, foliis tamen paulò latioribus ac panicula diuersa, quæ magis sparsa, rubens: flosculi apicum modo, rubentes: radicibus terræ firmite hærentibus, in quibus capillares albæ fibræ.

C. Bauh. Phyt. *Gramen* 34. siue foliolis iuncis primum. Eid. pin. *Gramen iuncum* 1. siue foliolis iuncis oblongis, radice alba. H. Lvgd. p. 425. *Gramen iuncum Dalechampii*.

Montbelgardii obseruauimus supra muros cum flore mense Iunio.

GRAMEN TENVIFOLIVM GLABRVM.

CAP. LXVIII.

Numerosos effert culmos, satis tamen tenues, & rubentibus geniculis aliquot distinctos, panicu-

Æculis singularibus Phœnicis seu Lolij rubri, sed crebrioribus, grandioribus, sparsis, incoaditis, coloris herbacei: folia longa, tenuia, si vagina excipias, qua culmum involuunt, glabra, pedalia, & cubitalia, non rigida, fibræ capillares, nigricantes.

Casp. Bauh. pin. *Gramen iuncum* 2. siue foliolis iuncis breuibus maius radice nigra. Hoc in prod. pro 34. sic describitur: ex radice capillata, nigra, folia iunca, rariùs duas tresve uncias superantia, prodeunt: inter quæ culmus tenuissimus, pedalis, læuis; cuius summo glumi minimi, quemadmodum in gramine exili duriore alternatim dispositi sunt: ad mœnia vrbs nostræ legitimus.

GRAMEN TENVE DVRIVS CVLVM & penè iuncum.

C. A. P. LXVIII.



IN sine hifloriæ nostræ balnei ad mirabilis descriptus quoddam gramen, quod vocauimus iuncum cinereu, in rupibus & muris hærens ita firmiter radicibus tenuibus capillaribus, nigricantibus, vt vix euellere possemus, coherentibus simul multis plantis, foliorum marcidorum vestigia

demonstrant non annuam plantam: folia alioqui vegeta sunt, longitudinis quinque, vel sex unciarum, quedam etiam breuiora, conuolutio-nis ergo iunci instar tercia, nonnihil rigida, cinerei ferè coloris, restantibus Octobris huc ealaminis, valde tenuibus dodrantalibus & pedalibus, cum vestigijs veluti parue spicæ: idem, vt verum fatear, mihi videtur graminis illud genus, quod Montbelgardi prouenit, aut valde simile, cui folia virentia, tenuia, compressa, viridia, glabra, culmi plurimi tenues, pedales vel cubitales læues, in quibus vnum geniculum, præter illud quod ad radicem, & foliolum ex longa vaginula: sub vncialis, spicæ ferè similis, virens vel nonnihil purpurascens, in qua quedam partes, ad phœnicem nonnihil accedunt, & in paruas attas desinunt: in iis flosculi vel apices minimi albi: toti planta sapor subdulcis, in cæteris similis præcedenti, radice enim est nigra: & folia inferiora Autumno albescent, cineræve redduntur.

Lob. in Ic. plant. pag. 7. & Hist. Lugd. p. 432. *gramen exile*: Lob. in Obs. pag. 9. *exile gramen durius*: Gerar. & Tab. icon. & Hist. *gramen minus durivsculum* Klein hat grass: Eid. hist. *gramen* 19. C. Bauh. phyt. *gramen* 35. siue *foliolis iuncis* alterum: Eid. pin. *gramen iuncum* 3. siue foliolis iuncis breuibus minus.

Primum nostrum gramen in monte Teckcia-

Tom. II.

no Ducatus VVirtembergici copiosum erat mensis Octobris sine, destitutum penè omnibus spicis vel iubis: item in co nuiilaris rupium & supra muros & rudera arcis. Alterum Montbelgardi florebat Iunio, obseruatum supra muros etiam, ac ni fallor, secus vias aridioribus locis. Lobelius ait suum gramen exile omni subuletis & squallido aridiorique agro Galliæ, Angliæ, Germaniæ, & Belgi.

GRAMEN EXILE DVRIVS NORTVE-gicum aut Danicum, Scopario Gramini cognatum.

C. A. P. LXIX.



Saxorum Locu Descruptio
Sinterueniis leui terrâ sterilibus Petræ Nortuegiæ, imisque marcidis, timosis caudicibus sylvarum Daniæ hoc gramen (Lob. in Aduers. altera parte) viget, densissimo sparsoque rigidorum iuncorum, sesquiuincialis altitudinis tenuissimorum foliorum stipatum: sesqui-

palmaribus, numerosis, cirratis, geniculatis stamineis calamulis, quorum summa folia latiuscula, vaginula instar, spicatas, vnciales, paniculas claudunt aut amplectuntur. Iubata concinnatæq; dodrantalis radix, Buxci pallida coloris, totaque planta prolixior, vti graminis Scoparij, cuius cognata videtur.

C. Bauh. pin. *gramen iuncum* 5. siue foliolis iuncis radice iubata: *gramen exile durius* Nortuegicum aut Danicum Lobelij, Adu. parte altera.

GRAMEN NEMORALE AVENACEVM alterum, ex fusco xerampelinum & lucidum Danicum.

IN siluigeris Daniæ collibus & montibus (ex re- Locu sitatione Lob. Adu. part. 2. pag. 465.) perlegans, exilique gramen oriundum foliolis creberrimis, rigidis, cirratilque, vncialis & binarum vnciarum altitudinis radicibus. Pedales & sesquipedales, exiles, lucidi, & nitidi, aspectu iucundi culmi, ex fusco xerampelini, in quibus è longiusculis paniculis Auenacæ semina.

C. Bauh. pin. *gramen auenacum* 4. siue *capilla-* Synon: *ceum minoribus glumis: gramen Anglo-Vritannicum auenaceum, Danico nemorali simile*: Hoc nomine à D. Lobelio accepimus. *Gramen nemorale auenacum alterum ex fusco xerampelinum & lucidum Danicum*, Eid. adu. part. 2. cuius etiam varietatem notat.

GRAMEN AVENACEVM

lanuginosum glumis rarioribus
C. Bauhini.

CAP. LXX.

Descript. **G**ramen hoc auenaceum 6. Casp. Bauhini in pin. 72. in prod. ex radice fibrosa, folia iuncea oblonga, & culmi plures iuncea, cubitum superantes, paucis foliis donati, exurgunt: in quorum summo glumi rariores, albi, lanuginosi, & triculam continentes, quibus semen nigrum, splendens, inclusum est: locis asperis circa Monspelium prouenit: diuersum est à Gramine Clusii.

GRAMEN GLUMOSVM

Dalechampii.

CAP. LXXI.

Descrip. **G**ramen glumosum Dalechampii Lugdun. p. 429. sine Gramen auenaceum 7. sine lanuginosum C. Bauh. pin. radice foliisque multis graminum generibus non est dissimile: sed hac peculiari nota distrepat, quod spicas densissimas glumarum grandium ordinibus stipatas edat, quam ob causam glumosum nominatum est. In agris letis nascitur.

Locus

GRAMEN RVBRVM MONSPEL.

Descriptio

Qantum quantum est, rubet, spicae, folia: atque haec quidem pilis minimis aciem oculi ferè fugientibus obita sunt. Singuli calami multas gerunt spicas paruas oblongas, aristis longis, raris, vt in Gramine Hordeaceo. A me Monspelii obseruatum fuit.

Locus

GRAMEN ALIVD MONSPELIENSE.

Descriptio

Aliud Monspelii memini Gramen obseruatum, quatuor aut quinque spicis in vno calamo donatum, sed crassum cum paruis aristis: folia pilosa sunt valde.

GRAMEN ALIVD GLABRVM
MONSPEL.

Descriptio

Spicas gerit multas in eodem calamo, admodum exiguas, molles, nec aristis vllis obuallatas, diluore rubore, quam Gramen rubrum Monspelianum, à quo distet quoque, quòd folia non sunt pilosa.

GRAMEN MINIMUM

Monspelienfe.

CAP. LXXII.

Descriptio

Dura radicum fibrae, culmi paucis geniculis distincti, palmares & sesquipalmares, foliis stipati praetenuibus culmo altioribus: panicula in metam fastigiantur, singulares vnciam ferè exquantas, quam meis pusillis glumis contextae.

Quod descripsi Gramen pro minimo prouenit locis saxosis Monspelii: Gener. Chælerus at-

tulit nomine Graminis exilis durioris, obserua-
tum propè Burlonctum iuxta Monspelium, vt &
& alibi siccis & squalidis locis.

GRAMEN PANICVLA

multiplici, C. Bauhini.

CAP. LXXIII.

Gramen praetense paniculatum 7. sine Gramè D. panicula multiplici, vt auctor in pin. vocat, siue Gramè n. in prod. ex radice multis citris villosis albicantibus composita, culmi plurimi, palmares, laeues, geniculati & recurui, foliis graminis, oblongis, angustis, vestiti exurgunt, quibus panicula triuncialis angusta variè diuisa, per maturitatem rigida & spadicea, infidet. Monspessuli prouenit; maius & minus reperitur, & Gramen minus duriusculum vocatur.

GRAMEN CVM PANICVLA
mollis rubente.

CAP. LXXIV.



Confirmitas capillaribus radiculis subcespitem foliorum ima prodeunt, tunicis inuolucris compacta, interque bulbuli oblongi capitulum efformant, quae à radicibus statim multa pronascuntur, quadrantalibus & trientalibus, perangustis, mollibus, glabra, in culmis pauciora,

minora, in singulis tamen geniculis singula. Culmus pedalis, minor interdum, subinde maior, tenuis, paniculam gerit vnciam & sesquunciam, diuisam, ex viridi purpurascens, glumis crebris, exilibus, in breues, interdum tortiles, aristas, molles & quasi sericeas desinentibus.

Lobel. Aduers. Gramen minimum in sabuletis squallidis & vineis glareosis Norbonae sepius visitur, omnium minimum: perpusillam radicem, capillaceam, albam, calamulis etiam capillamentis similibus, elegantibus purpureis, Gramini Ischaemo vocato non diuersis, sed spica mollicella, sericea, speciosa. Icon plant. p. 2. Gramen minimum xerampelinum. Norbonense etiamque Belgicum. Si Lobelius, quod suspicor, eandem plantam nobiscum intelligit, figura non placet, mihi videtur Dalechampii apud H. Lugdunensem p. 427. sub Graminis bulbosi Dalechampii titulo proposita.

C. Bauh. phyt. Gramen 14. sine paniculatum aruens. Aduers. minimum: Variat paniculam quoad colorem, modò namque vires, modò rubet: Quare Ta-

re Tabern. Ic. pag. 204 & 207. duas proponit Icones albi & rubri nomine. Sed non videtur nobis Gramen panniculatum Tabern. respondere figura aut descriptione minimo Lobelij, potiff. album. Idem C. Bauh. in pin. gramen Matthioli esse censet, de quo cap. de gramine officinarum egimus. Gramen, inquit, paniculatum aruense r. siue gramen aruense panicula crispâ, est gramen Matthioli, & H. Lugd. p. 421. gramen minimum xerampelinum Lob. & H. Lugd. p. 433. & gramen bulbosum Dalechampi, eiusdem H. Lugd. p. 427. Casp. Bauhinus hic separat Gramen paniculatum Tabern.

gramen panicula spica molli rubene obseruauimus Monspelij in pratis: Genoux supra muros: Basilea citra telonium ad margines agrorum: Montbelgardij mense Iunio cum bulbulis supra muros.

GRAMEN PANNICULATVM MINVS
album & rubrum.
CAP. LXXXV.



Gramini paniculato, minori, albo, radix est exilis villosa, ex multis eculi fibris perplexa: ita admodum angusta, parua, acuta, leuia: culmi parui, equales, doctantem medium non excedentes, licet in pingui solo radicem egerit. Panicula extensa, alba, nonnihil splendent.

Rubrum quidem iam dicto radicem, folia, culmum & paniculam quod atinet per omnia simile feret, nisi quod in hoc culmi & paniculae rubescunt.

Tabern. Ic. & hist. p. 639. & 640. gramen paniculatum minus album & rubrum, Klein weiß vnder rot Straußgras. gramen 16. & 17. Qualia sint hæc gramina, nondum nobis perspectum.



Frater C. Bauh. in phyt. putat idem cum minimo Lobelij: verum nobis non videntur nec eius icones nec descriptiones (quæ nos exhibemus) respondere, potiff. albi. C. Bauh. in pin. mutat sententiam vocatque gramen pratense paniculatum s. siue minus: gramen paniculatum minus Tabern. gra-

men minimum album & rubrum Gerardi: variareque perhibet panicula & culmis purpurascens & albis.

Prouenit passim (album vt legimus apud Tabern. in hortis & vineis: Rubrum autem rard conspicitur, quod haud omni terrarum loco crescit. Obseruauimus nos (inquit Tabern.) primum in Burgundia non procul à Bisantio in vineis, & apud montem Argues, sicut etiam in superiori Alsatia inter Königberg & ciuitatem imperialem Obernehen in solo arido cum aliis graminibus. Ast alias nullibi in Germania offendimus.

GRAMEN MINIMUM CAP. LXXXVI.

Capillorum instar tenues radice caespitem Descriptio
mordicus obdident culmi numerosi, plus minus viciales, e-



nus viciales, e-nodes, molles, tenuissimi in spicam desinunt alternis glumis graminis pratenis obtitum: foliola stipulas à radice aliquoufque comitantur, tenella, perpusilla.

Locus:

Gener Cherlerus attulit ex Gallia Narbonensi, & speciatim se collegisse ait propè fontem illum magnum Templi Dianæ propè Nemausum;

nec alibi vsquam obseruasse.

GRAMEN MINIMUM DALECHAMPII.

CAP. LXXXVII.

Descriptio

Est veluti Egleba amplutcula, rotunda, radiculis plurimis breuibus, candidis: foliis digito non longioribus, teretibus, spica valde gracili, parua: si sculis rubris, Februario statim ad primam aëris temperiem exorientibus, sapore initio dulci, deinde amaro. Nascitur in aruis.



Hist. Lugd. p. 424. gramen mi-

num Dalech. C. Bauh. phyt. gramen 16. & gramen minimum instar gleba amplutcula. Eid. pin. gra-

men tremulum 6. siue minusum paniculis elegantissimis.

GRAMEN ANTHOXANTHON.
spicatum.

CAP. LXXVIII.

Descriptio



Folliis & radiculis capillaribus proximè ad Gramen pratense accedit: verùm folia glabra; Culm dodranta-les: aliquando cùbitò al-riores, tenues, frequentiusculè geniculati, spicam gerunt singuli vnicam vnius duarum- siue vaciarum, ex viridi flavescentem, in metà figuram, cuius glumæ singulares,

inolles, oblongæ, compressæ, acuminatæ, muticæ, interdum totæ flauent, interdum bicolores, flauæ & viridantes, per confinia decurrente ceu nervulo


Synonyma H. Lugdun. p. 426. *Gramen Anthoxanthon Dalechampi*. C. Bauh. pin. *Gramen spicatum pratense* 3. siue spica flavescente.

Locus. Obseruati Genevæ & in valle Griesbachiana ad fontes acidos florens Maio, itemque circa S Hippolitum Burgundiæ.

GRAMEN VERSICOLOR.

CAP. LXXIX.

Descriptio



Raptantibus graminibus accensendum, radices duras geniculatas longè latèq; spargit, fibris profundè demissis, satis crassis, vix euelli potest è rupium rimis; culmi foliis crebris vestiti, dodranta-les, spicam singuli gestant graminis anthoxanthi paulò breuiorem, modò purpuream, quæ colore ad obiectum lucis variante placet, paruùm semen longiusculum ad semen graminis Mannæ accedens, rufescens & serine, internè albescens, in-

uolutum parvis glumis.

C. Bauh. pin. *Gramen auenaceum* 8. siue glumis Syn- variis: 73. in prod. sic descriptum: ex radice crassa, membrana alba rugosa intercta, caules bini, terniue, pedales, fragiles, laues exurgunt, quorum summo spicæ similibus panicula vncialis; ex glumis variis coloris infidet: folia plura ad radicem angusta, palmaria, saturatè virentia: locis montosis circa Montbelgardum prouenit, vnde à Fratre p. m. accepimus.

Genevæ obseruati in colle *la Bassie*, circa S. Lo Hippolitum Burgundiæ, semine maturo Maii principio, transfuli Montbelgardum in hortum, tolet inter rupes prouenire loco soli expotico.

GRAMEN PANICVLA AVREA.

Tenuem surrigit dodrante maiorem culmum, per cuius fastigium conscendunt quinque aurifex auricolotes panicula splendidæ, semunciales, graciles, teretes, acerolis glumis contextæ: folia perangusta, vix culmo cedunt longitudine.

H. Lugd. p. 430. *Gramen aureum Dalechampi*. C. Bauh. phyt. *Gramen* 20. & *Gramen panicula pendula aurea*. Eid. pin. *Gramen paniculatum aruense* 2. siue panicula pendula aurea.

Habui Argentinæ à D. Vldarico Chelio medico: hoc, vt testatur H. Lugd. in siccitibus & equalidid locis prouenit.

GRAMEN LANATVM
Dalechampi.

CAP. LXXX.



TOTVM mollicellum est, comentoque obsita non tantùm folia longiuscula, sed & calami, eorumque genicula: paniculæ mediocriter diuisæ, spicam inueniuntur, sefenciale, sepe palmareum & longiorè, colore iam purpurascente, iam cinericeo, aliàs coloris ex his mixti, vix vllis donatæ pilis, molles ra-

men non minùs ac folia, glumis laxioribus, breuioribus, aristarum expertibus, plurimùm striâ vnicâ obtectiore donatis, florum apiculis luteis.

H. Lugd. p. 428. *Gramen lanatum Dalech.* sic dictum quod manibus contectantium blandatur: C. Bauh. Phyt. *Gramen* 17. siue paniculatum molle: Eid. pin. *Gramen pratense paniculatum* 1. siue molle: *Gramen paniculatum molle* Lob. Adu. parte 2.

Genevæ, Basileæ, vt & in gallia Narbonensi locis prouenit: loca. amat montium editorum & asper-

perorum, vda & rigua prata.

GRAMEN SORGHI EFFIGIE
LOBELII.

AD sesquipedalem surgit altitudinem, foliis parvis, latis. Radix fibrosa: semen & spica Sorgho similes. Nascitur in arvis.

Eobel. in Ic. p. 5. itēque hist. Belg. *Gramen Sorghi effigie*: Dodon. Lat. *Gramen pratense* 5. sine descriptione. Tabern. (apud quem in Icon. & Hist. p. 639. Icon à Lobelio proposita, est pro arbitrio immutata: nec enim vllam videtur habere cum Sorgho sua spica similitudinem) *gramen Sorghinum*: Eid. hist. c. rāmen 12. siue *Sorghgrass*.

C. Bauh. phyt. p. 8. *gramen* 27. siue Sorghi effigie: Eid. pin. *gramen sorghinum* 1. siue *gramen Sorghi panicula erectum: gramen sorghinum, cerardi*.

GRAMEN HARVNDINACEVM SORGHI
paniculā sparsā Casp. Bauhino.

CAPVT LXXXI.

GRamen hoc Sorghinum 2. in pin. 52. in prod. C. Bauhino, culmis est cauis magna ex parte reclinatis, ita vt capillaribus radicibus terrae alligantur, qui folia (quae longiora & angustiora quam in priore) veluti per tubum transeunt, & in summo paniculam ferē palmarem sparsam, parvis vtriculis donatam, sustinent. Locus natalis memoria excidit.

GRAMEN ASPERVVM.

CAP. LXXXII.



GRamen asperum culmo est bicubitale & altiore, geniculato, asperito, potissimum sub nodis & in fastigio: folia longa vagina culnum inuoluunt in acutum pungentēque mucronea definentia, à quo deorsum si digitis stringas, aspera sentiuntur: panicula itidem aspera, rigida, & crassa, albicans vel rubens, saepe minus sparsa: aliās etiam magis cum parvis paniculis ex pediculis longis asperis, antrorsum duntaxat vergit, ex latiusculis ceu muscariis composita, strobilos luteos vibrantibus.

Hist. Lugd. p. 427. *gramen spicatum* Dalecham. p. 17. C. Bauh. phyt. *gramen* 11. siue *gramen folio aspero*, nonnunquam articulato: Eid. pin. *gramen spicatum pratense* 5. siue *gramen spicatum folio aspero*: *gramen varians folio nonnunquam ar-*

ticulato, & floribus, qui Basileæ passim mense Iunio pallidè lutei: in pratis verò montium frigidorum subrebeci sunt.

GRAMEN PARVVM ECHINATVM.

CAP. LXXXIII.



Longis albican-
tib is fibris radica-
tur, culmis plu-
sulis donatum pal-
maribus, paulò
longioribus, duris,
rubentibus, crebro
interceptu distinctis,
quos folia ferè totos
obuoluunt, vix vnciam
ab iis recedentia, hirsu-
tis per margines pilis
donata, alioqui glabra:
spica vnciales & longio-
res, interdum eam longi-
tudinem minime attingunt,
denso glumarum pulchris
denticulis muricatarum
stiparu contextæ, semen
echinulimeditullio continen-
tium, pusillum, oblongum,
ruffum.

Descriptio

AC. Bauh. in prod. pro *gramine* 3. siue *canino* maritimo aspero sic describitur: radicem habet ex multis fibris oblongis, albis, capillaribus compositam, ex qua ramuli plures dodrantales, in terram primum reflexi, prodeunt, calamis rotundis rufescentibus donati, quos folia quasi in fasciculo iuncta, breuia, dura, veluti in aculeum fastigiata, in circuitu leuiter hirsuta, ferè instar minutissimè exasperata, cingunt: spica folliculo primùm inclusa, angustæ, ceu ex lappulis elegantissimis, exiguis, asperis & echinatis composita. In littore Veneto, maritimis quoque circa Anconam, & Monspelluli reperitur mense Septembri. Lobelius Aduersariorum parte altera in catalogo graminum, *gramen caninum* medicatum marinum spica echinata C. Bauhini (sed sine descriptione) vocat, quia hoc nomine in Phyt. nostro ante annos viginti quatuor breuissimè descripsimus. *Hæc ille*, qui pilos foliorum in sua icone exprimit. In phyt. vocat *gramen* 4. siue *caninum marinum spica echinata*: in pin. *gramen caninum* 10.

Gramen caninum maritimum C. Bauh.

Locus:

Icon Casp. Bauh.

GRAMEN CANINVM MARITIMVM
spicatum C. Bauhini.

CAPVT LXXXIV.

HVic *gramini canino* 2. (vt vocat in pin.) siue *gramini* 4. ex radicibus tenuibus, lignosis, leuissimè capillatis, viticelli plures repentes, rotundi, læues, pedales, cubito etiam longiores, frequenter geniculati, vnde ramuli plures, foliolis arundinaceis breuibibus & angustis cincti, prodeunt, quorum superioribus spica

Descriptio

triuncialis, ex cinereo nigricans insidet.
Locus. Ad litus maris, non longè Mouspelio Dominus Saltzmanus legit & communicauit.

GRAMEN MVRORVM RADICE REPENTE, C. Bauhini.
 CAPVT LXXXV.

Descriptio Gramini huic canino 12. C. Bauh. in pin. 50. in prod. ex radice nigricante repente & capillacea, culmi plures, pedales, incurui, tenues, geniculati, foliis paucis, breuibus & angustis cincti, prodeunt: quorum summitati panicula albicans, selquiuncialis, ex minimis glumis contexta, insidet. Hoc in muris fossarum interiorum vrbs nostræ prouenit.

GRAMEN PERPVSVILLVM
 capitulo rotundo, spinoso Cherleri.
 CAP. LXXXVI.

Descrip.



Paucis fibrillis radicitur summo cespite hærentibus, folia aliquot vncialia & breuiora, rigidula, pro plantula modulo latiuscula: Calmus vnciam vnam aut alteram altus, durus, rigidus, striatus, non sine foliis, quorum vnicuique capitulum insidet glomeratum, exalbidum, stellis denticulatis admodum rigidis pungentibusque mucatum.

Locus. Nemaufii ad molendinas in saxorum & rupeorum cauernis collegit Gener Cherlerus, nec maius vllibi reperit, quam pictura exhibet, quæ ipsammet plantulae magnitudinem representat.

GRAMEN CAPITVLO LVCIDO
 globofo Tabernæmontani.
 CAP. LXXXVII.

Descript.



Synonyma

Glomerosi Gram. radice est tenuis fibrosa, folia Graminis vulgaris similia: Culmos surgit lanæ, tenellos, spithamam longos. In quoru summitate insidet spica pellucidæ glomerosæ, strobilus albidis dense stipatæ, quos dehiscetes minutulum excipit semen, Tabern. Tabern. Ic.

& hist. p. 639. *Gramen lucidum* Geem. Föbleins graß. Eid. Hist. *gramen* 15. C. Bauh. Phyt. *gramen* 42. & *Gramen capitulo glomoso*: Eid. pin. *Gramen nem. rosum birsutum* 4. siue capitulo globofo. *Combrerum* Plinii, Ang. *Herba Luziola* vulgo, Cæl. *Gramen lucidum* Tab. *gramen palustre* cchinatum Ger. icon.

Locis prouenit incultis collibusque asperis & siccis. Tabern.

GRAMEN HIRSVTVM
 angustifolium maius C. Bauh.
 CAP. LXXXVIII.

EX radice exigua fibrosa, rufescente, culmus vnicus, cubito altior, vt plurimum leuis, exurgit, in cuius summitate panicula alba, mollis, leuiter sparsa, ex multis laminulis composita, in quarum qualibet femina minuta, subnigra & subrotunda: *foliis* est paucis, angustis, palmaribus, & villosis, aliquot culmum circingentibus: ipsi vero panicula, vtrinque folium tenuissimum subiicitur, quorum alterum paniculam superat, alterum non adæquat. Prouenit in nostris paludosis pratis Michelfeldensibus; *Gramen* hoc 47. in prod. siue *Gramen nemorosum* 5. siue angustifolium maius.

GRAMEN PHALAROIDES
 exile, supinum, humi sparsum, Danicum Lobelii.
 CAP. LXXXIX.

Videas [itequit Lobelius in Adu. par. 2.] prope Cronemburgum arcem Regiam munitissimam Schandia Danorum, è regione equilis horti Regii, fibriloso solo, ad latus maritimum *Gramen* pusillum humile, humi que sparsum, innumeris duarum triumve vnciarum culmis, rotulis spicatis effuse fastigiatis, exilibusque apiculis præditis. Foliolis vncialis longitudinis & latiusculis, crassioribusque culmis pro plantulae magnitudine. Radix fulca, cirrofa. Tora albicat herba fænisicia.

GRAMEN CRISTATVM.
 CAP. LXXXX.



Graminis D genus istud selquicubitalibus asurgit calamis perquam tenuibus, geniculatis, non sine *foliis*, quæ vaginæ instar factis longo intervallo, culmum complexa, palmum longa, ab eo recedunt, angusta. *spica* quadrantalit aut paulo longior, duobus vertibus in vnam par-

nam partem vergentibus, glumarum pallidarum, cristatarum, fimbriticarumve, flocculorum fuscorum, luteorumve, tremulas fibrillas explicat, dorso spicæ glumis viduo: Radices tenues & cirtate.

C. Bath. phyt. *Gramen 12.* siue cristatum: Eid. pin. *Gramen cristatum & spicatum pratense* siue *gramen spicatum cristata læue*. *gramen* varians florum colore, communiter ex pallido flavescente, aliquando puniceo. Hoc ante in prod. fecit *gramen 18.* & sic descripsit: Radicum capillamentis plurimis oblongis albicantibus abundat, quæ in vnum veluti caespitem coeuntia deorsum repunt: culmis est pluribus sesquicubitalibus, geniculis paucis donatis: foliis breuib; congestis, & circa caulem paucis, vncias quatuor vel quinque longis: spicam habet tenuem oblongam, pallidè virentem, quæ Galli cristas plurimas, vel semen capitis gallinæ dictæ plantæ refert, cuius nomine cristatum in phyt. appellare placuit: quod nomen & D. Lobelius in Adu. parte altera probavit, *gramen cristatum* C. Bauhini nominans: prouenit in prato infra patibulum, aliquando ad mœnia Basilienfis. Idem, sed spica elegantiore & densiore, in monte VVasserfall & Montepelluli obseruauimus: simile ei ex Anglia D. Lobelius multis annis post misit.

De gramine cristato C. Bauhini hæc Lobel. in Aduers. par. 2. scribit: A cristatis palmaribus, dum curuantur, spicis, cristam callinacæ æmulantibus, hoc cristatum *gramen* scitè à clariss. C. Bauhino vocatur, Alopecuroideis graminibus in stirpium Illustrationibus nostris annectere libuit: quo nihil frequentius variis editis pratis Londinensis agri, iuxta Hackneum (alibique multis in locis transmarinis) vbi à rusticis, vti nonnulla gramina, floreis, pergulis, transfennis, topiariis, coronariisque operibus arte manûque factis, elegantissimè inuicem annexis, concinnandis, æstiuo tempore aulis & caminis ornandis aptum. Vernaculè etiam *Beur* vocatur.



GRAMEN SPICAM FOLIO AMPLECTENS.

CAPVT XCIII.

Fibris capillaribus numerosis radicanr, calamis palmaribus & breuioribus, geniculatis, foliis teneris, glabris, quorum quod è summo oritur geniculo in vtram degenerat, sinu suo comprehendentem spicam semenciam glumis masculculis aristatis dense congestam, quod superest eius in mucronem foliaceum graminum facessit.

Descriptio

H. Lugd. p. 425. *gramen pratense* Dalech. Casp. Bauh. phyt. *gramen 10.* siue *gramen pratense*, cuius spicam folium instar vesicæ amplectitur. Eid. pin. *gramen cristatum & spicatum pratense 4.* siue *gramen pratense* spica purpurea ex vtriculo prodeunte, vel *gramen folio spicam amplexante*.

GRAMEN SPICA CRISTATA SVBHIRSUTUM Casp. Bauhini.

CAP. XCI.

Gramen suum cristatum 2. siue spica cristata subhirsutum, vt in pin. vocat, in prod. 19. fecit & sic delineauit: à priori differt, radicem capillamentis rufescentibus, culmis tenuioribus, parte inferiore leui lanugine aspersis & humilioribus: foliis longioribus: spica candicante, minus compacta, nec ita eleganter cristam exprimente: quod in dumetis circa Cliben copiosè prouenit.

GRAMEN GENICVLATVM, TABERN.

CAPVT XCII.

Radix ex pluribus fibris composita multos protrudit nodosos, seu articulatos, culmos, in alios subinde diuisos: folia longa, angusta, acuminata, ueruo per medium eleuato: spicam longam, tenuem, villosam, glumis albis constantem, in quibus semen paruum.

Dicitur Auctori Icon. & H. *gramen 3. genicula-*

GRAMEN TREMVLVM.

CAPVT XCIV.



Non aded altè fibras suas demittit *gramen* hoc tremulum, culmum erigens tenuem, geniculatum, inancem ad sesquicubitum interdum, humiliorrem sepe. Folia magna sui patte culmum ceu vagina complectuntur, reliquam surrigunt breuiorem rigidam: à summo culmo multi tenuissimæque rubètes peccoli glumas sustinent rubescentes, è squammulis pulchro ordine digests compactiles, leuissimè attractu tremulos, minores quàm Tremuli maioris, forma conoide.

Descriptio

In nostra tabella, triplex proponimus Graminis tremuli genus. Nempe Gramen tremulum, minus, & maximum tremulum. Tremulum vero, & de qua nunc egimus, in medio tabella pingitur.

Synonyma C. Bauh. Phyt. *Gramen tremulum minus*: Eid. pin. *Gramen tremulum* 2. varians panicula colore viridi, & spadiceo. Lolium 10. & Aegilops Plinii, Trag. *Aegilops*, Gesn. horr. Lon. *Graminis* 1. genus, Dalech. in Diosc. Ama. *Phalaris pratensis minor*, Adu. Lobel. icon. p. 44. *Amourettes tremblantes*, Clus. hist. *Phalaris pratensis* Ger. *Gramen polyanthos*, Lugd. p. 428. *Gramen leporinum & tremulum*: itemque, *Linum D. Mariae*, Tabern. *Gramen loliaceum* 10. *Tragis*, Thal.

Clus. Hist. post. de hoc ait: Graminis, seu viridis Poae, genus in omnibus quas vnquam iustrui regionibus, prata, vt ceterae herbae multis locis vestiens, cui similes paniculae ferè, breuiores ramem, & ab exornu latiores è summis culmis dependent. Id Galli & Arthesii seu Atrebatum mei populares *Amourettes* etiam appellat ob panicularum elegantiam, sed vocem *tremblantes* adiciunt, ad alterius differentiam: quia, vel vnico, vel pluribus eius scapis manu recentis, omnes eius paniculae perpetuò tremulae sunt. Germani *Syden* / *hasenörling* / *hasenbrot* / & quibusdam *Jungfrauen haar*: Belgae *Elyenbrende* / & *Beuernelle*, vocant.

Locus.

Genus passim in pratis mense Maio, nec non Basileae, ceu & Montbelgardi quoque reperitur.

GRAMEN TREMVLM MINVS.

CAP. LXXXV.

Descriptio EX radice rufescente & quaquaerfum repente culmos surgit pedales, plüs minüs graciles, vix vno vel altero distinctos articulis, iubas sustinentes paruas è folio vaginaceo, superna parte acuto, & iubam ipsam saepe superante, media parte sui prominentes; quae ex squammulis delicatulis, rotundis, pallidis, aut subflauescentibus & splendentibus, ex breuibus pedicellis pendulis, tremulis, sed in vnum tantum latus plurimum nutantibus, constant. Quibus notis singulis à maiori dicto tremulo facile distinguas licet. Folia ceterum inferna graminica, pallide virentia, angusta, acuminata. Huius iconem in praecedenti tabella primo loco expressam damus.

Synonyma C. Bauh. Phyt. *Gramen* 39. siue tremulum minus, vulgò *Hasenbrot*. An Graminis Loliacei species parua apud Thalium in sua Harcynia: Eid. pin. *Gramen tremulum* 4. siue minus panicula parua.

Locus. In pratis montosis Basiliensibus provenit.

GRAMEN TREMVLM

minus panicula magna. C. Bauh.

CAP. LXXXVI.

Synon. Gramen tremulum 5. siue minus panicula magna aliquando in cacumine tres aut quatuor ramulos exiles fundit, semenque triangulum habet. Idem autem facit cum Phalaride parua Caesalpini, & Gramine *Amourettes* altero Clusii cur. post.

GRAMEN TREMVLM MAXIMUM.

CAP. LXXXVII.

Descriptio CVlmo est cubitali, gracili, inferius rubeate, paucis geniculis donato, foliis amictio raris,

breuibus, glabris 4. vel 5. vnciarum, stipulae summae in pili instar tenues tremulosque finditur peciolos, quorum vnusquisque spiculam gerit semunciale, paulò minus latam, compressam, ex flavo rubentem, squammarum maiuscularum, nitidarum & splendentium, denique similia capitula habet cum Gramine tremulo, (sex spiculae supputauit) mutuo incubitu imbricatam; pro radicibus fibras est fortitus. Gramen tremulum maximum exhibuimus, cum duobus prioribus, cui appictum capitulum maximum.

C. Bauh. Phyt. *Gramen* 38. siue tremulum maximum: Eid. pin. *Gramen tremulum* 1. siue maximum: an Phalaris altera, Caes. Gramen *Amourettes* maiori panicula candidante, Clus. cur. post. Colore panicularum variat, est rufescentis, est albi coloris.

A multis annis habeo à Valtrando: Cherlerus Loci gener etiam secus Romam passim ferè obseruasse se testatur, maximè vero in via quae Romam Viterbum pergitur, vnde etiam attulit Frater Casp. qui aliquando misit, scribit se in monte *Rua* apud Monachos non longè Patauio collegisse, & in montibus Euganeis provenire.

GRAMEN AMORIS DICTVM.

CAP. LXXXVIII.

Fibrae numerosae, satis crassae in caput unum coeunt, è quo surgunt pedales culmi, graciles, laeibus vestiti *soluti*, per calamorum fastigia tremulis filis pendent paniculae longae pulcherrimae, albicaetes, vel ex atro purpureae, vnciales circiter, culmi latitudine, compressae, gemine vtriusque squamularum contextae, arista omni piloque carentes: radices capillares.

Dodon. Lat. *Gramen pratense sextum*. Tabern. Syn. icon. & hist. p. 638. *Gramen paniculatum satiuum Heragrosii*, *Liebgras*: Eid. pag. 642. *Gramen* 11. Clus. hisp. & Hist. Gramen *amourettes* ob panicularum elegantiam, ruficis gallicis appellatum, graminis genus elegantissimum. Lob. Obs. p. n. ic. pl. 7. *Gramen paniculosum phalaroides*. Gerar. *Gramen paniculatum*. H. Lugd. *Gramen siccum*, seu polyanthos secundum. C. Bauh. Phyt. *Gramen* 36. Eid. pin. *Gramen tremulum* 5. siue paniculis elegantissimis, siue *gras*, maius. Patauij erant qui Canariam Plinii volebant.


Montspelij vidi totum album. Patauij attulit Frater sicum nonnihil rubens nomine *Zea* filij. Cortusi. Inuenitur nonnullis Hispaniae locis aridis & sabulosis, meminit etiam Clusius obseruare & colligere Parisiensi agro, non procul à traiecta Sequana, qui ferè ex aduerso monasterij vulgò dicti, *Les bons hommes*, secundum semitas frequentissimum. Narbonensi agro nonnunquam occurrit In Gallobello, etiam frequens iuxta Auxiacum castrum, & vicinis locis passim, inquit Lobelius. Quamuis autem etiam in quibusdam Germaniae locis proveniat, vt in Alsatia superior, nihilominus tamen propter pulchritudinem plantarum in hortis etiam relinquatur.

GRAMEN PVLCHRVM PARVVM, PANICVLA LATA COMPRESSA.

CAP. XCIX.

Pvilcelli huius graminis radices capillares sunt, colore ruffae, palmum longae, folia parua, vna

ciam vnam, duas, tréve longa, tenuia, culmi triquetri, enodes, frequentes, palmares, & sefquipalmates, quorum extremis seffiles, sineque pediculis, vt plurimum (licet etiam interdum è medio productus pediculus brevis plures alias sustineat paniculas) impositæ panicula, umbellam quodammodo metientes, speciosæ, graminis *A-mourettes* dicti, non ita dissimiles, compressæ, sefficiam circiter longæ, culmum latæ, binis versibus squammatis compactæ, colore ex viridi rufescente, nido, *semen* minutum nigrum, paniculis subiecta sunt terna folia graminea, quorum vnum



reliquis multò breuius semper conspicitur.

Tragus gerin. lib. 2. cap. 37. hoc gramen sine descriptione pingit sub nomine *flein Riedgras*, Calamagrostis, idque secundo loco: capite verò 43. meminit eius inter Iunceos tertio loco, & vocat *flein Vintzen*, hoc est, Iuncum exiguum, ac Graminis genus facit. Lat. comuodè pingit p. 679. sub titulo Calamagrostis atterius speciei. Huius in contextu mentionem non facit: pagina verò 676. vocat Iuncum exiguum pratensis, de quo ait: Tertium quoddam Iunci admodum exigui genus in quibusdam humectis pratis inuenitur dodrantalis altitudinis, calamis ex vna stirpe supra viginti erumpentibus, lato, frequenti, & stipato in fastigiis semine dependente. De hoc genere cum ad Graminis genera pertinere videatur, plura supra cap. 33. *Hec ille*, Nos eo capite nil inuenimus quod conueniat præter iconem.

C. Bauh. phyt. *gramen* 61. siue cyperoides minimum panicula substatia: Calamagrostis 3. quoad iconem Tragi pag. 679. Iuncus exiguus pratensis eiusdem p. 696. Eid. pin. *gramen cyperoides* 11. siue minus paniculâ sparsâ substatiente. Iuncus exiguus pratensis Trago. Calamagrostis 3. Tragi. con. H. Lugd. p. 1006. Carex minor Lon. *gramen maximum spicatum minus*, Carth. *gramen cyperoides minimum paniculâ substatia Casp. Bauhinus*, Lobelio Aduers. parte 2.

Abundat locis humidis circa Montbelgardum, vigens spicis Iulio & Augusto. Ad Brytan Basilensium in palustribus & in Michelfeld.

GRAMEN PARVVM PVLCHRVM ALIUD PANICULA COMPRESSA NIGRICANTE.

CAP. C.

Gramini paruo pulchro à Trago depicto, similem habeo aliam plantam, diuersam tamen: quippe maior paulò videtur, dodrantem interdum excedens, tota habitior, folia latiora longiora: culmi trianguli, crassiores, similiter et Tom. II.

nodes: paniculae haud secus distichæ, squammatæ, vt numero ferè superiores, ita magnitudine inferiores, colore nigricante, folia paniculis subiecta eundem habent positum, eandemque inter se proportionem; sed maiora quam alterius.



C. Bauh. phyt. *gramen* 62. siue cyperoides minimum panicula nigricante: Eid. pin. *gramen cyperoides* 12. siue minus paniculâ sparsâ nigricante. *gramen cyperoides minimum nigricante panicula*, Lobel. ad. parte 2.

hisdem locis cum præcedenti prouenit.

GRAMEN CVM CAUDA MVRIS MINVS.

CAP. CI.



Longa huic *radix*, obliqua, crassiuscula, ex qua fibrae tenues sursum in aliquot capita diuiduntur, ex quibus folia multa vnciarum quatuor vel quinque, graminis pratensis similia: culmi aliquot palmares vel pedales, spica vnciarum trium vel quatuor, quales gramini cum cauda Muri maioris, sed tenuiores, eodem modo quali squammatae, an hoc à maiore variet tantum propter solum, asserere non ausim.

Tabern. icon. pag. 217. hist. p. 655. *gramen Typhinum* 1. C. Bauh. pin. *gramen typhoides* 3. siue asperum primum: *gramen typhoides asperum maius*, fortè Thalij. *gramen Typhinum* 1. Tab. *gramen typhinum maius*, Ger.

Vnde habuerimus non occurrit, frater quidem C. Bauhinus dedit Basileæ pro gramine typhino 1. Tabern. qui prouenire locis siccis & graminosi campis scripsit.

GRAMEN CVM CAUDA MVRIS FOLIIS HIRFUTIS.

CAP. CII.

Culmi aliquot cubitum excedentes, internodiis circa imum nonnihil rubefcentes, densis, Rr

rarioribus, & ferè nullis superiùs, foliorum vaginà multùm inuolutis, quæ vbi à culmis recellerunt breuia satis sunt, & angusta, hirsuta. *spica* trium vaciarum, nitida, densissimis tenuibus glutinis compacta, luteola ferè, singulae glutinæ planæ, angustæ, in acumen vnicum desinunt, tota autem *spica* nonnihil diuisa conspicitur. *radix* capillaris, alba, tenuis, ex capite crassiusculo, an repat non obseruauimus Montpelij.

Lob. Ic. Plant. p. 9. & hist. Belg. p. 11. Gramen alopecuroides minus, (quod vt in descriptione eius refert) eiusdem ferè altitudinis est cum gramine alopecuroides ipsius, sed culmis & spicâ tenerioribus, radice item & foliis inferioribus multò minoribus.

Tabern. ic. & hist. pag. 641. Gramen alopecurinum 3. *Süchschwanz gras*. Eid. p. 641. Gramen 21. Illud hic monendum pictorem Tabernamontani gramen hoc trifolium facere, ex malè scilicet consideratâ Lobelij figura. Descriptio etiam eius parum valet.

C. Bauh. phyt. Gramen 50. siue typhoides repens alterum: Eid. pin. Gram. typhoides 6. siue culmo reclinato: gramen alopecurinum maius, Gerardi.

Gramen alopecuroides minus Lob.

Gr. alopecurinum 3. Tab. Tabern. notatur.


Gr. typhoides repens alterum C. Bauh.

GRAMEN CVM PARVA

cauda muris, radice non nodosa, repens.

CAP. CIII.

Desc.



Gramen ex cuius radice fibrosa, & veluti bulbulis nodosa, aliquot emergunt culmi cubitales aut sesquicubitales, tenues, laeues, & ab internodiis reflexi, quos ab imo statim plucula comitantur folia, glabra, breuia, angusta. Ex singulo ceterum internodio singulum prominet foliolum: summitati spica incumbit parua, hispida, Lobelij Typhini Graminis figura, bicornibus squammulis densissimè facta.

Huic circa Bessfordiam reperto, simile, si non idem, obseruauimus in Ducatu Wirtembergico: in quo an reperiatur radix bulbulis nodosa, & squammula bicornis, non animaduerti: in ceteris discrimen adhuc agnoscere non potui: utrumque repit.

An Sarcicis, aut si quilibet

Synonyma

Lob. Ic. Plant. p. 11. Gramen aquaticum spicatum. Tabern. ic. & hist. p. 654. Gramen fluuiatile album reitè sicut gras. Eid. hist. Gramen 23. C. Bauh. phyt. Gramen 24. siue aquaticum spicatum: Item, Gramen 98. siue, nodosum alterum spica parua à fratre Io. Bauhino communicatum. Eid. pin. Gramen spicatum aquaticum 2. siue geniculatum spicatum: Gramen fluuiatile spicatum Gerardi. Item, Gramen nodosum 3. siue spica parua: 6. in prod. de quo ait,

radice est, parua, nodosa, albicante; fibris pauca & breuibus donata, cui, ceu alter nodulus oblongus insidet, qui in calamus cubito altiore, laetum, internodiis aliquot distinctū abibit, folio ad quemlibet nodum vno, angusto, vncias quatuor vel sex longo: in summitate spica vnica, vix vncialis, mollis, typhini graminis forma. In dumetis vdis circa Bessfordiam (vrbe, diei itinere Basilea distans) prouenit, vbi D. Ioannes Bauhinus frater meus collegit & transmisit.

Quod nodosum est, in dumetis propè Bessfordiam, nou longe à pago Daniutin nobis repertum Augusto cum suis spicis. At quod sine bulbis, in Ducatu Wirtembergico propè fontem Admirabilem Bollenfem obseruauimus ad ripam riuuli præterlabentis.

GRAMEN CVM CAUDA MVRIS

maioris longa, Maius.

CAP. CIV.



Gramen Typhinum 2. Tabern.



par. I. sch. dodde gras. Nimiùm breuis Lobelij descriptio est, vt ex qua certi quid colligi non possit: figuram si cõsideres, non malè exprimit

Radices tenues, culmi habet principium bulbillo oblongo simile, cubitales, altioremque interdum, stas aspera, vagina longiore, stipulam circumplexa: summum cacumen palmarem, sæpè etiam longiorem, spicam sustinet, teretem, caudæ magni Muris simile, mollem si sursum versus manu demulceas, asperam si contrâ, coloris cinerici, innumeris squammulis in binas breues aristas desinens, solenas aut lateritias cannulas imitatis, constantem.

Lob. Icon. Plant. & Obs. p. 10. Gramen Typhini gaudet fabuletis & maritimis natalibus. Radix pusilla, capillacea, caulis dandrantalibus & pedalis. In Belg. p. 11. I. sch. dodde gras. Nimiùm breuis Lobelij descriptio est, vt ex qua certi quid colligi non possit: figuram si cõsideres, non malè exprimit

Gr-

men de quo hic agimus, appingit enim bulbosa caulium principia: sola inagnitudo dubium parit; verum ea sola non fufficit ad differentiam constituendam.

Hist. Lugd. p. 433. *gramen typhinum*. Tabern. Hist. & Icon. *gramen Typhinum* 2. *Lieschgras*. Nescio aa Tabern. hoc gramen differat à Lobeliano, multa alioqui habet communia, & potissimum culmorum principia bulbosa & alia pleraque.

C. Bauh. phyt. *gramen* 44. siue typhoides maximum spica longissima, gramen multum conueniens cum *gramine viciae* maiore & molli apud Thaliu in Hircynia. Item *gramen* 46. siue Typhoides asperum latifolium. Lobelio typhinum. Et *gramen* 47. siue typhoides asperum angustifolium Tabern. Typhoides 2.

Nos donec intellexerimus differentiam à Fratre manifestam inter tria dicta gramina ea ab inuicem non separabimus. In pin. non amplius tria, sed duo duntaxat statuit genera. *Gramen typhoides* 1. siue maximum spica longissima: 25. in prod. Et *gramen typhoides* 4. siue asperum alterum. *gramen typhinum*, Lob. Lugd. *gramen pratense* 7. Dodon. *gramen typhinum* 2. Tabern. *gramen typhinum minus*, cet. Porro Typhoides maximum in prod. sic describitur: ex radice parua, nodosa, cui fibrae exiguae & plurimae adnatae, culmus exurgit rectus, sesquicubitalis, internodiis rationibus distinctus, qui in spicam rectam, teretem, palmarem, virefcentem, in maturitate albicantem, tactu mollem, definit, vtriculari aristas oblongiusculas & copiosas exhibentibus. Inter fruteta circa Geppingam Ducatus VVirttembergici primùm, dein non longè Basilea. in sepiibus agrotum inter Michelfelden & Huningen, & in salicetis Michelfeldæ legimus.

Incrementum maximè adipiscitur *gramen typhinum* 2. Tabern. in solo humido, arenoso, & graminofo, in silua dicta *Ostwald* iuxta viam, sed præcipuè in pago *Erlendach*, & aliis eiusdem naturæ locis.

GRAMEN CVM CAUDA MVRIS purpurascens.

CAP. CV.

EX denso foliorum gramineorum glabrorum Lagmine aliquot emergunt culmi, quorum alij pedales, alij cubitales, aut sesquicubitales, interdum purpurei, foliis infernis latioribus vestiti, paucis atque exiguis articulis distincti: in summo spicam gerunt purpurascens, palmarem aut breuiorem, teretem, caudæ muris forma, sed confuso glumarum steriliu ordine refertam, ex quibus breues & tenellæ profiliunt aristæ. Flosculi eius apices sunt linteo-



Tom. II.

li pallidi ex tenuissimis filamentis penduli. Radix mera sunt fibrae.

Lobel. Ic. plant. pag. 9. *gramen alopecuroides minus alterum*. Eid. Hist. Belg. p. no. *Anders vossensstereen gras*, in campestribus & iuxta semitas, culmis bicubitalibus paucis foliis donatis. Tabern. Hist. & Ic. *fuchs wanz gras*. *gramen alopecurinum* 2. C. Bauh. phyt. *gramen* 49. *gramen typhoides repens*, *gramen alopecuroides minus alterum*, Lob. At nostrum contra, quod exhibemus *Gramen non est obseruatum repere, sicut nec etiam Lobelius, at Tabernam. repens pingit. Eid. pin. gramen typhoides* 5. siue spica angustiore, *gramen alopecurinum minus* Ger. Variat spica longiore & breuiore.

C. Bauh. nos.

Circa Montbelgardum loco secco florens *Locus & collectum* Junio: olim Geneuæ mense Aprili vbi tempus abundans obseruati ad vineas Nofodochij.

GRAMINI CAUDA MVRIS PURPURASCENTI aliquatenus simile.

CAP. CVI.

OBliquè radicem agit crassam satis, tenuibus fibris donatam, veteri præteritorum foliorum cespite amictam, ex qua è terra statim pluscula prodeunt folia graminea, vix triuncialia, rarispilis ad latera obtusa, striata, Culmi surriguntur aliquot pedales, cubitales, aut etiam altiores, teretes, rigidiusculi, paucis internodiis versus ima potissimum donati: quorum singulos ex longo interuallo seiuicta amictunt foliola sesquuncialia, aut ad summum duas viciis longa, infernis alioqui similia. Summitati inherent spicae, quæ primulum prorumpentes caudæ muris purpurascens spicam aliquatenus emulantur, tum figura, tum colore, præterquam quod aristis nullis sit septa. Mox diuisa & aperta elegantem glumarum purpurearum aut xerampelinarum & pulchre splendentium thyrsu exhibet. Ex quibus flosculi vel potius apiculi vtrinque bifidi (dum nimirum floret) dependent, pulchelli, obscure purpurascens, tremuli. Glumæ cæterum cassæ, inutiles. Sapor graminis vulgaris.

Descriptio

Locus

Siccò gaudet cespice, arenosis item, squalidis & saxosis viarum marginibus, aruorinque oris incultis, Montbelgardi ad collis proximi quæ meridiem spectat, nobis primùm obseruata, florens Junio.

GRAMEN CVM CAUDA LEPORIS aspera, siue spica murina.

CAP. CVII.

PLufculos surrigit calamos graciles, rigidulos, pedales aut sesquipedales, in quorum summitate spicae sunt breues, magnitudine & figurâ caudæ vulpinæ haud dissimiles, sed crispis alperis, vtrinque quoque muricatis, cum aristis longiusculis & leniter recuruis, & quæ ex breui reflexu in summitate culmi nutant: In quarum sinu glumæ latent paræ inutiles. Folia medio-cris longitudinis rigidiuscula, glabra. Radix densa satis, numerosam hirsutarum fibrarum prolem demittit.

Descriptio

C. Bauh. phyt. *gramen* 51. & *gramen alopecuroides* Synon.

Rt 2



Locus.

des aspera spica. Eid. pin. *gramē alopecuroides* 6. siue spica aspera. H. Lugd. p. 432. *gramen chinatum Dalehampti*. An Tabern. p. 678. *Alopecurus alter spica breuioribus* [quàm in Alopecuro molli breuique spica] nec ita villosis. Gener Chertelus attulit ex Gallia Narbonensi, vbi non adeò infreqües animaduertit.

GRAMEN ALOPECUROIDI accedens, & Phalaridis, spica longiuscula, folio lanuginoso.

CAP. CVIII.

Descriptio **D**ras & frequentes satis ad infimo culmo pendentes habet fibras, easque candicantes: Culmus autem cubitalis, crassiusculus, propter terram rubescens; foliis pro geniculorum numero obsepus, palmo longioribus, Hordeaceorum latitudine, totis molli canaque lanugine rectis: spica singularis, vncialis, aut etiam sextantalibus, argenteo nitore micans, turbinata, glumis acetosis gracilibus mollibus, numerosis, denso stipatu coactuatibus constans.

Synon. Lob. ic. Plant. p. 8. & Hist. belg. p. 10. *Dioscorides* *gramen graß* / *gramen Alopecuroides*, sic dictum (sic i. ibid.) quod spica sit oblonga, forma itidem caudæ vulpine. Calamo est bicubitali, articulis & foliis paucis. Radicula ex miris fibris constat. Tab. Hist. p. 640. & icon. *gramen Alopecurimum*. *fuchsianus gras*. Eid. Hist. p. 643. *gramen* 20. C. Bauh. Phyt. *Gramen* 45. siue *typhoides* molle. Eid. pin. *Gramen typhoides* 2. siue molle: *gramen alopecuroides minus*, Gerardi. Frater Casp. attulit mihi hoc *gramen* Montpelii collectum. Lobelio vero suum provenit in campestribus, & iuxta semitas.

Locus.

ALOPECVROS ALTERA maxima Anglica paludosa, siue Gramen Alopecuroides maximum.

Descriptio **G**ramineo generi cognatam hanc paludosa in Aduers. parte altera. Est autem in riguis herbis Comitatus Zont-hampronie proximè salinas & antiquas ædes Drayton vocatas, eis mate, duobus miliaribus Anglicis à Portmouthe ex aduerso vestis Insulæ plurima. Culmus cubitalis, sesquicubitalis, bipedalis & quâdoque procerior geniculatus, & folia illi Graminis aut Tritici; sed quinque vncialis sæpè speciosissima, habitior, sericea, spicata, caudataque panicula; Mōspeliensium Pseudo-Schœnanthi. Hanc quoque vdis fossis lacustribus Essexiensis comitatus, le-

Graminea paludosa maritima Alopecurus

Locus.

Descriptio.

git authot. iuxta Thamefis amoenissima fluentia, sed paulo minorem.

GRAMEN ALOPECVROS spica longa tomentosa candicante.



lis, radice fibrosa infirma.

Lobel. in Adu. Obs. p. 43. Icon. p. 83. *Marinus* *gramineus* *Iuncus foliis Schœnanthi*: in Hist. Belg. p. 16. huic titulo præponuntur hæ voces, *Welsch Schœnanthum* / hoc est Pseudo Schœnanthum. H. Lugd. *Gramen tomentosum*: *ἀλωπεκρος* Plinii & Theophrasti. Tabern. ic. & hist. *Gramen sparteam secundum*, daß ander sffrincen gras. Caspar. Bauhin. Phyt. *Gramen* 119. siue *Alopecuros spica longiore*. Item *Gramen* 116. siue *sparteam sextum*. Eid. pin. *Gramen alopecuroides* 3. siue *Alopecuros maior spica longior*: *Iuncus marinus gramineus foliis schœnanthi*, Adu. Lobel. icon. Lugdun. *Schœnanthum adulterinum*, Tab. Ger. Item: *Gramen tomentosum* 1. siue spicatum: *Gramen tomentosum*, *Alopecuros vera* Theophr. & Plinii, Lugd. *Gramen sparteam* 2. & *Schœnanthum*, Tab. Iun. *us marinus gramineus*, Ger. tit.

GRAMEN ALOPECVROS. Spica breuis. CAP. CIX.



HERBA mollissima aut breuis spica, vt potest dâum plus minus vnciarum sed cœcinnior propius ad vulpinam caudam accedens; coloris albi & rati, glumis tomentosis vbi apparentibus propter comestit densitatem; articulis longiusculis molliculis, circumscripta radiatis; Culmis genicul

cularus, cubitalis, sesquicubitalis, foliis amictus gramineis, paruis, mollissimis pilis albis hirsutis: radix parua, alba, capillaris.

Plinius lib. 21. cap. 17. Alopecuro spicam tribuit mollem, & lanuginem densam, non dissimilem vulpium caudis: vnde ei nomen fecit. Ast videtur Stetophuri loco Alopecurum accepisse, vti descriptio liquidò docet, inquit Lobelius, qui in Adu. pag. 17. hanc plantam describit & pingit, vti etiam in hist. Belg. p. 56. & Ic. plant. p. 44. pro cauda vulpis Monspelienisum, Alopecuro Theophrasti.

C. Bauh. phyt. Gramen 120. siue Alopecuros spica breuiore: Eid. pin. *gramen alopecuroides 2.* siue spica longiore: Alopecuros summà spicâ, Tur. *Cauda vulpina Monspel.* Adu. Lob. Icon. *alopecurus maior*, Tabern. Variat magnitudine & spicarum longitudine, quæ in altera longior, in altera breuior & rotundior.

Circa Monspelium prouenientem obseruauit ad mare mense Maio. In Anglia Alopecuron prouenire negat Turnerus, allersens se in Germania solum & Italia vidisse. Notissimam ait Lobel. frequentemque maritimis ad Magalonam, & Monspelio propinquioribus.

Iyefende Cruyde von Spaensch faede, oft Canarien faede, quod sic describit Phalaroides quoque appellauimus gramen hoc, licet spica eius Phalaridi (Hispanico aliàs femini dicto) non



per omnia respondet. Radice quoque est fibrosa, culmo cubitali vel sesquicubitali duobus tribusve foliis donato. Tabern. icon. p. 210. hist. pag. 642. figuram graminis phalaroidis *des wilden Canarien grass* sine descriptione ponit. C. Bauh. phyt. *gramen 43*: siue *phalaroides*: Eid. pin. *gramen phalaroides 1.* siue *maius*, siue *italicum*: *gramen a-*

lopecuroides maius Gerardi.

Pulchrum Gramen habuimus Argentinæ ex plantis Domini Agerij cum hac inscriptione, *gramen Onocord. n.* Lob. Teur. ed. p. 10. ait tam in campestribus, quam iuxta semitas reperiri, suum gramen phalaroides.

Locus:

GRAMEN ALOPECVROS ALTERA LOBELII.

CAPVT CX.

Aliud genus quoddam est caudæ vulpine Theophrasti, spicis tamen minoribus ac breuioribus, nec ita lanuginosis vt Monspelienis: Culmos quoque multo surrigit altiores, bicubitales: Folia graminea, radix nbrofa, Lobel.

Lobel. hist. Belg. p. 58. & Plant. Icon. p. 45. *Alopecuros altera.* C. Bauh. pin. *Gramen alopecuroides 1.* siue spica rotundior: *λωπεκουρος* Theoph. Ang. *Cauda vulpis Monspelienisum speciosior*, Alopecuros Dod. Lugd. Taber. Cain. Ger. *Alopecurus altera*, Lob. icon. *Cauda vulpina*, Cæf. Variat: Creticum enim spicâ est maiore & ad tactum delicatior.

Græcè à Theophrasto dicitur *λωπεκουρος*, auctore Dodoneo. Lat. cauda vulpine: Germ. *fuchschranz*: Belg. *Dossen steer*: Gall. *Queue de renard*.

Sesquimiliari Brugis distantibus campestribus iuxta *Werrich* copiosè prouenire ait Lobelius. Dodonæi Alopecuros nascitur in aruis vnâ cum frugibus ætate, reperitur in pluribus Galliæ, præteritum Narbonensis agtis.

GRAMEN PHALAROIDES MINVS SIVE Hispanicum C. Bauhuui.

CAP. CXII.

Foliis est oblongis, angustis, viridibus, quorum vnum vel alterum, culmos cubitales, tenues, tubi instar cingit: in culmorum summo spica Phalaridi similis, sed angustior, uncias tres longa, insidet, nec radicem, nec semen vidi: & nomine Phalaridi alterius Hispaniæ, D. Gillenius transmissit, idcòque gramen phalaroides 2. siue minus, seu Hispanicum denominauit, iquit Auctor in pin.

Synonyma

GRAMEN PHALAROIDES SPICA MOLLI, siue Germanicum, C. Bauhini.

CAP. CXIII.

Gramen phalaroides 3. siue spica molli, seu Germanicum C. Bauhini in pin. pro gramine 27. sic in prod. describitur: culmo est cubitali, prioris craltiore, vno alteròve geniculo distincto: folio vno vel altero, eòque breui, culmum ambiente, cuius summo, spica biuncialis, prioris angustior, cinericei coloris, splendens & mollis insidet. Hoc Vlmenses, apud quos prouenit, à colore, Onocordon appellare iatlexi.

Locus: *Onocordon*.

GRAMEN ALOPECVRO SIMILE GLABRUM cum pilis longiusculis in spica Onocordon mihi denominatum.

CAP. CXI.

Calamus cubito altior, inermis longis distinctus, quem inoffensè fuscè dequè contractes licet, quemadmodum & *solia*, quæ tamen non apparent cana lanugine obiecta: *spica* summo culmo sedit, Phalaridi æqualis, textura dissimili, breuibus & mollicellis pilosis glumis compactis, ac aristis mollibus longiusculis, coloris cinericei.

Lobel. Ic. plant. pag. 8. & hist. Belg. pag. 10. *gramen Phalaroides alterum*, *das ander Gras ghez* Tom. II.

GRAMEN PHALARIDI SIMILE QVOD etiam aliquid commune habet cum Alopecuro.

CAP. CXIV.

Phalaridis haud ad eò absumile est quod culmum quoque surrigit satis longum, glabrum

R 1 3

brum. Ex cuius articulo folia culmum ferè tota ambientia prodeunt: mox carinata reddita velut è sinu promunt spicam squarrosam, vnciam vnam longam, duas longam, densiore squammarum stipatu, quam in Phalaride, multò tamen molliore, quæ in acutiorem aristam desinunt. Quæ argenteo nitore fulgens, purpurâ dilutâ quoque decorata est. potissimum in supræma parte: Hæc autem desumptimus ex planta sicca non integra, quam Gener Cherlerus ex Gallia Narbonensi attulit.

Locus.

GRAMEN PLUMOSVM LOB. SPICA
candida & serici modo lucens.
CAP. CXV.

Descript.

GRAMEN plumosum foliis est duris, rigidis, & aridis, ad Schoenanthi folia non parum accedentibus, culmi similiter rigidi, sesqui cubitum, aut cubitos duos, alti, spicæ longæ densæ, ex purpureo rubentes, paleaceæ, per maturitatem candidæ, & serici inftar micantes, Lobel.

Lobel. Hist. Belg. p. 8. *Plumy-Kinggras*. Eid.

Synonyma



in Ic. Plant. p. 6. *Gramen tomentosum & acerosum*, Calamagrostis quorundam, & vulgè *Gramen plumosum*. C. B. Phyt. *Gramen* 32. siue *tomentosum* Lobelin: An Graminis arundinacei alia species Thallio? Eid. pin. *Gramen arundinaceum* 3. siue paniculâ molli spadicâ maius: *Gramen tomentosum* Lob. Ic. *Graminis lotacei* 8. alia species Thalii.

Locus nascitur feticosis Sylvarum quarundam, Flandriæ & Angliæ: iumentis inutile.

Locus

GRAMEN ARVNDINACEVM,
ramosum, plumosum album. C. Bauh.
CAP. CXVI.

Descript.

Radice & foliis est arundinaceis, & in arundinis altitudinem excrefcit: caule anguloso, albo, paniculam arundinaceam, ramosam, palmarem, albam, mollem, splendens, inftar serici albi sustinet. Gramen hoc 44. C. Bauhini in prod. Gramen arundinaceum 5. siue ramosum, plumosum, in pin. non longè Monspelio, circa Perault & Magelonan reperitur.

Synonyma

Locus.

GRAMEN MONTANVM
panicula spadicâ delicatior
C. Bauhini.
CAP. CXVII.


Descriptio

GRAMEN quod C. Bauh. in pin. vocat paniculatum montanum 1. siue Gramen montanum

panicula spadicâ delicatior, in prod. pro Gramine 12. sic describitur: Radice est alba, breui capillacea, culmis ternis, quaternis, geniculatis, pedibus, vno altero è folio cinctis, quæ etiam ad radicem breuia & pauca sunt in culmorum summo panicula triuncialis spadicæ coloris, ex locustis minimis composita. Hoc tamen variat magnitudine, cum & caule sesqui cubitali & spica semipalmari inueniatur: prouenit locis saxosis, maius quidem in monte Grentzacho: minus verò in monte Wasserfall dicto.

GRAMEN STRIIS PICTVM.

CAP. CXVIII.



IN hortos vt deducreretur fecit foliorum grata varietas, quæ Arundinaceis minoræ, rigore tamen non cedentia, striis albis & ex viridi glaucis alternatim virgata sunt: paniculas summo culmo sustinet palmares, candidantes, acerosas, mediocriter diuillas: pro radice fibris nititur.

Observatione sanè dignum, quod diligentissimus Botanicus & Phyliaer Arnoldus Gillenius Cassellensis asserit, nobisque in paucis graminis huiusce foliis Montbelgardi demonstrauit, colorem scilicet triplicem album viride & purpureum, siue potius incarnatum.

Lobel. Adu. & Ic. Plant. p. 4. *Gramen sulcatum & striatum album*. Camer. hort. *Gramen pictum siue striatum*, Manæ vulgè dictum. Tabern. icon. & hist. p. 633. *Gramen sulcatum pictum*, Hispanicum, Spanisch gras / welsch gras: Eid. hist. p. 642. *Gramen* 10. C. Bauh. phyt. *Gramen* 26. siue *variegatum*: Eid. pin. *Gramen paniculatum montanum* 3. siue folio variegato: *Gramen sulcatum*, Adu. Lob. icon. *Gramen striatum*, Lon. Ger. *Gramen pictum* Cam. Tab. Variat in colore foliorum.

Basileæ mense Iunio vidi in orto D. Fel. Plateri, qui vocabat Germ. humel raut i. e. Cæli Mannam: In hortis Montbelgardi & Clerual vocantur des *Eguillettes*.

GRAMEN SYLVATICVM
paniculatum altissimum C. Bauh.

CAP. CXIX.

EX radice repente fibrosa, calami duorum sesquicubitorum exurgunt, qui paniculas paruas sustinent: foliis est latis, cyperi æmulis. Hoc in sylvis circa Montem Belgardum prouenit, ex quo rustici chlamydes pastorales, & torques equis aratra trahentibus, conficiunt.

C. Bauh.

C. Bauh. prod. *gramen* 14. Eid. pin. *gramen paniculatum montanum* 4: siue *gramen syluaticum paniculatum altissimum*.

GRAMEN SPICA QUADRATA AD SECALE ACCEDENS.

CAPVT CXX.

GRamen culmo bicubitali, infernâ parte nodorum articulatione distincto, supernâ enodi, glabro ceterum, & foliis gramineis glabris duarum vel trium vnciarum, pro articulorum interuallis singulis vestito. Spicam sustinet, quadratam, aliquatenus fecalinam, compactam, cuius glumæ munitæ aristis breuibus haud panis, sed superioribus glumis appressis, & oppositis apparent lateribus. Radix fibrosa.

An hoc *gramen spica fecalina* C. Bauhini, de quo infra?

Ex siccis suis plantis obtulit nobis Thomas Platerus circa Basileam collectum.

GRAMEN LATIFOLIUM SPICA TRITICEA LATIORE COMPACTA, C. Bauhini.

CAP. CXXI.

Culmo est sesquicubitali, vno altero ve geniculo distincto, foliis frumentaceis, pediculis, spica triticea, palmari, lata, glumis acutis caritate: Basileæ ad agrorum margines.

C. Bauh. prod. *gramen* 53. Eid. pin. *gramen spica triticea* 1. siue *gramen latifolium spica triticea latiore compacta: gramen varians latiore & angustiore folio*.

GRAMEN LATIFOLIUM SPICA TRITICEA DIUULSA C. Bauhini.

Hoc à priore, spica potissimum differt, quæ in spicis distinctas & angustas diuulsâ est, & quæ sibi inuicem alternatim in culmo subssequuntur, quarum vtriculi breuissimis aristis armantur: in Italia ad agrorum margines.

C. Bauh. prod. *gramen* 54. Eid. pin. *gramen spica triticea* 2. siue *gramen latifolium spica triticea diuulsâ*.

GRAMEN ANGVSTIFOLIUM SPICA TRITICEA COMPACTA, C. Bauhini.

Hoc foliis est angustioribus, sesquipalmariibus, rigidis, acuminatis, & albicantibus: culmo læui, rotundo, striato, sesquicubitali: spicis palmariibus, compactis: vtriculis rigidis & acuminatis.

Basileæ, ad fepes locis aridioribus extra portam Blasianam.

Casp. Bauh. prod. *gramen* 55. Eid. pin. *gramen spica triticea* 3. siue *gramen angustifolium spica triticea compacta*.


GRAMEN ANGVSTIFOLIUM SPICA TRITICI MUTICÆ SIMILIS, C. Bauhini.

CAP. CXXII.

Radicibus serpit oblongis, geniculatis, nodosis, candidis, quæ caules proferunt sesquipedales.

cubitales, rotundos, aliquot geniculis distinctos, spicâ oblongâ triticeâ, aristis carente, glumis paucis oblongis, similibus ei Tritico quod Fuchsio Triticum primum, aliis spica mutica dicitur. *Folia* obtineratundinacea [iuncea in prod. vbi pro *gramine* 56. describitur] dura, angusta, oblonga, in acumen fastigiata, quæ ab vna caulis parte sunt disposita, inquit author Casp. Bauh. in phyt. vbi vocat *gramen* 31. siue *arundinaceum*, spica triticea *weitzengras*, atque similitudinem quandam habere cum *gramine aquatico haruadinaceo paniculato Tabernamontani*. Ego non video quid commune habeat figura illa Tabernamontani, quæ paniculatam iubam habet, cum Fuchsij Tritico, quod spicam gerit, neuiquam verò paniculam aut iubam: quod mihi Basileæ demonstrauit, videtur potius spicam habere similem Lolio, quàm Tritico. Eid. pin. *gramen spica triticea* 4. siue *gramen angustifolium, spica Tritici muticæ similis: gramen frumentarium segetale, triticeum, siue Triticea spica*, C. Bauhini, Lob. Adv. par. 2. 56. in prod.

Notat Frater prouenire locis arenosis in Klyben circa Basileam suum *gramen*, vnde verò habuerim meum non recordor.




GRAMEN SPICA BRIZÆ MAIUS Casp. Bauh. ni.

CAPVT CXXIII.

Radicibus & culmis est frumentaceis, foliis angustis, spicis palmariibus, multiplicibus, vtriculis aristis breuibus armatis: flosculis, vt in Tritico, luteolis: tota planta ad viri altitudinem affurgit, & apud nos locis accliuibus ad Rheni ripam, & ad montis Crenzacenensis ascensum prouenit.

C. Bauh. prod. *gramen* 58. Eid. pin. *gramen spica Brizæ* 1. siue *maius*.



GRAMEN SPICA BRIZÆ MINUS eiusdem.

Tota planta palma minor est, radice exili, fibrosa, foliolis ad radicem breuibus, mollibus, canescentibus, spica vnciali, quæ modò simplex, modò gemina & terna, vtriculis aristis armatis: in agris Montpelienfibus D. Saltzmanus legit:

C. Bauh. prod. *gramen* 59. Eid. pin. *gramen spica Brizæ* 2. siue *minus*:

GRAMEN PHOENICOIDES, FOLIIS CONUOLUTIS, IUNCEIS AC PUNGENTIBUS.

CAP. CXXIV.

Cvbto altiore calarum tollit, internodijs oblongis geniculatum, foliis amictum sesquipalmariibus circiter, duris, rigidis, acutis, medio criter latis, summo culmo spica infidet sesquipalmum longa, alternante glumarum muticarum squammatum compactarum positu, ad eum ferè modum quem in Phœnice animaduertimus, sed maiorum multò, colore ex viridi in flauum vergente: radicem apparet esse perennem, oblique actam, fibrosam, duram, albam, ita ex sicca planta: Hoc *gramen* vnde habuerim nescio, huius

Rt 4

An Oxygroffis maritima, Dal?

valde simile quod iuncum vocauit olim collectam circa Montpelium, cui folia rigida, initio lata, tandem veluti in iuncum teretem conuoluta, in mucronem desinentia, sæpè spicam superantia, culmus in eo etiam obseruatus vix cubitum altus, desinens in breuem spicam, phoenicem aliquo nodo exprimentem: an hoc quoque idem sit cum atrociter pungente quem describit Dalechampius asserere non ausim, licet partes illius Graminis habeam: sed sine spicis, quas Dalechampius non tradit: nec etiam in eo Gramine pungente quod habemus, folia sunt: ad singulos nodos gemina, sed alternatim disposita: radix fibris multis capillata: crassioribus enim est fibris. Iconem exhiberemus nisi plâtam siccam, vt nonnullas alias ipsi communicatas, Frater retinisset.

Icon.

Hist. Lugdun. *Oxygroffis maritima* Dalecham-
Synonyma pit. C. Bau. phyt. *Gramen* 36. siue *maritimum*: Eid. pin. *Gramen arundinaceum* 8. siue *maritimum acutifolium*.

Locus.

In maritimis Narbonens. Gallie obseruauit Gener Cherlerus, & ibidem etiam crescere Hist. Lugdun. testatur. I. Gargillus *Gramen maritimum* pungens vulgò Bent vocari ait & copiosè in arenoso maris litore nasci scribit, referetque eo Anglos, conclauibus stratis: æstate quidem virenti conciliare frigus: hieme siccatò calorem fouere: vile precium in onus graue esse.

Vius.

GRAMEN IUNCUM MARINUM
foliis conuolutis cum longa spica, simile Gramini nodoso.

CAP. CXXV.

Descriptio Vidi apud fratrem C. Bauh. *Gramen* quoddam maritimum foliis ita conuolutis vt rotunda iuncæue existimarem, ea penè cubitalia sunt: ex radicibus duris prouenit crassiusculis spica similis est Gramini nodoso.

Quoniam hæc sit planta C. Bauh. in pin. ex tam breui delineatione cognoscere admodum difficile est.

GRAMEN MARIE ODORATVM.
CAPVT CXXVI.

Descriptio



Deser. C. Bauh.

XX

Hoc nomen ex Morte regio Bortulsiæ ad se missum *Gramen* impertiuit frater C. Bauhin. fibris crassis radicatam: folia plana quidem suapte natura; sed ita cocumbibus marginibus conuoluta, vt teretem iuncum culmum imitentur, rigida, firma, pungentia.

C. B. *Gramen suum* 13. in phyt. & prod.

sic describit: Radicibus candidis geniculatis serpit: culmo est bicubitali, geniculis paucis distincto, foliis angustis, longiulnis, paniculam superantibus, in acumen fastigiatis, tuauem, & odorem spirantibus, cuius culmo panicula parua, leuiterque sparsa à pectore non ritè expressa insidet: A Regiomontanis *Gramen Mariæ* dicitur, quod in fasciculos collectum: propter odoris fragrantiam, vestibus adiciunt, vt D. Valmarus, qui plantam transiisit perscripsit. Hæc ille, cuius iconem exhibemus. In pin. vocat *Gramen paniculatum montanum* 2. & *Gramen paniculatum odoratum*.

GRAMEN REPENS MARINVM
spica exigua.

CAP. CXXVII.



Gramen geniculatum maritimum alia folia profert spicam alta, ex quibus surgit culmus paruus, spicam exiguam ferens graminis exilis durioris. Radix longa, Graminis geniculati instar. Frequentissimum in maritimis collibus, in Walheren, Lobel.

Lob. Icon. Plât. p. 21. *Gramen*

geniculatum caninum maritimum. Tabern. icon: & hist. p. 637. *Gramen caninum* 3. Eid. hist. p. 642. *Gramen* 7. C. Bauh. phyt. *Gramen* 3. siue *caninæ supinum maritimum*. Eid. pin. *Gramen caninum* 8. siue *maritimum spicatum: Gramen caninum maritimum* Gerardi.

GRAMEN LONGIUS RADICATVM
marinum, vtriculos pro spica gerens.

CAP. CXXVIII.

Hoc nō aliter à precedenti differt, foliis, modo crescendi, & radice, quam quod spicatum loco inter folia profert vtriculos squammosos, Lobelius.

Tabern. icon & Hist. p. 641. *Gramen caninum* 4. & *Gramen* 8. C. Bauh. phyt. *Gramen* 4. siue *caninum supinum maritimum alterum*. Lobel. in Hist. Belg. p. 22. *Andere deyn duyuen-hede gras*. Icon. plant. p. 22. *Gramen caninum longius radicatum marinum alterum* Eid. pin. *Gramen caninum* 9. siue *maritimum spica foliacea: Gramen caninum maritimum alterum*, Gerardi.

GRAMEN GEMMEVM SEV
nodosum alterum.


CAP. CXXIX.

Radices fert gemmæ rotunditatis, candidas vt veluti Margaritas, quatuor aut quinque in vicem

uicem harentes, ac si stilo essent transixte, fibrosis alis ex postremo exeuntibus: culmos fert cubitales: foliis Tritici, iuba Milij, feminibus Auenae binis pendentibus tenuioribus à breuioribus aristis, vt Oryza.

Hanc descriptionis author Casalpini in genere Frumentorum recenset, sed semine inutili, licet spicam ferat, vt Frumenta. *Perlaram* vulgò appellat herbam in montibus, & Oryzam syluestrem dicendam autumat.

C. Bauh. pin. *gr. amen nob. sum 2.* siue *gemmeum*. Propagatur radice & graminis modo.



GRAMEN SPICATVM ANGVSTIFOLIVM montanum C. Bauhini.

C A P. CXXX.


Gramen hoc spicatum montanum 1. siue *gramen spicatum angustifolium montanum* in pin. *gramen 20.* in prod. à *gramine caryophyllato* pratens differt folijs, quae angustissima: cauliculis, qui in hoc tenuissimi, plures & longiores: & loco, cum hoc solum in montosis, Maio mensis florens, proueniat.

GRAMEN SYLVATICVM ANGVSTIFOLIUM spicà albà C. Bauhini.

C A P. CXXXI.

Radice rufa, transversa, fibrae capillares descendunt, & folia plura capillacea, palmata, etiam breuiora, ratiùs longiora, exurgunt, vna cum culmis tenuissimis, ipsi folijs plerumque breuioribus, quibus spica vt plurimum simplex, candida, exiguis aristis donata, vnciam vix superans, infidet.

Gramen hoc spicatum montanum 2. in pin. siue *gramen sylvaticum angustifolium spica albà: gramen 21.* in prod. in syluis humidis Huningensium.




GRAMEN CARYOPHYLLATVM NEMOROSUM spicà multiplici, C. Bauhini.

C A P. CXXXII.

Radice est ex fibris capillaceis rufescentibus composita, ex qua, tanquam ex cespite, folia semipalmata, etiam breuiora, Veronicæ caryophyllatae similia, prodeunt: inter quae culmi quamplurimi capillacei, nudi, folia aliquando superantes, spicas multas breuissimas & rufescentes sustententes, exurgunt.

Gramen hoc 22. in prod. *gramen spicatum nemorosum 3.* siue *gramen caryophyllatum nemorosum spica multiplici* in vmbrosis & humidis ad Birsam & VViesam reperitur. Huic non multum dissimile, sed radice magis geniculata, in via Richana ad sepes ad sinistram reperitur.



GRAMEN CARYOPHYLLATVM MONTANUM spicà varià C. Bauhini.

C A P. CXXXIII.


Radicebus est paruis, fibrosis, oblongis, nigricantibus, ex quibus instar cespitis folia, ali-

quando palmum longa, angusta, vt in *gramine spicato caryophyllatae* folijs, prodeunt: inter quae culmi plures, tenues, folijs nudi, in summitate spicam modò diuisam, modò compactam sustinentes.

Locus

In Basileensi vrbi vicinis collibus reperitur *gramen hoc 23.* in prod. vel vt vocat in pin. *gramen spicatum montanum 4.* siue *gramen caryophyllatum montanum spicà varià.*

Synon:



FESTVCA GRAMINEA GLVMIS VACVIS C. Bauhini.

C A P. CXXXIV.

Gramini 64. C. Bauh. in prod. in pin. verò *Gramini Festuca 2.* siue *Festuca graminea glumis vacuis*, ex radicibus fibrosis simul iunctis, culmi aliquot geniculati, pedales, ad radicem lanugine pubescentes, folijs angustis, paucis, donati exurgunt, qui glumos plurimos, laeues & vacuos, filamentis tenuissimis adpendentes, partim virides, partim spadiceos, aristis oblongis donatos, sustinent: haec apud nos in tectis & muris crescit: & cum glumi longis filamentis appensi sint, facile à quouis vento agitati, tremunt, hinc Montpelienibus *gramen tremulam* dicitur. Haec aliquando, apud eosdem, glumis paucioribus & aristis longioribus & recuruis in agris reperitur, & *Festuca graminea aristis incuruis* nominari potest.

Descriptio

FESTVCA GRAMINEA EFFVSA IVBA eiusdem.

C A P. CXXXV.

Gramen hoc 65. C. Bauh. in prod. siue, vt in pin. vocat, *gramen festuca 3.* seu *Festuca graminea effusa iuba*, altius exurgit, caule viridi & rotundo, qui in iubam pedalis longitudinis effunditur, cuius glumi angustiores & longiores, breuibus aristis cincti, pediculis capillaceis oblongis infident, qui per maturitatem albicant: inter segetes reperitur.

Synon:

Descriptio

Locus

FESTVCA GRAMINEA NEMORALIS, latifolia mollis.

C A P. CXXXVI.

Constat ex calamis cubitalibus vt plurimum, saepe bicubitalibus, hordeaceis, sed tenuioribus, geniculatis, & omnino similibus calamis festucae nemoralis maioris. *Folia* ei inter omnes species sunt latiora, secundum longitudinem interstriata, & molli lanugine obuoluta, cuius ratione tactui mollitiem eiusmodi offerunt, qualis in Althææ folijs tangentium digitis obicitur. *Iubam* in oblonga profert spica, non ita elegantem, vt iam commemoratorum *Festucaceorum*, coloris antequam flores exerat subrubentis, deinde ex flauo pallidioris, vtriculos etiam breuioribus pediculis appensos habentem, quantitate ea, quæ medij generis iam indicati esse diximus. *Semina* continet paruula, oblonga, splendens, & quasi Milij cuiusdam seminum rudimentum experientia.

Descriptio

Synonyma Thallo descriptionis auctori, *Festucaginis species in numeribus graminosis, Festuca 4. siue nemoralis lacifolia. C. Bauh. pin. Gram. Festuca 4. siue Festuca graminea, nemoralis, lacifolia, mollis.*

FESTUCA IUNCEO FOLIO
Casp. Bauhin.


Synon: **G**ramini 66. [vt in prod. C. Bauh. vocat] siue Gramini Festucæ s. seu iunceo folio (vt in pin.) ex radice parua fibrosa, alba, folia pauca, iuncea, semicubitalia longa, vt & culmus rotundus cubitalis exurgit, qui in paniculam aenaceam, sed angustiore, albam, angustâ, delinit, quæ ex oblongo folliculo [a folio constituto] paniculam luge superante, prodiit cuius glumi rari, aristis longissimis & argenteis donantur. In Vallesia ad paludem vrbis sedum copiosè prouenit, vnde D. Burserus nobis attulit.

Locus. An Festuca nemoralis s. siue tenuifolia Thallo, de qua hæc scribit: In nostris syluis Hærcynicis non semel reperi, quam pro Festuca quinta habeo, ita vt dicatur Festuca tenuifolia. Omnia enim præter iubam cæteris tenuiora habet. Radice constat plurimis exiguis ac tenuibus cirris prædita, ex qua straminei, renues, teretesque ac flauentes, geniculati, & cubitales calami prodeunt, foliis strictioribus donati. Iubam etiam hæc profert rariorem, in tenuissimis capillaceis, & multo longioribus, pediculis vtriculos exercerem, quantitate vtriculorum Festucæ gramineæ nemoralis, coloris fului, ac argenteo nitore micantem.

GRAMEN CALAMAGROSTIS LOBELII.

C. A. P. CXXXVII.

Descript.



Synon.

torium æquante: Spicata Panicæ aut Sorghi comosâ lanugine.
Lob. Adu. *Calamagrostis*, vel *Harundinaceum Gramen*, fortè *Babylonium*: Eid. Ic. Plant. p. 6. *Calamagrostis*: Item hist. Belg. p. 8. *Niedtgras*, & fortè *Gras von Babylonien*. Hist. Lugd. p. 434. *Calamagrostis Lobelii*, vulgò *Leche*. Casp. Bauh. phyt. *Gramen* 28. siue *arundinaceum aquaticum*: Eid. pin. *gramen arundinaceum* i. siue spica multiplici: *χαλαμύρα* Dioscoridis: *Calamagrostis* Lob. & Hist. Lugd. cui & *gramen arundinaceum*: Tabern. *gramen arundinaceum maius* vt & Ger. Variat ratione loci: nam quod in arenosis, spica ac est crassiore: quod in montosis, ac dumetis humidis, spica est tenuiore.
Casp. Bauhin. olim in phyt. *Gramen arundinaceum maius* Tabern. separauit à *Calamagrosti Lobelii*. Nos de *Gramine* Tabern. plura mox scorsim dicemus. *Lobelii* descriptio non videtur nobis respondere iconi, in qua spica siue iubam non apparet similis *Panico* & *Sorgho*: magna etiam differentia inter paniculam *Panici* & *Sorgho*: radix etiam non reptans pingitur.
Præter vdis, sed strigolis, macilentis & fabulosis neglectis familiare hoc genus *Graminis*. *Pabulo* haud cedit, nisi multum esuriant & penuria melioris admodum laborent veterina, nec egreges vescuntur, quippe quibus non modò ingratißimum, [& Saur, seu acidum, Rura vernaculè dicunt] verùm etiam maciem, sicim & tabem conciliare creditur, linguam & æsophagum vulnerare & ætætare, sanguinem in ventriculo elicere, vnde tumefactio & inflammatio & mors plerumque subsequatur. Quod si Babylone fuit natum vbi id maleficiũ adterre proditur, sictius & rigidius, grex verò imbecillior & alio duriore, minùs mirum illius esu iumenta illic eunctum iri. Sic enim videas interdum iumentorum labra & fauces eruoere manantia & fauciat, quæ cum reliquo stramine per fenestricia, huius aut consimilia harundinæ folia citantur. *Medix* itaque inter *Harundinem* & *Gramen* est naturæ.

Descript. **R**adice capillarem, humi serpente: folia ex vtroque latere obiectum vehemèter secantia, *Harundini* similes quoque cauos articulatos calamos, vna cum spicis, nisi quòd minores sunt. *Planta* admodum vulgaris notitia.
Tabern. ic. Synon. & hist. *gramen harundinaceum maius*, groß Niedtgras. C. Bauh. phyt. *gramen* 29. siue *arundinaceum alterum*. In pin. non amplius separata à *Calamagrosti Lobelii*. Mihi ambæ descriptiones conuenire videntur, quamuis figuræ sint diuersæ: verùm *Lobelii* icon, vt præcedenti capimouimus, non respondet descriptioni.
Litora, paludes, pratæque rigua quærit.

GRAMEN HARVNDINACEVM
maius, Tabern.

C. A. P. CXXXVIII.



Tabern. ic. Synon. & hist. *gramen harundinaceum maius*, groß Niedtgras. C. Bauh. phyt. *gramen* 29. siue *arundinaceum alterum*. In pin. non amplius separata à *Calamagrosti Lobelii*. Mihi ambæ descriptiones conuenire videntur, quamuis figuræ sint diuersæ: verùm *Lobelii* icon, vt præcedenti capimouimus, non respondet descriptioni.
Litora, paludes, pratæque rigua quærit.

Litora, paludes, pratæque rigua quærit.

Gram.

GRAMEN HARVNDINACEVM MINVS
cum spica.



Radix & harundo nodosa priori respondent: folia verò sunt & latiora, & longiora: spica plures magisque patula.

Tabern. ic. & hist. *gramen harundinaceum minus*, Fleu riedtz grasß. C. Bauh. phyt. *gramen* 30. siue *arundinaceum spicatum*: Eid. pin. *gramen arundinaceum* 2. siue *spicatum*: *gramen harundinaceum minus*,

Gerardi.

Prouenit in locis humidis & paludosis, vt præcedens, quamuis non ita copiosè.

GRAMEN MAIVS AQTATICVM
LOBELII.

CAP. CXXXIX.

Inter gramina vulgaris notitia est istud, copiosiusque reperitur ad aquas & riuos, in Gallia, Anglia, Germania, Italia, & Belgio, potissimum verò in Batavia, vbi etiam secatur, optimo pabulo vaccarum, folia habet pollicem lata, sesquicubitum, aut cubitos duos longa: culmus quatuor aut quinque pedum altitudine est, panicula miliacea: radix fibrosa.



Lobel histor. Belg. p. 6. groot water gras met brede hirs aren.

Eid. ic. p. 4. *gramen aquaticum maius* Tabern. ic. & hist. *gramen harundinaceum paniculatum*, wasser riedtz grasß. C. Bauh. phyt. *gramen* 22. siue *panicularum aquaticum*: Eid. pin. *gram. panic. aquaticum* 4. siue *Gr. aquat. paniculat. latifolium*: Lolii nomen genus, Tragi: *gram. maius aquaticum*, Lobelii: *graminis arundinacei alia species*, Thalii: *gramen harundinaceum paniculatum*, Tab. & Gerardi.

GRAMEN AQTATICVM HARVNDINACEVM
paniculatum, Tabern.

CAP. CXL.

Radice agitur transferfam, repentem, multis fibris donatam: calamos crassos, nodosos,

maiores quam gramen harundinaceum, sed minores, quam Harundo: folia gramini harundinacco similia, sed maiora & longiora: paniculam haud dissimilem.

C. Bauh. pin. *gramen paniculatum aquaticum* 1. Synon. siue palustre paniculatum altissimum: *gramen aquat. harundin. paniculatum*, Tabern. *gramen maius aquat. ger.*

In riuulis & paludibus stagnantibusq; occurrit. Locus

GRAMEN HARVNDINACEVM ENODE.

CAP. CXLI.

Inter folia bicubitalia, semuncia angustiora, rigida, ex radice fibris validis crassisque fundata, culmus surgit teres, homine procerior, cauus, enodis, nudus, crassiusculus, firmus: in fastigio summo paniculae palmo longiores, in tenues spicas desinentes, rubentes, a se inuicem longe interdum dilatas. Descriptio

Tragus hoc gramen ad caput de scirpo reuocat, Scirpique primum genus facit, dicens cum prouerbio apud Plautum occasionem dedisse, *Nodum in scirpo queris*. Hoc autem in homines plus æquo anxios & curiosos torquetur, qui illic scilicet scirpulum mouent, vbi nihil est dubitandum. Ceterum Germanicè *Hingehelmer* vocat, suspicaturque eos à veritate non multum erraturos, qui *wald Bohr*, hoc est, Arundinem syluestrem appellant. Græcè *ἄραρον ἄραρον* dicendum putat. Arbitratur & Syringiam Plinij. Ab aliis tamen *Oxychaenos* dicitur, vt in annotatione marginali legitur.

C. Bauh. pin. *gramen arundinaceum* 6. siue *enode minus montanum*: *Scirpi* 2. genus, Tragi: *Iuncus syluestris*, Lonic. quoad iconem: *Iuncus lychnanthemus maior*, Thalii: *gramen harundinaceum montanum*, Tabern. Arundo silu. Syringia Plinij. Oxychaenos Synon.

Copiosè prouenit prope pagum *Colombier sauaureux*, & in syluis inter *Lare* & *Lanmont*: Item in monte prope *Krentzach* & *Leurach*, ac in monte *Salcau*, in dumetis & humidis. Scirpus Tragi in altissimis, asperis & humectis syluis, nec non sub Iuniperorum fruticibus apud Mediomatrices nascitur. Iunio mense coles emit it, qui Augusto flaccescere incipiunt, ac firmi planè & rugoli euadunt. Qua de causa à rusticis mulierculis leguntur, quibus caesoes recentes & prahumidos in aère sicandos imponunt. Sed & ex iis nascè piscatorum conficiuntur. Locus & tempus vsu;

GRAMEN HARVNDINACEVM ENODE
de minus.

Trago Scirpi genus alterum multò tenuius, breuius, & cernagis exiguum, Germanis *Schmelen* vocatum. Scirp. 2. Tragi.

Thal. Iunci lychnanthemis species media, iuncus *λυχνανθημειος* tenuis maior dicenda, stylos continens multò tenuiores, teretesque, sed non ita perpendiculari rectitudine, se sustollentes, palmo longiores, breuena & vix vnicalem spadicem fennè coloris spicam exhibentes. Est *Broccenberg* familiaris. Iunc. lychnanthemis medius Thal.

Calp. Bauh. pin. *gramen harundinaceum* 7. siue *enode minus sylvaticum*. Gr. arund. enode minus silu. C. Bauh. Vicia

Ex minore hoc Tragi Scirpo nonnulli pilcos.

quibus Æstate aduersus Solis radios & calorem vtuntur, conficere solent.

GRAMEN PALVSTRE LOBELIO.

C A P. CXLII.

Descriptio R Adicem habet exilem, fibrosam, folia graminea producentem: inter quæ exit culmus gracilis, pedalis, spicam Cyperi gerens; iisdem nascitur locis cum Cyperoide, auctore Lobelio, qui in hist. Belg. p. 13. inscribit *Zegge* vel *warez* et *gras*: in Ic. Plant. p. 11. *Gramen palustre maris*. Figura quidem non videtur respondere descriptioni.

Synop. C. Bauh. phyt. *Gramen* 58. sine *Cyperoides spica* m. 111. Eid. pin. *Gramen cyperoides spicatum* 4. sine Gram. cyperoid. angustifol. spicis longis erectis.

ARVNDINES EX VETERIBVS.

C A P. CXLIII.

Arundinũ differentia. **Theoph.** Theophrastus hist. lib. 4. cap. 12. Harundinum differentias constituit, ex ipsarum corpore solido, cauo; ex breuitate, proceritate, crassitudine, gracilitate; foliorum multitudine, paucitate; natalibus siccis, aquaticis; denique ex ipsarum vsu. Verum duo summa genera, *ἡ ἀρὺνδος*, *ἡ τριβία*, h. e. tibialem & alteram facit. Harundinis, inquit, duo genera tradunt, Tibialem & reliquam: quippe vnum genus reliquæ deprehendit, sed inter se inuicem simile firmitate, crassitate, tenuitate, exilitateque differre. [hæc Dalech. emendatius sic legi posse putat: sed inter se inuicem differre crassitudine & tenuitate, robore & debilitate.] Crassam & validam, Vallatoriam vocant: alteram autem Textilem: Nasci textilem super infulus fluitantes; Vallatoriam in comithibus. Comythes autem vocant ubi acruata Harundo, implexaque mutuo radicum raptu sit: quod fit locis stagnorum, ubi tellus pinguis lataque est. Nonnunquam etiam ubi tibialis, Vallatoriam gigni, longiorem quidem, quam reliqua vallatoria, sed vermibus erodendam. Huius differentias eis tradunt. Tibialium quandam nono anno prouenire nonnulli volunt. Hunc quoque ordinem generandi statuunt: quod error est. In totum enim aucto lacu nascitur. Sed quoniam id superiori tempore anno nono potissimum cucurrit videretur, ortum quoque Harundinis talem esse credidere, euentum fortuitum pro ordine certo capientes. Gignitur verò copiosior, meliorque cum post imbres frequentes biennio, minimum aqua permansit: quod maximè posteriori tempore factum meminere, cum infaustum illud Cheroniæ accidit, quippe, hoc antè aunis pluribus lacus altitudinem extendisse, post, ubi vehemens pestis inuasis, impletum quidem affirmant: sed cum inundatio non permansisset, sed Hyeme decreuisset, sic & Harundinem prouenisse. Fertur enim, videturque aucta altitudine lacus, duratèque iundatione crassasi Harundinem, & fieri crassatam quiddam Armamentariam: Bombicam verò, cum non aqua permanserit. Generatiorem itaque talem tradidere. Distare autem à reliquis Harundinibus præstantia quadam nutritionis naturalis confirmant: quippe plenior, carnosior, in totumque facie femininè lasciuioris spectari: etenim folium am-

Theoph. emendatur

Vallatoria Textilis.

Tibiales. Error.

Vs copiosior meliorque gignatur.

Armamentaria. Somblyca.

plius, candidiusque habere, & minus lanuginis quam cetera: quasdam etiam omnino nihil habere, quas & nomine Spadonum appellant: Hinc paria optima fieri quidam affirmant, sed paucam in opere bene succedere: cædi tempestiue solitas, usque ad Antigenidem, cum adhuc simplicibus tibiæ vterentur sub Arcturo, mense Septembri: quippe sic casas plerisque quidem post annis viles esse incipere, multa que interim exercitatione sonandi indigere, sed ora linguarum comprimi, quod erat illis theatrorum moribus vtilius: sed postquam varietas, sicutque accessit, cæura mutata est. Cædunt enim nostra ætate, mense Maio, & Iunio, quasi paulò antè Solsitium, vel sub ipso Solsitio: & fieri viles in trimatu referunt, & breui exercitatione egere &c. Hæc *armamentaria cadende tempor a radunt.* *Preparatio vero, & confectio hunc in modum fieri solet.*

Cum collegerint Hyeme sub diuo exponunt suis vestitam tunicis: Vere autem dispoliatam, atrituque expurgatam, Soli expandunt: Æstate post hæc concilam in internodia, rursus sub diuo, ad tempus quoddam exponunt, relicto internodiis superiori geniculo. His *longis udo* palmo nunquam minor. Nascitur plurima inter Cephissum, & Melanam. Pelaciana locus hic nominatur. Huius quædam partes Chytri vocate, lacus altitudines sunt, quibus Harundinem laudatissimam prouenire affirmant. Sed omnium optima nasci creditur circa Oxæam, Campen vocatam. Est etiam alius locus Aquilonis, Oxææ Campæ Boedrias nomine, quo etiam ipso nobilem Arundinem nasci asseuerant. In totumque ubi crassum, laxum, sæxosumque solum sit: Cephissus se permisceat, acque etiam altitudo lacus ampliatur, Arundinem optimam oriri. Nam circa Campen & Bædriam, hæc omnia comperiuntur. Quod autem Cephissus vim magnam ad faciendam Arundinem laudabilem fortiat, argumento capiunt, quò eo loco, ad quem Melas, qui vocatur, inluit: quanquam locus profundus, solumque crassum, atque sæxosum est, tamen omnino nulla, aut vitiosa exurgit. Generatiorem Arundinis, tibialis, naturam, confectioem, quibusque differentis à reliquis distat, satis dixisse arbitramur. Geneta non hæc solum, sed plura etiam Harundinis etiam intelliguntur, quædam enim densa, tam carne, quam geniculis: quædam rata paucisque geniculis: & alia caua tota, quam *Fistulariam* quidam appellant (nihil enim ferè ligni, carnisque habet) alia solida, & tota penè intus repleta. Item alia proœra, ex-celsa, crassaque: & alia gracilis, foliosaque: alia paucis foliis omnino: multæ quidem differentie pro natura, vsuque intelliguntur, singule namque ad singula viles. Nominibus aliis appellant, sed *Cama* communissima quodammodo est, quam & frutescentiam maximè omnium referunt, & apud flumina lacusque potissimum nasci: plurimum tamen in quoque genere distare inter sese aquaticas, & sicco nascentes perhibetur. *Sagittaria* quoque, quam Creticam quidam appellant, sui generis est, nodis paucis, geniculata carnosior omnibus, maximeque hexum recipiens, atque omnino obsequens, quò libeat flecti calefacta. Magnas & folia differentias reddunt, quemadmodum diximus, non multitudine, magnitudineque tantum, sed etiam colore, quippe quæ *laconica* cognominatur, versicolor est. Item positu ipso, atque annexu: Genus autem quoddam Harundinis vel terrenum emigrat, quod non erigit caulem, sed super terram spargitur Graminis

Spad.

Cad.

tem.

Prepa.

ratio vero,

& confectio hunc in modum fieri solet.

Lu.

Al.

Ar.

res.

Fij.

Ca.

me.

bu.

un.

Dij.

Ar.

à se.

minis modo, atque ita se sumptat: mascula foli-
da est, femina inanis: quippe hoc marem à fe-
mina distinguunt. Quæ edam magnitudine præ-
stantes, atque robustæ, ut vicem hastarum præ-
beant. Hæ circa Aethiæ amnem orientur. O-
mnis autem Harundo viris est, atque adusta
melius refurgit: itaque stirpe crassa, numero-
saque est, ob id mori peritica. Radix ipsa geni-
culata, quemadmodum in Graminis: verum non om-
nes simili modo informantur. Arundo autem
geniculata est & corticem habet neruoso in maci-
lentiaque, radicem geniculatam: perpetuo vir-
get: à gelu enim torpere minimè potest, vulnera-
tisque facillè coit. *Et hæc passim ex versibus Gæse.*

Quinque Harundina (χαλδαιον) genera, ve-
luti noticia profudit Dioscorides: in haru in ge-
nere quedam Nistos, id est, plena solidave ap-
pellatur: ex qua sagitte fabricari solent: altera
fæmina, ex qua tibiis ligulae conficiuntur. Alia
Syringias, hoc est, fistulosa, multa carne prædita,
(V. παχυσαρκος) geniculis densior, ad librorum
scriptionem accommodata. Alia denique crassis
& concava, circa amnes nasens, que etiam
donax, & à quibusdam Cypria vocatur. Est &
alia phtagmifera, quasi sepiementis idonea, gracili-
or, candidians, (V. ἀποδυσήτης aliter λευκός, ἀπο-
λευκός, & λευκός) vulgò nota. Cuius radice contri-
ta, ac tum per se, tum cum bulbis imposita spicu-
la, aculeosque corpore extrahit. Ex aceto verbò,
luxata, dolorèque lumborum deinulcet. Virentia
porrò folia rufa & imposita tum erysipelatis,
tum aliis inflammationibus medentur. Cortex
vltus & ex aceto illitus akopceias emendat. Cæter-
rum panicule flos, si acres intrauerit exurdat.
Eadem quoque præstare valet que Cypria Har-
undo dicitur.

Plinius, qui ex Theophrasto nonnulla mu-
tauit, lib. 16. cap. 36. multò plures differentias ag-
nouit. Inter eas, inquit, quæ frigidis gaudent, &
aquaticos frutes dixisse conueniat. Principium
in his tenebunt Harundines, belli pacisque
(belli, ad iacula: pacis ad scribendum) experi-
mentis necessaræ, atque etiam delicias (ad ti-
biarum vsum) gratæ. Tegulo earum domus suas
Septentrionales populi operiunt (ob id pannicu-
lam tectoriam vocat Plautus in Milite:

*Cuius tu legiones distulisti spiritus
Quasi ventus fluit, aut panniculam tectoriam,*
Turner.
Plaut. in rudente:

*Quin tu in paludem is, exigisque Harundines,
Qui perægamus villam, dum sudum est?*

durantque axis tecta alta. Et in reliquo verbò Or-
be cameras leuissimè suspendunt (ex iis camerae
fornicisque pergularum quam leuissimi & mini-
mè onerosi sunt) Chartisque seruiunt calami,
Ægyptij maximè, cognatione quadam papyri.
Probatores tamen Gnidij & qui in Asia circa
Anaticum lacum nascuntur. Nostratibus fungo-
sior subest natura, cartilagine bibula; que cauo
corpore intus, superne tenui inarefcit ligno: fistu-
lis, præacuta semper acie, geniculata. Cæterò
gracilitas nodis distincta, leui fastigio tenuatur
in cacumina, crassiore panniculæ coma; neque
hac superuacua. Aut enim pro pluma strata cau-
ponarum replet: aut vbi limosiore callo indu-
ruit, sicut in Belgis, còntusa, & interiecta nauium
commillitis ferminat textus (tabularum com-
pages) glutino tenacior, rimisque explendis fide-
lior pice: Calamis Orientis populi bella confi-
ciunt. Calamis spicula addunt irreuocabili hamo-
noxia. Mortem accelerant pinna addita calamis.

Tom. II.

Fitque & ex ipso telum aliud fracto in vulneri-
bus. His armis Solem ipsam obumbrant. Pro-
pter hoc maximè serenos dies optant: odere ven-
tos & imbres, qui inter illos pacem esse cogunt.
Ac si quis Æthiopus, Ægyptum, Arabas, Indos,
Scythas, Bactros, Sarmatarum tor gentes, & O-
rientis, omniàque Parthorum regna diligentius
computer, æqua ferè pars hominum in toto mun-
do calamis superata degit. Præcipuus hic vsus in
Creta bellatores suos præcipitauit. Sed in hoc
quoque, ut cæteris in rebus vicit Italia: quando
nullus sagittis aptior calamus (Harundo sagitta-
ria ea vocatur) quam in Rheno Bononiensium
amne, cui plurima inest medulla, pondusque (fin-
dendo acri opportunum, volucre: contra flatus
quoque peritica libra. Quippe non eadem gra-
tia Belgicis. Hæc & Creticis commendationibus:
quoniam præferantur Indi, quorum alia qui-
baldam videretur natura, quando & hastarum vi-
cem præbent additis cuspidibus. Harundini qui-
dem Indicæ arborea amplitudo: quales vulgò in
templis videmus. Differre (de Harundine Epi-
geio, non de Indica id Theophr. qui masculam
solidam esse, fæmiam verò inanem, etiam scri-
bit) mares ac fæminas in his quoque Indi tra-
dunt. Spissius mari corpus, fæminæ capaci-
us. Nauigiorumque etiam vicem præstant (si credi-
mus) lingula internodia. Circa Aethiæ Theophrast. cap. 12. lib. 4. de Calamo tantum id scribit,
qui huius vicem præstat) amnem maximè nascun-
tur. Harundo omnis ex vna stirpe numerosa. At-
que etiam recita fecundius refurgit. Radix natu-
ræ vitæ, geniculata & ipsa. Folia Indicis tan-
tum breuia. Omnibus verò à nodo orsa, com-
plexu tenues per ambitum inducunt tunicas: at-
que à medio internodio cum plurimè desinunt
vestire, procumbuntque. Latera Harundini cal-
amòque in rotunditatem bina, super nodos al-
terno semper inguine, ut alterum ad dextra fiat,
alterum superiore geniculo ad læua per vices. In-
de exeunt aliquando rami, qui sunt calami te-
nues. Plura autem genera. Alia ipsior densior-
que geniculis, breuib; internodiis. Alii rarior
maioribus, tenuiorque & ipsa. Calamus verò a-
lius totus concavus (Falsum esse id appetitissime
ostendit Arist. Theophr. de Orchomenio calamo.
Plinius hæc mirè perturbat. Lego. Calamus verò
alius Orchomenius totus concavus &c. Quem
verò Auleticon &c.) quem Syringiam (Syring.
Theophr. Ita porrò vocant, non quòd utilis sit
fistulis, quemadmodum Plinius exposuit, sed
quòd fistulosus & inanis sit) vocant, vtilissimus
fistulis, quoniam nihil est ei cartilaginis atque
carnis. Orchomenius est continuo foramine per-
uius, quem Auleticon vocant. Hic tibiis (Tibias
à Barbaris inuentas fuisse tradunt, ideòque in
describendis mulicis instrumentis, quibus per-
strepebat furiosa Bacchantium cohortis, rectè Ca-
rullum dixisse:

Barbaraque horribili stridebat tibia cantu.

Apud Hom. Troiani de suis rebus prosperis læti,
sele ut oblectent, pernoctantes in campo tibias
inflant. Olympiad. à Phrygiis inuentas fuisse
tradit, vsumque in certamine Marsiam tibia, A-
pollinem verò cithara, Victoriis cap. 10. 30.) vri-
lior, fistulis ille. Est alius crassiore ligno, & te-
nui foramine. Hunc totum fungosa replet me-
dulla. Alius breuior, alius procerior, exilior,
crassiorque. Fruticosissimus qui vocatur donax,
non nisi in aquaticis natus: quoniam & hæc dif-
ferentia est, multum prælata Harundine que in
liccis proueniat. Suum genus sagittario calamo,

Harundo sagittaria,

Harundo Indica arborea.

Mas & fæmina.

Harundinis deliciae.

Densior rarior. Plinius laus.

Syringias.

Orchomenus, seu Auleticus.

Crassior ligno. Alia differrentia. Donax fruticosissimus & non aquas.

Sf

vt diximus, sed Cretico longissimis intermodiis obsequenti que quò libeat flecti calefacto. Differentias faciunt & folia, non multitudine, verum robore & colore. Valida Laconicis, & ab vna parte densiora, quales in totum circa stagna gigni putant, dissimiles amnicis longisque vestri tunicis, spatiosius à nodo scandente complexu.

Arundo elegia. Est & obliqua Harundo, non in excellentem nascens, sed iuxta terram fruticis modo se spargens, suauissima in teneritate animalibus. Vocatur à quibusdam elegia. Est & in Italia nascens ad arca (calamachne ea quoque dicitur cap. 10. lib. 31. vide cap. 22. lib. 20. Adarces enim est subsalsa concretio, humidis & palustribus locis, sicco calo, spissescens, Arundinis & herbis inhaerescens: molli Alcyonio profus similis, valde spongiosa, &c. Ex hac Dioscoridis Historia apparet Plinium Adarces naturam non intellexisse, quoniam nec Harundini peculiaris est, nec è cortice comàue nascitur. non in palustris & cortice (Harundinibus atque herbis inhaerens. Diosc. In præ Plinius Adarces, quæ Salsilago est, inter Harundinarum genera commemorat, vide cap. 22. lib. 20. & cap. 10. lib. 31.) tantum sub ipsa coma, vtilissima dentibus, quoniam vis eadem est quæ Sinapi. De Orchemenii lacus Harundinetis accuratius dici cogit admiratio antiqua. Characiam [Phragmitem ipse vocat cap. 10. lib. 32.] vocabant crassiorē, firmiterque, plotiam (plocimon Theophr.) verò subtiliorem, hanc in insulis fluitantibus natam, illam in ripis expatiantis lacus, Tertia Harundo (In sequentibus multa Plinius ex Theophrasto male transcripsit. Apud Theophr. locus est cap. 22. lib. 4.) est tibialis calami, quem auleticon dicebant. Nono hinc anno (Nono anno nasci putabant, quoniam eo temporis intervallo lacus augebatur, sed magno errore, Theophr.) nascebatur. Nam & Lacus incrementa hoc temporis spatio seruabat, [prodigiosum id esse Theophrastus non ait, sed contigisse circa tempus eius infausti prælii] si quando amplitudinem biennio extendisset [si post imbres frequentes aqua biennio copiosa permansisset Theophr.] quod notatum apud Cheroniam, in fausto Atheniensium prælio, & apud Lebadiam sæpe notatur influente Cephisso. Cum igitur anno permansit inundatio: proficiunt in aucupatoriam quoque amplitudinem: vocabantur Zeugitia [Zeugitia aucupatoriam male Plinius exponit: Zeugitiam enim dicebant eam, quæ crassitie & longitudine ad compingenda duarum tibiaram paria & coniungia, ut Zeugitiam idonea & apta foret, vt sequitur, quæ ob stitigofam maciem tibiâ dignum sonum non ederet, sed bombam tantum. Apuleius 4. Aſini nuptiales tibiâs vocat Zygiâs, quasi iugales, sicut lunonem Zygiâ, iugam siue iugalem vocant cui vincula iugalia curæ, vt inquit Poeta. Idem l. 6. Harundinem mulicæ nutriculam appellat, lepidè qui dem, sed affectatè] Contra bombyciæ maturis reciproco graciles, fœminatam latiore folio atque candidiore modica lanugine, aut omnino nulla, spadonum nomine insignibus [insignes Dal.] Hinc erant armentaria [Tibiæ fiebant, quibus canerent. Armentum licenter Plinius instrumentum vocat: quod Gazam impulit, vt apud Theophrastum parum aptè Zeugitiam verteret Armentariam:] ad inclusos cantus [Inclusos cantus dici volunt, qui in theatris aut tempus muro circumseptis, vel etiam in priuatis ædibus personant, non autem in aperto ederentur, veluti tubis & cornibus. Al-

lus putat scriptum fuisse Includos pro Inclutos, unde factum sit Includos. Ennius de Cochlitæ.

Hic datus est occasus Horatius incultris salu. apud Festum.]

Non silendo & reliquo curæ miraculo, vt venia sit, argento iam potius cani. Cædi solebant tempestiue vique ad Antigemem tibicinem, eam ad huc simplici mulica (Tibia Theophrast.) vterentur, sub Arcturo: sic præparata aliquot post annos viles esse incipiebant. Tunc quoque multa domandæ exercitatione, & canere tibiæ ipsæ docendæ, comprimimentibus se ligulis (conuenienti ore linguarum. Theophrastus) quod erat illis theatrorum moribus vtilius. (In Theophrast. est quod ad vsum exercitationemque canendi vtilius fuit.) Postquam varietas accessit, & cantus quoque luxuria cædi ante solstitia, ceptæ, & fieri viles in trimatu, apertioribus earum ligulis ad flectendos sonos: quæ inde sunt & hodie. Sed tum ex sua quâque tantum harundine congruere persuasum erat: & eam, quæ radicem antecellerat læuæ tibiæ conuenire: quæ cacumen dextre: immensum quantum prælati, quas ipse Cephissus abluisset. Aucupatoria Harundo à Panthormo laudatissima, piscatoria, Abaritana. [Hæc sunt viginti duo genera: quibus si addas Ægypticum, Gnidium, Anaiticum, Italicum, Belgicum, Creticum, Indicum, supra memorata viginti nouem comperies, quor le recitasse ait cap. 11. lib. 24.] ex Africa. Harundinis Italia vsus ad vineas (ad eam pedamenta & iuga. Vide varr. cap. 8. lib. 1.) maximè. Cato sericiam iubet in humidis agris, bipalio subactò prius solo, oculis dispositis intervallo ternorum pedum. Simul & corrudam, vnde asparagi fiant: concordare enim amicitia. Harundinis igitur genera viginti nouem [39. CH.] demonstrauimus (pergit Plinius lib. 24. cap. 11.) non aliter euidentiore illa natura, quam continuis nostris voluminibus tractamus liquidem Harundinis radix contrita & imposita, Filicis stirpem corpore extrahit: item Harundinem Filicis radix. Et quoniam plura genera fecimus, illa quæ in India Syriacæ nascitur odorum vnguentorumque causa, vrinam mouet cum Gramine aut Apij semine decocta. Ciet menstrua admota. Medetur conuulsis duobus obolis pota, iocinori, renibus, hydropi, tussi, etiam suffitu, magisque cum resina. Futuribus hulcerumque manantibus cum myrrha decocta. Excipitur & succus eius, si que elaterio similis. Efficacissima autem in omni Harundine, quæ proxima radici. Efficacia & genicula. Harundo Cyptia, quæ donax vocatur, corticis cicutæ alopecias emendat: item putrescentia vlcera. Foliis eius ad extrahendos aculeos vrantur. Efficacius & contra ignes sacros collectionesque omnes. Vulgaris Arundo extractotiam vim habet & recens tusa, non in radice tantum. Multum enim & ipsam Arundinem valere tradunt. Medetur & luxatis, & spinæ doloribus radix in aceto illita. Eadem recens trita in vino pura, Venerem concitat. Arundinum lanugo illita auribus, obtundit auditum. L. b. 2. cap. 10. de Harundinibus hæc subdit. Inter aquatilia dici debet & Calamochnus (Pericalamitis Galeno, & limnestris calamachne. Vide cap. 16. lib. 16. cap. 22. lib. 20.) Latine adarca appellata. Nascitur circa Harundines tenues & spuma aquæ dulcis ac marinæ vbi se miscet. Vim habet causticam: idèò acopis additur contra perfrictionum vitia. Tollit & mulierum lentiginem in facie. Et calami simul dici debent. Phragmitis

mitis (ad fepes faciendas vtilis ob crassiciem & firmitatem. Eum esse volent, quem ex Theophr. locoproximè citato appellavit *χαλακίαν*.) radix recens tufa luxatis medetur, & spinæ doloribus ex aceto illita. Cyprij verò, qui & donax vocatur, cortex alopecijis medetur vřtus, & vlcetibus veteratis, folia extra hendis quæ infixæ sint corpori, & igni sacro: paniculæ flos, si aures intrauerit, extirpat.

Cæterùm conuenit hoc in loco obiter monere quòd nomine Calamii iam sepiùs nominati, differens habeatur autorum significatio, attestantibus id verficulis subfequentibus.

Virgil. Egl. 3.

Aur hic ad veteres Phagos cum Daphnidis arcum Fregisti & calamos.

Aristob.

Volgosticuri gli altri à quella banda Ond'era vřsito il calamo homicida.

Mart.

Dat chartis habiles calamos Memphisca tellus. Texantur reliqua recta palude tibi.

Idem:

Babula decipitur calamis, & veribus ales.

Hoc enim in loco Ceclinus intelligit per calamum primo loco Cannam siue Harundinem scriptoriam: secundo loco piscatoriam: Accipitur & pro fistula:

Virgil.

Tu calamos inflare leues:

Propria tamen *καλαμίου* significatione Arundo siue Harundo, planta communiter ad amnes nascens intelligitur. Græcis autem *χαλακίαν* & *το χαλαρόν αμυγδαλίαν*, vt vult Etymologus, dicitur. Arab. *Casab*, & *Hafab*: radix *Ofel* *alchafab*. Germ. *Kohr*, *decfricor*. Belg. *Nier*: Gall. *Rofeau*: Ital. *Canna à far seppe*: Hiip. *Cannas*. Angl. *Reede*: Boh. *Trefst*.

ue feminis spe abripitur; glutinis videlicet cassis contenta.

Matth. in Diosc. Arundinis Cypria titulo olim posuit figuram quæ minis placebat eà, quam in com. cum mag. fig. Lat. & Ital. nomine Arundinis palustris ac etiam (perperam tamen) pro Calamo aromatico exhibet.

H. Lugd. p. 100. Arundo vallatoria Dodonæi. Item Arundo palustris Matthioli. Dux vnus stirpis figura.

Geln. de coll. stirp. Arund: Eid. hort. Arundo a lia: Turn. Hort. Luf. & Lob. Adu. Arundo vallatoria: Lon. Arundo aut Calamus: March. & Tab. Arundo palustris. C. Baul. pin. Arundo modora 1. & Arundo vulgaris siue *χαλακίαν*, Dioscor. *χαλακίαν χαλακία*. Theophr. Lob. Obs. Arundo vallatoria. Phragmites Diosc. Ruell. Corn. & Dod. Lat. *harundo phragmitis*. Amato, *harundo vallaris: harundo vallatoria*, Dod. gall. Thal. & Gerardo: *harundinis 5. genus*, Trago. *Calamus siue harundo vulgaris*, Cordo in Dioscor. *Calamus siue harundi gracilis*, Cæs. *Calamus Arundo vallatoria siue Phragmites* Lob. Ic. plant. pag. 51. *Canna secunda, quæ facina* Diosc. Anguill. epist. 4. dicitur etiam *Canna sepiaria*, *χαλακίαν χαλακίαν*, *Calamus vallaris*, *harundo sepiaria*, *harundo* aut *calamus characias*. Theophr. & *canna vallatoria*.

In maritimis & locis palustribus passim obseruauit gener Cherlerus, sed speciatim inter Balerucas thermas & lacum maritimum, ex fossis vdis & irriguis excerptis. Nascitur in aquis residibus, veluti in vrbiu fossis, & circa fluminum laxiorum ripas: Lubæ sub finem Æstatis excunt.

Cæterùm quod ad facultates attinet, Calami Phragmitis, inquit Galenus, radicem cum bulbis, aculeos, & stipites ex alto extrahere quidam scripsere, ceu trahendi quædam vis ei inesset, nos tamen eius rei periculum non fecimus, verùm, quantum gustu liceat conicere, abstergentem facultatem possidet non paucam, minimeque acrem. Quinetiam folia ipsa abstergentis sunt facultatis: cortex verò eius combatus admodum tenuium partium, & digerentis facultatis efficitur, adiunctum habens absterforium quiddam, vt efficiet & excalfaciat tertio quodammodo ordine, plus tamen desiccet quam excalfaciat. Vitandus est eius flos, quem *αδινλευ* vocant: nam si in aures incidat, adeò tenaciter adharrens efficitur, at auelli non possit, auditumque viciat: quamobrem sepiùs extirpat. Reliquas vires ex Dioscoride, Plinioque lege aittè. Nobis (teste Trago) ad varia nostra Arundine vri licet. Sunt enim qui testa sua hîcè conlarciant, vt interim textores præteream qui nonnulla pro filis glomerandis instrumenta ex illis conficiunt. Cortex vřtus, vt videre est apud Tabern. maturat & repurgat, sicut & folia, quæ admodum sunt frigida & sicca. Radix in aqua aut vino decocta & cepota mentes & vřnam ciet, atque stranguriam medestur. Hoc verò decocto si caput laueris, surfures emendabis. Æstate verò huiusce foliis conclauiæ consperguntur, in quibus agri decumbunt, qui febris ardentibus laborant, quò aer corrigatur, frigidiorque reddatur, atque patientes refocillentur. Recentia porro contusa & imposita erysipelati commodant, tumoresque scroti discutiunt. Radix in subtilissimum puluerem trita, fistulis & vlcetibus inspersa prodest. Sed & aceto vini in vnguentum commixta, enit dolorem luxatorum. Si barba ranarum defluerit, Cicer. Harund. vnc. j. Ciner. ranar. vřlar. drach:

Locus:

Tempus:

Vires & vřsus. ex Galeno Radix.

Folia Cortex ab. bulbis.

Flos St. tanis.

Arundo germ. Eius vřsus

Cortex vřsus.

Radix mē. ses. vř. vřnam ciet.


Febres. Erysipelati. Fistula.

Barba dę. fluxa.

ARVNDIO VVLGARIS PĀLVSTRIS.

C A P. C XLIV.

Vulgaris Arundo obliquè geniculatam agit radicem, nouos subinde surculos, oculolq; continuo auctu protrudens, ex quibus culmi surgunt hominis altitudinem æquantés, aut altero tantò maiores, minimo digito tenuiores, geniculati, inanes: ex quorum nodis singulis ferè, culmum inuoluentia folia exeunt, rigida, & aspera nonnihil, vncias duas lata circiter, cubito longiora, venosa, scapus summus in comatam mollem purputascetem iubam, tandem villosiore mollioremque coloris cinerice redditam, nutantam effunditur, quæ ventis ludibrium debens fistula.



lioremque coloris cinerice redditam, nutantam effunditur, quæ ventis ludibrium debens fistula.

vij. sem. Eruc. drach. v. sem. Vrticæ drach. iij. Pulveriscentur subtili modo & fultic. q. ol. Laurin. F. vng. quo pars calua illinatur. Radices minutim incisæ, & vel solæ, vel cum capis contuse, ac infert emplastri administratæ, sagittas, aculeos, spinas, & clausos extrahunt. Sola etiam contusa cum melle in emplastrum redacta, si imponatur, spicula quæuis & globulos extrahit. Contra venenatos istus, ne se. cordi venenum incommo- det. ℞. Rad. Harund. vnc. ij. Rad. Aristoloch. ʒ. j. Sem. sinap. ʒ. se. nis, Capar. tost. num. ij. Stercor. columb. vnc. ij. Omnia simul cum melle in Emplastrum rediguntur, & bis in die imponuntur. Cinis corticum naribus inditus hæmorrhagiam sistit: cum aceto vero aut adipe Leonum, aut vitroque si ncl. com. mixtus, illitu aploeciam sanat. Radix in oleo communi incocta si percoletur aliquoties in die & parum auribus instil- letur, dolorum eorumdem sedabis. Contra variolarum relicta vestigia ℞. Succ. expressi rad. Harund. seui asin & mellis an. part. æqual. vel q. d. f. vngt. quo macule illinatur. Recentis Harundinis medullam contundito, eademque sinciput & pedes illinito, tæque lectui committito, optimeque contegito, quò potenter sudorem prooves. Succus Harundinis fissuras labiorum & linguæ sanat, si cum melle permisceatur: & sæpius illinatur. Harundinum radicibus, ex autoritate Aduerf. rufis, arefactis & in farinam molitis etiamnum hodie nonnullæ gentes panem non insuaveu consueunt. Quin etiam gramineo est sapore etiam nostratis Arundinis radix. Vmbei inopia salis naturalis ex Arundinibus vltione factam conficiebant, quo loco naturalis vtebantur.

Spica.

si morha- gna.

Variolarum Vestigia.

Sudorem mouet medulla. Succus fissuras labiorum sanat Panis ex radicib.

Salem præparant.

ARVNDI MAXIMA ET HORTENSIS. CAP. CXLV.

Descript.



Studiôsè in Svarios vsus colitur Hortensis dicta Arundo, multò maxima, hastam longissimam æquans, calami pollice crassioribus, validis, cauis, crebrè geniculatis, hæfcentibus: comosa iuba & folia vallatoriani imitantur, maiora. Radix longè latèque sub terra vagatur,

tuberosa, cuius teneri turiones cum grata dulcedine esitari possunt.

In hortis colitur. Ego propter latitudinem foliorum aliquando Papyrum esse suspicabar: nunc verò cum Anguill. Donacem statuo.

Matth. sibi persuadet esse Arundinem vallatoriam. Fiunt, inquit, ligulæ tibiarum ex communi hac arundine Dioscoridi vallatoria nuncupata, quæ nostri in viridariis, ac hortis in topiariis extruendis vtuntur ac palos vitibus aptissimos efficiunt. Quod autem vallatoria sit hæc nostra

Donax.

Arundo Vallatoria Plati.

communis mihi aliquando dubitandi præbit ansam Dioscorides: quippe qui dicat, eam esse gracilem, cum tamen communis nostra sit crassior. Verùm cum postea inuenerim Theophrastum crassiorē vel vallatoriam nominare, facillè sum ad credendum inductus Dioscor. hunc locū esse deprauatum. Hæc illes, qui in com. cum mag. icon. Lat. & Ic. habet iconem nomine Arundinis domesticæ, quam pro suo more posuit pro calamo aromatico, olim posuerat aliam iconem pro calamo aromatico, qualem etiam posuerat pro Arundine, quæ Arundinem palustrem exprimere videbatur, hinc apparet quanta fides in abscuda Matthiolo in plantis peregrinis ac etiam vulgari- bus, is sæpius ad descripciones plantas pingendas curauit.

Tabern. Hist. & Icon. Arundo domestica, Græcè δὲραξ & ὑδραυρος ὑπερος, Arundo Cypria, harundo domestica, hispanica, Canna hispanica, Hispanischriedt, Hispanischrohre & Zamrohr: Item calamus aromaticus. Tabern. habet iconem Matthioli similem, & postea Matthioli imitatus ponit iconem non differentem pro calamo aromatico, ex quo apparet quanta etiam fides adhibenda sit Tab. dicenti se vidisse verum calamū aromaticum: verùm hoc non nouum apud Tabern. & alios qui pro suis venditare solent, quæ non sunt, & miscere ac confundere plantas similes quæ se vidisse quæ non viderunt.

Gerard. harundo Cypria, Cypresse cane. Et alibi, calamus Aromaticus. Gerardus sequitur figmentum Matth. & Tabern. & pro calamo aromatico proponit plantam quam posuerat pro harundine Cypria.

Casp. Banhin. pin. Arundo inodora 2. siue Arundo sarina, quæ δὲραξ Diosc. & Theoph. Arundo Matthiol. Lac. Cast. Amnica Ruell. Arundo domestica, Matt. Lugd. Tab. Arundo Cypria, Dod. gall. Amat. Ger. Canna quarta, qua Donax, Ang. Arundo magna, Gesn. hort. Italica maior, Canna. Arundo donax siue cypria, Dodon. Arundo donax sarina, Lob. Adv. Obs. p. 28. Ic. p. 51. Calamus siue Harundo crassa, Cæf.

Ex vsta huius radice Arabum spodium paratur, tamen vt non necessarid. ita non magno incommodo. Ex hac Romæ fiunt & Colus mulierum, & vinearum radice: in Gallia sepes.

ARVNDI, PAPYRVS QVIBVS DAM, folio latissimo denticulato. CAP. CXLVI.



Papyri nomine, fragmentum rudis nec dum elaborati folii, quale ad seruo, descripsi exhibeo: latitudo est quatuor vnciarum, longitudo quanta fuerit, non queam certò affirmare: crassities triū quatuordecim foliorum chartæ nostræ: textura fungosa pedicu-

dicolorum Nymphæar, fistalis similiter directis, membrana vtrinque striata, mediocriter lauis, cœcicris, folii margines obiter denticulati, nihilque fecius medium percurrentem exemptilem coltam denticuli quidam amant.

Arundinis huius peregrinæ & pulcherrimæ portionem dedit Pharmacopœus Parauinus ad aquilam, cui congener videbatur Arundini maxima.

ARVNDI ANGLICA FOLII IN SVMMI
tate dissectis C. Bauhini.

CAP. CXLVII.

Arundo inodora 3. (vt vocat Autor in pin.) vel (vt in prod.) Arundo 2. siue Anglica foliis in summitate dissectis: foliis est cubitalibus, duratum, triūne vnciatum latis, neruis aliquot, per folii longitudinem excurrentibus & eluatis: foliis in summo in duos, tres, & quatuor apices diuisis: hanc D. Gargillus ex Anglia misit.

ARVNDI SCRIPTORIA.

CAPVT CXLVIII.

Illustris D. Carolus Rym. ab Eckenbeken, nobilis Ganduensis, vir doctus, ex legatione ad Solimannum magnum, Cæsaris Maximiliani nomine reuersus, inter alia multa peregrina Constantinopoli relata, calamos aliquot mihi (Lobel.) communicauit Arundinis scriptoriæ, cuius etiamnum hodierna die ad scribendam vsus est Constantinopoli & in Græcia. Crassiores hi calami non sunt anserinis aut olorinis pennis, præduri, coloris tulli, extrinsecus obsecutioris, laeuore polito veluti splendentes, intus albi, in assulas fissiles, vbi rumpuntur: internodia dodrantalia aut pedalia, articulis adnascuntur albæ ligulæ, Lob.

Lob. plant. icon. p. 52. *Fistula vel Syringa & Arundo scriptoria*. Eid. pin. hist. Belg. p. 71. *Nier om te schuren*. Anguillapist. 4. *Canna 3. Calamus scriptorius an syringa?* Tabern. icon. *canna fistularis, Schreiber ried / Schreibrohr*. Hist. *arundo scriptoria, arundo 6. Συγγιας aut χαλαρος συγγιας*. Arundo fistularis, canna scriptoria. Gerard. Arundo scriptoria Curesie weiten Reede.

C. Bauh. pin. *arundo inodora 4 siue arundo scriptoria atro-rubens: χαλαρος συγγιας* Dioscor. συγγιας Theophr. *syringias fistularis arundo 3*. Dod. gall. *Harundo fistularis Amati*.

ARVNDINIS SCRIPTORIÆ INDICÆ GENUS SPADICEO COLORE.

CAP. CXLIX.

Indicæ Arundinis nomine, calamos conuictos Iaffero, scriptoriæ affines, vt qui in eum vltimo pulchre aptari possunt, quemadmodum periculo facto me docuit experientia: internodia dodrantalia: crassitudo quæ vallatoris nostrati: color foris spadiceus siue rufus, intercuratibus subinde maculis albicantibus, politis laeuoris, iatus albicant: parietes quam in Phragmite crassiores, assilulose franguntur.

ARVNDI NASTOS SIVE FARCTA
crassa & maior.

CAP. CL.



LOb. Adu. Ic. p. 52. & Hist. Belg. p. 71. *arundo Nastos* vel *farcta*, *Toxicos* Theophrasto. Tabern. icon. & Hist. *Nastos 3. pfeilrohr*. Eid. & *Arundo 5*. C. Bauhin. pin. *Arundo inodora 5* siue *arundo farcta maxima atrovirens*, qua *Principes pro scribendis vtiuntur χαλαρος νεος, Dioscoridi, χαλαρος νεος*, Theophrasto. *Canna Indica*, aliis quibus *Papyrus*, *Matr. Ital.* Can-

na prima species Dioscor. Ang. *arundo Indica & prima*, Dod. gall. *arundo Indica*, cum teres sit, *Papyrus Antiquorum* non recte statuitur, *Guiland. Lunus, Pappi aegyptia canis, Amat. Nastos*, vel *farcta*, Lob. icon. *tertia*, Tabern. *Nastos Classis*, Ger.

ARVNDI NASTOS SEV FARCTA TOXICA FIGURATA.

CAPVT CLI.



Hanc videlicet nobis contigit apud Cl. Dom. Platerum, cuius etiam frusto palmati liberali nos donauit manu. Sesequipedalis est bacillus vtrinque sectus, vt neutiquam integrum esse facile fuerit animaduertere, enodis, crassitudinis vitæ furculi mediocritas, ferratis impressionibus eleganter

donatus, quæ ferræ eminentiores reliqua parte, saturatioris, ac ferè spadiceæ, laeues, superficie tenus lucentes. Reliqua pars pallidior est. Tota quoque zonulis nigis denso ordine politis cincta est. Lignosa alioqui eius est substantia ac intus circa medullam secundum longitudinem porosa. Odorem nullum in sicco & euasido frusto deprehendimus.

De Arundine Nasto Lobel. hæc scribit: *Sciurus Arundinis Antuerpiæ & alibi mercatores quodam, qui pro*

Sf 3

scipione vntur Arundine quadam pulcherrima, crebris geniculis distincta, admodum facta, lignosa, dura, recta, leui, micante, rufa, colore spadiceo & obliuore secundum longitudinem variegata, discurtantibus hinc inde lincis crispis, densiculos serrae figurantibus, aspectu pulcherrimo. Et hanc & praecedentem, pulchritudinis, raritatis, leuitatis, commoditatilque ergo argento consueuerunt circumdare. Crassissima aequat Arundinem quae Donax nuncupatur. Vtramque nobis communicauit, nostri rerumque exoticarum & stirpium studiosissimus Iohannes Douue, alias Vogelshack, cuius Antuerpiensis.

Synon:

Lobel. Icon. pag. 53. & Hist. Belg. p. 72. *Indiansisch Nict / Nafos* siue facta altera toxica, crebris geniculis cincta, qua etiam pro scipione & iaculis vntur. Tabern. Icon. *Arundo facta*. *Canna* siue calamus sagittalis, *Indiansisch gesült Rohr / pfeilrohr*. Hist. pag. 703. *Arundo facta* seu *Nastos*. i. Arundo 1. Dioscoridos *αροστρον* vnde Theophr. *αροστρον* *αροστρον* *Calamus factus*, *Harundo facta*, *calamus toxicus*, *Harundo toxica*, siue enodis, *Canna facta*, siue sagittalis. Casp. B. pin. *Arundo inodora* 6. siue Arundo facta geniculata siue sagittalis. *Nafos* & *Arundo prima*, Dod. gall. *Nafos* huc facta altera toxica, Lob. icon. *Arundo facta* seu *Nastos*. Tabern. *Calamus sagittalis* Ger. In Bali Insula, gestant Cannas sagittiuomas, ex quibus teretes exilique sagittulas ex Arundine fabricatas [an ex praedicta arundine?] in apice vero intoxicatas, cillant : in in hist. Ind. Orient. part. c. 39.

An *Harundo* versicolor?

An *Harundines* versicolores, quibus, referente Chr. Columb. nauig. cap. 94. in contignationibus.edium Canibalarum pro trabibus vtebantur, mira arte textis complicatilque.

An *Harundo* diuinatoria Incantatorum, regis Tartarorum *Chinchis*?

An hanc Arundinem intelligit M. Paulus Venet. l. 1. de regn. Ot. cap. 53. Chinchis Tartarorum Rex (cum castra posuisset in planitie quadam magna *Tanduc* nomine, proficiscens hostili animo contra regem *Vncham*) praecipit Incantatoribus & Astrologis suis, vt illi indicarent qualem euentum praelium futurum esset habiturum : Tunc Astrologi sciendentes Arundinem per longum in duas partes, posuerunt diuisiones ipsas in terram, vnamque vocauerunt *Chinchis* & alteram *Vncham*, dixeruntque regi. Interim quo nos inuocationes legerimus Deorum, nutu ipsorum fiet, vt haec duae partes Arundinis ad inuicem pugnent. Et cuius pars super alteram ascenderit, ille Rex victoriam in praelio obrinebit. Multitudine itaque ad spectaculum illud concurrente, caeperunt Astrologi murrare precationes suas & legere incantationes, & mox commotae sunt partes Arundinis contra se pugnantes, donec tandem pars *Chinchis* ascenderet super partem *Vncham*. Quo viso, Tartari de futura certiores facti victoria, confortati sunt. Tertia igitur die praelium commissum est, & multis vtrinque cadentibus, victoria tandem penes *Chinchin* remansit. Sicque factum est, vt Tartari regnum *Vncham* penitus subiugarint.

An *Harundo* quindecim passus?


An eadem cap. 65. Arundo quindecim passus in longitudine habens, & in ipsitudine tres palmos; ex qua fiunt columnae, tabulae, & compagine, itemque imbricamenta. De hac Arundine idem lib. 2. cap. 36. haec scribere videtur. Nascuntur in regione *Tebeth* maximae *Harundines*, quae habent in longitudine passus quindecim : crassitudo vero in gyro tribus mensuratur palmis. Porro inter duos viciniore nodos distantia est trium palmorum. Itaque quando via-

tores noctu volunt quiescere, accipiunt faeces magno de illis Arundinibus, & in vnam ponunt congeriem, subiectoque igne succedunt : quae igne correpta incipiunt crepitare, tantisque in eis excitatur stridor, & fragor, vt eminus ad aliquot miliaria audiri possit, quem terribilem sonitum animalia cum audiunt, obstupescunt, fugiuntque tamdiu, donec crepitus ab auribus eorum euanescat, illisque sic elusis mercatores & viatores tuti pertrascant prouinciam illam. Porro equi & alia iumenta, quibus mercatores pro itinere vntur, hoc audito strepitu plurimum inhorrescunt, & multa in fugam conuersa dominis suis elapsa sunt : sed prudentiores viatores pedes eorum compedibus ligantes, vi secum ea retinent, ne territa aufugiant.

An tandem c. 59. de eadem haec reperit in flumine quodam magno ciuitatis *Singui* canabeis funibus non vntur in nauigiis, nisi pro malo & velo, sed pilorchas seu chordas faciunt de Arundinibus magnis, quibus naues quandoque per flumen trahuntur. Scindunt autem Arundines illas magnas quae quindecim in longitudine continent passus, & scissuras colligantes, & contorquentes, funes longissimos faciunt, vt quidam longitudinem contineant trecentorum passuum. Et sunt pilorchae illae fortiores funibus canabeis. Caeterum, remis & malo nauis *harundinea* vntur circa *Calecut*. *Harundo* arcus & teliloco succedit militibus vrbis *Indiae* *Tarnafari*. In *Insula* *Zaylon* lanceae, acenis gladiique vicem supplet *Harundo*. An de praedicta Arundine sunt iam dicta intelligenda?

ARVND O NASTOS SEV FARCTA, siue Toxica, gracilis & plicatilis.

CAP. CLII.



Antonius AbAchele (autor est Lob. Belg.) Cayro Aegypti reuersus, inter alia rara, pulchram attulit Arundinem, gracilem, plicatilem, quae adnecta dicebatur ex Orientali India, per Adem & mare rubrum, Sionem [Belg. Ziden] prope Mecham, & tandem Cayrum &

Alexandriam Aegypti. Recta est, leuis, splendida, coloris laeui, lignosa, dura, facta, haud secus ac illa quae pro scipione est, crassitudine calami aromatici, aut Arundinis scriptoriae : genicula duodenis, terdenis & quaterdenis pollicibus inuicem distant. Superficies squammata serpentium dorsum emulatur : nec odorem, nec saporem habet vllum, non magis quam facta quae pro scipione vsurpatur : cuius vtriusque nec radicem, nec folia vidimus.

Lob.

Lob. Icon. plant. p. 53. *Nastos plicatilis*: Eid. Hist. Belg. p. 72. *Nastos seu farcta* siue *toxica, gracilis & plicatilis*, Anguill. epist. 4. *Canne* (siue *Arundinis*) *species tradita à Diof.* ex Syria allata *gracilis & folida*, & hæc *Nastos dicta*. Tab. icon. *Nastos* siue *Arundo farcta* 2. *Indiamisch gefült rohr* *rohr gefült nur maref.* Eid. hist. *Nastos* 2. siue *Arundo* 4.

C. Bauh. pin. siue *arundo inodora* 7. siue *Arundo farcta flava* *Zwiften & zwifgen*: Theophrasto. *arundo femina & secunda*, Dod. gall. *Nastos seu farcta*, siue *toxica gracilis & plicatilis*, Lob. icon. *Nastos secunda*, Tab. *arundo farcta*, & c.

Ind. Orient. part. 2. c. 78.

C. Bauh. pin. *arundo indica* 3. siue *versicolor*.

Arundo Ind. versicolor C. Bauh.

ARVND INDICA VERSICOLOR flexilis.

CAPVT CLV.

Rota vocant in Bengala, aliud genus eiusdem *Rosa* *Zora* *gala*. *Arundinis*, quod *gracilius & fuccinctius* est, *vininis ad modum flexilis*, ex quo *Calathi & alia multa pulcherrima conficiuntur*: ex Hist. Ind. Orient. part. 2. c. 18.

Arundo Indica versicolor C. Bauh.

C. Bauh. pin. *arundo indica* 4. siue *versicolor flexilis*.

ARVNDO HVMLIS, RARA, AC inuitata.

CAP. CLIII.

Quæ hoc loco depicta est *Arundo*, *Calamus* est *humi sparsus*, *graminis modo*, quod de *Arundine epigeio* prodidit *Theoph.* cortice *saluo contentus*, *lineis squammatim cingentibus distinctus*, *cauliculos alios multos vtrinque producens densa congerie stipatos*, *simili cortice, similitèrque squamoso virgatos*, qui *rursum & alios gignunt*, *prominentium veluti nodorum aut oculorum modo exertos*, *plures superiore parte quæ terram non attingit*, *pauciores inferiore quæ terræ insternitur*, *aspectu pulcherrima*, *densissimâ illâ tenuium cauliculorum furculorûmque congerie*, *cùm cætera Arundines folia tantum hinc inde mitant*, *illos autem prætereæ vel furculos vel calamos: folium nostræ Arundini simile à nodis exoritur*, *sed numerosius magisque multiplex*, & *plures complexu inuolucrorum per ambitum tuicas inducit*. Hæc *Arundo* *pumila in faccis magnis Costo arabico & Zinzibere plenis aliquando reperta*, *veluti rara ac inuitata*, *hæc doctis & rei herbariæ studiosis spectanda proponitur*, inquit *Author Hist. Lugd.* qui *Arundinem epigeion* p. 1000. inscripsit.

Gesm. hort. dicitur *Arundo humilis*: Item *Copia elegia Ollingeri*. *Suspiscatur autem Copia* vocabulum esse *corruptum*, ac *pro eo legendum CANNA*, id est, *Arundo*. De hæc *Plinius lib. 16. cap. 36.* *per obliquam Arundinem*, non in *excellitatem nascentem*, sed *iuxta terram fructicis modo se spargentem*, *suauissimam in teneritate animalibus*, à quibusdam *Elegiam* dictam, *locutum fuisse arbitratur*. Non interim *negat posse Chamæcalamum appellari*.

C. Bauh. pin. *Arundo inodora* 8. siue *Arundo repens*: Cæf. *Arundo* 3. in *maritimis*.

ARVND INDICA VERSICOLOR.

CAP. CLIV.

Canna de Bengala *Lusitanis*: in *Regno Bengala* *crefcunt Arundines versicolores*, *medullâ plenæ*, *crassitudine Arundinibus Hispanis similes*, *pauld tamen tenuiores*: *virides adhuc lentæ inscæduntur*, *ad stanni modum*, aut *instar Salicis*, *foris punctis versicoloribus notatæ sunt*, *haud secus ac si arte ita pictæ forent*. *Vtuntur iis in Lusitania mulieres ventilæ pro scipionibus*, quibus *gressus tibæbanes sustinent*, *quarum varia genera apud Doct. Paladano videre est*: in hist.

Tom. II.

ARVND INDICA PVNICEA MOLLIS.

CAPVT CLVI.

Arundo, vel *Scirpi* potius *genus puniceicoloris & mollis*, quam *parumper contortum*, *arui pro neruo adaptant*: nascitur in *Regno Congiano*, & in *regno Bengala ad Gangen fluium*, in Hist. Ind. Orient. part. 1. cap. 5.

Arundo punicea mollis C. Bauh.

C. Bauh. pin. *arundo indica* 5. siue *punicea mollis*.

ARVND INDICA VOLVBILIS.

CAP. CLVII.

Arundo *Indica in insula Sumatra*, *variè se circa arbores vinciens*, *centrum, ducentarum, imò trecentarum*, & *plurium Orgyrum longitudine*, *ita vt vix eius origo finisve deprehendi possit*, *circulis vasariis conficiendis*, *valde accommodata*: ad *Clusij curas* postest.

Arundo Ind. volubilis C. Bauh.

C. Bauh. pin. *arundo indica* 6. siue *volubilis*.

ARVND INDICA FLVITANS.

CAP. CLVIII.

Trembas siue *Arundineta fluctuantia* in *Bali insula*: in *Hist. Or. Ind. part. 3. cap. 2. & 40.* & *part. 4. fig. 10.* *pinguntur*. *Arundines longæ seu Algæ in salo fluctuantæ*, *par. 5. Ind. Orient.*

ARVND INDICA LATIFOLIA.

CAP. CLIX.

Hex *primùm vnus*, deinde *plures stolones* *Descripsi* *ex eadem radice prodeunt*, *cubiti vnus*, *interdum duorum aut trium altitudine*, *digiti crassitudine*, *geniculate Arundinis modo*, quos *circa genicula ambiunt folia multa*, *ampla*, *transuersis hilis neruosa*, *foliorum Musæ arboris specie*, *sed tenuia*, *herbaceo virore pallefcentia*, & in *extremo acuminata*, *quæ cùm primùm erumpunt characeorum corniculorum modo conuoluta conspiciuntur*, & *gustata herbaceum quandam saporem referunt primùm*, qui *paulo post nonnihil acrimonie admixtum* habet. In *summo caule sunt flores*, *gladioli floribus formâ similes*, *colo-*

re phœniceo pulcherrimè nitentes, capitulo cui-
dam hirsuto inhaerentes, quod cum flore non-
dum aperto cancri seu locustæ marinæ chelam
quadantenus representat, floribus dilapsis aut
marcidis, capitula ista auferuntur, fiuntque trian-
gula, & veluti spinosa, fructus ricini modo, in
quibus semen per maturitatem fuscum & atrum,
rotundum: radix nodosa, crassioribus fibris stipa-
ta, ex cuius nodis aliis adnascuntibus radices a-
liæ procurantur, marti similes, inquit author
Hist. Lugdunen. duas effigies proponens. Est
autem *Arundo*, seu *Canna indica* nominata, quo-
nam ex America primum delata fuit, & eius ito-
lones Cannarum seu Arundinum ritu genicula-
ti sunt, à nonnullis quia eius flos nondum aper-
tus cancri chelas colore & forma refert, flos can-
cri, ab Hispanis & Lusitanis *Cuentas*, à numeran-
do quòd ex istius fructu, vt ex tenellis & deci-
duis malis Arantii, spherula precatoria fiat, ab
aliis *Cannarus*, ambiguit inter Cannas & Aco-
rum naturæ.

Synonyma Casp. Bauhin. pin. *Arundo indica* 9. siue *latifolia*:
Canna indica, Gein. hort. Clus. Hist. [cui & flos
cancri nonnullis] Cam. Cal. *rubra* Eyst. *A-*
rundo indica florida, Ad. Lob. & *Canacorus* quo-
rundam. *Papyrus*, Cast. *gladiolus indicus*,
Cam. ad Matth. *Arundo* seu *Canna indica*, Lugd.
Arundo indica latifolia siue *florida*, Tab. *Harun-*
do florida, Ger.

Locus. In Lusitania monasteriis quibusdam frequen-
tem vidit Cluius etiam media hyeme flo-
rentem. Hodie multis aliis in locis feritur & co-
litur à rei herbarie studiosis in fictilibus, aut li-
gneis dolis, vt Soli meridiano facilius exponan-
tur: quoniam calore & apricatu valde gaudet,
alsiosaque planta botæ: statû & frigore maximè
læditur. Huius folia esse putant, quibus massas
gummi elemi obuolutas videmus in Scythiis.

ARVNDIO INDICA LATIFOLIA, FLO-
re luteo punctato.

C A P. CLX.

Descr. EX radice nigricante, nodosa, & fibris cras-
sioribus donata, aliisque nodis adnascentib.,
caules plures sequicubitales, crassi, Arundinis
instar nodosi, prodeunt, circa quos folia pallide
virentia, expansa, lata, in acumen desinentia, ner-
uosa & tenuia: quæ cùm primum ante caulium
exortum nascuntur corniculorum chartaceorum
modo connolura existunt. Cauli, flores gladioli
floribus forma similes, coloris lutei, punctis as-
persis variegati, capitello hirsuto inhaerent,
quod flore delapso augetur, subsæperum fit, & se-
men nigrum subrotundum continet. Hæc vt om-
nibus suis partibus, ita & semine minor est
quam ea quæ florem minii coloris habet.

Synon. C. Bauh. prod. *Arundo* 3, Eid. pin. *Arundo indica*
10. siue *Arundo indica latifolia* flore luteo pun-
ctato: *Canna indica* lutea rubris maculis puncta-
ta, vel flore croceo guttato, Eyst.

Locus Hanc in horto habet C. Bauhinus, in olla co-
lit, hyberno tempore in cellam repo-
nit, quæ primo vete plures cau-
les, antiquis relictis pro-
fert, & lulio mense
floret.

* *

GRAMEN LONGISSIMUM,

C A P. CLXI.

D Vorum, trièrue cubitorum altitudinem ad-
nunquam superat, foliis & caulibus tenuibus,
triangularibus pluribus, ex radice crassiuscula
perenni, nigricante, fibrosa, panicula parue, vix
vinciales, in aliquot veluti paruas spicas diuisa:
flosculi ex apicibus luteolis: sapor nullus in-
signis.

C. Bauhin. Phyt. *Gramen* 15. siue longissimum à
fratre 10. Bauhino ostensum. Non inuenio hu-
ius in pin. Casp. Bauhinum meminisse, nisi sit
eius Gramen paniculatum montanum 4. siue
Gramen syluaticum paniculatum altissimum, pro
Gramine 14. in prod. descriptum, de quo alibi.

In montibus circa Genuam cubitum excedit:
Montbelgardi in syluis duos & tres cubitos, Lc
In Sanguouia reperi in diametro cum paruis pan-
niculis breuib. florens April. Montbelgardi
vntur hoc Gramine rustici ad equorum tor-
ques, quibus aratra trahunt. Efficiuntur etiam
ex eo chlamydes pastorales, quibus opiliones ad-
uersus pluuiam vntur.

GRAMEN AQUATICVM CVM LON-
gissima panicula,

C A P. CLXII.



CALAMI
crassiuscu-
li bicubitales,
fibrarum è ge-
niculis demissis
radicantur, fo-
lis amicti la-
tiusculis, do-
drantalibus, &
lôgiorib. vagi-
na longa cala-
mum comple-
xis, à medio ve-
rò, summo te-
nus gracilescit
culmi, panicu-
lam cubita-
lem, & mino-
res numerosas
profertentes,
quarum singu-
lares vnciam
aut sesquunciam
æquant, graciles, alterno glumarum situ con-
textæ.

Gramen anatum Trago, germ. *Entengraß*. Synon.
Gramen fluitatile, & *graminis perispermatis*, *Flutgraß*: Ta-
bern. icon. & Hist. *Gramen aquis innatens*, Lob. 14.
pag. 12. & Hist. Belg. p. 14. *Gramen* 23. siue panicu-
latum aquaticum alterum Caspar. Bauhin. Phyt.
Eid. pin. *Gramen spicatum aquaticum* 1. siue
fluitans multiplici spica: *GRAMEN*
fluitatile Gerardi.

* * * *

GRAMEN MARITIMUM FLUITANS
cornutum, C. Bauhini.

CAP. CLXIII.

Gramini huic 17. in prod. vel vt in pin. vocat, Gramini spicato aquatico 3. siue maritimo fluitanti cornuto, ex radice exili capillata, culmus tenuissimus, geniculatus, cubito longior producitur: ex quolibet geniculo, folia uncea, communiter bina, culmum basiflata, instar vesicæ, ambientia, in latus sparguntur; indeque cauliculus vnus aut alter educitur, & tandem in capitulum membranaceum finit, quod in foliola bina, terna, rarius quaterna, angustissima, in latus reflexa, & cornuta desinit. Tota planta stagnis Montpeliensibus mari finitimis innatat, & gramen hoc spicatum aquaticum 3. in pin. 17. in prod.



non diuersum aut saltem valde simile eiusdem Tabern. gramen aquaticum geniculatum, de quo antè: descriptio mihi conuenire videtur, nec figura multum discrepare.

Caesp. Bauh. phyt. gramen 96. siue panicum siluest. spica nigra: Eid. pin. gramen panicum 5. siue spicis nigris: gramen panicum paruum

gerardi.

GRAMEN AQUATICUM GENICVLATVM
Tabern. digitatum, atro-purpureum.

CAP. CLXIV.



Radice est fibrosa, ex qua plures nascuntur teretes, geniculati, sesquipedales circiter calami, folia ad articulos gramineis breuibus, latis, acuminatis, amicti in calanorum fastigijs spica nascuntur longæ, tenues, digitalis licheni spicis similes, breuiores, atropurpureæ Tabern.

Tabern. icon. & Hist. itémque Gerard. Gramen

aquaticum, geniculatum, wasser Knoden gras/ Hydroglossis.

C. Bauh. phyt. pag. 3. Gramen 25. gramen aquaticum geniculatum. Eid. pin. gramen dactyloides 7. siue gramen dactylon aquaticum.

Passim in lacustribus & palustribus nascitur.

GRAMINIS DENTIS CANINI SPICA DULLA
tenuior nigra species.

CAP. CLXV.


Gramine Dentis canis primo & secundo, folia ac renuiores: panicas licheni non dissimiles, colore nigras: semen externa facie nigrum quidem, sed cortice detracto intus album.

Lobel. Hist. Belg. pag. 15. de derde soorte van panic gras. Tabern. icon. & Hist. gramen panicum. Item Ic. plant. pag. 14. Panicæ græce gramen verum. Gramen panicum 3. Tabern. idem esse eum Lobeliano satis indicat icon, suspicor ab eo

GRAMEN FLORIDVM.

CAP. CLXVI.


Folijs ad summum vsque vestitus est culmus, eum aliquotusq; involuentibus, a quo vbi recesserint, diuina vnciarum longitudine sunt, in gracile acumen desinentia, lauis & glabra panicula pulchra summam ornat stipulam, fuscuncialis, muscariis amœnis cõtexta, floretulorum radiatis complusculis foliis constantium; eminentibus è medio apiculis.



GRAMEN EQVINVM MOLLE, SEMINE
ferè Hordei, magnu.

Gramen equinum siue Hippagrostis Gesneri, Kofgrass circa Tigurum vulgo. gramen albicans, lanuginosum, molle, duos cubitos cum dimidio attingens: semine lato, satis magno, vt Hordei ferè. Retert ille in pratis nasci, sed parè. Habet hoc Camer. ex horto Nobiliss. viri D. Georgij Retzelij, vbi spontè inter cetera gramina proueniebat.

Synoni



GRAMEN ALPINVM RABINVM DICTVM,
folijs carnosis, non apparentibus neruis:

CAP. CLXVII.

Gramen alpinum quoddam Rabinum cognominant Lactarij, id est; præcipuum, folijs breuibus, carnosis (non apparentibus neruis,) circa radicem radiatis in orbem pluribus Gesneri non diu vidit: Pecori eius pabulo lactis copiam plurimum augeri aiunt, referent Gesnero de hort.

Gramen alpinum Rabinum Gesneri

De hoc Lob. in Adu. hæc scribit: gramen Rabinum vel Rauissium montanum, folijs Veronica caryophyllata. Saginæ & lactis vbertari omnium latidatissimum: Montium atcola opiliones Sabaudi & Heluetij Rabis vel Rabinum, quasi præstantius & præcipuum, dicunt: folijs autem est crassioribus, carnosioribus, breuibus, montosis, vdis Angliæ & Heluetiæ familiare. Lobelius

Gramen Rabinum vel Rauissium non tantum, Lob. bel.

Lob. nigr.

non se explicat in Obsera. In iconibus proponit figuram cum hac inscriptione. Gramen spicatum foliis Veronicæ Caryophyllatæ. An aurem Rabinum intelligat nescio: Tabern. & frater C. Bauh. ab eo separant.

Synonyma
reliqua.

Tabern. Hist. p. 641. *Gramen Rabinum* Rabinus nigras & pag. 463. *Gramen* 24. Rabinus gras Gesnero. Nobis dedit Guill. Turnerus, ei autem missum erat ex Heluetia, nec unquam licuit virens videre ad picturam, folia alioqui sunt Gramini caryophyllo valde similia, nisi essent maiora & longiora. Item pag. 645. *Gramen Rabinum* & Rabinum dictum quia opilionibus magistratæ Gramen, id est, nobilius & melius inter alia pro cibo & impinguatione pecudum.

Casp. Bauhin. Phyt. *Gramen* 54 & *Gramen Alpinum præcipuum*. Gesnero *Rabinum*. Eid. pin. *Gramen spicatum montanum* 8. siue *Caryophyllatum alpinum*.

GRAMEN MONTANVM SPICATVM
flore herbaceo, caule enodi.

CAP. CLXVIII.

Descrip:



Gramen montanum spicarum Clusio, multis capitibus ex radice digitalis crassitudinis, bifida in rerdum & trifida, multisq; tenuibus fibris supremâ parte hirsutâ, prodeuntibus constans, quorum singula proferunt tena aut plara oblonga crassa & nonnihil carinata folia, Caryophylli

illius, quod vulgò Gramen marinum maius cognominant foliis valde similia, in sumâ sede sese inuicè amplectentia, gustu amariuculo & acriuculo, ex horum medio dodrantalis nonnuncquam & pedalis exit cauliculus, firmus, læuis, nudus & enodis, qui summo fastigio, multos flosculos, spicæ instar, congestos, herbaceo que colore præditos, profert.

Synonyma Tabern. icon. *Gramen siluaticum* 2. waldgras / prouenit in pratis montis Hercinix sylæ supra Denmersberg.

Casp. Bauhin. Phyt. *Gramen* 69. siue *spicatum fertum & montanum*: Eid. pin. *Gramen auenaceum* 1. siue *Gramen montanum auenaceum spicatum*: *Gramen marinum spicatum alterum*, Gerard.

Locus.

Inueniri inquit Clusius in montanis quibusdam pratis, duobus supra Badenses thermas, miliaribus. Similem autem in Flandriæ maritimis frequenter legere meminisse, quod vulgus, ni memoria labitur, Suden appellaret.

GRAMEN HIRSVTVM ANGVSTIFOLIUM
maius, C. Bauhini.

CAP. CLXIX.

EX radice exigua fibrosa, rufescente, culmus vnicus, cubito altior, vt plurimum læuis, exurgit, in cuius summitate panicula alba, mollis, leuiter sparsa, ex multis laminulis composita, in quarum qualibet *semina* minuta, subnigra & subrotunda: *foliis* est paucis, angustis, palmaribus & villosis, aliquot culmum cingentibus: ipsi verò paniculæ, vtrinque folium tenuissimum subicitur, quorum alterum panniculam superat, alterum non aequat. Prouenit in paludosis pratis Michelsfeldensibus.

Gramen hoc 47. in prod. siue *Gramen nemorosum hirsutum* 5. siue *angustifolium maius*. *Gramen* 79. (inquit in Phyt.) multum habet similitudinis cum icone Graminis nemorosi Dalechampii: plus verò cum eiusdem Gramine Leucanthemo, & tamen diuersum vtrunquo habeo.

GRAMINI LVZVLÆ AFFINE
flore albo.

CAP. CLXX.



Perennis vitæ Gramen, foliis ead ad Graminis Luzule siue nemorosi folia accedentibus, consimiliter pilosis: arculi maiores, cubitales: florum manifestum discrimen, ii siquidem in summo fastigio albi sunt, festucæ, cum in altero non in festucas, sed in capitula delinunt, seu paruos calyces semina claudentes, coque nigricantes, cum huius festucæ albescant. Luzulæ modo quosdam habet pilos, qui etiam facile decidunt, à nostro pictore in sicca planta non obseruati.

H. Lugd. 426. *Gramen Leucanthemon Dalechampii*. Figura non placet, quia desunt pili. Casp. Bauh. phyt. *Gramen* 70. *Gramen hirsutum paniculis albis Aeschimon Plouii Guilandino*. Eid. pin. *Gramen nemorosum hirsutum* 6. siue *angustifolium minus paniculis albis*.

Gramen hoc prouenit Geneuæ in nemoribus, vt in colle *la Basse* florens Maio & Iunio.

GRAMEN RORE LVCIDVM NEMORENSE, siue Luzulæ.

CAP. CLXXI.

Gramen lucidum, radice nititur magna, fibrosa, geniculata, ruffa, sapore cum leui dulcedine

cedine adirringenti, culmo cum flore dodranta-
li, folio vno aut altero amplectente donaro: spi-
ca; temæ, quaternæ, aut quinæ breues, ex qui-
bus vna fecilis, reliquæ pediculis femuncialibus
& vncialibus appendæ: flores linguli folioli sex
radiatis spadiceis, totidemque staminulis luteis,
vmbilicòque virente, stamen nigrum profere-
te, contantes, quibus capitula succedunt trique-
tra, semina terna minuta continencia. Folia qua-
drantalia aut palmaria rigidiuscula, acuta, surre-
cta, extrosam striata, glabra, at in lateribus lon-
ga, canã, teneraque lanugine in folium etiam to-
tum vtrinque incurrente obrita: ista lanugo vel
pili qui facillè decidunt tacti, colligunt rorem
qui splendet noctu irradiantibus stellis vel Luna,
ita vt sit admirationi videntibus: herbam perqui-
rentes, decedente rote inuenire non possunt.

Gramen hirsutum neinosofum Lob. icon. pag.
16. & Hist. Belg. itémque Ger. *Gramen sylvaticum*
4. siue *pilosum* Taber. ic & histor. *Combratum* Plin-
ius, & *Herba Luzula Ittraria*, Anguill. epist.

An Gesu. hort. Cypirella Cordi? Holostridium
quidam docti, sed imbecillà coniecturâ, augura-
bantur, longè verius, Lobelij iudicio, coniecturi:
si Ischemon Plinianum dixissent.

C. Bauh. phyt. *gramen* 77. Eid. pin. *gramen ne-
mosum hirsutum* 1. siue *latifolium minus*. Item
gramen nemorosum hirsutum 2. siue *latifolium mi-
nus, magnitudine potissimum differens: datur & hu-
ius maius & minus.*

Lugduni provenit *au bis de la belle Allemande*.
Basilea Frater obseruavit in pratis Munchen-
stein. Geneuæ incipit florere mense Martio.

GRAMEN LVZVLÆ MEDIVM.

CAP. CLXXXII.



Radice do-
natum fi-
broso, pro plan-
tæ portione fa-
tis crassa, minus
autem profun-
dè radicatum:
calamo recto,
geniculato, scf-
quicubitali, in
summitate cum
p amine Luzu-
læ maximo la-
tam producen-
te Iunci pani-
culam, in vagi-
nis longiori-
bus, quam la-
tioribus, semen
continentem
album; acutum:
Foliorum ma-
nifesta discrepantia: ea siquidem quæ ad articu-
los excurrunt, angusta: quæ verò circa radicem,
quæ terrâ emergit, conspicuntur, semunciam
lata sunt, sed acuminata ambo, pedemque longa,
Collegimus florens Maij principio in valle
Griesbachianæ acidorum fontium, vidimusque
inter fratris C. Bauhini plantas siccas.

GRAMEN LVZVLÆ MAXIMVM.

CAPVT CLXXXIII.

In frequentius est Luzula gramine paruo, ra-
dice firmatum, crassa, obliqua, nigra, nume-



Griesbachiana ad fontes acidos.

GRAMEN LVZVLÆ MINVS.

CAP. CLXXXIV.

Frequentius est hoc Luzula gramine maxi-
mo, foliis tenuioribus sursum eleuatis, angu-
stis, mucronatis, pilis & seta-
taea lanugine aliquantùm
hirsitis Calamus
exilis admo-
dum, duobus,
ditatus articu-
lis, ex quibus
folia duo vn-
cias duas lon-
ga emergunt,
vnum quidem
in calami me-
dieta, alter-
um verò in su-
premitate vbi
coma in tres,
aut quatuor
(ecu capitula)
diuiditur par-
tes, Cypero



longo inodoro syluestri pares. Radice ex libus
fibris & capillamentis barbata provenit.

Prædictum gramen plurimum accedere vide-
tur ad gramen exile hirsutum Cyperoides Lob.
An idem tamen asserere non audemus.

Collegimus mensis Maij principio florens in
valle fontium acidorum dicta Griesbach. Locus & Temp

GRAMEN EXILE HIRSVTVM, CYPE-
roides Lob.

CAP. CLXXXV.

Minus est Gramine aquatico echinato cype-
roide, alioqui culmis & foliis, hirsutis ta-
men, ac sapore simile constat flores breuioribus sunt,
confertiores, compactioresque; luncorum mo-
do, coloris ferrugineis: radices itém ista
dicto non absumiles: Descriptio

S. 207.



Phyt. *Gramē*, 71. siue *hirsutum cyperi panicula*: Eid. pin. *Gramen nemorosum hirsutum* 3. siue capitulis Pyllyi. *Cyperella Cordi* & *Pseudocyperi* species pumila, Gcfu. hort. *Gramen exile hirsutum cyperoides*, Lob. icon. *Gramen cyperinum pilosum*, Tab. *Gramen nemorum Dalechampi* Lugd. *Gramen exile hirsutum*, Ger. Variat foliis latioribus & angustioribus.

Locus.

Inuenit Lobel. locis sabulosis, eosdemque habet natales, cum Gramine aquatico echinato cyperoide. Tabern. prouenire ait locis humidis, arenosis, herbosis in Ostwaldt secundum vias & potissimum propè pagum Erlendach.

GRAMEN NIGRO-LUTEVM VERNVM

CAP. CLXXXVI.

Descriptio



mari & minori: *solia* culmo longiora, *Cyperi* foliis similia, angustiora: radice nectur lignosa, satis crassa, reptante, circa quam quæ terra emergit, densum quasi capillitium conspicitur ex foliis veteribus marcescentibus, & in fibras tenuissimas facessentibus: Hoc sanè Gramen videtur mihi non parum variare ratione loci vbi prouenit, quale descripsimus sicissimis prouenit

Cum hoc Gramine in multis conuenit Gramen nostrum Luzule minus, quod an idem sit, affirmare adhuc nobis non licet.

Lobel. descriptionis auroti in Hist. Belg. pag. 16. & Plant. icon. p. 15. *Gramen exile hirsutum Cyperoides*. Tabern. hist. & icon. *Gramen cyperinum pilosum*. C. Bauh.

in pratis, non nimium humidis maius crescit, & idem fortè cum Gramine cyperoide.

Effigies Lob. ic. Plant. pag. 10. sub titulo *Graminis spicati Veronica*, *Caryophyllata*, exhibita, non malè conuenit cum Gramine nostro nigro luteo, quod insignite variat, verum si ponit eam figuram pro *Gramine Rabino*, quod in Adu. dicit esse foliis *Veronica* *caryophyllata*, diuersum erit à nostro Gramine: quibus notum erit erit Gramen Rabinum iudicent. Tabern. & Frater Casp. Bauhin. separant à Rabino.

Tabern. Icon. & Hist. *Gramen caryophyllum*, *Küglin gras*. Eid. Hist. *Gramen* 23. Figura apud Tabern. eadem cum Lobeliana: si (quod perhibet Tabern.) verum est, suum Gramen esse culmo rotundo, laui, sine foliis, non erit nostrum. Sed potuit descriptio parari ex icone Lobelii, in qua nec anguli, nec folia in culmo apparent.

Casp. Bauhin. Phyt. *Gramen* 52. Eid. pin. *Gramen cristatum & spicatum pratense* 6. siue Gramen *caryophyllata* foliis, spica diuisa. *Gramen spicatum foliis Veronica*, Lob. icon. *Graminis liliacei obtusi* 4. species Thal. *Gramen nigrum*, Lugd. *Gramen caryophyllum* Tab.

Reperitur maius in pratis humidis, minus in siccis.

Generæ floret Martio: Montbelgardi etiam April.

GRAMEN FOLIIS CARYOPHYLLÆI
floris, angustifolium, C. Baulini.

Hoc à priori differt [putat à Gramine *Caryophyllæo* eius latifolio quod 52. Gramen est] foliorum angustia, dein & cauliculis, qui in hoc & tenuiores & longiores quam in priori sunt.

C. Bauh. Phyt. *Gramen* 53. & Gramen foliis *Caryophyllata* (malim *Caryophyllæi* floris dicere) angustifolium.

In montosis Muræta locis Maio florens obseruauit frater Casparus.

GRAMEN CYPEROIDES CVM
panniculis nigris.

CAP. CLXXXVII.



Enicula. *Enicula* incedunt, & proximè radices crassiusculæ *Cyperi* longi radicibus similes, a quibus pendent fibræ crassiusculæ: *solia* leuicubitalia & cubitalia, carinata, *Cyperi* patia, caulis triquetrius, duobus cubitis non raro altior, enodis, ceteroqui nudus, per

per fastigia foliis aliquot ipsius cacumen haud paulum separantibus donatur: à quorum sinu panicula vel spica quaedam emicant, duam triumve vincturam, ex obscura purpura nigricans, triquetris loculis congestis semen cuiusdam figura, durum, nigrum comprehendens: supremam verò spicam, veluti summam perfectionem, nondum assecuta, è squamis spadiceis striatis atque glumis inanibus mollibus contextantur. In hac planta mihi viderat non parum ludere pro ratione loci, nec certus sum an cramen nostrum nigroluteū in hanc degeneret loco humidior: Hoc enim vt illud reliquias veterum foliorum multas habet, sunt ambo perennes planta.

C. Bauh. phyt. *gramen* 55, siue spicatum folio triangulo: *gramen vulgare cognatum Tragi*: *gramen triangulum*, H. Lugd. p. 1004. Item, *gramen* 56, siue spicatum latifolium caule triangulo. *gramen cyperoides* Lob. Obs. p. 10. Ic. p. 11. Nullum intercedit inter hæc gramina discrimen, ideoque non separanda, vel ipso C. Bauhio subscribente. *Gramen cyperoides* 1. (inquit in pin.) siue *gramen cyperoides latifolium spica rufa*, seu caule triangulo, est craminis 4. genus Tragi, *gramen cyperoides* Lob. Cam. Tabern. Ger. & H. Lugd. p. 433. cui & *gramen triangulum*, p. 1004. & *Carax Tragi*, p. 1007.

Ceterum, signa, cui apud H. Lugd. titulus est *gramen triangulum* fuit Dalechampij, ita denominantis plantam. Porro, vbi Tabern. obseruauit *Cyperoidis* craminis caulem rotundum, nescio: nisi fortè in figura Lobelij ita pingatur, quod in multis plantis euenit: nec ita facile in omnibus iconibus plantarum anguli exprimi possunt, nescio qua in re *gramen* Tabern. Typhinum ab hoc differat.

Tiguri videtur *Horrens* Maio, Gesnerus vocabat *Cyperum* adulterium: maximum obseruauimus Maio *horrens* iuxta flumini radicibus crassis reptantibus, tale quid pinxit Hist. Lugd. habuimus Lugduni à Dalechampio. Montebeldardi abundat.

GRAMEN CYPEROIDES LATIFOLIUM
spica spadiceo-viridi maius C. Bauh.

CAP. CLXXVIII.

Gramen hoc 40. C. Bauh. in prod. *Gramen* *verò Cyperoides* 2. in pin. radice est oblonga, multiplici, rufa, mirè capillata, canibus triangulis, cubito minoribus: *folijs* Arundinaceis, pedalis, & quàm in vulgari angustioribus: *spicis* ternis, quaternis, rarius quinis, alternatim succedentibus, angustis, trium, quatuorve vnciarum longis, coloris spadiceo-viridis, quarum prima semper folium oblongum angustissimum subiicitur.

Hoc in humidis ad Sellam nouam Montispeulii primùm vidimus: dein ex Lusacia à D. Franco *graminis Sprau volderis* nomine accepimus.

GRAMEN CYPEROIDES ANGVSTIFOLIUM, spica spadiceo viridi, minus, eiusdem.

CAP. CLXXXI.

ET hoc auctori in prod. *gramen* 41. in pin. *gramen cyperoides* 3. in phyt. *gramen* 57. siue *cyper-*
Tom. II.

roides angustifolium, differens à Cyperoide Lobelij positumum foliorum forma, quæ in hoc duplò angustiora, acutiora & longiora.

Ceterum, radice est breuiore, sig. iostore, parum fibrosa, & rufa: caule triangulo, pedali, *folijs* angustis, duris, sempalnaribus, in acutiem definitibus: *spicis* aliquot angustissimis, oblongis, spadiceo-viridibus, alternatim dispositis, & pediculis longis capillaceis insidentibus, quod Apulii mense circa Birsam reperitur. Aliquando tamen altius exurgit.

Descrip.

GRAMEN CYPEROIDES ANGVSTIFOLIUM, spicis longis erectis.

C. Bauh. pin. *Gramen cyperoides* 4. siue angustifolium, spicis longis erectis: *gramen palustre maius*, Lob. icon. quid?

GRAMEN CYPEROIDES VVLGATIVS aquaticum.

CAPVT CLXXX.



Gramen Cyperoides *vulgatius* aquaticum tres, quatuor, nonnunquam plures profert radices, longas, nigras, vnciam crallas, *Cypero* longo similes: *Folia* etiã similia, quæ non solum è radice, verum è culmi quoque nodis excreseunt. *Caulam* verò triangularem, cubitalem: *Flores* dense spicatos, quos subsequuntur spicæ quandoque simul quinque ferrugine clare, Tabern.

Descrip.

Synon.

Gerard. & Lob. Icon. p. 20. *gramen cyperoides aquaticum*, vulgatius. Tabern. icon. & H. *gramen cyperinum maius*, *Gros Cyper grass*: Eid. Hist. *gramen cyperinum* 6. C. Bauh. pin. *gramen cyperoides* 7. siue panicula sparsa maius: Variat panicula in altera compactiore & breuiore, in altera magis expansa & longiore.

Vbiq; in aquosis, palustribus, & stagnantibus locis reperitur.

GRAMEN TYPHINVM 3, TABERN. SPICA multiplici nigra, accedens ad Gramen cyperoides.

CAP. CLXXXI.

Radice striatum, obliqua, nodosa, vnciam & plus crassa, fibris exilibus ceu capillis ornata pluribus, à quibus *folia* prodeunt trina, longa, culmos amplectentia geniculatos, minoribus folioliis præditos, ad quorum exortus supra me-

Tt



Synonyma

diam penna longitudinem spica surgunt longæ, atperæ, atque nigra. Sapor acidus, adstringens. Tabern. icon. & Hist. Gramen Typhinū; lieschgrasß. C. Bauhin. phyt. Gramen 48. Eid. pin. Gramen typhides 7. siue spica multiplici: Calamagrostis prima Tragi descript. Cyperus typhinus Ger. Amans vborum pratorum.

GRAMEN NEMOROSVM PANICVLIS

albis, capi llaceo folio, C. Bauh.

CAP. CLXXXII.

Synon. Descriptio

Cespitibus instar Gramen hoc (45. in prod. Nemorosum glabrum 1. in pin.) existit, quod ex radicibus capillaceis, folia copiosa, viridia, pilis tenuissimis similia, pedem longa, emittit: inter quæ culmi tenues geniculati, cubitales, aliquando sesquicubitales, penè nudi in paniculam rariorem, albicanrem, palmo minorem, ex glutinis paruis aristis donatis compositam, abeunt: in Querceto non longè Michelsfeldâ copiosè prouenit.

Locus.

GRAMEN CYPERINVM NEMOROSVM.

CAP. CLXXXIII.

Descriptio



Radicem nititur fibrosa, capillari & ipsa principio exorta: folijs angustis, dodrantalib., acuminatis, foliorum Graminis vulgaris instar, iuxta quæ caules prodeunt tres, aut quattuor rotundi, angustissimi, pedem longi, quorum quisque producit spicas duas, aut tres ex luteo purpurascentes,

trium vnciarum longas.

Synonyma

Tabern. icon. & Hist. Gramen cyperinum nemorosum walde Cypres gras. Eid. Hist. Gramen cyperinum 5. Calp. Bauhin. pin. Gramen nemoro-

sum glabrum 2. siue Gramen nemorosum spica subnigra, recurua: Gram. cyper. nemorosum Tab. & Gerard.

Hinc inde in syluis, vli ginosis locis, herbaceis, & arenosis inuenitur præsertim autem tu dem Ostralde & linden felscher gemarck.

GRAMINIS CYPEROIDIS GENVS, PSEUDOCYPERUS Lobelii spicis vel panniculis pendentibus ex longis pediculis.

CAP. CLXXXIV.



Gramen de quo hic agemus solum visum apud fratrem Caspar. Bauh. panniculas fert similes Gramini cyperoidi aquatico spica nigra, verum in eo differunt, quod ex longis pediculis pendent Graminis tremuli modo, non surrectæ, spicæ paniculæ ue etiam non

nigræ in sicca planta latiores, in quibus longiusculi pili.

Lobel. Hist. Belg. p. 109. & Icon. Plant. pag. 76. Pseudocyperus wälsche wilde Galigaen.

Casp. Bauhin. Phyt. Gramen 63. siue Pseudocyperus primus δαλματικος: Eid. pin. Gramen cyperoides 5. siue spica pendula breuiore: Pseudocyperus Geln. hort. Lob. icon. Dod. Pseudocyperus δαλματικος, Thal. Gramen aquaticum, Lugd. Maius & minus habetur.

Cæterum & Pseudocyperi, seu Cyperi syluestris, altero genere hoc scribit Thalius. Pseudocyperum δαλματικον nomine, quod quidem, quoad folia & radicem [quæ huic quoque nigrescens est, crassa, & frequenter capillaceis fibris oblecta] priori simile est, sed capitulis seminum differens, quæ licet ut prius, in summo caulis ex nodoso tuberculo emittit in singularibus pediculis oblongis contenta, ea tamen pauciora, rariora, ac flauescencia sunt, & squammata. Estque hoc rursus duplicis discriminis: Pseudocyperus enim δαλματικος maior, multis in locis reperitur, foliorum magnitudine ac latitudine, caulis item proceritate τὸ πρῶτον simillimus. Minor verò radice constat parua, spadicæ, fibrata, folia continens Milio breuiora, digitalem longitudinem raro excedentia: cauliculum emittens, dodrantalem, interdum paulò longiorem, tenuem, paucis minoribus ac tenuioribus folijs ornatum, in cuius summo ex tuberculo nodoso, pauci, tenues, breues, pediculi emergunt, capitula parua, pauca raræque & squammata, spadicæ coloris exhibentem.

GRAMEN

**GRAMEN CYPEROIDES SPICA PENDV-
la longiore & angustiore, C. Bauh.**

C A P. CLXXXV.

Caulis est cubitali, anguloso, striato, foliis oblongis, angustis, basi oblonga, caulem instat tubi vestientibus, ex quo veluti tubo, spica lingulae, vncias quatuor vel sex longa, angustae, prodeunt & propendent, ipsum vero folium cuilibet spicae subiectum oblongum est.

Hoc gramen 42. C. Bauh. in prod. seu, vt in pin. vocatur, *gramen cyperoides* 6. siue spica pendula longiore & angustiore, locis humidis circa thermas Apponentes, Patauinorum crescit.

**GRAMEN CYPEROIDES PALVSTRE
triquetrum, spica integra.**

C A P. CLXXXVI.



Triquetrum Cyperti tollit caulem cubitalem & sesquicubitalem, cuius fastigium ornat spica, Panicis quodammodo similis, rariore textura, sesquicubitalis & sextantalibus, in loculis triangularibus nigricantibus, aut ex viridi rufescentibus *semen* continens Milio ferè æquale, compressius. Radices fibrosæ, perplexæ, ex deciduorum foliorum fibris comolæ: *folia* mediocriter lata, caulem ferè longitudine æquant.

Lobel. Hist. Belg. p. 20. & 29 *water wilde Galgaengras*. *gramen cyperoides palustre*: sic & in Ic. p. 19. & Gerardo. Tabern. icon. & Hist. *gramen cyperinum palustre, wasser cyperogras*.

C. Bauh. phyt. *gramen* 59. siue cyperoides palustre: Eid. pin. *gramen cyperoides* 8. siue palustre maius spica compacta: *gramen unceum triquetrum*, Thal.

Locis aquis obseruauit Geneuæ.

GRAMEN CYPEROIDES SPICIS MINORIBUS, minus compactis, C. Bauh.

C A P. CLXXXVII.

Ex radice fibrosa, lignosa tamen, folia prodeunt angusta, graminæ, palmum longa, inter que caulis sesquicubitalis, triquetrus, subasper, & magna ex parte nudus exurgit: in cuius summo spica parua, diuisa, & quasi aculeata consistit, quæ *semina* oblonga, subnigra, in aculeatum: cuspidem desinentia continet. Huius tres differentias notauimus: 1. est latioribus & lon-

Tom. II.

gioribus foliis, spicis maioribus, & ad triulum molendinarium vrbis nostræ trans Rhenum reperitur. 2. à priori rarioribus & minoribus spicis differt, & in via Riechana ad sepes crescit. 3. foliis est angustioribus, breuioribus, spicis inter duas priores mediis, quod Patavij locis humidis anno 1578. collegimus, & cum D. Guilandino ostendissemus, Ichæmon Plinij censuit, quod non probamus: idem sed per omnia minus anno 1579. Montepelluli in humidis inuenimus, quod *gramen cyperoides* nominabant. Et hæc sunt, quæ de suo Gramine (vt in prod. vocat.) 43. vel (vt in pin.) de Gramine cyperoide 9. siue spicis minoribus, minusque compactis, author prædidit.

**GRAMEN PARVVM SYLVATICVM, PAN-
niculis forma pedum autum.**

C A P. CLXXXVIII.

Numerosas, sed & prolizas habet fibras, te- Description
nues: *folia* multa, nonnihil aspera, culmum ferè æquantia, qui dodrantalis, enodis, paniculas in summo gerit rufas, partim culmo appressas, partim digitatim ab eo recedentes.

Geneuæ obseruauit in syluis. Idem reperi prope *Locus* Machin in Burgundiorum montibus, florens Maij principio.

**GRAMEN CYPEROIDES EX MONTE
Ballon, spica diuisa.**

C A P. CLXXXIX.



Folia subinde dodrantalia, & breuiora, præteritis graminis in morem angusta: *caulis* triangularis, nullo utriculo donatus, cubitalis & sesquicubitalis, paniculam diuisam gerit in summo fastigio, Cyperti minus speciosi, corrugato folio subiecto, radicibus fibræ graciles, contortæ.

Lobel. Belg. *Synon*:
Hist. pag. 19. &

20. *Nejne waterwilde Galgaengras*, *gramen cyperoides paruum aquaticum*, sic & Leon. plant. 19. & Gerardo: Tabern. Hist. & Leon. Klein *wasser cyperogras* *gramen cyperinum palustre minus*.

C. Bauh. phyt. *gramen* 60. siue cyperoides palustre alterum. Eid. pin. *gramen cyperoides* 10. siue palustre maius spica diuisa.

Gramen cyperoides obseruauit in monte *Bal-* *Locus*
lon inter Gerarmegni & Locharingiam cum suis spicis mense Augusto.

**GRAMEN PALVSTRE ECHINATVM.
CAPVT CLXXX.**

Gramini palustri cyperoidi affine, cui tamen Description
magnitudine cedit: summo *cauli* spica ad-

T t 2

nascuntur paucula, semunciam longe, viridantes, triangularibus loculis minoribus, semen triquetrum quoque continentibus, muricata, quibus supereminet summum occupans fastigium, imperfecta spica rufescentes, longior ferè duplo, vix sextam crassitudinis partem æquans, mollis, meris squammulis contexta. Radices prorsum agite, nigricantes.

Synonyma

Hist. Lugd. pag. 1003. Gramen aculeatum. Lobel. Hist. Belg. pag. 16. watergras met steefende arenegras. Eid. 16. Plant. pag. 15. Gramen palustre echinarti. Casp. Bauh.

Vaijeras.



aculeatum italicum vel maius.

Geneux & Montbelgardi in paludosis occurrunt.

GRAMEN MARINVM CYPEROIDES.

CAP. CLXXXI.

Deser.



cuius basi apposita tria folia caput superantia, porracea, albescencia, dura, palmaria: nullo vel sapore vel odore excellit.

Synon:

Lob. in Adu. Iuncus Cyperoides maritimus, & Gramen marinum cyperoides: Eid. plant. Icon. p. 27. Iuncus maritimus: sic & Tabern. Iuncus maritimus alius. Pena. Hist. Lugd. pag. 1396. sine icone: Eid. p. 1391. Gramen maritimum Dalech. imp. C. Bauh. pin. Gramen cyperoides 14. siue maritimum.

In litroribus & arenosis Narbonæ & Gallol. prouincia prouenit.

CYPERVS IN GENERE.

CAP. CLXXXII.

Cyperus (malè Gaza apud Theoph. Gladiolum conuertit) in lacu Orchomenio prouenit & vt reliqua radice numerosa adheret, nam illa deorsum versus potissimum vertitur, vireq. intendit, qua de caula vix hæc interit, & omnino genus eius vniuersum diurnum est. Radix plurimum in æqualitate à cæteris distat, quòd pars quadam crassa, carnosaque sit, quædam gracilis arque lignosa. Quin & germinatione generationeque refert: nascitur enim de ramaceo illo radice altera tenuis, iuxta latus: deinde caro rursus in eo conglobatur, ex qua sese caulis promit, qui æqualitatem quandam peculiarem sortitur, in quo positum germen est. In profundum quoque radices eodem modo demittit, quamobrem omnium maximè mori contumax, enellique difficilis est. Ei inter frutices, vt cæteris similibus palustribus harundinacea ex plantæ geniculis folia prodeunt. At verò odoris contraria ferè natura in loco est. Nam quamuis odoratus & siccus suapte natura sit, tamen viridis aut nihil olet, aut non æquè: sed eius etià vigor intelligi debet. Sapor autem, aut odor, hæc propter caulæ cognationem inferre placuit, aut iuuauitas, qua eueniat ratione lege Theophr. de caul. lib. 6. c. 16:

Cypero, quem alii Erysiocyperum vocant, Dioscorides folia tribuit Porro similia, longiora ramem & graciliora, caulem cubitalem, aut etiam maiorem, angulosum, iunco odorato rotundo similem: in cuius vertice folia parua exoriantur & semen: radices autem subsunt, quarum & vltus est, oblongæ velut Oliuæ, inter se coherentes, aut etiam, rotundæ, nigre, odorata, amaræ. Nascitur in locis cultis & cænosis. Prima est radix que grauissima est, & densa ac plena, agrè fragilis, aspera, odorata, cum aliqua acrimonia. Talis autem est Cilicia & Syriaca, & ab insulis Cycladibus petita.

Bulborum generi quidam [autorè Plinio lib. 21. cap. 17.] adnumerant & Cyperi, h. e. Gladioli radicem. Dulcis ea est, & que decocta panem etiam gratiorem facit, ponderosiorèque simul subacta. Non dissimilis est & que Theophr. vocatur gustu aspera. Cætera eiusdem generis folio differunt. Mago & Gladiolum alterum, quem Cyperon vocant, & ipsum palustrem, Iulio mensè roto secari iubet & radicem, tertioque die Sole sicari donec candidus fiat. Quotidie autem ante Solem occidentem in tectum referri, quoniam palustris. defectis nocturni rores nocent. Quidam (subdit Plin. cap. 18.) etiamnum vnum genus faciunt, Iunci trianguli, Cyperon vocant. Multi verò non dissecarunt à Cypero vicinitate nominis. Nos distinguimus vtrumque. Cyperus est Gladiolus, vt diximus, radice bulbosâ, laudatissimus in insulis Creta, dein Naxo, & postea in Phænice. Cretico candor odòrque vicinus Narodo, Naxio acrior, Phænicio exiguum spirans, nullus Aegyptio: nam & ibi nascitur. Discutit durities corporum. Iam enim remedia dicemus, quoniam & florum odorumque generi est magnus vsus in medicina. Quod ad Cyperon attinet, Apollodorum quidem sequar, qui negabat bibendam

benda n. quanta in profectus efficacissimi nam esse aduersus calculosus, eos foeret. Fœminis quidem abortus facere non dabitur. Mitæ nque tradit, Barbaros sicutum huius herbe excipite res ore lienes consu nere: & non egredi do nib is, nisi ab hoc suctu. Vegetiores enim sicutioris que sic etiam fieri. Inter triginum & alara n vitius, perfrictioibus cu n oleo illitu n non dabit mederi. Cyperos luncus est, q ualiter dixim is, angulosus, iuxta tetra m candidis, caca mine niger, pinguis que. Folia imi porraceis exiliora, in caca mine minuta, inter que est semen. Radix Oliæ nigra si nilis, quum, cu n oblonga est, Cyperida vocant, magis in medicina vsus. Lius Cypero prima A n noniaco, secunda Rhodio, tertia Tutacio, nouissima Ægyptia, quod & confundit intellectum, quoniam & Cyperos ibi nascitur. Sed Cyperos durissim a, visque spirans. Ceteris odor & ipsi s Nardu n imitans. Est & per se Indica herba, que Cyperis vocatur, Zingiberis effigie: co n manducata Croci vim reddit. Idem lib. 17. cap. 13. de germinatione arborum dicit, ocyssi nam omnium Cyperum & Pseudo-cyperum inter fruticos esse, eumque protinus foret, semênque proferre. Et hi sunt loci, quibus de Cypero egisse constat, & cum eo gladiolum confundisse.

Et hæc forte occasio est, quod vagum & commune multis nomen sit Gladiolus. Nonnulli (inquit Hermol.) distinctionis gratia Cyperon pro luncu triangulati, siue quadrato nominant. Non defunt qui Pseudo-Cyperum vocent Gladiolum, de quo Plinius inter ocyssimas plautas. Qu idra tus autem & angularis ad differentiam rotundi Iunci, quem Schænon Græci vocant, cognominatus intelligitur. Penultimam Cyperi quando que diphthong longam, quando que vocali breuem Græci scribunt. Dicitur hæc & neutro genere Cyperum à Paulo. Habetur & Cyperus Indica, quam Plinius Cyperin appellat, etiam si quibusdam exemplaribus Cypera legatur. Non possum non mirari quamobrem Laur. Valla Cyperum in Herodoto Siler conuerterit.

Cyperum Gallie officina nominant: ast rura, referente Ruellio *Soucheti* nomine norunt, quod Iunio mense radicibus eruant, digeruntque sspites in manuales fasciculos, quos prius insolatos aceti imbre conspergunt, siccatoque frustatim tundunt, vt odoris gratia vestes interpositis commendent. Sunt qui censent Cyperum hunc, que Gladiolum in Theophrasto Theodorus verit à Dioscoridis Cypero dissidère. Verum nusquam à priori sinitione posita superius inuenitur desiccere, imò Dioscoridis placita firmare. Siquidem eius radix magna inæqualitate notatur, quod pars quædam crassa carnosaque, quædam gracilis atque lignosa sit. Nonne vides radicis tenuitatem sicculosam protinus in oliuaria tubercula verticillari? Radices in altum duci, euelli, morique contumaces quis non videt? Quod si reliqua que sparsum à Theophrasto traduntur, prosequi libeat, inuenies huius nostri Cypero sursitari. Nam palustrem esse idem affirmat auctor, caule enodi, folio harundinaceo, tam terrenis quàm aquosis, vlginosisque prodeuntem: radice partim tenui, partim carpsola, neruosaque, quæ vnguentis expectatur, que non de Xiphio, id est, Gladiolo possunt audiri, cum merito debeat vnguentis abdicari, vt pote vitus oleus, vnde spatulæ fœtidæ nomen ei dederunt officinæ: namque suâ odoris grauitate lauitiorum vnguentorum gratiam aboleret. Vides ergo horum dicta authorum in

eandem herbam referri. Plinius alteri iudicio subscripsit, sed ferè suspicor eum in dotes Cypericam Gladiolo confundisse, vagn que iis & conum inem non nacturam inposuisse. Cui Theophrastus per a diphthong in *κῦπερον* scripserit, cu n ad nos venit, aliqui e, aliqui i, ex vni retinuerunt, Græci quando que diphthongo, q uando que vocali breuem, penultimam scripserunt. Cyperum tamen Theophrasti, à Cypero Dioscoridis nullo discrimine separari docuimus. Galenus & Paulus in simplici u censu vnus tantum m eninerunt, non alioquin omissuri, si aliqua diuersitate secerententur. Nec Plinio (qui in gladiolo Apollo dorum, in Cypero Dioscoride n, alioque ie Græcos sequitur) gladiolus à Cypero differt odore. Quare cu n mihi Græci omnes altipaleantur, longæ tucius fuerit vnum genus facere, neque discernere aut distingere in gladiolum, qui Cyperus dicitur, & Cyperum. De angularis Cyperi, grauis inter Aurores discordia. Cælius quadrangulum luncum vocauit, Plinius Triangularem, Dioscor. angulosum, qui litem videtur diremisse, & vtriusque historiam confirmasse. Est no. 1. lo 193 dissimilis radix, que vocatur o ficinis recentioribusque Medicis Galanga, odore Cyperum quadrantem imitante: vnde multi herbaturu n coniectores Cyperum Babyloniam cogio nent: Et hæc Ruellus de Cypero est sententia.

Fuchsius depingit & describit Cyperum longum, sicuti Tragus, qui dicit hæc nomina *κῦπερος, κῦπερος, & κῦπερος* diuersarum plantarum appellationes quidem esse: & tamen indifferenter à plebique cypero longo attribui, qui à Dioscoride Aspalathum quoque & Erythætrum cognominatur, licet & hæc appellationes ad alias quoque pertineant plantas. Hæc Tragus, qui quomodo dicat Aspalathum vocari cyperum nondum video, id non dicit Dioscorides.

Sed his omisis videamus quid dicat Cordus. Plinius, ait, inter cyperum & cypium differentiam facit, sed magno errore. Reuera enim nihil differunt: quare siue cyperum siue cypirum pronuncias, aut alicubi scriptum reperias, eadem erit planta. Est autem cyperus luncus odoratus, angulosus, triangularis siue, à quibusdam etiam quadratus appellatus, sed malè admodum, non enim quadrangularis illi est, sed triangularis caulis. Eius autem duæ species: alter longas habet radices, is Græcis vocatur Cyperis, in pharmacopoliis verò cyperus Romanus siue longus: alter rotundas habet & sibi inuicem coherentes radículas, quem pharmacopola cyperum rotundum appellant: Græci autem simpliciter: Germani vtrunque vocant *wilden Galangan*. h. e. siluestrem Galangam. Parcius afferitur ad nos longus cyperus. Hæc Cordus. Syluius & Matthiolus, sicut & alii, ajunt reperiri quadrangulum, quod Cordo contrarium est.

Matthiolus, qui Cyperum longum depingit, hæc notatu digna habet. Tametsi vnum tantum cyperi genus memoria prodiderit Dioscorides, cuius radices inter se coherentes oblongas referunt Oleas, aut omnino rotundæ sunt: visitur tamen cyperus in pluribus Italia locis qui radicibus constat longis. Er nascitur hoc cyperi genus laudatissimum propè Timauí fontes, circumstantibus palustribus locis in Iaspidia finibus, Galangæ vocatæ per simile, non tantum facie, sed etiam odore: commendatur etiam nudi

Plin. n. 193

Gal. ex Paulo dicitur Cyperus.

Cyperus Gladiolus nullus.

Galanga dicitur à multis Cyper. Babyloniam.

Fuch. & Trag.

Trag. rei dargustari

Cordus. Plin. error.

Cyperus quadratus nullus.

Contra Cordum

Matth.

Cyperi duo genera contra Diosc.

Locus fœcundus.

odoreis, qui in Hetruria provenit, radicibus ferè Filipendulæ æmulis, sed non ob id illi fuerit preferendus quem Syria mittit: quandoquidem hic longè odoratior est, & subamarus, &c. Reperitur cyperus quandoque etiam quadrangulari caule, unde non mirum, si quadratum luncum eum vocaverit Celsus lib. 3, cap. 21. Optimus dicitur ad nos ex Syria & Alexandria Aegypti in cuius defectu Italicum supponunt Officinæ.

Cyperus quadrangularis.
Delectus.

Amato Cyperi tres species.

Unica altera species.

Unica quadrangularis Celsi.

Auellanada.

Locus.

Unica triangularis Celsi.

Consulenti meæ sententia esset [Amati verba sunt] si in præsentia cyperi tres species potius describerentur, quam dux tantum, quum ipsa conspecta, ita esse comperiamus: nam altera species luncus est, folia Porri in parte decliviori habens, longiora tamen & exiliora, in cuius cacumine minuta sunt, inter quæ semen exoritur: cui caulis cubitalis & maior inest, qui plerumque quadrangularis conspicitur, nam radices rotundæ, nonnunquam oblongis oliivis sunt similes, nigre, suaviter olentes, & gustu aliquantulum amaricantes: hanc verò *Celsus, verus Hippocratis imitator*, quadratum luncum appellavit, cuius in aquis & palustribus plerumque nascentis radices, medico vsui servantur: quibus vniuersa Hispania abundat, nec opus habet Syriacis, quas suâ voce præcipue Salmanticenses *Auellanada* vocant: nec enim in Italia, præsertim Longobardia desunt, sed myropolæ parùm curiōsi communioribus radicibus earum loco vtiuntur, iis autem radicibus affinis cum voce, tum figura, alia radix, quam vniuersa Lusitania iuxta ac Hispania *lunca auellanada* vocant. Secunda autem species cyperi, vbi que in aquis comperitur foliis à prima non dissimilibus, caule tamen triangulari, cuius radices oblongæ, &c. Hanc Plinius triangularem appellavit luncum, cuius radices, Hispaniæ & totius Italiæ mulierculæ, aceto paratas, pro odorameto ac suavi fusu recondant. Nec communiore officinæ alias præter has radices, pro vero cypero monstrant, habentur, quum tamen illæ primæ, oliivis similes, à Dioscoride vt præcipue commendentur. Hanc verò secundam speciem nominari cupimus, cui veluti & primæ Dioscorides caulem, non quidè triangularem, aut quadratum inesse dixit, sed angulosum potius, vt nos cautos redderet, quod cyperus & triangularis & quadratus reperitur. Item quod melius esset, triangulari illo, radices oliivis similes habente vti: quanquam & altero, pro uero dexterrimè vti possumus, prout hoc tempore myropolæ continuo factitant. cyperi species, quam Dioscorides secundam facit, ex India ad nos vsque fertur. *Huc vsque Amatus.*

In seplasiis radices cyperi cognom. ac longi ostendunt, ex qua autem planta collectæ sint, mihi (inquit Cronenburg.) incognitum habetur, quandoquidem nemo hæcenus eam aperuerit. Indubitatum tamen est, omnes seplasiarios illis radicibus vti. Sed dum hanc rem diligentius inquiri, & has radices per omnes qualitates examino, animus inclinatur, vt ipsius cyperi germanas radices esse credam, ac prorsum eas, quas in Italia Matthiolus & Amatus nasci memoratæ prodiderunt.

Cyperus germanicus radices.

Cyperus Dioscoridis.

Monachi gloriantur se collegisse verissimi Cyperi Dioscoridis radices in Romano solo, ac etiam intus Romam. Eas quidem non excedere Olearum figuram & magnitudinem, & esse conuexas ad inuicem, folio mediantem, sicut radices herbæ Filipendulæ. Nullam denique notam à Dioscoride positam deesse eis. Plantam etiam similiter conuenire descriptioni Dioscoridis, ex-

cepto quòd respectu alterius plâte, sc. Cyperi vniuersalis, hæc minor sit. Rarò equidem luncum triquetrum supra binum palmum erigi. Supradictæ autem cyperi vniuersalis plantam multoties ultra nonum palmum protendi. Huius igitur dictæ parue plantæ cyperi radicibus vtendum esse, cõtra communem vulgarem vsum. Et indubiè tenendum, hunc esse verum cyperum Dioscoridis: nec obitare quod in Italia sit parua planta, cum & Dioscorides dicat caulem eius cubitalem esse aut maiorem. Verùm propterea non volunt asserere illum magnum seu vulgarem non esse cyperum. Quia licet ab ipso Dioscoride & aliis authoribus non præcisè scribatur, habet tamen [exceptâ radice] omnes alias notas cypero attributas. Nec magnitudo eius facit aliquid: vt non sit cyperus. Fatenur enim ipsum esse cyperi speciem: sed à veritate formæ radicem ipsorum, alterum rotundum, alterum verò cyperum longum, appellandum concludunt: In vnum autem medicum rotundum magis commendant.

Anguillara, aliter ac alii, videtur existimare cyperum Theophrasti à Diosc. differre, cum ait: cyperus tum ille qui descriptus est à Theophrasto, tum ille Dioscoridis, notissimus est in Italia. Vterque est in horto publico Patauino. *Hæc Anguillara.*

Dodonæus duarum specierum meminit nempe longi & rotundi. Quod ad rotundum attinet, nescio de quo loquatur, radicem non exactè describit.

Antidot. Florentinum meminit tertium his verbis: Duorum generum in Italia reperitur: Vnum exiguum, cui radices Oleæ similes: Alterum maius, cuius radices inæquales & contortæ. Hodie quæ ex Oriente adfertur melior est nostræ. *Hæc Collegium Florentinum.*

Cyperum (inquit Corn.) quem Celsus iuncum quadratum appellat, & Plinius triangularem, Diosc. simpliciter angularem dicit, & similem *gingivæ*, id est iunco rotundo ac odorato à Celso dicto. Nec cyperus alius à cypero est, velut Plin. ex Theophrasto putauit, qui tamen eandem quæ Dioscorides descriptionem habet. Nec Galenus, nec Aetius, nec Paulus amplius quàm vnum cyperum agnoscunt: cyperis tamen priuatiim radix cyperi dicitur. At cyperi species in India nascentis Zingiberi similis, ea esse creditur, quæ tamen hodie Zingiberis radicibus ammixta reperitur, dum ex India illæ afferuntur, & per Italiam ferè, itemque in nostris Officinis Curcuma appellatur. Reperitur etiam inter Zingiberis radices allata, radix fulua, geniculata, ponderosa, aceri admodum sapore, quæ Officinis Galanga appellatur minor: nam maiorem diximus esse Acorum: & hanc cyperi aliquam speciem esse Herbatii sagaciores conieciunt, & Babylonicum cyperum appellant. *Hæcille.*

De Cypero cuiusque speciebus, hæc Casp. Bauhin. in pin. *notices* aut *notes*, à radicis effigie, quæ pyramidalem aut vasculum pusillum imitatur, nomen accepisse videtur. Genera duo Dioscorides lib. 1. recensuit: alterum radice rotundâ, quod Officinam cyperus est: alterum Gingiberis effigie, quod in Officinis Curcuma dicitur.

Cyperus alius amarus, alius dulcis est: amarus vel odoratus, vel inodorus: vterque vel rotundus, vel longus: dulcis verò vel angustifolius, vel latifolius est.

Notes aut *notices* & *notiones*. Græcis: Latini cyperus dicitur, Officinæ Latini nomen retinent. *Ingræ* Diosc. spuria numeratur: Romani

ni uocant *Iunci radicem*, alij *Iuncum*. Germ. *wilden galgaer*, & *wollichende ecfere Bingen*, hoc est sylueftrem galangam & iuncum odoratum angulofum (à caule nimirum) nominant. Gall. *Souchet*, fortè à radice quam Galli *Souche* uocant cuius vis & uſus eſt præcipuus. Arab. *Saberade*, Hiſp. *Iuncia de obr*, & *Iuncia auellana*, ut ait Matth. Amatus tamen dicit Saluantrices Pharmacopolas *Auellanada* uocare, & *iunca auellanada*.

Cyperus uetera genera nota noſtro ſeculo ſunt tria, præter Indicum, quæ cognita fuere Matthiolo, Collegio Florentino & mihi, Quorum i. Longus, Secundus quem rotundum nigrum Italicum uocamus, qui Dioſcoridis uidetur. Tertius eſt rotundus Syriacus magnus.

Cyperus autem nomine aliquot donatur plantæ, in primis cyperi genera, de quibus hoc capite agitur, cuius radices oblongas dicit Plinius uocari cyperida. Secundò cyperus Plinio quæ eſt xyphion & gladiolus de qua ſuo loco. Tertio eſt cyperus in India Dioſcor. de qua cap. de cypero Indico, apud Plinium cyperis dicitur cap. 15. lib. 21. Officinis *Terra merua*. Quotò cyperi nomine donatur Galanga, ſunt enim aliqui qui cyperum Babylonicum cognominarunt, ut Ruellius & Syluius. Quintò eſt Pſeudo-cyperus Plinio, qui an ſic ex numero præcedentium uel plantæ diuerſa difficile eſt diiudicare.

Cyperida, Plinio. *Cyperus*, Matth. (qui & longum & rotundum uulgarem vna figura exprimit, ut & Lugd.) Ang. Fuchſ. Tur. Lac. Geſn. cat. (cui & Iuncus anguloſus) Caſt. *Cyperus Romanus* ſiue *longus*, Cord. in Dioſc. *Cyperus longus* (odorator, interponitur in Ic. plant. pag. 75.) Lob. Adu. Eid. Obſ. p. 40. & Hiſt. Lugd. *Cyperus longus*, Cord. Geſn. hort. Dodon. Camer. Tab. Ger. *Cyperus ſecunda ſpecies*, Amat. *Cyperus primus & maior*, Caſt. *Galanga ſtu. langa*, Germanis.

Græci *κύπερος* aut *κύπερος*: Ger. *wild Galgant*. Nominè hoc eo, galangam ſylueſtrem, & *wollichende ecfere Bingen*, id eſt, Iuncum odoratum anguloſum, uocant: Belgæ *wilde Galgaen*, Galli *Souchet*. Quin & galangam Velcurienſem, quoddam bi multum proueniat, Corn. appellat.

Cyperus noſter longus, de quo loquitur etiam Fuchſius, naſcitur in locis cultis & paluſtribus. In Germania non niſi cultus in hortis prouenit. Minuta folia in cacumine cum ſemiue Junio & Iulio menſe producit. Dodonæus in Flandria tantum in hortis reperit. Sed licet aſſerant nonnulli cyperum in tractu Rheni gigni, Tragustamen nunquam, quàm in hortis tantum prouenire uidit. Matthiolo cyperi radicibus longis genus laudatiſſimum naſcitur propè Timauum fontes. Commendatur etiam uinum odoris, qui in Hertraria prouenit, radicibus ferè Filipendulæ æmulis: ſed non ob id illi fuerit præferendus, quem Syria mittit. Longi habitioris, odoratoris Europæi frequentior multo prouentus & uſus Septentrionalibus regionibus, ut Germania, Belgio; Angliæ & Galliæ quàm Meridionalibus tranſmarinis: Lobelio & Pena teſtibus. Nos etiam cyperum quem deſcripiimus odoratum circa Montepelium variis in locis obſeruauimus, ut iuxta urbem ad riuum non longè à portu S. Gille ad ſiniftram eamque cum flore menſe Junio, obſeruauimus etiam in hortis quibuſdam ut Tiguri Geſneri, Paterniaci Jo. Textoris Medici, Paternij, Geneuæ.

Nominè linguarum

Locus;

CYPERVS PANICVLA SPARSA SPECIOſA.
CAP. CLXXXIII.

Radices importuno reptatu luxuriant, circa Montepelium: longæ, mox in Oliuares portiones extuberantes, itque ita continuatæ ut in



Filipendula, odore grato, colore fulco: Culmi triquetri, bicubicales, ſtriati, quos à radice ſtatim comitantur folia multa longa, pediculi palmares, & dodrantales, aut etiam vix vnciales, panicula plurima, diuifæ. Habent ſeplatiæ cyperum longum, quæ nec ipla nodis deſtituitur, ſed qui minores ſunt quàm Syriacæ, maiores quàm

Creticæ, nec ita rotundi, ſapore & odore ſuaui aromatico cum amaritudine. Hanc cum Montepeliana eandem autumo. Si figura non fuiſſet ſculpta meliorem curafſemus parandam.

Hiſtor. Lugd. figuram titulo cyperi noſtratis longi odoratoris poſuit ex Lobelio: & præterea aliam pag. 991. à Matthiolo ſimpliciter nomine cyperi: vna meo iudicio ſufficeret imago, nec duæ diuerſæ plantæ exprimuntur.

C. Bauh. pin. *Cyperus longus odoratus* i. ſiue cyperus odoratus longâ radice: & *Cyperus officinarum*: *Cyperus radice gracili & ſarcuſoſa* Thcophr.

Tom. II.

CYPERVS PANICVLA CRASSIORE minus ſparſa.
CAP. CLXXXIV.



Culmum Descriptiõ
collit triangularem ad cubiti & ſequicubiti altitudinem, quæ ſtipant folia graminæ, ſtriata, catinata; acuto dorſo gibba: in culmi ſummitate folia duo aut tria breuiora: anguſtiora, oriuntur, quorum ſinu *panicula* ſe explicat fulca, *ſteſſatis* pallentibus: *radix* è pluribus oliuaribus glandibus conſtat, colore foris fulco, intus albo, ſub-

dibus conſtat, colore foris fulco, intus albo, ſub-

T t 4

stantia dura dulci: hinc adnata compluta filamenta, glandiūque inter se connexis per filamenta fit, culmum crassitudine æquantia: virens odore destituitur.

Synonyma Lob. Obs. pag. 95. & Ic. pag. 75. Plant. Icon. *Cyperus rotundus* vel *Iuncus angulosus*: *Iuncus quadratus*. *Iuncus angulosus* & *triangularis* Cellii & Plinii. Qui non describit nec dicit cuius cyperi sit figura, in odori vel odori, vel vbi viderit. Dodonæus de purg. nomine cyperi rotundi, vt etiã in folio figuram pōnit: quæ videtur respondere cypero hic à nobis descripto.

Casp. Bauhin. pin. *Cyperus rotundus odoratus* 3. siue vulgaris. *Cyperus*, Trago. Lob. Obs. cui & *Iuncus quadrat.* Cellii. *Iuncus angulosus* & *triangularis*, Plinio. *Cyperus prima species*, Ama. *Cyperus rotundus*, Cord. in Dioscor. Gesn. hort. Dod. Lob. Ic. Lon. Tab. Ger. *Cyperus alter radice o-luari*, Cæli.

Locus & Tempus. Montbelgardi suo nimio reptatu molesta, florens Iunio & Iulio. Turnerus attulit nobis aliquando cyperum collectum Heidelbergæ, cum pulchris nodosis radicibus, quem suspicamur eundem cum eo quem descripsimus.

CYPERVS SYRIACA ET

Cretica, rotundæ.


C A P. CLXXXV.

Descrip: *Cyperus* quam pro Syriaca accepimus Lugduni, delatam à Valerando Dourez ex Italia ad Theriacam, plerumque totosa, solida, facta, exterius ruffa, transuersis liris seu Zonulis cinctâ, interiùs ex ruffa in album vergens, sapore vegeto, etiam post annos triginta, acri & subamaro, Zedoariæ simili, sed ignauiore: turbinata, vel globosa, crassis filamentis adhæsisse apparet.

Pro Cretica mihi data Lugduni cyperus quæ Venetiis: Valerando Dourez missa, radix Oliuæ minoris, rugosa, foris nigra au fusca, odorata aromatica & amara.



Synonyma



Hos Cyperos referimus ad Theophrasti, quorum meminit lib. 4. cap. 11. & l. 1. cap. 8. & lib. 9. cap. 7. & 16. Item cauli lib. 6. cap. 16. & 17. Plinius vocat cyperum genus Iunci triguli, radice Oliuæ nigre, & cùm oblonga est, vocat cyperida. Diosc. *κύπερον* & *κύπερον* quorundam. *Cyperus* præfertur à Matthioli, quem Syria & post Alexandria Aegypti mittit: quandoquidem longè odoratior & subamarus, in huius autem defectu Italicum supponunt officina.

Non ad eò multi sunt anni, à quo quidam horum Italia rariorem, rotundum vocarum, albant,

Lobeliusque copiam duorum generum rotundè



vocati ex Syriæ cinporiis Venetiis aduelli videbat, scil. Dioscoridis maiorem hunc & minorem rotundum.

Cyperus alterum genus Cæsalpini exile, palmi altitudine, numerosis est radiculis, Oliuæ figura, media quadam fibra, tanquam hilo, cõnexis, multum odoratis: similes radices afferuntur inter externa, longè crassiores,

exterius rubentes. Nostrium cyperum (videlicet longum maiorem & minorem rotundum de quo hic) aliqua ex parte à Dioscorideo differre patet, licet viribus fortè non sit inferior. Theophrast. cyperum vocat quem Theodoros Gladiolum vertit. Plinius *Cyperum* differre putauit à cypero; quem Gladiolum esse inquit: vnde Theodori error.

Cyperus Hisp. *Iunca de olor*, & *Iunca auellana-da*, Lusit. *Iunca de cheiro*, Albasor, Longobard. *Tricola* dictus Amato, est caule plerumque quadrangulari, radicibus rotundis, nonnunquam oblongis, oliuis similibus, nigris, Coruelio.

Antidot. Florent. cyperi in Italia genus exiguum, cui radices Oleæ similes.

Lac. cyperis Oliuis similis Romæ vulgaris: Item cyperus odoratior ex Syria & Alexandria.

Alpin. Aegypt. cyperus rotundus, Aegyptiis *Hedueg* vocatus, cui radices sunt nigre, rotundæ, magnæ Oliuæ crassitudine, multæque vni radicis capillamento appense simul coherentes.

Hist. Lugd. pag. 991. cyperus peregrinus, siue Syriacus rotundus maior & minor.

Casp. Bauhin. pin. *Cyperus rotundus odoratus* 1. siue rotundus Orient. maior. *Cyperus rotundus Hedueg Aegyptiis*, Alpino. *Cyperus Dioscor. maior rotundus Adu.* *Cyperus rotundus Orient. maior vel Babilonicus Rauv.* *Cyperus maior Syriacus*, Cam. in Matthioli. *Cypero rotundo similis Cæli.* *Cyperus rotundus odoratus 2.* siue *Cyperus rotundus Orientalis minor.* *Cyperus rotundus minor Adu.* *Cyperus minor creticus*, Cam. & Matthioli. Orientalis cortice est fusco: Creticus verò nigro.

In lacuosis palustribus, & cultis enascitur, vt in Cilicia, Syriaca & Cycladibus, autore Diosc. cyperi minoris radicem duplo minorem esse ait Lob. Syriaca, quæ non modo è Syria montosis humentibus, sed etiam Illyriæ & Apulicæ consimilibus natalibus vbi sponte prouenit, in Italia fertur emiturque magni. *Cyperus rotundus niger* in Nilo flumine atque in pluribus Aegypti lacubus vel locis palustribus copiosissimus est, teste Alpino. *Cyperus* Syriaci radicem elegantem in naturalium nostro thesauro adseruamus ab Illustri Medico Patauino Hercule Saxonia missam, qua

qui idem pro singulari sua humanitate & munificencia pluribus aliis exoticis Cherlerum donavit.

De huius viribus hæc Dioscorides : Vis ipsi est calefactoria, & apertendi, vrinam ciendi. Calculosis & hydropicis potu auxiliatur, itemque à scorpione iclis. Est ad vteri perfrictiones, & fomentis adhibita prodest, menses ducens. Facit etiam ad oris vlcera & depascendo prosperentia arida trita. Misceatur & malagmatis calefactoriis. Narratur & alia species Cyperi in India. Cyperi radices maximè vsui sunt exalfacientes pariter & exiccantes absque mordacitate, autore Galeno. Raque vlcibus, quæ præ nimia humiditate cicatricem difficulter admittunt mirificè profunt: habent enim quiddam etiam adstringens: quapropter vlcibus oris conueniunt. Quin & incidendi vim quam piam illis inesse testificandum, quia & calculo vexatis congrunt, & vrinam mensesque prouocant. Cypero vis in Medicina Psilochri, vt refert Plinius, illinitur pterygijs, vlcibusque genitalium, & quæ in humore sunt omnibus, sicut oris vlcibus. Radix aduersus serpentium ictus, & Scorpionum præfertim, remedio est, vulvas aperit pota. Largiori tanta vis, vt expellat eas. Vrinam ciens, & calculos, ob id vtilissima hydropicis. Illinitur & vlcibus quæ serpunt, sed his præcipuè quæ in stomacho sunt, ex vino vel aceto illita. Apud Ægyptios maximos ad medicinam vsus habent radices. Sunt verò odoratæ, atque acuti saporis. Hæ calefaciunt, exsiccant sine mordacitate, incidunt, attenuant, otæque venarum aperiunt. Sed præcipuè ad vlcera oris: & pudendorum sananda familiarissimum ipsarum tum puluis, tum combustarum cinis, est remedium: ex ipsis paratum decoctum, vel puluis, stomachum, cerebrum, pulmones, vterum, & neruos, articulos, aliquibus diebus sumptum, plurimum calfacit, siccat, roboratque naturalem calorem: ex quo omnibus morbis à cerebri tum frigida, humidæque temperie, tum frigidorum humorum distillatione concitatis, hæc efficacissimum sunt auxilium: non minùsque stomachi cruditatibus, humiditatibus, flatibus, anhelitûsque difficultati, orthopnææ, tussi, nec non hysteriis omnibus, mulieribus ex frigido, humidæque vtero effectis, aliisque morbis, ab iisdem vteri causis obortis, & articulorum doloribus. Familiare satis remedium ad suppressos menses eas esse ibi expertum est. Decocto ac puluere ad frangendum tum in renibus tum vesica lapidem, ac ad ciendam vrinam frequentissimè illi vtuntur, quod etiam non minùs in omnibus chronicis febrilibus ac alijs diuturnis morbis frequentant.



CYPERVS ROTVNDVS LITTOREVS inodorus.

C A P. CLXXXVII.



trus, in quo racemosa iuba congesta. Gustu subadstringit, radix frigida & sicca odoris & saporis expers. Lobelius.

Lob. Obs. pag. 40. Ic. plant. 77. *Cyperus rotundus littoreus inodorus*. Hist. Lugd. *Cyperus rotundus inodorus Lobelii*. Cæsalp. *Pseudocyperus*, cuius herbam Noccum in Hetruria vocant. C. Bauh. pin. *Cyperus rotundus inodorus* 2. siue. *Anglicus*.

CYPERVS AQUATICVS SEPTENTRIONALIS Lobelio.

C A P. CLXXXVI.

Scrobibus item & riuis ad Scaldæ amœnissima fluenta pone Nouam Antuerpiam vrbem iisdem folijs & iubara panicula prouenit. Radices nonnullas, sed paucas, teretes, oliuare, oblongiores instar Filipendulæ emitens glandulosas, gustu adstringentes, nulla odoris gratia. Lobel.

Lobel. Obs. pag. 40. Ic. p. 72. *Cyperus aquaticus septentrionalis* 1. *Cyperus aquaticus Lobelii*. Ca-

CYPERVS LONGVS INODORVS SYLV. Lobelio.

C A P. CLXXXVIII.

Notratis Cyperi altera species minor inodora, feruè neglecta, quam Theophrastii in

mer. hort. *Cyperus rotundus nigras inodorus radices habens*. Cæsp. Bauhin. pin. *Cyperus rotundus inodorus* 3. siue *Germanicus*.

Locus

IN Angliæ borealis & Belgij fluminum litoris lene fluentiumque riuulorum, & maris alluionibus, Cyperi genus non inelegans, radicem longè latèrque sparsa sobole multis & bicubitalibus implexarum filamentis cypero rotundo parium oritur. Folia angulosa, canalicubitalis & sesquicubitalis, nitidus, triquet-

Synon.

Locus & Tempus.



Heluetia miscabant suis quintis essentiis.

Lob. Adu. *cyperus longus inodorus*. Eid. Icon. pag. 76. *cyperus longus inodorus* filu. Casp. Bauhin. pin. *cyperus longus in. d. r. 4.* siue Germanicus.

Cyperus adaltecianus Gesn. in aquis circa Arues, florens mense Maio.

CYPERVS LONGVS INODORVS
sylvaticus, vel montanus C. Bauh.

CAP. CXC.

Descriptio **R**adices habet oblongas geniculatas, rufescentes, folia plura, palmata viridia, angusta, subaspera, ad principium membrana rufescente simul vestita: caulem hactenus nullum obseruimus: In syluosis montosis humidis, ut in monte nostro Muteto prouenit.

Synonyma Hic *cyperus longus inodorus* 5. Casp. Bauhin. in pin.

CYPERVS GRAMINEVS.

CAP. CXCI.

Descript.



Triquetrum cubitalis altitudinis caulem ferrugit, quem folia comitantur, eius inuenticio tenuis ferè complexa, ubi à caule recesserunt, eius cacumè superantia, carinata, duplo Gramineis latiora, alioqui non ita dissimilia: summo caulis fastigio Miliaceæ in latum diffunduntur

panicula, granis confertis iunci grauide, quorū exortui folia subiiciuntur, inferioribus, nisi minora essent, similia. Radix fibrosa.

Synon.

Lobel. in Adu. & Icon. Plant. pag. 79. *cyperi gramineæ* siue miliacæ titulo ponit iconem, quæ non placet.

Hist. Lugd. duas dedit imagines, quasi distinctas plantæ. *Inuus latus* pag 988. & cy-

perus Gramineus, seu *miliaceus* Penn. p. 993.

Casp. Bauhin. pin. *Gramen cyperoides* 13. siue *miliaceum*: *Pseudo-cyperus* *peduncatus*, Thalii.

Geneur, Basileæ & Montbelgardi frequenter & copiosè Maio mense Aorenrem obseruauit.

MALINATHALLE THEOPHR. ET
Anthaliu Plinio.

Inter edules radices quas Aegyptus fert Malinathalles à Theophrasto connumerantur: ait enim lib. 4. cap. 10. Locis autem arenosis, haud procul à flumio distantibus, nascitur in terra, quod Malinathalle (*μαλινάθλλη*, Malinathalle Gaz.) appellatur, figurâ rotundum, magnitud. verò Mespili [*μίσπυλος*, sine nucleo, sine cortice: folia ut *cyperus*, *κυσπύρα*, Gladioli Gaz.] mitit.

Has eadem planè notas suo Anthalio Plinius lib. 21. cap. 15. tribuit, dicens: Anthaliu longius à flumine nascitur Mespili magnitudine, & rotunditate, sine nucleo, sine cortice, folio *cyperi*.

Mihi autem *Trasis* [de qua mox agemus] conuenire videtur cum Malinathalle, quod idem mecum sentiunt Cæsalp. Fab. Columna & Clusius. Contrarium verò tenet Bellonius, qui Malinathallen existimat esse *Melanthesia* siue Mala insana, cuius opinio nec mihi, nec Dodonæo, nec Clusio probatur. Nos de Malis insanis agemus l. 34.

Dodonæus air Malum quod vocant Aethiopicum cum Malinathala non conuenire. Idem sentit & Hist. Lugdunen. & merito ut iudicauimus l. 34.

HABALZELIN SIVE GRANVM
Alzelin Veteribus.

CAP. CXCII.

Habalzelin granum est pingue [inquit Serap. cap. 37.] Ciceris magnitudine, citrinum exterius, & album exterius, & habet bonum saporē & defertur ex terris Barbariæ. Auicennæ granum *Alzelin* est boni saporis, & oritur in partibus Hæsus.

Habalzelin potè esse *Trasis* existimant Bellonius, Matthiolus, Montanus, Gesnerus, Alexander Bened. Lobel. & Pena, Rauuollius, Fumanculusque. Negant Guiland, & de Trais paulo post agemus.

Matthiol. scribit Guiland. Aethiopicum Piper cum Grano Zelin confundere: Gesnerus verò Guilandinum *Crom* vel Piper Nigrorum cum *Alzelin* commiscere: vide Hist. n. g. l. 5.

T R A S I.

CAP. CXCIII.

Non simul depositis in terra uuida radicem bulbulis mihi curatū est *Trasis* foliis quidem luxurians cyperinis, acuto dorso triquetris, minoribus, nec ad eò ltrigenti infestis: verum nec caulem quem triquetrum aiunt, nec paniculas quas Cyperinis proximas asserunt, produxit: bulbuli verò cyperi modo circularibus Zonulis præcincti, partium æquant Adellazani caudica dulci



dulci, compa-
cta, vesca carne,
ex radicum fi-
bris penduli.

An verò *Trasi*,
Theophrasti
sit *μαλαβαδων*, si-
cut & Anthal-
sium Plinij
(quod ego qui-
dem tenco) Le-
ctoribus exami-
nandum relin-
quo. Meam opi-
nionem à Cæ-
salpino confir-
matam inuenio,
& postea etiam
à Clusio. Bel-
lum huius me-
minit in sine A-

uie. de nominibus Arabicis vocans eam *Al-
zelin* vel *Allezin*, Venetorum *Dulcighini*, & alio
nomine Arabico *Hal Alzizi*. Iul. Scaliger huius
mentionem fecit, dum ait *αλαζιζιν* falsò putarunt
esse eam, quam terrestrem Ziziphon vocat vul-
gus. Namque in nostro agro ea sunt Chamæzi-
zipha.

Cord. in Obs. flua, Herbarum radice Nucis a-
uellana figura & quantitate (ita enim vocat
Trasi) suspicatus fuit, esse xyphion Theophrasti,
aut Ornithogalon, aut *Moly* sive *Myle*, cum tamen
nec vili plantarum à Veteribus denominatarum
respondeat.

Matthiol. in Epist. ad Fallop. Oloconitis Hip-
poc. non est *Trasin*, quod Veneti *Dulcighinum*:
perperam Guilandinus contendit contra Bellu-
nensem Granum Zelinum apud Serapionem non
esse *Trasum*: Æthiopicum Piper cum grano *Zelinum*
confundit, perperamque Bellunensem impugnat.
Facultates grani Zelinum Auicennæ respondent
Dulcighino. Idem in Dioscor. *Trasi* saporis dulce-
dine castaneis proximè accedentes, sunt radícula
figura ac forma persimiles sericinis Erucis, quæ
seruenti balneo clixæ contrahuntur, dum terica
stamina inde mulieres conglomerant. Folia far-
ragini similia, cuius radicibus *Trasi* coherent:
Has verò satis representare videntur radices il-
læ, quas Doronicos vulgus Officinatum nomi-
nat. Er in Epit. *Trasi* ita Veronensibus appella-
ti, Venetis *Dolzolini*: folia in cacumine mucro-
nata, cyperi modo, quem quidem planta rota
plurimum imitatur. Caules enim edit cubitales
& angulosos, in quorum cacumine folia exiliora
in stellæ modum radiantur, inter quæ flores spe-
ctantur spicati subfuluescentesq;. Radices habet
numerosas, è quibus globuli dependent bulbosi,
oblongi, subrubescentes, Fabarum magnitudine,
etiam grandiores, alba dulcique intus medulla,
scabro putamine. Matthiolus olim Iconem pone-
bat in qua nulli caules nec flores, ea figura
est minùs artificiosa, potius, quoad radices: in e-
pitome postea & aliis commentariis mutata est
icon & descriptio, additque sunt caules & de-
scriptio non ex autopfia, sed fortè ex icone aut
descriptione missa per Calzolarium, quam bene
relinquimus iudicio Ioh. Pona Pharm. Veronen-
sis.

Amatus in Diosc. cypero affinem ait, & in v-
niuersa Lusitania ac Hispania *Iunca auellana* vo-
cari refert, significantiùs tamen Iuncum Auella-
nam.

Patum abfuit quin *μαλαβαδων* meditaretur Guil-
landinus *Mamiras* apud Paulum, & Holoconitum
apud Hippoc. non modò diuersorum generum
plantas denotare, verùm etiam vtriusque vocem
ab Itatorum Dulcichinis (quæ Veronenses *Trasi*
& *Trasi* vocant, Genueses Ziziphas terrestres,
Hispani Iuncum Auellanam, Arabes *Habbaziz*
discernere. Est idem autor Dulcichina *βουβαδων*
dici non posse. Nihil tamen ob stare contendit
quominùs Dulcichinum *Mamiras* dici possit. Ri-
det autem Bellunensem, qui Dulcichinum ab A-
uicenna granum *Alzelin* vocari asserit. Tandem
asserit Holoconitum Hippoc. non dissidere à Dul-
cichino.

Dulcichinis siue *Trasi* minoris in Africa vbi
vocatur *habalzelin* vocatis, & ab aliquibus in
Italia Iuncus Auellana, quem Amatus Venetiis
vendi seribit ex Æthiopia aduectam, Græcè
Schænocaryon nomen fluxerit Gesn. hort. Idem
hæc ait ad Guiland. inter Epist. Marth. Dulci-
chinum Oloconitum Hippocratis negabas: nunc
verò coniugas: dubitavi ego possit ne idem Bul-
boestanon dici, nunc verò tecum sentio non
esse: asseram à te veram Tralliani lectionem
assentior. Tu Dulcichinum Mamiram esse affir-
nas, ego nego. Item Bellunenensis granum alze-
lei & c. Alex. Benedictus idem sentit, tu contra-
dius. Ego Dulcichinum granum alzelin esse
sentiam, Croni vel Piper Nigrorum cum grano
Alzelin contra Serapionis sententiam confundis:
Oloconitis Hippoc. non est Dulcichinum.

An Leri cap. 13. *Trasi* intelligit cum ait: Syl-
uestribus Americae est genus fructus quem vo-
cant *Manubi*, in terra proueniens Tubercum mo-
do & filamentis coherens, nucleus non maior
fatiis Auellanis, eiusdem saporis, cinerei colo-
ris, cortice non duriore quam Pisorum: an fo-
lia & semen proferat, licet sepiùs comederim,
non obseruavi: nec recorder. In margine *Manubi*
species Auellanae (nossete gall.) proueniens in
terra. Multum similitudinis habet hæc radix cum
Trasi: an eadem affirmare non audeo.

Bellonij Obs. lib. 2. cap. 25. *Dulcighum* Itatorum,
siue *D. legum*, in Hispania Valentino agro *Iun-
cia abellanada* vocata, cum *Malinathua* Theo-
phrast. & Plinij, multis notis conuenire videtur
Clusio.

De Dulcichino (vt vocat de purg. & Histor.
Lat. in fol.) hæc scribit Dodonæus. Dulcichi-
num cyperum rotundum refert. Folia etenim
eius arundinacea, oblonga, dorso eminente,
triangula, cyperidis similia, caulibus angulosos &
iuba similiter respondent, omnia tamen bre-
uiora ac minora, à tenuibus radicum fibris, A-
uellanis ferè conformes, sed tamen aliquantò ob-
longiores, dependent globuli, veluti exigui bul-
bularum, specie articulati, colore exterius ruffe-
scente, interiore verò carne candidi, sapore gra-
to, dulcique & castaneis proximò. Stirpem ipsam
nostra aras Dulcichinum, & radículas *Trasos* siue
Tragos appellat, aut *Trascos*. Cyperi species est, sed
dulcis, Theophrasto, vt satis apparet, non inco-
gnita. Libro siquidem de causis septimo. Cype-
ri radices inter dulces atque edules refert.
Cyperi, inquit, radix dulcis, & vt eorum
quæ in fluminibus & paludibus proueniunt.
Quod procul dubio, non de alio, quam de isto,
accipi potest: aliorum siquidem cyperorum ra-
dices amaricant & minimè edules sunt. Non de-
sunt tamen, qui *Trasos* istos Arabum Medicorù
Habalzelin siue Granum Zelin esse constanter
existimant, quod tamen veritati parùm consen-

Ces. contra
Guiland.

rancum. Nam Alzelin ab auctoribus Arabibus iuter fuctus sine Grana connumeratur, nequam autem inter radicales. Scrapio quidem sic habet. Habelzelin granum est pingue, Ciceris magnitudine, citrinum exterius, & album interius. & habet bonum saporem, & defertur ex terris Barbarie. Idem affirmat Auicenna cap. 303. Ex quibus, quod inter hæc discrimen sit, palam fit. *Hus & sine D. d. n. eus.* Dodonæus eudit suam desc. ad iconem Matthioli, ex eodem asserens, quod non vidit: duas icones habet, vnam sine caulibus, quæ placet: alteram cum caulibus & floribus ex Matth. minus artificiosam: cyperum esse dulcem Theophrasti asserere nondum possumus, nec etiam negare esse Habelzelin: non satisfacit nobis argumentum eius.

Lebel. in Ada. vocat Trasi Recentiorum, Afrotum *Hab. al. Z. in, & Trasi Veronensium* [vt etiam Obs. pag. 4. & 4. itemque Ic. pag. 87.] statuens, cyperis congeneres, indeque cognomine cyperos ciculentos.

Cæsalpinus refert aliquos agri Veronensis *Zizalas* terrestris vocare, cyperi genus hoc vulgò *Trasi* vocatum, quo Doronici radices adulterant.

Inter edules radices quas Aegyptus fert *Mali-anthalles* à Theophrasto connumerantur. Ex tuius textu Plinius mutuatus pro *μαριμαδδων*, Anthalium transiit: quod *μαριμαδδων* scriberetur, ex *μαριμαδδων*, & *μαδδων*, vel *μαδδων* compositum, quod est regermino, parum distans à verbo *μαριμαδδων*, quod ex *μαριμαδδων* aduerbium, & *μαδδων* constat, significatque valdè regermino, quod etymon proprium est huius plantæ, quæ radice vnica sata se propagat, innumeratque producit, auctore Columna.

Nos assumpsimus iconem Columnæ, cui flores, quos negat Pena ferre, dicens potius esse cyperi cum Trasi prouenientis Veronæ. Clulus exhibet iconem sine caule & flore, quæ nobis placet.

Trasi nostrum vel esculentum cyperum Dulcicinum à Guilandino vocatum, collocat Pona inter plantas, quæ nec caulem, nec florem, vt nec semen etiam producant.

Synonyma

Casp. Bauhin. apud Matthiolum putauit esse cyperum radicibus dulcibus Theophrasti, quam sententiam videtur retractare in pin. dicis: *cyperus esculentus* i. sine cyperus rotundus esculentus angustifolius *gergerminis* Gesn. hort. *Trasi* Matthioli. *Casf. Casf. Lugd. Frag. Herba radice magnitudine Auellanae.* Cord. Obs. *lanicus Auellanae, Ama. Trasi Veronensium,* Ada. Lob. *Dulcicinum* Gesn. hort. Guil. Dod. *in conitis* in propter. Fabric. *Cyperus dulcis* Theophr. Cam. Tab. *Cyperus esculentus,* Ger. *Malmathalla* (quasi valdè regerminans) Theophrasti *Aegyptiorum,* & *Anthalium Flina* Dalechamp. in Plin. *Casf. Colum. Margarita Aegyptia,* auctore libri *Aristotelis de plantis,* Dalechamp. in Plin. *Trasi sili. cyperi.* Clus. in Gatz. *nabaziz portæ. nabel asfis Tripolitans.* siue *Giamen alzelien Arabum,* Rauuolff. Plantam hanc nec caulem, nec florem, nec semen producere, sed sola radicum propagatione conseruari, Gesnerus lib. de hort. & Pona in suo Baldo affirmant. Contrà Matthioli. Dodonæus, Lob. Columna cum flore pingant, & Cæsalpinus, caules, folia & semen cyperi, & Frag. in pin. spicatos aliquantum fluos, tribuit.

Antonomasia

Trasi propria Veronensis est, nullibi eadem in aliis partibus præterquam apud nos sponte nascitur. *Flora Aegyptia* in pin. de prope vr-

beni ad meridiem auctore Pona. In Aegypto colit radicem quam Itali *Dalegum* nuncupant, testatur Bellonius. Clus. frequenter reperit in agro Valentino in Hispania. Rauuolffius scribit Tripolitensem in officinis proponi ex Aegypto delatam. Planta germinat Vere & Aestate. In fluminis Athelis leuitur sabulosis, vt tradit Alexander Benedictus. Autumno bulbuli leguntur, Verferuntur in plures multiplicandi.

Trasi cremore pectoris & laterum vitia expurgantur. quo fit vt tussientibus opem non inodicam præsent, tunduntur enim, maceranturque carni iure, deinde per lintecolum exprimitur cremor, quem etiam venereis portionibus miscent Recentiorum nonnulli: Sunt, vt experientia compertum esse, & ex dulcedine conici posse, scribit Matthiolus in calfacientium & humectantium genere, sed status quodammodo giunt. Excalfaciunt quidem & humectant ordine primo, leniunt, læuigant, emolliunt, Veronenfes pro bellariis vescuntur. Capiti non mediocriter conducunt.

TRASI MINORES.

C A P. CXCIV.

DE herba tota certi nihil adferre possum, at radices rotundiores minorisque quam Trasi vulgaris Veronensium, mediocrius Pii magnitudine, foris rugosæ, nigriores, intus albæ, dulces, sapore eodem cum Veronensium Thrafi.

An Gesn. hort. *Dalchini* & *Trasi* minores in Africa vbi Habelzelin.

Anno 1539. accepi Trasi minores, missas à Carolo Paludano sub titulo *fructus ex capo grati esui* & postea anno 1598. ab eodem cum inscriptione *Trasi Indici.*

CACERAS TRASIVM MODO NASCENS, folia Iridis luteæ.

C A P. CXCIV.

Inuenitur in India *radix* Trasi modo ipsis terre visceribus nascens, quæ deinde per siccitates *caulicium* emittit dodrantalem, *folia* simul implicata, virentia, Iridi luteæ aequatæ: siue Gladiolo similia. Delicente per siccitates terra exilix Tuberum modo, deinde siccata castanearum saporem refert, non siccata autem ingrati saporis est: *Caceras* illic vocant, vt Gar. Arom. l. 2. c. 23. prodidit.

Casp. Bauhin. pin. *cyperus esculentus* 2. siue *cyperus rotundus esculentus latifolius.* *Caceras,* Garzizæ addit Clus. in notis, *uad. nabaziz* a Theophr. *Caceras* in Goa, Frag.

PAPYRVS NILOTICA.

C A P. CXCVI.

Cum nobis incognita hæc sit, nec vnquam viciis, placuit in ea pertractanda cum ordine in obseruare, quo ab ipsis auctoribus est manifestata. Non corticis igitur, siue libri, cui inscriberetur, vt quidam putarunt est Nilotica, siue Aegyptia Papyrus sed plantæ magnitudinis speciose admodum, peri similis, efigie, natalibus, etiamque natura Aegyptia, qua in regione secus



fluente in Nili palustribus. adolefcit, nec è profundo emergeit, fed tantùm è vadofis frutefcit, non procul à ripis, vt etiam diuina pagina narrat Mofen diuinæ fpei & elegantia delicatulum puellum à matre inuita cietum propè Nili ripam inter Papyros, vnde diuinitus iuffu filia Pharaonis eductus, indèq; *Mofes* vocatus,

quali *aquis erectus*, fuit. Niloticam Papyrum, vnde & qualem defcribunt Theophrastus & Plinius aduectam, hortiq; Pifani totius ora Thyrræna, longè amœniffimi & ruris fctipibus ditiffimi inquilinam factam vidi & florentem legi beneuolentia Profelforis in Academia Pifana Andrea Actoaria Cifalpini, quo etiam hortante nonnullos ftolones Papyri & aliarum rariorum plantarum gelfero miffimus; quarum oblectatus peregrina elegantia, vt erat incomparabilis modestia & eruditionis, non ita multò pòft literis gratulabundis hæc significauit. Rarum fpectaculum fui mihi præbuerunt fctipes duæ munera tua rariffima, quarum illam Papyrum Niloticam vocas, altera, mihi tecum ignota est: fed nec illam nouiffimè, nifi tu monuiffes effe Papyrum Niloticam è Pifano hortò lectam. Plinio videtur gemina *Ægyptia* & *Babylonia*, ex qua præparantur ac chartæ diuifæ in prætenues, fed quàm tenuiffimas phyliras. Tuâ verò an fic poffit parati nefcio: Pliniana præmuntur prelis plagula & feceruntur fcapo nunquam plures quàm vicena. Plurima quæ ibi habet Plinius non allequor, nec cum Theophrasto conferre vacat, fed peruelim fcire cuiufmodi tuæ fuit folia, & an non cyperus fit, ac cum noftrum opus in lucem exhibere curem depingendas, ac tibi acceptas feram.

Neutiquam mirum dociff. Gelfero vifam effe cyperum, cum illi fit congenere & fimillima: verùm elegantior multò est, linceo harundinaceo ve triquetro caule, medulla farcto tomentacea, quæ tuâ glutinofque in fpeciem fubacta ducebatur in bactreas Papyraceas, quæ mutò fibi appreffa folia craffiora conflabant feribendo apta, quemadmodum etiamnum fit ex laciniis linei panni contufi & in candidum gluten redacti. Medulla verò vtebantur ex præcepto Antiquorum, quemadmodum hodie Chirurgi Itali linamentis & turundis ex medulla Sambucina aut fpongiz paratis, quò fuis poris meliùs faniem imbibant, fuâque qualitate deficcando fiftulas latiores faciant, quod fctitari folitum meminit Diofcorides. Scitipum numeroforum proceritas, lauis, nitida, furtecta fenim feptenũve interdum cubitorum, quibus, nufpam nifi ad imum folia infunt cyperi aut Sparganii repanda: radices autem arundinaceæ, fibrofæ, quas in *Ægypto* erutas afferebant, non illic ortas, propterea quia femine caret, tamen fi floribus efi perquàm fpectiofis & luculentam in ambitu cæfariem effigian-

tibus: numeroſis, gracilibus thyrfulis denſo & æquabili comarum fctipatu, & apicibus prominentibus, Ferula in modum collectis, non vt cyperi fctipis, quos circa ortum ambiunt radiantim, fctia folia, multò minora illis, quæ funt ad imum, vt in cypero. Idcirco veriffimè fit hæc veram Theophrasti eſſe, & Papyri defcriptionem apud Plinium geminam eſſe, fed mutilam, æque duabus diuerſi generis Papyris confuſam, nempe ex *Ægyptia* hæc & ex *Babylonia*, cuius etiam alij Scriptores, meminerunt. Nam vt nomen & res indicat, Theophrasti Papyrus non alia eſt, quàm Dioſcoridis, quæ notiffima omnibus fuit, ex qua præparabantur chartæ, & vtiliffima Medicis ad ora fiftularum diducenda, nempe medulla, vt fuperiùs oftendimus, etiamq; è lincea medulla hodie fieri fcimus, nam ipſam chartam non eſſe, fed medullam, indicio eſt, quòd Dioſcorides dicat cinerem crematæ Papyri, præſtantiorem eſſe quàm è charta, & ipſos fctipites neutiquam inferti fctibus aut fiftulis folitos, fed medullam, propter commoda quæ recentet Dioſcorides. *Idcirco* aut vſum tum funium, tum chartæ obſeruat Plinius tradit, cum dicit, texuntur omnes tabulæ in dente Nili aqua, quòd de funibus quis forte interpretetur. *Et max:* turbidus liquor vim glutinis præbet, cùm primò fupina tabula fctibenda illinitur longitudine Papyri, quæ potuit eſſe ſegmentis, vtrinque amputatis: tranſuerſa poſtea crate peragitur, præmuntur deinde prelis & ſiccantur Soie plagulæ, atque inter ſe iunguntur, quæ medulla gutem in chartas duci folium inuere videntur. At vbi in Euphrate circa Babyloniæm naſci ſcribit, non eandem videtur defcribere, fed eundem vſum habere chartas, quæ diuifæ ac in prætenues, fed quàm rariffimas, phyliras præparantur. Quare & hifta folia admodum lata, quibus metæ faccharatæ adferuntur paſſim inuoluntæ ex Austrinis trans *Æquatorem* Inſulis vocari poſſunt Papyraceæ, quemadmodum olim etiam folia *Palmæ* & aliarum arborum, quibus poterat quippiam commode ſcribi, tamen non eſſe geminam certum eſt. Quapropter conſultius eſt, vbi defuerit hæc noſtra Papyrus, cinerem parire ex cyperi vulgaris, aut lunci magni aquatici medulla vrendam ad de paſcentium vlcærum rabiem feram compeſcendam.

Papyrus, quam *Berd* *Ægyptij* vocant, Alpino eſt planta fluminis Nili, binis aut pluribus caulibus rectiffimis fupra aquam feptenũve cubitis allurgens. Cauliumque in fctigiis fcapus innumetis capillamentis, longis, rectisq; contextus, cernitur. Foliis quoque conſtat multis, rectis, enſiformibus, typhae aliquatenus fimilibus, triangulatis, ac mollibus. Chyrurgi foliorum medulla vtuntur, ad vlcærum ora dilatanda. Ex fcapique combuſto cinere, recentia vlcera cerant, qui etiam maligna augeri (ſi ſæpe aſpergatur) non ſunt. Ex fcapis recentibus aquam diſtillant, ad oculorum fuffufiones, caliginis, ac obſcuritates maxime proficua.

Cæſp. Bauh. pin. Papyrus 2. Bibliosvel Syriaca, ſive *Sylliana*. Sarti, Theophrasto. Biblios fecundo, Eufachio, Papyri altera ſpecies, que Papyrus in Sicilia, Guiland. Papyrus, Cæſ. Nilotica, in Adu. & Ic. p. 79. Tab. Ger. Papyrus *Ægyptia*, Penn. Hiſtor. Lugdun.

GRAMEN SPICATVM CVM PERI-
carpiis parvis rotundis.

CAP. CXCVII.

Descriptio



Veretis est
Serasisque
folijs Phalangii
similibus. Cul-
mus verd spi-
thameæ lon-
gitudinis, spica
gerit inftar
Plantaginis.
Lob.

Lob. Tent.
& Ic. Plant. p.
16. Zeege &
rentgras, Gra-
men marinum
spicatum: Cluf.
Paan. Gramini
montano spica-
to simile in ma-
ritimis Flan-
dria frequens,
vulgò Euden

appellatum. Tab. icon. & Hist. Gramen aquati-
cum spicatum, Gecarbe wasser gras / Hydragro-
stis. C. Bauh. Phyt. Gramen 68. & Gramen spica-
tum alterum maritimum. Eid. pin. Gramen iun-
ceum & spicatum 17. siue Gramen spicatum alterum.

Locus.

Copiosè in Zelandia nasci ait Lob. in tiuulo-
rum ripis locisque aqua irrigatis: Vidimus apud
fratrem Casparum missum Norimberga.

GRAMEN TRIGLOCHIN.

Descriptio



Gramen
triglo-
chin ex capi-
te pendulis fi-
brosis comp-
plicatis radici-
bus nititur:
culmos tollens
nudos, enodus
iuceos, cubita-
les & sesqui-
cubitales, in-
terdum locis
squalidus pal-
mares ferè:
spicam à me-
dio gerunt
summo ten-
nus: longà se-
rie sterculi
rurbinati, for-
mà ferè capi-

culorum Pyrolæ, delapsis primulùm floribus, nõ
item magnitudine: quos excipit series mucro-
natorum fructuum, qui acumine cõtiniui, inferius
spectante, in triplicem barbulam alati, inftar tri-
dentis sagittæque, dissiliunt. Folia ab radice orta
culmos comitantur palmaria & dodrantalia,
perangusta, plana.

Synonyma

Lobel. Belg. Ander zee oft zee landesch ghee

arent gras. Ic. Pl. Gramen marinum spicatum, m. alterum. Tabern. icon. & Hist. Binsengrasß 4. Græ-
niën iunceum 4. & iunceum spicatum gcächres
Bießgrasß. Camer. hort. Gramen marinum spi-
catum alterum Lobelii. Majus cuius pictura est
apud eundem, ad lacus salos nascitur circa Ha-
lam Saxonie. Minus verò in pratis latioribus
& humectis circa Lipsiam, quod inter Calama-
grostis species Tragus depinxit.

Cap. Bauhin. phyt. Gramen 67. Eid. pin. Gra-
men iunceum spicatum 16. seu Triglochis: Cala-
magrostis 2. Trago, icon Calamagrostis 4. Hist.
Lugd. Carex minus, Lon. Gramen mixtum ex iun-
co & Gramine, Thal. Gramen marinum spicatum,
Ger. Gramen triglochis Dalechamp. Lugd. Gra-
men iunceum 4. vel Spicatum, Tab.

Hist. Lugd. iconem habet meliorem, quoad
fructum, quam Lobelius, at flores Tragus rectius
exprimit, vt & Tabernamontanus.

Inuenitur inter Spiram & Heidelbergam, in
pratis locisque aliis humidis.

HYACINTHI PARVI FACIE

Gramen triglochis.

CAP. CXCVIII.



Oblongum
habet com-
matumq; bul-
bã, Allii Alpi-
ni in morena
simplicem a-
liã, aliã mul-
tiplicem, à cu-
ius imo demis-
sis fibris radi-
catur, folia te-
nuissima, gla-
bra, palmaria,
interdum ma-
jora, tria, aut
quinque, sta-
tim à radice
oriuntur: cau-
siculus, durius-
cul. teres, gra-
cilis, nudus,
enodis, inter
folia surgit,

palmaris & sesquipalmaris: longam gerens spi-
cam sterculorum luteorum, [nisi fallit in sicca plã-
ta color] exiguorum, è quorum medio proten-
ditur stylus longiusculus, ita vt cum eo flos refe-
rat rudimentum capituli Pyrolæ delapsis flori-
bus: hinc stylus ille satis longo nixus pediculo
triquetrus apparet, inque tria spicula superius
coherentia, subtus delinquit, quo modo in Grami-
nie tritulo seu triglochis est obseruari.

In squalidis quibusdam locis maritimis Nar-
bonensis Gallie, & supra Admirabilem illum
Gari fluii Pontem trigeminum, eruit Gener
H. Cherlerus Iunio.

GRAMEN IUNCEVM MARINVM

dense stipatum.

CAP. CXCIX.

Radice & folijs est Graminis marini spicati
Zelandici similibus, duris & rigidis. Cuius
culmi




mi spicas gerunt Iunci aquatici. Alioqui maritimo gramine, haud melius est aut vtilius.

Lob. Hist. B. p. 17. Teutsch dick Grasfen/ Teutsch dick bieß Grasfen. Et Icon. pl. pag. 17. Gramen iunceum dense stipatum. Tab. Hist. grameu iunceum 1. Binggrasß 5. Et Icon. gramen men iunceum 4-

quaticum minus.

C. Bauh. phyt. gramen 72. siue iunceum tertium. Eid. pin. gramen iunceum spicatum 11. siue gramen iunceum foliis & spica Iunci minus: gramen iunceum marimum Gerardi.

Ad litus Middelburgicum reperiri refert Lobelius in Cambis heymer heyden & in superiori comitatu Farzenelebog.



GRAMEN IUNCEVM EX MONTE

Baldo.

CAP. CC.

Iunum culmum amittunt folia pauca, dura, ceteroqui nudum, enodem, dodrantalem, glomeratum è glumis candidis capitulum summo cacumine gestantem, cui ad basim subiecta bina foliola acuta, aduersa, alterum altero longius, parum tamen semunciam superans. Hac ex sicca: sic autem describit Frater in prod. Radice est parua, fibrosa, circa quam folia bina, ternave semipalmaria: culmus iunceus, leuis, enodis, & nudus, pedem superans: cuius summo capitulum instar Phalaridis squamosum in apicem desinens, ex albo leniter rufescens, insidet, cui utrinque foliolium rigidum subicitur, quorum longius, vnciam superans, deorsum vergit, alterum quod triplo breuius, recta effertur.

C. Bauh. phyt. gramen 75. siue iunceum montanum, gramine maritimo Dalechampij in multis conueniens, utpote caule & capite: Eid. in prod. gramen 36. In pin. gramen iunceum 12. siue montanum capite squamoso: Prouenit in montis Baldi summitatibus.

GRAMEN IUNCEVM MARINVM CAPITULO squamoso C. Bauhini.

CAP. CCI.

Gramini huic 37. in prod. vel, ut in pin. vocat, gramine iunco 13. siue minimo capitulo squamoso, capillares sunt radice: folia pauca, capillacea, vnciarum ferè duarum: inter quae culmi vnciarum quatuor vel quinque exurgunt, in quarum ferè summo capitulum vnicum minutissimum squamosum rufescens, cui eulmi apex supereminet:

Tou. II

In aquis circa Altorffium Noricorum, vnde D. Doldius misit: & Francofurti ad Oderam prouenit.

GRAMEN IUNCEVM MINIMUM ALTERUM eiusdem.

CAP. CCII.

Gramen hoc 38. in prod. in pin. verd. Gramen Synon: iunceum 14. siue minimum alterum, à priorum differt potissimum capitulis, quae & summo cauliculo insident, & squamosa non sunt: in fossis Patauinis, aqua defluxa, reperitur.

GRAMEN IUNCEVM MINIMUM MARITIMUM C. Bauhini.

CAP. CCIII.

Tota planta dodrantem non superat, cespiti similis, ex cuius singulis radiculis, singuli cauliculi exurgunt, foliis capillaceis paucis cincti, qui exiguis vtricularis donantur, gramen Synon: hoc 39. in prod. in pin. gramen iunceum 15. siue minimum maritimum in Zelandiae maritimis, ad oppidum Gous, D. Gillenius collegit & transfudit.

GRAMEN SYLVATICVM PARVVM tenuifolium, rigidiusculum.

CAPVT CCIV.



Radice pro-tuberat ab vno principio multiplici [auctore Tabern.] fibrosa: foliis angustis, vulgato gramini similibus, sed plus firmatis, lolidis, denso ordine stipatis. Culmi procedunt ex his plures, tenues, rotundi, ac duntaxat, spithamei. Spicae in horum sublimitate molles, capillares, subrefcentes.

Tabern. Hist. & Icon. Gramen sylvaticum primum: Gramen nemorosum. Germ. waldgras/ Buchß od Bofchgras. Ital. Gramen sylvaticum Angl. weddegras. Belg. Bofchgras. Ger. Gramen sylvaticum.

Casp. Bauhin. Phyt. Gramen 28. siue nemorosum primum: Eid. pin. gramen nemorosum glabrum 3. siue Gramen nemorosum spica rufescente molli.

In humido vliginolo & arenoso colo colligitur. Locus tur.

GRAMEN SYLVATICVM III. TABERN. paruum, tenuifolium, cum spica aculeata.

CAP. CCV.

Radix ab vna origine multiplex, exigua, filamentis referta: folia angusta, in acumen ab-

Vu 2



Synonyma

pin. *Gramen nemorosum glabrum* 4. siue Gramen nemorosum spicis paruis asperis. Variat hoc latiore folio in dumeris & angustiore in pratis. Locum cum præcedenti cunde n adamat.

cuntia palmum medium ferè longa; ex his oriuntur calami nouem aut octo renes, aphyllis æquales, spichanici. Horum lûmitates occupant spicæ parue, aculearæ. Tabern. Hist. & Icon. *Gramen sylvaticum* 2. siue nemorosum, waldgras 3. Ger. *Gramen sylvaticum minus*. Casp. Bauhin. Phyt. *Gramè* 2^a. siue *nemorosum alterum*. Eid.

Casp. Bauhin. Phyt. *gramen* 84. siue *gramen nemorosum* 5. siue *Gram. nemorosum caliculis paleaceis*: duplex repens & erectum. Palsim pratis muscosis, aliisque putridis ac humentibus locis prouenit.

GRAMEN HOLOSTEVM ALPINVM minimum C. Bauhini.

TOta planta vnctas tres non superat: foliis capillaceis, vnctilibus: cuius culmils capitula paleacea insident, copiosè in Heluetia in S. Bernardi monte minore prouenit. Gramen hoc in pin. nemorosum glabrum 6. siue Gramen holosteu alpinum minimum, 46. in prod.

GRAMEN SPARTVM PLINII, SIVE Sportularum Ficuum.

CAPVT CCVII.



Spartu Latinorum & Plinii (inquit Clus) à Sparto Græcoru frutice differens, herba est graminea, folia proferens, numerosa, tenuia iucea, viridisque, cubitalis longitudinis ex eadem radice prodeuntia, quæ, dum nouella sunt, latiuscula conspiciuntur, & interiore parte canescèntia, successeu vero

temporis contrahuntur & conuoluuntur, sicut que iuncea, dura, flexibilia tamen, & marginibus ita coniectis, ut vix rima appareat, nisi diligentiùs oblectes. Inter hæc enim exiliunt ipsi foliis paulo longiores, qui Vere & Austate paruum arundinaceam paniculam ferunt, simili prope modum cum illa ratione florètem: deinde oblongum semen, ut nonnulla Graminis generatibus nititur fibrosis & perennibus, quibus multè simul enascèntur plantæ contiguæ, tunc modo, ut interdum vna planta, siue multarum simul congestarum plantarum culmus, ductum pedum spatium, vel etiam illo amplius in ambitu occupat.


Fuit hoc Spartum post Theophrastum Græcis notum, ut Plinius lib. 24. cap. 9. testatur in quo quæritum proponit, num Genista Græcorum Spartium sit, de quo Homerus dicit, Nautium Sparta dissoluta. Cui breuiter respondet, certum esse, nondam eo tempore Africanum vel Hispanicum Spartum in usu huius, ut credendum sit, Genistam Græcorum Spartum esse, nostrum vèd Spartum illis ignotum esse, nec de eo vllam posteritati reliquillè memoriam.

Hernol. coroll. Spartum alterum in Hispania & Africa sumibus natum, *Leurea* siue *Lygia* dictum ab Athenæo. Amato Spartium aliud à Genista. Dodon. frum, Spartum herba à Plinio

HOLOSTIVM MATTHIOLI IVNCVEM.

CAP. CCVI.

Descriptio



Matthiolium vocatur plantulam in palustribus obuiam, palmum aut sesquipedalem altam, coliculis frequentibus, tenuibus, nonnihil rubentibus, & in ramos plures diuisis: folia acuta duas aut tres vnctas longa, angusta: floribus secundum ramulos, ad eoque & in extremitatibus crebris, succedunt

vascula pusillum semen tussam pellucidum claudencia. Radices subsunt capillaceæ.

Si Lob. in se Plant. p. 18. per Holostium Matth. eandem intelligit, quam Matthiolus plantam, melius placet Lob. si figura. March. suam plantam non describit.

Synops

Matthiolus mutata priore sententia in post. comm. editione Holostium exhibuit pictum, nulli adiecta aut figura, aut virium declaratione, inquit H. Lugd. p. 112.

Gramen. in 2^a art. videtur Thallio ea planta, quam Lob. titulo Holostii Matthioli insigniuit.

Tabern. icon. & Hist. *Gramen bufonium*, Brotzengras / Germ. Peddegas. Fland. & Brab. Todegras. Gall. Herbe aux crapaux aut Crapaudine. Eid. Hist. *Gramen iunceum* 6. Ger. *Gramen iunceum*.

lib. 19. cap. 1. descripta. Lac. Spartum vulgare, differens à Genista. Clus. Spartum herba 1.

Lob. in Aducrf. *Spartum* vulgè *Elpha Hispanica Iuncea*, vulgi *Funispartion*, an *Linspartion* Antiquorum: Eid. Obs. p. 45. Ic. plant. pag. 88. *Spartum Plinii*, Clus.

C. Bauh. phyt. *gramen* 3. siue *gramen spartum* 1. Eid. pin. *gramen spartum* 1. siue paniculâ comosâ: *Spartum Plinii* Clus. Lob. & H. Lugd. *Spartum herba*, Dod. *Spartum Plinii* 1. Tab. & Ger. *Iuncus Ibericus* siue *Hispanicus*, Dalech. in Plinium: *Δυσσπέρων* Theophrasti.

In Bætica regione Hispaniæ parte, præcipuè regno Morisceni nasci tradit Amatus: veluti in Algarbia apud Lusitanos, Apliritæ contermina. Frequens nascitur, auctore Clusio, collibus arenosis inter Væna & Alcalal-Real, atque aliis Bæticiæ locis: sed omnium abundantissimè ab initio Granatensis regni, siue Bæticiæ limitibus, vsque ad Murgim urbem, vulgè *Murgia* dictam, vt non sine causa totus ille tractus Veteribus appellatus sit *Spartarius campus*, quo etiam noua Carthago, vulgè *Carthigena*, vrbs maritima continetur: hæc etiam à nonnullis Spartaria cognominata est, ob Sparti (vt credibile est) eo agro nascentis abundantiam. Nascitur & Valentino regno, atque illud quidem, superiore longè vberius & lætius.

Porro, Sparti vsus, inquit Plinius, multa post secula ceptus est: nec ante Pœneorum arma, quæ primùm Hispaniæ intulerunt. Herba est hæc (Iuncus Ibericus, siue Hispanicus, *ἰνκύνος*, *ἰνκύνος*, *ἰνκύνος*, ad nexus tantùm vtis Dal.) spontè nascens, & quæ non queat feri, Iuncusque propriè aridi soli, vni terræ dato vitio. Namque id malum telluris est, nec aliud ibi feri aut nasci potest. In Africa exiguum & inutile gignitur. Carthaginensis Hispaniæ ceterioris portio, nec hæc tota, sed quatenus parit, montes quoque Sparto operit. Hinc strata rusticis eorum, hinc ignes, facèsque, hinc calcamina, & pastorum vestis, animalibus noxium præterquam cacuminiu tenebricitate. Ad reliquos vsus laboriosè enellitur, cereatis cruribus, manibusque tectis manibus, conuolutum ossis ligneisve conamentis. Nunc iam in hyeme vix. Facillimè ramen ab Idbus Maiis in Iunias: hoc maturitatis tempus: Vulsium fascibus in acervo animatum (adunatum) biduo, tertio resolutum, spargitur in Sole, siccaturque, & rursus in fascibus redit sub tecta, Postea maceratur aqua, marina optimè, sed & dulci si marina desit. Siccaturque Sole iterum rigatur, si repenè vergeat desiderium, persusum calida in solio, ac siccatur stans compendium operæ fatetur. Hoc autem tunditur vt fiat vile, præcipuè in aquis marisque iniuctum. In sicco preferunt è canabi funes. At spartum alitur etiam demersum, veluti natalium litim pensans. Est quidem eius natura interpolis, rursusque quàm libet vetustum nouo miscetur. Verum tamen amplectetur animo, qui volet miraculum æstimare, quanto sit in vsu omnibus terris nauium armamentis, machinis ædificationum, aliisque desiderijs vitæ. Ad hos omnes vsus quæ sufficiant, minus xxx. pass. in latitudinem à litore Carthaginis nouæ, minusque in longitudinem esse reperitur, longius vehi impendia perhibent. Hæc ille natur. hist. lib. 19. c. 2. Virgæ (inquit Amatus) huic ad summum cubitales sunt, solidæ, ad frangendum difficiles, vinculorum vsui præcipuè, ex quibus cordæ, funes, Cameli & nauium ornamenta parantur: nec minùs in ipsa Algar-

bia & Bætica regione, ex isto Sparto, infinitus sportularum & corbium calasthæcorum numerus, pro deferendis scibus, & passis, aliisque mercibus ad vniuersam Germaniam, Prussiam, & Bohemiam, Galliam & Scythicam fiunt, hodie verò Spartum hamato ligno conuolutum eradicator, veluti quoque Plinij tempore, ossis, ligneisve conamentis euellatur. Spartum eodem in vsu nunc est apud Hispanos, referente etiam Clusio, quo fuit Plinij tempore. Nam ex crudo & exsiccatò tapetes seu aulæa, storiæ, corbes, rudentes, aliosque funes conficiunt: corbes etiam illi in quibus ficus, & vuar passæ aduehuntur, ex Sparto contexti sunt. Sed ex illo aquâ, iustar lini, macerato, deinde siccato & tuso, calcementi genus, quod ipsi *alpergates* appellant, paratur, funes etiam & alia subtiliora opéra. Præfertur autem id quod Valentino regno creseit,

GRAMEN SPARTVM 2. CLVSIO.
CAP. CCVII.



Spartum herba alterum Clusij nascitur Murciano regno, humidioribus præsertim locis, superiore tenerius, cuius valdè raris est vsus, vt quod storiis aut humilimodi operibus conficiendis minimè sit idoneum, plurimum autem eius vsus in eâ regione, ad lineos saccos, quos lectis sustinent, impleidos, vt nos stramine vti

solemus, quoniam molliore, tenuioreque sit iunco, quàm primum: paniculam fert breuem, & pericarpio quodam, siue membranaceo folliculo inclusam: vti Narcissorum & similibus serè flores.

Lobel. Hist. Belg. p. 122. & Obs. p. 45. *Spartum alterum Clusij*. Eid. plant. icon. p. 88. *Spartum Plinii & Clusij alterum*.

C. Bauh. pin. *gramen spartum* 2. siue paniculâ breui folliculo inclus. : *Spartum alterum Plinii*, Lo-Sydon. bel. Hist. Lugd. Tab. & Ger. Sparti herba alia species, Dodon.

Nascitur eodem quo superius illud ad multa vile, modo: paulò tamen maturis flores producit: nam Martio suis floribus onustū legebat Clus.

Locus. & tempus.

SPARTIVM SPICATVM, PVNGENS
Oceanicum.
CAP. CCIX.

Spartum herba 3. siue Oceanicum aut maritimum Clusij, nonnullis, Galliæ, Flædiæ que locis & aggeribus illis sabulosis, Oceano obiectis inuenitur, *Halm*, ab incolis, præsertim Flædris vocatum: quod priori Hispanico non valdè dissimile est, sed multo maius & rigidius, cruribus eorum, quibus per eos aggeres sine ocreis iter est, permolestum: pungunt enim & cutim penetrant eius folia. Crescit eodem modo quo superiora, magis ramen latè sepe Graminis modo: *Spicam* autem fert Secalis panè instar: eius vsus,

Defcriptio

Vu 3



vt latis suis cespitibus & valde confertis, atque obliq. spargentibus sese radicibus, arenam firmiorem reddat, & colliget in aggeribus, ne ram facile marinis vndis & fluctibus eluatur, & facilius resistant tepellatibus, qui in Oceano crebra.

Ex Plinii l. 19 cap. 2. ac lib. 24. c. 9. ostendit porcell Genista & Spartium diuerfas esse plantas,

quoniam obscure utramque herbas discernat, ac dubia pro fusus fide tradat: ramen priori loco per luncos aculeos, siue virgas, longas, sine foliis, eas omnino intelligere videtur, quas Holandi Oceani magni accola, ob vrgentem dânosumque maris impetum, atque inundationem, arenosis montibus inferunt, ne validiori arena vento promptè defluat aut dissipetur. Plinius montes his operiti, in ceterioris Carthaginensis Hispania portione, scripsit. In Holandia Scliu vocant, quasi Galeam. Hanc omnino pinxisse Dioscoridem lib. 4. cap. 13. 9. arbitrarur Cronemburgus. Sed quo modo ad Diosc. Spartum referri possit non ostendit.

Cronemburg.
Spartium
Hollandicè

Synonyma

Casp. Bauhin. Phyt. *gramen* 11. Eid. pin. *gramen sparceum* 3. siue *spicatum*, folijs mucronatis longioribus, vel *spica fecalini*. *sparceum tertium*, Clus. Hist. Lugd. *sparceum herba 3. maritimum*, Clus. Hist. *sparceum vferas*, Lob. Obs. p. 45. l. c. 89. Hist. Belg. pag. 125. *sparceum 5. & Plinianum* 3. Tabern. *sparceum Anglicanum*, Ger.

GRAMEN PENNATVM, ALIIS Spartum.

CAP. CCX.

Descript.

Pretenuia è rad. capillatis geminant folia dodrantalia: Alia superius teretia, inferius plana: inter que surgentes culmi in cristam selqui-palmarem lanugine mollicea, vtrinque plumatâ, contortamque, desinentes. *Spartum herba* quintam, siue Austriacum pennatum, non in locis aurâ marinâ afflatis (autore Clus. Pannon. & Hist. post.) natum, sed procul à mari, procul ab arenosis illis aggeribus, spontè etiam crescens. Habet verò id *folia* pedalis longitudinis, gracilia, viridâ, numerosa, plana initio: sed quorum limbi randem coeunt, lunci modo læuia, recetâque sunt, Sparti Hispanici foliorum instar, quibus nõ multum abiuuilia sunt, sed minima & graciliora: inter ea *culmi* exeunt graciles, foliorum fastigium non superantes, qui *spicam* ferunt aliis dissimilem, sed tribus aut quatuor oblongiusculis granis, longa contortâque cauda insignitis duntaxat *opulartem*, quæ in dodrantalem, nõ pe-



dalem, interdum veluti penulam, tenuioribus alarum auis illius *Mammocodiae* siue paradisi vulgò nuncupatae, pennulis termè respõdentem, desinit: *radix* subest è multis capillamentis gramineisque fibris composita, Hispanici Sparti radicis instar.

C. Bauhin. Phyt. *gramen* 118. siue *sparceum* 8. vel *pennatum*: Eid.

pin. *gramen sparceum* 11. siue *pennatum*: *Spartium austriacum*, Clus. Pann. *gramen* 9. vel *iuncum* Dod. *gramen pennatum* Dalechamp. Lugd. Variat iuba colore: est flauo, & etiam candido.

In aridissimis tumulis, apricis, lapidosisque provenit. Abundè hoc genus, ut testatur Cluius, nascitur in monte Badenibus thermis imminenti, totâque illâ catenâ montium qui inde ad Danubium vsque procurrit, præterea ad syluulam *Lachn* aliisque apertis & Gramineis locis Austriae & Vngariae: sed omnium vberimè in Viario illo Neapoli Austriacæ vrbi contiguo, in quo vbetiùs lætiâque provenit. Semen marurum Iunio, vel læuissimo aurâ statu excutitur, atque cum sua pennula paululùm volans, vbi decidit, statim per Gramen itrepat & terrâ se condit.

GRAMEN SPARTEVM VARIEGATVM, Casp. Bauhini.

CAP. CCXI.

Gramen 33. in prod. *gramen sparceum* 12. siue *variegatum* folijs est quatuor vel quinque vnciarum, rotundis, variegatis, quorum alternatim pars vna vitet, altera rubet: quod primo Vere in Franckenhusis montibus copiosè reperiri, D. Iungemannus anno 1662. scripsit, & colorem culta mutare monuit: Spartique nomine, solum folia, mitti.

SPARTVM MARITIMVM SIVE Oceanicum latifolium.

CAP. CCXII.

In sabulosis collibus Walcheræ & Hollandiæ, inquit Lobelius, reperitur Spartum. Vnum spica, radice, magnitudine, femine aceroso, ad Spartum tertium Clusii proximè accedit. Discrimen in folijs est *folijs*, quæ pulchra Frumetaceis & Graminis striati sulcati folijs lætiora, coloris glauci.

De hoc scribit Clus. Spartum herba 4. Batavicum siue Oceanicum 2. à tertio maritimo siue Oceanico

Oceanico primo, minime differt tota plantæ forma, radicelque sub arena condendi, latæque spargendi licentiâ: eius tamen spicæ breuiores videntur & Phalaridis potius quàm Secales paniculas imitari, id Baonius, quibus valdè familiare iisdemque visibus feruit quibus Oceanicum primum, etiam *Halm* dicitur.

Icon apud Clusium, quæ eadem cum Lobelia, monstrat magnam differentiam à priore Oceanico, in quo folia angusta pinguntur: verum responder descriptioni Lobelij. Eid. dicitur in H. Belg. p. 133. & Icon. plant. p. 89. *Spartum nostras alteram.*

C. Bauh. phyt. *gramen* 114. siue *Spartum* 4. Eid. pin. *gramen sparteum* 5. siue *spicatum latifolium: Spartum* 6. vel *Plinianum* 4. Tabern.

GRAMEN ÆGYLOPS, BROMOIDES
Tabern. longissimis aristis.

CAP. CXXIII



Radice est multiplici (vt autor est Tabern. fibrosa, ex qua numerosum emergit agmen foliorum paruum angustorum iuncorum. Inter quæ terni vel quaterni assurgunt culmi tenuis cubitales aut sesquicubitales, qui in summitate spicas gerunt glumis aenacis similes, sed aristis acutis & longis, quæ ex membranaceo folio, vel utriculo spicam infernâ parte complectente, profiliunt, & in vnum tantum vergunt latus. Glumæ verò seminum sunt vacuæ. Decidentibus verò aristis & ipsa sicca cum glumis suis in iubum & tonsilibus cirrhis contextam, instarque lini pantam dehiscit, tandem vanescit tota.

Tabern. hist. *Aegyl-ps* 4. *Bromoides* 1. habet wach. Icon. *Aegylps Bromoides* (sic etiam Gerardo) *Wadelwach.*

C. Bauh. phyt. *Gramen* 107. siue *Festuca longis aristis*. Eid. pin. *gramen Festuca* 15. siue *Festuca longissimis aristis glumis vacuis spadice coloris.*

Arenolis gaudet locis & siccoribus pratensibus: potissimum verò in viis inter VVormatiam & Frankental Palatinatus ciuitatem obuium esse restatur Tabernamontanus.

SPARTVM PARVVM LOBELIO.

CAP. CXXIV.

DVras crassaque fibras demittit: culmi numero plures, inâ parte foliorum circumiectorum volaminiibus crassescunt, alioqui sili instar tenues, enodes, dodrantales, quos à medio ad Tom. 11.

summum vsque conscendunt, altera duntaxat



parte crüptentes, eodèmq; vergetes, glumæ duræ, tenues, longiusculæ: folia vbi stipulam non amplius inuoluunt, admodum tenuia, & ferè rotunditrium, quatuorve vnciarû longitudine: acceptus apud D. Vldaricum Chelium, Medicum Argentinensem ex plantis Agerianis fectis.

Label. Hist. Belg. p. 124. & Icon. plant. pag. 90.

Synon:

Flein *Spartum van desen landen. Spartum nostras paruum.* Tabern. *Spartum* 7. vel *Plinianum* 5. Casp. Bauh. phyt. *gramen* 117. siue *gramen sparteum* 7. Eid. pin. *gramen sparteum* 6. siue *lunifolium.*

GRAMEN SPARTEVM PRIMVM TABERNAMONTANI.

CAP. CXXV.

Gramen sparteum primum (inquit Tabern.) Radice nititur fibrosa, longa: folia rigida, tenuia, pedalia, nervo medio percurrente: culmi cubitales & altiotes, teretes, leues, foliis multis amicti: spica digitali longitudine, interdum longiores, colore fulco oblectiore.

Tabern. Hist. *gramen sparteum primum* p. prime Synon: *ween gras das est. Icon. lunifolium.*

C. Bauh. phyt. *gramen* 115. siue *sparteum* 5. Eid. pin. *gramen sparteum* 4. siue *spicatum foliis mucronatis brevioribus, Spartum Anglicum* 2. Ger. tit.

Vberi prouentu, Tabern. annorante, nascitur in squalidis locis inter Herzogenbusch in fabuletis, variisque aliis Brabantie locis.

Locus:

GRAMEN SPARTEVM BASILENSE CAPILLACO FOLIO, C. Bauh. Hist.

CAP. CXXVI.

Ex radice fibrosa, culmi plures exurgunt, qui statim in folia capilli instar angustissima, in acumen molle fastigiata, palmum sepe, pedemve altiora, absumuntur: nec paniculam, nec spicam obseruauimus. Tota planta insigniter vires, & ex multis plantis simul iunctis cespès constituitur: in paludibus Michelfeldæ prouenit e ramon, hoc *Spartum* 7. siue *Basileense*, folio capillaco, vt autor in pin. vocat, vel, vt in prod. *gramen* 29.

Descriptio

GRAMEN SPARTEVM MINVS, VEL HOLLANDICUM, C. Bauh.

CAP. CXXVII.

Gramen hoc 30. vt in prod. vocat, vel, vt in pin. *Gramen sparteum* 8. siue minus, vel Vu 4

Hollandicum pro radice fibras tenuissimas albas habet: *folia* copiosa, capillacea, pallida, triū quatuorue vnciarum, inter quæ culmi tenuissimi, palme altiores, vno, alteroꝛue internodio donati, & penè nudi offeruntur, qui paniculam pallidam diuulsam sustinent: & communiter plures cespites constituunt. Nomine sparti Hollandici ex Sylua Hagana D. Weckerlinus misit.

GRAMEN SPARTEVM MONSPELIACUM
folio capillaceo minimum,
ciusdem.

CAP. CCXIX.

Synon. **R**adicem habet Gramen Sparteum 9. siue Monspeliacum capillaceo folio minimum [vt ab autore in pin. vocatur] pro 3. in prod. descriptum, ex fibris albis, oblongis, capillacis compositam, *folia* capillacea, vncialia: *culmos* tenuissimos, nudos, triū quatuorue vnciarum: paniculas paruas ex loculis minimis compositas & per maturitatem rufescentes: quod Monspelluli in agris æstiuo tempore reperitur.

GRAMEN SPARTEVM SETAS EQVINAS
referens Casp. Bauh.

CAP. CCXX.

Synonyma **H**Oec [quod in prod. 32. est: in pin. verò Gramen spartum 10.] album est, & ex radice alba, setarum instar, *folia* cubitos quatuor longa producit, quæ forma & tenuitate, & robore caudam equinam eiusque setas referunt: ex quibus Iauē insule incolæ rapetia texunt. Cuius fortè mentio fit in C. Clusii curis poster. sub Herba, *Sparto Hispanico n. n. ab simili*. Sic ex Insula Virginica, arboris cuiusdam cortex candidissimus, in pili tenuitate diuisis adferret, è quo incolæ pānos texunt: hunc corticem à D. Gillenio, Gramè verò à D. Saltzmanno accepimus.

GNAPHALIVM TRAGI, SIVE IVNCVS
Bombycinus.

CAP. CCXX.

Descriptio



Gnaphalium
Trago.
Linum
pratense.

Implexis fibris radicitur, iucos tollens rectos enodes, foliosos, in quorū summitate è bifori vagina, longis lentisque pediculis appenduntur paniculae tomentose, candida bombycū opera & molitie præstantes.
A Trago inscribitur Gnaphalium, & Matteschæ / h. c. Linum

pratense, & Wisen wollen, id, est, Lana pratensis cognominatur, statuiturque Iuncea Graminis genus. Eiusdem cum Trago opinionis est Cornarius.

Tabern. icon. & Hist. *Gramen tomentosum*, *Linum pratense*, *Linagroß*, *Eriofchanus*, *Linoschanus* Angl. *Waterleese* & *Medeoye wouste*. Fland. & Brab. *Syde Biese volckbiese / Quispelbiese / Mattensplachß vuidt wattenbiese*. Germ. *flachs sengraß*. Errant qui Dioscoridis Gnaphalium faciunt.

Geln. de stirp. coll. vocat simpliciter *Matteschæ flachs*: In catal. pl. appellari censet Alopecuron, & Frumentum caudatum à quibusdam, quæ opinio nobis non placet.

An Plinius lib. 19. cap. 1. de hoc ait: Aegyptii quartum Lini genus Orchomenium appellant. Fir è palustris veluti Arundine duntaxat (Fit è palustris arundinis foliis, vel duntaxat Dalech.) panicula eius.

Casp. Bauhin. Phyt. *Gramen 122. siue tomentosum*. Eid. pin. *Gramen tomentosum 2. siue Gramen pratense tomentosum panicula sparsa. Gnaphalium* Diosc. Trag. *Typha* Diosc. Ang. *Iuncus bombycinus*, Adu. Lob. icon. pag. 87. Obs. pag. 44. *Gramen eriophorum*, Dod. *Linum pratense*. Geln. coll. Icon. *Gnaphalium Tragi*, Hist. Lugd. pag. 116. *Pseud linum*, Cast. icon. *Gramen iuncum lanigerum* Thal. *Gramen tomentosum*, & *Linagroß* Tab. *Gramen tomentarium*, Ger. Nonnunquam contractis pediculis tanquam pappus conspiciuntur.

Genus provenit in vliginosis pratis quæ itur *Colym*, cum suo tomento Maio. In valle Griefbachiana vbi fontes acidi, abundat. C. Bauhin. observavit Basileæ propè Michelfeld. Plurisque humidis & desertis Brabantia & Germaniæ locis, huiuscemodi Gramen reperitur: præsertim Iunio ac Iulio mensibus, quando ex ipsis iuncea stylis lana candidans dependet.

Vi pollet adstringente & condensante, quare in vino nonnulli decoquunt, propinquantque alii profluvio, ac colica ab eadem causa exorta laborantibus, vires vltiores & facultates nos latent, Tab.

IVNCVS ALPINVS CVM CAUDA
leporina.

CAP. CCXXI.



Crebros ex parvis radicibus surrigit culmas dodrantes, interdum cubitales, striatos, *foliis* propter tetram stipatos, quæ & ipsos culmos aliquotusque involuunt, alioquæ Iuncea folia in stylum exeunt acutum, paulloque supra radicem rufescentia, sæpe in fibras como-

comotas fatiscunt: ceterum singuli culmi in orbisatam caudam, canescentibus tomentosis squamis, compactilem, fastigiantur, molliticoleserica prouocantem: radicatur denique fibris aliquam multis, fragilibus.

Caesp. Bauh. phyt. *Iuncus* 10. siue *Schoenolagurus*, missus à Fratre Io. Bauhino nomine Iunci alpini cum cauda leporina: Eid. in prod. *Iuncus* 7. siue *capitula lanuginosa*: Item pin. *Iuncus capitula lanuginosa* 3. siue *Schoenolagurus*, à capitulo haud multum leporum cauda dissimili.

Prouenit in monte cundo Ribesgawe ex fonte acido S. Petri Maijo, eodemque mensē in procelso monte, itinere Griesbachiano, *Dornjster* vrbem Ducatus VViremb. versus.

IUNCUS ALPINUS BOMBYCINUS.

CAP. CCXXII.

Qui C. Bauhino in prod. *Iuncus* 8. in pin. verò *Iuncus capitula lanuginosa* 2. siue *alpinus bombycinus* est, ei ex radice aliorum Iuncorum simili, *salsa* iuncea exurgunt, inter quæ *culmi* plures tenuissimi, palmi minores, qui capitulum paruum, lanugine alba ornatum, sustinent.

In montibus Morauicæ loco dicto *Reffel*, Di Fleissertus eruit, & communicauit.

SCHOENANTHOS SIUE IUNCUS odoratus.

CAP. CCXXIII.



Inter Schoenanthi vulgatis plantas reperitur quedam festuca, multæ simul innæta, Gramini similes, in quibus interdum ab vna radice oriuntur multæ veluti spicæ, cespiteo modo longitudinis palmi, coloris ferè & forma foliorum Tritici circa inferiora, color enim est ex luteo pallidus, vt plurimum, vel quasi cinereus, interdum tamen

etiam rubent: rubent etiam superiores partes foliorum, quæ vbi graciles sunt circumuolutæ ab ipsa statim radice: *salsa* sepius inter se circumuoluuntur & efficiunt veluti caulem. *Caulis* habet multos ab vna radice, circa quos conuoluuntur folia in inferioribus, nodis (longè ab intuem distantibus) distinctos. A nodis exoriuntur etiam folia, quæ caulem amplectuntur. *Caulis* autem similes sunt culmis Tritici Auenæ, Graminis &c. qua ratione verò dicuntur *ab aquo*, à Dioscoride, intus non sunt concaui vt prædictorum, sed medulla fungosa farcti simili medullæ Iunci vulgaris: *steres* ex purpureo canescentes, papposa lanugine obsiti, habent aliquid com

mune cum Arundinis floribus, ac quodammodo similes feminibus Nerij. *Radices* multæ sunt lætis longæ, duræ, denudatæ, vt plurimum, à cortice, quodammodo similes Cirris Hellebori, vel Valerianæ. Interdum adfunt radices paulò crassiores, densæ, geniculatæ, gultu valentiores reliquis, ex quibus tum circi oriuntur, tum ipsæ veluti spicæ quæ videntur veluti per terram repisse. Vbi recens est hæc planta, qualem ego vidi, manibus confricata iucundi est odoris, & saporis non ingrati, licet videatur aliqua adesse amaritudo cum acrimonia, luculenter linguam mordicante, quæ tamen solet elicacior esse in quibusdam foliis tenuissimis, cramineis, valdè tenuibus, & carinatis.

Clusius apud Garciam sic describit: Natæ sunt nobis anno 1568. aliquot Iunci odorati plantæ, è femine, ex Italia misso. Est verò Iuncus plura multis culmis aturgens, tenerioribus foliis quam Gramen, seu *rua* (quam pulcherrimè refert) linguam mordicantibus iucunda & aromatica quadam acrimonia, quæ trita gratum quidem spirant odorem, sed in quo rose odor non eluceat: nam manducata potius Rosæ, præsertim Saccharo condita, odorem emulari videntur. Nullum protulit florem, quod ferè prouenerit: imò primis frigoribus perit, ita vt annua planta censenda sit. Radix est numerosa & capillaris, non nodosa, vt ait Serapio, gultu feruido & aromatico. Eius *iconem* ad vitium expectatam inferere hic libuit.

Iunci duplex genus est (vt vult Diosc.) Vnus vocatur Iuncus læuis: alter Iuncus acutus, qui in summo acumen habet. Duplex autem & huius species est: Alter enim sterilis est: alter semen habet rotundum, nigrum: Et huius calami crassiores sunt, carnosioresque. Est & tertium genus, multò carnosius & asperius, quam illa duo, quod vocatur holoschænos, hoc est, Iuncus torus. Habet & hic semen in cacumine, simile præcedenti. Ceterum Æthiopicus (alij *seren*) Iuncus somniferum semen habet.

Plinius lib. 2. cap. 18. de Iuncis agens. Tria, inquit, genera citus: acuti sterilitique, quem marem & Oxyon Græci vocant: reliqua fæmenini, ferentis semen nigrum, quem Melantranin vocant. Crassior hic & fruticosior. Magisque etiam annuum tertius, qui vocatur holoschænos. Ex his melantranis sine aliis generibus nascitur. Oxyon autem & holoschænos eodem cespite. Vitillissimus ad vitilia holoschænos, quia mollis & carnosus est. Fert fructum enorum coherentium modo. Nascitur autem is, quem marem appellauimus, ex semetipso, cacumine in terram defixo. Melantranis autem, suo semine. Alioqui omnium radices omnibus annis intermoriuntur. Hæc Plin. de libro 4. Hist. pl. Theophrasti transfuit. Sed mox de suo addit. Vfus ad nasas marinas, vitillium nexus, elegantium Lucernarum lumina, præcipua medulla, amplitudine, iuxta maritimas alpes tanta, vt incisio ventre impleat penè vnciarum latitudinem: in Ægypto verò cribrorum longitudinem, non aliad vitilliorum. At verò hic locus haud dubiè corruptus est. Deest enim vnciarum numerus. Quæ verò puranda est cribrorum longitudo? Quamquam autem inquit Cornar. doctissimus quisque ita hætenus legerit, & locum hunc citauerit: tamen ego sic lectionem restituendam iudico, vt legatur amplitudine iuxta maritimas alpes tanta, vt in ciso ventre impleant denum vnciarum latitudinem: in Ægypto verò cybiorum

Clus. test.

Iunci duplex Diosc.

Iunci genera Plin.

Plini loci corruptus

longitudine, non aliis vtiliorem. Denum viciarium, id est, pollicum latitudinem implere dixit. Sunt enim aequè duodecim pollices in pede Romano, sicut in libra duodecim uncia, velut lib. 5. cap. 9. comm. medic. declaravi. Et profectò proclive fuit penè vocem, per denum substitueret. Deinde cybiorum longitudinem implere ait, eamque longitudinem non esse aliis, quam cybiis videlicet, vtiliorem, nimirum ut ipsis excipiantur ac colligantur. Cybium autem appellari concisam pelamidè Plinius testatur. Et hic facile fuit à cybiori voce, ad cribotum vocè delabi. Vetus noxter codex cimbiolorum scriptum habet vnde ad hanc coniecturam devenimus, quam cuiusque iudicio expositam, sequendam aut reptobandam relinquimus. *Porro subiungit Plinius hinc vsum Iunci medicum. Iunci radix, inquit, in tribus heminis aquae decocta ad tertias, tussim medetur. Semen tollum & in aqua potam, sistit alium, & saminarum menses, capitisque dolores facit. Et haec consonè cum Diosc. nisi quòd in aqua potam, pro aqua decocta dixit. Est autem vicia vinum aqua dilutum: deinde rursus menses reddit paulo post suo more, velut iam saepe dixi. Verùm quod hinc sequitur penitè alienum est à Diosc. sententia. At qui vocatur rursus menses reddidit paulo post suo more, velut iam saepe dixi. Verùm quod hinc sequitur penitè alienum est à Diosc. sententia. At qui vocatur rursus menses reddidit paulo post suo more, velut iam saepe dixi.*

Iunci vsus medicus.

Euripico Plinio;

Et tandem subdit Plin. Inuenio etiamnum vinum Iunci genus, quod Euripicem vocant. Huius semine somnum allici sed modum seruandum, ne sapor fiat. At hic Euripices vocis lectio doctis semper suspecta fuit. Vetus codex Trepicen habet, non minus incerta lectione, Dioscoridis codices partim *εὐριπίου* habent, partim *αἰθιοπίου*. Hos sequutus iudicium doctis defero.

Galenus, iuncus lauis alter, inquit, *εὐριπίου* alter *αἰθιοπίου* nominatur. Et gracilior quidem ac durior est oxysechæus, crassior autem & laxior holschæanus. Semen holschæani somniferum est. At oxysechæni duæ sunt species, altera sterilis, cuius vsus ad medicinam nullus est: altera semen fert, & ipsum somniferum, sed minus quam holschæni semen. Inducit tamen hoc etiã capitis dolorem. Amborum verò semina si cum vino bibantur, fluxiones ventris resicant, & fluxum rubrum cohibent. Ex quibus clarum euadit temperamentum ipsorum esse compositum ex terrea substantia leniter frigida, & aquosa: leniter calida, ut inferna siccare possint: & vapores ad caput remittere leniter frigidus, quibus somnum inducunt.

Iunci odoratus rotundus, seso.

Celsus & Latiniore Iuncum odoratum rotundum vocant, ad differentiam angularis, quem iidem quadratum appellant, Græcè *εὐριπίου* appellatur per excellentiam, quum aliàs omnes Iunci species hoc nomine veniant. Hippocrates *εὐριπίου* *αἰθιοπίου*, id est Iuncum odoris iucundi, & benè olentem, ac odoratum, in lib. morb. mulier. vocat, h. c. Aromaticum Iuncum, ut Galenus exponit in glossis. In Officinis hodie radices raro habentur. Quae verò reperiuntur Festucae siue culmi, Squinanthi nomine appellantur corrupto illo ex *εὐριπίου* *αἰθιοπίου*. Nostri *Welschende bingen* vocant, *Camelherb* / host est Iuncum camelorum, velut etiam Galli *pastum* camelorum. Et profectò Festucae illae Officinarum praeraste apparent ex superna parte, quod ipsis à Camellis contigitile verisimile est. Appellant etiam Græci *εὐριπίου* *αἰθιοπίου*, quòd in vnguenta recipiatur.

In Mazcate & Calaiate Arabiae prouinciis, ab incolis *Sachbar* vocatur: à nonnullis verò *haxis cabule*, id est, herba lotoria, aut lotionibus idonea: tametsi non negem [inquit Garcias] aliis etiam nominibus apud Arabes insigniri. Nā Auicenna lib. 11. cap. 591. cum *Adhar*: Serapio c. 19. *adher* appellant: quos sequuntur omnes Arabici & Perlici Medici hic agentes: florem verò vocant *Foca*. Nam quod Syllaticus cap. 12. *adher* & adhecarum vocari scribit, corrupta sunt vocabula. Perlis, qui ad iam dictas, vsque Prouincias pettingunt, *Alasquod* herbam significat, vocatur, quo nomine per excellentiam appellari potest. Apud Indos peculiare nomen non est sortitus, sed herba *Mazcatensis* appellatur. Sunt qui *palcam de Mecha* nuncupent. Nec desunt qui *Pastum camelorum* vocent, nec immeritò, sed tamen Cameli non sunt istic adò frequentes, ut hoc Gramen cum floribus omninò depascere possint. Sed sunt ibidem multi Asini, Muli, Equi, quos Atabicos vocamus, boues Caprae, & oves, quae nullum aliud pabulum norunt quam hanc herbam, siue Gramen. Desertur quidem in Indiam in vsum Medicum vsurpandis. Maximè tamen copià per fasciculos colligatur, in nauibus adsumunt equarii mercatores seu margones, ut equis subternant, ne stercoreis & vrinae praedote offendantur. Nam simul atque maduerit, recentem subternunt, & madidum in mare abiiciunt. Sed & nautae fasciculos aliquot secum aduchere solent, quos deinde in Italia vendunt. Memini in Insula *Diu* vili emisse multos Iunci fasciculos, quos in Lusitaniam cum aliis aromaticis mitterem: nullum tamen florem videre contigit. Sed nec aliquo in pretio ab incolis habetur, cum gens firrudis & syluestris. Nullus est huius vsus apud istius regionis incolae: sed nos duntaxat, & Medici Arabes & Persae, eo vtuntur. Ipsi indigenae eo se & sua iumenta lauant. *Nunc ad Aethiopes, qui eius meminerunt veniamus.* Dioscorides lib. 1. cap. 16. laudatissimè ex Nabathæa, proximum Arabicum, quem aliqui Babylonium vocant, pessimum ex Africa adferri scribit. Floris culmorum, radicisque esse usum. Eligendum eum qui manibus confricatus Rosae odorem emittit. Scio in iis quas supra enumeraui prouinciis, quae Arabia nomine comprehenduntur, provenire. An verò in Nabathæa gignatur (quae à Nabatoch Ismaelis nepote denominata, prouincia est Arabiae Iudæae continens) diligenter percontatus sum à Medicis, qui in Hierusalem, Galilæa, aliisque vicinis prouinciis versati erant: Sed illi responderunt, eum, quo istic vtentur, ex Cairo aduehi. Interrogati verò an in Cairo nasceretur, an autem ex Mazcate adferretur, ignorare se dixerunt, quoniam medicamenta interdum ignota manerent ob indigenarum negligentiam. Quae cum audirem, inquirere non volui num Babylone nasceretur, tametsi id fieri posse putem. *Cum Africam verò Dioscorides Africanum improbet, non oportet nos admodum sollicitos esse in eo inuestigando, praesertim cum non adscriptum quae Africae regione proveniat. De floribus autem, cum meam, tum reliquorum Medicorum negligentiam agnosco qui non iubeamus eum aduechi. Nostri etenim culpa factum est, ut eius vsus defierit. In medicamentis odoratis, Dioscoridem incertis comparationibus plerumque uti video, quem admodum & in hoc Iunco. Nam tritus iucundum quidem spirat odorem, sed Rosae haudquamquam. *Iuncus odoratus*, Cornelio Celso Iuncus rotundus vocatur, & ad Iunci vulgares, & cyperis, siue Iunci*

Iunci

luncus triangularis differentiam : sed minime in eam altitudinem excrefcit, quâ luncus. Auicenna lib. 1. cap. 59. duo eius genera conftituit, Alcerum enim Arabicum vocat, qui eft odoratus. Alterum in *Agiam* natum, per quod vocabulum *Damaſcum* intelligit. Sed quod Dioſcoridis teſtimonio, luncum fructum proferre nigrum probet, manifeſtus error eſt, cum Dioſcorides nſquam fructus meminerit. Serapio lib. ſimpl. cap. 19. ex auctoritate Bonif. ſcribit luncum habere radicem *Chulem* ſimilem, latiore tamen, & minoribus modis cinctam, multos calamulos præduros proferentem, qui fructum proferant ſimilem floribus Arundinis, graciſſiorem tamen & minorem: ſimulque & in vno caſpite multas plantas naſci. Huius radix adeo ſimilis eſt Chulem, vt ſub eo nomine à nonnullis appelletur, quemadmodum initio dixi. Matthæus Siluaticus cap. 12. decem annis conſeruari aſſerit. Credo in ſiccis & mediterraneis regionibus multo tempore conſeruari poſſe, cum humiditate non abundet. Sed in huius Prouinciæ maritimis, paucis annis in ſua odoris fragrantia conſeruari poteſt. Quod ad Braſauoli & Monachos in Meſuen com. attinet, doctè illorum argumenta reſellit Matthiolus, Com. in Dioſc. lib. 1. cap. 16. quare ſuperuacuum eſſe iudico quidquam his addere. Satis tamen Monachorum in Meſ. diſt. 1. cap. 47. oſcitantium mirari non poſſum, qui calangam lunci odorati radicem eſſe contendunt, cum galanga in Sina naſcatur, quæ bis mille ferè leucis ab Arabia ab eſt, & plurimum ab luncu odorato differat tum foliis, tum radice: nec niſi ſata proueniat galanga, quemadmodum & Calamus: luncus verò ſpontè naſcatur, nec ſeratur. *Hætenus Garcias. Tempeſtuum nunc eſt, vt ad alios Auctores qui de luncu ſcriperunt, deueniamus.*

Anguillara ſibi perſuadet Squinanthum non eſſe luncum odoratum: quia in Squinantho, non reperitur caulis qui ſimilis ſit cauli Cyperi, vt videtur voluiſſe Dioſc. Deinde quòd radices quæ exhibentur non ſunt ſimiles radicibus Valerianæ. Præterea quòd in vſu medico olim ſos, caulis, & radix lunci odorati recipiebatur: noſtri autem vſus tantum ſit foliorum: res quæ non videbatur ſtenda fuiſſe Dioſcoridi: ac etiam quòd odor & ſapor qui in lunci odorati caule & radice ſentiuntur, in Squinanthi iſtè partibus non item. Cum in libris Arabum legimus (Monachorum in Meſ. verba ſunt) ſorem Squinanthi, non poſſumus per Squinanthum intelligere ſorem Schœni, ſed plantam eius, intelligunt enim per Squinanthum abſolutè plantam ipſius ſchœni. Schœnum autem non ſunt illæ paleæ, quibus vbique in Officiis vtuntur: quia deſcriptio Dioſcor. de Schœno odorato non conuenit illis, vt quilibet videre poteſt: non enim habet radices notabiles ad Medicinæ vſum, ſed quaſi capillaceas paruas, & nullius roboris vel momenti, nec mordicant linguam ipſæ paleæ, & quamuis ſint æqualiter odoratæ, non tamen ſpirant roſæ odorem: & quod maius eſt, videmus quod non producant luncum, ſed calammum nodolum, ſicut & calamus hordei aut frumenti: quoniam vt plurimum expottantur cum parte ipſius calami. Vnde nonnulli rectè exiſtimant ipſum Squinanthum vſualem eſſe plantam calami aromatici. Reuera Squinanthum non habemus. Sed multorum quidem non ſpernendorum eſt opinio, quòd hæc radix quia communiter pro Galanga vtuntur, ſit radix ipſius veri Squinanthi. Etiam à nonnullis qui fatentur ſe vidiffe viuam plantam iſtius Galangæ vſualis,

habuimus quod ad vnguem correfpondet Dioſc. deſcriptioni de luncu rotundo, odorato. Galanga autem, quæ (vt ſuprà diximus) Græcis incongnita fuit, & à nobis quoque minime cognofcitur, alia planta eſt, & apud Arabes ſolummodo perquirenda. Vnde tam pro floribus quàm pro ipſo Schœno, (quibus caremus) quàm etiam pro ipſa radice poſſumus, vt vbi oportet hæc vſuali Galanga. Poſſumus quoque vt hoc vulgari Squinantho, quod eſſe plantam calami aromatici, opinantur plures, quoniam, vt in Dioſcoride & cæteris fide dignis authoribus videri poteſt, virtutes & proprietates calami aromatici & lunci odorati, nihil, aut ſatis parum, inter ſe differunt: ex quo bene poteſt alterum pro altero compenſari. *Hætenus Monachi.*

Cord. in Dioſcor. hæc de Schœnantho ſcribit. *Cord.* Contuli aliquoties de Schœnantho cum mercatoribus, nonnullisque aliis grandæuis & magnis viris, qui viſendæ terræ ſanctæ gratia in Orientem hinc proficiſcebantur. Ij reuerſi, negociatores ex Syria Alexandriam ducere Camelorum greges, quos *Caruans* vocant, impoſitas merces ferentes, cum autem in ſolitudo proueniant inter Syriam & Ægyptum ad Arabiam fitas, neque pabuli, neque aquæ copiam inueniri, naſci tamen ſecus vias vbique aridæ veloſtippulas, eâſque numeroſas, denſas, & ſupatas ex imo radicem caſpite admodum odoratas, quas obiter inter eundem aut aliàs queſcentes depaſcant Cameli, eâſque ob cauſam ſe pabulum hoc *famelſtro* & *famelſhetu* appellare. Referbant etiam illos folere tali pabulo Camelos onerare, ne in ſterilibus deſicerent iumenta: quod verò ſuperſtit Alexandria & Alkani vili admodum vendere. *Hæc Cordus.*

His ſequentia opponit Matthiolus: Flos ad nos non importatur, quod tamen mirum non eſt, cum etiam Galeni tempore non haberetur. Proinde, inquit lib. 1. de Antid. luncum odoratum ex Arabia allatum &c. Quæ Galeni (ſi licet nobis dicere quod ſentimus) potiùs ridenda quàm probanda videntur. Arduum quippe fuerit credere, tam ingentem eſſe numerum Camelorum, qui locuſtatum modo in vniuerſum Schœni flores depaſcantur, vt nulla penitus ſuperſit planta, cui ſos non deuoretur. Referunt quidam naſci odoratum iuncum etiam in Apulia, quin & in Campania prouenit, vt Braſſauolus inquit Plinij auctoritate. Sed vereor ne hallucinentur, quòd nec inde flores adferantur, nec paleæ: neque etiam id Plinius aſſerimenter aſſerat. Is, quo Seplaſarij paſſim vtuntur, non aſſertur aliunde, quam ex Alexandria. Cæterum non parua quidem diligentia, dum emitur eſt adhibenda: quandoquidem non deſunt impoſtores, qui ad merces augendas, Schœnum palearum, & herbarum quibusdam ſtuſticis adulterent. Præterea videndum eſt, ne vetuſtate exoleuerit. Quod Dioſcoridem oſcitanter legerint, cum dicunt Schœnum luncum proferre nun cala num, facile patet, quandoquidem contrarium ſcribit Dioſcorides, vbi Schœni vſum reddit his verbis *χοληος & το αιδου & το ναδα μωρο, τρις ελκω.* Præterea quod communis vſus Schœnos acrimoniam non habeat, pariter falſum eſt, palam eſt, Monachos vel nunquam Schœnum deguſtaſſe, vel ſi deguſtarunt, illum adeo vetuſtate exoleuerum fuiſſe. Quod autem noſtri Schœni radices tenues ſunt, nihil ad hiftoriam refert: ſue enim tenues ſunt, ſine cratte, eas non deſcripſit Dioſcorides, Schœni flores ex Alexandria ynâ cum integra planta allatos ego

in manibus habuit, qui digitis attriti Rosarum odorem emittebant. Quamobrem non temere contra Monachorum sententiam affirmandum putauerim communis usus Schœnnum, legitimum & probatissimum esse. Et in post. comm. Lat. & Ital. com. mag. fig. Fuchium errasse crediderim, qui scripserit sua in methodo, Schœnanthi stipites nullam acrimoniam mansu relinquere: in quo errore cum secutus est Anguillarius.

Patavinus nos rotundum odoratum Iuncum, qui non fuerit exoletus, nunquam degustasse Anguillarium, ut nec Fuchium. Nec prætereundum erat quod aliquando monuit Rondeletius præceptor meus, figuram Schœni odorati Matthioli fictam, potius, quoad flores, quod manifestè mihi quondam apparuit visis Verona apud insignem Pharm. Bellicorum summmitatibus Schœni odorati in quibus erant velati flocci: Lugduni copiosum habebat Valerandus Dourez pro Theriaca.

Monachos quoque refutat *Amatus*, dicens: Schœnos siue odoratus iuncus, in Africa & Asia præcipuè nascitur, quanquam & in Campania & Apulia reperiri, viribus saltem impotentioribus, audio: quem Latiniore rotundum Iuncum odoratum appellant, ut diversum ab illo odorato anguloso Iunco faciât, quem hodie Officina sub eodem ferè nomine habent, Schœnanthum appellant. Verbum iunci, florem significat, nam Schœnos Græcè iuncus est, Anthos verò flos, unde Schœnanthum, quasi iuncus flos: quanquam hodie, veluti Galeni tempore, flos ad nos non affertur, unde ille libro de Antidotis primo, ita inquit, præterea Iuncum rotundum Arabicum immitti præcipit, qui à vulgo, haud scio quomodo, Iunci rotundi flos dicitur, quum tamen nos non adeò floris copiam habeamus, tota enim aduehitur herba subinde ex parte superiori à camelis erosa: nam libentissimè eam depascuntur, & copiosissimè in Arabia viis crescentem habent, *hæc ille*. Hodie quoque ex Oriente ad nos absque flore portatur, cuius folia, caulis & radix in Officinis habentur quæ utinam pura essent, quum à multis adulteretur, illis variâ immiscensibus, vel recètia saltem & non verè portarentur, quum Galeno autore, facile schœnos veterescat, quod ex odoris amissione deprehenditur. Nonnulli tamè opinati sunt, ut Monachi, qui nuper Mesues antidotarum enarrarunt, quod hodiernum Schœnanthum officinis vulgare, Dioscoridis Iuncus iste odoratus rotundus non sit, quum in eo acutus ille desideratus sapor, linguam mordicans non percipiatur, nec quantumque odoratum sit, nec manibus contritum Rosæ odorem spiret. Item quod Schœnanthum hoc, non Iuncum aliquem ex se mittit, sed potius calamum, similem illi quem Triticum aut Hordeum facit, unde inter se multum differre, pro firmiter gloriatur: sed re vera eorum gloria in infamiam vertetur, quum in duplici errore comprehendatur, primò Dioscoridis textum non intelligentes, quum Dioscorides Schœnnum, id est odoratum Iuncum, non Iuncum aliquem ex se loco caulis mittere, sed potius harundinem, aut calamum tradat ut in sua legitur lingua, quæ ita habet, *ἵνκος δὲ ἄριστος, ἔχει τὴν ἰσὴν ἀρωματῶν, ἢ τὴν ἐλάτης*, id est, floris calami, & radicis vilius est. Ex quibus verbis satis percipitur, quàm malè Monachi isti Dioscoridem intellexerunt, quum Schœnon, non Iuncum, sed calamum ex se caulis vice mittat: Secundo hallucinantur Fratres ij, quia experientie contradicunt, affirmantes Officinarum Schœnan-

thum in gustu linguam non vellicare, quum te vera recens eam valentissimè mordicat, unde credendum est, Schœnanthum ab illis gustatum, vetus omninò esse, à quo non solum odor, sed & sapor facillè, ut ex Galeno didicimus, evanescit. Sed quod Rosæ odorem referat, qui illius flores viderunt, similem odorem habere attestantur, ut minimè ambigendum sit, quod Officinarum Schœnanthum, Iuncus odoratus Dioscoridis sit, cuiusque vires inuestigat Galenus l. 4. simpl.

Fuch. de comp. med. ait iunci odorati flore qui Actuario & aliis recentioribus Græcis *ἰνκος* appellatur, maxime vendum esse. Hodie tamen florem ad nos minimè deferri, sed culmos dumtaxat eiusdem, superiore tamen parte à Cameliis erosis: Germ. Camelshew / i. e. Fœnum camelorum, nominari in offic. vero Squinanthum. Esse præterea perhibet qui culmos illos legitimos esse negent, quòd se linguam non mordicet, nec Rosæ odorem spiret. His alios opponit, qui Schœnanthum recè & linguam valdè mordicare, & Rosæ odorem referre testentur. Nec miratur vetus & odorem & saporem amittere.

Anguillara & Monachi, ut ex hæcenus dictis patet, præcedentiū [Cord. Syllii, Cronemburgi, Dodonæi, nec non Cornarii, ac Amati, & aliorum, qui vulgarem Iuncum odoratum recipiunt,] opinioni resistunt, negantque nostrum Schœnanthum, esse verum & Antiquorum, quorum argumenta sic refellimus.

Primum Anguillara respondeo, me non animaduertente, Dioscoridem velle caulem Schœni similem esse Cypero, ut ipse ait: nec etiam igneio vocari Iuncum angulosum, ut dicit Dodonæus.

Secundò, Dioscorides cum comparat Valerianam siue Phu Schœno, non totam radicem, sed partes, videlicet *ἰνκος* intelligere.

Tertiò, quod ad argumentum desumptum à viribus & usu, quod ait nostri Schœnanthi usum esse tantum foliorum, dupliciter respondeo. Primum fortè eos vsos adhuc virentibus, & fieri posse, ut efficacior hinc sit recès, quàm verultior, qualem ut plurimum habemus. Apparet enim fibras rectas fuisse cortice, & tantum remanere lignosas partes, aut in cortice fortè vis non parua est. Secundo laudantur radices à Dioscor. & Galeno ab adstrictione, in quibusdam affectibus, quæ adstrictio gustanti apparet, maxime in crassioribus radicibus proximis caulibus & foliis. Flores laudantur à caliditate, idè recipiuntur in antidotos, ut Theriaca, iis tamen carum sicuti & culmis integris. Pro iis virum summmitatibus foliorum, & in eritò, cum omnia in iis comperiamus, quæ requirit Dioscorides, & Galenus licet fortè imbecillius.

Quartò dicit non silendum fuisse Dioscoridi foliorum usum: respondeo non siluisse Dioscoridem, nec Galenum, sed eos loqui primò generaliter de tota planta, deinde ne quis reiciat usum foliorum vel culmorum, vel radicum, vel ignoret vires valentiores in hac quàm in illa parte esse, contendunt particularem in usu esse partes prædictas, & qua in re differunt.

Quintò dicit, se non sentire, neque saporem neque odorem in caule & radicibus: ad hoc respondeo idem quod iam de radicibus. Præterea cum obcuriores sint vires fortè in culmo & radicibus minùs ei apparuerunt. Addiderim me nusquam legisse efficaciores esse vires in radicibus, & culmis quàm foliis, nisi in radicibus, ut dictum, ratione

Monachi

Amatus

Monachorum error

tionē, adstrictiōnis. Hāc eādē ratione respon-
deo Monachis, qui reiiciunt nostrum Schean-
anthum, quod radices non mordicent linguam.
Credo equidem eas non sensitse, cum nec in foliis
perceperint, in quibus manifestē tum Matthio-
lus, tum ego deprehendimus, nec non & Ama-
rus. Præterea non celebratur acrimonia in ra-
dice.

Sexto est quod respondeam Monachis dicenti-
bus Scheanthum luncum non producere, sed
calamum nodosum. Calamum ferre fateor, luncum
requiri à Dioscoride non reperio: interea
quo modo luncum sic similes postea ostendam in
descriptione.

Septimò non morabor refutando opinionem
Monachorum Squinanthum vulgare non esse
Calamum aromaticum, ut ipsi volunt, cum ra-
tionibus præcedentibus euerctam eorum argu-
mentā, & consentiam cum iis, qui credunt, nos
verum Scheanthum habere.

Octauò, refutanda esset eorum opinio, quā exi-
stimant Galangam esse luncum odoratum. Ver-
um hoc factum suo loco capite de Acoro.

Nonò miror Matthiolum ridere Galeni ratio-
nes, cumque non meliores adferre, imò hac in
parte nullas.

Decimò, illud considerandum relinquo an me-
ritò Matthiolus reprehendat Fuchsum, nusquam
enim legi eum scribere, quæ, dicit Matthiolus.
Recitat quidem loco supra adscripto, opinionem
quorundam, qui dicunt culmos non mordicare,
non autem suam. Quinimò in sine hoc vetustati
attribuit Fuchsius.

De luncis hæc notatu digna scripsit in suo pin-
Caspar. Bauhinus. *Iuncus* à iungendo, Græcis *σχι-
νθος*, à loris & funibus dicitur. Dioscorides in o-
doratum & inodoratum diuisisse videtur. Nam
lib. 1. de luncis odorato, quem simpliciter *σχινθον*
per excellentiam nominauit, egit. At lib. 4. de ino-
dorato tractauit: hunc duplicem fecit, vnum lae-
uem, alterum acutum: hunc sterilem, & alterum
femine nigro & crassiore calamo, & tertium *δολο-
χενος*, prioribus carnosiorum. Sic Theoph. 4. hist.
3. tria sunt genera *σχινης* & *ἀναρπος*, acutus & steri-
lis, qui *μακρὰ πη. σ.* frugifer, quem *μακροχενος*,
atriterum vocitat: tertius *ὁλοχενος* dicitur: de
odorato 9. hist. 7. egit. Plinius lib. 21. cap. 18. quin-
que fecit, 1. *Μαρίση* appellatum, 2. *Μαρινύμ*, O-
xyfchænum, & huius tria genera: acutum, steri-
lem, quem marem & oxym: alterum semen fe-
centē, quem Melancranium vocant, & fructuosior:
magis tertius, qui Holofchænos nominatur.
Quare Iuncus alius est odoratus, inodorus alter,
vel alius locis aridis, alius aquis prouenit: hic,
vel in aquis dulcibus, vel maritimis. Rursum v-
triusque generis alij *ἀπόχης ἐπ' ἀρεθον*, in mucro-
nem pungentem desinunt, alij in fastigium obtu-
sius: & sic alius *λατὸς*, leuis: alius *πυρρὸς*, asper:
alius fastigio acutiore, alius obtusiore. Iuncus la-
uis & in fastigio acutus, alius est Oxyfchænos,
alius Holofchænos. Oxyfchænos alter *μακροχενος*,
nullo semine fecundus: alter *σχινα* *μακροχενος*,
μακρὸς, nigrum semen ferens: sic ad fecundum cla-
uatus: per totum verò ad lapides referendus est.

Ceterum, Iuncus de quo præsentī capite nobis
sermo est, vocatur *σχινθον* *ὁλοχενος*, & *δολοχενος*, & *ἐ-
νόδιος*, Hipp. *σχινης ἀρωματικὸς* & *μακροχενος*, Græcis
posterioribus. *σχινης* Diosc. & Galeno. *Iuncus o-
doratus*, Plinio, Hermol. Ruell. Matth. Turn.
Lac. Lob. in Adu. & Obs. p. 42. Ic. plant. pag. 82.
Cluf. in Garc. & H. Lugd. p. 188. *Iuncus rotundus*.
Celso. *Iuncus rotundus odoratus*, Matcell. Amat.

to, & Corn. *Iuncus* sive odoratus seu aromaticus,
C. Bauh. phyt. in pin. *Scheanus* & *Iuncus odoratus*
teres ac rotundus, Cordo. *Scheanthum* Meluzo.
Lon. (cui & Cyperus rotundus.) Tabern. (&
Iuncus aromaticus) Cam. (& *Iuncus floridus sive*
aromaticus) Acolta. *Squinanthum* Varroni, An-
guill. Guil. & Officinis, quasi *σχινης* *αἰθρ.*, Iunci
flos. *Adhar* & *Adhir*, Arabib. *Sabbar*, Arabia
incolis. *Palea de Meiba*, & *Passu camelorum*, vul-
gò, & Germ. *Camelstro*, hoc est, Camelorum stram-
en, *Camelshew*, *Fenum camelorum*, mollric-
fende *Binsen*, luncum bene oleum; & *Can-
disch hew*, *Fenum Candia*. Gall. *Pasture de Cha-
meaux*. Ital. *Squinanth.* Hisp. *Paya de meya*.
Belg. & Angl. *Squinanthum*. Boh. *Sity wona*
ne.

Schiuus, alius in Lybia nascitur, alius in Arabia, Locu-
alius in Nabathæa. Adferretur & ex Ægypto. In
Campania & Apulia quoque reperitur. Reponit-
ur ut alia: quotannis mutatur, quamuis etiam
decennium seruari possit.

Vsum porò esse floris, & culmorum, & radi-
cis, hæc Dioscorides docuit: Vim habet vrinam
ciendi, menses ducendi, flatus dissolucndi; gran-
nar caput & moderatè adstringit: habet inf. per
vim atterendi, concoquendi, & aperiendi: Flos
igitur ipsius in potu commodus est ad sanguinis
eductiones, & ad dolores stomachi, pulmonis,
hepatis, renum: miscetur etiam antidotis. Radix
adstringit: quapropter etiam naufragandis sto-
machi exhibetur: hydropicis item & conuulsis,
cum æquali Piperis pondere ad aliquot dies. De-
coctum verò ipsius inflammationibus circa vte-
rum commodum est ad infesum. Galeno Schini-
anthos modicè calefacit, modicèque etiam ad-
stringit, nec planè à tenuitatis natura alienus est.
Quocirca his de causis vrinam mouere, mensē-
que ciere perhibet, siue in fomentationem,
siue in potionem adhibitum: prodest & ic-
coris, & stomachi, ac ventris phlegmo-
nis. Magis eo adstringit radix. Quod verò
floreum vocant calidius est. Porò in omnibus
suis partibus, in aliis magis, in aliis minùs, gu-
stantibus apparet adstrictio: proinde medicinis,
quæ hæmorrhæicis, siue sanguinem reiicientibus
exhibentur, commissetur. Ex Nabathæa lauda-
tissimus, vel Plinio teste, proximus Babylo-
nius, pessimus ex Africa & sine odore. Est autem
rotundus, vinosè mordacitatis ad linguam. Sin-
cerus in confricando odorem rose cinitit, ru-
bentibus fragmentis. Discutit inflationes, ob id
stomacho vtilis, bilēque & sanguinem reiici-
entibus. Singultus sedat, ructus mouet, vri-
nam ciet, viciè medetur. Ad muliebres vsus de-
coquitur. Opisthotonicis cum resina arida impo-
nitur. hæc Plinius.

Vires & ef-
fus.

IUNCI GENVS EVRIPICE.

CAP. CCXXIII.

Aliud etiamnum Iunci genus ex versione Desleipide
Hermolai traditur à Dioscoride, quod Euripicen
Evrapien *εὐραπίου*: pro qua voce Cornarius à nobis
recedens ad *Hermodium* legit, vide antè.) vocant: cuius
femine somni alliciuntur, sed modus in eo ser-
uandus, ne sapor fiat.

Non desunt autem qui Euripicen Tropicen ap-
pellent, inter Recentiores: quorum plerique eru-
ditionis suæ periculum faciunt; multisque parti-
bus rei latinè officunt:

Plinii verba de Eutipice, legendae. c. præcedenti.

IVNCVS PANICVLA ARVNDINACEA.

CAP. CCXXV.

Descriptio



Caulis siue styli huic ex vno cespice crebri, cubitales, aut altiores, teretes, firmi, propter terram rubentes, dein obscure virentes, striati, palmatibus foliorum tudimentis circa imū obuoluti medulla ratissima & prope modum membranacea, mucrone mitiore, sed plerūque longo &

tenui, infra quem panicula iubata effunditur, ad Arundinaceam accedens, sed ei mollitie cedens, semen fetens tenne & fuluam, oblongis, in tria foliola dehiscitibus conceptaculis clausum: radix crassa, multis, crassis, intus albis, fibris donata: cuius oculi primū erumpentes, squammis lucidis nigris compactiles conspiciuntur.

Synon.

Trago *Juncus vulgaris alter*, siue tenuior, cineracei coloris: *Junci tertium genus: Haleschianus Plinij: Virgilij Juncus mollis & limosus.*

Dod. gall. *Juncus secundus*: Et sic lat. in fol. & de frum. sed ibidem primo loco pingitur: Dicitur & *Juncus laevis*, siue *χαλκω-λαία*.

Lobelius in Obs. pag. 43. in Ic. verò pag. 48. figuram habet Dodonæi sub inscriptione *Junci laevis vulgaris panicula sparsa*. Sed ea non responderet descriptioni Aduersariorum.

Casp. Bauhin. phyt. *Juncus 1. siue acutus panicula sparsa*: Eid. pin. *Juncus laevis 4. siue panicula sparsa maior*: *Juncus oxychamos*, Anguill. *Juncus laevis* [siue lenis] Cordero in Diosc. Dod. Hist. Lugd. pag. 985. *Juncus laevis vulgaris* Lob. in Adu. & Thalia.

Locus.

Genear & Montbelgardii hic *Juncus* à nobis obseruatus.

IVNCVS MATTHIOLI.

CAP. CCXXVI.

Descriptio

Juncus Matthioli Maximo vt omnibus numeris minor, ita facilius, medullam habet compactiorem, albam, oleique in lampadibus bibulam, & elychnii seu funiculi candelarii sebo immerfus, detracto magna ex parte cortice læui, Solèque aut fumo siccor redditus, vicem supplet: flores è lateribus citra summitatem erumpentes, ruffescentes in orbem glomerantur.

An Lob. in Adu. *Juncus laevis vulgaris*?

An Trago *Junci vulgaris* genus alterum catnosius?


Synonyma

An Dod. lat. hunc describit pro *Junco* primo: Casp. Bauhin. phyt. *Juncus 2. siue acutus alter panicula non sparsa*: Eid. pin. *Juncus laevis 7. siue*



IVNCVS PVNGENS, SEV IVNCVS acutus capitulis Sorghi.

CAP. CCXXVII.



panicula non sparsa: *Juncus* Matth. Lac. & Cast. *Juncus laevis siue Oxychamos vulgaris*, Hill. Lugd. p. 984. *Juncus laevis glomerato flore* Lob. Ic. p. 84. *Juncus palustri minor* Tab. An *Juncus rotundus*. Casalpino.

Densè stipatos tollit culmos sesquicubitales, crassiusculos, rigidos, cortice pillo, medulla folioli diuicula, alba, quos statim à radice crassis fibris contexta, inuolunt foliaceae vaginæ rubentes, dodrantem circiter longos, comitantibus pinnatis crisillis Sparti Austriaci formæ, non .a. colore,

qui hic ruffus, aculantibus: infra mucronem autem culmorum pungentem tribus quatuorue pollicibus exiliunt storum seminumque glomerata capitula, quorum exortui subiectum est folium indidè erumpens, ex latiore principio vaginam imitata in acumen desinens.

Casp. Bauhin. in pin. *Juncus acutus 1. siue capitulis Sorghi*, & Dioscor. *Juncus acutus* Anguill. Cordi in Dioscor. & Calloris: *Juncus acutus acuminis* Gein. cat. *Juncus maritimus 1.* Lob. Adu. *Juncus rotundus alter*, Casalpini, quid: *Juncus* in maritimis nascente locis, acuto & ad vulnus infligendam infello acumine prædito, *Oxychamos* vocato, nos carcere dixit *Cordus*.

Casp. Bauhin. ad hunc suum *Juncum* referri posse putat *Viam* palustrem, & inusitatum *Carricis* genus, cuius folia peracuta, crura & pedes sauciantia traduntur par. 6. Ind. Occid. exp. in Floridam.

IVNCVS

IVNCVS ACVTVS MARITIMVS CAULE triangulo, C. Bauhini.

Radice est serpente, fibrosa, à qua aliæ radiculae, prioribus exsiccatas, nascuntur: hinc caules, quos ad radicem breuia folia cingunt, pedales, trianguli exurgunt, & in extremitatem pungentem desinunt, infra quam è latere floccus racemosus, rufescens exit.

Iuncus hic acutus maritimus caule triangulo, C. Bauh. in prod. 3. acutus, in pin. in littore Veneto, & à Perault via, quæ Mouspelio ad mare itur, provenit: & ad Danubium Lintzj legitur, referente Burfero. An Iuncus exiguus maritimus, Cels?

IVNCVS FOLIACEVS.

CAP. CCXXVII.



Foliaceus Iuncus obliqua radice, fibras albas demittente, recipit: culmi habet bicubitales & altiores, Iuncus panicula arundinacea mihi dicto satis similes, verum non adeo circa imum rubentes, nec ita densos crebrosque, medullâ rarâ præditos: quos duo triæve aliquotque obvolvunt seu vagina conclusos

folia, postmodum in stylos iunceos teretes abeuntia, è lateris fissura panicula prodeunt spatse magnæ (quarum capitula singularia parva) quibus parum altior reliqua styli portio, aliàs etiam brerior.

Nostra icon minus dextrè facta, malè exprimit folia obuolventia.

A Dod. gall. videtur pingi pro primo Iuncus, & describi pro tertio, sicut etiam in hist. frum. & Lat. in fol. vbi dicitur Iuncus acutus & Oxysebanus: à Germ. Strop biesen. Belg. Yseren biesen.

Dodonæi figuram habet Lobel. in Obs. pag. 43. secundo loco cum alia, quibus titulus communis, sc. Iuncus lanis vulgatus: Adu. p. 43. & 44. An verò descriptio Aduersariorum huic conueniat, iudicent doctiores.

An Tabern. icon. & hist. gramen iuncum 2. siue gramen iuncum aquaticum majus, Groß vasser bingrin gras: Fland. & Brabant. Groot water biesgras: Angl. Great water rushe-gras.

Casp. Bauh. pin. Iuncus acutus 4. siue panicula sparsa: Iuncus 3. Dod. gall. acutus Dod. & Castori, Iuncus acutus vulgaris, Lob. icon. pag. 85. Iuncus Oxysebanus Dodonæi, Hist. Lugdun. pag. 985.

Tom. II.

IVNCVS FOLIACEVS CAPSVLIS TRIANGVLIS.

CAP. CCXXIX.



Descriptio

Magnitudine non parum variat, aliàs palmatibus, aliàs plùs quàm cubitalibus culmis, nodosis, compressis aliquantum, fungosis, ramosis, striatis: folia & à radice statim, & adgenicula culmos aliquotque amplectentia, graminea, acuta: scirculis è culmo diuiso exactis, & ad diuarticationem radicum insidit capsellæ quinque, sex, plures, paucioresque, simul iunctæ, triquetrae, oblongæ, mucronata, ex rufo nigricantes, nitidæ, semina claudentes

perpuilla ruffa. Sed & culmulis aliàs perbreuibus, oblongis aliàs, spicæ quædam velut excrementitiæ, & ex foliaceo quodam genere squammatae, rubentesque insident, vdis præsertim & apricis hoc crebro euenit locis, vr circa Montbelgardum & Basileam in palustribus Michelfeldensibus: radix qualis Iuncis, fibris admodum capillata, usque longis, & iuxta terræ faciem coeuntibus, serpit, adeoque si culmi terram attigerint, ex articulis fibras demittunt terram denud comprehendentes.

Lob. Ic. plan. pag. 12. gramen aquaticum alterum. H. Lugd. p. 1007. Arund. minima. Tabern. icon. & hist. gramen aquaticum, Hydr agr. stis, Wasser gras.

C. Bauh. phyt. gramen 66. siue iuncum semino triangulari: Eid. pin. gramen iuncum 9. siue folia articulata aquaticum: gramen iuncum polycarpon Thali: Habetur maius & minus: in maiore, post senescium, caulis nouus palmaris excrefcit, cui non amplius capitula corymbacea insident, sed vtriculi viciales paleacei in capillamenta fissi, modò virides, modò purpurascetes: rarissimè cum corymbis vtriculi reperiuntur. Hæc C. Bauh. Nos huc gramen polystachion Thali reuocandum censemus.

Locis humidis copiosum obseruauimus Ge- Locks neuz & Montbelgardi, florentem Iulio, & cum capsulis Augusto.

IVNCVS TRIFIDVS.

CAP. CCXXX.

Ex longiusculis fibrosis radiculis scirpi pro- Descriptio ducuntur dodrantales, valdè tenues, quorum singuli per extrema in tres stylos palmares, acutos sinduntur, interque hos ad exortum sedentia semina pauca, ex ruffo fusca.

Pro Iuncus 4, siue acuminè reflexo trifido, sic à C. Bauh. in prod. describitur: Ex radice nigra, gea Xx 2

Synonyma



niculata & fibrosa, iunci plures, tenues, palmum superantes, exurgunt, qui in summo in tres, rarius quatuor, stylos, tenuissimos, trium, quattuorve vnciarum, diuiduntur, in quorum summitatibus, post iunci diuisionem, panicula parua locatae sunt. In pin. est *Iuncus acuminatus flexosus*, seu *minor*, vel *trifidus*.

Locus.

In monte Fracto Lucernatum, in Pyrenaeis & montibus Morauiae prouenit.

IVNCVS MAXIMVS HOLOSCHOENOS. CAP. CCXXXI.

Descr.



Nodosq; stylos omnium altissimos & crassissimos promit, medulla pumicosa & exigua: circa quorum fastigia è latere erumpunt paniculae sparsae, è capitulis turbinatis, magnis, squamatis, imbricatimque compactilibus, rufis, contextae, pediculis nunc longioribus, nunc brevioribus & ferè nullis: semen in squammas delitescit triquetrum.

Synonyma

Tragus licet iuncu maiorem palustrem, germ. grossi weyer Wurgen vocet, tamen Harundinis potius genus, quam Iunci existimat, indeque piscatoriam Abatitanam dicendam affirmat. Videtur alibi etiam Iuncum, Plinio Maritimum dictum, appellare. Ego autem non video quomodo ad Arundinem referri possit.

Locus.

C. Bauhin. phyt. *Iuncus* 5. Eid. pin. *Iuncus laevis* 2. *Iuncus maximus*, siue *Scirpus maior*, Mariscus Plinii: *Iuncus palmifolius maior*, Tragi & Tabern. *Iuncus grandis*, *Holoschoenus* Gesn. cat. & Dod. (cui & *Iuncus* 4. *magnus* in hist. gall. in lat. *Iuncus* 1.) *Scirpus*, *Iunci* 1. *species*, Lac. *Iuncus* 3. *Holoschoenus* Anguill. & Cast. *Iuncus* & *Scirpus*, Lon. *Iuncus aquat. maximus*, Lobel. Adu. & Ic. pag. 85; itemque Gerardo. *Iuncus laevis aquaticus maximus*, Thallio: *Iuncus rotundus* 3. Cxi. *Iun-*

cus laevis Gericon. *Holoschoenus*, H. Lugd. p. 987. Montpelii in lacubus: Basilea & Montbelgardii in Vitis fossis prouenit. Gaudet enim locis humidioribus, aquas crebro aut semper habetibus.

IVNCVS PARVVS CVM PERICARPIIS ROTUNDIS.

CAP. CCXXXII.



Palmare sapè, aliquando cubito nequaquam minores profert culmos iuncos, foliis circa imum multitis gramincis statim è radice obliqua, iucea, fibrata exortis, donatos, quorum scapus in umbellam inconditam Filipendulae modo explicatur, cuius capitula singularia, polita, rotunda, folliculis nigri-

cantibus, semen obuolutum gestant, tandemque in tres exiles carinas dehiscunt.

Gramen iuncum maritimum, Lob. ic. pag. 18. sic & Ger. *Gramen iuncum* 3. Tabern. *Gramen iuncum* 10. siue *foliis* & *spicis* 1. n. 1. Casp. Bauhin. pin. Eid. phyt. *Gramen* 69. siue *iuncum alterum*. In pratis & riguis obseruatur.

IVNCVS HVNILIS.

CAP. CCXXXIII.

Folia, stylisve profert fescunciales tres quattuorve teretes, ex radice fibrosa, & pro plantulae modulo, crassiuscula: vix enim vnciam saepe perat.

Gesnerus, cum Tiguri prope lacum [*Bartensee*] Feltnum collegit Maii mense, vocabat Iuncum humilem inutilem & *Chamaeschoenum*. Casp. Bauhin. in prod. est *Iuncus tertius*: Eid. in pin. *Iuncus laevis* 9. siue *Iuncellus muricis*. Huc referendum ait Iuncellum omnium minimum Lobelii in Adu.

IVNCVS EXIGVVS MONTANVS, MVCRONE CARENS, CASP. BAUHINI.

CAP. CCXXXIV.

Radicis est pusilla, nigra, capillacea, caudicibus quattuor vel quinque vnciarum, cuius summo capitulum paruum, ex fusco purpureo, cuius summo distidum, in exiguum rigidiusculum filamentum ambiens, infidet: *folia* ad cauliculi principium tria, iunceae, vnciam longa.

Iuncum 2. C. Bauhini in prod. siue eiusdem *Iuncum laevis* 3. in pin. D. Burkerus in Taurero Rastadien-

radiens collegit. Suspiciatur autem Casp. Bauh. hunc eundem esse cum *Iuncus lychnanthemio tenuis*, plures ex radice fibrosa emittente iuncos stylos, breues, digitales, spica perpusillâ, spadicefcenté- que in apice exornatos, Thalij, quem nusquam quam in Broccenbergo collegit.

IVNCVS FOLIATVS MINIMVS.

CAP. CCXXXV.



Iuncus minimus vnciales & fescunciales emittit culmas, plures ex cespitate ortos, enodes, paniculam singulos gerentes exiguam, glomeratam, senuen glumis rubescentibus triangulum occultantem, cui bina apposita foliacea cornicula, alterum surrectum, alterum secundum culmos deorsum vergens: folia è radicibus

fibrosis capillaribus angusta, vncialem longitudinem circiter adeptâ.
Nemausio attulit Gener Cherlerius.

IVNCVS MINIMVS FONTIS ADMIRABILIS.

CAP. CCXXXVI.

Segetem de cespitate vno tollit magnam, foliorum & culmorum, quæ præ tenuitate stamina imitantur, lætè virentia, glabra, altitudine plus minus palmari: culmi autem nudi enodifque, circa fastigium (quod acutum) paniculam iuncorum more ex latere emittunt, aliquando vnam, aliquando geminam, ex viridi fuscam, squammatam, exiguam, lenticulæ magnitudinis, aut paulò maiorem, turbinatam.
Inuenitur loco humido cum Holostio Matthioli propè *Eichelberg*, non longè à Fonte admirabili.

IVNCVS PARVVS MONTANVS GYM PARVIS CAPITVLIS LUTEIS.

CAP. CCXXXVII.

Longissimis fibris Iuncus hic montanus issicquibiles enodifque in summo fastigio capitulum gestans, duplo triplòve breuius quam Iuncus clauatus, inter squammas longiores emicantibus *slofculis* luteis.
Tom. II.



Perennis planta est, vt apparet ex reliquijs veterum foliorum, Nardo Celticae similibus.

Observauit in monte, cundo Ribelsaue ex Fonte acido S. Petri in valle Griesbachiana, locis humidis principio Maij tem. floren

IVNCVS CAPITVLIS LONGIS, SIVE CLAVATUS.

CAP. CCXXXVIII.



Erpente nitescitor radice, multis fibris capillata: culmi striati, nõ asperi, teretes, enodes, ac sine foliis, cubitum ferè æquant, fungosi, circa iunum rubentes, quorum summitas non in stylum exit acutum, sed in spicam clauatam, rufescentibus squammis imbricatam.
Lob. Obs. p. 44. Ic. plant. p. 86. Iuncus aquaticus minor capitalis Equiseti. Hist. Lugd. pag. 986. Iuncus clauatus Dalechampii, sine (in contextu) Iuncus alius secundus. C. Bauh. phyt. Iuncus 7. Eid. Synon. pin. Iuncus capitulis Equiseti. huc maior, varians sicutis latioribus & triplò angustioribus.

Genevæ in aquis circa *Aruc*, alibi que in cenosis & stagnantibus aquis nascitur: floret Maij & Iunio mensibus.

IVNCELLVS CAPITVLIS EQUISETI MINOR & FLUTANS, C. Bauhini.

EX radiculis capillaceis Iuncus recurvus tenuissimus (6. in prod. Iuncus capitulis Equiseti Descriptio alter, in pin.) prodit, qui in plures Iuncellos duarum triumve vnciarum subdividitur, quorum aliqui erecti, aliqui reflexi, capitulum minimum sustinent, & Iuncellis singulis foliolum tenue capillo ceu adponitur.

In aquis Angliæ fluitat, autore Gillenio.

IVNCVS LÆVIS, SEV SCIRPVS INDI-
cus Casp. Bauhini.

CAP. CCXXXIX.

Iuncus lævis (ἰσοχῆμος) 1. seu *Scirpus Indicus*,
Casp. Bauhini in pin. *Iuncus Indicus porosus*,
Clus. cur. post. nobis notus est. Ex hoc autem
Iunco parari in Guinea tapetia, par. 2. Ind. Oriët.
cap. 4. fortè prodidit Linchotanus. Fortè & ex
hoc, sportulas, floreas, stragula, & pileos in Gui-
nea puellæ faciunt, vt legitur par. 6. Ind. Oriët.
cap. 7. & apud Bantanos, pitæ lutoriæ, par. 5. Ind.
Or. fig. 11.

IVNCVS SYLVATICVS, TA-
bernamont.

CAP. CCXL.

Descrip: **R**adicibus nititur pluribus, digitali crassitudi-
ne, profundè in terram spatiosis, æqualibus,
Iunci palustris, multis fibris capillaribus: ab his ex-
oriuntur *florum loco*, oculi, ex latiore princi-
pio vaginam imitati, in acumen desinentes: *culmi*
sunt crassi, minores tamen Iunci palustris cul-
mis, iuncus albâ, molli, rarâque medullâ refertis: *flo-
res* in horum summitatibus glomerati, ex rubro
nigricantes.

Synonyma C. Bauhin. pin. *Iuncus lævis*, siue *Scirpus medius*:
Iuncus sylvaticus Tabern. ic. & hist. *Iuncus quin-*
tus. *Iuncus aquaticus maximus*, Ger. icon.

Locus: In syluis locis aquosis inuenitur.

IVNCI GENVS MEDVLLA PRORSVS
niuca Hist. Lugd.

CAP. CCXLI.

Descrip: **H**oc Iunci genus Iunco Matthioli proximû
est, paulò breuius & crassius, ex quo medul-
lam prorsus niueam extrahunt; tum ad lucerna-
rum lumina, tum ad candelabra, aliâque id ge-
nus confingenda, quòd facile in spiras duci, at-
que in se flecti & complicari possit.

Casp. Bauh. pin. *Iuncus lævis* 5. seu *Iunci lævis*
aliud genus, H. Lugd. sine icone, p. 985.

In stagnantibus & palustribus aquis nascân-
tur.

IVNCVS ACVMINE REFLEXO
maior.

CAP. CCXLII.

Descriptio **R**adices capitatas profert. Cæpis & Gethyis si-
miles, non omnino rotundas, sed quâ parte
aliæ aliis adherent & incumbunt, leuiter com-
pressas, cortice nigro obductas, quæ infernè & ad
latera radículas emittunt, in vnum cespitem, si-
curi in asparagis, coaceruatas. Inde prodeunt
scapi, seu scirpi multi, sesquicubitales, nigra tuni-
ca prope radices conuerti, qui infra cacumen pe-
dis ferè spatio extumescens veluti clauam con-
cipiunt, deinde pariunt ouo quid simile. Id porò
hians petiolos multos emittit, in quorum vertice

membranosa & rotunda vascula, obliquè adne-
xa, in quinque veluti radios fissa, fructum conti-
nent angulosum, nigrum, cuspidatum, minutissi-
mis *seminibus* & luteis plenum, saporis aquei &
subausteri.

Hæc diligentissimè Theophrastus expressit, vo-
cans Iuncum hunc oxyphænon; feminam, non
μελαγχρωτισμῶν, vt in vulgatis eius exemplaribus
corruptè legitur, sed *μελαγχρωσις*: Gaza atrife-
rum vertit, alii haud feliciter Attripitem, inquit
H. Lugd. p. 985. vbi Iunci Melanctranidis titulo
pingitur.

Casp. Bauhin. pin. dicitur *Iuncus acumine reflexo*
1. siue maior: *Iuncus lævis*, Gesf. cat. & Tabern.
Dubitat autem an sit Iuncus lychnanthemus
tenuis maior Thalii: nos hunc ad aliam plan-
tam referimus.

Nascitur in aquosis & pinguibus locis, sed pu-
ra & præterfluente aqua ferè madentibus.

IVNCVS ACVMINE REFLEXO ALTER,
Casp. Bauhini.

CAP. CCXLIII.

Culm. est sesquicubitali, rotundo, læui, aphyll-
o: *panicula* umbellæ simili, atrop splendente,
pediculo carente, filamentis cæuleis, vt in
Aphyllonte, donata: quam caulis duarum, tri-
umve vnciarum, acutus, sed mollis, parùmque
reflexus supetat.

In Prouincia Galliæ prouenit Iuncus, qui
Casp. Bauhin. in prod. quartus est: in pin. verò
Iuncus acumine reflexo secundus.

IVNCVS FLORIDVS.

CAP. CCXLIV.



Floribus in-
signis Iun-
cus, nudos cau-
les, rectos, alte-
ram aut tertiu
cubitum altos,
minimi ferè di-
giti crassitud.
erigit, quorum
fastigiû ex folli-
culo membra-
neo emergentè
amplam tuiti-
net umbellam,
inæqualiter di-
gestâ: *florum* ex
albo purpura-
centium, (can-
didorû, Trag.)
staminibus lu-
teis medium
occupantibus,

quibus succedentia capitula *semina* parua conti-
nent: *radicem* habet iuceam, crassiusculam, si-
bratam à qua *folia* compluscula, caule non mi-
nora, germinant, carinata, cyperi similia, qua-
drantem vncie lata, vel latiora.

Eum sic descripsisse videtur Cordus in hist.
Gladiolus palustris, folia ab vna radice erigit
multa, Iridi similia, angustiora tamen, triquetra,
& superiùs in mucronem desinentia, è quorum
mediò caulis duàm, triumve cubitorum altitudo

altitudo

dine erumpit, insigni leuore & equalitate præditus, in cuius summo flores multi, longis pediculis, ex vno principio nascuntur, in purpura candidi, tribus foliis constantes, sub quorum interuallis alia tria (sed illis minora) sunt: stamina in se flores habent numero plerumque nouem, atque in summitate puluisculo manus atrectantium inficientia. Habent singuli flores in medio capitulum, semini ferendo aptum & sex partibus diuisum, quibus sunt singuli in summo repandi apices: omnibus huius capituli angulis singula adherent gutta, admodum parua, crystalli modo translucida, sapore & substantia melior. Radices habet duas, quarum gracilior & nigrior descendit: crassior uero superius ferè in superficie terræ transuersa fertur: utriusque propagine aliquot, & multæ fibræ adnascuntur: habent radices saporem dulcem & glutinosum: nascitur autem pinguis, limosis & humentibus locis, quò fluuiorum inundationes peruenire possunt.

Sunt qui Gladiolum hunc Cordi, Theophrasto dictum, esse suspicantur: sed Theophr. Cyperum intelligit.

Ad Gramen harundinaceum, & Caricem acutam Virgilij referendum Tragus iudicat, idè quò Graminis tertium genus, & Calamagrostin alteram vocat: eius autem figura non placet.

Lob. in Adu. Obs. p. 44. l. c. p. 36. dicitur *Iuncus cyperoides floridus paludosus*. Dod. gall. *εραπιδιον & εγισιδιον*, hoc est, Sparganium & Iris syluestris, ac etiam Scirpus quorundam.

C. Bauh. phy. *Iuncus* 8. siue *floridus*: Eid. pin. *Iuncus floridus* 1. siue *maior*: *Calamagrostis* 2. *Tragi*: *Iuncus floridus Martii*. & *Cass.* *Gladiolus palustris Cordi* hist. *gladiolus aquaticus* Dod. Lat. *Sparganium*, gall. *Carex alterum*, Lon. *Iuncus cyperoides paludosus*, Eyst. *Iuncus cyperinus floridus*, Tabern. *Butomus Theophr.* Cæsalp. *Iuncus floridus Macrobii*, H. Lugd. pag. 989. Eid. pag. 1006. *Calamagrostis prima*.

Monspessuli in maritimis & lacustribus palustibus, inter Iuncos præsertim obseruatur. Sic & in Italia ferè rotius lacustribus, & vdis pratis maritimisque, iunctis potissimum. A Maio ad Augustum vsque florere.

IVNCVS FLORIDVS MINOR. C. BAVH.

Radice est candida, geniculata, fibris plurimis adherentibus: caule palmari: foliis ternis, iuncis, oblongis, acutis, duobus caulem superantibus, cuius summo, singulis pediculis, qui quini sunt alternatim sibi succedentes, flores (quos non vidit author,) insident, quos fructus gemini rotundi, Orobi Creteci magnitudine, sequuntur.

In palustribus Heluetiæ circa cœnobium Eremitanorum, & in monte Fracto ad lacum Pilati Lucernatum D. Burferus obseruauit Iuncum hunc, quem in prod. C. Bauhinus nonum fecit, & in pin. *Iuncum floridum secundum* siue *minorem* vocauit.

CALAMVS AROMATICVS IN GENERE.

CAP. CCXLVI.

Theophrasti de Calamo atomatico duplex occurrit locus. Ait enim lib. 9. hist. cap. 7. Tom. II.

quòd Calamus trans Libanum montem, inter ipsum Libanum, & alium quendam montem paruum valle minima exeat. Non, vt quidam dixerent, inter Libanum atque ante Libanum, inter quos campus amplissimus & pulcherrimus est; Aulos appellatus. Quà uero proueniat, lacum in amplum spatium, iuxtaque eum palustribus siccatis, istum assurgere. Occupare locum plusquam triginta stadia. Viridem nequaquam esse videri, sed siccum: forma uero nihil ab aliis (quos non vidit) differre. Locum ingredienti protinus odorem spirare, non tamen longius, vt quidam referant. In Arabia autem spirationem a gri odoratissimam esse inter omnes. Et huius rei causam reddit C. Cauf. 22. dicens argumento hoc esse, quòd tractibus astuosis, meliora odoratorum genera proueniant, quòd melius ibi concoquatur, & siccata oleant, viridia autem nihil, vt Calamus & Iuncus.

Quæ ex Dioscoride & Galeno hic adducere possemus, vbi de vitibus agemus, adscribemus.

Calamus (inquit Plinius lib. 12. cap. 22.) odoratus in Arabia nascens (Plutarchus libro, Quod bruta ratione vtuntur, id quoque prodidit, sed errore manifesto, Guiland.) communis Indis atque Syriæ est: in qua vincit omnes (annis, M.) A nostro mari centum quinquaginta stadiis, inter Libanum montem; aliumque ignobilem, non (vt quidam existimauerunt) Antilibanum, in conualle modica iuxta lacum, cuius palustria Æstate siccantur, tricenis ab eo stadiis Calamus odoratus gignitur. Nihil autem à ceteris sui generis differt aspectu: sed præstantior odore, itatim è longinquo (alienâ fide Theophrastus, ex quo Plinius hæc ad verbum transcripsit, narrauit, quod minimè verum esse Guilandinus testatur, qui eam regionem peragrauit. Idem scripsit & Vitruuius) inuiat, mollior tactu, meliorque quàm minus fragilis, & qui assulosè potius quàm Raphani modo frangitur. Inest fistulæ arancum; quod vocant florem. Præstantior est, cui numerosius. Reliqua probatio vt fuluus sit. Niger alius damnatur, (nec legendum, Reliqua probatio, vt niger sit. Damnatur aliubi.) Melior, quò breuior, & crassior, lentiusque in frangendo. (malim legi mandendo.) Calamo pretium in libras xi. iunco xv. Traduntque Iuncum odoratum & in Campania inueniri. Idem lib. 24. cap. 11. Et quoniam plura genera Harundinis fecimus, illa quæ in India, Syriæque nascitur, odoratum, vnguentorumque causa, &c. Lege caput de Harundine, vbi vires traduntur.

Plinius. Plutarchi error.

Theophr. lapsus.

Plinius le: suo refert.

alter Syriacus, ad ripas lacus Genesaretici, quem alij mare Galilææ, alij mare Tiberiadis vocant, nascens, à vulgari nihil dissimilis præterquam quòd, post quadragesimum diem siccatus, non nihil flagrat: alter Indicus, descriptus à Dioscoride olim, nuper à Garcia ab Orta, diuersissimus à Syriaco. Dionysius de situ orbis *ερωδωριον* vocat, à colore, non vt Eustathius putat, quòd eius atrix India Erythro contermina mari sit. Dioscorides *κρη* esse tradit. Apud Vegetium lib. 4. de re veterinaria, Absyrtus in confectioe pulueris quadrigarij Calamum Syriacum & aromaticum, id est, Indicum, memorat. Et hæc Calami genera plurimum inter se discrepantia, Plinius ignoratèr miscuit ac confudit, teste Guilandino.

Calamvs Syriacus differt ab Indico.

Plinius.

Quæ Paulus, Aetius, Plutarchus, Celsus, & Dionysius de calamo prodiderunt, à Theophrasti;

Diof. Plin. & Galeni placitis re ipsâ nihil differunt. Quare his neglectis ad Neocer. devenimus.

Hermol.

Legi (inquit Hermol.) & in Meotide odoratum nasci Calamum radice subalbida, & sine fistulis, plena iuris & arara, specie Acoti, de quo & falsi quidam sunt, Acorum eam putantes. Quanto autem amarior, tanto & calidior est Indico. Vtrumque tamen genus Acorum odore superat. Teredinibus ut Acorum incessit: omninôque vicarium pro Acoto est. Ab Ionia & Ponto, & Herculis columnis profuturque apud omnes, qui mediterranea colunt Aphrice, ut si eadem non sunt planè, maxima tamen germanitate visantur, ut autores plerique tradunt.

Non est radix Mart.

Aromaticus porro calamus, si Dodonæo gall. si Trago: si Chilio, præterim verò si Martiolo in apol. in Amatum credimus, non radix est, sed Calamus pretiosissimus, ut qui hæcenus ad nos non fuit apportatus. Nam [inquit hic] quod Plinius ait efficacissimam in omni Harundine eâ esse partem, quæ radici proxima, quis non videt de Harundine, non de radicibus intellexisse Plinium: examines enim partes in vniuerso calamo, radicibus proximæ cæteris præstare dicit, quod facillè prudens animaduertet Lector. Nec enim aliam ob causam Plinius maiori vi pollere eas calami partes quæ prope radices habentur, quam quòd eadem ubi crassiores, vegetiores, robustioresque in omni Harundinum genere reperiuntur, quam in cæteris earundem locis: quo fit ut etiam calami ipsius genicula efficaciora pariter ipse existimauerit Plinius. Quippe & genicula robustiora sunt, & crassiora. Quam ob causam calamum illum prætulit Dioscorides, qui densè fuerit geniculatus. Quòd verò Calamum, non radices describat Dioscorides, apertè quidem constat, cum ait. Calamus odoratus in India nascitur, melior est fuluus, densè geniculatus, & qui assulosè frangitur, plena araneorum fistula. *Hæc ille.* Quæ tamen perperam Lusitanus intelligit. Quippe calamus in primis Harundinem designat, non radicem. Præterea proprium Harundinis est pluribus constare geniculis, & assulosè frangi. Deinde fistula, in qua quoddam araneæ telæ simile concluditur, calamo tantum debetur, non radici, quæ solida, dura, lignosa & vbiq; occlusa spectatur in omni Harundinum genere. Ad hæc fuluus color calamo sanè debetur, non radici. Quippe quòd radix in Harundine perpetuò albicet. Ad id autem quòd proprium sit radicis (ut Amatus contendit) ut ipsa geniculata dicatur, calamus verò potius nodis cinctus, Dioscorides ipse respondet. Quandoquidem is non inodò quarundam plantarum radices geniculatas facit, sed etiam caules, & calamos nonnullarum stirpium reddidit geniculatos, ut facile quis certior fieri poterit, qui eius codicem legerit in Hydriopete, in altera Cyclamino, in Gentiana, in Panace asclepio, in Gramine, &c. Constat præterea Calami odorati, quo passim Scythia videntur, radices ex Lithuania, & Tartaria finibus, quin etiam ex Ponto, ubi passim ferè proueniunt, ad nos conuochi. Quod inaximo cuiusque argumento esse potest, eos cum Amato prorsus hallucinari, qui eas ipsas radices Calami odorati esse contendunt, quòd nullus exter auro qui scripserit odoratum calamum alibi prouenire, quam in India & Syria. *Et hæc sunt Martioli in Amatum argumenta,* quibus docere conatur calamum odoratum communis vsûs, legitimum, genuinumque esse Acorum: quin concludit calamum odoratum harundinem esse non radicem.

Iam dictis adstipulatur Aloisius Mundella in Braslauolum, & hunc in modum argumentatur. Si calamus aromaticus, qui in officinis pro calamo & habetur & venditur calamus odoratus est Dioscoridis: statuendum vtiq; est calami descriptionem, vel calami ipsius esse, vel radicis, vel vtriusque apud Dioscoridem. Quod autem vtriusque non sit, colligitur, quia Autor non exprimit, quæ caulis aut radicis sint propria. Non radicis: primùm, quoniam illius mentionem non facit. Deinde, quia radix, quam pro calamo venditant, non videtur ruffa: actisque insuper & amara est, velut Acorus. Postremò in assulas non distillit, h. e. per longitudinem assulas paruas, dum frangitur, non relinquit. His quoque addit: Non constat quomodo fistulæ araneorum plene exillant in hac radice, quemadmodum in ea, quæ est calami Dioscoridis, quas araneæ secundum Plinium florem cognominat. Quod si ergo calami est descriptio apud Dioscoridem, huic nostro vulgari quæ est radix conuenire non potest. Quare dubitat ne hic officinarum calamus, magis ad acori radicem accedat, quod Martius, Cordus & alii quoque suspicantur, & Matthiolum omninò genuinum esse Acorum credit, & olim Io. Rodericus [Amatus Lusitanus: sub nomine enim Io. Roderici Lusitani superioribus annis commentarius in Dioscoridem in lucem euulgauit.] affirmabat. Nunc verò firmiter contrarium asseuerat.

Ar uerò cum huius rei diuersa penes sint aliorum placita. Argumenta que pro negatiua parte faciunt, pauca reserabimus, affirmatiuaque rationibus comprobabimus.

Martiholo itaque dicenti, quod calamus aromaticus, non radix, sed calamus Dioscoridi sit, primùm respondemus, calamum aromaticum simpliciter, per se, & absolutè dictum, nec radicem, nec harundinem, nec talè quid esse, sed in hæc, tanquam totum in suas partes, diuidi: Et hæc ratione æquè radicem, ac calamum, aut tertium quid esse posse. Quod manifestè eius descriptio comprobat, quæ partim ad calamum pertinet, partim ad radicem, ut patebit. Quod ad nos non fuerit apportatus. Audit Amatum verò restantem: calamum ex India Lusitani nostri singulis annis deferunt per mare rubrum in Cairum & Alexandriam deferentes. Venetias portant, calamis similem, vnde nomen accepit. *Licet adhæc Plinius efficacissimam in omni harundine eam partem esse dixerit, quæ proxima radici sit, non ideo denegauit radici ipsi excellenriam, sed Arundinis tantum superioribus partem non ita efficacem asserit.* Præterea Theophrastus & Plinius alibi ipsam calami radicem desiderant, & eam cæteris partibus anteferunt. *Nunc suo se gladio iugulat Mundella.* Vtriusque (calami & radicis simul) descriptio non est, inquit ille: quia autor non exprimit, quæ caulis, aut radicis sint propria. Pulchrè ratiocinatur si diis placet. Quæ consequentia: Non exprimit propria, ergo vtriusque non potest esse. Si non exprimit, nec etiam contrarium affirmavit. Quod enim dicit optimum esse, qui solus est, ad radicem referendum est: Sicut & illud Plinii, subalbidus, in commanducando viscosus, subacris, adstringens, ad radicem pertinet, velut ipsum experimentum docet. Quod verò frequentibus geniculis præditum ait, & assulosè in multa segmenta diffringi, & fistulam araneis plenam habere ad calamum. Non radicis (pergit Mundella) quoniam ipsius mentionem non fecit Diof.

Dioſc. Quæ eſt rationis huius neceſſitas? Non memin-
 nit radicis, ergo deſcriptio eius non eſt. Dic
 quaſo Mundellæ, Quid aliis in locis deſcribit
 Dioſcorides, ubi nec plantæ foliorum nec radi-
 cis, aut aliarum ipſius partium memin-
 nit, Dic, quid deſcribit capite de Coſto? Reclam-
 at tandem ipſa experientia verbis, quæ opponit, Radix non vi-
 detur ruſſa, non diſſilit: Non conſtat Mundellæ,
 quomodo ſiſtula aranearum plenæ exiſtant. Re-
 clamat, inquam, ipſa Amati experientia, dum
 ſcribit, Venetiæ portant, Calamis ſimilem, al-
 bum & ſubruſum, crebris geniculis, in aſſulas
 diſſilientem, ſiſtuloſam, araneo albo plenum.
 Sed iam probatum eſt deſcriptionem non tantum
 Calami, verum & radicis eſſe. *Utrum* ſi Calamus
 aromaticus Officinarum Acorus genuinus eſt, vt
 Matthiolus & alij quidam affirmarunt, fruſtra hi
 omnes cutia multiplicans, ſeparantque à ſe inui-
 cem quod vnum eſt. Diuerſis ſiquidem capitibus,
 de Acoro & Calamo tanquam de diuerſis trad-
 unt.

Hoc tempore penitus ignotum ſcribitur,
 quod Calamus aromaticus, cuius Veteres memi-
 nerunt, Officinatum communis Calamus non
 ſit, ſed radix, neque præſcriptis notis inſignita, vt
 ex Manardo, lib. 6. Epit. a. lib. 8. Epit. a. cuius rati-
 ones mutuat Mattheus, eſt aliorum arenis mu-
 niatur, feroci admodum aſpectu, ea in Braſa-
 uolum tela contorquet, vt ſibi ipſi Vulcanus videat-
 ur: magno enim errore Braſauiolum duci, ſitis
 palam eſſe ſupponit: quod tam facile ſibi perſua-
 ſerit, legitimum odoratum Calamum, illam eſſe
 radicem, quæ temerè omnibus in ſepaliſis il-
 lius vicem explet, cuius opera ſi interuiſſent,
 quis non miſellum hunc Braſauiolum cachinnis
 irritaret? hem quis non admiraretur tot contra-
 dictiones: rot lapſus? tantam inſcitiam? tot gra-
 uia crimina? quæ tamen ab altitudo hoc homine,
 cuius ſententia peruerſe, corruptis verbis, di-
 minuitis clauſulis, ei falſo adſcribuntur: vt per
 ionem lapideum iurare cogar, (inquit Apollon) in
 ſuis lineis depictum Matthiolum, vobis planè in-
 dicaturum: ita enim ſcribit Braſauiolum, decimus
 agitur annus, quod Venetiæ verus Calamus aro-
 maticus afferatur, qui Calamus eſt, & non ra-
 dix, ac communis aromaticus Calamus, qui paſ-
 ſim venditur, radix eſt, & non Calamus, id verò
 de quo in præſentia loquitur, Calamus eſt, & non
 radix, qui folia habet circumcirca in aliquibus
 Calamis, quæ noſtroſum Calamorum folijs aſſi-
 milantur, & niſi putaiſſem Galangam eſſe Aco-
 rum, non potuiſſem, non arbitrari vulgarem Cala-
 mum aromaticum eſſe Acorum, & totè radix
 hæc, quæ Calamus aromaticus vocatur, eſt odora-
 ti Calami radix: Calamus autem verus odora-
 tus, in Officina Campanæ, Venetiis vendebatur.
 En igitur Studioſi, quibus verbis peritos inſectetur?
 quàm fideli ſermonè candidiſſimos laceret?
 quàm tumultuoſis rixis, ſe vbiq; moleſtiſſi-
 mum, ac inſeſtiſſimum exhibeat? hæc ſunt argutię
 quibus prægrandem confarcinauit librum, ſolo
 lepore illoſo lacceſcens, ſuiſque obruens calum-
 nis, non aliam ob cauſam, niſi vt doctiſſimis
 aduerti videretur, & quocunq; modo in eos
 argumenti eſſunderet, hæc importunitate exer-
 ciaret, tantum ſibi arrogans, vt quæ non dixe-
 runt, dixiſſe velit, quæ enim in eius ſententiam
 pedibus non eunt, tergiuerſatur, ſi quis nodus
 incidit, itatim tranſilit, velut angue conſpecto,
 aut ſaltem lippis oculis intruetur: eſt clariffimo
 ſuorum ſcriptorum teſtimonio ſaniffimi ingenij

videatur, vt quum minime compertum habet di-
 xiſſe Dioſc. & Galenum Calamo aromatico ali-
 quid in eſſe amaritudinis: quod vel Ruellij veg-
 tionem quam ſe imitari pollicetur, in ſui operis
 initio, paulò ſeguitur perlegerit, vel in eam, ſi
 quid perperam ex Græco tranſlatum, vt ſui mo-
 ris eſt, aliquid iniicere tenebatur, quòd cum ali-
 quantæ acrimonia amarum Calamum tranſtule-
 rit: id quod Secobienſis Lacuna, Græcis, Lati-
 niſque literis eruditiffimis, qui Ruellium fide-
 libus teſtituit, corrupta loca reſarcinauit, aucta ſim-
 minu t, mutata ad priſtinum candorem reduxit,
 malè huic tributum amarorem nõ annotauit, eſt
 Marcellus quod ad amaritudinem pertinebat,
 ſe reliquiſſe aſſerat, quia in melioribus illa vox
 non legatur. Manardus etiam lib. 4. Epit. 2. probans
 Calamum non eſſe Canellam, inter alias
 differentias enumerat, quòd in ea canella non ſit
 amaror, inuere calamo amaritudinem in eſſe, vt
 hinc Fuchſij ſententiam improbare non poſſit,
 atque an communis illa radix, calami odorati
 propria ſit, quæ amariſcula, necne, nullum eſt
 in hoc cuidens argumentum, quod eſt Harundi-
 nis trunculum, cacumini annexum non defe-
 rant: folia Iridis ſimilia; laru adinacea, quæ dan-
 tenus præ ſe ferunt, ſicca potiſſimum, an verò
 Acorus ſit, eo in capite diſcutiendam relinqui-
 mus: hic tamen præterire non poſſamus Amati
 auctoritatem, ne dicam ambitionem, aut inſo-
 lentiam, qua calamum aromaticum Officinatum
 Dioſc. legitimum, ſuis notis repræſentare non
 ambigit, potiùs, vt credimus, ſomniando, quàm
 ſenſum libertare, tam abſurda proferendo: nec
 Matthiolum contraria aſſumentem, hoc eſt, cala-
 mum aromaticum harundinem, ſiue calamum,
 non radicem eſſe debere, deceptum aſſerere ve-
 retur: quòd licet Theophræſtæ ac Plinius in cala-
 mo odorato calamum, & non radicem, laudate
 videantur, alibi tamen radices cæteris partibus
 anteferunt, idque ex Plinio manifeſtè percipi;
 lib. 24. cap. 11. quum odorati calami facultates e-
 numerans, inquit: Efficaciſſima autem in omni
 harundine, quæ proxima radici, efficacia & ge-
 nicula, ex quibus in omni Calamo radicem effi-
 caciorem eſſe partem contendit: id quod ſi Pl-
 uius intellexerit, vel ipſi pedagoguli diiudicent.
 Quis enim etiamnum mediocriſ ingenij ita ar-
 guerit? Plinius proximas in Harundine radici
 partes alijs præferit: ergo radix efficacior eſt
 pars? Quiſnam etiam ex palliotentis Medicis,
 qui ſtultiffimum hoc arguendi genus non ex-
 cludat: qui in re vulgatiffima illum exentire non de-
 prehendat, qui inquam dum ſitiam ſedare cupit,
 ſitiam alteram crefcere non videat, vt quantò
 plus hiberint, tantò magis ſitiant Parthi: quum
 ſcilicet huiusmodi radix, quæ in multa ſegmen-
 ta nunquam aſſuloſè frangitur, non ſiſtula ara-
 neo velo ſimile quicquam ocludente, quæ qui-
 dem Harundini debentur, non radici, ſi ſaltem
 Calami aromatici radix: cuius nulla eſt ab Ama-
 to probatio: rot autem oculati reſtes ex Manar-
 do, ac Matthiolo contrarium aſſuerantes, tot
 ab his rationes, quas hic ruſum inculcare, ope-
 rare pretium non eſt, vt quum Braſauiolum huic ſue
 opinioni aſſentire teſtatur, ſecus quàm ipſe de-
 ſcet, vt ſupra: quum Dioſc. calamum odoratum,
 non radicem, ſed Calamum eſſe debere, ſcri-
 ptis mandauerit, quumque calamos equiſeti, gra-
 minis, ac aliorum geniculatos reddiderit Dioſc.
 non eſt quod radici proprium eſſe geniculatum,
 Calami autem nodis cinctum aſſerere debeat;

Fuchſij lib.
166.
161a.Amati
turpi et.
ror.

quum autem calamum aromaticum esse officinarum Schœnanthum arbitrantur Calopodiani, qui in Metuſi ſcripſere, nec illorum ſpernūt opinionem, qui radicem calami aromatici vice acceperam, legitimi calami radicem ſtatuunt, quam magno implicentur errore, non animaduertunt. Siquidē Schœnāthi Officinarum radices tradūt capillorū modo, tenues, huius verò adulterini calami radices craſſe ſūt, & effatu dignæ: propterea Schœnanthi radices eſſe non poliunt, & per cōſequentes: ſi Schœnanthum vulgare calamus eſt aromaticus, hæ radices non erunt calami odorati radices: quūque in aſſulas non diſſiliat Schœnanthum id, non ſiluum ſit, non in mandendo lentum, meliūs diſcant, ne rudere potiūs, quàm erudire videantur: veri tamen calami loco, radicē hoc nomine vſitatam ſubſtituere malo, etiamſi Acoras ſit, quæ multas calami qualitates obtinet, quā Sphagnum, lacini muſcus arboreus, Officinarum vīnea: & ſi Auic. cap. de muſco, pro quo Thalch repoſuit Bellunēſis, muſcum ſtuitalem, aqueum, terreum, petroſum, maritimum complectatur, & cap. de Vīnea arboreum videatur diſtinguere, aperta ſeparatorum nominum & capitum conſuſione. Galen. verò ac Paulus in ſuis ſeccedaneis, pro calamo ſphagnum cum Matthiolo ſupponunt: hæc enim in alienam meſem irruſſe creduntur, doctorum omnium iudicio, quòd plura his ignota inferant, aut facultatibus diſſimilia ſuggerant, vt Myrtum pro Cardamomo, &c. quorum eſt ſylva: moſcus verò arboreus, hypnoſ etiam vocat³, hoc eſt villoſa illa caucies arborum caudicibus adharens, multiplex eſt, vt ſuo oſtendetur loco.

Schœnanthum Calami loco ſubſtituitur.

Nomina linguar.

De hiſce ſatis, vela retrahamus: vocatur græcè *καλαμὸς ἀρωματικός*, *καλαμὸς*, *καλαμὸς* h. e. lat. Calamus aromaticus, odoratus & unguentarius. Arab. vt Serap. *Maſabel derire*: *Alſaharino*, *Alterira*. Bellunenſi *Alderire*, *Aldarira*, & *Chafab darirhe*: item *Caratis* & *Caratum*. Germ. *Waldriche* *Waldriche* *Waldriche* *Kohr*. It. & Hiſp. *Calamo aromatico*.

Aequiuoca Calami odor. Ind. Verum. Calamum Matth. f. Genus.

Præter calamum aromaticum quorundam Indicum & verum, ſunt & alix plantæ, quibus calami aromatici nomen attribuitur.

Calamum odoratum Matthioli pingit, & ex eo Lacuna. Lonic. Acoſta, Durantes, Hiſt. Lugd. Tabern. & Gerardus, Calamum aromaticum nominantes, qui nihil aliud eſt quàm ſigmentum, nihil differens ab Arundine horteniſi ſue fatiua.

Acorum.

Malè in officinis calami aromatici nomine Acorum, de quo ſuo loco, venale proſtat.

Caffabuſerire Bellonius cum vulgo Pharmacopolarum Conſtantinopolitanorum calamum aromaticum eſſe opinatur, ſed *Qualcebeni* quidē & Matthioli iudicio, abſurdiſſimè. Sunt enim calami lapidei: non verò cuiuſdam plantæ.

Schœnanthi

Schœnanthos quibuſdam idem eſt cum calamo aromatico. Quare Colleg. Florent. huius loco Schœnanthon ſupponit. Idem & Borſgar.

Canella.

Opinio Marcelli dicentis calamum aromaticum eſſe Canellam, meritò tanquam erronea damnatur ab Acoſta.

Galanga.

Notat idem Acoſta quòſdā calamum aromaticum cum Galanga confundere. Et ſanè conſtat Venetos pharmacopœos, Theriacam paraturos, calamo Galangam ſubſtituere.

Angelica.

Antidotarium Romanum calami odorati veri loco Angelicæ radices, ſed ſia minori quantitate commendat.

Calami aromatici nomine Argentoratēſes hortulanæ venditare ſolent Phulmaius & nobile: vide Tragum.

Plura de calami aromatici ſubſtitutis dicta antè, vbi Apollinis verba adſcripſimus.

De calami aromatici virtibus hæc Dioſcorides ſcripſit: naſcitur in India. Eſt autem optimus, qui ſulaus (*κίβρος*. Act. *κίβρος*) eſt, & frequentibus geniculis præditus, & qui aſſuloſè in multa ſegmenta diſtingitur, ſiſtula araneis plena [*καλαμὸς*]. Plenam habens arancorum ſiſtulam, Sarrac. Malè arancorum: oportet enim verte-re telā araneæ, aut re ſimili telæ araneæ, Paſinas Salodjanus.] ſubalbidus [*καλαμὸς*. legendum *καλαμὸς*]. Paſ. Salod.] In commanducando verò viſcoſus (*καλαμὸς*, leg. *καλαμὸς*]. Paſ. Salod.) diſtingens, ſubacris (*καλαμὸς* Grib. amarus, Ruell.) Potus vrinam mouere poteſt. Vnde cum Gramine, aut Apū ſemine decoctus & potus hydropticis, nephriticis, vrinæ ſtillicidiis, & ruptis conuenit. Ducit etiam menſes & appoſitus & potus. Tuſſes quoque ſanat ſuſſitus per ſe ipſum, & cum reſina terebinthina, ſiſ fumus per ſiſtulam ore attrahatur. Decoquitur [*καλαμὸς*]. Paſ. *καλαμὸς*] etiam ad inſeſſus muliebres, & ad uteri colluſiones (vet. caret verbis, *καλαμὸς*.) Miſcetur & malagmati, & in ſuthris, iucundi odoris gratia. Calamus odoratus, *authore Galeno*, leuculam quandam adſtrictionem ac minimam acrimoniam poſſidet: magna ex parte eſſentia eius terrea eſt & aërea, in caliditatis frigiditatisque coniugatione temperata. Quamobrem moderatè vrinam mouet, & facultatibus quæ icori ſtomachoque imponuntur, miſceri poteſt: tum in fomenta quoque vteri, quæ phlegmones gratia, aut irritandis menſibus aſſumuntur, vtiliter admiſcitur. Ponatur itaque habeaturque ſecundi ordinis eorum quæ excalefaciūt. In eſt quoque ei quædam partium tenuitas, velut aliis omnibus odoratis ſiue aromaticis. Ceterum illorum compluribus tenuium partium plurimum, calamo verò non multum adest.

CALAMYS AROMATICVS VERVS quibuſdam.

C A P. CCXLVII.



Calamum aromaticum creditum à triginta iam annis aſſeruo, vegeto amaro, cum lentore quodam præditum, teretè, craſſitudine pennæ cyneæ, internodijs longiſculis articulatu, rutilanti & ſpædiceo foris colore, aliàs buxco, ſubtus candicante, intrinſecus ſubſtantiã ſiſoſa rariq, textura ſarctum: ad genicula ſingula, calami ex aduerſo

uerso sui pronascuntur, vt calamo primario magnitudine cedentes, ita colore & compositione potè que conuenientes.

Similem calamum accepi anno 1598. ab infigni viro Jo. Lurzio Ill. E. V. V. V. pharmacopato. Alium sic descripsit gener Cherlerus, Calami aromati. veri furculus, qui ad C. Balthinum Argentinà missus bicubitalis erat, Betule inlar ramus, in cuius altera bivaricatione folium, vel potius folij fragmentum, nullo pediculo, sed principio angustiore hæret, vniciale, tribus neruis insignibus donatum, facie folij Indi, aut potius Plantaginis quinque-neruie, vnicæ quadrantem latum.

Pingimus in nostra tabella calamum vnum cum radice ex Clusij Garcia: secundum & tertium, cui rami ex sicca planta.

An Cordo in Dioic. Calamus aromaticus verus, aliquoties in pharmacopoliis inter Squinanthi stipulas & spicam Indicam intuitus?

An Qualeeb. Iuncus odoratus Matthioli, mira acrimonia linguam gustantis mordicans, nihilque tamen, præter amaroris plurimam, inter gustandum derelinquens?

Lobel. in hist. Belg. pag. 71. in icon. Plant. pag. 54. sub titulo Calami odorati Libani, & calami aromati ex Alepo missi, vobis dicitur hanc figuram habet, quæ eiusdem plantæ, cum ea quam descripsimus, videtur.

De calamo suo odorato Libani in Obs. p. 29. hæc scribit. Memini me vidisse Venetiis ad Angeli symboli Calami aromaticum, quem Alepi Syriæ Sequinus Martinellus doctus & industrius pharmacopæus, fortè delatum ex lacu inter Libanum & illum ignobilem montem Plinio memoratum miserat. Arundo erat geniculata, mrida, crassitudine paruum digitum æquans: color fuluus, ni labat memoria, saturior, odoratus, parum lentus, in mandando, subacris & amarus. Iacobus Vtenhouius generosus Gandauensis, stirpium & artis Medicæ peritissimus, calami aromati doctores canulas araneæ telis plenas, fuluas, geniculatas, digiti minimi crassitudine, gustu planè aromato, amaricante, Schœnantho præstantiore, nactus est inter Schœnanthi festucas, quas Massiliam aduectas ex lacu Plinio memorato afferbant. Multò maiores habuit præclarus vir Augerius D. de Bousbecke Flander Insularius, Cæsareæ maiestatis Constantinopoli Legatus, stirpium exoticarum peritissimus.

Volunt nonnulli Calamum officinarum esse Acorum Veterum: Ego autem (inquit Garcias) nullius opinioni addictus, liberè dicam, quod sentio. Calamus aromaticus quo officina in Lusitania vruntur (aromaticum voco, non odoratum, vt plerique alij, quandoquidem atoma odorem non significat, sed quod vulgè *drogram* vocant, neque etiam calamum odoratum scio, sed Iuncum duntaxat) idem est cum eo, qui in India magno est in vsu cum viris, tum mulieribus & iumentis. Vocatur is in Guzarate *Vaz*: in Decan, *Bache*: in Malabar, *Vazab*: in Malayo, *Diringno*: in Peria, *Heger*: in Cuncam, quæ est regio maritima, *Vaticam*: Arabibus *Cassab* & *Aldirra*. Serapio lib. simpl. cap. 205. eum vocat *Assabdirri*, sed corrupto vocabulo: omnes enim Arabes Medici cum Auicenna lib. i. cap. 157. & 207. *Cassab* & *Darirbe* appellant. Idem autem sonat *Cassab*, quod Calamus, & *Aldirra* ex aromatibus: nam *Dirirbe* idem quod nobis aroma est. Quoniam verò Malayo incolæ eius vsum ab Arabibus qui ex Coraçone erant, didicerunt, idcirco

corrupto nomine *Diringno* vocarunt. Cæterum non est odoratus, nisi è terra auulsus: quantòque virentior est, tantò mihi validioris, terriorisque odoris videtur, tametsi aliud sentiat Ruellius. Portò quoniam Hippocrates & Galenus i. si. npl. Indicum hunc calamum vnguentarium appellant. Plutarchus verò calamum Arabicum, & Cornelius Celsus calamum Alexandrinum: videtur etiam extra Indiam nasci. Ego, vt veritatem elicerem, sciscitatus sum à multis Coraçone incolis & Arabibus, si apud eos nascereetur calamus: item an esset eis cognitus, eoque virentur: Negarunt omnes apud se inueniri, nisi ab Indis aduectum iercimonij gratià, probè que sibi cognitum, vtpote cuius plurimus apud eos esset vsus. Non falluntur tamen, qui Arabicum vocant, nam ex India in Arabiam deferretur, & inde in alias regiones: neque qui Alexandrinum appellant, quoniam hinc Alexandriam, deinde Barut & Tripolim Syriæ deferretur. Quod autem Manardus lib. 3. epist. 1. dicit in Pannonia se vidisse adè recentem, vt non longè petitus videretur, fieri potest vt fallatur: aut, si viderit, statim fortè in spora, aut fictili vidit. Sed illud certissimum est, hinc aucti Calamum in eas regiones.

Is verò, quo vtimur, radix non est (pusilla etenim est radix) sed ipsius calami cum aliquantula interdum radicis parte fragmentum. Hallucinantur ergo qui nihil nisi radicem esse scribant, confirmandæ suæ sententiæ causâ, quæ contendunt hunc calamum Acorum esse. Neque quod in Calamo est spongiosum & flauescens colore, aliqua in re simile est araneæ telis, vt falsò putarunt Auicenna lib. i. cap. 157. & Serapio simpl. cap. 205. quos Græcis & Latinis hæc meliùs nosse oportebat. Denique quòd calamus Acorum non sit, nec etiam Galanga, satis ex Auicenna & Serapione probari potest, qui tria distincta capita de Calamo, Acoro & Galanga scribunt. Præterea qui Calamum describunt, autem cum in India nasci, quod verum est: nec enim in alia regione nascitur, Acorum verò non nisi in Europa nasci tradunt. Ad hæc Calamus pallens, actis, calidus & siccus est in secundo ordine: Acorum, albet, amarum, calidumque & siccum est ordine tertio: Galanga autem vtroque calidior & odoratior. Denum calamus & Acorum cerebri & neruorum morbis conueniunt. Galanga verò ventriculum roborat, flatus discutit, & oris halitum commendat. Galanga item & Calamus medicamenta sunt in hac regione ab initio cognita, & in Occidentem vehi solita. *Hæc isque Garcias.*

Sed quàm eruditè notat Clusius, dicens: *Notandum officinarum calamus longè alius est ab eo, quem hic satis obscure describit Garcias, quippe cuius Calamus legitimus videatur à Veteribus descriptus. Noster verò nihil nisi radix est, cum aliquantula interdum foliorum particula. Cui cum omnes notæ à Veteribus descriptæ pulcherrimè conueniant: Manardi & aliorum sententiam improbare non possum, qui Acorum legitimum esse volunt. Eo & Germani, & Itali, & Galli vruntur, alij neque calamum non norunt. Solebat enim Antuerpiam Vlysiopone aduchi calami genus vsuali nostro simillimum, sed terri odoris & saporis horridi: quæ nota illis communis erat cum calamo Garciae descripto: solam tamen hanc ob causam in vsu apud nos esse desit, licet omnes aromatarij multò efficacius eo, quo nunc vtimur, fuisse affirmarent. Cæterum, cum tertio recudenda esset Garciae historia, innotuit legitimus Calamus aromaticus, quem Paludanus,*

Contra
Ruellium

Calam. Spon
guentarium
Hipp. &
Gal.
Cal. Arabi:
cens. Hist.
Alexandri
no Celsi.

In Arabia
non inuenit
tur,

Manard.
Hist.

Radix non
est.

Auicenna
& Serapio
n. s. lap. p. 1.

Acorum
non est non
etiam Galanga.

Garcias à
Clusio not.

ex Syria & Aegypto redux communicauit, qui exactissime ad Dioscoridis descriptionem quadrare videtur. Umbellifera verò potius planta, quam harundinacea meo iudicio censenda est: etiam rectius habet caule, multis nodis, seu geniculis cinctu, leuè alioqui, intus cocanum, & membranula, vti Harundines, præditum, qui assulosè frangitur, èstque satis odoratus, gratique saporis, amari tamen, & nonnullius adstrictionis particeps: folia (vt ex vestigijs colligere licet) bina ex aduerso singulis geniculis sita caulem amplecti videtur: radix summo capite nonnihil extuberat, deinde in fibras desinit. Vicefimo quinto porò anno post quam nobis communicasset calamum illum Paludanus, mittebat ad me Lugdano Allobrogù Ant. Colinus pharmacopœus, limilis calami fragmenta, significans se eo vsum in Theriaca compositione: ea autem, licet simili profusus formâ essent cum illo, quod à Paludano accipiebam, magis tamen amari saporis deprehendebam, nec vllius adstrictionis prædita, quod forsitan alterius arati adscribendum. *Et hæc Clusius in Garciam.* Ego quoque Garcie non notum fuisse calamum aromaticum vulgarem suspicor: qualis Vlyssiponensis calamus fuerit nondum mihi constat: umbellifera planta cur potius dicatur quam harundinacea, nescio, quum notæ adscriptæ à Clusio melius cum harundinacea planta conueniant, quam cum umbellifera.

Clus. hal. lucinatio.

et cetera not.

Acolta dum reprehendit Ruellium, Manarum & Monachos, non animaduertit calamum aromaticum vulgarem Europæis plerisque dielû (quem multi Acorum putant) longè diuersum à calamo aromatico Indico, quem Garcias describit, in quo malè etiam Acolta Garciam imitatus est.

C. Bauhin. not.

C. Bauh. phyt. Arundo i. siue odorata: Calamus odoratus Libani Lob. Ic. Plant. pag. 54. Calamus à Paludano Patauij exhibitus: An calamus odoratus Matthioli? Sed quid quaeso commune habere potest figmentum Matthioli, cum Calamo odorato Paludani? Matth. in lat. comm. editis anno 1559. sub inscriptione calami aromatici figuram habet quæ est pars figuræ pro Arundine posita, & per consequens falsam & non factam ad vsum calamum aromaticum Paludani, vel similem. In comm. lat. cum mag. fig. editis anno 1585. & Ital. editis 1568. nouam habet figuram magis artificiosam, quæ etiam pars suæ Arundinis. Tabern. vel eius typographus Baisæus Matthioli postremum figmentum assumpsit, quæ est portio Arundinis quam domesticam cognominat. Prudenter & doctè Camer. in hist. germ. & Epit. Matthiol. pro calamo aromatico, à Paludano delatû calamum figurâ exhibuit: sicut etiam Clusius apud Garciam, & nos cum Clusio quem à Valerîdo Dourez accepimus: Est autem hic calamus omnino diuersus à Matthioli imaginario: Paludani verò calamum fuisse Libani, vix puto demonstrari posse, licet in ea opinione perseueret C. Bauhinus in pin. vbi inter calamum aromaticum Indicum, & Calamum aromaticum Syriacum, & calamum aromaticum Matthioli, quæ fictitium suspicatur, ita distinguit: Arundo odorata i. siue Calamus aromaticus est odoratus & odoratus uulgaris, Hipp. & Galeni odoratus, Theophrast. odoratus, Dioscor. Orib. Aegin. & Actii: odoratus & odoratus, Dionysii de situ Orbis: Calamus Arabicus Plurarchi: Cal. Alexandrinus, Celsi: Cal. odoratus, Plinii, Hermetol. & Ruellii: Cal. aromatis, Manardi: Cal. aromaticus Cordi in Dioscor. Fuchii: Guil. Garz.

Synonyma Calamus arom. Indicum.

Lob. Obs. Clus. ad Garz. Acof. Cef. & in 4. part. Ind. Orient. fig. 29. & Diringo Malays, & Diringo par. 3. Ind. Ot. 39. Diringo 4. part. Ind. Or. fig. 20.

Arundinis odoratæ 2. seu Calami aromatici Syriaci caulem seu potius caulis partem anno 1579. à D. Paludano ex Aegypto reduces Patauii accepimus. Verùm cum totam plantam à D. Doldio habeamus, breuem eius descriptionem scilicet ab alijs nõ proponatur adiciere lubet. Ex radice inuicili, trium, quatuorue uciarum longa, summo capite nonnihil extuberante, & in paucas fibras desinente, caulis, [modò vnus, modò plures] ferè bicubitalis, reclus, rotundus, leuis, fragilis, multis geniculis distinctus, exurgit, qui intus cauus, spongiosus & membranula, (quasi tela alba subtena), vti Harundines, præditus, qui assulosè frangitur, & in plures ramos diuiditur, hi que in tenuissimos subdividuntur, ad modum Ligulstri Aegyptiaci Alpini, vel Lenticis Peruiuanis, siue Molle Clusii: qui flores paruos, foliaceos, plurimos, singulis tenuissimis pedicellis insidentes, sustinent, ex quorum medio apex styli inlatus prodit. Folia pauca, semper bina, ex aduerso ad singula genicula sita, caulem amplectuntur, vnicam lata, setquinciam longa, neruis aliquot per longum excurrentibus. Caulis sapore est aromatico, valdè amaro, quo in Theriaca pro calamo vtitur.

Scrîtur, teste Garcie, per vniuersam Indiam plurimum verò in Guzaratæ & Balaguate. Hic etiam Gor (vbi multus eius est vsus) in hortis latus prouenit, sed per paucos. Conuehitur ad maritimam, quoniam qui isthic nascitur non sufficit. Qui ex Balaguate adfertur, ad Occidentem mittitur. Calamus aromaticus, autore Linschortz, crescit etiam in Sunda Insula Iauæ regionis India: Orientalis. Magna copia Chinensè emittit verò in Chinam portent.

Familiaris eius vsus [ita enim Garcias scripto reliquit] est mulieribus in vteri affectibus, & neutorum doloribus. Sed maximè expetitur hieme à mulomedicis: contusum enim, additis Allijs, Ammi (quod est Cuminum rusticum) salis momento, butyro & Saccharo, iumentis aduersus frigora manè exhibent, vocantque id medicamentum Aratis.

CALAMVS AROMATICVS CECIINI Martineili.

CAP. CCXLVIII.

Non inuenit Cechinus Martinellus, apud Diosc. nec Galenum calamum aromaticum fuisse Veteribus Cannam (siue Arundinem) licet Neotorici id certò existiment, decepti Plinii opinione, qui dicit calamum, & Iuncum odoratum, non differre ab alijs calamis & Iuncis: addunt id indicare nomen calami nihil aliud significare quam Cannam: suo autem iudicio calamus Latinis diuersimodè potest intelligi: Dicebatur de tenui Canna [siue Arundine] ex qua Veteres sagittas faciebant, qualis erat mos Orientalium licet non sit Canna (id est Arundo caua) de qua Virg. eclog. 3. & vario vocabulo Ariolus Dicitur etiam calamus de Canna cum qua scribebant Antiqui: calami etiam dicebantur Canella (siue Arundines) palustrium aquarum, quibus tegebantur tecta domuncularum rusticorum, de quibus duobus Martial. in suis dicitichis: Metaphoricè

pro stylo scriptorio fumpfit Virg. Eclog. 1.

Scribere quæ vellem Calami permisit ægræsti
Pro Calamo concauo ad fistulas qui dicitur Sy-
ringu.

Eclog. 2.
Pan primus Calamus cera coniungere plures
Institit.

Sub nomine Calami comprehenditur virga cui
alligatur filum ad piscandam, & virgulæ quæ
visco illinuntur pro captura auium.

Interdum Calami dicuntur de paruis Cannis
frumenti, quæ *Sepie* vulgò dicuntur.
Sumitur etiam pro omni re conuoluta instar
Cannæ: communiter dicuntur Calami arborum
& vitis.

Canna quoque Zucchari vocatur Canna cum
ramen non sit, sed ei similis.

Paulus etiam calamus odoratum vocat corti-
cem. Alius bonus author ait Calamum aromati-
cum esse crassum corticem cauum, cum enim
colligitur extrahitur lignum: vnde desumpsit no-
men. Cech. Martinellus *mis. 210* ait calamum vo-
cari quæ ita geniculata prouenit, vt hic Calam-
us, quod prolixè profequitur, & apud ipsum vi-
dere est.

Calamus præsentatus per Cechinum Marti-
nellum Aromatarium habetur pro vero & legiti-
mo calamo aromati-
co, ac in confectionibus
Theriacæ ac Michridati; ceterisque medicamen-
tis adhibeatur, & remoueantur succedanea. Sed
libellus contra Cechinum incerti authoris obla-
tus pharmacopœis Mantuanis contrarium om-
nino sentit. Nominetur, inquit, *καλαμὸς* Græcè,
aut calamus Latine, aut *calamo* Toscanè, nullus e-
rit ita fultus qui aliud intelligat quàm Cannam,
ita etiam Virgilius & Ariostus nihil aliud intel-
lexerunt &c. & quomodo potest esse canna quæ
non sit canna &c.

Folia binos cubitos æquant, angustiora tamen,
Donacis (siue Arundinis fatiæ) scabra, & se-
cundum longitudinem striata, numerosa: *Stolones*
harundinibus ceteris concolores complectentia.
Comofo *stire* & quadatenus *Sorghii*. Radix ad
Cannæ radicem accedit, sed dulcior, succulen-
tior, minuscule lignosa: vnde germinula erum-
punt farioni oportuna.

Ζάχαρος, genus Mellis (*αίλιος*) concreti in
India & Felici Arabia in Arundinibus (*ἄνη* / *ἄ-
νημον*) inueniri pro dit Dioscorides: Salis modo
coactum, dentibus, vt sal fragile.

Saccharum
Dioscoridi
Mellis.

Galen. 7. simpl. *Sacchar* appellat, & ex India ac
felici Arabia afferri quoque scribit, & in arun-
dinibus concretere. Est autem & ipsum Mellis
genus, & minus quidem dulce, quàm nostrum.

Sacchar
Galeni.

Archigenes ait, Sal Indum esse, colore & con-
sistentia salis communis, gustu Mellis, magnitu-
dinis Lentis, *καλαμὸς* aut ad summum Fabæ, *καλαμὸς*.

Sal Indum.

Saccharon & Plinius Arabiam ferre dicit, sed
laudatius Indiam. Est autem Mel (Mel Arundi-
num Indicarum vocat Theophr. Arist. & Strabo.)
in Arundinibus collectum, gummium modo can-
didam, dentibus fragile, amplissima Nuci Auel-
lanæ magnitudine, ad medicinam tantum vsus.

Deleatius
Plinio.
Mel arun-
dinum In-
dicarum,
Theophr.

Inueniuntur (inquit Seneca) in India Can-
næ, quarum humor pinguis, dalsive in mel abfit.
Quoniam verò non apis pensum mel hoc est, sed
plantæ excrementum, liquet inde etiam Anti-
quis notum fuisse Saccharum.

Canna
mellis.

Cætera, quæ de Saccharo Veteres scriptis man-
dauit, inter vires comperitur.

Hermolauus ex Neoteriis perhibet Saccharum
ex Alexandria Egypti & Cypro adferri com-
mendatissimum: Saccharum Græcos vocare *Sac-
char*.

Locus in-
ta Herma-
laurum.

Manardus astruit nouam opinionem, aliud
scilicet esse antiquorum Medicorum Saccharum,
ab eo quod nunc voce parum (vt fieri solet) mu-
tata, *Zuccharum* vocatur.

Saccharū
Antiquorū
diuersum à
nostrate,
Manardo.
Saccharum
nostrum
Veteribus
notum,
Corn.

Cornarius, qui Saccharum idem cum Zuccha-
ro esse credit, nouisse perhibet Veteres, à Diosc.
& Plinij seculo, Saccharon, sed conereturum qui-
dem, nec ex Cannis expressum veluti hodie ad-
feratur magna ex parte, in pyramides siue metas,
octo plus minuscule librarum coactum.


Manardus & eum sequutus Fuchsius hunc in
modum in Matthiolo refutantur. Non desunt
inter recentiores Medicos, qui disputent, an Sac-
charum, quod sub mellis genere scripserunt Ve-
teres, præsertim Dioscorides, & Galenus, in In-
diâ, & felici Arabia nasci, idem cum nostrate
Saccharo dici possit. Et quamuis plerique repe-
riantur, qui dubio procul existiment, ac pro certo
assument, communis vsus Saccharum, & quod
ab Antiquis describitur, vnum & idem esse, quòd
ex eadem proueniant planta, tamen Manardus
Ferrariensis, & Leonardus Fuchsius ipsam secun-
tus, maximam inter ea ponunt differentiam, om-
nino opinantes in alio Arundinum genere con-
creuisse Antiquorum Saccharum, de quo inter
Mellis genera scripserunt Dioscorides, & Galenus:
concretereque ad hanc diem vsque ex celesti
rore, quemadmodum & id, quod mannam voca-
mus: non autem in iis arundinibus, è quibus in
aqua decoctis huiusce atatis Saccharum in Ma-
dera, Sicilia, Creta, Rhodo & Cypro insulis, ac
etiam in Agypto exprimitur. Qua in re eos vi-
ros alioqui doctissimos, planè hallucinatos, cre-
diderim, quòd nullo, vt puto, authorum probato-
rum testimonio ducti sibi persuaserint, Mannam in
modum ex rore concretere Antiquorum Sac-

Sacchari
considera-
tio ex
Matth.

Manardi
& Fuchsi
opinio re-
probata.

ARVND SACCHARINA, ET SAC-
charum.

CAPVT CXXLIX.



Quæstio
hic agita-
tur, notumne
fuerit Antiquis
Saccharum, cuius
laucitas
tum vititas, in
culinis, in Phar-
macopœorum
Officinis, est,
potu. in secun-
da & aduersa
valetudine, in
quauis ætate,
forte, regione,
nunquam satis
celebrari po-
tuit.

Medius igitur
inter milia-
ceas, atque A-
rundinaceas

plantas vi letur Saccharatus Calamus. Septenum
octonumve pedum *Calamos*, pollere crassiores
densis geniculis, fungosa, perquam dulci, succu-
lentæque & albidâ medullâ obfarctos prouenit,

charum solis ardore super Harūsinum folia tam in India, quam in felici Arabia. Quippe quoddam aufquam repererit scripsisse Dioscoridem, Galenum, nec Veterum, vel Recentiorum quendam, concretum Saccharum in Arundinum foliis, ex rore Solis feruore concreto, siue potius exiccato, quemadmodum in quibusdam arborum frondibus manna per se concretum. Quo fit, ut mihi refellenda videatur eorum sententia. Nam si verum illud esset, ut ipsi imaginantur, non modo, non est credendum, sed ne cogitandum quidem, Dioscoridem, qui diligentissimè simplicium medic. historias, literis, memoriaeque mandauit, silentio præterisse tam pulchrum & admirabile, scituque dignum naturæ opus in Saccharo conficiendo. Nec minùs id reticuisse Galenus naturæ operum inaximus indagator, quemadmodum nec reticuit lib. 3. de alim. facult. aëri mellis historiam quod nos mannam vocamus, quoddamque sua ætate in monte Libano, aliisque locis super arborum frondes reperiunt scribit. Quamobrem magis veritati consonum videtur, ut dicamus, nil aliud Veteribus Saccharum extitisse, quam nostræ Sacchari Arundinum lachryma, seu liquor, qui nimia succi copia aperto in latere calamo perinde ac gummi, exterius concreuerit. Huic nostræ opinioni subscribit Plinius, ex cuius verbis facile cognosci potest, quod non ex rore, ut Mannæ euenit, coalesceret Antiquorum Saccharum super arundinum folia, sed quod fractis calamis earū internodiis cohereret collachymās, è quibus vulgare nostrum conficitur. Quandoquidem, hoc modo resinæ, gummarque omnes scisso sui arboris cortice emanant. Alia præterea huc accedit ratio, quæ (ut quidem arbitror) Manardi ac Falsii sententiæ prorsus aduertatur. Nam quemadmodum in Apulia, & Calabria manna à Sole tacta, dum arborum inhaeret foliis, paruo temporis intervallo in auram euanescit [ut libro primo diximus in mannæ mentione,] eadè sanè ratione id Saccharo euenisset, si ex rore (ut ipsi contendunt) concreueret. Si quidem à Sole tactum, rarefactumque facile desiliisset in auram, nec gummi modo concreuisset. Eoque magis quod nullquam legerim in Diosc. nec Galeno Saccharum è foliis Arundinum colligi, sed in ipsis calamis concretum reperiri. Quod etiam testatur Strabon. 15. Geographiæ, ubi apertè scribit, in India Arundinem mel sine apibus gignere: non autem quod ex rore in arundine fiat, ut quidam perulicæ, ignarique Medicus mecum contendere, atque etiam, ut suam mordicus teneret opinionem, Strabonis codicem contempere non est veritas. Præterea cum memoriæ prædiderint Dioscorides, Galenus, & Plinius, Antiquorum Saccharum durum esse, Salis modo coactum, album, dentibus fragile, ex his coniectare licet, è rore Saccharum nequaquam fieri. Quippe quoniam manna, quæ eodem modo è rore concretum, sal minimè refert, nec dentibus fragilis deprehenditur, sed potius mandentibus tenax, & Cere modo lætescens. Quare crediderim Antiquis Saccharum fuisse tenuiorem, ac præstantiorem illius partem in arundinum Sacchariferatum medulla, quæ per internodiorum silluras exiens Solis calore concreuerat, ut & Saccharum nostrum calore ignis arte concretum, & addentatur. Quod cum accuratissimè perpèderent homines, liquorisque præstantiam agnouissent, à natura edocti hoc arte facturos existimauerunt. Neque id incassum attentasse videntur: quandoquidem Saccharati integros calamos assumentes, minutim que

Antiquorum
Saccharum

Falsii
Sacchari
in uocato.

incidentes, ignis calore tamdiu decoxerunt, donec vniuersus liquor, absumpta igni aqua, diu efferefcens in Saccharum Salis modo in vasis fundo cõcreuerit. Verùm etiã Sacchari arte facti nihil inemerint Dioscorides, & Galenus: non defunt tamen qui dicant, hoc etiam ante eos factum esse, Solini auctoritate freti, qui in India palustribus arundinem ita crassam progigni ait, ut fissis internodiis lembi vice vediret nauigantes, è cuius radicibus dulcem etiam exprimunt humorem ad mellis suauitatem. At qui liquorè hunc, qui ex harum Cannarum radicibus elicitor, Saccharum nostri vsus fuisse existimant, procul dubio falluntur, quòd Indi non modò ex decoctis Cannarum, sed aliarum quoque arborum radicibus sibi potus parent, cum illius cœli, & Soli elementia, frequentissimè sint plantarum radices quæ mellea dulcedine imbuntur, ut Strabon testis est loco super citato, ubi sic inquit, Nullus annus in India inuenitur vtroque tempore sine pluuia. Quapropter contingit annum feracem esse, cum semper terra sit facunda: fructus autem arbores multos gignit, arborumque radices, præsertim magnarum Arundinum, & natura, & decoctione dulces esse, aqua à Solibus tepesacta, tam cœlesti, quam fluuiali. Ad eò quòd ea, quæ apud alios è fructuum & succorum maturitas dicitur, apud illos concoctio est: quæ tantum ad dulcedinè operatur, quantum ea, quæ per ignem fit. Sententiæ nostræ Lucanus quoque suffragatur illud explicans, hoc carmine.

Quæque bibunt tenera dulces ab arundine
succos.

Quin etiam Marcus Varro, qui eodem serè tempore claruit, his tribus, verbis attestatur, dum inquit:

Indica non magna nimis arbore crescit Arundo.

Illius è lentius premitur radicibus humor,
Dulcia cui nequeant succo contendere mella.

Ex iis palam est, hos omnes de factitiis Indorum potionibus, quæ iis vini loco sunt, fuisse locutos: non autem quòd ex illis Cannarum radicibus Saccharum aliquod pararetur. Quandoquidem & nos è Glycyrrhizæ radicibus, quin & è decoctis, prescisque siliquis, sicut è aliis è dactylis, dulces elicimus succos ad variis vsu potationes: quemadmodum & Occidentales Indi è pluribus dulcibus arborum fructibus suos sibi parant potus. Sed non ob id dicendum hos liquores, quòd mellis dulcedinem præsent, esse mel, neque Saccharum. Nec mirum sanè si Indiæ Arundines radicibus dulcissimum præbeant succum, non modò illæ magnæ: sed etiam quæ ibi nascuntur, nostris fortasse non multò grandiores: cum etiã nostrates recentibus manse, quadantenus ori dulces sentiantur. Quod autem minores Arundines in India radicibus dulces præbeant potus, superioribus carminibus explicauit abundè Marcus Varro: cui non magna nimis est arbor. In hoc tamen à Solino dissentit: cui arundines, quarum meminit, validissimæ sunt proceritatis. Hinc ergo eorum sententia explosenda viderur, qui credunt ex illarum magnarum arundinum radicibus, Saccharum nostrò similitus factitasse Indos, quòd non quidem Saccharum, sed dulcis inde potus vini loco sibi conficiant. Sed ut suam opinionem auctoritatibus fulciet Manardus Ferrariensis, vtque lucidius comprobaret Antiquorum Saccharum, perinde ac mannam, ex rore fieri lib. 9. epist. 5. Auicennam etiam admittit, quem tamen alias vbiq; reiecit, ac reproba-

vit, afferens, quod cum ipse huius fuerit sententia, ultimo capite lib. 2. Antiquorum Saccharum mannani vocauit. Quod manifestè declarat Zuccharum *alhasfer* apud Auicennam huiusce arboris esse mannani, vel gummi, non autem Græcorum Saccharum in calamis concretum. Illud insuper nostram comprobat sententiam, quod eodem loco addidit Auicenna, sic inquit. Et in Zuccharo quidem *alhasfer* est cum absterfione pauca stipticitas, & amaritudo. Siquidem austeritatis & amaritudinis, quæ in Antiquorum Saccharo fuerint, nunquam meminere Dioscorides, & Galenus: nec item quod conferret id pulmōni, & aquæ intercuti, ut paulò infra voluit Auicenna. Qui etsi dixerit deinde Zuccharum hoc oculorum motibus, pariterque renu, & vesicæ vitii auxiliari: non tamen ob hoc dici potest, Zuccharum *alhasfer* esse Antiquorum Saccharum. Sed rectè quidem contra Manardi sententiam, Auicennæ testimonio (cùm & ipse hoc in loco Auicennæ autoritate nitatur) probari potest, quod Antiquorum Saccharum gummi modo collachrymans in arundinibus concreueret, non autem ex rore. Quippe quòd is de Zuccharo agens loco nuper citato, ibique Antiquorum Saccharum recensens, inquit: Assumptum sicut gummi ab harundine abstergit oculum. Quibus palàm fit, Antiquorum Saccharum, perinde ac gummi, ab interiori medulla exterioribus emanasse, ibique postmodum Solis ardoribus concreuisse. Verum eniuverò quòd *Alhasfer* apud Arabes sui generis aibor sit, & ab harundine maximè differat, & quòd eius Zuccharum, quamuis ab Auicenna manna dicatur, quòd fortasse granulis concreuerat mannae similibus, ex rore haudquaquam fiat, sed gammium modo ab arbore destillet, manifestè ostendit Serapio cap. de Saccharo his verbis. *Alhasfer* habet lata folia, & habet Zuccharum quod egreditur ab oculis ramorum suorum, & à locis foliorum eius, & colligunt de eo homines rem conuenientem, & in Zuccharo eius est amaritudo, & egrediuntur ab hac planta mala quadam, sicut testiculi camelorum, è quibus liquor quidam emanat adurens, stipticæque facultatis, ad cæteria peridoneus. Et lignum quidem *Alhasfer* est leue, crassum, rectum, pulcherrimæque, & idèò assimilauerunt canulænarij in cantilenis suis brachia, & crura dominarum ligno eius: *hæc Serapio*. Ex quibus facillè & Manardum, & Fuchium, viros alioqui doctissimos, hac in re hallucinatos putauerim. Cæterum Fuchius, ut probaret Antiquorum Saccharum è roscido cæli succo in calamis concretere, vtque illud à nostrate diuersum ostenderet, dicit, quòd cum nostris vsus Saccharum perinde ac mel, calidum reperitur, sitimque facillè concitret, Antiquorum Saccharum esse non potest, eò quòd Galenus suæ ætatis Saccharum id efficere non prodiderit. Cuius tamen sententia (pæc sua dixerim) experimento minimè respondet: à quo non discedit Galenus lib. 7. simpl. medic. ex cuius verbis clarum est, quòd cum Saccharum melle minùs sit dulce, minùs etiam calidum sit necesse est. Eaque propter asserit Galenus, Saccharum non perinde ac mel, sitim excitare: non tamen quòd nulla ab eo sitis exciteretur, vti Fuchius interpretari videtur. Quin etiam idem Galenus lib. 8. cap. 4. meth. med. Saccharum inter ea connumerat, quæ febrientibus exhiberi possunt. His igitur rationibus, & auctoritatibus adductus sum, vt certò crediderim Antiquorum Saccharum ab iisdem arundinibus emanare, à quibus vulgare nostrum exprimitur:

Tom. II.

sed hanc tantum inter se differentiam esse, quòd à natura factum sit nostrate facticio longè tenuius. Idèòque Auicennæ: Zuccharum (inquit) *tabaræd* frigidius est & subilius. Hoc laudibus extulit Paulus, & post ipsum Auicenna Archigenis autoritate *Sal Indum* ipsum appellans, ad lingue scabritiem, ariditatemque in acutissimis febribus. Sed eo nos hac ætate, caremus, quòd amplius non afferatur: quanquam ego non ita pridem à viris fide dignis accepi, qui *Ums Thomæ* insistentemque Maderam iustrarunt, adhuc iis in locis Saccharum inueniri in arundinibus sacchariferis concretum illi non dissimile quod arte fit, & candidum cogitominatur) postquam ab illis spontè emanari gummi modo. Quòd autem adferri desierit, non aliud in causa esse existimamus, quam quòd hodie putum ad nodum proueniat. Siquidem Dioscoridis, & Galeni tempore, quo ad nos copiosum conuehebatur, cum adhuc non innotuisset exprimendi ratio, necesse quidem erat, vt arundines Sacchari liquore prugantes, cum annis compluribus adoleuissent, & falcem nunquam expertæ essent, per se liquorem exudarent, veluti innumeris arboribus gummi, & resinæ emanant. Proinde non mirum, si eius à natura facti Antiqui fuerit vbertas. Sed postquam lueri dulcedo, fulgentisque auri sitis docuit homines artem modumque, quo Saccharum concisus decoctis, pressisque arundinibus copiosus elicerent, factum est, vt Indi quotannis vniuersos inciderint calanos, ac iterum quotannis feuerint. Hinc igitur euenit, vt nullis remanentibus, quæ Saccharo plurium annorum ætate turgeant, natura impedita sit operatio, deperditumque hac de causa sit Antiquorum Saccharum. Cuius vice eo Recentiores vtuntur, quod Officinæ candidum cognominant, arte factum, pellucidum, Salis fossitij modo, dentibusque fragile, vt Antiquorum Saccharum vnde quaque referat. Competit petindè ac illud, scabritie lingue, pectorisque asperitatibus. Verum ad hæc id præstantius est, quod in fistilibus, vbi violaceum Iulapium asseruatur, ætate concreuit: eò quòd violarum diluti facultate humectet, leniatque magis.

Lobel. in Ic. plant. pag. 49. inseribit Arundinem Saccharinam Indicæ, ac de eius Saccharo in Aduers. hæc scribit: Non Indico Saccharo hodie prima laus, tametsi ex India primùm in ceteriorum Asiam, Rhodum, Cyprum, aliisque non pauca loca transmiserint. Nam hodie Canarium & Maderensè longè omnibus suauitate & candore excellit: quippe tametsi quòd Genuam ac Massiliam ex India, Alexandria, & aliis Africæ emporijs, Liburnicis Venetiis asportant, sæpius excoctum, candore nammoreo Canarium prouocat: multò tamen suauitate & dulcedine gratissima superatur. Dum enim lixiuio illo acriore, quasi sapone ex calce parato, feculentioris, nigriorisque pinguedinis sordes eluantur & abstergantur, vber dulcedinis gratioris perit, atque nescio quid rancidæ acrimoniæ inuenitur: vnde bilis gignitur, & sanguis vitur, caput grauat. Quod quilibet nosse potest ex esu vsuque *Thomæ, r. bri* vocati, *Sachari*, ex cognomine Insulæ, sub ipso fermè *Æquatore* sit. Antuerpiam enim & Londinum Angliæ, vbi defæcere solent quidam industrij artifices, si gustes adhuc impurum & rubrum, multò suauius & dulcius reperias, quam excoctum, lixiuisque & cortinas expertum. Et quia, quæ purius reddant industriæ, cœlant Pharmacopæorum plebem: lubitum est hic monere. In Corrinam scilicet ahenum, Sacchari Thomæ, vel alterius quantum volunt, immittunt. Lixiuij fortis sola ex cal-

Zuccharum
tabaræd.

Sal Indæ.

Arundo
saccharina
Indicæ
Lob.

ce viua parati, iustum modum, & quod ebullitioni despumationique suffecturino sit, affundunt: tum agitatione, scopulisque spumas rumidas multorum albuminum ouorum sensim affundunt, vicissim despumando, & rursus instillando, donec sculam plenam mellea & fordidiore pinguedine, despumando exemerint. Tunc probe limpium & suluum factum syrupum, lixiuio nondum absumpto, transmittunt per cilicium, colum, vel stamen, quò inibi festucas, quisquiliasque relinquat. Tum feruet denudò, donec expirarit in vaporem lixiuuium. Quod si (vt ferè sit) feruens Saccharum impetu, artificie inuito, labrum effusione, & ebullitione superet, non aquam, nam sic [vt illi loquuntur] decoqueretur, recrudesceret: sed butyri momentum illicò addunt, atque actutem resident videntes spuma. Iam è Syrupo ad darditiam excocto Saccharo, infundibula, sigillatue vasa, (Veneri aenea) quibus subus in angustiore loco inest foraminulù, priùs fontanè imbura, Saccharo adhuc calente opplèt, eodem obturato foraminulo: recludantque promo, cella, aut Hypocausto sicciore, tepidiore: cumque induruerit, Meta ordine dispositè latiorembasim inducunt, luto ex siglina fulcèj aut pulla terra & aqua calida subacto diluitorè, ac loricam latara duorum, triumue digitorum. Qua erulta vbi partim loci, partim Sacchari tepore sicco & bibaci aruerit, demitur, noua apponitur: bis terue repetentes singula in mutatione fusi mucronem in foraminulum mittunt, vt faciliùs effluat crassamentum pinguius, & fordidius, quod Syrupum vulgè vocant, Gallis *Melasse*: qua quidem improbiore pharmacarii, suos stercoreos Syrupos condunt. Postremò bis aut tertio ex Metis erutum tontana liquefaciunt: rur: umque in Metas infuso, referant subus foramen, superiùque lutum addunt, cuiusmodi diximus. Notum fuit Saccharum Antiquis etiam Diosc. & Galeno antiquiori Theophr. huiusque preceptore philosopho. Paulus recèset inter Sales. Primum è Græcis Actuarius, Medicatos succos Saccharo exceptissè, nomènj, Iosacchari, Rhodocacchari commentus fuisse putatur. Varro & Strabo etiam ex radicibus succum promi suauissimum tradunt.

Tabern. vocat Arundinem saccharinam, & Calamum saccharinum, germ. *Zuckerrohr* / & *Zuckerriedr*. De Saccharo autem eiusque speciebus hæc tradit: Veteres utebantur tantum Saccharo spontè effluente, erat eis ignota parandi ratio per decoctionem. Inter Græcos Medicos qui docuere cõdere cum Saccharo loco Mellis est Actuarius, dein de Nicolaus Alexandrinus. Arundo Saccharina dicitur etiam Harundo & Canna. Succus dicitur *Σάκχαρ* *Σάκχαρον*, Ariano *Μέλι* *γλυκύμαζον*, Paulo Aegin. *αὐτὸν ἰσθίνος* Mellis genus: Galeno, Paulo, Aphrodisæo lib. 2. probl. cap. 74. & Straboni. Serap. lib. simpl. cap. 50. *Zuchar*. aliis Arabibus *Suchar*, *Zazar*, *Sudur* & *Sutter*, Polonicè *Guseer*. Nostro tempore sunt nobis 7. Sacchari genera. Primum genus ad nos adfertur ex Lithuania ex insula Madera aut Medera: dicitur Saccharum Maderiense: hoc cæteris omnibus præstantius & præferendum in vsu Medico.

Saccharum 2. Canarium, aut Canariense, quod defertur ex insulis Canarinis: boritate secundum obtinet locum. Saccharum 3. *Finium*, *Resinatum* & *Valentinum* dicitur, quia Valentia: Hispanie repurgatum. Practicè s & pharmacopœis hodiernis Saccharum *Tabarzerb* quod nomen competit Maderièsi Saccharo, Arabes enim per *Tabarzerb*

intelligunt optimum Saccharum. *Saccharum Valentinum* arte fit ex Maderiensi & Canarino, itaque repurgatur, vt acquirat similitudinem Marmoris albi aut Alabastris, & ob suam pulchritudinem existimatur præcedentibus duobus præstantius: verum cum per lixiuuium ita præparatum sit, meritò ab vsu medico reiciendum, per lixiuuium. n. acquirat acrimoniam, aliquomodo amittit dulcedinem, acquirat aliam naturam & proprietatem, sitim excirat & valdè exsiccat: caueant Pharmacopœi ab huius Sacchari vsu in præparandis Tabellis quæ dicuntur Manus Christi & aliis, ac etiam in aliis medicamentis. Ex hoc Saccharo parant paruas Metas pyramydève, quas inuoluunt papyro cœrulea. Quam vulgè sic persusum melius Saccharum inuoluit charta cœrulea: mercator es Saccharum vilissimum Thomassinum lixiuio dealbant & repurgant & candidius reddunt, verum semper molle remanet, nec ritè induratur: & quò candidius est eò plùs habet Amili, quo adulterant hoc Saccharum dum repurgant, & parant pyramides libram ponderantes.

Saccharum 4. defertur ex insula Maltha, Saccharum est durum vt Canarinum, sed magis cinereum, tertium bonitate locum obtinet, præferendum Valentino, eius vsus in cibo, vocatur *Saccharum Malthanum*, *Melsum* aut *Melstrum* & cibale. Germ. *Malis zucker* aut *Sprußzucker*.

Saccharum 5. ex insula S. Thomæ, est omnium vilissimum, molle est & rufum, dulcius tamen Valentino & salubrius: vocatur *Saccharum Thomassinum*, *Thomæum*, practicè & pharmacopœis rubrum, Arabibus *Zucharum Sadimenum*. Germ. *Thomazucker*.

Saccharum 6. Miscellaneum dicitur, Germ. *Fanzucker* / *Cassanzucker* / compositum est ex fragmentis omnium generum Sacchari, tam albi, quam ruffi: defertur in doliis & capsis ad nundinas, eius vsus ad syrupos & cibos.

Saccharum 7. est liquidum instar Mellis aut Syropi, defertur ex insulis vbi Saccharum coquitur & in metas reducitur: fit ex spuma Sacchari dum coquitur, semper manet liquidum, adfertur in doliis, satis vili venditur, ad multa vile esset loco Mellis, quia viliori pretio venditur, quam Mel, si non rimenda esset impoluta: dicitur *Remel*, *Mel Saccharinum*, aut *Saccharcum*: Gall. *Melasse*, Belg. *Syróp* / Germ. *Zuckerhonig vnde Syrup*. Multi volunt vulgare Saccharum non esse Dioscor. & Galeni inter quos Manardus & alii qui eum secuti: verum qui diligenter considerabit Antiquorum scripta, comperiet Antiquorum & nostrum Saccharum esse ex eadem plâta, nempe ex depicta Arundine, & præparatione tantum differre: Duo autem genera fuerunt Antiquis nota, primum de quo Diosc. Plinius & Galenus: quod erumpit vi Solis ob copiam succi, quo vsi sunt Veteres tantum in medicina, quod non adfertur amplius, sed eius loco substituitur Saccharum Candis, quod arte præparatum ex Arundinibus iisdem ex quibus Veteres collegerunt suum Saccharum. Aliud Saccharum Veretum, quod parâtes, ex recentibus radicibus Arundinis Saccharæe exprimebât, ac vrebât eo modoquo vrimur Melle, inde dictum *Mel Canne*, quod ex Aegypto, Rhodo, Cypro, Creta & Sicilia olim afferebatur, quanquam non esset in medico vsu ante Actuarii tempora, nihilominus Galeno non fuit incognitum, meminit enim lib. 2. simpl. Arundinum dulcium que in Aegypto proueniunt: quomodo fuisset Galeno incognitum Saccharum liquidum

Arundo
sacchar. 7.
Cal. sac-
charinus,
Tab.

Saccharum
1. Maderi-
se.

Sacch. 2.
Canarinum.

Sacch. 3.
Valentinum.

liquidum, quandoquidem vulgare fuit diu ante Galeni tempora, vt apparet ex Marco Varrone, qui eius meminit, is vixit tempore Caesaris, ante Aduentum Christi, Stautus meminit etiam Sacchari arundinacei: Lucanus Poeta meminit etiam Sacchari mollis. Strabo meminit vtriusque. Scribit etiam Solinus de succo expresso ex radicibus Arundinis.

Arundinis saccharina hæc sunt Synonyma nota. Dicitur C. Bauh. in pin. *Arundo Indica* 2. vel *Saccharifera*: *Arundo* 8. vel *saccharata*, Dod. gall. *Arundo* ex qua *Saccharum*, Cord. in hist. *Arund. saccharata Dalech.* in Diosc. *Sacchari Cannæ*, Gesf. hort. *Arundo Saccharina Indica*, Adu. Lob. Icon. H. Lugd. *Canna mellea*, Cæs. *Arundo* & *Calamus Saccharinus*, Tab. *Calamus Indicus*, par. 6. Ind. Or. c. 19. *Calamus Indicus Saccharites*, & *canna Saccharina*, in hist. Ind. Orient. part. 4. 5. & 6. cap. 38. & Hist. Occid. Ind. part. 3. 4. & 9. De Sacchari differentiis & conficiendi modo, in nostris in Matthiolum notis, & lib. de comp. medic. egimus: Vide & Munsteri Cosmograph. l. 2. c. 91.

Loca in quibus Saccharum provenit præter supra allegata, hæc passim annotantur: Insula Madæra, quæ Oceano Atlantico innatæ è regione Mauritania: Insula Hispaniola: Insula S. Mariæ, Terra sancta, Vrbs fœlicis Arabiæ Zibith, Sumatra, Brasilia, & Regnum Concela. Ex Arundinibus in aqua decoctis huius aratris Saccharum in Sicilia, Creta, Rhodo & Cypro Insulis, ac etiam in Ægypto exprimi refert Matthiolum. Arundo Saccharina in nostris regionibus, (inquit Tabern.) raro propter frigus perficit florem, cam Arundinem primò vbi Francofurti in horto Pharm. Adami Keechen qui per aliquot annos eam aluit, sed tandem asperiore hyemæ ci periit: ex eius radicibus & medulla excoquitur Saccharum in India, Arabia, Ægypto, Canarinis insulis, in Insula Madæra, Malta, Cypro, Sicilia & S. Thomæ. Lobel. Orbi Europæ iam multis ad Mediterraneum Oceanumque tractibus inquilina: vt Hispanicis, Lusitanis atque amenissimis Olibæ in Galloprovincia viretis, non procul & ex Aduerfo Stæchadibus insulis, quem virentem inibi & alibi habuimus, & in Belgio meminumus. Panguntur talem imæ radici abscessæ, atque bellè primò proficiunt in Gallia & Belgio, sed hyemis fœuitia eueantur, humentis foli, sed tepidioris æris. & auræ alumina ac amassa.

De viribus & vsu Sacchari ita Dioscorides, Saccharum aluo est idoneum, & stomacho vtile, si aqua dilutum bibatur: vexata verò vesicæ renibusque auxiliatur: quin & illitum ea discutit, quæ pupillis tenebris offundunt Saccharum Indicum & ex Arabia fœlicis confectum Galenus minus suo dulce statuit, sed similes ei vires attribuit, quod ad abstergendum, desiccandum, & digerendum pertinet. Quatenus verò nec inimicum ventriculo est, nec sitim adferens, eatenus ab illo substantiâ differre scribit lib. 7. simpl. medic. Ast 8. meth. med. cap. 4. Saccharum inter ea connumerat, quæ febricitibus exhiberi possunt. Saccharum (teste Tabern.) temperate est natura, calidum & humidum in primo ordine, primario quidem *Maderiense*, *Canarium*, & *Melissum*, & ad Mel quàm proximè accedit. Similiter & *Finum*, quod non ita dulce, igneam & acrem, ex lixiuio calcis, quo preparatur, assumit qualitatem, quâ *Th. menum* etiam superat, ideoque sitim causat ingentem, ita vt ad internos vsus inutile reddatur, quamuis vulgus Medicorum (quoniam præ cæteris candidissimum sit) magno errore

contrarium teneat, optimèque esse diiudicat. Quapropter eligatur temper vel Maderiense, vel Canariense. Saccharo cibi austeri & acidi corriguntur: saluti nimium in temperantur: crassi, attenuantur: ingrati verò suauiores redduntur. Emendantur, vt paucis multa complectar, Saccharo omnia, quæ medium excellere in culina. Quid namque acidi acie & acrimonia præcellit acetum. Attamen nihilominus hocce virtus eius infringitur. Nec Pharmacopoi sine hoc suo (vt vellent & continèd deberent) officio satisfacere queunt. Nunc enim Electuaria, Syrupos, Iulepos, potiones, vina, conferuas, condita, succos, ac omnis generis confectiones, tabulas, panes Martios, & cætera, Saccharum ingreditur. Nunc quantum requirit omne genus animalium, volucres cæli, pisces maris, & pecora & reptilia terræ, & si quæ alia excogitari possunt, quæ ex Saccharo quotidie efforantur, ac variis coloribus depinguntur. Nunc quantum semina & fructus, & si nucleci, amygdalæ, auellana, pistacea, Citreum, Cinnamomum, Coriandrum, Anisum, Fœniculum & similia, quæ eodem obducuntur. Quæ quidem vt plurimum luxu, nocturnis potationibus, intemptiuis conuiujs magis abdicantur, quàm salutaribus medicinis. Sed quid profint, experiuntur Magnates, qui grauissimis morbis subitò nonnunquam corripuantur, symptomatibus periculosissimis continèd vexantur, humillâque sapissimè morte ipsa extinguuntur. De quibus qui in acie & prælis potatorum versantur, multo certius, quàm ij, qui in vinbraculis, & extra se ipsi iactum (ita dicere liceat) vitam degunt, testimonium reddere sciunt. Spontanea igitur lachrymæ sunt, quibus nobis inet ipsi ventriculum, Heparque afficimus, ipsumque adèd totius corporis temperamentum subuertimus, vitamque ipsam antè deperdimus, quàm constantem ætatem attingimus. Hac ergo ratione media hæc à Deo Bonorum omnium autore ad vitam consequendam concessa, non media ad vitam, sed media ad mortem, efficiuntur.

Saccharum Maderiense moderatè in cibo & potu usurpatum, purificat sanguinem, spiritus recreat, membra corroborat. Per se quoque, aut modo dicto, assumptum, ad vitia thoracis & pulmonum vtile. Proseuum arteriæ asperæ contra raucedinem. Commodum quoque internis apostematibus, lateris & c. thoracis vlcibus, Tussim sedat, ventrem emollit, præsertim verò infantum. Doloribus thoracis medetur. Biliofi & Scærici, extra medicinam entent Saccharum, id enim facillè in bilem mutatur. Ad hæc obest omni vitio, quod à bile originem suam traxit. Infantes si plus de Saccharo ingerant, lumbrici non raro in ijs gignuntur. His itaque non nisi virgine necessitate, aut saltem minus administratur. Non assentiendum iis, qui existimant Saccharum intestinorum obstructionem parere, quandoquidem abstergit & mundificat. Salutare admodum est renum, vniuariorum meatuum, & vesicæ affectibus. Non tantam, vt mel, sitim excitat. Dentibus valdè nocuum. Non enim nigros duntaxat reddidit, sed & putrefecere, vacillare, atque excidere facit. Quare sibi consulunt ij, qui assumpto Saccharo, os aquâ frigidâ cluunt. Ex frigida quoque haustum, raucam emendat vocem, à calore ortam. Contra tussim siccam, sitim & asperitatem faucium: & Sacch. vnc. j. Aq. frigid. mensur. j. Decoq. ad consumpt. tertiæ partis. De hoc decocto bibere quantum lubet. Si præstantius desider-

vsus in orina.

vsus in medio.

Luxus est dicitur.

Sacchari Maderiense si Sicut.

deras. Adde drach. ij. Liquiritiæ minutim incise: vnc. f. Vuar. Corynth. Bull. mod. dicto, percolenturque, seruetur ad vsum. Saccharum hoc lacti recenti ad lulepi consistentiam incoctum proficit iis, quibus vitriolum aut alumen fuit propinatum. Noxam enim eorum corrigit, quæ post se relicta intestinum omne læderent. De hoc bibet quando voler. Medicina hæc, non vulgaris est antidotus contra tussim etiam infantum, si ad sitis usque extinctionem ipsis de hac haurire concedatur. Nunc in puluicem redactum & cum vnc. iij. Ol. Amygd. recent. express. commixtum ebibitum Colicam sedat. Oleo verò Rosar. aut Butyro recent. mistum & eorum sanat omnes internos affectus ab assumpto alumine, Vitriolo, Cantharidibus, eiusdemque generis acris & erosiuus rebus exortos. Aduerfus capitis, cerebri, thoracis & ventriculi dolorem à frigore profectum. ꝛ. Sacch. Maderiensis vnc. viij. Rad. Ireos vnc. f. Zingib. drach. ij. Galang. Maioran. Calam. arom. ana. drach. i. Nücis Mosch. Cubeb. Cardamom. Cinnâ. el. Ment. crisp. Caryophyll. ana. drach. f. Piper. long. scrup. i. scorsum in puluicem subtilem redigatur. Cætera simul conterantur quam diligentissimè, traicianturque per cribrum angustissimum, ac miscantur. Fiat Tragea, seruetur in scarula ad vsum. Huius Tragea manè ieiuno stomacho cochlear vnum pane in vino prius generoso madefacto, exceptum, ac commanum, calefacit refrigeratum caput, cerebrum, thoracem, pulmonem ac ventriculum, corroborat memoriam, & cor atque principaliora membra, sensus adauget. Pectoris angustia medetur, & tussis frigida. Anhelitum commendat, hilaritatem inducit, appetentiam excitat, concoctionem iuuat, absumit humiditates, status dissipat, neruoso generi conducit, tenibus prodest, obstructions hepatis & lienis referat, naturalem colorem inducit. Saccharum Maderiense subtilissimo modo puluerisatum oculis inasperum obscuritatem visus depellit, eosque lucidos reddit. In frustula parua fractum, carbonibus impositum, fumisque naribus exceptum, capitis lilit cathartos, emendatque Coryzam. Contra linguæ ranulam ꝛ. Sacchar. fini. Aluminis, viridis artis ana. vnc. f. f. pulu. subtiliss. quem cum melle in linimentum rediges, quo sepius illines ranulam etiam inueteratam. Vt dentes conferues, Saccharum hoc puluerisat, cum melle commisce, & eò sepius dentes frica, quo facto aqua frigida os collue.

Sacch. Canariu.

Ad Vinum clarum reddendum.

Saccharum Canarium cum æquali portione salis vsti puluerisatum, & cum oleo communi decoctum, eoque mentum instar saponis lotum barbam producit longam. Idem in puluicem redactum, vlcera sanat, bis in die inasperum. Vinum turbidum sequenti ratione clarum reddes. Accipe pro quolibet dolio Sacchari & Aluminis vnc. viij. hæc diligentissimè simul puluerisat, & in vino clarificando dissolue, eidemque infunde, bacilloque foraminulento illud agita: hinc vas ad 14. dies oclude, posteaque in aliud transfunde, & vinum clarum cognosces. Euaporatum verò ita corrige: ꝛ. Sacchari pulueriz. lb. f. Rasura cornu cerui vnc. iiii. Quæ miscendo impones in linteum sacculum. Posthæc vino superinfunde mensuram vnam lactis recenter multi, agitando strenuè vinum baculo iam dicto. Quibus ita peractis sacculum indito, vasque fortiter obrurato. Præstans in vindemiis sic effice. ꝛ. Sacchari iam sepius dicti vnc. xvi. Polypodii, Macis, ana. vnc. i. Quæ consuade grosso modo, misce ac in succu-

lo include, vinoque cum elaboratum est ad 14. dies iniice, vas verò diligenter oclude.

Aqua Saccharea in multis morbis vicem potus ordinarii supplens. ꝛ. Sacchari vnc. viii. Aq. frigid. lb. vii. coq. igitur lentos ad consumptionem medietatis, percoletur, serueturque ad vsum, Aqua hæc pro sitis vehementia ebibita, medetur Catarhis, taucedini, tussi, Orthopnæ, Pleuritidi, affectibus calidis pulmonum, astuanti ventriculo, & eiusdem generis inbecillitatibus. Prodest insuper febre Ephemera laborantibus. Si infantes quoque laborent, nutrices non alio, quam de hoc decocto bibant, quod illis admodum salutare. *Alia in Carbaris* ꝛ. Hæius decocti lb. iiii. Succ. Granator. acid. vnc. iiii. Vfus eius vt primæ. Tertia cum Cinnamomo, pro iis quibus interdictum est vinum. ꝛ. Sacchari vnc. iij. Cinamon. drach. ij. Aq. fontis lb. viij. Imponatur simul in cantharum linteo obruratum, suspendatur in aque calentis balneo, permittanturque ad ad minimum duabus horis coqui. Denum amoue cantharum donec ex se refrigeretur, tandem decoct. percoletur, serueturque ad vsum. *Alia* pestilentialis quæ non solum litem sedat, sed ipsi veneno resistit, facultatemque vitalem reficit. ꝛ. Sacch. vnc. vj. Succ. granat. acid. Cydon. ana. vnc. viij. Aq. font. lb. viij. Ponantur vna in vas lapideum in balneo aq. calentis per dimidium horæ, coletur ad vsum. *Quinta* ex pluribus composita aduersum dyspnæam, angustiam pectoris & obstructionem pulmonum. ꝛ. Sacch. vnc. v. Vuar. Corynth. bene lot. vnc. j. Sem. fœnic vnc. f. Pappau. alb. vnc. j. Sümie. Hillop. Saluæ, Viol. mat. ana. M. i. Capill. Ven. p. j. Iuito. rub. & nig. ana. n. xii. Dactyl. mund. Ficus ana. n. iij. Liquirit. ras. ꝛ. Sc. Anisi, Cinâ. an. vnc. ij. Rad. Helé. 3. f. l. acidend. incidatur vasiq; cum Sacch. indantur, affundantur aque due vel tres mensuræ, vas quoque ipsi obturetur, ac balneo aq. calentis imponatur ad horas 4. post vbi frige factum fuerit, coletur serueturque ad vsum. Hoc quoque in loco vinum illud Saccharatum nobis recludendum venit, quod ꝛ. vini optimi vel Creeci lb. iij. Sacchari albilissimi lb. ij. Coquantur ad lentum ignem more Syrupi, serua & vtere cum duabus partibus aquæ vel aliter, vt vsum postulat. Semibus, frigidis & debilibus conuenit, & quibus humor natiuus, & calor naturalis immittitur: nutrit enim & sanguinem generat, & replet partes principales spiritibus. Syrupus saccharatus & eodem modo paratur, & iisdem viribus pellet.

SACCHARVM CANDVM.

CAP. CCL.

Sacchari candi duplex genus in Officinis habemus. *Prims* & præstantius candidum est, forma & facie salis gemmæ aut Crytalli splendens, nec vti Saccharum vulgare ita facile dissolubile sub lingua. *Aterum* obscure rufum est, obiter splendens & velut per scintillas, prædicto fragilius, quippe cui duritie haud parum cedat, dulcore alioqui non inferior. Sed Saccharum Candi inter reliqua omnia præstat, cuius confectionem talem docet Tabern. Maderiensis Sacchari purissimi libræ viginti plus minus in minutissima frusta continguntur, postea teruntur, & in Caccabum aut aliud simile vas commodè immittuntur, superfusaque aqua fonta-

quantum ad dissolutionem sufficiat carbonibus accensis superponitur ad dissolutionem & ebullitionem, quam celerrimè fieri necesse est. Etenim si diutius bulliat, flavescit. Quocirca quò parcius aqua affunditur, eò melius & candidius Saccharum efficitur. Saccharo itaque sic dissoluto, ebullito & in Syrupi co nùtentiam cocto: ad manum habere oportet arca instar, vas fictile oblongum, quadratum, coctum, interna parte vitreatum, ab ima parte interna summa versus suffulturis prominentibus binum digitorum distantia donatum, ita vt propter has veluti scalas angustiore fundo patentiore sit ore. His suffulturis siue scalis sic ordine dispositis bacilli tenues quadrati, duorum itidem digitorum distantia à se inuicem ordinantur atque disponuntur, incipiendo ab imo & progrediendo ad summa vsque. Mox Saccharum adhuc bulliens, huic vasi infunditur vt repleatur: Quo facto obtegitur, & prope fornacem collocatur ad decimam sextam aut vigesimam vsque diem. Vase tum detecto, maior Sacchari pars Crytalli instar candidata, eleganter bacillis adhærescere conspicitur. Quod restat Syrupi, nec dum condensati, lentè & cautè effunditur in Cacabum, vt denuò bulliat. Sed post hanc ebullitionem modicè refrigeratum Saccharum, denuò dictis bacillis, quibus iam Sacchari Candi magna pars hæret superfunditur, & in decimam diem vti priùs stare permittitur. Quibus peractis omne Saccharum, candidum & clarum factum, baculis adhærescens deprehenditur. Sed ex nullo alio ligno dicti baculi parari debent, quam ex abietino, pinastrino, aut tædino. His enim dictis lignis faciliùs adhærescit Saccharum quam reliquis, quod experientia facillè constat: Conditæ namque Saccharo radices aut fructus si doliolo ex abietino, aut aliquo ex prædictis ligno parato, immittantur. Syrupus facillè adhæret vasis, condensatur, atque candescit, quod in aliis vasis haud ita temerè obseruaueris. Veneti *Saccharum Candi* ex repurgato Saccharo parant: & candore quidem atque claritate præcellit. Verùm quia istud Saccharum cum lixiuio decoqui ac depurari (vt illi putant) solet: fieri nequit, quin istud Saccharum acrem, adurentem & feruidam quandam qualitatem acquirat, atque ob id haud absque damno in internis affectibus præscribi queat. Satius itaque fuerit, si ex laudatissimo Maderiano Saccharo paretur: quippe quod candore & pulchritudine priori nequiquam cedit, dulcore verò haud parum superat.

A Venetis auctore Lobel. sic paratur *Saccharum Candi*. Primæ notæ Sacchari accipiunt vicinas, tricenarive libras, pauca aquila fontana, vt liquefcat, faciunt: & ne multum in multa aqua bulliat (nam flavesceret) & quia parum aquæ inest illico in crassum syrupum abit. Tunc arundinaceos bacillos, aut radicas pusillas, quas priùs cancellarim, decussatimque ad ollæ imum, & latera aptarim, mergit Saccharo, Syrupove calcæ, & vas paulò superius, quam medio tenus opplente, multum inuolutum bombace densa, vas cella, aut Officina calcæ facta reponunt super aslere, semimense aut viginti pòlt diebus aperiant os, & nondum concretum syrupum priùs effundunt, tepente affusa calida, ad syrups eluendam pinguedinem. Quà denuò & illico affusa, reponunt quouis calidiore, aut quouis alio loco: effusa tòque eodem die aut biduo vase, pellucidi candoris crytallinas bacillis aggestas habent glebas, multò durissimas, quas citius vres, quam liquefacies igni, nisi liquore addido.

Tom. II.

Nostrate Candum etiàmque vulgarum Saccharum abstergit, oculisque prodest. Sacchari Veterum vice Recentiores vtuntur (inquit Matth.) quod officinæ *Candidum* cognominant, quod pellucidum Salis fossitij modo, dentibusque fragile, competit, veluti Antiquorum, scabritici lingue, pectorisque asperitatibus. Verùm ad hæc id præstantius est, quod in fictilibus, vbi violaceum lulapium asseruatur æstate concreuit.

Saccharum Candum, atque præparatù quo vtimur pro Veterum Saccharo, ignotum fuit (puta: ita Tabern.) Veteribus & Recentioribus Græcis Medicis, ac nullus eorum meminit præter Nicolaum Myresum, qui nominat *καβίτον*, alij legunt *καβίτον*, Lat. dicitur Saccharum Candum, Candium, Canditum, Crytalinum. Hieronimo Montuo *zaccharum* & *Saccharum lucidum*: Hermolao *Saccharum Cantium*, Germ. *Candi Zucker* / *candi Eiszucker*, & *crystallinzucker*: duplex est, vnum pulchrum clarum lucidum instar crytalli, quod præparatur ex Maderiano aut canarino Saccharo: aliud rubrum, ruffumque quod ex Thomassino Saccharo paratur.

Virg.
*Sach. Sicilaceum.**Pro Veterum Saccharo & surpatur.*

Nomina

SACCHARVM CANDVM
violaceum.

CAP. CCLI.

Purpureum violaceum æquè pellucidum, sed pulcherrimum, nec minus vile, solis Venetis, dum illic ageremus, notum, sic paratur. Summo, exempli grætia, Sacchari finissimi lib. 6. liquefcat & bulliant quàm fieri potest paucissima aqua, donec ad tabellaram electuarij crassitiei deducatur. Tunc affusis vnciis 24. expressionis coactæ compendiosa, & recens eductæ ex frigida & violis contusis: aut potius violacea stilliticia (ne vires colorve deleatur) recrudescat, seu (vt illi loquuntur) decoquatur, vt recedat ad Syrupi superioris simplicis Candi crassitiam. Feltucis, olla, & eodem loco & modo paratur elegantissimum Violaceum. Dum Saccharo percocto miscetur Violarum dilutum, vel expressio purpurea, qualem diximus, addendo aliquot guttas succi Limonum, viuidiore colore & limpidiore diaphano placebit. Denique vtilissimum simul atque fragratius, curabimus parandum, additis drachmis duabus Iridis candidissimæ lacinia inuolutæ, quæ amica societate, solita est Violæ fragrantiam & gratiam, tum addere, tum excitare, nec parum sic Arteriacis commodi adferre. Sic decet nitidum Pharmacopœum parare, nec perpetuò, quasi miscellus foret seruitor, Seraphico Vercelleni radiato Apollini auscultare, qui imperat vas condendum & obruendum sterquilinio, vt fermentando & putrefaciendo (fortè & ipse persuasus à Theophrastinis stercoreis Philosphis. suas imbibat penitus fragrantias & vapores, stercoreosque adscescat spiritus.

Blauwer Candit Zucker (vocat ita Tabern.) *weyl candit Zucker*. Saccharum Candum ceruicium seu violaceum: paratur hoc modo: Accipe Sacch. finis. lib. 8. Ag. violac. marr. quantum ad dissolutionem necesse fuerit vt fiat Syr. coq. lenitur ad perfectionem, vt tabule fieri possint. Dein affunde succi violac. absque pediculis & cū ag. violar. destillata expressi lib. 3. Iterum coq. ad consistentiam idoneam. Effunde in vas vitrarum terreum, ad præsens institutum cum bacillis paratura eo modo, quo iam dictum procedendo.

Preparatio

XV 4

si verò pellucidum magis & coloratum violaceū parare libeat, Succo violarum adduntur aliquot guttæ succi Limonium aut Malorum Granatorum.

Vires

Saccharum hoc rufi medetur, sicut & thoracis atque pulmonum affectibus, à calore exortis.

SACCHARVM PENIDIUM.

C A P. CCLII.

Descriptio

FACTITUM & Penidium est, quod ex Melisso fit, commune verò ex Thoma, optimum verò ex Miscellaneo. Accipitur igitur Sacch. Miscellanei ad lb. iij. aut quinque, Aq. fortan. q. l. coq. leuiore flamma: parata autem habere oportet albumina ouorum quinque optimè priùs agitata, de quibus penicillo quouis saccharum calens aspergitur, permittiturque aliquamdiu coqui, donec fordes ouorum albumini adhæreant. His ita peractis Saccharum ab igne remouendū, à quo, vbi bullire cessauit, feces cochleari tollendæ. Hinc iterum coquendum, rursusque albumine aspergendum, atque feces demendæ, quod eouque reiterandum donec à spuma & omni impuritate liberum reddatur. Posthæc coletur, iterumque leno igne, attamen per gradus æquales, coquatur, vsque dum ampullas grossas producere incipiat, quibus apparentibus solum aut bacillum teretem, & æqualem in aqua frigida madefactum ad vnciam profundè in calens Saccharum mittito, cūque, vna quod ei adhæsit, cum Saccharo in frigida refrigerato. Quod tum demum perfectè coctum est si induratum facilè detrahitur, nec masticatum dentibus agglutinatur: aut quādo eius portiuncula aliqua digitis extremis duobus distracta, in tenuissima quasi fila abigit, quæ perpenſa digito, tanquam vitrum distiliunt. Inde amorum ab igne, ampullisque sidentibus, super marmor, butyro, oleo amygdalarum, aut oliuarum inunctum effunditur, & manibus vel inunctis, vel amyli polline aspersis, ne adhæreat comprehensum, ex alto paulatim comprimendo, & fricando hinc inde demittitur aliquoties; tandem, vbi paulum refrigit, ferramento vnicoparicti infixo obuoluitur, idque tantisper, dum bene lentum & candidum efficiatur. Quò autem diutius trahitur, eò candidius redditur. Tandem attractum famulis distribuitur, vt distrahendo torquendoque formetur modo consueto. Formarum reponatur loco calido.

Nomina

Medici Græci Sacchari huius nom meminerūt. Nostris autem dicitur, *Saccharum penidium*, *Zaccharum penidium*, & in plurali numero *Penidia*, *Penidæ*, & *Penidis*. Andree Bellunensii *Alfernd*, & Matthæo Syluatico *Alfernd*. Germ. *Zuckerpenid*, *penid*, & *Penidzucker*; ac etiam *gerrebetz* dicitur.

Vires

Mediocriter calefacit, emollit & humectat. In cibo & potu, aut alio quolibet modo vsurpatum, asperitati, rufi, & raucedini medetur, tumores emollit. Saccharum penidium puluerifarum & in cibis assumptum his conducit, qui ex diuturno morbo macie confecti sunt, vt etiam phthisi & hæctica febre laborantibus, si vnc. iij. aut quinque Sacchari cum mensura vna lactis asinini recenter nulli sumant. Quibus pulmones laborant sine febre, his continuo prodest Saccharum hoc cum lacte ebibitum. Paratur etiam ex hoc Electuarium pro variolis malè affectis collo, arteria

aspera, & pulmonibus. R. Sacch. penid. in pollicem redact. vnc. j. Mucilag. sem. coton. Gummi Arab. puluer. ana vnc. f. Misce. cum Syrup. lub. q. s. subinde fumant ægri etiam infantes de hoc El. medium cochleare. R. Saccharum penidium puluerif. cum butyro recenti. f. El. pro is qui ex Alumine, Vitriolo, aut aliis acerbis & crostius assumptis offenduntur. Saccharum penidium in lacte receti dissolue, eoque in Angina ad tumores emolliendos loco gargarifini vitior. Fit quoque aqua Sacchari penidiid decocta, hoc modo. R. Sacch. penid. vnc. v. Ap. font. l. vij. Decoq. igne leuto ad consumpt. medietatis: coletur, serueturque ad vsum. Inseruit autem ariditati arterie asperæ, raucedinè emendat, sitim extinguit, tussim sedat, promouet sereatum, ventrem emollit, phthisicis vitilis.

Habetur tandem & Diapenidium sine speciebus calidis apud Nicolaum, quod R. penidorum vnc. ij. drach. f. Pinearum Amygdal. dulc. Sem. Papaueris albi ana drach. iij. serup. j. Cinnamonij, Caryophyllorum, Zingiberis, Succu Glycyrrhizæ, Tragacanthæ, Gummi Arabici, Amyli, Sc. Cucurbitæ, Sem. Citrulli, sem. Cucumeris, Sem. Melonis ana drach. j. f. Caphuræ G. vij. Sacchari albi quantum sufficit. Fiat electuarium. Valet aduersus omnem thoracis noxam, tussim, vocis iacturam: tabidis denique & purulenta excreantibus succurrit.

SACCHARVM CANDVM ROSACEVM.

C A P. CCLIII.

EX Saccharo Maderiensi, aquâ Rosarum distillata, & succo rosarum Zucharinatum expresso paratur, eadem omnino ratione, quâ Saccharum Candum violaceum, pulchrè rubens & pellucidum, maxime quidem si non nihil succi Limonium aut Mali Citrei Saccharo superaddatur. Sedat sitim, confortat ventriculum relaxatum, & hepar supercalefactum, & cor, resistit putredini, peccilentie & ventositati: Tabern.

SACCHARVM CANDVM Cinnamominum.

C A P. CCLIV.

Eodem penidus modo fit [inquit Tabern.] quo Saccharum Candum, nisi quod aquæ communis loco, cinnamomea destillata recipiatur ad dissoluendum Saccharum, ac præterea olei Cinnamomi parum immisceatur. In affectibus frigidis thoracis & ventriculi commendatur, ac cor roborat & ventriculum.

SACCHARVM ALHEISAR.

C A P. CCLV.

Zaccharum alhusar, vt videre est apud Auic. est Manna cadens super Alhusar, similibus gumis Salis: parum, autem abstergit, austerrum est & amarum: confert pulmone & aquæ intereuti, Oculorum morbis, pariterque renum & vesicæ vitis auxiliatur. Assumptum vt gummi ab Arundine abstergit oculum. Sed Alhusar, quemadmodum apud Serapionem legimus: habet

habet folia lata, Saccharum verò prodit ex oculis ramorum iuxta folia, quod colligitur, amarumque est: Huic plantæ sunt Mala quædam, veluti testiculi Camclorum, è quibus liquor manat adurens, austeræque facultatis ad cauteria peridoneus: lignum eius est leue, crassum, rectum, pulchrumque, & ideo assimilauerunt Cantilenari, in cantilenis, brachia & cætera dominarum ligno eius.

Manardus vt comprobaret Antiquorum Saccharum perinde ac Mannam ex rore fieri, Auicennam admittit, teste Matth. At nos qui huic opinioni minimè adspicimur dicimus Alhufar siue Alhaffer (vt Belunenensis castigauit) nullo pacto Arabica lingua, Arundinem significare, sed aliam Egypti & Arabiæ arborem. Quòd Alhaffer apud Arabes sui generis arbor sit, & ab Arundine maximè differat, & quòd eius Saccharum, quamuis ab Auicenna Manna dicatur, quòd fortasse granulis concreuerat Manna similibus, ex rore haudquaquam sed gummiu modo ab arbore distillet, manifestè ostendit Serapio.




rantis turbinè, aut gigan-tis staturam minacè signaret, nomen disse videtur.

A Galeno, Paulo, & Actio. omiffa.

Hanc Typham & Plinium (Cornario nobis attestante.) C. tamen Bauhinus cum lib. 16. cap. 36. inter aquaticos Calamos de hac Plinium cõgisse scribit) & Galenus, & Paulus, & Ætius in Simpli censu præterierunt: credo e quidem de crecis, quòd multa alia haberent, quæ eũ vsum præstarent, quem Dioscor. de Typha flore prodidit.

Nomina linguarum

Nota est hodie Typha per omnes ferè paludes & stagna occurrens, Germ. Tolben simpliciter vocant, id est, clauas, à similitudine videlicet ad ipsas, alii Nosselben à natali loco appellant. Alii Rõrditfelben; ab ipsa formæ alii Harrenbolben, hoc est, clauam stulti, alii Ließnospen, Belg. Mieschdoden & donsen. Gall. Masse de rones & simpliciter Masses appellant, & oppositè quidem, inquit Ruellius: Galliarura Masses dixerunt, quòd scepra regum Massus vulgò dicitur; perpolitus caulis lanosa floccorum densitate summatim fastigiatus æmuletur. Hetruscis Marthiolo auctore Marza forte dicitur, quòd eius lanugo, si in aures decidat, surditatem afferat: Hisp. Be.r.d. seu Inno Amac. rodaro: Angl. cattis rayle & recde male.



Tragus Typham aquaticam inscribit, ac Pliniori lib. 16. cap. 36. inter aquaticos Calamos huius Typha mentionem fecisse suspicatur; cum hunc in modum scribit: Caterò gracilitas nodis distincta: leui fastigio tenuatur in cacumina, crassiore paniculæ coina, neque hac superuacua. Aut enim pro pluma strata cauponatum replet: aut vbi limosiore callo induruit, sicut in Belgis, conuulsa & interiecta nauium commissuris ferruminaat textus, glutino tenacior, rimisque explendis fidelior pice. Ad hoc autem credendum induerunt Tragus victores Germani, qui doliorum commissuris fideliter & tenaciter coniungendis Typhæ folia adhibent, maximè eius quæ in caulem haud dum exiuit, Vocant porrò ea folia

Calamus aquaticus Plinio.

TYPHA PALVSTRIS MAIOR.

CAP. CCLVI.

Alustris Typha maior, altitudine procerum hominem æquat, vel etiam superat, caule sepe singulari, est vbi pluribus, rectis, rigidis, teretibus, læuibus, longis geniculis articularis: folia cubitos aliquot longa, vnciam lata, ancipiti acie stringentem valnerant, crassiuscula substantia spongiosa, longissima vagina caulem inuoluentia, sapore subdulci, quorum alia statim à radice oriuntur, alia è caubum geniculis: Cæterum caulis fastigium tomento in cylindri formam rufescente in passos tandem abeunte obtuoluitur, morionis clamam imitatus, mucrone paluari aut longiore præpilatus. Radix obliquè acta serpit, nouo bobolis pulliati se propagans, ex albo rufesceus extrinsecus, intus verò niuci candoris veluti ex funiculis multis compacta, à qua frequenter dependent fibræ concolores, sapor denique fatuus est. Oculi verò ex radice primulùm emergentes, subdulces, tenericaules.

Diximus inter Frumentacea de Typha, cuius Theophrastus vatiis in locis meminit. Hic autem de Typha sermonem habemus, quam prim. Historiæ 8. ex palustribus & in stagnis nascentibus, enodem & planam esse scribit: quàmque 4. hist. 2. in lacu Otchomenio nascentes collocat, sine folio, radice haud numerosa. Huius Typhæ & Diosc. recordatur, cui florum esligies turbinata, quasi typhonis sese gy-



Iesen & Bnospen. Plantam ipsam sunt qui Sparulam fetidam nominatam velint, sed quoniam recte ipsi videntur.

A Dodon. Gall. & Lat. Typha palustris titulo describitur & depingitur, ibidemque inter cetera hac de Typha leguntur: à Dioscoride *man* appellatur: Recentiores ad differentiã alterius Typha, quã inter fruges est, palustrem & lacustrem cognominant: appellant etiam iudein *Cestum morionis*, nec non Typham aquaticam.

Cel. morionis.

Theophrastus Typhæ inuenit absque folio, quæ huic nostræ parum similis. Plus certè similitudinibus Typha nostra cum *celæ* Theophrasti habet, eo videlicet, qui in lacubus nascitur. Ouidius hanc stirpem Scirpum nominare videtur; ex ea etenim flores scirpeas *mattas* nominat, vt Pastor. 6.

Pbleum Theoph. Scirpus Ouidij.

At domus discite, ait, planstrisque morantes
Sustulit, in planstro scirpea matta fuit.

An Dod. gallici Papyri species

Nunc quæ sit Dod. Gallici Papyri species *Roseau à faire mattes*, dubius hæreo: nisi fortè intelligat Typham palustrem, prius quàm caulem producat. Non tamen id fieret sine errore, si ex vna stirpe duas faceret. De sua Papyri specie hæc scribit. Hæc Papyri species folia habet longiora rigida, & quasi triangularia, plena intus medulla spongiola. Radix est dura, crassa, alba, pluribus fibris donata, & aliquot juncturis lateribus conspicua, à quibus oriuntur flores alij, & alia planta. Quoniam radices desiccantur facile incenduntur & claram flammam reddunt. Gladioli hæc species crescit secundum torrentes, fluuios, accessus & recessus aquarum. Videtur ea Papyri species, quam Strabo *Cythum* appellat, qui gaudis est Gladiolus, habens folia laris larga, radice n. satis magnam, brachij vnius magnitudine; reperiturque in Aegypto ad Nilum, ex quo antehac fiebat charta scriptoria, qualiter hodie fieri solet ex linteis dilaceratis. Assimilatur temperamento & facultatibus Papyro, vnde desiccatur sine acrimoniã: præcipue cineres eius, qui profunt contra vlcera erodentia, præsertim oris, imperli. Folia aperitunt fistulas & plagas angustas. Eadem sicca apta sunt ad mattas siue flores contextendas. Hanc Papyri speciem Dodon. in post. suis de plant. Hist. silentio præterit, animaduertens fortè s. Typha imperfecta primũ inque è terra erumpente illum fuisse. Eadem pingitur ab H.L. p. 983. pro linceo aspero Dod.

Nepot typha Diof. Annulli Typha a loco decaurata.

Anguill. non admittit hunc pro Typha Dioscoridis: nullis autem rationibus suam stabilit opinionem.

Typham vocauit Gesl. de coll. stirp. à loco natali palustri qui Græcè *tyssa* dicitur per iota, & sic Typham herbam etiam scribi existimauit, nisi fortè differentiã gratia à Typha, Tritici genere per y scriberetur.

Synonyma

Dicitur Typha siue palustris maior C. Bauh. Typha aquatica, Trag. Lugd. Typha, Matth. Fuch. Ama. Lac. Tur. Cord. in Diosc. Lon. Lob. Call. Tab. Ger. Typha palustris, Ruell. Cel. Aquatica Papyri species, Dod. gall. vlna, Ang. Inuus asper Dodon. gall. Hist. Lugd.

Locus.

Typham obseruauit Montpelij, Geneuæ, & Montbelgardi in fossis, in Allatia in lacubus. Locus palustribus, inquit Dodon. in stagnantibus aquis, & iuxta laxorum fluuiorum ripas exit. Iulio & Augusto paniculæ videntur, Roscolorum spicula iam arida ac decedente. Restant subinde paniculæ ad alterius anni ætatem, atque nunc non rarè pediculi in ipsa panicularum lanugine nati reperiuntur: quod admiratione haud caret. Cum

enim caulis tunc omninò sit aridus, & lanugo adeò sicca vt vento abripiatur, animalcula his, iuscemodi sub lanugine ista gigni ac viuere posse mirum est.

Typhæ [*tyssa*] herbæ flos suillo adipe cloto [Ruell. Græcè *tyssa*] excepto ambullis medetur. Ex his Dioscoridis verbis colligit Tragus Typham moderatum quoddam temperamentum esse fortitan. Petrus Hispanus dicit quod radix herbæ Cesti cum folijs sapè datã in potu & emplastrata curat rupturam, Valef. de Taranta, vium foliorum suprà exposuimus.

TYPHA PALVTRIS
MEDIA.

CAP. CCLVII.

Peculiar hoc genus Typhæ, vcluti medium, obseruabat Clusius, copiosè nascens palustri quadam fossa apud Tyburni Sacellum, primo ab vrbe Londinensi militari; erat folijs multò angustioribus quàm Typhæ vulgaris folia & graciliore claua, maiore tamen quàm minima illa à Pena Lobeliòque expressa. Aliòqui à maiore non differt pullo illo tomento in clauam compacto & florum oblonga spica, tenui flauo polline respersa, supra clauam enascente. Florebat Iunio.

Typha media, Clus. pann. & Hist. Typha 2. siue palustris claua gracili, Casp. Bauh. pin.

TYPHA MINOR.

CAP. CCLVIII.



Typha minor maioris similis, & radice obliqua geniculatim incedente folia promit graminæ, longa, angusta, & inter hæc caulem scquicuburi aut duorum cubitorum altitudine, iuncum, rigidum, enodum, cuius sumus scapus geminas iustinct tomenti fuscis extrinsecus, intus albi, clauas cylindraceas,

modica inter se distantes intercapedine, multò & breuiores & strigiosiores quàm Typhæ maioris.

Typha minor Lob. Adv. & Ic. Plant. pag. 81. & Hist. Lugd. Typha minor, siue Typhula, Tab. Typha minima, Clus. pannon. Typha 3. siue palustris minor, C. Bauhin. pin.

In agro Geneuensi, quã confluunt Rhodanus & Arue exit, vbi ego & Lob. collegimus.

SPARGANIVM QVIBVS DAM.

CAP. CCLIX.

Numerosis fibris capillata radice nititur, folia tum à radice exorta, tum à caule, Typhinis similia, carinata, striata, acuta, elatiori dorso stringentis manum infesto vulnere scindentia, gustu nonnihili dulci: caulis cubitalis & altior, teres, tortuosus, inæquali ramorum diuicatione brachiatu: flores ruberculis ramorum, nullo pediculo, adnascuntur, aspergillum inuicem, radiatis in orbem staminulis albidis apiculos fuscis sustentibus constantes, nullo relicto fructu seminé caducis, alibi enim nascuntur, pilulæ echinatae Platani, ex conulis singulis singulos acinos continentibus



glomerata.

Plantam hanc à Germanis Riedgras appellatam Tragus Sparganium Dioscoridis esse iudicat. Eius figura nobis non placet: pulchriorem habet Marthiol. qui & ipse in priorib. comm. Sparganium Diosc. & Galeni constituerat: in post. tamen comm. Ital. reuocat in dubium an sit Sparganium, aut iniquitas, ut vult in Aduers. Lobelius, qui Commentatorem illustum fuisse scribit triuiali intellectione literæ, sic habentis: folia ad certam inclinata magis, vel procumbentia. Ceterum in Obs. p. 41. & Icon. p. 30. picturam habet sub titulo Sparganii & Butomi Theophrasti.

Cord. in Diosc. Sparganium vocat Germ. degenfräus, dicitque alibi Gladiolum à Veteribus etiam vocari.

Dodon. gall. Butomum inscribit: Lat. Platanaria seu Boutomon. Platanariam quidem à fructuum cum Platani pilulis similitudine nuncupat. Non desunt qui Calamagrostin Dioscoridis esse velint, sed male.

Sparganii Diosc. apud Matthiolum bonam figuram esse testatur Anguillara: verum quantum ab eius descriptione abit, vel solus pilularum situs ostendit, que non est à uicis ræ uauis, siue in summo caulis modo, sed & multò infra eius fastigium & alibi quoque exoritur. Plus similitudinis Platanaria cum Corbelio habet, cuius Theophr. lib. 4. De stirp. Hist. sapius meminit, quòdque ait locis palustribus exire, foliis multis angularibus, Harundini ac Cyperi similibus: caule, qui æqualitatem peculiarem sortitus sit, & fructu nigro, Sidæ magnitudine proximo. Huius Butomi mentionem facit Democ. Geoponic. Cassij Dionysij lib. 2. ubi ait folia ipsum habere Cyperi, grata boum pabulo: vnde nomen, Ruellio auctore, accepit. In Græco exemplari habetur: φιλια uicis φιλια uicis, sed pro ἀειχμη, restituendum κωνια uicis.

Pro Sparganio hanc plantam admittere videtur quoque C. Bauh. qui in pin. hæc scribit: *Sparganium à πη σπαραγαν, fascioliis, quòd foliis eius latis & vitium modo lentis pro fasciis nutrites vrantur: cuius Diosc. lib. 4. meminit. Theophr. Theophr. 4. hist. 8. cui mas & femina, & hæc sterilis. Dicitur hæc stirps Sparganium 1. siue ramosum. Sparganium, Trag. Marth. Ang. Tur. Cord. in Diosc. Ges. cat. Lac. Cæf. Cast. Cam. Tab. (cui & Gladiolus palustris) Ger. Eyst. Butomus Theophr. Ang. Butomon, Ruell. Dod. gall. Ges. cat. Platanaria, Dod. Thal. Sparganium & Butomus Theophr. Lob. Carex, Lon. Phleus fœmina, Lugd. Calamagrostis secunda, Ejdem.*

Locis palustribus, perennes aquas habentibus exiit, ac iuxta riualorum quorundamque fluuiorum margines. Pilulas Augusto mense profert.

SPARGANIVM ALTERVM.

CAP. CCLX.

Sparganium alterum, non tantum pediculis adherentes pilulas fert, sed & caulis alius earum rotatum circumpositis transadigit, quibus mollities initium barbularum contrectabilior maricatis Sparganii primi cehinis: à quibus & illud dispescit quòd in orbem acti flores glomerati, subsequenticibus capitulis æquales, tremulas staminum luteorum fibras vibrant: eo, in summo scapo ordine vt verticillorum series appareat.



Sparganium alterum (sic etiam vocat Cæf. H. Lugd. & Tabern.) per Lobelium in Obs. p. 11. & l. p. 30. exhibitum, plus similitudinis habere quam superiorem, cum Sparganio creditur Dodonæus, qui Platanariam alteram inscribit. Cæf. Bauh. in phyt. & pin. dicitur Sparganium non ramosum: Sparganium laticellum Gerardi.

Florens, nueni mensis Iulij 11. in stagno inter S. Colinum & Balguc Castellum Saragozæ.

SPARGANIVM MINIMVM C. BAVH.

Sparganaria III. sine minimi, vt author vocat in pin. ab eo in Prodr. sic descriptum reperitur: plantula est vnciarum quatuor, nam radícula ex fibellis oblongis componitur, vnde cauliculis vnciarum duarum effertur, & in capitulum exiguum subrotundum, cui aliud minus insidet, herbacei coloris & formæ, quemadmodum in Sparganio maiore, definit circa quem folia vtrinque quaternis, vel quinis, angusta, cauliculum superantia.

Plantulam hanc D. Furerus anno 1617. transmissit, his ascriptis: Sparganium minimum & sc.

Northusi in lacunis quibusdam cœno-
suis partes superiores per artem exie-

maris est, rara, ex locustis albicantibus, arctis ob-
longis armatis, composita.

Hec in dumetis humidis circa montem Cren-
tzaceensem prouenit: at in vdis Michelsfeldensi-
bus, altius exurgit.

ET RECTA HUIUS LIBRI OBSERVETVR SERIES,

Hic quæ eius finem constituant locum esse
debet post Gramen pratense panicu-
latum minus angustiore folio
Casp. Eaub. sicque post
caput 52.

GRAMEN PALVSTRE PANICVLA
speciosa, Casp. Bauhini.

CAP. CCLXII.

HOc Gramen palustre paniculâ speciosa;
quod in prod. 15. est, in pin. verò Gramen
paniculatum aquaticum secundum, ad bicubita-
lem altitudinem exurgit, calamo lato crasso: fo-
liis est paucis, pedalis, latiusculis, per mar-
ginem asperiusculis, quorum aliqua tubuli in-
itar, calaminum mediâ ex parte ambiunt: paniculâ
est iubata, selquisulmarî, ex elegantissimis, par-
uis & subrotundis laminellis composita.

In humidis circa Patanium author collegit: &
in Hassia stagnis reperiri intellexit.

GRAMEN PRATENSE MINVS.

CAP. CCLIX.

Gramen
minus,
Lob.
Locus.

Gramen hoc minus (vt vocat Lob. in Ady.
& Ic. p. 1.) quod montanus vel decliuus, in-
cultus, exustus & aridior ager, vt pabulo
gratius & vtilius vellere, sic multo delicatius, &
temine efficacius est.

Gramen
4. vel 11.
Tab.
Descript.

Tabern. qui in hist. Gramen 4. facit, & icon.
Gramen minus vocat, sic describit. Medium
est genus inter primum (Gramen repens Ceme-
rarij intelligo) & secundum (Gramen cum
spica aliquatenus arundinacea): radicibus paruis,
albis, multis fibris donatis: culmis nodosis, spi-
thaneis, aut paullo longioribus, quatuor aut
quinque: folia sunt longa, angusta, quorum mediû
perius percurrit: trinq; acuta, in acumen de-
sinentia: spica quasi ex festucis componitur plu-
ribus, binis semper oppositis.

Est Gramen pratense 2. Dodon. lat. Gramen pra-
tense minus Gerardo: Gramen pratense panicu-
latum 5. siue medium, Casp. Bauhin. pin. latiore &
angustiore folio.

Varietas.

An fortè Gramen tenuifolium hirsutum?

GAMEN HARVNDINACEVM PANI-
culatum, Tabern.

CAP. CCLXIII.

Radicibus, nodosisque calamis Gramini ha-
rundinaceo maiori comparat author: fo-
lia autem sunt latiora, maiora & longiora: pani-
cula quoque multiplicior & latior.

Dicitur Gramen narundinaceum paniculatum, et-
iam Gerardo. Gramen maius aquaticum Lob.
Icon. Plant. p. 4. Casp. Bauhin. pin. Gramen pani-
culatum aquaticum 4. siue latifolium: Graminis ar-
undinacei alia species Thelio: Lolis nonnulli genus,
Trago. Idem & nos esse concludimus cum Grami-
ne maiori aquatice Lobelii.

In humidis & paludosis non raro occurrit.

GRAMEN AQUATICVM HARVNDINA-
cum paniculatum, Tabern.

CAP. CCLX.

Descrip.

Radicem transversam agit fibrosam: calamos
maiores, at ipsa Harundine palustri minores:
folia similia harundinaceo Gramini, sed maiora
& longiora: paniculam harundinaceam. Author
in sua hist. facit Gramen aquaticum 4. cognomi-
natque etiam in Ic. Gramen aquaticum harundi-
naceum paniculatum. Gerar. Gramen maius aqua-
ticum. C. B. pin. Gramen paniculatum aquaticum 1.
siue Gramen paniculatum altissimum.

Synonyma

Idem suspicamur cum Gramine maiore aqua-
tico Lobelii. Nec ab hoc separandum putamus
Gramen harundinaceum paniculatum eiusdem
Tab. de quo infra.

GAMEN CARYOPHYLLATA FOLIIS
spica squamata.

CAP. CCLXIV.

CBauhin. pin. dicitur Gramen spicatum pra-
tense 7. siue Caryophyllata: foliis spica
squamata: Graminis loliacei octavi alia pepu-
silla species Thalii, cuius tota plantula palmatè
longitudinem non excedit, radicibus paruis, fi-
bratis, nigricantibus, foliis oblongiusculis, stri-
ctis, recuruis ac imbricatis: colicula tenui, in sua
summitate breuem, squamatamque spicam con-
tinens.

Huius figuram Gramini nigro luteo iunxit
Lobelius in Ic. Plant. p. 10. sub titulo Graminis
spicari foliis Caryophyllata.

Nascitur locis aridioribus & apricis.

GRAMEN PALVSTRE PANICVLATVM
minus, C. Bauhini.

CAP. CCLXI.

Synon.
Descriptio

Gramen paniculatum aquaticum 4. [vt au-
thor in pin. vocat,] siue, vt in prod. Gramen
16. ex radice crassa fibris albicantibus durioribus
donata, calamo rotundo, striato, cubicum supe-
rius exurgit, quem folia pallidè virentia, latius-
cula, pedalia, subsæpera inuestiunt: panicula pal-

GRAMEN TYPHOIDES MOLLE.

CAP. CCLXV.

Radicem nititur exigua, fibrosâ: caulis cubita-
lem & maiorem adipiscitur longitudinem,
nodisue distinguitur: folia sunt pauca, eadem-
que angusta & acuminata: spica longa glumis
ita

ita densè stipata, vt caudam vulpinam præ se ferant.

Dicitur Tabern. descriptionis auctori, *gramen alopecuroides* 1. Lob. in lc. p. 8. *gramen alopecuroides*: Germ. *gramen alopecuroides minus*: Casp. Bauh. pin. *gramen typhoides* 2. siue molle.

Dubitamus an sit *gramen Alopecuro* accedens, & Phalaridi spica longiuscula, folio lanuginoso.

Secus femitas passim occurrit.

GRAMEN ECHINATVM DALECHAMPII.

CAP. CCLXVI.

Radicibus multis nitur, gracilibus, candicans, tubisq; cauliculis, ex vno cespite multis huc illuc diffusis: folio arundinaceo, minore: capitulis in summo caule oblongis, tactu sic asperis, vt echinati videantur: semine minutulo, glutinosa obvoluto. Sapor totius plantæ ex fatuo subdulcis. Nasctur ad ripas Arares,

An *gramen cauda leporis aspera*: C. Bauh. pin. *gramen alopecuroides sextum*, spica aspera: *gramen echinatum Dalechampi*, H. Lugd. p. 432.

GRAMEN TOMENTOSVM ALPINVM minus, C. Bauh.

CAP. CCLXVII.

EX radice parua, inutili, *calamus* raro dodrantem superans, foliis duobus, tribusve vestitus exurgit, cuius summitati pappus infidet.

Gramen 28. in prod. *gramen romanosum* 3. siue *alpinum* & minus, C. Bauh. in pin.

Prouenit in Heluetia, in D. Bernhadi monte minore ad lacum: in Rhætia Burserus collegit.

GRAMEN PALVSTRE IVNCEVM RACEMOSO femine, C. Bauh.

CAP. CCLXVIII.

Foliis est paucis iuncis, culmo cubitali, ex cuius summitate, inter bina foliola, veluti racemus paruus propendit. Est *gramen* 35. in prod. In pin. autem *gramen iunceum* 7.

In aquis circa Francofurtum ad Oderam D. Fleischerus collegit, & anno 1605. auctori communicauit.

GRAMEN IVNCEVM AQUATICVM maius, Tabern.

CAP. CCLXIX.

Radicem habet incuruam, minimi digiti crassitudine, hinc inde in imo multis fibris repentem: iunci sunt tenues & angusti, tesquipidem alti, quatuor, aut quinque, longis, graminis, ex nodis prodeuntibus, foliolis conspicui: flores nigro-lutei, iunci communis. In paludosis occurrit.

Auctori in hist. est *gramen iunceum secundum*: Eid. ic. *gramen iunceum aquaticum maius*, groß wasser, bingen gras, *gramen iunceum aquaticum*, Gerardo. *gramen* 74. C. Bauh. phyt. siue *gramen iunceum* 5. & maius. Eid. pin. *gramen iunceum* 7. siue polyfaction.

Tom. II.

An fortè Iuncus foliaceus,

GRAMEN IVNCEVM SYLVATICVM. Tabern.

CAP. CCLXX.

Radix magna, fibrosa: iunci siue culmi complures, pedales, nodis distincti, intus rarè medullà referti, extrà colore ex nigro viridantes: è nodis siue geniculis prodeunt exigua, ex nigro viridia, graminea foliola: iunci in summitatibus ceu in ramulos abeunt, producentes hosculos arugineos, siue spadiceos.

Dicitur auctori in hist. *gramen iunceum* 1. Eid. ic. *gramen iunceum sylvaticum*, waldbingen gras. C. Bauh. phyt. *gramen* 73. siue *iunceum* 4. Eid. pin. *gramen iunceum* 8. siue *folio articulo*: *gramen iunceum* 1. vel *sylvaticum nemorosum*, Tabern. *gramen iunceum sylvaticum*, Ger.

An Iuncus foliaceus capsalis triangulus, & idem cum eiusdem gramine triangulo?

Nasctur in humidis, arcuosis, umbrosisque locis, ac in siluis fecus vias, locis graminosis.

GRAMINIS LOLIACEI OCTAVI III. SPECIES, Thelio.

CAP. CCLXXI.

Miuor (secundà specie) est, breuioribusq; ac tenioribus coliculis: foliis breuioribus ac strictioribus, spicis item paniculatis, spadiceis, breuioribus ac tenuioribus: Cùmque secunda species per totum caulem à radice vique in cacumen ex geniculis emittat suas paniculas: hæc cauliculo constat in inferioribus partibus enodis, in summitate tantùm pauca genicula habente, ex quibus panicula binæ, tres, vel quatuor ad summum prodeunt. Panicula autem postquam defloruerunt, decidunt, ac eas subsequuntur squamata capitula includentia semen nigrum, paruum, acuminato cuspidè præmunitum.

C. Bauhino pin. *gramen arundinaceum* 4. siue *panicula mollis spadicea minus*: *graminis loliacei octavi tertia species*, Thelio.

GRAMEN ECHINATO CAPITVLO, C. Bauh.

CAP. CCLXXII.

Gramen echinatum 1. siue spicà rotundà echinata, vel *gramen echinato capitulo*: *gramen echinatum tribuloides*, Columella, C. Bauh. in pin. nobis nondum visum.

GRAMEN SPICA PLANA ECHINATA, C. Bauh.

CAP. CCLXXIII.

Plantula palmaris est: *radicula* ex fibellis albis composita, ex qua *foliola* capillacea, pauca, vnciam longa, & festuca tenuissima, prodeunt: *spicam* habet vncialem, planam, quæ ex verticulis minutissimis aristas acutas emittit: ex Hispania D. Albinus attulit *gramen* hoc spica plana echinata, siue *gramen* 49. in prod. *gramen echinatum* 2. in pin.

Z z

GRAMEN LOLIACEVM MINVS,
spicâ simplici. Casp. Bauhini.

CAP. CCLXXIV.

Descriptio **E**X radice capillacea, cauliculi plures, rotundi, duri, duarum vnciarum, & etiam semipalmates, foliis paucis, angustis, & brevibus cincti, exurgunt, quibus spica duarum vnciarum, angusta, Lolio similis, infidet: in agris Monspeliensibus frequens est hoc Gramen, quod in prod. est 6. in pin. verò Gramen loliaceum 4.

GRAMEN LOLIACEVM MINVS MULTIPlici spica, C. Bauh.

CAP. CCLXXV.

Descriptio **H**Oc maiori ex parte repit, & caliculis est multis, vnciarum quatuor, foliis paucis, & spica multiplici: cuius vtriculis semen paruum, oblongiusculum includitur. Et hoc, est in prod. Gramen 2 6. in pin Gramen loliaceum 5. Monspeli prouenit.

Synonyma

GRAMEN LOLIACEVM SYPINVM
Lobelii, Casp. Bauh.

CAP. CCLXXVI.

Synon.



Delet.

Gramen loliaceum 6. siue supinum C. Bauhini in pin. à Lobelio in altera Aduers. parte, Gramen phalaroides exile supinum humi sparsum Danicū nominatur, & sic describitur: Gramen pusillum, humile, humiq; sparsum, innumeris duarum vnciarū culmis, torulis spicatis effusè fastigiatis, exilibusque apiculis præditis: Foliis vncialis longitudinis & latiusculis, crassioribusque culmis pro plantulæ magnitudine. Radix fusca, cirrosa: Tota albicat herba per fœnicium.

Synon.

Videtur propè Cronenburgum arcem regiam Selandiæ Danorum, è regione equalis & horti Regii, sabuloso solo ad latus maritimum pone rusticos lares.

* * *

GRAMEN MARITIMVM PANICVLA loliacâ, C. Bauh.

CAP. CCLXXVII.

EX radicibus capillaceis, cauliculi plures, rotundi, recurui, altitudine impares, palmo inferioriores, geniculati, foliis paucis, angustis, oblongis cincti, exurgunt, paniculam loliaceam, trium quatuorū vnciarum, sed ramosam, sustinentes: locis maritimis circa Monspeliū, vnde D. Saltzmannus attulit, hoc Gramen, quod in prod. 62. est, in pin. Gramen loliaceum 7. siue maritimum paniculâ loliacca.

FESTVCA IVNCEO FOLIO SPICA geminâ, C. Bauh.

CAP. CCLXXVIII.

Hæc, quæ est in prod. Gramen festucæ 6. culmo est sesquicubitali, rotundo, geniculato, & ramoso, cuius summitati spica, vix vnciam longæ, molles, rufescentes, aristis oblongis armatæ, Ichæmo Gramini villoso similes, indent & semper duæ simul, vni oblongo pediculo indidentes, iunguntur: folia habet iunca, longæ, inor dinatè disposita.

FESTVCA SEXTA, THALII.

CAP. CCLXXIX.

PASSIM in agris prouenit Hæcynicis, foliis brevioribus cauliculis tenuibus, triaristis, in cuius summo racematim dependent, palmi longitudine, in tenuissimis & vix visu perceptilibus pediculis, parui quidam membranacei & paleacei vtriculi, quorum exteriores membranulæ rubent, quibus dehiscens candidulus stios emicat. C. Bauhin. pin. Gramen festuca 9. siue Festuca graminæ aruensis minor.

FESTVCA PRATENSIS LANVGINOSA, Casp. Bauhin.

CAP. CCLXXX.

EX radice capillacea, rufescente, foliis multæ, angustæ, pedalia vnâ cum culmis tenuibus, bipedalibus, foliaceis, molli & paucâ lanugine [culmi potissimum] aspersis, exurgunt: spica est oblonga, angustæ, ex glumis oblongis, aristis donatis composita, & quasi in paniculam paruum expansa.

Basilicæ passim in pratis Gramen hoc, quod auctor in prod. 68. constituit: in pin. Gramen festucæ 10.

* * *

FESTUCA DUMETORVM, EIVSDEM.

CAP. CCLXXXI.

Gramini 69. (vt in prod. author vocat) vel
(vt in pin.) Gramini festuca n. sine dume-
torum, ex radice capillacea, nigricante, cul-
mi plures, geniculis distincti, paucissimis pilis a-
spersis, duorum, triumve cubitorum, foliis ob-
longis, angustis cincti, exurgunt, in quorum sum-
mo spica oblonga, locustis raris, oblongis, cauli
proximis, & aristis armatis constans.

Iulio mense in dumetis circa Bitam haud dun-
taxat, verum etiam in vepribus, locis siccioribus,
prouenit.

FESTUCA DUMETORVM FOLIS ANGV-
stissimis, pilosis, C. Bauhini.


CAP. CCLXXXII.

Gramini huic 70. in prod. Gramini festuca 12.
in pin. radix est albicans, ex durioribus fibris
composita: ex qua calami aliquot tenues, vno al-
terove geniculo distincti, & penè nudi, exurgunt:
folia sunt breuia, angustissima: laui, mollique la-
nugine hirsuta: calamorum summitati veluti pa-
nicula, ex spicis pluribus composita, quarum
quælibet capillaceo pediculo insidet, multus glu-
mis aristatis & candicantibus constans: prouenit
in dumetis circa Cliben.

Descriptio

FINIS LIBRI DECIMIOCTAVI.







HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER DECIMVS NONVS.

DE HERBIS BVLBOSIS ET HIS AFFINIBVS.



FRUMENTORVM quibus opes Cereus constant, affiniūque ipsis Graminum, ac his rursus affinium Iuncorum & Harundinum natura iudicata propemodum est: ita connexu rebus, vt immensa herbaria natura silua, horreorum diuitia, palustrium, maritimorum, pratorūque, accessitum morsu perquirendi subtilitas simul accretur. Succedant nunc Bulbosa plantae, caulium simplicitate, florumque figura à dictis haud ita aliena. Ac in hac quidem specie differentiāque varietate in immensum propemodum luxurians ceruitur natura. Innoxia & hominum cura nouas, omnique priore aeuo nostro huic Orbi incognitas ac inuisas florum diuitias, Hyacinthos, Bulbocodia, Narcissos, Tulipanos, Coronas Imperiales, & eiusmodi tripudiantis natura Specimina. Non fuerat sanè hoc decus in maiorum nostrorum hortis. Crescit profectò cum historia ipsa admiratio naturae diuitiarum: & autòque copia maior dicenda restat, tamò magis mirari Dei Opt. Max. in creando potentiam, in largiendo & propagando benignitatem subit. Nec dubie superata hoc modo possit videri etiam rerum natura ipsius munificentia, si humani operis esset inuentio. Nunc verò Dei ipsius Protoplasti fuisse eam apparet, ac cerè diuinam, etiam cum homo artu mangonio eam variare nouit, nullo industria miraculo maiore, si verum fateri volumus: sique verum quod in Magia naturalis insolentibus illis commentationibus gloriantur. Offendentis ergo & hoc naturae munus, & singula, more nostro, graphicè depingamus.

CÆPE SIVE CEPÆ RVBRA ET ALBA, ROTVNDÆ AC LONGÆ.

CAP. I.



caulis nudus, rectus, duorum, triūque cubitorum altitudine circa medium in ventrem vtrinque turbinatum turgescit, glomeratum in summo fastigio

BVLBORVM, quantum viciam est in naturae ditione, notissima Cepa est, cuius radix acetrima, oculos mordicando lachrymas elicit, ex tunicarum inuolucris contexta, modò rubra [potissimum tunice exterioris,] modò alba, interdum orbicularis, aliàs bulboso longo, pendulis ab imo fibris albis. Folia pedalia, fistulosa, parum acrimonia videntur radici cedere, si recentia fuerint:

sustinens florum caput pugni magnitudine, semen angulosum atrum.

Iam olim Theophrasti & Dioscor. aeuo, magnam Ceparum varietatem, è locis, colore, magnitudine, acrimoniā, teneritudine, variòque mangonio petita fuisse constat. Ita nāque Theophrast. scriptum reliquit. Ceparum [ἡ ἰσχυρὰ, non ἡ ἰσχυρὰ vt Hist. Lugd.] genera plura, vt quæ à locis nomina accipere, Gardia, Gnidia, Samoethracie: item Setanica, & Fissiles, & Aiscalonia. Ex his Setanica minima, sed large, dulces: Fissiles verò & Aiscalonigum cultu, tum naturā inter se differunt: fissilem etenim hyeme suā cum comā inertem relinquunt, Vetre externa folia detrahunt, & reliqua colunt: detrahitis his foliis, altero germinant. simulque inferiùs finditur: vnde fissiles appellatæ sunt. Quidam vel omnibus detrahenda folia censent, vt vim suam imo contineant, neque effluere seminecant. Aiscaloniarū peculiaris quædam natura notata est: etenim sole fissiles, & quasi steriles ab radice consistunt, nec eā parte crescere, ac proficere possunt: quamobrem non eas deponunt: sed semine serunt: cum deinde germinatum sit, transferunt. Perficiantur ad eō ce- leriter, vt cum cæteris, aut etiam priùs euelli possunt. Plus temporis dimissa in terra, putrescentia

Caput florum.
Semen.

Theoph.
A loco.
Setanica.
Aiscalonia.
Aculea & natura.
Fissilia.

Aiscalonia.

Plantata caule non edunt, semineque tantummodo
 in radice, cum exinaniuntur arque inarescunt.
 Harum igitur talis natura est. Nunc explicatâ A-
 fcaloniaum naturâ, alias Ceparum differentias
 Theophr. persequitur. *Ἐπιπέριον ἔστιν ἐξ ἧς τοῖς χυλοῦσι
 οἱ ἐπιπέριον ἔστιν* (Sic legit GAZA, non ἐπιπέριον, vt ha-
 bent vulgata exemplaria. Plinius legit, *ἐπιπέριον*) *τὸ
 ἴδιον ἔστιν ἐπιπέριον τοῖς ἑσπέραις*. Differunt & colore non-
 nulle: etenim apud Isum cetera quidem candi-
 dis similes constant, sed colore candida admo-
 dum proueniunt, Sardiâque similiter ferè af-
 firmant. Cretensium peculiaris maximè natra
 notatur, sed Afcaloniis quodammodo proxima,
 ni forè vel eadem dici debeat: est enim in Creta
 genus quoddam, quod semine quidem satum in
 radice crassatur, depositum verò in caulem se-
 menque totum funditur: sine capite, saporeque
 dulce est: id enim quasi è contrario ceteris ha-
 bet: omnes namque deposita melius, celeriusque
 perficiuntur. Omnes post arcturum proueniunt,
 repido adhuc solo, vt depositas imbrès occupent.
 Seruntur & toto capite & circumcisò, sed ger-
 minationes haud similes fieri solet: parte namque
 inferiore Cæpa nascuntur, superiore herba tantum
 erumpit: lectè in rectum germinare omni-
 nò nequeunt. Gethyum dictum sine capite est, &
 quasi longi ceruicè confilens, ob id germinatio
 tota in fronde: sæpiusque iurissent, vt Porrum,
 qua de causa semine feritur id nec deponitur. Cæ-
 pas hucè ferè differentiis discernere licet.

A colore.

Cretenses.

Tempus.
Sat. 10.

Gethyum.

Plurimè dif-
ferentia.

Setania.
Tusculana.
Sardica.

Afcalonia.

Samothra-
cia.
Sardica.
Cretica.

Gethyum.
Pallanacia.

Africana,
Gallica,
Tusculana,
Amite-
rna.

Satis.
Tempus.

Ex his plurima mutuatus est Plinius, de iis sic
 scribens; Cæpe genera apud Græcos Sardia, (Sar-
 dia Ch.) Samothracia, Allidena, Setania, Schista,
 Afcalonia ab oppido Indica nominata. Omnibus
 etiam odor lachrymosus, & præcipuè Cypriis,
 in minè Gnidiiis. Omnibus corpus totum pingue-
 tudinis carum cartilagine. E cunctis Setania
 minima, exceptâ Tusculana, sed dulcis. Schis-
 ta autem & Afcalonia condiuntur. Schistam
 hieme cum co. na sua relinquunt, vere folia de-
 trahunt, & alia subnascuntur iisdem diuisuris: v-
 de & nomen. Hoc exemplo reliquis quoque ge-
 neribus derrali iubet, vt in capita crescant potius,
 quàm in semina. Afcaloniarum propria
 natura. Etenim velut steriles sunt ab radice, &
 ob id semine ferit illas, non deponi, iussere Græ-
 ci. Præterea ferit circa ver, cum germinant,
 [germinant, CH. germinauerint. TH.] trans-
 ferunt ita crasse, & tunc propere præteriti
 temporis penitacione. Festinandum autem in
 his est, quoniam maceræ celeriter putrescunt.
 Si deponantur, [caulem mittunt, CH. neque le-
 gitur, & in M.] & caulem emittunt & [semen-
 tant vet.] semen ipsæque euanescent. Est colo-
 rum differentia [amido CH.] Samo enim & Sar-
 dibus candidissime proueniunt. Sunt in honore
 & Cretica, de quibus dubitant, an eadem sint,
 quæ Afcalonia: quoniam [satis radices agunt,
 CH.] satis capita crassescunt: depositis, [caulis
 & semine] caules & semina. Distant sapore tantum
 dulci. Apud nos duo prima genera. Vnum con-
 dimentaria, quàm illi Gethion, nostri Pallaca-
 nan vocant. Seritur mensibus, Martio, Aprili,
 Maio. Alterum capitata, quæ ab æquinoctio
 Autumni, vel à Fauonio. Genera eius austerita-
 tis ordine, Africana, Gallica, [Tusculana, Af-
 calonia, Amitern. CH.] Tusculana, Amiterni-
 na. Optima autem, quæ rotundissima. Item ru-
 fa actior, quam candida: sicca, quàm viridis: &
 cruda, quàm cocta: sicca, quàm condita. Seritur
 Amiternina frigidis & humidis locis, & sola Al-
 lii modo capite, reliquæ semine. Proximæque æ-

state nullum semen emittunt, sed caput tantum
 quod inarescit (inarescit, vt mox, cum incrementi
 & Dal.) Sequenti autem anno permutata terio-
 ne semen gignitur, caput ipsum corrumpitur. Ego
 omnibus annis separatim semen Cæpe causa
 feritur, separatim cæpe seminis. Seruantur autem
 optimè in paleis. Gethyum pecuè sine capite est
 ceruicis tantum longæ, & idè totum in fronde
 sæpiusque resecatur, vt Porrum. Idè & illud se-
 runt, non deponunt. Cæterò Cæpas ter folio solo
 ferit iubent, extirpatis radicibus herbarum in iu-
 gera denas libras. Intermisceri Satureiam, quo-
 niam melius proueniat. Rincari præterea & fati-
 riri, si non sæpius, quater. Afcalonium mense Fe-
 bruario ferunt nostri. Semen Cæparum nigresce-
 re incipiens, antequam maresecat (inarescant
 CH.) metunt.

Quales verò differentias Dioscorides agnouerit,
 ex in frâ de viribus dicendis mox patebit.

Cæterum Plutarchus lib. de Id. & Ofir. scri-
 bit Cæpam Aegyptios Pelusios auersari, quod
 lachrymas eliciendo, Festos dies celebrantibus,
 molesta sit, & excitata siti incommoda iis, qui re-
 ligionis causa potu ciboque abstinent. Præterea
 quia Lunâ decretescente viget & augetur, singu-
 lisque diebus flores promat, minutâ verò depo-
 nat, & ad eiusdem vices redeat. Bias à rege A-
 lyatte accersitus, regî fortunâ spretâ, illum iussit
ἡ ἑρμῆα ἰδὼν, ἄνθρωπος ἄριστος ἐστίν, Rhod. c. 4. Lucil. lib. 5.
 Sat.

Elebite Cæpe simul, lachrymosque ordine calle
 Sic enim Festus vocat interiores Cæparum tuni-
 cas. Aui & Ataii, inquit Varro, nostri cum Allium
 & Cæpe verba eorum olerent, tamen optimè ani-
 mati erant. Tunicatum Cæpe Persius eleganter
 vocat Satyr. 4.

Tunicatum cum sale mordens Cæpe
 Lucil. lib. 5.

—lappus edendis
Acribus asidue suis Cæpis lacrimosis.
 In Priapeis

Acribusque Cæpis, Allinque sibratum.
 Existimat Tragus Cæpas Afcalonias Theo-
 phraiti esse Cæpas nostras magnas, Fissiles autem
 & steriles, paruas illas esse, quæ plantentur & se-
 men non profertant, coquilque in multo vsu sint.
 Gethiam tandem esse Cæpas longas, mulcibus
 cermanis dictas Varr, quia magis in herbam
 quàm bulbum excrescant. Sed mirum cur Tra-
 gus statim sequenti capite aliam tradat cepam
 sterilem siue hillelem.

Cordus vnam describit speciem nomine cape-
 ouatz, Cronnos ab Arist. dictam, quod oculo-
 rum tunicam pupillamque mordaci vapore lan-
 cinando, conuincere contrahique cogat, lacrymas
 eliciendo: vnde Latinis Cæpa lachrymosa. Cæpa
 verò à capitis magnitudine.

A Celsalp. cæpa colore rubro, aut candido, figu-
 ra alii scitili, atque oblonga describitur.

Mathiol. in Dioscor. cepam pingit, & aliquot
 species recenset.

Sunt & cepollæ ab Antiquis appellata, Cæpis
 quidem maiores, quas vulgus nostrum (inquit
 Carol. Steph.) appellat *des oignonnettes*: Quæ pau-
 lo sunt maiores ferè sine capite, ceruicis tantum
 longæ, & à Græcis tantum Gethy nomen acce-
 perant, puto à nostris appellatas *des Ciboules*:
 Marfca simplex quæ ab Hermolao describitur.
 Vniç, à rusticis appellata, eam puto quam nostri
 appellauerunt *Oignon*. Cæpa olim, inquit Turne-
 rus, Latinis dicebatur *onio*, quòd vnica planta
 ex vnica nascatur radice.

Dodon. Gall. & Lat. in fol. Figuram habet Lobbii & sub titulo *Cepa rotunda* describit.

Aduerf. Lob. & Penz tradunt aliquot species *Cepa*.

Nos vnica tantum proponimus iconem ex nostris imptitis, quae exprimit tantum *Cepam rotundam*, camq; fementem semenque proferentem maturum.

Sapius obseruauimus magnas, latas & sessiles: rubras, vt vocant, ac etiam albas: Ex cultura autem & soli ratione existimamus potissimum perdere, quod quaedam *Cepae* maneat paruae & rotundiores, quae frequentiores sunt, potissimum rubrae, albae etiam *Cepae* solent esse rariiores, quibus adhuc infrequentiores sunt longae albae in Alfaria a nobis visa: per longas siue sublongas *Cepas* non intelligimus eas, quas *Tragus* longas vocat *Cepas*, & *Theophrasti Gethyum*, nepe quas mulieres *Germ.* vocant *Warr*, id est stultas, quia magis in herbam quam bulbum exerceant, est enim pulchrum genus particulate oblongarum.

Cepa & *Cepe* in neutro genere Latinis & officinis, Graecis *κεφαλαία* dicitur, *κεφαλαία* teste Athenzo, quod odoris grauitate nictare nos faciat. Al. *Zwibel* & *Zibel*, nonnullique *Böllen* dicuntur, & *Zippelen*. B. *Yunin*. G. *Oignon*, *Siboula* Fuchf. R. *Cippolla*. Hisp. *Cebolla*, *Ceba* & *Ceboba*. Arab. *Basil* & *Bissal*. Angl. *Onyon*. Boh. *Cybulc*. Hung. *Hegyma*.

Cepas obseruauit *Pataui* in hortis magnas, *Watvilla* albas longas, vt & alias latas magnas rubras, quas & *Montbelgardi* ex *Nemauiano* semine habui. Caterum vbique in Italia, Gallia, Germania, Anglia, *Vasconia* prouenit, maximeque hortorum cultoribus. Terram autem desiderat solutam, pinguem, vehementer subactam, irriguam, stercoreatam. Scribit *Martio* aut *Aprili* in Italia, verum etiam *Ianuario*, ac *Februario*, *Palladio* autore, vel etiam *Novembri*, vt per *vnuersam* *Tulciam*, teste *Crescentio*, & fit super ipsarum *seminarium* velut *pergularium*, de aliquibus straminibus cooperitum.

Sola quidem in areis subinde feminatur, quandoque verò cum aliis herbis, veluti *Lactuca*. *Palladius* cum *Saturcia* feri probat, quonia melius vt *Plin.* ait proueniat. Plantatur. a. in areis per vni semilem, vel *Spithamam* ab inuicem separatae, & in area quatuor acies poni debent. Quas verò vis ante maturitatem comedere, plantabis in areis vbi sunt cucurbitae, cucumetes, citrulli vel melones. Et cum haec creuerint saepe colliguntur, vbi etiam si dimittantur, ad maturitatem proueniunt, licet non sint ita grosse, sicut haec, quae in areis solae plantantur.

Cum plantari debent rescinduntur radices vsque ad grossitudinem vnus, vel medii digiti iuxta *Cepam*, & per vnum digitum tantum sub terra merguntur. Haec enim planta facile adeo comprehendit, vt si solummodo ponatur, vel cadat super terram, vel ad partes longinquas portetur, etiam discooperta, in tertia quali arida, dum tamen optimè puluerizata, plantetur, summa facilitate, nascatur & augetur. Saepe circumfodi desiderant, & ab herbis quibuslibet liberari, quod si terra eodem anno stercoreata non fuerit, debet plantationis tempore stercoreari, vt optimè conualescat. Collectis autem *Cepis* maturis, quod patet cum se sustinere non possunt & amplius non augetur: meliores earum plantantur mense *Augusto*, vt anno sequenti semen faciant: deteriores verò plantantur vt in quadagesima viri-

des habeantur, mediores verò seruantur, quae si in augmento Lunae euulsa fuerint claro vel sicco tempore existente, melius seruantur in loco obscuro & sicco.

Floret *Iulio* potissimum mense, deinceps semen profert, quod non ante legendum, quam cum nigrum colorem praefert. Is enim color maturitatis est index. Earum feminae durant per annum tantum. Sed in matris suspensa per triennium seruantur illaesa. Bulbi verò Vere plantandi sunt, a quibus semen separatur, quod *Augusto* mense ad perfectionem venit. Nouella autem *Cepae* exactis mensibus colligi ac reponi postulant. Quod si diutius *Cepam* inueterari [inueterare *CH.*] libeat, aqua salta tepida capita intingenda (vnguenda *CH.*) sunt. Ita diuturniora fiunt, melioraque vsui, sed in statu sterilia. Alii contenti sunt (tumo. *Vet.*) primo super prunas suspensisse, abundeque ita profici arbitrantur ne germinet. Quod facere *Cepam* extra terram quoque certum est, & cauliculo acto euanescente. His aduerfantur *Nuces* leniuntque earum saporem.

Cepae (κεφαλαία) caput purgatum, ex qua tritum in linteam ligati, autore *Hipp.* subdito, si vterus pituita laboret. Quo in loco *κεφαλαία* rectè legit *Cornarius* vt vult *Foetus* *noctis* vitiosè *Aldina* exemplaria: *Caluus* istud omisit: *Valicana* impressio, *noctis* habet vitiosè quoque. Nobis autem placet legi *κεφαλαία*, licet praecedentibus lineis bis *Cyclamini* meminert. Pergit *Hipp.* m. m. Ad pueri aluum solvendam, si adultior fuerit, *Ceparum* interiores partes ex melle ritas indito. Ad quem locum pro

ta *κεφαλαία*, *noctis* cum *Corn* legit: *Foetus* idem apud *Tragum* *Cepam* oculis prodesse contra omnes *Medicos*. *Cepa* longa acrior est *Dioscoridi* quam rotunda: itein flaua quam candida, & sicca quam viridis, & cruda quam cocta, aut sale condita. Omnes tamen mordent, flatus gignunt, appetentiam inuitant, sitim mouent, ac extenuant, fastidium pariunt & expurgant, alio vitiles sunt: ex detractis purgantibus in oleum coniecta, haemorrhoidas reliquosque excretionum exitus referant, subdita pro balanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis & incipientibus suffusionibus auxiliatur, anginae eodem perunguntur, suppressos menses pellit, caput purgat naribus infulus: canis moribus cum aceto, ruta, & melle illinitur: cum aceto autem perunctas in sole vitiligines sanat & cum pari spodio, scabras lippitudines sedat: varos cum sale reprimit: contra calceamentorum, attritus cum gallinaceo adipe vitilis est: citae aluo prodest & in auribus sonitum ac grauitatem emendat: ad purulentas aures & eliciendam earundem aquam valer: alopecie earum succo petrificantur, qui celerius quam *halcyonium* pilos euocat: latiore cibo *Cepa* capitis dolores ciet, coctaque vehementius urinam pellit: eos lethargicos efficit, qui valetudinibus aduersis, ea etiam cocta, plus aequo vescantur: elixa & cum

vis passis & Ficu illita, tubercula concoquit, & celeritè rumpit. *Galenus* ex quarto censet esse ordine excalcamentum, etsi essentia eius potius crassarum sit partium: vnde etiam haemorrhoidas aperit, tum apposita, tum cum aceto inuncta, alphas abstergit, tum alopecis attrita pilos alcyonio citius restituit. Porro si succum eius exprimas, quod reliquum est, admodum terreae substantiae est, eiusque calide: at succus aqueae aëreaeque caliditatis. Hic igitur iis qui sus-

Semen quando gerendum. Duratio. Affermatio.

Vires & vsus. Viterum. Hippoc. illustratur.

Ad aluum solvendam. Hippoc. noctis. Vires ex Diosc.

Haemorrhoida. Oculorum morbis. Angina. Menses. Canum morsus. Vitiligines. Lippitudo. Calceamentorum attritus. Aurium dolor. Alopecia. Ceparum noxa.

Temperata. Galea. Haemorrhoida. Alphi. Alopecia.

fusi sunt, aut aciem oculorum obtusum præ crastu sine humorum obiectu, inunctus prodest: atque ex huius temperatura tota Cepa flatuosa est manducata.

Vlcera oris.

Olfactu ipso (inquit Plinius) & delachrymatione, caliginè medentur, magis verò facci inunctione: somnum etiam facere traduntur, & vlcera oris sanare, commanducata cum pane. Et canis morsus virides ex aceto illita, aut sicca cum melle & vino, ita vt post diem tertium soluantur. Sic & attrita sanant. Ita verus Codex, sed vulgari, tritæ falsò pro attrita habent. Coctam in cinere & epiphoris multi impofuerunt cum fatina hordeacea, & gonitallium vlcetibus. Succo & cicatrice oculorum, & albugines & argema in unxere: & serpentium morsus, & omnia iulcera (vulnera cũ) cum melle. Item auricularum cum lacte mulierum: & in isdem sonitum ac geuitatem emendantes, cum adipe asserino, aut cum melle stillare in stillare (Dal.) & ex aqua bibendum dedere repente obmutescitibus. In dolore quoque ad dentes collucidos instillare, & plagis bestiarum omnium, prius scorpionum Alopecias fricare & ploras tatis capis. Coctas dyfentericis vescendas dedere & contra lumborum dolores, purgamenta quoque earum cremata in cinerem illinentes ex aceto serpentium moribus, ipsaque multipede ex aceto. Reliqua inter medicos mira diuersitas. Proximi inatilia (iuniles Ver.) esse præcordis & conuulsioni, inflationeque & sicim facere dicunt. Atelepiadis schola, ad colorem quoque validum (viuidum, Ver. pallidum Aliud.) profici hoc cibo. Et si ieiunium quotidie edant, firmitatem valitudinis custodiri, stomacho vilia esse, spiritus agitatione, ventrem molire, hæmorrhoidas pellete subditas pro balanis: succum cum succo feniculi contra incipientes hydrotipes mirè proficere. Item contra anginas, cum Ruta & melle. Excitari eisdem lithargicos. Varto, quæ sale, & aceto pista est arefactaque vermiculis non infestari, auctor est.

Canis morsus.

Epiphora Vlcera genitalia, Oculi.

Aqua.

Dolor dentium.

Flora. Dyfenteria Lumborum auct.

Hydrops Angina.

Cancer.

Diosc. ex plura ur.

Aer infectus.

Deza.

Ceterum, ab omnibus in cibo abstinendum, maxime si cui biliosior sit natura: quum solis his qui pituitosum, aut crudum, & crallum ac viscosum humorem collegerunt, eiusmodi edulia conueniant. Porrò quod Diosc. dixit, *scilicet* *id est*, id est, Cepas appetentiam cibi excitare: & mox eadem *id est* esse, id est, nauseam parere: ita intelligendum est, vt prius de moderato, posterius de nimio ipsarum vlu accipiamus. Sunt autem duplices *scilicet*, alteri nauseabundi, alteri anxij, & nullam decubitus formam facile ferentes. admodum perniciosè affecti.

Cepa (inquit Porta) purpureo flore esu atrabilem auget, vmbellifera ad capillos facit testes, ostendunt ad Venetem valere, caule est cano, ad tracheam, & fluxus: sobolescit ad fecunditatem: tumida est, ad tumores: alba dulcis, rubra acris, calida, & humida. Sed hæc qui volet experiat.

Qui operas exercent, manè cepam crudam cum sale & pane theriacæ loco citare solent aduersus aërem infectum, persuadentes sibi, eo ditutos à pestifera luce fore, qui hoc remedio vli fuerint, nec illos spes fallit, liquidem experientia constat aduersus intemperiem aëris vt nihil vulgarij, ita neque efficacius quicquam hac theriacæ reperiti: at qui laboribus ac eiusmodi cibo minus aduerti fuerint, nihil illo iuuantur, sed la-

duntur potius, vt qui infansio, dolores capitis, caliginem oculorum, mentis alienationem, ac turbationem, nec non lethargicum morbum gignat. Cepæ continuè vsurpata in cibo alium emollunt, vrinam cient, pelluntque. Anicula nostræ crudam cepam conficiunt, ac in aqua fontanam iniiciunt, perque noctem in ea macerant, postea eam aquam pueris & infantibus potandam exhibent ad eiciendos ventris lumbricos, sanè haud infelicè successu. Continuo cepæ vlu genitale semen augetur, ad eam verò rem vltimè semen facit. Cepa magna excauata, theriacæ deinde repleta & tecta, ac postea in calidissimo cinere affata, demum detractis exterioribus tunicis fusa, ac cataplasmatibus ritu impofita, pestes ac venenosa vlcera reliquaque collectiones malas & duritias efficacissimè emollit ac aperit. Cepa vt vlt Holeris coquit, trahit, discutit, aperit. Querit Langius, propter quod adustiones calido sedantur & subsistant? & calidum impediatur vesicæ efferescere? Anne imbecille à robustiori contrumpitur & marcescit? Et verum id esse competi, inquit Langius cum loco adusto phlura cepæ sub cineribus coctæ tepide applicantur, aut succus cepæ expressus linteois exceptus adhibetur, impediri ne vesicæ efferescant. Ambrosius Paræus ad ambusta, modò ne epidemide pars sit spoliata vel vlcera, mirè commendat cepas crudas cortice liberatas, & cum momento salis subito applicatas, empyreuma enim extrahere, vesiculas prohibere. Hoc remedij genus contra calumnias fusè cum rationibus, tum experientia defendit lib. 12. cap. 17. sive Chirurgia, id quod etiam confirmat Fernelius methodi lib. 6. cap. 26. scribens: cepas cum sale contusas parti impofitas ambusta miraculo sanare. Scribit præterea Paræus se vidisse nobilem excipientem supra manus liquefcens inflammatum lardum illitis prius manibus caparum succo.

Io. de monte in exper. Sume, inquit, cepas quinque vel sex, confinde optime, coque in lartagine cum butyro addito sale, cum voles te in lectum componete, comede omnes calidas, manè eundem cibum assume, id fac per quatuor dies & noctes, in hydropo mira videbis.

Verum ad calculum remedium à Domino Caertifchin duce militari in Iula, communicatum Domino Lazaro à Schuendi: Ollam nouam accipe, reple capis rubris concisus, affunde aquam, coque super ollam sedens calidum vaporem recipe per horam manè & vesperi.

Marantha meminit nonnullos, Dioscoridem sæpius reprehendentes, quod cepam scripserit capitis dolorem inducere, quia hanc, quandoque conederint, & tamen caput non doluerit. Sed sciant Dioscoridem velle cepam hunc effectum edere, largius & frequentius cibo vsurpatam. Ad Alopeciam post foras inunctiones præscribit Fernelius vt manè & vesperi caput confricetur: capis contusis, dum profusus rubescat, & mox melle oblinatur vice cataplasmatibus.

Ad vermes puerorum trium annorum exhibet M. Rolandus in potu decoctionem caparum. Item alibi puero 8. annorum laboranti vermium, ventris tumore & dolore, febre & ictero.

Felice Platero scribente, tempore pestis ad præcautionem caparum succus variis modis exhibetur. Calor ignis in aspectum producit literas scriptas succo cepæ prius delitecentes.

Ad tollendos factores anhelitus, proueniens à cibis quibuldâ Thomas Morus cepas comendat:

scilicet

*Sebile ne terras Porrum tibi spiret odores,
Protinus à Porro fac mihi Cepe ovres.*

An porro Cæpæ flatus excitent, & an in febrili pe-
lentiali laudentur in cibis ad præservacionem,
legantur Io. Matthæi verba polita capite de Al-
lio.

Sed hic quæri solet, cur Cæpæ lachrymas cican-
ant? Respondet Cardanus de varietate rerum,
non ob actimonias, quia nec Allium, nec Piper,
cùm sint æriora. Oleum illitum cit lachrymas,
non nisi quia lentum sit, at Cæpa quia ætris, oculo-
los ferit: quia lenta, humorem educit. Quid igi-
tur lentor facit (nam hoc de Cæpis à Rhodigi-
no scribitur) vt lachrymas ciciat? Quia oculus
multos habet spiritus, vnde ex eo multa perpetuò
fit resolutio, quæ cùm impeditur, aut nimis
propter provenit, aut cogitur, lachryma prodit:
impeditur a lentis, cogitur à frigore, propter exit
vel ob gaudium, vel ob dolorem, vel ob æstum
cerebri: atque his omnibus causis oculi lachry-
mantur.

Cæpas tandem comedere inter dormiendum,
si Artemidoro credimus, non est bonum, mani-
bus verò has gestare non est malum. Ipsis tantum
ægris significant hæc radices duplicia: Si
quis enim ægrotus somniet, se multum Cæparum
absumere, grauitèrque decumbere, is saluus eua-
dit, à suoque morbo liberatur. Sin autem parùm
edat, mortem ipsi affore præfigit. Qui enim mori-
untur parum plorant. Mæsti verò non ita con-
festim doloris sui obliuiscuntur, ideoque ipsius se-
pius flere contingit, longiorèque tempore. Huius
autem rei ratio naturalis cùm nulla sit, eius
dignitatem inter Græculas vanitates merited re-
ponimus.

CEPA ASCALONICA, SIVE FISSILIS.



Plures si-
mul coniu-
ctos bulbos,
Porraceis me-
diocribus sup-
pares, oblon-
gos, fibrosos
habet, sapore
Cæpæ vulgaris:
filia exeunt fi-
stulosa, teretia,
glabra, eodem
sapore prædita.

Hanc Tra-
gus pingit &
describit, ni fal-
lor, dicens: Cæ-
pa in Alfatia,
Iuchel & Es-
Iuchel appel-
lata est ea, que
Apicio Cepilla

vocata fuit, Theophrast. verò sterilis vel fissilis.
Gesner. hort. *Cæpa sterilis, fissilis vel Ascalonia
quorundam.*

Elcalotas autem Gallicas, Antiquorum Asca-
lonitides siue Palestinas Cæpas arbitrantur Ad-
nerf. quas Francigenæ *Apperitz* vocitant. Bul-
bus fortè est Serapius, quem Theophrast. & Pli-
nius Cæpæ genus quoddam testantur. Lob. Obs.
scribit Cæpam Ascalonitidem vocari Angl. *Scap-
yon*. Icon. pl. Ascalonitides Antiquorum. Prom-
ptum est colligere ex Theoph. Turnero, quam il-
le vocat Cæpam fissilem, & Græci *Crommyon*

fchilton, eam esse quam Angli vocant *Boacte* /
Germ. *Sere* aut *Siere* / in Frisia *Sutley*, quod
idem ex Plinio confirmari potest lib. 19. cap. 6.
Nam Cæpæ eis *Boactes* appellata eius sunt na-
tura, vt si vna seorsim pangatur, breui ex eadem
radice multa propagentur, sine fatu: sique ex
racematis cohærentibus (ad rz.) radicibus vnâ
Autumno detractam depangas solam, ea sequen-
ti anno duodecim tibi pariet, si letum sit solum.
Quare cùm planta hæc hyemem in terra perfe-
rat, satius estet Angl. *winter onyon* cæpam hy-
bernam quam *Boacte* nominare. Distinguit etiâ
manifestè Plinius Ascaloniam & Fissilem. Ex cuius
verbis colligimus, vnum cæpam genus ra-
dice fecundum esse: sed cùm nec cæpa vulgaris,
nec Ascalonia, radicibus propagetur, neque alia
vlla species, præter *Boacte*, sequitur hanc esse
cæpam fissilem.

Cæpam fissilem siue Ascalonicam transtuli in
Hortum E. C. collectam Bedfordiæ in orto N.
viri pia memoriae Ioh. Vldarici à Stadione, & ex
Tremoyne, ex orto N. viri Michælis à Franck-
mont, quos andiu vocatè S. *Jacobs Zwieblin*.
Lugduni & Genevæ habui cæpas quas quidem
vocant *chiltes*, multa simul iunguntur parua:
longa, folia fistulosa vt in cæpis capitatis. Cæpæ
Ascalonitides Hyemem Cæpingæ in orto Ill. E.
C. perferebant.

Cæpa Asca-
lonica ubi
intra.

Cæpa hys
berna

Locus,

PORRVM. CAP. II.



ÆPIS

Porro pro-
pter affinita-
tem coniun-
gi desiderant:
adolefactus
enim adhuc
Porrum folijs
luxuriat se-
muncia cir-
citer latis, al-
ternatim po-
sitis, inferior
te superius
ecu vaginâ a-
liquouique
complecten-
te: adultis i-
dem positus,
sed longitu-
do cubitalis,
latitudo sex-
tantalis, for-
ma carinata,
color ferè
glancus, sa-
por Cæpæ-
us. Vbi cau-
lescit, scapum
digitalem &
crassiorè ad
tres quatu-
orue cubitos
surgit, soli-
dum, succu-
lentum, glo-
meratos in
pilam, quam
vtraque ma-
nu vix com-
plectaris, flo-

Descriptio

Folia.

Color.

Scapus.

Flora.

ex crassiore tritici farina decoquit, oleoque insu-
sculos sustinentem, suo vnumquemque pediculo
innixum, ex albedo purpurascetem, apicibus sa-
turiore tinctis purpura. Semen triangulum, atrum,
Cepæ: radix bulbosa, tunicis albis compactis,
fibrata, sapore mitiore, quam Cepæ.

Semen.
Radix.
Icones.
An Scorodoprassum
Diosc. Tra-
p.

Porri icones duæ sunt ex nostris emptitiis. Hu-
ius iconem ponit Tragus, ni plurimum fallimur
lib. 2. cap. 68. pro Scorodoprasso Dioscoridis. Des-
criptionem autem ponit cap. 10. Notandum tam-
en prope radicem siue Bulbum Scorodoprassi
Tragi, appictos nucleos, qui sūt allii. Scimus aliud
sentire Gescnerum, & ad aliam plantam referre:
nec tamen propterea dimouemur à nostra opi-
nionem, quia Tragus nullibi meminit porri: des-
criptio etiam Tragi optimè respondet nostro
Porro, iug est cap. 7. vbi hæc in verba prorumpit:
Mediomatrices muliercule in hortis Allii genus
quoddam plantare confueuerunt, quod radice, toliis,
& caule per omnia vulgare Allium æmulatur, nisi
quod radix huius nequaquam ut illius in duplici
nucleo coaguetatur. Quamquam autem lachrymas ce-
liciat, non tamen tam feruens & acris est saporis
atque Allium, quin potius ad Cepam, quod ad
odorem attinet, accedente videtur. Quod vero faci-
lius à vulgari Allio Scorodoprassum distinet
queat, notandum est hoc latiora tolia, & grandio-
res caules fundere, deinde quotannis nigro præ-
gnate semine, quod in cacumine fistuloso caulis
profert, non aliter atque Cepa. Radix, nec non
herba huius plantæ Allio respondent, sed odor ac
semen Cepam representant, quare illi natura
inest promiscua, Allii inquam & Cepæ, quo no-
mine à Dioscoride *καριδὸς πορροῦ*, hoc est, Allio por-
rum [si ita liceat dicere] vocauit, Germani *Aber-
fnohlauch* dicunt: possent & *Groslauch* hoc est,
Porrum graude, dici. Ego sanè hoc Allii genus
id esse existimo, quod Veteres *Vilicium*, *Gallicum*,
Cyprium, *Biticum*, *Antiscorodon*, *Aphroscorodon*, & *Pu-
nicum* vocauerunt.

Natura.
Allio porri.
Allium Vil-
icium, Gal-
licum, Cy-
prium, Bi-
ticum, An-
tiscorodon,
Aphroscoro-
don, & Pu-
nicum.

Porri gene-
ra tria.
Porrum.
Capitum.
Sectium.
Amphelo-
prassum.

Diosc. duorum generum meminit, duobus diuer-
sis cap. Plinius tria facit, Theophr. vnius memi-
nit, quod nec *καριδὸς πορροῦ* sit, nec *καριδὸς πορροῦ*. Qua-
re apud Theophr tria quoque sunt genera. 1. *πορροῦ
καριδὸς πορροῦ*, Lat. Porram capitatum. Angl. *Leefe*
simpliciter. Germ. *lauch*, de quo in præsentia. 2.
Porrum sectium. Græc. *καριδὸς πορροῦ*, ut qui-
dam volunt, Angl. *freuch lefe*, quod genus non
nisi in Anglia vidit Turn. de quo mox. 3. *καριδὸς
πορροῦ*, Porrum vineale Germ. *Wildlauch*. Vnde
Anglicè dicere possent *Wild lefe*. Cuiusmodi nun-
quam vidit Turn. copiosius & pulchrius quàm ci-
ca Wormaciam. Quod frequenter rescatur &
attondetur, Porrum sectium siue sectile Colum-
nellæ ac Palladio nominatur. Sed quod non res-
secatur Porrum capitatum est: Græcis *πορροῦ κα-
ριδὸς πορροῦ*. Istud autem Diphilus apud Athenæum
vocari ait *καριδὸς πορροῦ*: à nonnullis verò & *καριδὸς πορροῦ* di-
ci. Gethyum autem Plinius Cepæ speciem facit,
& Theophr. frequenter veluti Porri attonderi tra-
dit. De Porro capitato ita cecinit Martial. Poëta:

Gethyllis
Diphilo.

Mixta præcipuos nemoralis Aricia Porros:
In mæno virides spirite cernit comas.

Porri gene-
ra Corn.

Porri duo genera sunt hodie omnibus vbique
ferè cognita: Sectium vnum, & alterum capita-
tum: Vocat autem capitatum quod in caput in-
crescat Cornarius.

Matth. pingit, ac dicit Porros Hortorum cul-
tores nescire capitatos efficere Capatum instar,
quamuis ii apud Veteres in frequentissimo vsu
fuerint, quod longis qui propriè sectiui appellan-
tur, sapiiores sunt: De his autem tanquam præ-

stantionibus scripsisse Diosc. non tamen quiddam
sectiui genere differant, quibus mangonio capita-
ti sunt: ac Porrum Capitatum & Sectium
genere non differre, sed mangonio: capitatum
autem è Sectiuo, siue longo, fieri, subfracta tegula
in transplantatione, relectis prius foliis, annotat.
Eum autem mirari lubet, cur mangonium adscri-
bat, siquidem hortorum cultores, ut ipse fatetur,
capitatos efficere nesciant: frustra docer, quod
fieri nequit. Quid si Matth. sibi conficias dili-
gentioribus se nature indagatoribus inuidiosè
negauit?

Πορροῦ & *καριδὸς πορροῦ*, Porrum, & Porrum capi-
tum & Palladio masculino genere, Porrus dicitur,
Arab. *Kurat*, seu *Kurat*, Germ. *lauch*, Belg. *parayel*
loody, Gall. *Peurieu* vel *porrot*, Ital. *Porro capitato*,
Prass, Hisp. *Puerto*, Angl. *leefe*, Boh. *Por*, &
Woselegch, Hung. *par Ragyma*.

Montisli maxima habent, ut & Patauii, Por-
ra: Genueæ & alibi copiosè ferunt, ad hybernium
vsu: Montisbergardi, vbi frequens eius vsus se-
runt, transplantant, & reponunt hyeme eden-
dum. Floret & Iulio. De cætero, Porri sustinent
ferè omnem ætatem, & terram desiderant mediocri-
ter solutam, ut optimè proficiant, & pinguem,
& stercoreatam. Seruntur autem in locis calidis &
temperatis in mensè Decembri & Ianuario: Fe-
bruario & Martio in temperatis & frigidis
cum terra fuerit ad æqualitatem redacta. Hæc
autem satis fit ante solam, aut in aliis herbis
mixtum, in terra optimè culta & desuper laticu-
mine cooperta. Hæc semina sunt spissa spargendo,
deinde euelluntur Porri grassiores, primò nec
aufertur aliquid de ipsarum radicibus, cum sulcis
plantantur, sed quando cum palis debent planta-
ri, absciuntur radices & summitas foliorum,
& plantantur mensè Aprilis & Maio per totum
mensè Iunii, sed plantari possunt mensè
Iulio, Augusto, Septembri & Octobri, & erunt
vtilis in sequenti mensè Martio, & Aprilis. Nec
in plantatione Porrorum quærenda est mollis
terra, sed mediocris est optima, & satis bona
est illa que fuerit, ferè sicca. Fit autem
duobus modis Porrorum plantatio, vno modo
subtilis, ut Bononiæ moris est, ut scilicet per vna-
nam completam spithamam vnus sulcus ab altero
distet, & sint ab inuicem in sulco iacentes posi-
ti quaterim separati digitis, & cum sequentis sulci
terra trahitur super Porros & pedibus molli-
ter conculcatur. Secundo autem modo palo
plantantur, scilicet ut optimè pastinatis & dispo-
sitis arcibus fiant foramina cum palo grosso, ferè ut
lancea, & concaua per vnam spithamam, & ultra
vno semisse distantia, in quibus ponuntur præpa-
rata porrocellæ, foramina verò replentur, aut quic-
quid terræ in eis ponitur, sed clavis tribus septi-
manis cum herba in eis nascitur sarculantur, &
herbis mundantur. Porri autem sic plantati sunt
meliores aliis, nec possunt faciliè sursum euelli, sed
hic modus magis laboriosus existit. Item hoc mo-
do plantantur optimè inter Cepas iam quasi gros-
sas, & euellis Cypis sarculantur & inueniuntur
optimè prouenire: cum euellentur, aliqui in vno
loco relinquuntur, ut pro seminibus reseruentur.
Cuius quidem semina possunt per triennium il-
lela suspensa seruari.

Hipocratis loci multi sunt, in quibus Porri v-
sum præscribit, quorum aliquos hic adscribere
superuacuum non est. Is igitur in m. Si lac de-
ficiat Porra trita & aqua macerata potui exhibet.
Item si ex partu vteri inflammationem con-
ceperint, umbilici Veneris folia & Porra [7. dea]

Vir-
sus.
Vre-
Diss-
auti.
Hipp-
Ass-
sem-
Vir-
sus.
Vre-
Diss-
auti.
Hipp-
Rex

per usum exhibet. Ego nolim prescribere Porrum in praedicto affectu, nec etiam ad fluentem sanguinem, siue ex vtero, siue ex naribus. Idem si purgatione opus habere videatur, Porrum (quodammodo) incoquere iubet, quo in loco Fossius notat in sine lib. 2. *de purgatione*. Porri succum addi. Adhuc si vteros expurgare animus est: Porri & Cardamomi semen conterit ex vino & lacte cocto maceratum, ac ino ventri illinit. Linimentum componit aliud ex Laseis drachmae vnius quantitate & succi Porri. At si purpercia in grumos concreuerit, & dolor in infimo ventre oboriarur, Porra certa exhibet. In potione ad fluxum muliebrem Porri [*apud Galienum Caluus*] succum ex vino albo aqua temperato, propinat. Quod etiam fluentem ex naribus sanguinem sedare dicit: quod si adhuc fluxus feratur ex vino Porri succum exhibet. Si vterus vsque ad vesicam doleat, fenem ex aqua tritura bibendam praecipit.

Porrum capitato, inquit Dioscoridus, flatuosum est, & mali succi, graui somnia facit, vrinam ciet, alio commodum est, attenuat, visus hebetudine inducit, menses detrahit, vesicam viceratam & renes laedit. Coctum autem cum pitana, & in cibo acceptum, quae in thorace haerent, educit. At coma ipsius in aqua marina & aceto coctus, ad infessus commoda est, in vteri conclusione & duritia. Edulcarat, & magis flatus exors euadit, duabus in aqua cocturis, & in frigida aqua maceratum. Semen [*de purgatione*] eius actus est, & vim quandam adstringentem habet. Vnde succus ipsius sanguinem iulit cum aceto, & maxime cum qui è naribus ferat, manna aut thure addito, [*de purgatione*] eis sc. qui frigide iunt natura, Cresc.] Veneris ita stimulat, & ad omnia in thorace vitia cum melle pro eleganter vsurpatur. Facit & ad tabe in cibo acceptu. Sed & arteriam purgat. Verum si assidue edatur, visum obscurat, & stomacho incommodum est. Succus cum melle potus, aduersus venenatarum bestiarum morsus opitulatur. Sed & ipsum Porrum impositum prodest. Auxiliatur etiam aurium dolori & sonitu, succus cum aceto & thure & lacte aut rosaceo instillatur. Tollit varos folia cum rhoë obolionum imposita, & epinictidas sanat, crullatque cum sale imposita emarginant. Ceterum feminis drachmae duae, cum aequali baccarum myrti pondere potae, veteres sanguinis è thorace eductiones cohibent.

Meminit Maranth. nonnullos Dioscoridem sepius reprehendere quod Porri semen in cibis visus obscuritatem inducere scripserit, quia hoc quandoque comederint, & tamen visus hebes factus non sit. Sed non animaduertent boni viri Dioscoridum hunc effectum produci largiori & frequenti cibo estatum.

Plinio autore, Porro capitato maior est ad eadem effectus quam sectiuo: Sanguinem autem reicientibus succus eius particulatim cum galla, aut thuris farina, vel acacia datur. Hippocrates & sine alia mixtura dari iubet, vluatque coctas aperiri putat: fecunditatem etiam feminarum hoc cibo augeri. Contritum ex melle vlcera purgat. Tussim & destillationes thoracis, pulmonis & arteriae vitia sanat, datum in sorbitione pitana, vel erudum praeter capita, sine pane, ita vltimis diebus sumatur, vel si purulenta excreuerit. Sic & voci, vel Veneris, somnoque mltum confert. Capita bis aqua mutata cocta, alium sistant, & inflationes veteres. Haec Plinius in veteri codice legit, & ita vulgaris Macri libellus citat. Vulgata tamen Plinii exemplaria caule pro galla falso habent;

Galienus de aliment. ubi de cepis, allio, ac Porro agit, harum plantarum radices, inquit, edunt sepe homines, sed caulem raro, itemque folia, quae multum acrem vim similem habent. Calefaciunt autem corpus, & crassos in ipso humores attenuant, & viscosos secant. Bis tamen aut ter cocta, acrimoniam deponunt, attenuant tamen adhuc, & paucillimum alimentum corpori praebent. Sed ad pleniorum Porri doctrinam scire conuenit, quod Porrus calidus & siccus est in tertio gradu, secundum cibum illaudabilis est, nocet enim stomacho, faciens inflationem ac ventositatem, & cum sui acumine nervos eius r. ordet, habet etiam proprietatem faciendi fumum nigrum melancholiae generatiuum, qui ad caput saliens visui tenebrositatem facit, atque somnia terribilia & formidolosa inducit, vnde caueant ab ipso cholericis, maniacis, & oppilationem in capite habentes. Sed diligentes eos comedere accipiant post eos lactucas, & Portulacas, Endiuas, & similia, vt eorum calor temperetur ab istis, aut elixentur, deinde bis aut ter lauentur, & eius postea dentur.

Bapt. Codronchius de virtus vocis ex auctoritate Arist. lib. 11. prob. 39. maxime laudat vna cum Plinio & Dioscor. Porrum, eo quod voci splendorem adferat & arteriam purget, vitari tamen debet assiduus vel multus illius vsus, qui visus obscuritatem efficit, stomacho aduersatur, multaque alia incommoda facit, ea propter nisi robustis admodum, decoctumque cum melle vel in pitana, erit exhibendum.

Apoll. tribuit ei temperamentum frigidum ac venenatam naturam, ac dicit à nemine edendum, nihilominus tamen commendat in febrilibus. Sed vtrumque praeter omnem rationem. Nonnulli accipiunt (vt Holeriana schola probat) Porros nouem aut decem recentes, medios transfigunt filo, folia extrema amputant, vt odorem inspirerent, circūdant collo obuensis foliis naribus, & deorsum versis capitibus. Malim vti qualitate manifesta operantibus, quam hoc in quo qualitates repugnant, in Porro enim infignis caliditas & acrimonia extenuans, sine vlla astringitione: odor etiam caput grauens, videntur porrus ad mouendum sanguinem, quam ad reprimendum facere.

Tradit Alb. Magnus dici in libris Hermetis, quando proiciatur semen Porri super Acetum, reddere accositatem eius. Crescentius contra vt acetum mutetur in vinum in cum semen Porri committit.

Diligenter notandum est Ambrosii Paracum vti canticulo Porri inuncto oleo ad derubandam spinam aut ossiculum haerens in faucibus, vt videre est lib. 17. de operat. chirurg. c. 24.

Remedium optimum ad lumbricos, credit Timot. Ross. Si folia Porri applicentur regioni vetriculi, arger interea sedeat in lacte tepido vel aqua mellita.

PORRVM SECTIVVM ET SCHOENO- prafon quibusdam.

CONFERTIM in fasciculos plures nascuntur huius plantulae, implexu mutuo cohaerentibus bulbis albis, odoris Capacei, quo etiam praedita sunt iuncea folia fistulosa, Cepae adolescentis: sesquipalmum aut dodrantem etiam alta, flores ex vtriculo albedo umbellatim produunt, quorum singuli, foliis constant sensu acuminatis,

Temper.
Calidus.

Acetum
Stomacho
nocet
Nervis im-
micit.
Vnum ha-
betur
Quibus ca-
nendum
Porrus
Corrigen-
tia.

Acetum im-
mutat

Apoll. r. a.
prebendit
imr.

Explicuit
quarunda
opinio.

Acetum r. a.
suisit.


Spinas

Lumbricis

Descriptio

Oder.
Folia

Flora



Nomina
& Synon.
Cepa minima
L.

tempus.

Porrum se-
ctile.
Curat se-
ra, L.

Se. Porrum
sectile.

Gethyll.
Cepa
Gethyon.

Ascalonit
Palaestina.

Sucus.

colore dilute purpureo, litra saturatio- re medium foli- um percur- rente; itamina albida apici- bus flori con- coloribus.

Porrum se- ctium Tragi, minimu n est Cepae genus. Quod vero il- li in magitu- dine decit, hoc numero refar- cit. Siquidem vna planta du- centis non- nunquam co- pacis Cepu- lis constat, ita tamen vt à se mutuo diuelli, & sin- gula par- gant plures coniunctim plantari pos- sint, & fertilio- rum quidem succellat: plures namque co- iuncta, terra- que interta, hyemis frigora fa- cile ferunt. Ear apperente Februatio torunda, fistulosa, & vitida proferunt foliola, minimis lincis similia, eademque copiosa & frequentia, quae Maio mense adu- cant, capitularis, & pur- pureis floribus instat Cepae satuae in cacumine emicant. Sunt qui *Porrum sectile* esse existimant, quorum iudicio ipse subscribit. Serapio Porrum curat, vocat, Hebraei quidam *Kerefin* appellare videntur. Porrum sectium, Graecis *μεγαλον κερειον* nostris [inquit Cornarius] *Schnitlauch* & *Bisflauch* appellatur, eo quod coma frondens adhuc ad terram vsque refecari solet, & in ciba- ria ac obsonia addi. Nouit & hoc Martialis Poeta qui de eo sic ait in Aeneis:

Fila Tarentina grauior redolentia Porri
Edisti quoties, fistula clausa dabo.

Schanoprasium Dodonaei gall. delinitur no- mine Graeco & Latino. Porrum sectium (quod à Dodonaeo Schanoprasium ficto nomine, & in- ferioribus Germanicis *Biesloef*, aliis *Brislauch* vocatur) Gesner. horti Gethyllidem appellauit, quam Nicandri scholiastes Ceparum genus esse dicit. Carolus Steph. Ruellium securus Gethyon Theophrasti interpretatur Porretam vul- go à Gallis dictam & Ciuetam, qua Portaginem & Capulam hoc est Porrum sectium à Germa- nis vulgo dictum designant, idque in agro: Idem in horto: Bulbi genus, inquit, vulgus nostrum v- cat *des Porrettes*, vel *Oygonettes*.

Auerf. Schoenoprasium, Germ. *binzenlauch* nominant, non *Brislauch*: quam perperam Com- mentatur Theophr. Ascalonitidem siue Palesti- nam dicit.

Lobel. Obs. & Icon. pl. Schanoprasion, Asca- lonica Matthioli.

Lonic. *Porrum sectium*, Porrum Tarentinum.

Pars maxima Herbariorum Germaniae, docet nostrum Cyne (Turneri verba sunt) seu Germa- norum *Schnitlauch* esse Porrum Sectium, lon- ge tamen falluntur: siquidem illorum *Schnitlauch* Gethium est, inter Cepas à Plinio recens- situm, non igitur Porri genus est. Vt enim om- nia Ceparum genera fistulosa habent folia: ita Porri genera folio sunt plano carinato.

Porrum sectium non nisi vbique obuium.

Porrum Sectium, ait Plinius lib. 20. c. 6. pro-

flum sanguinis sistit in naribus, *conscito co- toratis*, vel galla misto, aut menta: Item ex a- bortu profluua, poro succo cum lacte mulierum. Tussi etiam veteri ac pectoris & pulmonis vitis medetur. Illitis foliis sanantur & ambusta, & epi- nyctides: ita vocatur hulus, hulus aciem habe- tans & in ang. Allii. Certè in M. haec verba, quae & lyce, defunt.] quae & lyce, in angulo oculi, per- petuo humore manans. Quidam eo nomine ap- pellant pustulas liuentes ac nocibus inquietan- tes. Et alia hulcera cum melle trito. Vel bestia- rum morsus ex aceto: item serpentium. Aurium verò vitia cum felle caprino, vel pari mensura mulsi: stridores cum lacte mulieris, capitis dolo- res si in mare fundatur: dormiturus in aurem duobus fucci cohlearibus, vno mellis. Succus & ad serpentium scorpionumque ictus (potus. CH.) bibitur cum mero, & ad lumborum dolores cum vini hemina potus. Sanguinem verò excreanti- bus & phthisicis, distillationibus logis, vel succus, vel ex ipso cibus prodest. Item morbo regio, vel hydropicis. Et ad renum dolores, cum pitanae succo acetabuli mensura, idem modus cum melle vuluas purgat. Estur verò & contra fungorum ve- nena: imponitur & vulneribus. Venerem stimu- lat: sitim sedat, ebrietates discutit. Sed oculorum aciem hebetare traditur: inflationem quoque fa- cere, quae tamen stomacho non nocet, ventrem- que [mollire *curat*. Diosc.] mollire: Vocis splen- dorem affert. Eius frequens vsus est verno tem- pore in cibus, vt acetariis & iusculis, eo modo quo iuniores Cepas: hinc Tragus ait, in nostris regionibus, id est, Germania, Porri sectium verno tempore dū alia Culinariae herbae adolefcent, ad placetas quas *Pfannenfuchen* appellat, vruntur. Gultu Capa refert, sed remissiore sapore praeditū, Nos tanē tum propter saporem tū propter formā foliorū fistulorum, potius ad Cepae genus refe- rendum censemus. *Tragus* 743. Porrum sectile ad intinctus, qui cibus adiunguntur, admodum vtile est, si cum aceto folia eius tusa temperentur. Et Capas, porra, & alia pauperum esse fercula, ac se mutuo consequi, trito fertur diuerbio. Assiduis eius & nimis usus capitis dolores excitat, sto- macho, renibus, & vesicae non satis conuenit. Porrum sectile alium emollit, exulcerationibus pul- monis cum melle prodest, vitia thoracis educit, semenque genitale calescit, & auget. Hinc Ba- ptiista Fiera ita cecinit.

Tabida cui cura pulmonis membra & anhelum
Pectus, cum Porri torrida coena vocat.
Cura mihi est stomachus, placidissima somnia,
dentes,

Sis licet elixum non tamen illud edam. &c.

Porrum Sectile ad omnis generis ulcera & apo- stemata adhiberi potest sicut Cepa.

ALLIUM VVLGARE ET SATIYVM.

CAP. III.

EX Cepaceorum delineatione nonnullas Allii notas rectè mutuabimur; *scapus* ergo procerus, enodis, concauis, glemaratim congestis in magna capita flores sustinet Cepaceos, rupto folliculo apparentes, post modum & nucleos paruos quibus pollet propagari. Vtrum *folia*, non ut Cepis fistulosa, sed grammica: bulbis denique non simplex, sed numerosis nucleis sub vna comuni tandem membrana collectis constat, sapore peracri, vnde fibrae candidae dependunt.

De Aliis ,
quæ Cepæci
etiam generis
sunt, Theophr.
lib. 7. hæc tra-
didit : Diferūt
Allia quod al-
terum sit sero-
tinum, alterum
præcox : est en-
nim genus
quoddâ , quod
sexaginta die-
bus perficitur.
Differunt &
magnitudine
& paruitate.

Magnitudi-
nem quod Cy-
prium voca-
tur , quod non
decoquunt, sed
ad intrita, quæ
Myrtora appel-
lantur, vtutur,
& cum teritur
in molem ad-
mirandam fla-
tu intumescit.
Præterea quæ-
dam ex spicis
non coagmen-
tantur. Dulce-
dinis autem, o-
doris, & crassi-
tudinis Allio-
rum, quemad-
modum & cæ-
terorum fato-
rum, causa sit
natura loci &
cultus.

Ex quibus
hæc sumpsit
Plinius lib. 19
cap. 6. Allium
ad multa, ruris
præcipuè , me-
dicamēta pro-
desse creditur.
Tenuissimum &
quæ separan-
tur in vnter-
sum velatur
membris, mox
pluribus
coagmentatur
nucleis, & his
separatim ve-
stis. Asperi
saporis, & quò
plures nucle-
i fuerit, hoc
est asperius.

Tedium huic
quoque halitu, vt
Cepis, nullum
tamen coctis.
Generum differen-
tia in tempore.
Præcox matu-
refcit 60. diebus,
tum magnitudine.
Et mox. Vlpicum
quoque in hoc
genere Græci
appellauere
Allium Cyprium,
alii Ophioscorodon,
præcipuè

Africæ celebratum inter pulmentaria ruris, grâ-
dius alio. Tritum in oleo & aceto, mirum quan-
tum increfcit spuma. Ex his itaque intelligi-
mus, quod Theophr. Cyprium appellari ait Al-
lium magnum, quod Latini Vlpicum dixerunt,
& Dioscor. Ophioscorodon. Deinde quædam
Allii genera nucleos non habere negat, quod so-
lum genus Diosc. in Aegypto nasci dixit.

Duo itaque sunt Allii genera, fatium & syl-
uestre. Hoc Colum. lib. 11. cap. 3. ἀφροσκορον vo-
cat, fortassis à spuua, quâ increfcit, vt Plinius ait,
aut, vt Theophrast. ἐμπυματόν ται. Idem Columella
non Cyprium, sed Punicum Allium appellat, vt
ἐμπυματόν appellatio facta videri possit. Verba
eius hæc sunt. Vlpicum quod quidam Allium
Punicum vocant, Græci autem ἀφροσκορον ap-
pellant, longè maioris est incrementi, quàm Al-
lium.

Galenus Allium quarto abscessu siccare & câ-
lescere dicit. Ophioscorodon autem syluestre
Allium fatium validius esse, quemadmodum e-
riam alia syluestria. In Plinio tamen loco supra
citato, vulgari codices antiscorodon habent, pro
Ophioscorodon: & Dioscor. etiam Elaphoscoro-
don vocari ait: vt variae appellationes vnius rei,
pro occasione factæ videantur.

Ceterum nunc autore Dioscoride Allium
partim fatium est & hortense, & hoc in Aegy-
pto vnius capitæ est, quemadmodum Porrum,
dulce, ad purpureum colorem vergens, paruum:
reliquum verò magnum est, matorum capitum,
album. Vocant autem acinos in ipso, aglithas,
id est, nucleos Est & aliud syluestre Ophioscoro-
don vocatum, id est, Allium anguinum siue Vi-
perinum, & Elaphoscorodon.

Cordus in hist. dicit duo genera Allii, vnum
vocat Allium fatium multifidum: alterum, Al-
lium alterum fatium amphicarpon, & postea
cap. 78. tradit Allium simplex, indiuiduum v-
trumque.

Allium etiam si vulgò omnibus notum sit,
tamen affabrè, Cornar. teite, depingitur à Plinio
lib. 19. c. 6.

Quas πάρας & ἀγλιδας Dioscor. dixit, Theo-
phrast. ἄγλιδας appellauit, Plinius nucleos, Colum-
ella spicas. Græci item ὄνυχας & οκτάδενδρας ap-
pellant. Allium quod Græci Scorodou, vulgus
nostrum [ait C. Steph.] des aulx. Ceterum caput
Allii Antiqui (inquit Galenus) ὀκτάδενδρα nomina-
bant vulgus nostrum teste d'aulx. Allii autem co-
mas cum capite solo Molyzam appellat.

Camer. apud Marthiolum de Allio scribit, sed
in eadem tabella ponit figuram Allii & Ophio-
scorodi. Debuisset itaque Camerarius indicaf-
se, quam figuram pro Allio posuerit.

Quod σκοροδοί Græci, Latini passim Allium hor-
tense, domesticum siue satium vocant, Arabes
Chaum, Chairin & Thum. Germ. Knoblauch vel
Knobloch, Belg. Loof. Galli ail & aulx, It. A-
glis & Aio, Hsp. 4901, Angl. Garlyfe/ Boh. Wez
sueg, Hung. Fok Hagyma.

Allium obseruatur vbique Gentium ferè: Leg-
duni verò maximum folio simili omninò Porro,
vt vix odore discerni possit. Allium non facile
seritur, Nam si ex femine hoc plantare necesse
esset, non solùm tardiùs, sed etiam admodum exi-
guum proueniret, ita quidem (Theophrast. teste)
tertio demùm anno perfectum redderetur. Asser-
rit autem Didymus, si Luna sub terris posita fe-
ratur, & rursus altero à satu mense, antequam
nouis nucleis conglomeretur bulbus, sub terris
luna larènte vellatur, odoris fœditate carere &
A a a



Aphrosco-
radon

Ophiosco-
don

Aegyptium

Aglita.
Ophioscoro-
don.
Elaphosco-
radon.

Synonyma

Locus, tem-
pus, sicut,
Inferio.
Magonia,
delectum,
repositio,
adseruatio

dulcescere, vbi verò ad iustam maturitatem peruenierit, & perfectionem adeptum fuerit, ac quò plures in eo spicas coalescant, hoc asperius & acrius sentiri. Sed vt historiam Allii abfoluamus, cum iam maturitatem suam consecutum est, id quod plerumque circa Festum D. Iacobi fieri consuevit, Allium euellit, ac vnà cum Cepicia sua fronde in locis fumo peruiis suspensum, ad insectem vsque annum conseruatur. Satiuum igitur Allium primo Vere, quo ciconia ad nos redire solent, in terram mediocriter cultam, aut naturà suà aliquin bonam, nec nimis fortem, aut lentam deponitur. Fiunt autem tum nucleorum eius aut spicarum diuortia, singulæque tum spicæ liratum depanguntur, interuacante digito longa mensura. Hæ verò spicæ intra paucos dies erumpunt. Cæterum, optimè plantatur in terra maximè alba, foissata & subacta, sine stercore, licet in alia terra etiam stercoreata proueniat. Sarculanda sunt frequenter, (vt Crescent. inquit, vt melius eorum capita crescant, si bene capitata facere volueris, vbi cæperint eorum stipites prodire, proculca, ita quòd succus reuertatur ad ea. Colliguntur cum eorum stipites se amplius sustinere non possunt, in lunæ defectu & claro aere. In paleis condita, vel fimo suspensa durabunt.

Ad faciei maculas, ephelidas dictas, Allii cortex, inquit Hisp. in uterum subditur, & post die (postero die) spectatur, num odor ad os proueniat, quod si sic, concipiet; sin minus, minimè. Idem ait m. m. Cum mulier peperit, neque secundus est liberata, ea dare præstitit ex quibus puerperii purgamenta potillimum expurgantur, Allia cocta aut assa ex vino & oleo, cum paruis polypis & Cepioliis. In vapore & fotu uterino, in ollam Allia sicca iniicienda, eaque minutim magis fracta, quàm quæ contusa sunt, & aqua quæ tribus digitis excedat vt macerentur affundenda, vitulique matini adeps infundendus: &c. In coena autem & in cibo, concedenda. Si uteri ad coxendicem decurrant, menses cum crassi sint, non cant, dolor ad inum ventrem permeet, & ad lateris inanitatem, morsumque percipiat: cum sic habuerit, copiosa & calida lauanda, eique Allia plurima, comedenda, danda. Scabies extenuatur, trito Allio defricto, eodemque remedio, autore Columella, curatur rabiosi canis morsus.

*Ophio-
cora-
don.
Elapho-
scorodon.*

Vim acrem obtinet Allium vt contendit Dioscor. ex calcificat, mordet, flatus pellit, aluum turbat, stomachum exiccat, sitim gignit, inflationemque facit, summam corporis cutem exulcerat, & oculorum aciem effeberat. Eadem præstat estatum Ophioscorodon, quod & Elaphoscorodon, quasi Ceruinum Allium, nuncupatur. Sed & latas quoque tineas, in cibo pellit Allium, vti nasque detrahit: morsus à vipera & hamorrhoo maximè, si quid aliud, confert, dummodo continud post vinum superbibatur, aut ipsum è vino reratur ac in portione sumatur. Quin & eodem vsus, & contra canis rabiosi morsus vtiliter imponitur. In cibo verò sumptum contra mutationes aquarum proficit, [fauces expediendo, easdemque asperas leniendo] voci splendorem affert, veterem tussim crudum coctum in cibo lenit. Potum autem cum origani decocto, pediculos ac lendes enecat. Combustum ac melle subactum illitumque, oculorum sugillationibus medetur, & Alopecis cum nardino unguento. Cum sale verò & oleo sanat papularum eruptiones. Vitiliginem quoque, lichenas, lentiginis, ulcera capitis manantia, furfures ac

lepras cum melle eximit. At cum thure & tada decoctum ac in ore detentum, dentium dolorem imminuit. Cum siculneis foliis & cumino, contra muris aranei morsus imponitur. Comè decoctum foeminarum decessionibus additum menses secundasque partus extrahit. In eundè quoque vsum suffumigatur. Cæterum factum ex eo & oliua nigra intritum, quod mitroton vocant, esu vrinà cit, oravenarum patrefacit, ac hydropicis quoque est vtile.

Cæterum, vires Allii largius aliquatò, Plinius exponit quàm Dioscorides, dum inquit, Allio magne vtilitates contra aquarum & locorum mutationes. Serpentes abigit & Scorpiones odore: atque vt aliqui tradidere ex bestiarum omnium ictibus medetur potu, vel cibo, uel illitu: priuatim: cõtra hæmorroidas prodest, cum vino redditum vomitu. Ac ne contra areneorum murium venenatum morsum valere miremur, Aconitum, quod alio nomine pardalianches uocatur, debellat: Item Hyoscyamum; canum morsus, [inquit M.] in quæ vulnera cum melle imponitur. Ad serpentium quidem ictus potum cum (radicalis bulbo subanthesis. Alii vestibus, id est membranis corticibus] restibus suis efficacissimè ex oleo illinitur: attritumque corporum partibus [vel si vesica intumuerit M.] vel si in vesicis intumuerint. Quin & suffitum [hæc eadem ex Plinio tradit Ruellius quem non nominat] eo [secundas & partus. Vet. secundas à partu. Aliud lego, secundas partus, vt infra cap. II.] secundas partus euocari existimauit Hippocrates: cinere eorum cum oleo, capitis vulnera manantia sanitati restituens. Sufpiriosis coctum, aliqui crudum [id tritum dedere M.] id dedere. Diocles hydropicis cum centauro, aut inter duas ficos exceptum: vel fico portione dupla addita) fico duplici ad euacuandam aluum: quod efficacius præstat, viride cum Coriandro in mero potum. Sufpiriosis aliqui & tritum in lacte dederunt. Praxagoras & contra morbum regium vino miscuit: & contra ileum in oleo & pulre, sic illinens strumis quoque. Antiqui & infancientibus crudum dabant. Diocles phreneticis elixum. Contra anginas tritum imponi, & [gargarizare CH.] gargarizare prodest, dentium dolorem tribus capitibus in aceto tritis [minuit CH.] imminuit, vel si decocti aqua colluantur, addaturque ipsum in caua dentium. Auribus etiam infillatus succus cum adipe ansetino: phthiriasis & [porriginis Vet. & CH.] pruriginis potum, item cum aceto & nitro compescit: distillationes cum lacte coctum, vel tritum [permittumque Vet.] permittumque caseo, molli: quo genere & raucitatem extenuat: Vel phthirium in fabæ sorbitione. In totum autem coctum vtilius] est crudo, elixumque tosto: sic & uoci confert: [Tanius alii:] Tineas & reliqua animalia intereanorum pellit, in aceto multo coctum. Tenefimo in pulre medetur: Temporum doloribus illitum elixum, & pustulis coctum cum melle deinde tritum: Tussis cum adipe vultu decoctum, vel cum lacte: Aut si sanguis etiam excreetur, [vel pura CH.] vel purulenta, sub prima coctum & cum mellis pari modo sumptum: conuulsis hupis cum sale & oleo. Nam cum adipe tumores [ne in abscessum, vel gangrænam, transeant, Alii Cancerosos alii pestilentes, aut venenatos alii:] suspectos sanat. Extrahit fistulis vitia cum sulphure & resina etiam [Harundinum infixas assulas, nam ex harundine sagittæ fiebant:] Harundines cum pice, lepras, lichenas, lentiginis exulcerat, sanatque cum origano, vel cinis eius ex oleo & garo illitus. Sic & sacrosignes.

Sugillata aut liuentia ad colorem reducit, com-
bitum ex melle. Credunt & comitialem mor-
bum, [sanari M. & CH.] sanare, si quis eo in
cibo vtatur ac potione. Quartanas quoque ex-
cutere potum caput vnum eorum Lacerpitii obolo
in vino austero. Tullium & alio modo ac pecto-
rum suppurationes quantalibet sanat (facte
CH.) fracta incoctum faba, atque ita in (cibos
CH.) cibo sumptum, donec sanitatem restituat.
Facit & somnos, atque in tonum rubicundiora
corpora. Venetem quoque stimulat cum Corian-
dro viridi tritum, poru nque è mero. Vitia eius
sunt, quod oculos habet, inflammationes facit,
stomachum laedit, copiosius sumptum (Galeno c.
vt. lib. 12. merhodi, Allium sitim prorsus nullam
facit.) sitim gignit, Cetero contra pituitam, &
gallinis & gallinaceis prodest mistum farre in
cibo. Iumenta vrinam reddere, atque non tor-
queri tradunt (si co trito M.) si trito nauia tan-
gatur. Apud Plinium porro per hamorrhoidas,
non sedis affectionem accipere oportet, sed ser-
pentis genus, in quo mas, hamorrhuis : femina
verò hamorrhois vocatur, velut Aëtius 13. c. 23.

Maximè omnium in colica affectione apud
Ant. Mariam Allium est in vsu coctum.

Sed hic de alio perdifficilis oritur quaestio.
Allium enim (inquit Iohan. Matth.) flatus ge-
nerare docent Hippocr. com. 4. de victus rat. ac
text. 90. nec non epid. 18. text. 33. Plin. lib. 20. c.
6. Ruell. lib. 2. cap. 85. Diosc. verò, Galen. & Aëtius
contra flatus praestantissimum esse remediū
lircis prodiderunt. Hippocr. Plinii & Ruellii
sententiam confirmat quod Capas Aëgin. & O-
ribasius ad generationem flatuum & vomitionem
conferre docent: atque hic etiam facit quod cō-
muniter expectinur post comestionem Caparum
& alioiū frequentissimorum excitatis flatibus
ructus fieri. Verū cum clariss. sit Galeni do-
ctrina lib. 3. de sympt. causis cap. 2. flatus fieri à
viciis pituitosis vel cibis deficientem calorem
habentibus : Allium autem & Cepas, nec deficien-
tem calorem habeant, sed manifestè excessentem.
nec pituitosum humorem gignant, sed cum
tota natura pituitoso humori repugnet, sequetur
absurdam esse Hippocr. Plin. & Ruellii sententiā.
Galenus vt Hippocratis auctoritatem in hac cō-
trouersia tuetur, in com. de vict. acu. inquit li-
brum istum non esse genuinum Hippocr. Idem
de texta qui habetur 6. Epid. responderi potest.
Sciendum autem Allium & cepae per se & ex sua
natura flatus minimè quidem gignere, eò quòd
aeria sunt & calida, ex accidenti tamen, quan-
do in corpus crudo phlegmate refertum ingerit-
ur, eo ipso dum phlegmata attenuare & resol-
uere nituntur, flatus quoque exsuscitare: quos si-
cut accidentaliter exsuscitant, sic per se etiam
suaque natura innati caloris beneficio dissipant
& consumunt. Idem in Discursu de febr. Pe-
stilentiali pag. 24. Ad praeseruationem profunt
Allia, cepae, Sinapi, Raphanus marinus, quae
non alimenti sed condimenti loco vtiliter vsur-
pantur. Mira igitur quorundam curiositas, qui
famosa haec rusticorum antidota ignoranti pop-
ulo suspensa reddunt, & prorsus vitanda esse cō-
sulant: sed ex quo fundamento hoc ipsis liceat,
ipsi viderint. Sat equidem scio, immodico &
frequenti rerum acrimia vsu sanguinem incal-
escere multūque biliosi humoris generari: pes-
tilentes verò febres inde oriri, firmiori proba-
tione indiget. Nonnulli cum viderent capas cū
Theriaca sub prunis affatas & tumoribus pesti-
lentibus impositas, venena attrahere, suspicati

sunt easdem capas intra corpus assumptas omnē
externam malignitatem ad interna viscera per-
trahere. Verū in Galib. 3. Temper. cap. 3. haec
somnia satis refutat: non enim quae foris impo-
sita attrahunt vel exulcerant, illa etiam intus
assumpta idem praestant: acrimonia siquidem
coctioe & variis ventriculi humiditatibus per-
missa plurimum remittit: vnde Marcellus etiam
ipsum caparum succum expressum, peste laborā-
tibus propinare minimè vetetur. Sic Roscellus
praestans Medicus eundem succum ex capis pres-
sum pro arcano pestis remedio exhibet, reliquū
verò caparum pulpa tumoribus pestiferis in-
ponit. Accedit quod Solion antiquus auctor
memoriae prodidit, caparum vsum firmam vale-
tudinem conseruare. Nec Horatius Alliorum
vsu suspectum reddere potest, quando inquit:

Parentis olim si quis impia manu

Sensile guttur fregerit.

Edat cicutis Allium nocentius :

O dura messorum ista!

Quia hoc veneni sicut in praecordiis:

Apparet enim Horatium Poëtarum more lu-
dere, ac id cui fortè affictus non fuit, iocosè re-
prehendere. Constat alioqui Allii vsu contra
venena in Vngaria & Italia potissimum astituo
tempore, quando messoribus & agricolis vene-
nata reptilia nocere possunt, vixit, Allium esse:
Vnde Virgilius

*Nunc virides etiam occultant spineta Lacer-
tas*

Thestylis & rapido festis, messoribus esse

*Allia, Serpillumque herbas comendat o-
lentes.*

Eiusdem conditionis sunt, Sinapi, Raphanus
marinus & similia. Si enim naturam illorum per-
pendamus, omnia haec superflua corporis humi-
ditates consumere & venenis potentissimè resi-
stere ualebunt. Hinc non sine graui causa Sina-
pi in compositionem Electuarii, quod Oram au-
reum vocat tanquam principalis pars ingreditur.
Nec immoderatum horum omnium vsu cui-
quam consulere velim, sed quantum condimen-
ti ratio permittit. Dignum & illud notatu,
quod Iac. Ruell. prodit. Si matrix per puden-
da prodeat, experimentum valdè vile. Allium
contusum in aqua ita dissolue vt nihil ipsius tui-
dis reliquum sit, cā aquā prominens matrix la-
uetur. Quod Forestus l. 9. Obseru. 19. notat, Mer-
catori cuidam Delfensi de hydrope periclitanti
cum crurum inflatione. Allium comestum ma-
ximè profuit: quo solo aliquando in Gallia hy-
dropicum curauit, cui egregiè profuit cum ad ca-
chexiam & hydropem inclinatus videretur.

Sed nihil atque ex omni parte beatum. Nam
vt Tragus perhibet, unum est in Allio detestan-
dum, nimirum foetidus ille ac fortissimus odor,
quo cerebro officit, caliginem oculorum facit,
iram comouet, sitim excitat, somnūque indu-
cit: quae omnia in gallo gallinaceo videre est, qui
Allium deuorauerit. Ceterum mirum alicui vi-
debitur qua ratione foetentem anhelitum à cepa
prouenientem teter Allii odor emendare queat,
id quod Thomas Morus in suis Epigram. atte-
statu.

Denuo serorem si vis depellere Cepae,

Hoc facile efficiunt Allia mansa tibi.

Spiritus at si post etiam grauis Allia restat,

Aut nihil aut tantum tollere merda potest.

Sed posterius hoc pentametrum veritate carere
Tragus hīc testatur. Si quis postquam Allium,
cōstituit, non possit odoris tetri foeditatem sus-

ferre, his folia ruta recentia supermanduct, quâ ratione odor ille fatidus, maiore ex parte delebitur. Quare merito à Thoma Mo-
n, sic emendabimus.

*Spiritus ac si post etiam grauis Allia restat,
Aut nihil aut tantum tollere ruta potest.*

Dydymus quoque edentibus halitus tedium af-
ferit aboleri, si crudam fabam supermanduca-
rint. Verum ad emolliendam odoris tetrici foe-
ditatem, Betæ radicem in prunis tostam super-
disse fatis est. Eo liquorem remedio virus extin-
gui Menander è Græcis pollicetur.

Sunt qui pulmentariis Allium adhibeant, nec
noua armis allandis nucleos eius insigant. Sed
quicquid id est, Apicianum est inuentum. Mu-
hercula, quæ in fontes lac suspendere aritate so-
lent, vt dulce maneat, ollarum superiores partes
circumcirca succo Allij inungere debent; hac e-
nim ratione à serpentum iniuria asserunt qui a-
lioquin lac admodum expetunt, ita quidem vt
in ollas ipsas non raro incidant. Quod si per
fomium, vt sit aliquando, serpens corpus alicuius
intrauerit, huic non facile succuri potest nisi
continuo Allij esu, hoc enim remedio serpens e-
ijcitur, teste Erasmo. Allium singulare morbo-
rum in pecoribus remedium, quibus non tan-
tum fuit, sed & in cibo Allium adhiberi de-
bet, teste Columella lib. 6. cap. 4.

Arnoldus de Villa noua ad dolorem capitis à
pituita scribit: Allium tritum, & calfactum su-
pra regulam, parti dolenti appositum dolorem
tollit, ac ad Hemierianam Allium elixum, & in
oleo frixum, cum pauco pulegio, & puluere Pi-
peris applicatum loco dolenti, mirabiliter pro-
dest. Distingueret, inquit Herc. Saxonia, de lue
venere, benigna lues venerea à maligna hoc ex-
perimento: quæ malignior fuerit ex assumpto
Allio vel Cæpis post triduum duplicatur, beni-
gnior verò eodem est statu, præterquam quòd
habenda semper est ratio personæ, & præterito-
rum. Ioh. Bockelius de peste inquit, tempore
pestis Hungari non habent certius remedium
quàm Allium, exsiccat enim corpora humana, &
putredinem impedit.

Allium, inquit F. Platerus de febribus, in hydro-
melite decoctum & ad uncias duas vel paullo
plùs exhibitum, potenter sudores & vrinas elicit
in peste laborantibus. Idem, vt ait Turnerus, ex
lacte coctum, & tritum, mistumque cum caseo
reccit, sicut catarrhos, sicque prodest ad raucedini-
nem. Tres nuclei in aceto tritici, dentibus dolen-
tibus imposti conferunt. Allium domesticum
claram reddere vocem, eò quòd guttura purget,
memorie prodidit Dioscorides, inquit B. Con-
dronchius, sed quoniam habet certum quid viro-
si, & mali succi, præsertim si crudum esitur, iure
optimo elixum conferre scripsit Plinius: elixatio-
ne enim tollitur illa grauitas: animaduertent-
tamen qui temperamentum habent calidum, & ca-
tarrhis obnoxii sunt, vt eo parcissimè vtantur,
quia nocet capiti, oculis, ac renibus. Allii tamen
tutior est vsus quàm Porri, præsertim naturis si-
gidis & humidis, si elixum, & cum sapa conditum
comedatur.

Iac. du Veloux de venatione, vt Canticula ad
Venerem stimulentur exhibet Allia additis aliis
quibusdam. Magnetem allio perunctum ferrum
negligere vulgò creditur. Sed Guiljelm. Gilbert.
de Magnete lib. 1. figmentum ait & mendacium
esse Magnetem non attrahere ferrum, si Allio
Magnes illius fuerit, aut si Adamas propè fuerit:
Sed Marthiolum Allii & Adamantis renouare fa-

bulam. Allium prægnantibus inimicum esse su-
tuitur. Quidam Hispani liquorem ex Allio ex-
pressum, ad expellendum venenum quod à fagit-
tis infectis infligi solet, exhibent. Contra vipe-
ras, rabidos canes, & venenosas aquarum muta-
tiones Allium valent.

Si gallinæ galli Allium, vt videre est apud
Ringelbergium prius comederint, ferocissimi fo-
res dicuntur ad pugnam: atque alios omnes supe-
raturi. Ideò & viatores eo vescuntur, quòd ani-
mosum reddat hominem. Datur & equis ean-
dem ob causam ferocioris animi.

DE AMPELOPRASSO

Diosc. de Ampelopraso tractans, stomacho,
inquit, incommodum magis est, quàm Por-
rum. Sed plus calefacit, & magis vrinam eie-
ct. Menses item ducit. Et eius usus his qui à vena-
tis bestiis icti sunt, commodus est.

Plinius lib. 24. cap. 15. ait Ampeloprasum in vi-
netis nasci, foliis Porri, ructu graue. Contra
serpentium ictus esse efficax. Vrinas & menses
eiecit. Eruptiones sanguinis per genitale inhi-
bere porum impositumque. Dari & à partu
mulieribus, & contra canis morsum. Ampelo-
prason dictum est, quasi Porrum vinearum. Gale-
nus sylestre Porrum dici posse ait, & à Porris
tantum differre, quantum etiam in aliis omnibus
eiusdem generis siluestria ab hortensibus diffe-
runt. Nam & acrius est Porro & siccius,
& propterea etiam stomacho magis incommo-
dum. Sicut agria omnia reliqua domesticis. Sed
& crassos (vt Lobel. Ob. inquit) & lentos humo-
res potentiùs incidit, valentiusque infarcta or-
gana obstructione liberat: atque hac quoque ra-
tione vrinas sæpè pronocat, vbi à crassis & lentis
retinetur humoribus. Ad eò verò est calidum, vt,
illitum cataphasmatis modo, exulceret. Dictum
est autem antè, ea quæ cum in modum sunt
calida, extremi esse ordinis.

Cordo, Ampeloprasum, vineale Porrum, sicut &
Lonicerum, cui præterea Porrum siluestre, Allium can-
inum, & Porrum vitigineum dicitur: Germ.
Wildlauch & hunderlauch/ Hisp. Pucro saluage.

SCORODOPRASSVM DICTVM.



Allo hic
scorod-
prassum subde-
mus, cuius
caulis tres
quatuorve
cubitos altus,
in summa parte
digitalis, paul-
latim in iun-
ceam tenuita-
tem desinit,
foliis amictus
Porraceis, lō-
gis & latis, su-
periore tamē
parte nudis,
ferè in sum-
mo caput in
branca eo in-
uolucro te-
lunt,


sum, vt Cepa, sub quo, florum glomer purp. r-
 rascit, staminulis emicantibus luceis, magnitudi-
 ne pugillari: *stofuli* Clusio Cepaccis similes,
 sex exalbidis foliolis constans: quibus succ. sic
 trigona capitula, in quibus nigrum *semen* Cepæ
 femini par eidem Clusio: bulbis ei infessilis, par-
 uæ Cepæ æqualis, multis albis tunicis contans,
 fibratis, florum glomeri suppar, & spicis multis,
 allii ritu coherentibus, odore & sapore remissio-
 re, Clusio graui odore, mediocriter inter Allium
 & Porrum: Verustate in alios maiores bulbos se-
 se diuidens, aduatis etiam extrinfecus bulbillis,
 triangularibus ferè, tunicâ durâ inuolutis, femi-
 nis vicem suppleturis: semen adhuc nullum vi-
 dimus

Sicut autem nomen Allii & Porri Scorodopra-
 sion refert, ita etiam, Cornario rekte, qualita-
 tes & vires vtriusque possidet. Olicina hinc Al-
 lium porrum vocant: Germ. verò *Aberland*
 quasi iterum porrum dicas. Alii quam Plantam
 per Allium porrum intelligit Cornarius consi-
 deratione certò dignum. Clus. in Pann. & hist.
 post. Scorodoprasion primum. Lob. obs. & icon.
 pl. pag. 157. Icon. Camer. apud Matthioli. Germ.
 Scorodoprasion, Germanicè *Aster oder A-
 sterfnoblauch*. Gall. *ail pourreau*. Ital. *Aglio por-
 ro*. Hisp. *Hajo porras*. C. Bauh. phyt. *Allium
 tenuiusiue sphaericum*.

Au *Tabern.* icon. & hist. Porrum Syriacum,
Syrifherland / qui sola contentus icone non
 demonstrat quam plantam intelligat. Compil.
 Tabern. sequitur Gerard. qui iconem eius habet
 plantaque Alpinam facit, quod non placet. Vocat
 siquidem Scorodoprasion, Angl. *Great mon-
 taine garlic*.

Scorodoprasion nascitur Dioscoridi, velut ma-
 gnum Porrum. Clusio Iunio & Iulio floret, qui
 Vienna obseruauit, cui pauci bulbi Bizantio al-
 lari sunt, postquam Vicinam venisset. Vnicus au-
 tem que n. seruauerat, mirum in modum se pro-
 pagauit, vt successu temporis multis elargiri po-
 terit. Et quidem Iunii initio suum caput con-
 torquet: Iulio autem erigit, eodemque mense,
 bulbos ad maturitatè perducit, qui si terræ cre-
 dantur, sui generis plantas procreant. Ego
 Montbelg. copiosum habeo in horto Ill. E. C.

Allii & Porri qualitatis particeps. Vnde etiam
 mixtas vires habet, & facit quæcunque & Allii
 & Porrum, tenuis è tamen. Olerum modo autho-
 re Dioscor. in cibi vsu venit, & velut Porrum
 coquitur ac edulcatur. Galen. & in sapore, & in
 odore mixtam Allii & Porri qualitatem Scorodopra-
 sion ait habere: & eodem modo etiam in
 facultate. Ita quoque Paulus, sicut & Dioscor.
 suum Scorodoprasion apud Turcas esse in deli-
 tiis, Clusio aliquando referebat Illustr. Augerius
 de Boufbecque.



tiò purpurascens, postea exalbidi, & inter hos
stofuli: tota planta grauem Allii odorem spirat.

De hoc Clus. in Pann. & hist. post. scribit, vo-
 cans Scorodoprasion alterum. Sunt, inquit, qui
ἀσκαρόεδον appellent quia, caput cum suprema
 caulis parte serpentis imitè se contorquet.

Casp. Bauhin. phyt. Moly tertium siue Serpen-
 tinum Lobel. Allium 2. siue Sarcium 2. ampli-
 carpum Cordi. Allium 6. siue capite ex muicis
 bulbis coalato & contorto, Scorodoprasum 2.
 Clusii. Sed nãquid entia multiplicat Fr. C. B.
 qui tres diuersas plantas statuit

An Cordo in hist. pl. Allii factiui alterum genus
 quod Amphicarpon appellat.

Dodon. in fol. figuram Clusii habet nomine
 Ampeloprasion: cap. tamen 12. meminit *ἀσκαρόεδον*
 Cordi, nec tamen idem cum Ampeloprasio facit.

An Lob. Obs. & Icon. pl. p. 165. Moly serpen-
 tinum vocatum.

Camer. in hist. Math. in tabella Allii figuras
 habet duas notatas numero 3. & 6. quas refero
 ad nostram Allii genus Ophioscorodon dictum
 quibusdam. Idem in horto Alliam Creticum
 vocat siue Serpentinum, Scorodoprasum in P-
 nonicis Clusii. Hortus Lus. *Allium Creticum*
serpentinum Scorodoprasum Clusio, *Moly serpen-
 tinum* Angl. rum. H. Welsch *fnoblauch* / *Schlangen
 fnoblauch*.

Iunii initio suum caput contorquet, Iulio verò
 erigit, eodemque mense bulbos ad maturitatem
 perducit, qui terræ crediti, sui generis plantas
 procreant. Est à nobis plantatum in horto Ill.
 E. C. Montbelg. multos bulbos habens, ex cuius
 bulbulis deciditibus nouæ oriuntur plantæ
 quotannis. Basileæ coluit in horto suo Cl. D. D.
 Iacobus Zuingerus.

C. B. not.

*Allium
 Creticum
 Moly ser-
 pentinum.*

Tempus.

Locus.

ALLII GENVS, OPHIOSCORODON
 dictum quibusdam.

Allii genus, Porro & Scorodoprasio si-
 mile, cuius bulbum multis nucleis con-
 stantem, fibrisque numerosis exalbidis capilla-
 tum, sessili parte circumuectiunt tunica Cepaceæ
 binæ aut ternæ ex albo purpurascens: *caulis*
 singularis, minimi digiti crassitudine, ses-
 quicubitalis, aut bicubitalis: *folius* vt plurimum
 quinque Porraceis, carinatis donatur: quæ post-
 quam caulem aliquosque inuoluerunt, ab eo
 abscedentia reflexa terram spectant, medio, au-
 reo Clusio, inter Porrum & Allium odore: su-
 Tom. II.

ALLIUM SIVE MOLY MONTANVM
 latifolium.

Multa, inquit Clus. Pann. & hist. post. etiam
 in Vngaria, Austria, Stiria, Morauiaque
 montibus Moly sine Allii sunt genera, foliis,
 floribus, vel capitibus inter se discrepantia: quo-
 rum maximam partem ab aliis hæctenus mini-
 me obseruatam fuisse existimo. Primum, *caulem*
 habet duorum cubitorum altitudine excrecen-
 tem, quem, ad medium vsque, ambiunt *folia*, mul-
 Descrptio



radix bulbosa, crassa, ex multis nucleis constans, numerosis albis fibris prædita est: sed & bulbi rudi radici inhaerent, is ferè pares qui in capite nascuntur, quæque, terrâ excepti, plantas sui generis producant. Toti stirpi Allii grauis odor inest. Iunio & Iulio flores & bulbos fert. Hort. Lusit. Allium silu. alterum latifolium Breut. bletterich Wilder Knoblauch.

ALLIUM BICORNE, PROLIFERVM,
flore intus albescente, cum steria
purpurascente externè.

Descriptio **D**issidet huius radix ab allii radice, non tantum odore minus viroso, sed & quod non è spicis constata, verum simplex Cepacearum tuicarum involucris duntaxat consistet, sublonga, candida, Nuci Moschatae par, pendulis fibris tenuibus donata, superacris: caulem producit cubitalem, bicubitalem & ampliozem, firinum, teretrem, nonnihil striatum, quem inuoluunt, ceu vaginâ pedem aut cubitum longâ, folia, quæ ubi à caule abscedunt pedalia, vel etiam cubitalia, Cepaceis similia, fistulosa: striata, sed strigiosiora multò & compressa, in terram reflexa. Carterum caulis in folliculos duos definit in corniculatum mucronem desinentes, palmum circiter longos, globum claudentes cauli continuum, Auellana rotundâ parem, & multis bulbillis rubentibus congestum, inter quos frequentes exeunt pediculi, vnciam vnam aut alteram longi, quibus insident sterculi senis foliis contexti, externè viridibus, intus albicantibus, purpurascente lineâ striatis, apicibus medium occupantibus superueniunt capitula sexangula.

Iconem habet Clus. Pannonic. & post. hist. sub titulo *Allii* siue *Moly montani* (id nos Allium bicorne purpurascens proliferum vocamus) *tertia*, ea nobis placet, vt etiam respondere videtur descriptio.

Tragus nomenclatur.

Tragus hoc Allium pingit tertio loco, titulo, *Allium caninum alterum*, huudè Knoblauch der ander. Sed ita obscure hanc tradit historiam vt nihil certi affirmare ausim, an hoc Allium descripserit, lectores pendant quæ scribit cap. 71.

Vegetabilium.

Obscurus est & Fuchsius, figuram eandem cum Trago habet, nec describit, dicitque *Allium*

quæ in Allii generibus latiora, longa, porraceis proxima: summo cauli, qui lauis & iuncens est, insidet è multis bulbis ex atro purpureis simul congestis, satique crassis constatum, inter quos in oblongis petiolis nascuntur flores dilute purpurascetes, quibus succedunt trigona vascula, in quibus semen:

silvestre alicrum, Germ. feld Knoblauch. Matthiol. quoque huius picturam habet, sed nec is in contextu demonstrat quâ plantâ intelligat. An eadem l. 2. c. 144. quamvis ibidem figuram Porri habeat, Agreste Porrum, *quædam* quasi vineale Porrum, quod in Herruria *Porrando* vocatur. Galenus, inquit is, minus fortasse rectè lib. 6. simpl. tribuit Ampelopraso quod Scorodopraso competere videtur, cum inquit, Si inter Allium & Porrum medium quiddam concipias, facultatem Ampelopraso inuenies. Latinis *Porrum agreste*, *Ampeloprasum*. Mauritanis *Nabazi*. Italis *Porro saluatico*: Germ. Wildlauch, Hisp. *Ayes* & *Pueros de la vinbas*, Gall. *Porreau de chien*. Tertio epist. ad Guill. Nusquam scripsit, inquit, Moly esse plantam Italiæ incognitam, hallucinatur cum credit Allium caninum Tragi esse Moly, non conuenit cum descriptione Dioscoridi perperam interpretatur apud Hippocratem. *Moly*, falsò asserit Galenum Allium interpretari. Cui Gesnerus ad eundem Guilandinum inter epistolas Matth. ad tripulatur, dicens: Allium caninum Tragi, Dioscor. esse Moly in præsentia non concesserim. An Guill. epist. ad Gesn. inter Epist. Matth. de hoc egit, cum scripsit: Gal. lib. qui obsoleta Hippocratis vocabula planiora facit *modè* Hipp. vocare ait, quæ cæteris Moly dicitur. Quod Diosc. Moly nominat, Hisp. *u. d. u. z. ar* nuncupat. Moly Diosc. ignotam esse Italiæ plantam dicit Matthiolus. Moly inquit Galen. eodem loco, Allium est simplex caput habens & non diuisum in spicas. Quem locum si Matthiolus legisset nunquam in Moly & suam & reliquorum ignorantiam accusasset. Nihil Allio isto syluestri esse potest notius. Nascitur locis campestribus passim. Flores candidi à Trago allium caninum dicuntur, & quoque sub nomine secundo loco post Allium syluestre depingitur. Mihi sanè, si dicam quod res est, si obscura est Tragi delinatio, Guilandini adhuc obscurior, quia nondum vidit Allium quale describit flore albo.

Car. Steph. describit & vocat *Scorodoprasum*, *Allium Porra cum & porrum*, qualiter Officinae vocant. Nouimus autem aliter sentire Gesnerum de hortis.

Dodon. describit & Iconem Tragi & Fuchsii habet, dicens: *ωπιοσπεριδον*. Lat. *Allium silvestre*, Gall. *All saunage*. Germ. Wilder Knoblauch. Belg. wildt loof.

Aduert. Quæ *Allium silvestre tenuissimum*, Germ. wilder knoblauch, Angl. wilder Garlic vocant, describunt obiter, ac annotant in margine à Fuchsio exhibitum lib. Icon. p. 129. Lobel. Obs. & c. Pl. p. 155. ubi pingitur & describitur Ampeloprasum *dumtaxat*, siue Porrum silvestre. Germ. wildlauch. Angl. wild garlic: Hisp. *Puerro saluatico* Ital. *Porrando*. Sed in figura Lobelii, si nostrum Allium depingit, requiruntur flores & duo folia sub floribus.


Geneæ passim: Montbelgardi in horto meo flores, & patuos bulbos habet Iulio, ubi spontè prouenit omnia minora, vt videre licet à *la Roche de Bauans*, vt vocant, ad Dubium itinere versus

L'Isle, & à la chaux in nostris vitibus.

ALLIVM SYLV. BICORNE
flore viridi.

Frater Casp. Bauh. inter suas plantas siccas attulit nobis Allii sylvestris genus, Allio nostro bicorni radice & foliis simile, regenerans in radice, cuius bulbum plantavimus in Horto Ill. E. C. in quo prouenit: comam non proferebat caeruleam sed viridem, copiosiores etiam flores, nec bulbuli ad flores: Nomina hæc erant adscripta. *Gerbyon Theophrast. Pallacana Plinis: Guiland. Allium vrsini in us. l. g. Cortufo.* Aliàs vidi, sed non obseruavi locum. Considerandum

an respondeat huic Allio, illud quod à *Clusio* in Panno. & post. hist. exhibetur pro Allii montani quarti speciei. siue Moly montano oboletiore flore, de quo ille scribit: Allii notati quarti alia inuenitur species pari ferè à litud. excrefcens, similibusque propè foliis prædita, cuius coma inter laxas, membranaceasque, & longum mucronem habentes tunicas latè sese explicat, floribus coloris valdè obsoleti plena: radix superiori similibus, nucleos etiam in lateribus protert. An *Plant. icon. p. 158.* Allium rubentibus nucleis:



Prouenit inter fruteta etiam Basilea.

Au plant. icon. p. 156. Ampeloprasium prolesum.

Hoc genus Allii inter siccas plantas attulit nobis Frater C. Bauh. collectum Venetiis à Lio nomine Allii anguini, quod quàm dudum esset repositum & exsiccatum, ex bulbis tamen quos ademi Horto Il. E. C. Montbelgardi regehinabat, ferè bæcque flores Iulio & Augusto.

ALLIVM SYLVESTRE MONSPESSVLANUM
albidum: Joh. Bauhini.

Monspelluli spontis siue Allium mihi repertum, caulem habet bicubitalem etiam minorem, album, cauum, festucaceum ferè, cuius fastigium in Cepaceum caput, sed minus, glomeratur, floribus singulis ad Allii vrsini flores accedentibus, maioribus quàm alterius vllius Allii sylvestris, tactu sicillimis, pediculis æqualiter longis hærentibus, albis, quos sena componunt folia apices luteos circumstantia, non prodeunt, quod obseruauimus, ex longis vaginulis, sed breuius obuoluntur tunicis pr utquam erumpant: folia magna ex parte caulem complexa, cubitalia ferè, angusta, graminea. Bulbus sibi est parvus, oblongus, albilimis pelliculis infectus, cui annexæ non tantùm capillares fibræ, verùm & nucleæ parui adnascuntur, odore viroso Allii.


Descriptio

Florens repertum Aprili in monte non longè à *Villevue* quàm itur Frontignanum vno milliari à Monspelio: Non viso Moly Diole. id suspicabamur. Casalp Allium vrsinum alterum.

ALLIVM SYLV. BICORNE PVR-
pureum prolesum.

Tenui sed duro, tereti, glabro & singulari est caule, cubitum alto, in quo folia tria quatuorue sesquipalmaria & dodrantalia, admodum angusta, crassiuscula: scapo summo insidet capitulum è bulbillis viridantibus glomeratum, è quorum commissuris emicant trensili pediculi numerosi, sextantem circiter longi, puniceantes, flores còcolores sustinentes, sed diluiores, è senis foliis, quorum medium stria saturatior, peccurrit, compositi, è medio proslitentibus staminibus purpurascens, radices bulbaceæ plures simul coherent, oblongæ, albæ, fibratæ, sapore Porri.

Idem existimamus à *Clusio* Panno. & h. post. traditum pro Allio siue Moly montano. de quo ait: Cubitali assurgit caule, laui, rotundo, viridi, in quo terna plarumque folia, superioris folio angustiora, & veluti graminea: summus caulis caput sustinet duabus laxis membranaceis tunicis longiore mucrone præditi obuolutum, quibus sese aperientibus, multi exigui bulbi simul congesti apparent, inter quos flores sex, purpurascens foliolis constantes, & oblongis pediculis inherentes dependent: rotundam, albam, longis candicantibusque fibris capillatam radicem non habet.

ALLIVM FLORE LVTEO
siue pallido.

Cauli cubitali tereti insidet umbella dehiscens folliculo membranaceo sese explicans, floribus luteorum, pediculis vincalibus longioribus insidentibus, senis foliis, toridèntibusque staminibus & stylo tenui longiusculè constantium. Semen maturat nigrum triquetrum.

Descriptio

trum: *folia* angusta, pedem longa. *Radix* bulbosa, fibrata, nucleos quoque parit, vnde propagatur, odore Allii.

De hoc Allio censemus Clus. Pann. & hist. post. hæc scribere: cum ait, Allii montani quarti speciem primam, terna iunca folia, caulem cubitalem, rotundum, &c.

C. Bauh. Phyt. *Allium 12. siue montanum flore pallido odoro.*

Allium pulchrum coma lutea dono accepi Argentinae ex plantis ficcis D. Agerii. Vidi etiam pulchre florens apud D. Fridericum Meier Argentinae mensis Iulii 8. 1595. Clus. Suum Moly montanum flore pallido odorato circa Pofonium & locis Nicolaßburg vicinis in Moravia Julio florentem obseruauit.

MOLY LVTEVM BOTANICORVM
latifolium allii odore.

Descriptio



Exoticum Elegas hoc Moly luteum Botanographis indicatum, à N. le Quelt Rhifotomo è-prum & in Pyrenæis montibus, ni labat (aiunt Aduerf. parte altera) memoria, erutum: floribus est luteis (senis foliis, pluribusq; staminibus coloribus donati, Ornithogali Arabici floris lactei similibus, mi-

noribus tamen, vno exortu è pediculis, quampluribus in spithamæo cauliculo, binis *foliis* latiusculis, Tulipe Bonemensis siue Apenninae vocata: similibus prædito: vno latiore, altero vt plurimum angustiore. *Radix* verò parit, sed breuiore. Hoc anno 1604. nobis floruit Londini in horto Nobiliff. V. D. Baronis Zouche, & Franqueuille. Tota planta allii fragrat odorem, eoque Moly propior quàm Ornithogalo luteo; Ornithogali autem lutei nomenclaturâ quò carius distrahatur, à Rhizotomis perperam donatur.

Ornithogalam luteum Moly montanum latifolium flauo flore.

Hoc quoque descripsit Clus. Exor. part. 2. Append. 2. Cuius quidem descriptionem ideò apponere placuit, vt studiosis rei herbariæ, hæc exotica raritas planta èo faciliùs innotesceret. Moly igitur montanum, inquit ipse, latifolium, flauo flore, nunquam anrè mihi conspectum mittebat anno 1601. Ioachimus Vener. Ioanni Hoggelandio, in cuius horto insequente anno flores protulit. Illius iconem, & historiam, quia à nullo alio hæcenus, quod sciam, tradita, hic adponere libuit. Habeat verò illud bina duntaxat folia, infimâ parte sese mutuo amplectentia, decem aut plures vncias longa, vnam lata, surrecta, firma, supinâ parte nonnihil carinata, Potracæ coloris, at odoris Allium referentis; inter quæ assurgebat caulis enodis & satis gracilis, firmus tamen, virescens, pedem altus, aut paulò amplior, sustinens summo fastigio producentes ex

membranaceo folliculo bifariam diuiso triginta aut plures flores vncialibus vel longioribus pediculis, iisque firmis, subnixos, senis foliis stelle in modum expâsis constantes, foris pallecentes, interiore parte profus flauos; occupante vmbilicum triangulari capitulo sex flauis staminibus cincto, quorum apices etiam flauis: qui mense Iunio explicabantur, succedebant trigona capitula semen nigrum inuale continentia: radix erat bulbosa, gemina, vt Orchidibus radicem quodam modo æmularetur. Subsequente anno aliquot similes plantas ab ipso Venerio etiam accipiebam, & illas quidem vel singularem, vel gemino bulbo præditas, quantum terna aut quaterna germinarunt, & florem tulerunt anno 1603. aliqua quidè vno duntaxat folio prædita, alia autem binis, vno ampliore alterum angustius amplectente, inter quæ prodibat caulis enodis, flores è folliculo membranaceo emergentes sustinens. Similes etiam bulbos eodem anno, cum plerisque aliis Plantis in Pyrenæis montibus erutis, venales adferabant in hæc Prouinciâ Rhizotomi quidam Galli.

ALLIVM QVODDAM SILVESTRE
flore purpurco.

AVellanæ magnitudine radix, multos nucleos membranis inuolutos complectitur, pityidas imitatos: *folia* longa, graminæ tenuitatis, *caulis* sesquicubitalis, iunceus: cuius summo capitulum insidet parui Mespili ferè magnitudine, *stosculis* purpureis glomeratum.

ALLIVM SPHÆROCEPHALVM
purpureum Syluestre.



Allii Sphaerocephali bulbus è multis contextus est nucleis albis, tunica alba inuolutis, fibratis odore Allii graui præditis: *folia* tria quatuorue, palmis longa, interdum inuoluta pro natalium ratione, vigente flore marcida, *caulem* fistulosa vagina, complectuntur, qui cubitalis aut sesquicubitalis, colore & forma iunceus, teres, solidus, firmus, in summo fastigio sphaeram gerit, ouo columbino parem, maioremque purpuream, floribus constantem glomeratis paruis, sex foliis constantibus cum staminibus concoloribus, in pediculis breuibus.

Nostræ icones fuerint emptæ, Clusii meliùs placet, quam ponit sub titulo allii seu Moly montani, qui de eo scribens; Altitudine, inquit, cubitali assurgit, caule nudo, viridi, paucis foliis viridibus obito, cuius fastigio insidet caput orbiculare nitid. è multis floribus breui petiolo prædi-



tis congestum, qui sex foliola, nunquam sese prorsus explicata, habent, sex in medio staminibus & stylo, elegantis purpurei coloris: radix bulbosa, alba, nucleis interdum tenui membrana rectos, & proxime caulē lateribus adnatos habens, sessili parte multas albicantes fibras. Eius odor, Allii instar caput ferit. In Vigaria circa Poloniam duntaxat obseruatur, quum Pannonicarum stirpium historiam publici iuris faciebam, ad vineorum in collibus Danubio imminuentibus sitorum marginibus, Maio & Iunio florib. obseruatum. Postquam verò Vienna discessi, & Francofurtum ad Menū perueni, aliquot stirpes inter fegetes agris illi vbi vicinis inuentas, in meum hortulum transtuli propter florum elegantiam Anno 1599. Tertio autem post anno, binos eius bulbos Neapoli accipiebam à Ferdinando Imperato, qui flores duntaxat promiserunt Lugduni apud Batauos, vbi demum quale genus Moly montani esset agnouit: paulò tamen præcocius florere mihi visum est illo, quod in Vigaria, quod Francofurti obseruabam: nam & illud Lugdunum adferebam. Item Exot. par. 2. Append. 2. Aliud Moly montani genus ab isto non valde diuersum mittebat Venerius Burdegalæ, quod flores protulit in meo horto mense Iunio, sed in honesti Lopez horto multò seriùs, extremo duntaxat Septembri: paucioribus tamen floribus præditum esse videbatur, quam vel Pannonicum, vel Neapolitanum, vel Francofurtense, illique minùs etiam elegantibus.

Car. Steph. de re hortensù describens dicit, Allium sylvestre, *Aulx sa uis ages*: Græcis *Ophiosrodion*, quasi serpentis Allium.

An Cordo in Dioscor. Ampeloprason. Germ. wildenlauch. An verò *σικεραδὸν ἀγροῖον* Gesner. apud Cordum in hist. qui Tragi figuram habens, dicit: Tragus Caninum vulgò cognominari ait, & Allium sylvestre *Σικεραδὸν ἀγροῖον* / Ampeloprason esse conicit: *wilderlauch*.

Σικεραδὸν ἀγροῖον, sylvestris Allii genus. Germ. *wilderlauch*, siue *wildenlauch*, qua hætenus herba cuiusq; semine pro scordio vsi sunt Pharmacopola, & adhuc magno errore vtuntur.

Tragus lib. 2. cap. 69. hoc pingit sub titulo: Allium caninum, sed id cap. 17. describit ac dicit: Plin. lib. 19. cap. 6. Allium sylvestre Vrsinum vocauit, id verò quod in aruis spontè nascitur Allium, Quod in vineis nascitur *σικεραδὸν ἀγροῖον* Dioscoridi vocatur. Apud Paulum Æginetam Porrum agreste Germ. *wilderlauch* nuncupatur. Ego, vt verum fatear, non ritè intelligo Tragum: vereor ne non separet Allium nostrum bicornè ab Allio Sphaerocephalo, iudicent Lectores.

Fuchs. icon. & hist. eandem figuram habet, in Trago, ac scribit vocatque Allium sylvestre

primum *σικεραδὸν ἀγροῖον*, anguinum Allium, *wilderlauch*.

Matthiol. in Dioscor. describit & figuram habet non multum dissimilem à Tragi vel Fuchsi figura, dicitque, in errore versantur Arabes & eos secuti, quòd pro Scordio Allium sylvestre, quòd Græci *σικεραδὸν ἀγροῖον* vocant in passillos theriacos addiderint, & in illius locum suffecerint.

Brassauolus falli deprehenditur libro suo de simplicium. Examine Romæ priùs excuso, vbi sylvestre Allium ampeloprason, siue Scorodoprason appellari scribit: primùm quod existimari Allium sylvestre Scorodoprason vel Ampeloprasum esse. Deinde quòd crediderit Ampeloprasum & Scoroprasum vnàm & eandem plantam esse.

Dodon. etiam huius figuram ex Trago vel Fuchsio habet quam non ritè describit, ac Allium sylvestre paruum vocat.

An Plant. icon. Allium sylvestre tenuifolium Teut. 195?

An Aduers. Scorodoprason siue Allioporum, cuius descriptio manca & imperfecta.

Clus. in Pann. Allium seu Moly montanum purpureum elegantissimo flore.

Cordi descriptio conuenit cum planta picta & descripta à Clusio, licet videatur aliam intelligere Gesneras.


An Casp. Bauh. Allium 5. siue sphaericum minus, quod Ophioscoroli minoris nomine collegimus: An ab aliquo descriptum sit dubitamus.

Allium Sphaerocephalum purpureum, pulcherrimum visu est, vbi floret. Florens reperimus iuxta castrum Besfordianum mense Iulio, in eodem circa Montbelgardum in planicie *Bechem* versus *Andincourt*, in fegetibus, vnde transtulimus in Hortum E.C. & olim, ni multum fallimur, Montspeli. Geneue in vineis & fegetibus: Frater C. Bauh. reperit in fegetibus *Baulea*. Allium in aruis spontè nascens in summo proceri caulis purpureos flores ostentat, colore & forma conspicuos, ac membrana ambiens spicas rubeſcit.

Corpus (vt Porta rattocinatur) in meliorem colorem mutat sanguinem emaculando.

Locus & tempus.

ALLIUM SPHÆROCEPHALUM
bifolium Italicum.



Vix sesqui-palmarè altitudinem adæquat. Radicula nectur oliuari, fibrata, alba, nullo tunnicarum fortis conspicuo vestigio prædita. Coliculus rigidus & proplante proportionè sic latis crassus, teresque surgit, atrouitès, binis *falsis* crassis & canaliculatis velticis. In summo flores


Descriptio

gerit in glomum congestos, eleganti purpura conspicuos: ex quibus ita minula quaedam mucosa profluunt. Sapor Allii haud dissimilis. Parum adest, quin ipsam plantæ magnitudinem & proportionem figura exprimat. Culturâ mutarum magnitudine obsecrauimus.

Româ bulbillos aliquot ad nos importauit Cherlerus noster. Floret toto Maio in horto Ducis. Montbelg. quem colimus. Ingruente tandem æstu farscit donec planè euanescat.

ALLII GENVS FORTE Scorodoptalon alterum Lobelio.

Descriptio



Allii petraei. Vnde habuerimus hanc plantam non recordamur.

De hoc fortè Lobel. obs. Gracilioribus nucleis bulbis stipatur, membranis inuolutis atro flamentibus: hos & folia Allii exiliora: odor & sapor Scorodoptalli. Hoc in meis Italicis peregrinationibus in sportulas conieceram.

An Lobel. Scorodoptallium alterum. C. Bauh. Phyt. Allium 4. siue Sphariceum. 2.

ALLIUM PETRÆVM VMBELLIFERVM.

Descriptio



ralescente, quorum singula ex senis foliis componuntur, totidè apiculis saturatoribus interdù pal-


lentibus, triquetrum in medio positu Comulâ circumscâribus. Radix bulbosa, porracea, alba, tuberculis adnascèntibus nouam bulborû fobioicem profert, fibris longiusculis capillata: ac veluti repens, multum se multiplicat, plurimum affinitatis habet cum Allio nostro pratensi vmbellifero, de quo post.

Icon nostra quam sculptam eminus demonstrat strigosas plantas loco sicciori erutas: hanc verò pingere existimamus Clusium Pann. & hist. in horto fortè cultam aut loco minùs strigoso collectâ de qua sic scribit: Allii odore, tuberosa radice Allii siue Moly Narcissinis foliis 2. cui quina aut sena folia primi (siue nobis sequentis) foliis non minùs lata, sed breuiora, nonnihil sese contorquentia, viridia & splendètia, inter quæ pedale caulè promit, superiore graciliorem, sed non minùs firmum, & striatum, qui in summo & ex membranea tunica promit multos flosculos in orbiculare ferè caput simul congestos, prioribus similes, sed elegantiore purpura nitentes: capitulis & semine superiori respondet: similiter & adnatis in circuitu non infelicis priore sese propagat. Illius etiam genùs inuenitur longioribus & angustioribus foliis neque adeò conuolutis, cauliculis paulò infirmioribus, in reliquis partibus conueniunt.

Allium Petræum Gesnerus aliquando nobis denominauit cùm peregrinaret cum eo in Rhætia Scorod. in Petra. in. Inueniebamus tunc Burmii florentem Junio, ab eo tempore vidimus Basileæ in horto D. Felicis Plateri, & in monte Pater Helueticorum, Frat. C. Bauh. attulit Patavio nomine Ophioscorodi minoris. In horto Ill. E. C. v. ubi plantatum florebat Julio, prouenit autem ex semine ab Ill. Landgrauio Guillelmo misso nomine Bulbi vomitori, folio anguloso. Hoc nobis præterea visum in Ducatus Wirtemb. vixit in horto egregii Pharm. Io. Lutz.

Gesn. horti. Petram Petræum in saxis circa Badam nascitur, nisi Allio potius cognatum sit. Hoc Allii montanum Petroscoredon dixeris. Clus. in Pann. x. p. 222. Allium siue Moly Narcissinis foliis 2. Item Moly Narcissinum minus. An Camer. horto, Allium saxatile, Bulbus vomitorius, Moly folius Narcissi.

ALLIUM VMBELLIFERVM PRATENSE.



Dis pratensis, Genes ultra flumen Arue oriundum Allium vmbelliferum nobis dictum, radice nititur Petri sublonga, fibrata, alba, sed quæ ex bulbo radicem obliquam fibratam Valerianæ hortensis radice aliquatenus similem producat, odore Allii: folia primùm penè triangula, paulatim

Atha compressiora cuadunt, cubito longiora, *cauli* aequalia, qui nudus, angulofus, in caput albicans oblongum definens, eo dehifcente *umbellam* explicat alii vrsini *umbelle* similem. *flosculus* sex foliis apicibufque compositis colore purpurafcente: flores mensis Iunii principio.

Frater C.B. attulit nobis nomine alii Plinii ex horto publico Patauino. Ei magna similitudo cum alio *umbellifero* Petraeo. Considerandum an forte tantum eius variatio fit, ratione loci vel an idem cum alio sine Moly Narcissinis foliis de quo Cluf. Pann. & hist. post.

An Lobel. Obs. Moly foliis Narcissi, & Icon. pl. pag. 161. de quo ait: Alterum proceritate, & caule non abfimile: sed floribus caruleis, & foliis compressis, Narcissi similibus, & ferè paribus, oblongis, & albis radicis bulbis Porraceis simul implexis & coherentibus magno capitulorum stipatu: Allium odore preferentibus, cuius aliquot bulbos adhuc habemus munere Raphaelis de Coxia, summae humanitatis & stirpiù magni admiratoris, qui non modò exoticarum stirpium hatud pœnitendum numerum, sed & eandem affabre, arguta manu, summoque artificio pictas, ut si quis alius apud Belgas, nobis dederit. Tabern. hist. Porrum silv. 2. & Icon. Porrum silv. 1. wild brislandy. Compil. Tabern. non describit: sed tantum ait Porrum silv. duplex: vni foliis acutis: contrarium tamen est in eius figuris: quod enim acutis foliis est, latioribus est: erant multae diuersae notae si iucelligit eandem quas nos intelligimus. Vna notabilis à flore *umbellifero*. Nos existimamus ei incognitas illas plantas.

Gerard. Angl. Allium sylvestre *Crome* Gerard. Hist. Allia sylvestria *crispoda* *dypera* Diosc. *apocynites* *dyper*, Anguinum & Ceruinum Allium. Icon apud Gerardum est Tabern. Considerent Lectores an descriptio & nomina conueniant Iconi propofita, & an prouenit planta quae per iconem demonstrata in planitie Mantelae dicta, & in *3f. lington* prope Londinum.

Cluf. Nascitur cum precedenti in Leytenberg supra Manderstorf vbi tepide sunt aquae quarum vsu multi valetudinem curant praesertim calculo obnoxii, & aliis montibus Vrbi Viennae vicinis.

ALLIUM SYLVESTRE PERPVSILLVM iuncifolium moschatum.

Aridis, auctore Lobel. Adu. par. 2. Nitrobricum agri Monspelio vicinis collibus hic exiguus bulbus, conuictor & alumnus parili bulbo Hyacintho Autumnali. *Cauliculo* palmari, recto, rigidiusculo, exili: è cuius summo sex circiter erumpunt propagines, è quibus *flosculi* veluti in *umbellam* positi prodeunt, quinque aut senis foliis constantes: paruis, angustis & oblongis, Ornithogali floribus similibus, acuminatis, lineis fuscis in medio per longitudinem interstinctis, Aphodeli albi instar: coloris albi obscurioris, staminibusque in medio. Moschi planè odorem suauissimum spirantibus, praeditis: quibus succedunt *capitula* rotunda in quibus tria vel quatuor triquetra, oblonga, nigrae *semina* continentur. Bulbi subsunt parui, albi, oblongiusculi, Allii sylv. similes, ingratisque odoris. *Folia* emittit laucea, exilia, tenuissima:



ALLIIS AFFINIS PSEUDOORCHIS
Monophyllos.


Non incommodè forsitan, inquit Clusius hist. post. Pseudoorchis appellari possit elegans plantula, quam ex Italia rediens obseruabat Anno 1593. eruditus vir Guliel. de Mera Batauus Medicus, & mihi Francofurti communicabat, paulò antè meum ex eà vrbe discessum. Habet verò illa vnicum *folium*, ex membranaceo quodam inuolucro prodiens, semuncialis latitudinis, duarum vnciarum aut amplioris longitudinis, multis venis secundum longitudinem excurrentibus, & medio neruo praeditum, valdeque tenue, dum reliccatum est: ex eodem inuolucro prodit & *cauliculus* semipedalis, aut minor, gracilis, à medio ad summum fastigium, *flosculus* quibusdam onutus, quorum forma mihi ignota, quia siccam plantam duntaxat videre contigit, in qua inhærebant adhuc *flosculorum* petioli, & bina aut terna capitella, instar Capitulorum Orchidis: *radix* bulbosa est, aliquot membranaceis inuolucris recta, praeter Orchidum naturam, sub qua multae tenues fibrae exeunt, ut in Allii generibus, cum quibus affinitatem quandam habere videtur, radicis ratione, cui plerumque adhuc inhæret superioris anni exsucca, & cauliculum retinens. Cum porro mediam quandam naturam habeat haec planta, & peculiare caput non videretur requirere, Orchidibus subiiciendam esse existimaui. Per me tamen semper licebit aliis, quo velint loco reponere, & nomen illi imponere.

Descriptio

ALLIUM VRSINVM BIFOLIVM vernum sylvaticum.

Allium vrsinum *radice* oblonga Porri est, tenuiore, longis & frequentibus fibris, capillata, membrana mediocri crassitudinis inuoluta, Allium redolente: à cuius imo statim exoriuntur bina aut trina *filia* odore vehementi Allii, & gustu feruido, lato virore splendens, striata, tenera, sesquipalmm longa, in acumen desinentia, duas vncias lata, pediculo dodranali virente, qui post in membranam tenuem, lucidam striatamque faciens floris alteriusve vicini folii pediculum ad fadices vsque fibras vaginae in,

Descriptio



star obuoluit: eodem autem loco cum foliis surgunt pediculi bini, terni, aut plures, triangulares, Cyperi modo, dilute virecentes in *vilgam* factam laniunculam exalbidam, mucrone virente striatam desinentes, quae ubi se explicauerit umbellam ostentat: numero's *fofolis*, etiā ad 40. cōstat, candidis, in stellā modum radiatis, quos constituunt folia lena oblonga mucronata, intra quae stamina totidem alba, filis, quae concolor, ex umbilico tribus tuberculis virentibus compacti. Soler autem cum florum tum foliorum pediculos simul omnes membrana eximia tenuitate pellucida, alba, striataque obuoluit, quae expansis floribus marcida decidit. Semen succedit trigeminum, rotundum.

Synon.

Est hoc *Allium Vrsinum* Cordo in Diose. *Syluestre Allium Ophioscoron* appellatum. Germ. *Kampfen*, siue *Kampfen* & *Kampferen* / *Vrsinum* Plinio Eidem in hist. *Allium stylacium*: Germ. *waldknoblauch* / *Germfel*, hoc Tragus Ophioscorodon Dioseoridis esse putat: Aliqui vrsinum cognominant, Figura Tragi appositā. Brunt. figuram habet sub nomine *Allii syluestris*, dicitque: Dioseorides meminit *Allii sili*. Plinius vrsinum vocat, pro quo exhibemus Helueticis [quod quidem Io. Agricola testatur] dictum *Kampferen* / nominatur apud quosdam eorum *Allium agreste*.

Caralp. de pl. *Allium vrsinum* vocatur, de quo Plinius, loquens, inquit: est & siluestre, quod *Vrsinum* cognominant, odore molli, capite praetenui, foliis grandibus.

Harchio & Trago Germ. *waldknoblauch*. Otho Brunfel. ait vocari *Kampferen* hoc est *Germfel* vocatur & *Schlangenknolauch*: *Allium Colubrinum*, *Anguinum*, *Scorododon* Diose. lib. 2. c. 141. potest etiam esse esse *Aphroscorodon* Columellae lib. 13. cap. 3. Serap. *Scordium*. In hist. lat. *Allium syluestre waldknoblauch*.

Fuchl. *Allium siluestre verinum*, quod *Vrsinum* cognominant: Germ. *waldknoblauch*. Item in icon. *Allium vrsinum*, Angl. *Rammes* vel *Kampferen*. Matth. in post. Ital. comment. *Aglio orfino*, qui depingit: An Anguill. *Scorodoprassum* Bononiensibus *Aglio arenino* & *Vulpico*. Lonic. *waldknoblauch* / *Kampferen* / *Kampfen* / *Germfel*, *Ophioscorodon*, *Allium Colubrinum*, *Anguinum*, *Vrsinum*.

Ophioscoron Lonic.

Gesner. de col. stirp. *Allium vrsinum*, de hortis, *Allium siluestre bisolium*, *Allium Vrsinum*, hodie nonnullis hoc est *Aretoscorodon*. Dod. hist. Gall. *Allium* 3. *Allium Vrsinum* Neotricis: Gall. *All d'ours*. Belg. *Borloek*. Videtur Dioseor. *Scorodoprassum*, vel ut quidam putant *ampeloprasum*. Aduerf. Lob. & Pen. sic ut & Gerardo *Allium vrsinum*: *Abfelin* siue *Moly Hippocraticum*, Angl. *Kampfen*. Postea tamen dicunt, an sit *Allium Vrsinum*, Hippocr. *Moly*, cuiusmodi Galenus interpretatus videtur, haud certum est. Lobel. Obs. *Allium Vrsinum*. Germ. *Beerhunds knoblauch*. Ital. *Aglio de gli orsi*. Icon plant. pag. 158. *Allium Vrsinum latifolium*. Clus. histor. post. Cum Victorialis longae foliis magnam similitudinem habet *Allii Vrsini* folia, licet molliora & teneriora. Frequentissimum autem id est in omnibus Pannonia & Austriae siluis, coniunctim plerumque nascens cum *Lilio conuallium*, siue *Oenanthe*, Austriae, ut ante dixi *weisser baldrian* / *Vngar. Zent Giorgi veraga*, hoc est, *S. Georgii* flos, dicta & *Geringy wrag* à nonnullis, quod significat vniouis florem. C. Bauh. Phyt. *Allium* 17. siue *Vrsinum*. Sunt qui *Diose*. *Scorodopr.* aut eius *ampeloprasum*, aut *Ophiosc.* sed male, censeant. Camer. apud Mat. Germ. & in horto, *Allium vrsinum*, a *retoscorodo* syluestre flore albo. Quibusdam *Cornicum porrum*.

Vidi Bononiae in horto Caesaris Odonis, ut & Patavii Martio mense in horto D. Bernardini Trevisani, Ferrariae in horto S. Dominici à l'Angeli. Genevae prorumpere incipiunt folia in horto meo in fine Martii; in principio aprilis à la Bassie incipiebat florere. Basilae etiam observauit, & frater Casparus in *Mundschlein* iuxta aquas: Inueni circa *Mesvans* & in itinere versus Cleremant & non longe à ponte Montbelgardensi Vauiaucourt ad sinistram in colle, vnde trāstuli in Hortum E.C. Laeti inditum, referente Brunfelsio, ipsum coagulare dicunt.

ALLIUM ALPINUM



Allo Alpino est obliqua nonnihil in longum bulbum desinens, multasque fibras perplexas emittens, inuoluitur multiplici cortice variis fibris transuersim coeuntibus, & quodammodo reticulato: singulis annis, aurore Clusio feliciter aliis bulbis circa ipsam adnatis se propagat, fibris adeo implicatis,

ut difficile sit bulbos coniunctim natos & cohaerentes sciungere, huic emegit *caulis* cubitum altus, crassitudine minimi digiti, propter terram rubescens, enodis, laevis, superius viridis, striatus, fungosus, cui insident glomeratim congesti flores. Ceparum floribus similes, vincta longioribus pediculis haerentes, candidi, è femis foliis singuli costant, totidemque apicibus & stilo: quibus triquetra succedunt capitula, in quibus *femina* rotunda, pulla: *folia* duo aut tria vagina sua caulem complectuntur, formā foliorum *Allii Vrsini*, nec uel,

noſa, ſublonga, & lata, acuminata, ſed maiora, rigidiora: Géciane maioris foliis penè ſimilia vt non malè cenſet Cluſius: Noſtra icon quam iam ſculptam eminus exprimit.

Lobel. & Pena Adu. Obſ. & Icon. pl. 159. *Allium latifolium maculoſum* ſive *Serpentinum*. *Ophioſcorodon*. Wirſung. *Sigwurz*: *Radix victorialis*. Cluſ. Pann. & hiſt. poſt. Copioſè naſci tradit in Durtenſtein duobus ſupra Gamingam milliariibus, vbi montanis paſtoribus. *Kaulauſch* dicitur, quibus magno eſt in vſu, aduerſus corrupti aëris, & nebularum exhalationes. Inueniri & in montibus, qui Bohemiam à Sileſia diſterminant, vbi à Germanis *Sigwurz* appellatur, quia qui effodiendis metallis operam dant, magnas certàſque illius vires, ſe experiri prædicant, ad ſeſe muniendum aduerſus impurorum ſpirituum inſultus, à quibus frequentiffimè impetuntur: vnde etiam *victoralis* nomen ab effectu inditum contendunt. Matthiol. *Allium anguinum* vocauit. Iofias Simlerus *Allium alpinum* nuncupat, *Sigwurz* & *Sibenamform* / ab inuolucrorum, quibus tanquam reliculo radix inuoluitur, multitudinè. Vulgus Herbariorum *victoralis longa* aut maioris cognomen dedit vt à gladiolo diſcernat, cuius radicem ob corticis quo integitur, cum ſuperiore ſimilitudinem, *victorialem* rotundam & parum appellat. Geſnerus, paſſim: *Allium Alpinum radice reticulata*, vulgò *Sigwurz* *victoria radix*, ſuperſtitione quadam. *victoralis longa*. Camer. in horto *Allium Alpinum: victoralis mas & ſamina*. Mari folia multò ſunt latiora, ſemina verò anguſtiora. Apud Matthiol. Germ. *Allium anguinum, victoralis longa*. C. Bauhin. Phyt. *Allium* 18. ſive *Serpentinum foliis oblongis*, ea Lobel. ſue figure vt & Matthiol. non depingit: melior ergo Camer. & Lugd. Item *allium* 19. ſive *Serpentinum foliis rotundioribus*, ſive *Alpinum mas* Camer. à nemine adhuc pictum. Pingit Porta *allium Alpinum*, nomine alii anguini: conſiderandum autem an maculatus caulis, & an idem cum *Ophioſcorodo*. Tabern. *Allium Alpinum, victoralis mas*. Gerard. *Allium Alpinum latifolium ſeu victoralis Brodeleanè* montane *Garkich*.

Allium Alpinum collectum in horto veteris amici mei ingignis Medici & profeſſoris in academia Argentinenſi D. Melchioris Sebitzii plàraui Montbelgardi in horto Ill. E. C. vbi floret & ſemen fert. Genevæ habebam in horto, alatum ex montibus, folia protendebar in fine Martii. Baſileæ vidi in horto D. Doct. Fælicis. D. Fridericus Meyer dedit mihi ſemina nomine *victoralis longa* cum eſſem Argentina 1594. Heidelbergæ vidi in horto D. Sprengeri, audio non longè prouenire ſpontè.

Perhibetur teſte Wirſung, radicè *victoralis* collo perpetuò appenſam arcere contractionem. Et, ſi Porta: fides habenda, crematum vitil igini, lentigini, & ſigillationibus valet. Galenus fatiò validius eſſe dixit, ſerpentes abigit odore, belliarum omnium icibus medetur: præcipuè hæmorrhoidibus. *Allium alpinum*, ait D. Balch. Hamclius pharm. ſe experti ſedare conuulſionis ſpeciem, dictà *frampff*: ſe porò intellexiſſe ſedare dentium dolores.

MOLY VETERIBVS.

Moly, inquit Dioſcor. *folia* habet graminiſimilia, ſed quæ latiora ad terram ſunt: *ſtores* violæ albæ ſimiles, lactei coloris, minores tamen, & cum violæ purpureæ floribus comparandos: *caulem* album longitudine quatuor cubitorum, in cuius cacumine eſt alii ſpeciem referens quiddam: *Radix* parua eſt, bulbola. Hæc valdè commoda eſt ad vteri apertiones, trita cum irino vnguento, & in peſſo appoſita. Hæc deſcriptio, inquit Cornar. videtur eſſe veri illius Homericæ *Molcos*, quod Mercurius Vlyſſi contra Circes veneficia dedit: de quo ita Odyſſ. 10. poëta cecinit.

Sic ſatus diuulſam è terra porrigit herbam.

Mercurius, ſimul & nat vt an me dicit huius.

Radix magna huic, ſed lacti ſiſ concolor exit:

Moly vocant ſuperi.

De hoc Plinius lib. 25. cap. 4. ita ſcribit. Clariffima herbarum eſt numero reſte, quam à Diis vocari putat *Moly*, & inuentionem eius Mercurio

affignat, contraque ſumma veneficia de nonſtrat.

Naſci eam hodie circa Pheneum, & in Cylleuc Arcadiæ tradunt, ſpecie illa Homericæ, radice rotunda, nigraque, magnitudine Cæpæ, folio ſcillæ.

Effodi autem dulciter. Græci autores ſtorem eius luteum pinxere, quàm Homerus candidum ſcripſit. Inueni è peritis herbarum Medicis, qui & in Italia naſci eam diceret, afferri que è Campania vidi, aliquot diebus eſſam inter difficultates ſaxæ, radicis triginta pedes longæ, ac ne ſic quidem ſolide, ſed abruptæ.

Plinius hæc partim ex Theophrasto [lib. 9. c. 19. inquit Tragus,] tranſcripſit, cuius verba hæc ſunt, Gaza interprete: *Moly* apud Pheneum exit, atque apud Cylleuc eſſe (quemadmodum Homerus dixit) aſſerunt: radice rotunda non abſimili Cæpæ, folio Scillæ. Vſum eius contra veneficia ſimum, non tamen effodi difficulter, vt ait Homerus. Hæc Theophrast. Plinius tamen Homerum ſequutus, eam difficulter effodi tradit. Naſo quoque Poëta, Homerum ſectans, ait,

Paciſer huic ſtorem dederat Cylleucis album,

Moly vocant ſuperi nigra radice retentum.

At contra hos omnes Galenus *Moly* hoc non habet, ſed *Myle* appellat, & Dioſcor. idem citans ſic ait, *Myle* radix quæ bulbo paruo ſimilis eſt, conſtringendi vim habet. Quare cum loliacea farina appoſitam ipſam vterum apertum ſanare dicit Dioſcorides. Hæc Galeni verba nullum alium Dioſc. locum citant, quàm præſentem, quo de *Moly* agit. Nam & ipſe radicem paruam bulbola ei attribuit, & vim conſtringendi apertum vterum aſſignat, dum ait, *αὐτὴν ἐπιβάλλειν ἐπὶ τῶν ἀνοικτῶν ἀναστομάτιων*. Non enim accipiendum eſt commodam eſſe ad apertendos vteros, videlicet concluſos, velut à multis intellectum eſt, ſed aduerſus uteros apertos, vt ſcilicet conſtringatur ac concludantur. Eſt enim *συμπερικλυτὴν ὑπὸς αὐτῶν ἀνοικτῶν*, vt Galeni verba clare habent. Atque ad hanc rem haud ſcío an non magis idonea ſit farina loliacea, quam Galenus illi ammifendam eſſe dicit, quàm vnguentum irinum, cum quo tritam illam Dioſcor. in peſſo apponere iubet. Certè lolium in tertio diæne calefacit ac ſecat, vt ad hiantem & apertum vterum non ineptum eſſe poſſit. Irinum autem vnguentum contra mollit, & vteri concluſionibus conducit, & hæmorrhoides aperit, velut lib. 1.

Locus:

Scilla folia

Flora luteo.

Radix 30.

pedes longæ

Myle Gal.

leno.

Dioſc.

malè inter-

pretatur.

c. 53. Diosc. docuit. Et tamen etiam sic idoneū videtur, vt radix cū ipso teratur, & in pesto subdatur. Mihi itaque videtur omninō fieri potuisse, vt alterum pro altero, vel apud Diosc. vel apud Galenum, à Librario agnitum sit, & ob similitudinem suppositum. Sed cur Moly in Mylen Galenus mutarit, nulla mihi ratio succurrit: nisi & hic Librarii error putandus est. In hac autem diffinitione, facilius etiam ferendum est nobis Moly hoc in totum ignotum esse. Ad quem modum Clusius Hisp. ait: Moly quod Plinius in Italia nasci scribit mihi incognitum nec quenquam audire vel scribere memini, qui se vidisse diceret. Ceterum μάλυ από τῆ μαλένας ab amolien- dis morbis, C. Bauh. dictum contendit.

MOLY DIOSCORIDIS PARVVM quibuldam.

Descriptio



Folia pro-
nea, in terram
nonnihil reclina-
ta, hirsuta,
Allium obolē-
tia & respicentia:
caulis teres
pedalis, lævis,
rotundus, ca-
uus, in cacumine
disrupta, mem-
branā vimbellam
gerit florum
candidorum,
flores Allii
Vrsini experimentium,
maiorum paullo,
& sex foliis cō-
stantium. Radix
bulbosa, Allii

aut Auellanae magnitudine, nigricantibus mem-
bris involuta, intus candida, succulenta, calidiuscula & subingrato odore.

Synon.

Camet. apud Matth. *Moly*, cuius Matthiolus meminit. C. Bauh. Phyt. *Moly secundum* siue *minus*. Matth. in post. com. ment. Ital. *Moly* à Cortuso missum, vero ac legitimo. Diosc. *Moly*, similima planta: quod Gal. l. simpl. 7. *Myle* dicit. Hist. Lugdun. *Moly* Matthioli, idem prorsus opinatur, quod Clusius vidit Gadibus. Nascens hoc *Moly*, & initio Februarii flores profertens Gadibus, eā veteris urbis parte quæ in mare protenditur, eruebam, teste Clusio, non procul à sacello locum occupante, in quo Hercules templum fuisse ferunt *Moly* quod Dioscoridis dicitur vidimus Patrauii apud Iacobum Anton. Cortusium Nobilem Patavinum, & in horto publico Patavino: odorem habentia Allii: prorumpentia Ianuario & Febuario: ab eo etiam semina accepimus: Visum etiam à nobis florens mense Aprili Bononiæ in horto Nobilis *di Gonz. adinis*. Semina accepi Stulgardiæ ex horto Ill. C. V. Virt. serenda Montbelg.

Locus & tempus.

MOLY MINVS FLORE orbiculato maiore.

Moly Dioscoridis antè dicto valde simile illud, inquit Clus. hist. post. *Moly minus*,



quod Moerkerca Flag. Des-
drorum in cultissimo
suo horto alebat
de Dranoutre,
Moerkerken,
&c. *Caulis* eius
palmatis, viti-
dis, denos aut
plures sustinēs
flores 6. niueis
folioliis, non
mucronatis, ut
superioris, sed
orbiculatis &
maioribus cō-
stantes, senis
in medio stam-
minulis, inter
bina porracea
quodammodo,

sed angustiora *folia* assurgebat: *radix* erat rotunda, candicans, nucis ponticæ magnitudine, albicantibus fibris prædita. Vnde habuisset ignorabat, sed semine peregrinè accepto sibi natam eam plantam augurabatur.

MOLY THEOPHR. MAGNVM



Dvo aut
tria ex
radice bulbo-
sa, foris nigri-
cante, intus al-
ba, promit *fo-
lia*, longè, lata,
crassiuscula,
Scillæ foliis
accedentia, tria
aut quatuor
longiora, in-
quit Clusius,
in vicem am-
plectentia, *caulis*, nudus,
cubito maior,
crassius, con-
cauus, candi-
dicans, rotun-
dus, *foliis* ex-
pers, *flores* in



summitate, quasi ex vimbella, gerit stellatos, albos, ex longiusculis pediculis, quos excipiunt capitula triquetra *semen* continentia nigris, Ceparum semini simile. Addit Clusius iuxta caulem inter folia alius plerumque exit cauliculus planus & foliaceus, seu verius folium summo veluti Allii nucleum gerens, initio candicantem, deinde pallidulentem, qui, terra exceptus, germinat, & eiusdem generis plantam profert.

Anguill. vt existimat, *Moly* Theophr. & non Diosc. Ad. Lob. & Pen. An hic flos dicatur *Moly* liliflorum Homericum fortè? Obf. & Ic. Pl. *Moly* liliflorum bulbum in lilio gerens Theophr. & Homericum fortè. Videant lectores & perpendant an flos ritè describatur. Differt à Diosc. *Moly* quod Theophr. lib. 9. cap. 15. & post eum Plinius lib. 25. cap. 4. ex Homero descriperunt. *Moly* Hom.

Hometicum, cuius Theophrast. & post eam Plinius meminere: radicem negat (teste Clusio) Theophr. difficulter effodi vt Homerus tradit. C.B. Phyt. Moly. siue *Masue*. Hoc Theophrast. est Moly fortè & Plinii radice: rôtunda. Sunt qui velint Scillæ genus esse quod Pancratiû Diosc.

Moly quod Theophrasti quibusdam dicitur, primò succum vidimus apud Cort. Nob. Parauinum, postea virens in eiusdem horto & siccam plantam quis videns Allii magnum genus dixisset.] obseruauimus ferè florens menis Aprilis: Bononiæ in horto Nobil. di Gonzadinis & S. Saluatoris al burgo di S. Catharina, præterea in horto publico Parauino. Bosileæ quoque in horto D. Felicis Plateri Florentem Mato. A Spriengero accepi Heidelbergæ semen Moly maximi quod Montbelg. factum in horto Ill. E. C. Alitur hoc apud nos (inquit Clusius) in hortis ab herbariæ rei studiosis, & Maio mensis floret.

MOLY INDICVM SIVE CAUCAFON.



MOLY Theoph. foliis & reliquâ formâ simile, nunquâ flores apud me, neque apud multos alios protulit: sed eorum loco caulis pedalis, ferè planus, aded infirmus, vt, nisi aliquo fulciatur adminiculo, atrolli non possit, summo fastigio conglomeratum caput fert, multis veluti Allii spicis mespili vulgaris magnitudine constans, inritò viridibus, deinde pallecentibus, quæ etiam in terra non reposita, germinant, telluri tamen commissa, in maiores bulbos adolefcunt, siliquæ & caules (non tamè singulis annis,) producant: radix, vt alterius, gepæcea, rotunda, alba, multis tunicis ami-

ta, quarum externa fusca, vetustate sepe separans, & in alios bulbos pangens. Aiunt apud nos (inquit Clus. Hist. & hist. post.) herbariæ rei studiosi aliud quoque Moly genus, quod Indicum

vocant (alii barbaro nomine *Caucasofon*), quoniã ex India primùm in Hispanias perlatum esse ferunt, & inde ad Italos transiisse, ab illis certè Belgæ acceperunt. Lob. Obs. *Caucasofon*, Moly Indicum vocatum quod nos Luteciã vidisse meminimus in horto Castellani, sibi no caule bulbulos sphærico pericarpio membranaceo inclusos gerebat: qui depacti facillè propagantur. Folia bulbos & reliqua, cum Moly Liliiflore siue Theophrasti similia. Suspiciamur nos Lobelio non benè notum Moly Indicum, id quod verisimile apparebit consideranti eius descriptionem & iconem quam hic proponimus primo loco, si quis conferat cum descriptionibus & iconibus Clusii & Imperati cuius iconem proponimus addito folio ex iconem Clusii. Casp. Bauh. Phyt. Moly 4. siue Indicum. Ferd. Imper. Moly Indici & Caucasofon nomine demonstrata planta, species est bulbi, cui parui bulbuli sunt pro flore & semine, singuli singulos habentes folliculos:

Crescit Constantinopoli, Viennamque adferri vidit, (dum istic viuerebat) Clusius, Zumbul Arabi bulbis permixtum: & inde fortitan, etiam in Italiam: à D. tamen viro Ferd. Imper. intelligebat, Neapolitano regno spontè nasci.

BVLBVS ESCULENTVS VETERIBVS

HVe vsque prosequuti sumus culinariorum bulborum historiam, graecolentum quippe, Caparum, Porrorum, & Alliorum, quibus succedunt bulbi suauem gratiã neque odorem spirantes, qui & ipsi esculenti & non esculenti.

Theophrast. lib. 7. cap. 13. autore, Bulborum plura esse genera manifesta. Magnitudine siquidem, colore, figura, & sapore differant. Alicubi enim aded dulces nascuntur, vt per se sine condimento alio edantur, quales in Taurica Cherronefo. Et paulò inferius. Quam & bulbosa plura, nec iis [lanigeris herbis] pauciora notare licet: Leucoion (Violam albam, Gaza) Bulbinem, Pytion [Opitionem Gaza] Coicem [scilicet legendum non *zozis* vt Gaza] & Silyrinchium quodammodo, quæ quidem redigi ad bulborum genus desiderant, quòd radice orbiculenta. Nam colore quidem penitus discrepant, eadem enim, nec squamis constant. Quæ sic reddidit Plinius: Bulborum genera differunt colore, magnitudine, suauitate: quippe quam quidam crudi mandantur, vt in Cherronefo Taurica. Et paulò post: Genera Græci hæc fecerunt, bulbinem, sitanion, pytion, acrocotion, argilopa, Silyrinchium. In hoc mirum, imas eius radices crescere hyeme: verno autem quum apparuit Viola, minui ac coëtrahi. Tum deinde bulbum pinguescere, inquit Cornar. & Theophrast. Apparet locos esse corruptos. Nec idem, nec eodem modo dicunt. Idem tamen Plinius eodem loco Catonem Megaricos bulbos maximè celebrare ait. Post illos in Taurica Cherronefo natos ipse probat. Post hos, inquit, in Africa nati maximè laudantur, mox Apuli.

Sed hic obseruandum est, duo Bulbos propriè appellari, Esculentum scilicet & Vomitorium, Verùm generaliter omnes Olerum radices, quæ similitudinem ad bulbos habent, bulbos appellari. Sic Cels. lib. 2. cap. 18. Ex oleribus valentiora Rapa Napique & omnes bulbi, in quibus Cepam quoque & Allium numero.

Quoad Bulbum satiuum, etiam ab annis 28. m. 2.

gno labore perquisierint, Turnerus in Anglia, Germania, & Italia nusquam ramen inuenit, neque ex Recentioribus aliquem legit, qui vidisse se dicat, excepto Amato Lutitano, cui tamen reuera ignotus fuit perinde ac mihi vel Marthiolo. Cepan paruum, Hetruscis *Cipolla maligna*, Romæ verò Alcaloniam dictam Bulbi esculentis speciem esse volunt quidam: Sed Amati, Lacunæ, & Marthioli iudicio falluntur: Eorumque error manifestè deprehenditur ex Theophrasto qui Alcalonium fuisseque Cepe inter Ceparum generalibro 8. cap. 4. de plantarum historia recensuit, non autem inter Bulbos, de quibus speciatim distulit lib. 7. cap. 13.

AMARUS.

Sunt etiam qui Hyacinthum comosum in Bulborum esculentorum classe ponant, sed eorum sententiam probare non possum. Huius vires Diosc. in hunc modum prosequitur, Bulbus esculentus (*βύβος ἑσκούτος*) quem edimus omnibus notus, stomacho commodus, iremque aluo, fuluus, & qui è Libya affertur. Verùm amarus, & scilla iunilis, stomacho commodior & concoctionem adiuvat. Omnes autem bulbi acres sunt, & calefaciunt, & ad Veneream concitant. Quare Martialis Poëta in Xenis;

Quam sit anus coniunx, & sint tibi mortua membra,

Nit aliud bulbus quam satur esse potes.

Exasperant linguam & Tonillas, multum nutriunt, carnes gignunt, inflationes faciunt. Idem impositi faciunt ad luxara, contusa, spicula infixa, & ad articulum dolores, gangrenasque ac podagras, cum melle & per se. Item ad hydropticorum tumores, & canum morsus, similiter cum melle & Pipere trito impositi. Cohibent etiam sudores, & stomachi dolores sedant, & fures ac vlcera capitis manantia, cum nitro affato detergunt. Purgant & sugillata & varos, per se & cum oui vitello: & lentiginem cum melle aut aceto. Contusas aures & contulos vngues cum polenta sanant. Auferunt etiam ficus, in calido cinere affati, & cum manarum capitibus vltis. Vlti verò & cum Alconio permixti ac in Sole illiti, maculas Solares & cicatrices nigras depurgant. Si verò cum aceto cocti edantur, ad rupta faciunt. Caterum copiosum ipsorum esum virare oportet, eò quòd nec tuos lædant. Hinc Ouidius.

Damnus an Libyis bulbus tibi missus ab oris.

An veniat Megaris, noxius omnis erit.

Galen. Bulbi temperamenti.

Marcellus Medicus empyticus. Vetetrum inquit cap. 12. id est bulbus, quod est genus Cepe, in aceto decoquitur, idque acetum ore continetur, vt mobilitas dentium listatur. Ceterò vt Diosc. recitanea perhibent. Cum polenta & adipis sulto coctus, appositus, tumores & tubercula compendio suppurat & rumpit. Bulbum cibarium velut omnibus notum, non describit Diosc. inquit Corn. fuluum esse, & à Lybia affert: dixisse contentus, & alterum amarum esse, & Scilla similem. Nec Galenus sexto Simpl. phar. aliud dixit, quàm bulbum qui editur, frigidiorum esse & crassorem, & viscosum humorem gignere. Nā & agrè concoquitur, inquit, & fluxuosus est, ac veneream stimulat. Impositus autem, eò quòd ammatitudinis & adstringendi facultatis particeps est, adstringit & glutinat, & nimium siccatur. Idem 2. de aliment. Editur, inquit, bulborum radix absque foliis, in vere aliquando etiam asparagus. Habet autem in scipio amaram & austeram vim manifestam. Quare etiam stomachum exolutum quodammodo excitat ad appetentiam. Nec aduertatur his qui ex thorace & pulmone

expuitione opus habent, etiam si naturam corporis crassorem & viscosiorem habeant. Verùm amaritudo resistit crassitudini; vt cuius natura est secare viscosa ac crassa. Viros bulborum diligenter præscribit Plin. lib. 20. cap. 10. Caterum bulbi ex aceto & sulphure vulneribus in facie medentur. Per se verò triti nerorum contractio, & ex vino portigini: cum melle canum morsibus. Erassitraro placet cum pice. Sanguinem idem eos sistere tradit illitus cum melle. Alifii è naribus fluat, coriandrum & farinam adijciunt. Theodoros & lichenas ex aceto bulbis curat, & erumpentia in capite cum vino austero aut ouo. Et bulbos epiphoris idem illinit, & sic hippitudinem detur. Equè vitia quæ sunt in facie, eorum rubentes maxime, in Sole illiti, cum melle & nitro emendant: lentiginem cum vino, aut cucumini cocto. Vulneribus quoque mixtè profunt per se, aut (vt Damion) ex melle, si quinto die soluantur. Idem & auriculas fractas curat, & restium piruris. In articulum doloribus miscent farinam. In vino cocti illiti ventri, duritiem præcordiorum emolliunt. Dysentericis in vino ex aqua celesti temperato dantur. Ad conuulsam intus, cum silphio pilulis fabæ magnitudine. Ad sudorem rufi illinuntur. Necuis viles: idè & paralyticis dantur. Luxara in pedibus, qui sunt rufi ex his, citissimè sanantur cum melle & sale. Veneream maxime Megarici stimulant. Hoi, tentes parum cum sapa aut passo sumpti. Syluestres interaneorum plagas & vitia cum silphio pilulis deuoratis sedant, & fatiuorum semen contra phalangia bibitur in vino. Ipsi ex aceto illinuntur contra serpentium ictus. Semen Antiqui bibendum insanientibus dabant. Diocles oculos hebetari ab iis putat. Elixos affis minus viles esse adicit, & difficile concoqui, ex vi vniuersulque naturæ.

BVLBVS VOMITORIVS Veteribus.

AT qui ab effectu, Vomitorius Bulbus vocatur, *solia* habet, inquit Diosc. multò lentiora quàm Esculentus. Radicem autem similem, cortice nigro. Qualis autè herba vomitorius sit Bulbus hodie non cuius notum ait cum Cordo Turnerus: nonnulli verò eundem censent cum radice Narcissi de quo Dioscorid. lib. 4. cap. 155.

Radix si edatur per se, & si decoctum ipsius bibatur, vesicæ affectiones sanat, & vomitum mouet. inquit idem Diocorides.

Nec miremur cum Marantha Bulbum vomitorium in cibo sumptum vesicæ malis mederi: namque id quod Græcè est *ἀντρίχου ἴσχυρος* *ἰσχυρὸν* *ἰσχυρὸν* *ἰσχυρὸν* Ruellius vertit, ea radix: manna: cum potius effect sic verendum. Hæc per se comedatur, vel vt Marcellus, quæ in cibo sumpta: eadem confusio est in Scandice, in Ornithogalo & multis aliis, quæ mandit aut Ruellius: cum potius edi vel in cibo sumi dicendū esset. Verùm cum familiare quodammodo sit Plinio, vt hoc verbo mandit vtatur pro eo quod est edere, vt in Bulbo vomitorio cuius radicem mandit ait 1. 19. c. 5. voluit Ruellius magis esse cum Plinio confusum quàm per se ipse distinctus. Galenus de hoc testatur, ipsum multò calidiorem esse esculento.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

HYACINTHI HISTORIA EX VETERVM
Sententia.

HYacinthus ait Diof. *folia* habet bulbo similia: *caulem* palmi altitudine, laeum, & paruo digito tenuiorem, viridem: cui incumbit coma incurua purpureo, flore plena: radicem etiam ipsam bulbo limilem.

Plin. lib. 21. cap. 11. Vernos flores prout citò aut serius proueniunt, recensens, etiam Hyacinthi meminit. Post hæc Gladiol^o comitatus hyacinthus inquit. Et mox, Hyacinthus maximè durat. Et hæc ex Theoph. lib. 6. Hist. stirp. transcripsit (inquit Cornar.) Sed paulò post de sito addit. Hyacinthum comitatur fabula duplex, luctum præferens eius, quem Apollo dilexerat: aut ex Aiaceis cruore editi ita discurrentibus venis, vt Græcorum literarum figura, *ω*, legatur inscripra. Hanc autem duplicem fabulam Ouidius Poëta in vnam contraxit, & *ω*, literarum figuram non Aiaceam referre dicit, sed a pollonis luctum. Sed atrescane Corn Hyacinthum plantam, Ouidius non aliam esse censet, quàm eam que à nostris Braune lilien appellatur, id est, lilium purpureæ. Et sanè tota Hyacinthi descriptio in Diof. neque in foliis, neque in caule, neque flore, neque radice, ab illo purpureo appellato Lilio ab horret. Itaque etiam Virgilio suaue rubens Hyacinthus dicitur, & mollis ab eodem appellatur, Nonit idem etiam, & in quæstionem proponit, literarum in Hyacintho figuras, dum in Palæmone sic ait.

*Dic quibus in terris inscripi nomina regum
Nascantur flores.*

Et de hoc Hyacintho Plin. l. 21. cap. 26. sic tradit: Hyacinthus in Gallia eximie prouenit. Hoc tibi pro cocco hyginum tingitur. Radix est bulbacea, mangonicis venalitiis pulchrè nota.

Quum autem Hyacinthum etiam *Vacinium* appellari, in suppo. apud Diofcor. legatur: & aliquibus *Vacinii* vox, ex Hyacintho facta esse videatur, id quod Plinius de *Vaciniis* lib. 16. cap. 18. tradit, planè ad Hyacinthum pertinet, & locum illum, quem iam citauimus de Hyacinthi in Gallia tinctura, exponit, quapropter huc transferimus: *Vacinia*, inquit, Italiae in aucupis fara prouenit. Gallia verò etiam purpurea tingendi causa, ad seruorum vestes. Vult enim Plinius *Vacinia* quæstus gratià feri in Italia. Sic enim ego hunc locum accipio, etiam Plinius non aperte *Vacinium* esse Hyacinthum dixit. Esse autem Hyacinthi syluestrem & satiuum, Theophrast. testatur his verbis: *ἐπιρροχέται ὅτι, ἢ ἀγρίων τῶν λαοῦ ἀπὸ τῶν ἰσχυρῶν, ἢ τῶν ἀγρίων, ἢ τῶν ἀγρίων. αὐτῶν ὁ ἀγρίων.* Quin & Verg. dum ait,

Et nigra Violæ sunt, & Vacinia nigra.

Et alibi,

Alba Ligustra cadunt, Vacinia nigra leguntur.

Et rursum,

Mollia luceola pingit Vacinia caltha.

Non de aliis *Vaciniis* loquitur, quàm de iis quæ & Hyacinthorum nomine veniunt. Nigra autem dixit purpurea, sicut *Violæ* purpureæ, appellantur nigrae. Atque sic modò hyacinthi appellatione vitur, modò *Vaciniorum*, pro eadem plâta. Sicut quoque Plinius eundem usum ad tingendum, modò *Vaciniis*, modò hyacintho adscripsit, diuersis appellationibus in eadem re versus, tamen tota hyacinthi descriptio in Diof. purpureo huic Lilio velut dixi, respondeat: tamè scio alios aliud hyacinthi genus agnoscere, quod nostri *Bergblumen* id est, Martios flores vocant.

Tom. II.

in multa genera distinctos. His itaque nõ repugno, sed quæ ego produxi simul expendenda citra contentione propono.

Constat igitur ex Cornario, Hyacinthi Diof., Theoph. Plinii, Ouidii, Vergilii & Galeni Braune lilien Lilium purpureum esse.

Radix cum vino albo pueris imposita, autore Vices Diof. impuberes seruare creditur. Siftit autè aluum, & vrinam ducit pota. Opiulatur quoque co morosis à phalagio. At semen maiore adstringendi vi præditum, & ipsum in theriaca medicamenta aduersus venenatas bestias commodum est. Morbum regium quoque depurgat cum vino potum. Galen. simpl. hyacinthi radix bulbi speciem præferens, ordinis primi est in siccando, secundum in frigidificando iam completi, aut etiam tertii initio. Proinde diuissimè impuberes pueros asseruare creditur imposita cum vino. Semen leniter extergit & adstringit. Quare etiam in morbo regio datur cum vino, sicca iam tertio ordine, sed in caliditate & frigiditate medio consistens. Radix ex Plinio in vino dulci illita, pubertatem coërcet, & non patitur erumpere. Tormentibus & araneorum moribus resistit. Vrinam impellit. Contra serpentes & scorpiones, morbumque regium, semen eius cum Abrotono datur. Et hæc partim etiam Diof. habet.

HYACINTHVS VERNVS BOTRYOIDES
minor, caeruleus, angustioribus
foliis, odoratus.



BVLBVS Descriptio

huic qualis Hyacintho stellari vulgato, oblongus, fibris multis capillatus, tunnicis compactus, sapore viscido & amaro: *folia* tena, nouena, dena, iuncea, carinata, striata, viridia, propter terrâ purpurascantia, *caule* palmi nonnunquam longiora: *caulis* vnius, interdum duo, dodrantales,

teretes, laues, propterque terram, vt folia, rubescentes, per reliquum herbaceo colore præditi, excepto scapo saturo caeruleo tincto, qui flores sustinet ex breuibus pediculis in racemum duas vncias longum congestos, odoratos, in vrceoli modum concauos, & corum nutantes, purpureo violaceo, oris albidis, crenatis: quorum qui extrinsecum botrum claudunt longè minores, diluioze purpurâ infecti, nulli tamen albedine oras picti, non ita mutant: sed vel surrecti, vel rectè foras prorensi coma explicata subiectos flores inunbrant. Serius hic florere quàm Botryodes, qui innox sequitur.

De hoc & similibus scribit Clusius Pann. & post. hist. Spontè plerisque Pannoniæ locis & copiosè nascitur Hyacinthus ille Hispaniis & Gallia Narbonensî vulgaris & passim obuius in

Bbb 3

grorum marginibus & secundum vias, quem ego a floribus racemi in modum extremo caule congestis *Strypsis* cognominò, nonnulli comosum minorem appellare malunt: nec desunt qui Bulbinem Plinii esse putent: Herm. hunda fnoz blauch/id est, caninum Allium: Belgæ à racemi instar congesta florum spica druyneiens appellant. Eius duo inveniuntur genera vnum crassioribus, longioribusque foliis, florum etiam, racemo longiore, dentiore, & odoratiore; alterum minora omnia habet, & magis vulgare est. Istorum duorum generum flores saturum admodum colorem habent, & quasi nigrum. Est vero & tertium genus brevioribus, latioribus, firmioribusque foliis quæ humi diffundi non solent, nec flexuosa sunt vt superiorum, sed surrecta: huius flores licet superioribus formâ similes, longè tamen aspectu hilariore, dilutioris purpure, atque in caruleum tendentis colore præditi sunt. Id genus Viennæ, aut vicinis locis spontè non nascitur, sed ex Tyrolensi comitatu delatum esse fertur. Similes porò omninò plantæ non modò Viennæ, sed etiam antè in Belgicâ è semine Hyacinthi botryoidis, laetico atque è nuco purpurascente flore (binæ eius enim inveniuntur differentia) natae sunt: & inter illas etiam quæ ramosam tulerunt florum Vuam, hoc est, quæ Vuæ in modum plures congestos habuerunt racemulos, alios alius minores & graciliores: quibus similes plantas semine albi à me communicati natas habuit plures quàm quadragenas Ill. Balthasar de Bathyan in Zolonoeh sub Martii finem florescentes, Anno 1585.

A Dodon. hist. lat. de fl. & in fol. dicitur *Hyacinthus racemosus* & inter Neotericos. i. folia quasi rotunda: flores colore caruleo, aliàs diluto, aliàs saturato: subinde candido, aut ex albedo dilutè admodum purpurascens: *Hyacinthum Botryoidem* nonnulli cognominant. Ex esulentorum bulborum genere aliquo esse videtur. &c. Verùm hoc notandum, Dodon. non distinguere *Hyacinthum* odoratù ab inodoro, sicut à Futschio exhibitò, de candido & albedo postea agemus.

Lobel. & pen. Adu. *Hyacinthus comosus minor*, Quidam Bulbinum Plinii veriorum autumat: vulgus Provincialium *Barriluz* vocat, quasi lagenulas: foliis iunceis. Addit in obsidici quoque *Bulbum esulentum*, *Hyacinthum silu. Cordi*. *Hyacinthum exiguum Tragi*. *Hyacinthum Botryoidem* Herbariorum. Item Ic. Pl. p. 107. *Hyacinthum Botryoidem vulgarem*. Et pag. 108. *Hyacinthum caruleum amicum*. Nos *Hyacinthum siluestrem Cordi* non discernimus, sicuti Gesnerus, vt & Dod. aliter sentiunt. Nec etiam cum Lobel. sentimus, hunc *Hyacinthum* eundem esse cum *Hyacintho* exiguo Tragi.

Tabern. icon. p. 625. tres *Hyacinthos* tradit, quorum primus depingitur nomine *Hyacinthi carulei minoris* Flein blau Merzen blemen, Alter p. 628. titulo *Hyacinthi botryoidis incarnati* leibfarb trauben hyacinth: Tertius his verbis, *Hyacinthus botryoides caruleus maior* Groß veyel braun trauben hyacinth. Fieri fortè fortuna potest vt his Tabernæ figuris aliqua conueniat *Hyacintho Botryoidi* inodoro, id tamen asserere non ausim, peritiores de istis iudicent, siquidem Compiler non describit nec distinguit. Gerard. cæcus, cæci ducis Tabernæ tres figuras ponit: Quarum prima *Hyacinthus Botryoides caruleus* Blaw Grape flower. Altera *Hyacinthus Botryoides caruleus maior*, Geraz Grape flower. Tertia *Hyacinthus botryoides caruleus amicum*,

Et sic coloured Grape flower.

Camer. horto *Hyacinthus botryoides odoratus Pruni odorati referens maior*.

C. Bauh. Phyt. *Hyacinthus 22. racemosus maior caruleus Botryoides Clusii*, *Caruleus amicus Lobelii*. Item *Hyacinthus 24. siue racemosus minor angustifolius primus Trago*. *Bulbine Gesnero*. *Hyacinth. vulgi* Lob. quibusdam *Bulbine coronaria* Theophr. 6. histor. pl. Variat floris colore caruleo diluto, saturato, candido, exalbido, dilutè purpurascens seu incarnato. Camer. & frater C. Bauh. hac in re longius à nobis recedunt, & à verò declinant. Sunt enim occasiones cur Tragi *Hyacinthum* & *Bulbinem Gesneri* huc nò referendū censeamus, sed ad *Hyacinthum* inodorum. Si *Hyacinthus* de quo hic agitur, solo colore ita variat cur non demonstrant: Scimus Dodonæum scribentem de hoc *Hyacintho* meminisse diuersorum colorum; verùm is comprehendit alias species quæ sub alii titulis traduntur.

Plurisque Italiæ, Germ. Galliæ, ac etiam Hispaniæ locis (experientia Dodon. ad stipulante) hic *Bulbus* exit: reperitur & in Belgio in Atrebatum ac Marinorum finibus, in syluis ac nemoribus: Folia eius qui ex Hispania in Belgiū allatus est, ante hyemem exeunt, Germanici verò ac Belgici non ante ver: flores Martio vigent aut Aprilii. *Hyacinthum botryoidem* minorem caruleum foliis angustis & longioribus habeo in horto E. C. Montbelg. à me plantatum, qui tardius floret sequenti & diutius, ac ita se multiplicat vt tandem molestus sit: non dissent meo iudicio ab eo qui Montpelij passim prouenit, floreque Lugduni in agris spontaneum vidi florètem Maio ac etiam Parauij, & in montibus Appenninis siue Bononiensibus, nec non Basileæ in hortis. Repertus etiam ad Castellum Sponeck Illust. E. VV. iuxta Rhenum, vnde in prædictum delatus hortum.

HYACINTHVS BOTRYOIDES,
vcrnus: minor, latifolius, caruleus, idoneus.



chiana demonstrat, nec caulis altitudinem attingentia: caulis singularis, tenuis, scilquialnum altus: flores sustinet racematim congestos vt superior,

Lobel. notat.

rior, sed non ut illa, odoratos, rariore, breviores, minores, magisque ventriosos, oris similiter arenatis coloratissime.

An Cordo Obsc. ylia. Hyacinthus minor globosis, concauis, purpureis, deorsu. mutantibus, & gibbosam comam constituentibus floribus in caule dodrantali brevior: foliis porro multo minoribus, radice bulbosa: floret post Veris initium. Nascitur copiosiss. in Alpium Suevicarum planis pratis, in Hassia & Wederauia.

Trag. germ. lib. 2. cap. 71. vocatur. Ein and Fnobland / Hyacinthus vernalis, Klein hunds Fnobland / Klein hyacynth. Et cap. 79. Klein frülzenen hyacynth / Et hist. lat. *Alti genus aliud, agro V. maiter, & calie familiare &c.* qui ad Rhenum habitant hunds zwibel vocant. Et *Hyacinthus vernus exiguus: omni odore destitutus: sissime nigre.*

Fuchsi hist. Hyacinthus cæruleus maior femina, Großblase merzen weible: qui nō describit nec distinguit exacte hunc Hyacinthū ab aliis.

Dodon. Gal. Bulbi efculenti genus minus, *re-rit bulbe de iarden*, fecit, figuramque Fuchsi exhibuit; qualis nostra. In postremis verbō scriptis hunc non videtur distinguere à præcedenti, uti dictum.

Gesner. horti *Bulbine* flore cæruleo.

Clus. in Pann. & post. hist. hyacinthus *Botryoides* tertius brevioribus latioribusque foliis & firmitioribus, quæ humi diffundi non solent, sed erecta sunt: flores aspectu elegantes, dilutioris purpuræ, atque in cæruleum tendente colore præditi sunt. Id genus ex Tyrolensī comitata delatum esse fertur.

Camer. horti hyacinthus botryoides alter minor inodorus, cæruleo, incarnato & albo flore. Sic ne? Camerariōne vnum? hyacinthus albus & cæruleus. Nos quidem cæruleum ab albo separamus, de quo postea.

C. Bauhin. phyt. hyacinthus 23. siue racemosus minor latifolius cæruleus femina Fuchsi. Item hyacinthus 25. siue racemosus latifolius floribus dilute purpuræ, Botryoides tertius Clusio, incarnatus Tabern. Nos quoque Clusii & Fuchsi eundem hyacinthum facimus.

Hyacinthus minimus vernus Botryoides cæruleus. Montb. proremit spouté, translati in hort. C. W. citius floret præcedenti, folia etiam non reinet tam diu. Geneue idem fortè in segetibus ultra pontem *Arue* floret Aprilī. Ludt hic Hyacinthus foliis quæ interdum latiora, potiss. vbi aduitoria & culta: folio lato ex hortis Basil. misit Fr. C. Bauhinus.

nulla exalbida, brevis, cum stilo viridi, vix in conspectum venientia.

Clus. in Pann. & h. ait hyacinthus *Botryoides* lacteo flore, à superiorib. florū formā non differt, sunt. n. concaui & tumetes, nulla tamen, vel perquam exigua odoris gratia commendabiles. Is etiam in duas species distingui potest. Vna enim lacteum omnino florem habet, caulem exalbida, foliaque dilutius virentia, & quasi pallidescencia: tota etiam planta tenerior, nec nisi primo vere, folia protrudit. Alterius Hos niueo quidem colore præditus est, sed cni perfusa videatur tenuis quædam & diluissima purpura, qualis in gosis albis nondum planè expanthis, præsertim circa vngues: hæc vetustate & marcescente flore

intensior redditur: caulis è viridi purpurascit, folia viridiora sūt, & infima parte quodammodo purpurascencia.

Omnium semina in triangulis quibusdam vaticolis continentur, totūda, nigra, exigua: omnium etiam radix plurimos exiguos nucleos in ambitu generare solet, nulla tamen



abundantius quàm duorum priorum. Florent vt plurimum Aprilī, interdum etiam Maio, si Vernum tempus ob præcedentis hiemis asperitatem ferius incipiat. Lactei prior species olim nobis communicata à C. V. Alphonso Pontio, memini in Baldo monte erutam à Stud. osis quibusdam ex Italia reducibus Viennam adferri: Altera ab amplissimo V. Cortuso Dipcadi albi nomine in Belgicam missa.

An Cordo obs. filia. hyacinthus minor candidus, minori purpureo similis, maior paulò nascitur in Hassia & Wederauia, sed parcius quàm purpureus.

Lobel. Obs. pag. 55. *Dipcadi candidis floribus varietas gemina.* Dodon. in folio, *hyacinthus Neotor.* i. flore subinde candido aut exalbido dilute admodum purpurascente, Itatorum plerique Dipcadi appellant. An Camer. horti. *hyacinthus Botryoides minor in albus flore albo.* Tabern. icon. & hist. *hyacinthus Botryoides albus lacteus. weistrauben hyacynth.* Casp. Bauh. Phyt. *hyacinthus 26. siue racemosus albus tertius, vel lacteus vel minus diluissima purpura perfusa, vel ex cæruleo virentes.* Gerard. hist. *hyacinthus botryoides lacteus white Grape flower.* Figuram habet Tabern. ac præterea alium habet Hyacinthum, de quo sub maximo botryoides.

Habeo in horto H. E. C. missum Sturgardiæ per Clarissimum virum Dominum Schwartz horti medici præfectum.

HYACINTHVS BOTRYOIDES ALBVS.

HYACINTHVS Botryoides albus ex bulbo mediocriter magno & fibroso, albo, tunicis compacto & gustu nonnihil viscido, subacri, tandem & subamaro, folia profert quaterna palmaria aut paulò maiora, latiniscula, carinata, herbaceo colore virentia, in quorum medio statim à radice surgit, Cauliculus palmari rarò maior, teres, læuis, ex viridi luteolus, florem sustinens, nonnihil odoratum, in racemi morem congestum, ex flocculis multis rotundis, candidis, formā florū Ericæ, terram spectantibus, leuiter deductis oris in sex labella extrorsum reflexa diuisis, ex brevissimis albis pediculis: in medio sena flami-

HYACINTHVS AUTVMNALIS
minimus, & maior.

Descriptio



tum florere incipiunt, reponit. Verum quidem est hanc plantam, florere incipere antequam folia emergant: sed alio loco Tiphii inter aestiuos flores meminit: quæ nota huic non conuenit.

Dodon. de flor. *Hyacinthus quintus, qui serotinus est.* *Hyacinthus autumnalis.* In fol. p. 219. *Hyacinthus autumnalis minor.* Gesner. horti ex sententia Coldenbergii. *Hyacinthus autumnalis.* Lobel. & Pena. Adu. & Ic. pl. p. 102. *Hyacinthus autumnalis minimus sed pulchellus.* Et C. Bauh. Phyt. *Hyacinthus. 6. sine autumnalis maior Clusii.* Item *Hyacinthus 7. sine autumnalis minor.* Gerard. Angl. *Hyacinthus autumnalis venter hyacinth.* Item *Hyacinthus autumnalis maior.* Gerard. venter hyacinth.

Primum in hottulo duntaxat aluit Clusius, spontè natū non vidit maturius minore florentè, interdum uel sub Iulii finem, vel Augusti initio. Alterum ante 40. annos in vicinis Monspelio colliculis florentem sub initium Septembris eruebat; deinde Madritanâ Parisiorum siluâ eâ parte quâ ad Bononiensè cœnobium uergit, areno-

fo solo & salebroso: postremò Salmantica proximis colliculis ad flumen Thormim sitis, lapidoso admodum solo. E Veroueni Agro nullus fuit Lobelio: plurimus postea etiam Lutetia Patifiorum, Narbonæ ad Aquas Marianas, & ad Cellam nouam Montpelii visus nobis glaucosis; asperis, Autumno incunte, non Vere. Maior in pensillis Belgii hortis aluit. Florentem circa Aurumnū vidimus in sylua propè Montpelium. Tiphium Theophrasti Dalech. nobis visum Sturgardie.

HYACINTHVS MAXIMVS
Botryoides, comâ cærulea.

colore obsoleto, concaui, ab angustiore basi quâ pedicello semunciali appenditur, sensim dilatata, vix tantillum hiantes oris in sex obscure partitis, ut ditiusculter conspici possint latentes apiculis cinerei: fastigium autem thyrsi in comosam iubam cæruleo purpuream, longis pediculis concoloribus explicatur: odore nullo eccellente, plerumque flores abundant pulnere fuliginoso. Amara est hæc planta.

De hoc Hyacintho scribit Clusius. Hyacinthi primi Matthioli, siue comosi maioris à quibusdam cognominati, qui in multis Orbis Christiani prouinciis spontè nascitur, duo in Pannoniis genera obseruabam. Alterum præcox latiore folio, crassiore comâ, ineleganti tamen, angustiore bulbo. Alterum magis serotinum angustiore folio, tenuiore comâ, laxiore verò & elegantiore: huius flores comæ proximi, ex cæruleo purpurascunt, eiusdemque cum coma sunt coloris, quæ nota in priori desideratur: bulbos etiam minor. Præcox Maio, hoc Iunio, floret. Semine autem ex Hispaniis anno 1575. Hyacinthi Orientalis Hispanici nomine misso cuius tamen duo esse genera statim deprehendi, nam magnitudo dispar erat [Viennæ Austriae bulbaceæ plantæ mihi natæ sunt, quæ tandem duo Hyacinthi comosi maioris genera pepererunt, à vulgaribus nec florum coma, nec foliis differentia, nisi quod alterius folia latiora & Muscari foliis proxima incunte Vere duntaxat emergere solebant, alterius angustiora longioraque, etiam antè hiemem: minutius semen Hyacinthi comosi maioris æmulum erat, alterum crassius

EX cepacco bulbo folia D. aliquot interdum scapo longiora, & plusquam semunciam lata, castia, per terrâ sparguntur: inter quæ surgit caulis singularis, duas spirithamas longus, nondum exiccatis floribus in pyramidalem thyrsum defuens, qui ubi expansi fuerint, longius inuicem abiunguntur,

Mus-

Muscari femini perquam simile, quæ ad eam causam fuit, vt separatim sererem. Illud autem peculiare in nonnullis, vt præmaturi flores excussi, nigrum siue fuliginosum pollinem spargant vsilagini ferè similem.

Hyacintho syluestri Cordi addita est figura Tragi, cum his verbis Gesneri: idem est ni fallor aut planè cognatus hyacinthus maior Tragi & Fuchsi, cuius iconem addimus quanquam cæruleis floribus, cum Cordus suos purpureos tribuat. In alia annotatione est scriptum verus est hyacinthus Medicorum. Nascitur Schenberge bey hetzeth: vbi Braunlinct appellant. A Cordo in Dioscor. hyacinthus, quem medici intelligunt. German. Breiſling vocatur. Ibidem quidem annotauit Helueticis vt quidem aiunt, nescio quibus Colrosce.

Tragus Germ. lib. 7. cap. 70. Groß hyacinth. Et cap. 79. die vierden / Bauris Sew zwibel: Idè in hist. lat. Hyacinthus maior Bauaris Sew zwibel, hoc est, Cepa fillia.

Fuchsi. hyacinthus cæruleus maximus. Et icon. hyacinthus cæruleus mas maior Großblaw Merzenblumen mennle. Denegato vadimonio præceptorem nostrum vltro dimittimus, vt qui indistinctè de Hyacinthis scripserit, nec certè demonstrat, quis verus sit Antiquorum hyacinthus, hinc, vel stellatus maximus Matthioli. passim, hyacinthus uetustis Cipollæ Canina.

Dodon. Paneratium interpretatur herbam quam Fuchsius exhibuit pro Hyacinthi genere, quod Gesn. audit Monspessuli Ophioscorodon existimari à doctis, & vulgè Allium Caninum nominari. Lacun. Paneratium & Sella minor. Dodon. Gall. Cap. des d'odone. Bulbus esculentus, Germ. hunds knoblauch. Belg. hunds loof. Gall. Hyacinthus comosus spurius, sine tertius Neororicorum. Anguill. vt existimat Bulbi esculenti sunt hodiè pèti, pro hyacintho. Clus. hist. post. vulgarem vtrumque (Hyacinthum comosum maiorem) Vngari appellant Kygno hâgyina serperus Cepam. Belgæ Brabant, Quispel, hoc est, Aspergillum, propter comam aspergilli instar expandam, Hispani Aio de ciguonnas, hoc est, Alliû Ciconiarum. Non desunt qui Pericarpum bulbû Plinii esse censent, cuius duas species esse dicit lib. Nat. Hist. 25. cap. 10. cortice rubro alteram, nigro papaueri similem: sed ex tam mutila descriptione, quis sententiam comodè ferre queat? Illud autem vetè dicere potest Clusius, nullum vnquam bulbum se gustasse, qui maiorem ad vomendum vim ipsi fecerit hoc Hyacintho maiore qui in esculentorum bulborum classem ponitur. Lobel. & Pena Adu. Hyacinthus comosus Dioscor.

Tabern. icon. & hist. hyacinthus maior, Großser hyacinth oder merzen blumen. hyacinthus purpureus magnus peregrinus, Großser purpurs braut freinde hyacinth. Compilator uarietate rerum obrutus nudam proponit figuram cuius hyacinthi nescio pro peregrino.

I. Gerard. hyacinthus comosus, Faire haire Zaccint. hyacinthus comosus albus, wire haried Zaccint. Gerardus quoque more suo quæcumque mutans binas figuras Tabern. habet: sed colorem alium tribuit: ac præterea ponit ex eodem Tabern. aliam figuram pro Hyacintho albo de quo post, lector ista diligentius seruetur & lucem adferat.

Camer. horti. hyacinthus comosus maior siue serotinus, & minor siue præcox. Crescit in aruis passim in Italia. Anguill. Bulbû propriè esse dictum

volebat, & in Græcia adhuc vocari Cepam Boninum.

C. Bauh. hyacinthus racemosus maior. An Bulbine Plinii lib. 20. cap. 9. & lib. 19. cap. 5. Huius, inquit, genera duo. primum procerius latiore folio, crassâ comâ, maiore bulbo pingit Lob: Obs. p. 55. alterum angustiore folio, comâ tenuiore, minore bulbo pingit idem Lob. icon. p. 106. C. Bauh. vt patet hyacynthos duos racemosos tradit ex Lobel. cui tamen prior figura in Obs. nò placuit, quia in illa non nutabat coma, ideòque aliam curauit parandam & in iconibus priorem omisit, referuatè postremâ, si duo existimasset genera vtramque vt existimo retinisset. C. Bauh. apud Matth. hyacinthus. hyacin. sylu. Cordo.

C. B. vobis

Lobel. Italie, Narbone, reliquæ etiam Gallie tepidiori abundè in satis & viarum marginibus prouenit. In agris Monspessuli & Genue in segetibus & pratis, ac inter Ferrariam & Bononiam. Bononiæ in horto Nobilis di Gonzadinis in stramator florens Aprilis. Item spontè in montibus Apenninis siue Bononiensibus è regione portæ S. Mamma. In cacumine montis Vendra propè Balneum Aponense inueni in fine Februarii: vidi etiam Patavii in horto Nobilis à Pasqualigò. Basileæ in horto D. Doctoris Fælicis Plateri, Repertum cum flore mense Iunio inter Chemilli & Vestutium in Burgundia, euulsi & plantam Montbelgardi in horto Ill. E. C.

Locus & Tempus

HYACINTHVS ORIENTALIS QVIBVS DAM CONSTANTINOPOLITANVS.

Hyacinthus quem Orientalem, nonnulli Constantinopolitanum, appellant, radice est bulbosa magna, gustu viscido dulci, cui subsunt fibræ longæ, teretes, mediocriter crassæ: A qua exsurgit caulis singularis, dodrantalis, lauis, teres, foliis nudus, ad imum diluto virore pallescens, supernè fulcus, micans: à cuius rædio ferè ad summum seapum prodeunt semuncialibus pediculis ex viridi subnigris, deorsum mutantibus appenti flores tres, 4. & 5. ad vndecim aut duodecim & plures, odore suauis, hilari, cæruleo, aut mixto, aut rariùs albo, omninò spectando colore, vnciales, teretes, concavi, campanulari quodammodò æmulis, in sex lacinias profundiusculas diuisi, stammina luteo puluere conspersa, breuia, penitus recondita continent: folia tria, quinque, sex à bulbo statim exorta, colicolum ad summum vs-

Descriptio

Hyacinthus Orientalis flore maiore.



ad summum vs-

Hyacinth. minor Polyanthes.*Hyacinth. Orientalis Polyanthes foliis.**Hyacinth. Orientalis albus.*

superabat, sed folia firmiora erant, caulis e-
giam inter illa prodiens maior, crassior vi-

que fastigium nonnunquam comitantur, alias citrà desinunt, latiuscula, carinata, inferne herba; ceo colore, propius cacumen saturatius virentia. Succedit capitulum tricoccon ceu Lathyridis (sive Cataputia maioris). Vnum genus fert flores maiores, colore etiam à minore variante, putureo quidem: aliud minores, verumq; modò plures modò pauciores: quod minores, idipsum quoque plures ferè fert, licèt etià interdum duos aut tres.

Quandoquidem autè *Cultus* horù Hyacinthorum discrimina diligenter obseruauit, luber totam historiam ex eo ponere. Præter Hyacinthum Orientalem inquit, qui omnibus satis notus est, cuiusque florem coloris intentione vel remissione admodum variare deprehendi, (nū totus quasi caruleus, vel subcineraceus, vel dilutiùs purpurascens & hilaris, aut saturatè purpureus & ad violæ nigre ferè colorem accedès inuenitur) in meo hortulo albam, cuius bulbus reliquorum magnitudinem non admodum

cenos aut plures flores proferens, aliis quidem similes: sed ex cineraceo quodammodò purpurascens, omnique in vnū latus propendentes, reliquis non minus odoratos: semen in triangulis capitibus minus altero. Huius femine nata mihi est planta *πολύανθος*, cuius caulis cubitalis, crassus, firmus, anno 1587, decem & septem flores habuit, non eiusdem cum matre coloris, sed purpureos floridiores, & sublis binos ramulos, quorù

Hyacinth. Orient. purpuræ rubens.

singuli quinis floribus erant onusti: sequente tamen anno nudum tulit caulem pauciorisq; flores, cum longè plures expectassem, quandoquidem primo factu tam fuisset fertilis. Verùm diligentissimus & eruditionis non contemnendæ la-cobus Plateau mihi scripsit, Hyacinthum alere se valdè amplis foliis, magno, crasso, firmoque caule, multis floribus prædito, colorem non addidit, sed iconem mihi Hyacinthi polyanthi maioris nomine insignita: qualem hic exprimi curauimus. Habeo quidem vnam stirpem valdè lato folio & saturatius virentem præditam, cuius caulis etiam crassus, firmusque, sed in ferendis floribus par-cior, vt pote qui plures dens non det, colique non ad latus vnum spectantes & conuersos, sed omni latere æqualiter quasi spartos, saturatius purpurascens, capita enim saturatius virentia, quasi purpuræ insperso colore. Ceterùm, quod silentio minime premeendum duxi, Generoso Wolfgango Christophoro ab Entzeltorf, femine à me communicato natus est Hyacinthi bulbus, qui Aprili mense anni 1582, florere cepit, & sequentibus annis similes primis flores proferre non desinit. Eius folia aliis similia sunt, paulò tamen dilutiùs virentia, inter quæ caulis emergit satis firmus, lenos, septenos aut plures (habui enim duodenos & quatuordecim) interdum flores proferens crassiusculos, interiore parte omnino niueos, foris etiam albos, sed quorum externa tria folia ad *ὄχρῳ* colorem quodammodo accedunt, non minus tamen odoratos quàm superiores Hyacinthos: his succedunt trigona capita dilutiùs virentia, semen etiam nigrum continentia: radix satis crassa, candicans, multis fibris donata. Anno porro 1587, Bizantio accepit Generosa D. Vngnadin magni muneris loco, & pro hyacinthis niueo flore, quatuor exiguos bulbos à reliquis discretos, quorum duo candicantes erant, alii dilutè purpurei & coloris admodum floridi: vtriusque generis vnum mihi dedit: purpureum vtrique subsequens hiems corripuit, tamen mei magnam curam habuerim, alter paucos dedit flores eoque omnino niueos, altero minores, vt etiam tota planta multò tenerior & infirmior est. Diuersus autem ab vtroque qui pro albo

Hyacintho hætenus est habitus, eiq[ue] vnicâ
 stirpem à C.V. Alphonso Pantio missam albat
 in pensilibus hortis Il. Jo. de Brancion, cùm Vi-
 nâ enocatus sum ex Belgica: cuius postea plures
 bulbos Vienna illi misit, nam istis fatis frequens
 erat, cùm valde sit liberalis in sobole generanda.
 Sunt verò illius flores antequam explicentur, al-
 bis, sed aperti oras tantum albas habent, reliquâ
 parte quasi carni coloris, cùm tamen fenescere
 incipiunt, ferè toti niuci sunt. Tutæ omnes
 hyacinthos hætenus acceptos *Zambul* appella-
 tione miserunt, additâ voce Indi, cùm Indicum,
 vel alia quapiam, cùm locum vnde acceperint,
 indicare volunt. Florent omnes Aprili.

Huius itaque hyacinthi variae sunt species,
 quarum unam hyacinthum Orientalem flore
 maiore vocare solemus, quæ modò plures, mo-
 dò præciores habet flores purpureos, cæruleos-
 que. Huius iconem desumpimus ex Camer. Epit.
 Alterius autem siue hyacinthi minoris Polyæthes
 ex Placon. pag. 105. Tertius id est, hyacinthi Ori-
 entalis Polyanthos foliis, Figura est ex Cluf.
 Hist. post. pag. 175. Quartus est hyacinthi Ori-
 ent. albi, quæ exstat in Icon. Pl. pag. 05. Quintus
 denique est hyacinthi Orientalis purpureo
 rubei, quem depinxerunt Ic. pl. pag. 104. An-
 guill. hyacinthus Theophrasti & Dioscoridis,
 Tertius *Zembeleuder*. Aliud hyacinthi genus quod
 Orientale appellare placuit misit [Matth. in Dio-
 scor. cum magn. figuris] Cortusius, quod sibi mis-
 sum ex Orientalibus regionibus fatebatur, quod
 hyacinthus Orientalis *strembder* hyacinthi cog-
 nominatur. In Epit. cum Camer. Icon. Figura
 siue quæ ponuntur à Camer demonstrant hya-
 cinthum maiore & minore flore: sed secunda
 non respondet figuræ Matthioli, quæ nihil aliud
 meo iudicio quam Ornithogalum inaius album,
 ut suo dicitur loco, exprimit.

Dodon. de fl. hyacinthum quem Italia & Bel-
 gium Orientalem nominat, folia habet piugui-
 ora & latiora, caules crassiores, flores potentiores
 maioreque, ac citius procedentes. Item in fol-
 iorum vnus maior, plures profert flores: alter
 minor pauciores. Figura, quas proponit Dodon.
 non displicent quamuis minis exactè distinguar
 plantas.

Lob. & Penæ Adu. hyacinthi Orientalis Græ-
 ci varietas quam Indi *Zumbel* vocant, caulem
 habet Serpentariæ modo maculosum, & tortilia
 folia.

Tabern. ic. & h. *hyacinthus Orientalis caruleus*,
 blauer *strembd* hyacinth. Item: *hyacinthus*
Orientalis maior Polyanthus: Gesulter *strembd*
hyacinth.

Halepi cùm esset Rauvvolf. obseruauit prin-
 cipio Februarii aliquot hyacinthi species, potif-
 simum Orientalem quem vocant *Zumbel*.

Camer. hort. *hyacinthus Constantinopolitanus*
Diosc. *hyacinthus Orientalis*, albo cæruleo flore,
 itémque purpureo. Turci vocant *Zembul*. Item
hyacinthus Arabicus à D. Aicholsio communicatus.
Zumbal Arabibus. Nos Arabicum quoque
 hoc capite ponimus, quia nondum nobis constat
 quantum differat à cæteris, & quia teste Rau-
 vvolfio cæteri hyacinthi Orientales ita dicuntur.
 Lob. etiam vt antè demonstratum vt memi-
 nit etiam *Zumbel*, an idem cum hoc nescimus.

I. Gerard. *hyacinthus Orientalis caruleus the*
blew Oriental Jacint. Item *hyacinthus Oriens*.
Polyanthos Double Oriental Jacint.

C. Bauhin. Phyt. *hyacinthus n.* siue Caule ser-
 pentariæ instar maculoso, Matthiolo *Orientalis*

alter, Lobel. *Orientalis Græcus*. Et *hyac.* 12. siue
 Orientalis purpureus Lobel. purpuræ rubens.
hyacinthus 13. siue Orientalis albus 1. Orientalis
 albus. Et *hyacinthus* 15. siue Orientalis maximus.
 Matth. *hyacinthus Orientalis* Lob. *Oriens maior*
Polyanthos. Tandem *hyacinthus* 17. siue *hyacin-*
thus Arabicus Cam. Nostro iudicio si quid suspi-
 candum ex nuda Matthioli figura, suspicor Mat-
 thiolo hyacinthum Orient. alterum potius cum
 maiore Lobelii conuenire quam primum, & pri-
 mum Matthioli potius quadrare cum Lobelii
 Orientali Græciæ.

Idem C. Bauhin. apud Matth. *hyacinthus Orien-*
talis, *hyacinthus* caule Serpentariæ. *hyacinthus*
Orientalis alter Matth. siue maximus [sed figuræ
 transpositæ erant, figuræque mutila. Matthioli
 figura hyacinthi Orientalis non demonstrat plâ-
 tam, cuius figuram ex Tabern. ponit. mihi Mat-
 thioli hyacinthus ille est Ornithogalum maius
 album, vt iam dictum, foliola quæ appingit ad
 singulos pediculos longiusculos, & aliam diffe-
 rentiam manifestam demonstrant ab hyacintho
 Orientali maximo, nec figura Matthioli inutilis
 est, vt quis existimet, si sumatur pro Ornithoga-
 lo dicto.

Orientalem siue Constantinopolitanum hya-
 cinthum cùm essemus in Italia vocabant *Zemle-*
erder, vidimus Veronæ in orto Nobilis di Mu-
 scardo. Ferrariæ in orto Principis mense Ma-
 io nobis ostendit ipse Anguillara iam desore-
 scentem, & in quo capitula incipiebant prodi-
 re. Bononiæ in orto Nob. Alpassel. Parmæ in
 orto Nob. Antoni Lalata, mense Aprili desho-
 ruerat. nunc etiam vidimus in orto Priuli &
 Pasqualigo Patavii. Genæ in aliquot hortis vt
 in nostro etiam mense Februario flores incipie-
 bat protrudere & folia. Montebgardii Genæ
 allatum prorupit Ianuario in orto nostro: trā-
 stulimus in hortum Il. E. C. Wittomb accepimus
 etiam à D. Landtrauium flore albo. Basileæ apud
 Doctorem Felicem: Nunc in orto Ill. E. C. ali-
 quot species habeo maiorem purpureum cæru-
 leum & album.

Locus &
 tempus

HYACINTHVS BRVMALIS ALBVS.



Louanio
 Lad nos
 (inquit Lob.)
 primùm mis-
 sum hoc hya-
 cinthi Orien-
 talis venustif-
 simum & ra-
 rum genus à
 D. prof. Regio
 D. Cornelio
 Gemma, ico-
 ne & oratio-
 ne scitè ex-
 pressum &
 descriptum.
 Eius bulbos
 Infulis ad me
 postea misit
 amicus singu-
 laris Ioannes
 Baillet, Mer-
 cator Insula-
 nus. C. Gemma-
 rum hoc profus
 videtur ar-
 que exoticon
 hyacinthi
 genus: nam
 et si folio-

Descriptio

rum formâ & florum cum aliis plerisque conueniat, id tamen sibi vendicat singulare, quod statim sub Solis hibernum tropon sub tertis erumpat, caulem quoque protrudens interdum per medias niues. *Florem* venustissimum laxat circa principia Ianuarii, vt apud me iam ter quaterue floruerit à fine Decembris vsque ad medium ferè mensis Martii, non sine maxima patet admiratione & aspectantium voluptate. Non gaudet humidis locis, sed ab humore prius quam frigiditate corrumpitur: ideoque & in terra fidelius asseruatur: semen tamen aut bulbi germen hæcenus ab eadem planta impertare non potui, quod florum illa nimis præcipitata petrusio facit. Sunt illi *folia* non vt cæteris laxa & mollia, sed succulenta, spissa, ac ferè semper erecta, vt in generibus Aizoï. Nera in his nulli conspicui: sed stræ solummodo rectæ ac veluti tenues fibræ. Durant autem virore constante vsque ad finem Iulii mæsis, ac multò diutius quàm cæteris vsu venit. *Flos* leui caule, nonnihil circa fastigia ad pediculos singulos excauata, propter candidus, nonnihil tamen sub initia, & circa supremas oras quiddam subcaruleum præseferens, quo quidem euanescente sensim Februario mensè totus fit lacteus, odore fragrantissimus, in ea specie deinceps mensè plus integro perfectans. *Radix* bulbosa, intus candida, foris ruffa, circa foliorum exortus maculas quædam, quales in Serpentariæ maioris caule spectantur, effundit, interfula purpura nigra. Verùm id maximè sub Veris auspicia, & cum tetra rufus mandatâ caulem emeritum gerit.

Lobel. append. & Icon. Pl. *Hyacinthus brumalis*, *Orientalis albus*. C. Bauh. Phyt. *Hyacinthus* 14. siue *Orientalis albus alter*.

HYACINTHVS MINIMVS

serotinus flosculis Hyacinthi Orientalis.

Descriptio

HYACINTHVS Lobel. Ad. pat. 2. minimus serotinus elegans, facie Orientalis Hyacinthi, sesquipalmates & spithameos tenuissimos caulos edit, tribus flosculis è gracilibus petiolis, ex ceruleo dilutis, senis caruleis venis striatis, hyacinthi Orientalis similibus, sed longè gracilioribus, minoribusque, sex paritis oris sub finem Maij præditos. *Folula* angusta, sparsa, spithamum longa, hyacinthi Autumnalis maioris quadrantenus. Paruulus item *bulbus*, albidus. Alicur in sicilibus à D. de Franqueuille ex Gallia delatus, & acceptus ab honestissima matrona vxore D. D. L' Aoust, tanto florum amore capta, vt sibi meritò Flo: ræ nomen vendicari.

HYACINTHVS ODORATISSIMVS

dicitur Tibcadi & Muscari.

Descriptio

HYACINTHVS Tibcadi dicitur bulbo admodum magno, albicante, multis tunicis pertexto nititur, gustu amaro, cui apposita fibræ pauca quidè, sed crasse & longe, quæ Clusio perennes, nec singulis annis matescunt & pereunt, vt hyacinthorum, Narcissorum, Tuliparum, Liliorum, & multarum aliarum bulbacearum stiptium fibræ: *folia* quinque aut sex dodrantalia & longiora latitudine ferè vnciali, sex striis per longum discurrentibus, crassiusculis, carinata, satis crassa

& succulenta: *caulis* singularis, teres, satis crassus, nudus, admodum infirmus pro sua



crassitudine: hunc à medio ferè ad summum racematim coherentes ambiunt *flores* botryoides, quorum colores sic tradit Clusius: Imtò interdum purpurascetes aut virides, deinde ex purpura viuentes, aut ex vitiditate sibilicætes, non nunquam subcarulei, aliquando nigricantes imtò, siue saturate purpurascetes, de-

inde pallidi vel flauescetes, vel ab initio pallidi, postea flauis, postremò vbi tabescere incipiunt nigricantes aut pulli, siue mucrone quàm in aliis crassiore aut obtusiore interdum, qui matescere incipientes, gratissimum moschi ferè aut aromaticum odorem referunt, licet qui flauo colore est, grauius quidpiam & Narcissinum quodammodò spirer: intelligo & niueo flore, atque etiam egregiè rubente inueniri. Flores sequuntur capitula prægrandia triquetra, & veluti pinnata, in quibus semen nigrum rotundum. Clusius ait se obseruasse interdum hanc stirpem caulem in binos ramos diuidere, quorum singuli multis floribus onusti fuerint.

Matth. in Comment. Ital. & Lat. cum magnis fig. *Bulbus vomitorius*.

Dodon. de floribus, *Hyacinthus alter* quidam *spurius*, Matthioli pro Bulbo vomitorio depingere videtur, nullis interim notis eum delictibus, nullis testimonis aut rationibus sententiam suam astringens. In fol. *Hyacinthus spurius Recentiorum alter*. Dodon. vò penè euenit quod reprehendit in Matthioli, delictiprio ita icinua, vt difficile sit agnoscere de quo hyacintho tradat nisi in post. histor. lat. fig. apposuisset.

Lob. obl. *Dispeda Chaledonum* & *Ital. rum*. *Bulbus vomitorius Matthioli*. Item Icon. pl. 109. *Dispeda Chaledonum* & *Muscari Clusii*. Tabern. icon. & histor. *Hyacinthus botryoides Chaledonius muscatus*, fremden rauben hyacinth. Gerard. *Muscari Clusii*, Ein Colored graspfloer. C. Bauh. phyt. *Hyacinthus* 27. siue *racemosus Muscariis*, *Bulbus vomitorius Matth.*

Clusius: E vicinis Constantinopoli hortis vltima Bosphorum in Asia sitis primum nostræ Europæ communicata est hæc planta. hyacinthi species odoratissima Nobili viro D. Antonio Cortusio *Tibcadi* Arabibus dicta. In principio Martii florebat Patavii in orto prædicti. Montbelgardi in orto E. C. per Fratrem C.

Bauh. missum ex Italia, & per Landgrauium habuimus copiosum.

* * * * *

HYACINTHVS ODORATISS. TIBCADI
luteus.

Clusus nullam particularem ponit Muscari flavo flore descriptionem, licet iconem habeat.

In Exot. part. 2. Append. 2. annotat quae sequuntur: In illis plantis Muscari quae flavum proferunt florem, discrimen quoddam observabam.



Nam ea quae pallidas ab initio proferunt florum gemmas ante hyemem plerumque germinare solent, & praecociores producant flores, quam illae, quarum gemmae ab initio nigricant, aut saturius purpurascunt. Ex illis autem femine natas mihi esse plantas memini, quarum flores colore non referebant ma-

tris flores, sed alium quandam peculiarem nanciscabantur, ex viridi scilicet flavescetem: matris tamen florum odorem retinebant.

Tabern. Icon. & hist. hyacinthus borryoides Chalcedonicus luteus, frembder gel trauben hyacynth. C. Bauhin. Phyt. hyacinthus 28. siue racemosus muscatus luteus. I. Gerard. Muscari flavum Vellav muskodd grape flower/ Lobel. ic. Pl. pag. 109. Dep. ad flavum siue Muscari Constantinopolitanum siue Chalcedonicum T. cut. 145.

Vidi Studgardiae in horto Ill. C. Wirtemb.


HYACINTHI TIBCADI LVTEI VARIE-
tas siue Muscari lutei praecox.

Mediocrasti Mattiacorum (inquit Lob. Ad. part. 2.) in stirpium exoticarum ditissimoviridario D. Cornelius Corne alebat, Martio flores laxans, initio subcaeruleos: Aprili vero aureos. Folia minimè sparsa aut procumbentia, vel alterius flavi Muscari sed Tibcadi floris caerulei modo erecta. Caetera eadem.

HYACINTHVS STELLATVS BIFOLIVSET
trifolius vernus dumetorum, flore
caeruleo & albo.

Ex radice bulbofa, oblonga, fibrosa, alba, gustanti viscida & subdulci, exit coliculus iunctus, fragilis, palmaris & pedalis, fuscus, radicem vertus exalbidus, duobus foliis, interdum tribus, longiusculis, carinatis, à bulbo statim exortis, stipatus, qui in pediculis pro florum numero plures paucioresve ad duodecim nonnunquam, nunc breviores, nunc longiores, recetes divariantur, licet aliquando ipse coliculi scapus flosculum singularem gerere reperiat: flores pul-

chri, caerulei, rariùs albi, stellati, sex foliolis distinctis, angustis, mucronatis, confertis, in quorum medio staminula sex diluco caeruleo sustinent capitella faruatiùs tincta, pistillum turgidulum mucronatum concolorem circumstantia: at si flos albus, tum staminula quoque alba apicibus luteis praedita pistillum albu ambiunt: succedit capitulum, in quo semen Trago autore fuluum, Milio simile. Clusio in triangulis vasculis non atrum, vt caetera hyacinthorum genera, sed fuscum duntaxat & ueluti fuligine infectum. Icones quas proponimus sunt ex Fuchsiis quas emimus, flores in iis non bene picti.



stelle formam decussatis, stellati cognome apud rei herbarie studiosos inuenit, is videlicet qui caeruleo est flore in quo varietatem etiam observabat aliis floribus magis saturis & ad violaceum quasi tendentibus, aliis ad carneum colorem proximè accedentibus. habet autem ipsa planta vel terna folia, vel plurimum bina, ut etiam illi bulbi quos Neapoli Francosurtum ad Clusium mittebat Ferdinand. Imper. Qui albo est flore, spontè nascentem nusquam videre ipsi contigit, sed binos aut ternos eius bulbos Francosurti accipiebat manere D. Philippi Stephani Sprengeri Pharm. Palatinalis Heidelbergae: aliu deinde exalbido & veluti cineraco subcaeruleo flore praeditum, Lugduno Batauorum missum à N. V. Ioanne ab Hogelände. Superioribus autem generibus maturius floret, & in triangulis vasculis semen fert, non atrum, vt caetera genera, sed fuscum & tanquam fuligine infectum cui non valdè dissimile: etiam est illius semen, qui albos proferit flores. Viennenses porrò Matrone cum qui caeruleum habet florem, Blay baldrian appellant, quasi caeruleum Liliu conuallium: nam Oenanthen vulgò Liliu conuallium dictam, ipse baldrian nuncupant: Belge à

Tempus

Nomen

Oenanthe
Lilium conuallium

Ccc

*Narcissus
stellatus
in aeneo
deff. annis.*

stellato flore *Strecken* vocant. Sed & Hyacinthum stellatum vulgari aliqui forma siudem reperiri audir, quorum alter flores proferat, suauiter rubentes & quali carneo, alter, flauos: illos autem videre nondum ipi contigit.

Icon Clusiana sub titulo *Hyacinthi stellati* albo flore apud Lobel. obs. p. 53. Et icon. Plant. p. 99. est sub titulo *Hyacinthi germ. Lilj-flori* siue Floris Martii stellati, *Narcissi carulei* Boeckii: sane placet icon pro caruleo & albo, quia quod animaduertimus non differunt nisi colore. *Brückel. T. 1. Rhapf 33. & 4. p. 150. Narcissus Martius.*

An Cordo herba *Narcissi*, caule dodrantali, flore est in lateralibus pediculis cado, stellato, aut cruciformi, odorato: radice bulbosa, *Norimbergae* in horto *Ollingeri*.

Non vult litigare *Tragus* an hi bulbi, vel *Narcissi carulei* & albi, blo *hornung blumen* blo *mergen blumen* siue referendi ad *Bulbos vomitorios* aut *Narcissos* vel *Hyacinthos*. Figuram vnicam habet *Tragus* quae minus placet.

Fusch. hist. Hyacinthus caruleus minor. Hyacinthus albicans seu foetina. Item icon. Hyacinthus caruleus minor inas, flein blau mergen blum mennele. Hyacinthus caruleus minor famina, flein blau mergen blum weible. Hyacinthus nitens weiß mergen blum.

Gesner. horti. Bulbus quidam sive Hyacinthi species, vt multi putant. In car. plant. Vaccinium, Hyacinthus, sive blaw mergen blumen. Item Hyacinthus, Latinis (vt quidam volunt) Vaccinium, Blaw hornung blumen / Ein hyacinthen geschlecht.

Lobel. & Penz. Adu. Hyacinthus Germ. Liliflorus, Angl. Our lardice flour. Doctiss. quidam cum Fuschio Poëtico Hyacinthum diuinabant. Sed eius effigiatuta congruentius multo Dioscoridis Hyacintho quam Poëtico foret, flores carulei purpurei. Item obs. Hyacinthus Liliflorus stellatus, flos martius stellatus Germ. Hyacinthus bifolius Theophrasti, Belg. Streckens. Et Icon. Plant. p. 99. Hyac. Germ. stellatus, Narcissus caruleus Boeckii. Aduerf. part. 2. Hyacinthus Germanicus stellatus.

Can. horti. Hyacinthus stellatus flore albo & purpureo. I. Getard. Hyacinthus stellatus Fusch. Starvie Sacinth. Narcissus caruleus Boeckii.

C. Bauh. Phyt.

Hyacinthus 1. caruleus siue trifolius. Hyacinth. 2. siue primus albus Narcissus candidus Trago. Hyacinthus Germ. stellatus albicans serotinus Lobel. Et Hyacinthus 3. siue caruleus alter bifolius Tab. icon. minor: Dodon. Satyrium 2. Dubito an Tragi planta eadem sit cum Lobeliana, quia Tragi solet cum alio florere & flores habere albos, qui sex foliolis constant, Lobelij verò serotina flore albicante pingitur cum foliolis 5. tantum. Nullam praeterea video occasionem separandi Satyrij secundi Dodon. ab Hyacintho stellato priuo, ipsemet Dodon. in potremis non separat.

Locus. & tempus.

*Norbonae montosis arduis, Geneuae aut Heluetiae & Germaniae in campatribus & iuxta sepes, Lobelio, nascitur, flore caruleo, purpureo. Hyacinthus Camer. stellatus flore albo & caruleo. frequens in Duc. Vvitemb. creber, vt Fuchsius quoque meminit & Cordus Tubingae in siluulis inuenitur. Nascitur in nemoribus: atque hinc est quod Galli apud quos, Plinii testimonio, eximie prouenit, vt Ruellius autor est, nemoralem & agrestem Cepam nominent. Et eius certè magna est copia Veneto tempore in nemoribus haud procul a vico *Luschnaw* iuxta *Tubingam* sito, vt vel etiam ex natali satis constet*

flores hos quos pictos exhibet Fuchsius esse geminos Hyacinthos. Vere prouenit mensibus nimirum Februario & Martio *Theopl. 1. 6. hist. c. 6.* hinc *Martius* flos dictus, eum itaque tempus etiam conueniat nemo est qui deinceps veros esse Hyacinthos dubitare merito possit.

Et loco & tempore Fuch. asserit non dubitandum de suis pictis Hyacinthis, verum non demonstrat, qui sint ex iis, qui in Ducatu *Vvitemb.* vel in *Gallia* proueniant, hinc apparet finitas argumenti.

Cronemb. Satyrium verum colligitur in tractibus siluosis & arboribus confitis ex quibus nos olim frequenter etiam, ac maxime circa *Hellen* eximium *Holandiae* oppidum.

Hyacinthus stellatus verus modò bifolius modò trifolius à me obstruatus inter *Balneum Aponense* & *Arqua* & in monte *Venda*, & *Patauii* in horto *Nob. Pasqualigo* florens in fine *Februarii*; *Monspeli* allatus ex montibus circa *Gangem* mense *Aprili* cum foliis latis, radice bulbosa, & floribus caruleis multis ab inuicem diuaticatis cum pediculis satis longis: *Geneuae* copiose in colle circa *Castellum la Bastie* florens *Martio* mense, è regione *Champvitra* fluiuium *Arue* in siluosis locis mense *Februario* folia protrudens, & circa finem *Februarii* florere incipiens, ac ibidem non solum colore caruleo, sed etiam pulcherrimo niuco: nec video differentiam quam coloris: inueni etiam *Montbelgardi* ac habeo plantatum in horto *Il. E. C.* qui passim prouenit, vt in colleundo *Vauiaucourt* & in nemoribus versus *Arbouans*.

HYACINTHVS STELLARIS Albicans Serotinus.



Scribit Lobel. in Append. Hyacinthus stellaris albicans serotinus. Serius floret & folia exiliora habet, flos aspectu iucundus albicat. In Belgium delatus è Biscaya montibus, & muncere missus à Mutone. Item Icon. Pl. p. 100. Hyac. Germ. stellatus albicans, Tent. 136. Item Aduerf. part. 2. Hyacintho Germ. stellaris congener Hyacinthus serotinus albicans è Cantabria montibus delatus, cuius ciliogis Icon. p. 100. exprimitur. Septenis floribus & pleribus aspectu iucundissimis in hortis D. I. Someri & D. Iacobi Tibii: albis floribus variare memini & luxuriare cum hyacintho Stellati Bizantino à Clusio descripto radice foris nigra, flore praecoci. Item Hyacinthus stellaris albicans Botanicorum effig. icon. p. 100. A stellae instar radiatis floribus ab herbarum cultoribus sedulis vocatur Stellaris aut Stellatus Hyacinthus, floribus albis amoenissimis septenis & pluribus in horto

horta Someri variat. Lobel videtur mihi obscurus: Cur in post. Animad. bis mentionem facit Hyacinthi stellaris, hyacinthi albicantis: cur bis reperit descriptionem hyacinthi stellæ cum albis floribus, suum albicantem pingit cum floribus quinque, vnum autem flos pingitur quinquefolius, an veraciter nescimus, stellares dicti solent esse sex foliis.

C. Bauh. Phyt. existimavit eundem cum Tragi Narcisso candido, quod nobis non videtur, non ramen negamus eum quem describit in Adu. postremis floribus albis eundem esse cum Tragi Narcisso vt ante dictum.

HYACINTHVS STELLARIS VERNVS paruulus, flore ex cæruleo cinereo.

Per similes
autore Lob.
Adu. part. 2. par-
uulus Hyacin-
thus stellaris
Vernus, etiam-
que stellatis
Hyacinthis con-
ger pumilio,
nouus indictus
hyacinthus, Ló-
dini hoc mense
Aprili 1605, in a-
menissimo &
exoticarum stir-
pium ditissimo
hort. C. V. D. Io.
Coys, cuius sæ-
pe meminimus,
flore laxavit re-
nos aut quater-
nos, stellatos, ex

cæruleo cinereos, senis foliis, totidémque staminulis & apiculis cæruleis obscuris conflatos: pistillo in medio cum umbone aut apice ex cinereo cæruleo. Vix palmaris plantula est, solum angustis, vt cærulei ameni floris paruuli Hyacinthi Botryoidis surrectis, minoribus tamen gracilioribusque, quaternis aut quinis, è quorum medio cauliculus prodit. Radix parua, alba, oblonga, parum fibrata, quâ vt & plerisque aliis nouis Plantis ex Galliis delatis Georgius le Seigneur Britanniam ditauit.

HYACINTHVS STELLARIS MAIOR.

Hyacinthus stellaris maior, auctore Lobel. Adu. par. 2. omni sui parte duplè maior hyacinthi stellari Germanico. Matiacis Medioburgensibus botanicis Belgis innotuit opera D. I. Someri, quem in hort. Magni Ducis hetrurix nactus est. Flores intensioris purpure: Radicis bulbosus albet.

HYACINTHVS STELLATVS astius minor.

Quum primùm è terra, inquit Clus. prodit hæc planta septena aut octona à radice pro-
mit folia angusta, plana, viridia, & quodammodo splendens, circiter septem uncias longa, quæ se humi diffundunt, & in orbem spargunt, at-

Tom. II.

que veluti contorquent: inter quæ assurgit cauliculus teres, breuis, binarum unciarum longitudinem non excedens, summo fastigio senos aut septenos stufculus alternatim ferens, veluti spicam congestos, iis formâ & colore panis similes, quos profert hyacinthus stellatus astius, cuius paullo antè meminimus, sed longè minores: his succedebant triangula etiam capitella extremo mucronata, nigrum semen continentia: radix erat bulbosa, ferè orbicularis, crasse Auellanae hispanica magnitudinem æquans, candida sed fuscâ membrana recta, è cuius infimâ sede numerosa exiliebant fibrae, magnâ ex parte valdè tenues, iis ramen admixtae septena aut octaua paullo crassiores. Florebat Maio mense cum maiore. Vnicam huius generis plantam, eamque ab arboribus accipiebam anno Christi 1603, à Nicolao le Quille siue Quelt Gallo rhizotomo cum bulbo vnifolio, & aliis quibusdam à Lusitania, vt asserbat, petitis.

HYACINTHVS RARVS.



Radice ni-
rur hya-
cintus nobis
rarus dictus,
bulbosa, ma-
gna, fibris do-
nata, alba, ali-
cubi purpura-
scente, sapore
sabdulci, visci-
do, & nauco-
so: folia à ra-
dice quina aut
quaterna, per
terram sparsa,
vnciam lata,
Hyacin. stella-
ti siue dume-
rorum latio-
ra [à quo differt,
licet affinis]
sunt longitudi-
ne cubitali, ca-

Descriptio

rinata, striata & splendens: caulu tenuis v-
nus vel duo, interdum quaterni, cubitum alti,
alii palmum, sesquipalmum, & palmos duos ló-
gi, purpurantes, nitentes, angulosi, flores sustinent
in summo fastigio, quaternos, quinque, senosque, à
lateribus ex foliis sex compositos, sublongis, acu-
minatis, cæruleis, vel potiùs violaceis, vngue
albicante, decurrente per longitudinem linea fa-
turariore viola tincta, ita à se inuicem ad pedi-
culum vsque distantibus, vt radiatam stellam æ-
mulentur: medium occupat capitulum rotundum
canaliculatum, Pisi parui magnitudine, album,
loculamenti summum rudimentum, quod ordine
circumstant staminia rigidula, sena, violacea, circa
imium albicantia, è medio autem capitulo stilus
violaceus emicat: pediculi, inferiorum quidem
florum plùs quàm duas uncias longi, purpuran-
tes, splendidi, surrecti, superiorum verò vix cul-
mum latum longi, mediorum medio modo se ha-
bent.

Hoc Hyacinthi pulchrum genus attulit nobis Locus
Frater Casp. Bauhinus ex Italia, collectum Pa-
tauui in hortu Treuisani: ex bulbis à nobis satis
in hortu Ill. nostri Principis, flos emicuit Aprili
mense. Frater nobis retulit D. Cortusum no-
minare hyacinthum nondum descriptum cum

Ccc 2

hoc bulbo magnam affinitatem habere videtur hyacinthus Stellatus Byzantinus Clusii: cui an utriusque bulbosa plantæ nota fuerit differentia statuito.

HYACINTHVS STELLATVS
Byzantinus.

Descriptio



H yacinto nostro raro, in multis correspondente tradit Clusius hist. post. nomine hyacinthi stellati Byzantini; de quo ille ait, quater-na aut quina sunt folia humili fusa, longa, carinata, dilute virentia, hyacinthinis adeo similia, ut antè quàm florem conspicerem, hyacinthum esse crederem: inter hæc emerit di-

gitalis ferè longitudinis, gracilis, & infirmus *canticulus* priorè anno ternos sustinens flores, altero quaternos aut quinos, sex foliis constantes, diluti carulei coloris, inodoros, qui Solis radiis illustrati instar florum hyacinthi stellati vulgaris sese explicarunt, & exalbida sex staminula ostenderunt, quorum apices purpurei, stilo in medio eorum assurgente: successerunt triangula capitula, qualia in vulgari, sed inania, ut *semen* observare nequiverim: *radix* bulbosa est, non magna, nigro cortice tecta, & fibris subris prædita. hunc Bulbum Byzantio acceptum cum aliis stirpibus Francofurtum ad me mittebat anno 1590. Generos. Domina Vngnadin nomine adscripto *susam guile*, quâ appellatione initio Lilium Susianum insignitum, deinde, Iris illa bulbosa præcox, quam Matthi olus pro *hemodactylo* Constantinopolitano exhibuit, Dodonaus pro *Iride tuberosa*. Flores mihi protulit Aprilis cum aliis hyacinthis.

tempus.

Lobel. Adu. part. 2. p. 485. *hyacinthus stellatus Byzantinus à Clusio descriptus*. Videtur idem p. 486. eundem tradere his verbis: *hyacinthus stellatus Byzantinus tenuifolius præcox: effig. rar. pl. p. 184.* Affinis stellari hyacinto Germanico, foliis & effigie: sed minore vnciam longo, paruum digitum crasso bulbo: flores itidem stellatos, obsolete cartuleos tenui superiore caule fusos, Martio & Aprilis laxar in hortis cultionibus Botaniceis. Dubium nobis est de quo hyacinto stellari Byzantino scribat Lobelius: ille hyacinthus stellaris Byzantinus cuius meminit Clusius in post. hist. p. 184. non est tenuifolius: nec Clus. ait ei tenui folia.

HYACINTHVS STELLATVS
Bizantinus alter elegantiss. serotinus, bullarus.

Descriptio **H**ic præcoci deflorescente Hyacinto stellato longè elegantior, nitidus, stellatus, caruleis,



ditissimo Nobiliss. Baronis D. Eduardi Zouche, Cambriæ magni Præsidis, vnde quidam alii postea habuerunt. Lob. Adu. part. 2.

HYACINTHVS STELLATVS
multiflorus cineræci coloris.



ci ferè: inter quæ prodit *canticulus* palmaris, virenos, tricenos aut plures interdum flores, spicæ vel Væ instar, congestos ferens, seu foliolis constants, medium occupante vmbone siue capitulo, ex sex staminibus, non secus ac in Hyacinto, qui stellati cognomen vulgò obtinuit, sed longè dilutioris, & veluti ex cartuleo cineræci: *floribus* succedunt capitula trigona *semen* continentia: *radix* bulbosa est, candida, instar radicis Hyacinthi Belgici. Floret cum vulgari, hoc est, sub extremum Martium, vel etiam Aprilis: paullo tamen secius vulgari &c. in Exot.

Hyacinthus stellaris Bizantinus vel exoticus Someri inquit Lob. Ad. par. 2.]atà depressa spicâ

fastigiatus, hyac. stellatus Cineracei coloris apud Clusum. Effig. Rario. Plant. pag. 184. Iam septenis & pluribus annis elapsis altera Stellati hyacinthi exotici noua species nobis Medioburgi innotuit operâ eiusdem Domini de Somer, qui prius bulbum eius in Belgium attulit. Facie totâ, sparsis foliis, & cauliculo Spithamæo quadantenus hyacinthum Belgicum vel Britanicum æmulatur: sed umbellæ instar initio stipitum stellati subcærulei pallidi flores, Plantaginis rosæ modo in latam expressam aut aliquantulum depressam spicam, & tandem in longam fastigiati. Apud Britannos hortensis hodie, & bulbo propagatur operâ D. de Francque ville in orto Medico Nobiliss. Baronis Eduardi Zouch magni Præsidis Cambriæ siue Walliæ.

crasso digito penè longâ, atque in profundum se mergente, vt aliquoties in aliis etiam hyacinthorum generibus obseruare memini.

HYACINTHVS BIFOLIVS THEOPHRAST. Lobel.



Lob. H. Belg. Descriptio Blauer Meybloomfens. Et Icon. Pl. pag. 100. hyacinthus bifolius Theophr. Teut. 137. C. B. Phyt. hyacinthus A. siue bifolius Theophr. Lobel.

HYACINTHVS STELLATVS ÆSTIVS.



Hoc hyacinthi genus ait Clus. Exot. part. 2. Append. 2.] suis floribus onustum, primam Maio mense anni à nato Christo 1606. conspiciebam in cultu. horro perurbani & ornati Viri Lopez eius Leydani, quod è Lusitania allatum esse asserbat: dein de illo ipso anno videbam

etiam in hortis Ioannis ab Hogelande, & Christiani Porreti. Quam autem neque eius iconem, neque historiam quispiam hæcenus (quod equidem sciam) exhibuerit, operæ pretium me facturum arbitrabar, si in hoc appendice proponerem.

Erant autem hæc planta quaternis, senis aut pluribus foliis prædita, viridibus, carinatis, palmum longis, satis angustis, humique quali in orbem stratis, alioqui satis firmis, instar foliorum hyacinthi illius stellati qui cineraceos flores profert, superiore capite descripti, inter quæ assurgebat palmaris cauliculus satis firmus, sustinens oblongis periolis inter appendiculas purpurascens prodeuntibus, denos aut duodenos profert ex cæruleo purpurascens, nullius aut certe perexigui odoris, sex foliis constantes, umbilicum occupante vinbone, siue capituli rudimento nutronato, cincto sex staminibus ex albo purpurascens, quorum apices cærulei: fiebant tandem ea capitula triangula & mucronata, qualia ferè in Hyacintho Belgico siue Anglico: quæ maturitate deficiente, semen continere deprehendebantur rotundum, nigrum, splendens, hyacinthi Belgici siue Anglici semini protus simile: radix erat bulbosa, penè orbicularis & candicans, infimâ siue sessili parte in ambitu frequentibus & tenuibus albis fibris in latera se se spargentibus donata, & interdum vnâ etiam

HYACINTHVS COMOSVS BYZANTINUS candicans cum staminibus purpureis.



Quæternâ, inquit Clunus, quina aut sena interdum habet folia, humi vt plurimum fusca & expansa, nonnunquam procumbentia duntaxat, oblonga, hyacinthi primi Marth. foliis valde similia, latiore tamen mucrone prædita, & in lateribus veluti renui lanugine oblita, præsertim infimâ parte, circa eorum

exortum, ingrati gustus & nauscam facillè excitari: ex horum medio pedalis, nonnunquam maior, nascitur caulis, teres & rotundus, nudus, inus fungosus, foris viridis lauisque, quem à medio ad summum sexageni plerumque, aut plures ambiunt flores oblongiuculi, otis in sex laciniolas diuisis, sex staminibus purpureis inus præditi, in odori, initio candicantes, deinde cum marcescere incipiunt, fusci & inelegantis coloris: pediculi quibus flores nituntur, initio breuissimi sunt, deinde paulatim marcescentibus floribus excrecentes, quatuor vnciarum aut amplio-

rem longitudinem adquirent, sic ut rotus caulis suis floribus ita expansis onustus, aspergillum nõ minus referre videatur, quam Hippuris quoddam genus: caulis suprema pars cum florum pediculis purpurascit: incipit florere ab imis: trigona deinde capitula fert, exigua, pro plantæ amplitudine, in quibus paucum semen, interdum in singulis capitulis vnicum dicitur, rotundum, nigrum, Hyacinthi comosi maioris semine minus continetur, interdum nullum, nam vt plurimum capitula inania sunt, nec arbitratu vnquam Clusius plura collegisse ex vnica, quam habebat, plantâ, ternis seminibus, aut [quando plurima] quinis aut senis: radix rotunda, bulbosa, multis candidantibus tunicis constat, exteriore subfulca, & basi multis fibris fulta.

Nomina

Quo nomine à Turcis insigniatur, me later: nam Muscan bulbis temper permixtus fuit: ego propter comæ & florum quandam cum comoto maiore Hyacintho similitudinem, *comosum Byzantinum* cognominavi. C. Bauh. Phyt. *hyacinthus* 21. siue *racemifolius albus alter*. *hyac. comosus* Clus. in Pann. & hist. post.

Natales.

Circa annum 1578. primum allatus est Constantinopoli cum aliis varii generis bulbis Mag. V. Paulo à Trauhon Cæsareæ aulae Mariscallo & à secretiore Consilio, in cuius suburbano paucos bulbos videbat Maii initio florentes anno M.D. XX. Ex eodem tempore nullos millos meminit Clusius, præter vnum aut alterum, duntaxat semel atque iterum: quia forsitan non experitur, cum nullâ floris elegantia sit præditus.

HYACINTHVS COMOSVS ALBVS
cum cæruleis Staminiibus.

Descriptio



HYACINTHVS
generis
[Hyacinth. comosi] alius inuenitur [teste Lob. Appéd.] in hortis quibusdam Belgarum, *his* quidem similibus, sed flore albo, intus cæruleis staminiibus decoratus, radicis tunicæ minimè rubent, Hyacinthus comosus albus. Item Icô. Pl. p. 107. Teur. 144. Pann. lib. 2. c. 15. & post.

hist. l. 2. c. 28. Hyacintho comoso Byzantino non admodum dissimilem & in Belgicâ, & Viennâ aluit Clus. nullâ aut perpulsillâ comâ præditum, cuius flores obsoleioris coloris albicantis, Byzantini floribus satis accedunt, pediculi tamè flores sustinetes, in longitudinè non excresecunt, semè & radix satis conueniant. Vulgare eius nomen, *Hyacinthus comosus albo flore*. Nisi Clusius eandem iconem cum Lobelio haberet, dubitaremus an Lobelii & Clusii descriptiones eiusdem essent

plantæ.

Camer. horti *Hyacinthus comosus leucanthemos*, & semine Italico [Norimbergæ] natus. C. Bauh. Phyt. *Hyacinthus* 20. siue *racemifolius albus* 1. Lobel. *comosus albus*. *Narcissus montanus albus cæruleis staminibus*. *Narcissi montani iuncifolii minimi genus alterum Lob. obs. in appendice sine icone*. Lobel. non vocat in append. plantam, cui tribuit cærulea stamina Narcissi montani iuncifolii minimi genus alterum, nec est sine icone: Adest enim icon sub titulo Hyacinthi comosi albi: bis igitur eandem rradit C. Bauh. plantam diuersis locis.

In Italia agentibus inuenta est Hyacinthi species in monte Gilbi, bulbosa planta foliis prædita Hyacinthi dumetorum quaternis, palmâ longioribus: inter quæ caulis surgebat dodrantalis, summo cacumine flores multos gerens, quo modo à Lobelio pingitur Hyacinthus comosus albus, radix bulbosa alba. Similis etiam ex Italia per Fratrem C. Bauh. ex Italia innominata delata. Eandem non asserimus.

HYACINTHVS AFFINIS PLANTA.

An Bulbus Eriophorus Peruanus.



Crasullus, cuius scapus magnum profert pediculorum quadrantalium, circa exortu viridiu, superius purpureorum numeru: quorum vnusquisque florem fert maiusculum purpureu, floribus Hyacinthi nostri rari similem, quinque foliis longiusculis constantem, apicibus mediu obtinentibus. Succedit tandè feminu conceptacula, rotunda, crassiuscula, in stilum definentia: porrò singulorū pediculorum exortui ligulae adnascuntur vt in Ornithogallo, longæ, albicantes & pellucentes.

Pulcherrima hæc plâta Ludgundi demonstrata fuit sicca, per Baronem quandam Germanum redouit.

redentem ex Hispania ex qua curauimus depin-
gendam. Sunt ab eo tempore quo primam curauimus
depingendam plantam modo descriptam, circi-
ter 40. anni, quam anno 1608. Hyacinthi Peruu-
iani nomine donata planta de qua mox, à qua
non ausimus hanc diuertam aut eandem pronun-
tiant: Considerandum etiam quantum nos-
tra hæc planta à Clusii Bulbo Eriophoro Perua-
no in cuius iconè ligule pediculis apparent [quas
ipse Clusius appendiculas vocat] differat.

Sic autem Bulbum eriophorum Peruanum
describit Clus. lib. 2. cap. 23. Elegantiſſ. Eriopho-
ri genus ab eruditiss. Viro D. Simone de Tour
Medico hispalense anno 1596. accipiebam nun-
quam antè mihi conspectum quod iam descrip-
to adiungendum putauimus. Multa id ex radice pro-
mit folia, succreſta inuicem, deinde in terram sese
inclinantia, densa, carinata, instar foliorum hya-
cynthi, viridia, splendentisque, quæ minutim
contracta, tenuissima stamina præbent, haud se-
cus ac primum genus. Inter hæc folia sesqui-
pedalis nascitur caulis, teres interdum & gracilis,
firmus tamen, nudus, virescens, qui summo fas-
tigio plurimos fundit flores, inuicem quasi in spi-
cam congestos, deinde ab infimo sese explicare
incipientes, & in latitudinem expandentes, qui sex
foliis stellatis decussatis consistere deprehenduntur,
coloris purpurei, circa umbilicum autè
cærulei, vt & prominens vincto, atque fena quæ
illum ambiunt stamina lata, flauis seu palli-
dis apicibus prædita, singula florum folia per
longitudinem secante vena ex atro purpureâ, o-
dor valde tenuis & exilis: oblongis verò gracili-
busque innituntur flores pediculis ex viridi pur-
purascentibus, quorum singuli ex appendicula-
rum candidarum & membranacearum sinu pro-
deunt: floribus successerunt trigona mucronatâ-
que capitula, semen continentia rotundum, ni-
gri, semini hyacinthi Anglici seu Belgici par:
bulbus eius crassus, longiusculus & quodammodo
pyramidalis, ex albo flauescens (cuius squamæ,
perinde ac in priore, molli lanugine plene) infi-
mâ sede multis crassiusculis fibris prædita: flo-
ruit extremo Maio insequente. Ceteram cum
diligenter hæc stirpem considerat Clusius, & cū
hyacinthi stellati Peruanici iconè confert, pluri-
mis notis conuenire comperit, & illâ ipsâ iconè
hanc stirpem, aut illi parem, expressam esse, pe-
nè sibi persuadet: illud solum interest quod iconi
folia non carinata, sed medio nervo prom-
berante, & subleuata adspiciunt, tum radix ni-
mis obtusa mucrone. hanc ob causam Lectori
optionem relinquit, vt quo loco volet, iconem
adaptet. *Eriophorum* Laniferi nomen huic bulbo in-
ditum, ob tomenti copiam, quòd lanæ modo in
stamina diduci possit.

gis cærulea vel purpurea: intus apices cærulei sex,
in quibus minima capitula lutea, & in medio sti-
lus cæruleus, cui subest rudimentum siue *capitu-
lum seminum*, Floris sapor non manifestus, nisi
fortè non nihil acris & viscosus. An hic hyacin-
thus diuersus sit ab hyacinthi affini planta non-
dum asserere possumus, magna certè similitudi-
ne. Quicquid tamen sit pictura Hyacinthi Stel-
lati Peruanici Lobelii Aduers. alt. part. benè cõ-
uenit & no-
bis placet, ex
qua duos flo-
sculos tan-
tùm accepimus, vnum a-
pertum & a-
lium clausum.
Hyacinthi
stellati Per-
uani, ex Per-
uano Orbe
exemplar ad
Clusium mi-
sit Nob. vir
Carolus de
Tassis, quod
lata, crassa (vt
ex iconè ani-
maduertere
licuit) habuit
folia, Hyacin-
thi Orienta-



lis, seu potius Eriophori bulbi, foliis similia, hu-
mi, magnâ ex parte, sparsa, & viridia, inter quæ
prodiit nudus caulis, virescens, summo fastigio
multis floribus, spicæ in modum simul congestis,
omnibus, qui ab imo sese primùm explicare inci-
piunt, instar Scille, Ornithogali & similibus: pe-
diculi oblongi, ex atro virescentes, ex gracilium
& exiguorum foliorum alis orti flores sustinent,
sex foliis stellæ instar expansis constantes, purpu-
rei foris coloris, intus ex purpurâ cærulei, vincto,
queinadmodum in vulgari, floribus umbilic-
um, cum sex staminibus illum ambientibus, oc-
cupante. Fuerit ne aliquo odore præditus is
flos, aut in semen abiit, nondum intellexi: ra-
dix bulbosa, crassaque instar radicis Hyacinthi
Orientalis, fusco colore prædita foris, & multis
crassiusculis fibris ab ima sede prodeuntibus fir-
mata. Icon quæ proponitur à Clusio, antè ab
eo etiam posita fuit pro Eriophoro Bulbo Per-
uano.

HYACINTHVS ANGLICVS SIVE BELG.

Hic folia quatuor, & plura, caule longiora,
repanda, caulis è bulbo vnicus, dodrantalis
exurgit, colore & crassitie Hyacinthi Orienta-
lis: flores odorati, cærulei seu violacei, penduli,
octo aut nouem, non eodem tempore se panden-
tes, non nigri, vt in Orientali, quanquam tales
obiter intuenti videri possent, sed ex squamma-
tim incumbentibus & subeuntibus sex foliis, o-
ris multum reflexis, quibus adnatæ sunt fibre lu-
teæ ad albedinem tendentes, compositi: in quo-
rum medio stilus tenuis, triquetrus, cæruleus, pe-
diculo serè vnciali, cui appositâ ligula violacea
pediculo longior, ad medium vsque florem per-
tingens. Semen atrum, reliquorum hyacintho-
rum instar.

Descriptio

HYACINTHVS PERUVIANVS.

Sturgardie in horro Junii principio floruit
Hyacinthus Peruvianus dictus speciosus ad-
modum flore, Folia supra terram serè sparsa, di-
gitum circiter lata, penè glauca, vncias quatuor,
vel palmum longa, sapore viscido. Caulis palmo
non multò maior, rotundus, crassus, firmus: flo-
res à medio caule inumeri prodibant, cum al-
ternatim ambientes, ex pediculis oriundi, trium
serè unciarum, cærulei vel purpurascentes, qui
consistunt ex sex foliis, sublongis, in acutum de-
cussatis: in quædam parte linea, siue costa ma-



xi, colore vt plurimum carulei, subinde albican-
tes: aut candidi siue niuei, aliquando etiam Vio-
lae nigrae dilutam purpuram referentes: semen in
siliquis triangularibus paruum, rotundum. Radix
bulbosa, candida, perennis, lento succo, vti &
tota herba, plena.

Dodon. Gall. Hyacinthus, *Iacinte*, quibusdam
Belg. *Blaw* & *Neyle* comfena. Clus. Pann. p. 197.
Hyacinthus Belgicus siue *non scriptus* Dodon. Et
hist. post. *hyacinthum non scriptum* Dodon. non
modo circa Macliniam & Bruxellas non pos-
tremas Belgicae vides in pratis quibusdam & sil-
uulis nascentem conspexi: sed in Galliae parte,
Belgicae vicinae, vulgo Picardia dicta in siluulis
erui dum Lutetiam proficiscerer: nusquam tamé
abundantiùs, quàm in pratis herbidiisque locis
Londino vicinis, & etiam longius ab ea vbe dis-
sitis, vbi eruere memini qui cubitali constarent
caule, & tricenos haberent flores, modo inten-
sius purpurascetes, modo dilutiùs, aliquando
etiam omninò niueos (quales etiam apud Bru-
xellas nasci solebant) vel media ex parte pur-
pureos, altera candicantes: sed carnei coloris e-
tiam inueniti, non modo ad me perscriptis hone-
stus vir & diligens Pharm. Iacobus Garcus iu-
nior Belga, verùm etiam binos eius bulbos pos-
tea misit, quorum alter corruptus, alter elegan-
tè carnei coloris floribus auctus est. Iconem à
Dodon. & Lobel. propositam, Clusius ponit sub
ritulo *hyacinthi hispanici* de quo mox.

Lobel. & Pen. Adv. *hyacinthus Angl. Belg.* *hyacin-
thus Bruxellensis*. Magna huic cum Fuchiano
affinitas, sed conspicua florum discrepantia. Sem-
per in folliculo herbaceo artum, Nigellae, vel
Cerae. Obs. *hyacinthus Anglicus & Belg.* Icon.
Pl. p. 103. *hyacinthus Belgicus candidus*. Adu. 48.
Teur. 104. Camer. hort. *hyacinthus Belgicus*. Tab.
icon. & hist. *hyacinthus Anglicus* weisser *Engl-
scher hyacynth*. C. Bauhin. Phyt. pag. 47. *hyacin-
thus* siue oblongo flore caruleo, Lob. Angl. &
Belg. subinde albicans aut candidus: aliquando
Violae nigrae colore. Item *hyacinthus*, siue ob-
longo flore albo, Lob. Belgicus candidus, An au-
tem *hyac. Belg. candidus* differat à candido An-
glico dubito, facile mihi persuasum eandem
plantam, variantem tantùm colore & effigie.

I. Gerard. hist. Angl. lib. 4. cap. 70. *hyacinthus
Anglicus*, *Blew* & *Englisch haredels*. Item *hya-*

cinthus Anglicus albus, *Withe* & *Englisch haredels*.
Figura albi Hyacinthi ex Tabern. omninò displi-
cet.

Hyacinthi Anglici nomine Tossanus Carolus
Pharm. misit bulbù qui platurus in horto Il. prin-
cipis Montbelgardi floruit eodem anno. 1. Gar-
gillus misit mihi ex Anglia flores siccos cum his
inscriptionibus, *hyacinthus Anglicus incarnato
flore* indicatus vt reor. 2. *hyacinthus Anglicus
niueus*. 3. *hyacinthus Anglicus ceruleus*. In Bel-
gio in aruis & iuxta agrorum margines, fructibus
aut arboribus consitos: & praecipuè quidem pro-
pè Mechliniam urbem vbi copiosus nascitur, flo-
ret Aprilis & Maio mense, Dod. Nusquam ter-
rarum graminosi saltus & prata vberiori scaent
copia, quàm in Anglia: Lobelius.

HYACINTHVS HISPANICVS.

Hyacintho, inquit Clusius hist. post. non scri-
pto valde abimilis non est *hyacinthus his-
panicus*, *folia* tamen profert non adeò splen-
dentia, nec humi strata, sed potiùs surrecta, bre-
uiorem *caulem*, *flores* dilutiùs purpurascetes, &
ad caruleum colorem quodammodò tendentes,
quorum odor etiam magis obscurus: *semen*, *ra-
dix*, ferè conueniunt.

Floret eodem tempore cum Dodonaei non
scripto, nempe sub Aprilis finem & Maio. Hunc
in hispanicà meà peregrinatione non obseruaui,
sed paucos antè anno. e Belgica missum accepi à
Generoso Dn. du Longatre, *hyacinthi hispanici*
in odori nomine. Vnde porro ille habuerit, mihi
incompertum.

HYACINTHVS STELLARIS CINEREVS.

Hyacinthus Stellaris cinereus acceptus à N.
le Quelt, Rhizotomo Lutetiano, mihi nò-
dum floruit: prouenit prope Fonteyn Gallaciae.
Quam plantam intelligat Lobel. Adu. altera par-
te perpendendum: antè vnum tradidit *hyacin-
thum stellatum* Cineracei coloris apud Clu-
sium in post. hist. quantum autem is differat non
demonstrat, quanquam suspicemur, consideratà
descriptione Lobelii *hyacinthi totius albi* siue
Campanilla, hunc *hyacinthum* pertinere ad *hya-
cinthos Belgicos*.

HYACINTHVS TOTVS ALBVS:
Campanilla.

Hyacinthus totus albus Campanilla: Con-
gener fortè aut idem cum superiore (ci-
nereo) qui flores summo caule vno versu
aut ordine vti Gladiolus profert. Radix alba,
hyacinthi stellaris. Oritur iuxta D. Oue Lusitaniae:
Gallis s. *Yual*: nobis nondum floruit. Lob.
Adu. part. 2.

HYACINTHVS FLORE RVBRO

Hyacinthus quidem est flore rubro elegans,
in Lusitania propè Cogny, flores siccatos
vidit Lob. Adu. par. 2. operà Nicolai le
Quelt Botanici.

HYACIN.

C. E. not.

HYACINTHVS OBSELETIOR

Hispan. Anglico similis.

Hyacinthus obsoleto coloris hispanicus ferotinus Clusii Pân. & hist. post. quina aut sena habet *filia*, oblonga, carinata, succi plena, coloris ex cineraceo virelcentis, Muscari foliorum æmula ferè, angustiora tamen, flexibilia, orbiculato ferè mucrone, candidà venâ interiore parte per longitudinem excurrente, ingrati saporis: prodiit *caulis* è medio foliorum, pedalis longitudinis, vel etiam amplior, gracilis, firmus tamen, nudus, duodenos, interdum etiam vicenos, flores per intervalla ferens, deorsum spectantes, hyacintho Anglico non multùm ab similes,



senis foliis constantes, quorù externa exteriora valdè reflexa sunt, interiora non aded, sed veluti tubulum quendam imitãtia: color in his valdè obsoletus, vt qui ex purpureo, pallido & virecente permixtus videatur, odor nullus: *semen* sext in triangulis capitulis, planũ, nigrum, cartilaginofum, circumscripta ferè ro-

tunditatis, scilla semini parè par: *Radix* globosa & rotunda, multis candidantibus tunicis constat, & numerosis fibris sèssili parte prædita est. Spontè nascitur quibusdam Hispaniæ locis, vnde primùm in Belgicam delatus, nonnullis amicis floruit, à quibus semine communicato, nata mihi sunt plantæ Viennæ, quæ aliquot annis nullam semen tulerunt, anno verdè 1582. & frequentibus abundè, quinimò semina 1583. nata, atque simul ac maturuissent circa matrem facta, illo ipso anno germinarunt Septembri, & quadam ex illis plantæ biennio post flores dederunt, deinde capitula suum semen continentia. Serò germinat, & folia in Autumnum seruat. Iunio autem cù Liliis floret, flores etiam, semine ex eodem capite excepto naturam stirpium variare soleat obseruabam, vt alii aliis obsoletiores conspicerentur, quidam etiam virentes. Cùm in Belgicam amicis primùm mitteret hunc bulbum Franciscus Hollebeque, Regis Hispaniæ Simplicita & hortulanus in Araniocæ, nomen adscriptum erat Hyacinthi flore coloris cineracei & terrei. Et sine dubio inter hyacinthi genera recensendus est.

Meminit huius Lobel. Adu. par. 2. his verbis: *Hyacinthus obsoleto Hispanicus semine compresso Pæteratii Monspeliciaci, &c.* C. Bauhin. Phyt. *Hyacinthus* rosæ ex flore purpureo pallido & virelcente mixtus. Camer. horti, *Hyacinthus hispanicus obsoleto flore.*

HYACINTHVS MINOR HISPANICVS

angustifolius caruleus & albus.

Accipiebam, inquit Clus. Exor. part. 2. Append. 2. anno 1601. ab Eruditiſſ. viro Ioach. Venerio Burdigalâ perpusillos hyacinthi bulbos, quorum nonnullos caruleum florem gestare scribebat, alios candidum, eosque in Hispania legisse, priores quidem apud Pontem de Suert, posteriores in monte *Seuue de S. Tourains*. Duorù autem, qui, de tribus quos conseruauit, florem tulerunt videlicet illius qui caruleum illum habet, & alterius qui album, icones in vna tabella exprimentas curabam, quæ hic adponeretur.

Is porro qui anno infæquente florem proferebat: ex radice bulbosa oliuæ pusillæ magnitudine, fuscâ membrana recta, & multis fibris donata, quina aut sena promebat folia, longa, angusta, striata, & supinâ parte carinata, viridia, humi plerumq; sparsa, infernâ parte quæ tellari proxima, nonnihil purpurascens, nec valdè ab similia



foliis hyacinthi botryocidis: inter quæ exiliebat gracilis cauliculus dodrantalis longitudinis, obsoletè purpurascens, leuis, summo fastigio sustinens senos aut septenos flosculos, concauos, in sex paruas laciniâs per oras diuisos instar florum hyacinthi Orientalis, sed longè minores, inodoros, subcaruleo, & tandem caruleo colore præditos, sex subflauis coloris staminibus ex umbilico prodeuntibus, in quorum medio exiguis stibus: his succedebant trigona capitula, mucronata, semen continentia. Reliquorum verdè duorum qui altero post iam descriptum anno floruerunt, vnus florem illi cuius modò historiam dedi prorsus similem habuit: alter verdè totum niueum, formâ quidem à superiore non differentem: sed ipsius plantæ folia paulò angustiora mihi videbantur, cauliculus etiam dilutiùs virère. Florebat vterque Maio mense, semen maturum præbuit Iulio: quod in vtroque genere prorsus simile fuit, rotundum videlicet, nigrum & splendens. Ceterùm illo ipso anno Nicolaus le Quele Parisiensis rhizotomus, varios bulbos in Hispania & Lusitania (vt ipse asserbat) erutos huc venales adferbat, inter quæ istius etiam hyacinthi aliquot, quos vel album florem vel rubrum gestare aiebat: & sanè cum albi, tum rubri flores suis cauliculis adhuc in hærentes inter pagellas repositos mihi ostendebat, quos formâ non differre à modò dictis obseruabam: eum autem qui dilutè suauiterque rubebat, venas quasdam saturatiore obtinere deprehendebam per trium foliorum externorum longitudinem excurrentes.

Descriptus

Hyacinthi minoris Hisp. natæ lei.

Hyacinthi minoris Hispanici

Caruleo colore.

Albo flore.

HYACINTHVS MINOR

Hispanicus obsoleto flore.

Mittebat (inquit Clusius Exor. part. 2. in ap- pend. 2. [Venerius anno 1602. Hyacinthi cuiusdam bulbos in Cantabris erutos, quorum flores albo cineraceo & ex albicante virescentes esse scribebat: illorum vnus insequente anno flores dedit, huius obsoleti floribus prorsus forma & colore similes, sed meâ opinione paullo minores (quia forsitan bulbi nimium afflicti fuerant) folia etiam similia & valde longa, quæ ad mensem vsque Nouembrem ferè viridia permanferunt. Decembri autem subsequente quatuor alios ab ipso accipiebam, quorum flores obsolescos scribebat: si Deus vitam produxerit, & hiems bulbos non contumpet, obseruare poterimus an eiusdem sint generis. Sed etiam cum superioribus illis quorum vnum florem protulisse dicebam, alios quinos bulbos mittebat, quorum scheda quâ inuoluti, inscriptionem habebat, *hyacinthus minimus serotinus caruleo flore*: ex his tenui folia produxerunt, Hyacinthi minoris hispanici iam descripti foliis non dissimilia, sed florem nullum: Decembri etiam insequente alios ab eo accipiebam simili nomine inscriptos: proxima autem ætas nos certiores faciet [si viuimus) an eiusdem sint generis.

HYACINTHVS INDICVS

Tuberosa radice.

Descriptio



Planta rara, cuius primam cognitionem acceptam fert Clus. hist. post. Bernardo Paludano: cuius caulem ab illo accipiebat bipedalem aut ampliorem, firmum, enodem, quem tamen per interualla ambiebant octo, aut nouem folia incondito ordine disposita, & ipsum mediâ ex parte amplectentia,

vt nodorum quandam speciem præberent, circa inum longiora & latiora, supernâ parte bteuio- ra, omnia tamen carinata, dilutius virescentia, satis dura, & si quis vel in minimas partes confringeret, veluti tenuissima stamina, instar foliorum Eriophori vulgaris diuisorum, ostenduntia: sum- mus caulis delinebat in duodenos aut plures flo- res (quorum vnicus dantaxat apertus, reliqui adhuc clausi) confertim & in spicâ quodammodo formam nascentes, vnciam longos, summâ parte in sex laciniâs aliquantulum reflexas diui- sos, florum hyacinthi Asiatici instar, sed longè crassiores & magis succulentos, non minùs for- san, quàm Mali Citrii flores, sex staminibus è me- dio prodeuntibus [quorum apices pallidi] & illis breuiore stilo: odoratusne sit, an odoris ex-

petis, Clusium lateat, quia satis afflictum videretur, & mediâ ex parte coarctatum accipiebat: qualem autem radicem haberet, non erat adscriptum. Nulla porò fuerat Paludano hæc planta cuius in- scriptione, *Bulbus indicus florem album præserens, floris hyacinthi Orientalis emulum*: Clusius pro- pter tenuissima illa, instar telæ araneorum stami- na, quæ cauli inhaerentia folia, vel minuciam con- fracta reddebant, Eriophori genus aliquod arbi- tratur, tamen si & caulis foliis ornatus, & flo- rum forma refragarentur, nec radix ipsi conspe- cta esset.

De hoc ita Lobel. Adu. par. 2. p. 488. *HYACINTHVS INDICVS tuberosus Clusii*: Peregrinam vèrò rarum & eximium hyacinthi genus ab Ill. Comite Ar- nbergio & C. viro Paludano floribus albis missum, descripsit Clusius foliis longis &c.

HYACINTHVS MAVRITANICVS.

Ex eâ Mauritaniz parte in qua Feza & Maro- co vrbes sitæ, initio anni 1599. cum aliis bul- baceis plâtis adferrebatur hyacinthi genus exori- cum, hyacintho obsoleto in hispanico serotino valde dissimile, cum foliis, tum floribus: omnia tamen in hoc paullo maiora. Nam huius folia hyacinthinis, aut Ornithogali Arabici legitimi foliis satis respondebant: & inter illa prædabat caulis pedalis longitudinis aut amplior, crassior quàm in hispanico, firmus, impenitè viridis, vi- cenos, interdum etiam plures flores sustinens sex foliis constantes, quorum externa tria nonnihil explicantur, interna quodammodo coeunt, & ter- ti cuiusdam formam, expriment, extemitare tamè aliquantulum reflexâ, veluti in hispanico iam dicto, coloris autem magis obsoleti & fuscî: de semine nihil pronuciare possum, quia nullum tu- lit: radix bulbacea, alba, Hispanici radici non dissimilis, paullo tamen maior, & ad Ornithogali Arabici legitimi radicem valde accedens. Flo- res dabit Maio insequente: plantas vèrò om- nes corrumperebat cum multis aliis singularibus, asperissima quæ subsequebatur hiems. nunc cum aliis bulbis, è Mauritania acceptum, Wilhelmus Parduyn & Io. Somer ciues Medioburgenses in Walachria amicis, teste Clusio & Lobelio Adu. part. 2. communicabant.

HYACINTHVS LATIFOLIUS

Dalechampii.



Hyacin- thus ex Dale- champio lati- folius, qui in monte Aureo Aruerni spò- rè crescit: ra- dice corticosa, Lilio simili- folis sex aut octo, nigricâ- tibus, crassis, latis, Liliî ferè: floribus purpureis ele- gantibus, pat- ticulatim sese expandenti- bus: femine in capitulis ro- tundis

andis herbaceis, Hist. Lugd.
C. Bauhin. Phyt. hyacinthus 18. siue latifolius Dalech. Hunc semel tantum vidimus Patavii in orto Clarissimi Medici Bechar. Triuefani flore albo. In figura Dal. radix non videtur correspondere descriptioni eius, vti nam aliquis nobis ex Arternia bulbos mittat.

HYACINTHVS LILIOFOLIVS
stellatus.



E Biscaya Montibus inquit Lobel. Moutono iridem asportatus & ab eo mihi liberalissimè communicatus hic admodum rarus & perelegans hyacinthus, quem appositè Liliaceum quis dixerit. Radice enim ac bulbo lili est, sed minore & oblongiore, flauescente: vt Liliu cruenti,

siue Martagonis. *Folia* Lilio candido simillima: sena aut septena, inter quæ medius exilit nudus sine foliis spithameus caulis in cuius summo flores hyacynthi stellaris caruleo purpurei.
Hyacinthum stellarum Liliu folio cum sequente descriptione Viennam ad Clusium mittebat Tornaco Io. Moutonus. Atulit, inquit, qui Pseudo-Narcissos iuncifolios communicabat, ex iisdem iugis erutum bulbum, Liliaceo fati similem, sed oblongiorem, flauescens coloris, vt Martagonis quorundam, siue Liliu syluestris & montani purpurei radix: sena autem vel plura fert folia, Liliu albi [ante quam in caulem abeat] foliis similia, è quorum medio caulis exilis pede breuior, multos flores in summo sustinens, hyacynthi stellati vulgò nuncupati floribus, omninò pares, sex foliis constantibus intense caruleis, siue violaceis, eminentibus ex umbilico quodam veluti umbone, cuius causâ hyacynthu stellarum *λεπτοφυλλόν* appellat: flori succedunt triângula capitula, in quibus semen. Mittebat etiam ille anno 1586. eius bulbum ex aliquot pallefcen- tibus squamis imbricatis dispositis constantem. Sed cum toto bimestri in itinere hæssisset, atque omninò flaccidus ad me peruenisset, terre cõmissum subsequens hyems corruptit. Alterum deinde bulbum ab eo accipiebam, & aliquot post annos vnum etiam à Iacobo Plateau: sed omnes mihi corrupti. Eius porò iconem à Moutono etiam acceptam in app. ad suam Strip. hist. exhibet Lobelius noster. Sed anno 1595. eius bulbum à N. V. Ioan. Boissot accipiebam, qui insequente anno mihi flores dedit. Similes bulbos ad ipsum (Exot. par. 2.) Append. 2. mittebat Burdigalâ anno à Christi natiuitate 1600. & eum insequente Ioachimus Venerius, quos partim in Pyrenæis, partim in monte Gallie Aquitanica, cui nomen nos, eruisse scribebat, vbi à pastori- bus *Sarabug* appellaretur, qui etiam assereret, ani-

malibus eam plantam depalescentibus caput intumescere, deinde morte in subsequi: addebat etiam illis vnicum, quem valde rarum inueni signifi- cabat, niucos flores proferere, atq; in mote *Puiole* in Hispania legitè scribebat. Omnes quidem, præter vnum aut alterum, bicanio post germinare, sed nullum florem tulerunt: tertio demum anno vnus caruleum florem dedit: eius verò florem qui niucus esse debet, nondum videre contigit. Humentibus locis eas plantas gaudere scribebat. Eidem Clusio & aliis aliquot bulbi qui flores caruleos gerunt, plures flores, vel longiorem flori comam protulerunt, quam præcedente anno: qui tamen pro commissis, cuius flores essent albi, nulli florem tulit quam illo ipso anno. In oglandio planta vna, Porreto planta vna, honesto planta vna, Clusio etiam vnica quam habebat planta: nam quam Venerius anno præcedente ipsi mittebat, hiems corruptit.

Lobel in append. & Ic. Pl. pag. 101. *hyacinthus stellaris Liliifolius floridus siue Liriophyllus*. Tabern. icon. & hist. *hyacinthus Liliaceus siue Liliifolius & hyac. 7. hyacynth.* C. Bauhin. Phyt. *hyacinthus 5. siue foliu & radice Liliu*. Mihi videtur hyacinthus Lobelij magnam habere affinitatem cum nostro hyacyntho raro. I. Gerard. *hyacin. stellatus Liliifolius, liliu Jacynth.* *hyacinthus bifolius Theophrasti.*

HYACINTHVS TRIPOLITANVS.



Foliis est ^{Descriptio} longis tenuissimis, Phalangio nostro similibus, caulis fatis magnus, in cuius summitate quatuor flores speciosi, colore & magnitudine similes foliis tribus erectis in parua Iride cartulea: radices formâ, & colore Tulipis similes: florebatur Aprili Tripoli vbi obseruauit, Rauvvolf.

Camer. in Epir. Matthioli: item ad eius hist. G. *hyacinthus Tripolitanus* quem accepi à Domino Rauvvolfio. Rauvv. itin. *hyacynthi speciei* incolis Tripolitanis *ayur*. C. Bauh. Phyt. apud Matth. *hyacinthus 16. siue Tripolitanus.*

HYACINTHVS EX THRACIA.

HYacinthum florem, qualem Diosc. describit, in hortis nostris habemus, quæ ex Thracia Venetias tulimus. *Folia* habet bulbi protinus à radice, caulem dodrantalem, quem, tenuioremque minimo digito, coloris herbacei, comam procumbentem, incuruam, plenam florum olentia iucundissima, coloris carulei aliquantulum ad purpuram inclinatis, primo aspectu grati, deinde euanescentis antequam fatiet, semine nigro,

Coriandri magnitudine, radice bulbosâ purpuranteque: floret initio Veris cum viola purpurea. Verùm quia possit aliquis cauillari, dicens hunc quem descripsimus florem non esse Hyacinthum, cum Diosc. Hyacinthi florem non colorem caruleum sed purpureum habere descriperit, qui nec de odore quicquã meminerit: dicimus Diosc. per purpureum violaceum intelligere, quippe cum & violam illam quam Ic. prophyrion Græci vocant, eius colorem violaceum siue Ianthinum vocari diximus, vñã cum Plinio coloris purpurei esse descriperit: nam & Plinius Hyacinthi colorem violaceum dilutum vocauit: Fran. Massar. in 9. Plinii cap. 41.

LEUCOIVM BVLBOSVM

Hexaphillon cum vnico flore,
rarius bino.

Descriptio



crassiore, virente, nutat & doctum spectat, exigui Cymbali modo, maior quàm Triphylo ex foliis septius sex, interdum septem, & octo, ceterã candidis, mucrone acutiufculo, extrinsecus macula virente punctato, intrò leniter reflexo: in medio apices lutei sex modicè inter se distantes stylum intimum candidum ambiunt, odor ei non gratus qui Fuchsio violarum purpurarum pro-

fus refert, Clusio Oxycanthis vulgò creditur odorem referens. Succeedit flori capitulum vt in Narcissis siue membranaceum capitulum, Pyri modo, vt ait Clusius, turbinatum, semen ex candido flauescens, oblongiusculum durum.

Duas proponimus icones ex nostris empiriis quarum vna plantam demonstrat cum flore: incipit: altera cum semine profert, vti olim à Fuchsio exhibitæ fuerunt.

De Leucoio suo ita scripsit Theophr. lib. 6. c. 7. Leucoium (viola alba, Gaza) inter vernos flores primum se ostendit, vbi caelum clementius statim fuerit, etiam hyceme nondum exacta. Vbi vero immitiùs, postea.

An de hoc Plutarchus in lib. de amore fraterno:

Inter Echnopadas velut asperam & Ononin nascuntur passim millia Leucoia.

Mihi quidem videtur potius referendum hoc distichum ad Leucoium bulbosum quàm ad Leucoia alia propter locum natiuitatis.

Brunf. sub Narcissi titulo non solum Leucoium hoc pingit, vetum etiam Bulbocodium ac nomina vtriusque plantæ cum nominibus Narcissi confundit.

Trag. hist. Germ. & Lat. weißhornungs blumen. Hergen blumen. Otho vult Narcissum. Parum refert si nomenent Narcissum aut Ligustrum, weißmerz violen. Quod autem quidam asserunt florere vere & Autumno falsum est. Nobis vera est *hyacinthus* aut syluestre Lilium Diosc. lib. 3. 120. eidem hemerocatalactum, Crinanthemon, Porphyranthes, Bulbus vomitorius, Bulbus agrestis: Etli Leucoium Theophr. quod quidem Anemone Limoniã interpretantur, constanter credimus.

Gesner. de coll. stirp. Leucoium bulbosum, weißhornung blumen. Item in cat. pl. *Viola alba Theophrast.*

Fuch. hist. *Leucoium* Theophr. diuersum à Diosc. Leucoio, quod plerique docti non animaduertunt, Lat. *Viola alba*. In edit. Lugd. Fuchsi addita hæc annot. Massario in lib. 9. Plinio deprehensum est. Et icon. *Viola alba Theophr.*

Viola alba Belgis, witte Spöckel blumen / soomer Sottefens & witte Zudlofen. Idem de fl. Leucoium bulbosum, exaphillon, Matthiolo Narcissi species.

Matth. in post. com. Ital. *Narcissus* 7. qui non describit.

Aduert. Lob. & Pen. x. *Leuconarcissolirion pratense vernum*, viola alba Theophr. vel Moly Rondeletio: An Plinio Lilionarcissus. & Icon. Pl. 19. *Leuconarcissolirion paucioribus foliis*.

C. Bauh. Phyt. *Leucoium* 1. siue bulbosum vulgare.

Clus. pann. & hist. post. *Leucoium bulbosum præ. x. maius*, Rhizotomis mulierculus *Meß veyl*, quasi palustris viola in Germ. weißhornungs blumen; id est, candidus Februarii flos.

Thal. Hac. *Leucoium bulbosum* Theophr. seu *Narcissus albus*. & *hlangen blumen*.

Hist. Lugd. Theophr. lib. hist. c. 7. inter vernos flores *viola alba*, & lib. 7. hist. c. 13. bulbosus annumerat Leucoium bulbosum, Fuchf. violam albam appellat, non ab re. Germ. *Weißhornungs blumen* Lugd. *Campanes blanches*.

Prima horum (teste Fuchfio) Tubingæ hyceme etiam nondum exacta, Februarii o nimum mēse & die diuo Valentino facta, vbi caelum clementius fuerit, apparet in April, vbi appropinquare iam cepit Maius, euanescit, inter initia Martii ad

tia ad perfectionem venit. Semen in Aprili ostendit in capitulis. Prodeunt in vmbrosis syluis & locis, qualis est non procul à Tubinga pauld supra & infra monasterium Bebenhausen vocatū, vbi copiosissime nascitur. Plantatur nunc etiam passim in hortis. Dodon. Mense Maio pereunt caules & folia: sola radix duratur vt Narcissi. Prodit maturè admodum, statimque inter bina folia florem ostendit vix liquefactis niuibus. Maio mense semen maturefcit & folia marcescunt. In sylua quadam [Pannoniæ] non procul Zolonock Ill. Di. de Bathyan oppido vdis locis solummodò obseruabat Clusius, crescit etiã plerisque Germaniæ locis. Copiosè prouenit in monte Bar Com. Momb. in dumeris, vnde transfuit in hortum Ill. E. C. habent etiam alii in hortis: copiosum inueni florens Mensis Martii principio inter Audincourt & Mandeuere, olim dictum Epamandodurum in itinere versus Dampierre, ex transplantatione interdum flores fert cum oëtonis foliolis, vel cum duobus floribus ex vno caule. Anno 1598. floruit Montbelgardi, sine Decembris in vno caule. Patauī obseruauī florens Februario in hortis nobilium, D. Cortusii & Pasqualigo; Ferrariè in canobio S. Dominici à l'Angeli. Bononiæ in hortu S. Saluatoris Al bargo di S. Catharina: Lugduni, Basilæ, Geneuæ, in hortis, cum esse Montpelii, reperi propè turrim de Late plantam cum pericarpis duobus, nò multùm dissimilibus à pericarpis Narcissi vnum florem habentis, sed maioribus multò, in quo femina rotunda nigra, magna, huius Leucoii fuisse suspicor, ac in catal. horti Bèbi inuenio, Viola alba Fuchsi Verna latte di Gallina.

Hoc Leucoium, ut auorauimus in descriptione, bulbum habet sapore viscido, acrimoniã vix notabili: Scribente Fuchio folia ferè qualitatis omnis expertia, radix autem dulcis & glutinosa est, vt hoc nomine adstringit & exiccat, ut reliqui bulbi, digerètem leuiter, & cum hoc adstringentem facultatem, sicut reliquos bulbos habere ex iis que commemorauimus satis constat, tamen nunc nullus, quod sciam, eius stirpis vsus est.

LEUCOIVM BVLBOSVM MINVS
Triphyllon.

Totum minus Leucoio præcedenti hexaphyllo, ex radice bulbosa parua, multis tunicis albis constans, externa nò nihil nigricante, & fissili parte, multis fibris appensis: donata gustu est leuio, amaro, subacti: exurgit coliculus singularis, angulosus, vagina albã ad mediam vsque longitudinem inclusus, tenuis, concavus, nudus, dodrantalis aut panillò maior, quem ferè ad summum vsque comitantur folia bina, porracea, glauca ferè, nec ita lucida vt Leucoii Exaphylli, vel, vt ait Clusius, colore aruginoso & quodammodò cineraceo: extremum caulis tenet flos pediculo longo nutante, vaginulã aliquotque incluso, vnicus, paruus, foliolis tribus, peniculis lacteis, nonnihil obtusis, aliis interioribus, duplò longioribus, latoribusque constant, intra quæ alia tria, alterante situ, breuiora angustiora, rigidiora, leui castrã, in summo, in quo extrinsecus, corculi ex diluto virore, panè luteolo, effigiatu, intrinsecus discurfantibus, per folioli longitudinem, alternatim striis albis, & viridantibus. Totius floris medium obtinent apices lutei, rigidiusculi, sex, stilisq; exilis, candidus,

Tom. II.

interioribus floris foliolis, dimidiò breuiores.



Clusio odor aullus aut perquam exiguus: florem sequitur capitulum vt Narcissis, Oliuæ virentis [inquit Clusius] formam panè exprimens, in quo semen candidius altero præcedenti: flos noctu se contrahit, cū Sole explicatur, etiam extra terram in hypocausto, & vt dicit Clusius, radis Solaribus illu-

stratus, aut sudo celo explicatur.

Theophrast. de Hist. pl. l. 7. cap. 13. Inter bulbosas Leucoium, vel, vt vertit Gaza, Violam albam recenset. C. Bauhin. Phyt. Leucoium bulbosum 7. siue minus. Clusius Pann. & Hist. post. Leucoium bulbosum præcox minus, Rhizotomis mulierculis weyffe veyl & Schneetropf, hoc est, alba Viola, & Niueæ gutta, ab insigni videlicet sandore appellatur. Matthiol. Narcissus. 2. Et in post. com. Ital. Narcissus sextus, à quo non describitur, sed figuratantum ponitur. Dodon. de flor. describit & depingit, ac vocat Leucoium bulbosum triphyllon. Adnerf. Lobel. & Penz hunc tradunt sub Leuconacissulicio præcoxi. Nonnullis Narcissus herbaceus Plinii putatur. Obs. & Ic. Pl. pag. 119. Leuconacissulicium minus. nist. Lugd. que figuram habet ex Matthiol. vocat Leucoium bulbosum primum. Camer. hort. Leucoium bulbosum triphyllum valdè ad Narcissum referunt.

Prodit maturè admodum cum præcedenti, vix liquefactis niuibus quas nonnunquam etiam penetrat: Non modò in Viennensi & Leytano salubus, sed etiam plerisque Pannoniæ ptatis: vmbra tamen (teste Clusio) magis delectari videtur. Florens vidi nunc in fine Februarii passim in montibus Engancis, vt inter Thermas Aponeuses & Arqua, &c. Item Patauī in horro Magnifici Laurentii Priuli. Hoc habemus Môtbelgardi in hort. Ill. E. C. vbi plantauimus, floret Aprili ac citius quàm Leucoium Bulbosum hexaphyllon, obseruauimus etiam florens in hortulo nostro Ianuario & Februario sub ipsis niuibus, & anno 1597. sine Decembris.

Locus & tempus

LEUCOIVM BVLBOSVM PRÆCOX
Byzantinum.

Leucoium [autore Clusio in post. hist.] bulbosum præcox Byzantinum Leucoio minori ferè simile est, incuntque Martio bina folia promit illi similia, sed latoria, arugini etiã coloris, floris gemman vt in illo completentia: crassiusculus caulis tandem succrescens, vnicum florem vanigulã inclusum sustinet, formã superiori similem, duplò ferè minorem, tribus externis foliis alarum modo expansis, profus niucis, interioribus verò breuibus, bifidulis, vt in superiori.

D d d

re, simul coëuntibus, & veluti tubulum quempiam efformantibus, foris plerumque citra vngues virefcentibus, reliquâ parte albis, oras tamen secundum crenas virides macule inficiunt, interius verò aut magna ex parte viridia sunt, aut octo radiis ab imis vnguib. secundum longitudinem ductis prædita: prioris fragrantiam utcumque æmularur hic flos, & suavius quidpiam spirare mihi videtur: radix secundo maior.



C. Bauhin. phyt. *Leucoium* 8. siue *bulbifloris* altera species. Lob. Ad. part. 2. *Leuco-Narcissi* Lyon. siue *tercium bulbosum* *Leucoium præcox* Clusii.

Locus

Byzantio Viennam inferri coepit, Narcissi bulbis permixtum post annum 1592. Sed & simile panè-mitebat Clus. Doct. Imperatus Neapoli sub Autumnum anni 1592. è monte Virgineo erutum.

LEUCOIVM BVLBOSVM

Polyanthemum tardiùs florens, floribus minoribus.

Descriptio



Leucoium hoc vt reliquis eiusdem generis serius, ita tota mole maius, radice crassa, longè maiore, bulbosâ, qua multis succulentis tunicis ac etiam fibris constat, sapore amaro: caulem tollit vnum aut alterum pedalem, cubitale, & setquicubitalem, fistulosum, crassum, viridem, qui ne planè rotundus sit impedimento est, vtrinque vel altero tantum latere clata costa acuta: *folia* Narcissina, virentia, caulem tanquam vagina inferiore parte completentia, multa, Clusio quinque aut sex, carinata, semungiam aut vnciam lata, mucrone obtuso, quorum alia pari cum caule altitudine assurgunt, alia infra subsistunt: in singulorum caulium cacumine ad geniculum è vagina oblonga prodeunt flores, *Leucoii* bulbosi hexaphylli simi-

les, paullò minores, numerosi, quini, seni, aut duodeni, tintinabuli modo penduli, sex aequalibus & niueis foliis constantes, quorum extimam partem virides macule inficiunt, cenis intus flammibus flautis, medioque lacteo stilo, apice viridi insignito, odorati: pediculis aliquando palmaribus, aliquando vix vncialibus, præsertim antequam flos expandatur; hiq; non simul sese explicantes, sed aliis expansis & ferè marcidis, alii primum è vagina pullulantes prodire occipiunt. Floribus succedunt magna & trigona angulis obtusis capita, Pyri in modum terè turbinata (quæ facillè à limacibus apud nos atroduntur priusquam semen maturecere possit) apud nos Montbelgardi: *Semen* nigrum, Orobaceum, inquit Clusius, Liliaphodeli flauo flore semini non abimile continentia.

Dodon. de flor. *Leucoium bulbosum Polyanthemum*. Aduers. Lob. & Pena meminerunt sub *Leuconarçisso*. Obf. & icon. pl. pag. 18. *Leuconarçissilivon præense*: & p. 65. *Leuconarçissipræense vernum*, num *viola alba* Theophr. vel *Moly Rondelerio* multiflorum. Hist. Lugd. Dodonæo *Leucoium bulbosum tertium Polyanthemum*, quibusdam videtur esse *Narcissus* 2. *Martiboli*. C. Bauh. Phyt. *Leucoium bulbosum* 6. siue *maius*. Sunt qui *Acrocorion* Plinii lib. 19. c. 5. qui nil nisi nomen habet, esse velint. Clus. Pann. *Leucoium maius ferotinum bulbosum*. Camer. hor. *Leucoium bulbosum Polyanthemum* vulgò ad *Narcissum* referunt.

Serius superioribus *Leucoiis* duobus plerumq; germinare solet, atque Maio demum mense flores proferre. Vno duntaxat inter amnis Pannoniæ loco hoc genus obseruabat Clusius, vlgiginosis pratis supra Waraldinum anno 1579. Meminit & illi simile planè duodetriginta priùs annis eruere in pratis Lateræ vicinis cum Monspelij viueret. Sed & eius genus quibusdam pratis ad Danubium sitis infra Viennam Austria nascitur, cuius folia quidem similia, sed pallidiora, non adeò mucronata, & veluti bifido mucrone prædita: flores item maculis ex viridi magis pallentibus infecti. Aliter hoc etiam in Germaniis & Belgicis hortis. *Leucoium bulbosum polyanthemum* habemus in horto illustriss. E. C. Montb. nobis missum per Nobilem virum D. à *Belle fontaine* ex Bizantio vbi videramus in eius cultissimo horto: oliui etiam visa fuerat hæc planta Florentiæ in horto Nicolai Ferrarientis. Accepimus quoque in Malmunster ex horto nobilis Viduæ ab Ambringue, floret Aprili & Maio post alios duos præcedentes.

LEUCOIVM TRIPHILLON

flore caruleo Someri.

Obel. Ad. part. 2. *Viola* albam Theophrasti, à D. Fuchio & Botanicis vocatam, siue *Leucoion* flore caruleo amantissimum, in Albania, iuxta Fritillariam albam, purpuro-phæo resillatam Constantinopoli rediens eruit prædictus D. I. Somerus, huius studii iucundus apud Martiacos coryphæus.

* * * * *

LEV.

LEVCOIVM BVLBOSVM AVTVMNALE
minuds tenuifolium.



Cauliculo
est palmu
alto gracili, v-
nicu, interdū
alterū & ter-
tium ferens
florem omni-
nō lacteum,
pendulum, sex
foliis constā-
tem, & tintin-
nabuli modo
formatū, ino-
dorum, ingra-
trique guttus,
in quo pallida
stamina: flore
iam aperto,
demum pro-
deicit quaterna
aut quina, ca-
pillaria viri-
diāque folia:

(Lob. atronirentia) radix bulbosa [Lob. oblonga, alba,] satis crassa, pro plantae exilitate, è multis glutinosis tunicis compacta & amara, quae candicante membranā integitur.

Clus. Hisp. & post. Hist. *Leucoium bulbosum minus Autumnale tenuifolium sine quintum.* Lob. ic. pl. pag. 120. *Leuconarcissolicon minimum Autumnale:* Aliam iconem habet in Aduerf. part. 2. *Thicns:* A foliorum quadam similitudine & exilitate Leucii Autumnalis genus istud ab Egr. viro D. Theodorico Clutio in Lugdunensi Batavorum Academia horti Medici primo instructore cultum, hyacinthi Autumnalis peregrinum & elegans genus creditum fuit: cuius delineationē Petro Clutio fratri suo debemus. C. Baul. *Leucoium 9.* sine bulbosum Autumnale.

Extremā Baticā, quā Lusitaniam concernina est, non procul Badaioz, quam nonnulli Pacem Augustam esse existimant, ad flumen Anam sita, nascitur, vbi sub finem Octobris & Novembris initio, cum suo flore crucebat Clusius, Vlyssiponem proficiens, vnde in Belgicam cum paruo sſlo serotino Narcisso anicis mittebat: qui diu in pensilibus suis hortis vtrumque aluerunt, nullum tamen, quod sciat, florem videre potuerunt, & an lacteus bulbos conferuarint ignorat.

LEVCOIO BVLBOSO FORTE AFFINIS
Bulbus flore intus leuco foris
purpureo.

Bulbus ex Hispania Clusio Pann. missus per
Regis hortulanum flore Campanulae albae
satis magno, terram spectante, colore
intus leuco foris purpu-
reo. C. B. Phyt. *Leu-
coium bulbo-
sum, 3.*
* * *

Tom. II.

LEVCOIO BVLBOSO FORTE AFFINIS
Bulbus quidam.

Bulbus Clusio missus ex Hispania per Hortu-
lanum Regis, quatuor aut quinque flores
gestans, in modum Campanulae albae efformatos.
C. B. Phyt. 84. *Leucoium bulbosum 2.*

BVLBOCODIVM VVLGATIVS.



Descriptio

Bulbocodii
radix bul-
bosa, vt Leu-
coii bulbosi
Theophr. vul-
go dicti, mi-
nor, ex multis
tunicis com-
pacta, tactu &
gustu viscida
cū aliqua dul-
cedine acrimo-
niam tandem
aliquam relin-
quens, cui sub-
sunt multae ca-
pillares fibrae,
nonnunquam
unica, aliās
plures vbi se
propagat: fi-
tra Leucoio
praedicto simi-

lia, longa, caulem ad summum fastigium comi-
tancia, angustiora, breuiora, colore diuerso, Al-
lii ferē, non tamen ex viridi lucentia vt illius, strata,
costis duabus auersa parte praedita, terna, qua-
terna, quina, tunica vna cum caule staminā à radi-
ce exorta, aliquotisque inuoluta. *Caulis* palmaris
& dodrantalis, compressus, striatus, fistulosus,
cui insidet *flos* singularis, deorsum nutans, duas
vincias longus, sex pallidis & stellatim decessa-
tis foliis constans, magno, longo, flauoque & sin-
briato calice Campanulae ferē figura protuberans,
aureus, splens, simbria comata & laciniata, in
cuius medio apices sex lutei circa pistillum con-
colorem intorquentur, & lacinia est minimo o-
dore, non, vt aliqui volunt, nullo, quia parte ge-
niculo intermedio cauli flos adnascitur, mem-
branula exalbida florem, antequam explicet, in-
uoluit: pauloque infra floris medium sex folia
pallida, micantia, mediocriter lata, mucronata,
ex ipso floris codio, rectā foras se pandunt. Suc-
cedunt pericarpia rotunda, in quibus *semen* Cam-
mer. nigrum, in principio latiusculum, temporis
progressu rotundius. Iag. Garg. Binos flores in
eodem caule obseruauit Basilea.

Bruntel. Tom. 1. Rhaph. 20. ponit figuram sub
Narcisso, nec vllam particularem aliam eius
mentionem facit. Tragus Germ. *Gelhornügs
blumen.* Ortho Bruntel. inter Narcissos recen-
set. Matthioli. Narcissi nomine ponit commo-
dam figuram. Lugduni, quod nos recordamur,
vocant *Campanes launes.* Montbelgardis, *Cabere.*
Dodon. Gall. *Coquelourde,* Gall. & Germ. *geel
hornügs blumen.* Lat. quibusdam *Narcissus lu-
teus & Pseudonarcissus.* Item hist. flor. Et in fol.
Narcissus luteus syluestris. Belg. *Geel Spooten
blumen.* Gesner. de col. stirp. de hort. & in cat.
pl. Codiaminum:

Codiaminum

Ddd 2

Aduer. Lob. & Pen. *Totus luteus Narcissus montanus Theoph.* Icon. Pl. p. 141. & *Obl. Narcissus totus luteus montanus Theoph.* Pseudonarcissus Clus. & Dodon. *luteus sylv.* Adu. p. 51. *Bulbi codion Theoph.* Cordiaminum, vt vertit Gaza, nisp. Campanilla.

Clus. nisp. Pseudonarcissus Belgicus. Idem post. hist. Pseudo narcissus vulgaris: Sunt qui putent Theophr. l. 6. c. 7. *Colobis zedior* esse, cuius meminit Plinius lib. 21. cap. 11. inter flores qui maturè erumpunt: ac quod bis florere ait Vere & Autumnò: *Austriacæ mattonæ gelb beeeel*, id est, flauum caliculum & *gelb Merckblumen* / hoc est, flauam violam Martiam appellant: Galli nonnulli *Coquelourdes*, alii *Porron*, à *Porraceis* videlicet foliis. Reperitur huius genus magis præcox, alioqui non valde diuersum à iam memorato, cuius flos non pallidus, sed aureus instar maioris hispanici. nunc verò colorem interdum mutare obseruauit, hoc est calicem illum medium non minùs pallidum habere, quàm sint sex illa externa folia ipsam ambientia.

Calice pal-
lido.

Taber. icon. & hist. Pseudo Narcissus luteus Josephus stablein Geel hornungs blumen. Camer. apud Martii. Germ. *Narcissus 4. luteus*, Josephus stab: interdum fert duos & tres flores, vt in hortis meo (Norimbergæ.) Item in Epitom. Matth. *Narcissus totus luteus*. C. Bauh. *Narcissus 14. siue luteus, calice prælongo primis*. Quibusdam censetur *Colobis zedior* Theoph. vbi Gaza vertit Codiaminum secutus procalduho Plinium lib. 21. c. 11. Cõmuniter cuiuslibet cauli flos vnicus insidet, aliquando verò & duo.

Locus &
tempus.

Mulherculæ, vt Trag. scribit, hanc plantam in hortis sui ferunt, propterea quòd inter Vernos prima floreat. Reperitur non paucis Belgii locis circa margines agrorum & Veruacorum, humido præsertim solo & in syluis locisque arboribus confitis, & similibus quoque cum in Germania, tum in hispania, transfertur etiam in hortos. Profert teste Dodonæo, sua folia, caules, & flores mense Februario & floret interdum sub niue. Semen maturum mense Martio, ita vt postea non ampliùs videatur. Tanta abundantia in pratis Londino fati vicinis, crescere certum est, vt in celebri illo vico, vulgò Ceapside nuncupato, Martio mense rusticæ mulieres maximà copiâ flores venales proponant, & omnes tabernæ eo flore exornatæ conspiciantur. Crescit & aliis Angliæ, & plerisque Germaniæ locis: memini & olim (inquit Cluius) cum Loventii humanioribus literis operam darem, ad filulam illius, Cænobio vulgò Perck dicto vicinæ, margines legere spontè natum. Nobis verò Mõtbelgardii abundat Bulbocodium, vt in monte Bar, vnde transtuli in hortum Ill. E. C. Obseruauit Geneuæ florens Martio, & in môte Thuirii mèse Iunio: Lugduni Februario: Parauii variis in hortis & aliis Martio. Mõtbelgardii Februario & Martio: floret interdum sub niue, semen maturat Martio, herba perit Aprili & Maio, manentibus bulbis in terra occultatis vsque ad sequentem annum. Abundat in colle prope *Dampierre* arcem ad Dubim: anno 1597. floreat copiosè Aprili.

Temperam:
& Virtus

Calida & sicca est herba Pseudonarcissi, temperamento eodem ferè cum Narcisso: certa experientia inuentum est (si Dodon. non fallitur) duas drachmas huius radices adhuc recentis, in vino aut aqua cocta cum pauco semine Anisi aut Foeniculi & parua portione Gingiberis exhibitas, purgare pituitam lentam & viscidam per inferiora. Itaque hæc radix utilis ad omnes motbos ex-

pituita viscida natos. Non dissidet à Diosc. Narcisso facie vel viribus. Xyridis modo purgare afferant Aduer. radices decoctum, ac rusticam plebem vomitiones cum eo moliri certum est.

BVLBOCODIVM HISPANICVM



EST (teste Lob. Obl.) Narcisso montano Theophrasti facie non dissimili, sed latioribus foliis, maioribusque, omnino luteis. Alit eum Ioh. Baillet Insulanus & Muttonus. Plant. icon. p. 121. *Narcissus totus luteus montanus Theophr. Hisp.* Pseudo narcissi genus inuenitur à Clusio nonnullis veteris Castellæ pra-

tis, & locis montanis humidis Anglico quidè simile, sed foliis longè maioribus, magisque virentibus longiore caule, paulò minore flore, coque profusè flauo, & quasi aureo, videlicet tam externis foliis quàm calice: radix huius crassior est quàm in superioribus. Dodon. lat. in fol. *Narcissi sylv.* alia icon. qui non facit duas species. C. Bauh. Phyt. *Narcissus 15. siue luteus calice prælongo alter.* An Camer. in epit. Matth. inuenitur *Narcissus 3. in montibus profusè luteus seruis florens.*

BVLBOCODIVM FLORE PLENO.



Narcissi è multiplici foetura varietas, Belgicis amicorum hortis visu digna, cæteroquin omnia profusè cadè. Tarnari primum [vt Lob. Obl. testatur] reperitur in horto cuiusdam pauperis. *Narcissus luteus multiplici flore*, Eidein.

Hic calice pleno, inquit Adu. part. 2. variat, simbratis oris, rugosis & complicatis foliis compacto; etiamque tanto copiâ coniu exuberante & dehiscente, vt forem totum adimpleat, multiplicati Narcissi lutei, speciemque referat: intermixtis

mixtus tamen pallidioribus nonnullis foliis, & quandoque ex luteo herbaceis: inferioribus senis floris, radiatis aut stellatis foliis concoloribus, remanentibusque pariter aliis sui generis quandoque, in singularibus spithamæis cauliculis simplicibus floribus. Cætera cuncta vulgari luteo Narcisso haud absimilia.



Clus. Hisp. Pseudo narcissus multiplex, qui apud Belgas in hortis alitur, Belgico per omnia simile cum foliis, tum bulbo, sed flos calice caret, & eius loco innumera habet folia externis sex similia, colore pallido. Item hist. post. Pseudonarcissus pleno flore. An Camer. horti, Narcissus ex

luteo pallidus flore pleno, nullo intus calyce? Dodon. in fol. Narcissus fistu. multiplex, qui medio calice caret. C. Bauh. Phyt. Narcissus 22. luteo flore luteo multiplici calyce carente. Taber. icon. & hist. Pseudonarcissus luteus Polyantus, Gesn. Josephus stablein.

In Viridario quodam rustico præfectura Wilhelmsæ Sarum Episcopatus, iuxta tuguriolum Veturæ pauperulæ D. Ioan. Gerard. fortè fortunà hoc elegans Narcissi genus offendit. Martio cõgeneres pleni floris Narcisso luteos flores laxariucundos.

BVLBOCODII PLENO FLORE SPECIOSUM genus Veneti.



ANNO 1603, scribebat ad me Venerius, inquit Clusius Exot. appèd. 2. se obseruasse Pseudonarcissi genus quoddam sibi antè non conspectum, cuius paucos reperisset bulbos: illum autem vitis coloribus depingi curabat, quia verò similis formæ à nemine hætenus obseruatū esse arbitror, in tabella eius iconem exprimendam curabam.

Quantum porò ex pictura quam ad me mittebat obseruare poteram, crescebat hæc planta Tom. II.

Pseudonarcissi vulgatis modo, quatuor oblonga viridia folia ex bulbosa radice producens, inter quæ prodebat calicis latus, modis, viridis, pedem altus, summo fastigio membranaceum folliculū sustinens, è quo emergebat flos foliis pallidis, geminà serie dispositis præditus, prominente ex eius umbilico calice siue tubo oblongo, cras habente nonnihil reflexas, etque crispas & incisas, aurei prorsus coloris, veluti Pseudonarcissi maioris Hispanici tubus, attamen non simplici, vt ille, sed triplici, hoc est continente alteram tubum qui tertium comprehendebat: radix erat bulbosa, ex multis tunicis constans, quarum externa subfusca, multis fibris extinà sede prædita. Si vnicam duntaxat plantam reperisset, nihil nouum uideretur, quia natura interdum sic in floribus ludere solet: sed quum aliquot similes obseruauerit, peculiare quoddam genus esse credendam est. Scribebat etiam vnam Pseudonarcissi vulgatis plantam binos flores in eodem caule gerentem obseruasse, quæ alioqui vnicum solummodo proferre soleat.

BVLBOCODII SIVE NARCISSI FLORIS lutei multiplicis varietas.

Londini diluatore maioreque flore uariat, & in foliorum floris extremitatibus angustiores in horto D. L. de Francque ville. Radix Aluimodo nucleis propagatur. Foliis est quàm superiorum paulò latioribus & tantillam recuruatis. Adu. part. 2. Lob.

NARCISSVS CYPRIVS LVTEVS polyanthes flore pleno.



Debetur hoc admodum elegans Narcissi exoticum genus egregio viro Londinensi, D. Leete negotiatori Constantino-politano: qui eius bulbos cum pluribus aliis è Cypro Insula delatos, amicis suis comunicauit, & hoc mense Decèb. 1604. filia pedalia, imà sede vnicam lara, superne angustiora, & flores vno caule foliis altiore plures, luteos, multiplicèque laxauit in horto præfati D. de Francque ville, è bulbo Narcissi crassiore, coloris Castaneæ inuolacro tecto.

Hanc Narcissum esse, ex natura quorundam exoticorum bulborum, valde suspicor, quibus à natura insitum est, vt non nisi anno primo à quo in Septentrionales regiones algidiores deuecti sunt, soli & cæli natiuu succo adhuc prægnantes, flores laxent. Huius enim Cyprii Narcissi folia Autumno germinare inceperunt D. D d d 3

Lectre, D. Coys & alijs quorum sepe mentionem fecimus, [inquit Lobel. Adu. 2.] sed nusquam floruit bruma aut Vere elapso, in praedicto horto de Franqueuille mediâ admodum manufacta hyeme, ubi flores illic leuissimâ serâ superueniente aura marcescunt. Huius familiae est Narcissus Polyanthos Byzantinus, & Lilium Alexandrinum Italorum, nec non aliae Plantae.

C. Bauh. *Narcissus* 16. siue luteus exilis. Pseudo: narcissi genus admodum exile Clusii. *Narcissus* 21. siue montanus coronatus.

BVLBOCODIVM MINVS.


Descriptio

Pseudo narcissus minor Clusii.



Iohan. Baillet Insularius & Muronus alunt Narcissum montanum Theophrast. multo minorem vulgari. An Pseudo-narcissus minor Hispanicus latifolius, qui nouo vere terna aut plura profert folia, maiori, forma coloreque similia, sed longè minora & angustiora, florem pusillum, maiori tamen hispanico & forma & flauo colore persimilem, insidentem digitali, tenui, viridi cauliculo inter folia emergenti: flori succedit trigonum, obtusis tamen angulis, & ferè rotundum capitellum, in quo semen inaequale nigrum, fatis magnum pro planta proportione: radix bulbosa, exigua, foris nigricans. Mihi mihi hic fuit primum à Io. Moutono, Narcissi minimi montani latifolii nomine; deinde à Generoso Dn. de Longarte pro Pseudonarcisso minimo Hispanico flauo. Clus. hist. post.

BVLBOCODIVM MINIMUM coronatum.



Plant. icon. p. 122. *Narcissus minimus coronatus*. T. 122. Lobel. hist. Belg. Klein geeroude Berg *Narcisse*. Lat. *Narcissus montanus minimus coronatus*. Muronus nobis misit.

An Clusius Pann. *Pseudo Narcissi* genus admodum exile ex Hispania missam per Regis Hispaniae uortulanu. An

BVLBOCODIVM TENVIFOLIUM. flore luteo.



N Ascitur, inquit Clusius, quibusdam Lusitaniae, Bataviaeque collibus Pseudonarcissi genus cui folia non lata ut superioribus, sed valde angusta, siue potius aerea, caulis tenuis, nudus, palmum altus, cuius extremitati insidet flos è vaginula emergens, qui sex folijs herbido pallefecibus & expansis constat, quorum medium calix flauus, calathi instar oblongus, oris praedictus non sinuosis & fimbriatis, ut superiorum, sed aequalibus; radix exigua Narcisso similis, intus candida, foris nigricans. hisp. & nit. post. *Narcissus uniceis folijs primus*. Sed Clusius icorem non habet pro tenuifolio primo, idè nos ex Lobelio ponimus qui fortè idem cum eo de quo Lobel. in append. Narcissus montanus iuncifolius minimus flore luteo, palmaris longitudinis, tenuibus foliolis iuncis, multo exilioribus, interdum erectis, interdum ad terram reflexis: inter quae cauliculus palmaris exeritur, in cuius summo ex tenui, instar ceterorum Narcissorum, consimili membrana, flos singularis, vulgato Narcisso montano similis, & penè par, aspectu suaussimo & hilariore: cui siliqua Narcissi succedit. Radicis bulbus quantus nucis ponticae nucleus. Huius peregrini floris primus me monuit C. V. Aluarus Nonnius Medicus Antuerpianus eruditissimus. Postea eius bulbo me donauit M. D. Maria de Brimeur, è cuius uicis florentem plantam delinari curauimus. Paucis post diebus eiusdem icorem Tornaco ad me misit noster Mouton, sed erectis folijs ab hac duntaxat variam.

Narcissus uniceis folijs minimus alter flore luteo Lob. *Narcissus* 17. siue montanus luteus minimus: C. Bauh. phyc. Florebat sanuatio, cum Vlyssipone hispalim Clusius proficerecetur, ubi incolae Campanilla, hoc est, Campanulam vocabant.

Narcissus uniceis folijs minimus alter flore luteo Lob. *Narcissus* 17. siue montanus luteus minimus: C. Bauh. phyc.

Florebat sanuatio, cum Vlyssipone hispalim Clusius proficerecetur, ubi incolae Campanilla, hoc est, Campanulam vocabant.

BVLBOCODIVM TENVIFOLIUM aliud flore luteo fimbriato.

IN sigulinis [ut scribit Lobel. in append.] adferuatur & colitur è Bisciaie montibus in Belgium delatus bulbus à quodam à Gallicia redeunte: Narcissus montanus iuncifolius minimus alter flore luteo fimbriato reddendus pag. Obl. 63. Rugosus



gofis plicis, fimbriatisq; floribus habuit Mutton, alioqui non differt à superiore. Narcissus montanus iuncifolius minimus, alter flore luteo fimbriato Mutton, Lob. in append. T. 155. C. Bauhin. Phyt. Narcissus 13. sine montanus luteus fimbriato flore.

Cluf. hist. post. cap. 17. i-

conem habet qualem Lobel. sub hoc titulo *Pseudonarcissus iuncifolius*. 2. flava flore: ac addit. Alter *Pseudonarcissus luncensis* foliis tenuiora paulò, licet surrecta, habuit folia, florem flauum, hoc est, calicem per oras leuiter & tenuiter fimbriatum, & sex illa foliola calycem ambientia, ex herbido pallefcencia, in capitulo flori succedente nigram rotundiusculum semen etiam tulit: radix pililla, foveis nigricans, bulbacea, tenuibus fibris è sede prodeuntibus firmata.

NARCISSVS FOLIS FLORIS ALBIS
oblongo calice luteo.

Mittebat [inquit Cluf. Exot. par. 2. in append. altera] ad me anno 1601. Erud. vir Ioach. Venerius Burdigala, inter plerasque plantas quatuor Narcissi bulbos, quos duorum generum esse, & vnicū florem gestare scribebat, è singulis videlicet generibus binos. Illo tum vnus insequente Aprilis florem tulit. Quum verò similem antè videre nō meminerim, illius iconem in tabella exprimentam curabam quam Lectoris oculis proponere, atque eius historiam adijcebam. Habebat porrò is Narcissus terna, oblonga, & satis angusta, carinataque folia, cæsi quodammodo ex viridi coloris: inter quæ prodibat caulis pedalis longitudinis, aut amplior, lauis, enodis, satis gracilis, firmus tamen, summo fastigio folliculum membranaceū sustinens, è quo emergebat vnicus flos longiusculus, summā parte in fena folia alba & in macronem delincentia diuisi: cuius umbilicum occupabat calix flauus, semunciam longus, oris aliquantulum incisus & quodammodò fimbriatis, habens in medio stilum pallefcentem, eiusdem cum calice longitudinis, cinctum sex staminibus flauā veluti farinā conspersis, eorum præsertim apicibus. Semen obseruare nequiuī, quia florem carpebam, vt à pictore commodius exprimi posset: valde autem lituus erat odoris. & Muscari floris odorem penè referentis: radix bulbacea, oblongiuscula, digitalis crassitudinis, alba, è multis runcis constabat, quarum exterior subfusca, aliquot crassioribus fibris albis infimā sede donata. Alter ab eodem Venerio missus florem dabat etiam Aprilis altero post superiorē anno, illi prioris similem: calicis tamen eius oræ magis erant croceæ. Vnum etiam non valde dissimilem videbam apud Honeft. virum Christianū Porretum, qui à Venerio acceperat: illius tamen

fena folia ex albo pallefcabant, aut *ex croceis* erant, calix verò multò latior, & oras planè croceas habens. Iac. etiam Plateau similem habuisse eodem anno florentem intelligebam: illum autem à rhizotomis quibusdam Gallis redemerat cum aliis bulbis è Pyrenæis montibus erutis.

Narcissum album montanum, calyce magno luteo Botanico Lutetiano N. Quelc debet Lobel. Adu. par. 2. qui eius bulbos, vncias duas longos: & vniū, plus minus, crassitudine æquates, in Pyrenæorum montium Souton iuxta *Banmiers de Luffon* monte vocato eruit, nec dum illi floruerat.

Narcissus albus montanum.

PSEVDONARCISSVS ALBO
flore Clufii.

Inter Narcissos reponendam esse inquit Cluf. Exot. par. 2. App. 2. eam plantam quæ Pseudonarcissi appellationem vulgò obtinuit, nullum esse opinor mediocriter in re herbaria verfatum qui dubitet: Multæ autem sunt eius differentie &c. verim enim verò nouum quoddam genus repertum est quod valde rarum censeo, cuiusque binos bulbos anno 1604. ab Eruditiss. Venerio accipiebam: Horum alter florem mihi protulit insequente Aprilis quemadmodum etiam aliis, Sed & eodem anno mense Decembri Rhizotomis quidam Gallus similes plantas adferbat: valde elegans hæc planta, terrena è radice bulbosa oblongiore, nigroque cortice iue membranâ tecta (à cuius sede frequentes tenuesque oriebantur candidæ fibræ) proferebat folia, dodrantem vel paulò amplius longa, Narcissi angustioribus foliis valde similia, lupinâ parte carinata, inter quæ nudus prodibat caulis satis exilis, non crassus, dodrantem altus, summo fastigio membranaceum folliculum gerens, è quo propendebat flos rotus albus, Pseudonarcisso vulgariori, quem Germani *Gelbe hornügs blumen*. Belg. verò *Gele Tullofen* appellant, formâ quidem similis, paulò tamen minor, sescunciam longus, sex foliis tubum amplectentibus



similiter constans: tubo autè paulò angustiore, & oras nonnihil fimbriatas habente, in quo sex alba stamina flauescente apice prædita, & medius stilus longior: nullum verò peculiarem odorem in eo flore obseruabam, qui aperiebatur Aprilis, deinde Iunio semè proferebat in triangulari capite sue thecæ, orbiculare, nigrum & splendens, quale Narcissi iuncifolii albo flore reflexo, sed maius.

BVLBOCODIO FORTE AFFINIS BVL-
bus flore luteo.

BVlbus ex Hispania Clusio Pann. missus per Regis hortulanum flore luteo superiore parte aperto. C. Bauh. Leucoium bulbosum 4. Nec plura habent.

BVLBOCODIO FORTE AFFINIS BVL-
bus alius flore luteo.

BVlbus Clusii Pann. alius flore luteo humili, cui semen simile Hemerocallidi Valentinae. Casp. Bauhin. Leucoium bulbosum 5. Nec plura adiciunt.

NARCISSVS IUNCIFOLIVS OMNINO
albus calyce longo.

Scribit Clusius Hisp. & in post. hist. se intellexisse ab Hispanis Narcissi quoddam genus in

Descriptio



Hispania inueniri quod omnino iuncis etiam sit foliis, sed florem candidum producat, eaque ob causam *Iunquillos blancos* ab incolis appellari. Anno 1596. inquit preterea, à D. Simone de Tourar paucos bulbos eo nomine insignitos accipiebam: sed ad exiles, ut post multos duntaxat annos

illorum flores sine sperandi, imò illos ipsos nullo modo auctos anni 1600. asperum gelu, quod Februarii mense valde apud Belgas seuit, profusus corrupti. Et Pann. Narcissus iuncifolius flore albo ex Hispania missus per hortulanum Regis. Item Exot. par. 2. App. 2. Narcissi genera duo anno 1605. apud amicos flores protulerunt, nunquam antea mihi conspecta. Primus Narcissus iuncifolius albo flore reflexo, è radice bulbosa Nucis ponticae magnitudine, candida, fusca, membrana obducta, cuius sedem plurime tenuis albae fibrae occupabant, quaterna aut quina exiliebant *folia*, dodrantem longa, angusta & parè iuncea, aliquantulum striata, & supinâ parte nonnihil caninata, viridia, inter quæ prodibat dodrantalis *caulis* viridis, lauis, non valde crassus, summo fastigio sustinens in membranaceo inuolucro, binos, ternos, interdum quaternos oblongos *flores*, niuei quidem candoris, sed odoris expertes, deorsum propendentes, sex longiusculis in latis angustis foliis præditos, sursum reflexis, florum cyclaminis instar, è quorum umbilico prominerebat calix semunciam longus, vel etiam longior, inæqualibus oris, continens tria *stamina* alba, quorum apices flauescerent, & tenuem longum stilum extremas calicis oras multum superantem: succedebant triangulares *stipulae* siue theca, exiguo, orbiculari, nigroque & splendente *semine* plena. Florebat autem Aprili. Istud Narcissi genus redimebant

biennio antè à rhizotomo quodam Gallo cui nomen N. le Quell siue Quilt, elegantes & raras plantas in has Prouincias quotannis adferre solito, quas per suos in Pyrenæis & etiam in Hispaniis conquirere iubet. Inter eos etiam qui redemerunt, nonnulli huius Narcissi plantas habuerunt paullò latioribus foliis præditas, quarum flores etiam oblongiores erant. Alterius Narcissi iuncifolii vnicam plantam habuit Christianus Porretus Pharmacop. Leydenfis, à Petro Gassano siue Plantino missam, cuius multò longiora erant folia, quàm præcedentis, & viridia: *caulis* etiam longior, summo fastigio sustinens binos aut ternos flores diuersæ tamen à superiore formæ: nam Narcissi iuncifolii minoris floribus valde similes erant: horum tamen color albus, tam ipsius calicis quàm sex foliorum ipsum ambientium. Florebat etiam Aprili: radix erat non valde magna, longiuscula, membranâ eam cingente protus fusca. Accipiebat etiam ab eodem alios bulbos simili nomine insignitos, crassiores tamen, quorum folia eius solus quos Nicolaus adferrebat valde similia erant: sed florem nondum tulerunt. Ceterum anno superiore nobis mittebat non solum Venerius, verum etiam Nicolaus adferrebat plantas Narcissi iuncifolii albo flore nomine donatas: eæ autem quum florem nondum protulerint, nihil de eius forma vel colore pronunciarè possum: nam bina duntaxat habuerunt hoc anno folia cum eæ plantæ quas nactus sum, tum quas alii redemerunt, & illa quidem angusta, supinaque parte aliquantum plana, valde longa, non tamen stricta, imò potiùs humi quodammodò procumbentia: illorum item color, meâ opinione non vnus. Nam plantarum quas Venerius mittebat, magis viridis videbatur: earum quas Nicolaus adferrebat magis ad caelum tendens, penè vt foliorum Pseudonarcissi. Si quam porrò dabunt florum differentiam, proximus aut eum subsequens annus (si viuimus) certiores efficiet.

C. Bauh. Phyt. Narcissus 25. siue *Iuncifolius* flore albo. Iuncifolium Narcissum totis albis floribus ad Lob. Adu. part. 2. misit C. V. D. Kirch Bellenal, horti Medici præfectus in Monspeliensi schola.

BVLBOCODIVM MINIMUM
tenuifolium album.



PSEUDO Narcissus iuncis foliis tertius, Clusii in post. Hist. quaterna aut quina *folia* habuit tenuissima, & capillaria, viridia, humi procumbentia & sparsa, inter quæ *cauliculus* emerit infimus, palmaris, tenuis, nudus, vnicum in summo *strem* è membranaceo foli-

liculo procedentem fustinens, tenellum, candidum omnino, & calicis oris fimbriatis: huius *semen* non obseruati, *radix* superiori similis. Omnes verò has elegantulas plantulas ipsi abstulit asperitima illa anni 1586. hiems.

Narcissus omnium minimus montanus albus Lob. in append. T. 156. C. B. Phyt. Narcissus 20. si-
u. *montanus albus minimus.*

NARCISSVS IUNCIFOLIVS ALBVS
calyce magno D. Cor. Coorne tor-
tilibus foliis.

Narcissus
Iuncifol.
inquit Lobel.
Adu. pag. 2. al-
bus tortilibus
foliis floris
donato, caly-
ce magno &
longo nutan-
te, prominulo
pistillo tenui.
qui ano 1604.
floruit Me-
dio Castr
Walachriae a-
pud D. C. Co-
orne, cuius
floris iconem
Londinum ad
me misit. Idè
esse reor cum
Narcisso Iun-



cifolio omnino albo, calyce amplo, prope Betam
Gallaciz oriundo, empto à Nic. le Quele Rhi-
zotomo Parisiensis, Anno 1603.

NARCISSVS IN GENERE.

HYacinthis congener est Narcissus, qui (The-
ophrast. lib. 6. cap. 6. teste) etiam Lirion co-
gnominatur. Alii siquidem hoc, alii illo nomine
appellant, *Folium* ad terram Asphodeli folio si-
militate habet, sed multò latius, vel ut Lilium: *can-*
tem sine foliis herbaceum: & in summo *florem*:
& in pellicula quadam velut in vase, *semen* ad-
modum magnum, colore nigrum, figurâ oblon-
gum. Hoc excidens spontè germinat: sed & qui
colligunt id figunt: & radicem quoque plantant
quam habet carnosam, rotundam, magnam. Sed
in Narcissi descriptione Dioscor. secutus est Theo-
phrast. scribens: Narcissum aliqui, & ipsum ve-
lut Lilium, Lirion vocauerunt. Folia habet
Porto similia, sed tenuiora, & multò minorâ ac
angustiora: caulem etiam, sine foliis, altitudi-
ne palmum excedentem: in quo flos est albus, in-
tus croceus, in aliquibus purpureus. Radix est
ficus alba, rotunda, bulbi speciei, semen velut in
pellicula, nigrum, oblongum. Nec vlla diuersitas
(ait Comar.) in folio est, quod Theoph. Aspho-
deli: Dioscorid. verò Porri folio simile dixit.
Nam & Dioscor. Asphodelo, Porri folium attri-
buit. Sunt & purpurea (autore Plinio lib. 21. c.
5.) Lilia, aliquando gemino caule, & carnosiore
tantum radice, maiorisque bulbi, sed vnus: Nar-
cissum vocant: huius alterum genus flore candi-
do, calyce purpureo. Differentia à Liliis est &

hæc, quòd Narcissus folia in radice sunt. Tertio
generi cæterâ eadem, calix herbaceus. Ità Plin-
ius Lilia à Narcissis distinguit. Sed clariùs de-
inceps de Narcissis cap. 19. agit. Narcissi duo
genera, inquit, in vsum Medici recipiunt. Vnò
purpureo flore, & alterum herbaceum. De pur-
pureo eo Narcisso Virg. in Buc.

Pro mollis viola, pro purpureo Narcisso

Carduus & spinis spargit Paliurus acutus.

Quidius etiam ad adolescentem Narcissum, flo-
ris Narcissi ortum referens, hunc affabrè depin-
git, ita canens:

Nusquam corpus erat, croceum pro corpore
florem

Inueniunt, foliis medium cingentibus albis.

Virgil. purpureum Narcissum [vt putat Hadrian.
Spick. Itag. lib. 1. cap. 11.] nominat, non quòd vn-
dique sit purpureus: sed quia medium floris
(quod calicem Plinius appellare videtur) purpu-
reum cernatur. Plinius vnun genus Narcissi
purpureo flore recenset, alteram herbaceo: quod
tamen si de floris colore intelligat [inquit iam di-
ctus Spick.] falsum est. Non enim flori color
herbaceus, sed albus: in medio verò aut croceus,
aut purpureus, aut albus totus. Herbaceum cau-
lem Narcissò adscripsit Theophrast. pro *modis*.
Videtur Plinius legisse *modis de* & sic ad florem
non ad caulem herbaceum retulisse. Ex his om-
nibus colligitur Narcissum esse ex genere flori,
qui à Cornario Zeytosen / & herb. ibidem / ap-
pellantur. Sunt enim multæ & coloribus diuer-
sæ species.

Narcissus
multi.

Ceterum, quòd Plin ait, à narce Narcissum,
non à fabuloso puero dictum, restatur hoc Plut. in
Sympos. qui quasi neruos hebetantem, & torpi-
das facientem grauitates, refert. Quapropter
& Sophocles magnorum subterraneorum Deo-
rum coronamentum eum vocat, quòd scilicet
defuncti, & morte rapidi, torpida flore meri-
tò coronarentur. Appellatur autem etiam, Apu-
leio teste *αυδου*, *βορβου* *εμμενο*, *αυτογενες*. *Αυ-*
τογεν quidem Narcissus propriè montanus est, eò
quòd ab aquis remotus proveniat. *βορβου* *εμμενο*
nomen ab effectu habet: Dioscor. siquidem au-
tore Narcissus etiam vomitum conicit.

Narce.

Corona
Deorum.

Græci huiusmodi flores *Ναρκισσος*, Latini simi-
liter *Narcissus* appellant. Germ. *Narcissen rösze*
lin. Belg. *Narcissen Spaensche Jenceten* / Gal-
li peculiare nomen non habent, possent tamen,
autore Clusio *Narcisses* nominare. Hisp. *Narcisso*
vocant. Omnem porò Narcissum præter eum,
quem peculiari nomine, *Dueb. hini* (Narcissum
mediopurpureum) Clusius appellari dicit, Tur-
cæ propriè appellant *Serin cada*, hoc est, Regium
calicem, quod flauum illud in medio flore, calicis
formam quodammodo referat: qui verò mit-
tunt eius bulbos vario corruptoque nomine, vt
plurimum inferibunt, nunc *Zerem cada*, modò
Zerem cada, interdum etiam inceptiore *Zar em cat-*
ta, addita voce *bianca*, vel *giallo*, cum colorem
album vel flauum designare volunt. At qui pleno
est flore, plerumque *Zerem cada catamer* ap-
pellantur, additis iisdem vocibus *bianca* & *gial-*
lo, pro coloris florum, quos mittere se putabant,
uarietate: tamen si sepius nobis impositum de-
prehenderimus: nam multos simpliciter flore hoc
nomine accepimus, contra nonnunquam pleno
flore præditos, hac simpliciter *Zerem cada* inferiptio-
ne. Interdum etiam tam plenus, quam qui am-
plo simplici est flore, præsertim crasso præditi
bulbo, Penachio nomine missi, *Gnil caramer la-*
te (qua appellatione & Anemonem pleno flo-

re, & alias quasdam Scirpes accepimus [quae voces Rosae plenae florem significant. Sapphili. nec etiam eiusdem generis bulbis diuerfa nomina adscripta fuisse comperimus. vt schedis additis minus fidendum sit, sed cuius coloris florem sint habituri Narcissi bulbi, ipsa *aurora* nos docere & certos reddere debeat.

Nascitur, autore Diosc. optimus in montanis locis [probatissimus in Lyciae montibus, Plin.] odoratus: reliquis Porrum refert, & herbaceum odorem remittit. Ast contra nasci odoratum etiam in pratis refert Theocritus Eidylio 20. vbi Europam cum suis prata ingressam, bene spirantem Narcissum carpsisse, canit his versibus:

*Florida sed postquam venere in prata puella,
His illa, haec alius se floribus oblectabant.*

*Narcissi, illa quidem bene olente, atque illa
Nymphae.*

Vires &
vius

Narcissus Theophr. serotinus valde est. Nam post Arcturum floret, & circa Aequinoctium (Autumni Plin.) Ita quidem Theoph. quod postremum etiam reddidit Plinius, & omnibus generibus adscripsit. Narcissi omnes serotini.

Narcissi radix (autore Diosc.) siue estur, siue bibitur, vomitus mouet: prodest ambustis ab igne cum melle trita: praecisus quoque neruus agglutinat imposita: luxatis item malleolis, diuturnisque articuloꝝ doloribus trita cum melle, & imposita subuenit: expurgat ephelin & alphum cum vrtica semine & aceto: at cum Eruo & melle vlcera sordes expurgat, & abscessus qui aegre maturantur rumpit: educit & aculeos infixos cum Lolii farina & melle. Et in vsu quidem Medico tradendo Plinius non multum a Diosc. euariant. Narcissus herbaceus vomitorius est, ac ideo stomacho inutilis: alios quoque soluens, neruis inimicus, caput grauens. Vtriusque porro radix mulsei saporis est. Ambustis prodest cum exiguo melle. Sic & vulneribus & luxatis. Panis vero cum melle & aena [arinea vet. lolii scilicet] farina. Sic & inlixa corpori extrahit. In polenta tritus (trita Dod.) oleoque, contusus medetur & lapide percussis. Purgat vulnera permittit farinae. Nigras vitiligines emaculat. Ex hoc flore fit Narcissinum oleum (unguentum Diosc.) ad emolliendas duritias, calcificandaque alserunt. Auribus est vtilissimus, sed capitis dolores facit. Ceterum Narcissi radix, vt Galenus ait, usque adeo exiccandi facultate pollet, vt & maxima vulnera glutinet, vel ad incisiones vsque, quae circa tendones accidunt: habet vero quiddam absterforium & attractorium. Narcissi cuiusdamque generis radicem praemaniam vomitum cetera Clusius sapenuncro expertus est.

NARCISSVS MEDIO PURPUREVS.

Descriptio

Radix ei bulbosa & fibrosa, sapore amaricante: *folia* a radice statim exoriuntur caulem tanquam vagina aliquosque inuoluentia, latitudine semunciali, pari cum caule longitudine: *caulis* singularis, sesquicubitalis, compressus nonnihil, vtrinque acutus, fistulosus; in cuius fastigio *stos* vnicus amoenus, suauis olens, candidus, nutans, pediculo per articulum cauli iuncto, vaginam membranaceam obuoluto, cuius cervix in triquetram saturatam virentem floris quasi basim demittit: hinc canaliculata fistula explatatur, cui *sema* illa floris candidi folia coherent subrotunda, quorum tria aculeum mollicellum proferunt, totidem alternatim eo destituuntur: florem me-

dium obtinet corona subbriata, ora rubenti, interea quam circulus exalbido, aliusque huic subiectus luteus: *sema* in fistuloso canali stamina lutea, tria

modice elata, reliqua tantillum apices proferentia. Figura nostra exemptis non placet.



Narcissum suum medio purpureum Dodon. sic describit: Folia habet virentia oblonga, porri foliis similia: caulem angulosum, absque foliis, dodrantem aut pede altiore, & in summo florem & membranam erumpentem,

vt plurimum vnicum, subinde geminum, mediocriter amplum, odoratum, ex sex candidis foliis congestum, in quorum medio breuis calix est circumatae rotunditatis, purpurei per ora coloris, intra quem stamina breuia, cum apicibus subluteolis: capitula inde angulosa: semen in his nigrum: radix bulbosa, quae nucleos ex se demittens, in multos facile bulbos multiplicatur. Reperiuntur autem huius generis tres, forma, colore, aut odore nequaquam, sed florendi tempore, differentes: magnitudine etiam nonnulli, sed parum, dissidentes. Maiores medii praecedentes & serius procedentes, minores sunt. *Narcissus Dodon. gall. flore singulari*, in cuius medio circulus coloris pallidi aut herbacei cum subbria rubra. Eiusdem hist. fl. & in fol. *Narcissus medio purpureus*, cui floris candidus, in cuius medio breuis calyx purpurei per ora coloris. *Narcissus Diosc. Theocrito, Plat. Sophoc. Apuleio, & Plinio. Narcissus purpurei floris*, cuius etiam Virg. in Bucol. Aegloga 5. & Theophr. l. 7. meminit.

Trag. *Narcissus Veterum*, qui descriptioni Diosc. & Serap. pulchre respondet: flores niui in quorum medio teres luteus ac eleuatus apparet circulus, Luna quadam flammee coloris circumdatus: Diosc. dicit nonnullos vocare Narcissum Anhydron, alios Autogenes, alios Bulbon emeticon, alios Liton, Romani Bulbum morbitarium, vel [vt alia legunt exemplaria] Vomitorium vocant.

Narcissus ille qui Trag. verus: Gesnero vero potius Aenone Limonia videtur, quibusdam *Urtum Dine Mariae* dicitur. Lob. & Pen. Adu. *Narcissus medio purpureus Dod.* Vulgatissimum Poeticus, cuius croceum florem videre est, foliis medium cingentibus albis, vt scite canit Metamorph. estque idem Dioscor. Narcissus. Flores candore micantes lacteo, corolla medium occupante subbriata ex croceo purpurascente. Obs. Narcissus Poeticus medio croceus & (vox, & superflua est) medio purpureus Dodon. *Hisp. Lirio blanco* & *Cebolina* Adu. p. 50.

Clus. *Hisp. Narcissus medio purpureus* Dioscor. qui nonnullis Narbonensis Galliae pratis sponte pronenit. Idem Pann. & hist. post. Narcissum qui medium calycem exiguum & planum, subbriacque

brâque rubente insignitum habet vnicum duntaxat ferè semper, aut rarò binos flores, eodem caule ferentem, Turcè vocant *Deuè bohini* vel *bohni*, id est, Cameli siue caput nuncupant, quoniâ floris collum longius quàm cæteri Narcissi profertum habet.

Cur Frater separet Tragi & Lobelii Narcissum à Dodon. nondum animaduercere possùm, nisi ea distinguens particula, Et postea, in Obf. occasio nem ei præbuerit, verùm superfluum esse satis apparet ex Lob. hist. Belgica & Plantini iconibus.

Narcissus verus non ita pridem vitus Trago fuit, primùm namque è Burgundia in Germaniâ deuenit, dein verò Biponti in horto quodam plantatus: Flores iniitiis Maii mensis emicant. Narbonensîs, (tradente Lobel.) Galloque pronunciat prata ornat Februario & Martio. Hortis Belg. Germ. & Anglicis inquilinus. Excutit qui medio purpurei sunt [inquit Dodon.] plerisque Gallie locis, & apud Heduos ac Sequanos in Pratis. In Belgio prioris generis præcoces Narcissi florent Aprili. Circa Monspelium spontè Prouenit in pratis quibusdam. Idem passim in Germania habetur in hortis: Basileæ habetur florens Maio in hortis. In horto patris mei vidi cû foliolis sex ac etiam decem in vno flore. Geneuæ florens in fine Aprilis. In Italia spontè prouenientem vidit. In Sabaudia spontè nascentem & Maio florentem inueni prope pagum *Cormon* non longè à S. Mauritio. Mantuæ in hortis. Ferrariæ in horto Principis ostendit Alois. Angul. Montbelg. est mihi in horto Ill. E. C. Narcissus mediopurpureus maior, qui interdum fert duos flores ex vno pediculo.

quina Martio mense erumpunt *folia*, oblonga, angusta, inter ea deinde *caulis* nudus, rotundus, intus fungosus, in cuius summo, è tenui membrana prodit, vnicus nonnunquam & alter, *stos*, sex



niucis foliis stellæ modo decussatis constans, paruum calycem pallidum cingentibus, cuius orre rubella sinitria exornata, sex in eo inæqualibus staminibus flauescens: flori suauiter odorato succedunt *capitula*, triangula, crassiuscula, in quibus nigrum inæquale *semen*: *radix* vt cæteris bulbacea, multis candicantibus tunicis constans, extima, quæ reliquis ambit, falca, è cuius fissili parte plurimæ subulscæ fibræ dependent.

Dodon. Gal. Dux species Narcissi planè similes Mediopurpureo, foliis, caulibus, semine & radice, nisi minores essent, & vna altera citius floret, & altera tardiùs. Item Hist. Lat. præcoces & ferius prodeunt minores sunt. Plant. icon.

p. 113. *Narcissus minor serotinus medicroceus* T. 150. Lobelius duas habet figuras sub eodem titulo, minor non placet, in Adu. posita fuerat pro Lilio narcisso luteo, verùm apud Plantinum adæptus figura vnus è floribus. C. Bauhin. Phyt. *Narcissus* 5. siue *medivireus minor*, quem Frater videtur separe à Dodon. ferius florente. Tabern. icon. *Narcissus serotinus albus*, weis spat *Narcissen röslein*. In hist. Narcissus 16.

Prouenit magno [inquit Clusius hist. post.] miliari supra Gamingi Charthuf. Monast. D. Virgini ad Thronum nuncupata, sacrum, pratis quibusdam altissimo lacui vicinis ad prædium *zera* Hoff dictum, in quo, curantibus Carthusie moderatoribus, perhumaniter & luculenter excepti semper fuimus, dum in summa *Herren-alben* & *Surrenstein* iuga tenderemus, aut ex iis iugis Gamingam rediremus. Quo isthic tempore florebat, mihi non constat: Sed ille Viennam perlata, Maio mense in meo hortulo floruerunt: verisimile est autem natali loco ferius florere. Memini & illi ferè similes in Euganeis montibus inuentos, ac à Studiois ex Italia reducibus Viennam ad me perlatos.

NARCISSVS MEDIOPVRPVREVS
magno flore: folio latiore.

Meminet Clus. hist. post. Narcissi lat. septimi, quem sic describit: Latiora reliquis *folia*, æruginei ferè pallescentis coloris, inter quæ satis prode *caulis*, nudus vt reliquis Narcissis, paulò infirmior, foris striatus, intus concauus, summa parte sustinens magnum, laxum, membranaceum folliculum, quo desiccante exit vnicus, vt plurimum, *stos* magnus, odoratus, sex albis foliis medium calicem pallidum cingentibus constans, cuius sinitria ex pallido purpurea: flori succedit satis crassum triangulate *caput*, nigrum *semen* continens: *radix* crassior superiore & cum maiore illo, quem in Anglia spontè nasci dixi, comparanda, etiam soboles reliquarum Narcissinarum iustar, satis feliciter procreans.

E Styria allatum Dn. de Heusenstein dicebat: ferius etiam reliquis floret, nempe Maio mense. Id genus deinde satis frequens obseruabam Fræcorthianis in hortis.

NARCISSVS MEDIOPVRPVREVS
minor.

Spontè prouenientem circa Blaumontium arceem Il. CEL. Wir. obseruauimus Narcissum, qui etiam in eius horto Montbelgardi & aliis abundat flore omnibus partibus minore quàm precedentis, foliolis eius angustioribus & acutioribus, tardiùs etiam florens. Clusio in Pann. pag. 276. ni fallor *Narcissus serotinus montanus*: & in post. hist. *Narcissus latifolius* 6. cui quaterna aut

Narcissus medio purpureus minor prolifer & monstruosus.

In horto Bolleni apud fontem & Balneum admirabile, admodum proliferum obseruauimus Narcissum stellatum cum minori corolla, rubente, monstruosæque suos exerente in hoc florum genere lusus. Inter alios verò in vno caule, quatuor flores gestabat, eisdemque omnes foliorum numero differentes, vnus quidem vulgaris & sexifolius. Alter verò nouem, tribus nimirum

proliferis: at tertius decem, vno hunc excedens
 contabant. Quartus duplicem corollam, & præ-
 ter duodecim in ambitum sed temerè disposita
 folia, gemina adhuc. cornuum instar sursum è
 medio ferè floris producuta, que duras illas co-
 rollas separant, habbeat, erat cæteris elegantior.
 Caulis non rotundus, sed latus ferè vnciam, den-
 sus aliquatenus, planus, & longus vt reliquorum,
 eum demum in quatuor diuidunt partes nodi
 illi, qui, vt in vulgaribus, paulò infra feminis re-
 positiorum vel capitulum adfunt, arida protecti
 euticula.

*Narcissus parvus stellatus albus medio
 suauè rubente vertice.*

Exoticus parvus Narcissus nouus stellatus albus
 medio suauè rubente vertice nondum Lob. Adu.
 p. 2. floruit, acceptus à N. de Quelt Botanico Lu-
 teticano cum aliis Lusitanicis Narcissinis bulbis.

NARCISSVS MEDIOPVRPUREVS
 flore pleno.

Descriptio



Narcissus
 plenus
 quintus (Clu-
 ssi in poster.
 hist.) è genere
 Narcissi me-
 diopurpurei
 latifolii sexti
 qui ex laxo,
 membranaceo
 folliculo exit,
 prodirque no-
 uo Vere cum
 illo, foliis, ali-
 que rebus om-
 ninoò similis,
 solum disceri-
 men in flore
 est, qui sex
 quidem ma-
 iusculis foliis
 latè expansis

constat, vt ille, sed in calice illo rubra simbria
 ornato, alia sex folia paulò minora continet, sin-
 gula peculiarem fimbriatum caliculum habena-
 ria, è quorum medio, aliquot alia minuscula fo-
 lia staminibus permixta procedunt: suauis ad-
 modum est odoris, ad Muscari quodammodò ac-
 dens. Singulares vt plurimum sustinet caulis
 flores, interdum etiam binos, vt qui simplici fo-
 liorum texturà constantem florem fert.

Locus & tempus.

Floruit mihi Maio mense anni 1590. præce-
 dente Autumno à Io. Boissoto Bruxellis missus.
 Eodem tempore pro pleno etiam Narcisso acce-
 pi ab honesto viro Io. Mermanno Colonia bul-
 bum, qui quidem sequente vere prodiit & in sum-
 mo caule vaginulam tulit: sed illa exarscens
 floris spem præcidit. At annus 91. planè similem
 superiori esse declarauit. Quo etiam anno mi-
 hi communicauit N.V. Philippus de Siruy, præ-
 fectus vrbi Montibus Hannover, Narcissi bul-
 bum, qui sequente anno florem tulit illis simi-
 lem, sed viginti, & pluribus foliis constantem,
 intercurfante illa fimbriato calyce, vt iam dicto.
 At qui Ill. Com. de Aremberg floruit anno 1589.
 quatuor & sexagena folia habuisse scribebat ad
 me idem Boissot, & vnicè bulbi, quem ab eodem

Comite impetrauerat, prolem superiore Augu-
 sto, cum aliis aliquot raris bulbaceis stirpibus ad
 me mittebat: verùm tabellario, cui pyxidula,
 quâ inclusi erant, tradita erat Coloniam ferenda,
 in prædones incidente, cum illi adiunctis pe-
 riit magno meo dolore.

Dodon. lat. in fol. & de fl. *Narcissus purpureus
 floribus multiplicibus.* C. Bauh. Phyt. Habetur Pa-
 tauii in horto Bembyano multiflorus polyanthes
 medio purpureus.

NARCISSVS FLORE SINGVLARI
 albo pleno.



Narcissus
 plenus
 sextus albo flo-
 re, autore Clu-
 ssi. hist. post. vide-
 tur habere fo-
 lia paulò an-
 gustiora (quàm
 quintus de quo
 proximè scrip-
 tum) alioqui
 non dissimilia,
 bis floris speci-
 men Vienna
 mihi dedit, sed
 vitium fecit,
 Francofurti to-
 to biennio fo-
 lia duntaxat
 nouo vere de-
 dit: an id acci-
 dar propter
 fecunditatem, proles enim singulis annis facis
 liberaliter subministrat, ignoro: at qui bulbam
 cum hac icone mittebat hon. vir Iacobus Pla-
 teau, mihi significabat vnicum summo caule fer-
 re florem sub Maii mensis finem, totum niucum
 & multiplici foliorum texturà constantem: hu-
 ius radix minor est quarto genere.

NARCISSVS MEDIOCROCEVS
 tenuifolius.



Narcissus
 mediocro-
 ceus nomine à
 Lob. Adu. part. 2.
 pingitur planta
 singulari flore
 de qua tradit: In
 Londinensi sub-
 urbano hortulo
 honestissimi viri
 henrici Casfa-
 bri egregii, flo-
 rum & fructuum
 rariorum stu-
 diosissimi, Anno
 1602. hunc indi-
 etum Narcissum
 in Belgio nactus,
 obseruauit, pal-
 maribus & quin-
 que vncialibus
 tenuibus, Hy-
 antino

cinthi Autumnalis foliolis, viridibus: Bulbo ca-
 teroque

teroque emle dodrantali & flore præcoci me-
diocroceo, Narcisso non dissimili, minore tamen.

NARCISSVS MVLTOS FERENS FLO-
res mediolurcus Narbonensis.

Radice donatus est bulbosa satis ampla, nigricantibus aliquot tunicis septa, fibrisque multis capillata, inrus omnino alba & si præcudatur, lentum quandam succum, vt reliqui bulbi exstiliante, amara, vnde *fl.* producantur Leucocii bulbosi Exaphylli vel Porri foliis ferè similia. Clusio virentia, longa: inter qua emergit *caulis* vnus, aliàs duo aut tres, caui, striati, nudi, vigentibus floribus, dodrantales, iisdem in semè abeuntibus plusquam cubitales, in cacumine ex membranco inuolucro, *flores*, ex longis collis & pediculis triangulis, prominent nouem, decem, vel duodecim, interdum duos duntaxat: Monspelii locis humidis [sed qui magnitudine paucitatem condensent, nisi forte alia species] pulchros, odoratos, quos constituunt folia sex, alba, Clusio

interdum *æ-*
æ-
æ-
coronâ luteâ
meditullium
vnde apices e-
rumpunt am-
biente. *Semen*
nigrum, ob-
scurum, rugo-
sum, angulo-
sum, saporis
amari, in pe-
ricarpis mi-
noribus quàm
Narcissi me-
dio purpurei,
Cardamomi
minoris vulgò
dicti, follicu-
lis non mul-
tùm absimi-
lis.



Lobel. &

Pen. Adu. & Obs. *Narcissus Mediolurcus* Dodon. floribus fenis, denis, duodenisque, minus candidis & circinnato verticis calyculo in luteum languescente. Galloprovincia, vbi gramini detrimèro, *Donas* flores quos corollis innectunt, vocitat. Plant. icon. pag. 114. Narcissus mediolurcus *Donas* Narbonensium. C. Bauhin. Phyt. *Narcissus* 7. sine Mediolurcus tertius comoso flore. Tabern. icon. Narcissus mediolurcus 2. *Narcissus* rōss-
lein. Et hist. *Narcissus* 7. qui nullam ponit descr.

Dodon. hist. flor. & in fol. ait: Narcissus mediolurcus alter siue tertius, foliis non modò quàm primus (siue mediopurpureus,) verùm etiam quàm Alphodelus latioribus longioribusque: floribus in singulis caulibus quatuor aut pluribus candidis, minoribus, medio eorum luteo, calyce eminentiore, multò tamen quàm Narcissi lutei silu. breuiore: radix similis est & bulbosa.

De hoc scripsit Theophrast. lib. 6. cui latius, quàm Alphodeli tribuit folium. Scribit autem Narcissi florem esse luteum, siue melini coloris, quod de medio floris calyce accipiendum esse, Ouidii testimonio iam ostendimus. Florem ete-
nim ait Croceum, albis tamen foliis cinctum. Exemplaria Theophrast. præcè omnia *melina* *ty*
æ-
æ-
habent, quod Hermol. & Marcello occasio-

Tom. II.

nem dedit, vt Narcissi florem nigrum esse existi-
mauerint, Sed pro *melina* reponendum est *melina*.
Est autem Melinus color, idem qui ochre, siue
luteus. Putatur autem & hic Narcissus se-
rotinus à Theophrasto haberi, & Autumnò demùm
florere, propterea quòd in his quæ extant exem-
plaribus, huius descriptionem mox subsequen-
tur hæc verba: post Arcturum productio floris
est, & circa æquinoctium. Verùm ad Narcissi
historiam hæc non faciunt: inter Narcissi siqui-
dem descriptionem & verba ista, defectus ac hi-
tus est.

Nascitur (inquit Clusius) plerisque Hispaniæ,
quæ Mediterraneo mari obiecta est, locis, & om-
nibus ferè circa Mompelium pratis. Memini non
procul Villâ nouâ oppidulo Magalona vicino,
bulbum eruere, cuius summus caulis decem &
sex flores sustineret, vt meritò *melina* appel-
lari poterit. Illum in C. V. Guillelmi Ronde-
lectii, apud quem vivebam, orto, terra commisi.
Flore in calidioribus regionibus mense Februa-
rio, eruere memini etiam quasdam plantas Iau-
uario in pratis Boutonero suburbanò vicinis [vt
interdum inter eiusdem generis stirpes alia aliis
maturis geminat,] Apud Belgas verò non nisi
Martio aut Aprili. Floret mense Februario,
Martio & Aprili: femina durant ad Maium. Ge-
nena florentem vidi in hortis in fine Aprilis.
Patauii in orto publico cum multis floribus
simplicibus, vt etiam floribus multiplicatis.

NARCISSVS PLVRES FERENS FLORES
maiores præcocior mediolurcus.

Narcisso (Clus. Hisp. & post. hist.) medio luteo (multos ferenti flores) similis inuenitur, paulò tamen præcocior, latioribusque foliis & amplioribus floribus, cui plerumque bini, terni, quaterni, aut ad summum seni supremo cauli insident. Adfertur Constantinopoli cum plarisque aliis, & in fictilibus vt plurimùm colitur, vbi floret Aprili, interdum etiam Martio, si Veris temperies paulò calidior fuerit, maior odoris fragrantia in hoc nates ferire videtur quàm in superiori: Narcisso latifolio Byzantino mediolurco 2. Hic Narcissus conuenit cum Narcisso medio luteo Narbonensi quem diximus pauciores ferre flores, sed maiores. Huius [Byzantini] generis aliquot bulbos, Narcisso dopio nomine, mittebat ad me (inquit Clus. post. hist.) anno 1590. Ill. Heros I. Vinc. Pinellus, quos flores perluros sperabam, sed subsequente Vere me spe frustratum deprehendi. Nā elegantes quidem flores habui, sed simplici sex foliorū serie constantes, superiore ampliores, omnino niueos, præter medium calicem flauum, odoris fragrantissimi, septenòs & plures summo caule simul nascentes: folia carinata, nec minùs lata habuit, quàm qui plenum fert florem, & crassio-
rem. Mortuus autem quos miserat bulbos simplici-
cem florem tulisse, aliis me impertit minùs cras-
sis, quorum flores, pleni fuerunt, paulò tamen
minores Narcisso præcoco pleno flore.

Lobel. Obs. *Narcissi mediolurci species*, quam
Narcissium præcoccem faciūt Herbarii peritiores
Belgæ cum Clusio latioribus floribus
& foliis. Casp. Bauhin. Phyt.
Narcissus 4. siue *Me-*
diolurcus maior.


* *

Ecc

Descriptio

NARCISSVS ALBIDVS MEDIOLVTEVS
cum aliquot floribus.

Descriptio



Plant. icô.
Narcissus
albidus medioluteus Tasi.
Lobel. Belg.
switte droene
Narcisse mit
ein gelen crâs
int midde: pri-
ma species
Narcissi me-
dio lutei in
Belgio foliis
similibus val-
de candido
Narcisso: caule
maiore plerû-
que ferens sto-
res 2. aut tres
albicâtes cum
Corolla ochre
modo lutea.

Icon quæ a-
pud Lobelium
& Plantinum
proponitur
Narcissi albi
nomine, eam
Clus. in post.
hist. posuit pro
Narcisso lati-
folio, flore
prorsus flauo:
Dodon. histor.
Lat. & de flor.
Alter Disforid.
Narcissus medio
luteus folia
haber longio-
ra quam me-
dio purpu-
reus, latiora, &
aliquantulum
minus virentia:
caules pro-

ceriores, & in singulis flores 2. aut 4. prioribus si-
miles: sed medio calyce luteo: semen & radi-
cem bulbosam similia. C. Bauh. Phyt. *Narcissus* 6.
siue *medioluteus alter*. Tabern. icon. *Narcissus me-*
dioluteus. Narcissen rôslein. Et hist. *Narcissus* 6.
Tabern. mutauit figuram Lobelii non indicans
quare non describit, ea quæ à nobis ponitur est
ex iconibus, quas iam sculptas emimus. An Clu-
sio *Narcissus præcox* simplici flore: foliis florum
ex insularibus, de quo antè, de *Narcisso* flore medio
luteo Narbonensi.

NARCISSVS MEDIOCROCEVS
ferotinus cum aliquot floribus.

Descriptio

Plant. icon. *Narcissus mediocroceus ferotinus*
polyanthos. Lob. Belg. Gheimeine wittes par-
de bloeynde Narcisse mer veel blooyten. Folio-
rum latitudo & magnitudo eadem cum magui
Narcissi lutei Hispanici, sed obscurius virentia:
Maio profert flores. 2.3. vel quatuor pulchros,



magnos ex vi-
no pediculo,
qui costat ple-
rumque foliis
6. & interdum
7. 8. & 9. vt vi-
deantur flores
pleni. Con-
siderandum
an hic Lobelii
sit ille qui à
nobis traditur
sub. *Narcisso*
medioluteo cû
duobus aut tri-
bus foliis &
quem in horto
habemus de
quo paulò
post.

An Dodon.
in fol. Alius

Narcissus tertius, est foliis non modò quàm pri-
mus (qui medio purpureus,] verùm etiam quàm
Alphodelus, latioribus, longioribusque, floribus
in singulis caulibus quatuor aut pluribus candi-
dis, minoribus, medio eorum luteo, calyce emi-
nentiore, multò tamen quàm *Narcissi lutei* silu.
breuiore: radix similis est & bulbosa.

De hoc ita Clus. hist. post. Nascuntur *Narcissi*
quibus latiora folia & flores simplici foliorum
textura constantes, in Belgicis & plerisque Ger-
manicæ hortis: de quibus consulenda: Clu. virorum
Dodon. & Lob. obser. Illud autem dicendum pu-
taui, Maiorem illam amplis foliis, & in eodem
caule binos vt plurimum, interdum ternos &
quaternos flores magnos sustinentem, sex foliis
albis conitantes, & pallidum calicem cingentes
odoratos, [etiam qui & duodenis foliis consta-
rent,] in Anglia spontè nasci, à viris fide dignis in-
tellexisse.

An Matth. G. & Lat. cum magn. fig. *Narcissus* 1. Et
Ital. *Narcissus* 8. Figuram non artificiosam ponit
Matth. sine descriptione, more consueti. C. Asp.
Bauh. *Narcissus* 3. siue *medioluteus pluribus flori-*
bus Matth. Lat. & ic. 4. *Narcissus* 1. Tabern. icon.
Narcissen rôslein Narcissus 9. Matth. Et hist. *Nar-*
cissus 12. Matth. 9.

Hic *Narcissus* fortè est qui ptouenit in nostro
Ill. E. C. horto Montbelg. cui interdum flores
iunguntur cum pediculis suis, duo vt videantur
pleni.

NARCISSVS MEDIOLVTEVS
Pisanus plures flores ferens.

Plant. icon. p. 15. *Narcissus medioluteus Pisanus*
ex Italia delatus. Hæc icon Lobelii est posita
à Clusio post. pro *Narcisso* latifolio flore prorsus
albo secundo, de quo poitea ex Clusio agemus.
Lobel. hist. Belg. *Narcisse* in de middel geel von
Dise ghebrecht, *Narcissus medioluteus Pisanus*
ex Italia delatus: Herbarii Belgæ cum nostro
Clusio faciunt speciem precedentis *Narcissi* (nè-
pè *mediolutei* *Dumacis* dic.) latiora habet folia,
& flores multos valde pulchros, cum corolla lu-
tea in medio, paulò minores quàm in luteo, & co-
lor viuacior, missus Pifa, quidam dicunt Consttan-
tinopoli delatum.

Dodon.

Dodon. de fl. & in fol. videtur huius descriptionem tradere nomine Narcissi mediolucei 2. siue Narcissi 3. si saltem ibi bene legitur floribus minoribus. C. Bauhin. Phyt. Narcissus 8. siue medioluteus. 4.



NARCISSVS ÆGYPTIVS.

Narcissus (auctore Lobelio Adu. par. 2. d'Argiers ab aliis Aegyptius nuncupatus, erutus ab eodem N. le Querc in Lusitania, prope D.V. de, bulbo Narcissi mediolucei Narbonensis pari & simili, sed externis involucris nigrioribus. Flores, caulis, folia, Narcisso Pisano similia, sed flores variant, quemadmodum Vere claspò annotauimus Londini in horto Nobil. Baronis Zouche, aliis minoribus, rotundioribus, & veluti decurtatis: aliis verò vnà pluribus & longioribus.

NARCISSVS CVM PLVRIBVS FLORIBVS
plenis corolla lutea.



Atioribus (inquit Clusius) filis quàm primus simplex [nobis Narbonensis dicitur] & quodammodo carinatis, ternis aut quaternis, caulis striatus, nudus, intus concavus, vt in superioriibus, pedali altitudine assurgit, qui è membranaceo folliculo summo cauli insidente, ternis

nos, quaternos aut plures (nam memini in horto meo Viennæ florere qui septenos habuerit) flores promit, senis albis, amplisque foliis, vt prioris simplicis tertium genus, constantes, quibus pro calyce sex alba alia filia sunt, minora tamen & flauo calicis fragmentis sic intersecta & diffusa, vt nulla calicis forma appareat, sed veluti apophysis flaua ad singula interiora folia adnata videatur: odoratissimus est ille flos, & grauedine quadam caput tentas: nullum semen in hoc genere obseruauimus: radix interdum crassissima, multis spadiceis tunicis septa, & frequentibus fibris donata.

Tqm. 11.

Clus. Hist. Narcissus flore multiplici, & hist. post. Narcissus plenis flore. Hunc Lobel. Obs. describit his verbis. Narcissus albus Polyanthus. Chalcedonicus elegantior, hilarior & rarior. An Narcissus 8. Matthiol. non descriptus: in deliciis habetur: floribus multiplicibus & foliis aspectu iucundis, niueis, peramentis: corona media lutea orbatis: cuius vicem multiplex florum festura supplet, quodam tamen lutei specimine permitto inter foliola dispersè adseruato. Plant. icon. Narcissus albus polyanthus, siue Chalcedonicus elegantior, & rarior multiplex. Dodon. hist. fl. & in fol. inquit. Sunt & Narcissi multiplicibus floribus, cum primi (mediopurpurei) tum alterius generis (mediolucei) foliis & bulbis haud dissimiles. Eandem figuram habet cum Clusio & Lobelio, nostra figura non placet, est ex iis quas iam sculptas emimus.

Narcissus exoticus siue Constantinop. plenis floribus fragrantiss. qui primo suo anno ex Italia allatus [inquit Camer. hort.] floruit (Norimberge) sed postea iidem bulbi nunquam, quamuis viret, & multa prole quotannis auerentur, florem præbuerunt. Turci vocant Gül camer tale. Et apud Matthiol. Germ. Narcissus 2. flore pleno, qui facile perit. Item in Epit. Narcissus 2. non differt à priore neque facie, neque viribus, quos admodum speciosos proponit, cãdidos quoque, sed quorum medium habet foliola. Miror ita similem facere Camerarium Narcissum plenum Matthiol. cum Narcisso mediopurpureo, a quo non solum florum plenitudine differt, sed etiam florum numero, cã inque potius sit ex genere mediolucei, de monstrante ipsius figura ex Matthiol. Idem hor. Zircinada Camer. floribus albis ex Constantinopoli.

Casp. Bauhin. Phyt. Narcissus 17. siue albus flore multiplici. Matth. in Dioscor. cum mag. fig. Lat. lib. 4. Narcissus 2. Item Narcissus 8. In Ital. cap. 162. Narciss. Item Narciss. 2. In hist. Germ. lib. 4. c. 141. Narcissen rôßlein 2. siue odoratus Narcissus. Tabern. icon. pag. 60. & hist. p. 2. Gez. fult. Narcissen rôßlein, Narcissus 1. Polyanthus Matthiol. Item icon. p. 604. & hist. p. 302. Narcissus 3. Matthioli 10. (Matth. 2.)

Bizantio singulis annis Clusio Viennam mittebatur.

NARCISSVS AMPLO FLORE, CORONA aurea plena.



Describitur à Clusio hist. post. Narcissus pleno flore seculendus, qui filia, bulbum, caulem priori [pleno] ad eò similia habet, vt neuter ab altero discerni queat, soli flores discrimen faciunt, qui etiam è vagina summo cauli insidente, emergunt terni aut quaterni, priori Ecce 2

magnitudine æquales, senisque foliis albis constantibus, ampium aurei coloris calicem cingentes, ad eò multipliciter, mirumque in modum implicatum, vt Leucoii Havi polyphyllum florem futuriorum quodammodo amuletur: odor perinde suavis ac in priore.

Clus. duntaxat in horto Generosæ Dominæ Vnguadin conspexit anno 1588. præcedente anno Byzantio illi missum.

NARCISSVS MINORE FLORE
corona tota lutea.

Descriptio



Narcissum quandam pleno flore, sic describit Clusius hist. post. *Folia & reliqua omnia superioribus* (duobus plenis) ferè similia habet, paulò minor: *flores in hoc etiam minores, ex albis foliis constantes, medium calycem flavum & plenum habet, emicantibus è medio oblongiusculis angustis*

foliis stellatim quasi decussatis, albi quidem coloris, sed cui & viridis foris, & pallidus interiore parte permixti sunt, odor ferè qualis in priore, sed nescio quid magis aromaticum spirans, mediis inter Narcissi & muscari odorem.

Clus. Pann. *Narcissus pleno flore, Narcissus pediculis siue multiplex.* In hist. post. *Narcissus pleno flore tertius.* Plant. ic. p. 15. *Narcissus albus alter, media sumbriata lutea multiplex corolla.* T. 152. C. Bauh. Phyt. *Narcissus 9.* siue albus corona multiplici lutea.

Descriptio

Habui [inquit Clusius] munere Philib. de Bruxellis Cæs. dapiferi, cum plerisque aliis bulbis sub anni 1575. initium, eodem quidem anno & sequentibus folia produxit, ac nullum florem: toto anno 1579. latuit, vt peritisse existimauerim. Anno subsequente Martio denud prodiiit, & Aprilis ternos flores, quales modò descripsi tulit: & proximo subsequente anno plures dum in Anglia peregrinarer, referentibus domesticis. Florent etiam superiores Aprilis. At huic antè hiemem folia emergere non solent, sed nouo Vere duntaxat, eo videlicet anno quo florem dabit. Nam si ante hiemem illi prodeunt [rarissimè id fit] proximo anno non florebit. Sæpe etiam in reliquis præcocius Narcissis qui Constantino-poli mittuntur vel pleno flore vel albo medio luteo, accidit vt sterilitatis indicium sit si folia ante hiemem emerferint.

Narcissus Constantin. quem Ziden sari vocant.
Narcissus Constantinopolitanus quem *Ziden Sari* vocant ab amico ex illis locis [Camer. horti] transmissus bulbo anguloso, tunica tenui, nigra, vestito. C. B. Phyt. *Narcissus 12.* siue *bulbo anguloso.*

NARCISSVS CVM PLVRIBVS
floribus totus albus maior.

Narcissus latifolius Clus. totus albus prior (Narcisso medio luteo Narbonensi) formâ non dissimilis: *folia habet terna aut quaterna, viridiora paulò iam dicto, longiora & angustiora: è quorum medio exilit caulis latusculus, angulosus tamen & concavus, cui insident seni, septeni, interdum deni flores prioribus similes, sed oblongiores paulò, & omninò niuci, quorum vi-*



delicet calyx ille medi [qui priore flavus] etiam albus est, odor prioris similis, vt etiam radix.

Clus. Hisp. *Narcissus totus albus prior.* & hist. post. *Narcissus lat. simplicis flore proprosus albus.* Hisp. *Licio blanco & cebollinas, quibusdam etiam Narcissi, de Sevilla,* id est Hispalensis Narcissus,

quod à me primùm posita aliis inde sit missus. Hæc planta ex illorù numero est quas stirpium Historiæ Lugdani expressit: auctor Dodon. tribuit & ab eo me lapsisse scribit. Ego verò non modò hæc, sed plurimas alias Dodonæum à me habuisse assero.

Lob. obs. *Narcissi mediolutes varietas, Narcissus totus albus.* Hisp. *In quillos blancos:* Belgicis hortis inquilinus factus opera Clusii, Plant. icon. *Narcissus totus albus.* Dodon. hist. fl. & in f. *Narcissus totus albus siue quartus antedictis formâ similibus, sed per totum florem & medio quoque candidus.* C. Bauh. Phyt. *Narcissus 10.* siue totus albus maior. An Camer. horti: *Narcissus albus maior.* Tabern. icon. *Narcissus albus weiß Narcissen rößlein.* Et hist. *Narcissus 5. albus.* Item icon. *Narcissus nixæus serotinus, weißspat Narcissen rößlein.* Frustrâ nonnihil figuram mutante neglecta descriptione. Hinc quis sit à loco positus nescio, cum eius tantùm meminerit titulo tenus.

Illius nec capita neque semen obseruare potuit Clusius, nam Ianuario extremo nascentem pingui solo nonnullis Lusitanicæ & Bæticæ locis & vliginosis, multaque aqua stagnantibus, cum florentem obseruabat: 1585. tum etiam Februarii initio in summa Calpe crebat duntaxat. Eius aliquid bulbi in Belgicam missi nondum flores tulerant octenniis post.

NARCISSVS FOLIIS CANDICANTIBVS
cum pluribus floribus totus
albus minor.

Narcissus totus albus alter superiore minor, firmioribus magisque candicantibus foliis, qualia ferè sunt in Narcisso marino qui Narbonensibus

nensibus Scilla siue Pancratium dicebatur, caule breuiore, & binos, ternos aut quaternos duraxat flores proferente. Ex Hispania (inquit Clusius) post meum reditum mihiis, reliquis Narcissis seruis, hoc est, Maio, Bruxellæ in quibusdam hortis floruit.

Clus. Hisp. Narcissus totus albus alter, Hisp. *tuquillos albus*. In post. hist. Narcissus latifolius niueus alter. Lobel. Obs. Narcissi mediolurei varietas, Narcissus totus albus paucioribus floribus & folio albido, rigidoque, Belgicis hortis inquilinus factus operâ Clusii. C. Bauh. Phyt. Narcissus totus albus minor paucioribus floribus. An Camer. hort. Narcissus albus minor? In Clusii icone, plures duplò appinguntur flores, quam tradat hunc Narcissum ferre, nempe octo. Huius icon est posita inter Icones Plantini pro Narcisso mediolureo Pisano ex Italia delato Teur. hist. Lobel. de qua hic antè.

Narcissus niueus latifolius Byzantinus.

Narcissus latifolius niueus tertius Byzantio, Clusio Hist. post. allatus 1587. sequenti anno *folia* dedit primo generi similia: *caulem* inter folia emergentem, pedalem, qui ternos & quaternos flores dedit eiusdem cum superiore magnitudinis, niuei profusus coloris, id est, calice etiam niueo, è quibus emergebant sena stamina, terna aliis longiora, flaua. Alius præterea adeò illi in omnibus similis, ut vix quispiam discernere potuisset, nisi differentiam fecissent flores illo minores, & frequentiores in summo caule nascentes, odorem & fragrantiam lasmini referentes: huius *semen* in trigonis capitibus conclusum, nigrum, inæquale: vtriusque *radix* minor paulò priorè, & nigris tunicis septa, *Zerincada cat amer bianco* nomine missa fuit, ut & quinquennio antè: Floruit Maio mense.

Narcissus latifolius flore profusus flauo.

Narcisso latifolio flauo flore, siue quarto Byzantio *Zerincada cat amer fari* nomine, Clusio allato, *folia* sunt proximè descripto similia, *stos* in illo variat, nam vel totus flauus est, vel omnino pallè, præter calicem qui in hoc planè aureus est: *semen* in trigonis capitibus Narcissinum, inæquale, nigrum: *radix* tunicis spadiceo coloris tecta. Icon à Clusio apposita eadem est quæ apud Lobelium in Obs. Teur. siue Belgicis pag. 171. & Ic. 6. Plantini p. 114. ponitur pro Narcisso albo medio luteo.

Narcissus pallido flore medio aureus.

Tradit Clus. post. Hist. Narcissum pallidum flore medio aureum siue quintum sibi missum 1596. Hispali per D. Simonem Touar Hispalensem Medicum: cuius *bulbus* satis crassus erat extremo cortice, spadiceo colore præditus, qui Ianuario sequente, quaterna protulit *folia*, lata, & quodamodò carinata, ut præcedenti aliquot, viridia, cubitalis longitudinis, inter quæ prodiit cubitalis aut altior, deinde duorum cubitorum altitudinem superans *caulis* (quam in reliquis Narcissorum generibus obseruare non memini) viridis, striatus, intus cauis, summo fastigio sustinens membranaceum quoddam inuolucrum, è quo exiabant suis petiolis innitentes flores, quini, seni, septeni, aut plures, seni foliis, intar aliorum Narcissorum simplici foliorum texturâ constantium


Tom. II.

præditi, coloris flauo, non nihil quidem pallescens, floridi tamen, quorum medius calix aureus, siuavis valdè odoris. An porrò prolificum *semen* daturus sit, adhuc ignarus sum, quandoquidem eo florente eius historiam concinnabam Martii initio, ut is annus valdè præcox fuit, nullâ, aut perquam exiguâ præcedente hieme, quæ demum extremo Martio valdè aspera fuit, & multas stirpes corrumpit. Non multum dissimilis erat, qui anno 1586. mihi floruit à Io. Boissot præcedente Autumno acceptus, quem Ferrariâ allatum scribebat. Misit & alium cuius florem ex pallido virefcere aiebat, calicemque angulum flammam habere, sed vtrumque bulbum corrumpit hiens illa rigida subsequens.

Narcissus totus luteus foliis angustis Thracicus. Iam inuenitur [teste Clus. Hisp.] & alius ex Thracia primùm delatus *foliis* siquidem Narcisso toto albo similibus & angustis, sed flore omninò Descripio aut luteo aut pallido, odoratissimo: *semine* Narcissino simili, *radice* plerunquæ minore tunicis coloris spadiceo tecta. Sed qui pallidus est, colliculum medium planè aureum uti medio luteus, radicem æquè crassam, & folia non minùs lata, habet. C. Bauhin. Phyt. Narcissus 27. siue totus luteus.

NARCISVS IVNCIFOLIVS

flore luteo.



Cubitalis *caulis* Descripio
lis, *foliis* nudis, tenuis, in cuius cacumine desinent vtriculo membranaceo, flores emicant; in meo quidè horto bini, aliis plures, pediculis sextantalibus, Narcissi vulgaris floribus similes, & minores è seni foliis radiatis totis luteis compositi. quo etiam colore præditus est non tantum tubulus oblongus, sed & mediù florem cingès corona. Caulem comitantur *folia* pauca angusta, tenuitate & virore iuncoo. *Radice*m habet bulbosam fibratam.

Luber hiè subnectere Clusii similia Narcissorum descriptiones: Bina aut terna sūt oblon-
 Eec 3

ga folia, angulosa, carnosa & pæne rotunda, iuncis viridioribus & medullosis, laeuore coloreque quodammodo similia, nec minùs flexibilia, inter quæ medius exilit caulis, rotundus, cauus, nullis ornatus foliis, in cuius summo, ex renui quodam membranaceo inuolucro, flores terni, quaterni, aut quini prodeunt oblongi [gemelli interdum] forma Narcissiniis similes, odoratiore eo qui medio purpure⁹ est, flauus omninò, hoc est tã interiori calice quàm ambientibus cum foliis, quæ vel mucronata, vel mucrone nonnihil orbiculato conspiciuntur: his succedunt triangula capita obtusis angulis, vt reliquorum Narcissorum, nigro & anguloso semine plena; minore tamen quàm aliorum: radix etiam minor, candida, nigricantibus membranis recta. Ilius genus inuenitur minus, gracilioribusque foliis, cauliculis è medio prodeuntibus pusillis, vnicum plerùque aut alterum florem duntaxat sustinentibus, flauum & odoratum vt alterius, sed foliis constantem firmioribus & magis orbicularis. Narcissus iuncifolius alter. A similitudine quam eius folia cum Iuncis habent *Jonquilles* vocant, nos Narcissum iuncifolium luteum dicere possumus ad differentiam alterius qui ex Thracia latiore folio defertur. Et hist. post Narcissus 10. seu angustifolius 2. & iuncifolius primus & 2. minor.

Dodon. Bulbum vomitorium esse contendit: quo autem argumento ipse & reliqui qui eius vestigia sequuntur, id probare possint libenter intelligerem? Lobel. & Pena Adu. *Narcissus luteus paucioribus foliis & floribus duntaxat diuersis*. Et p. 462. append. *Narcissus iuncifolius flore rotunda circincitatis roseo reddenda*. obs. p. 62. In horro C. D. Marix de Dorimon & D. Aluati Nonnii alitur Narcissi iuncifolii genus serotinum Narcisso per omnia simile: sed flos rotundior est & latior. Sed & Hist. Belg. p. 157. *Narcisse non der fristen*. Narcissus iuncifolius præcox. Ad hæc Gele spade *Narcisse met briefe bladers*. Narcissus iuncifolius. Kurtum p. 158. *Jonquilles met ronde bris de bloemen op de vyffe van enckel Roosfont*. Iar. Iuncifolius flore rotunda circincitatis roseo. Et Alder meeste Spansche *Jonquille*, Narcissus Hispanicus iuncifolius quem &c.

Plant. icon. p. 117. Narcissus iuncifolius serotinus Lob. 62. T. 158. Et p. 124. Narcissus luteus Aphricanus præcox, an Bulbus vomitorium? Camer. horri. Narcissus iuncifolius maior & minor odoratissimo flore, vterque hyemis acrioris impatiens. Dodon. in fol. Narcissus iuncifolius maior & minor vterque Belgis horrentis est Diosc. est *βουβουλις* sive bulbus vomitorium. Tabern. icon. & hist. *Narcissen Roßlein*. Narcissus. 8. iuncifolius. 5. Et Narcissus 9. Iuncifolius 2. Item *Großgeel & Narcissen roßlein*. Narcissus 10. roseo luteus maior. Et tandem *flein geel & Narcissen roßlein*. Narcissus 11. roseoluteus minor.

Tab. vel eius Cõpulator de Iuncifoliis Narcissis duobus primis obicit ex Clusio pauca proponit, de duobus cum roseo flore nihil: figuras duas mutat nonnihil, sed meliores non reddit, tantùm vt persuadeat ignaris ad viuas plantas paratas figuras: Cur duos roseo-luteos tradat non video: nec scio vnde desumpserit figuras cum nihil iuncis demonstret in foliis, nec in floribus accedunt Iuncifolio roseo Lobelii, cui flores duo ex vno pedicelo, non soli ac etiam multam disse-

rentes: planè hoc loco Matthiolum cum suis fingentis imitatur, nec satis mirari possum aliquem extare qui velit stirpium peritus esse, & eius naniis & figmentis patrocinari, ac ita veritati fucum facere.

C. Bauh. phyt. Narcissus 23. sive Iuncifolius maior, Clusio prior, Lobelio Aphricanus. Narcissus 24. sive iuncifolius luteus minor. Lob. serotinus: Alterum diceremus (inquit C. Bauh.) apud Clusium nisi diceret hunc multò pluribus esse foliis monente etiam Lobel. obs. p. 62. Item Narcissus iuncifolius flore rotundo, Lobelio roseo, huius maior & minor datur species, quarum Tabern. duas icones proponit nomine Narcissi roseolutei maioris & minoris. *Narcissus C. Bauh.* Sed dic quæso Tabern. vbi vidisti tales duas plantas, phantasticæ sunt icones imaginatarum plantarum, dignæ quæ iungantur multis Matthioli figuris.

Prior spontè nascitur in montanis pratis non procul Toletò, & circa Guadalupe. Posteriorem vliginosis intrer Hispaliæ & Gades locis cum ipso flore creuebat Clus. Ianuario mense, at in Belgicis hortis neuter nisi Aprilis floret, vel etiam Maio, licet interdum denudè paulò ante brumam si mitior sit æris constitutio. Ex Bona, & Argertia (Chartaginisque finitimis locis Aphricæ affertur: Non procul præterea Agathensis sinu affirmant inueniri, etiamque ex Hispanicis nuper, in Belgium & Franciam delatos audimus. Narcissus iuncifolius prior flore luteo, mihi in horro Ill. mei Princip. ex bulbis Stuckardiam missis, florens Aprilis, hiemem apud nos facillè profert.

NARCISSVS IUNCIFOLIVS
flauus amplo calyce.



Narcisso 9. seu angustifolio 1. Clusii in post. hist. bina aut terna sunt folia, pedalis aut maioris longitudinis, crassa & succulenta, instar foliorum Narcissi præcedentis retri minoris, sed angustiora, & quodammodo media inter illa, sequentis Iuncifolii maioris folia, carinata tamen & viridi colore prædita proximè ad Iuncifolii Narcissi foliorum viriditatem accedente. prodit inter folia caulis gracilis, instar eius qui sublequitur firmus, pedalis longitudinis, qui summo fastigio ex membranaceo folliculo, binos aut ternos flores promit valdè elegantes, maiores & laxiores quàm reliquorum Narcissorum inuoco folio, sex præditos foliis flauis, quorum medijs occupat *calix* maior quàm in vllò Narcissorum genere, semunciat namque longus, & per oras veluti sinuosus, paulò saturioris lutei coloris, continens breuia *sex flumina* flaua, apicibus aureis prædita, & stilum flauum extrinsecus cras-

Bulbus vomitorium
negatum est
vta Dodon.

crassorem: odoratis est is flos, perinde atque Narcissi iuncifolii flores, radicem habet Narcissi sequentis bulbo aequalem.

An Camer. hort. Narcissus luteus Polyanthos, id est, plures vno caule flores gerens sicili asseruandus, brumæ feruitæ impatientiss. Lob. Adu. par. 2. Iuncifolius Narcissus amplo calice flore luteo siue primus Clusii, è montibus D. Iacobo Gallæciæ vicinis à Nic. le Quele ad nos deuectus. Iuncifolius Narcissus magno calyce luteo ad me misit, C. V. D. D. Kirch. Bellenal. horti medici primus instructor in alma Monsp. schola.

Clusio ædem conspectus est hic Narcissus anno 1595. Aprilimense suis floribus onustus apud Theod. Clutium Acad. horti præfectum Lugduni Batavorum, quo anno bulbi ipsi communicati, cum ab illo, tum à Cornelio van Hille Eccles. Roterodamensi.

Narcissus iuncifolius minor flore pallido.



A Venerio accipiebam [inquit Clusius Hist. post. par. 2.] Narcissi iuncifolii alterius bulbos, qui minor ad aliorum differentiam vocari poterit. Producebat is Narcissus, ex bulbo aliorum Narcissorum, iuncto folio bulbis formâ non dissimili, valde tamen pusillo, quinque aut sex folia angusta quidem illa & iuncta, aliquantulum tamen planiora, dodrantem aut pedem longa, nihil procumbentia, viridia: inter quæ prodibat vnus aut alter cauliculus, gracilis, nudus, viridis, pedalis longitudinis, summo fastigio gestans folliculum membranaceum instar aliorum Narcissorum, è quo exhilarat vnus aut alter flos longo pediculo innixus, formâ iuncifolii vulgaris floribus similis, sed pauld minor, sex folis pallidioribus conitans, cum medio calyce flauo, maiore aliquantulum & magis parente, quam in vulgaris Narcissi iuncifolii flore, è cuius umbilico pallidula breuiusque staminula emergebant, medio stilo prominente: odoratus quidem est flos: pusillo tamen grauior est eius odor quam vulgaris Iuncifolii. Florebat Aprilis. Spontè nasci in illa Gallia parte scribebat, quæ vulgò *Rouergie* nuncupatur. Congenet cum Narcissis iuncifolii Hispanicis videtur Lobel. Adu. 2. Iuncifolius Narcissus erutus è Gallia præfectura *Rouergie* vernaculè vocata, & missus Burdegalo à D. Iacobo le Venier, qui nullos tractus Pyrenæorum montium vicinarumque regionum singularis annis sedulè non pertractari.

Narcissus vernus præcocior flauo flore.

Non iungimus Narcisso latifolio Indico alium propter similitudinem iconâ (qui potuisset etiam poni post Colchicum flore luteo quorûdam,) quæ Clus. in Exot. pingit & vocat Narcissum vernum præcocium flauo colore, ac sic describit: Narcissi genus reperitur incunte Vere flores producens, prorsus nouum, in his præsertim regionibus: mihi cerè ante annum à Christi natiuitate 1600. videre non cõtingerat: propterea eius historiam & iconem dignam iudicabam quæ in hac append. adponeretur. Producebat autem ille Narcissus quaterna aut quina folia aliorum Narcissorum instar: plana, digitum pænè lata, surrecta, viridia, Narcissi medio lutei foliorum æmula, inter quæ prodibat cauliculus ferè dodrantalis, planus, non valde firmus, leuis & enodis, sustinens summo fastigio membranaceum folliculum, reliquorum Narcissorum modo, è quo emergebat vni-

cus flos coloris flauo, Narcissi Autumnalis maioris flauo flore præditi formâ non valde dissimilis, sex etiam foliis constans, septicunciam longis, semunciam latis, mucronatis, quorum terna interiora pauld longiora erant externis, toridem ex umbilico produntibus staminibus candicantibus in flauum apicem desinentibus, atque illorum quidem tribus breuioribus quam cætera, cum medio stilo omnibus staminibus longiore: radicem habebat crassam, rotundam, è multis tunicis constantem [quarum internæ albæ, externæ verò ex spadiceo nigricantes] & infimâ sede multis fibris præditam.

Præcox erat hic Narcissus: nam quum eius bulbum ab Ill. viro Ioanne Vincenrio Pinello missum Patauio sub initiû Nouembris anni à Christi natiuitate 1600. accepissem, illic in sicili terræ committebâ, vt à cæli inclementia per hiemem facilius præseruare possem: atque insequen-

Narcissus flore caruleo.

Narcissus flore caruleo ex Hispania Clus. Pann. per Regis hortulanum missus. C. Bauh. Phyt. Narcissus 28. siue flore caruleo Clus. Lobel. & Pena Adu. Narcissus purpureo caruleus: Quibus asserere non postrema fidei amici se nactos totis floribus purpureis Narcissos prope Lanum fluuium, non procul Monspelio, quos tamen diu, sæpèque inibi & aliis adiectis præsentibus frustra venati sunt, ac studiosos simplicium & præceptores suos, vt indicarent, rogarunt. Monuit quidem Malachias Bernardus Med. Doctor Lobeliû Adu. par. 2. fe in horto D. Quintini Narcissum hunc solo flore caruleo à Mediocroceo diuersum collegisse.

NARCISSVS INDICVS LATIFOL.
rubro flore.

ELegantis Narcissi (inquit Clusius hist. post.) Descriptio (qui inter eos qui latiora habent folia & erit) flos cum aliquot foliis mihi mittebatur à D. viro Bernardo Paludano qui Indicum cognominabat: ego eius historiam pro meo modulo ita cõtinuabam: Sena vel plyra habet is Narcissus se-



Tempus

lia ferè in Narcissi Autumnalis minoris (de quo cap. 16. huius libri) flore conspicitur, non haui tamen, vt illa, verùm rubri saturi & splendens coloris, instar floris Arundinis Indicae vulgò appellatae, cui non valdè ab similibus est, è quorum medio prodibant sex *stamina* eiusdem panè coloris, oblonga (quibus insidebant apices fuscii coloris quia forsitan ex attritu corrupti) & medius stilus, sub quo rudimentum triangularis capitatis, quod haud dubiè *semen* dedisset, fortè etiam maturum, nisi ipse florem praecidisset, vt mihi conspiciendum praeberet: *radicem*, Paludano referente, habet bulbaceam, Capis vulgaribus rubentibus prorsus similem. Vnicam autem eius plantam habebat, ipsi missam ab Erudicill. viro D. Simone de Touar Hisp. medico, quae florem dabat Iunio 1594. alterum expectabat sequente mense quoniam precedente anno eadem planta bis illi florem prorulisset mensibus Iunio & Quintili. At anno insequente, ex Indice Touarici horri, & Epistolis quas ipse Touar ab me deinde scribebat cognoscebam Narcissum Indicum Iacobæum ab ipso nuncupatum.

Narcissus Indicus, Iacobæus mihi indigitatus, vt scribit in epistola Cal. Iunii 1596. ad me data ex Occidentali Indiâ [vbi Azcal Xochilt, quod est Bulbus flore rubro, vocatur] nobis delatus: nulli rei herbariae Scriptori hactenus, quod sciam, notus, cuius radix bulbosa, Cepae rotundae similis, verùm supernè tunicâ pullâ: folia primum emittit crassa, oblonga, Narcissi marini, sibi Hemerocallis Valentina dicti, æmula: secundum folia verò, atque ad eòs exlarere, pedalis & longior etiam emicat caulis, plerumque vnus, aliquando verò & alter, nonnunquam pariter, [quanquam hoc rarò] interdum successiuè, dilute rubens, compresso tamen stilo, cauus, & interius subalbidus, qui in membranam desinit vaginulam saturatè rubentem, & ad extremum acuminatam filamque, è qua flos vnicus erumpit, oblongus, pediculo nixus viridior, qui deorsum inflexus & veluti procumbens (vt in Leucio bulboso vel Lilio rubro, tamen non æquè nutans), sex munitur foliis eleganti minii colore rubentibus, tribus superioribus: totidem inferioribus: quorum quod è superioribus mediū est, succètius eminet: reliqua duo ad latera à medio reflectuntur: inferiora autem deorsum curuatur, cūctis, ita cōcinatis, vt ensis etiam rubri qui ab ordinis S. Iacobi Equitibus in veste gestatur, for-

ma valdè referat, vnde Iacobæi cognomen ipsi me inditū. Sunt porò in hoc elegantissimo flore stamina septem similiter rubra: quorum mediū aliquantò longius in triangularem apicem definit: cætera sex apices tranuersi finiunt, interius fuscii, superficie verò luteo puluisculo obducti: cuncta autè, ad mediā ferè eorum longitudinem, mediū ex inferioribus folium ambit: idem etiam à reliquis duobus inferioribus cōplexum: atque vbi hæc deorsum fleuntur, stamina ipsa sursum eleuantur. Illo ipso porò anno floris cum suo caule & foliorum iconem ad me mittebat Ill. C. Arembergius, quam ad viuū depingi curauerat, ex planta quæ illi florem protulerat, à D. Touare eodem anno accepta: deinde sequente Februario bulbi suis coloribus expressi iconem, qui crassus est, tunicâ exteriore fusca tectus, fibrisque infima sede, non nihil prominente, frequentibus, crassis plerisque & in alias tenuiores diuisis, & aliis minoribus præditus.

Lob. Adu. par. 2. *Narcissus Indicus rubro flore Clusii, & Narcissus Iacobæus D. de Touar.* à C. viro Bernardo Paludano acceptus Mediocastri Walacrie vnicum florem laxauit D. Ioanni Somero. Sed cum exactior, latèque elegantissimi ac amenissimi floris extensi icon Lutetia ex Christianif. Regis Henrici Bourbonii rarissimis plantarum exemplaribus delineata, enataque in orto D. I. Robini, allata mihi sit, huc inferendam operæpretium duxi.

PANCRATIUM VETERIBUS

Pancreatium (*πανκρετιον*) à vincendis & profligandis morbis omnes denominasse videntur.

Scillam, sunt (vt ait Dioscor.) qui appellent. Pancreatium [vt idem describit] radix est, bulbo magno similis, subfulua [*υπολευκη*] aut subpurpurea [*υποπορφυρα*] amari ac feruidi saporis. Folia habet Lilio similia, sed longiora. Vim eandem quam Scilla habet. Præparatur & eodem modo, & exhibetur, faciens ad eadem affectiones. Minor tamen huius facultas est quam Scillæ. Vnde succus ex radice huius expressus, & ad Erui farinam ammixtus, & in pastillos efformatus, cum aqua multa, & splenicis & hydropicis vtiliter exhibetur. Hæc Diosc.

Plinius eadem ferè dicit l. 27. c. 12. his verbis: Pancreatium aliqui Scillam pusillam appellare malunt, foliis albi Lili longioribus, crassioribusque, radice bulbi magni, colore nullo. Aluum foliis, succo cum farina Erui sumptis. Vlcera purgat. Hydropicis splenicisque cum melle datur. Alii decoquunt eam, donec aqua dulcis fiat. Eaque effusa radice terentes digerunt in pastillos Sole siccatos.

Dodon. in fol. Plinium reprehendit, dicens: In Plinii verbis, & cōtradictio quadam apparet & à Diosc. sententia diuersa; Si enim radices magni bulbi, quare Scilla pusilla appellatur: Folia Lili albi crassiora Plinius, angustiora habet Diosc. Atque vel hinc Plinii exemplaria plerisque locis corrupta esse apparet: proinde & que de vtraque Scilla scribuntur posse vitata esse.

Cord. in Dioscor. Scillæ speciem facit. Pancreatium, (inquit) minor Scilla est, quæ hodie rarò ad medicinæ vsum affertur: quantitate & viribus maiori inferior.

Casp. Bauhin. apud Matthioli videtur securius eandem dicere cum Narcisso tertio Constant. Matthioli, & Narcisso marino Dodonæi: quis ex dictis verbis id potest asserere?

Scillam vulgarem omnem ruffam multi Pancratii volunt, quidam tantum inter eas minores bulbos. Videtur Casp. Bauhin. ab hac Scilla vulgari separare Pancratium Clusii, quod non placet. Dicitur Pancratium quibusdam [nobis Pancratium Monspeffulanum] nonnullis etiam Pancratium Lacunæ, & Hyacinthus cæruleus maximus Fuchsii, de quo Dalechamp. aliquando annotat esse verum bulbum. Pancratium ex Dioscor. vim eandem quam Scilla habet. Preparatur & eodem modo, & exhibetur ad easdem affectiones. Mitior tamen huius facultas est quam Scillæ. Unde succus ex radice huius expressus & ad Erui farinam ammixtus, & in pastillos efformatus, cum aqua multæ splenicis & hydropicis exhibetur. Alum. soluit [vt Plinius tradit] Succo cum farina Erui sumpto: vlcera purgat. Hydropicis splenicisque cum melle datur. Alii decoquant eam donec aqua dulcis fiat. Eaque effusa, radicem terentes digerunt in pastillos Sole siccatos, & postea vtuntur ad capitis vlcera, & cetera quæ repurganda sunt, item ad tussim quantum tribus digitis apprehenderint, in vino dantes, & ad lateris dolores aut petipneumoniacis Eclegmate. Propter Ischiada in vino bibendum & propter tormina mensisque ciendos. Radix [inquit Gal. simpl.] Pancratii Scillæ similem gustum refert: quare ea quidem pro Scilla, si ea non adfit, vtuntur: efficit omnia in genere quidem similiter, sed longè imbecillius.

albam. Anguill. esse Epimenidiam, de ea autem c. de Scilla.

Quandoquidem autem Clusius describit plantam nostram prout obseruauit in Hisp. colore a nostro variante, lubet eius descriptionem hic subiicere. Hemerocallidi Valentinae quæ inter Narcissi genera referenda, quina aut sena sunt folia,



Hemerocallis
callis Valentinae
Clusii
Narcissi
generis

oblonga, lata, Narcissifinis similia, sed planiora, firmioraq; subcineraci quodammodo coloris, caulis inter ea assurgit, in cubitali interdum altitudine, & Leucosii bulbosi 4. (Leucosii bulbosi ferotini maioris r.) crassitudine, firmior, nudus & sine foliis, qui cacumine promitt membranaecum inuolutum, & eo

dehiscente quinos aut senos, interdum plures, flores Pseudonarcisso vulgari similes, Lilio odorem spirantes, albos omnino: præter externorum sex foliorum neruum & extremos mucrones, qui viridi colore nonnihil aspersi conspiciuntur: è medio oblongo protuberante calyce per oras laciniato exeunt candida sex oblonga stamina, suis apicibus flauis ornato, & medio longo stilo, vt Lilio albo ferè: marcidis & defluentibus floribus subsunt triangularia capita in crassitudinem successu temporis extuberantia, quibus semen continetur nigrum, magnum, compressum, fungosum: radix bulbacea, magna, alba, oblonga, lento humore plena, nigricante cortice obducta, quæ interdum adnatis Narcissorum modo se propagat. Caulis etiam & folia concisa, aut iustacta, lenrum humorem exstillant.

Bulbus litoralis Theophrast. quod Monspeii Pancratium interpretantur, Et Pharmacop. vulgò pro Scilla minore habent, alii Hemerocallidem esse putarunt, decepti, testimonio Gesn. de hort. nomencl. Lili marini, quæ apud Diosc. Hermocallidi attribuitur. An eadem Pancratium quod aliqui pro Scilla substituunt? An apud eundem Pancratium verum Woicelli & Scilla minor.

Bulbus litoralis.
Hemerocallidis non est.

Scilla minor.

Hemerocallis Hispanica, meo tempore [inquit Clus. Hisp.] Rondel. Scilla vocabatur, & ex ea trochiscos, qui theriacâ ingrediuntur, Mopeliæ pharmac. parabat. Postea Pancratium flore Lili vocari cepit. Quæ in Valentino litore nascitur Ioh. Placc. Hemerocallis nuncupabatur, qui sublucos & pallefcentes flores ferè assecrabat: Hispani Amores suos vocant. Itali quidam Gigliomarino, capit etiam Constantinopoli adferri, Con Zambac nomine, inter varii generis Narcissos. Idem sequenti capite ait: Hemerocallis Valentinarum Scilla Epimenidia esse non potest, vt quidam volunt, quandoquidem eius Epimenidia cibus grata sit: Valentina verò He-

Scilla Rondel.

Pancratium flore Lili.
Hemerocallis flora sublucos.

Con Zambac.
Non Scilla Epimenidis.

PANCRATIUM MONSPEFFULANVM, multis Scilla alba Parua.

Pancratium Monspeffulanum, radice nititur bulbosa, minore quam Scillæ vulgaris ruffæ, Lobelio Obseruat. cum maxima est, quanta maximi Lili aut Arancii vel Limonii, oblonga, fibris donata, cortice Cerebræ obrecta pullo, intus candido, tunica vestra Cepaceis, pellucidis, leuiter striatis, aliquor detractis candidissimis, etiâ in medullis satis crassis, inuis tamen quam Scillæ dictæ, albis, viscidis, amaris sine acrimonia: fl. lita septena vel octona, porraceis similia, cubitalia, pollicem circiter lata, coloris glauci, in obtusum mucronem desinentia: Inter hæc castis attollitur, parum foliis longior, crassitie Alphodeli, tenuior, nudus, enodis, qui è fastigii folliculo membranaceo flores ternos, quaternos ac etiam plures profert, magnos, foliorum ferè forma, viciastres vel quatuor longos, albos, apicibus luteis stipatos, quibus succedunt pericarpia aliquot maxima, plena femine nigro, magno, lato, compresso: cui cum Aristolochiæ Clematidis vulgaris femine aliquid simile.

Monspeii olim vocabant Pancratium, & bulbum marinum: Lugdunenses & Geneuenses Pharmacop. plures vgebant bulbos hos Scillas, & pro eis vsurpabant: nescimus quâ ignorantia & negligentia aut auaritia, cum possent veras habere Scillas, tum albas, tum ruffas. Scillæ à Diosc. & Theophrast. descriptæ non respondent, nec florendi modo, nec acrimonia: Cum Pancratio etiam non conueniunt, nec foliis, quæ non sunt Lili, nec colore, nec acrimonia, siue feruore.

Sunt qui suspicantur Scillam esse Epimenidiâ Theophrast. & Plin. Gesnerus putabat Scillam

therocallis, siue Pancratium flore Liliij Mompe-
lianum, præfens sit venenum. Et hist. post. Itali
quidam *giglio marino* apud quos rubro aut pur-
pureo flore inueniri, præfctum Oitienfi portu
ipsi aliquando relatum est: ipsi certè alterius co-
loris flores videre non contigit quàm albi, quan-
doquidem non nisi in maris littore spontè nasci-
tur, Narcissum marinum, commodè appellari
posse arbitratur.

Venenum.

Rubro & purpureo, flore. Narcissus marinus

Pancratium Dalech. quod Hist. Lugd. curauit
depingendum & descripsit: folijs est *rebus*. (Li-
lij albi, vt Plinius vertit) longioribus & crassio-
ribus, caule pedali & nonnunquam proceriore,
anguloso, summo fastigio in quinque foliola can-
dicantia, virgata, acuminata, scle explicante, è
quorum medio angulose breues, & veluti com-
presse siliquæ pediculis subnixæ, ex quorum ver-
tice flos albus emicat, oblongus, infernè arcuus,
supernè latus ambitu supremo, in radios velut
cuspidadim diuiso, pallidis apicibus multis, stam-
inibusq; in^{ter} exstantibus: flore delapso semè in sili-
quis adolefcit & maturèfcens grandescit: floret
mense Iunio. Ex his perspicuè est Pancratiū Scil-
lânò esse, sed specicè, flore potissimè ab ea distan-
tem: Pancratiū istud Monspesc. Clusius Hemero-
callidem Valentiam vocat. Negligenter sanè
Dalech. icon & descriptio facta ad plantam sic-
cam, ideoque minùs placet: nec ea planta folia
habet Liliij albi.

Non Pan-
cratium
Hist. Lugd.
nascitur.

Pseudonar-
cissus.

Non Pan-
cratium:

Bulbum (inquit Dodon. in fol.) ad Pseudo-
narcissi genus pertinere apparentem, placet aliis
esse Pancratiū, & quidem vicinum. Pancratiū
autem bulbus vt Dioscor. refert, *σπογγίος ἢ ὑπερ-
σπογγίος* id est, subbruffus aut subpurpureus est:
istius verò albidus.

Matth. quantum ex icone colligere licet inter
Narcissos numerat & Constantinopolitanum
cognominat, & præstat inter Narcissos retineri,
& marinum dici, quàm vel Scillam vel Pan-
cratium temerè alitnare. Ast nos Narcissum
Matth. ad aliam plantam referimus de qua mox.
Narcissum hunc marinum teste Cæsalp. quidam
Hemerocallen putant, quia id Liliū marinum
à Diosc. vocetur, siue Elium vt Theodorus vocat
in Theophrast. alia tamen ostendit pro legitima
Hemerocalli.

Hemerocal-
li.

Flores lu-
ceos & purpurei.

Narcissi
folio.

Ad cunctos morbos affectus, [vt Lobel. &
Penæ Adu. tradunt profigandos promittit auxi-
lium, bene ominata no. nomenclatura Pancratiū quæ
tamen Scilla species, maritimusque bulbus est.
Radices omnes Pancrati (Narbonensij) alba
non rubræ, quod accidit regionis situ, & supe-
riū aspectu. Lob. Obs. Iconem Clusij habet, ac
dicit, Pancratiij marini è floribus colore varietas:
Adu. p. 57. Hemerocallis Valentina Clusij. Nar-
cissus Constantinop. Matth. non descriptus. Ital.
giglio marino. hisp. *Amor nys* & *Squillamenor*.
Prorsum Pancratiū Monspeliensij idem; sed huic
flores luteolos hispanica littora dant: qui etiam
interdum purpurei, & quandoque punican-
tes produntur. *Azulesnas de las Indias* Pancratiū
Monspeliaco similis est semine & bulbo: Num
eadem sit asserere non auctum, vt cuius flores non-
dum apparuerint in hortis pensilibus Io. Mironi
Neruiensis pharmacop. exit folio Narcissi. Icon
pl. p. 168. Pancratiū marinum, Hemerocallis
Valentina Clusij. Item 169. Pancratiū floribus
rubris, cuius icon est apud Clusium pro Heme-
rocallide Valentina.

Bulbus lit-
toralis

Bellon. dicit Bulbum littoralem Theophr. esse
Pharmacopolarum Gallorum Squillam aut Scil-

lam; Verùm an de hac loquatur nescio, cum ali-
ter existimet Dodon. Videant Lectores.

C. Bauh. phyt. *scilla 3 minor*, Narcissus Con-
stant. vel 3. Matth. *giglio marino* Theophr. 6. hist. c. 1.
Vbi Elium vertit Gaza & Liliū marinum. Va-
riat floribus colore, apud Monsp. flore est albo, &
aliàs subluteo, & pallefcente: apud Italos rubro
& purpureo, quandoque punicante. Quare Ta-
bern. huius tres figuras proponit. Idem apud
Matth. Narcissus 3. Constantinop. Matthiolo in
maioribus figuris, Tabern. Narcissus 8. Matth. in
compend. exprimit Scillam minorem, quam vo-
cat Narcissum marinum Dodon. fol. Cæsalp. He-
merocallis. Gesner. hort. Hemerocallis Valen-
tina. Clus. hist. hisp. Lob. Cam. Pancratiū verum
Gesner. hort. Pancratiū Cordi in Diosc. Nobis
autem videtur vt postea dicemus, Narcissum
Matth. potius respondere Lilionarcillo Heme-
rocalli facie Clusij: nec placet C. Bauh. opinio,
dum dicit esse Hemerocallen Theophr. cui sus-
frutex est, qui non numeratur inter plantarum
bulbos. Nec etiam est Hemerocallis Dioscor.
quia non habet folia & caulem Liliij. Cæsalp. non
recipit pro Hemerocalle Theophr. Gesn. eam o-
pinionem refutat, dicit prætere Pancratiū
quomodo asseri possit non videmus. In Epit.
Matth. quam habemus impressam 1571. pro Nar-
cisso 8. nihil est simile cum Valentina Clusij, sed
quædam icon, quæ potius Tulipam malè eistam
demonstrare videtur.

Plurimum toto littore illo ab aquis Marianis
ad vicus Norbonæ vrbis maritima sæpius vide-
runt & eructunt, sabulo arido, vndis alluto, mer-
sum selsquialmum altè. In maritimis circa Va-
lentiam Hispania frequens, vt toto illo maritimo
tractu infra Mompeliū, vbi Maio mense flo-
rentem, Iulioque & Augusto semen maturum fe-
rentem, magna difficultate eruebat Clusius, tam
altè arena maris fluctibus aggesta mersa erat.
Allata est etiam Viennam aliquoties dum istic
viuebat, Constantinopoli, addita inscriptione,
Albos ac odoratos flores proferre, medio inter
Augustum & Septembrem tempore: & certè his
flore dederunt, recens allati bulbi Gen. viro
Volfg. Christ. ab Ensfthorff Austr. sed illæ ipse
plantæ, nullum postea florem amplius tulerunt,
quemadmodum nec eæ omnes, quas è Gallia,
hispania, & Italia, sæpius in Belgium delatas, vel
semine natas aliquot annis aluit. Itaque hanc
plantam, vt & alias quasdam, in illarum classem
reiciit, quæ mutato natali solo nunquam, aut ra-
rissimè florere solent, cum videlicet concepto
iam in ipso bulbo, flore eruantur, & transferun-
tur. Cæterùm ex semine nobis creuit, verùm nul-
los flores produxit. Monspeliū quoque ad maris
ripam abundare obseruauimus, & quidem flo-
rentem Autumno, vbi Pancratiū & bulbos
hos Scillam vocabant.

Littoris incolæ piscatores, & prædones, raptu
interdum victantes, rati hanc esse Cæpe, voran-
tes ex sale & pane, quamuis famelici, ta-
men [teste Lobelio] nauocabant. Facultate igitur
Pseudonarcisso luteo [Bulbocodio] assumis
Dodon. videtur: nam & gustatus tantummodò
bulbus nauicam excitat, vt iam Lobel. auctor
fuit. Magis venenatam qualitatem cis Clvir
Rondel. attribuit, qui refert solbat exemplum
de duobus piscatoribus, quorum alter cultrum,
Hemerocallidis concisè succo intinctum, soddè
quem oderat, cibo sumpturo apposu- t, ille bonæ
fidèi, pcc infidias metuens, carnes propinquas
fecat,

fecat, utque vescitur, abstinentie alio, qui se fame premi negabat, post paucos dies, miserè sublatu fuit: arguit hoc vnicum Plinii testimonium Hemerocallidem Valentiam Epimenidiam Scilam esse non posse, quia edulis sit.

PANCRATHI MONSPELIANI VEL
Hemerocallidis Valentinae facie
Lilionarcissus, vel Narcissus
3. Matthioli.



Lilionarcissus Hemerocallidis facie (inquit Clusius hist. post. quinquā cum Hemerocallide Valentina, magnam adimere. u. habeat, eodem tamen cap. nō completendum, sed peculiare illi tribuendum, diximus: notas enim quālibet habet ab Hemerocallide alienas.

Semine ex

Italia misso nata est Io. Bidart. Canonico Insulano. Iacob. Plateau scribebat simili plantam ipsam utam semine Florentia misso Martagonis appellat. Eius bulbos Muscari crassitudinem aequat, vel etiam superat, pauloque longior est, multis involutus tunicis, quarum extrema fusca, sequens subrufta, tertia candidior: Eius radices seu fibrae, graciliores & frequentiores, quam in Muscari: sub Aprilis demum finem (nullis bulbos memini adeo tardè emergentes) senu aut plura producit folia, duplè fetè latiora quam muscari, sed illis breviora, & sub extremum Augustum matrescentia, simili planè ratione, quam Hemerocallis Valentina, cuius folia Augusto emergunt, deinde tota viridè hyeme permanent. Ex eodem bulbo bini interdum prodeunt caules ferentes singuli, circiter Iunium mensè, foliolo inclusos sex aut 8. flores, paruo Lilio non dissimiles, mediū occupante paruo calyce albo, in multas lacinias per oras secto, odorato, in quo sex alba stamina, flavis apicibus prædita, & mediū stilus albus; semen in thecis nigrum, minus, & magis rotundum Hemerocallidis semine. Iacobus Plateau Liliū Narcissum Orientalem appellaret, sed meo iudicio permittit. Illius potè iconem ex ea quam ipse Plateau mittebat expressam hinc subieciimus. De hoc scripsit etiam Exor. part. 2. append. 2. his verbis, Narcissus montanus huc marinus alter, qui Matthioli. 3. An Orientalis dici queat valdè dubito, tamen fieri possit, vt in Oriente etiam nascatur: quotquot tamen illius bulbi in hanc regionem vel etiam in Galliam perlati, non ex Oriente aduecti, sed in Europa spontè nascentes reperti fuerunt. Nam ante biennium plurimos eius bulbos ex Illyrico adferrebat Ioh. van Ophem Bruxellensis, quos ipsomet crucerat. Hoc verò anno 1603. scribebat

ad me Bononia Frater Greg. de Reggio. Ordinis Capucinorum sese ab eodem van Ophem literas accepisse Florentiæ exaratas, quibus significabat Corsicam & Sardiniam insulas se perlustrasse, atque elegantissimas plantas reperisse, inter quas hunc Narcissum in altissimis Sardiniae montibus nascentem, ac in vno eodèque caule quinque & triginta flores gerentem. Dicit amnū præterea Craticum odoratissimum, minoribus & candidioribus foliis præditum, & multa elegantissima Crocigenera, & illa quidem locis etiam maritimis: quā sanè ratione hic Narcissus vel montanus, vel marinus nuncupari possit.

Matthiol. Lat. cū magn. fig. & in Itaconem sine vlla descriptione & annotatione à quo accepit iconem habet tertio loco sub titulo Narcissi Constantinopolitani, qui nobis videtur melius quadrare cum Lilionarcisso Clusii modò dicto quam cum Pancratio Monspeliano.

An 1603. Sturgardiz vidimus in horto Ill. nostri Principis ducis Wirtemb. bulbosam plantam quam Narcissum Matthioli tertium vocant, qui ab annis plurimis est in horto peregrinarum herbarum, qui hyeme tegitur & cum hypocauftis calefit. Eius dicitur vocant: mensè Julio folia magna ei erant multò latiora quam in Pancratio Monspeliano, magis ad Scilla folia accedentia, colore etiam non glancescente, aderant etiam in summitate caulis capita plura semen continentia nondum maturum. Hanc eandem plantam eodem nomine donatam per Hortulanum vidi Caroloburgi in Il. March. Georgii Friderici Badensis horto abundanti plurimis plantis.

Hist. Lugd. Narcissus 3. Constantinop. Matthiol. Scillarum aut bulborū littoralium species videtur qualis in Gallia Narbonensi. Tabern. icon. Narcissus Constantinopolitanus, & Tarassen vöplein von Constantinopel.

Casp. Bauhin. ex Tabern. posuit in suo aucto Matth. iconem pro 3. Narcisso Constantinopolitano, idem existimans, cum Lobelii Pancratio. Nos non possumus C. Bauh. assentiri securè assentiri in suis Animad. in h. Lug. Narcissum Const. C. B. vor. Matth. esse Pancratium Dalechampii.

PANCRATHIVM INDICVM AVT NARCISSVS CLVSIJ INDICVS MAXIMVS AVT VMLIS QUORVNDAM, NON AMARVS, ALBVS.



Radice est [inquit Lob. Adu. par. 2.] spithamum longa, brachialis crassitudinis, multis Cepaceis subalbids tunicis squamosa, extimisque cuticulis ex rusto subfuscis, aut Castaneæ diluti coloris: sessili parte maiore mediocrem pugnam equate: numerosis carnosis habitioribus

HISTORIAE PLANTARVM

floris, Pancretatii aut Scilla instar, quasi trunco aut nodo collectis & appensis fultâ. Opinabatur Lob. Pancretatii aut Scilla speciem, sed neutiquâ, sapor amarus refragatur. Septembri & Octobri octonis aut denis stellatis floribus Colchici albi Anglici paribus, sed longioribus, sublucis, ex albo luridis, senis, longioribus, staminibus albis præditis, latioribus è membraneis tunicis, Moly Dioscorid. nodo pendulis, breuioribus, sine caule penuria fortè alimentii inhaerentibus. Inter plures vnicus *bulbus* ipsi floruit: sed quia diu nati terrâ destituti, foliis vidui erant: tamen rudimenta conspicua in minore bulbo retusa apparuerunt, Pancretatii Monspeliaci similia, duas vncias lata, breuiora tamen, fortè nondum prorsus enata aut perfectam longitudinem assecuta. Omnes hi bulbi hyemis fauoris iniuriâ Anno salutis 1600. Londini, Antuerpiæ & alibi amicis communicati perire, quos ipsi dederat amicus singularis D. Ioannes Loeus Germanus apud Londinenses Chirurgus egregius, à naucleris reducibus ex Alta Hispaniola Occidua Indis Teborum *Capo* siue portu vocata.

differentias reperiri audio.

SCILLA VETERIBVS.

Inter eas radices, [auctore Theophrasto] quæ Punicas multiplices corticofasque habent, Bulbi, atque etiam *Capeæ*, [Theoph. l. 4. c. 10. & Scilla, hisque similes reponuntur. Semper enim his aliquid circa eximi potest: quæ quidem omnia, duplex quodammodo genus radicis habere, videntur. Nonnullis hoc idem de omnibus capitatis & inferiore capitis parte radices mittentibus placet: Edules autem sunt non solum Bulbi, & his similia, sed etiam radix Scillæ (σπίλλιον) non tamen omnis quidem, sed vocatæ *σπίλλιον* quæ ab usu nomen accepit: hæc anguliores est folio & leuiore quàm cæteræ. Floret per partes, vt Alphodelus. Incipit primò ab inferioribus. Omnia igitur capitata (κατακλιπτα) radice, viuacia maiorem in modum sunt [σπίλλιον] maxime verò Scilla: vt pote quæ suspensa viuere possit, & quidem plurimum temporis permaneat. Potest autem reposita seruari, vt Malum granatum detractò pediculo. Traditur & ante portas lata remedio esse contra veneficiorum noxam. Omnia hæc confertim crescunt. Admitandum inter omnia quod in Scylla & Narcisso euenit. Cæterorum enim tam recens sarorum quàm regerminantium, suo tẽpore foliis primò oritur: deinde posterius caulis. In his autem caulis primò. Florum autem proeuntis ternos ostendit (σπίλλιον δὲ τὰς ἀθίνας τῶν) quorum primus, tempus arandi primum ostendere videtur. Secundus medium, tertius postremum. Quot enim fuerint isti, totidem & arandi tempora fecè occurrunt. Sed cum ita fenucir, tum foliorum exortus, multis postea diebus ineptit &c. Cæterò Ficus si in Scylla (Σκύλλιον) voce vitur Theophrastus quæ nunc Lentiscum nunc Scillam significat: malè autem Gaza hoc in loco Lentiscum vertit, vt annotat Gesnerus.) plantetur, ocyus crescit, minusque à veribus infestatur. Summatim, omne quod in Scylla plantatur, melius germinat & nutritur celeriusque augetur. habet enim quandam caliditatem & humiditatem, & sit velut insitio quædam.

De Scilla & Pancretatio hæc doctissimè scribit vir summa doctrina præditus Dalech. Pancretium, inquit, quod & aliqui Scillam vocant, vt Plinius legisse videtur & rectius, quod non simpliciter Scillam vocant, verum *σπίλλιον* videtur Scillam pusillam, nascitur vbiuis in litore maris, radice bulbi magni amplitudine, cortice subtrifido vestita, infimè capillata, Capeæ modo: foliis *ακτιῶν* siue Lili albi, vt Plinius vertit, longioribus, &, quod præter Dioscoridis literam Plinius addit, crassioribus: caule pedali, & nonnumquam proceriore, anguloso: summo fastigio in quinque foliola candicantia, virgata, acuminata, se explicante, è quorum medio, angulosa, breues & veluti compressæ eriguntur siliquæ, pediculis subnixæ, floret Iunio. Ex illatum vertice flos albus emicat, oblongus, infernè artus, supernè latus, ambitu supremo in radios velut cuspidatim diuiso: pallidis apicibus multis staminibusque inus extantibus. Flore delapso in siliquis semen adulescit, & maturescens grandæscit. At quoniam affinis est Scyllis Pancretatii natura, Scyllamque Plinius c. 17. lib. 21. ter florere scripsit: Theophrastò c. 21. lib. 7. histor. ἐκ τῆς ἀθίνας, vt Plinius: sed

PANCRATIUM ALTERVM Vernum Indicum.

Descriptio **P**ancretium Indicum alterum Vernum, siue Narcissus Indicus alter, facie Pancretii Monspeliaci. Lilio narcissus Hemerocallidis facie Clusii aut congener. Narcissis associanda hæc Pancretii Monspeliaci facie bulbacea Indica planta, cuius bulbo me (inquit Lobel. Adu. pat. 2.) do. auuit C. V. D. 1. h. Hussenius Consil. Ord. & Societatis Praefectorum rei maritimæ Zelandiæ Belgarum, in cuius horto quotannis floruit & floret, è duplici *ca. le* dodrantali & pedali, quatuordecim floribus liliaceis, candidis vno ab eodem, vt prædicti Pancretii, exortu procedentibus quatuordecim: altero verò duodecim, senis foliolis longis albis conflatis, internè tantillum subflaudentibus & calyce medio laciniatis, totidemque staminibus longis, medioque stilo præditis. Mihi hoc Londini in horto Nobiliss. Baronis Ed. Zouche & D. Iacobo Gareto Myropole, rei herbariæ studiofissimo, senos



aut septenos tantum laxauit, cui caulis ex bulbi latere prodiit. *Foliorum* & *bulbi* fuscæ similitudo & patilitas, quodammodo Pancretii Monspeliaci. Annis elapsis floribus fulci Caryophyllo aromatico concolotis varium alebat Medico-caltri Zelandorum in horto Michaelis de Lannoy affinis meus. Varias aliorum colorum

Ad *παιδάς τρεῖς ἀνδρῶν*, præter rem non fuerit
 Ictorem ebiter admonere falli multos, qui ex
 his Plinii Theophrastique locis, tribus annis di-
 uerſis temporibus, exempli gratia, Autumno, Ve-
 re, Aestate, Scyllas florem edere putant. Id por-
 tō quomodo fiat vt cognoscamus, habendum sic
 est, inter bulbosās omnes plantas Scyllam & Af-
 phodelum quā diutissimē florere, ob alimen-
 ti copiam & vbertatem, quod Theoph. cenſet c.
 11. lib. 4. caull. & *χρῆμα ἀπὸ ἡμεῶν ποιεῖν* non *ἀνοῖν*,
 vt in exemplaribus nostris legitur, particulatim
 florere, & ab ima parte caulis primū incipere:
 Augusti ergo principio Scylle caulem assurgere,
 quod pluries obseruauī, cubitalem, aut etiam
 proceriorem, densissimo florum stipatu conce-
 ptum: imos flores primos produci, ac interim dū
 aperti vigent, medios turgescere, supremos glif-
 cere tantummodō, quę *πρῶτῃ ἀνοῖστος ὄντῃ*, primus
 ad florendum conatus. Exactis aliquor die-
 bus flores qui primi reclusi fuerant, labi, mediōs
 que scēz promere, supremis tantū intumescen-
 tibus, quę est secunda ἀνοῖστος: postremō deslue-
 ntibus mediis, supremos se explicare: quę ἀνοῖστος
 tertia est: hoc florendi ter repetito impetu,
 terram quoque ter subigi oportere denuntiat,
 priusquā fruges serantur. Priscidit vrb̄ & con-
 torto caule folia nasci circa 1a. iuarii vel finem,
 vel mediū, quę æstatis post squaloribus exar-
 rescant. De Lentisco Virg. prodidit post Aratum
 quod de Scylla Theoph. his verbis:

*Iam vrb̄ semper viridis, semperque granata
 Lentiscus, triplici solita exardescere sæu:
 Ter fruges findens tria tempora monstrat
 arandi.*

Quomodo autem Theophr. & Plinii corrupti de
 de Scilla loci restituendi sunt docet Idem Dale-
 champius.


Hac de re hæc Robertus Constantinus in suo
 Lexico: *Σκίλλη* inquit, (vt scribendum distin-
 ctionis causa,) vel *σχιλλῶ* etiam, est herba bulbō-
 sa, Scilla siue Squilla Varroni, ἢ σκίλλα, vel eius
 bulbus, aut Scilla species minor, τὸ παρρησίον
 etiam à Diosc. *Σχιλλῶ* exponit gal. in glossis Hip-
 pocratis *ὡς μὲν τὸ θυμαράδες ἐστὶν, ἀλλὰ δὲ ἕδος τῆ
 σκίλλης, εἰ μὴ ἄρα δὲ πῶσις σκίλλης τὸ βιβλόν.* Plutar-
 chus etiam in Pericle, ipsum ait, ob capitis instar
 Scilla inueniēti & oblongi formam, *σχιλλῶ* φασιν
 appellatum esse, quasi dicas Scilla capitonem:
 Libri. cap. 12. *σκιλλῶ* loquens Theophrast.
παιτίται, inquit, *δὲ τῆς ἀνδρῶν τρεῖς ἔσονται ἢ πρῶ-
 τῇ δυνάμει σκίλλῶν τὸν ἀσπῆτον ἄροτον, ἢ τῆς δυνάμει
 τῆς μύσσης, ἢ δὲ τῆς τῶν ἔργων.* &c. Ex quibus Plinius
 lib. 12. cap. 17. de Scilla dixit. Eadem ter floret, tria
 tempora fationum ostendens &c. Quod autem
 ipsa floreat ter, id intellige de floribus triplici ni-
 xu: floret enim particulatim, id est *μεταξὺ* siue
χρῆμα: vt idem Philoſophus dixit: In Scil-
 la quod intus tenerum ac molle quæsiq; adeps,
σπιρῆδον σκίλλης dicitur, *δὲ στερεὸν δὲ σκίλλης μέσση*.
 Vario Scilla medium vocat. In eodem signifi-
 catu *μάστιξ* in Lactuca vsurpauit Plutarch. q. Sym-
 pos. *Hæc Constant.* qui plurius rem prosequitur
 vt apud ipsum videre est.

De Scilla æquiuocationibus & substitutis sciē-
 dum: Quod Scillam rubram vulgarem, quam
 quidam nolunt Scillam esse, sed Pancretarium, qui-
 dam pro substituto recipiunt. Quod insuper
 in dubium vocetur an forte Scilla alba sit eadem
 cum rubra, differens colore tantū, an aliis foli-
 orum figura etiam differens. Quod autore
 Clusio dicatur Ornithogalum maius quod quidā
 Scillam Epimenidiam vocant. Quod, Plinio teste,

cū Epimenidia Scilla edulis sit, Hemerocallis
 Valentina illa esse non possit, certissimo argumē-
 to est exemplum de duobus piscatoribus Ron-
 delerii. Quod tandem pro Scilla, auctore An-
 guillara, varii bulbi supponuntur.

SCILLA RVFFA MAGNA VVLGARIS.

Bulbum habet Scilla magnum Pomo Adami, *Descriptio*
 vel Citrio maiori sæpè parem, multis crassis
 fibris donatum, è laminis tuniceis, rubentibus,
 viscidis contextum, sub bulbo multa fibra, è quo
 folia emergunt, impenſè virentia, cubicum lon-
 ga, palmum ferè lata, succulenta, crassiuscula cū
 multa visci-
 ditate amara:
 inter quæ sur-
 git caulis Af-
 phodeli *flori-*
bus insignis;
 seric longa
 dispositis, &
 succelluè sese
 aperientibus,
 candidis, Or-
 nithogali
 spicati flores
 æmulantibus:
 Fuch. caulis
 vt in croco
 prius proilit,
 tum ex eoslos
 in luto can-
 didus, qui
 cū senuerit
 folia demum
 multis post
 diebus emi-
 cant lata, nullo
 nixa pediculo,
 cepitia quadam
 specie, & plerūque
 ex iis in terram
 deflexa: Mat-
 thiuolo amara
 est Scilla & acris,
 folia Liliū qua-
 lia.



Dodon. Gall. Hodierno tempore duæ reperiū-
 tur Squilla, vna foliis angustis, quæ vera Scilla,
 altera latis, quæ vulgō vtuntur pro Scilla. Primæ
 & veræ Scilla: bulbi sunt valdè magni & crassi,
 candidiores bulbis Scilla vulgaris. Folia longa
 & angusta sunt, colore cineritio, vulgari Squilla
 sunt etiam magni & crassi bulbi colore magis
 ruffo, cortices spissiores quàm in priore, folia ma-
 gna & lata, Liliorum foliis similia. Flores parui
 & lutei, secundum summitatem caulis, succedit
 deinde semen. Squilla deferretur ex Hispania ad
 vsum medicum, quidam plantant in hortis (Bel-
 gicis.) Prima species Capæ genus peregrinum
 dicitur: Serap. Capæ mutis. Secunda species pot-
 tiss. vsurpatur in Oñe. pro Squilla, quamuis non
 sit vera: sed Græcorum Pancretarium, cui pares
 vires quæ Scilla, vnde sine errore potest sumi
 pro Scilla. Bellonio existimatur Bulbus lito-
 ralis Theophrast. cum quo magna similitudo.
 Pancretarium Dioscor. & bulbus Theophrast. vna
 & eadem planta videntur. Scilla calida secun-
 do gradu & sicca tertio.

Dodon. eandem iconem quam nos ex Fuchſio
 habet, titulo Scilla communis & Pancretarii: is in
 postrema historia icones duas, quales Clusius
 habet, proponit: Nobis autem videtur Dodoneus
 suas descriptiones non ad plantas fecisse si-
 bi obiectas, sed ex Antiquis & Neotericis com-
 posuisse: considerent igitur lectores Dodon. duas
 descriptiones & quæ paulò post dicentur.

Scilla dua
Scilla cā
didior.
Scilla Sul-
garia.
Locus:
Cape mu-
ris.
Squilla of-
fice. est Pan-
cretarium.
Bulbus lit-
toralis
Theophr.
Temperā:
Icon Do-
don.

Cur Cepa
marina di-
ctā.

Cepaceo generi [vt rectè notant Lob. & Pena in Aduerſ.] rãntoperè est compar Scilla: vt multum eam *Marinam Cepam* vocent. Quia autem inter hanc & marinum refaccim pilcem à tunicea squammarum compactili serie Squillam vocatum, tanta ſimilitudo interceſſit, hæc putatur ſic dicta. Poſuit etiã à fabuleſis maritimis Sole rorridis, cuiuſmodi ſunt in Hiſpania & propè aride Luſitanix teſqua maritima. Huius duas differentias colore duntaxat inter Hiſpanicas tam multas animaduertere eſt, quarum extrinæ tuniceæ vni rubent. vt Cæpis oblongis, alteri albert, magnitudine pares. Vtraius maxima Pomũ Aſſyrium nun ſuperat: è tam multis antè millib⁹, quæ quorannis tum Venerias tũ Antuerpiã deuchuntur, nullam meminimus maiorem, eã que fata & perbellè adulta fuit Monſepii in horto Iacob. Farges Pharmacopœi. Vniuerſa namque folii cauma, vel dorſum, palium ferè lata, pedem alta, craſſitudo minor quàm Aloes, crebra è bulbo pullulant ſquammatum compacta, caulis ſeſquicubitalis, gracilis, ſoſculos Fragariæ gerit ſimiles ſed minores, in ſpicam poſtremò ut ſcificens.

Matth. re-
preſenditur.

Neutiquam mirum Matthiolium, poſt alios Neotericos nuperos, ſententiam de Scilla mutaffe, cum neſtiquam viſam ſibi genuinam ſed tantum verbis depictam, fatetur. Quin etiam ſi verum Panerarium vidiffet, numquam pro illo ſpeciem Scillæ ſubdiſſet. Et foliorum gracilitas, à qua ſe deceptum conſequitur, fanè non aliam ſpeciem conſtituit Scillæ: ſed tantum contingit habitiora & maiora adolere folia, mutatione celli, ſoli & cultu.

Lobel. Obſ. & Ic. pl. Scillæ rubentibus radicis tunicis, folio Aloes carinato. Figuram habet ex Cluſio, ac dicit Panerarium verum Cluſii.

Paneratium.

Cluſ. in poſt. h. it. de hac Scilla ſcribit. Paneratio [Hiſp. dicto eodem nomine quo Scilla, *Cebolla*] amplitudo maior eſt [quàm Scillæ,] extimæ tunice rubent, foliaque ampliora, longiora, magis carinata & quodammodò ſtrecta. Abundè creſcit in Hiſpaniæ mediterraneis: bulbos erui, florentem autem aut ſemen ferentem nunquam conſpexi. Fabiano autem legas vt ad me ſcribat in penſilibus hortis non modò caulem protulit, ſed etiam pluriſmos flores ſpicæ inſtat in eo naſcentes, ſex foliis naſcentes Scillæ [quantum ex pictura, quam epistolæ conuincerat colligere licebat] ſorum æmulos. Πανεράτιον ἢ Σκίλλα Græcis, Panerarium Latinis dicitur. uſpanici eodem quo Scillam [albam] nomine donant, *Cebolla albarrana*. Scilla, inquit Matthiolus, quam vulgus officinarum Squillam vocitat omnibus vulgariſ notitia eſt atque vtiliſſima, medicamentis expetita, vtpote ſine qua legitima Theriaca conſici non poſſit. Panerarium, quod aliquibus puſilla Scilla vocatur, quoniam hodie in medicamentorum vſum non recipitur, idè Medicis & Sepſaliariis neglectum eſt. Vnde etiam pauci fortaliſ ſunt qui vel ipſum nouerint vel animaduertent: cum ramen variis in Italia locis gignatur, præſertim in Apuleia, vbi magnus eſt Scillarum prouentus. Verum eſt id in officinis non habetur, nihil ramen iacturæ in medicina fieri puro, quòd eius vicem maior Scilla valentius etiam praſtet. Scillæ duo notantur genera, vnum album alterum verò nigrum. hinc nonnulli vt Ruellius inquit, album maſ, nigrum autem feminam faciunt: quanquam magis rationi conſentaneum videatur vt contrarium exiſtimari &

Scilla Offic.
et vera.

Scilla puſilla.

Iocus.

Scilla duo
genera.
Ruellius
notauit.
Matthiolus
repreh.

eſſe debeat. Matthiolium decebat demonſtrare qua in re differat Panerarium Italicum à Scylla: ille in poſtremis com. non amplius eius meminir nec locorum vbi prouenit Scilla Officinarum: quare id fecerit ignoramus fortè quia de re non perfectè ſcripſerat: cenſuram etiam in Ruellium omiſit, & merito, niſi Plinium etiam velit taxare ex quo Ruellius aſſumpſit.

Quandoquidem autem Matthiolus in poſt. comment. nullam facit mentionem Scillæ albæ, verſimile nunquam ab eo viſam, nec etiam flores Scillæ vulgariſ quos pinxit cum quatuor foliolis. Scillam poſtò vocari tradit in Epit. ab Arab. *Haſſel*, *Manſel*, *Aſchil* ſiue *Alachis*. Bulbo niſi ingenti ſubructo, radicibus infernà fede numeroliſ ſquammiſ craſſiſ, leno ſucco pregnantibus acri & amaro, folia mittere Aloes ſimilia, caulem ſeſquicubitalem, læuem, & flores in ſummitate ſubpurpureos. Idem ait in hiſt. Germ. Scilla multas habet ſquammas ſubrubescentes parum, ſed, multò maiores & craſſiores fert ex vtriuſque caulis latere pulchros flores ſuaſcentes (weiß gelbe,) vbi flores exciderunt pluribus diebus poſt ex bulbo prodeunt lata craſſa folia ſine pediculo, vt in albis Liliis: Copioſe proeunt in Apuleia & Sicilia. Matthiolus in Epitome & in hiſt. Germ. non ſibi conſtat, dum vno loco ſcribit flores ſubpurpureos, alio autem ſuaſcentes.

Quàm benè etiam Caſp. Bauhinus in ſuo aucto Matthiolo poſt Scillam uſpanicam ſcripſerit, flores in ſummitate eſſe ſubpurpureos, iudicet alii: nos albos in vulgari Scilla vidimus prout annotauimus à quadraginta annis.

Cur poſtò Scillam ex Græcia & Italia in Hiſpaniam remittat Matthiolus mirari fatiſ Guill. nequit, vbertimo eius in Græcia & Apuleia prouentu, nomine rituque veteri in limine ianux eam ſuſpendendi, adhuc vſque tẽpora propagaro. Scillam eſſe decernit Guil. ex Galeni ſententia, cui radices ſint candidæ: Paneratio cui ruſſe; Dioſcor. authoritate. Ille Matth. ſi Scillam terræ ſuæ herentem conſpexiſſet, renos eam flores fundere haud negaſſet. Quod cur ex Theophrat. adnotauerit, nec Narciffum ter florere, quod ibidem traditur, obſeruauerit, magni eſt apud Guill. momenti. Agnoſcit fanè, ehm hoc in loco, rum in aliis non patcis, ingenium ipſius vaſtum & verſipelle.

Amatus quoque ſimilem Cenſuram contra Ruellium cum Matth. habet, dicens, Panerarium facit Scillam minorem & illam quidem nigram. Ruelliũ arguit eum contra naturæ ordinem nigrã ferè minimam facere cum ſit Maſculus appellanda. Verum animaduertit Amatus Ruellium Plinium imitatum.

Scillam ſiue Squillam pingit & Lacuna: Scribitque vocari in Caſtilla *Cebollam Albarranam*. I-bidem dicitur Arabibus *Haſſel* vel *Aſchil*. Cat. *Ceba marina*. Portugalenſibus *Cebola Albarrana*. Gall. *Oignon marin*, *Charpentiere*: Scillæ ſiue albeicæ & ad ſtaum inclinat. Si ſtirpium diligens indagator fuiſſet, tradidiſſet nobiſ diſcrimina Scillarum in ſua Hiſpania prouenientium, ille ponticonem Hyacinthi maioris pro Paneratio nulla addidit deſcriptione.

Lonicerus qui Scillam, Cepam marinam, & officinarum Squillam vocat, propriam addit figuram, & deſcriptionem, atque caulem & flores prouenire ante folia.

Scilla noſtra (inquit Geſner.) vulgariſ, ſiue Panerarium ſit, ſiue alia ſpecies Scillæ, rectè & vtiliter in Theriacam additur: & vires omnes, quas

Vete.

Veteres Scilla attribuerunt, egregie praestat, vt plurimis experimentis constat. Quamuis autem folium Lili eam habere aliqui obiciunt, non Aloes, quod Dioscorus requirit: non idcirco tamē à Scillarum genere excludi, & tãquam venenosa reiici debet. Matthiolus eam damnat quasi mitiorem iusto & parum efficacem. Anguillara cõtrario nomine quasi nihilum vehementem & venenosum. Ego tanquam bonam & conuenientē Antidotis approbo. Debet enim ad Antidotos quæ in eodem genere efficaciora sunt, deligi potius quàm lenissima. Eto vehementior quàm Scilla alba, edulisque (Scilla nomine adhuc in quibusdam Græciæ insulis nota, vbi Scillam nostram Cepulam caninam vocitant, vt Anguillara docet,) at eo medicatur esto. Esto venenosa si in cibis, praesertim sepias & copiosius, fumatur: non tamen venenosa erit si preparatur quo debet modo, & aliis multis miscetur: sed iam venenorum & morborum multorum alexipharmacum fiet. Alba verò & edulis si sic preparata antidoto misceretur, omnem viam medicamenti exceret. Esto Paneratum, vt vult Anguillara, nõ idē tamen venenosa erit in antidoto, nec reiicienda: cum Veteres Græci Medici, Paneratum ad eum simile fecerint Scilla, vt ab aliis simpliciter quoque Scillam, ab aliis Scillam minorem appellatum, & illam omnino viribus polleat, minoribus tamen, scripserint, quod si venenosius esset quàm Scilla, minus profectò non dici deberet. Et vt veneno eam non carere concedamus, non tamen ab antidotis excludenda est. Certè Plinius quoque vin Veneni Scilla tribuere videtur, cum scribit lib. 20. cap. 9. Oxymelitis scilliticæ tantum vin esse, vt animæ extinctæ speciem momento aliquo præbeat, id quod nos etiam à vino scilliticò factum obseruauimus in in muliere, quæ eo poto in vteri strangulationē, aut persimilem ei affectum ad breuissimum tempus incidit. Arabes etiam de Scilla venenata, loci natalis praesertim ratione, loquuntur. Authores cum albam Scillam eligi iubent, præcipuè ad acetum Scilliticum, hoc ipso ostendunt, aliquam etiam esse ruffam Scillam, quæ quoniam inultracrior & vehementior est, preparari debet, vt minore periculo sumatur assando, torrendo vel elixando, alba verò cum innocentiore sit, preparari aliter non indiget quàm vt in taleolas secta ficeatur in vmbra pro aceto vinòque medicatis ex ea parandis, ad theriacam verò Scillam albam deligere nemo iubet. Iam quod ad magnitudinem attinet Scilla vulgaris nostra duplex videtur maior & minor: quod si aliter quàm aetate differat: minorem Paneratum dixerim, maiorem verò Schinum, quo nomine Veteres (Hippocras. Atifophanes Theophrast.) Scilla speciem nominarunt: etsi Gaza malè Lentiscum verterit: vt & Cicero ex Arato: nisi forsitan & ipse Aratus homonymia nominis deceptus, transcriptum ab aliis Schini nomen, pro Lentisco arbore &c. Hispanicæ certè Scilla, quæ carteris acriorem esse aiunt & maiorem, folio Aloes, simpliciter Scilla dicerem: eaque si ad manum foret preparata ad Antidotos iterer. Ego ex homine docto & sive digno cognoui, toxicum etiam apud Hispanos ex Scilla parari, sicuti ex Elleboro: quod magnum ipsius vehementiæ argumentum est. At Scilla edulis alba quam in Creta & Cephalonia adhuc citari Anguillara tradit, non simpliciter Scilla, vt ipse putat, sed Epimenidia Theophrasti vocari debet. Diuidit autem Plinius quoque Scillam in genus medicatum & ciharium. Quod si, vt dixi, Scilla nostra

vulgaris minor, Paneratum est: & à maiori specie differat: vulgaris maior, quæ cum ruffa, tum albicans (vt audio) adfertur, quæ colorum differimina haud scio, an in minori quoque reperiantur) non temerè Schinus vocabitur: Galeus quidem dubitat an Schinus Hippocrati idē, quod Scilla sit, vel aliqua eius species: sed ex Theophrasto à Scilla differre, eique cognatum esse liquidò apparet. Plutarchus Periclem Schinoccephalum agnominatum tradit, ab oblonga & acuminata capitis figura: additque Schinum pro Scilla accipi. Hæc de Scylla generibus habui à me diligentius obseruata: ex quibus etiam constat [ornatissimè Calceolarij] paratam à te nuper theriacam antidotum, è vulgaribus Scillis trochiscos non temerè recepisse. Scilla Theophrastet floret in anno & tria arandi tempora significat: & Arato similiter, etsi is de messe loquatur. Sed Aratus primò Schinum ter fructum producere ait: deinde etiam Scillam ter florere. Et quoniam is primùm ab Illici simul & Schini fructibus, prognostica quædam tempestatum signa exponit, de duabus arboribus sentire videtur, Illice & Lentisco: cum Schinum verissimilium sit, illud quicumque hoc ante eum scripsit, à quo ipse nimirum est mutatus, pro Scilla specie accepisse: sicut & Theophrast. alibi accepit. Lentiscus quidem an ter floreat alicubi, non constat mihi: non sit autem mihi verissimile. Scillam ter florere minime dubito: non ubique tamen, sed in Græcia & notis Theophrasto locis. *90* igitur per tota in prima, scæmenino genere, Lentiscum significat, & antiquioribus eorum aliquando speciem Scilla: *90* verò per oi diptongum masculino genere, tuncum.

Vocat Tragus cum Iacobo Manlio Cepam muris *Neuszweibel* alioqui dicitur Cepa marina, *Neerzweibel*. Squilla in officin. Quæ Scilla Græcis dicitur, etiam apud Latinos nomen suum retinuit, Fuchf. Corn. & Cordo testibus, quam Varronis exemplo nunc omnibus officinis Squilla vocetur. Nostri *Neerzweibel* hoc est, Cepam marinam vocant, alii *Neuszweibel*, id est, Cepam murinam.

Bellon. lib. 7. Obs. cap. 18. ait: In Cretæ maritimis litoribus proueniunt copiosè radices, quæ Theophrasto littorales bulbi dicuntur, & ab Aromatariis, Gall. venduntur pro Squillis aut Scillis. Quo in loco quamuis Dodon. existimet Bulbos littorales Bellonii eosdem esse cum Scilla vulgari, nihilominus dubitamus: quid si Scilla sit Anguillare & fortè Paneratum Montepelianum vt suspicamur?

Camer. in Epitom. Matthiol. nouam figuram addit, in qua flores habent tantum quatuor foliola, an benè indicent qui viderunt aut videbunt Scillam vulgarem florentem.

C. Banhin. Phyt. Scilla 2. maior radice rubra: Paneratum Clusii: Scilla rubentibus radicis tunicis. Lobel. Obs. pag. 76. & icon. pag. 152. Florem huius nemo pinxit, Plinio à profigandis morbis omnibus dictum videtur. Si nullus florem pinxit necesse est iconem Fuchsi, Tragi, Dod. Math. & aliorum esse falsam, quæ exhibitæ fuere ante Clusianam.

Idem apud Matth. tres Scillas tradit, de quarum prima dicit: Scilla maior radice alba. Casp. Banh. Brunfelsio. Scilla seu Cepa muris Trago, Matthiolo. Fuchf. Cordo in Dioscor. Gesner. hort. Hist. Lugd. Scilla comitis, Dod. Gal. Scilla maior Castori. De secunda scribit: Scilla Hispanica, radice est alba. Nos de paulò pòt agemus. De tertia verò sua Scilla ait: Scilla maior,

Ruffa & albicans.

Schinus species Scilla.

Scilla ter floret.

Schinus Arato.

Innec.

Squilla Varronis Sulgo. Cepa murina & murina.

Bulbi littorales Theophr. Dodon. not.

C. B. not.

radice rubra C. Bauh. Hæc radice est maior: *Pan-*
cratium Clus. in sp. Dod. Lugd. Tabern. *Scilla ru-*
bentibus radice rubra, fol. *Aloes carinato*. Non
inuenimus quemquam ex iam nominatis Scillam
trahere maiorem radice alba, quinimò ii tradunt
vulgarem officinarum, quæ ruffa non alba: non
igitur tres facimus Scillas cum C. Bauhino, nec
Clusii Pancratium separamus à vulgari Scilla de
qua supra nominati.

C. Bauh.

Nomina

Reguarum

Locus &

Tempus.

Elegentus.

Vus.

Zidda, Offic. *Squilla*. German. *Meerzwibel*
Meuß zwibel Belg. &e *Ayenyn*. Gall. *Sciponte*,
Squille, *Charpentaire*, *Oignon marin*. Hisp. *Cebama-*
rina, *Bebela Albarran*. Boh. *Eybula* & *Neiffa*.

Spontè nascuntur copiosissimè in Balearibus
Ebusoque insulis ac per Hispanias. In Sicilia &
Apuleia copiose, maximè apud mare. Scillater
floret, tria tempora fationum ostendens: Non
solum Venetiis vidimus Scillas multas rubras
magnas, verùm etiam Lugduni, vbi tamen meo
tempore apud Pharmacopœos rarus erat vs-
sus, quemadmodum & Geneæ vbi Scilla-
rum loco alios vsurpant bulbos. Bulbi Scilla in
Offic. non fati qui constant corticibus, crassis, ruf-
fis, ac viscidis, folia produnt. Basileæ pharmaco-
pœos vtentes obseruau. Parauii vidi in orto
publico. Lugduno mihi missa quæ estate latitans,
tandem Autumno folia produxit Montbelgardi:
sed non diu perdurauit frigore interempta, in
orto E. C.

Elegenda bene magna & alba, vt docent tum
Democrates tum Diosc. Secundum Galenum &
Mesuem melior est quæ alteri connexa eruitur
[sola eniat & singularis, est venenosa] sapore
dulci, acris, amaro, laminis splendentibus, ex agro
libero: Aucennas eligit inter humidam gratiam
& non magnam, mediæ magnitudinis & plenam.
Foclius etiam expetit fœminam candidissimam,
iuxta magnitudinis, non admodum enormem,
benè habitam & nutritam, neque putridam, ne-
que gelu flaccidam, sed recentem ex terra sum-
ptam, cum eius caules exactè aruerint, seu quan-
do triticum metunt, quæ tum potissimam viget:
Idque iuxta regulam Dioscoridis generalem, quæ
ait, radices & succos ipsarum & cortices, auferre
oportet quum herbæ folia amittere incipiunt.
Colleg. flor. expetit collectam initio Iulii. Datur
potio Scilla à drachmis quinque ad drachmas
duodecim: Oxyveli autem scillites ab aur. sex
ad vncias tres: Trochisci autem à drachmis dua-
bus drachmas quatuor.

SCILLÆ MAGNÆ ALBÆ.

Candide autem Scillæ, siue albæ magnæ,
multæ, missæ fuerunt Antuerpiâ per D.
Pharm. Coldemburgium Val. Dourez, differentes
à Lugdunensibus paruis, siue Pancratium Mon-
peffulano, quas adhibuimus in conficienda The-
riaca Lugduni & Geneæ. Discrimen autem à
vulgari rubra, in iis non potuimus animadu-
uertere, præterquam in colore: magnitudo e-
adem, squammæ crassæ & latæ, ex quibus appa-
rebat folia, æquè lata esse, atque rubris. Ea in
re multum differentes ab eorum bulbis, quibus
vtebantur pro Scillis, an idem sit sapor non an-
notauimus: non placet igitur duplex descriptio
quam ante posuimus Scillæ albide traditæ à Dod.
Existimamus enim scripsisse ex alienis, non iuxta
plantas à se visas.

Is hist. in fol. pro ea assumit iconem Scilla

Hispanica, hæc de ea scribens: Scilla historiam
plerique dederunt, sed quia nemo hæcenus legiti-
mam eius iconem exhibuit, facere non potui
quin meis Obseruationibus infererem, cum eam
& primùm emergentem, & florentem, semine-
que onutam, plerisque Hispaniæ & Lusitanie
locis eruerim. Est verò Scilla *caulis* plerumque
cubitalis aut maior, rectus, nudus, abique foliis,
plurimis candidis & stellatis floribus ornatus, Al-
phodeli minoribus, ornithogali maioribus* (quod
quidam, Scillam Epimenidiam putant) explica-
ri incipiunt, quemadmodum Alphodeli & qua-
rundam aliarum bulbacearum stirpium flores:
his succedunt triangula capitula, compressis an-
gulis, & velut inania, in quibus tamen nigrum,
planum, palaceum semen: quinque, sex aut plura
demum emergunt folia liliacea, lata, vniua ad-
modum, densa, siue carnosa, humi expansa: non-
nihil carinata: radice crassa est, multis tunicis al-
bis lento quodam humore plenis prædita, mult-
isque crassiusculis fibris capillata. Copiose nasci-
tur supra Olyssipponem, & plerisque aliis Lusita-
niæ & Hispaniæ locis. Floret Augusto & Septem-
bri maturefcit: folia maturo iam semine, & exa-
rido caule, emergunt Nouembri & Decembri.
Cur Dodon. & Clusius Scillam albam, verius Scil-
lam censeant, quam ruffam, non possumus adhuc
intelligere. Constat siquidem Veteribus Scil-
lam fuisse duorum colorum: Albæ meminerunt
inter Veteres Diosc. Pinius & Democrates in
descript. Theriac. apud Galenum.

C. Bauh. *Pl. y. Scilla 1. maior radice alba*. Scilla
Math. l. 2. c. 168. & icon p. 44. Scilla siue *Cepa*
marina Lobel. icon. p. 73. & Clus. Hisp. l. 2. c. 16. Sed
legimus & nos Matth. & quidem plures editio-
nes, quas inde fessio studio euoluimus, nullam ta-
men inuenimus iconem similem iconi apud
Lob. & Clusium exhibitæ, nec etiam descriptio-
nem, icon eadem est valdè differens à Clusiana
& Lobeliana, quæ licet non vndique placeat,
placet tamen melius quàm nostra Fuchiana.

Idem apud Matth. *Scilla maior radice alba* C. B.
Squilla Brunfel. Trag. Matth. Fuch. & c. de quibus
antè. Itè *Scilla secunda Hispanica*. Clus. Hisp. Castor.
Lugd. *Scilla* Lonie. Cels. *Scilla* siue *Cepa marina*
Lob. *Scilla*. Dod. fol. Cur à C. B. tradantur hic duæ
Scillæ albæ nescimus, prior enim est rubra vul-
garis: etiam 2. hispanica Scilla. Nec placet
quod dicit Scillam suam secundam hispanicam
Clusii à Loniceo tradi, vbi nam id factum non-
dum nobis constat.

Scribit Matth. Scillam hispanicam veram ac-
rimoniam ac virium præstantiam communes no-
stras Scillas longè vincere, non demonstrans cuius
coloris, & quâ in re differat à vulgari ruffa,
quæ ei Pancratium, præterquam acrimoniam.

Amatus Scillæ meminit, vbi quid velit non
demonstrat: ex sequenti tamen capite apparet
cum per Scillam, intelligere hanc albam: quam
ipse fœminam putat, Ruellium reprehendens
quod maiculum appellat, in eo imitatur Matth.
Verùm non animaduertit Amatus Ruellium Plini-
um esse imitatum.

Lobel. Obs. p. 75. *Scilla* siue *Cepa marina* His-
panica. Adv. 57. Hisp. *Cebolla Albarrana* & *Cepa*
marina. Hæc ille, qui figuram Clusij habet. Ic.
Pl. p. 151. *Scilla* Hispanica.

Anguill. Scillæ Candide siue Cretæ & Cepha-
loniæ meminit, eamque veram & legitimam ex-
stimat, & ait Nicandrum & Diosc. ac Orisabium
laudare albam Scillam indicantes quo candidio-
rem

orem eò inimis acrem. Ego interea apud Dioscor. non inuenio candidam minùs acrem; nec propterea laudatam à quoquam: considerandum igitur an hæc Anguilla. Scilla diuersa sit ab Hispanica, alba, & an fortè Epimenidia Theophrasti & Plinii, & quantum differat à prædicta Scilla & in quibus: item an diuersa à Pancratio Monspelico.

Si duri fuerint veteri, ne concipiant, post adhibitum forum Scillæ [*scilla*] radicem longitudine sex digitorum, duorum crassitudine laxà conuolutam, Hippoc. subdit, tandiuque apponit, quoad os veteri molle & larum sit. Aut ipsam Scillâ sine radice tritam eodè modo laxà conuolutam apponit. Quibus modis, & vterum, si pituità laboreat, purgat, aperit, & aquâ ducit.

De Scillæ vitibus ita Dioscor. Scilla vim habet acrem & fetentem. Assata verò multam sui vsum exhibet. Farina (*scilla*) quidam vertunt pistorio opere) subacta, aut luteo oblinitur, & in clibanum mittitur, aut prunis obruitur, donec circumstita farina satis fuerit assata. Quâ ablata, si non flaccida facta est, altera farina aut luteo oblito, eadem faciemus. Quæ enim non sic assata est, interaneis maximè noxia exhibetur. Assatur etiam in olla opereculo recta, & in clibanum immissa. Sumitur ex ea quod maximè medium est, externis circumcirca ademptis. Coquitur item incisa, ita vt prima aqua diffundatur, & alia affundatur, donec aqua non amara aut acris fiat. Sed & concisa filo transmissa siccaur in umbra, ita vt frusta non se mutuo contingant. concisa itaque ad oleum & vinum & acetum scilicet utitur. Ad rimas pedum interna crude scillæ pars cum oleo serueta, aut cum resina liquata, imponitur. Commoris autem à vipera in cataplasmate cum aceto cocta. Ex assata verò contritis salis tostis partibus octo, ad vnam scillæ partem additis, exhibemus cochlearium vnũ, aut duo ieiunis, ad alium molliendam. Addimus & in potiones, & compositiones aromaticas: (*scilla*) quidam legunt *scilla*) & in quibus vrinam mouere volumus, & in hydropicis, stomachicis quibus cibi innatant, & in morbo regio, torminibus, diuturna tussi, anhelosis, sanguinem reicientibus, [*scilla*] Ruellius ore reicientibus: satis autem est pondus trium obolorum cum melle delinctum, coquitur etiam cum melle, & editur ad eadem concoctionem maximè adiuuans. Ducit autem strigmentosa. Cocta verò ad eadem facit, similiter accepta. Vitanda est eius exhibitio, in his quibus exulceratio quedam intrinsecus est. Assata eadem ad verrucas pensiles, & perniciosa illata facit. Semen eius tritum carica aut melle exceptum, & in cibo acceptum, alium mollit. Est etiam auxiliare contra veneficia medicamentum, tota præ foribus suspensa.

De iisdem Plinius [inquit Hist. Lugd.] confusè tractauit his verbis: Prodest & gingiuis, & dentibus, vel per se commanducata. Tineas & reliqua ventris animalia pellit ex aceto, & melle sumpta. Lingue quoque recens subiecta, præstat ne hydropici sitim sentiant. Coquitur plurimis modis: in olla quæ coniciatur in clibanum aut furnum, uel adipe aut luteo illita, aut frustatim in patinis. Et cruda siccaur, deinde concinditur, coquiturque in aceto, tum serpentium ictibus imponitur. Tosta quoque purgatur, & medium eius iterum in aqua coquitur. Vfus sic coctæ ad hydropicos. Ad vrinam eiciendam tribus o-

bolis cum melle & aceto potæ. Item ad spleneticos & stomachicos, si non sentiant vlcus, quibus iunaret cibus. Ad tormina, regio morbos, tussim veterem cum suspirio. Discutit & foetibus strumas quadrinis diebus soluta, furfures capitis, & vlcera manantia illita ex oleo cocta. Coquitur & in melle cibi gratia, maximè vt concoctionem facias. Sic & interiora purgat. Rimas pedum sanat in oleo cocta, mista resina. Semen eius lumborum dolori ex melle imponitur. *Hæc Plinius.* In quibus Marcellus, Vergilius & Corn. ettoris eum insimulant, quod dixerit adipe aut luteo illita, pro eo quod est apud Dioscor. *scilla*] *scilla*] id est, farina aqua subacta, quam *scilla* vocamus, aut luteo oblinitur: *scilla* enim & *scilla* hic non apicem, nec multis aliis locis apud medicos significat, sed *scilla* aut fermentum. Docet itaque Dioscor. & quomodo assata sit, & quomodo coquenda, & quomodo cruda concisa assicanda, omnia clarè & euidenter [inquit Cornarius.] Verùm ea confusè tradidit Plinius lib. 20. cap. 9. Coquitur, inquit pluribus modis in olla, quæ coniciatur in clibanum aut furnum, vel adipe aut luteo illita aut frustatim in patinis. Et cruda siccaur, deinde conciditur, coquiturque in aceto, tum serpentium ictibus imponitur. Tosta quoque purgatur, & medium eius iterum in aqua coquitur. Quod itaque tostū purgari dicit, & medium eius iterum in aqua coqui: hoc Dioscor. non vult, sed de assata siue tosta purgata, medium in usum allumi. Totam verò scillam item incisam coqui, permutata aqua donec amaritudo aut acrimonia in ipsa non percipiatur. Ibidem tradit Plin. vim quoque ac vsum medicum Scillæ: & habet id etiam quod Dioscor. ad sinem dixit, esse auxiliare contra veneficia medicamentum totam præ foribus suspensam, his verbis: Pythagoras Scillam in limine quoque ianue suspensam malorum medicamentorum introitum pellere dicit: quanquam idem quoque de Aphodelo lib. 21. cap. 17. prodiderit, velut embl. 154. Corn. meminit vbi etiam Theophrast. locum adduxit.

Quæ verò de aceto ex scilla parando exacuèdoque idem Plinius dicit, infra expendemus. Verùm hic addemus, *scilla* à Dioscor. & reliquis medicis Græcis dici, qui sanguinem ex infernis partibus sursum educunt, & per os reiciunt. Caterùm Dioscoridis modus preparandi scillam (ait Lobel. Obs. ignauia & inficitia Pharmacariorum exoleuit. De scilla sic differit Galen. lib. simpl. Admodum incidentem facultatem obtinet, non tamen admodum calidam. Sed secundum hoc quispian secundi ordinis censetur exalfacientium. Præstat autem aut assam aut elixam fumere: sic enim virium eius vehementia exoluit. Pauli testimonio scilla calefacit & siccat ordine secundo: Mesue autem calida tertio & sicca propè secundum. Dodon. autem tertio. Sed Matthioli sententiâ, vique adeò calida est & sicca, vt exulcerare possit.

Hoc autem annotandum cum Syllu, Veretes excepto Mesue, non meminisse, neque culti ex ligno Pini vel Cupressi, ad diuidendam Scillâ, nec acus lignæ, nec de medio eius abiiciendo, vt Neoterici faciunt. Quinimò Gal. ad Pisonè de Theriac. iubet fumere partes interiores Scillæ. De ratione extrahendi succi legatur Syllu. lib. 2. Pharmacopœia.

Si Scilla reponatur inter fructus arcet eorū putredinè. Aut minutim incisam & in vase vitreo melle pleno, per totam ætatem Soli expositam,

Plinius ubi

Temper. Galen.

deinde collatam, præsentaneum esse remedium epilepticis.

Pancratium ad eod. rusticis Hispanis exosum vt Clusium eius bulbos eruentem admoneret ne degustaret, præsentaneum enim esse venenum: Illi tamen aqua dum illa assatur extillante scabiem viliter illini & curari asserebant.

MEL SCILLITICVM.

Mel Scilliticum.

Quidam ætatis nostræ (verba sunt Marth.) Medici in cerebri, & nervorum frigidis affectibus Scillam crudam ab inuolutis repurgant minutim secant, & cum melle plurimo in vas vitreum coniciunt, in solantque per æstatem, ardente præsertim Sirio; demum percolato melle vntur ad comitales, & alias cerebri ægritudines, à frigiditate excitatas. Sed alia longè diuersa fuit Galeni ad hos vsus Scillæ paranda ratio. Quippe qui concissam Scillam nunquam melle commisitam exposuit in solandam, sed vt ab ea succum Sole colligatum in diebus canicularibus eximeret in fictile, vel vitreum, vas, in quo plurimam mel fuisset, dissectam Scillam immittit: deinde tantisper in solabat, donec Solaribus radiis ipsa liqueceret. Ex quo palam fit, quod plerique à Galeni instituto profus aberrant, vt qui Scilliticum mel conciant Scillæ liquoris vice.

Oxymel Scilliticum.

Tractaremus hic de Oxymelle Scillitico nisi maior esset historia, præterea iam incipit magis compositas vires nancisci, de eo Plin. l. 3. c. 2. Mesues lib. 3. de Antid. cum com. Sylui: vt & alii.

Vinum.

Vinum quoque ex Scilla fit hoc modo, concissam velut dixi Scillam in Sole siccato, deinde ex ipsa contusa, & angusto cribro excussa, minam vnam lineo raro illigato, & in multo boni ac recentis sextarios viginti mitto, & per menses tres macerari sinito. Postea vinum in aliud vas transfusum, diligenter coopertum reponito. Postest & humida Scilla in vsu assumi, Rapi modo concisa, & pondere duplicato. Debet autem per dies quadraginta in solari, & valdè inueterari. Sed etiam hoc modo prædictum paratur vinum. Scillæ dissectæ & purgatæ tres minas in Italicam metretam multo demitto, & senos menses in vase obstructo macerari sinito: post id tempus defæcatum & excolatum vinum reponito. Commodum est ad cruditates, & ciborum corruptiones, & eos qui hos reuomunt. Item quibus crassi in ventre aut stomacho hærent, lienosis, malo halitu præditis, hydropicis, morbo regio laborantibus, in difficultate vrinæ, tormina sentientibus, inflatis, resolutis, rigoribus diuturnis, vertiginosis, conuulsis. Ducit etiam menses, & nervos maximè lædit. Melius est quod verustius est. Vitæ tamen eius vsu oportet, tum in febribus, tum in his qui intus vlcus habent. Hæc Diosc. Hic subscribenda quæ Gal. tradit de vino Scillitico lib. 3. de paratu facilibus. Vinum fieri à Scillæ radice Plinius ita simpliciter lib. 14. c. 16. dicit. Sed quomodo fiat, & quem vsu de se exhibeat, neque eo loco, neque alibi vsquam, quod sanè ego (inquit Cornar.) sciam, tradit. Columella vero libri 12. c. 33. & vsu, & parandi modum sic tradit. Vinum Scillites ad concoquendum, & ad corpus reficiendum, itemque ad veterem tussim, & ad stomachum, hoc modo condire oportet. Primum ante dies quadraginta, quam vinum voles vindemiare, Scillam legito, camque secato quam tenuissimè, sicut ra-

phani radicem, talcolasque fectas suspende in vmbra, assiccantur. Deinde cum arida etunt, in multi amin. sextarios 48. Scillæ aridæ adde pondo libram, camque inesse patere diebus triginta. Postea eximito, & defæcatum vinum in amphoras binas adicio. Alii scribunt in multi sextarios 48. Scillæ aridæ pondo libram & quadratam adici oportere, quod & ipsum non improbo. Alii hoc ipsum Scillæ pondus, quod supra dixi, in multi duas vrnas adiciunt, & per 40. dies inesse patiuntur. Hæc quantum consona sint his quæ Diosc. prodidit, conferentibus diiudicare facile est. In vulgaris tamen exemplaribus Columellæ, ad finem legitur, in aceti duas vrnas adiciunt. Pro aceti autem voce, legendam esse vocem multi non dubium est. Sequitur enim aceti Scillitici præparatio mox c. 34. sequenti. Hic autem de vino Scillite parando agit.

Acetum Scilliticum hoc modo Dioscor. præparatur. Scillæ albæ purgatæ, concisæ, & filo tractatæ, vt frustra murò se non contingant, & in vmbra ad dies quadraginta siccatæ, minam vnam accipito, & in aceti boni sextarios 12. mitto, & in Sole ad dies sexaginta macerari sinito, vase diligenter operto. Postea exemptam ac expressam Scillam ipsam quidem abiecit, acetum verò excolatum vasis excipito, ac reponito. Quidam minam Scillæ vnam, ad aceti sextarios quinque amittunt. Alii mox purgatum citra reficcationem, eodem pondere iniiciunt, & per menses sex sinit. Et tale maiorem secandi vim acquirit. Idoneum est si colluatur, ad gingiuas humore flaccidas, constringens ac firmans ipsas, itemque dentes mobiles. Purredines quoque & graueolentias oris satis emendat. Idem absorptum guttur firmat, & callosum facit, & sonum validum ac clarum efficit. Allumitur etiam ad stomachicos, ægrè concoquentes, comitales, vertiginosos, melancholicos, & fatuos. Insuperque ad veri stranguationes, & coxendicum affectiones. Refocillat & valdè debiles, & corpus sanum ac benè coloratum facit. Vsum quoque acuit, & ad auditus grauitatem (vide postea Cornarii verba) instillari potest. Et in summa ad omnia efficax est, exceptis internis exulcerationibus, capitis doloribus, & nervorum affectionibus. Datur quotidie sordendum ieiunio, ab initio modicum, paulatim augendo vsque ad cyathum. Quidam tamen cyathos duos, aut etiam amplius exhibent.

Acetum Scillinum inquit Plinius l. 23. c. 2. inueteratum magis probatur, prodestque super ea quæ diximus, accitentibus cibis: guttatum enim discit pœnam eam: & his qui ieiunio vomunt. Callum enim faucium facit, ac stomachi, odorem oris tollit, gingiuas adstringit, dentes firmat, colorem meliorem præstat. Tarditate quoque aurium gargarizatione purgat, & tranlicum auditus aperit. Oculorum aciem obiter exacuit. Comitibus, melancholicis, vertiginosis, vularum strangulationibus, percussis aut præcipitatis, & ob id sanguine conglobato, neruis infirmis, renum vitis perquam vile. Cauendum exulceratis. Hæc Plin. post aceti tractationem, de aceto Scillino [inquit Cornar.] subiicit. Et in reliquis quidem à Diosc. non dissentit, sed quod neruis infirmis perquam vile esse dicit, in hoc & Dioscor. & sibi ipsi contradicit. Diosc. enim dum ad omnia efficax esse ait, internas exulcerationes, capitis dolores, & nervorum affectiones excipit.

Ipse

Ipsæ verò Plinius paulò antea de aceto agens, Vesicæ & neruorum infirmitatibus ipsam nocere dicit. In hoc itaque dissensio est, haud scio quâ occasione inducta.

Eius verò parandi hunc tradit modum. Scilla quæ candidissima fuerit, inquit, vtilissima erit. Huic aridis tunicis direptis, quod reliquum vivo est confutum suspenditur lino modicis intervallis. Postea arida frusta in cadum aceti, quamasperini pendentia immerguntur, ita ne illa parte vas contingant. Hoc fit antè solstitium hebibus 48. gypso deinde oblitus cadus ponitur sub tegulis, totius diei Solem accipientibus. Post eum numerum dierum tollitur vas, Scilla eximitur, acetum transfunditur. Hoc clariorem oculorum aciem facit. Salutare est stomachi, laterumque doloribus parum sumptum binis diebus. Sed tanta vis est, vt auidius haustum extrinsecus anime momento aliquo speciem præbeat.

Aqua ex aceto Scillitico distillata est gratior & efficacior [Oxymellicis] vnguitu etiam valenter purgat humores in ventriculo crassos lentos, vntres, dando ad scilicet cum mellis aut sacchari rubri vncis tribus.

De Aqua Scillæ ita differit Matthioli. Squillæ recentiores detracto cortice exteriori, cultro incisæ vasi infernè foraminulento, & supra operculo intèrque munito imponuntur. Huius ollæ fundus immittitur in alteram ollam subiectam in scobe terræ, & luto commissura circumdatur. Tum ignis excitatur circa superiorem ollam per noctem vnam, horas decem aut amplius. Sic aqua defluit in ollam inferiorem, quæ cum farina vel pane mixta, gustata mures citò necat: citiusque si ithargyri paucum miscueris. Scilla in aqua macerata & à muribus pota eos interficit. De ethiopsicæ scillæ Androm. ad Theriacam hæc leguntur.

Inde capillatam Scillam cum cortice sumptam,

Pulve linas, medio conficiturque fico.

Ac cineris rutuli cumulos superingere donec reddatur scilla mollis igne capiti.

Signa dabit, seruet pastos cum discunt ignes:

Excute, & vt laues demperis exuvias,

Tres Scilla partes, Erui compone duabus

Distillatque crepet concava pila diu.

Ac minimas tandem confusa premantur in orbem

Quos procul à radiis mitior umbra tegat.

De pastillo scillitico & de præparatione Scillæ ad pastillum potest legi Fuchii. de comp. med. lib. 2.

Hic autem ponemus rationem conficiendorum pastillorum Scylliticorum ex Galeno, quæ eadem est cum Andromachi præparatione: Verba autè Galeni hæc sunt l. 1. de Antid. cap. 9. Principio Scillam succulentam de terra euellens, cuius folia penitus iam & scapus auerint. Huic deinde cortice detracto duriorum partem induces ex tritico nouo, quantumque fieri potest exquisito confectam, ipsæ postea multo calidiorque cineri subiectam non prius extrahas, quoadque circumposita pulicula crusta planè fiat. Quod si vbi hæc agis furnus aliquis addit, vna cum pane Scillam illuc inferre potes, inde cum obducta plus iam exaruit, ipsam extrahes, & conteres. Satis assam verò Scillam intelliges, si festucam immixtam admiseris, Scilla namque cum bene tosta est, furculos facillè excipit. Vbi verò scillam diligenter attriueris, candidam Erui farinam admisce: nam quæ candida non est, amara supra modum esse conficitur. Cognitum autem vnicui-

que existimo prius oportere tenui cribro farinam excutere, ac præterea diligenter eam læuigare. Scilla verò scilicet pondere farinam superet opus est. Dico autem scilicet pondere, vt si duas farinæ fumas scillæ tres accipias. Quam rem cum & Andromachus iunior siserat, nescio quâ ratione ductus velit Erui farinæ drach. octoginta esse, scillæ verò centum viginti, cum satis sit dicere, scillam eruum scilicet pondere superet. Postremò verò simulatque rotulas tenues ex hac mistura conformaueris, in cella, sicuti paulò antè dicebamus, ad meridiem vergente repones, quas tamen non in solis radiis collocabis. Verùm sicut de pastillis Vipere dictum est, ita in his quoque cetera perage. Hæc Galenus.

De Scilla venenata & remediis.

In Scyllarum genere quedam suapte natura venenosa prouenit, quæ sua malefica vi, etiam quam paratè deuoretur, illicò tamen hominem torquet, quemadmodum Fungi, qui in lethali genere habentur. Venenosa igitur scilla [ut Mefues tradidit] sola, nec alteri annexa, prouenit, locisque oboritur fœdis, ac grauculentibus, vt apud Thermas. Quapropter de hac differens Auic. inter venenatas plantas fen. 7. 4. volum. sic inquit: scillæ male vsus ventriculum exulcerat, & intestina; ipsâque Mefaricas venas, aliisque meatus, qui è ventriculo in iecur permeant: Quo fit vt in visceribus orientur punctiones, acutique cruciatus, & inde dysenteria. Quibus incommodis succurritur lactis potu, in quo ferrum, quod Græci stomoma, nos verò chalybem appellamus, pluries restinctum fuerit, deuoratisque ouorum vitellis, in aceto decoctis. Quin etiam iis frixa cibaria conferunt; pingua carnum iura, recens, etradumque butyrum, & extrema iuuenum quadrupedum membra, aliisque permulta.

BVLBVS ERIOPHORVS.



Smulta, oblonga filia, Descriptio
Hyacinthinis ferè similia,
minùs carnosâ, & succulenta,
duriora tamen, viridia,
micro-nata, sapore ingrato,
quibus minutissimè etiam
confractis, tenuia quedam
sila instar tela aranearum
diduci possunt. Ex horum
medio canalis exit cu-

bitalis aut amplior, rectus, scillini caulis amulus, lauis, nudus, virefcens, superiori verò parte ad cæruleum colorem tendens: in summo veluti oblongam ac densam fert spicam in denos vel plures versus, antequam explicetur, distinctam, primùm viridem, sed paulatim (dum sese explicat in flores) cæruleum colorem contrahentem: flores senis foliis steliatum expansis consistant, triangulo vmbone in medio protuberante,

Hyacinthi autumnalis floribus promemodū similes, inodori, colore cum suis pediculis caruleo & internis staminibus, quorum apices inriō purpurei sunt, & ubi sese explicarunt, veluti pallefcente quadam farina asperiti. Incipit flores ab imo, vti Scilla solet, & reliqui magna ex parte bulbi, qui flores racemi aut spicæ in modum confertos habent. Semen etiam obseruare volumus: sed flores admodum caduci, statim marcescere cœperunt, & relictis in caule tantum pediculis deciderunt. Radix crassa & bulbosa est, ex plurimis tunicis contexta, alba, tomentosa, & veluti aranearum telis obsita, multos circa latera natos bulbos habens, & crassis oblongisque fibris nitens.

Hæc est Clusii descriptio quam integram ex eo ponimus: potuissimus quidem describere, vt qui diu coluerimus & obseruauerimus veluti siliā aranearum, quam franguntur folia, sed nobis flores non protulit. Liberum per nos esto cuiuslibet iudicium asserendi an planta quæ exhibetur sit Bulbus Eriophorus Theoph. scribentis lib. 7. Hist. pl. c. 13. conitare Bulborum plura esse genera, sed maximam, peculiaremque præcipuè differentiam lanigerarum herbarum. Esse enim tale quoddam genus, in littoribus nascens, cuius inter summum corticem, eamque partem, quæ edulis est, lana sit, ex qua mappalia, vestesque quedam conficiantur. Sed huius bulbi, Theoph. neque regionem in qua id fiat, neque quicquam diligentius, præterquam Eriophoron id appellatum, in exemplaribus, quæ quidem Plinius inuenerit, tradit.

Bulbus potè hic Mucari maioris nomine Constantinopoli Clusio allatus fuit. *species Laniferi* nomen ipsi indidit, ob tomenti copiam, quod lanæ modo in stamina diduci potest.

Dodon. in fol. depingit, sub titulo *Bulbi Eriophori Vienna nati*. Lobel. Obs. figuram Clusii habet, ac dicit eum veram Bulbi Eriophori Theoph. effigiem exhibuisse. I. Gerar. *Bulbus Eriophorus wolly Jacut*. *Bulbus bumbeyicus commentarius*. falsè beum basie Jacut. C. Banch. Phyt. *Bulbus Eriophorus* Theoph. id est, *laniferus*.

Bulbum Eriophorum primum vidi auno 1578. allatum ex S. Lupo Burgundie, Plantatum in horto H. E. C. Montbelgardi, quum latuisset ætate & existimare putrefactum, Autumnno produxit folia: tandem multiplicatus, verum multis annis florem non produxit, qui sanè mihi nondum visus: D. Martinus Chmielecius Prof. Basil. Basilee in horto suo colit, ac in horto H. C. Wirt. plantandum dedit 1599 quum petiisset mihi. Constantinopoli rediens artali Philibertus de Bruxella, qui nonnullos Clusio dedit, quorum partim ipse, partim C. V. Ioann. Aicholtzius Medicus & professor Viennensis aliquot terræ concedidit. Clusio omnes perierunt, ille verò duos conseruauit, quorum alter etiam floruit non sine ingenti eorum lætitiâ. Generoso D. Longatre Iunio anni 1583. flores dedit.

Flores mihi proferebat insequente Aprili, quia videlicet, in sicili per hyemem adseruata: altera minor, quam horto credebam, & etotius hyemis inclementiam in illo bellè perseferat, dumtaxat Maio, quemadmodum & illa prior, quæ etiam in horto reposita, altero anno florebat. Ceterum hanc plantam cum Narcissi speciebus quarum icones Matth. exhibuit suis in Diosc. com. historiam verò non dedit, diligenter conferens, non absimilem reperio eius Narcisso 4. qualis saltem

saltem extat in Comh. anno 1570. Venetiis editis.

Matth. Lat. & Ital. cum mag. fig. Narcissus 4. qui figuram habet cum solo titulo: non demoustrans vnde acceperit iconem.

ORNITHOGALVM CÆRVLEVM
pallens, & ornithogalum Hispanicum minus.



Ornithogalis qualibet sui parte valde cognatum [teste Lob. obs.] & affine, sed flos cæruleus, Hyacintho Autumnali penè par & similis. Ex Turnarèsi vrbe primùm D. Brancioni munere missum. Idè cum hoc fortè fuerit Ornithogalum Hispanicum minus siue sextū, quod sautore Clusio hist. post. Jex paruo orbiculari albi-

cante bulbo sena aut septena, nono vete profert siliā Ornithogalo vulgati ferè similia, sed paulò angustiora, nulla vena cænicante per longitudinem secta, è quorum medio prodit singularis cauliculus, interdum & alter, palmatis, teres, sustinens fenos, septenos, aut plures *stipulos*, alternatim quidem nascentes, sed quasi vmbellam quandam efformantes, adè aequali sunt altitudine, non fecus atque in vulgari & Arabico, fenis foliolis ex albo subcæruleo umbilicum occupantibus: nulla adhuc capitula vel semen obseruare Clus. potuit: totà coma breui à floribus marcescente. Cômunicabat Clusio Generof. D. de Longatre *Hyacinthi stellaris ferotini albo flore* in inscriptione, qui ex Hispania missum dicebat. Floret Aprili.

Lana miferens.

Locus & icon pus.

BVLBVS MONOPHYLLOS FLORE
albo, an *Ex Longatre* Theoph.



Valdè rara est hæc planta (autore Clusio Exot. cuius certè flos ipsi ante annum 1605. non cõspectus. Eam autem redemerat cū aliis biennio antè à Gallo thizotomo Nicolo le Quil, Lutetie Parisiorum com-morante, qui in Lusitania erutam asserbat. Vnico autem

autē ē terra profūbat *foliis* tenni primū & profūsis iunco, quod tandem pedalem adquirebat longitūdinem: duabus autem supra terram vicibus paulō maiorem adquirebat latitudinem, & canaliculātū fiebat, extrēmā tamen parte manente iuncēa: vbi verō latiorē adquirere incipiebat latitudinem, ex eius medio exiliebāt triuncialis longitūdinis *cauliculus*, tenuis, laevis, diluvis virens, in cuius fastigio alternatim siti erant tres *flores* non valdē magni [vt ex icōne obseruati potest, in qua voluit florum magnitudinem expressā] qui sex foliis cādidissimis erāt prāditī, non multū abfīmiles floribus Graminis Parnassī Herbariorum, siue Hepaticæ albæ Cordī, sed nullo caliculo, vt illi, inclusi: ē quorum medio prodibant sex alba *stamina* flauis *apicibus* prāditā, & vmbilicū occupabat *capitellum* triangulare, sumo fastigio sustinens exilem *stilum* album, flaminum longitudinem non excedentem. Oloratus autem erat iste flos, & spinæ appendicis florum odorem amulabatur. Eius *bulbus* orbicularis erat formæ, nec Auellanae nucis magnitudinem excedebat, fuscā membranā tectus, sedēque illis multis tenuibus candidis fibris obfītā. Bina folia, totidēque cauliculos habuit, vt in tabella ad plantæ nouam expressā videre licet: flores autem aperiebantur medio Iunio: quale *semen* prolatura fuisset, nihil pronunciare possum, quandoquidem plantam ē terra eximere coactus fui, vt pictori exprīmandam traderet: & tamen si bulbus postea terræ denud fuerit commissus, caulis tamen cum flore hūc emarcat.

Quo nomine appellare debeat hanc plantam dubitat, nisi quis fortē *Bulbus* esse censcat, cuius Theophrast. lib. 7. Hist. Plant. cap. 13. meminir: sed quū eam non describat, & dumtaxat reponat inter plantas quæ bulbosa radice constāt, difficile est certi quidpiam statuere. Siue autem *Bulbus*, siue *Bulbōs* *μαύροβόλον* quis appellare malit, per Clusium semper licebit.

BVLBUS SYLVESTRIS FVCHSII FLORE
luteo, siue Ornithogalum luteum.



VERIS minus Ornithogalum luteum radice est bulbosa, Ornithogali albi bulbum æquante, alba, prætenuis filamentis fibrata, gustu viscoso & subdulci non amaro, & astingente, vt anotāt Fuchf. & Dodon. ē radice statim *folium* emergit porraceū, semunciam ferē latum,

dodrantalis circiter longitudinis, in terram caductum, coloris glauci, in teretem mucronem desinens, glabrum, superius laeue, inferius costis plantagineis donatum, modō vnum, modō duo

aut tria, plura interdum folia sunt, pinguiscula, angusta, triquetra: comitatur ipsa ē bulbo quoque orris *caulis* singularis, angulosus, foliis breuior, subrubens, cætera nudus, alioqui fescūciā ferē infra summum cacumen folio præditum vnico aut altero sextantali, vel palmari, nonnūquam glabro, aliās subhirsuto, oris paulūm intrō flexis, vt carinam imitetur: ē cuius sinu reliquus caulis pergens, aliās indiuisus, *stamen* gerit vnum, aliās subdividitur pluresque ad nouem vsque flores sustinet, vnicuique diuisioni folio apposito. Flores singuli ex longiusculis pediculis Ornithogalo similibus, senis constant foliis oblongis, foris viridantibus, hirsutis oris luteis, intus penitus flauis, medium occupantibus totidem *staminibus* cum *apicibus* luteis: meditrillium oblidet, etiam nondum delapso flore subnascens *capitulum* triquetrum, *seminis* conceptaculum, cuius ex vmbilico *stilus* exir in apicem forcum desinēs, Suspicamur à Cordo in sua historia Silyri inchiū dici, cuius radices sunt foris interdum luteæ, intus verō candidæ, dulces, & Hordeum Pilūmque aqua maceratum sapore imitant.

Trag. *Bulbus agrestis*, *Cepa stellata* genus, Nonnullorum Germanorum Zieferzwibel/ feldzwibel/ & mildtzwibel/ hoc est, teste Clusio, *Cepa syluestris*. Quia verō nos de ea nihil apud Veteres Herbarios legimus, vocabimus interea Bulbum agrestem Fuchf. cui siuuliter bulbus silu. dicitur, ac qui describit & depingit, adaptans sibi Discor. Plini & Galeni verba.

Apud Amarum Lugduni impressum posita icon huius bulbi, cuius mentionem non facit, quod animaduertam. Gesner. hort. *Bulbus bifidus* scilicet lateris. Nondum cerdē cogitatum (Dodon. Gall.) quomodo hic bulbus Veteribus dictus sit, quidam Bulbinam putant: aliis est non *Bulbus* id est, bulbus esculentus: ille nobis nominatur *Bulbus syluestris*. Belg. Veltayen. Gall. *Oignon saunage*: hac Dodon. qui depingit & describit.

Lobel. Obs. & Ic. Pl. pag. 149. *Ornithogalum luteum* Adu. pag. 56. Gerin. Geel feltzwibel & Zieferzwibel/ *Bulbus syluestris* Fuchf. & Tragi. *Silyrinchion* Cordi. *Bulbus esculentus* Lacuna. *Ornithogalum* 8. Clusii hist. pag. 1. Vngari *Tekano* vocant, quod quidam *modicum* Perdicium Theophr. esse censent, qui forsan lib. 1. cap. 3. scribit plures illi radices esse quā folia: adiecit tamen crassas habere radices, quæ sanē nota hūc non conuenit.

Casp. Bauhin. Phyt. *Ornithogalum* 5. siue *luteum*, *Bulbina* quibusdam, aliis *Bulbus esculentus*, aliis *vomitarius*, nonnullis *Perdicium* Theophr. hist. 1. quibusdam *Bulbus marialis*.

Histor. Lugd. pag. 1502. *Bulbus syluestris* Fuchf. & Dodon. Sunt qui Bulbinam vocent, alii *Cordis* id est, *Bulbus esculentum*, nominant, quorum sententia peritis Herbariis haud placet. Ruellio, *Bulbus silu.* non desunt qui *Bulbini vomitorii* esse credant. Item Ornithogalum luteum Lob. siue bulbus silu. Dodon. Insignis ignorantia Compilatoris hist. qui duas habet figuras & historias vnius plantæ diuersis locis.

Tabern. icon & hist. *Ornithogalum luteum* siue *Geelfeldzwibel*. Melius nobis placet figura quā exhibemus, quæ iam ex Fuchfio parata erat quam noua Tabern.

Gerard. *Cepa agraria* Star wilde of Bethleh. *Bulbine*.

Basilicae provenit circa Wild & Gundeldingen: Fr. Casp. Bauhinus collectum in Rhætia

Silyrinchion:

Cepa Srel. lutea. Syluestris.

Perdicium:

Hist. Lugd. Comp. nov.

Cepa agraria. Bulbine. Locus & tempus

circa Curiam attulit: mensis Martii sine deflorescentem obseruauit in horto Io. Heitzman pharmac. Bas. circa Lugdunum florentem Februario & Aprili, Montbelgardi etiam prouenit mihi in horto Il. E. C. manere prædicti Pharm. florens Martio. Clus. In Alpium pratis ubi siluæ defluere incipiunt. Lob. Non ita frequens Italia, Norbonæque calidioribus visitur. In Aruernis & ad Lugduni pomeria. Silytrinchion primo Vere folia emittit, nec proximo, sed altero anno, caules floresque producit. Nascitur arenosis, iisque aliquantulum humentibus aruis. Qui verò in pingui planoque solo, sub arboribus nascitur (inquit Cornar.) quò fluuiorum inundationes perueniunt, maior quidem est, sapore & viribus ignatior, Vbi que ad agrorum & siluarum exduarum margines in Germania frequens, sed etiam apud Vngaros circa sepes & agrorum margines natum vidit Clusius.

Trago siluestris hæc Cæpa in cibo non vsutur. At in Medicina non contemendi est vsus. Siquidem radix [vt idem Trag. restatur] in calido cinere torrefacta, ac cum melle tusa, inque linteo imposita, vlcera depascuntia, & manantia sanandi, durosque tumores emolliendi vim habet. C. Bauh. Bulbum maiale contulum, infantibus lactantibus consulsione laborantibus in lacte exhibent. Hist. Lugd. Dictum autem est, *Pedicularium*, quòd perdicæ ad id se volunt terramque suffodiant. Non desunt qui vomitorium bulbum esse credant, quòd vsue ompertum sit radicis decoctum vomitiones eiecit, & aluum valenter ducere, non dissentiente Diosc. delineatione, scribentis, Bulbum vomitorium folia habere loti modo, latiora quàm Bulbus esculentus: radicem similem bulbo, cortice nigro. Quæ si per se edatur, vel decoctum eius bibatur, vesicæ malis medetur & vomitiones mouet.

ORNITHOGALVM PALLIDO FLORE.

Descriptio

Est hoc Clusio. Hist. poster. Ornithogalum 7. non valdè ab simile Bulbo silu. Fuchii, maiori tamen folio constat, cauleque crassiore, licet infirmo: binique aut terni, quos sustinet *stipes*, maiores, minus flauis, sed ex herbaceo, quod in modò pallidi. Obseruabat in Striacarum & Austriacarum Alpiu pratis, ubi siluæ defluere solent.



An Tabern. icon. ornithogalum maius Erdnussfeldt zwibel. Icon Tabern. videtur respondere Ornithogalo Clusii modò dicto, verum ineptè ponitur pro vero Ornithogalo, cuius eo capite tradit descriptionè. Gerard. Ornithogalum luteum, yelloc.

star of Bethlehen.

Ornithogalum minus è Pyrenæis.

Binos à Venerio exiguos bulbos in Pyrenæis erutos accipiebat Clusius histor. post. in append. de Hyacinthi stellati albicanibus floribus appellatione insignitos, quorum flores, quum anno 1600. conspiceret, non Hyacinthi, sed Ornithogali parui esse deprehendebat: etenim & similia tolia, & flores non dissimiles Ornithogali minoris sexto loco descripti (Ornith. cærulei palentis) c. 7. l. 2. plant. Hist. foliis & floribus habuerunt: in eo duntaxat differre ipsi videbatur, quòd istius flores paulò maiores apparent, sex etiam foliis constantes, vt illius, quorum singula neruo foris, seu vena subcæruleâ secundum longitudinem per medium essent distincta, & sex itaminulorum apices, in hoc furui, qui in illo violacei. Florebat Maio.

ORNITHOGALVM LVTEVM minus.

V Nito prodit foliolo, duas aut tres vncias longo, angusto, exalbidi coloris & acidi gustus: iuxta quod tenuis vncialis *cauliculus*, vnum aut alterum foliolum sustinens, è quorum medio bi-



ni aut terni exiliu *stipes* stellati, intus flauis, foris ex viridi purpurescentes, sex radiolis & totidem itaminibus intus præditi: iis succedunt pusilla triangulara *capitula*, semine ruffo, exili & inequali plena, radice alba, rotunda, cineraceo putamine obducta, exigui Pisi magnitudine. Sed & hoc cultura ali-

quantulum maius euadit.

Clus. Pann. Ornithogalum Panmonicum luteos. Et hist. Ornithogalum 10. C. Bauh. Phyt. Ornithogalum 6. siue luteum minus. Lob. Obs. Ornithogali species multò minor filis longè exilioribus & angustioribus: in vridatis nostris prouenit.

Aprico magis delectari videtur, abundantiusque crescit in aperis Meridici oppositis.

Ornithogalum flauum cum staminibus rubris.

Ornithogalum flauum Alemariannus, circa Alemariam holandæ urbem repertum, mihi non conspectum, inquit Clusius hist. post. sed N. V. Io. ab Hoglande de eo me monuit. Binos duntaxat id præditum est foliis, angustis, longis. Hyacinthi botryodis vulgaris cæruleo flore foliis valdè similibus: cauliculo inter illa prodeunt insident flores flauis, duplò maiores, staminibus in medio rubentibus: ejus bulbosâ adix aded vulgari

vulgari iam dicto similis, vt si miscantur vtriusque bulbi dignosci non possunt. Pro Nono haberi poterit.

ASPHODELVS MAIOR FLORE ALBO, ramulosus & non ramulosus.

Complures circumquaque ex vno radice capite Paeonia modo propagantur radice, otiarib. tuberibus intercepta gustu Montpellier, vt verum fateamur, dulcibus, nullaque nobis lingua acrimonia vellicantibus: folia carinata: Lobelio Cyperi, Oenanthes, aut Porri familia, triquetra, vidualantia, cubitum ferè longitudine aequant, statim exorta: inter quae surgit caulis singularis, rotundus, laevis, duos aut tres cubitos altus, robustus, à cuius medio ad summum vsque fastigium numeroi conspiciantur flores stellati, Ornithogali maiores, foliis albis striâ rubrà notatis conitantes, apicibus luteis: quibus decidèntibus capitula succedunt Ceratis paria, semen continentia copiosum, triquetrum, fuscum.

Sic nos descripsimus Asphodelum cum studiis incubere minus Montpellier ante 40. annos: icon nostra est ex iis quas emimus: quum autem Clusius suum aliter nonihil describat sapore diuersu, & duos proponat, nos tota ex eo hic ponimus historiam que eiusmodi est. Asphodelus primus multa habet filia oblonga, angusta, triangulari, & veluti carinata, fungosa & lenta, mucronata: caulem rotundum leuem, bicubitalem interdum, in ramulos superne fissu, quem à medio ferè sursum vergendo exoriant multi stellati sex foliorum flores, coloris intus

albi, foris uerò nemo purpurascete singula folia secundum longitudinem quasi distinguente, [vt Ornithogali hos virefcente linea distinctus est,] rotidem quot foliola staminibus medium

occupantibus: semen durum, lignosum, rugosum, artum, & figura triquetra, capitulo orbiculari ferè, sed tribus eminentioribus costis praedito, & ex viridi purpurascete continetur, quod illo per maturitatem dehiscente, cadit: floret per partes vt verè dicit Theophrast. & incipit ab imis. Radices ab vno capite numerose exeunt, oblongae, exiguis napsi similes, sed inferiore sede crassiores, atque in fibras desinentes, succi plena, candicantes, ingrati & acris gustus. Istius radices videre memini dum Olyppone Hispalim proficisceretur, aratro erutas, quae ducentos aut plures ab eodem capite pendentes, eosque crassos ad nodu, napsos haberent, vt quinquaginta aut amplius libras totam plantam pendisse putem. Itaque nihil mirum, si Plinius octoginta simul aceruatis saepe bulbis referat. Alter huic omnino similis, exceptis caule, qui vnicus est, neque surculosus, & flore qui omnino albus: illius etiam radix non adeo numerosa.

Piacet in tota Asphodelorum varietate priusquam ad certas species descendamus veterem de iisdem doctrinam more nostro proponere. Infit autem Theophrast. lib. 7. Hist. stirp. in p. de asphodelo. Id est, Asphodelum longum & angustum, & aliquantulum viscosum folium habet. Et paulo inferius: Caulem verò habet Asphodelus maximus omnium. Anthericus enim maximus est. Et paulo post: Est etiam multi feminis Asphodelus, & semen ipsius lignosum est, forma triangulari, figura nigra. Gignitur hoc in rotundo quodam, quod sub flore est, excidens astate vbi id dehiscit. Arescit particulatim, quemadmodum etiam in Scilla contingit, & primum ab inferioribus partibus. At in antherico nascitur vermis, qui in aliud animal volatile floridum transmutatur. Demde cum anthericus exaruerit, ipso eroso euolat. Videtur autem hoc peculiare habere inter reliqua leui caule praedica, quod cum angustus sit, propagines superne habet.

Asphodeli mentionem teste Plin. & Homerus fecit. Radix eius napsi modicis similis est, neque alia numerosior, octoginta simul aceruatis saepe bulbis.

Theophrast. vt ferè Graeci, principisque Pythagoras, caulem eius cubitalem, & saepe duum cubitorum, foliis Porri syluestris, anthericum vocauerunt, radicem verò, id est bulbos, Asphodelon. Noliti illud Albucum vocant, & Asphodelum hastulam regiam, caulis acinosi: ac duo genera faciunt, albucum est scapus cubitalis, amplus, paruum, laevis.

Galenus secundo De alim. radicem Asphodeli Scilla radici similem esse dicit, & magnitudine, & figura, & amaritudine: quae tamen si velut lupini prepararetur, plurimum amaritudinis deponit, & hoc modo Scilla praestat.

Sed de hoc ita differit Dioscor. Asphodelus [quem alii in eius (partis) Anthericum, Romani Albucum vocant,] planta plurimis nota est, folia habens Porro magno similia, caulem leuem, qui in summo flore habet Anthericum appellatum. Radices subsunt oblongae, rotundae, glandibus similes, sapore acres, & facultate calfacientes, Dioscor. plurimis notam esse plantam Asphodelum dicit: & hodie plurimis nota est, qui ipsam in Italia viderunt, vbi plurima etiam in hortorum cultu nascitur.

Verum in Germania pauci (inquit Comar.) aut nulli veram Asphodelum viderunt. Nam ea



Folium.

Anthericum Semen

Scilla modo floret.

Porri silv. folia

Radix Cal. Scilla similis.

radix quam officinis Aphodelum corruptè vocant, bulbosa quidem est, sed ex breui ac humili herba colligitur, quum Aphodelus caulem maximum habeat, vt inde Haftula regia [quod Sylu. inquit] nomen inuenerit. Itaque vt res ignota, nullum apud nostros Aphodelus habet, ita tamen vera Aphodelus est, quæ Aphodilus Officinis dicitur, velut à multis affirmatur, nostri ipsam Goldwurz vocant.

Verum Aphodelum primum [vt interpretes Kiherus apud Trag. monet] monstrauit is Herbarius, qui Latinus ex offic. Egenolphi in lucem prodiit. Vidit aliquando Matth. eius aliquam radicem bulbis ultra centum radici coherentibus.

Matth. not. Idem in hist. Germ. Aphodelus albus siue mas: olim non describat: in Ital. cum magn. sig. describitur quidem, sed colorem floris non annotat.

Albucum, seu veram Aphodelum semel duntaxat in Anglia vidit Turnerus. Nam quod vulgus illic appellat Affodil, vel Saffodil, species est Narcissi. Sæpius vidit in Italia, & nonnullis hortis Antuerpiæ. Idem verò etiam in Anglia in horto suo colit.

Aphodili duas species tradit Anguill. vnam in seopulis maritimis & arenosis locis nascentem, caule surculoso. Alteram caule simplici: vtramque autem speciem notissimam.

Aphodili a generis. Maran. inquit Diosc. describit Aphodili vni genus: nos tria alia reperimus: flore & radicibus valdè similia, licet folia multò minora habeant.

Gefner. horti Aphodelus Albus, Aphodelus maior & propriè Diosc. raris.

Dodon. Gall. hist. Aphodelus mas, cuius flos Græcis dicitur *ἄφωδός*, & secundum Plinium Latine *Albucum*. Ait portò in hist. lat. flor. & in fol. & ex eo hist. Lugd. Aphodili albi, flores esse colore candidos, aut ex valdè diluto rubro modicè purpurascetes, radices cum amaritudine leni, sapore astringente.

Meminit huius Aphodili Hesiodus in operibus & diebus, vbi stultos ait ignorare, quàm magnum bonum sit in Malua & Aphodilo. Nam huius præcipuè Aphodili radices edules sunt. Galenus tamen non de hoc Aphodilo, sed de bulboso eum scripsisse opinatur: eius tamen bulbos non nisi pluribus elixationibus esculentos reddi ipsemet testetur: quales non est verisimile Hesiodum commendasse, qui cibum aliquem paratu facilem insinuasle videtur.

Plinius Aphodelum [inquit Clus.] aliquibus Heroion appellari tradit, & Dionysio matè & feminam esse. Hispani priorem *Gamonis* vocant.

Tab. *not.* Lob. Obs. Aphodelus maior albus: Aduersp. 45. Hisp. *Gamonis* & *Gamonites*. Aphodelus maior albus. Aphodelus flore suaue rubente. Item Tom. 2. Aphodelus ramosus.

Tabern. hist. & icon. *weiß Affodilwurz*. Aphodelus 1. albus. Item Rott Affodilen, Aphodelus 6. rubens, cuius folia punctis notata.

Gerard. Aphodelus ramosus, *white Affodil*. Aphodelus ramosus, *Brauched Affodil*. Aphodelus flore rubente. *Rod Affodil*. Duæ priores icones apud Tabern. sub titulis transpositæ sunt.

C. Bauh. P. 17. Aphodelus 1. siue albus ramosus mas, Clusio maior, Lobelio ramosus. Aphodelus 2. siue albus alter, Matth. Aphodelus, Lob. albus maior. Aphodelus 3. siue autumnalis. Cam. autumnalis siue maior. Dodon. flore incarnato,

Lob. suaue rubente. Aphodelus 4. siue flore purpurascete foliis maculis aspersis. Idem apud Matth. aphodelus non ramosus, haftula regia Matth.

Græcis *ἄφωδός*, Lat. *Aphodelus*, & *haftula regia*, quòd dum floret profusus sceptri regii effigiem referat, & *Albucum*, siue *Albucum* vocatur, Officinis corrupta voce *Afrodilus*, Arab. *Cheunechunte*, *Birnach*, *Abg*, seu *Axeras*. Germ. *Goldwurz*, *weiß Affodil blum*/Brab. *Affodilen*/Gall. *Hache royale*, ou *Affodil*. It. *Affodili*, *Amphodila*. An. *Affodil*, *daffodil*.

Floret in melle autore Dioscor. inter spuria. Oportet autem albam Aphodelum secare circa æquinoctium vernum, aut equam semen augetur. Arida Narbona litora Aphodili communis feracissima sunt, vt scribit Lobel. nec minùs montes à mari distiti. Sponte sua nascitur vterque, teste Clusio editoribus, saxosisque Lusitania, Hispania, Gallia quòq; Aquitanica & Narbonensis, locis. Apud Belgas non nisi factus prouenit, vt neque in Germania. Floret vterque illic Martio & Aprili: in hortis Maio, & etiam Iunio. Prouenit ad vnum miliare à Monspelio, quà itur Frontignan in colle saxoso, vidi præterea inter Aquas mortuas & Arelaten copiosissimè, in silua quæ dicitur *la Vignede*. In Italia in hortis colunt. Cortulius in suo & in horto Parauino. Bononiæ florentem Aprili in horto Nobilis di Gozauinis, vidi. Genue in horto D. Coladonis Iurifconsulti, factus in meo horto primùm sequenti anno produxit folium vnicum, rectum, triangulum. Montbelgardi habemus in horto Ill. E. C. Witt. de latum Monspelio, vbi hyemem ferre non potest nisi reponatur: Nos curauimus etiam Sturgardiam in horum Ill. E. C. deferendum. Basileæ habuimus in horto Parentis Bauhini Medici, vbi etiam alii plures. Florentiæ obseruauimus in hortis, & Parma florens Aprilis in horto Nobilis Antonii Lalate.


Aphodili radices (ex Diosc. autoritate) potæ, vrinam & menses mouent. Sanant etiam lateris dolores, & tussis, conuulsæ, ruptaque drachmæ pondere ex vino potæ. Facit & ad vomitum magis idoneos radix tali magnitudine in cibo accepta. Datur & commotis à serpentibus vitilicetrium drachmarum pondere. Integere autem oportet uorsus, & radice, & floribus cum vino. Sordida item & depascencia vlcera, & manmarum & testium inflammationes cum polenta. At succus radice addito vino veteri dulci, & myrrha, & croco, ita vt hæc simul coquantur, illinendis oculis commodum fit medicamentum. Ad aures item purulentas idem succus per se in oppositam aurem infusus, dentium dolores mitigat. Cæterum vltæ radice cinis alopecias replet. Oleum vltæ in excauatis radicibus ad ignem coctum, exulceratis permionibus, & ambustis illitum prodest. Et aurium dolori opitulatur, si in aure infundatur. Vitiliginem quoque albam cum linteo in Sole præscriptam, radix illita erit. At verò semen & flores excellens remedium sunt in vino poti, aduersus scorpionis & scelopendras. Sed & per alium infernè erumpunt. Et inter spuria dicitur radicem potari, appetentiam Veneris inhibere. Sed & Crateuam radicissecam eadem dicere, & quod radix drachmæ pondere pota cum vino, podagræ dolores curat. Cæterum, inquit Theophrastus, ad alimentum vitilia exhibet. Nam & anthericus leuiter ad ignem tostus, in cibi vsum venit, & semen torrefactum.

Uanium verò maximè radix cum sicu tusa.

ASPHODELVS BVLBOVS DODON.
sive Ornithogalum spicatum
flore virente.



Similis Ornithogalo monspeliensi spicato, pugnum implet huius bulbos, albus, subdulcis, à quo exeunt præparanda folia portacea, carinata, humi ferè fusa sapore vici- do: inter quæ surgit rectus caulis, vnicus, læuis, nudus, teres, duobus cubitis altior, potissimum culta, in quo dodrantalis spica florum Asphodeli & Ornithogali spicati, ex longis pediculis folliculo aliquosque involutis, colore herbaceo, vel ex luteo pallido, odore grato, ex fœnis foliis stellatis constantium, in quorum medio rectè surrecta fibra latiuscula, foliis numero pares, albiore, in mucronem acutissimum desinentes, apices su-



stinè ex luteo albidis, capitulum ambiens triquetrum, oblongum, Pericarpium tria interstitia habet plena semine Ornithogali albi spicati ita simili vt distinguere non possumus, paruum est nigrum, angulosum, sapore leguminoso, vel potius rugosum, Staphidis agris modo solidum, in- tus candidum, sapore quali leguminoso: semine maturo se aperiuunt in tres partes.

Icon nostra quæ ex emptiis est, in quibusdà placet potiss. in spicato flore: altera quæ per in- euriam depicta ex Plantini iconibus in eo dis- plicet, quòd pro nostra descripta planta, minùs spi- cata sit.

Ornithogali maioris nomine meminit Clu- sius Pann. & Hist. post. quod sic describit: Omnium (Ornithogalorum) maximum, portacea habet folia sèna aut plura, caulem inter ea emergentè cubitalem aut ampliorem, rectum, nudum, firmum, magnam florum spicam gerentem, qui exphcati fœnis foliis consistere conspiciuntur ex albo vire- sentibus, & foris herbaceis omnino: his succe-

dunt trigona capita, nigrum, magnùmque semen continentia: radix satis crassa, bulbosa, multis cunicis candicantibus constans.

Dodon. cum Hist. Lugd. (bulbum fortè potius dixerit Gesn. hort.) bulbosum Galeni flore pal- lido [de quo lib. 1. de Alim. facult. & simpl. med.] appellat, cum tamen nihil commune habeat cum Asphodelis excepto caule cum florum disposi- tione. Lobel. Obs. *Asph. detus Hyacinthinus* tortè Galen.

C. Bauhin. Phyt. pag. 57. Asphodelus 7. sive bul- bosus. Camer. apud Matthioli. Germ. Asphode- lus Galeni bulbosus bulbo & floribus albis, què aliqui sub Ornithogalo recensent. Suspiciamur Camer. apud Matthioli. non nouisse discrimen Asphodeli bulbosi ab Ornithogalo, flore albo Monspeliensi.

Dodon. apud Belgas non nisi hotrensis. Floret Maio, & Iunio men- se, aut serius paulò. Clus. fatis frequentem obseruabat inter segetes agro- rum (Pannonia) Nemethvyyvar Ill. Bathiani vicinorum Maio florentem. Ego verò Genevæ passim & copiosè à *la Bassie*, & in colle iuxta *Ar- ue* fluum, è regione *Champé*, florens Maio mē- se. Montbelgardi in Horto E. C. plantatus per- durat.

Radix Asphodeli (inquit apud Dodon. Gal. de alim. facult. 1.) & magnitudine, & figura, & ama- rore Scillæ radici quodammodo est similis: si ta- men vt Lupini pareat, maximam partem sui a- maroris deponit: inq; eo à Scilla discrepat. Nam Scilla qualitas distinctè cluitur. Heliodorus cer- tè Asphodelum laudat eam sit ait: Nec quanta in Malia & Albaco sint bona, norunt. Equidem noui quosdam rusticos, qui grassante fame, vix tandem copulibus elixationibus, ac maceratio- nibus in aqua dulci, esculentam ipsam reddide- runt. Porro hæc quoque radix, quemadmodum & Draconii, facultatem habet tenuandi atque aperiendi. Proinde quidam pro summo remedio ipsius Asparagum ictero laborantibus exhibent. Vltæ autem cinis calidior, & exsiccatior, sub- tiliorque, ac digerere potentior efficitur: ac pro- inde & Alopecias sanat.

ORNITHOGALVM VETERIBVS.

Quoniam verò minùs constat quæle Orni- thogalum Veteres descriperint, rectè nos facturos existimamus, si seorsim de hoc Ve- terum placitis pertractemus. Autore igitur Dioscor. *quod hanc, caulis* est tener, candidus, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in ca- eumine mollibus agnatis, à quibus prodeunt flo- res herbacei, qui cum hiantes se pandant lactei visuntur, inter quos dissectum, cachryos modo, capitulum emicat.

Vires ex Dioscor. posuimus sub Ornithogalo vulgari, vbi Camer. addit radicem dulcem & suauem.

Quod *hanc, caulis* Dioscoridis dixit, Plinius semipedalem habet, sortè ex describentis errore, inquit Cornarius.

Ornithogalon itaque nouit etiam Plinius, sed Ornithogalen vocat. Theophr. & Galenus, & æmuli eius Aëtius ac Paulus, Ornithogalon non nouerunt. Nec nos ex Dioscoridis descriptione satis colligere possumus, quæ sit hodie ea her- ba.

Cæterum quod Dioscor. dixit, inter ipsos flo- res prodire capitellum velut cachry incisum: id

Cachry

Canchry.

Ornithogalum
se agnoscit.Cornarii
& Ruellii
lappus.

ambiguum est, an de Cachry, quod velut in a-
uellana nuce iulus, in multis arboribus nascitur,
sic accipiendam, de quo agit Theoph. lib. 7. hist.
pl. aut de Cachry rosmarini specie, quod Græ-
ci inserto γ. scribunt ρεϑϑου: sicut illud sine γ
ρεϑϑου. Et ad Cachry quidem nos magis ducit
εϑρεϑανειος id est, incisum: ad Canchry verò,
quod addit vnà cum pane id assari, velut Mel-
lanthium. Hæc itaque ex αὐτῶν pendent iudi-
canda.

Ornithogalum nos existimamus verius esse
vulgare Matthiolo incogitum, licet in Italia
copiosè proueniat, pro quo nescimus quam plâ-
tam aut figmentum exhibuit sua icone: nostrum
duplex est. Cornar. authore Ornithogalum est
ea radix quam Germ. Erdnus & Foffel Forn ap-
pellant, quam alii Apion volunt: hic sanè non
paruus est lapsus Cornarii ac etiam Ruellii ean-
dem nostro iudicio plantam intelligentis.

ORNITHOGALVM SPICATVM
albo flore Monspell.

Descriptio



Hic radix
bulbosa
vnicâ est, ma-
gna, cepam i-
mitata, Clusio
candidior
quàm præce-
dentis, flore
virenti, & lon-
gior interdum
in amplâ ma-
gnitudine
exuberans: fo-
lia cubitum
longa, polli-
cem lata, & ex-
tremo mucro-
ne acuminato:
caulis quan-
tùm hæcenus
obseruare est
datum; singu-

laris, robustus, cubito longior, ac etiam bicubi-
talis, teres, firmus, Clusio vitidior præcedenti
flore virente, à medio ferè ad summum fasti-
gium, compluribus ornatur sensim sese aperien-
tibus floribus, tam denso agmine circa fastigium
stipatis, vt spicam emittantur, quorum singula-
res tam prope ad Ornithogali albi minoris
flores accedunt, vt pro iis fallant decerpri, intus
albi, foris herbacei, apicibus in medio luteis,
interius veto dum explicari sunt lactei omninò
candoris: semen in triangulis capitibus alteri si-
mile, sed paulò maius & oblongius, nigrum, ru-
gosum inæquale, vt in Staphide agria, sed paruum
admodum.

Matth. not.

Matth. in Dioscoridem cum magn. fig. & Ital.
Hyacinthus Orientalis alter. Cuius solam ponit fi-
guram cum titulo, foliola ad radices pediculi, fa-
ciunt differentiam ab Hyacinthis.

Clus. Pann. p. 88. Ornithogalum maius Mof-
pelianum. Et p. 191. Ornithogalum maius Mompel-
liano simile, è semine à Rasio nomine à Rasio
ipsi Lutetia missio, natum. Camer. Epit. Matth.
Ornithogalum alterum maius. Et hist. Matth.
Germ. Ornithogalum Narbonense, quod etiam

dicatur Asphodelus bulbosus & appoluit figurâ
ex Gesnerianis ad meam plantam. Aduerf. in
titulo Asphodelus Hyacinthinus fortè Galeni:
Ornithogalum spicatum quorundam. Monspe-
liensis nonnullorum Pancretium. Aliorum As-
phodelus Galeni, & in margine, Asphodelus
fœmina Dodonzi. Ic. pl. p. 94. & Obs. pag. 47.
Ornithogalum Spicatum Monsp. flore lacteo.
Ornithogalum intus forisque ex albo flauescit,
neque candere lacteo vt ornithogali renidet,
neque auersa parte herbidos. Radix verò minor,
oblongior, Ornithogali spicati. Item p. 48. Or-
nithogalum spicatum minus, siue altera species,
omni sui parte longè minor, Belgica vireta cul-
tiora alunt, cuiusmodi Liera D. Jo. Rislii, & D. Ma-
ria de Brimon vxoris D. Conradi Schetz. Benè
fuisse Lob. si annotasset olim se idem existima-
se cum Asphodelo fœmina.

C. Bauh. Phyt. Ornithogalum. i. siue maius spi-
catum, & huius species longè minor Lobel. quæ
ab Ornithogalo magno spicato, tantùm magni-
tudine distat videtur, ac verò cum Ornithogalo
magnomâ Diof. conuenire. An Epimenidum,
Theophr. l. 7. hist. c. 11. de quo Plin. l. 19. c. 5. Epime-
nidii nomine. Idem apud Math. Ornithoga-
lum maius spicatum, folia modò angustiora, mo-
dò latiora, in hist. Lugd. duabus figuris ostendit.
Sunt qui Diof. Ornithogalum censeant.

Hist. Lugd. Ornithogal. Narbonense Dod. Or-
nithogalo Narbonensi simile & magnitudine
tantùm distat videtur, quod à Mycono habui-
mus. Ornithogalum magnum Myconi.

Inter segetes Mompeliano agro & per Hispa-
nias Viennæ etiam Clusio natum semine à Rasio
Lutetia missio Moly appellatione: Maio flo-
reret. Abundat Italia & propè Monspelium pro-
uenit inter segetes. Florens mense Aprilis. Mihi
delatum existimo ex Italia per fr. C. Bauh. nomi-
ne Asphodeli minoris albi Corusii. Est nobis
Montbelgardi in horto. Ill. E. C. Wirt. vbi repo-
situm hieme floret quotannis.

Ornithogalum maximum floribus
prorsus niuis.

Tamet si scripserim (inquir Clus. Hist. poster.)
Ornithogalum illud quod Dodonæus Asphode-
lum Galeni, omnium maximum esse, nunc tamen
sententiam muto. Nam postea aliud genus mihi
conspicuum est illo longè maius: cuius historiam
in hæc append. lectori proponendam censui.
Multa id ineunte vete ab radice producit folia,
longa, diluuiis virentia, latioraque, quàm Nar-
bonense & Byzantinum, inter quæ prodit sesqui-
cubitalis, & amplior interdum caulis, crassus, vi-
ridis, læuis, magnam, longamque florum spicam
gerens, vt centenos, aut plures in eadem spicâ
numerare meminerim, sex foliis constantes, ni-
uci prorsus candoris, & nullo neruo viridi, vt
aliorum flores insignitos, qui interdum explican-
tur, sexque stamina brenia & latiuscula, alba, fla-
uis apicibus prædita, capitulumque trigonum ciu-
gentia, & umbilicum occupantia ostendunt, no-
ctu verò contrahuntur, aliorum instar: floribus
excussis, succedunt trigona capita: semen ro-
tundum, nigrum continentia. radix bulbosa, cras-
sa, candida, è lata sede multas fibras emittens.

Floret cum aliis maioribus Maio, interdum et-
iam Iunio, pro anni præcocioris aut magis se-
rotini ratione. Eum bulbum accipiebant ornitho-
gali Arabici Liliæ Alexandrini appellatione insi-
gnitum:

gaitum : quemadmodum etiam Byzantinum eadem appellatione non semel ex Italia ad me missum.

Ornithogalum Byzantinum Clusio.



Ornithogalum maius Byzantinum (auctore Clusio) paulo humilior Ornithogalo spicato albo Monsp. dilutior etiam caule & foliis, quod cepit Byzantio deferri aliis bulbis permixtū nullo addito nomine: noster pictor minus bene expressit cariconem.

ORNITHOGALON CRETICVM ET Pannonicum albo flore.



Ornithogalum Creticum rariorem stirpium exoricarūque, haud postrema, liberalitate eximii Medici Cretensis Honorii Belli ad Fratris, indeque ad nostras prouenit manus. Bulbo est nucce Auellana maiore, cuius lateribus noua proles ipso genitore

minor adnata erat: sapore tantillum amaricanter: fibris tenuibus, uti in Cepis donato. Ex quo *cantis* prodibat pedalis in cacumine flores gerens vulgaris Ornithogali maioris, sed paucos, in spicacum morem digestos, sex foliis constantes, extrinsecus virentibus, internē albis: in quorum sinu veluti glomulus staminibus cinctus. Semen paruum nigrum rugosum, ac velut araneosis punctulis eleganter impressum, rotundum, nisi quod vna parte modicē exacutum sit, durum, intus, candidum: sapore subdulci.

Simile ū non idem est Pannonicum Clusii Ornithogalon flore albo, quod describit: addens, illud peculiare habet hæc planta, ut natali loco, vbi spontē nascitur magna ex parte, cum floribus onusta est, sine foliis conspiciatur, aut saltem iam ferē euandis & flaccidis. At in hortis culta diutius plerumque folia retinere solet, & in ma-

Tom. II.

iore amplitudinem exerceat, spicam aut vicenū aut plurimū florum nonnunquam proferens. Anno 1703, sub Kal. Decembres accipiebam Burdigalā paucos Ornithogali bulbos, quos in Pyrenæis montibus eruos esse adscriptū erat: cuius autem generis sint, proximus annus [si viuemus] nos docebit: quantum verò ex bulbi forma conicere poteram, non videbantur distimiles Ornithogali Pannonici flore albo iam descripti bulbis, quales etiam in aliis prouinciis nasci verisimile est.

Clus. Pann. Ornithogalum 1. siue Pannonicum minus flore albo. Poit. hist. lib. 2. cap. 23. Ornithogalum quartum. Tabern. icon & hist. Ornithogalum Pannonicum, siue 2. Ungarisch Erdnuss aut feldswibel. Casp. Bauhin. Phyt. Ornithogalum 4. siue album minus alterum. An Camer. Ornithogalum serotinan, folio magis cæcio & minus pingui. Gerard. Angl. lib. 1. cap. 33. Ornithogalum Pann. Star Hungarie.

Largissimè prouenire obseruauit Clus. apertō Locus illo & latè patente campo secundum siluulam pagi *Lachn* imminente, & in siccioribus pratis secundum Danubium, in monte Badenibus theinis imminente, totaque illa montium serie, inde vsque ad Calenberg excurrente, & Hamburgense monte apertis & gramineis locis. Bulbum & semina missa à D. Bello ex Cydonia Cretensi terræ commisit in horto Montbelg. quem auspiciis Ill. D. Wittemb. colimus.

LILIVM ALEXANDRINVM SIVE ORNITHOGALUM magna Syriacum.



Svimmo *cantis* Descriptio
flore gerit magnum, Narcissi medioctoci parem, quinque radiatis *foliis*, in obtusum mucronem desinentibus, candidis rotis, costantem, cuius medium occupat capitulum magnum, pericarpit rudimentum, circumstantibus acuminatis *ligulis* plusculis. Inter Lilio Narcissos [ait Lobel. Obs.] &

Ornithogala media est hæc venusta planta: radice quippe Ornithogali: folia oblonga Narcissi prodeunt, in unum caulem glabrum singularem, pedalem & cubitalem ambientia, in summo alis diuisum, quibus lilacei, lactei candoris, calycis instar, senis foliolis radiati flores, lunci aquatici, Alii vsini longè maiores, Tulipæ minores, obtusi, è quorum fundo glomerulus pullus protuberat. Semen pericardio terti Ornithogali clauditur. Stamina luteola glomeratum fundum pulum ambientia.

Id fusè describit Clusius hæc addens: Ex Italia missus bulbus Lili Alexandrini nomine: Cōstantinopoli verò semper *Zinbal arabi*, quod

Ggg 2

Hyacinthum Arabicum sonat. Sed quoniam ad Ornithogali genera potius referendus videtur, quam ad Hyacinthos, Ornithogali Arabici nomen indidit: licet Matthiolus Narcissis a nunciet. Viennenses matronæ uelut *Zaerthe* hoc est, candidum Hyacinthum appellant.

Tacinho del padre nostro.

Nunc Italos hanc plantam *Tacinho del padre nostro* appellare intelligo [inquit Idem Clus. Exot. pat. 2. Append. 2.] ob capitulum, siue orbiculum in medio flore conspicuum, ut opinor. Nonnulla autem (Lob. Obs. Tab. icon & hist. cum Hist. Lugdun.) Narcissis, cum in quibus nullam affinitatem habet, à Matthiolo adnumerari censent, & ab eo Narcissum quartum appellari: sed falluntur, in eorum numero me aliquando fuisse ingenue profiteor, sed istam opinionem nunc reuoco: nam alia est planta ab hac diuersa quam pro Narcisso quarto Matthiolus proponit: ea tamen etiam inter Ornithogali genera referenda.

Narcissus Matth.

Lobel. Obs. & Ic. Pl. p. 105. Lilio narcissus polyanthos, Liliium Alexandrinum Neoceritorum. Ornithogalum maius Dodon. C. Bauh. Phyt. Ornithogala n. 7. siue maximum. Camer. in hist. Germ. Matth. Narcissus 5. Matth. Dod. Ornithogalum maius non facile ferens solum nostrum frigidum. Item c. 32. l. 4. Ornithogalum Arabicum aut maius Dodonæi, ex quo Matth. Narcissum facit. Et Horti, Liliium Alexandrinum inter Liliom narcissos & Ornithogala medium, flos suauem odorem præbet.

Ornithogalum maius Dod.

Ornithogalum maximum.

Dulcis Hyacinth.

An Cæsalp. Dulipan & Hyacinthus albus de quo dicitur: Cauda est cubitali, crasso: coma in cacumine, ueluti umbella: floribus candidis, la- rissolis: uasculis nigris: Bulbum fert grandio- rem, quam prædicta genera, cortice nigro: folia quoque maiora, sed simili modo prælonga, & strata, hanc putauerim Bulbum vomitorium esse.


Locus & tempus

Belgis primùm communicata hæc planta fuit, missis ex Italia eius radicibus Ill. Ioh. de Brácion, à C. V. Alphonsio Pantio, & amplissimo Ia. Ant. Cortuso, deinde etiam Constantinopoli cum aliis raris stirpibus accepta. Semel istic florentem uidit Clusius Maio, Viennæ autem persæpè. Mira autem est huius bulbi natura: nam plerumque re- pertus est uix vlla folia promere, nisi singulis anniis exemptis aliquantò tempore adseruetur, de- inde Autumno terræ denudò concredat, tum enim demum geminare solet etiam antè bru- nam: nullus autem florere ipsi conspectus est, nisi recens Constantinopoli allatus. Nam ex illorum est numero, qui nisi istic eruti iam con- ceptum in vtero florem habeant, in frigidiores prouincias translati, nullum dent. Præterea cum frigoris valde impatiens sit, neque Viennæ hye- mem in horto ferre potuit: sed in scitilibus re- ponendus, ubi bulbis circa matrem adnatis felici- ter se propagare solet.

Tollanus Carolus Burgundicus Pharm. misit bulbulos Lillii Alexandrini, quos plantaui in Montbelg. horto Il. E. C. Dominus à *Belle fontaine* misit mihi Vesuntio anno 1594. bulbos ex Ita- lia, qui non flore albo.

ORNITHOGALVM VVLGARE ET uerius maius & minus.

Descriptio **R**adix bulbosa candida quæ multos bulbulos adhærentes habet, ueluti racematim cōpactos,



fibrosos, se pla-
rinum multi-
plicantes, gu-
tu amarican-
te, lenta spu-
moseque mu-
cagine mulli-
catos os re-
plentes: folia
promit angu-
sta, tenuia, lo-
ga, etiam ad
cubitum ipsi
caulem mul-
tū superan-
tia, carinata,
per medium
cotum lactea
discurrente li-
nea in retram
strata, mollia,
& inter hæc

caulem dodrantalem, & sesquipedalem tene-
rum, teretem & nudum, qui circa fastigium *pedi-
diculus* emittit, quorum vniciuque subiectum *fe-
lulum* oblongum, membraneum, acutum, *flores*
sustinent & foliis lenis compositos, oblongis,
lacteo intus candore, foris non nisi per oras, me-
dio herbido: intra quoque stamina latiuscula, lena,
candida, apicibus luteis: in medio *capitulum* can-
nulatū hexagonū stilum & summo profert al-
bidum, ex quo vasculum continens, inquit Ca-
merarius, *semina* compressa nigri coloris. Orni-
thogalum Diosc. & Plinii (quorum descriptiones
ante posuimus) affirmarem, si crudum mandā
obseruarem.

Ornithogalum Matth. quod aded inter sege-
tes frequens oritur, vti Maio mense in aruis re-
quiratur perennis prius notis illi à Diosc. attri-
butis, facile ab omnibus inueniatur. Hist. Germ.
Edmunde. Lat. cum fig. & Ital. Ornithogalum.
Item Ornithogallum secundum. Si Matthiolo
notum, cur non describit? cur contentus appo-
nere figuram non experimentum verum Orni-
thogalum. Mirum in post. com. retinere priorem fal-
sam ac etiam secundam falsam addere nomine
Ornithogali secundi, nullam declarans dif-
ferentiam: vel hinc solum satis apparet Matthioli ima-
ginaria in stirpibus petita, celebri encomio, ac-
tamen à stirpium ignatis decantata.

Lonicerus quoque assumpsit iconem Mat-
thioli reiciendam, vti & qui illi patrocinatur.

Dodon Gall. vocat Ornithogalum, Belg. Vels
Nyeny. lib. autem de floribus c. 23. vocat, Bul-
bum Leucanthemon. Ibidem ei dicitur *Ornithogalum*
Diosc. legitimum, & à Plinio Ornithogale.

Lob. & Pena Adu. Obs. & Ic. Pl. p. 148. *Ornithogalum*
Ornithogalum candidum vulgare. Belg. Vels
daynyn. Gal. *Charles, & vignon blanc champestre,*
nisp. *Leche Gallina.*

Clus. Pann. Ornithogalon vulgare flore albo.
Hist. post. Ornithogalum quintum, vulgare om-
nibus ceteris, quas pera grauerint, regionibus,
obnium in agris.

nist. Lugd. ex Matthiolo, duas Ornithogali
plantas exhibet, quod duo esse eius generis exulti-
met. Quorum vtrumque cum caule foliosum sit,
& differat ab eo quod Dod. depingit, quodque
legitimum Diosc. Ornithogalon esse censet. Or-
nithogalum. 1. & 2. Matth. Ornithogalum Dod.
seu bulbos Leucanthemis.

Tab.

Tabern. icon. & hist. Bulbus Solsequius *Wesf. feldzwibel*. Compil. Tabern. iconem Ornithogali [quæ non placet] cap. de Scilla sub modo dicto titulo exhibet, quæ erat ponenda folio sequenti pro suo Ornithogalo primo maiore, ubi alterius plantæ, nempe Ornithogali flore pallido, icon malè posita: Ibidem etiam considerandum an benè dicat Ornithogali flori albo folia non nihil aspera.

Gerard. Ornithogalum luteum *Star of Bethlehem*.

C. Bauh. Phyt. Ornithogalum. 2. Ornithogalum 1. Matth. an diuersum a sequenti cogitandū. Item Ornithogalon. 3. siue album minus, Matthioli. 2. Lob. Ornithogalon. Item apud Matth. Ornithogalum 1. Ornithogalam 2. siue album minus.

Copiosè prouenit in pratis circa Dresdam ad Albim fluuium, ubi vere reperit Camerarius. Clus. Frequens est ultra Drauum & Warasdinum in agris, & nusquam non Clusio conspectum ubi fuit. Abundat in Italia propè Patauium & iuxta Villenouam: floret Martio. Hanc apud Gesnerum vidi florentem mense Maio. Circa Lugdunum copiosè prouenit. Inter Mulinam & Saseul Castellum & oppidum in Italia spontè. Basilee vidi mense Februario pulchrè prorumpens in horto D. D. Felicis, vnde Montbelgardū traustuli virens mense Decembri. In horto E. C. VV. ita se bulbulis multiplicat, vt odiosum sit. In horto Nicolai Ferrarientis Aprilis mense florens obseruauit.

Coquitur à Diosc. cū pane, vt Melanthium. Radix bulbosa, cruda & cocta manditur. Camer. citans Diosc. addit: Est enim dulcis & suavis. ubi hoc inuenit nec minus, in nostro Ornithogalo nullam dulcedinem aut suauitatem experimur, imò nobis amaricat.

Ornithogalo Vulgari simile latiore folio.

Ornithogalum hoc attulit mihi Hortulanus Ill. Cels. Viri. Ioh. Manaut iunior, quod mihi primò visum Montbelgardii, florens anno 1610. Aprilis principio, vulgariore nondum florit, nec caulis rudimentum demonstrante. Huius caulis erat breuis, flores exterius virides, interius albi: folia latiora duplò, lineâ albicante destituta. Ornithogalum hoc vulgare aliud, teste Clusio, alebat Viennæ in cultissimo suo horto, Generosa D. de Heusenstein, latioribus foliis, crassiore caule, amplioribus floribus, paulò maiore bulbo, ex Tyrolensi comitatu allatum: alioqui cum quinto (vulgari) conueniens. Quale etiam Neapoli ad Cluuium mittebat doct. Vir. Ferd. Imperatus.

ORNITHOGALVM NEAPOLITANVM.

NOuum Ornithogali genus rectè mihi antè Nuncognitum [inquit Clus. Exot. par. 2. App. 2.] Neapoli ad me mittebat an. 1600. Doct. ill. Ferdin. Imperatus, & illud quidem non elegas pro Arabico, quod ab ipso petieram. Proferebat anni insequentis primo Vere terna aut quaterna folia carinata, longa, Hyacinthinis non valdè dissimilia, verùm angustiora, viridia: inter quæ prodibat caulis satis firmus, dodrantem altus, leuis, viridis, sustinens superna parte quinos, vel etiam plures interdum flores, in anteriorem partem propendentes, tamen alternis in singulis caulis lateribus nascentes è cuiusdam membranula sinu, internâ parte candidis, externâ autem ex cineraceo virescentibus, orâque albas

Tom. II.

habentibus: floris umbilicum occupabat alter flosculus sex etiam foliis minoribus præditus, quæ extimâ parte quodammodo coibant, & veluti tubulum formabant, in quo apparebant sex alba staminula flauiscentibus apicibus donata, & medijs stylis albis:



thogali Arabici radix, minus tamen amplâ sedè, sed multis candidis fibris in âbitu præcità.

floribus porro erant prorsus inodori quibus succedebant trigona capsula crassiuscula, in obrusum mucronem desinentia, quæ caulem propter gravitatem deprimunt, semen nigrum rugosum continebant: radix erat bulbosa, candidans, fuscâ tamen membranâ tecta, in conum supernâ parte falgigiata, in fernâ autem plana, petinde ac Ornithogali Arabici radix, minus tamen amplâ sedè, sed multis candidis fibris in âbitu præcità.

ASPHODELVS MINOR FOLIO
fistuloso.

IN Asphodelorum classe & hanc quoque descripsit Innumerant speciem minorem, quæ ex fibrosis phalangii (cui tora planta satis similis) radicibus mediocriter crassis, non nodosis tamen, folia promit, multa, angusta, rotunda ferè, tres aut quatuor uncias longa: inter quæ caulis surgit teres, in ramos aliquot fissus. Flores Asphodeli minores, sicuti & capitula.

Ante 40. annos descriptissimam plantam repertâ mense Maio in Prouincia perstudiorum socium Leonhard. Rauuvolff. Augustanum Medicum cum essemus Monspelii. Huius autem semen ni fallimur nobis missum est ex Italia per Fr. C. Bauhinum quod fatum Montbelgardii produxit plantam eodem anno, radicibus etiam fibrosis, foliis tantæ magnitudinis vt cubito essent longiora, striata, fistulosa, in acumen desinentia: è foliorum medio caules plures surgebant teretes, ramosi: A medio caulium ad summum vsque flores expandebantur senis foliolis constantes, colore lacteo lineâ ferragi-



Ggg 2

nea vnumquodque folium secundum longitudinem percutrent, staminibus in medio lacteis, apices ferrugineos sustentibus: vascula suboriabantur triquetra ferè: semen nigrum triangulum claudens: florebat Montbelgardi Septembri: conditus interdum proferebat hyemem, & eodem anno maturesebant semina.

Fistulosum *Asphodelum* videramus antè Tiguri, in horto D. Gesneri, florente in Maio, cum capitulis se demonstrantibus. Nobis etiam visa planta in oppido *L'Isle* in horto præf. D. Friderici Cappler nobilis summi amici nostri: obseruauimus etiam Sturgardix in horto Ill. C. W. florentem Maio.

Clusium nostrum *Asphodelum* fistulosum sic tradere arbitramur: *Asphodelus* tertius, vt foliis, caule, & floribus satis similis est superioribus, ita radicibus omninò differt, quæ non glandulosa, sed fibrosa, crassèque & numerosè, ex vno capite nascuntur: folia *Asphodeli*, minora, multò angustiora, lentiora, diluitorisq; sunt coloris, è quorum in medio sex aut plures eadem radice assurgunt caules cubitales, ramosi, quos sine ordine uiscentes stipant flores, superioribus similes, sed minores, medium folium purpurascens venâ per longitudinem secante: floribus succedunt triangula capitula, initio viridia, deinde exalbida, in quibus semen rugosum, altero minus.

Dod. hist. fl. & lat. in fol. Pseudo *asphodelus* quidam non abs re videtur, aut minor *Asphodelus*. Gesner. horti ex sententia Coldemburgi, *Asphodelus* annuus, & *Asphodeli* species altera radice breuiori. Annè eadem in append. *Asphodelus* tertius minor, *Asphodelus* maritimus quorundam: Tota Gesneri descriptio optime conuenit nostro *Asphodelo* minori folio, fistuloso, nisi diceret foliis esse non cauis. Aduers. Phalangium Cretæ Salonensis. Lob. Obs. & Ic. Pl. p. 43. sicut & Hist. Lugd. *Asphodelus* minor Clusii & Dodonæi. Clus. Hisp. & Hist. *Asphodelus* minor & tertius radice fibrosa, Valentini *Gammillos*, id est, paruum *Asphodelum*, Granateses *Cebolla de culebra*, hoc est, Cepam Colubrinam appellant. Parauina schola *Asphodelum* fistulosum, quoddam concava folia habeat forsitân. Tab. icon. & hist. Phalangium Narbonense *Erdspringen* fraut Gerard. Phalangium Cretæ, Candy *Spiderwort*. C. Clusio *Asphodelus* minor. Pro hoc Phalangio non bene ponitur icon, quia Tabern. posita est pro *Asphodelo* luteo palustris, & ab ipsomet Gerardo iterum l. 3. c. 64. pro *Asphodelo* Lancastriæ: non bene etiam interpretari videtur Cretam Salonensem Lobelii per vocabulum *Candy*. C. Bauh. Phyt. Phalangium 5, siue minis foliis fistulosis.

Gerardi
vor.

Locus &
tempus.

Toto Valentino regno, nullus ferè est alius *Asphodelus*: nascitur & Gadibus ad ipsam pontem de Sualço cognominatum, quo insula Còrincenri coniungitur, & plerisque Granatensis regni locis: olim etiam campo illo lapidoso supra Arelatem, Massiliam proficiscens locus semitas colligere meminit Clusius, semine ex Hispaniis à se delato: amicis natus est in Belgica, sed cum frigoris sit impatiens, peribat hieme, eam ob causam annum cèsebant, donec ipso monitore qui magnas illius plantas hieme virentes in Hispania viderat J. Ill. Io. de Brancion vna n ex iis quæ postea semine nara, fistili inditam conseruaret, quæ deinde aliquot subsequentiis annis florens, maturum semen præbuit, quod etiam terre

creditum prouenit. An porò alicuius in re mendica sit facultatis à nemine hæcenus intellexit.

ASPHODELVS MINIMVS ALBVS



Nouum *Asphodeli* genus, inquit Clusius in Hist. appèd. & à nemine descriptum, femine natum sibi esse scribebat Iacobus Plateau. Minor est tertio iam descripto, & ab eo plurimum differt: nam glandulas radices habet instar Secundi generis, licet minores, è quarum capite

prodeunt quina aut sena folia, valde angusta, & longiuscula, inter quæ assurgit *cauliculus* rotundus, dodrantem aut pedem altus, singularis, nec vllis ramis præditus, in quo spicæ in modum nascuntur multi flores albi, sex foliis constantes, quorum singula internè & externè, verè quadam secundum longitudinem sunt notata, perinde ac Tertii præcedentis flores.

Iulii initio flores proferre incipere scribebat, quàm reliqua genera suos abiecerit, proptereaq; magis illis serotinum censendum: hieme folia amittere, & noua denud acquirere circa Aprilis initium.

ASPHODELVS LVTEVS.



Quamquàm *Asphodeli* lutei meminisse non compertuntur Veteres, tamè in *Asphodelorum* censum cooptandum hunc esse multa docent. radices ab vno capite multæ nax, sed longè tenuiores quàm *Asphodeli* albi maioris, colore luteo prædite, exportredis per tranuersam

fibris se propagantes: cauis *Asphodeli* albi modo selquicubitalis, singularis, à medio ad summum floribus ornatus *Asphodeli*, sed luteis: quos recipiunt pericarpia rotunda semen continentia: *floribus* portò

porò vt longitudine folia Aphodeli iam dicti vincunt, ita infdem latitudine cedūt, colore glauco prædita.

De hoc fortè Lobel. Adu. Aphodelus luteus minor, nufquam litoreis infdem vifitur, tamen hortis Batauinis & Gallie familiaris luteus hic A antiquis indictus, generèq̃ diuerfus, est enim radicibus prolixioribus, nec ita bulbosis, fed Corrudæ modo minùs tuberosis, lenitufque turbina- ris, è quibus Cyperi folia complura exeunt, exilia, faturo virore. Caulis rectus floribus crebris luteis, alterius fimilibus, fastigio tenui ftipatus: fementriangulum pericardii continetur primi modo.

Lobel. Obf. & Ic. Pl. pag. 91. Aphodelus luteus minor. Adu. pag. 45. Iphyon Theophrast. Anguill. & Eri. ambac. Arabum quorundam. Con- siderandum an figura poffit conuenire nostro Aphodelo minori luteo.

Math. Ital. cum magn. fig. dicit Vnam Aphodeli fpecie proferre ilorea luteam: fed non diftinguit radicibus & foliis ab altero.

Camer. apud Matthiol. Germ. & Epit. Gelb. Zffodil wurg. Aphodelus luteus fivie. famina Plinii.

Quid autem fit Iphyon Theophrast. certò af- firmare non potest Anguill. Aphodelus flore luteo pro eo potest demonstrari. Quod etiam Aphodelus luteus Recentioribus à Dionyfio fæ- mina dictus fit refertur Dodon. hift. ff. & in fol. Gefner. hort. Aphodelus luteus. Præterea Af- phodelus alius radice lutea. Hort. Lufit. Apho- delus luteis floribus.

Tabern. icon. Aphodelus luteus: & hift. lu- teus 5. Item ic. Aphodelus luteus minor, & Hift. Aphod. 4. Compiler Tabern. non defcribit nec demonstrat qua in re ab albo vel à quarto minore luteo differat: præterea appingit malè radices, quales albo. Icon autem Tabern. Af- phodeli lutei minoris eadem est cum iconè à Lo- bello exhibitæ.

Gerard. fequitur Tabern. cuius iconem habet fub titulo Aphodeli lutei Gelb Zffodil: verùm cap. 64. Iconem Tabern. minoris habet fub hoc titulo Aphodelus luteus minor The fingit fpe- are & post Xiphium Lat. Aphodelus luteus fivie Dionyfius, Haftula regia. An Gerardus nõ inftipiat, quòd diuerfo capite iconem Aphodeli Tabern. minoris ponat, iudicent periti: cur etiam Xyphii nomen ei tribuit?

Casp. Bauh. Phyt. & apud Matthiol. Aphode- lus 5, fivie luteus & flore & radice. Haftula regia Trago. Nos Haftulam regiam apud Tragum non inuenimus. Hift. Lugd. duas habet figuras, vnam quidem Aphodeli lutei Dodon. Alteram verò Aphodeli lutei minoris Lobelii.

Aphodelum luteam Tigris primò vidi apud Gefnerum, deinde Bafilea in duobus hortis, Flo- rentem Maio: fructu turgentem mense Iunio. Patavii in horto D. Cornu & horto Patavino. Ferrariz in horto Cænobii S. Dominici à P' Ange- li. Bononia in horto Nobilis di Gonzadinis. A- prili ferè florens. Montbelgardi tranfz in hor- tum E. C. ex meo hortulo: Argentina etiam at- tuli ex horto Di. Friderici Meyer. Sturgardiz vi- dimus in horto Ill. E. C. florens Aprilis anno 1670. Lobel. Hortis Batauinis & Gallie familiaris.

ASPHODELVS MINOR RADICE LVTEA.

Aphodeli fpecies peregrina radice lutea Gef- ner. Item in Append. Aphodelus alius me-

die magnitudinis; radice lutea.

Anno 1594. Sturgardia accepi mus femen mis- Locus & sum per Horculanum Ducis Florentie cum hac Tempus. infcriptione. Aphodelus luteus minor Cretenfis: femen valdè angulofum & acutum, multò maius



quàm ea fe- mina, de qui- bus mentio facta fub Af- phodelo fiftu- lofo: viden- dum erit an conueniat cū planta Gefne- ri: provenit mihi, fed vni- cum tantum produxit fo- liolum mense Iunio, cum fuiffet fatum in horto E. C. Montbelgardi mense Aprilis.

ASPHODELVS LVTEVS ACORIFO- lius palustris Anglicus Lobel.



Folia pro- mit pul- Defcriptio chare virentia, aliquantulum ftriata, Iridis aut Gladioli fimilia, fed angulata, & do- drante bre- uiora: caulem rectum, pedale, Autherico fatis fimilem: flores è lenis foliis, exiguis stami- nibus in me- dio, colore lu- teo pallentes, Aphodeli lu- tei æmuli, fed minores: fe-

men perexiguum in oblongis acuminatis vasculis radice longa, geniculata, non abfque fibris ferpit graminis modo. Hec ex Dodonæo.

Dodon. itaque lat. in fol. Aphodelum hunc palustrem quemdam vocat, Aphodelo fc. luteo caule, florèq̃ fimilem. Huic refragatur auto- pia Cluf. Hift. post. fcribens: Pseudo-Apho- delum primum potius dixeris, quàm Aphodelum flauo flore palustrem: nihil enim Aphodelo si- mile habet præter flores, licet Dodon. caulem etiam fimilem faciat, qui tamen non est nudus, fed multis foliis fivie vaginulis illum amplectenti- bes donatus.

Hic Pseudo-Aphodelus maior appellari poffet, ad differentiam fubfequentis.

Huius iconem exhibet Gerard. Angl. lib. 1. c. 64. nomine Lancafbhir Zffodil / Lanca- ftriz Aphodeli: Quæ postea ab eodem Hift. fuz

lib. r. c. 33. male reponitur ex Tabern. pro Phalangio Cretæ.

Cer. d. d. v. Lobel. Ad. Asphodelus acorifolius palustris, luteus, Angliæ, Flandriæque, vel potius Asphodelus palustris, & Pseudo asphodelus luteus: *Βασιαρδ yellow Asphodil.* Obs. & Pl. icon. p. 92. Asphodelus minimus luteus, Acorifolius palustris, Asphodelus luteus palustris Dodon. in agro Lancaſti Angliæ. Scribit aures Lobel. Ad. par. 2. Rhizotomos, quosdam Tabern. Asphodelum luteum palustrem, Bataurorum, & Brugensium, confundere cum Lancaſtrensium Asphodelo luteo de quo pōt: verum si liceat verum dicere ipsemer id facit, in Ad. Obs. & Ic. Pl. vbi iconem sub dictis titulis ponit à nobis hic positam ac eandem cum Dodonæi iconem.

Lobel. not.

Tab. icon. & hist. Asphodelus luteus palustris. 7. *Geel wasier Asphodil wurz.*

C. B. not.

C. Bauh. Phyt. Asphodelus 6. siue palustris, Gesnero tertius. In quo ad sinistram desceſcit C. B. A palustri siquidem longè diuersus Gesneri, qui nobis est Asphodelus minor folio fistuloso. Dodon. nasci tradit in humidis quibusdam ac palustribus Flandriæ ericetis: æstiuis mensibus florens. Cluſius eruebat aliquando in palustribus illis ericetis Maldeghemo vicinis, secundo à Brugarum vrbe Flandriæ: celeberrima miliari, mense Maio.

Vfus.

Floribus lictiuo maceratis puellæ crinem flauum inficiunt Lob.

PSEVDDO ASPHODELVS QVIBVS DAM.

Descriptio



Caulis do-
drātalī,
aut etiam cu-
bitalis, iun-
cens, vno aut
altero folio
gramineo do-
natus, spicam
gerens *florum*
paruorum, ſe-
nis foliolis
constantium,
ex luteo virē-
tium, quos ſe-
quantur *capitula*
trigona,
anguloſa, mi-
tiſſimo ruſſo
ſemine ſarcta:
folia circa i-
mum cau-
lem ex fibroſa

radice numeroſa, graminea, rigidula, glabra, duarum vnciarum, aut maiori longitudine, acuminata. Cluſio eſt Pſeudo Asphodeli genus alterum, quod ſic deſcribit. Numeroſa ſunt illi folia, ſeſe mutuo amplectentia, vt in ſuperiore, & Irīde, anguſta, breuia, viridia, dura, amariſculi, & calidi ſaporis: è quorum medio *cauſculus* gracilis egreditur, pedalis interdum, aut maior, aliquot nonnunquam foliolis inhaerentibus, ſpicam hoſculorum ferens, ſex foliolis constantium, alterius inſtar, ſed minorum, pallescentis ex herbaeo coloris, & odoris expertium: quibus ſuccedunt trigona capitella, interdum tetragona, & pentagona, miniſſimum ruſſum ſemen continentia: radix vix corpus habet, ſed tenuibus aliquot fibris duntaxat conſtat. Pſeudo-asphodeli

minoris ſiue pumilionis folio Irīdis nomen in-
didi ad prioris differentiam.

Lobel. Ad. par. 2. Asphodelus minimus Nor-
uegicus luteus, palustris, Scotticus & Lancaſtri-
ſis. Anglo Britannæ mulieres apud quas frequens
naſcitur, à tingendis capillis, (*wayden haire*. i
Virginum Veneriſue capillum vocitarunt: *Ca-*
pillus enim Veneris Angliſ, *wayden haire* dicitur.
Non videtur diuerſum à ſecundo Pſeudo-Aſ-
phodelo Cluſii, ſed variare paruitate & magnitu-
dine ratione natalis foli. Aliquot menſibus cla-
pſis Noruegico luteo Asphodelo parem & ſimi-
lem ex Scotia huc Londinum ad me miſit Iac.
Gargillius Botanicus inſignis. Aequè Rhizotomi
quidam, ſorum inſtitores, & vernacula lin-
gua tranſcriptores, mira Metamorphoſi litera-
rum & linguarum inſectiā, alienarum lucubra-
tionum interceptores, & perſtriçta frontis depo-
pularores, falluntur, ac Tabern. cum ſuis aſſectis,
& Typographo ſuo, qui cautè noſtris ſcriptis &
iconibus tanquam ſuis abuſi ſunt, dum Lanca-
ſtrensium Britannicum palustrem Asphodelum
luteum, cum Batauo aut Flandrico Asphodelo
palustri Dodonæi, vt alia pleraque adumbrant &
confundunt. *ſi liceat* nobis liberè dicere quod
ſentimus, conſuſionis ſi quid apud Tabern. in
hac planta eſt, autor videtur eſſe ipſemet Lobe-
lius, qui olim non diſtinxit, vt paulò antè di-
ctum.

C. Bauh. Phyt. Holostrium glabrum viride.

In *Snealpen* (inquit Cluſ.) *Neuberg*, atque a-
liis pratis montanis, & gramineis collibus, Junio
florens & Iulio ſemen proferens Pſeudo-Aſpho-
delum Cluſii mihi miſit inſignis Pharmac. Toſſa-
nus Carolus anno 1590. Menſe Iulio, cum ſuis ca-
pitis trigonis quem plantaui Montbelgardi in
horto Ill. E. Principis: Eandem plantam habeo
inter herbas ſiccas è Gallia allatas puto ex mon-
tibus Sabaudia. In collibus quibusdam circa A-
uenionem & Nemaufum Narbonenſis Gallia,
iſſique vmbroſis & velut pratensibus obſeruauit
idem.

PHALANGIVM CAP. IV.

Veterum *φάλαγγιον*, quæ herba dici me-
reatur, cum hodie aſſertu arduum valdè ſit,
nemo (vti quidem ſperamus) inſicias ibit, ſi de
hoc, quæ ipſi quondam ſcriptis mandarunt, ſine
vllis tamen verborum ambagibus, præmittamus.

φάλαγγιον igitur [inquit Dioſc. lib. 3. c. 12.] alii
φάλαγγιππος [Phalangitum, alii & hanc (*λευκανθου-
ρα*, Leucacantham) dicunt. Ramuli ſunt ei
duo, aut plures, inter ſe diſtantes (*διεσώτις* in
diuerſa tendentes Plin. [*διεχορτίς*.] Flores albiſſi-
miles Lilio, multas inciſuras habentes: ſemen
crasſum (Ruell. latum. Math. græca Exemplaria)
non *πυκνόν*, ſed *πυκνόν*) nigrum, velut lentis dimi-
dium, multò tamen gracilius, Radicula parua, te-
nuis, & dum è terra extrahitur pallida, vel ſub-
lutea (*χλωρόν*) vt vertit Dalech. & non viridem
aut herbacei coloris, vt Plin. & cum ſequuntur
Ruellius. Poſtea autem, cum herba ſcruatur &
contrahitur, albefcente, quam notam à Dioſc.
traditam Ruellius omiſit. Naſcitur in locis
tertæ editioris. Huius folia, & ſemen, &
flos ſi cum vino bibantur, iſtis Scorpionæ, &
Phalangio auxiliatur Diſſolunt etiam tormina.
Finit Dioſc.

Plinius lib. 27. c. 12. de Phalangio planè eadem

habet. Phalangitis à quibusdam Phalangion vocatur, ab aliis Leucanthemum, vel, vt in quibusdam exemplaribus inuenio, Leucacatha. Ramuli sunt ei nunquam pauciores duobus, in diuersa tendentes: hos candidus, Lilio rubro similis: femine nigro, lato, ad lenticulæ dimidiæ figuram, multò tenuiore: radice tenui, herbacei coloris. Huius folio, vel flore, vel femine auxiliantur contra Scorpionum Phalangiorumque & Serpenti-um ictus. Item contra torinua.

Galenus Phalangitin ita nominatam esse dicit, quòd commorbis à Phalangio opitulerur. Esse autem tenuium partium & siccantis facultatis. Vnde etiam tormina sentientibus auxiliari videtur.

Nomine autem Phalangii & Phalangitis plures sese offerunt species. Quippe Phalangium primum siue ramosum. Phalangium non ramosum. Phalangium flore Lili. Phalangium de Asphodelo minore fistulosum. Phalangium Tragi, Lob. & Penæ Adu. p. 13.

PHALANGIUM QVIBVS DAM PARVO flore, ramosum.



Radice fibris perenni crassiusculis, candidis, subdulcibus, glutinosis, carnis surgit singularis, tenuis, leuis, teres, sequecubitalis, cuius scapus in ramulos aliquot facessens, flores sustinet frequentes stellatos, è semis foliis compositos, emaculato candore Lili conspicuos,

quibus, pericarpia globosa succedunt, Lini capitalis æqualia, per maturitatem in tres partes dehiscentia, femine vt vult Dodon. nigro, veluti Melanthii, non perinde tamen anguloso, refoerta: folia graminea, porraceis tenuiora, angustiora, carinata, pede aliquando longiora, ac etiam cubitalia, statim à radice exorta in terram repanda parum attolluntur. Non nostra est ex iis, quas sculptas emimas.

Aduerf. Lobel. & Penæ Phalangium, an Moly Plinii? Non rectè Dodon. Moly vocat. Nomine enim Phalangii donatur multò sanè aptius quàm Moly, seu Dioscor. seu Plinii, vt nonnulli voluerunt. Lobel. Obs. & Ic. Pl. pag. 47. Phalangium ramosum. Dodon lat. in fol. Phalangium ramosum, qui quondam in histor. Gall. pingebat pro Moly Plinii, addens à Belgis in hortis excoli ac Iulio florere.

Phalangium [vt Cæsalp. placet] Asphodelus paruis dici potest: nam in totum Asphodelo simile: multò angustioribus foliis breuioribusque, cauliculis fermè cubitalibus, modò simplicibus, modò ramosis: floribus latoribus, candidioribus & magis patulis: nascitur in asperis. Cæsalpinus videtur duo Phalangia simul tradere,

quorum vnum fortè est quod vocamus pulchrius non ramosum. Quomodo etiam in totum Asphodelo simile, si folia angustiora, breuioraque: Phalangium ramosum.

Tabern. icon. Phalangium ramosum *Erdo* *Dod. not.* *spinnenfraut* / quibusdam Moly Plinianum, sed ineptè.

Lugduni in collibus accliuibus ad Rhodanum, Eridanoque flumini collibus vicinis: variis Londini & Belgii hortis colitur. Fortè quod colitur diuersum est à præcedenti Lobelii & idem cum sequenti. In accliuibus collibus nonnullis apud Gallos & alibi gignitur haud procul à fluminibus ac ripis aquarum decurrentium. Iunio ac subinde Iulio vigent flores, Augusto semina perficiuntur. Prouenit Phalangium ramosum Tab. in collibus & montibus Astartæ, & in montibus iuxta Rhenum, quidam in hortis colunt. Basileæ in monte Mouters, vt amoraui frater Cæsp. Bauhinus, Barnii Rhætorum, Tiguri Iunio & Iulio florens: in collibus circa Geneuam florens Maio, & Iunio & Iulio: Montbelgardi in planitie ad Dubim inter *Arbusians* & *Andincourt*, & in monte *la Chaut* vbi vires, cum flore Iunio & Iulio, & cum femine maturo Augusto: transfusi in Hortum E. C. Argentina vidi florens mense Iulio in orto Di. Frederici Mereri, qui asserbat se habere diuis species huius Phalangii ramosi.

Locus, & tempus.

Camer. Laudatur aduersus multos morbos & affectus, ac contra omne venenum non solam Scorpionum & arucarum venenatarum, vt Dioscor. & Gal. de suo Phalangio scribunt, quod asserere non potest, quia non expertus Camerarius.

PHALANGIUM PVLCHRIVS non ramosum.



Descriptio

Phalangium quod pulchrius dicitur, respectu præcedentis, non sequentis, quod flore Lili dicitur, *Julis* est præcedenti penè similibus, latoribus paulò: *caule* eodem, sed non ramoso: *floribus* paulò maioribus albis, multis, spicæ præstantibus, & multò pluribus quàm demon-

strat icon Lobelii in obs. & icon. Plantini: succedunt *capitula* sablonga, in quibus *semina* rotunda.

Phalangium hoc [teste Lob. Obs.] voluptatis ergo in hortis Belgicis Italicis & Anglicis colitur. Priori Phalangio ei omnia similia præterquam summus pedalis cauliculus, quem sine ramulis in pediculis lacteis stellati flores & semina in pericarpis antedicto similia sed maiora

ambiant Phalangium non ramofum Aduerf. p. 18. Ital. Phalangio.

Item Icon. p. 48. Phalangium non ramofum, *Liliago Cordi*. Non sine nota Lobel. in hoc à nobis recedit: nos enim Liliagine Cordi ab hoc Phalangio feparamus.

Dod. in fol. Phalangium non ramofum. Thal. in Harc. fortè Liliago altera minor. Camer. apud Matt. G. Phalangium maiori flore de quo ante. In horto, Phalangium minus. Tabern. icon. & hift. Phalangium non ramofum & *Spinnen* fraut. An hift. Lugd. p. 1497. planta quam Myconus ex Hispaniis mitit, quam Lilium Polyrhizon nominauit: Lilium quidem, quòd florum figura, colore, dulci & glutinofa fapore Lilium albu referat: polyrhizon à radicum copia: rectè, an fecus, id pentis Herbariis æftimandum relinquatur.

C. Bauh. Phyt. Phalangium 2. maius alterum: Lilium polyrhizon Myconi. Considerandum an Myconi Lilium prædictum, quod etiam pingit Hift. Lugd. fit Phalangium pulchrius non ramofum. C. Bauhinus feperat à fuo Phalangio quarto ficut non ramofum, nos autem dubitamus an diuerfum fit id ramofum quod ei etiam dicitur Liliago Cordi, quæ nobis videtur Phalangium Liliii flore: de quibus paulò pòft. Gerard. Phalangium non ramofum, *Unbrauchd Spider* moerit. C. Bau. Phalangium 4. non ramofum. Noftum iudicium hac de re, lectores videant inter ea, quæ mox fequenti titulo dicemus.

Copiofum vidi fimile, quod flore minore eft quam fequẽtis. Sturgardie in horto Ducis florens Maio: tranfuiti Montbelg. in hortum E. C. hift. Lugd. pag. 1497. Lilium polyrhizon Myconi nafcitur in hispaniæ montibus, fed terrenis humidiffique locis, quandoque iuxta fluenta.

Liliago Cordi ftatim à radice folia profert Hyacintho fimilia, anguftiora tamen: è quorum medio caulis affurgit cubitalis, aut aliquando maior, tenuis, terrefque fuperius, vno atque altero intervallo fingula habens folia, prædictis multò minora: in fummo caule & aduatis flores producit fex, oblongis vncialibusque folioliis conftantes, è medijs floribus, luteis apicibus, itamina prominent, in fumma Lilio, vel potiùs Aphodelo vero fimiles flores funt, multò tamen minores, nec ita refupinatis partibus repandi. Radicibus nititur multis, culmi craffitudine, lentis, pinguibus, glutinofis, perennibus, ab vno capite, vt etiam in Aphodelo in diuerfas partes diftractis, longitudine dodrantis. Saporem habet glutinofum & naufcofum aliquantulum. Nafcitur editis apricisque locis iuxta rara & parua arbuta.

Gefner. vt antè dictum pro Liliagine Cordi ramofum exhibet Phalangium, nobis autem videtur Liliago potiùs conuenire Phalangio flore Liliii de quo hic agimus. Idem horti [vt antè monuimus] hoc vocat Phalangium floribus maioribus proueniens in Sabaudia & Rhætia: de collect. ftirpium p. 91. Phalangitis maior montana. Iconem ni fallimur proponit Marth. pro Phalangio, nulla addita defcriptione, folum ait in montibus prouenire: ea icon non eft arificiofa, fed malè exprimens plantam quam intelligimus.

Camer. in Epit. Matth. omiffa Matth. icone pro Phalangio ponit iconem Phalangii ramofioris de quo antè.

Tabern. hift. Phalangium 4. Phalangium Marth. qui non defcripfit, licet diligenter perquifuerimus, neminem audiuimus vidiffe, dubitamus an vnuquam fuerit in rerum natura, exiftimamus nunquam vifum Marthiolo.

Lobel. & Pena Adu. Phalangium Marthiolo, pictum quidem non autem defcriptum ipfis, nec multis doctioribus vifum, fortè nec Marth.

Icon Dalechampii videtur non malè exprime re Phalangium Liliii flore: an autem id intelligat confiderandum. Præterea perquirendum, vbi Pena & Lobelius repræfentarint. Habet hift. Lugd. Iconem Marthioli.

Liliago Cordi (quod Thal Harc fcribit) aliquibus pro Phalangio habita cum potiùs quantum ad extremam faciem, aliquam fylu. Aphodeli speciem referat: licet radice bulbosa non conftet. Eius radices hodiè plurimis locis copiofe erantur, ac hinc inde pro veri Rufci radicibus *τὸ τοῦ Ρυφίου* diuenduntur, vnde multa Pharmacopolia non sine infigni errore eafdem pro Rufco reuendunt, cum tamen vtriusque radicem fapor vnulmodi non fit, hoc Medicos quofdam animaduertere oportebat: nec adeò temerè imperitis Herbariis & Pharmacopoeis plerisque fidere.

Nafcitur verò planta hæc copiofe circa Gerrodum, item inter Wernigerodam & Elbingero dam. Eius duæ species funt, Altera maior, folio longiore pauloque latiore, capitulo magis triquetro, in quo femina continentur etiam paulò maiora: Altera minor cui omnes partes funt minores, ftrictioraque folia. Nos exiftima-

PHALANGIUM FLORE LILII.

Defcriptio



Radix è multis fibris albis longis Phalangii & Ellebori radicibus fimilibus Liliorù modo gultu glutinofa: *folia* Phalangii: *caulis* cubitalis ac etiam minor, rotundus, læuis, non ramofus, in cuius fummitate prodire cernuntur ex breuibus pediculis flores magni duo, tresue vel

quatuor, paruis Liliis fimiles, eodem etiam odore grati, albi, vncias duas ferè longi, feminum *capiti* a fublonga.

Hanc repeti florentem Iunio an. 1561. in peregrinatione mea cù Gefn. in pratis môtis Septimi, Burmi propè Kafest: tunc denominaui Liliii vel Phalangii speciem, vt ad meam plantam ficcam,

C. Bauh.

Locus & tempus

nas priorem Liliaginea Thalii esse nostrum Phalangium flore Liliū : alteram minorem referimus ad Phalangium non ramofumū: iudicet alii, qui venient in Harcinia Saxonica.

Casp. Bauhin. Phyt. Phalangium r. siue magno flore, Matthioli & Dalechampii cuius figura melior. Phalangium q. siue non ramofumū, Cordo Liliago. Lobel. etiam Phalangium non ramofumū. Dux huius species altera maior, folio longiore, paulò latiore, capitulo triquetro, semine paulò maiore: altera minor, cui omnia minora & folia strictiora: Huius radices sæpè pro Ruscii veri radicibus, magno errore diuidentur. Idem apud Matthioli. Phalangium primum, & Phalangium non ramofumū: aliud magno, aliud paruo flore.

co iconem habet Cartami, qui postea traditur. Cord. Barbarus, Ruellius, Marcellus, & vetus interpres & Plinius culpa librariorum cap. de Croco, legendo *Dulcis* pro *Suis*, mortarium interpretantur male, cum Thuiam arborem intelligat. Cordo in historia, qui nomine Croci describit, Genueris figuram addit ex Tragi lib. 2. cap. 77. Casp. Bauhin. Phyt. Crocus primus siue satiuus.

Synonyma
linguar.

Tragus qui depingit & describit, vocari ait Hebræis *Kark*, teste Elia Leuita: Arabibus verò teste Scrapione *Sahasaran*. *Κεζκος* Diofeor. inter reiectancia à quibusdam *αζρορ*, *κωρδουσσ* & *αζρα* *ηρακλις*. *Crocus* & *Crocutum* Lat. Germ. *Saffran*. Belg. *Saffraen*, Gall. *safran*. It. *Zaffran*. Hisp. *azfran*, *Saffra*, *Azafraon*. Angl. *Saffran*.

Crocus nunc in plerisque Germaniæ locis plantari cepit, adeò feliciter, vt (teste Michael. Neand.) vrbibus Exotico non cedat. Nos, quidem Crocum colimus in horto E. C. copiosè alatum per Cincm *laques à salin* Milhusia, ei infesti sunt mares. Montepelii florentem reperi in cacumine montis *Esperon* plantatum mense Octobri: circa Aumionem propè Castellum Papæ vidi agros eo confitos. Basilea habent in hortis, Lugduni etiam & Patauii. Ferrariæ in monasterio S. Dominici à *l'Angeli*. Geneuæ copiosè passim in hortis colitur ac hyeme folia reseruat, radix eius bulbosa dulcis est. Hodie non solum regiones ad meridiem, Africa, Cyrene, Sicilia, Gallia, sed etiam ad Septentrionem fitæ Anglia, & Hibernia laudatissimum ferunt, quo Belgium, Germania, aliq; vicini cibos condiunt, ac medicamentis miscent. Matthiolus Crocum ex Aquila Vestinorum vrbe primum sibi locum vendicare in Italia scribit, eo tamen præstantiorem esse qui ex Vienna Austriæ metropoli defertur. Agellos integros Closterneuburgi, ac Cronenburgii, nonnullisque aliis in locis circa Viennam Austriæ Croco lasciuientes Ioannes Schvvab magna cum admiratione frequenter intuitus est. Crocum, inquit Theophr. tam montanum (quod inodorum est) quàm satiuum, Autumnio florere incipiunt: statim enim primis imbribus florent. *Et rursus*: serò floret, seròque germinat, aut præmaturè, vtro scilicet modo tempus acceperis: Floret quippe Vergiliatum occasu, paucisque diebus, confectim Vere cum folia quoque expellit, quinimò priùs: gaudet calcari, & melius ita euadit, radice attrita pede deorsum versus, idè iuxta semitas, fontèsq; pulcherrimum exit: satus radice fieri asolet. Hoc siccatum ad certum vsque temporis spatium reconditum, ac in ueteratum aere spirat odorem. Vnà enim & quantum humoris aquosi est, exhalatur, & alimenti cessat accessio.

Locus &
tempus.

Tempus

Cultura.

Hæc passim Theophrast. que Plin. lib. 21. cap. 6. ferè expressit, dicens: Crocum siluestre optimum: serere in Italia minimè expedit ad scrupula vsque singula areis decoquentibus. Seritur radice bulbosa. Satiuum latius, maiùsq; & nitidius, sed multò leuius degenerans. Sed nec vbi que fecundum, etiam Cyrenis, vbi semper flores laudatissimi. Prima nobilitas Cilicio, & ibi in Coryco monte: dein Lycio, monte Olympor mox Centuripino Sicilia. Aliqui verò Phlegæro (Aegæo, Turner.) secundum locum dedere. Adulteratur nihil æquè. Probatio synceri, si imposita manu crepat, (crepitat. CHERLER.) veluti fragile. Humidum etiam, quod eucni-

CROCUS.

CAP. V.

Crocus vbius orbe terrarum notissimum [satiuum intellige] at multa sanè mundi parte, quod natalem concernit verè exulè, accedim.

Constat hic bulbo dulci, Auellanae magnitudiue, multis fibris capillato: folia quinque aut octo, palmum aut etià dodrantem longa, admodum angusta, striata: caulis inter hæc oritur breuis, florem sustinens vnicum, Chelidici flori similem, ex foliis cæruleis constantem, in quorum medio sunt stamina aliquot flammei ruboris, valdè odorata.

Icones duas quas hic ponimus iam scilicet cimus. Bulbosi generis itaq; Crocus est tam sa-

tius, quàm siluestris. De hoc Theophrastus atque ex eo Plinius hæc prodidit. Crocumnaturà herbaceum modo prædictorum erupit, sed folio angusto ferè, namque in capillamenti modum exrenatur. Radix multa, carnosa, & in totum viuax. Theod. Dorst. pro Cig-



adulteratione, cedit [silet. Turn.] Altera probatio: si manu prolata ad ora, leuiter faciem oculisque mordeat. Et per se genus satiuu blandissimum vulgè, cum sit [quod sit. Dal.] medio candidum, dialucon vocant. Contra Cyrenaco vitium, quod omni croco nigrius est, & celerrimè marcescit. Optimū ubique quod pinguisimū, & breuibus capillis, breuis capilli. C. I. pessimum verò, quod situm redolet. Mutianus autor est, in Lycia anno septimo aut octauo transferri in locum subactum, atque ita degenerans renouari. Vfus eius in coronis nusquam. Herba enim est folio angusto pentem capillamenti modum. Sed vino mirè congruit, præcipue dulci, tritum ad theatra replenda. Floret Vergiliarum occasu paucis diebus, folioque florem expellit: Viret bruma & colligitur. Siccatur vmbra, meliùs etià hyberna. Carnosa & illi radix, viuaciorque quàm cæteris. Gaudet calcari, & atteri, percundoque meliùs prouenit [atteri pede quò meliùs M. atteri pede percundoque meliùs. Vet.] Ideò iuxta semitas ac fontes lætissimum.

Mirum igitur alicui videri possit (inquit Petr. Victorius) quod tradunt Veteres de cultu croci: cum aras nostro longè alia ratione serar. Quod Veteres de croci natura cultū, tradunt, magnoperè discrepat à consuetudine nostri temporis: curaque, quàm nunc in eo tuendo rustici homines adhibent: illi namque, si fidem habemus iis, qui de agri consuetudine scripserunt, loca vbi lererent eligebant pressa vestigijs hominum: arbitrabanturque quanto magis lolum tereretur, tanto meliùs prouenire: nunc verò nihil tam inimicū putat, quàm pedibus terram eam calcari: summoque studio inde, & belluas & homines arcent. Plinius quoque id relictus est, locum verrens Theophrasti è 6. lib. de iis, que oriuntur è terra: inquit enim, Gaudet calcari & atteri pede: percundoque meliùs prouenit, ideò iuxta semitas lætissimum. Græci etiam scriptoris verba hæc sunt. Quibus diligenter animaduertis ratio etiam, qua Plinius in vertendis sententijs Græcorum vtebatur, intelligitur. *quæ dicitur hæc περὶ τῆς κροκίης καὶ τῆς κροκίης καὶ τῆς κροκίης καὶ τῆς κροκίης* quod enim Theoph. inquit lætiorer fieri, si conculetur radice terra obruta, ipse reddidit, rem augens, vel potiùs ludere in hoc volens: percundoque meliùs prouenit: hoc enim potius incredibile est, fierique non potest: quod enim perit, perditur, ne dum melius fiat. Vnde Theodorus, qui reliqua verba Plinii expressit in hoc rectè eum secutus non est: sed ait. Et melius ita euadit: radice attrita pede inferiùs. Præterea etiam illie *ἐν τοῖς κροκίῃς*, iuxta fontes vertit quia solitum propè fontes solidum ac durum: pedibus namque haurientium aquam animique causa illie degentium, calcatur ac premitur. *κροκίῃς* verò loca vocantur, que pedibus saltantium pullantur, atque ita induriscunt: hoc autem videtur Lucretius intellexisse cum inquit.

Principio pars terræ nonnulla perusta.

Solibus ofiduis: multis pulsata pedum vi,
& quæ sequuntur.

Crocus (vt legitur apud Cresc.) duplex est scilicet syluestris, qui seritur sicut alia herba & est modicæ utilitatis: Item est bonus crocus domesticus, qui non seritur, quia semina non producit, sed cepula eius colliguntur mense Aprili vel Maio, & dimittuntur octo diebus in acruo vt maturentur, & tunc mundantur & siccantur in lo-

7 lin not.

Cultus.

eo calido non tamen ad Solem, ne vequantur, cum sint maturæ, quod cognoscitur, quia tunc folia eorum sunt sicca, & seruantur vsque ad mensem Augusti, & tunc vel ante aut post vnâ separata ab alia in areis pastinatis plantentur cum radicibus, quas habent, per vnâ spânam distantes quatuor digitis submergantur in saleis, vel duobus vel tribus annis dimittantur, & quolibet anno mense Aprili si fuerint tunc folia sicca, & mense Maio, Junio, Julio, si herba nascitur, in areis immittantur, superando terram per totam superficiem per duos digitos deorsum, vt non tangantur Cepæ. Et si plantantur circa finem Augusti, aut mense Septembri, raditur terra, vt area ab omni humiditate seu vitiditate mundetur, deinde nascentibus floribus colligantur, & crocus siccus siccatur ad lentum ignem, & aliquo loco clauso fuerit: & elapsis duobus vel tribus annis totus euellatur mense Aprili, & iterum plantetur, vt dixi. Terram desiderat cretosam vel mediocrem, & potest etiam quamoptimè plantari, vbi fuerint Cepæ, vbi sunt euulsa. Et est sciendum quod crocus non multum læditur vmbra, sed plurimum læditur à muribus, & talpis quæ sub terra corrodunt cepas eius, plantatur igitur Crocus viui radicibus, iuxta Constantini agriculturam, quum florem abiecerit. Florem autem priùs remittit quàm folium. Flos colligitur vbi bonum colorem indeptus fuerit, cupidibus ex medio flore extractis, & ad triduum aut quadriduum perfrigeratis ac siccatis, deinde summa eius pars purgatur, & album quidem admittit. Componitur in vasis quantum fieri potest obruratis. Diophanes in vmbra Crocum perfrigerandum ac assiccandum esse tradit.

Diofcoride eligitur optimus in medico vsu, Coryceus, recens & boni coloris, qui parum de candido in circulo habet, & longus est, integer, non fractus, cui nihil desit, plenus, dum diluitur manus tingens, non cariem aut situm tedolens, sed in odore imitans, & acris. Qui enim talis non est, aut verustus est, aut madefactus. Secundum locum obtinet qui extra Corycum ad Lyciam nascitur, & qui Lyciaco Olympo. Deinde qui ex Aegibus Aetolix vrbe affertur. At Cyrenæicus, & Centuripinus omnium in Sicilia nascentium debilissimus est viribus: quum omnia eius genera sint oleracea. Attramen ob succi abundantiam, & coloris præstantiam, qui in Italia Thyiam tingunt, hoc vtuntur: Et propterea magno venditur. Verùm ad medicamenta præscriptus commodus est. Adulteratur autem Cromagnatis cõtusi ammixtione, aut sapa subtili: contrita simul ad ponderis grauitatem addendam argenti spuma, aut plumbagine. Indicat autem hæc tuæ puluis inhaerens, tum sapa odor. Opera verò & inentas ex Thyix ligno, croco centuripino tinctas fuisse, mihi [inquit Cornar.] verum ille sit. Quamquam mirum sit Plinium eius rei nullam fecisse mentionem. Tamen verò lignum per se adèd crispum, croco tinctum insipet fuisse ambigi possit, tamen coloris flaui indicendi gratia fieri potuit, vt croco tingetur. Hoc enim probabilius est, quàm quod ad mortaria tingenda Croco in Italia vsi fuerint, quod volunt hi qui hoc loco *buixar* vocem, pro *buixar* legunt, At verò qui Plinium vidēt dicere, Crocum tritum & ad theatra replenda hi iam pro *buixar* legendum esse *buixar* contendunt, & Diofcoridem, idem quod Plinium dixisse, nimirum

in per theatra replenda, *in Sicut ad hunc* intelligentes. Ego vero velut dixi *Sicut* lego, & de thymo ligno accipio. Cæterum Sepaliarii Crocum perpetuò subterranis, ac per hoc humectis locis feruant, quò ponderosius fiat, maiùsque iucum inde sibi comparent. Crocus, quem & Sapor & odor commendat, quique concoctione iuuat, non Medicis solum Officinis, sed etiam culinis ad obsonia colore iucundo tingenda plurimum expeditur.

Crocus aut. Dioscor. vim habet concoquendi, molliendi, leniter adstringendi, vrinam ciendi: & colorem bonum induci: & crapulam arceret, si cum passio bibatur. Fluxum etiam oculorum sistit illitus cum lacte muliebris. Miscetur etiam vtiliter potionibus ad internas affectiones. In pefos quoque & cataplasmata ad vterum, & ad sedem additur. Sed & Venetrem stimulat, & inflammationes ignis sacri illitus mitigat, & in compositiones auriculares commodus est. Tradunt porò ipsam etiam occidendi vim habere, si cum aqua pondere trium drachmarum bibatur. Quò verò facillè conceri possit, in calido siccili ad Solem siccare (*Αψχεν* Bas. cod. *Επαδεν* Dal. quia tñ odorem retinet Corn. in emb.) ipsam oportet, & celeriter versare, sed & radix ipsa cum passio pota vrinam mouet.

Hæc & alia quædam profudit Plinius. Discutit inflammationes omnes quidem, sed oculorù maximè ex suo illitus. Vulvarum quoque strangulatus, stomachi exulcerationes, pectoris & renum, iecinotis, pulmonum, vesicatumque, peculiariter inflammationi earum vehementer vtile: item tussi & pleuriticis. Tollit & pruritus, vrinam ciat. Qui Crocum priùs biberint, crapulam non sentiunt. Ebrietati eo resistunt. Coronæ quoque ex eo mulcent ebrietatem. Somnum facit. Caput leniter mouet. Venetrem stimulat. Flos eius igni sacro illinitur cum creta Cimolia. Ipsu plurimis medicaminibus miscetur.

Crocus, inquit Galenus, paulùm quid adstringens habet, quod terream frigidùmque est: sed superat in eo calfaciens & qualitas, & facultas, vt tota eius essentia secundi sit ordinis exalfacientium, & primi exficantium. Quare concoquendi vim quandam obrinet, adiuuante scilicet in hoc pauca illa adstrictione: quippe quibus medicamentis, cum non admodum exalfaciant, pauca adest adstricção, ea parum facultatem habent essentis emplasticis vocatis, quas cum iunctas esse caliditatis non vehementi contigerit, *πυρρετες*, hoc est, concoquentes esse ostendimus.

Scribit Auicenna Crocum Cephalalgiam excitare, & capiti nocere. Id quod non exiguo, sed nimio vsu efficere potest. Vigiliis enim copiosius inducit, quæ modum excedentes capiti & sensibus obstruit. Moderatus autem Croci vsus cerebro prodest, sensus vegetiores reddit, somnũ & torporem excutit, lætitiã gignit, corroborat cor. Thoracis crudos humores ad cõcoctionem perducit, pulmones aperit, & ab obstructione liberat: & ad hæc tam efficax est remediũ, vt subinde phthisicis in sumo vitæ discrimine, & propemodum animam agentibus, spiritum reducat, & vitam aliquot dies proroget: scrupuli dimidiũ, aut ad summũ integri podo, cum passio, aut vino dulci propinatus. Quo etiam modo grauissimas subito irruentes dyspnæas citra febrem statim & momento temporis tollere experimẽto compertum est. Laudatur ad hepatis & fellis

obstructiones, & ad regium morbum. Croci stammina trita carpis, aut sub mammis adnota illitæ, vires suas Cordi cerebròque illicò transfunt, quasique vertiginem tenebricosam inuehunt, aciem oculorum præstringunt, aut hebetant.

Scribit Serapio ex auctoritate Rhazis Crocũ drachmarum duarum pondere partum accelerare, maximèque inebriare, si cum vino miscetur: actantã lætitiã parere, vt ex nimia lætita insaniam gignat. Quod experimento confirmat Amatus Lusit. afferens se mercatorem *visisse*, qui cum in ollam in qua carnes coquebantur, multũm Croci inieciisset, post earum esum, in tam profusum visum erupit, vt parum absterit quin risu nimio & cachinno è vita excesserit.

Ex Serapio

His addenda Symeonis Sethi auctoritas. Crocus stomacho bonus est, inquit, ciborũque cõcoctionem efficit. Obstructiones tollit. Pituitosa & lethargica vitia iuuat. Discutiendi quoque vim obrinet, viceribus vtilis est, & ad spiritus difficultatem conducit. Si qui illo mediocriter vtatur, bonum colorem habet: sin verò vlta modum, pallorem contrahet, & capitis dolorem, cibique inappentiam faciet. Cum opio & lacte & rosacea pedum doloribus impositus vbi dolent, summo perè prodest, superpositis Betæ foliis. Cum porò Dioscor. Crocum ad inflammationes valere allerit: considerandum Crocum concoctoriam & exalfacientem vim habere, & non nisi tranfacto inflammationis initio commodè adhiberi.

Ex S. Serbi

Causis

Hic aded est thoracis [inquit Camer. horti] affectibus amicus, vt sint qui ad 3s. atque etiam vnum, cum dimidio molci grano, & vino optimo calido propinando, asthmaticos curauerint. Ad respirationem ex nimio frigore prohibitam, eodem modo plurimum conducit. Huius extractũ ritè preparatum in minima copia datum per os, difficilem partum promouet, corroborando imprimis vires grauidæ & fetus.

Crocus (vt confirmat Tragus) cordi conducit, ideòque quibusvis eius affectionibus auxiliatur, sanguinem purgat, veneno aduersatur: quãobrem haud immeritò aduersus pestem vsurpatur. Quidam Crocum in occlusa Ovi testa cum Theriaca & Sinapi, aliisque speciebus igne coquant, & ex illis demum hoc pacto tostis electuarium consiciunt, quod ad internam faciat pestem, venenũque, per sudorem exigat. Crocus in cibo aut potionibus vsurpatus, vrinam cit, & morbum regium, ac menfes mulierum educit, trahitque. Hæc radix Croci cum vino Apiano, aut alio quouis dulci efficacius præstat. Crocus paralyticis membris ac induratis neruis apprimè confert: quare Oxyroceum emplastrum ex Croco conficitur, ad emolliendam duritiem neruorum accommodatissimum.

Infantibus, scribit Matth. perpetuò euulnatis, neque surgere queuntibus, arenulãque mentibus, pauxillum datur Croci cum lacte. Si verò iidem se ostenderint, nihil præstãtius quàm si Croci integri nõnihil tamdiu in aceto infudatur quoad eius colorem cõtraxerit, idque acetum bibatur. Si quis apoplexia correptus fuerit, aut lethargo & aponia, Crocus cum aceto acerrimo & Castorio miscetur, in quo intincta pluma natibus indatur ex graui enim stupore excitat. Ex floribus nondum decerptis staminibus, exstillatur aqua, quæ duabus à cœna horis assumpta, somnum conciliat (Camerarius ad eum locum an-

notat, esse qui è floribus, post adempta semina, eliciant eam aquam, cuius summa dosis sit iii. Crocus cum lixiuo & oleo oliuarum mistus, calidè applicatus, cõfert in tumoribus vbi metuitur gangræna: ad quam singulare remedium est emplastrum ex Lupinis in lixiuo & vino albo coctis, addito tandem Croco. Stamina omnem mitigant calidum tumorem, cum oui albumine, & vitello imposta. Serum ex Croci floribus capiti circumpositum, somnum inducit. Calidæ podagræ dolores immensos lenit Crocus cum lacte, oleo rosato & pauco Apio simul mixtis. Auic. cephalalgiam facere scribit, & capiti nocere: id quod non exiguo, ait Dodonæus, sed nimio suo vsu efficere potest. Vigiliis siquidem copiosior inducir, quæ modum excedentes capiti & sensibus obsunt: moderatus autem Croci vsus cerebro prodest, sensus vegetiores reddit, somnum & torporem exurit, lætitiã gignit: corroborat quoque Crocus cor, thoracis crudos humores ad coactionem perducit, pulmones aperit, & ab obstructione expedit, & ad hæc tam efficax remedium, vt subinde phthisicis in summo vitæ discrimine, & propemodum animam agentibus, spiritus reducat, & vitam ad aliquot dies proroget, scriptuli dimidii, aur ad limum integri pondo, cum Pisto aut vino Præmnio, vel alio dulci, exhibitus: quo modo etiam datus, grauisimas subito irruentes, citrà febrim, dyspnoeas, statim & momento temporis tollere, non semel à nobis compertum est. Laudatur ad heparis & fellis obstructiones, nec non ad regium morbum atque hinc bonum colorem. Crocum efficit Diof. scribit: additur eodem autore ad omnes quæ interancorum causa temperantur potiones: sed nostra ætate ad eas potissimum, quæ menses, factus, & secundas educunt, oculos ab ecchymatis & exanthematis cum lacte, aur Foeniculi, Rosarumque liquore præferat illitus, & humorum in eos fluxiones reprimat.

Aduersar. Affirmant Aduersaria, Croci stamina trita carpis aut sub mammis adnotata, illitæ, vires suas cordi cerebroque illicè transmittere, quasi que vertiginem tenebrosam inuehere, aciem oculorum perstringere aut hebetare.

Gesneri. Crocum. Croci parum iusculis in melancholica passione miscet Gesn. Dicamus urgente negotio quadam vt ex præscripto Diof. ad Crocinũ vnguentũ præparandum spissabis antea oleum, velut de Sufino dictum est, eo pondere & mensura: & acceptis olei ad Sufinum spissati libris tribus & dimidia, immittito Croci drachmas octo, & sæpè per diem commouero, ita vt hoc assidue facias ad quintam vsque diem. Sexta verò oleum de Croco purè defundito, & ad eundem Crocum olei mensuram vnã affundito, & ad triduum commouero. Deinde ad defusum myrrhæ contusæ & cribratæ drachmas quadraginta ammisceto, & in mortario commodè moueto, & sic reponito. Quidam oleo ad Cyprinum aromatis imbuto, etiam ad Crocinum vtuntur. Optimum ex ipso est quod abundè Crocum spirat, quod sanè ad vsum medicum expetitur. Secundum locum obtinet quod myrrham redolet. Vim habet calefaciendi & somnum inducendi. Vnde sæpè phreniticis conuenit, si ex eo irrigentur, aur ipsum olfaciant, aur etiam naribus illinant. Gignit item pus, & vlcera purgat. Facit etiam ad vteri duritias, & conclusiones, ad vlcera in ipso maligna, cum cera & medulla, & duplo oleo. Concoquit enim & mollit, & humectat, & mitigat. Fa-

cit & ad glaucomata oculorum, si cum aqua sublinææ. Proportionem verò cum ipso habet, & id quod Butyrium appellatur, & Onychinum, & Styracinum, vt quæ nominibus solum differant, verum præparandi modo & viribus similia sunt. In Crocino (inquit Cornar.) nihil est quod aliquid morari possit, si nostram translationem cum Græcis diligenter conferat. Quod dixi secundum locum obtinet id quod myrrham redolet, *τὸ τὸ αὐτὸν μυρρῶδες*, in Græcis legitur: quod similitudinem significat, sed non aliam quàm odoris, vt ego puto: quum antea oprimum spirare Crocum dixerit. Nam si quis Myrrham referre dicit, obsecrum relinquit quæ in se similitudo illa posita sit. Et potest etiam hæc locutio inter eas referri, quas Galenus in propriis in Dioscoride deprehendit. Paulus alium Crocini parandi modum habet, sed exemplaria Græca eo loco & corrupta sunt, & transposita. Nos autem in nostra Pauli translatione omnia in iustum locum restitimus, & in Dolabellis nostris in eundem omnium rationem reddidimus. Quod porò ad finem dicit, cum Crocino eandem vim & præparandi modum habere Butyrium & Onychinum & Styracinum: de Butyrino quidem facile creditur est, itemque de Styracino: & ex appellationibus etiã aliquo modo constat: & de Styracino quoque infra Diof. in Styrace repetit: sed de Onychino ambiguum penitus est, &c.

Diof. similiter, Crocomagna facit ex Crocino vnguento aromatis expressis & efformatis. Est autem bonum id quod odoratum est, moderate myrrham redolens, græue, nigrum, non lignosum, dum diluitur croci colorem abundè referens, læue, subamarum, & quod dentes ac linguam vehementer ringit, colore ad multas horas durante. Tale verò est quod à Syria affertur. Vim habet extergendi ea quæ pupillis tenebras offundunt, vrinam ciendi, molliendi, concoquendi, calefaciendi. Croci viribus aliquo modo respõdet, plurimã enim de ipso parte obtinet. Crocomagna Diof. ex Crocini vnguenti aromatis extimit [ait idem Cornar.] & in massis siue pastillis: efformat. Alia verò est Crocomagnatis præparatio, quam Democritus verbis conscriptam, Galen. lib. 2. Antid. recenset: & Aëcius lib. 2. cap. 6. cap. 50. habet, constans ex Croci drachmis centum, myrrhæ Tragodyticæ, rosarum siccarum, amyli, gummi, singulorum drachmis quinquaginta, teruntur hæc cum vino, & efformantur in pastillos, qui in vmbra siccati in vsum veniunt, & ad capitis dolore temporibus illinuntur. Et in aliorum quoque Pharmacorũ præparaciones miscetur. Galenus quoque lib. 2. cap. 2. *κρόκινον* in capitis ex febris dolore: Illinenda est frons, inquit, ex cyphi in frigidioribus, ex Crocomagnare in calidioribus. Hippocrates Crocomagma etiam *κροκίνα* appellat in libro De sterilibus.

CROCUS VERNVS LATIFOLIUS ALBO
flore interdum purpurascens venis vario.
Alius flore purpureo minore.


IN post. Hist. Clusius sub titulo Croci verni latifolii albo flore hanc tradit descriptionem. Latifolii Croci prima species, terna & quaterna interdum habet folia latiuscula & breuia, duabus albis venis per eorum longitudinem subtus excurrentibus prædita, inter quæ prodest è membrana flos breui pediculo nitens, sex foliis constans

flans albis, imâ parte cum pediculo purpurascē-
tibus, & in medioculio stamina, cum breui trifi-
do stilo continens: radix bulbosa, candida, tenui
cortice amicta, fibrisque candicantibus in-
firmâ sede prædita. Nulla inter reliquas Croci
vernæ species, hæc magis fecunda in edenda fo-
bole. Eius verò flos interdum variat: nam ter-
na illa exteriora folia, nonnunquam purpurascē-
tibus venis sunt aspersa, interdum foli foliotum



mucrones pur-
purascunt, ali-
quando etiam
purpureus ra-
dius omnia
folia secundâ
longitudinem
media fecat.

Crocum au-
tem vernum
latifoliū purp.
flore minore
sic describit.
Similibus est
foliis latifolio
albo, paulò ta-
men angustio-
ribus, inter fo-
lia promens è
membranaceo
inuolucro, e-
iusdem ma-
gnitudinis flo-
rem breui pe-
diculo innitē-
tem, sex foliis
constantem
violaceâ ad
cæruleum ten-
dentis purpu-
ræ colore, vn-
guibus & sū-
mo pediculo
saturatiore
purpura nitē-
tibus: radix al-
teri similis, &
in edenda fo-
bole satis fec-
unda inter-
dum. Nonnū-
quam, sed val-
de raro, fert
vtraque hæc
rotundū exal-
bidum semen
in triangulo
capitulo.



Primæ, secundæ, & quattæ (de quo paulò post)
specierum meminit Iol. Simlerus in Heluetiæ
descriptione, atque istic in montanis inueniri,
colore purpureo candido, & vtroque mixto: *Sue-*
tricc vulgò vocari, & à Iuræ montis incolis (apud
quos in supremo iugo etiam nascuntur) *Leffrati*:
addit radicem suisbus esse gratam.

Audio & in Baldo monte agri Veronenfis pro-
uenire. Nonnulli primum genus Crocum vernū
ob foliorum & floris cum legitimo Croco simi-
litudinem vocant: Græcè *κροκός* *κροκός* dici pos-
set: alii Crocum montanum appellare malunt,
(aliud tamen montanum Crocum postea dabi-
mus) Turcæ *Zafran* vocant Crocum, & voces
addunt *ak, mor, sari*, quàm album, violaceum, fla-

Tom. II.

uum colorem exprimere voluit.

Croci silu. verni etia obseruauit genera Dale-
champ. *Primum* minimum radice bulbosa, exi-
gua, rotunda, multiplici cortice vestita, infernè
Cepæ modo fibrata: cauliculo dodrantali duo-
bus latiusculis foliis obuolato, vsque ad floris
exortum ferè ascendentibus, quatuor insuper,
aut quinque foliis ex lateribus vtrinque enatis,
oblongis, angustis, linea candida quæ media in-
terfecat, diuitis: flore Croci hortensis, paruo, su-
pernè purpureo, infernè flauescente, extantibus
in medio staminibus crocicis. *Secundum* priori
in multis simile est, in quibusdam diuersum: nē-
pe quòd radice sit amphore, ac densius fibrata:
caule proceriore, grandiore, crassiusculo: flore
maiore & latiore. *Tertium* radice est gemina,
Gladioli modo, læuiore, integriore, minùsque la-
cero cortice obducta, parùm fibrata: foliis qua-
tuor, aut quinque, longissimis, sed angustissimis,
linea media candidissima distinctis: caule foliis
vacuo, recto: flore media sui parte purpura ni-
tente, suprâ & infrâ candido, interdum prorsus
albo. Crocus siluestris in plerisque Galliæ locis,
sed in Allobrogibus potissimum nascitur, præ-
sertim primus & tertius in niuosis montibus, ter-
ra nigra & pingui. Liguatâ niue, & sub finem
Maii flerem & folia statim promunt. Hanc ob
causam opinatur Clusij appellandum Crocum
Vernum, quòd flore sit Croci. Vetrèque floreat.
Tres quoque figuras habet Dalechampius, & de-
scriptiones, nos priorem & tertiam accipimus,
secunda minùs placet, quare ex nostris ficcis v-
nam cum latioribus foliis.

Crocum sanè montanum silu. obseruauit Bur-
mii Rhetorum cum flore ac etiam semine Iunio. Locus;
Genere etiam cum essem reperi Iulij principio
in monte Thuyri, verum iam deflorerat & ade-
rat semen: transuleram in hortum, nos autem il-
lud describere negleximus, purpureum colorem
in ficcis animaduertimus:

Croci mei vbi primum crumpunt cum flore,
quidam extra terram, vix per quatuor vncias ex-
tant, vnciarum ferè duarum inter folia herbacea
qui interdum ea superant, in flore sex folia &
apices lutei, quos non animaduerti extra florem
eminere vt demonstrat figura Dalechampii, flos
desinit in capitulum ex breui & vnciarum duarū
aut trium pediculo tenui, in quo semina: folia
herbacea tantum terna, angusta, Croci: quæ su-
perant florem, & potissimum vbi incipit euane-
scere, & tandem ita excresecunt vt palmum exce-
dant, & latiora euadant multò quàm in hortens-
is. Pictor noster perperam pinxit quatuor folia
pro tribus: membranæ aliquot tenues late am-
biunt simul pediculum floris & foliorum prin-
cipia, quæ exprimuntur in figura Dalechampii:
membranæ etiam alia tunica amplectitur cau-
liculum floris, ad cuius initium vsque, nec pe-
diculus ita nudus est, vt pingit noster pictor, qui
per negligentiam eam omittit: radices plerūm-
que duplices, vt in Gladiolo, tunicis reticulatis
tegentur, subsunt deinde capillares radiculæ.
Cur Prater Phyt. separat Clusij vernum maiorem
tertium à Lobelii Violaceo toto nondum ani-
maduertere possum.

Gesner. hort. Crocus silu. flore candido pul-
chro proficiente sub finem Februarii.

An Camer. hort. Crocus vernus purpureus.
Et apud Matthiol. Germ. Reperiuntur aliquot
species Croci silu. potiss. in altis montibus, flori-
bus albis purpurascētib; aut cæruleis [flam:]
vt plurimum Vere floreat, in Iurâ monte dicunt.

C. B. n. s.

tur *Leffrat*, in aliis motibus Helueticis *butreiff*.
 Sæpius mixatur Clusio se, nec in Aultriacis,
 nec in Styriacis, neque etiam in Pannonicis mō-
 tibus, vllum Croci verno tempore perlustrarit, quum
 Helueticæ Alpes, illis etiam frigidiores, aliquot
 eius genera sponte alant.

Vires &
 Vfus.

Croci siluest. montani flore albo radice foris
 duntaxat quidam vtendum censent, tam Clusio,
 quàm Lobel. testibus, intus non perinde: illitus
 ubi vrinas elicit crebras atque crassas, tumores
 Hydropicorum discutit, spicula euellit. Isto agre-
 sti facilius abigeret è suis interulis pediculos Gēs
 Hibernica, nam virosior est, & penetrantior. Ve-
 rum vulgatiōr præterquamquod Hibernis mise-
 ris tam impòrrunos hospites, quietis & famis ho-
 stes abigit, etiam colorem floridum, vegetumque
 calorem, vigorem, & animorum ferocitatem ar-
 rubus & alit & auget, illuicque fordidas vestes
 colore commendat, militiæ idcirco non parum
 conducibilis.

CROCVS VERNVS LATIFOLIVS
 perpetuus flore maiore.

Perelegans Clusio in post. hist. Croci verno
 tempore florentis Tertia species latifolia pur-
 pur. flore maiore, quam ei mittebat Doctiss. vir
 Ferdinandus Imperator. Eius verò iam marcidis,
 & dudum terrâ eruti bulbum vnicum accipiebat,
 qui sequente Vere folia quidem protulit, sed nul-
 lum florem. Lugduni porò Batauorum, cum aliis
 Croci verni latifolii speciebus *florem* dedit, illis
 formâ similem, hoc est, sex foliis constantem,
 quorum externa tria paulò longiora, interna tria
 breuiora amplectuntur, multò ramen ampliora
 quàm in secunda specie, licet illis colore nec val-
 de disparia. nec iniucundi odoris, tria *stamina* cō-
 rinentem alba, magnis flauis *apicibus* prædita, &
 inter illa *stylum* paulò longiorem, extrinâ parte
 in tres quasi tubulos laxiores diuisum, aurei colo-
 ris: cum flore, è membranaceo, instar reliquorū,
 in uolucro prodeunte, ex eunt terna, aut quaterna
folia, proximè descripti foliis nō dissimilia, paulò
 tamen longiora: *radix* bulbosa: superiore maior, &
 ad Quintæ speciei radicis amplitudinē accedens.

CROCVS VERNVS ALBVS, CÆRVLEIS
 oris in latere folii, Lobelio: & Crocus
 vernus latif. albo versicolore
 flore primus Clusio.

Descriptio

Lob. Obs. & Ic. Pl. Crocus vernus albus 1. cærv-
 leis oris spatris in latere folii: ex Italia D.
 Bracionus accepit. Hist. Lugd. figuram habet sub
 Croco serotino Lobelii. C. B. Phyt. Crocus 6. siue
 Alpinus vernalis triphyllus, Lobelii albus. 2.
 Croci verni latifolii albi, versicolore flore primi
folia Croci satini & legitimi folia satis referunt,
 nisi breuiora essent: inter quæ bini aut terni pro-
 deunt *flores*, primæ & secundæ speciei floribus
 maiores, sex foliis mucronatis constantes, quo-
 rum terna exteriora (quæ pallida sunt foris) tri-
 bus radiis ex arto purpurascensibus, ab infima ba-
 si ad extremum folium ductis striata, internè al-
 ba sunt, vt & tota interna tria folia, *stamina* que in
 meditullio habent Croco mentano similia, sed
 magis pallentem *stylum*: liberaliùs hæc *femen*
 præbet in triangulis capitibus, rotundum, ex ru-



Id pōst, sub Croco verno latifolio albo versicolo-
 lore secundo simplici.

CROCVS VERNVS LATIFOLIVS
 albo versicolore flore 2. sim-
 plici & duplici.



etiam duodenis, illiusque iconem ad me mitte-
 bat, peculiare genus esse existimans: sed infe-
 quente anno simplicem sex foliorum florem
 tulit.

Clusius habet in post. hist. Iconem Lob. ex Plan-
 tini iconibus p. 139. quæ in tabella præcedenti,
 nobis paulò antè posita sub Croco verno albo &
 noratur II. Clus. præterea aliam iconem habet,
 cui titulus Crocus vernus latif. duplici flore.

An Lobel. Obs. Crocus silv. albus duplex ma-
 ior & minor. Flores illis albis, purpureis, viola-
 ceis lineis striati, quos ex Italia præclarus vir
 Bracionus accepit. Pagina verò sequenti & Ic.
 Pl. p. 139. Crocus silv. 5 purpureus, obfoletus, pullis
 lineis striatus, quem D. Bracion Alphonf. Pantii
 Ferr. munere alit, supra figuram, Crocus vernus
 serotinus 1. flore purpureo rubente, violaceis li-
 neis striatus.

Hist. Lugd. Crocus serotinus Lobelii. C. Bauh.
 Phyt.

fo candicans:
radix superio-
 ribus similis,
 foris mem-
 branâ fuscâ
 obductâ, fi-
 bris infima se-
 de donata, &
 intus alba.

Clusium in-
 telligere eun-
 dem Crocum
 cum Lobelio
 asserere non
 audemus: ean-
 dem iconem
 habet, quæ à
 nobis in no-
 stra tabella
 notata est I.
 de altera ico-
 ne notata II.
 agemus pau-
 lo.

Q Varro Def

Croco
 (inquit Clu-
 sius) verno la-
 tifolio albo
 flore similem,
 sed per omnia
 minorem, antè
 multos annos
 in Belgicam
 nobis mitte-
 bat C. V. Al-
 phonfus Pantii
 Ducis Ferrar.
 Med. cuius *florem*
 interdum o-
 cronis & de-
 nis foliis præ-
 ditum habui.
 Jac. Plateau

LIBER XIX.

Phyt. Crocus 3. siue Alpinus Vernalis purpureo violaceus 1. Lobel. Vernus ferotinus 3. reperitur flore purpureo, aurco & vario. An Camer. horri Crocus vernus flore vario:

quod florem proferret saturatissimâ purpurâ nitentem, quem, vt pote magis ferotinum, conspiciere illi non licuisset.

CROCUS VERNUS PURPUREUS
striis virgato flore.

CROCUS VERNUS LATIF. PURPUREUS
verficolore flore.



Folia ex radice bulbosa statim promit, aliquot nonnihil repanda distantia & longiora, culmo angustiora, rigidula; *semina* in cacumen desinentia, sulco candidante aduersa parte exarata, marginibus vitidantibus. Sulco auersa parte respondet poica elatior nitidi vitoris,



Crocus verni quinta species Clus. Hist. post. siue Crocus vernus latifol. purpureo verficolore flore, quem Alphonus Patris mittibat, florem iam marcidum adhuc retinentem, & semen in triangulo capite maturum, ex quo mihi natae plantae, quae tertio anno flores proferre coeperit: sunt vero in superioribus ampliores, ad tertiam speciei florum magnitudinem proximè accedentes, sex etiam foliis praediti, quorum externa tria foris ex candido, quodammodo purpurascunt, & saturatissime, quaeque atra purpurea, tribus vel etiam quinque lineis ab infima parte sursum ascendentibus insignita sunt, internè purpurascunt, interiora vero tria, vel diluorioris, vel saturatioris purpurei sunt coloris, circa vngues tamen, similibus, vt exteriora, radiis insignita: *semen* in triangulis capitibus subfuscum: *folia* superioribus speciebus longiora & latiora, Tertiae foliis non valde abimilia, duabus etiam albis lineis sebris distincta: *radix* paulò amplior: huius florem etiam octonis foliis interdum luxuriantem habui quatuor videlicet internis, totidem externis.

à qua deuxa caniculata latera colore ferè sunt glayco: inter hæc emergūt, mox à radice *pediculi* palmares & latiores, teneri, infirmi, maiore parte cãdidi, candidã membranã vaginã diuoluti, superiore parte albis purpureisque striis distincti: *singuli florem* vnum sustinentes fragrantis odoris, nudum, spiculum antequam explicetur amulantem, foliis constat lenis, vncialibus, acuminatis, quorum extrema tria complexu suo, reliqua in occulto flore occultant, colore intus albicante, foris striis purpureis, pallidè flauescuntibus & albis pulcherrimè virgata: tria verò reliqua, coloris intus forisque sunt diluorioris violacei, excepto vngue saturatae violae externa parte conspicuo: medium obsident tres fibræ puluisculo flauo respersæ, auicula linguam imitate, *stamina* ambientes totidem saturati crocci coloris.

In icone Clusii non apparent lineæ sursum ascendentes.

In horto Ill. E. C. Montbelg. licuit in huius foliis lusum obseruare: siquidem extrema illa striata floris folia, vna aut alterã profunda cæsura per margines dissecta ani maducitimus: pronenerat autem ex bulbis à Genero Cherlero Romã delatis, florèbat circa finem Februarii & principium Martii.

CROCI VERNI TRES SPECIES, FLAVA
aurca & pallida.

De hoc fortè Clus. post. hist. Ioach. Iungermanus C. V. Ioach. Camer. ex forore nepos mihi scribebat in herbatiõne, quam Comite Iosepho de Casa buona Sereniis. Ducis Flor. simpliciãta vt vocant ad Tirrheni maris littora instituerat, tres Croci verni differentias inuenisset. Ex iis elegantiorẽ, vel albicantes, vel purpurascences flores proferre, quorum exteriora terna folia crassiores qualdam venas purpurã saturã infectas haberent, quæ mirum flori decorem adderent. Reliquas duas maiores esse, Croco latiuo non inferiores, & vtriq; florem purpureum: sed in vna Colchici floris instar dilutum, in altera à Croci legitimi flore parum diuersum. Addebat, Iosephum admonuisse, aliud elegantissimum genus galci in iisdem pratis circa Liburni portum, Tom. II.

Crocus verni Mœsiaci latifolii flore flauo, ad quintã speciei folia valdè accedentia, longiora tamen & circa exortum latiora, binis candidis venis secundum medium neruum per longitudinem excurrentibus, vt in reliquis Croci speciebus, quæ emergere incipientia, *florem* sinul ostendunt, sex foliis, dum explicatus est, constantem, exterioribus mucronatis, internis paululũ orbiculatis, flauicoloris, vtriusque odoratum, tria longiuscula latiusculaque *stamina* dilutiùs flauescencia, intus continentem, & longiore stylum summo fastigio in tria stamina diuisum, satiuo Croci staminibus penè concolorem: cui succedit, vt in superiore Croci verni specie, membranaceum triangulare *capitulum*, rotundo rufosq; *semine* plenum: *radix* cum superioris radice conuenit, vel etiam maior est.

solida, aliquot candicantibus fibris, sessili parte donata, & aliquot tunicis obvoluta: binos plerumque, ternos aut quaternos, vel etiam plures profert flores: nulla enim Croci verni species hac liberalior in producendis floribus.

Croci verni latif. aureo flore.



que; Stylus alteri similis, summa parte interdum in quatuor staminula diuisus, alterius Stylo concolor: florebat mihi anno 1584. & sequentibus duobus, pauld maturius flauo, & multos etiam dabat flores.

Croci tandem verni latif. pallido flore tertia species folia non minus lata habet, floresque sex foliis magis mucronatis constantes, coloris omnino pallidi, viridibus venulis exteriorum foliorum vngues foris distinguentibus, cetera nota conueniunt.

Omnes has flauis differentias corrumpebat rigida illa biems anni 1586. & plures quam sexaginos bulbos iuniores eorum semine natos, prater tres aut quatuor qui flauis genus conseruauerunt.

Crocus vernus latifol. flauo vario flore, Constantinopolitanus siue 7. Clusii, dubitat Lobel. Adu. par. 2. an sit Crocus sil. vernus versicolor, aureo rutilo panno concolor, quem Galli *drap dor* vocant: de quo pauld post.

C. Bauh. Phyt. Crocus 12. siue vernalis flauus. Item 13. siue Vernalis pallidus. Camer. hort. Crocus vernus aureo flore.

Tempus

Florent autem omnes, inquit Clusius, Croci montani differentia ineunte Vere, alia aliis maturius, Martio, & Aprilis initio: nulla autem diutius (ob numerum florum subinde nascentium) que flauum fert florem, que omnium etiam liberalissimè semen præbet: ea primùm Germania innotuit post annum 1579. Stephani van Hausen Norimbergensis diligentia, qui Constantinopoli rediens, in Seruia siue Mœcia superiore sub Belgrado florentem eruit Martio mense: pottea & alii antè à me admoniti videntur istinc Viennam redeuntes, in Thracia, non modò flauo flore, sed etiam albo & subcæruleo: sed non eruerunt: Flauæ autem varietate pauci bulbi allati anno 1597. Octobri mense, itiq; admodò marceidi & exsucco, vt verno tempore erutos appareat: nam & flores & folia adhuc retinebant, empirique fuerant in foro Constantino-

poli. Vnus aut alter eorum quos redemeram, & terræ commiseram, prodierunt sequente Vere, vnicū duntaxat folium proferentes, & anno demū 1590. & sequentibus, flores quos descripti mihi tulerunt Francofurti ad Moenum, & Lugduni apud Baraous.

CROCI VERNI LATIF. FLAVI vario flore 1. & 2. species, vtraque flore simplici & duplici.



Crocus vernus latifolius flauo flore, siue Septima species, Clus. Histor. poster. quinque aut sex habet folia, tenuia, in- instar ferè legitimi Croci, infima parte ex purpura nigricantia, è quorum medio vnum aut alterum florè promit aurei ferè coloris, legitimi Croci odorem non nihil referenti, sex etiam foliis constantem: vt reliqua Croci genera, quorum exteriora tria pauld angustiora, & magis mucronata, tribus crassiusculis radiis ex atro purpurascens ab imo ad summum, secundum folii longitudinem excurrentibus, & multas interdum venas in latera spargentibus, insignita, terna interiora latiora sunt, & vngues habent foris etiam ex atro purpurascens, pedicellum qui florem sustinet, totidem purpurei coloris saturi radiis notandum, quot sunt in flore folia: umbilicum occupant tria flaua stamina, inter que stilius eminent extremitate trifidus, aurei coloris: floribus succedunt crassiuscula trigona capita, admodò saturo purpureo colore infecta, vt atra videantur & splendens, que maturitate hiscentia, semen continere conspiciuntur superiori aequale, & magis rufum: radix bulbacea, vt in superioribus, sed prater illorum morem multiplici reticulatoque cortice obducta, & multis tenuibus fibris sessili parte, per reticulati corticis maculas

culas & exerentibus, prædita, raro adnatos bulbos preferens.

Istius alia est species, quæ nec radice, nec foliis, neque flore differt, exceptis radiis, quia deo latè sese spargunt, ut præter oras, totum externorum trium foliorum doctum inficiant, ac pediculus etiam florem sustinens, totis ex purpura nigricante splendeat. Vtraque species aliquoties florem dedit duodecim foliis constantem, sex internis aurei coloris, sex externis purpureis radiis insignitis, deinde hexagona capitula interdum etiam gemellos flores vni pediculo inhaerentes, quibus etiam gemella capita, vtraque femine plena.

Lobel. Adu. par. 2. Crocus vernus latifolius flavo vario flore, siue 2. Constantinopolitanus Clusii. Pleraque ferè Croci sylv. varietates Anglobritanniæ & Belgio inquilina.

Crocus vernus flore luteo, coronâ Phœnicæâ.

Crocus vernus flore luteo, coronâ Phœnicæâ auctore Lobel. Adu. Penes D. Somerum quorannis Aprilis florêt, de lato & eruto bulbo ex horto magni Ducis Hetruriæ.

Croci lutei & aurei varietates.

Eius (inquit Lobel. Adu. par. 2.) tres differentias alunt Ioannes de Franque ville senior & junior, mercatores Cameracenses huius ameni studii cultores egregii. *Vnum* quippe flore flavo siue fulvo, nitido: radice aliis non dissimili. *Alterum* rariorem multò, præcoccissimum, flore saturo colore fulgente, [An crocus Vernus latifolius Clusii flavo vario colore Constantia.] aurei splendoris foris elegantissimis violaceis nigris lineis striato, auro texto Serico panno amulo, vnde [Crocus aureo panno concolor] croci concoloris aureo panno nomen, *Gund Labea* vulgò Brabantorum, & *Drap d'or* Gallorum. Staminibus intus luteolis: foliis tenuibus crectis: Bulbo subtus aliquantulum fibrato, reticulo obtecto instar nucis Myrsiticæ inuolutæ, Macis vocati. Hoc alii Hacknei sigulino vase. *Tertium* flore pallido ab aliis diuersum: cæteris vt vt fatis respondentibus.

Varietas. Crocus vernus aureo flore Clusii, variat flore intensè, magisque luteo aut rutilo & aperto. Sed tota planta minor, alioqui omninò ferè similis.

CROCUS VERNVS ANGVSTIFOLIVS
floribus cæruleis siue violaceis interdum candidis, Hispanicus.

Croci verni angustifolii species prior (inquit Clusius hist. post.) terna, quaterna aut plura habet *filia*, longa, viridia, Crocinis longè angustiora gracilioraque, rotunda & capillaria ferè, inter quæ prodeunt bini aut terni *cauliculi*, vniciales vt plurimum, angulosi, sustinentes flores sex foliis constantes, vt reliquæ species, imâ parte flauescens, intus nonnihil candidantibus, cæterâ ad cæruleum tendentibus, siue violaceis [inveniuntur & toti candidi] odoratos, quibus insunt *staminula*: his succedunt folliculi, siue *capitella* trigona, exile *semen* fuluescens continentia: *radix* exigua Auellanae magnitudine, duro spadicæque cortice siue putamine tecta, *stans* alba, firma, subastringente gustu.

Clus. Hist. & Hist. post. A ppeffatur hic bulbus à nonnullis crocus vernus, quòd flore sit croci. Verèque floreat: folia tamen croci non sunt, sed rotunda & capillaria planè. Nomen vulgare Lusitanis Galeræ vicinis apud quos etiam nasci quidam illius regionis incolæ asserabant, *Nozellas pequenas*, id est, Auellanae parua.

Lobel. Obs. & Ic. Pl. pag. 141. crocus silu. maior Hispanicus, flore patulo, vulgò Nozilicha minor & Nozellas. Nucula à radice forma, quam etiâ gustu refert. Crocus vernus minor primus Clusii. Hist. Lugd. crocus vernus minor. 1.

C. Bauh. Phyt. crocus 14. siue vernalis minor. i. Frequens inuenitur à Clusio Gadibus Prior, atque inter Afundum (vulgò Medina Sidonia) & Calpen, locis salcibrosis & apricis. Floret cum sequentibus Ianuario & Februario.

Angustifolii croci verni nullas facultates cuiusquam exploratas intellexit Clusius.

Locus & tempus.

Crocus Vernus minor alter flore minore ex albo purpureo.

Croci verni angustifolii species altera, foliis & Descriptione radice externo cortice illi omninò similem in Beturia collibus Lusitanie sinibus obseruabat Clus. hist. post. paulò minore flore, ex albo purpurascens, vix que è terra prominente, atque vnum bulbum eruebat florem habentem è foliis octo compositum, quatuor externis paulò maioribus: radix erat gemina, candida, vna super alteram insidens, quarum superior firma, dulcis & edulis erat, inferior flaccida.

Crocus vernus minor alter Clus. Hist. incolis Cebollina [parua Cepa] dicitur, quo ferè nomine solent Hispani minores omnes bulbos nuncupare. Lobel. obs. crocus vernus 2. Clusii Hist. Cebolina. parua Cepa. C. Bauhin. Phyt. crocus 11. crocus alpinus gemina radice.

Obseruauit hunc Clusius in Beturia collibus Lusitanie conterminis, florentem Ianuario.

Locus & tempus.

CROCUS VERNVS ANGVSTIFOLIVS
tertius Clusio flore multò minore cæruleo.



formâ similis: paulò tamen maior est, *semen* etiam crassiusculum;

TERTIA Descriptione croci verni angustifolii species Clusio vberioribus & crassioribus est *filia*, illique interdum surrectis: *stos* duarum præcedentium flore longè minor, totulque cæruleus, tribus exterioribus foliis exceptis, quæ foris virecente colore nonnihil asperfa sunt: huius *radix* prior

Crocus vernus minor tertius Cluf. Hisp. Iconem aliam ponit Clufius in post. hist. cum titulo Croci verni angustifolii violaceo flore, quam autem pro tertio profuerat in Hisp. plantarum hist. in post. ponitur pro Croco tenuifolio, licet eius descriptio non respondeat.

Lobel. Obl. Crocus vernus Hisp. 3. minor Clufio. Et Plant. icon. p. 142. Crocus sylu. Hispanicus vulgò Nozilicha maior, Crocus vernus 1. Clufii. Hist. Lugd. Crocus vernus minor 3. Clufio. C.B. Phyt. Crocus 14. siue vernalis minor. 1.

Locus.

Hunc Gadibus duntaxat iuxta priorem inuenit Cluf. eodem tempore florentem.

CROCUS MONTANVS AVTVMNALIS.

Descriptio



Crocum montanum primum, inquit Cluf. Hisp. & hist. post. flore est satui Croci, sed diluatore & minore, tribus intus croceis staminibus, & stilo luteo summam partem in aliquot staminula diuiso: *folia* illi quaterna Crocinis similia, breuiora tamen, interiore parte, lineam quandam can-

dicantem secundum longitudinem, exteriori vero, binos tanquam canaliculos seu sulcos vtrinque secundum neruum excurrentes habentia. *radix* minor quam in satiuo, candida, plena, & veluti internodiis distincta, quia [quod omnibus aliis Crocis generibus, gladiolis & Sisyrinchio etiam accidit] planta florente, superior radice pars augetur, inferior autem flaccescit & minuitur, vtraque tamen denso quodam cortice è multis villis contexto inuoluta & tecta, tenuibusque fibris per corticem se exercentibus, sessili parte donata: subdulcis porro illa est initio, deinde ingrati saporis.

Hunc Theoph. lib. 6. c. 7. *κρόκος ἰσχυρὸς* appellat, Latini Crocum montanum & siluestre. Lusitani *Pie de burro* (pedem alinum) vocabant. Quam uero de causa nescit Clufius. An adu. par. 2. Autumnalis Crocus silu. sine foliis ut Colchicum vulgare flores laxat. Item Obl. Crocus montanus Autumnalis Lugd. & Hisp. etiamque nostris, vulgò *Pied de burro*. Plant. ic. p. 138. Crocus montanus Autumnalis. Hist. Lugd. Crocus montanus Clufii. C.B. Phyt. Crocus 3. siue Alpinus autumnalis. Camer. hort. crocus montanus Theoph.

Locus & tempus

Nascitur in nonnullis Lusitanie rupibus, præsertim iis quæ non procul à mari absunt, ubi Nouembri obseruabat Clufius & cum suo flore eruebat, anno 1564. & amicis in Belgium mittebat. Illic etiam Septembri floruit. Viennæ Austriae & Francofurti ad Moenum, Octobri, interdum maturius: Maio tulit crassa, argilosa ca-

pita, semine plena, quale Croci verni latifolii Quattæ spicici semen est. Belgis, teste Lobel. hortensis & inquilinus factus, è maritimis Lusitanie collibus delatus.

Crocus angustifolius 4. flore purpurei saturati coloris.

Crocus verni angustifolii quarti ad Clufium mittebat diligentill. vir Iosephus de Casa bona aliquot bulbos, quorum nonnulli sequentibus annis verno tempore florem tulerunt. Erant vero illis terna aut quaterna iunca *folia*, priori angustifolio hispanico modo descripto similia, inter quæ vncialis, tenuis *cauliculus* prodibat, membranaceum *folliculum* sustinens, ex quo *stipitulus* emerit sex folioliis constans purpurei satui coloris, quibus *ungues* albis venis distincti, & *stipilus* ex umbilico prodians: fugax admodum fuit hic flos, ut pote qui vnico duntaxat die apertus inanescit, *radix* Hispanici angustifolii radici par, multis tunicis, siue corticibus duris tecta.

Apud Clufium est icon, nescimus an pro hoc quarto posita an pro tertio: In iconibus Plant. p. 141. posita fuit cum priore Clufii angustifolio sub titulo Croci siluestris minoris flore patulo.

Crocus montanus secundus flore purpureo foliis orbiculato mucrone.

Crocus montani alterum genus, Cluf. Hist. post. fere simile primo, *florem* sine *stipilis* promittit Septembri, vnciali aut longiore pediculo innitente, satis odoratum, sex aequalibus foliis orbiculato mucrone præditis, & saturatioris purpurei coloris præneque violacei, constantem, tribus ex umbilico prædeuntibus flauis *staminibus*, & stilo extremum mucronem multitudine, crassiusculumque habente: nullum adhuc *semen* mihi obseruare licuit: nec qui bulbum mittebat, vllam eius mentionem in epistola faciebat: *radix* prioris radice valde similis, cortice è multis villis contexto inuoluta, oblongos interdum nucleos satis procul à mare spargens. Hoc [Alterum] Croci siluestris appellatione mittebat Nobilis, idemque Doctiss. vir, Ionannes Boissot, verete amicitia Clufio coniunctus, Francofurtum anno 1591.

CROCUS MONTANVS TERTIVS.



Crocus tertii Clufio Histor. post. *stipilis* inodorus etiam est, vel tenuis admodum & euanidi odoris, senis, ut reliqua Croci genera, *foliis*, quorum interiora terna paulò breuiora sunt, omnia autem orbiculato mucrone, albicantis initio coloris, sed in quo deinde, temporis succellu,

fuccellu, dilutus quidpiam cæruleum perfulum videatur: *stamina* ex umbilico prodeunt terna, flava, & in medio *stibus*, siue penicillus, in tria vel plura *stamina* diuisus, flauo etiam coloris: flaccescente vel iam marcido flore, quina, sena, raro plura emergunt in ambitu *folia* ex tenui membrana, qua florem initio obuoluerat, Croci verni latifolii foliis penè similia, hoc est, paulò latiora quàm satiu, albâ lineâ singula folia per longitudinem superiâ parte distinguente, & pronâ binis: *semen* hactenus nullum obseruauit Clusius licet multis annis aluerit: *radix* digitalis, vel etiam pollicaris est crassitudinis, orbiculata ferè, alba, solida, tunica spadiceo coloris obducta, multis albis fibris sub ea nascentibus prædita, quæ florum satis ferax est: nam & ternos, & quaternos, interdum etiam quinos profert flores.

Missum est hoc tertium Croci genus Byzantio anno 1537. Octobri mensis *Zizania* maby, hoc est, Croci cærulei nomine, quod tamen, proflus cæruleo non esse flore, idem mensis declarauit: nâ octiduo postquam terræ commisit flores profere cepit.

CROCVS SYLV. BYZANTINVS SEROTINUS candidus tantillam subcæruleus.

Debetur auctore Lobel. Ad. par. 2. Pelelegans Croci sylu. autumnalis serotinum genus D. Ioâni Parkinson Londinensi Pharmacopolæ egregio, & Rei Herbatæ amantissimo, qui eius bulbos Byzantio delatos sedulis doctioribus amicis Herbatum cultoribus

Britanniæ ingenuè impetitus est: vt Domino Ioan. Nafiniâ Botanico primario, & Chiturgo Regio præstantissimo, generoso item viro D. I. Coys harum peritissimo, & D. I. de Franqueville.

Vniuersa planta quinas & senas vncias altitudine æquat, In palmari delicatiore *cauliculus*, vaginula prædita, flores laxat candidos, aliquantillum dilutâ cærulâ vimbâ mixtos, ampliusculos, Colehici paulò minores, senis foliis conflatos: tibus *staminibus* luteis inferioribus, Croci verni sylu. similibus, totidémque ternis sese exerentibus exilioribus concoloribus staminibus aut stilibus. Floruit in hortis prædictorum quorundam Botaniconum per mensem Nouembrem in sextu aut octauum Decembris, vnâ cum foliis dilutioris viriditatis (obscure vident Croci sylu. montani folia) sparsis, ternâ vnciarum, lineis albis medio exaratis, quæ paulatim marcescente flore ad palmarem altitudinem & vncias quatuor excrefcunt. *Radix* adulta Nucem Myrsicam æquat, etiâque superat, rotundior tamen Gladioli similis, intus alba, cortice obducta subulco. Ac-

cedere videtur ad Crocem montanum tertium Clusii.

Crocus vernus capillari folio.

Mittebat Venerius Clusio Histor. post. Croci verno tempore florentis genus capillari folio, quod Burdegalensi agro locis desertis nasci scribebat, & duorum generum inueniri, vnum purpurascens folio: alterum quod rarius, albo. Et certè illius quod cæruleum habet florem aliquos ipsi bulbos semel atque iterum misit. At illius quod albo est flore, ne vnum quidem bulbum ab ipso impetrare potuit: in alios licet magis liberalis fuerit: certus enim est eos, qui illud habebat ab ipso accepisse. Id autem exiguum *radicem* habebat, bulbosam, duro spadiceo cortice testâ, instar illius quod in Hispania obseruabat ad Anam flumen, vel eius, quod Casabonus ei mittebat: quâ insequente anno bina aut terna prodibant quasi capillaria folia, viridia, surrecta, inter quæ *pediculus* verius quàm *cauliculus* vncialis longitudinis aut paulò maior, ab vnâ parte planus, sustinens semuncialis magnitudinis florem sex foliolis constantè, quorum terna exteriora paulò longiora erant, & purpurei coloris, tribus venis saturatioribus secundum longitudinem exterioris distincta, tria interna breuiora & dilutiori colore prædita, omnia autem internè dilutè purpurascabant, & *ungues* habebant pallidos, ternis venis distinctos, prodeuntibus ex umbilico tribus *staminibus* breuibus, longo apice flauo præditis, & medio stylo extremâ parte diuiso.

Tempus

Florem proferebat initio Maii, qui Sole splendente aperiebatur, sub noctem autem clauderetur, & paucos dies durabat, nullius, aut per tenuis odoris.

Crocus montanum Pyrenæum Autumnale.

Anno 1602. à Gallo quodam *siçoruo*, qui multas plantas in Pyrenæis montibus erutas adferbat, aliquot redimcbam (inquit Clus. Exot. par. 2. Append. 2.) inter quas binos aut ternos Croci bulbos: horum vnus insequente anno Septembri florem ferebat, Primi Croci montani flore ampliolem, colorisque saturatioris & quodammodo mediū inter illum & alterum in mea Plantarū historia descriptum, cuius mediū stylus multifidus summâ parte perinde ac illius, magis tamen diluti coloris, & proflus flauo: huius item folia marcescente flore, non statim prodibant vt in primo. An porrò alii istius generis sint futuri dies nos docebit, si non peribunt.

Crocus sylu. similis Bulbus.

Bulbus montanus ignotus similis Croco siluestri missus ex Hispania Clus. Pann. pag. 194. C. Bauh. Phyt. Crocus 16. siue Croco siluestri similis.

Crocus Zizania.

Crocus Zizania, bulbus quidam nuper cum Croco è Valle si missus, superficies Croci, magnis interuallis latet & redit. Gesner.

EPHEMERON NON LETHALE

Veteribus.

CAP. VI.

EpheMERON [*εφμερον*] quod alii Agrestem Irin [*ειρα αγρα*, Ald. cod. velus Liliū,] appel-

Descriptio



lant caulem, foliaque habet Liliæ, sed hæc tenuiora: flores candidos, amaros: semen molle: radicem vnam digitali crassitudine, longam, adstringentem. Nascitur in syluis & opacis.

Plin. more suo paucis immutatis ita legit. Ephemerum folia habet Liliæ, sed minora, caulem parum, florem caruleum, [semen molle: radicem superuacuum, radicem digitali crassitudine.]

Ephemeræ
æquinoctiales.
Colchicum
vulgare.

Cæterum Ephemerum à quibusdam pro Colchico vulgari habetur. A quibus recedit Lobelius qui Ephemerum non lethale suspicatur esse Hermodactylos officinarum. Diu. sum quoque Ephemerum non lethale est, quod depinxit Matthiol. ab indigenis *Gigle Matto*, hoc est, Lilium stultum nominatum. Fuchsius plantam vulgò Lilium conuallium nuncupatam Ephemerum non lethale esse contendit. Ephemerum non lethale radicem dentium doloribus remedio esse scribit Diosc. si decocto eius colluatur; Folia verò in vino cocta illitæque, & demata tuberculaque discutere, quæ quidem humidi nihil dum contraxerint. Sed hic Fuchsius (puris) pro *βυβλιν* [humidi] ex Galeno legendum censet. Galeni verba hæc sunt: Ephemerum non illud lethale ac deleterium, quod & Colchicum nominant, sed alterum quod & Irin agrestem cognominant, radicem habet adstringentem, & boni, sua usque odoris. Ex quibus palam fit, facultatis, temperaturæque esse mixtæ, nempe repellentis, & halitui [non halitui, ut per incuriam Typographi in Hist. Lugd. legitur,] euaporantis. Testificatur opera, quæ particulatim edit. Siquidem non inefficaciter radix eius in dentium doloribus colluitur. Tum phymatum augmento & statim folia conueniunt. Oportet autem ea in vino decocta, prius quam pus moueas illinire. Liquet igitur ex his Galeni verbis pro *βυβλιν* esse legendum. Variat tamen ab hac lectione & Plinius, scribens lib. 25. c. 13. Ephemerum habet radicem dentibus præcipuam, concisam, in acetoque decoctam, ut tepido colluatur. Et ipsa etiã radix mobiles fistit. Causis & excelsis imprimatur, [imponitur,] Ver. Et seq. lib. 26. cap. 12. Folia Ephemeræ tuberibus atque tumorebus illinuntur, quo etiam dum (& tantum CH.) discuti possunt.

COLCHICVM VETERIBVS.

CAPVT VII.

DE Colchico Theophrastum ex professo quædam literis consignasse non ita constat. Licet non desint, qui Narcissum esse Plinii & Virgilii purpureum affirmant, apud Theophr. Autumno florentem, post Arcturum circa Equinoctium. Verba Theoph. de Hist. pl. lib. 6. c. 6. hæc sunt: *Νάρκισσος* aut *Νάρκισσος* (sunt enim qui hoc, & qui illo nomine appellent) folium Asphodelo simile habet, sed multò latius & Liliæ, [quod dicitur *Νάρκισσος* quasi Liliaceum Marc.] modo caulem nudum quidem foliis, veruntamen herbaceum, cui flos in summo, semen, velut in vasculo, membrana quadam clausum, grande, nigrum (ut *αυτ.* legendum, *υψηλόν*, Dod. Ita etiam Clus.) figura oblongum: hoc decidens, sua sponte germinat: verum tamen id colligentes etiam in terra depangunt. Serunt & radicem, quam rotundã, carnosam & grandem habent. Serotinus flos est, post Arcturum enim & circa Equinoctium floret. *hæc Theoph.* Quæ an Colchico Ephemero

respondeant, quislibet verba iam in mediũ prolata diligentius examinans, absque negotio facillè iudicabit.

Cæterum Diosc. *κόλχικον*, aliis etiam *εφemerum* nonnullisque *κόλχικον* dici autor est. Lat. Colchicũ, Ephemerum, & Bulbum agrestem, & stragularotium. Colchicum autem, ut ille describit, sub finem Autumni florem edic Croci candidantem: deinceps verò folia bulbi, sed pinguiora: caulem dodrantalem cum rufo semine: radicem cortice præditam è nigro fulucente: quæ quidem delibrata candida, tenera, succi plena, atque etiam gustatis dulcis reperitur. habet verò bulbus eius median rimam fissuram, è qua flos erumpit. Plurimum in Messina & apud Colchos nascitur. Et licet dicat Diosc. Colchicum radicem habere cum delibratur candidam, nostam tamen cum Marantha obseruauimus tempore diuturnitate rufescere: nec minùs cum eam saporem esse dicit, nostræ partes sunt scire, hunc saporem non nisi per Autumnum retinere: nam cum folia verno tempore profert amarissima est, quam nobrem à nonnullis pro Colchico habitam non est.

Plinius, Galenus, Ægineta, atque Aëtius huius meminerunt, quamvis non descripserint, appellantes Colchicum hoc Ephemerum venticulum, lethale, deleterium.

Quæ de re frequentibus agit Serapio: *Serugen*, [id est Hermodactylus Diosc.] Est herba quæ florescit in fine Autumni & eius flos albus, similis in figura sua flori croci, deinde emittit folia similia foliis bulbi, in quibus est humiditas adherens manui, & habet stipitem longitudine vnius palmi porrectum, cuius color est albus, declinans ad nigredinem, & habet radicem, cuius cortex est niger, ad rubedinem declinans, & Sed quando auferitur cortex, apparet radix interioris alba, mollis, dulcis saporis, & plena humiditate. Est autem radix ipsa rotunda, similis Cæpæ bulbi, & habet radicem ipsam in medio sui fissuram, ex qua egreditur stipis, supra quem est flos. Nascitur multum hæc herba in loco qui dicitur Karin, & terris quæ dicuntur Gnagna, hæc herba si comedatur occidit strangulando, sicut occidunt Fungi. Conferunt autem illi qui ipsam comederit omnia quæ conferunt illi qui comedit Fungos malos, est autem summum remedium ei lac bouinum, non egent namque alio adiutorio qui eam sumpserunt, &c. *Hæc Serapio*, qui Galenum citat vires enumerans [quas recensimus sub hermodactyli titulo] verum nihil tale apud eum inuenimus; citat etiam Paulum, sed ex verbis Pauli certò asserere non possumus, de qua planta loquatur.

Colchici nomine enartatæ plantæ ordine sequentur. *Narcissus Perficus* à quibusdam Colchicus dicitur, de quo agimus post Colchicum luteum. Videtur porro Clusio Colchicum Syriacum Alexandrinum quorundam, *Tulipe genus Apeninum* de quo paulò post agemus. Scribit Hist. Lugd. *Melanagradem* Dodonæi nonnihil accedere ad figuram Colchici Orientalis Matthioli de quo lib. 50.

COLCHICVM.

NON multis communis florendi modus efficit ut Colchicum prius semina ferre quam florem vulgus sibi persuadeat: sed quemadmodum Crocus, ita Colchicum Autumno florem promit

foliis nudo & albidis, tenuisque pediculis purpurei
carneis coloris in fena folia oblonga diuifum,



in
medio cro-
ceis: Vere fo-
lia producit
tria aut qua-
tuor Liliacea,
sed longiora,
latioraque, in
retque vbi in-
diuerfa abire
incipiunt, con-
ceptacula oriū-
tur feminum
oblonga, Lili
capitulis quo-
dammodo fim-
ilia, è duobus
tribusve locu-
lis composita,
marcida &
nigricante
membrana
obuoluta, in

quibus femina ad Raphani accidentia, petiolis
breuibus ad mediam lineam vniuscuiusque lo-
culis adherescētia. Radix subest rufescens foris,
intus alba, bulbacea, altera parte compressa: in-
stat Castanea.

Diligentem descriptionem Cordi lubet hic
adscribere quam habet hist. lib. 2. cap. 152. Colchi-
ci inquit (quod hodie Hermodactylum vocant)
tres sunt species. Primum enim cum siccatum
fuerit, foris nigrum, intusque fuscum in candido
colorem habet. Alterum in flauo subrubentem,
tertium verò candidum. Ex his nigrum, paulò
ante Autumnale æquinoctium florere incipit, vs-
que quò superueniens gelu sub ipsis pruinis su-
perbientes flores opprimat. Colchicum itaque
Autumno edit quincunciale, nonnunquam etiã
dodrantalem, gracilem, glabrum, candicantem
atque egregie teneritudinis caulem, in cuius su-
mitate flos Lilio non dissimilis, sed minime re-
pandis & reflexis deorsum foliis, sex vt pluri-
mum foliis longitudine sesquiunciam aut beseu
æquantibus, latitudine verò vnciã paulò angu-
stioribus, vtrinque acuminatis, glabris, nitidis,
pinguibus, in attitu glutinosi, primùm clausis &
conuolutis, postea se explicantibus, constans, co-
lore in subrubente purpura albicans, in medio
luteo colore stamina, numero ipsa floris folia
non excedentia continens: qui postquam vnum
atque alterum diem durauerit, ita accescunt, de-
inde paulò post sequentis Veris initium folia pro-
fert longitudine dodrantali, latitudine verò vnci-
e aut sesquiuncie, acuminata, crassa, Liliaceis
forma & substantiæ lentore similia, sed longio-
ra, sub terra cœuntia, & teretem, teneram, candi-
cantemque pediculum constituentia: in quorum
medio prope terram vtriculosus extulberat acumi-
natus, triquetrus, longitudine ad sesquiunciam
plerumque accedens, latitudine verò vnciam ad
plurimum æquans: rotundo, miliòq; maiori, pri-
mum candido, ætate deinde post solstitium ma-
turefcente, ad rufum in nigro colorem transeunte
semine plenus: quo sparso folia flaccescant.
Inueniuntur nonnunquam duo aut tres vtri-
culi simul coniuncti & ab vna radice profectus,
cum eadem radix totidem flores produxerit, sed
vnus tantum ex his magnitudine præstat, alii ve-
luti abortiuus sunt. Radice nititur longitudine

sesquiunciali, modicè in plenum compressa, lati-
tudine vnciam plerumque quarta eius parte ex-
cedente, superius turbinata, inferius autem lati-
uscula parte veluti in paruum vnguem desinen-
te, & candidas fibras in terram demittente, &
paruis bulbis circa latera enatis se propagante:
foris multis in ruffo nigris tunicis vestita: ex
quorum numero eius ætatem cognoscere potes:
singulis enim annis singulas perindit tunicas,
quibus detractis reliqua radice pars carnosa,
toraque candida, & lacteo succo plena est, ead-
em ab vna parte rimam veluti habet, per quam
floris coliculus transiit, hunc enim non è supe-
riori & acuminata parte maioris radice Autu-
mno promittit, sed ab inferiori flaccescentis vngui,
& latiore, contra reliquorum bulborum mo-
rem. Ea verò radix à cuius mucrone flos & folia
emittuntur, sulco caret, vsque in Autumnum, do-
nec subnascens paruula alia emissio flore priorè
fulcet. Hinc est quòd radices, quibus Vere & æ-
statis principio folia insident, canaliculatum istud
sulcum non habeant. Folia enim exaruerint, ve-
stigiū quoddam turbini impressum relinquunt.
Eadem radix quæ priorè anno germinauit, se-
quenti anno flaccescit, Autumno succedit alia
admodum parua, inferius adnascens, à cuius su-
periori parte Autumno flos prodit: nam hic mi-
nimè à maiore exit, minor hæc radix vna cum
flore adolescit, in Vere autem & Æstate sequen-
ti simul cum semine ad instam magnitudine per-
uenit, quo tempore prior omnino perit. Siccata
radix tam foris quam intus fusca fit. Saporem
radix habet dulcem simulque anarum, tenuem,
saluam prouocantem, & aliquantulum nauco-
sum. Odorem verò omnes herbe huius partes,
grauem & nausebundum spirant. Nascitur in
pratris tam planis quam montanis solo pingui,
plurimumque in Wirtembergie, Suecia, vbi Au-
tumno omnium ferè montium decliua, campi &
prata his floribus albicant. Colchicum subru-
bens (quod à colore radice siccate ita cogno-
minatur) nigro in omnibus notis & proprietati-
bus assimilatur, præterquam quòd siccata eius
radix, quamuis excoctata, rubescat. Saporem
quoque & odorem nigro similem habet, nasci-
turque eiusdem nature natalibus: rarissime ta-
men iuxta se simul nascuntur.

Olim quamplurimi cum magno multorum
vitæ periculo abusi sunt Colchico pro Hermoda-
ctylis, illud exhibentes, cuius rei testes est Her-
mol. in Dioscor. dicens. Colchicum haberi mo-
dò passim prædicant: Hermodactylum Recen-
centiores pro Ephemero accipiunt. Colchicum
copiose in Colchide nascitur. Estque in illis re-
gionibus venenata herba.

Quod verò apud nos [pergit Cord.] prouenit,
amarium est, quo sapore veneni aliqua pars di-
luitur, nec tamen innoxium redditur. Homines
enim quos eo pui gauerimus, secissima incurrit
accidentia. Colchicon aut alibi, Bulbus agrestis
aut flos Autumnalis, non est Hermodactylus, li-
cet id Serapio velit. Quidam vt Brunfelsius Nar-
cissum esse crediderunt. Sed reuerà Narcissus
plurimum ab hac differt. Colchicum aliqui etiam
Ephemerum appellarunt. Nobis autem illud
consideratione dignum, an nostrate Colchicum
minus sit venenatum quam quod in Colcho pro-
uenit, vt vult Cordus, cuius argumentum non fa-
tisfacit.

Nec placet Ruellium non distinguere Hermo-
dactylos vulgares à vulgari Colchico, dum scri-
bit: Officinæ Hermodactylon vocant, è quo-

Colchicum
Wirtembergie

Hermoda-
ctyl.
Ephemerum

Narcissus

Ephemerum

Cordus
not.

Ruellius

Cataporia ad podagras tantoperè commendantur. Habet ac in medicina suos vsus, quorundam veniens pro remedijs abutendo, quorum medicina maioris mali periculum adfert. Hermodactylos quibus Cataporia tantoperè commendantur ab Aetio & Paulo, Ephemeron non esse satis mihi constat, etsi Recentiores, pro Ephemero vsurpent, cum Paulus separatim tantquam diuersorum mentionem fecerit, tradens Hermodactyli radicem alui decoctionem moliri, priuatim in articularijs doloribus, in defluxione decoctum eius dari, verum stomacho aduersari.

Pauli & Aetii Hermodactylus non sunt Ephemeron Canineae. Euch. Roslin not.

Euch. Roslin in Herbar. sub nominibus Canineae Gallorum weissen zeytlosen / Zbigera-weef, Colchici, Ephemeris, Hermodactyli [quod Colchicum dicitur] hermodactel wurz / Spinblumen, confundit multas plantas, ac Colchico male salubres facultates tribuit.

Neoterici duo hermodactyli genera statuunt (inquit Tagaultius) vnum radice oblonga, alterum rotunda. Qui radice est oblonga Ephemeron est Diosc. Galeni, Pauli & Aetii. Qui verò radicem gerit rotundam, eorundem haud dubie Colchicon est, è quo Cataporia tantoperè ad podagras & arthritim commendata Officina conficiunt. Verum enimverò cum hoc Graecis omnibus Scriptoribus, atque ipsi etiam Plinio deliberrimum ac praesentaneum venenum sit, non admodum certè tutus est eiusmodi pilularum vsus: nisi fortè dicamus nostrum hunc Hermodactylum non adeò venenosum esse vti illud Colchicum est Ephemeron, id est, quod in Colcho insula nascitur, Verum cum Hermodactyli quibus passim hodie vtantur Officina in conficiendis huiusmodi Cataportis, haequaquam radices sunt [innocue enim, praesertim veteres gustari possunt] quas Veteres & Paulus Aegin. in articularibus morbis tantoperè commendarunt: securius sanè fuerit ab eis in totum abstinere. Quòd autem Hermodactylus de quo scribit Paulus lib. 7. res alia sit ab Ephemero & Colchico, eo argumento conuincitur, quòd dicat Hermodactyli radicem, & per se, & ipsius decoctum peculiariter & priuatim articularum doloribus in ipsis fluxionibus plurimum valere. Diuersa tamen capita de Colchico & Ephemero iam conscripserat, quibus nullam vim sanandi arthriticos tribuit. Sed neque Diosc. neque Galen. neque Plinius, neque Aetius in Colchico aut Ephemero, vel bulbo de articularum morbis loquuntur. Proinde res alia Pauli Hermodactylus ab Ephemero & Colchico esse videtur. Porro tamen Ephemeron apud antiquos Graecos nomen sit generis signifiens idem quod apud Arabes Surugem, apud Recentiores hermodactylus, dictamque sit [vt putauit Theoph.] quoniam intra diem iugulet: praecipuo tamen nomine & peculiariter ad Ephemeron dicitur, quod veneno caret, innocensque est, & remedit ratione vimque salutiferam habet, tantum abest vt lethiferum sit, aut exitiosum. Colchicum verò per Antoniasiam, id est, Excellentiam loci in quo nascitur, & ob fasinora Medae veneficae mulieris ex Colcho, de venenoso solum Ephemero dictum est. Maleficum hoc Ephemeron, Colchicum dictum, exitu Autumni in pratis florem edit subcaudum siue albicansim: posterius, id est, ab eo tempore, folia bulbi pinguiora caulem palmeum vel semipedalem, rufum semen, radicem rotundam, foris è nigra rufescentem,

Colchicum cur dictum.

quae delibrata disquamatae intus albicae, tenebrae ac mollis spectatur, lacteo mader succo, atque guttata [vt auctor est Diosc.] dulcis inuenitur. Bulbo medio rimula dehisce, quòd flos erumpit. Quae notae omnes ad amissim Officinarum Hermodactylo conueniunt.

Quidam superites adhuc hodie Medicus Ferrariensis, adserit se Colchicon gustasse, ac in eo Castaneae saporem inuenisse, sed paulò post striditum quandam itica asperam arteriam praesensisse, ac si manu stringeretur: mox vaccinum lac bibisse, & nihil incommodi sensisse. Rura hodie apud nos plantam hanc Canecam appellant, quòd canes deuorata necer. Officinae Hermodactylon vocant.

Ceterum cum dicit Mesue de rotundo Hermodactylo tanquam de meliore se sermonem habiturum id sanè intelligendum est. Nempe Hermodactylum rotundum, qui Colchicon est Ephemeron, meliorem ac perfectiorem esse quod ad ea ad quae valet pertinet, vt puta ad articularios dolores. Sed iam recitata verba Tagaultii tam distincta sunt, vt magis distingui velint. Quicumque enim considerabit radices hermodactylorum & conferet cum Colchici radicibus nostratibus exsiccatas, insigne discrimen perspiciet, quicquid dicat Tagaultius de notis quae conueniunt.

De Colchico quidem nihil prodit Galenus [inquit Cornar.] Nec Plin. Colchici meminisse, nisi lib. 28. c. 9. Officinae Colchicon vocant Hermodactylon, sequentes in hoc Setapionem Arabem, qui totam Colchicam apud Diosc. descriptionem Hermodactylo attribuit. Verum Paulus Hermodactyli radicem proponens, non addit Colchicum vocari. Et quamuis Colchici sorsum non faciat mentionem, tamen de Ephemero agens, nò de veneno loqui se dicit, sed de eo quod Iris agrestis vocatur. Per venenum autem nihil aliud ipsum intelligere quam Colchicum, ex Galeno clarum sit ex quo Paulus transcripsit. Non debuisset autem praeterire, neque eo loco quo de hermodactylo agit, Colchici appellationem, si Hermodactylus Colchicum esset: neque lib. 5. cap. 48. vbi de Colchico vetero agit, hermodactyli appellationem, si Colchicum hermodactylus esset. Quare diuersas res esse hinc colligitur. Sed & idem Paulus lib. 7. cap. 5. podagrucam ex Hermodactylo compositionem recensens: & mox eandem purgatoriam addens, Colchici appellationis nullam mentionem facit, libenter alias exponere solitus, si quae sunt obscuriores appellationes. Nostris Zeytlosen vocant. Quidam etiam Hebsibulum. nec Cornar. Qui sui oblitus l. 4. c. 140. Collegit Narcissum esse ex genere florum, qui à nostris Zeytlosen & Hebsibulum appellantur.

Errat & Tragus qui putat esse Moly Homeri, quando scribit: Sunt qui putent Narcissum esse Theoph. lib. 6. cap. 6. & Virgilii lib. 4. Georg. inter quos est Philippus Melancthon in Syntaxi sua. Huc sententiae subscribo quod ad florem attinet. At radix nec non folia huius plantae, nobis à Dioscoride sub Colchico, Ephemero, siue Bulbo agresti comprehenduntur. Serapioni cap. 194. Surugem, Hermodactylum, Liliu syluestre, & Achimeron, quod meo iudicio Ephemeron legi debebat. Serapio Hermodactylum venenum esse clamat, vti & Mesue, &c. Rursum cum Serapione, Mesue & Paulo Aegin. ingemino, ac constanter affirmo Colchicon quòd Arabes, & Officinae Her-

Hermodactylum dicunt venenum, nunquam intrò sumendum. Mestic Hermodactylum Homeri Moly Germanis Pfsffenhoden & Naefblum/ Narcissus Poëtarum fabulis celebratus. Potest fieri vt Dioscor. duobus in locis separatim hanc plantam explicatit sub Colchico radicem & folia, sub Narcisso florem. Hæc Tragus.

Ceterum, attestante Turnero, prudenter monet Matthiol. non amplius Colchici radicibus pro Hermodactylis esse vtendum quem errorem Serapio ac Mauritanii medici non animaduertentes vel negligentes Dioscoridis monita ac contra Galeni, Pauli, Nicandri & Plinii mentem perperam inuixerunt.

Castor. Dur. pag. 141. Colchicum, Bulbus agrestis pag. 142. falso Hermodactylus Pharmacop. in pilulis ad Arthritidem, pro eo non ponant Colchici radices. Item pag. 169. Iris syluestris *καρχιδον* siue Ephemerum Arab. Zurungem. Miramur cur Castor eiusdem plantæ duo faciat capita & duas ponat figuras: videant etiam lectors an pitremo loco non confundat cum Colchico, Ephemerum lethale.

Fallop. de purg. Hermodactyli radix, Arabibus est radix Ephemeti Colchici. Hæc ille qui non putat venenatum vt postea ostendetur. Non probo eum non distinguere vulgatum Colchicum, quod venenatum, ab officinarum Hermodactylis.

Clus. Hist. Colchicum vulgare Salmaticensis, *Quira merendas*, quibusdam etiam *Villanita*.

In hist. pl. Lugd non bene ponitur Icon Colchici vulgaris sub titulo Colchici Orientalis Matthioli, demendunt igitur vocabulum Orientale, nec placet quod illa statuit Colchici seu Ephemerum radicem medicamentis immixtam non esse perniciosam.

Colchicum, autore Thelio, passim in pratis. Reperitur locis Septentrionalibus, prope Stenbur- gum, flore etiam candido.

Tabernaicou. Colchicum masculinum, *Zeitosen maulein*. In Hist. Colchicum 8. Item Colchicum foeminiuum *Zeitosen weiblein*. In Hist. Colchicum 9. Non demonstrat qua in re differant, nec etiam figuræ multum sunt dissimiles.

Græcis *καρχιδον* [Colchicum] *ή εδμηου* Diosc. (Ephemerum) *ή βοτ. ή βοτ. ή βοτ.* quibusdam, *Bulbus agrestis*. Germ. *Serbsblumen* *Zeitosen*/quibusdam *wisen wild saffran blumen* *Maeferjuren* / & *Hundeshoden*/canis testiculi. Belg. *zulesen*. G. *Mort au Chien*, *Tue Chien*, *Mourb.* *Des Violaires*. It. *Colchico*, *Zaffrano Saluatico*. Angl. *wild Safran*. Boh. *Ocum*. Hung. *Bofordum* / quo nomine aliis etiam stripes insigniunt.

Nadus ille flos quem Colchicon, seu vt Officinæ (secundum Tragum) vocant, Hermodactylus, Autumni tempore fundit, hiemis aduentantis nos admonet. Quanquam verò exitu Autumni plerumque appareat; tamen non raro quoque circa Festum D. Iacobi primum in detontis pratis, ac eo inde tempore vsque ad finem Septembris mensis spectatur. Folia autem post flores generantur, qui primo statim Vere e terrâ erumpunt. Semen in æstate Iunio potissimum mense producitur: Nascitur passim in omnibus pratis Germaniæ. Prata humida (vt notat Gesner) nusquam non abundant, Autumno florem Croci prodit nudum, & nullis omnino foliis. Colchicum Clusii omnibus Germaniæ & Vngariæ pratis obuium. Colchicum sine Ephemerum lethale

Tom. II.

le, Basilea passim in pratis florens Septembri & Octobri, Monspelii etiam prouenit, Genevæ folia protrudit mense Aprili in pratis, Lugduni abundat in monte *Rosberg* prope Mafiumster vidi florens Octobri. Montbelgardi passim floret Septembri, & Octobri etiam in Horto Ill. E. C. mense Februario: in pratis prope Montbelgardum vidi aliquot plantas florentes.

Radix in cibo accepta, tradente Dioscor. necat per strangulationem, similiter vt Fungi. Descripsimus ipsam, vt ne quis fallatur & pro Bulbo edat. Præter opinionem enim imperitos illi- cit, ob suauitatem. Auxiliantur his qui ederunt, eadè que his qui Fungos susceperunt. Lac item bubulum potu. Quæ re hi hoc adit, nullo alio opus est auxilio. Et rursus inter Alexipharm. Qui Ephemerum acceperunt, quod aliqui Colchicum, aut Bulbum syluestem appellauerunt, eos pruritibus per totum corpus concomitatur, velut a Scilla aut Veruca excitatus. Internæ partes mortuum percipiunt, & stomachus cum multa grauitate exarsuat. Innalescente verò affectione, per alium feruntur euentra ramentis ammixtis. His auxilium ferendum est, velut his qui Salamandram hauserunt, & per vomitum, & per intusa per Clysterem. Antequam verò innalescat Venenum dandum est ipsis Quercus foliorum, aut glandium, aut Malicorii, aut Serpylli decoctum cum lacte bibendum: Aut Polygoni succus, aut Virgultorum Viris, aut Rabi, aut Ferule teneræ medulla, aut baccarum Myrti succus cum vino. Sed & ipsæ Myrti, baccæ, tulle, trita, & in aqua macerata, auxiliantur, si cremor ipsarum accipiantur. Facit similiter & Castanearum que Sardi- næ glandes appellantur, pellicula mediæ, cruda cum aliquo ex relatis succis accepta. Orignum item cum lixiuo potum. Exacte verò auxilium sentiunt, qui lac Aluminum aut bubulum calidum bibunt, & in ore tenent, vt hi quibus huius copia est, alio nullo auxilio opus habeant. Hæc Diosc. Eadem Paulus Aegin. de verbo ad verbu lib. 5. cap. 47. Calidum & siccum nonnulli Colchicum in secundo ordine, seu à medio recessa statuunt. Quanquam radix & flos huius plantæ ad abigendos & enecandos pediculos satis conferant tamen vltis eorum præsertim si intrò sumantur annuente Trago, minimè tutus existit, vt quæ plus detrimenti quam veritatis allatura sint. Admonendi ergo mihi hoc loco sunt ii quoru interest pilulas pro podagricis præscribere & conficere, ne suis confectioibus Colchicon, seu Hermodactylum adhibere viderint, quod hæcenus magno cum errore commissum fuit. Cæterum articulario morbo & podagra laborantibus vtilem esse radicem Colchici Arabes scripsere, quod & nos aliqua ex parte experti sumus, Verum tamen, cum forissecus imponitur. Ferunt, legitur apud Hist. Lugd. Turcas Colchici floribus, vt cum inebriari volunt: eos enim vino macerant, quo epoto adeò stupidi redduntur, vt in eestatum abeant. Ad verrucas ani accipit N. L. Ducis Wirtemb. Medicus Colchicum [zeytoseu] tudit, superligat, excidant. Ad extripandos verò pediculos lutos pudendorum contundit radices Colchici, coquit cum aqua & locum affectum eâ abluit.

Vires, venenum & remedia.

Auxilia Lac.

Ephemerum, Colchicum, Bulbus, Hæc. Signa assumpti Colchici. Remedia.

Castanea, Sardinia: na glandis pellicula.

Colchici flos res inebriant.

COLCHICVM ALBVM CVM PURPV. - rasantibus Lineis.

Colchici picti radix, vt & aliorum bulbosâ foris in sulco nigricans, intus alba est, & ex

Descriptio

illa parte (quod à nemine monitum est) unde
florum caules erumpunt, in conum desinens, ad
quem in imo *bulbi* fibræ barba instar dependent:



Ex eo bulbo
caules nudi,
molles, splen-
dentes, candi-
di, striati, bini
vel terni pro-
deunt: in quo-
rum summo
rotidem *flores*
(reliquis Col-
chicis figura
similes) candi-
di, purpura-
scentibus li-
neis, & macu-
lis eleganter
persperiti: ho-
rum quilibet
foliola sex ha-
bet ad quo-
rum singulo-
rum princi-
pium, singula

adnata *stamina*, vt in Tulipis, croceo puluere as-
persis. *Semen* sequente anno in vesicariis trian-
gularibus Valulis fert fuscum, subrotundum, &
ex parte angulosum. Iunio mente maturum.
Iuuenimus in Heluetia in conuallibus ad radi-
cem montis *Wasserfal* & in hortum transiuli-
mus Mense Septembris anno 1598.

Colchico vulgari similes bulbi.

Paucos colchici bulbos, vulgaribus bulbis valde
similes Neapoli Francofurtum ad me (ait Clus.
hist. post.) mittebat Ferdinandus Imper. qui mi-
hi Lugduni Batauorum demum *flores* dederunt,
vulgaris floribus non dissimiles, hoc est, vel dilate
vel saturate purpureos. Ex illis tamen, binos ha-
bui *bulbos*, quorum singuli quaternos aut qui-
nos flores protulerunt anno 1598. & cum in se-
quente, non adeò altè assurgentes vt in vulgari,
sed breuioribus, quorumque folia luci opposita
retellatim distincta apparebant, perinde
ac in dilutiore Fritillarie flore: *semen* etiam
abundè præbet id genus, sed in minoribus
breuioribusque capitibus quàm vulgare.
Francofurti ex Italia accipiebam semen vulgari
Colchici semini par cum suo laxo capitulo, her-
modactyli Syriaci appellatione, quod terra cre-
ditum necdum germinauerat quum inde disce-
derem.

*Colchicum
Neapolit.*

*Hermoda-
ctylus Sy-
riacus.*

COLCHICVM BIFLORVM.

NOuum & ratum Colchici genus est cuius
cognitionem acceptam fert Clusius Doctiss.
viro Moyfi Quadrato qui monebat Verno tem-
pore sibi obseruatum in montano quodam pra-
to, non procul Heydelbergi, vbi tum domicilium
habebat: edoctum tamen antè, similem iuveni-
ri plantam, ex Epit. de Plant. C.V. Ioaehimi Ca-
merarii inclita Reipub. Noribergem. primarii
Medici. Io. Mulerus Pharm. Francofurtensis et-
iam asserbat, sibi adolescenti conspectum in
pratibus Sauerorum vicinis nouo Vere florens.
Petinde autem crasso id constat *bulb* ac vul-
gare Colchicum, ex cuius infimà parte *caulis* emer-
git quatuor uncias longus, ex membranaeco

innolucro *florem* promens oblongo pediculo ni-
tentem, vulgaris flori formâ æqualem, sex foliis
constantem, sed minorem, quorum terna ex-
terna maiuscula,




interna autè
tria angustio-
ra & breuiora,
saturatiùs
paulò purpu-
rascentia esse
videbatur: nec
folia, nec se-
men [si quod
tulit] obser-
uare licuit
Clusio per
morbum.

Lobel. Ani-
mad. part. 2.
Colchici bi-
florum vulga-
ri simile, sa-
turiore flore
Clusii & Ca-
merarii. Con-
siderandum.

an hoc Colchicum biflorum non sit idem cum
Camerarii verno, licet aliam iconem proponat
Clusius.

COLCHICVM VERNVM CLVSII.



Quadrage-
simo pri-
mo capite l. 2.
mex Rario-
rum plant. his-
torie, inquit
Clus. Exot. p. 2.
Appèd. 1. Col-
chici verno
tempore *flo-*
rem proferen-
tis mentio-
nem faciebã,
quod tandem
biflorum esse
existinasse:
quia nouo Ve-
re cum suo
flore acceptu,
deinde Autu-
mno cum aliis
colchici gene-

ribus *florem* conspexisset. Quum autem non ni-
si Autumno flores gustare possem obseruarem, istã
appellationè in li commentis non sum arbitratus,
sed præter naturam in solito tempore primum il-
lum *florem* tulisse censebam, vt in aliis plantis
interdum contingere videmus.

Verum tamen peculiare Colchici genus repe-
ri, quod nouo duntaxat Vere, cum Croci verni
& dentis Canini generibus, non autem alio tem-
pore flores gerat, Doctiss. vir Io. Verneius
anno à Christi natiuitate 1601. Iulio mense ad ire
scribebat, & sex eius bulbos mittebat, quos illo
ipso anno è monte Sorou in Hispania eruerat. Ho-
ni quatuor insequente Vere apud me flores tulerunt:
vnius flore, atque alterius cù suo capite
trigono semen continente iconem in subiecta
tabella

tabella exprimendam curabam. Non porro Vere cum Dente canino, Crocoque verno, vt dicebam, hoc Colchici genus prodire, & vnum aut alterum florem vna cum foliis producere solet, primis quidem diebus, ante quam sese explicare & pandere incipiat, coloris albi, sed qui paullo post in purpureum dilutiorem mutetur, breui pediculo lubnixum, sex foliis constantem, minoribus & angustioribus quam in vulgaris flore, & Croci verno albo formam valde similem, singulis foliis ex infima sede album, *stamen* proferentibus, cuius apex flavus: exteriorum trium foliorum stamina interiorum staminibus tunc breuiora: & medio floris umbilico oblongiutculus exilit *stylus*, staminum longitud. superans, albus, in tres partes summo diuisus. Nascebatur vero flos ille inter terna folia carinata sese mutuo completentia, Colchici vulgaris foliis longe angustiora, montani tamen Hiip. foliis paulo latiora: flori succedebat triangul. membranaceu capitula haud magnum, *semen* continens rotundum, subrufum: *radix* Colchici vulgaris radice siue bulbo, formam quidem si nilis erat, & fusca pelle obducta, sed longe minor, multas candidas fibras ex infima sede protuberante spargens. Plures similes bulbos anno insequente cum aliquot aliis elegantibus plantis ad me mittebat idem Venerius atque ad Hogelandium & Porretum: sed meos cum iis qui prius missi, & plurimis aliis leuissimis plantis subsequens hiems corrumperebat: vt plerumque Cannensem cladem meus hortulus illa hieme acceperit, tamen si etiam non vulgarem duabus precedentibus passus esset.

COLCHICVM VERNVM CAMERARIL.



Colchicum vere florens, cuius flore mense Aprili nonnunquam inuenit Camer. in Epir. Matthiol. prodeuntem ex foliis breuiusculis, ternis, herbaceis, quibus antequam emergat involuitur. *Flos* ipse obfoletiore colore purpurascit, quam qui Autumnoprodit, apices

partos luteos habet, & totus etiam minor strigosiorque apparet. Gesner. annotauit apud Camer. horti, Colchicum subobscurum flore praeter altero & minore crescere circa Tigurum in Heluetia Aprilis initio, cum alia omnia in Autumnum florent.

Considerandum, an Colchicum vernalis non sit idem cum colchico bifloro Clusii, vel eius verno, quamuis Icones differant. *Colchicum Polyanthes siue multiflorum purpureum.* Nihil a vulgatissimo Colchico differre videtur, praeterquam florum abundantiam: denos enim, duodenos, & plures purpureos dilutiores Septembri profert flores, quemadmodum Colchicum Tom. 11.

Pannonicum polyanthes candidos eodem tempore. In Cameracensi de uexo agro, miliari paruo ab vrbe, in villa Nicruui vocata, quo loco D. I. Fraqueville collegit. Perperam Pseudobotanici nuperi nugivenduli Colchicum purpureum Austriacum dixerunt, Lobel. Adu. par. 2.

COLCHICVM POLYANTHES CANDIDUM eleganti rubore varium.

Indelictis est (inquit Lobel. Adu. par. 2.) perlegans Colchici genus in Belgio, etiamque Londini in horto plantarum exoticarum ditissimo D. I. de Fraqueville, ob floris amenitatem quae nunc plurimum foliis latiusculis praediti, nonnullis candidis omnino, aliis vero rubore diluto prorsus tinctis, aliis candore & rubore hilariter secundum folii longitudinem dimidiatim distinctis, aliis denique medio lineis albis striatis. Quos flores edidit congelstos, quorum vnus quatuor tantum foliis constabat, quam aliorum latioribus: totidem item staminibus luteis praeditus: at caeteri omnes quinque donati fuere. *Folia* latiora vere erumpunt, cubitalis longitudinis altiorisque, haecenus neque *semen*, neque folliculos, iam octavo anno edidit. *Bulbus* Colchico Pannonico albo maior.

Descriptio



COLCHICVM POLYANTHES ALBVM.



Sic describit Clus. Pann. & Hist. post. Colchicum, *multiflorum* albo flore. Multorum florum est, quod in quibusdam pratis Viennae Austriae vicinis, nec procul a Danubio sitis, inter vulgares plantas nascens ante multos annos obseruabam, vt in hortulū transferrem, deinde in pratis arci Staren. lii 2

Descriptio

berg Magnif. Da. de Heufenstein vicinis, magna copia inuentum est. Septenos enim, denos, aut duodenos, vel etiam plures interdum promit flores lactei candoris, eleganti spectaculo: huius etiam folia, vulgaris Colchici foliis æqualia, sed dilutiùs virentia, inuente duntaxat Vere exeunt: copiosum fert semen subrufum in laxis triangulis capitibus: radii, vulgari bulbo maior, ad Secundi tamen, siue insequentis, amplitudinem non accedens. Istic & pauci bulbi reperti. quorum flores eleganter rubebant.

Col. hirsutum rubro flore.

Camer. epit. Marth. Colchicoidi polyanthon flores albos proferens. Item horti, Colchicum Pannonicum polyanthum flore albo: quamuis in Germania quoque interdum flore albo reperitur, sed non ita referto in vna planta. Plant. Ic. p. 144. Colchicum candidum Pannonicum polyanthon Clusii. Teut. 177.

Locus & tempus

Colchicum simile Anglico flore albo, Autumnno pratis quibusdam Viennæ Pannoniæ vicinis, non procul à Danubio cruit Clus. Hist. radicibus magnis, quæ nonnquam semos aut octonos flores simul protulissent.

Tabern. icon. Colchicum Polyanthos: & Hist. par. 2. p. 311. Colchicum 4. Item p. 620. Colchicum album Pannonicum Vngaricis & zeulosen. Hist. Colchicum 7. Ponende erant eius duæ icones sub vno titulo & in eadem pagina, vna enim monstrat florem sine foliis, altera folia cum fructu sine floribus: nec numero distinguenda erant.

Tabern. not.

Hunc Bulbum charissimus F. C. Bauhinus misit Basileâ, vegetum admodum mense Augusto ann. 1608. qui recte commissus, floruit in horto E. C. W. Montbelgardi Septembri.

COLCHICVM CANDIDO
flore Anglicum.

Descriptio



Istud nupian Herbariis memoratum, quia Anglia copiosissimum spontè fundit, nec alibi facile reperias, Anglicum nuncupauimus. Perpulchra planta, lacteis floribus Ornithogali vel Asphodeli maioribus, Croci montani Syluetris paribus, caulis seliquipalmaris: radix & folia,

aliòqui pratensis vulgaris sunt: ea tamen foris fusca, intus candida. Londini hortis mense radices Hyemem ferunt, Vere emergunt, non secus ac in collibus & montosis prope Britoliã &c. Aduers. Lob. Obs. & Ic. Pl. p. 143. Colchicum candido flore Anglicum. An Moly Hoinerum radice nocua.

Moly Hoinerum. Lobel. not.

Considerandum an Lob. verè dicat Colchicum Anglicum candidum, nusquam memoratum, & an differat à Cordi candido, de quo multis annis

antè scripsit in sua hist. his verbis: Colchicum album floribus, foliis, semine, & radice Colchico nigro & subrubenti si nile est, qualitate tantum ab illis differt: siquidem radix etiam cum sicca fuerit foris albicat, quanquam interdum flauescat cum inuenerat, intus verò candidissima, tenera, in tundendo mitis, mollis & tractabilis existit, quæ tusa farinam triticeam aspectu refert Saporem habet dulcem & valdè suauem, nulla amaritudine mixtum, spontè in Germania nascentem nondum vidi, sed cultam tantum, & è louginqus allatam lucis.

Verisimile est (inquit Dodon. purg. hist. & in fol.) albidum huius peregrini Colchici radices esse, quæ in Officinis Hermodactyli nomine veniunt: qui non propriè Colchicum dicitur. Monendi lectores ne confiderato solo colore floris Colchici sibi remerè persuadeant vel non venenatum, vel eundem cum Hermodactylo Officinatum: Anguillara & Lobel. volunt Hermodactylos officin. alterius differentis plantæ esse radices, nempe Colchici Illyrici.

Clus. Colchicum Polyanthemo Pann. affine, siue Anglicum albo flore.

Tabern. icon. & Hist. Colchicum album Anglicum. Item Colchicum album Germanicum. Duas icones habet Tabern. vetum non demonstrat qua in re differant plantæ.

Thalio in Hircyn. Colchicum flore candido quod propè Ssenburgum reperitur. An Camer. hort. Colchicum flore albo, quod in Germania interdum inuenitur? Hist. Lugd. Lobeli Colchicum flore candido Anglicum.

Colchici albi nomine missum Heidelbergâ semen paruum, magnitudine ferè simile Papaueris Corniculati, non omninò rotundum, penè cinereum: scui Montbelgardii in Horto III. E. C. An idem fuerit cum præcedenti dubii hærenus.

Colchicum pratense Salmaticum.

Colchicum pratense Salmaticum vulgari minus Salmaticensi agro obseruabat Clusius in altioribus pratis, dilutiore flore, atque in nonnullis plantis, lactei omninò candoris, inuente Vere folia duntaxat proferens. Hist. Lugd. Colchicum vulgari minus, flore omninò lacteo Clusii in pratis Salmantinis.

COLCHICVM PLENO FLORE



Elegans est Colchici genus, quod apud Belgas inuenitur, cuius quidem cognitionem acceptam fero (inquit Clusius) Ill. Comiti Artembergio. Is Autumnno 1595 bulbum ad me mittebat, vt florem conspiceret postem: sed cum nullum protulisset insequente Nouembri iconem egregiè expretam adauit. Flos vulgari colore perti-

perfamilis est, sed pluribus foliis constans, nempe vicenis aut pluribus, valde confertis, quorum sex externa reliquis maiora, vulgaris tamen foliis angustiora, inter quæ *stamina*, vt in vulgari, flauis apicibus prædita. Ex alimentis copia plenum florem tulisse existimabam in iudicium, quemadmodum natura interdum ludere solet in aliis floribus qui deinde ad ingenium redeunt: sed ipse Comes asseruit, tum etiam Io. Boifot, singulis annis plenos flores id Colchici genus profert, eoque plures, maiores, & maiore foliorum numero constantes quò bulbus maior & vetustior est.

Originem ex Germania ducere aiunt, & primùm in Belgium allatum à Rhizotomo, cuius nomen Nicolaus, qui frequenter è Belgio in Germaniam à Nobilibus quibusdam matronis ablegaretur. Huius autem Colchici plenos flores anno 1599. obseruabam esse versicolores & folia habere coloribus similibus distincta, quibus Colchici versicoloris alterius flores distincti sunt, hoc est, ex albo & dilutis purpurascens mixtos. Colchicum pleno flore Antuerpiâ Londinum (Lobel. Adu. par. 2.) misit Clariss. vir D. Aluarus Nunnius summus Philof. & Med. parum à vulgari Colchico, nec nisi concoloris floris multiplicabili incremento distinet. Surreptus fuit eius bulbus cum aliis plantis Nobilib. Baronis Zouche.

COLCHICVM BYZANTINVM
latifolium Polyanties.

Colchicum Byzantinum *μακροφύλλο* nouo Vere germinat, ternâq; aut quaterna producit *folia* amplissima, Elebori albi foliis nec formâ, nec magnitudine valde ab similia, nec illis minus nervosa, magis tamen viridia, & sese mutuo amplectentia: Autumno cum vulgari numerosos fert flores, vt vicenos aliquando ob-



seruare meminerim [ait Clusius Hist. post.] ex eodem bulbo prodeuntes, vulgaris quidem floribus forma & colore propè similes sed ampliores, crassioreque pediculo subnixos, foris dilutius, internè saturatiùs purpurascetes, & tanquàm venis quibusdam per folia sparsis notatos. In quibus *stamina* vt in vulgari: latis copiosum *semen* fert interdum in triangulis laxis breuibûsq; capitulis siue folliculis, triplo crassius vulgari: eius *radix* crassissima, pugnum æquans vel etiam amplior.

Constantinopoli singulares eius bulbi bis sūt allati dum Viennæ vivebam: Gen. D. de Heufenstein, à qua prolem accipiebam.

Colchicum Lusitanicum purpurei cum albo mixto coloris.

Cum Byzantini flore quandam affinitatem, autore Clusio, habere videtur *flor* eius Colchici, quod Theod. Clusius è Lusitania acceperat: nam sex etiam foliis constat, purpurei cum albo mixti coloris: & velut tessellatum [vt in Fritillariæ flore] dispositi, floridioris tamen: umbilicam etiam occupant sex alba *stamina*, flauis apicibus prædita, & medius *stilus* in staminula diuisus, purpurascens in supremâ parte coloris: odor aut nullus, aut valde obscurus. Floret cum reliquis Colchicis.

Descriptio.

Colchicum Lusitanicum serotinum flore albedo cum tantillo rubore.

Bulbum adnatum sibi annexum habet, inquit Lobel. Obs. *flor* albidus, nitidus, tantillo summis foliis rubore confusus: alioqui persimilis effigie & magnitudine vulgato nostro Colchico, quale Liex Brabantorum floruit Septembri & Octobri in amenissimo horto Mariæ de Brimeu.

Colchicum latifolium Boifoti.

Quartum genus à Boifoto accipiebam (pergit Clus. Hist. post.) crasso etiam Bulbo, quod terræ commissum non modò non floruit, sed prorsus perit. Scribebat autem eius florem purpurei coloris esse, qui procul aspicientibus vulgari patere apparet, at diligentius obseruantibus, coloris ex albo & purpureo distincti videbatur, satis ad Fritillariæ colorem accedens: folia item habere ampla, ad terram inclinata. Postea tamen, conspecto Colchici Byzantini, cuius bulbum ad ipsum mittebam, flore, diuisum à meo latifolio, suum Colchicum esse monebat. Forsitan verò idem genus erit, cum Lusitanico Clusii.

COLCHICVM HOIKIAANΘΕΣ
sue versicolore flore.



Colchicum *ποικιλανθές* siue rectum genus [inquit Clus. H. post.] habeo munere Generosi Dn. de Heufenstein, quæ in cultissimo suo horto suburbano ad Viennam urbem, binos aut ternos alebat, quos vnde adquisiisset, ignorare se affirmabat. Non minus est crasso id bulbo, quàm Primâ, vel etiâ crassiore: Octobri, paulò seriùs quàm superiora, binos, ternos, aut quaternos, producit flores, vulgari breuiore, & breui pediculo innixos, vt vix supra tellurem attollantur, quorum interiora tria folia ex pur-

Descriptio.

purei, paulò seriùs quàm superiora, binos, ternos, aut quaternos, producit flores, vulgari breuiore, & breui pediculo innixos, vt vix supra tellurem attollantur, quorum interiora tria folia ex pur-


purâ quodâ modò rubent, aut Hispanici montani floribus concoloria sunt, vt plurimum, exteriora autem tria vel omnino lactei candoris sunt, vel internè mediâ ex parte purpurea, aut crassioribus purpureis venis radiatim distincta, vel purpureis maculis aspersa, omnia verò mucrone magis orbiculato & obtusò quàm in vulgari: huius *folia* ineunte Vere germinantia, ex viridi purpurascunt, deinde explicata saturius virent vulgari foliis. Semel duntaxat eius *semen* legere meminissis, prioris semine minus.

Colchicum montanum alterum.

Aliud (inquit Clusius) Colchici vericoloris flore genus accipiam ab honesto viro Theodoro Coornhart anno 1599. quod *bulbo*, & *foliis*, cum vulgari profus conueniebat, & perinde altè asurgebat, *flores* proferens vulgari floribus formâ quidem similes, sed diuerso colore, ex albo videlicet & purpurascente vario, dissimili tamen à præcedente, quia in hoc colore magis permixti, & purpurascens dilucior: binos vel ternos tulit flores, quibus successerunt longa, crassa, & trigona *capita*, vulgari capitibus non dissimilia *semen* etiam simile continentia, Florebat cum vulgari, paulò maturius præcedente.

COLCHICVM MONTANVM
flore purpureo.

Descriptio



TERNA, aut quaternaria sunt *folia*, digitalis longitudinis, carinata, firma, humi tamen sparsa, saturatius virentia & splendens, vix semunciam lata, acidigustus, rufescentem colorem contrahentia dum tabescere incipiunt: *flor* sine foliis primùm exilit Septembri aliquando etiam Augusti,

sex longis, angustis, & ex purpura rubentibus foliis, toridem medio *staminibus* constans: hunc statim (præter aliorum Colchici generum morem) *folia* subsequuntur, & totam deinde hiemem perdurant, vsque in Mensẽ Maium, vel etiam Iunium: *radix* bulbosa, non magna, multis ex rufo nigricantibus tunicis amicta, intus alba, solida, & cum quadam adstrictione dulcis, longiusculâ sede, quali in cæteris generibus, & adnatis in lateribus se propagans. Et sic descripsit Clusius, qui passim tum in Hispania, tum in Hist. poster. Colchicum montanum Hispanicum, siue quintum *λεπτόβουλον*, aut tenuifolium, Salmaticensibus Merenderas vocatum, appellat.

Colchicum minus semine prægnans. Item

Colchicum minus florens, Colchicum montanum Clusii: Cuius minorem speciem, olim latissimis patenlibus pascuis ad montis Lupi Norbontensis radices, ad diuersorium publicum, via qua Gangen vrbeculam itur, collegimus [inquit Lobel. obs.] Septembri Rosculus stellatus croceus, aut Colchici vulgaris purpurocæruleus erumpit, sed minor. Idem esse audio cum Colchico montano Clusii nostri, quod olim seuerat in horto Cl. D. Brancionis pro Erythraico, foliis croceis, angustioribus, in cauliculo vix palmum æquante, & interdum etiam maiore. Semen subrotundum, Colchici vulgaris, in siliqua triquetra. Icon. pl. p. 145. Colchicum minus semine prægnans Lobel. 70. Teut. 178. Item Colchicum minus florens siue Colchicum Clusii Teut. 178. Obseruandum apud Plantinum in hoc Colchico rictulum, transpositum, figuræ autem sunt ex Clusio.

Hist. Lugd. Colchicum montanum Clusii, & Colchicum montanum minus Clusii.

Tabern. icon. p. 621. Colchicum montanum Clusii & Hist. Colchicum 10. Bergzeitlosen. Item p. 622. Colchicum minus Flein zeitlosen: & Hist. Colchicum. 11. Ineptè Compilator ex vna planta duas facit.

An Camer. hort. Colchicum paruum Hispanicum.

Collibus Salmaticæ vicinis, solo valdè lapidoso primùm eruebam, inquit Clusius, cum suo caule, dodrantali, firmo, & triangulari capite, in quo semen ex rubro nigrescens, siue fuscum, læue, exiguum, subrotundum Maio mense, anno 1564. Apud Belgas, apud quos, semine quod natali loco collegeram, natum est, nullum adhuc semen dedisse intelligo. Viennæ autem Austria, quoties ex meis stirpibus semen collegi, capite inclusum vix terrâ interdum emergente, & inter folia iam languida latente, aliquando digitali & palmari cauliculo innitente, vti etiam Francofurti ad Moenum, & Lugduni Bataurorum.

COLCHICVM MONTANVM
minus vericoloris flore.



Colchicum montanum minus vericoloris flore (vt ait Clus. post. hist.) Hispanico non multum est ab simile, quod Jac. Placæu in suo horto Tornaci alere ad me scribebat, tum foliis, tum bulbo: flores autem disseminat, quorum omnia quidem folia longa & angusta etiam essent, interiora verò tota alba, exteriora media ex parte viridia, altera carnei quodammodo coloris.

COL.

677
Corompe;
melior.

COLCHICVM MINIMVM TENVIFOLIUM Gallæcium

NOuum Colchici pumili genus (inquit Lob. Adu. par. 2.) alimus in horto operâ lo Quæ rhizotomi Luteciani ex Hispaniâ regionû Gallæcia delatum, foliis Croci montani minoribus, humi sparsis, binis, ternis, quaternis aut quinis, carinatis, vncias binas, aut sesquiuunciam longis (mihî folia duo solum dedit.) Radice Colchici, Auellanzæ pamiæ nucleum æquante: flore vnâ cum foliis prodeunte, senis constante foliolis angustioribus, purpurantibus: totidémque staminibus, & apiculis luteis præditis, è breui pediculo parum è terra emergente. Floruit nobis Anno 1403. Hoc etiam alitur in hortis Londinensibus, exoticis plantis distissimis D. Coys, & D. I. Narsimith Botanici Regiî primariî & Chirurgi.



HERMODACTYLI VETERIBVS.

CAP. VIII.

Quod magno & pernicioso errore Scrapio Colchicum & Hermodactylum confuderit, describens hunc iisdem planè verbis, quibus Dioscor. Colchicum, confirmat Paulus Aegin. l. 7. de Ephemero & Hermodactylis scorum, tanquam de diuersis, tractans, ac quidem de Hermodactylo. Hermodactyli radix (inquit) & per se, & ipsius decoctum vim habet purgandi: priuatim etiam arthriticis nunc quum humores desunt exhibetur: verum stomacho nimis quàm aduersatur. Quidam verò in ipsis exacerbationibus, in omnibus arthriticis purgatione ex Hermodactylo vtuntur, verum attendendum est, quia stomacho incommodus est Hermodactylus & anxios ac ciborum inappetentes facit. In foliis igitur his qui negotiis quæ differri non possunt vtuntur, ipso vtendum est, Compendio enim & post duos vt plurimum dies sedat fluxionem, vt quis ad consuetas functiones obeundas transire possit. Noui autem quendam qui non ipsam Hermodactyli substantiam exhibet, neque aliquod medicamentum ex ipso compositum, sed herbâ ipsam coquit, cum aliquo ex consuetis pharmacis, velut Aniso, aut Apio, & decoctum bibendû præbet. Et mirum est quomodo per Ventrem euacuatî à fluxione liberantur. Oportet autem præterea quòd stomacho incommodus est, velut dixi, postea stomacho gratis, & corroborantibus, cum moderata caliditate, osculum ventris corri-

gere. Cæterum Alexander purgationem ex Coronopodio, inliorem esse dicit eâ quæ sit ex Hermodactylo, vt quæ eandem euacuationem & dolotis sedationem efficiat cum hoc, nec stomacho incommoda sit. Hæc Pauli.

Actuarius lib. 5. Meth. Med. cap. 6. de antidot. compositionem habet, quam vocat ex Hermodactylo, podagricis & arthriticis, vt quæ succos crudos ex alto detrahit, proficiam: Recipitq; Hermodactyli, Galangæ, Pyrethri, Zingiberis, Zaduaris, Anisi, Gentianæ, Aristolochiæ, singulorum quadrantem, mellis sufficientem modum.

Inter alias quamplurimas compositiones purgantes, quas hic enumerare & longum & tediosum foret, Nicolaus Myrepsus in aurea Alexandrina recipit Hermodactylum rubrum & album. Quæ quidem compositio non instituitur ad purgationem.

De Hermodactylo hæc Mesues lib. 2. cap. 6. de purg. Hermodactylus est radix herbæ cuiusdam montanz: & ea vel digitum longa, vel rotunda, ac eadem præstantior, si multum est albâ, intus & foris, magna, mediocriter dura: alter Scilla aut Raphano proxima, si creuit, si Vere lecta est, & mensis deinde sex siccata est. Rubra autem & nigra mala est, & quæ in loco pingui & humido prouenit, quòd inde humor eius inflans, & excrementosus ei largior insit. Rara verò, laxa, & leuis est imbecillior. Calidus est ac succos ordinis secundi in initio, cum humiditate tamen excrementosa, flatulenta, nauseabunda, quâ ventriculo nocet, præsertim quando in eum ex paribus aliis excrementa confluunt, Pituitam crassam præsertim à inunctis trahit, ob id podagræ, & aliis arthriticis differentiis confert, non sumptus modò, sed etiam Cataplasmate ad motus, præsertim cum vitellis ouorum, & farina hordei, vel mica panis. Impinguat, sperma auget, vlcibus confert, quia terget sordem eorum, & carnem in his putrem consumit. Cuminum, Zingiber, Piper longum, Libysticum, Mentastrum, Mastiche, mista, Hermodactylum prohibent, ne suo humore excrementoso, & flatulento ledat ventriculum, nèue flatus crassos & nauseabundos, in eo excitet, aut multa in ipso excrementa colligat. Si verò Hermodactylus cum paucis Zingibere, & succo Raphani, vel cum Scilla assata, aut Scilla succo & Zingibere, & spica in trochiscos fingatur, purgat celerius & plenius (per se enim tardè & imbecilliter vacuat.) Myrobalani quoque reborando stomachum Hermodactylos citò deturbat, & humorum in ventriculum affluxum prohibent. Datur ab aureo vno ad aureos duos: annos tres feruatur.

Cæterum Hermodactylus radice oblonga, Neotericorum est Tagauicio Ephemerum Diosc. Galeni & Pauli, vt indicatur sub titulo Colchici vulgaris. De hoc autem quod à multis dicitur & sentetur Hermodactylus] sub suo titulo.

Existimat quoque Dodonæus Hermodactylos Officin. esse Colchicum flore albo Cordi. Anguill. contrâ & Lobelio Hermodactyli officin. sunt radices Colchici Illyrici luteo siue flauo flore.

Brunf. tenet Hermodactylum Narcissum esse Germ. Hornungsbilam.

Hermodactylus Mesux quibusdam est Pleurohermodactylus, qui aliis Satyrium Erythronium censetur.

Hermodactylus (inquit Tragus) mihi dicebatur Cyclamini parua species, sed falsè.

Hermodactylo tandem non venenato conge-

Hermod.
rubr. &
album N^o
col.

Herba m^o
tana.
Longa &
rotunda
Alba præ
stantior.
Scilla aut
Raphano
similis
Rubra &
nigra tar
ta.

Corrosiui

Purgatio

Dosis

Hermoda.
ctyli x.
quiuoca.
tiones &
substituit
Ephemerum
Petrerib.
Colchicum
vulgar.
Colchicum
flore albo.
Colchicum
Myrricorum
flauo flore.
Lencioin
bulbosum
Theophr.
Satyrium
Erythronium
quorundam
Cyclamen.
Iris bulbos.
sa.

ner Lobelio, videtur Iris bulbosa latifolia hispanica Clusii.

Iris tuberosa.

Marth. suum Hermodactylum haber de quo cap. de Iride tuberosa, qui non placet Lobel. & Dodonæo, nec nobis.

Palma Christi sive Orchis palmata.

Hermodactyli albi & rubri [Lob. Adu.] Nicolai, Actuarii & aliorum, non Cathartici, sed Cordi, Venerique amici: an sint Behen album & rubrum eadem? Vocem Hermodactyli æquiuocam fuisse, & Ephemero Diosc. comparari potuisse, non modò caput Pentaphylli indicat [vt cuius radix Hermodactylus sit vocata, non ram similitudine, quàm superstitiose & incantatoria expiatione,] sed etiam quæ extant apud Actuarium & Nicolaum celebres admodum compositiones arguunt. Quippe Aurea Alexandrina illa & Diamoschum Hermodactylo rubro & albo non carent, misceturque aliis apud Arabes compositionibus cordialibus, &c.

Hermodactyli Endi.

Hermodactylum ad verbum interpretatur Mercurii digitum (interpretis autem est Tagault.) quòd digitorum forsitan imaginem quandam exhibeat, quo nomine etiam Pentaphyllum Dioscorides appellauit. Vnde factum est, vt plures Pentaphyllum, Hermodactylon, esse arbitrarentur, Verùm Pentaphylli radix tantùm à nostris hermodactylis vocatis differt, quantum lux distat à tenebris.

Fuchs. vir sua ætate ceber in Nic. Myr. In auream Alexandrinam Hermodactyli rubri & albi &c. Per hermodactylos hoc loco & aliàs etiam Nicolaus intelligit radices, quas Officinæ hodie vocant Behen album & rubeam, Quod etiam facit Actuarius. Idem in antid. Esaræ putat per hermodactylum intelligi Been. Et lib. i. c. 8. Actuarius certè, vt ex compositione Antidoti Diamoschi Sole Meridiano clariùs conspicitur, & Nicolaus Myrepsus multis in locis Behenum album & purpureum, nominant hermodactylum candidum & purpureum, forsitan quòd digitorum quandam imaginem radix illa exhibeat. In antidot. Actuarii & Moscho nullam mentionem hermodactyli inuenio, vt dixit Fuchsius, habet enim Antidotum propriam ex hermodactylo, in qua non videtur loqui de Been, cum dicat eam antidotum ex alto detrahere. Idem Fuchsius de com. med. l. i. c. 94. hermodactylus Mefue radice digitali, est Behen.

Fuchs. not.

Been.

Quæ autem radix nobis hodie [inquit Marthiol.] Hermodactylus dici possit, difficile quidem fuerit discernere, quòd ex probatis rei herbariæ Scripitoribus hæcenus neminem inuenirim, qui notis vllis eius tradiderit historiam. Verùm tamen si ex vocabuli etymo conicere licet, nil aliud significare videtur hermodactylus, quàm digitum hermetis. Vnde factum est, vt aliquando cogitauerim, an illa bulbacea radix, quæ manus humanæ formam refert, quamque vulgò Christi palmam appellant, ad hermodactylum accedere possit. quòdque sumpta non modò vomitiones, sed & aluum cieat, vt testis est Nicolaus Florentinus, qui hac radice, pluribus factis vomitionibus, Biliozum quandam quaternarium curauit. hæc in medium proferre libuit, non quòd ita esse certò asserere auisim, sed vt rei herbariæ studiosis res hæc melius æstimanda proponeretur.

Been. Tormentilla. Palmata.

Gesner. epist. l. 2. ad Oeconem. Pro Been albo & rubro, si tormentillam ponitis, cur non relinquitis, quòd ex maritimis tractibus adferunt Been rubri nomine? id enim à tormentilla colore, o-

dore, sapore eue nihil differt: à pallinacæ autè radice, quam been albo substituitis, toto genere differt tum forma, tum viribus. Ego pharmacopolis nostris vt vel radices, vel flores albos & rubros, Saccharo præsertim conditos, pro Been substituant consulo. Verum quidem vtrunque facillè haberetur è Syria: est enim quod *Allabe* Barbariæ vocat Auicenna. Quæ radix, inquit Bellunenſis, similis est Rhaphano paruo, oblongo, aliqui hermodactylorum speciem quãdam esse dicunt, & appellari apud Arabes etiam *Buzeiden*. Sic ille. Actuarius etiam pro Been, modò hermodactylum album & rubrum: modò heelenium album & rubrum scribit.

Diosc. [inquit Tragus] nullius meminit in scriptis suis hermodactyli, præterquam in Pentaphyllo, quod alias Tormentillam vocant.

Syluius in antid. pro Hermodactylo in doloribus iuncturarum substituit folia Anchusæ & dimidium Bdellii. Quod idem Placor. facit.

Norat Castor Dar. quod in pilulis aduersus arthritidem pro Hermodactylis, Pharmacopœi non ponunt Colchici radices, sed pro succedaneo videntur Centauro minore.

Radix Hermodactyli habet virtute n laxatiuam, & similiter aqua in qua bulliunt, datur autem propriè in doloribus iuncturarum, in tempore fluxus humorum ad eas, verùm ipse est malus stomacho. Confert dolori Podagræ, & est laudabilis finis operationis eius, verùm nimis vltus eius facit putrescere musculos. Confert tamen iuncturis multum. Surugen albus augmentum efficit in spermate. Albus est bonus podagræ, sed rubeus occidit, & non est frigidus nimis, ita quod narcotizet, quia si hoc esset, non esset laxatiuus. Hermodactylus est calidus in primo gradu. Rubeus occidit, & albus confert podagræ, & desiccet vlcera antiqua, & abstergit ea, & est frigidus & siccus in secundo. Si Hermodactylus esset calidus, mordicaret vlcera. Hermodactylus est calidus, multæ caliditatis. Est calidus & siccus in principio secundi gradus, & habet proprietatem sedandi dolorem iuncturarum & Podagræ, & confert variolis, & meliorem eo est ille qui est interius & exterius albus, & quando frangitur, est contractio eius facilis, & non dura. Niger verò & rubeus sunt ambo interficientes. Errauerunt autem qui putauerunt quod ipse sit Lagia agrestis quæ defertur ab Africa, nam illa Lagia impinguit mulieres, quando bibunt eam, & humectat corpora sicca, & augmentum efficit in carne, & facit rubere faciem colore bono, quando datur in potu cum Sannich, est calida, caliditate forti, & commouet sanguinem, & acuit eum multum, & fortassis inducet poranti se dolores calidos, adustiuos, & infert nocumentum magnum, & ægritudines sicut Erisipelam in capite & facie, & in membris aliis corporis. Hæc dicunt apud Serapionem varii, qui etiam de Hermodactyli temperamento & facultatibus contraria videntur statuerè.

COLCHICVM MINVS MALIGNVM, sive Hermodactylus Officinarum.

Officinarum Hermodactyli, radices referunt nostri Colchici, sed quantumuis inueterari extento sunt cortice minimè que rugoso, fusco, compressa Castaneæ figura, in turbinem fastigiata: imò parte fibrarum vestigiis apparentibus, vnde

vnde ad μ cronem per longum

insculptus cernitur canaliculus. Substantia solida in qua nullum vel vestigium fibræ vilius apparet, facile in pollinem teritur, subdulcem, emplastica pulcricula linguam emollientem.

Ruellius existimans hermodactylos officinarum esse Colchicum, venenum putat esse: vti antè dictum.

Tagaultius quoque Differentiam ostendens inter vulgares hermodactylos & Colchicum vulgare securiùs ait in totum ab eis abstinere, ac asserit non esse Pauli hermodactylum: cuius sententia in præcedentibus posita est.

Hermodactyli duo fastigia facit Mefue apud Sylium, vnum radice digitali longitudine, quod Ephemerum esse videtur Dioscor. Galeni & Pauli, radice oblonga. Alterum radice rotunda, & ea foris vel nigra | quod Colchicum est Ephemerum & deleterium, prædictis autorib' passim freques, flore Croci per Autumnum erumpente) vel rubente, vel alba, vt intus, quam eligi solam, si crassa sit ac modicè dura, & ex loco edito lecta: calida sicca initio secundo, gradus, stomacho aduersissima est. Pituatam crassam à iuncturis præsertim extrahit, ob id podagre, & ipsi arthritidi prodest, per se, vel decocto stumpha, aut etiam admota cum farina hordei, vitellis ouorum, mica panis. Hæc omninò est, quam Paulus hermodactylum vocat & ab vtroque Ephemero se parat, Veteribus indicta radix, vti & quæ rubens Mefue dicitur. An verò quæ in officinis ostenditur, horum sit Hermodactylus vel Colchicum, discernere non est difficile his qui legunt, aut integras habent radices, nam delibrata ad nos cõuehuntur. Canis tamen largam eius vim per me depastus innoxie, & multorum tutò hac radice purgatorum experientia quotidiana facit, vt credam, vel hermodactylum hunc esse Mefue, & Neoteriorum Veteribus indicatum, vel saltem non esse Colchicum. Acharium miror inter purgantia simplicia hunc non descripsisse, cum toties eius meminerit in compositis medicamentis, *Ἡρμόδακτυλον λευκὸν ἢ ἄλινον*, alicubi appellans. Serapio hermodactyli nomine principio Dioscoridis Colchicum repræsentat, deinde etiam Ephemerum. De omni hoc genere Mufa in examine simplicia, & Tagaultius suis in Mefue simplicia annotationibus doctis pariter ac luculentis accuratius scribunt. hermodactylus Mefue probatur radice rotunda. Quæ in Officinis est affirmatur mihi ab his qui legerunt frequenter in Gallia Narbonensi & Prouincia, esse folio nigro, porraceo, flore per Autumnum Croci, sine Croco tamen, foris nigra radice: quæ res declarat esse Colchicum, innoxium tamen, aut saltem

innocentius experitur: fortè quia siccatum est, nisi recens nobis vsurpatur.

Tragus hermodactylos officinarum recipit pro hermodactylis Serapionis & Mefue vtrumquod ait ipsos cum Paulo venenum dicere, putat idem esse cum Colchico, & iis abstinendum in internis, forissecus eis vtendum, vt fecerunt Arabes.

Fuchsius quoque teste, hermodactyli Mefue, duo facit genera: Vnum radice digitali longitudine, quod non est nisi Behen, & minime Ephemerum, non lethale, vt nonnulli existimant. Alterum radice rotunda: quod itidem in duo partitur genera. Vnus enim habet radicem albam, crassam, ac modicè duram, atque is est, qui in hodiernum diem nomen Hermodactyli in officinis Medicorum retinet. Ac à Paulo quoque Hermodactylus appellatur. Hic alui decoctionem molitur, pituitamque crassam ab articulis præsertim extrahit. Ceterum is, Paulo auctore, stomacho nimisquam aduersatur. Proinde aliqua quæ eius multitià corrigant ac vehementiam coerceant, illi miscenda erunt: Vt sunt Cinnamomum, Mastiche, Zingiber, aut Piper longum: Datur cum Oxymelle Scillicico, aut melle rosacco, pòdere drachmæ vnus aut plùs aut minùs, pro fumentis viribus. Alterum genus hermodactyli rotundiforis nigram aut rubentem radicem obtinet. Atque is est, qui Croci flores per Autumnum passim in pratibus ostentat, & vulgò hermodactylus nuncupatur. Græcis vetustioribus Colchicon dicitur: is intra corpus ut pote venenatus, tutò haud sumitur.

Hermodactylus non minore copià reperitur apud Monachos in Mef. In montanis, inquit, pratibus, & aliis locis grossi, & pulchri sunt, quod si nesciuissimus eos esse malignos, aliquando comedissemus ipsos. Quoniã vt Dioscor. refert] recententes magnam voluptarem afferunt aspicientibus, & præcipuè incautis de illorum malignitate, eò maxime quòd dulces gustatu sentiuntur. Sed nescimus delicare eos sicut Orientales faciunt. Pluribus enim modis tentantes experiri ipsorum desiccationem, numquam effectum desiderii nostri consequuti sumus. Etenim multos de hoc interrogauimus à quibus varios accepimus modos. Verùm tamen semper omni modo efficiuntur duri vt lapides, rugosi, & vti Carbo nes nigri, forsan quia alio solo & celo nascuntur. Colchicon Græce idem est quod Hermodactylus. Latine etiam Bulbus agrestis dicitur. Auctor enim noster in proprio capitulo duo genera facit. Vnum quod est longum, vt digitus, aliud rotundum: Rotundum quippe est Colchicon. Pro longo autem putamus intellexisse Ephemerum, de quo Dioscorides separatim capitulum fecit. In quo dixit Ephemerum habere radicem &c. Non obstantè quòd dicat Colchicon etiam ab aliquibus Ephemerum, vocitari. Similiter Serapio in vno suo capitulo de hermodactylis, duo cap. Diosc. contrinxit. Scilicet e. de Colchico & capitulu de Ephemero, vbi per Ephemerum Barbarè Achimeron legitur. De rotundo autem, quod est Colchicum, Auctor noster similiter, vt Serapio, posuit tres differentias, scilicet, quod hermodactylorum alius est albus, & alius rubens, & alius niger. Et quod albus est eligendus, rubens verò & niger sunt mali. hermodactyli quidem aromataris & herbaris noti sunt, Sciendum tamen quod recentes non sunt administrandi. Teste ipso filio Mefue, qui

Behen. Non Ephemerum.

Hermodactylus officin.

Hermodactylus Pauli.

Hermodactylus generis albi. Colchicum vulgò. Colchicon.


Locus

Hermodactylus Orientalis.

Hermodactylus Mefue longus.

Ephemerum.

Hermodactylus aromaticus.



Error in-
scriptis A-
uisen.

Hermoda-
ctylus 2 spe-
cies Dodo-
nas.

Scrapio re-
prehendi-
tur.

Reiciendi
Hermoda-
ctyl. Sulg.

Cronem-
burgus: no-
satur.

sic ait. Et meliores sunt, in quibus iam præterit
medius annus, post bonam eorum exiccationem.
Aucenna autem dicit, quod est radix
plantæ habentis Rosas albas & citrinas: in qui-
bus rebus manifestatur vel ipsius, vel interpretis
eius mala intelligentia, scilicet quod pro flore
Croci albicante (vt in Diosc. legitur) intellexit
flore Croceum, scilicet Citrinum, & album.
Vnde dixit: Rosas albas & Citrinas.

Secunda species hermodactyli Dodon. gall.
quæ inuenitur in officinis vocatur à Paulo Aegi-
meta, Mesue, Serapione, & à quibusdam aliis an-
tiquis medicis Græcè *ἑρμόδακτυλος*, Lat. hermo-
dactylus, ac hoc nomine in Officinis cognosci-
tur. Is autem quo in medicamentorum composi-
tionibus vitur (ait idem Dodon. hist. purg. &
in fol.) ab isto differens est. Bulbus nempe huic
magnitudine & formâ satis respondens, verum
resiccatus, & albidus permanens, neuiquam ru-
gosus, modicè durus, tûdique facilis, cuius puluis
candidus est. Valerius, Cordus Colchicum
quoddam reperiri scribit superioribus simile, sed
flore candido. Nondum ego ausim asserere
cum Dodon. Colchicum album Cordidem cum
Hermodactylo Officinarum. Cordus non separ-
at figurâ, sed colore albo à vulgari Colchico;
Colchicum autem Illyricum cuius radices vo-
lunt esse Hermodactylos Anguill. & Lobel. dif-
ferunt colore luteo & figura.

Dilucidum est Cronemb. de comp. med. duo E-
phemeri genera ab hermodactylo Pauli discre-
ta existere, & quam imperitè Scrapio dum vni-
co velut pallo insectiam suam regit, de triplici
planta prodiderit. Iam si synceto iudicio, & ad
amissim, vt dici solet, Dioscoridis atque alio-
rum Græcorum Colchicum spectemus, confera-
musque vulgari Officinarum Hermodactylo,
procul dubio eandem omnino radicem compe-
riemus. Quapropter haud iniuria esset, ab con-
suetudine medica eliminanda. Et si quispiam im-
peritè arrogans mihi quotidianam eius securi-
tatem obiiciat, illi respondeo, vel eò mitiorem
nostri hominibus videri, quod in Colchico solo
non exeratur: Sed in vniuersum innoxiam esse,
nemo sapiens pronunciat. Ego nulli au-
tor ero, vt temerè periculum subeat. Cronem-
burg. nullam facit differentiam inter Colchicum
vulgare & Hermodactylos Officinarum, licet
manifestum sit discrimen.

Matth. vt antè ostendimus cap. de Colchico,
existimat Colchicum idem cum hermodactylis
Officinarum; erroris accusat Serapionem, Fu-
chium, & Monachos: denique reicit omnino
Hermodactylos officinarum vt venenatos.

An Anguill. de hoc loquitur dicens: Colchicu
in Græcia & circa Sclaunionâ differt ab Italico, ra-
dices portantur in Italiam & venduntur pro Her-
modactylis. Nostri [hist. Lugd.] Colchici radi-
ces etiam pro hermodactylis à quibusdam v-
surpentur, sciendum tamen ab Officinarum Her-
modactylis plurimum differre. ni enim pte-
regriini sunt, non permittiosi, vt multis seculis plu-
rimùm vsus edocuit. Tabern. Hermodactylus Of-
ficinarum hermodactyl. Gabr. Fallopius tract.
de simpl. medic. purg. c. 5. tit. de Hermodactylis.
Hermodactylus est duplex, vnus est radix oblon-
ga digiti similitudine, & est hermodactylus Pau-
li. Hermod. verò Mesue est rotundus, & est E-
phemeron Colchicum Dioscor. & iste est in vsu
in officinis: & quamuis in Colcho sit venenum,
tamen in hac regione non est venenum. Vfus

ipsum præcipuè est conficiendas pilulas de her-
modactylis: pro decoctione autem, & pro infu-
sione rarò est in vsu. At empirici probant vsu
Hermodactylorum, quia in morbo Gallico exhi-
bent puluerem ipsorum, & vinum etiam quod-
dam ex ipsis. Sed docti viri non exhibent sub-
stantiam Hermodactylorum, nisi & ipsi vtantur
aliquando medicamentis empiricorum: ar cre-
bto exhibent pilulas de Hermodactylis. Dosis
Hermodactylorum ait Mesue, est à drachma vna
vsque ad duas. Sed Fallopius non vitur Her-
modactylis in substantia: nec vidit vnquam
vllum doctum virum, ipsis vtentem. Nullo
modo assentiri possumus Fallopio nullam faci-
enti differentiam inter Hermodactylos Offici-
narum peregrinos & Colchicum nostrarum re-
gionum: quod non solum in Colchide venenum,
verum etiam apud nos, à quo caueant omnes,
quicquid dicat Fallopius: non sumus etiam vsi
Hermodactylis Officinarum, quum non desint
nobis certiora medicamenta.

COLCHICVM ILLYRICVM SIVE
Græcum non venenatum flore luteo.

Veneris munere Alberti Martinelli Alepo
Syriæ euillas à fratre Cequino habui [in-
quit Lobel. Obser.] Colchici Anguillare plan-
tas, prout palmaribus septenis, denis, & duode-
nis foliis Colchici, striatis, mucronatis, reflexis,
in angulum fastigiatis, imbricatis, & laceratis
stipatis, è quibus in pusillo pediculo, flores exe-
runtur lutei, pallentes, terni vel quaterni, Col-
chici parui minores, itamini bus irem concolo-
ribus: *Siliqua* non dissimilis. *Radix* foris Cereæ
concretio-



ne: intrus eua-
nida & vieta;
qua in cau-
lem, folia, flo-
res, fructum,
& semen vis
tota eruperat.
Anguillare
& Cequino as-
sentendum,
quibus acce-
ptan refeto:
mihî tantùm
siccata arida-
que visa.
Lob. Obs. &
Ic. Pl. p. 147.
hermodactyli
non venenati
Officinarum.
Colchicum Il-
lyricum siue
Græcum non

venenatum Anguillare [Lobel. Hist. Lugd.] Ta-
bern. icon. & Getard. Colchicum Illyricum
Griechisch wesen zerlosen / Græcæ Medow
Saffran.
Colchicum quod prouenit in Græcia & par-
ribus Sclaunionæ circa Sebenium Anguillare, non
illud est quod in multis locis Italia inuenitur,
producit enim folia angusta, similia bulbo, reflexe
in terram radices euelluntur, ac in Italiam ve-
nales feruntur pro hermodactylo. Profert in
Autumno flores similes floribus Croci, sed mul-
to minores, tres aut quatuor in summitate cau-
lis,

lic dodrantalis. Colchicum Illyricum Anguilla-
ræ nunquam Clusio confectum.

COLCHICVM FLORE LVTEO
quorundam.

Subest *bulbus* oblongus, mediocriter magnus, unde fibrae aliorum more dependent, sapore præditus amaro: *folia* è radice statim exoriantur, accidentia ad Leucoium bulbosum, carinata, atroviuentia, & splendida, in mucrone obtusum modicè definentia, crassa, vnciam plùs minus lata, non totum dodrantem longa: inter hæc *caulis* surgit palmo breuior, compressus, in cuius fastigio, hiante folliculo membranaceo, *stos* apparet totus luteus, Colchici florum forma, sex foliis, totidemque staminibus & stylo luteis constant.

Hunc bulbum sic descripsit Clusius: Narcissus



Autumnalis maior. Persico Narcisso valdè affinis est. Narc. Autumnalis, tametsi neuter flore Narcissum æmuletur, sed foliis foliis & radice. Quia autem & sena habet folia, oblonga, pollicem lata, præ viriditate ferè nigricantia, splendens, humi plerumque sparsa, inæc qua breuis exit cauliculus vi-

ridis, rotundus, vix supra terram se attollens, cui insidet stos superiori formâ similis, sed breuior, flauo omninò coloris, ex membranaceo folliculo emergens, cuius exteriora tria folia interioribus maiora sunt, eaque velut amplectuntur, omnia autem mucrone sunt magis orbiculato, quàm Persici folia: sex stamina suis apicibus ornata, & stilus è floris umbilico emergens: radix crassa est, rotunda, intus candida, foris vt Narcissus nigricans. nuius alia species inuenitur angustioribus foliis, in reliquis cum illo conueniens.

Dodon. hist. Lat. Narcissus autumnalis maior, & Narcissus Marcelli dicitur. Lobel. Obs. Colchicum luteum, an Ephemerum non venenato Dioscor. conuenit? Narcissus Autumnalis Marcelli Vitigilii. Mutono flore luteo pallente. Lirium alterum Theoph. Dod. Adu. part. 2. Colchico Narcissus Botanicorum: Narcissus autumnalis persicif. in herbariorum, sine Colchicum luteum vocatum, cum à floris figura, tum à tempore florescendi, verum de hoc maiore & de minore adhuc certatur & ambigitur num referri debeant ad Colchici familiam aut Narcissos, quia vires non sunt exploratæ: quare peritiosos multi in dubium reuocant, vt Io. Moutonius: Catulus de boucin. Ancipitis vtriusque nature videntur: Radicis siquidem concretio & textura Narcissifamilia, quàm Colchico proximior est: cætera magis Colchicum æmulantur. Folia atroviuentia

Autumno cum flore luteo è breui pediculo prodeunt. Proinde liberum cuique erit Narcissif, aut Colchicum, vel Colchico Narcissum nuncupare. Clus. hisp. Narcissus Autumnalis quorundâ & maior hisp. *Ac. genus amarillas*, id est, Lilium flauum. Idem hist. post. dicit, Nonnulli vocant hanc stirpem Narcissum Autumnalem, alii Colchicum luteo flore, cum tamen nihil cum Colchico commune habeat præter florem, reliquæ sunt Narcissif. Quod si Colchicum dicendum, omnia Croci genera etiam Colchicum appellare licebit: E Thracia allatum est Cedonari nomine. Posset non incommodè forsan ad Lirium alterum Theophrasti referri vel *varias* *Θ-ε-ρ-α-κ-ω-ν-ι-σ* Græcè dici.

Colchicum
Ex Thraci-
a.

Tabern. icon. Colchicum luteum. Narcissus autumnalis maior, Geel wifen zeitlosen. Et u. Colchicum tertium.

C Bauhin. Phyt. Colchicum 10. luteum: Lirium alterum genus Theophr. lib. 6. cap. vlt. variat in hortis Belgii angustioribus foliis autore Lobel.

Sub Augusti finem, aurore Clusio, & Septembri, germinare incipit, & plerumque flores. Gaudet montanis quibusdam hispaniæ pratis, etiam in Italia spontè nasci audio, [ait Clusius.] Ex Thracia antè paucos annos etiam adferri cepit, cuius bulbos quiddam siccitate palleferent in insid Persici Narcissif esse putabam: sed emergentia illis, postquam tallari fuerunt communi bulbi, folia, omnem dubitandi occasionem adnerunt. Colchicum flore luteo accepimus a D. Belle fontaine, plantandum in horto E. C. Vidi Argentinae in horto Di. Frederici Meier, à quo bulbos etiam habui: qui in eius horto virentia habent folia Februario, & Martio: auno 1696. in fine Octob. floruit in horto Ill. E. C.

Locus & tempus.

NARCISSVS PERSICVS CROCI FLORE
melino, Colchicis affinis.



A ^{varias} planè est Clus. in Pann. & in post. hist. Narcissus Persicus & floris duotaxat pediculo præditus veluti crocum Colchicumque: exilit ergo è membranaceo *caulic* tanquam ex vaseculo, aut theca *stos* oblongus, Croci aut Colchici floris annulus, sex foliis constant ex flauo palleferentib⁹, quorum tria

Descriptio

interiora paulò angustiora sunt, externa latiora. & summo mucrone nonnihil incurua, siue *an-* *ten* quandam habentia, quæ interiorum mucronem amplectuntur & comprehendunt, ingrati odoris & Pauperis quasi virus redolentis, *stamina* sex medium florem occupant, in foliorum vnguis nata, sed interiorum foliorum reliquis

longiora, exiliter medio oblongior *stilus*, gracilis, & sine capite. *Folia* illi sunt Hemerocallidi Valentinae non multum ab similia, lata, plana, eiusdemque cum illis coloris, hoc est, ad arugineum tendentis, quae ut plurimum conuoluuntur, aut sese circumagunt: *radix* crassa, bulbosa, à basi (quae multis fibris donata est) sterim extuberans, intus candida, foris pallidior quidem, sed aliquantulum etiam nigricans.

Semel duntaxat Constantinopoli allatum est hoc bulbi genus, mihi quae (ait Clus. communicatum à Philiberto de Bruxellis, cuius ante meminimus, anni 1575. initio, quem postea variis amicis cum in Belgicâ tum in Germaniâ distribui. Intrib Narcissum Autumnalem maiorem, ex bulbi forma esse conticiebam, in qua opinione valde me confirmavit flos sub finem Septembris emergens. Sed postquam folia non subsequi animaduerti, & ineunte demum Vere prodire obseruaui, eaque ab illius foliis colore differentia: tam exactius collata inter se utraque plantâ, dispares esse manifestè deprehendi: altate breue inter folia caput pollicem crassum, breui pediculo inhærens, & summa tellure vix emergens, ferre aliquoties obseruaui, quod cum inane esset, feminis conspiciendi spes omnis sublata.

Nomen Schedæ illi addite inscriptum erat *Zarem cada persian.*, id est, Narcissus Persicus. Multum verò conuenire videtur, cum Narcisso uel Lirio altero Theophrasti, cuius meminit Hist. Plant. lib. 7. c. 6. florem amplum illi tribuens, coloremque [ut eruditiones volunt] melinum non nigrum, figurâ oblongum, serotinumque admodum, post Arcturum & circa Equinoctium sese ostendentem, uel, ut sequente cap. ait, Autumnis primis imbribus, quemque lib. 7. hist. c. 12. caulium tantum floris habere dicit.

Icon nostra facta est ad iconem quam habebat Clusius in Pann. eam autem in post. hist. mutauit quod folia attingit.

C. Bauh. Phyt. Colchicum 11. siue melino flore. Narcissus Persicus Clusii. Quo nomine à Tabern. icon. & hist. eum Cam. hort. cognominatur. Frigori nostro libenter afflucescit.

Colchicum vernum flauo flore.

Scriberat Iacobus Plateau [inquit Clusius Hist. post.] Colchicum se habuisse quod verno tempore flauum florem protulisset: sed bulbum cum eruisset corruptum reperisse.

Huius, ni fallor, meminit Lobel. Ad. par. 2. Narcissus luteus vernus D. Leet facie Narcissi Autumnalis lutei siue Colchico-Narcissi Botanicoꝝ; Narcissinae classis videtur noua, rarissima, & elegantissima planta, quae quamuis tota facie Narcissum Autumnalem siue Colchicum luteum vocatum cum à floris figura, tum à tempore cum Colchico florescendi referat, Narcisso tamè propior, quia vere nouo flores laxat. Nouus igitur hic Byzantinus Narcissus folia cum floribus luteis Vere laxat, at ueruentia, situ imitò bina, deinde utrinque plura, binâ & ternâ uinciarum, quae postea excrescunt longiora, Colchici Autumnalis lutei quadantenus: minora tamen paulò, & breuiora: cauliculus compressus ternas & quaternas uincias longus, floribus & seminibus luteis fastigiatus, præ d. Col. lutei similibus, sed minoribus. Bulbus Narcisso Autumnali huius speciei similis, fati magnus pro Plantæ ratione.

nunc debemus D. Leet, insigni Londinensi negotiatori; Constantinopoli à suis mercatoribus cum *alio* rarissimis bulbis transmissum.

COLCHICVM PARVVM MONTANVM
luteum, aliis Narcissus.

Narcissus Autumnalis alter siue minor [Clus. Hist. post.] Octobri mense quemadmodum Persicus, nudum è vaginula membranacea proferet florem sex oblongis & angustis foliis constitem, non æqualibus, nam exteriora paulò longiora & latiora sunt, omnia autem micro-nata foris flauescencia, interius flaua, ad maioris colorem magis accedentia, flaua stamina medium florem occupât, odoratus est hic flos, soloque pediculo innitens, supra terram nõ attollitur: florem iam marcescens, emergere interdum incipiunt fo-



lia, ut plurimum autem, ineunte Vere duntaxat, terna aut quaterna, plana, viridia, & splendentia instar foliorum maioris, sed longè angustiora, & præter aliorum morem sese contorquentia, & cinnorum instar conuoluentia: semen plurimum ipsis tulit anno 1591. initio Iunii in capitulis uincialibus, ferè trigonis, rotundam, nigrum, cui inhærebat albicans quædam & spongiosa ab vno latere materia: *radix* pusilla, nigra tunica recta, inferioreque sede tenuibus fibris firmata. Secundus hic Narcissus potest dici *Narcissus Armenicus* uel *Armenicus*. Mihi missus à Generoso viro Carolo de Houchin Colchici lutei minoris nomine, à Iacobo Plateau verò Colchici montani minimi lutei appellatione.

Lobel. icon. pl. p. 148. Colchicum paruum montanum luteum D. 10. Monn. Tent. 182. Item Adnerf. par. 2. de Narcisso autumnali minore adhuc certatur & ambigitur, num referri debeat ad Colchici familiam aut Narcissos.

Tabern. icon. Colchicum montanum luteum minus, flem. geel Berg & zerlosen. & Hist. Colchicum 12.

C. Bauh. Phyt. Colchicum 14. montanum paruum luteum.

NARCISSVS AUTVMNALIS
minor & similes plantæ.

Vnicum cauliculum, digitalis longitudinis, gracilem, vacuum, habet hic Narcissus, in cuius summo florem Narcissinum odoratum, sex foliolis albis constantem, & in medio exurgunt calicem flauum continerem: flori succedit exile


Nomina
Litton al-
terum
Theophr.

exile trigonum caput, exiguum, nigrum, angulosumque semen continens: radix Narcisso Iuncifolio valde similis, minor tamen, multis candidis tunicis, lentoque succo prægnantibus confectis, sed nigra quadam membranâ tecta. Tota planta amara est, vt superiores Narcissi, verèque dixit Plinius, odorato saporem rarè vlli non amarum.

Icon quam damus plantulæ à Clusio descriptæ figuram & magnitudinem affabre sanè exprimit.

Clus. hist. Narcissus quartus siue autumnalis minor. Et post. hist. Narcissus serotinus siue autumnalis minor: Incole in Hispania *Tomisada* appellabant.

Plant. icon. pag. 122. Narcissus autumnalis (vt & Dod. in fol.) parvus Clusii Lob. 62. Teut. 158. Lobel. B. 153. Klein sp. de Narcissen. C. Bauh. Phyt. Narcissus 29. siue (cum Tabern. icone) autumnalis minor Clusii.



Nascitur plurimus ad Anam flumen in Turdalis, vbi (inquit Clusius) florentem, & suis capitulis iam maturefcere incipientibus eruebam sub Octobris finem, nullis è bulbo natis foliis, nec vlla eorum vestigia obseruans, quod sanè mihi admirationi fuit. Quantum intelligo per fratrem C. Baulinum, qui communicauit, prouenit in monte Spiegel.

SPARGANIVM PLACÆ NARCISSO simile flore albo Lili.

Supra Valentiam salebrosis & petrosis locis nascitur quædam planta bulbacea, binis foliis prædita, humi stratis, longis, crassiusculis, ex viridi nigricantibus, Narcissi maioris Autumnalis foliis ferè similibus, sed quibus interna parte secundum nerui medii longitudinem, alba quædam lineola ducta est: radix bulbosa multis tunicis constans candidantibus & lenti viscidij succi plenis, ingrati amarique saporis, foris nigro cortice obductis. Etiam C. V. Ioan. Plaga Medicus Valentinus, pedalem caulem [nam radicem cum foliis dumtaxat, eruebam, ait Clus. Hist. & hist. post.]. Iæuem, aliquot in summo flores Liliæ amulos, candidos ferentem, habere, deinde rotunda capitulo, in quibus exiguum semen contineretur, assererat, & Sparganium vocabat.

Casp. Bauhin. Phyt. Colchicum 12. siue Colchico luteo similis (supple planta), Sparganium Placæ Clusio.

TVLIPA SIVE LILIO NARCISSVS.

CAP. IX.

Bulbaceas inter stirpes, recensetur meritò peregrina illa planta, quæ ob insignem in flore colorum varietatem, omnibus longè gratissima esse solet. Quæ de re Io. Posthius.

Multiplex tuncit florum genus omne colore Hucusque à Geræis Tulipa missa viget.

Hanc vulgus Tulipam, doctiores verò Liliomarcissum appellant. Cùm autem non occurrat nobis, an aliquis de Tulipa verba fecerit, ante Doctiss. & diligentissimum Botanicum nostrum Præceptorum Gesnerum, lubet hic subiicere, quæ in sine operum Cordi, de hac memoria prodidit.

Anno à Natiuitate Domini 1559. initio Aprilis, Augustæ, in horto Magnifici viri Iohann. Henrici Heruatiuividi inquit is, herbam hinc exhibitam, ortam è semine quod Byzantio (vel, vt alij, è Capadocia) allatum erat. Florebatur tum temporis flore vno pulcherrimo rubente, magno, iustat Liliū rubri, octonis condito foliis, quorum quatuor fortis sunt, & rotidè



Gesner. de Tulipa.

Descriptio

intus, odore suauissimo, leni, & subtili, qui breui euanescit. Color interius pallidus est aut subflauus: & stamina tanquam Croci, in medio intercepta, ceu geniculo, ipsa quoque octona, ex quibus iterum alia exterius paulo sunt, alia interius. Calix nullus. Caudis est circiter pedem altus. Folia in eo quaterna albicant, crassiuscula, solida, duos palmos (id est digitos octo) longa, Orchæam ferè foliorum figura, modicè recuruato margine (non aded quidem vt pictura præ se fert, quam antea expressam amicis quidam ad nos misit,) ex his tria inferiora maiuscula sunt: summum, paruulum. Macula nullæ dum erant, quas in adultioribus foliis apparere aiunt. Radicem non vidi: sed aiunt esse bulbosam iustat hermodactyli ferè, vel Porri formâ & magnitudine, tertio anno florem producere: propagari de radice, bulbo puro adnascente, semen nullum proferre, siue naturâ, siue nostri cæli culpa. Turcico vocabulo Tulipam vocant aliqui. Sunt ex Turcis (inquit Kentmannus,) qui Tulipam dicunt nomen habere à flore, qui formam refert pileoli Dalmatici. Liliū rubentis genus [pergit Gesner. b. vt.] videtur etiam Tulipa Turcarum, cuius picturam, cùm ad virum quemdam Doctiss. misissem is (y-northodon Plinii [vel vt ipse legere vauit Crinorhodon] esse putauit. Sed ita dictum à Plinio Liliū in Italia quoque nascitur: Tulipa verò ista (nam & alia quendam hoc nomine vocatur herba turco flore) Italix (ni fallor) profus pe-

Tulipa.

Liliū rubens Cynorhodon. Crinorhodon.

Satyrium
Erythraicum
Tulipa alba.

regrina est, nisi in horto aliquo conspiciatur. Cynorrhodi quidem Lili Hyacintho similis Helychius etiam meminit. Satyrium Erythraicum fortè est Tulipa à Turcis dicta: quam vidi Augustæ in horto Magnifici viri Io. Henrici Heruuarti, quanquam semen ferre negant. *Et hæc is de Tulipa.*

Satyrium
triphyllo

Nos quidem Tulipam flore rubro, serere semina obseruauimus, quæ non respondent seminibus Satyrii à Diosc. traditi, ideo Satyrium Erythronium dicere non possumus: Tulipa tamen alba, multa habet quæ respondent Satyrio triphylo Diosc. Suspiciamus præterea priorem Gesneri Tulipam esse inter Clusianas, de quibus postea, præcocem rubram dictam, in eo tamèn differt quoddam Gesnerus tribuit flori octona folia: Clusus autem tantum sex: Secunda fortè referenda est ad Bononiensem deinceps tradendam.

Narcissus
5 Martib.
qui nota-
tur

Ineptè Matth. proponit quandam iconem sine ulla descriptione sub titulo Narcissi 5, quæ ad Tulipam referenda videtur, in cuius caule folia octo spectantur, in flore sex foliola, in epitome verò septem in caule, quinque in flore.

Lotus her-
ba Homero.
Alc Zempul
Lotus Diosc.
Lotus

Notatui digna sunt quæ Guiland. in Theone de hac planta scripsit: De herba non arbore intellexit Homerus in Iliade, quando Iouem rem cum Iunone habuisse canit, terra subter Lotum, Crocum & Hyacinthum gignentem. Ac an ea sit Lotus quam Turcæ *Alc Zempul* vocant, Itali *Tulipa*, nomine barbaro & proinde peregrino, querendum: quanquam parum referte Autumno, si vel pro vibana vel siluestris Diosc. Loto capiatur. Verùm cum Plinius tres laudasse flores annotet, Lotum, Crocum, & Hyacinthum, nec Lororum, qui apud Dioscoridem habentur flores, præstari forma commendabiles sint, vix fieri posse reor, Homerum de iis locutum. Cæterum Lotus Aegyptia est flore constet pulcherrimo, nullum tamen hac parte locum occupat, vt pote quæ in sicco nasci recuset, Croco & Hyacintho nequaquam in aquis prouenientibus. Nec sunt aquæ ad coitum aptæ, fundum petente corpore. Suspiciari quis posset Tulipam inquit Dodon. qui tres differentes species agnouit $\mu\alpha\lambda\iota\sigma\sigma\alpha$ esse Theophrasti, si edulis bulbos esset & cogendo efficac. Nam $\mu\alpha\lambda\iota\sigma\sigma\alpha$ quidem à Theophr. inter edules bulbos refertur & herba est, quæ lac cogitur, vt ait Helychius.

Lobelia sen-
centia.

Pytion
Theophr.

Gesnerus Tulipam Satyrium esse existimauit, an autem conueniat & quantum, ex Satyriorum descriptionibus relinquemus diligentius considerandum.

Dodonæi icon prior, est apud Clusum pro Tulipa præcoce alba varia. Secunda autem est pro Tulipa præcoce rubra: in hist. flo. vnica erat icon, quæ à Lobelio exhibetur in Obs. loco, cui floris foliola non desinunt in acutum.

Anemone
Limonia.
Cynorrhodon
Plinii.
Satyrium

Dodonæi suspitioni subscribit C. Bauh. dicens apud Matth. Licet alii ad Anemonem Limoniam Theophrasti, alii ad Cynorrhodon Plinii: alii ad Satyrium Erythraicum referant, videtur tamen ad $\mu\alpha\lambda\iota\sigma\sigma\alpha$ Theophr. referenda. Gesnero Anemone Limonia.

Lilioneis
suis purpu-
ro Narcissi
Plenus
Casse, Lale
Zampul
Foliorum
numerus.
Purpurea.

Tradit Lobel. in obs. Lilioneis varietates quamplurimas, inquit: an purpuro-Narcissi Plinii, Turcarum *Casse Lale*, *Zampul*: Omnibus Tulipæ siue Lilioneis speciebus foliorum numerus in caule pedali & sesquipedali, ternus, quaternus, quandoque quinarius, septenus & octonarius: flores senis foliolis, interdum pluribus, quorum vngues flauent, calathum emigian-

tes, constant: quorum alii præcoces, alii autem serotini. Flos sex foliis obtusis purpurei sanguinei Lilioneis constat: Radix item & caulis perfoliatis, in quo quatuor, & nonnunquam plura, folia, liliaceis & porrinis media: interdum innatum bulbum in folio notauimus apud D. Io. vander Dils, cuiusmodi in Moly Homericorum. Luculento pendente flore, supremis foliorum oris & fundo ad basin luteis pallentibus, medium cingente sanguineo subfusco: calycolorum oris & media carina foris luteis: cætera cuncta sanguineo fusco exoleto similia: medio intus flamine nigro, staminibus croceis obducto. Semina, vt reliquorum, compressa in oblongo tripartito membrano anguloso folliculo: quæ itidem facta colorum varias subeunt mutationes, & sæpe degenerant, vt longo vsu diligentissimè animaduertit clariss. vir. D. Ioannes Boissot.

Eriophori vocati radix cepacco inuolucro obducitur, molli sericeo tomento facta, calathæneum ritu: flos vt reliquorum, sed calathi fundus siue foliorum vngues atrii & medio lutei conspiciuntur.

Luteo & medio pullo, fundo. Maculoso, medio fusco folio. Sanguineus toto calathi fundo pullo. Vngue toto luteo. Vngue pullo, triangulis luteis: Flore odorato, aut inodoro. Torus luteus maior Chalcedonicus, sanguineo puniceo par, & similis: odoratus Croci æmularione & inodorus: præcox & serotinus aut pallidus.

Niuco candore & rubore confusus coccineus.

Purpureus sanguineus, puniceusue obsoletus, candidioribus oris, carinam intercurstante albo rubore mixta diluta linea, imo ad basin croceo vngue.

Purpureus coccineus, rubentibus oris, medio folio exteriori candidic, vnguis luteolus, summo, medio tenus coccineo luculento cruore.

Coccineus purpureus puniceus, tribus exterioribus mucronatis foliis: internis verò retutis.

Rubellus pendente flore in acutum modicè fastigiato.

Rubidus candore mixtus, nitidus, niueis oris.

Niuicus, extremis & summis rubidus oris, vndantibus in caule foliis.

Candidus, striatis suauè rubentibus oris. Parulus, rubidus, candidans.

Rubicundus, rutilans, luteola carina.

Sanguineo, puniceo saturato luteo, summis candidantibus oris, expansus, folio latiore, mucronato.

Obsolera purpura, summo albicans, purpurante medio.

Imo & summo luteus amœnus, medio coccineo, sanguineo.

Luteus striatis rubentibus oris. Rubellus niueis oris striatis.

Luteus hilaris oris phœnicæ.

Niuicus totus, fundo rutilant luteo.

Luteus, phœnicæ confusè mixtus.

Luteolus phœnicæ, dilutus.

Luteus coccineis rubentibus oris, Candore & rubore confusus, Rosæ dehiscentis pallidæ colore.

Luteo

Luteo phoeniceis luteo centibus oris; sc-
tenis per amplis foliis.

Purpuro violaceis.

Haecenus Lobelius apud quem haec consideranda. Folia Tuliparum nobis non videntur esse virore Liliaceo, nec feminis descriptio placet, quae nec plurimum distat ab Aristolochia praedictae femine. Dodonaeus dicit cartilaginofum plantum. Illud etiam perpendendum venit, quod scribunt de Tulipae nomine aliter ac peritissimum Guillandinus: Nec hoc negligendum, tradit in Aduers. florem cum quinque foliis, ac etiam iconem proponi in qua tantum quinque foliola sub titulo Lilionarcissii purpurei: eam autem iconem in iconum l. Plant. iterum proponit hoc titulo, Lilionarcissus sanguineus paniculatus. Teut. 152. In Adu. po. ut praeterea alteram iconem sub titulo Lilionarcissii lutei, planè dicitur, ac potius alicuius Narcissi quam Tulipae, si non est error typographicus: de his dicimus, quod ibidem paulo post dicit aduerfum Matthiolum, pueros pueris pingere & illudere. De caeteris iconibus Lobelii in obs. & in lib. ic. Plantini postea agemus.

Camerac. apud Matthiolum in Epit. pro Narcisso 5. Matthioli ponit descriptionem & pulchram iconem, quae summè placet, & pro plurimis sufficere videtur, ac idè etiam à nobis propolita: Tulipa peregrina, inquit etiam, & ante aliquot annos demum cognita apud nos planta, de facultatibus adhuc ambiguit. Helichrysum Crataeum non adè malè ad luteum quadrat, quantum herbam non integrè descripsit, sed tantum dicit florem esse similem Croco, colore aereo. Tulipae differentias quod attinet. Prae aliis floribus varietas est in praecoci: Praecox lutea vel planè aereo colore, vel pallido. Adhaec vel rubris maculis conspersa, & alia maiore ex parte rubens. Item vel aereo fundo vel nigro. Semina etiam discrepant, quae in nonnullis staua sunt, in aliis nigricant. Praecox rubra, eaque vel purpurascens, vel coccinea. Item purpurascens albis oris decota. Nec non dilute rubens, vel incarnata, & vnguib. vel inferioribus foliorum particulis candidis. Alba, ferè prima omnia florere solet, sed & frigoris vehementia aliquando succumbit, si non satis profundè intra terram abdatur. Est verò quaedam penitus candida, excepto fundo qui nonnihil hauescit: quaedam diluta rubedine inficitur, & tertia violaceis maculis pulchrè distinguitur. Media siue Dabia, lutea, aurea, pallida, itaque conglobato flore, nõ ut reliquarum parulo: & lutea media fusca, purpureis staminibus, & praeter has, quae virentibus striis variatur. Denique nana siue pumilio flore aereo. Rubra coccinea, fundo flauo, nigro, subaerente, in caeruleum vergente. Est inter has quae nigrum fundam habet & foliorum in flore virentes apices. Praeterea parvula admodum strictis foliis colore saturo rubro, incarnata, languidi coloris, nigricantibus staminibus. Serotina. Haec plerumque maxima est & pulcherrima, sed minore colorum diversitate commendabilis. Lutea nimirum, aurea, pallida, itemque renella strictifolia interhaec, latifolia quoque rursus, eaque diclonos, nec non cristata Papaueris modo, siue *à cypripide*, id quod etiam in rubra admodum grandi notati. Est & suauis rubore purpurascens, qualis in Pæonia colos. Tandem quae Solis oculus vocatur, fundo nigro, quem circulus aureus ambit, reliqua floris parte eximie rubicunda: cuius varietas etiam in odore habetur, qui in qua-

dam planè Lilium conuallium dictam emulatur. His plerisque interdum accidit, ut proliferent extra terram, id est, ut inter alas foliorum protrudant bulbam, qui sensim tabescente matris superficie incrementum capessit, quemadmodum hoc à C. Clasio in Parnonicis affabre designatur.

Caeterum miratur Adrian. Spieg. inter Narcissos relata. n. eam florem, quem vulgus peregrino vocabulo *Tulipanum* & *D. liponum* vocat. Ipsi enim inter Lili genera rectè videtur collocandus. Quo nomine Veteribus dicta sit haec planta, multi dubitant. Sunt tamen peritiores nonnulli, qui ad Satyrium Dioscor. quibusdam *serotina* cognominatum referendum censent, ad cuius tanè descriptionem multis notis accedit.

Haecenus autem Tuliparum bulbi nobis [inquit Clusius qui Liliaceam stirpem appellare videtur] Byzantio mihi sunt, praecociis quidem *Cassate*. Serotinae verò *Cassate lutee*: à locis nimirum vnde prima Constantinopolim illati sunt

Locus:

appellatione indita: *Cassate* vrbs est in peninsula Gazaria dicta, quae inter Propontidem & Euxinum Pontum sita est. *Cassate* verò in Macedonia vrbs maritima. Sunt qui Tulipam praesertim purpuream Colnosandalon esse velint, a Veteribus inter Coronarias herbas numeratum: Nos Tulipae duo primaria genera observamus: *praecox* & vnum, *serotina* alterum, tamen inueniuntur quaedam veluti dubia, quae medio inter utrumque genus tempore florere solent, potius tanè inter serotinas habenda, quam inter praecoces.

Colnosandalon.

Praecocior Tulipa vnicum fert caulem, pedalem maxime ex parte, interdum amplio rem, rotundum, virentem, & breui quaedam incanaeque lanugine aspersum, non concavum, sed firmè medulla plenum: hunc plerumque terna amplectuntur folia, nonnunquam quaterna & quina, inferiora lata admodum, ut etiam palmarum latitudinem explere viderim, & liliacea longiora tamen, & crassiora, carinata, supra terram sese pandentia & contorquentia, superiora autem minora, & angustiora, eaque vel propendentia & nutantia, aut interdum surrecta, omnia aere colore ex caeruleo virente aut arugineo, & veluti farina asperso. Summo cauli insidet magnus flos, vnicus (geminos etiam aliquoties vidi, vel summo caule coniunctim nascentes, vel bifido inherentes) fusum spectans, sex foliis ut plurimum constans, tamen si septenis & octonis conspexerim] eiusdem in modum cum caule coloris, & interdum ad terram sese inflectens, illicque incumbens, ut colubri aut serpentis caput in terra decumbentis eminentiarum, deinde paulatim sese subleuans, & colorem mutans, atque tandem sese explicans. & ciliati Cyathii instar in fundo pandens, ex quo sena aut totidem quot foliis constat, stamina prodeunt, modò lutea pallida, modò nigricantia, pediculis etiam quae stamina sustinent, mirum in modum variantibus. Excusso flore, succedit membrataceum triangulare caput, satis magnis, oblongiusculum, vel breuius utrumque magis prominulo, quo in tres partes à summo dehiscente, conspiciuntur sex ordines feminis plani, cartilaginosi, liliacei ferè, & circumatae propemodum rotunditatis interdum, altera tamen parte, quae capitis centrum & interiora pertingit, oblongiusculi ut plurimum, pallidi, fulvi, aut rubescentis, & si imbres frequentiores occiderint, etiam fusci. Radix bulbacea interdum, breuior est, nonnunquam oblongior, crassa, inferiori sede non-

Tulipa praecociis 115.

hil prominente, vti Colchici radix ferè, fibris aliquid tenuibus donata, & foris fuluescente, sed magna ex parte nigricante, membrana obducta, quæ interna parte lanuginosa est, Castaneæ corticis instar, aliquando autem ad eodentomemto plena, vt mollissimè recubet bulbos, qui solidus est, firmus, & velut albumen oui coctû candidus, gustantique dulcis, saltem non ingratus. Summa autem in præcœce est coloris varietas: nec maiorem in vilo alio flore videre memini, nisi fortè in Papauere. Etenim aut omninò luteus est, aut ruber, aut albus, aut purpureus: interdum etiam bini vel plures ex his coloribus in eodem flore permixti conspiciuntur. Non desunt qui carulei omninò coloris se vidisse asserant, mihi sanè hæcenus videre non contigit.

TVLIPA PRÆCOX FLAVA.

Descriptio L Vtea Tulipa vel ad auri fulgorem accedit [pergit Clusius in hist. post.] aut pallet, foliorum autem vngues plerumque aurei sunt, licet etiam habuerim veluti fuliginè asperfos: odor quasi Cereæ recentis, siue etiam Croci, interdum nullus, vel admodum imbecillus.

Tulipa flava. Hic notandum à Clusio poni in post. hist. iconem quæ non erat in Pannonicis, aliam iconem habet pro Tulipa flava siue lutea quam



Lilionarcissus siue albus.

ponit postea pro Tulipa præcœce alba, vt iterum monebimus. Que verò hoc loco proponitur in post. hist. pro lutea ponitur: ea est in libro Iconum Plantarum delineata hoc titulo p. 110. Lilionarcissus albus parvus & parvulus, medio iuxta carinam rubellus nitens, Lob. Teut. 166. An Schvven. in cat. Siles. Tulipa lutea 1. *Avicenna d. m. c. a. 11.* Theoph. Narcissus 6. Marthiol. Geeler Tulipan, Gelbe Turckische Narcissen. Plures sunt nobis Marthioli impressiones, verùm in nulla invenimus iconem Tulipæ luteæ.

Habeo in horto E. C. Tulipam luteam præcœcem, quæ pallet, vngues aurei parvi florum, folia quina in cuspidem desinunt, floret principio Aprilis.

TVLIPA PRÆCOX RUBRA.

Rubra Tulipæ color nunc saturatior est, modò dilutior, & gratissimi aspectus, interdum etiam inælegans, & obsoletus: foliorum vngues vel lutei omninò, aut tanquam leui quadam fuliginè in luteo aspersi, in quibusdam nigra macula medium vnguem luteum tantummodò inficit, in aliis totum ferè ita occupat, vt nihil nisi lutea

quædam linea nigrum vnguem ambiens conspiciatur: interdum ad eod magni sunt isti vngues, vt dimidiam folii partem occupent. Huius verò odor alias gratus est instar Mali aurei, magna verò ex parte valde obscurus, vel Papaueris virus quodammodò referens. Hæc Clusius hist. post.



Clusius in Pannon. & Hisp. eandem iconem habebat. Icon eadem erat apud Platinum p. 126. hoc titulo Lilionarcissus purpureus liguineus p.

niceusve quintus Lobel. 65. Teut. 162. Hist. Lugd. ponit pro Tulipa maiore Clusii quam scribit esse Narcissum quintum apud Marth. Idem sentit C. Bauh. qui pro iconè Marth. ponit similem iconem Clusianæ. Camerarius in hist. Germ. & in Epit. nouam iconè ponit Tulipæ nomine. Schvven. Tulipa præcox rubra. Narcissus 5. Marth. *Rote Turckischer Tulipan.*

Tulipam rubram primùm vidi Montebgardii in horto Ill. mei Principis allatam ex Italia, pulcherrimus sanè flos omnibus admirandus, ex rubro fuscus cum vnguibz luteis quotidie se expandens & recludens, multis diebus integer remansit mense Aprilis. Casp. Bauh. attulit bulbum hunc non se propagauit, & tandem periit.

TVLIPA PRÆCOX ALBA.

Tulipæ albæ flos omninò candidus est, nisi tria exteriora folia dorso cineracei vel interdum etiam carulei quidpiam coloris admixtum habere viderentur: vngues lutei, nonninquam veluti fuliginè alperiti, apices & stamina pallent. Hæcui (inquir Clusius) quibus vngues prorsus albi esse, apices nigricantes. Iam antè monuimus iconem hoc loco positam, in Pann. olim locatam à Clusio sub titulo Tulipæ præcœcis luteæ, erit fortè ex prædicto loco transfere-



renda


tendz dicta flava siue lutea & quæ hic alba dicitur ed releganda: nobis tamen nouus inde oritur scrupulus quòd in Iconibus Plantini pag. 128. hæc eadem sit icon sub hac inscriptione Lilio-Narcissus sanguineus puniceus siue obsoletus tribus exterioribus mucronatis foliis, internis verò retusis Lob. 67. Teut. 165. sanè icon non respondet titulo: interna folia non apparent in icone retusa. Tulipa alba præcox in horro Ill. E. C. W. multis annis durauit non se propagans, ad hæc fortè potissimum referendus Narcissus Mathioli 5. Lob. etiam in Obs. meminit Lilionarcissi præcocis niuci.

TVLIPÆ PRÆCOCES VARIÆ.

Tulipa varia aded multiplex est, vt difficile sit omnes eius differentias verbis exprimeret. Nam cuiuscunque tandem præcocis Tulipæ semina excussa, & tellure sepulta germinent, non omnia retinent natium matris colorem, in varios colores transformant flores, præsertim Albæ, cuius semine prognatas plantas insignem colorum varietatem præ reliquis nancisci, experientia & diligenti obseruatione didicit Clusius. Semina enim in eodem capite nata, à semetipso collecta, eodemque ferè momento terræ Autumnò commissa [quò tempore, non verno, serenda sunt omnium bulbacearum & tuberosarum semina, vt feliciter proueniant, vel etiam maturius, cum spontè defluant] plantulas proximo subsequente vere prodixerunt, quæ post quintum, sextum, septimum, imò etiam [vt alia aliis facilius adolefcunt] octauum, nonum, & decimum annum flores protulerunt, eosque aut omninò albos & matrem referentes, aut albos varios, vel purpureos, ac purpureos varios, quorum videlicet purpurea folia albis oris ornata fuere. Quantum ad flauis aut Rubras attinet, pleræque proles matris colorem retinent: sæpè etiam in alium commutant.

TVLIPA PRÆCOX PURPUREA.

Purpurea Tulipa aliàs saturatior est, & violaceum, siue amethystinum colorem habet, aliàs Pæoniæ floris æmula, nonnunquam dilutionis, & Damascenam siue Prouincialem (quam eruditiores Prænestinam vocant) rosam colorem referens: interdum verò aded diluta, vt albescere videatur, aliquando ex purpura nigricat & obsoletior est: omnium autem vngues cum apicibus aut pallent, aut lutei sunt coloris, tamen nigros etiam apices habeant nonnullæ, & pediculos eas sustinentes quadam veluti fuligine infectos. Inuenitur & odorata, & inodora.



Facere verò non potest, quin hic adiciat Clusius, quæ circa simplices has, & vnus coloris Tulipas obseruauit. Habuit enim anno 1585. & aliquot subsequentibus, cuius flos cum præcedentibus annis elegans ruber fuisset, postea variè commixtus ex rubro & flauo inter se confusis coloribus, modò flauo medium quasi folium occupante, modò rubro, vel utroque radiatum per oras discurrente, fuerit. Similiter flauam quæ flauum, & rubrum: & purpuream quæ album & purpureum colores variè inter se commixtos, & radiatum folia secantes habuerint. At illud etiam obseruabat, quotquot sic natium colorem mutarunt, subinde corrumpi solitas, voluisse tamen antè, hac colorum varietate heri sui oculos oblectare, tamquam ipsi extremum vale dictura. Quam hic iconem ponit Clusius pro Tulipa præcoce purpurea, apud icones Plantini p. 129. posita est pro Lilio-Narcisso purpureo violaceo Lob. 67. T. 165. In Pann. hist. aliam iconem habebat Clusius pro Tulipa præcoce purpurea, quæ in lib. Ic. Plant. ita inscribitur, Lilio-Narcissus sanguineus puniceus siue 8. Lobel. 66. Teut. 163. Schvvench. Tulipa purpurea præcox, leibfarbner Turckischer Tulippan.

TVLIPA PRÆCOX LVTEA VARIA.

Lutea variæ Tulipæ flos explicatus, nonnunquam primis diebus totus luteus apparet, quarto deinde, aut quinto demum die, illius folia rubris virgulis, extrinsecus leuiter per oras distinguuntur, interiore parte omninò lutea remanente, præsertim tria externa, & vnguem



nonnunquam habent veluti fuligine tinctum, apices interdum luteos, & pediculos eos sustinentes fulcos. Interdum externa floris folia circa medià raris rubris radiis insignita sunt, interiora autem frequentioribus, & ad extremum vsque folium ferè excrescentibus, atque aureos vngues: pallida stamina habent. Nonnunquam exteriorum foliorum oræ foris plane rubent, interius à medio ad extremas oras rubris virgulis distinguuntur: interiora folia externè omninò rubent, internè autem à medio ad summum, rubrum neruum protensum habet: latera verò rubentibus radiis exornata. Sunt etiam quorum exteriora folia dorso omninò luteo sunt, per oras verò, diluitoris cinnabaris colore virgatim distincta, interiore parte ad vnguem vsque cinnabaris color tota occupat: interiora autem folia

cinnabaris etiam colore omnino infecta conspiciuntur, nisi duplex neruus luteus secundum longitudinem, & luteæ virgulæ in extremas oras excurrerent, illius apices nigricant, pediculi eos sustinentes lutei, nonnulli tamen fuligine infecti, vngues aurei, magni, stamina quodammodo superant. Aliorum exteriora tria folia mucronata & lutea sunt, præter oras, quæ purpurâ rubescere radiatim intercurfante insigniuntur, deinde extremæ oræ luteæ sunt, interna parte circiter medium folium, frequentes rubri coloris radios habent: interiora folia, orbiculato mucrone prædita ab infimo ad summum oblongis rubris lineis distinguuntur, præter extremas oras quæ luteæ sunt, interior pars minus radiata quam exterior, vngues magni lutei, quemadmodum stamina cum suis apicibus, hi odorati. Est & cuius folia extremam cuspidem orbiculatam habent, foris omnino aurea, luteis oris: intus autem omnino lutea, aurei sunt potius rubri coloris, flauo permixti, linea radiatim medium folium, transuersumque secante: pediculi lutei sunt, apices cineracei: aliquantulum odoratus est. Cuius item folia orbiculatae prorsus sunt mucrone, dorso in extremum usque mucronem luteo, oris latis, ex auro rubris, vnguib; luteis dimidium folium occupantibus, staminibus & apicibus luteis: nonnihil etiam odoratus. Alii similiter huic pares, sed diluore colore præditi, staminibus & apicibus duntaxat variantibus: sed nec hi odore carent.

Icon à Clus. proposita iam olim exhibita erat in Pannonicis sub eodem titulo: eodem lib. icon. Plantini reperitur pag. cum hac nomenclatura Lilio-Narcissus luteus coccineus rubentibus oris Lob. 67. Teut. 167.

TVLIPA PRÆCOX RVBRA VARIA.

Descriptio



plurimumque velut fuligine infectis: huius flos satis odoratus est. Interdum exteriora folia luteas oras foris habent, interioribus autem dilutiùs rubent, & quasi radiatim in luteas oras satis latis rubedo desinit: interiora verò similiter rubent, sed latiores oras habent, rubro colore, radiatim ut in exterioribus desinente, vngues luteos, stamina cineracei coloris: & istius flos nonnihil odoratus. Nonnunquam diluore minii colore rubent utraque folia, mediocres oras habentia,

foris minii colore interiora folia ferè tota occupante, virgatim tamen in oras luteas desinente, magnis vnguib; flauis, apicibus cineraceis, pediculis ea sustinentibus luteis, flos utinque etiam odoratus. Aliorum exteriora folia, medio dorso luteo sanguineis virgulis distincta sunt, reliquâ parte rubrâ, oris tamen luteis: interiora omnino ferè rubra, sed rubro colore radiatim in aureas oras desinente, interiore parte totâ prope modum luteâ, nisi circa medium folium rubris radiis distinguerentur, vngues cum pediculis luteis, apices nigri. Quorundam folia omnia mucronata, externè dorso lutei coloris, reliquâ parte sanguinei, præter oras quæ luteæ sunt, internè sanguineis radiis tota respersa, extremis tamè oris luteis: interiora foris sanguinis modo omnino rubent, luteæ seu flauæ oræ sunt, coloribus tamen sese inuicem commiscensibus, internâ parte omnino flaua sunt, nisi circa medium crebrioribus sanguineis radiis instar orbis quodammodo insignita essent: vngues, stamina, & apices cum superiore genere conueniunt. Sunt aliorum etiâ omnia folia mucronata, oris aureis reliquâ parte rubris: præter exteriorum foliorum dorfa, quæ aureis quibusdam virgulis aspersa sunt, omnium vngues lutei radiatim in rubro comixti, pediculi lutei, apices nigri. Nonnullorum externa folia mucronata, interna orbiculata, tota rubra, exceptis oris, quæ aurei coloris sunt radiatim in rubro desinentis: exteriora verò folia saturatiora sunt, omnia tamen interiore parte magis aurea sunt, vngues, stamina, pediculi, cum præcedente conueniunt: omnium istorum flores satis odorati. Inuenitur etiam cuius folia paruas oras aureas habent, elegantissimo rubro colore reliqua occupante, vngues flauos, stamina veluti fuligine tincta, apices obsolete purpureos. Hæc Clusius.

Clusius icones duas suas sub eodem titulo posuerat in Pann. quaquam antè in lib. icon. Plant. p. 133. sunt positæ cum his titulis, integra planta pro Lilio-Narcisso luteolis aucta parte foliis secundum ora striis rubris decorato, intus verò luteo amæno: plantæ non integræ titulus, Lilio-Narcissus luteus hilaris, oris rubris, striatis, carina subuiridi: Teut. 167.

TVLIPA PRÆCOX ALBA VARIA.



TVLIPA præcox alba varia aut omnia folia extremâ parte mucronata habet, aut tria duntaxat exteriora, sed interiora orbiculata. In nonnullis externa folia ad extremâ usque omnino ferè alba sunt, exceptis oris quæ elegantis & dilute admodum putrescentis, sive carni, ut ita dicam, colo-

coloris sunt : interiora verò magis purpurascunt, vngues lutei, deinde exalbidi, stamina cum suis apicibus flaua. In quibusdam exteriora folia exalbido sunt dorso purpureis virgulis asperso, reliqua parte purpurascente aut incarnata : interiora folia omninò purpurea sunt, vngues stellatim flauis, deinde albi, apices lutei, pediculi eos sustententes veluti fuligine asperiti. Aliorum externa folia albo etiam sunt dorso, pluribus purpureis punctis distincto, interiore parte diluore purpurâ nitentia interna folia saturatioris sunt purpureâ quâ in superiore, vngues flauis radiati stellæ instar, apices nigri, fulci pediculi. Interdum externa folia magnas oras carneo colore præditas habent, reliquâ parte alba : interiora verò quasi carnei sunt coloris. Nonnunquam externa folia pallescunt sunt dorso, alias omninò alba, præter oras quæ foris breuibus & raris purpurascens radiis exornantur : interiora tota alba sunt. Quorundam exteriora folia dorso & extremo mucrone pallent, alioqui candida omninò, oræ interiore parte paucis purpurascens radiis distinguuntur : interiora folia à medio ferè ad extremas oras purpurascens radiis foris aspersa sunt, intus verò omninò alba, præter oras quæ rarioribus virgulis distinctæ sunt. Aliquândo externa tria folia profus alba sunt : interiora autem oras nunc paucis, modò multis purpurascens siue carnei coloris virgulis distinctas habent : omnium vngues flauis sunt, apices & pediculi pallent. Inuenitur etiam cuius omnia folia coloribus quidem albo & carneo permixtis prædita sunt, sed qui cineraceum carneo coloris temerè perfusam referant, vel similis planè coloris cum tenuiore illo sericeo panno carnei coloris, cuius subtegmen album est, Germani Silberfarb/hoc est, argenteum colorem vocant : huius vngues exalbidi, apices obsoletè purpurascens, pediculi albi sunt.

Lobel. Icon. Pl. pag. 127. eadem est figura cum Clusiana [quam etiam in Pannonicis habebat] cui titulus est Lilio-Narcissus coccineus, rubentibus oris, mediis foliis candidans, & ad basin notulis rubris cordis effigie, asperitis, Lobel. 67. Teut. 165.

TULIPA PRÆCOX PURPUREA VARIA.

Purpureæ Tulipæ variæ flos magnâ ex parte omnia folia mucronata habet, interdum tamen externa duntaxat mucronata sunt, interiora autem orbiculata & obtuso mucrone prædita : est etiam cuius omnia folia orbiculata habent mucronem, vt ex singulorum descriptione videre licebit. Nonnunquam igitur omnia folia mucronata Pæoniae polyphylo, & pleno flore, purpureum colorem imitantur, orasque habent ex albo purpurascens, vngues, ex luteo viridique coloribus, si nullo quodammodo permixtis, subobscuros, exalbido orbe radiatim eos ambiente, pediculos flauos, sed veluti fuligine infectos apices nigros : illius flores magni sunt & admodum paruli. Mucronata etiam singula folia, foris vt plurimum purpurea sunt, intus mediâ parte carnei coloris, oris ex albo pallescens, vngues, staminibus, & apicibus flauis siue luteis. Interdum omnia folia mucronata, foris & intus purpurea sunt omninò, extremaque oras albas

habent, vngues luteos albo orbe circumdatos, apices obsoletè purpurascens intus, deinde vbi obuerti sunt (solent enim omnes bulbacei generis florû apices explicante sese flore se aperire & inuicere) flauo polline asperitos, flauos pediculos. Aliorum singula folia etiam mucronata, & saturatior purpureo colore prædita, omninò oræ exalbida, vngues albi, in imo tamen flauis, apices & stamina pallida. In quibusdam omnia similiter folia mucronata, sed color purpureus diluore, magisque floridus, oræ exalbida, vngues ex viridi pallentes, pediculi nigricantes, apices pallidi : odoratus est plerumque istarum Tuliparum flos, reliquarum inodorus, vt etiam subsequentiunt. Reperiuntur quorum omnia folia



mucronata, obscurioris purpuræ & quasi amethystine colore prædita sunt, magnis aurè oris albis, vngibus, staminibus & apicibus flauis. Quorundam contra florû singula folia orbiculatis sunt oris, istque magnis & albis, reliquâ parte saturatior, nitentèque purpureo colore prædita, flauos vngues à

bit albus orbis, cineracei apices, flauis pediculi. Nonnullorum interiora folia aliquantulum orbiculata, diluore purpureo colore splendent : interiore parte tota ferè alba sunt, omnium oræ magna, alba, vngues, stamina & apices flauis coloris. Reperitur etiam cuius externa folia mucronata & reflexa, exteriori parte obscurioris purpuræ colore prædita sunt, interiora verò orbiculata & diluore purpurascens, vtraque autem in magnas albas oras definentia, & interiore parte veluti purpureum orbem, totum florem per medium ambientem habentia, luteos & flauos vngues albo orbe inclusos, apices obsoletè purpurascens, flauos pediculos. Est præterea cuius omnia folia mucronata, & tria externa foris purpurea, omnia autè magnis oris albis prædita, interiorèque parte omninò alba, nisi mediâ eorum partem veluti purpureus orbis secaret & variam faceret, cuius vngues flauos ambit albus circulus, stamina cum apicibus pallent.

Sed antequam finem huic capiti imponam (ait Clusius) adicienda putauit, quæ circa Tulipas, semine Constantinopoli missa natas, obseruabam. Magnum seminis illarum cumulum acceperat Ill. vir Augerius de Busbeque cum plerisque bulbaceis stirpibus eo anno quo Viennam venit : hæc, cum sequente anno in Galliâ proficisceretur, mihi reliquit : ea verò demum ànis 1574. & sequente 1575. confertim [quod vetusta essent, & vieta, vixque nascitura existimarem] terre mandauit. Ex his tamen ingens Tuliparum numerus prognatus est, quarum nonnullæ quinto, sexto, atque etiam sequentibus annis flores tu-

lerunt insigni colore varietate commendabiles. Nam flavos omnino, rubros, albos, & purpureos, vel ex his coloribus inter se commixtis, hoc est flavam variam, rubram variam, albam variam, purpuream variam, nactus sum præcoces sed inter illas etiam fuerunt, qui diligentius observanti, potius ad Dubiatam vel Serotinam Tulipatum classem referendi videntur, quam Præcocium: nam licet æquali cum præcoicibus, magnitudine nonnulla assurgant, eodem tamen cum Dubiis, siue serotinis, tempore florere animadverti: de iis autem suis capitibus. Tulipa Byzantine genus alterum flore bino, rubescente & vatio, nullum cum hac inscriptione *Lalè de duoi fiori*, habet etiam Clusius, Præcocium sic concludens tractationem. Hæc sunt quæ de Præcocium Tulipatum varietate commentare libuit, nec me fugit, quin plures alie differentiæ tradi potuissent, sed eiusmodi, quas ad iâ enumeratas, tanquã primarias reduci, atque comprehendere sub illis posse existimo.

Lobel. ic. Pl. p. 129. habebat eandem cum Clusio iconem sub titulo Lilio-Narcissi rubelli nitidi, candidis oris Lob. 67. Teut. 166. Ipse etiam Clus. habuit in Pannonicis.

TULIPA PRÆCOX AMETHYSTINA varia.

Descriptio



Ad præcoces purpureas varias Clusii nobis videtur referenda præcox nostra Amethystina varia cui Bulbus, cuius folia Amethystino colore & situratiore quadam purpura tinctus, albis hinc inde maculis confersa. Ora pulchre variant, sed dilutiores vbiq; in extremo etiam ferè candicant,

versus quod purpureæ striæ excurrunt, quoddam quasi stamen representantes. Ungues speciosi autem, ad tertiam folii partem strias flavas quoque, aureoque nitore splendentes, emittunt. Apices flavi, stilus vt in aliis triquetrus.

Locus & tempus.

Aprilis initio floruit in hortulo Ducisse Wirtemb. quem colit elegantissimum in Castro Mörbelgardeni.

TULIPÆ SEROTINÆ.

Serotina Tulipa, maiore est amplitudine, cubitalem enim & tripedalem interdum habet caulem, firmiorem, crassioiorem, rotundum, fungosa materie plenum, & breui etiam incanaque veluti lanugine, siue efflorescentiã quadam aspersum: hunc alternatim amplectuntur quaternæ plerumque folia, nonnunquam quina & sena, carinata, firmiora, quam in Præ-

coce, vt plurimum erecta, non nutant aut ad tertiam inflexa, atque oris interdum aded reflexis, vt sinuosa videantur, aliquando omnia æqualia. Summo cauli, qui pedali vel maiore plerumque, imò cubitali etiam nonnunquã lōgitudine, nudus supra folia eminet, vnico infidet flos magnus & oblongus, cyathi modo concavus sex foliis constans, extremo apice omnino mucronato vel orbiculato, aut tribus exterioribus duntaxat mucronatis, interioribus orbiculatis, vt in

Tulipa serotina πολυκαλλος minor.



Tulipa serotina πολυκαλλος maior.



Præcoce, & è contra: caput in illa triangulare, membranaceum, crassius vtpurimum, & prominulo ventre, quo à summo dehiscente, sex ordine seminis plani, cartilaginei, fulvi, aut rubescentis, maiorisque quam in Præcoce conspiciuntur: radix præcoici similis, longiore tamen maioreque bulbo constat, plerumque in reliquis cum illa conueniens.

Tamet si autem hæc Tulipa non secus ac præcox vnico vtpurimum constet caule, cum tamen interdum & ramulorum habet: nam nacti mihi sunt tubro flore atque etiam flavo præditæ, quibus ex infimi folii ala alter nudus & pedalis tamen, gracilior tamen, & ad summi folii exortum tertius, crassitudine primarium caulem prope modum æquans, eademque altitudine nudus exsertens, adnascitur, singulæ etiam suum florem sustinentes: interdum quaterni, quini, & plures, frequentius vero accidit vt vnico ramo donetur, quam binis aut pluribus. In hac porro tam insignem colorum varietatem non deprehendi, sed flavas duntaxat, vel ad auri colorem inclinantes, & rubras, virgibus plerumque nigris, orbe aureo cinctis, eisque vel odorato, vel inodoro flore.

Habebat Clusius in Pannonicis iconem Tulipæ

pæ polyctonos minoris. Schvvenæ f. Catal. Silcf.
Tulipa lucea 2. Tulipa lucea polyanthos. Geler
Tulipan mit violen blumen.

TVLIPA SEROTINA FLAVA CVI
quatuor folia in caule.



Tulipa serotina flava eiusdem ferè coloris est cum Præcoccæ, hoc est, dilucentioris & quodammodò flavi, vel pallescens, vel intensioris, & quasi auri modo rutilantis, vidi etiam cuius foliorum oræ sanguineis guttis aspersæ essent: foliorum vngues plerumque cetera recentis

runt, interdum nigricantibus quibusdam venis distincti conspicuntur, vel nigra maculâ notati: apices cum pediculis vel flavi sunt coloris, aut cineracei, vel fuliginè quadam infecti, aut omnino nigri.

Apud Lobelium Obs. p. 66. & in l. icon. Plant. p. 137. Figura est eadem cum Clusiana, cui titulus: Tulipan siue Lilio-Narcissus Latifolius obrufus, phœniceis rubentibus oris Lobel. 66. Teut. 189. Hist. Lugd. Tulipa siue Lilionarcissus luteus latifolius.

TVLIPA SEROTINA RVBRA.

Rubra serotina Tulipa color plerumque saturatior est, & quasi nigricat, interdum dilucentior: & perlegans: foliorum vngues aut omnino flavi sunt, quales in quibusdam præcoccibus, aut omnino nigri, qui Sole illustrati caruleum quidpiam permixtum habere videntur, vel maculâ nigra nunc minore, modò maiore [cæque tenui orbe aureo inclusa, vt oculus quodammodò exprimeret videatur, quâ de causâ à nonnullis *Ochus di Sole*, hoc est, Solis oculus cognominatur] flauum inficiente, nonnunquam etiam totum ferè occupante: apices cum pediculis vel omnino flavi sunt, vel nigri, interdum apices cinerei coloris, & pediculi flavi. Ceterum harum Serotinarum Tuliparum quæ vel flavi, vel rubri coloris flore præditæ sunt, nullæ hæcenus varietatem in satione Clusio pepererunt, nisi quòd interdum ex rubra semine, flauæ: contra ex flauæ semine, rubra, nate sunt, vnguibz sæpenumero variantibus.

TVLIPA COCCINEA HOLOSERICA.

Tulipa Coccinea, per terram spargit folia lata, longa, carinata, & crebro flexu reflexaque pulchrè undulata, colore glauca, alia è

caule orta repada, non ita undulata: caulis teres, virefcens, florem sustinet vnicum omnes cocci cottinas amantate superantem, foliis surrectis, calathum effigiantibus coccineo colore tinctis, tribus tamen exterioribus externa parte minus hilaribus, atque his quidem foris vngues luteoli, intrus nigri sulco croceo ambit: interioribus, tam extrâ quàm intus vngues nigri sulco similiter croceo circumscripti: in fundo latent tres apices breues nigri, ex duarum membranarum quasi coitu seu cohæsu compositi, puluisculo atropurpureo conspersi, quorum mediû occupat stilius longior triquetrus ex luteo virefcens, capite triplo latiore, fimbriis multiplici implexu crispis compactili, florens Aprili in horto Ill.E.C.

TVLIPA DVBIA.

Tulipa medio inter præcoccem & serotinam tempore florentes, videlicet quæ marcescente præcoccium flore suos explicant, & serotinis floret incipientibus iam senescunt, imò interdum cum illis etiam florent: *Dubia* quodammodò appellari possunt, cum vtriusque generis naturam referant.

Tulipa dubia. minor.



Tulipa dubia. maior altera.



Descriptio

Sunt verò inter eas nonnullæ, quarum flores & ipsa planta serotinarum magnitudinem æquant: aliæ quæ præcoccis non superant, nec illis formæ sunt abimiles, & illæ quidem vel amplissimis floribus præditæ, vel præcoccæ non inferioribus: sunt etiam quædam præcoccibus humiliores. Singularum autem differentias quàm dilucidè poterimus hic explicabimus, earum videlicet quæ nobis sunt inspectæ: nam quis reliquarum infinitam

varietatem verbis exprimeret quæ?

Dubia maior.
Pallidus.
flor.

Dubia igitur maiores, florem non minus amplum habent quam ferotinae. Illum autem vel pallidum admodum, vel flauum, omnibus foliis mucronatis, & vnguibz flauis instar Ceræ recentis.

Flaua orbiculatis oris flor.

Inuenitur etiam cuius omnia folia omninò flaua, extremas oras orbicularas habent, ad præmaturam aurei Mali colorem accedentes: stamina cum apicibus flaua sunt, illius flos odoratus.

Aurea.

Alia item cuius color omninò aureus, externa deinde folia flauo dorso prædita, oras diluoris cinnabaris colore radiatum distinctas adquirent: interiora verò folia cinnabaris etiam colorem, atque insuper binos luteos nervos secundum longitudinem, & flauos radiolos in latera excurrentes: vngues huius magni, flauis, altitudinem superant: picum, qui nigri sunt, pediculi flauis, sed fuligine infecti.

Flaua cum rubris venis.

Nonnunquam omnia folia orbiculari mucrone prædita flauis coloris sunt, rubris venis secundum eorum longitudinem excurrentibus, nunc tenuibus, modò crassioribus, atque etiam totum dimidium folium interdum inficientibus.

Sunt quibus flores dilutiùs rubent, & cinnabaris colorem quodammodò referunt, omnium foliorum extremis oris mucronatis; vel saturiores sunt, & quodammodò nigricant, exterioribus foliis mucronatis, interioribus orbicularis: vnguibz flauis, magnis vel paruis, nonnunquam veluti fuligine aspersis, vel in omnibus foliis, vel in exterioribus dumtaxat: apices modò flauis & leuiter nigricantes.

Alba exoleta.

Aliarum flores sunt coloris albi, exoleti, qui *exoleti* dici queat; nam folia ex albo pallescunt, eorumque dorsum flauescit: interiora folia orbiculara, vngues & apices pallent.

Orbiculari carnea.

Nonnullarum flores omnia folia habent extremo mucrone orbiculari, diluissimè purpurei coloris, & quodammodò carnei, maximos vngues albos, quæ capiti adherent flauescentes, cum staminibus & apicibus.

Rubescens.

Quarundam paullo saturatiùs purpurascunt, & aliquarum præcocium præcociorumque rubescentium quarum quas Germani *Tetmner* / *Austriaci* *Winstarell* appellant, colorem referunt interiora folia orbiculari, vngues cum apicibus flauescunt.

Saturè purpurea.

Reperiuntur item quarum flores saturè admodum sunt purpurei, & nigrorum acidorum Ceræ lorum succum panè referunt, Austriaci *weixel farb* vocant: harum vngues vel subcæreulei sunt, vel ex cæreuleo nigricantes, stamina fusca sunt.

Lilionarcissus luteus.

Tulipæ dubiæ primæ maioris Clusii icon fuit inter icones Plantini p. 134. hoc titulo, *Lilionarcissus luteus phœniceus confusè mixtus* Lobel. 65. Teut. 167. Alteri autem Tulipæ iconi titulus fuit, *Lilio Narcissus phœniceus peramænis oris luteis* Lobel. 65. Teut. 168.

Lilionarcissus phœniceus.

TULIPA DVBLIA SECUNDA
media prima.

Tulipæ Dubiæ mediæ, quæ amplissimum florem habent, paucæ sunt à me obseruatae. Earum vna valdè pallidi coloris, còctum sulphur ferè referentis, propterea Austriacæ nobiles matronæ *Schuebelsarb* id est, sulphurei coloris cognomen illi indiderant: omnia eius folia mucronata, vngues fuligine infecti. Eius vnicum

bulbum Byzancio allatum habuit *Generosa* Da. de Heyenstein, quæ illius prolem communicauit: floruit quidem illa anno 1586. & bonum semen dedit, sed subsequens rigida hiems cum marre corruptis, semen anno sequente terræ commisit, Viennæ in meo hortulo (inquit Clusius) relictum.

Altera flauis elegantis coloris florem habet,



cuius omnia folia mucronata, nigri vngues, nigri apices, fuliginè infecti pediculi. Hæc anno 1589. florem mihi tulit sedecim foliis constantem, eius verò proles tredecim: at sequente anno, marer dumtaxat octo, proles sex.

Tertiæ flos ex flauo & rubro coloribus permixtus, magnis

sex mucronatis flauisque foliis constans, quæ ab ungue omninò nigro, rubras venas per foliorum longitudinem radiarim excurrentes, & in latera spatias habet, nunc raras admodum, modò densas & confertas.

Icon Clusii est in lib. icon. Plantini p. 132. cum hæc inscripção, *Lilionarcissus candidus suauè rubentibus oris*, Teut. 167.

TULIPÆ DVBLIÆ TERTIÆ
mediæ secundum genus, flore præcocius equali.

Tuliparum Dubiarum mediarum, quarum flores præcocius sunt æquales, & caules intra illarum magnitudinem nonnunquam constituunt, ut plurimum autem Dubiarum maiorum altitudinem equant, multiplex est genus, cuius differentia distictius distingui possit quam præcocium, ob variam colorum mixtionem per totos flores interdum diffusam, vt longa & diligente obseruatione didici, inquit Clusius, aliquas



quas tamen & his quæ vel mihi floruerunt, vel apud alios creuisse significatum est, quæ potè respiciuntur, pro ingenii mei tenuitate describam.

Sunt igitur quædam Flauæ diluiores vel pallentes, quarum externa folia quodam-

Tulipa Dubia media 2. versicolor.



modò foris virefcunt: alia quarum folia orbiculata sunt, vngues tamen subuirefcunt: quarum item folia flauo coloris elegantis, interiora tria superne orbiculata, & quibusdam sanguineis guttis aspersa: Nonnulla omnia folia flaua habent, vngues cerei coloris, quales aliqui ferotina habent: alia quarum vngues nigri & splendente maculâ sunt insigniti, vel ex fusco & viridi coloribus commixtis perfusi.

Nonnulla Flauæ variæ sunt, nam licet omnia folia inicidè flaua sunt, tertio tamen vel quarto die postquam explicati sunt flores, singula folia tenui limbo rubro exornata conspiciuntur, nonnunquam etiam in proliis [nam satis factifica est] nullus apparet, vel alterius duntaxat annis conspiciuntur: quædam flaua folia habent, oras autem cinnabaris ferè colore infectas: aliarum folia pallidiora sunt, & rubris venis ornata habent oras: quarum item folia etiam pallent, sed perfusus est Mali aurei præmaturi color, præsertim circa oras: inueniuntur etiam versicolor elegantissima, cuius color flauus & ruber ita commixti sunt, vt è fericeo pannio flauo, cuius subtegmen rubrum est, constare flores videantur, illius vngues nigri sunt.

Aliarum flores albi quidem sunt, sed in flauo degenerantis coloris qui *ἀνθελευκος*, qualis in Dubia maiore descriptus est, harum folia vel omnia mucronata, vel interiora orbiculato mucrone constant, vngues stamina, apices pallent.

Quarundam flores *ἀνθελευκος* etiam sunt coloris, sed alius color adiunctus, nam cuiusdam folia omnia mucronata, extremum illum mucronem rubro colore tinctum habent: alia pallidiora sunt, & oras rubris venis distinctas habent: in nonnullis foliorum oras, vel purpureis venis distinctas, vel carnei coloris omnino sunt, qui etiam media folia occupat.

Vnam habui A.V. ferotinae semine natâ quæ anno 1589. florem protulit album protulit, licet inicidè virefcens color perfusus quodammodò conspiceretur, staminum apices fusci fuerunt.

Nonnullarum flores A.V. sunt octauæ A.V. præcoci similes, siquæ, vel diluiores, interioribus foliis quodammodò orbiculatis, vnguib; nunc exalbidis circa summum purpureascentem maculâ insignitis, staminibus exalbidis, eorum

apicibus nigricantibus, modò vnguib; & staminibus candicantibus, vel vnguib; exalbidis subcæruleo orbe inclusis, albis staminibus, nigricantibus apicibus: aut saturatoribus foliis præsertim exteriori parte, exterioribus mucronatis, omnium oris candicantibus, vnguib; exalbidis subcæruleâ maculâ insignitis, albis staminibus, apicibus eorum nigricantibus: quarundam folia mucronata diluiorisque sunt coloris aut saturatoris. Inueniuntur etiam quarum flores plurimum ad A.V. præcoci secundæ & tertiæ colorem accedunt: & alia semine à Boisor missâ nara elegans in cuius flore purpureæ venæ per totum folium dispersæ sunt, floruit hæc primum anno 1590.

Purpurearum flores coloris nunc sunt diluiores & magis floridi, foliisque interiora orbiculata habent, exalbidos vngues, purpureascentia stamina, eorum apices nigricantes: modò quasi similes Purpureæ diluiori dubiæ maiori, candicantibus oris, vnguib; vel ex albo flauescentibus, vel flauis omnino, aut veluti fuligine infectis, aut ex cæruleo, flauo, & subuirefcente coloribus commixtis: modò saturatoris coloris, cui albicantes tamen quædam venæ permixtæ sunt, vnguib; aut ex flauo nigricantibus, aut flauis omnino, aut ex viridi nigricantibus, aut subcæruleis, siue ex cæruleo flauescentibus, aut cæruleis omnino, nihil flauescens orbis ambiret: Sunt etiam quarum flores diluè purpurei illum ferè colorem referunt, qui in Caryophylleis floribus remissè miniatis è Silesia primum delatis conspiciuntur, Vienneses & Silesiæ matronæ *Pomeransfarb* / quæi aurei Mali colorem illis tribuunt, quia dilutiùs rubenti coloris flauus quodammodò perfusus videtur, horum color vel diluitor, præsertim interiori parte & per oras, vel saturator, interdum internè dilutissimus, foris saturator, vngues vel flauis, vel flauum colorè fuliginosus ambit orbis, vel ex viridi nigricant, vel fusci sunt: vidi etiam quarum flos ad postremam differentiam Secundi generis valdè accederet, rubro tamen colore alium superante: quædam plurimum accedunt ad eam quæ inter Dubias maiores octauo loco reposita est, verum humilior, foliis interioribus orbiculato mucrone præditis, vnguib; vel omnino albis, vel candicantibus, & superiore parte ad cæruleum colorem tendentibus, staminibus exalbidis, apicibus ad fuscum vrgentibus, vel vnguib; cæruleis aut ex cæruleo virefcentibus, vel nigricantibus: alia Dubiarum maiorum nouo generi similes ferè, licet minores, quarum vngues vel fusci sunt, vel ex cæruleo nigricant, vel flauis nigro orbe flauum colorem ambiante.

P.V. florum folia vel diluiores colore purpureo sunt prædita, vel saturatiore, omnium oras mucronate, vel interiorum orbiculatæ exalbide sunt, vngues aut albi, aut subcærulei, aut albi quidem, sed quos latus orbis carnei coloris ambit, stamina plerumque nigricantia.

Inter reliquas Rubræ mihi natæ quarum folia foris ad purpureascentem colorem accedebant, interioribus autem coccinei ferè coloris erant, vngues, stamina, apices, flauis: item quarum flores rubri, foliis tamen exterioribus secundum longitudinem flauis color aspersus: & quarum color splendens sed obscurus & ad lateritium accedens, vngues flauis vel nigri: præterea quarum flores R. ferotinae similes, quæ ab vnguib; nigris, flauo orbe *oculis* *Solis* cognominata est.

7. Purpurea
rea.

9. Rubra.

Alia item cuius flos nondum mihi conspectus dum hæc scriberem, verum pictura à nobili viro Io. de Hogelande Lugduno Bataurorum missa anno 1590. deinde illius vnica quam habebat bulb-
 us eiusdem anni Autumno, cuius flos omnia fo-
 lia mucronata habet: eaque vt ipse Hogelandius
 ad me scripsit, initio quidem omnino viridia, de-
 inde oris veluti pallescens, quæ tandem in
 rubrum colorem mutantur radiatum sese alteri
 coloris commiscens, color etiam ille viridis se-
 nescente flore elanguescit, præsertim interiore
 foliorum parte: & sanè subsequens annis
 bulb-
 us ille florem mihi dedit, qualem descripsit.
 Sed & alia femine mihi nata est, quæ simi-
 lem florem produxit Lugduni Bataurorum an-
 no 1595.

Sunt omnes hæc dubiæ mediæ secundæ classis
 [præter postremum genus] mihi natae femi-
 ne, vel Byzantio allato, vel à Nobil. viro
 Io. Boissot communicato, vel (quod magis miran-
 dum) aliquot etiam præcoces. Nam anno 1586.
 ex purpurea præcoctiue florente habui P. feroti-
 nam elegantem diuertiorem: è P-V. autem præ-
 cocce, P. ferotinam ad rubrum quodammodo ten-
 dentem, & P-V. ferotinam diluorem elegan-
 tem: Anno sequente rursus è P. præc. Rub. ferot.
 elegantem ad carneum colorem accedentem, vn-
 guibus ex caruleo nigricantibus: 1588. autem an-
 no è P. præc. id. x. d. uicor ferotinam: R. ferot. vn-
 guibus & staminibus flauis, P. ferot. nigricantibus
 vnguis, & P-V. ferotinam: ex A. præc. Flauam
 ferot. & P-V. ferotinam. Contrà ex A-V. ferotinâ
 natae sunt præcoces Alba, Flaua, Rubra, vnguis
 flauis, Rubra *Ochro di Sile*, & P. diluor.

Cuiusdam porro R-V. quæ anno 1597. primâ
 Bruxellæ dorem protulit, semine, nactus est
 iam dictus Boissot, & quædam Nobiles matrone
 Dubias etiam Tulipas mira colorum varietate
 ludentes, vt ad me perscriptum est: etenim &
 flauas & pallentes, ex albo item pallescens, si-
 ue *ἀπορροια* purpurescentes, intensius aut dilu-
 tius rubentes, lateritii coloris, atque aliis colo-
 ribus insignitas habuerunt: quibus etiam similes
 & alia elegantissimis coloribus variè mixtis pos-
 stea mihi femine nata, & singulis annis adhuc
 nascuntur, quibus pares nunquam antè conspe-
 cta: ita *Deus in istis floribus admirabilem suam pu-
 testatem ostendit.*

Cæterum anno 1595. mittebat lac. Plateau Tu-
 lipæ, quæ illi femine nata erat, monstroræ quidem
 sed non inegantis, iconem, colore à reliquis
 differentem: eius enim flos, ipso referente, pror-
 sus viridis, internè sex parua cralla: quæ alia etiam
 viridia complectens, caput ambientia, vt initio
 parua Brassica florida siue Cypria videretur. Pri-
 mo quo florem tulit anno, se neglexisse scribebat,
 vitium aut naturæ ludum esse existimans: sed eum
 subsequens quatuor annis florem non variare
 animaduertens, nullum autem probum semen
 præbere, eius rei pertæsus, bulbum alteri dona-
 uit.

Sed & mihi biennio post, ex femine natis sero-
 tina mihi florem dedit sex foliis, vt reliquæ, con-
 stantem, prorsus virentibus, exceptis oris quæ
 pallidæ erant, & vnguis, qui ex viridi pallescer-
 ebant. Floruit etiam mihi anno 1596. alia viridis
 cuius oris albe fuerunt. *Breviter, si-
 gulari anni nobis præferunt nouum
 aliquod Tuliparum genus, nec
 ante cupiam conspectum.*

Ex præco-
 cis inter-
 dum seroti-
 na.

Colorum in
 Tul. præ-
 cocibus var-
 ietas.

ferot. vi-
 ridis, dupli-
 ci foliorum
 in flore se-
 me.

ferot. vi-
 ridis, oris
 pallidæ, &
 albis.

TVLIPA BVLBIFERA.



NOs Tu-
 lipæ Bul-
 bifera iconè
 proponimus
 ex Clusio, quæ
 verb de ea
 scripsit paulò
 post, vbi de
 cultura tra-
 ctabimus, re-
 censentur.
 Schvven.
 Cat. Silef. l. 2.
 Tulipa bulbifera,
 Lilio nar-
 cissus bulbum
 ferens in hor-
 to. Tabern.
 icon. Tuli-
 pa bulbifera.
 Marcijsen l. 1.
 l. 11.


TVLIPARVM ICONES EX LOBELIO,
 diuersæ ab istis quæ Clusius habet
 in postrema historia.

Multe sunt figuræ & icones Tuliparum ex
 Lobelio, cuius titulis in lib. icon. pl. quæ
 non sunt in poster. histor. Clusii, de quibus hic
 agere statuiimus vt illustrior sit historia Tulipa-
 rum.

TVLIPA LVTEA OBTVSIS foliis florum.


NOs sæpiùs obseruauimus in horto Ill. C.
 Wirtemb. Montbelg. pulchrum genus Tuli-
 pæ flore luteo, cui florum foliola obtusa, quæ nõ
 se multiplicabat: cui optimè respondebat [po-
 tullimum quoad florem & folia] icon à Lobel. in

Obser. p. 65.
 secundo loco
 posita, cui ti-
 tulus est: *Lilio
 Narcissus Chal-
 cedonicus totus
 luteus, sanguis
 neo panico par-*
 & similis hinc
 in iconè flo-
 rum cui foliola
 in acutum
 non desinunt
 existimamus
 tradi à Clusio,
 pro dubia se-
 cunda flaua.
 Dodonæus li-
 br. fl. eam icon-
 nem solam pos-
 suit pro Tuli-
 pa. H. Lugd.
 Iconem habet
 cui flos deorsum inclinât, alioqui non multum
 differens à iam dicto: de eo scribit ea: Tulipæ
 genus



Tulipæ genus quidam esse arbitrantur plantam quam *Oulondiam* Græcum vulgus appellat.

TVLIPA PHOENICEA LVTEIS ORIS
flore parulo.



LObeliferâ iconé Tulipæ habet cū hac inscriptione, Lilio-Narcissus luteis oris, flore parulo: huius descriptio fortè est quæ antè posita est Lobelio secundo loco. in scō. Plant. libr. huic figuræ ritulus est est Lilio-Narcissus

phœniceus luteis oris, flore parulo. Hist. Lugd. coniunxit hanc iconem cum alia sub titulo Tulipæ luteæ.



candidis oris Teut. 166. Nudam & hîc absque descriptione exhibendo iconem Lobelius, Lectores dubios & incertos relinquit.

TVLIPA RVBRA, ORIS ET VAGINULIS ALBIS.

Hic, qualis aliis, radix bulbosa: folia quoque consimilia, non undulata: caulis singularis, cubitalis, fuscus. Flos senis, itidem ut alia, foliis constans: singula sanguineo rubore in media maioreque parte tincta, oris circumquaque & vnguibus albidis: apices crocei: stilus ut cæteris triquetrus. Hæc nostra fortè ad præcedentes dubias Clusii referenda.

Schvven. in Cat. Siles. meminit Tulipæ rubræ candidis oris, Lilionarcissi rubelli candidis oris Lob. Roter Tulipan mit weissen spizen.

TVLIPA COCCINEA PVNICEAVE
Rutilans.



In libro Iconum Plantini p. 128. est figura cum hac inscriptione: Lilio-Narcissus coccineus puniceave rutilans, Lob. 67. Teut. 165. Dolendum est, quod Lobel. Tulipas suas, nō descripsit nec natales earundem assignavit, ut rei herbariæ studiosi certioris aliquid concludere possent. Amplius igitur de his cogitandum.

TVLIPA NIVEA TOTA.



Sunt in libro Descriptio Icon. Plant. p. 131. figuræ duæ cum hac inscriptione: Lilio-narcissus niveus totus, Teut. 166:

TVLIPA COCCINEA CANDIDIS ORIS.

In libro Iconum Plantini pag. 130. est figura cum hac inscriptione: Lilio-Narcissus coccineus Tom. II.

TVLIPA CANDORE ET RVBORE confusa.

Hanc iconem inuenimus tantum in libro LII

Iconum Plantini p. 131. titul. Lilio-Narcissus cado- & rubore confusus Teut. 166.



TULIPÆ PVMILES.

Tulipa dubia pumilio.

Descriptio



Tulipa pumilio altera.



regens plurimo, denso, candido, mollique romento iussula est, vt molliissime bulbum recubare necesse sit.

Inuenitur etiam alterum pumilionis Tulipæ genus, quod mihi (Cluuii verba sunt) quidem conspectum non est: sed iconem suis coloribus expressam accipiebam anno 1596. ab erudito viro Io. de Jonghe, Ecclesiæ Middelburgensi in Matthiæis, addita hac descriptione: Mitto ad te Tulipæ cuiusdam iconem, ad ipsius plantæ similitudinem expressam, hoc est, eadem quâ Tulipæ magnitudine, paribus caule, flore, foliis [quæ paullo longiora & angustiora: habere debet] & bulbo quem erui, vt pictor commodius exprimeret. Tribus iam annis continuis in horto habui florem profertentem, sed vnicum: nec florem habuit quâdiu singulari folio prædita fuit, aliarum Tuliparum modo: nâ superiore anno habui flore suo onustam, & aliam unicum folium producentem, quæ nunc quaterna folia nacta, primum florem demum tulit, alteri protus similem, vt certum sit id genus maiorem amplitudinem non adquireturum. *u. altens ille.* Tota verò planta [quantum ex icone deprehendere potui] palmo inaior non est, quatuor promens folia angusta, carinata, Tulipæ Mompeliæ foliis similia, inter quæ cauliculus prodit vnicalis aut paullo longior, nudus (præter aliarum Tuliparum morem) ex viridi purpurascens, summo fastigio florem gerens sex foliis constantem, foris non nihil purpurascens, intus candidis, umbilicum occupante oblongo capitulo sex flauis staminibus lecto, quod an semen protulerit, ignoro: florem autem tulisse Aprilis inde coniecit, quoniam sub Maii initium picturam mittebat, cuius bulbus exiguus, bulbi tamen aliarum Tuliparum formam referens, ex spadiceo nigricante cortice tectus. Icône accepta, Croci verno tempore florentis genus inuidè existimabam.

Cæterum non omnes flores diu in sua coloris elegantia & venustate perdurant, verum nonnullarum magis caduci, breui marcescunt, aliarum firmiores sunt & coloris gratiam diutius retinent, præsertim serotina & dubia, omnes certè nullo cælo sese contrahunt, & pluuio facillè corumpuntur, etiam antè quàm expandi possint interdum, si continui cadunt imbres: contra temperato Sole illustrati, explicantur & diutius conseruantur: at vehemente etiam eius ardore nimium excocti, & suo humore exhausti, facillè defluunt.

Neque omnes versicolores, tam præcoces, quàm serotina, singulis annis eandem coloris gratiam perpetuo retinent, sed alternis variate sapientius obseruari: exempli gratia F.V.A.V. vno interdum anno nitidissima sunt, sequente vix alius color, quàm flauus vel albus in eis conspicitur, sic R.V. & P.V. nonnunquam magnas habent oras flauas & albas, sequente valdè exiguas.

In lib. icon. plant. p. 127. Tulipa pumilio, Teut. 164.

Cæterum tametsi feminibus terræ mandatis Autumno [inutilis enim bulbacearum, & ruberolarum maximè ex parte verna est facio] huius plantæ genus conseruari solet: interdum tamen & nucleis maiori bulbo adnatè propagatur, sed nulla inter præcoces Tulipæ fertilior, rubra, & albæ: omnium autem maximè serotina rubra, quæ adeo foecunda est, vt etiam semine nata, & vix b. ma alias proles generet biennio aut triennioq.

antequam florere incipiat, quod etiam faciunt plerique dubia. Solent enim omnes Tulipæ nondum adultæ, & antequam flores profertre incipiant, vt plurimum singulis annis cœta & quasi ad perpendicularum in dodrantale & palmare altitudinem profundius descendere (Apeninæ excipio, & quasdam alias, quæ non in altum, sed in latus & obliquum, antè quàm floriferæ sint: proles è longis venis dependentes spargunt, vt proximo capite declarabimus:) ferotina autem illa & dubia iam dicta: etiã in veteris bulbi exuuij quod substantiæ relinquere, quàm alit bulbum efformata, similiter in exuuij substantiæ quiddam relinquit, quæ in alium bulbum transit: vt si quis cum dexteritate quadam & industria trimos & quadrimos eruat, exuuiorum vestigia sequendo, nonnunquam velut catenam aliquot bulborum coherentium, & ex primo exuuij ortum ducentium inueniat: licet interdum accidat vt R. ferotina iam grandior, nondum tamen planè adulta, instar Tulipæ Apeninæ siue Bononiensis proles in latus spargat, vt in meo hortulo, in quo varij generis bulbosæ stirpes florum elegantia & varietate commendabiles alebam & excolebam, dum Viennæ agerem, non semel obseruauit.

Memini & bulbos infimâ alâ, quasi summâ tellure natos, in ferotinarum & dubiarum generibus, præsertim (licet etiam in A-V, P-V, & quarundam aliarum præcocium alis bulbi mihi nati sint,) qui telluri commissi, eiusdem coloris cum matre florem subséquente anno produxerint: eundem colorem etiam renerint bulbi matri adnati.

Ex feminibus verò quæ fit propagatio, planè [vt dixi] incerta est, in præcocibus nimirum & dubiis: nam ferotina magna ex parte suum genus conseruare videntur, quemadmodum superiore capite dictum est, aut si aliquam mutationem adquirunt, exigua ea est, & plerumque in vnguium & staminum varietate, aut coloris intentione vel remissione consistit.

Solet caulis è medio bulbo erumpere: sed ipso cum folijs iam marcido, & siccato, si bulbum eruas, ad latus illius enatum conspicies (quod etiã euenit in Iride bulbosa, Colechico & congeneribus alijs,) nouo bulbo paulatim succrescente, & totius plantæ succum ad se recipientem, quæ tempore commodissimè erui potest, erutus bulbos diu extra terram adseruari, & in alia loca etiam procul distita sine noxâ transferri.

Omaes autem cuiuscunque generis Tulipæ (vt etiam hoc breuiter annotem) quemadmodum longâ experientia didici, quamdiu florem non ferunt, æque planè sunt, & vnicum folium singulis annis profertre solent: at si, dum emerit, sese explicare incipiens, secundum etiam eo inclusum appareat, illo ipso anno florem prolaturum spes est, nisi pruina, aut aliud ab insectorum erosione incommodum eam intercipiat.

Inutile sanè fatiorem Vernam Tuliparum obseruauimus, quia Tulipæ multæ in profunditatem descendunt, & sic perduntur: bulbis nouimus qui substernant tabulas lapideas: in solo macro & sicco feliciter proueniunt, quàm in pingui & argilloso: plurimi feliciter ætate bulbos terra exiunt, & per plures septimanas extra terram reseruant.

Tulipæ si quidem fides habenda Lobelio, medio iam Vere floret, non modo in Italis, sed etiam Belgicis & Gallicis hortis. Naturæ luxu & lusa huius quàm multas venustissimas florum in de-

Tom. II.

litiis habent inter Belgas D. Carolus de Croy, Princeps de Chymey, D. Io. de Brancion, D. Io. Vander Dils, D. Maria de Brimeu. Io. Montromus. In Thracia etiam, teste Dodonzo, & Capadocia Tulipa exit: Italia & Belgio peregrinus flos. Aprili mense florem Belgium videt: Thracia verò etiam Ianuario, veluti testis est Augerius Busbequius in itinere Constantinopolitano, qui ingentem vbiq; florum copiam media planè hieme, Ianuario mense sese inuenisse refert. Horum florum insignem varietatem obseruauit ego Sturgardiæ & Montbelg. in hortis Ill. E.C. Vviremb.

Vires Tulipæ.

An iisdem facultatibus cum Satyrio Tulipæ præditæ sint, neminem periculum fecisse intellexi, inquit Clusius. Io. Möller Pharmacop. Vienn. multos Tulipæ bulbos condidit, radicem Orchididis instar, quibus longè suauiores, & palato gratiores deprehendebat: an verò id præstarent quod Satyrio tribuitur, nondum intellexi. Anruerpianus quidam Mercator cum horum bulborum non exiguum numerum ab amico cum byssinis pannis Constantinopoli sibi missam accepisset, Cepas esse existimans, ex illis aliquot sub prunis assari iussit & vulgarium Ceparum modo, ex oleo & aceto in cœnam sibi parari: reliquos, in horto, inter Brassicas & alia olera deposuit. De viribus & facultatibus Tulipæ, nihil compertum habet Dod. aut à quoquam compertum reperit.

TULIPA MINOR LVTEA NARBON.

Minores Tulipæ (inquit Dodon.) folijs sunt *Tulipa minor Dod.* angustioribus & ferè porraceis: cauliculis tenuioribus ac breuioribus: floribus minoribus, & minus in latitudinem sese pandentibus: bulbis minoribus, alicubi in Gallia Narbonensi ac in Italia nasci feruntur.

Nonnulli Hermodactylus flore luteo dicitur, sed perperam tamen. Neque enim Hermodactyli species aliqua esse videtur. Narbonensem Lilio-Narcissum luteum montanum, Tulipæ speciem, erutam è Senenæ Narbonensis iugis à plurimis iam annis, in Belgium deferendâ Lob. & Pena Adu. curauerunt amicis Antuerpianis, qui primam Tulipam illam vocauerunt, ipsi verò Narcisso-Lilium luteum audacius fortè (vt solent, quò rerum cognitioni distinctioni consulant) indigitauerunt.

Hermod.



Flos itidem *Descriptio* singulo bulbo & caule Narcissi minore, tenuiore, delicatesiore, vnicus, luteus, tenuis folijs cœstans, ad Liliû aut potius ad Liliû lutei Asphodeli florè accedens, filamentis luteis è medio enatis. Bulbus exilior multò, nucleum oblongum Allii æquat, sibi quæ sæpius adnatum Allium exili stilo ad-

Il] 2

nexum habet: folia crassiora, pauca, è caule medio, potracea.

De hac Clufius: Tulipæ Apenninæ similis penè est Narbonensis è Cebennis montibus à Lobelio primùm eruta, & amicis in Belgicam missa: minor tamen est in omnibus, flores foris magis virentes, intus flauis, delicatius quiddam spirant: radix etiam è tenuibus neruis in latera loboles & bulbillos spargit.

Hist. Lugd. dicitur Tulipa minor Dod. & Camer. in hort. Tulipa minor Narbon. odorata & cum mediis ferè florens.

Nos hanc Tulipam siccam habemus ex plantis siccis Valerandi Dourez, caule palmari, bulbo sublongo, sub quo multæ radiculae, titulus est, Narcissus luteus: icon quam proponimus est ex iis quas sculptas emimus.

TULIPA HISPANICA NARBONENSI paulò minor.

Tertia in monte quodam Araniocis vicino nata in Belgicam à Frauc. de Hollebeque Regio hortulano missa, Narbonensi paulò minor est: eius florem non vidit Clufius, sed Narbonensi similem esse intellexit, qui folia tamen habeat foris non omninò viridia, verùm purpurascens etiam colore perfusa. Illius bulbos aliquando aluit, qui vnicò duntaxat folio semper germinarunt, adeoque inanes paulatim facti sunt, vt tandem perierint. Miserat præterea idem Franciscus & alios aliquot bulbos (vt Hispania bulbacearum, & variarum aliarum elegantium stirpium maximè ferax est,) quorum maximam partem in Hispanica sua peregrinatione non obseruabat Clufius, qui tandem Belgicam æterim repentes, contabuerunt.

TULIPA LVTEA BONONIENSIS.

Descriptio



Mediocriter magno bulbo prædita est hæc Tulipa, oblongo, fibroso, sapore dulci & grato, qualis est Tubercum terræ, spadiceo, vt ait Clufius, cortice recta, qui in binas aut plures res loboles singulis annis diuiditur, proximo anno flores daturus. quin & alias subinde obliquè & in latera

spargit, præsertim, quæ nondum florem tulit) non in altum rectà mergit: caulem profert cubitalem, & bicubitalem, nonnunquam in ramos binos aut ternos Cluf. ac etiam plures ab vna radice, vt afferit Camer. diuisum, angulosum, colore herbaceo fastigium versus purpurante: folia dodrantalia aut ampliora, aliqua minora, vnicam partem à radice statim, partim à caule exeunt, nullo pediculo, carinata, colore glauco. Flos vnico, cuique ramo, odore suauis Leucoi Cheiri dicti, sed imbecilliore, mediocriter magnus, foliis sex

constans, interdum octo Cluf. quorum exteriora tria, extrinsecus à luteo purpurascunt aut virescunt, intrinsecus lutea: tria reliqua penitus lutea nisi quòd mucrone tantillùm rubent: in medio apices lutei feni cum stilo triquetro viridi. Succedit filiqua magna. Semen, teste Clufio vt in reliquis Tulipis, sed longè minus.

Lobel. Obs. & Ic. Pl. p. 145. Bononiensis Liliomarcillus luteus [siue Tulipa] Narbonensi folio, caule, & flore proximus, omnia tamen vegetiora & grandiora, quandoque flores in caule bipartito geminos stielatos, & nonnullquam ternos videas, iucundo Leucoi lutei odore.

Gesner. in fin. hist. Cordi, Tulipa alia Turcica eruditus in Italia, quam Guilandinus Saryrium triphyllum coniecit: Louchitis, inquit Calsalp. cuius opinionem non probamus, à Lanceæ culpide cognominata, quiddam Narcissum luteum vocant: folia fert Narcissi, &c.

Camer. hort. Tulipa Bononiensis, quæ maior Narbonensi & plerumque polyclonos, odorata. Item apud Matth. Germ. Narcissus 9. Tulipa Bononiensis: Quæ planta sit Matth. Narcissus nomen hic, aut in Epit. Matth. Lat. 8. nescio, nisi sit hæc Tulipa. Sanè Icon quæ est in epi. Matth. pro Narcisso 8. Tulipam aliquam denotare videtur polyclonem: non accuratè pictam nec descriptam, quod vulgare Matth.

Hist. Lugd. Liliomarcillus luteus Bononiensis. Schvven. Tulipa Bononiensis Narcissus 9. Matth. Tulipa minor lutea Italica, welsch geel Narcissen lüten.

Tabern. icon. tulipa Italico. 1. Narcessen lüten. Floret cum serotinis aut paulò seridis. Nobis floret Montbelg. monte Aprilii in orto Ill. Princ. cum binis floribus in vno caule, magnis, luteis, qui diu durant, postea oriuntur magni calices. Missi bulbi ab Ill. Guillelmo Landgrauii nomine Tulipæ Bononiensis, videram alias Bononiæ in orto s. Saluatoris, folia sunt terna: ea multùm multiplicat, florebat principio Martii: facillè cæteris apud nos videtur multiplicari nec facillè perire.

TULIPA PVMILIO ANGVSTIFOLIA ALBA.

Tulipa pumilioni angustifoliae flos senit foliorum, albus: internis tribus candidis, laterioribus: angustioribus verò tribus exterioribus, internè item albis, externè ex fusco rubentibus,



Croci floris lutei ferè paribus & similibus. Tragopogi instar folia angusta, quina aut sena, humi procumbentia, caulibus palmo altior. Radix Monspelienfis Tulipæ maior. Bononiensis ferè par, subfusca foris. Maximo in pratino habetur & fealdò colitur (teste Lobel. Ada.

Adu. par. 2.) in horto an. 1655. D. Ioh. de Longhe Mesopoli Martiacorum concionatoris, huius studii callentissimi.

TVLIPA PVMILIO ALBA ALTERA Lusitanica.

Vncialis auc sesquiuncialis hæc plantula hoc anno 1603 à N. le Quelt Botan. Lutetiano egregio accepta, exilioribus brevioribusque angustifoliis Tulipæ superioris foliis: flore albo, exili breuique pediculo: florem sicum vidit Lobel. Adu. par. 2. album, icnis foliis donatû, staminalisque



totidem: Bulbus valdè parvus esigie aliarum Tuliparum, duriore involucre, externè pullo, squamoso, obductus: interiore autem rubens, quem studiosè in horto alere incipit, vt eius delineationem pressus cum multis aliis exhibere liceat: spontè in monte iuxta D. Oue ad maris littora.

COLCHICVM ORIENTALE ET Syriacum quorundam.

Colchicû orientale Italis, Zaffaran; Orientale Matth. in epit. minoribus exit foliis, angustioribus, & magis acuminatis, caule rotundo, flore gradiori. Radicè bulbosa, euidenter scissa, & lacteo succo prægnante. Camer. in Epit. Matthiol. aucta omisit tum icrum descriptionem.



Lobel. eam iconem habet Obs. cum hac inscriptione, Colchicum Syriacum Alexandrinum, Adu. p. 54. & Ic. Plant. p. 146. Colchicu Syriacû Alexand. Colchicum Orientale Matth. Teut. 179. De eo autem scribunt Adu. Colchicû decoctis Guaiaci, ad Lucem Veneream, aliisque sudor.

ificis magno remediorum compendio & ægrotum cominodo; admiscuisse Chirurgum quendam Venetum edoctum illic à plebecula.

Tabern. icon. & hist. Colchicum Syriacum; Alexandrinum, Orientale, Syrisch zeitlofen. Gerard. Colch. Syr. Alex. Assyrian Medom Saffran. Caterum Colchicum Syriacum vel Alexandrinum à nonnullis exhibitum, nihil aliud esse Clusio videtur, quàm Tulipæ genus quale Appenninarum foret, cui pictor nimis orbiculata folia tribuerit, ipsi verò plantæ nimis lata & breuia.

NARCISSVS AFRICANVS BIFOLIUS siue exoticus.



Crassa lætaque vtrinque compressa, squamosa, veluti nucleis compacta radice, bina tantum edit folia, vncias duas lata, lactioraque: & vncias quinque longa, viridia, laxa que, sub tellure tamen aliis duobus foliorum rudimentis præditis hic peregrinus bulbus, paruum

Descriptio

pagnum magnitudine æquans, cuius Lobel. Adu. par. 2. copiam fecit præclarus vir D. Iacobus de Keyser. Frater eius Gouarus de Keyser, bulbos eruit locis vicinis portui siue Capo bonæ Spei, & primus in Belgium detulit.

Narcissum exoticum appellauimus cui propriè esse videtur, quoad nomen magis conueniens nobis innotescat.

NARCISSVS AFRICANVS folio rotundiore.

Lobel. Adu. par. 2. p. 503. Narcissus Aphricanus folio rotundiore & complato apud Dominum de Keyser variat.

Descriptio



SATYRIVM QVORVMDAM

Erithronium Bifolium flore vnico
radiato albo & purpureo.

CAPVT X.

Descriptio

Satyrium hoc est radice duas vncias longa, alba, crassiuscula, & infima parte crassiore, superiore verò parte gracilescente: folia promit bina, rarò terna, inquit Clusius, opposita, primò mutuo se complectentia & florem occultentia, per terram fusa, Lili conuallium aut Allii vt sinu formà, crassiora & magis carnosà, ex anguliorum princi-



Cyclaminis instar: *stamina* in medio sena atropurpurea stilum circumstant: longiorem, album, truncuspidem: nullà odoris gratià, inquit Clusius placens, sed solà elegantia cõmendabilis: succedit *siliqua* triangularis, nutàs vt flos, in viridi spadicea: Capitulũ huc siliqua teste Clus. continet aliquot *semina* Leucoii bulbosi præcocis alterius seminibus ferè respondentia, sed longiora, gracilioraque, flauescens coloris. Quamdiu nullum florem dat hæc planta, vnico dumtaxat exit folio.

Est à nobis aliud genus in Italia obseruatum de quo scribit Clusius: Ei folia longiora, maculas albas diutius retinentia, initiò dum exeunt, florem etiam amplectentia, qui superiore maior platumque est, vel lactei omninò candoris, vel mistis purpurascente alboque coloribus constans, staminibus albis, apicibus nigricantibus, huic succedit trigonum caput semina alteri paria continens: radix etiam longa & superiore crassior. Hæc ille.

Satyria Diosc. vera vix adhuc Herbariis benè



sunt cognita, tamen ex Dalechampii cõiectura potiùs, quàm certa asseueratione hæc exhibet Hist. Lugd. Erithronium, montosis & apricis nascitur: radice bulbosà, inã parte fibratà, oblongà, Porro non dissimili, foris subrusà, intus candidà, nullà granitate odoris iniucundà, veluti Orcheos, tenera, gustu princi-

piò dulci, qualis est Castanea, deinde acri, Cerpæ Alcalonia modo, quam aiunt semine perfecto in globosum caput colligi, mali figurà, crescente verò caule extenuari, ac in longum produci, vt cauli quod satis sit alimentum velut de suo suppeditet, nunc simplici, nunc velut è duabus in vnum cõeuntibus iunctà, subnascens aliis perpetuò, & coherentibus duabus, tribusue, ac interdum pluribus, quæ exhaustà crassiore, postea magis augetur: caules si ortum eius à radice confideres, proceros, teretes, supernè rubenti: *siliis* Rumicis, aut Lili, minoribus, binis, nonnunquam ternis, aliquando quinis, ad terram infractis, virentibus, sed maculis rubris conspersis, tã crebris, vt rubere magis quàm virere videantur: flore purpureo, Lilio rubro, quod Martagon vocant, figurà simili, priusquàm pandatur, oblongo, dum seratus est, sex foliis constante, ad radicem candidantibus, reliquã sui parte ostro purpurascens, apicibus totidem quorũ sunt foliola, niuis supernè velut atro capite conspicuis.

Alterum, trifolium videlicet, inuentu rariùs, priori omninò consimile, nisi quod guttis & maculis lacteis folia variegantur, flos candidat. Vtrique semen oblongum siliquis includitur, nunc triangulis, nunc quadrangulis, copiosum. Inuenitur genus quoddam vnico, ac lato folio, sine flore, huc fructu. Marem appellant Herbarii.

Florent Aprili & Maio mensibus. Satyriorum historia id repugnare videtur, quòd rotunda & globosa radice non sint, qualem requirit Diosc. At si Satyria non sunt, tamen ob insignem & venustam figuram describenda fuerunt vulgato apud Herbarios seruatò nomine, quoad verius sit inuentum, aut è Veterum libris erutum.

Icones quatuor habet Hist. Lugd. primà titulus est Satyrium rubrum Dalechampii. Secundà: Satyrium

tyrii trifolium seu album Dal. Tertia Satyrium Dalech. forte Pseudohermodytylus Matthioli. Quarta autem c. 14. Pseudohermodytylus Matth. In iconc prima non placent duo caules nec radicem figura: in historia etiam displicet color radicis, & quoddam globosa dicitur, ac etiam numerus foliorum, qui plurimum est plantarum simul proueniendum non unius solus. Non video cur Satyrium cum lacteis maculis & flore albo magis trifolium dicendum sit, quam praecedens: quod flore rubro: ac cur id quod unicum fert folium dicendum sit genus: quoddam mas nescimus, quandoquidem potius vitium est quoddam lapsus quoque in Tulipis obseruatum. Icon 2. recitanda non videtur, verum melius placet tertia. Quarta autem ex Matthioli alio capite omnium pessima est.

Lobel. & Pen. in Adu. innotuisse scribunt non multis ab hinc annis bulbum perelegantem, cui amici Satyrium nomen fecerunt, quique a consulti Medicae materiae peritis Lugdunensibus (qui condendum curassent & exploratum habuissent) visus, Dioscor. genuinus sit habitus, nulli desiderata nota praeterquam coloris, qui valde variari loci varietate, ut in Squilla, Capis & aliis bulbaceis videre sit: Folia cum habere bina, plurimum terna: flos ex albo purpurascens.

Icon Lobelii nobis displicet, nec terna foler ut plurimum folia ferre, sed bina: nostrae etiam icones quas sculptas emimus non placent.

Satyrii Erythronii Lobel. Obs. seu Satyrii & Dentis canini Belgarum, Hermodytyli & Pseudohermodytyli Italarum Matth. flos aut purpura ruber, aut candore micat, aut purpura & candore confusus pallet. Hermodytylus & Pseudohermodytylus Italarum puratus foliis constat inferne angustis, qua radicis ceruici inniuntur.

Dentem caninum Dodon. de purg. Satyrium plerique appellant, & quidem Erythronium dicitur, desiderantur tamen nonnulla. In Matth. huic similis, (si non eadem eadem est) herba, pro Pseudohermodytylo depingitur. Quod si autem haec est, perperam, duo additur bulbi. Ephemeron. Diosc. esse possit, si in descriptione pauca aliter se haberent.

Clus. Pannon. Dentalis 1. seu purpureo flore. Dentalis 2. seu lacteo flore vulgo Styriae Medicis & Pharmacopoeis *Dentalis* appellata, à nonnullis rusticis Schoff mura. Ex Italia Apennino Pseudohermodytyli, & Dentis canini nomine missa: ex Allobrogibus vero Satyrii Erythronii. Eadem leguntur in post. hist. ubi Dentem caninum purpurascens & albo flore inscribit. Nos Dentem canis C. virum Vlystem Alexandrum Bononia: D. Gesner. & D. Melchiorum Guiland. Hermodytylum nominare auidimus.

Camer. in Epit. Matthioli. figuram pulchram habet sub titulo Pseudohermodytyli & Dentis canini, qui vulgo *Dr. Hermodytylo bestardo*. Lectores huius Satyrii historiam conferant cum iis quae Veteres de Satyriis scripserunt, quae Anno rauius cap. de Orchidibus vbi etiam reperient æquiuoca.

Nascitur flore purpureo copiose ad quorundam montium radices solo herbedo vdo, in Styria non procul Graetio. Similis planè cum hac coloris, in Allobrogum montibus erutam Valer. do Dourez sibi aliquando missam meminit Clusius: sed & circa Baiouam nasci, vicinis Cantabrorum montibus, referebat C. V. idemque Medicus Regius Io. de la Riviere. Floret Aprili, in-

terdum etiam maturis, in hortis praesentim culta. Flore albo aliquando accepit a C. V. Vlyffe Aldro. tum à Jac. Antonio Cortuso Patricio Patruino, & ab Achille Cronero Medico cum Patruui viueret: verum similes etiam radices Francofurtum misit Io. Vincent. Pinellas. Vtraque frigoris patientissima. Lugduni florebat Aprili in horro Valer. Dourez, (imò Io. Bauhini) è iura monte, cuius sedulitate primum nobis, inquit Lobel. innotuit, exuta Alpibus Lemano finitimis: & postea in collibus Taurinensium Pado, scsquileucam distans, eandem eruiimus. Florentem in fine Februarii & Martio floribus albis vidi, in Montibus Euganeis inter Aponensem Balneum & Arqua ac alnis in locis illorum montium: Hanc etiam in horro Priuli obseruauimus. Antea siccam videram apud D. Gesnerum. Ferrariae visa in canobio S. Dominici à *P. Angeli*, & copiose in collibus circa Bononiam. Item Basilea flore albo, mense Martio, in horro D. D. Platari. Aliud floris genus colore differens nempe rubro ex purpura: album dat in hortis & sponte copiose circa Genenam florens Martio & in colle *la Bajie*: Lugduni habebam in horro meo Genensium acersitum. Prouenit mihi Montbelgardi in horro ex radicibus Genensium missis protrudens folia & florem Martio, & Aprili euasens.

Styriacae mulierculae radicis exicatae pollinem pulvis puerorum inspergere solere ad enecandas eiciendasque ventris tinea Clusio relatum est. Ex vino autem haustum, mirifice coli dolores mitigare expertus est D. vir Thomas Hauvvlstein Sereniss. Archiducis Caroli primarius Medicus: sicut multos eius balbos non semel Viennam vsque misit, insuper corporis vires rescicere & nutrire: ex aqua vero pueros epilepticos iuuare. Ad excitandam, autore Lobelio, venere magnam vim habere ostendit, humidam & calida substantia, cum acrimonia paululo iuncta.

MALEAGRIS SIVE FRITILLARIA
saturatio & dilutio.

CAP. XL



Maleagris ex radice emergit bulbosa, candida, solida, nullis tunicis septa, Clusio, sed veluti in binas, eaque ut plurimum inaequales partes secta, è cuius medio protuberat quali pulvini quidam, vnde caulis emergit, sessili parte, multis fibris donata: caulem promit tenuem,

singularem, dodrantalem & pedalem, interdum etiam maiorem, fortis ex viridi purpurascens vel fusco obsoleto colore praeditum, teretem &

leuem, intus fungosum : ad quem sine pediculis adnata hinc inde, nullo ordine *folia* Tragopogonis purpur. quinque sex, septem medio-



critter longa, angusta, carinata, subacido sapore prædita : in summo caule *flos* sæpè vnicus aliquãdo bini, interdū terni, qualem nos exhibemus (omnes autore Clusio eodem tempore se aperientes) ex pediculis vnicalibus, cauli concoloribus, incuruis nurantibus dependent, pulchri, Campanæ instar, mag-

ni, ex foliis sex compositi [Clusius habuit cum 8. & duodenis] tessellato emblemate, fritilli seu tabulæ latricolorū distinctis, plagis alterno rubore, carneo, sanguineo, & albedine pictis, aspectu pulcherrimo, interiore superficie saturatiori purpurâ splendente: singula folia ab imo costam eleuatam habent, ad folii vsque medium abeuntem, in rautillo puniceo, luteolam: in floribus medio, *flamma* sex, capitulo farinâ crocea asperso, *filium* ambiunt tricuspideum, coloris herbacei, odoris nullius; florem verò excipit *capitulum*, angulosum, vel, vt tradit Clusius, triangulare, vnica etiam plerumque longum, supernâ parte crassius & sine coronâ, alioqui Narbonensis Tulipæ capiti simile; quod in se continet *semen* pallidum, compressum, Tuliparum femini accedens, vel, vt ait Clusius, Tulipæ Narbonensis semen quasi referens membranaceo margine latiore, in quo nullum, contrâ quàm in Tulipa, germen conspiciunt.

Tempus

Ea ex qua curauimus parandam nostram iconem speciosior est & coloratior, paulò citiùs florens; altera, colore diluatore est, minùs speciosa, & nonnihil tardiùs florens.

Flos interdum variat. Floret autem cum præcocioribus Tulipis, interdum etiam Martio in hortis: præcocior videlicet, nâ genus etiam inuenitur magis serotinum, & cum Tulipis serotinis flores explicans, eosque vel saturatiores maculas habentes, vel diluiores, quemadmodum genus magis præcox, magna autem ex parte, saturatior.

Clusius Icones duas proponit: vni, titulus in Pann. p. 173. Fritillaria saturatior: p. 170. alteri, Fritillaria diluitor. In histor. verò Fritillaria & p. 153. Fritillaria diluitor. Is ait ad se primùm missam hanc plantam à Pharmacopæo Aurdienfî Noële *Capperon* vocato, qui nomen indiderat: quòd eius areolæ vesiciformes Fritilliarum quodammodo æmulentur: vulgò Lilium variegatum antè appellata fuit: Melegridem alii appellare malunt, quoniam eius foliola variis coloribus picta sunt, vti plumæ Melegridis avis, quâ vulgus Gallinam sive Perdicem Barbaricam aut Gumez vocare solet, diuersis ramen.

Ceterùm, qui latè Narcissi nomen extendunt [in-

quit Dodon.] non modò Tulipam, sed & Melegridem ed referunt, quæ tamen à Narcissi differens est, Tulipæ similior, subinde florem germinans, quam nonnulli Fritillariam vocant.

Lobel. Obs. & plant. icon. p. 136. Fritillaria sive Lilio-Narcissus purpureus variegatus, Melegris flos Dodonæi Teut. 170. Item Aduerf. par. 2. Lilio-narcissus purpureo-violaceus tessellatus niger, saturatè, diluatè aut obsolete purpure, præcocissimus, præcox, & serotinus; sive Fritillaria à fritilli similitudine, è Lilio-Narcissi genere, præteritis Aurelianis oriunda iam diu omnium primò in Belgium delata fuit; deinde ex Xantonis, Pictauiensibus & aliis Galliarum pratis, in Britanniam, aliisque Boreales plagas ab amicis missa &c. Præcox florem Februario sæpè laxat, obsoleterioris purpure, nonnunquam diluitoris. Media mensè Martio cum præcocissimis Tulipis floret, cui flos colore hilarior paulò, pronus propendulè Campanulæ instar, Tulipæ minor, naturæ admirando opificio variegatus, quodam quasi emblemate, subalbi, purpureo-violaceo saturioris, variorumque colorum, pictus, tessellatus, segmentatulusque. Serotina Xantonica flos pulcherrimus est & saturiore nitidiorque purpureo-violaceo nigro colore gratissimus. Hæc nobis Antuerpiæ iam multis annis elapsis in deliciis fuit. Omnibus semen Tulipæ minus, clauditur oblongo triquetro vrinque superne compresso membranaceo pericarpio.

Spontè quibusdam pratis ad Ligerim flumen non procul Aureliâ, vrbe Gallie celebri, nascitur, vnde primùm ad me (ait Clusius) missa fuit Machiniam, & Belgicæ communicata anno 1572. [nasci etiam in Northmanniâ & Britannia minore intelligo.] Deinde Viennæ Austriae, aliquot bulbos accepi triennio post, munere Ill. V. Ioh. de Vuicop. Misit etiam aliquot post annos Ill. V. Augustus de Bousbeque. Anno verò 1579, in quibusdam pratis quadriduano itinere infra Budam Pannoniæ, ab iis qui Constantinopoli redibant, mensè Martio florens obseruata est.

Sed & postea pleræque femine mihi nate sunt, quæ septimo & octavo demum anno, vel etiam seridè floruerunt: quarum alie binos, quadam ternos, nonnullæ vel geminos, vel duodecim foliis constantes flores tulerunt. Melegris nobis per aliquot annos floret mensè Martio & Aprilii in orto Ill. Principis nostri, missi per Ill. Landgr. Philip. foelicis recordationis, eam nobis etiam misit ex Burgundia peritus Pharm. Toisanus Carolus: obseruauimus non primo anno nec secundo flores proferre, ac cum incipit vnicum, sequenti anno duos, postea etiam tertium; ea autem duplex tam coloratior, tum diluitoris coloris, fert flores Martii principio, & femine deciduo se multiplicat, verum primo Vere folium vnium tenue folium profert. Scmina vbi matura committenda sunt terræ.

FRITILLARIA NIGRA.

Fritillaria que nigra aut obscurior apud Lob. Adu. par. 2. vocatur, internè ex luteo virefcit cum reflexis oris, viridibus lineis striata; à medio ad centrum subfusca tessellata est, *flos* vnicalis longitudinis, vti aliorum congenerum. Tessulis à medio interno similibus prædita est, cuius flos hilarior purpurascens. Obsoleterioris coloris ex luteo

ex luteo magis viridi, parum subfusc. aintus minus tessilata, quemadmodum Fritillaria ex fusco & luteo subulrida, cuius flos longitudine sesquiuunciam aequat: omnibus per floris maturitatem, fena folia reflexa sunt.

MELEAGRIS SIVE FRITILLARIA
Pyrenæa flore minore.

Mittebat Venerius bulbos Fritillariæ cuiusdam (inquit Clus. hist. rar. in append. par. 2.) è Pyrenæis montibus erutos, è cuius floribus quos insequente anno proferebat, diuersam esse obseruabam ab his quas cap. n. lib. n. hist. Pl. exhibui.

Bulbum quidem habebat Fritillariæ illo c. descriptæ formâ similem, minorem tamen: ex quo prodibat pedalis cauliculus, gracilis, viridis, senis aut septenis foliis septus, ex viridi cineraceis, qualia ferè sunt in aliis Fritillariis, in cuius summo fastigio nascebatur flos, aliarum Fritilliarum flore minor, sex foliis constans, quæ extimas reflexas habebant, vt parui rittinnabuli formam exprimeret, quorum terna exteriora, internis erant angustiora, omnia obsoleti foris coloris, circa oras tamen (præsertim interiora) venis quibusdam flauescens distincta, internè verò ex viridi flauescens & splendentis, à medijs porò foliis ad ipsos vique vngues [qui similem colorem habebant] plurimis maculis saturatè purpurascens tessellatim dispositis notata: ex umbilico prodibant sex breuia stamina longis apicibus pallidis prædita, scilicet stilo è medio illorum procedente: odor eius grauis, quasi Phalli odorem referens, & proximè ad eum, qui in Spatula fetida percipitur accedens.

In earum porò Fritillariæ Plantarum quæ è Pyrenæis montibus eruuntur, floribus, non minor obseruatur diuersitas quàm in illis quæ vulgares in diuersis Gallia: Prouincijs reperuntur: nam licet omnium quos mihi loquitur Clus. Exor. in app. altera] quidem conspiceretur licuit forma quodammodo similis sit, sex videlicet foliis constans, eorumque terna interna folia magna ex parte tribus externis sint latiora & ampliora, quidam tamen flores illa repanda habent, hoc est, illorum extimas oras reflexas habent: nonnullorum verò oras vel non sunt reflexæ penitus, vel certè minimùm: rursus illi flores qui extimas foliorum oras reflexas habent: alii aliis saturatioris sunt coloris, quidam etiam ad eò saturi, vt nigri videantur, præsertim externè foliorum parte, quæ nec tessellis distincta apparet: at interna purpureis quibusdam maculis distincta, vel fre-

quentioribus vel minùs frequentioribus, aut magis saturis, aut dilutioribus, eaque splendet. Illi verò flores qui folia repanda non habent, vel quorum oras paululùm duntaxat sunt reflexæ, externâ partè vt plurimum virefcens coloris sunt, internâ autem ex viridi flauescens & splendentis, quali penè præditus est tenuior ille sericeus pannus vulgò *casera* vel *casar* nuncupatus, ex flauis & viridibus sericeis staminibus contextus: atque in illis tessellatum illa distinctio obscurius apparet: singulorum autem foliorum vngues interni nonnihil caui subuicide in maculâ impressâ habent: ex floris verò umbilico sex alba stamina prodeunt, quorum apices pallidi, inter quæ trifidus exilit stylus paulo supra stamina sese exerès. Florent paulò seriùs quàm vulgares serotinæ Fritillariæ, & semen ferunt in thecis sine capitibus triangulis, vulgaris Fritillariæ instar, planum, vulgaris semini protùs simile, in quo nullum etiam germen conspicitur. Interdum hæc planta binos flores in eodem caule profert, quemadmodum vulgaris. Audio huius generis plantas reperiri quæ proferant florem penè flauum, quas nondum videre mihi contigit. Lobel. Adu. par. Fritillaria Pyrenæa nigra foliis latioribus, quinis aut senis in caule pedali, altiorèque. Floruit Londini men'c Aprilis.

MELEAGRIS SIVE FRITILLARIA
Aquitanica reflexis oris.



NObilis Vir loh. Boissor genus habebat Fritillariæ magis serotinâ, quod toto bimèstri post primû flos ruisse ad me (ait Clus. Pân. & hist. post.) scribebat binis ornatum floribus, misus bulbos Autumnio: Maii subsequens initio florem aperuit sex foliis, vt in præcociore, constantem, quorum

extremæ oras nonnihil reflexæ erant, dorfi neruus paululùm extuberabat, atque virefcibat, interiora terna folia externis erant latiora, omnia autem externis ab imo folio ad extremas oras, obsoleta purpura radiis, sub quibus nonnihil flauis conspiceretur, distinguebantur, internis verò colore ex viridi flauescente prædita erant, veluti sericeus pannus viridis, cuius subtegmen flauum sit: sex stamina ex umbilico prodibant pallidis apicibus obsita, alia aliis longiora. Nul- lum semen tulit, proximo anno imminutus bulbos florem non dedit, tandem subsequens rigida hieims omninò corruptis.

Fritillaria hæc Aquitanica siue secunda species commodè Meleagris aut Fritillaria appellari nequit, quandoquidem colorum in eâ varietas simili modo non est distincta, vt in priorè: tamen & caule qui aliquantulùm tenerior, & fo-

Descriptio

liis, quæ in hac paullo angustiora magisque herbacei coloris videntur, & radice, atque etiam floris formâ nonnihil illam æmuletur.

Fritillaria Aquitania Clusii & Boissoti ferentina videtur Lobel. Adu. par. 2. quadrare cum varietatibus Fritillariae nigrae.

MELEAGRIS SIVE FRITILLARIA FLAUA.

Descriptio



Fritillariae quoddam genus habuit Ioan. Somer, quod florem produxit sex quidem foliis constantem & nutantem, ut cætera Clusii genera: sed quorum folia sunt flauis coloris rubris maculis distincti, illorum medio neruo prominulo & virefcentis coloris.

Fritillaria lutea Lobelii

Adu. par. 2. differt ab aliis floris colore luteo, rubris maculis segmentato. A Somero Medio-burgensi studiose colitur: Iconem Londini iam biennio elapso accepit, sed minus affabre delineatam, uti D. Clusius monuit.

Huius Fritillariae luteae bulbos Lutetia Londinum misit I. Robinus Botanicus Regius ex Pyrenæis montibus delatos, prouenit autem in Pyrenæorum Canislaure.

Fritillariam flauo flore (de qua Clus. rar. plant. scripsit) vidimus oblatam Ill. Princ. Sybillæ Anhaltinæ Ducissæ Wirt. florentem Aprilis, quæ erat ex horto Steckii, strias habentem internâ parte potissimum flauas.

Fritillaria alba ex phæo purpureo tessellata.

Fritillaria alba elegantissima ex phæo purpureo tessellata, collecta in Albania à Somero Constantinopoli in patriam redeunte: flos internè rubicundior est, vnguibis albis præditus, Lobel. Adu. par. 2.

Fritillaria floribus albis notulis aspersa.

Floribus albis notulis item fortuitis aspersis, apud Pictones Gallia Aquitanicæ reperiri, Lobel. Adu. par. 2. retulit Petrus Naudin Salamurii Pharmacopæus egyptius, Fritillariam, non procul ab arduis faxosis viis, *Passelourdin* vocatis, iuxta S. Benedicti vicum, miliari à Metropoli Pictauo distitis, vbi viperæ commendabiles ad Theriacem, exili collo & caudâ, captantur.

FRITILLARIA ALBA ALTERA.

Fritillaria alba altera, quam in Lusitaniæ monte oriundam iuxta urbem *Perre* vocatam anno

1604. florentem memini (inquit Lobel. Adu. par. 2.) in horto D. Matthiæ Craen Medico castrensi Mattiacorum aquâ mariæ actorum Scriba. Anno 1604. huius copiam emit Londini I. de Franceville à quodam Botanico Gallo, qui manipulum floribus præditum albis, nullis maculis distinctis aut cellulatis vendidit.

Fritillariae repertas esse plantas intelligit Clus.

Exot. append. 2. quæ album florem gestat, quæ præcocior sine generis an ferocini sint ignorat, quia nullam similem plantam hæcenus videre ipsi licuit, & rarissime inueniri intelligit: videlicet inter aliarum myriades interdum vnam ault alteram plantam. Mitebat eruditill. Venerius anno 1603, aliquot Fritillariae albo flore bulbos amicis. Hoggelandus altero post anno binas habuit plantas quæ flores tulerunt, notis quibusdâ discretas: vnius enim flos totus albus fuit, alterius foris etiâ albus, internâ autem parte venis quibusdam purpurascens distinctus: Porrettus vnicam habuit, cuius flos totus albus fuit.

An apud Recentiores medicum in vsum veniat Fritillaria Clusium fugit. Ob solum tamen elegantiam & venustatem expeti & diligenter in hortis coli potius existinat.

TIGRIDIS FLOS: DRACUNCULI species putata.

CAP. XII.



Pari quere- la cum Doda. Lobelio, & C. Bauhino, Plantæ huius peregrinæ historiam aggredimur. Siquidem nec nobis hæcenus visa. Eius tamen Eiconem apud Cl. Alexandrū, viuis depictam coloribus videre contigit Genero H. Chetlero. Qualem Lobel. affabre expressam à I. de Bracion coloribus ait: vireu

Lilium Vereribus.

Lilia quæ coloris differentia inter se distant, auctore Theophrasto. vnicum ferè caulem habent, duplicem rarò: quam differentiam caelum & solun efficiunt. Ex singulis caulibus aliquando vnũ, aliquando plura Lilia emergunt: pars enim superma germinat. Sed hæc rariora. Radice est copiosa, carnosã, rotunda. Fructus deorsus germinat, & Liliun emittit, sed minus. Reddit & lachrymarum confluxum quendam, quem etiam ferunt. Gaza, nescio qua ratione motus, vertit, fecit & lachryma cæcum quoddam confluuium quod etiam ferunt.

Cæterum quod dixit Plinius rubens Liliun Crinon vocari à Græcis, docti quidam legendum censent, ἐρινον κρίνον, vel composita voce ἐρινον κρίνον: nam etiam album Liliun Crinon vocant, Quod autem Liliũ florẽ Cynorrhodon vocari apud eundem legitur, alii ex Hefychio lectionẽ hanc retinendam, alii falsũ suspectam, & Crinorrhodon legendam censent. Cynorrhodi etiam appellatio nihil cum Lilio commune habet, verũ id Rosam syluestrem multis aliis locis Plinius vocat. Crinorrhodon verbõ propriè Liliũ rosam & florẽ significat, quem Hippocrates νεωδίννον appellat.

Crinorrhodon.

Lilium Plinio. Descriptio

Lilium rubrum. Cynorrhodon. Lilium purpureum. Narcissus.

Diagnos.

Liliun etiam in omnibus vbiq; ferè notum sit, inquit Cornar. tamen affabre admodum à Plinio lib. 21. cap. 5. depingitur. Liliun rose nobilitate proximam est, & quadam cognatione vnguenti, oleique, quod Lirion appellatur. Et impositum etiam maxime rosas decet, medio proventu earum incipiens. Nec vllis florum excellentias maior, interdum cubitorum trium, languide semper collo, & non sufficiente capitis oneri. Candor eius eximius, foliis foris striatis, & ab angustis in latitudinem paulatim sese laxantibus, effigie calathi, resupinis per ambitum labris, tenuique folio & semine, stantibus in medio erocis. Ita odor, colorque duplex, vt alius calycis, alius staminis, differentia angusta. Et paulò post de rubente Lilio, itẽmque de purpureo subdit. Est & rubens Liliun, quod Græci Crinon vocant. Alii florem eius Cynorrhodon. Laudatissimum in Antiochia & Laodicea Syriæ, mox in Phæsolide. Quartum locum obtinet in Italia nascens. Sunt & purpurea Lilia, aliquando gemino caule, carnosiore tantum radice, maiorisque bulbi, sed vnius, Narcissum vocant. Huius alterum genus flore candido, calyce purpureo. Differentia à Liliis est & hæc, quod Narcissus folia in radice sunt, probatissimis in Lyciæ montibus. Tertio generi cætera eadem, calyx herbaceus. Quæ de tingendi ratione subdit, inferius recitabitur. Et hæc partim de 6. lib. Hist. stirp. Theophrast. translata sunt.

Lilia, inquit Dioscorides, coronamentis se dedunt, Liria à quibusdam vocata, tradunt & purpurea inueniri. Sic Liliũ descriptionem perstringens l. 4. c. 19.

Theophrast. Lilia etiam vocauit Narcissos: ac tradit etiam I. D. uisus esse, Susanna & Sosanna dici.

Horatius breue vocat, quia non diu durat. Vnde D. Basilus in explicatione Psalmi 44. Nul- lum florem hoc melius exprimere fragilem humanæ naturæ conditionem refert. Idque etiam Theocritus.

Λευκὸν τὸ κρινὸν ἔστι, μαλακότερον οὖν καὶ πύκτον.

Candidum est Liliun, rarisissimè verd sum decidit.

virentibus oblongis angustis & acuminatis foliis è pullo radice bulbo: flore luteo, exiguis quamplurimis notulis fortuitis puniçatibus variato: è cuius medio saue rubens stylus exeritur: Omnibus herbariis studiosis ipsam plantam hæctenus incognitam: Eiusque bulbum edulem credi perhibet.

Lob. Obs. & Ic. Pl. p. 111. Trigidis flos an Dracunculi species: Tigris autem, cuius florem Dod. videre nondum concessum est, quò referenda sit cognoscere, nec dum potuit, videtur tamen ex bulborum genere: aut, quod verisimilius, inter Ari genera reponenda, & Dracunculi aliqua species esse, nisi pictura imponat. Hist. Lugd. & Gerardo Trigidis flos.

Gener Cherlerus eius partẽ aliquam, illam potiss. quæ floris nondum parũ speciem ferebat apud Robinum Herbarium Regium Lutetiæ vidit: saltem ex similitudine eius quidam moti ita censuerunt. Verũ ipsammet viridem plantã non vidit. Videant curiosi Rhizotomi an alicũ de ad nos inuehi possit. Scimus enim à Magnaribus plurimis admodum desiderari.

LILIVM ALBVM VVLGARE.

CAP. XIII.

FLorum delicia Liliun, ex radice bulbosa nucleis multis constante, caulem surgit rectum cubitale

lem & sesquicubitale, vel etiam altiorẽ, singularem, ter etem: cui ab imo ad summum adnata folia, nullo pediculis, flores in scapo serie quadam plures non eodem tempore panduntur, odoris suauitate eximia, colore lacteo, senis pinguis repandis foliis calathum imitati: in quorũ medio stilum longiusculum ex albo viridantem trifidulum circumstant stamina, foliis numero & colore paria, quibus apices insident crocei. Lilio adscribit Casalp. femina rotunda, ossa ex toto, nullã conspicuã medullã, sedentia in angulis &c.



Hebræis *Scofham*: Arabibus *Sufen & Alcoflam*,
 Egyptiis *Symphaphon*, aliis *Tralon*? Syris *Sufa*. A-
 phris *Abiblabon & Abiblabon*. *Keim, y, & yezos*, Gre-
 cis: [Crizon basilicon, Crinanthemon, Gal-
 lition, Grallition alii, inter spuria Dioscoridis] Lat.
 Liliū, siue Iunonia, aut Iunonis rosa, Liliū
 candidum Officin. & vt Adu. tradunt, Liliū Sa-
 lomonis. Germ. weisflgtgen/lilien oder Gilgen.
 Belg. wite lolie. Gall. *Lis, & lis blanc*. Hisp. *Asuce-
 na & Lico blanco*. Lob & Pena aiunt *Lario blanco*.
 Angl. wicitly. Bohem. liliū. Hungar. Fever li-
 lien.

Obscurus est Theophr. l. 2. hist. pl. c. 2. locus de
 Liliū & Hippofelini generatione, quem cum nec
 Theodorus, nec Bodinus [qui malè *Aquapium*
 pro Equapio legit,] satisfaciunt: sic intelligen-
 dum censemus: Propriissimam scilicet genera-
 tionem esse Liliū & Hippofelini, quum lachryma
 siue succus fecatus fuerit: id quod obseruatur in
 Capis, Allis, Croco, Tulipa, Corona Imperiali,
 & aliis, quæ è terra eximuntur & siccantur, per
 aliquor menses vt felicitius sequenti anno pro-
 ueniant & floreat, idque non sine ratione ma-
 nifesta: Illud tamen peruestigandum an ex cau-
 libus concisis nascatur Liliū: quedam sanè Li-
 lii genera & Moly ex caulibus producunt
 bulbos in caulibus, quibus se propagant, licet
 ex radicibus etiam, sicuti Lilia alba producunt
 bulbos.

Ceterū, Lilia adè omnibus notissima sunt, vt
 planè superuacaneum esse cum Marthiolo pa-
 rem, exemplo Diosc. adductus, vel ex nobis eor-
 um faciem representare, vel alterius historiam
 referre: sed tamen quoniam iis quandoque mos
 gerendus est, qui semper hortis nouis ac variis
 floribus refertis delectantur: idcirco silentio præ-
 terire non potui, quin hic infererem, quæ ratio-
 ne, quodæ manganio alba Lilia [si tanta fides
 præcis rei herbaria auctoribus adhiberi potest]
 purpurea fieri possint. Quod cum Plinius docue-
 rit lib. 21. cap. 5. vbi de Liliis latius differit, idè
 eius verba subiiciemus. Inuenta igitur est, inquit
 Plin. & in his ratio inferendi, monstrificis
 hominum ingeniis. Colliguntur namque mense
 Iulio scapi arecentes, Liliaque suspenduntur
 in fumo. Dein mundantibus se nodulis,
 in face nigri vini, vel Græci, mense Martio ma-
 cerantur, vt colorem accipiant, atque ita in
 ferobiculis feruntur, heminis facis circumfusus.
 Sic fiunt purpurea Lilia, mirūque ita ligni ali-
 quid, vt nascatur insectum. *Hæc Plinius.*

Lilia (vt Anatolius testatum reliquit) totum
 annum viridia durabunt, si cum ocellata silent,
 nec dum patentia dehiscunt, decerpta, nouis fi-
 cilibus non picatis [lagunculis picatis ne quid
 æris subire possit, An. Mizald.] indito diligenter
 operculo recondantur: sic enim clausa perpe-
 tuum annum vegeta manebunt. Sed vt inter-
 medio tempore ad vsum promuntur, statim ad
 Solem [vel tepida aquæ vaporem, An. Miz.] pro-
 ducta, cum senserint eius calorem, aperta pan-
 duntur. Potrò vt vicissim, & variis temponibus
 flores pariant Lilia, bulbis ita feruntur, vt aliqui
 duodecim digitorum altitudine obruantur, alii
 octo tantum, alii quatuor duntaxat profunditate
 mergantur, sic diuersis diebus dabunt Lilia: quod
 & in aliis floribus fieri pollicetur. Rubet cū Lilia
 si eorum bulbis diligenter apertis puluis aliquis
 rubri coloris, modò non sit erodens, iniiciatur,

& pingui solo committantur. Si verò etiam alio
 colore quis ipsa oblinat, cuiuscumque coloris vo-
 luert Lilia gignentur. Cæner. & Florentinus rei
 rusticæ Scripor.

In Liliū florente caule refecto etiam bulbo fe-
 mina prouenire obseruatum: quod etiam obser-
 uauit in Iride bulbosa. Liliū plantetur (inquit
 Crescent.) mense Octobri, Septembri, Nouem-
 bri in terra pingui & benè subacta: ac accipiuntur
 bulbis eius virides, vel sicci, ponunturque per
 vnam spanniam, vel unum pedem, quod est me-
 dius, separati: sicut fit de aliis.

Liliū vires tradidit Dioscor. lib. 3. c. 99. sic in-
 quiens: Ex liliū regis flore paratur vnguentum,
 quod neruos, priuatimque vuluæ duritias emol-
 lit: seruetur quoque, adultis proficiunt: aceto
 verò condita, vulneribus profunt. Ex eorundem
 succo in aræo vase decocto, adiectis aceto &
 melle, liquidum fit medicamentum, veteribus vl-
 ceribus recentibusque vulneribusque vtile. Inaf-
 sata radix & ex rosaceo trita, igni ambusta sanat
 vuluam emollit, menstrua ciet, vulceraque ci-
 catrice obducit. Cum melle autem detrita, præ-
 tiosissimus neruis luxatisque medetur: alphonse, le-
 pras & fardures emendat. Quin & vlcera in ca-
 pite manantia extergit, faciemque purgat simul
 & erugat. Eadem trita cum aceto aut hyoscyami
 foliis & farina tritici, testium inflammationes
 demulcet. Semen verò potum, serpentium mor-
 sibus aduersatur, cryspelatits autem semen & fo-
 lia trita ex vino imponuntur. Cæterū in Syria,
 & Palsidia Pampiliæ Lilia vnguento conficien-
 do efficacissima nascuntur.

His præterea facultatibus pollere Liliū, Ga-
 leni quoque comprobatur testimonio, qui libro
 7. simpl. medic. facult. dicat: ita de eo scribit: Li-
 lili flos, inquit, temperaturam mistam obtinet,
 partim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex
 qua virque habet. vt gustu sit amaro, partim ex
 aquæ, eaque temperata. Itaque etiam quod ex ea
 conficitur oleum, citra morsum digerendi, simul-
 que emolliendi facultatem habet: vnde fit vteri
 duritici apertissimum. Potrò radix foliaque per
 se trita delectant & abstergunt moderatè, proinde
 ambustis quoque competunt. Radicem ergo
 tostam, deinde cum rosaceo contritam, ambustis,
 quoad obducatur cicatrix, imponunt: quippe
 cum aliqui & aliorum vlcerum omnium bonum
 sit inducendæ cicatrici remedium. Quinetiam
 neruos emollit, menselque prouocat. Folia verò
 præcoquentes, & ipsa ad obducendam vlcere
 cicatricem, imponunt, non in ambustionibus dunta-
 xat, sed aliis quoque vulneribus. Sunt & qui aceto
 ea condientes ad vulnera suo tempore vtuntur.
 Plus tamen inest abstergentis facultatis in
 radice quam in foliis, quantum tamen nec in
 ea ipsa multum inest: nam in primi ordinis ab-
 stergentium est medicamentum. Itaque cum
 aut vitilignes, aut pforam, aut lepram
 aut aliquid id genus extergere volumus, com-
 misceamus ei aliquid aliorum medicamento-
 rum validius extergentium, cuiusmodi est mel.
 Cæterum si id moderatè illi ac conuenienter ad-
 miscatur, & ad neruorum diuisionis competit,
 & ad alia vniuersa, que valenter exsiccari possu-
 unt absque morfu. Imposimus verò etiam
 quandoque & foliorum succum cum aceto &
 inelle coctum. Quinque partibus succi plus vitro
 que erat, atque insignè medicamen ad omnia ea
 que

que exsiccati postulant absque morfu: seu vulnera omnia ingentia, & maxima quæ in capitibus musculorum cuciniunt, tum ea quæ nupis molliantur & diuturna, atque agrè ad cicatricem perducuntur.

Porro medicum vsum Liliæ exponit Plin. l. 21. c. 19. vbi inter cetera habetur. Sucus qui flore expressus est, ab aliis mel vocatur, ab aliis Syriū, ad emolliendas vulvas, sudoresque faciendos & suppurationes concoquendas. Falsò autem legi, mel vocatur: & legendum esse, Phaselinum vocatur: ex eodem Plinio patet, qui hunc locum citat l. 23. c. 5. Lirinon, inquit, quod & Phaselinum & Syriam vocauimus, rebus vilissimum est, sudoribusque euocandis, vulvæ molliendæ, concoquendisque intus. Sed & laudat. in Laodicea Syria, & mox in Phaselide Liliū esse, ipse Plin. lib. 21. c. 5. dixit, velut locus suprâ adductus testatur.

Ex Simeone Sethi odoratum frigido capiti prodest. Oleum verò quod ex ipso paratur, vinū habet discutiendi & emolliendi. Huius autem radice quidam vtuntur ad vulnerum sanationem.

Tradit Matthiol. elixam Liliæ radicem, veteri axungia exceptam & illitam, pedum clauos tollere, sed ante triduum remoueri non debere. Eandem ex adipe & oleo adhibitam fluxus pilos replicare: cum mulsò autem potam, sanguinem extra vasi concretum per alium eicere, suppurationes moliri & concoquere, & duritias quasæunque emolliere. Stillatitiam floram aquâ dari vtiliter potandam agrè parturientibus, & ad pellendas secundas addito croco & castia. Oleū quod ex floribus paratur, valere ad omnes frigidos nernorum morbos, nempe ad conuulsiones, & resolutiones: præstat item ad emollienda articulorum impedimeta, & scirrhosos quoscunque tumores. Illinitur quoque puerperis vteri dolore languentibus, addito oleo è Lini semine, præsertim cum fuceida lana iis calidis imbuta ventri superponitur. Additur elymatibus cum induratas fæces molliere fuerit opus. Lilia, quæ diu in oleo macerata fuerunt, illita, prius calefacta, apostemata calida circa dolorem maturant ac digerunt, præsertim ea quæ sunt in articulis.

huius aqua stillatitia ex floribus parata in partu facilitando & secundis expellendis (inquit Camer. hort.) efficacissima, vnde non temerè in aliis affectibus danda. Folia incocta vino austero & vulncri diuturno imposita secundū Galeni doct. in lib. 7. de simpl. Med. facult. multam iuuare, in eundem authorem annotauit Excell. Iulius Alexandrinus Cæsarius Archiater. Si serpentium ictibus auxiliare quispiam aggrediat, M. aranthæ consilio Liliæ folia illinat: ad vetera vlcera, eius succum ad ambusta, eius radicem: nam si indifferenter omnibus eius partibus ad omnes hosce affectus vtatur, scopum non assequetur.

Liliū (inquit Porta) qui radices squamosas habet lichenes, lepras & furfures in facie emendat, & vitiliginis emaculat.

Lonicæ aliorum vestigiis insistentis, Liliorū vires ita profequitur: Flores mixtæ sunt nature, radix & folia dissipant, exsiccant, atque mundificant, plurimum tamen bulbus. Oleum infimo ventri inunctum, matricem refrigeratam vehementer calefacit, eiusque humiditates induratas emollit. Radix decocta, tumoribus duris applicata, eos maturat. Tosta verò confusa, cum a-

Tom. II.

qua rosacea commixta, ac reiteratis abs interuallo vicibus admota ignem sacrum extinguit. Simili modo vulneribus imposita sarcotica habetur. Eadem prægnantis ventri superposita partum promouet. Radix Liliæ albi domestici decocta, tusa, ac Oleo communi mixta, adhibita tumores emollit. Sed hæc super hanc rem dicta sufficiant.

LILIVM ALBVM SYRIACVM
Rauuvsolfii.

Liliū quoddam genus in Maiori Batazæ peregrinum mihi obseruatum (inquit Rauuvsolf. in mercatorū poti sumum officinis, quod in paludibus, stagnis, vdisq; prouenire mihi narratum fuit. *Caulem erigit oblongum, colore & crassitie nostratium persimilem, latiore tamen multo,*

Descriptio



supernâ potissimum parte, quâ trium digitorum latitudine excedit, ita vt spathe sensim in acutè desinenti conferri possit. *Folia hunc vtrinque stipant plucula, tenella, satis longa, angusta tamen, decidua. Summa Lilia aliquot occupat nostratibus similia.*

Clusius sic describit: *Clusii de scriptis,*

Caules tamen vulgari Lilio non sunt breuiores, si quis diligenter contulerit graciliores esse deprehendatur, rarioribusque & minoribus foliis septi, atque etiam ipsius flores aliquatò minores, æquè tamen ac vulgares odorati. Nonnullæ verò radices in tantam molem excreuerunt vt vix vtraque



manu comprehendi possent: vnâ etiam illarum plures quàm sexagenos flores protulit: caulis autem planus fuit, & tres ferè vncias latustanno verò subsequente ad ingenium rediit. Sic interdum natura in plantis ludere solet.

Liliacea radix missa Coudenbergio: quæ illi flores huic omninò similes tulit: quam quoniam

Mm in

*Lilium fa-
rarium.
Sultan
Zambach.*

*Martagon
Constant.*

*Martagon
candidum
Chalcid.*

Locus.

plerumpue in extremo caule confertim nascebatur, & interdum vitium faciebatur, ipse Lilium fararium cognominare solebat.

Constantinopoli radices misse nomine *Sultan Zambach*, quibusdam amicis in Belgiam pro Martagone Constantinopolitano: Hinc apud Belgas modò *Sultan Zambach* appellatur, modò Martagon Constantinopolitanum flore albo, cum tamen, teste Clusio, vicia eademque sit plàta, non duæ diuersæ. *Sultan Zambach*, propter amœnitatem & floris decus, vel fortè quod magno Sulcano dicatur, Liliū hoc genus appellatum videtur.

Lobelio Obs. Radix illi Liliū cruenti, sed notulis, labeulisque purpurantibus variata, nuper Constantinopoli misa. Martagon candidum Chalcidonicum, Indidem delatum visendæ venulatis, vt si quid aliud, istud Lilium asseritur: folia Liliū albi nostratis candidiora, & radix itè cognata. Leon. Pl. p. 163. Martagon album, Lilium candidum Byzantinum Teut. 202.

Rauvvolf. itin. Liliū albi genus visum in magna Bazar de quo Theophr. lib. 4. c. 9.

Hist. Lugd. in append. p. 30. Lilium album Syriacum, quidam esse volunt Lilium à Theophr. memoratum lib. 4. c. 9. Cæterum de Stratiote aquatico Theophr. verba intelligenda sunt, citius meminere Athenæus lib. 14. & Plinius capit. 15. libr. 24.

Camer. hort. Liliū albi species Constantinopoli allata. Apud Match. Germ. *Sultan Zambach*. C. Baul. Phyt. Lilium 2. siue album peregrinum, Clusii *Sultan Zambach*. Lob. Martagon album. Lilium 3. siue album peregrinum alterum Rauvvolfii. Lilium pulchrum.

Lilium Byzantinum album ostendit Nobiliss. Frid. Meier Argentinæ mense Maio, quod nondum florbat.

HEMEROCALLIS VETERIBVS.

Hemerocallis (vt Diosc. describit) *folia & caulē* Lilio similia habet, viridia velut Portium: *flores* in ipso caule sunt per singulas propaggines tres aut quatuor, fissurâ, Lilio similes, quin hiare cœperint, colore vehementer pallido: radicem v. magnam & bulbosam. Hæc trita pota, & cum melle in lana apposita, pessum præbet, qui aquam & sanguinem ducit, Folia trita impolita, mammarum ex partu, & oculorum inflammationes mitigant. Sed & radix & folia ambustis commodè imponuntur.

Hemerocallis inter ea quæ folio tantum coronant Plin. numerat. Alio in loco, Hemerocallis, inquit, pallidum è viridi & molle folium habet, radicem odoratam & bulbosam. Quæ de Hemerocallide Diosc. accipienda esse, perspicuum est.

Ex illis verò quæ Theophr. lib. 6. c. 1. de Hemero-callide prodidit, colligere licet, eam à Diosc. bulbosâ dissidere: Recentens enim suffrutices coronarios, hanc inter illos, lignosa esse radice, & minutis constare foliis assernat.

Quando verò Plin. Hemeroalles folio tantum coronari tradit, sibi minus constat: Theophr. enim (vt Dalech. annotat) simpliciter has esse coronarias scribit: ac eius descriptione alibi traditâ truncatam & deprauatam esse patet confertenti cum Diosc.

Athenæus ex Theophr. Hemeroalles inter co-

ronarios flores numerauit, dicens lib. 5. Dipnos. ex Cratino:

Pascitur mihi caput ex charo u. emeroalle.
Floris Hemeroallis qui noctu flaccescit ad exortum Solis mox reuiuiscens, Cratinus in Ephemernis sic meminit:

Anemonarum vernis calicibus, Serpillo, Croco, hyacinto, Elychrysi ramis, Oenante, caroque mihi Hemeroalle.

Notatu sanè digna quæ Dodon. de Hemero-callide literis consignauit: Hemeroallidum, inquit, vna frutex, alia flos est. Hemerocallis frutex ex genere est coronariorum & lignosorum de quo Theophr. l. 6. Plin. l. 21. c. 21. Alia Hemeroallis flos est, cuius descriptio apud Diosc. est suspecta: quod enim radicem addit *quoniam 355. 65. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000.* inuinit deprauatam: vel enim superfluis videlicet ampliatam: vel duorum Liliorum mutilas descriptiones, in vnam contractas, Hemerocallis videlicet & alicuius alterius Liliū. Nisi fortassis & bulbosum aliquod sit Lilium apophifes faciens, & vnius tantum diei florem luteum habens: quale tamen nondum constat alicubi reperitum esse.

Cæterum Hemeroallis Theophr. & Plinii frutex coronarius vulgò creditur.

Dod. & alii quidam Hemeroallidem Diosc. & Athenæi censent esse Lilium Aphodeli radice, & foliis, flore luteo.

Pancretium Monspessulanum, quod quibusdam Scylla maior alba, nostro iudicio non benè dicitur Hemeroallis Theophrasti ac etiam Diosc.

Corona Imperialis Clusio dicitur Hemero-callis, est autem nobis occasio cur dubitemus, vt postea dicitur.

Habetur & Lilium Persicum hemeroallis, siue Sufianum Pennachio, Persiano folio purpureo.

Dicitur quoque de Lilio rubro vel croceo minore, vide Lilium rubrum.

Hemeroallis Cornario Lilium flore nutante ferrugineo. Item Lonic. Gesnero Hemeroallis purp. C. Bauhino an Hemeroallis?

Est tandem Hemeroallis altera Matth. nobis Lilium flore miniatu.

LILIVM RVBENS VEL CROCCEUM MAIUS



Par est magnitudine. Lilio albo, nisi quoddam folia in condita, minus sunt lata, at firmiora, neruosa, atrouirore splendentia, longiora quam in bulbifero, canis maculatus, bicubitalis, summitas in pediculos aliquot facescens, singulis singulos flores in harentes sustinet, Liliaceis magnitudine, for-

formâ, foliorumque numero similes, verum colore rutilo coruscantes, saturatioribus inrus stigmatibus punctati. *Radix* subest bulbosa è squamis compactis, alba, ex qua ramuli repentes nouos generant bulbos.

Hemerocallin Matthiol. vulgus Lilium silu. nominat, cuius flores colore perquam pallido, vt Dioscor. ait, adè vt fulgentis auri modo rutilent. In hist. Germ. Nor. Goldbilgen. Hemerocallis. Boh. Lilium 3late.

Figura à Camer. pro hoc Lilio posita non placet. Facile crediderim Lonicerum sub his verbis (Lilium croceum, Gelb lilgen / quod excreuit interdum ad duos cubitos, læditurque à nimio Sole) scribere de Lilio rubente maiori, quamuis figurâ id minus exprimat.

Dodon. Gall. Liliū alterum rubrum ab Herbariis Martagon dictum. Item hist. fl. & in fol. Liliū purpureum maius, quod Matthiol. Liliū syluestre in Italia appellari, & Hemerocallida esse, ait: quod tamen verisimile est Hemerocallida non esse.

Hist. Lugd. p. 1493. Lilium purpureum maius Dodon. de id. Erpag. 1498. Hemerocallis prior Matthiol.

Anguill. de hoc Lilio ait esse Martagonis speciem radicibus, floris magnitudinis Liliū, & epistola 13. ait: Non inuenitur planta quæ melius correspondeat Hemerocallidi Dioscoridis, quàm Cinorrhodon Plinii, id est, Martagon Liliaceum, Liliū rubens vel croceum alterum, Hemerocallis Matthiolo, quod Italicum cognominat.

Lobel. & Pena Adu. Lilium purpureum siue Chymitarum Martagon. Gall. *Lis or ange*. Colores Lilio candido quæsitos mangonio fuisse, et fieri rusticæ Scriptoris Plinius asseuerer, tamè purpurei Liliū duo genera spontè non arte oriri cum Dioscor. plurimi mones hodiè testantur. Senètis vocis huius ignarus, Phœnicum Liliū, valdè alioqui notum, dicit esse, colore perquam pallido Diosc. falsè teste adducto.

Tabern. icon. & hist. Nor. *heydnisch Lilien*. Martagon rubrum. Figura Tabern. placeret pro Hemerocallide Matthioli, quamuis aliter sentiat, qui ei patrocinari statuit.

C. Bauhin. Phyt. Liliū 4. siue croceum maius, rubens Plinii: Liliū rufum Trago. Aliquando flore pleno reperitur, vidimus & candido. Item apud Matthiol. Liliū croceum maius, rubens. Plinii fortè Hemerocallis Dioscor. Brunf. Fuchf. Gesner. Liliū rubens Dodonæo. Liliū rufum, Liliū purpureum maius Lugd. Camer. Fuchfio & Lonicero. Liliū croceum. Tab. Liliū croceum maius. Gesnero Martagon. Liliū purpureum maius Cæsalpino: Liliū sylu. aureo flore. *Tragi Liliū rufum mihi* ad minus referendum videtur non ad maius, Idem etiam de Lilio rubente Fuchfii & Gesneri: Tabern. Liliū croceum maius mihi videntur potius ad minus accedere, nec velim eius figuram ponere pro Hemerocallide r. Matthioli. Camer. apud Matthiol. non figuram ponit pro Hemerocallide. r. quæ nō placet, & quæ fortè Liliū rubri minoris. Liliū purpureum maius Lugd. huc non referendum existimo, vt ante dictum, maius pro minus scriptum. Martagon Gesner. de hortis f. 204. huc non pertinet. Cæsalpini descriptio conuenit minori Lilio rubenti.

Nusquam non prohenit [teste Matthiol. in Italia, quandoquidem circa messem in aruis inter segetes, in pratis, in montibus, & in vallibus aureo colore emicat. Ego Liliū croceum maius

Tom. II.

siue rubens vidi Basileæ in horto Di. Doct. Felici Plateri: Montbelgardi habeo in horto Ill. E. C. Wirtemb. delatum ex Marbach ducatus Wirtembergici, vbi florbar Iunio.

Et licet secundum Dodon. purpureorum Lili-
orum in Medicina incognitus sit vsus, & facultas incomperta. Scit tamen Lobel. bulbos Liliū puniceæ eadem posse quæ Diosc. vult de Hemerocallide.

Tempus?

LILIVM RVBENS VEL CRÖ-
ceum minus.

Scammatum bulbos *caulem* promit angulosum striatum, altitudine sesquicubitali, cui remerè folia numerosa adnascuntur atro virore splendens, perquam angusta, secundum longitudinem neruosa: *caulis* fastigium in aliquot pediculis firmos, punctis rubris variegatos, modicè hirsutos diuiditur: quorum vnicique *stos* infidet Liliaceus, colore ex rubro flauescente seu croceo, folia intus sulcata & punctis saturatioribus notata habens, odore suauis, *staminibus* & *pistillo* flori concoloribus.

Descriptio

Lilium rufum, Germ. Nor. *goldgilgen*, Plin. & Diosc. plantantur Lilia rubra arte fieri posse, quod an verum sit necne, si affirmare poterit, qui hoc experti fuerint. Neque satis constat Trago, an hoc Liliū genus Plinius Rufum dixit.



Hieronymus Brunschweig Narcissum vocauit, nec temerè quidè, cum & Theophr. ipse lib. 6. cap. 6. Lilia Nar-

cissi voce appellari: Crediderim equidem radicem huius quoque Liliū, sicut & albi, maturandis & emolliendis quibuscunque abcessibus prodesse.

Pingit Brunfel. Germ. Liliū hoc croceum minus, sub genere alio Liliū Goldwurz & Goldgilgen / aut Rotgilgen.

Apollin. *Gelb lilien* / cui tribuit eadem vires, quas Lilio albo.

Meminis Anguill. tertie speciei Martagonis radice alba: quam existimat Hyacinthum Homeri, Theocriti, & Pausaniæ, ac Ouidii: ait etiam Dioscor. & Theophrastum huius plantæ meminisse. Non errauerit (opinatur Gesner. horri.) qui Hemerocallidem alpinam appellauerit. Pingitur aut idem posita à Matthiolo pro Hemerocallide altera. In hortis hoc etiam diu viuut &c. Gesnero an hinc assentiendum dubitamus. Si enim Matthiolus hoc Liliū intelligit per Hemerocallidem, quod non existimamus, flores malè picti. Dodon. & Lobelius Hemerocallidem ab Lilio rubro minore separant.

Gesneri

H. Lugd.
Hyacinthus
Ovidius.

Clivus vocat Liliū rubrum minus non bulbi-
ferum. Hist. Lugd. p. 143. Liliū purpureum
maius [scribendum, ut iam diximus, erat minus]
Dodon. Item p. 149. Alterum purpureum Liliū
minus.

Dodon. Gall. Liliū secunda species *Hyacinthus*.
Liliū rubrum, Liliū tutum. Ovidio Hy-
acinthus. Belg. roode lilien. Hist. Lat. fl. & in fol. O-
uid. Huius generis Liliū Hyacinthum appellat
ab Hyacintho adolescente:

*Flos oritur, formamque capit, quam Liliū, si non
Purpureus color his, argenteus esset in illis.
Non furis hoc Phœbo est, [is enim fuit auctor
honoris]*

*Ipsē suos genitū solis inscribit, & aīai.
Flos habet inscriptum, junctaque litera du-
ta est.*

Huius Hyacinthi meminit etiam Theocritus in
Epitaph. Bionis Eidylio 9.

*Νῆϋ ὀκνῶνδῃ λαδῆι πᾶσι γῆράματα ἔϋ πλεον αἰεῖ,
Αδύβαντι τοῖς πᾶσι οἶα.*

Vt & Virgilius in Bucol. Ælog. 3.

---Phæbo sua semper apud me

Munera sunt Lauri, & suaue rubens Hyacinthus.

Dicitur rubens Hyacinthus, qui ab Ouidio pur-
pureus appellatur. Color siquidem florum ru-
bens, subinde nominatur purpureus. Existima-
tur & ille Hyacinthus ferrugineus cognominari,
quod ferruginis instar rubeat. Sed non omnibus
hæc sententia probatur, quibus ferrugineus non
alius videtur, quàm ad cæruleum accedens &c.
Hyacinthum purpureum siue rubentem Recen-
tiorum plerique Hyacinthum Poëticum appel-
lant, at nobis magis placet hunc scriptum Hy-
acinthum dici. Theocrit. Eidyll. 10. Hyacinthum
γῆρα τῶν οἶδ est, scriptum appellat. Pausanias Co-
rinth. lib. 2. Scriptum Hyacinthum aut ei si-
millimum florem Comosandalon ab Hermio-
nensibus appellari, memorie prodidit. Sunt in-
quit, corollæ ex flore contextæ, quæ *καρποπέδαλον*
incolæ appellant. Hyacinthum illum existimo:
est enim ei tum magnitudine tum colore petu-
similis: habet præterea eandem luctus indices litte-
ras.

Lobel. & Penæ in Obs. pag. 84. & Adu. pag.
61. Liliū purpureum minus, Chimistatū Mar-
tagon. Gall. *Lis orange*. Ital. *Giglio rosso*. plant.
icon. pag. 164. Martagon Chimistatum. Liliū
purpureum siue Phœniceum vulgare. Lobel. 84.
Teut. 204.

An Camer. apud Matth. Germ. *Note Gold-
gilgen*/Hemerocallis.

Tab. III.

Tabern. icon. & hist. *Gros gold gilgen*. Liliū
aureum maius. Quamvis Compilator maius vo-
cet, huc reducimus, quia figura satis accedit ad
minus: præterea maioris bonam figuram alio
ponit titulo, miror eum qui Patrocium Matth.
suscepit, hanc figuram maluisse assumere primā
Herocallide. Casp. Bauh. Phyt. Liliū n. siue cro-
ceum minus.

Liliū croceum minus, Basileæ in hortis pro-
uenit, Nos habemus Montbelgardi in orto E. C.
id etiam collectum in Passauiant in orto D. j. ab
Andlavv. plantam in orto E. C. Hoc

Liliū reprints propagines
ex sedimitit multas.

* * * * *

LILIVM PHOENICEVM DILVTVM.



Ob. icon.
L. Pl. p. 164.
Martagō Chy-
mistatum al-
terum: Liliū
phœniceum
dilutum Teut.
204. C. Bauh.
Phyt. Liliū
siue phœni-
ceum.

LILIVM CRVENTVM LATIFOLIUM.



Bulbo innititur
omnino tali,
quali Liliū albū:
caule verò dona-
tur, non vt cætera
Lilia, crasso, qui
florem producit u-
nicum, cruentum,
sex foliis latis con-
stantem. Cauli fo-
lia rara, valdè la-
ta, Plantagini si-
milia.

Tabern. icon. &
hist. Breyt bley-
terich blis gil-
gen: Liliū crue-
tum latifolium.
C. Bauh. Phyt. Li-
lium 6. siue cruen-
tum latifolii. Tab.

LILIVM BVLBIFERVM MAIVS.



Bulbicali
interdum
allurgit caule,
fitto, crasso,
fl. lris septo li-
liaceis, suba-
rtis, in summis
alis crassiores
bulbos gestans,
& amples flo-
res rubros, Li-
lio puniceo
minori non
bulbifero con-
colores. Tene-
riores huius
plantæ, ante
quàm flores
ferre incipiāt,
bulbis secun-
dum caulem
inter-

inter folia natis non minus donatae sunt, quam reliquae duae species: sed quando robustiores sunt florentque aliquot annis protulerunt, vix, nisi in summo caule, ubi in alas diuiditur, & secundum flores, maiores bulbi nasci solent.

Liliacea stirps, seu Liliū bulbiferum 1. siue vt Clus. appellat cruentum, Martagon bulbiferū 1. Liliacea stirps Clus. seu Liliū bulbiferum, siue vt appellat, Liliū purpureum siue rubrū maius, Martagon bulbiferum maius.

Lobel. Obs. Liliū cruentum bulbos gerens summo alis diuiso caule: Liliū cruentū varietas Martagon, cui flores rutilant, bulbis nucleis stipatis summo caule alis diuiso profert. Icon. Pl. pag. 65. Liliū cruentum Teut. 205.

Hist. Lugd. Liliū cruentum bulbos gerens Lobelii.


Casp. Bauh. Phyt. Liliū 7. siue bulbiferum larifolium.

Floret haec planta Liliacea cum duabus subsequentibus Iunio, alia aliā paulo maturius, semenque perficit Augusto, bulbi in alis (inquit Clusius) haerere solent, donec vento aut contrāctu excutiantur, imò interdum plantae adhuc inhaerentes, fibras deorsum spectantes agere solēt, ranquam ad communem matrem terram aspirantes, & illā se condi cupientes.

Haec quidem nullibi sponte nascens à Clusio obseruata est, sed eā primū Lira conspexit Clusius in horto Mariae de Brimeu, quae deinde bulbis in terram depactis, reliquis Belgicis hortis breui tempore communis facta est, atque etiam nunc Viennensibus ac aliis vicinis, Clusii operā: nam ipsa aliquot maiores bulbos è Belgica mittebat.

Solent verò tum haec, tum aliae duae non bulbiferae, cum primū florū gemmas ostendere incipiunt, à formicis admodum infestari, sic vt eo tempore nunquam immunes ab ipsis conspiciere liceat: non secus ac Praoniae flores antè quā explicentur, qui mirum in modum etiam à formicis appetuntur, praesertim qui plenus est, & ille etiam explicatus atque apertus.

LILIVM BVLBIFERVM INCANVM.



Vix cubitalē (inquit Clusius) excedit altitudinem, caule etiam est firmo, striato, ex viridi nigricantibus foliis praedito, quae tamē cum summo caule incanā lanugine pubescunt: eius flores igneo rubore non rutilant, vt in superiore, sed magis pallescunt, & ad Liliū puniceū nō bulbiferū maioris colorem plurimum accedunt. Eius adu-
torior caules paucos etiam bulbos, eoque superiore minores, nisi in summis alis gestare solent.

Tom. II.

Liliacea stirps, Liliū puniceum, siue vt Clus. hist. appellat) cruentum: Liliū bulbiferum, siue Martagon bulbiferum 2. Et Pann. Liliū purpureum siue rubrum bulbiferum, Martagon bulbiferum incanum. Clusius proponit figuram quae est Ic. Pl. secundo loco Liliū cruenti bulbos maiusculos gerentis, ubi duae figurae sunt sub vno titulo.

Casp. Bauhin. Phyt. Liliū 19. bulbiferum incanum:

In montanis pratis Austriae & Styriae sponte crescit, sed rarior inuentu. Caeterum omnium flores terram spectant, & per interualla in summo caule nascuntur, foliaque ad pediculum reflexa habent: semen etiam in trigonis capitibus duplici serie in singulis angulis cotinetur, fuscū, planum, cartilaginofum: radix luteo Ochrae colore infecta est, quam ob causam à Germanis Goldwurz/ id est, aurea radix appellatur.

Locus & tempus.

LILIVM BVLBIFERVM REPENS.



Scammato Scribo cum alis huius generis conuenit: caeterum caulis firmus, striatus, cubitalis, ac maior multo, maculis nigris notatus, lanuginosus, in alas diuisus, flores multos profert amenos, Liliū formā, nec non aliquatenus, odore, ex semine repandis aliquantum foliis, multo croco tinctis, intrinsecus multis liris asperatis

Descriptio

(qua parte & color folii mediū diluitor punctiq; saturatē sanguineis notatis: extrinsecus lanugine leui perfusus: quorum non nulla clatiorem, latiorē, saturatioremque costam, profundo vtrinque ad latera sulco, habet: medium florem obdident reliquorum instar sena stamina persistuntque triquetrum, eodem cum flore colore praedita: folia ferè Martagonis, quorum alis bulbi frequentes intident. Multum se propagat bulbis ac etiam maioribus repentibus.

Lubet hic subnectere Clusii descriptionem quae sic habet: Inter Liliū purpureum bulbiferum maius & incanum, media est magnitudine, nonnunquam etiam primū aequat: sed caules sunt inferiores, gracilioresque, ipsique cum foliis diluitor virore praediti: flores secundo generi similes. Hoc perpetuo fecunda Bulborum inter folia nascentium sobole onustum est: cuiusque radix priore minor è lateribus propagines spargere plerumque solet, quae ad singula genicula in candidos bulbos excrecentes, subinde nouas in circuitu plantas producent, Liliū rubri minoris non bulbiferi modo: eius bulbi in alis nati, fecundae speciei pares, priori tamen magnitudine inferiores: omnesque terrae commissi sui generis plantam procreant, & secundo anno in cau-

M m m 3

lem bulbillis onustum excrefcunt. Ferunt tamen omnes hæc plantæ in capitibus triangulis femelatum cartilagineum subfuscum, quemadmodum Liliū vulgare, quod non sterile est, sed sui generis etiam plantas profert: verum quæ ex bulbillis in alis natis crescunt plantæ longè citius adolefcunt.

An Gesner. hort. Liliū rubens seminiferum, Lilia crocea quæ semina in caule habent? An Cluf. Pann. Liliū purpureum siue rubrum bulbiferum minus, Martagon bulbiferum minus, Martagon bulbiferum pratense. In hist. Martagon Liliacea stirps: Liliū puniceum siue (vt vocat) cruentum, Liliū siue Martagon bulbiferum? An Lobel. Obs. Liliū quartum Lilio purpureo maiori par: flore Martagonis rutilo: & secundum caulem sesquicubitalem bulbulis à medio ad summum vsque ornatur: Liliū cruentum 4. Icon. Plantar. p. 168. Liliū cruentum secundum caulem bulbulis donatum Teut. 204. An Dodon. rar. Liliū purpureum tertium, Liliū bulbiferum? Histor. Lugdun. Liliū cruentum aliud Lobelii. Casp. Bauhin. Phyt. Liliū 9. siue bulbiferum minus. Habemus copiosè in horto E.C. quod se facillè multiplicat ex bulbulis deciduis, quales etiam Sturgardiæ collectos plantauimus. Bulbulos interdum fert priusquam florem producat: alioqui in magnam crescit altitudinem & multa fert lilia.

Locus & tempus.

LILIVM CROCEVM
flore pleno.



IN Iconibus colore depictis Ill. Principissæ expressa hæc figura anno 1608. colore est croceo.

LILIVM BVLBIFERVM
cruentum angustifolium.

Lobel. Iconibus Plantarum. p. 166. Martagon cruentum angustifolium exiguis alis diuiso caule nucleis compactos bulbos gerens, Teut. 166.

C. Bauh. Phyt. Liliū octauum, siue bulbife-

rum angustifolium, Lobelium Martagon cruentum angustifolium.



LILIVM FLORE NVTANTE
ferrugineo duplex maius & minus.



Fvlus huius bulbus ex squammis acuminatis compactilis, subdulci & viscido sapore, fibris donatus albidis, aliis in imo, aliis quæ cauli committitur, quem erigit bicubitalem, teretem, punctis rubèribus maculosum: cui ex interuallis radiata circumnascitur foliorum Lilia-

ceorum atrouirentium series: circa caulis etiam summum, singularia folia temerè quæ fors tulit apponuntur: caulis fastigium ornant Liliacei penduli flores, sex foliis pinguibus purpurascèntibus, sanguineo saturatiore guttatis, reflexis admodum, constantes: quorum medullium occupant totidem ferruginei apices cum pissillo, odore graui.

Cordus sic descripsit: Caulem erigit plerumque bicubitalem, teretem, gracilem, & viridem, solidumque, inferiùs purpurascèntibus maculis conspersum; foliis quincuncialibus longitudine, & duarum vnciarum latitudine, glabris, ex rotundo turbinatis, & pinguibus vestitum, iisque iuxta annexum angustioribus, superiùs utrigricantibus, inferiùs autem viridibus, eminentibus, ramosisque, à tergo & in mucrone coëuntibus venis: flores æstatis initid pròni summo cauli adnascuntur Lilio figura similes, multò tamen minores: nã senis vncialibus constant foliis mediè digiti latitudine, sursum reflexis, colore in pallido rubentibus, intusque purpureis maculis conspersis, substantia pinguis, carnosis & glutinosis: stami-

stamina ferunt singuli flores sensa, foliis numero respondentia, in quorum extremitate oblongum & transversum quiddam est, colore in ruffo purpureo, tubiginoso paluisculo, statimque percutente conspersum: è medio staminum prodiit iacutus apex in triquetrum rubensque capitulum desinens, viridi & triquetro folliculo insidens, qui desluentibus florum partibus solus remanet, & resupinus sursum incurvatur, paulatimque increfcit, donec vicia longior & semuncia latior fiat, qui inferius angustior existit, idè sex eminentibus angulis toridèmq; lateribus cõstat, intus autem tribus membranis ceu patietibus in tres camerulas per longitudinem diuiditur, in quibus bini contigui, paruoꝝ, lateruꝝ, planorum, leuium, sibi inuicem superiacentium & flauorum seminum ordinè continentur. Radicem habet bulbosam, diurnam, iuglandis quantitate, pinguis, crassius, acuminatis & flauis aut luteis squamis, veluti nucamentis fuscis spectantibus compositam: à qua alli exigui prodeunt bulbi, quibus se propagat. Saporem habent lenum, glutinosum & nauosum, tam flores quam radices, Liliis saporis respondentem. Nascitur in syluis & fructosis locis, tam editis quam planis.

Clusius in post. hist. duas proponit icones: vna est titulo Lili montani siue sylv. r. maioris, quæ apud Lobel. in Plant. pag. 168. est pro Hemerocallide flore rubello, Teut. 207. Alteri verò iconi appositus Clus. titulum Lili montani siue sylv. r. minoris, eam autem iconem Lobel. inter icones Plantini p. 163. ponit pro Lilio montano. L. 85. Teut. 207.

Braus. Germ. Goldwurz / Goldgilgen. Apud Doctos, inquit, nec apud Diosc. certum nomen nondum inueni: quamuis aliqui ad Hastulam regiam & Aspidilum aptare velint. Communia Herbaria, Aspidilum nominant, quod G. Heydnische blumen / vel Heydnische gilgen appellant.

Cord. in Dioscor. Hemerocallis sylvestris Liliū est, quod Germ. Goldpolne / siue Goldwurz appellant. Pharmacopole verò Asphodelum, sed falsè. Goldgilgen etiam dicitur.

Gesner. Cord. in hist. addit figuram ex Trago dicens: Hemerocallis rubens, quæ Itatorum Martagon videtur, quo pro Asphodeli imperiti quidam hæcenus abusi sunt. Olim in ea sui sinit Trag. sententia, vt crederem Goldwurz & Heydnische blumen esse Asphodelum seu Hastulam regiam Dioscor. sed animaduerti non esse, nec video quò rectè referri possit hoc Liliū genus, quàm ad Hyacinthum Poëcarum, de quo Virgilius Aegle. tertia & Ouidius. Idem mecum sentit Marcus Platearius.

Appollin. fol. 94. vocat Goldwurz / wildschwercel quod non placet.

Fuchs. hist. cap. 40. Asphodelum officinarum Aspidilum, Germ. Goldwurz / Asphodelum feminam vocat, quam propriè Hastulam regiam vocari dicit, hanc exhibet pro Asphod. femina, Theophrast. lib. 3. cap. 12. & pro Asphodelo Hesiodi, & Galeni lib. 2. de alim. facult. Hastulam regiam etiam Apulei putat. Verùm in Ic. libro Fuchsius mutata sententia vocat Liliū purpureum & Goldwurz.

Cornar. In Germania pauci aut nulli verum Asphodelum norunt, nam ea radix quam Officinæ Aspidilum corruptè vocant non est. Nostris dicitur Goldwurz. Hemerocallidem Dioscor. dicit Plinius ex Theophrast. Hemerocallis

appellat lib. 21. cap. 10. & de eo rufus eodem libr. cap. 21. Galeno Hemerocallis appellatur, Herbariis Liliū sylvestris aut marinum. Nostris Meerlilien aut wilde heydnische lilien. Quidam tamen hunc Asphodelum esse: Alii & verisimilius, Narcissi speciem volunt.

Theophr. Gohius in Onom. Hyacinthus, Golde wurzel / heydnische blumen. Asphodelus idem. Hastula idem. Oportebat scribere quem Hyacinthum intelligeret. Autore Matthioli. Inter Lilia merito annumerari potest quod Martagon Chymiltæ appellant, & Fuchsius Asphodelum feminam putauerat esse, sed hanc suam mutauit sententiam, sui erroris conscius factus. Item Epit. cum add. Camer. pag. 571. Martagon Chymiltis.

Apud Anguill. fit mentio Martagonis vulgi & Alchimistarum, radice lutea, de hoc loquentem, vt puto.

Dodon. Gall. Liliū sylv. in quibusdam Officinis Asphodelus, qui non sine magno errore vsurpant pro Asphodelo. Belg. Lolie de lelien. Hist. flor. & in fol. Liliū sylvestris: Gall. Lis santage. Non amplius ergo facit Hemerocallidem.

Diligenter inquirendum qua in re differat Hemerocallis hæc Lobelii à suo Lilio montano. Oskendimus autem Clusium eam iconem ponere pro Lilio montano siue sylv. r. maiore.

Cæs. Liliū in syluis vulgò Martagon, Liliū sylv. Liliū purpureum gerens florem.

Thal. Harc. Liliū purpureum sylv. falsè pro Asphodelo habitum, Goldwurz passim. H. Lugd. Martagon Matth. Camer. hort. Liliū sylv. Martagon flore subrubro & albicante falsè olim pro Asphodelo habitum. In hist. March. Germ. dicit flore pænè albo.

Tabern. icon. & hist. par. 2. pag. 527. heydnische lilien manlein / Liliū Sarracenicum mas. Item ic. p. 640. & hist. par. 2. heydnische lilien das weiblein.

Casp. Bauhin. Phyt. Liliū 19. siue montanum nostrum mains. Clusio Liliū sylv. r. Gesnero purpureum mas. Liliū 20. siue Martagon montanum minus. Idem apud Matthioli. Liliū 16. siue Martagon flore rubello, an Hemerocallis Dioscor. Huius duas proponit icones Tabern. nomine Liliū Sarraceni maris & femine. Vt verum fateamur nondum intelligimus diuisionem C. Bauhini, dubii hæremus an Tabern. Liliū Sarracenicum mas, sit nostrum liliū flore nuptantè maximum de quo paulò post.

Liliū purpureum Martagon dictum flore inclinante, vidi Ferrariæ in horto Monasterii S. Dominici à l'Angeli, Patuui in horto Triuefani. Montbelgardi spontè copiosè in monte Bar. Ex horto neo transfuli in horto E. C. Basileæ Frater obseruauit in monte Muretz, vbi etiam obseruauit. Geneuæ in montibus abundat. Passim vtrumque genus Clusii prouenit in siluis & vmbrosis pratis Leytenberg, coramq; montium, qui à Calenberg Austria, ad Alpes vsque procurunt: Nascitur & in plerisque Styriæ ac Vngariæ siluis, atque montibus illis siluosis, qui non proci Francofurto in ripa Mœni sito, ad Septentrionem absumt. Minus autem olim obseruare meminit in multis Germaniæ siluis, non modò editiore loco sitis, sed etiam in plano. Plantatur hodie in hortis hic Narcissus: (inquit Tragus) sicut alia quoque florum genera, volup-

Galini 777.

Martagon vulgi & Alchim.

Hemerocallis. Non est Asphodelus Liliū sylv. Dod. mutauit sententiam.

Liliū purpur. Diosc.

Locus:

tatis gratiâ. Aliâs in altissimis syluis Heluetio-
num, & câ quoque quæ Hercynia dicitur, nec nô
monte Tonitrui, qui à Vuasgoia non longè ab-
est, sponte sua prouenit.

Lilii Mar-
tagonis Vi-
re.

Qui difficulter vrinam reddunt, radicem in
vino decoctam bibant: prodest id medicamenti
mulieribus, inquit Tragus, quibus menses impe-
diti sunt. Omnes calidi abscessus & tumores ra-
dice tusa emolliiri possunt, præcipuè verò mam-
marum & genitaliû. Quidam vini facibus prius
concoquendam tradunt. Radix in cinerem reda-
cta, cunq; melle temperata, illita alopecias ex-
plet. Reliquas cum Lilio albo vires obtinet.

Dod. ner.

Perhibet quoque Camer. Empiricos vti radice
in contusis membris & vlceribus. Contra Dodon-
dicit: Vsum hoc Lilii genus iu medicina nullum
habere, cum tamen olim illi Hemerocallidis vires
ascripserit. Minimè tandem viribus, quas Apol-
linaris ei tribuit, fides est habenda.

LILIVM FLORE NVTANTE ALBO.

Descriptio

Lilii montani siue siluestris tertium genus sil-
uosis montibus ad Francofurti Septentrio-
nem inuentum, humile, Secundo generi proximi-
um: florum tamen colore varium: nam antè
quam explicentur, foris carnei quodammodo
coloris sunt, explicati verò, intus albi, & notis
quibusdam purpureis insigniti.

Similem stirpem habuit, inquit Clusius, munere
N.V. Boissot veteris amici, quæ tandem adole-
uerat perinde ac primi generis plantæ: sed eius
radix Ochææ colore minus tincta, quàm superio-
ru n. Sed Francofurtensis quidam cuius vnam ha-
bebat, cuius flores interiore parte omninò niuei,
nec vllis notis distincti. Habui etiam à Doctiss.
vito Ioachimo Venerio similis plantæ bulbum
Burdigalâ missum, cuius forma ab illius bulbo
non differabat, sed eius caulis & folia magis câ-
dicabant, flores autem antè quàm expanderen-
tur multâ lanigine erant obstiti: explicati verò
procius niuei, nec vllis maculis infecti, staminum
zpicæ non ferruginei coloris vt aliis, sed flauis.

Est nobis Montbelgardi in horto H.C. Wir-
temb. Lilium flore nutante, quod ceterâ simile
precedenti flore lacteo, staminibus herbidis, qui-
bus insident apices lutei: pistillus vitescit florens
Iunio. Attulit Gener Io. Henricus Cherlerus
Româ ex horto insignis Pharmacopæi Coruini.
Floret Montbelgardi Iunio.

LILIVM FLORE NVTANTE MAXIMVM.

Descriptio

Bulbus maximus profundè in terra latitans:
caules aliquot cubitorum: florum ingens
numerus, qui videntur minus maculati: folia an-
gustiora videntur, multò plura, & quædam ver-
ticillatim disposita.

Hoc primùm vidi in Than Alsatia vrbè in
horto Dj, à Pfirt parte umbrosa, vnde transituli
Montbelg. in hortum Ill.E. C. Witt. Obseruau-
imus postea in Duc. Wirtébergici vrbè Marbach
in horto Ludimoderatoris florens Iunio.

Hoc genus suspicamur depingi & describi à
Lobel. Adu. par. 1. Lilium silu. siue Hemerocallis
moschata Polyanthes, Martagon Imperiale nu-
perorum, Insulanis nostris Gallo-Belgis, Mar-
tagon à l'Espineere: Hoc Lilii montani nouum ge-
nus à florum fœtura coronata, Martagonis Impe-

rialis nomine insignitum aut vocitatum, conspe-
xi. Peregrinæ elegantia plantâ gauisus sum. Elap-
sis aliquot annis mihi huius bulbos nonnullos

munere dedit
D. Ioh. de Frâ-
queuille, stir-
pium & florû
ratiorem cal-
lentissimus
qui annis plus
decem illos
Insulis à quod-
dam Botanico
nactus est &
aluit, fœtque
studiosè in
horti delirius;
vbi rarâ tran-
splantatione
florum pyra-
midatum acer-
uum, centum
viginti & plu-
rium, suauissi-
mo spectaculo,
iucundissimi



mi Rosæ Moschatae odoris æmuli, densissimè
bicubitalem ex purpureo fuscum caulem fasti-
giantem. Flores pares, similes Hemerocallidis
secundæ nobis modò descriptæ; dilutiores & lu-
cidiores, per exortus quinque aut sex variè & fu-
se caulem ornant, fortuitis ex fusco purpureis
maculis latioribus diffusis, circum agunt & co-
ronant. Semen in valculis compressum, aliis
ferè par & simile: Hoc primò ante omnes Bota-
nici Gallo-Belgæ nacti sunt: sed vnde delatum
nescio. An icon. Pl. 168. Hemerocallis flore ru-
bello, T. 207.

An Clus. Lilium montanum 4. quoddam ge-
nus, cuius flores primo non dissimiles, sed se-
riùs sese explicare soliti, illique non insuauis o-
dore præditi.

MARTAGON ALBICANS PICTVM ad iconem cum coloribus.



debat quatuor pedes, Anno 1604. Iunii 2. Gold-
strurg vti ascriptum iconi.

LILIVM

LILIVM FLORE MINIATO NVTANTE,
sive Hemerocallis Chalcedonica aliquibus.

EX radice bulbosa, emergit caulis bicubitalis, minimi digiti ferè crassitudine, in parte punctis rubentibus guttatus, cæterà virescens, còcaus, paulò postquam è bulbo eluctatus est, radiatas fibras circumquaque emittens: per quem frequentia oriuntur folia indigesta, Liliæ Martagonis, striata, acuminata, per marginè nonnihil veluti pilosi ostentantia, sapore oleaceo prædita, flos cauli summo reflexo infidet plerumque vnus, aliquando duo aut plures, colore phæniceo pulcherrimo, quorum singuli Liliaceis similes senis foliis constant, vtunque angustiorib⁹ quàm Liliæ albæ, hæc striis notata, quæ extorsu reflexæ, cœu Martagonis, apicibus circa caulem còcunt, prominentibus, nudis, miniatas apicibus, quos pallida stamina sustinent, quorum medium obtinet pistillum apicibus concolor. *Semina*, Clusio teste, sunt in anguloso capite plana, Martagonis

aut Liliæ sylæstris semini ferè similia, sed nigriora, minoraque aded spongiosa, terè commissa prodierunt, planaque foliola tulerunt: *Radicis* vepulurum non est aded magna vt quidam existimant, sed Liliæ semestris radicem haud multum superat, colorque dum recens eruta est aded illi per similib⁹ [etenim si diutius extra terram adseruetur purpurea ferè tota est & subinde quibusdã notis saturatè rubentibus inspergitur] vt etiam in stirpium cognitione admodum exercitati, nisi eas inter se conferant, difficile discernere possint: Huius tamen radix è tenuioribus squamis contexta est, nec min⁹s fibræ suprâ & infrâ quàm illa donata.

Bulbum accepi (inquit Clusius) qui primis annis vnicum florem semper mihi protulit, tandem quaternos, altero tum insequente anno senos, eosque omnes ex summo extimoque caule simul procedentes, quemadmodum alteri floruit, tredecim flores extimo caule, eoque vnciam lato, sustinens, saturatè rubentes cum præcedente anno quinque duntaxat extimo etiam subrotundo caule vt meus tulisset. Sed & Patricia quædam Viennensis aliquot habuit plantas, inter quas vna extimo caule duas vncias lato tres & viginti flores tulit. Gen. Io. Van der Silf plantam habuit semine natam, quæ primo quo flores proferre cepit anno octonos, proximo autem insequente quadragenos protulit. Pictura à Rasso mihi donata vicosos aut plures flores ab extimo caule plano propendentes habebat. Binas habui saturatiores flores gerentis plantas, quatum prior quaterna, altera septenos flores tulit, omnes summo caulis fastigio æqualiter innascentes, nõ temerè per caulem sparsos, quemadmodum Lilium album aut siluestre ferè solent: singulæ autem hoc peculiare habuerunt, vt vnus medius inter reliquos surrecto pediculo nasceretur, & in alterà quidem ille duodenis foliis constans, & quodammodo gemellus, vt in secundà subiectà icone videre licet. Ceterum duorum generù esse videtur hæc planta: vna videlicet dilutioribus floribus prædita, altera saturatioribus. Ego sanè longâ experientiâ didici, eas plantas quæ dilutiores ferunt flores, caulem & folia viridiora habere iis quibus saturatiores sunt flores: postremis enim caules & folia plerumque ex purpurâ nigricant. Deinde mihi conspectæ sunt radices Constantinopoli allatæ, quibus color purpurascens fuit, dilutiores protulisse flores: alix contrâ saturatiores. E florum verò numero, incerta aliqua differentia [vt inieciò existimabam] constitui possit, plurimum ambigo, cum eas stirpes quæ numerosos tulerunt flores, subsequente interdum anno, paucos, aut vnicum duntaxat, habuisse obseruauerim: at leto & pingui solo depositos bulbos, plures vt plurimum proferre flores animaduersum.

Ob floris venustatem plerisque Italiæ locis *Ri-za de la Signora* appellatur hæc planta.

Lob. Obs. & Icon. Plant. pag. 169. Hemerocallis Chalcedonica purpureo sanguinea polyanthos, Lob. 35, Teut. 208. wilde lilien vom Caluarier / von Constantinopolen mit völe bloemen Belg. Iterum Hemerocallis Bizantina altera Teut. 208. In indice Hemerocallis flore rubello: Belg. Schœon Claer weisse lilië von Caluarie. Lilium Calcedonicum miniatum, sive hemerocallis, admodum elegans hoc Liliæ genus ob floris decus colorisque flammei nitorem: vtriusque Cinnabaris natui & factitii, inreuis aut diluti coloris, miniatu tinctillatione splendidiorem: eius duas va-

Zufinnere
Varietate.



etates aut plures obseruare licebit. Præcox, quæ, senos, denosque vt plurimum profert flores: & nonnunquam eius radix excrefcit & luxuriat vt caulem edat duorum ternumue digitorum latitudinis, qui Lobel. & Penz in Adu. amicisque sæpè triginta & plures flores proculerunt. Serotinum quandoque diu multisque annis vnicum florem edit: at temporis consequentis plures, sed serius, superioris Martagonis floribus elapsis, erumpunt flores quemadmodum amici nolque iamdiu obseruauimus. Caulis cubitalis, cæterà non dissimilia. Liliū rubrum, *Z. f. n. are*, Liliū rubrum siue miniatum Chalcedonicum Constantinopoli missum, *Sultan Z. v. b. a. h.*, ab aliis denominatum *Corona di Re*, hoc est, Corona regia, &c. Habetur præterea Liliū Byzantinum minus saturato flore *mod. v. b. i. z.* Liliū Byzantinum miniato diluotiore flore. Relatum est, conspectas esse Liliū huius Byzantini plantas, quæ florem ferrent prorsus niueum, in cæteris alteri partem.

Histor. Lugdun. p. 1498. Hemerocallis altera Marthioli: quæ Lugduni in horto quodam Dalech. industria creuit.

C. Bauh. Phyt. Liliū 17. siue Martagon purpureo sanguineum polyanthos. Hemerocallis 2. Marth. Chalcedonica Lob. Liliū 18. siue Martagon phœniceum vnico flore Clusio. Liliū rubrum Zufiniare. Lobelio Hemerocallis Byzantina.

Floret Junio aut paulo serius, Constantinopoli Viennam Clusio delatum, ex hortis vltra Bosphorum in Asia sitis bulbi allati: Nouo Vere solet emergere. Liliigenus flore vnico minui coloris inclinato, vt Martagon, habui Montbelgardi in in horto E. C. missum Sturgardia, vbi florens vidi Julio: folia vorare solent insecta quædam rubra: in horto Montb. protulit 2. flores. D. à *belle fontaine* Vesuntio misit mihi bulbum cum hac inscriptione: Hemerocallis Chalcedonica. Heidelbergæ sicca plantâ nos donauit Dominus Sprengenus.

De facultate huius comperti habemus nihil, nisi Dodonæo Circumforaneorum aliquis, quorum plena sunt omnia, pertinaciter resistere conetur.

LILIVM PRÆCOX NVTANTE flore rubro.

Descriptio **H**abebat [inquit Clusius Hist. post.] Ampliss. vir Io. Martorf. Pat. Franc. genus Liliū rubri ex Sturgard. Ill. D. Wirt. horto acceptum, quod vno ferè mense maturius Byzantino flores proferebat: nempe sub finem Maii aut initium Iunii, vt mihi referebant qui viderant. Erat autem *floris* color (illorum testimonio) minus satur & & longè diluotior eo, qui in floribus præcedente capite descriptis apparet: *caulis* sanè, vt ex planta quam mihi donabat deprehendere licuit, gracillior & breuior erat Byzantinis adultis, cubitalem videlicet altitudinem non multum excedens: *folia* quæ inhærebant angustiora & magis saturatâ viriditate prædita: *bulbi* squamæ (nam squaratas radicem habet perinde ac Bizantinū) longè etiam breuiores erant: tulerat verò illo anno tres flores summo caulis fastigio æqualiter insidentes, mihi autem Lugduni apud Batauos sequente proximo anno vnicum (tam longâ enim in itinere morâ radix valdè afflictâ fuerat,) eius, quem supra dixi, coloris, proximè autem insequente binos duntaxat. Licet autem matu-

rius altero flores profert, illo tamen serius gemmare solebat. Cæterum, sub initium anni 1594. monebat me Thobias Roelinius, Io. Somer varias & elegantes stirpes attulisset inter quas bina essent Lilia miniato seu rubro flore, maturius Byzantino flores proferentia, quorum alterum angustiora folia haberet illo quod Constantinopoli alatum: alterius verò folia multò breuiora essent, ac paulò latiora. Horum icones suis coloribus expressas, sed radice mutilas, cum aliquot vtriusque plantæ folijs sequente Iunio ad me mittebat.

*Liliū præcox nvt ante flore rubro,
tenuisfolium.*

Valdè autem diuersum est Angustifolium 3. L. Clusij, non quidem floris formâ (nam eius etiam folia circumuoluta & reflexa) sed colore, qui Lilio cruento maiori, non bulbifero similis est, tum situ, foliorumque per caulem sparsorum dissimilitudine: multa enim & conferta fert *folia*, cubitalem & ampliore caulem confusè vestientia, admodum angusta, & longa, inlar panè foliorum Tragopogi: caulis item fastigium flores profert non eodem ortu, vt in Byzantino, sed in summis alis, inter angustissima foliola *tragopoginos* nascentes: an vtriusque radix Byzantini radicem æmuletur, me fugit, ait autor noster: nam neutrius plantam videre mihi contigit. Sed & triennio post iconem suis coloribus expressam ad me mittebat idem Io. Somer, qualem ille depingi curauerat ad normam eius plantæ quæ ipsi eodem anno quinque & triginta flores protulerat. Illius floris (Exot. par. 2. Append. 2.) colorem plurimum ad Mali Aurantij præmaturi colorem accedere obseruabam: odorem autem non ad eò suauem vt eius quod præcedente capite descriptum est, sed potius Liliū montani flano flore odorè referre. Habebat porò Ampliss. vir Nic. Vanden Branden Consiliarius Bruxellenfis plantam similem Somerianæ, quæ anno à Christi natiuitate 1602. longè etiam plures tulisse fertur flores in vnico, sed illo plano, caule: anno autem insequente non minorem florum numerum tulisse ad me scribebat. Cæterum aliud eius genus reperitur etiam præcox & angustifolium, longè niriidioribus floribus quàm Somerianum præditum; nam prorsus miniatos illos fert, vt Byzantinum, certè magis saturos quàm Somerianum, nec eos inodoros. Præfatus Curforum Bruxellensis sub extremum annum 1602. pusillum bulbum eius generis mittebat, quem ex Italia recenter accepisse scribebat: & licet is bulbus Nucis Auellanae magnitudinem vix superaret, sequente tamen anno quatuor flores tulit eius quem dixi coloris: eius etiam folia licet angusta vt alterius, magis tamen saturâ viriditate prædita, & magis splendens mihi videbantur, arque inordinatè quædam flores in caule nascebantur: obseruabam etiam eius caulem & folia non ad eò breui marcescere vt alterius, sed diutius perdurare. Vt iungue genus, ab ijs qui diu alerunt, Martagon Pomponij vocatur, & hac appellatione ex Italia se accepisse asserunt. Rarum adhuc est in his Præuincijs, quia adnatis difficillimè se propagat, nec apud quempiam ipsam plantam semen præbuisse intellexi.

De hoc Lob. Adu. part. 2. inquit. Eximio ornamento decorat Botanicorum paradisos Hemerocallidis Macedonicæ tenuisfolij miniati coloris: Liliū siluestris montani Macedonici, &

CORONA IMPERIALIS SIVE
Tufai alis.

Radix bulbosa, rotunda, crassa, diuersa à Lili-
orum forma, est enim compressa ex magnis
crassissimis & succulentis squammis compacta,
colore interdum albo, nonnunquam etiam pur-
purascens, sæpe pallido, odore fætido & viroso,
vri & foliorum: Colchicum olente, Clusio verò
hircum, nares etiam procul feriente, qui eruit
binas & amplius libras pendentem. *Caudem* tol-
lit singularem, bicubitalem aut etiam altiore, in,
digitali crassitudine, inferiore parte plusquam
pollicari, firmo, intus fungoso, viridi, rotundo,
quidem, sed ad cubiti altitudinem striato, *foliis*
magna parte
stipatum num-
erosis, sple-
dore viridanti
nitentibus,
Liliaceis vel
Lilii montani
floribus Lobi-
pluribus indi-
dem ortis, æ-
quali ordine,
aliis incondi-
tis, nullo nixi
pediculo, sed
latiore sui par-
te cauli adna-
tis, ita vt ap-
pendices pau-
lum eminentes
ab iis propa-
gatis caulibus
reddant non-
nihil angulo-
sum. Supra au-
tem densius

Descriptio

Odore:

Pondus:



hoc foliorum agmen, caulis ad pedem, nonnun-
quam etiam cubitum protenditur nudus, sine so-
lus, gracilior quam inferius, & teres, neque stri-
atus & viridis, sed læuis & purpurascens coloris,
Serpentariae iustar maculosus, qui in summo toti-
dem præne in angulos definit quos flores sustine-
bit, nempe binos, ternos, quaternos, quinos, se-
nos, aut plures, omnes Vere quasi equaliter, sed
contrario situ nascentes, singulosque inter bina
folia inferioribus longè minoræ & angustioræ, æ-
quali ferè longitudine, quin flores primùm e-
rumpunt, inter folia latens, candicansque sunt,
deinde paulatim incrementum sumunt, vnà etiã
succrescente eã caulis que illos sustinet nudã
parte: florum verò *pediculi* qui sexunciales in
augmento deorsum intendantur è quibus flores
penduli sunt circum circa regum coronas imita-
ti, Lilii candidi, vel Martagonis pares, flammcõ
colore rutilantes, Lobelio ex phœniceo ruben-
tes, patuli, senis constant foliis latis, per extre-
mum mucronatis, pulchra striarum saturatorum,
sive purpurearum Clus. d. curfantium picturã
variegatis, laciniata cæsurã subinde ludentibus,
vngue autem, inquit Clusius, singulorum foliorum
nonnihil foris eminente, & ex nigro purpuran-
te, quorum vnus cuiusque secundum obicuriore
colore pictum obsider gemmantis liquoris mar-
garita argentea limpidissima & dulcissima, per-
tinaci durationis, post multos etiam dies à refe-
lutione, de quo liquore Clusius ait: Flos abso-
lutus & maturus expanditur, triennabili ino-

Martagonis Pomponi, splendissimi miniati co-
loris, D. I. Someri: Martagonis Pomponi So-
meri: Lilii rubri præcocis Clusii, luculentus flos,
intaminatè fulgens, miniati coloris &c. Debe-
tur hæc planta, præfata D. Somero, qui primus
eius bulbum è Macedonia montibus effossit in
Belgium detulit, & amicis communicauit. Hanc
quoque aliquot annis ob florum decus N. C. Ar-
bergius studiosè coluit, nec non alii Mediobur-
gentes.

LILIVM NVTANTE FLORE FLAVO.

Elegans Lilii montani genus à nemine quod
Clusius de sciat scriptum: cuius bulbum misit
Io. Robinus & descripsit, florem habere ex au-
reo flauescentem, foliis instar Lilii montani, aut
Byzantini, vt sunt Lilii montani siue Martagonis
Matr. flores. Misit ad me, inq̃t, Burdegala erudi-
tiss. Io. Venerius istius Lilii crassos bulbos, mo-
nebat alterum magis præcoces flores pro-
ferre: addebat insuper se aliud adhuc genus ob-
seruasse, cuius flores nullis punctis internè di-
stincti: nasci in *Cageire en barochis* nuncupatis lo-
cis, atque Pyrenæorum montium aliis, vnde ipse
retulerat. Ac se spontè nascentes eruisse vatos in
monte *Campsaure* vocato, & alio in loco qui à
Lilio nomen sumit: isticque à rutilicis *Consol*
appellari, id est, Consolidam, quod eius radice
contusa & imposita, tam hominum, quam ani-
malium vulnera, mirum in modum curari refe-
rant: atque aded Pyrenæorum montium inco-
las nullum aliud remedium vsurpare.

Lilium montanum flore flauo Lobel. & Penæ
Adu. non dissimilem vultum, ortum, & natales
habet, montium nempe Pyrenæorum, Lilio Bi-
zantino miniato aut syluestri montano Lilio.

MARTAGON FLORE LVTEO PRÆCOX.



Hemero-
callidem
siue Martagõ
flore croceo,
quod Tur-
cis *chshund*
vocat, vidi
flauescentem
cum octo flo-
ribus infrã te-
clinatis in hor-
to Stöckii, nõ-
dum tamè ex-
pansis Iunii 8.
videtur præ-
cocior ea He-
merocallide,
quam habent
in orto Prin-
cipisse, in qua
nondum appa-
rent flores inè-

sis Iunii 9. Eius flores sunt miniati vt ait hor-
tulanus: Martagonis autem crocei flos apertus
fuit 11. Iunii, intus punctis notatus, capitula api-
cum crocea ferè.

Vniuers.

Graminis.

Corona plures.

Coma mult. vifida.

Tufus natus.

do propendens, aurei Mali siue Citrii colore, sed pallidior, venis purpureis summam venustatem adferentibus: singula floris folia interna parte in ipsis vnguibus singulatibus tuberculis candidis prædita sunt, quæ meridiano etiam Sole limpidissimam dulcemque æquam exstillant lachrimarum in morem, vt vniuersos propendentes Lobelio visci grano ferè pares, videantur, sed abundantius pluitio tempore: ea deinde tubercula, marcescentibus floribus in albas lacunas abeunt. Ex ipso penitus floris umbilico prodeunt pro foliorum numero, stamina candida ad eò coniuncta, vt pro vno fallant obiter intuentem, apicibus masculinis in Ochtam vergentibus: breuiore trifido stilo inter ea latitante: Caulis reliquus supra nudus eminet supra florum coronatum agmen, confertâ duntaxat minorum & angustiorum comâ: interdum etiam mihi, inquit Clusius, nati sunt supra flores non vnicus cauliculus siue ramulus, sed bini terni aut plures, suis etiam foliis singuli ornati: Creuit porro Viennæ planta vndenis pluribusque, aut paucioribus floribus prædita; caulis supra septenos aequaliter propendentes denudus, quasi dodrantali longitudine allurgens, reliquos flores singulos inter folia nascentes protulit, longi, densa, & multifida aliâ foliorum comâ supra eos fusi. Sed & intelligebam ab his qui aliquot annis Constantinopoli hæserant caulem nonnuquam supra priorum illam florum æqualiter propendentium feriem, dodrantali longitudine attolli, aliâque florum seriem gestare, aliquando etiam tertiam, ac tum denum foliorum comam supereminentem: eas verò stirpes vnicum florum ordinem subsequentes annis plerumque ferè obseruavi, vt peculiare genus non sit censendum, sed Naturæ luxuriantis quidam duntaxat lusus, licet mihi etiam altero anno duplicem florum seriem gestare similem plantam meminim. Habuit autem Viennensis quedam Patricia, cuius caulis supra terram planus pedali longitudine extabatur, deinde in binos ramos fidebatur aequali longitudine excrefcente, singulos vndenis floribus onustos, magnâ etiam usâ supra eos foliorum comâ. Habuerunt & alij & ego similes plâras in binos caules cubitali panè supra terram altitudine diuisas, quorum alter octo aut plures, alter quinos aut senos flores tulit: mea verò plâta hoc etiam peculiare habuit, quod eminens coma multifida fuit. At Viennæ obseruata Tufai plâra, reliquas quas postea obseruaerim florum numero superauit: nam quinquagenis aut pluribus floribus onusta fuit. Illi Cattorum Principi Wilhelmo floruit planta quadragenis floribus. Iacobus Garerus Ciuis Londinensis monebat se plantam habuisse quæ binos & septuagenos flores protulerit. Habuerunt & alij similes interdum, in quibus plures flores nati, viceni nempe, triceeni: aut quadrageni: quotquot autem tam numerosos flores tulerunt, planos, lateque & valdè striatos habuisse caules animaduerti, atque proximo insequente anno ad ingenium rediisse, hoc est, caulem rotundum, ternis, quinis, septenis aut octonis floribus præditum habuisse. Nos quoque insignem lusum in eadem planta notauimus: vno anno vnicum caulem ferentem cum corona multorum florum, alio anno duos caules cum magno florum numero, in vtroque caule coronas: sæpe nullos produxisse flores, nonnunquam adfuisse caulem sine floribus &c. Fecunda futura capita sursum eriguntur magna Dei protiden-

tia, inquit Clusius, ne dehiscantibus semina ante maturitatem excidant.

Ceterum [inquit Clusius] aliud genus est, nec caule, nec foliis, nec florum forma a superiore differens: nam & illos in extrema læuis & nudi caulis parte aequaliter ferè in ambitu nascentes, singuloque inter bina angusta folia sustinet, vti superius, sed color variat, nec vt in præcedente flauus, vel versùs pallescens, sed ruber, aut sandacæ Sandicique colorem refert, instar Astaci elixi chelarum ferè: sex etiam latis & mucronatis foliis constat, vnguibusque ex purpurâ nigricantibus, cum suis interiore parte candidis tuberculis limpidaum rorem stillantibus, & sex flaminibus, stiloque æquali longitudine propendentibus. Hoc genus superiore magis venustum mihi videtur.

Variat item in nonnullis plantis florum color: est enim vel medius inter utrumque genus, vel ad prioris, secundique colorem quam proximè accedit.

Sed & quartam quandam differentiam obseruabam, licet eius florum color proximè ad Secundum genus accederet: angustiora enim folia habebat, illaque & radicem nullo tetro odore, quantum quidem naribus medicis percipi posset, prædita.

Idem Paan. p. 122. & Histor. post. l. 2. c. 1. Hactenus nullam plantam obseruare meminim, quæ Hemerocallidem Dioscori descriptam exactius (in hoc à Clusio sumus alieni) referat: alia est Hemerocallis cuius Athenæus meminim: Pancius iconem mittebat, Coronæ Imperialis nemine insignitam, quam appellationem in apud Herbariorum vulgus adhuc retinet: bulbi verò à Cæsaribus Oratoribus Constantinopoli missi, hæc Turf-
vntachi, modò Tufai, siue Turfai. Turfai autem [vt ab iis intelligebam qui Constantinopoli vixerant,] liliu. regium significat. Interdum etiam bulbi missi Turfai & Turfania appellatione: sed postremæ hæc voces à Turcis duntaxat nominibus adici solent, ad rei, cui adnexæ sunt, magnitudinem exprimentam. Ex Perlia verò Constantinopolim delatos illius bulbos omnino mihi persuadeo, quoniam cum accipiebam inter reliquas hæc fuit inscriptio, Tufai, siue Turfai. r. r. s. s. d. d. r. r. u. u. con lare r. s. a. ab. r. s. s. hoc est, Tufai, siue Persicus tuber aut decolor nutante capite.

Vidit inter alias ratiore stirpes hanc etiam nouam plantam nostra ætas, quæ vocat Turcico vocabulo Tufai, nam Constantinopoli allata est. Alii Liliu Persicum, à natali loco, vulgò ob similitudinem Coronam Imperialem siue Regiam appellant, quam peritillimus rerum simplicium C. Clusius, summus meus (inquit Camer. Embl.) amicus ad Hemerocallidem Veterum non male referri existimat. Huius floris maturus expanditur, ac in suis propriis pediculis planè deorsum flebitur, at quamprimum flaccescere incipit, succedunt illi sætis magna capita [vt quodque in Lilio rubro fieri solet,] quæ exactis flore itam sursum erigentur, ne scilicet, si deorsum dehiscerent diutius, semina nondum matura putrescant ac excidant.

C. Baul. Phyt. Liliu 15, siue Corona Imperia flore luteo, Lobel. Corona Imperialis. Liliu 12, siue Corona imperialis flore rubro, Clusio Tufai: Liliu 15, siue Corona imperialis multiflora, Clusio Tufai.

Lobel. Obs. Liliu siue Corona Imperialis, Turfani & Lale Herbariorum. Ic. Plant. p. 12. Liliu

lura siue corona Imperialis Teut. 210. Item pag. 172. Corona imperialis phœnicea duplici corona aut serie florum. Teut. 211.

Aduers. par. 2. pag. 512. Liliū siue Corona imperialis Herbariorum, cuius varietates peramœnæ & perquam speciosæ Belgio & Anglo-Britanniæ iam nostra ætate inquilinæ, oblectationi oculorum magis, horroꝝumque ornamento, quàm naribus dicantur: tetrum namque hircinum halant odorem Imperiales Coronæ, quarum varietates in caule, flore, & folio perspicuæ. Præcocior quæ statim Martio, nec dum lapso floret: folio lato est, dilutiore viridi, & flore non dissimili, sed pallidiore, à frigore fortè. Quæ media, est elatior, folio itè pallidiore sed angustiore: & flore item dilutiore. Pluricaulos, vt Liliū albū & Martagon siue Hemerocallis Byzantina interdū cūctu fortuito fit Imperialis Corona numerofo florum increment: foliis angustioribus, & Minii coloris saturiorib⁹, floribus aspectu iucūdis, quales florere Londini in horto D. Joh. de Franqueville Anno 1600. & Hacknei in horto Nobiliss. Baronis Eduardi Zouchæ 1601. Serotina latioribus foliis atrouirentibus: flore autem ex faturo phœniceo colore. Multis numerosisque latioribus foliis constat, stipatim bicubitalem caulem ab imo amiccitibus, florum elegantissimorum saturorum duplici serie coronatæ, nonnullisque floribus caulis comosum fastigium internascentibus, aspectu iucundissimo. Hac variis in hortis alitur & in honore habetur.

Inter syluestria Lilia Dod. Lat. venit & nuncranda Imperialis Corona dicta *Lale* & *Turfani* patriis vocibus appellari affirmatus.

Hist. Lugd. Corona Imperialis Dodonæi. Corona Imperialis 1. *Königsfron* / *Königsaliten*. Et Corona Imperialis 2. *polyanthos*, *Gesult* *Rösnigfron* / *Lilium Persicum*, *Turfai*, aut *Toufai*.


Floret Aprili, interdum etiam Martio, si æris temperies pauldè calidior fuerit. Semen Junio maturum. Nusquam spontè nascentem hanc plantam conspexit Clusius, sed Constantinopoli delatam, eo quo ad Maximilianum II. Viennam euocatus est anno, primus Belgicæ hortis communicauit & in Viennensibus reposita feliciter prouenit. Antè ipsius tamen discessum ex Belgio eius iconem [qualem Dodon. in purg. hist. Append. exhibuit] Ill. V. Joh. Brancioni miserat C. V. Alphonfus Pancius Scr. Ducis Fer. Med. Obseruauit Stutg. in hort. Ill. E. C. vnde translata in eius hortum Montb. floret Martio, ac hiemem fert non reposita: Visa etiam Basileæ florere eodem tempore, ac semen maturum proferre Iunio.

An apud Turcas medicum aliquem vsū obtineat, non intellexit Clusius, arbitratur tamen venustatis & ornatus potius causâ hanc plantam in suis hortis illos alere, quàm ob vllas eius facultates.

Hemerocallis vires licet videre antè.

CORONA IMPERIALIS MONSTROSA.

EX Iconibus coloribus depictis Illustrissimæ Princ. 1608. In magna iconè multò plures Tom. II.



LILIVM PERSICVM SIVE SVSIANVM.



erant flores ac folia. Est mōstrofa Corona Imperialis.

DOnauit D. Chersico meo Nobiliss. Corneus Patavii inter alia raritatis plena, Liliū, Persicum ei dictum: cuius caulis procerus, non multum crassus, cubitalis, rotundus, fluit ab ima parte sursum vortum dense stipatur, Lili croci foliis, angustioribus, acutioribus, digitalis longitudinis,

longè quàm Coronæ imperialis angustioribus, illis ferè similibus quæ in summo ipsius capite nascuntur, virentis ex cineraceo coloris, siue quodammodò æruginosi (inquit Clusius), qualis in Tulipæ foliis conspicitur, contorquentur verò illa, buxæque sunt odoris: summus caulis longum gerit thyrsum florum, selquiuncialibus & longioribus pediculis hæretium, numerosorū, pendulorum, terâ nque spectantium, Leucoii bulbosi, Theophrast. & nolas imitantium, fenis foliis constantium, satira purpurâ tinctorum, siue, vt ait Clusius, foris purpuræ valdè obsoleta colore præditos, internè autem dilutiores, inodoros, vnguibus subvirescentibus. Ex umbilico sex inæqualia staminula prodeunt purpureis apicibus primùm conspicua, qui obuerti, flauo polline conspersi apparent: tria deinde longiora staminula cœunt, stilumque medium florem occupantem æmulantur. Sequuntur deinde sexangula capita siue triangula, quorū singuli anguli bis alis sunt præditi, Coronæ imperialis capitibus ferè similia, sed minorâ & breuiora: semine etiam simili, paululdum tamen breuiore: Radix qualem nos habuimus bulbosa, Pomi Arancii magnitudine, subrotunda, fissa: magnis squamis lo-

Nan

ricata, ex albo flavescentis, tenui membrana cin-
cta, substantia eius qualis in reliquis bulbis: Ima
fertilis foramine plurimum pertusa, caulis vesti-
gio. Sapor substantiæ peramarus, horribilis.

Sapor

Odor.

Ætymna.

Clusio radix est magna, Tufai radici penè æ-
qualis, è paucis squammis contexta, candidioribus
tamen & aliquantulum longioribus, nullò-
que terro aut gravi odore nates feriente præ-
dita.

Missi aliquoties pauci bulbi Tufai bulbis per-
mixti cum inscriptione Tufai *Fier Persiano*, si *de-*
manda Penachio Persiano: tandem postremò ac-
ceptus *Sufam-giule* appellatione, quod è Sufis
primùm Constantinopolim allatus sit: hæcque ac-
cedè causâ Lilium Sufianum nuncupavi (ait Clu-
sius.) Munere Magnif. V. Jac. Contareni pa-
tricii Veneti ex Italia in Belgicam Ill. Io. de Brâ-
cion missus bulbis *Penachio Persiano* nomine, bi-
cubitalem aut ampliorem tulit caulem quinquagenis
floribus onustum, nullum autem semen: imò ne
germinavit quidem subsequente anno: illius iconem
dum florebat suis coloribus exprimebat Raphaël de
Coxia Regius pictor, & exemplar mihi mittebat, ex
qua nostra icon imitata: flores sunt magis patuli,
quàm in pictura expressi. Iconem habeo cum magno
artificio depictam munere Nicolai Rastii Regis Gallie
Chirurgi, qui Hyacinthi nomine appellabat. De hac
planta scribebat Alphonsus Pancius: *Penachio*
Persian è planta bellissima, & è specie di Giglio
à Martagon, *diverso della Corona Imperiale*.

Obi. Adu. par. 2. & Ic. pl. pag. 70. Lilium
Persicum Lobelij, vulgò Pennachio Persiano. *Hort.*
Lugd. Lilium Persicum Lobelij. *Camer. hort.* p. 89. &
Tabern. icon. & hist. Persische Gylgen/Lilium
Persicum. C. Bauh. phyt. Lilium 12. siue
Persicum maius & minus, Lutetiâ ad nos misit
D. Iohan. Menticus Cherlems. Audimus nos
Catillandinum existimasse *Penachio Persiano* esse
hemerocallidem: verùm hæc opinio, mihi non
satisfacit, multa non respondent & in primis color.

Hemerocallis
Gauil.

Floret Aprili, semen illius maturum cum Tu-
fai semine aut paulò post: Inter bulbos Constan-
tinopoli missa fuit Viennam: ternos tulit caules,
singulos ternis floribus præditos, hic vicinis, ille
triccis, tertius pluribus. Bulbos cū selectissimis qui-
busq; aliis rigida & aspera hiës corrumpit. Non modò
flores, sed abundè semen maturum protrulerunt
Lugdani Batauorum. Verisimile est [autore
Clusio] è Susa vrbe Sufianæ regionis Persidi vi-
cinæ primùm delatam fuisse Constantinopolim.

Camerar. hort. Lilium Persicum: Ital. *Pen-*
nachio del Persiano apud nos quidem perdurat et-
iam in hyeme non nimis acri, sed bulbus semper
decrecit, nec florem quod ego sciam, in Germa-
nia produxit. In Belgio & Germania rarum ad-
modum fuit: Angliæ hodie alienigenarum opera
conferuatur & propagatur, Lobel. Passim in hor-
tis Italiæ colitur, unde à Cherlero elegans allata:
speciosos ex Italia ad nos attulit Cl. D. Bierdun-
pfehus Med. doctor, & studii botanici sagacissi-
mus excoltor, quos hortus Ill. Ducis Montbelg.
habet. Floret Maio & Iunio, Montb. postea perit:
vidimus Argentinæ in horto D. Frid. Meier.

LILIVM ASPHODELI RADICE

Luteum, siue lilio Asphodelus
quorundam Flore luteo.

AD unū vel duos cubitos excrefcit, caule tenui
sed rigido, tereti, cauo, lævi, absque foliis in



summo in ali-
quot ramos di-
uiso, radice fi-
brofa, glandu-
lis appendis
donata, As-
phodeli radi-
cum æmula:
multæ oblon-
gæ ab vno ca-
pite descen-
tes, foris
buxæ, intus
alba, sapore
subdulci, ex ea-
rum annexa fi-
bræ quadam
crassiores fer-
punt, quibus
in plures plâ-
tas multipli-
cantur. *Folia ei*

sunt numerosa, Porri aut Asphodeli, longa, cari-

nata, striolis per longum donata: flores odore
planè & formâ Lili, sed colore penitus luteo,
post flores inquit Dodon. crasse, triangulares gi-
gnuntur siliquæ in quibus semen nigrum & splen-
dens, Pæonia paulò minus.

Gesner. de hort. in append. Gladiolus Indicus
à Calceolario missus Typhæ similis, radicibus
nodis Filipendulæ similibus, quæ iamdiu in hor-
to habet, iisdem ferè floribus quibus Cannæ,
nempe croceis, Lili specie, sed si sine femine de-
cidunt. Lilium luteum Ephemeron quod Tur-
cicum aliqui vocant, alii Gladiolum Indicum,
quem Asphodelis cognatum deprehendi: &c. Si
Gesnerus intelligit, Lilium non bulbosum, com-
paratio floris cum canna [scilicet Indica] non
placet.

Lobel. & Penz: Asphodelus Lili florus & Li-
rio-asphodelus, lilium luteum vel Asphodelum
Pharmacopœis Venetis.

Dod. in post. hist. non meminit ampliùs Lili
non bulbosum luri maioris & minoris, sed tantum
vnum tradit luteum, & aliud obsoleto colore ru-
bens: de quo mox, sicuti etiam de luteo.

Cæsalp. Liliagine vulgò appellantur due
Asphodelis affines, floribus croceis, figura & ma-
gnitudine Lili. Maiori caules cubitales, flores
ampli, colore quasi igneo, qui celeriter marces-
cant. Altera minor in totum non excedens di-
midium cubitum, floribus aureis, radices in
Asphodelo, maior in Vere tantum floret, minor
diutius propagatur. Hæmorrhoides videntur apud
Diosc. præsertim quæ maior: cui Diosc. teste Bul-
bo ingenti similis, videtur autem accipere glo-
bulum radicem ingentem. Theophr. inter suffu-
tices coronarios recenset. Theodoros Elium verit.
Hermol. in Diosc. non Elium legendum putat,
Sed Lilium matum. Plinii Hemerocallis
descriptio detruncata videtur acdepauata ut patet
conferenti cum Dio.

Histor. Lugd. Lilium non bulbosum, Hemero-
callis Dod. Et p. 1590. Liria sphodilus, Liliiflorus
Lobelie. C. Bauh. Phyt. Lilium 21. siue luteum
Asphodeli radice. Tabern. icon. & hist. Gesl.
Asphodeliten, Asphodelus Liliaceus luteus i.
Clus. Pann. Lilia sphodilus luteo flore elegant
& odorato, Vng. Zeod. Lelien: Croatis apud quos
etiam flore albo inueniri asserunt *Illiam Zvoec*.
Idem hist. Lilia sphodilus luteo flore. *Camer.*

Camer.hort.Lilium non bulbosum, siue Arundinaceum flore luteo, odorato admodum. Profert interdum germina in summitate caulis, ubi flores sine semine deciderunt, quæ terræ commissa statim radices agunt.

& Peregrinū Belgio: Floret cū Lilio purpureo maiore & paulò antè, Lilia candida præcedens, Dodonæus. In Vngaria maximà copià spontè nascentem in multis vlginosis pratis, non procul ab oppido municiū Nemehyvvvar inueni, Clus. Lilium non bulbosum flore luteo plantam in horto Ill.E.C.vbi facilè prouenit & se multiplicat, non ita tamen vt purpureum, semina proferens. Montbelgardi nondum vidi: Hanc plantam primùm obseruauit Basileæ in horto Di.Dodonæi Felicis Plateri. Frater Casp.Bauh. attulit mihi Parauio ex horto Di. Triacani, qui anno rari dicit à Guilandino Asphodelum Hermaproditum Recentiorum. *Erysibach* Arabum.

Dioscor.Hemerocallidis magno bulbo similem tribuit. Omnia nomina conueniunt excepta tantum Bulbi Hæmatici appellatione: *μυρωδανθής* autem vox purpureo propria est.

Lobel.Obf.Lirioasphodelus phœnicæus. Sunt qui Ephemera & Hemerocallidem dixerunt Plant.ic.p.93.Lirioasphodelus Lob.48.Teut.127. An Bellon.Lilia rubra Turcarum?

Gesner. hort. Lilium rubens arundinaceum Turcarum Bellonio. Si quis à radice forma Cynorrhodon vocare voluerit aut à foliis Cannorrhodon, non absurdè fecerit.

Dod.de fl.& in fol. Lilium non bulbosum flore rubro purpureo.

Tabern. icon. & hist. Asphodelus Liliaceus rubens Not. Assobul. liliæ. Histor. Lugd. pag. 1590. Lirioasphodelus phœnicæus Lobelii. Et p. 1499. Lilium rubrum non bulbosum, radicibus tantum differt à Lilio non bulboso luteo, quas multum fibritas habet. Non separabo à Lirioasphodelo, donec aliquis me moncat ubi viderit talè plantam.

C.Bauh. Phyt. Lilium 22. siue rubrum Asphodeli radice: Hemerocallis Diosc. Theophrast. & Plinii non potest esse Hemerocallis Theophr. est enim frutex.

Lilium non bulbosum habeo in Horto Ill.E. C. Wittemb. Montbelgardi, quod mirè multiplicat, quotannis floret, semen auren non profert. Basileæ obseruauit in horto D. Felicis Plateri: Suà autem propagante & reptante radice odiosum, ac multò magis quàm præcedens. Valdè luxuriat (vt Clusus testatur) in omnibus Autricæ, plurimisque Germaniæ hortis.

Facultates Lili non bulbosi incomptæ sunt, cum nullius hac ætate in medicina aut cibatu sit vsus. Hemerocallidis vires tradit Dodon.

LILIVM RADICE ASPHODELI PHOENICEUM, siue Lirioasphodelus quibuldam.

Non admodum ab similibus est hæc planta Lilio Asphodeli radice præcedenti, sed in singulis partibus maior, radice quippe cõsimiliter glandulis oblogis, filo conuexis, strumola, alba, gustu propemodum fatuo: *caulis* digiti crassitudine, duos cubitos altus & maior, fistulosus, enodis, cuius fastigium in aliquot alas



diuiditur: *folia* maiora, carinata, latiora, quàm Lutei: *flores* in caulium ramis, altero tantò maiores, Liliaceis pates, foliis tenis constantes, colore tristiore rubent intrinsecus, lutea linea per medium decurrente ad vngues vsque totos luteos: extrinsecus verò folia ad luteum, magis deurgunt.

An Camer.hort. Lilium non bulbosum, siue Arundinaceum flore suberocco.

Clus. Hist. Lirioasphodelus puniceo flore quem Hemerocallidem esse Dodonæus censet. Hemerocallis flos est qui nocte tabescit, Oriente verò Sole pullulat, Athenæo teste, quale istud non bulbosum Lilium, præsertim quod purpureum & fugacissimum est, hoc enim vno tantum die viger, matutino siquidem tempore exortum vespere flaccescit, quamobrem & propriè *μαρτυρική* ab vnius dici pulchritudine dici potest: Cum Dioscor. etiam descriptione conuenit exceptis radicibus. Flores proponit vnius generis Ochre luteo colore: alterius verò purpureos. Purpurei etenim coloris & Hemerocallidem aliquam esse *μυρωδανθής* nomen, inter nothas appellationes repterum ostendit: Neque obitat Dod. in fol. quod

GLADIOLVS SIVE XYPHION.

CAP. XIV.



Cum Iride bulbosa multà habent similitudinem Gladioli, *folia* cultrata, striata, caulem vagina tanquam conclusum aliquousq; circumplectentia: *caulis* sesqui cubitalis, singularis, teres, geniculatus, nonnihil, circa summitatem maximè, purpurascens: cui *flores* longà serie è vaginâ pro-

filientes adnascuntur, quasi intorti, longi, aliquomodo similes Iridi, sed minores multò, nunc vno versu eodem vergentes, nunc duplici, colore suauerubenti, formà Liliaceæ, foliis tenis constantes, quorum tria inferiora, Zonam habent per longum decurrentem, modò in medio albescentem, apicibus atro purpureis medium occupantibus. *Radix* duobus constat bulbis, gustu acri, altero alteri incumbente, alteroque magis quàm altero vegeto.

adnatis quoque per intermedias fibras subinde bulbillis quibus se præpatat, sub bulbis sunt duæ radices tarsi crassæ, tres vncias circiter longa, præter fibras quæ defunt in icone Marth. Nota etiam figura iam empta sculpta displicet.

Hunc porro Cordus hist. sua diligenter sic descripsit. Victorialis semina, id est silu. Gladiolus, rectum & mucronatum emittit folium: è quo alia duo aut tria erumpunt, Iridi similia, multo tamen angustiora, utrinque striata, & Iridis modo sibi inserta: iuncea, teretem, cubito longiorem, & glabrum caulem amplectentia: in cuius summitate quinque, sex aut septem egregiæ figuræ & coloris flores, Sole cancrum ingrediente, se proferant, à se inuicem distantes, in vnam partem caulis se inclinantes, & deorsum nutantes: constant hi sex foliis, vncias parum longioribus, simul ab vno exortu procedentibus: ex quibus quatuor semuncia paulò latiora sunt, colore roseo, sed multò latiore & pulchriore: interdiu, cum Sole tanguntur, ignis & scintillarum modo exteriori superficie coruscantia, & veluti flagrantia, reflexis labris profundioris calathi figuram referentia: reliqua duò foliola prædictis multò tenuiora sunt, ac intra florem constituta, inferius aliquantulum prominent, & candidam, longam, & in medio latiore maculam habent, quam vndique purpurea linea circumferibit, & terminat: superiori floribus folio stamen subest trifidum, & inter hoc & folium singulatis . . . pex. Florer paucis diebus, ab inferiori parte incipiendo: aperiente enim se sequi in summitate est flore, inferior flaccescit & elanditur: floribus singuli folliculi succedunt, in rotundo modicè oblongi, tenuibus venulis distincti, Nucis Auellanae quantitate: qui cum immaturauerunt in tres partes diuiduntur, & tenuis, paleacea, flauaque semina ostendunt: in quibus rubens, cartilagineus, & paruis est nucleis: radicem habet non profundam, paruum, rotundam, bulbosam, ab ima basi versus germen turbinatam, aliquot crinitis & reticulatis tunicis, veluti loticis vestitam: quibus detractis duo exigui candidi, carnosique apparent bulbi vno alteri insidère, superiori quidem Veris initio, minore sed vegetiore: inferiore autè maiore & latiore, verum flaccido & fungoso: perit enim & flaccescere incipit, prioris anni bulbis Veris initio, supernascente alio: itaque simul decrescens & increscens radicem habet: nonnunquam etiam inferiori subest recrius bulbosus, sed adèò flaccidus & inanis, vt inter cfodiendum (qua non est spectabilis) negligatur, dum floret superior & minor bulbosus increscit, vincitque soliditate & qualitate inferiorem: nam cum flaccescere flos incipit, digiti crassitudinem, & globuli figuram acquirit: fibras ab inferioris bulbi base emittit tenues, candidasque: saporem radix habet præ cæteris herbæ partibus excellentem, nempe dulcem & modicè acrem, relinquit enim in palato aliquandiu linguam & fauces aliquantulum vrentem & saliuam elicientem. [flores & folia idem faciunt] acrimoniam.

Xiphion seu Gladiolum caruleo flore describit Tragus, cuius descriptio inregra post traditur sub Indè tenuifolia Michelsfeld.

Gesner. Gladiolus vernus. Gladioli fegeralis [linguæ cætuinæ Apulei Dodon.] plerisque dicti, flores [purpurei:] vulgò appellatur *Monacucæ*: Arab. *Kassiflore*. Ital. *Gladiol.* Et quatuor Diofco. tradiderit quòd superior radix magnitudine in-

feriorem superet, plerumque tamen contrarium visitur. Plin. hac in historia à Diofco. distinet: siquidem in palustribus & aquis inueniri existimat. Ex quo facillè crediderit Matth. Phinium illum vocare Gladiolum quem passim Officinæ Acorum nominant. Lobel. & Pena Adu. p. 47. & 91. Gladiolus, Germ. *Schmerrel*. Gall. *glau. Segetis* Romanis. Hæc ille qui ait Narbonensium vnum habere florum ordinem, Italicum duos. Item Obf. & Ic. Pl. p. 98. Gladiolus Narbonensis. Adu. p. 47. & pag. 99. Gladiolus Italicus binis florum ordinibus.

Idem Adu. pat. 2. Gladiolus minimus, minor quam vulgaris Narbonensis Gladiolus: floribus concoloribus, minoribus vno versu digestis in pedali gracili caule: foliis item duplò minoribus. Radix Sisyriuchii aut Gladioli parui. Floret in hortis Londinensibus D. G. ill. *Gris* & D. *de Franqueuille* Maio mense. Floris omnino albi Gladioli radices & temen anno 1601. à D. I. Robino Botanico regio Lutetiæ accepimus. Sata Londini in horto D. *de Franqueuille* viguère.

C. Bauh. Phyt. Gladiolus. 1. vtrinque floridus Matth. Lob. Italicus 2. Gladiolus floribus ab vna parte caulis digestis silu. Cordi. Narbon. Lobelii. Item hist. Matth. Gladiolus.

Nascentur Cordo editis, frutetosus & herbosus locis, magis tamen planis nec adèò altis: ac solum amat lutosum, prouenit copiosiss. in siluulis frutetosis circa pedem Lanterbergi, quem hodie montem Diu. Petri vocant, vno atque altero ab Hala Saxonica mliaribus. Frequens in Hetruria & in comitatu Gontienfi, in pratis & in aruis inter fruges, vnde Segetalis plerisque dicitur, Marthiolo. Passim Montpelii in segetibus prouenit. Florentem vidi mense Aprilis, Hanc plantam prius videram in horto Di. Gesneri Tiguri, postea Patavii in horto publico, & Di. Triuefani, & Di. de Musali *al ponte Molin*, Venetiis, ac spontè inter Ferrariam & Bonoriam: Lugduni habebam in horto. Geneæ frequens in hortis florens Maio: in Iulii principio reperi copiosè in prato vbi Gratiola & Oenanthe quardam inter Burdigni & Thuri florebat & semen habebat. Montbelgardi habeo in horto Ill. E. C. transplantatam ex horulo meo, & ex horto Dj. à Morlor senioris: D. Agerio teste, qui plantam siccam dedit, prouenit in pratis pallidiore flore, planè albo vidi Sturgard. in horto Ill. C. Wirtemberg.

Nunc Ensis appellati radix dulcis decocta & trita farinæ admixta panem dulcem atque innoxium reddit. Per multas iuxta eam scolopendras reperitur, teste Theophr. gaudet enim ea herbæ, frequentesque congregantur in ea. Potest ex auctoritate Diofco. superna radix cum vino & thure imposita, spicula & aculeos extrahere. Cum farina verò Loliacea & aqua multa, panos disenti. Vnde eiusmodi emplastris additur. Ducit & menses apposita. Tradunt etiam superiorem radicem cum vino potam, Venerem stimulare: inferiorem verò steriles facere. Quin & supernam radicem cum aqua bibendam commodè exhiberi pueris, quibus ex intestinorum hernia, intestina in scrotum delabuntur.

Similes vires ei & Plin. lib. 25. cap. 21. attribuit dicens: Xiphii radices superior pars cum thure trita, quo pondere, admixto vino, ossa fracta è capite extrahit, aut si quid in corpore suppurat, vel si calcata sint ossa. Et rursus de eadem lib. 26. c. 8. Xiphii radix superior vrinam eicit. Infantibus enterococlicis datur ex aqua, & illinitur ve-

fiore vitis. Et rursus c. 70. Appetentiam Veneris facit radix è Xiphio superior, data potui in vino.

Galeo Gladioli radix, & maximè altera superna, attrahendi, discutendi, & nimirum succandi vim habet. Et 8. de facult. simpl. med. Xiphii radix maximè altera quæ superior est, attrahit, digerit, deficcaturque.

IRIS BVLBOSA LATIFOLIA FLORE
cæruleo & candido.

SEna vt Sphirium habet folia, longiuscula & latiuscula. Hemerocallidis Dodonæ, siue Liliatphodeli foliis ferè similia, breuiora tamen, alternatim inuicem amplectentia, mollia, in rectam prona, superinè ex viridi pallescunt, inferinè verò incana: è quorum medio flos exilit, è membranaeco inuolucro,



unicus, odoratus, cæruleus [interdum lactei cædoris] nouem foliolis constans, Iridis figurâ, quo marcescente, utrinque alii singulares succedunt. Nullus est illi caulis, sed flos longo duntaxat pediculo insidet, vt in Croco: radix bulbosa, candida, Auellanae instar dulcis, multiplici cortice nigricante inuoluta, cui (praesertim dum floret) aliquot, praeter fibras, crassæ, longæ radiculae subnascuntur, vt in Hyacinthi radicibus interdum fieri solet.

Huic Clus. Hisp. Iridis latifoliae purpureæ siue cæruleæ cognomen dedit. Hanc Hispani, vel Lirio simpliciter, vel Lirio espannana, Cordubenses Lirius azules, appellant, hoc est, Lirium, ensiforme, & Lirium cæruleum. In Histor. verò post. vbi eadem repetit, Iridem bulbosam, latifoliam, siue primam vocat. In Plant. Icon. pag. 96. Poëtarum Hyacinthus latifolius, Iris bulbosa, Latifolia Hispanica Clusii. L. 50. T. 133.

Inuenitur in Lusitaniâ, Bæticaeque collium radicibus, non procul ab Anâ flumine sitis, & copiosè circa Antequeram & Cordubam. In Lusitania porrò Ianuario, in Bætica autem Februario florentem obseruabat Clusius, & eruebat, apud Belgas delata [Cordubâ enim ad amicos Belgas aliquos bulbos mittebat] nondum flores dederat, quom oclténio post inde discessit, ad Carthænem Maximilianum 2. profecturus, idcòque nullum semen obseruare potuit: in illis tamen, quas in Hispania eruebat, stirpibus, infimam partem pediculi, qui primum florem sustinuerat, & inter folia reconditam, in rudimentum longi triangularis capituli desinere conspiciebat, multa candida granula continentis: quo argumento adducitur, semen Aprilis aut Maio maturum istic esse posse.

Tom. II.

IRIS BVLBOSA TOTA VIOLACEA
vel cærulea.



Hic nucleatus bulbosus, non minus altum nobis caulem protulit, quàm Hispanicus Poëtarum Hyacinthus, pluribus utrunque foliis stipatû, paullo latioribus, insigniter tamen acuminatis, carinatis; & interna parte membranâ candidâ succinctis, foris striatis: flores binos protulit, alterum alteri succedentem;

Defcriptio

inferiore paullo ortu, ex vagina laxiore quàm Hispanicus iam dictus, nonnisi foliis similiter constantibus, sed extrinis repandis multo per omnem dimensionem maioribus, extrema parte fimbriatâ, modicèque fissâ, cæruleo-violaceâ, mediâque sui parte, pro villosâ fimbriâ maculam luteam oblongam minorem, quæque non per folii Costam, vt in Hispanico, decurrat, habente, à cuius lateribus Zonulae albæ virgatæ excurrunt, vbi verò arctari folium incipit. (quanquam internis altero rantum latius est Hispanico) per Costam totam punctulis cæruleis albidisque guttatam est, extrinsecus autem ferè virecens: hisce tribus totidem superposita sunt purpureocærulea; angustiora quàm in Hispanico, nec vt in illo appressa, sed interuallo satis magno recedentia, bifido nihilominus extremo, quibus subsunt ligulae, quæ repanda folia spectant, albo purpureoque virgatæ, altera parte violaceæ: tria tandem surriguntur violacea, angustiore ceruice quàm in Hispanico, sed latiore extremitate.

Hanc sic describit nostro iudicio Clus. n. post. Crassiore & latiore folio, ac veluti Cepaceo, viridioris, parte interiore carinato, siue striato, multisque quasi bulbis argenteis resperso: crasso firmoque caule, quem quaterna aut quina folia amplectuntur: binos ex vaginalis, vt plurimum, promit flores inuicem succedentes, interdum unicum duntaxat, nouem foliis constantem, violacei prorsus & elegantissimi coloris, interdum dilutioris, inodorum tamen, quorum tria maiora sunt, ad terram inclinata & prona, vt in vulgari Iride, & laborum instar propendunt, tria alia angusta & extima parte bifida, alataque iis incubunt, v[el] que ad luteam maculam [quæ maioribus pro fimbria est] pettingentia, tria alia surrecta, supremâque parte latiuolenta, infima verò valdè angusta; floribus succedunt trigona laxâque capita: quibus semen rugosum, fuluescens, Erui magnitudine, quod maturum, in capitibus crepirat, si moueantur: radix magna plurimis membranis tenacibus, nigricantibus circumuoluta, intus alba, & sessili parte fibris prædita, quæ singulis annis nucleos circa latera depõnit. hu-

N. n. 2

ius folia nouo Vere demum germinant.

Est hæc Clus. Hisp. Iris bulbosa angustifolia purpur. Et hist. post. Iris bulbosa violacea siue 2.

Lobel. Ic. Pl. p. 94. Hyacinthus flore Iridis Theoctiri & Poëtarum, in Anglia proniciens Lobel. 48. Aducl. 47. Teut. 10. Adu. par. 2. Iris bulb. sa Pyrenæa, quæ prouenit in Souton monte, Anglo-Britanica vocata minor, fortè eadem.

Quia verò Lobel. hanc Iridem primus Belgis communicauerat missis ex Anglia aliquot ad amicos bulbis, spontè istic nasci Clusius existimabat & in Angliam profectus anno 1571. frustra in agris & collibus requirebat, donec Bristolium quàm venisset, vbi Lobelium conueniebat, ab eo intelligeret, istic primùm illi innotuisse, ex hortis, in quibus colebatur, erutam, vnde Londinum amicis misisset. Verisimile, Hispanicis nauibus quæ plerumque Bristolium comabant, primùm istuc ex Hispaniâ aut Lusitaniâ delatam. Multos post annos eruditiss. vir Io. Venerius, Clusium Exor. app. 2. monebat, hanc plantam maximâ abundantia spontè nasci in Pytenæi montibus, atque anno à Christi natiuitate 1601. se inter multas myriades earum quæ cæruleum siue violaceum florem gerunt, vnicam plantam reperisse, quæ florem profusè niueum haberet: anno autem insequente, quàm denuò montes illos conscendisset, venutarum plantarum quæ in illis nascuntur conquirendarum causa, paucas similes reperisse scribebat, quarum vnam Io. Hogelandio, alteram ipsi Clusio mittebat. Ea præter expectationem [nam valde adflicta] anno 1603. binos flores tulit profusè niuei coloris, præter paruum maculam flavam, quæ vt in iis quæ violaceum colorem habent, terna repanda folia inficiebat illosque vt violaceos odoris expertes.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. floruit Iunio.

IRIS BVLBOSA VERSICOLOR

ΠΕΛΟΥΚΑΥΟΣ.

Descriptio



fastigio innati bini ex iisdè vaginis emergentes, quemadmodum in Secundo genere solent, alter alteri succedentes, in nonnullis etiam tertius: Alia, præferrim versicolores, latiflora saturatioris, præter geninos illos flores in summo caule natos, ex singulari vaginâ infra illos sita, & altera frequente, singulares produxerunt ramulos, teretes, geniculatos, sustinentes binas vaginas, è quibus emerferunt singulares flores, primariis non

minùs elegantes, & perinde odorati. Habet etiam anno 97. multas Iridis bulbosæ plantas, quæ quater nos flores tulcrunt.

IRIS BVLBOSA, CÆRVLEO & albo Versicolor.



Radix huic bulbosa, adnatis bulbis subinde se propagans, colore albo: caulem tollit ad cubitum vnum & dimidium, rectum, geniculatum, tenerem, cui folia adnascuntur, carinata, pellucida, argentea membranula intrinsecus obuelata, extrinsecus colore cælio

striato, quorum latera cis fastigium, quod perquam acuminatum vix dimidii culmi latitudine est nonnunquam, coalescunt: stus ex vagina glauca emicans, pediculo canaliculato infidet amoenus, nouem foliis Iridum more constans, quorum tria surriguntur, non tamen capitibus cœuntia, sed modicè distita, dilutè cærulea: his totidem alternatim intericiuntur repanda, quorum costa per longitudinem discurrens ex luteo viret (basis verò tum horum tum præcedentium lutea est,) extremamque partem, quæ latior & ferè rotundata, magisque terram versus reflexa, albam possident; loeque supercillii amula fimbria, crocea decurrit Zona ad ipsius vsque folii cum pediculo commissuram, à cuius lateribus interna parte obliquè lineæ purpurascens excurrunt: atque hisce quidem tribus totidem incumbunt folia, ex albo cærulea, exactè zonam cum virgatis lateribus obtegentia, eoque donec repanda folia dilatari incipiunt, ibi verò zonæ luteæ finem denudantia, bihda extremitate, introsum reflectuntur, quibus subsunt singulis singulæ occultatæ ligulæ, quæ repanda folia spectant lutea: quæ verò postrema hæc, albida.

Hanc ni fallimur, sic tradit Clusius: Ei quinque aut sex sunt folia angusta & tenuia, cubitalis longitudinis, internâ parte striata & candidantia, externâ autem rugosa, viridis cum cineraceo cœmixti coloris, caulem amplexantia cubitalem, interdum etiam maiorem, nodosum, vnicum plerumque florem, rarò binos, è membranaceis vaginulis profertentem, Iridis angustifoliæ floribus forma similem, &c.

Tertiam hanc Iridem Clus. in Hispan. bulbosam angustifoliam flore vario Hisp. *Liris illyric.*: In post. verò Historia, Iridem bulbosam tertiam siue versicolorem appellat. Plant. icon. p. 96. Hispanicus Poëtarum Hyacinthus. Iris bulbosa angustifolia flore vario Clusii, Lob. 48. Teut. 10.

Copiosam habeo in horto Ill. E. C. Montbelgardi,

gardi, habetur etiam Stuttgartie: florēt Iunio: eādem attulit Gener Romā ex hortō Ill. legiti Hispani, à Coruino Belga eiusdem Pharmacopœo experientissimū alia plura. Sæpius nobis prouenit ex semine fato primo anno viticum profrens florem.

IRIS BVLBOSA LVTEA.

Versicolori per omnia ferè si milis (inquit Clus. in Hisp.) Iris bulbosa angustifolia luteo flore, cui



à floribus colore, flauæ, siue luteæ cognomen invidi, quàmque Lusitanii *reyllibues*, vocabat: In port. verò Hisp. iris bulbosa 4. siue lutea: breuiore tamen est caule, gracilioribusque & ex viridi pallecentibus foliis: flus viticus interdum bini, contractiores, latiores tamen, ex vaginulis summo cauli

inherentibus prædeunt, lutei coloris, in odori, mediæ inter secundum & tertium genus magnitudinis, quemadmodum & *siliquis*, seu caput trigonum, in quo semen superiori simile continetur: radix tertii generis radici similis, quæ nucleis, non secus ac illa, propagatur. Sed hæc in flore quandam etiam differentiam habet, licet exiguam: nam inuenitur latiore aliquantulum, saturatioreque & magis rutilante auro colore, radice item breuiore, & crassiore, membranacea præterea illa vagina, vnde primùm folia emergunt, sanguineo colore, à summis vaginæ oris in inferiorem illius partem radiatim desinente, magis infecta est, quàm illius, quæ dilutiore est flauo colore: nam illa interdum sanguineo hoc colore caret. Vtriusque autem, quemadmodum & Ternæ, folia ante hiemem germinare solent.

Lobel. Icon. Pl. Hyacinthus Poëtarum luteus, Lob. 49. T. 32. Cuius in par. 2. Adii. aliquot tradit species.

Nascitur (inquit Clusius) pingui solo, & petrosi collibus ad Tagum sitis, supra Olympionem, vbi eam eruebam Decembri Anno 1584. cū aliquot aliis rarissimis stirpibus, & inde ad amicos in Belgium mittebam. Florēt tamen paulò maturius Tertio genere, eodem ferè quo secundum tempore: breui tamen se mutuo consequuntur, & interdum simul florere conspiciuntur.

IRIS BVLBOSA CÆRVLEA LVSTANICA.

Quinta (inquit Clusius) Iris bulbosa, mihi primùm conspecta Lugduni Batavorum. Nihil verò ea differt caule, foliis, & forma floris,

ab Iride bulbosa, cuius flores versicolores, foliis floris color diuersus est. Nam nouem, vt ille, foliis constat, quorum terna inflexa & terna spectantia, cærulea, n. habent colorem, venis saturatioribus à mediò folio, in latera excurrentibus distinctum, & ab illo ad vngue. vsque, maculâ flauam satis latam, mediū n. folium per longitudinem secantem: terna illis incumbentia & gibbosa eiusdem etiam coloris, paulò tamen uittioris: tria sarrecta folia in igit saturata, odor parè florū Tilia: binos autem, ternosue in eodem caule fert flores, qui reliquarum Iridan bulbosarum floribus magis sunt ferotini, iisque marcidis demum apertur sub initium Iunii. Floribus succedunt triangula oblonga *capita*, vt in versicolore Iride bulbosa. E Lusitania porrò hoc Iridis bulbosæ genus, paucos ante annos, primùm in Belgicum deferretur. Sequente autem anno, è tribus bulbis ab amico acceptis, vnus florem longè elegantiore iam descripto protulit, amphioribus labris nempe constantem, tribusque foliis sarrectis latioribus, gibbis etiam amplioribus, totumque ad eò florem multa saturatiore purpurâ nitentem, & magis expansum, idem tamen qui in altero odor: caulis præterea circum nodos, quibus folia inherebant, ex purpurâ nigricabat. Hæc quam mihi spontè nascens non sit obseruata, nullam nomen vulgare intellexi sed qui hortorum cultu delectatur Barau, Lusitanicæ cognomen dederant. Omniū porrò istarum florib. illius præsertim quæ vario est flore (quia vt opinatur Clusius, rosicidum quædam succum in lateribus exsudant) formicæ mirum in modum sunt infecta. Præterea omnium istarum, tam illarum quarum mentionem fecimus, quàm subsequencium, flores marcescere iâ incipientes, hanc peculiarem notam habent, quòd minutorum vngium instar contrahantur: quod etiam aliorum Iridis generum floribus euenit.

IRIDIS VERSICOLORIS CLASSIS

2. Clusio.

Sunt, auctore Clusio, alie Iridis bulbosæ species non ex quidem aliunde inuictæ, sed semine apud Belgas nate, quarum historia præmittenda non videtur, eamque ob causam, superioribus subnectendam esse existimaui.

Prima igitur versicoloris quoddam genus est, à superioribus diuersum, non foliis, caule, aut radice, his enim cum Tertio aut Quarto genere conuenit, sed floris colore: quia tria eius folia ad terram inclinata, siue labra, flaua sunt, & Quarti generis foliis propendentibus liliorum instar terè simili, magnâ tamen aureâ maculâ in prominente & reflexo labro insignita, ad quam infimo folii vngue intrinsecus excurrunt aliquot venæ quodammodò purpurascèntes: tria autem gibba & illis incumbentia, dorso & alis pallent, lateribus candicant: tria verò sursum erecta, ex albo subcærulea sunt, hoc est, albicantis sunt coloris, quem subcæruleæ saturatiore vel dilutiore venæ distinguunt.

Alterius terna inflexa folia pallent, & labrum habent flaua maculâ insignitum, a qua ad vngue vsque angustiora sunt, vt in cæteris generibus, & interne quibusdam venulis purpurascèntibus distincta sunt: tria gibba folia ligulam regentia *αχρηδον* sunt coloris, vel albicant, summo ramè

gibbo pallefcence : terna furrecta exalbida funt, neruus tamen per longitudinem excurrentes flauelcit. Vtriuſque flores odorati, Tertii generis ſupra deſcripti florum inſtar: radix etiam non minus quàm in illo ſecunda producendis nucleis. Illas habui munere Ioh. Boiſſot anno 1586. quadriennio verò poſt, tres alias communicabat, quæ inſequenti anno hos flores protulerunt.

Prior quæ erit illius Tertium genus ab ipſo acceptum, latiore, breuioreque ſuit flore, cuius terna inflexa folia, lato & propendente ſunt labro, mediâ aureâ maculâ (quam albus orbis ambit) inſignito, per oras eriſpo, cærelei coloris, à maculâ autem vſque ad vnguem folii, extenditur neruus extrinſecus viſcens, intrinſecus pallidus, multis purpureis venis in latera excurrentibus, tria gibba alataque folia purpurafcentis ſunt coloris, gibbus albicans, alæ cæreleæ, tria ſurſum erecta folia, ex cæreleo purpurafcent.

Alterâ, ſiue eius Quarta, florem habuit, cuius terna folia terram ſpectantis, flaua ſunt coloris, aurea maculâ labrum occupante, à quo ad inſimos vngues: interiore parte ſparſæ ſunt quedam venæ dilutiùs purpurafcentes: folia iis incumbentia exalbida ſunt, præter medium neruum ad extremum folium excurrentem & gibbum, qui pallidi ſunt coloris, furrecta terna folia, inſimâ parte ex cæreleo purpurafcentibus venis ſunt diſtincta, ſuperâ candicant.

Tertia ſiue Boiſſoti Quinta ſlori, terna incurua ſiue inflexa folia, prout lactei candoris fuerunt, præter maculam illam medio labro impreſſam, quæ aurei coloris erat: gibba præterea folia illis incumbentia, alba fuerunt, vt & terna erecta, exceptâ illâ inſimâ parte circa vngues, quæ tenue quidpiam ſubcæreleum habere viſa eſt. Odorati etiam hi flores erant. Ex cuius generis ſemine natæ ſunt hæ varietates, nihil ad me perſcriptum, nec forſitan quiſpiam tam exactè obſeruaui: odor tamen qualis in Verſicolore illâ in Tertio genere ſuprà deſcriptâ, me in ſuſpicionem adducit, ex illo originem lumpſiſſe.

IRIDIS BVLBOSÆ VERSICOLORIS clalli tertia Cluſio.

QVas [inquit Cluſius] Irides bulbofas ptimè Flauæ-Variæ à Boiſſoto primùm mihi miſſæ, femine ego tactus ſum anno 1590. duobuſque illum ſequentibus, ſubiiciam.

Vna, quam F-V. hoc eſt Flauam-Variam maiorem, & omnium elegantiffimam meritò appellare poſſum, caulem non minus altum habet, quàm Tertium illud genus verſicolore flore à me tertio loco deſcriptum, videlicet cubitalem aut ampliorem, folia latiora & breuiora, media ſerè inter illius & Secundi generis folia, florem majuſculum, cuius terna folia inflexa & terram ſpectantia lucei ſunt coloris, & aureâ maculâ in medio labro inſiguntur, oris quodammodo purpurafcentibus anguſtiore foliorum parte quæ gibbo integitur, intrinſecus multis ſubpurpureis venis in latera excurrentibus notata: gibba & incumbentia folia diluto purpureo colore ſunt prædita: tria erecta valdè laturâ purpurâ nitent, & quaſi violacea ſunt, præſertim medius per longitudinem extenſus neruus.

Alterâ etiam F-V. & latiflora, ſed paulò hu-

milior terna ad terram inflexa folia flauæ coloris habet, aureâ maculâ inſignita. à quâ, ad inſimum folii vnguem, multis purpurafcentibus venis interiore parte ſunt diſtincta: gibba folia quodammodo purpurafcent, neruum tamen ſubflauum habent: tria folia erecta, purpurei ſunt coloris.

Tertia F-V. floris forma eadem, & terna illa folia inflexa flauæ coloris, aureâ maculâ inſiguntur, quâ verò parte biſidis & gibboſis illis foliis integuntur, radiis obſoletè purpurafcentibus diſtincta ſunt: furrecta terna folia ex cæreleo purpurafcent, medius autem per longitudinem excurrentes neruus flauelcit eſt coloris, & tria alii incumbentia, obſoleti, cui flaua quidpiam permiſtum eſt.

F-V. Quarta, etiam latiflora, terna inflexa folia pallida habet, aureâ maculâ inſignita, quâ autem parte camerato folio integuntur, purpurafcentibus venis ſunt diſtincta: gibba folia, etiam purpurafcent: tria verò erectiora folia, cæreleum habent colorem.

Quinta F-V. quæ anguſtiflora eſt, tria ad terram ſpectantia folia, flaua ſunt, aureâ etiam maculâ medio labro inſignita; & incumbentia illis folia candicant, neruus tamen eminentior quodammodo *ἀρχαῖος* ſurſum aſurgentia folia exalbida ſunt, inâ parte ſubcæreleis quibuſdam venis leuiter diſtincta.

Sexta F-V. etiam anguſtiflora, & humilior, non valdè abſimilem matri, hoc eſt, Primæ à Boiſſoto miſſæ, habuit florem: ſed quibuſdam notis ſecundæ ab ipſo acceptæ reſpondentem, vt mediâ quedam ſpecies inter vtramque cenſeri poſſit.

Latiflora eſt, & elatior Septima F-V. cuius inflexa folia habent latiora labra, flaua coloris, aureâ maculâ inſignita, quâ verò parte gibbis foliis integuntur, ad vnguem vſque, interius ex cæreleo purpurafcent: gibba & alata folia etiam purpurafcentis ſunt coloris, gibbo tamen dilutiore: furrecta folia latiuſcula ſunt, & illis magis purpurafcent, cærelei que quidpiam admixtum habere videntur.

Humilior, latiflora tamen, eſt Octava F-V. cui terna terram ſpectantia folia flaua ſunt, aureâ maculâ maiuſculâ notata, internâ parte quæ cameratis biſidiſque foliis regitur, purpurafcentibus radiis in latera excurrentibus diſtincta: gibba criſtataque folia, purpurei cæreleo comixti ſunt coloris, ipſo gibbo ex purpura flauelcente; erectiora folia, cærelei purpuræ permixti ſunt coloris.

Anguſtiflora, ſed humilior etiam, eſt Nona F-V. cuius trium foliorum terram ſpectantium labra longiora ſunt & pallida, oriſque aliquantulum purpurafcentibus maculâ aureâ longiore inſignita, reliquâ parte biſidis foliis rectâ, internè purpurafcente, præter medium neruum qui aurei eſt coloris, foris ex viridi palleſcentis: gibba cum ſuis criſtatis foliis, purpurea, gibbus paulò dilutior: furrecta terna folia, purpurâ ſaturatiore nitent.

Decima cuiusdem ſerè altitudinis eſt cum ſuperiore, cuiusque terna folia ad terram prona, palleſcente ſunt labro, breui flauâ maculâ in longos radios deſinentem inſecto, anguſtior folii pars foris viſcens, internè viridibus venis prædita: alata & biſida folia, exalbida ſunt, ad *ἀρχαῖος* colorem tendentia. gibbus palleſcens: terna folia quæ ſurſum atolluntur, alba ſunt, medio neruo circa vnguem palleſcente.

Vndecima, eadem quidem forma, sed dissimilis prorsus color: nam terna inflexa folia alba sunt, flauâ tamen maculâ insignita: gibba his incumbens, purpurascunt: tria sursum erecta purpurei, seu violacei sunt coloris: breuiter non mulsam abfimilis est Angustifoliae versicolori satura, in prima classe.

Media quodammodò inter Latifloram & Angustifloram est Duodecima, eaque elatior, labris etiam foliorum terram spectantium ex albo purpurascens, aureâ maculâ notatis, quæ medium etiam folium per longitudinem secans, ad infimum vsque vnguem angustior protenditur, eius latera interius saturatoribus venis purpureis distincta: folia cristata & bifida illis incumbens, diluti purpurei, & quasi ad rubedinem tendentis sunt coloris, gibbo paulò magis saturo: similis panis coloris sunt surrecta folia, eorum tamen vngues aliquantulum saturiores. Istarum porro omnium flores odorati sunt, & Tertii generis floribus versicoloribus odoris gratia respondent.

Et hæc quidem summe sunt differentia Iridum bulbosæ radice præditarum, quæ mihi semine F. V. primæ Boissiori natæ: alia tamen etiam natæ, sed quarum colores proximè ad istarum colorè accederent: propterea minimè huc inferendas putau.

Illud præterea in istarum Iridum plantis semine natis obseruabam, plurimarum vaginam illam initio emergentem, quæ ut in primo descriptis exeunt folia, rubri siue laugini coloris radiis esse affectam, non secus ac Quarti generis primæ speciei in prima Classe vaginulam.

Sed & Decimum tertium genus semine mihi natum, quod florem demum tulit anno 1594, quadriennio videlicet postquam semen telluri creditum. Cubitali verò assurgit caule, nodoso & geniculato, instar aliarum Iridum huius generis, quem ambiunt longa & angusta folia, carinata ut in superioribus reliquis: tummus caulis sustinet florem reliquis formâ similem & nouem foliis constantem, sed colore diuersum: nam terna maiora labro propendete prorsus cærulea sunt, tumte maculâ aurei coloris à medio labro ad infimum folii vnguem discreta, his incumbens, fornicatæq; & alata folia saturæ purpureæ colore sunt, ligulâq; tegût, terna surrecta, oblonga, angusta, saturâ purpurâ (cui rubedo leuis admixta) nitent: odor tenuis, nec ad eas quæ versicoloris sunt flore suauitate accedens: capitula trigona longaque instar capitum versicoloris, quæ tamen nullum semen tulcrunt: radix bulbosa vt reliquarum Iridum bulbosarum, pluresque nucleos ad latera generans. Flovit primo anno circiter quindecim dies ante illas quæ cæruleo & flauo sunt flore: altero cum istem, Iunio videlicet. Huic prorsus similem Hispani accipiebant anno 1596. ab eruditiss. viro D. Simeone de Touar Hispani Medico, vt ex eius flore, quem insequentis anni Maio dedit, obseruare potuit: an verò semine ipsi nata esset, aut aliunde missa, nihil adscriberebat.

Superioribus annis vt antè dictum est, in Flatae Iridis bulbosæ semine natis plantis nullam varietatem obseruaueram: at anno 1597. cum in hæc, tum aliis insignem varietatem habui. Nam anno 1593. scorsim in diuersis puluinis Flauæ, Albæ, F. versicoloris semina terræ commisi sub finè Nouembri: nata ex iis plantæ nec loco moræ, quarto post anno flores protulerunt: ex Flaua quidem, aut flauos prorsus, aut flauos quorum

surrecta folia aut pallesbant aut exalbida, vel cærulea erant, vel fuligine infecta cum fornicatis foliis: ex F. versicolore autè, flauos, flauos item quorum surrecta folia alba erant, vel initio labra habentes flaua aureâ maculâ insignita, deinde flauus ille color maculam ambiens cæruleum colorem prorsus contraxit, folia fornicata & surrecta saturâ purpurâ nituerunt: vel etiam alios illis persimiles, quorum tamen flaua labra oras auream maculam ambientes habuerunt versicentis ex cæruleo coloris, & alios matri similes: ex Alba verò pallidos, surrecta folia alba aut exalbida habentes, aut ex cæruleo purpurea, aut matri propemodum similes. Quam varietatem produciunt reliquæ plantæ illis seminibus natæ, in dicabit dies.

Idem Exot. par. 2. App. ait. Ceterum ex Epistola quam ad me dabat Venerius illo ipso anno quo Iridem illam niueo flore mittebat, varia alia Iridi bulbosarum genere ab ipso in Pyrenæis montibus obseruata fuisse intelligebam: quæ scripto comprehenderat, vt ad me mitteret exactam earum plantarum descriptionem: Verum, dum in variis illorum montium iugis, quæ panis sexagena descendit, perlustrandis erat occupatus, scriptum illud ipsi excidisse & periisse magno cum suo dolore: se enim non probè quenam inter illa esset differentia meminisse, cerò tamen se seire, viginti sex generum descriptionem fecisse: eam autem Iridem quæ flauam aut rubrum habet florem, in earum numero non comprehendi, quoniâ in illis montibus nullam similis coloris reperit.

*Ingeni Iridis
flam bulbosæ
varietas in Pyrenæis
montibus.*

IRIDES BVLBOSÆ ET ALBÆ.

Miro colorum incremento bulbosæ Lobelii Adu. par. 2. Irides, sat non secus ac Tulipæ præcoces satæ, semineque ortæ, albæ potissimum, variant, quæ insigni metamorphosi, colorum varias subeunt differentias: In bulbo alioquin folio, caule, ceterisque plantæ partibus discriminis perexiguum. Has differentias alunt cultiora D. Joh. de Franqueville nostræque vireta.

De Iridum bulbosarum viribus nihil comperitum habet, aut ab aliis traditum accepit Cluius.

SISYRINCHIVM VETERIBVS.

CAP. XVI.

ET hoc quodammodò Theoph. aut l. 7. c. 13. de Hist. Plant. ad bulborum genus redigi desiderat, quòd radice orbiculetur. Nam colore quidè penitus discrepat, candet enim, nec squamis constat. Huic peculiare datum est, vt ima [vna, Gaza legit] radix primò augeatur Hyeme, tam ineunte Vere, quod in imo excreuerit, contrahatur, supernumque crescat quod manditur. Radix (vt idem inquit de caus.) vt reliquarum generis eiusdem, dulcis est, partes verò superiores ex causa siccitatis insuaves & propemodum insipidae.

Post Theophrast. inter genera bulborum, quæ Græci fecere, Plin. l. 19. c. 5. Sisyrynchion numerat: perhibens, mirum imas Sisyrynchii radices crescere Hyeme: Vere autem, cum apparuerit Viola, minui & contrahi, tum deinde bulbum pinguescere.

Descriptio

IRIDI BVLBOSÆ AFFINE
Sisyrrinchium maius.

Descriptio



Irides bulbosas proximè, line controuersa, subsequi debet planta quædam flore Xyridis, minore rachen, & orbiculata, vt Xiphium, cuius duo genera in Hisp. peregrinatione à Clusio obseruata, Maius & Minus. s

Maius sic describit: oblongis angustisque foliis, mollioribus quàm Iridis bulbosæ folia,

& ad Allii aut Hyacinthi botryodis folia proximè accedentibus, striatis, viridibus, & humi plerumque sulis: rotundo, dodrantedi, striato, firmoque caule: qui ex multis inuolutis tanquam è vaginulis, flores promit quatuor aut quinque, alternatim prodeuntes, hoc est, vt primo marcescente alter succedat, deinde tertius, & sic deinceps, Xyridis potiùs florem referentes, quàm Iridis, ex nouem foliolis compositos, quorum tria vt in iam descriptis Iridibus bulbosis, deorsum inflexa, pro fimbriâ, luteam maculam etiam habent: alia tria sursum aliquantulum attolluntur: tria vero reliqua, quæ in aliis ligulam tegere solent, surrecta, summa parte diuisa & bifida. Est

Locus.

verò totus flos pulcher aspectu, coloris cærulei, præter maculas illas, & odore quidem præditus, sed valde fugax: floribus succedunt folliculi, vaginis quibusdam cutaceis inclusi, ad eò tenui membranâ constantes, vt semen rotundum, paruum, subrotundum, quod in illis continetur conspici possit: radix bulbosa, gemina, planta ipsa florente, & altera alteri insidens Xiphii modo, superior, plena, candida dulcis, edulis, & pueris exoptata, inferior [flaccida totam nimirum substantiam ad te trahente superiore, vt in Croco Xiphio,] & tandem euanescens cum inhaerentibus fibris: multiplici verò cortice reticulato, crasso, nigro integitur, Xiphii radicitus instar, & adnatis sese propagat: nam quinas, interdum etiam senas, aut plures plantas quarum singuli bulbi suo retiformi tegmine inuoluti erant, alio villosa capacioreque tegumeto simul compressis eruere nemini, in collium supra urbem Olyssiponem accliuatibus, apud suburbanum Magni. & Gen. viti Ferdinandi Corinho, equitis Lusitani, multis peregrinationibus in exterâs regiones factis, clari: atque etiam Gadibus, non procul à ponte, qui eam insulam continenti nunc coniungit: vnde eius bulbos in Belgium ad amicos mittebam.

Clus. Hisp. & hist. post. Sisyrrinchion maius, Lusitani Nozelhas (quasi Nucleas siue paruas nucas) appellant, quòd pueri istic eius bulbo perinde atque Auellanis vescantur, & in delitiis habeant. Plant. ic. p. 97. Sisyrrinchium Cordi & Clusii

Lob. 50. T. 133. Sisyrrinchium Cordi nobis, & bulbos sili. Fuchsi.

Floret vtrumque genus Martio, natali solo: sed apud Belgas Maio duntaxat: interdum etiam Iunii initio, idque valde rarò, vt pote quod altetnis vtrplurimum annis, duntaxat prodire soleat, imò paulatim plerumque contabescens, prorsus tandem sæpè numero pereat.

IRIDI BVLBOSÆ AFFINE
Sisyrrinchium minus.

SIMILE
Sest (inquit Clusius) præcedenti, minus tamè, gracilioribusque foliis: flores è vaginulis prodeuntes, colore superioris floribus similes, sed magis odorati; tenuiores etiam folliculi minore & exiliore semine pleni: radix icem minor, non minùs tamen, quam superioris, reticulato cortice recta, & gemina.

Sisyrrinchium minus, seu genus alterum, quòd Hisp. Lirio, nonnullis Maqueas dicitur, ad eum bulbum accedere videtur quem Theophr. 1. 7. c. 23. hist. nouèlyxii vel *maqueas* cognominauit. Crescit Valentino Hispaniæ regno, sed Murciano frequentissimum obseruabat atque eruebat Clusius, præsertim tribus leucis supra eius regni Metropolim, Murcia vulgò appellatam, quæ Veteribus Murgis, dicebatur, itinere Granatensi.

Ad ventris tormina (inquit Clusius) esse velle referebant incolæ sed deuotâ radice, illicòd corpus saltatione esse exercendum.

FLOS PERSICVS SISYRRINCHIO
congener.


Floris Persici [inquit Clusius Hist. post.] supremam caulis partem cum flore suis coloribus duntaxat expressam, anno 1594. Pragâ accipiebam ab Efaia le Gillon, meo fororis filio: pulcherrimus, summo cauli satis gracili & virefcenti innitens, & ex membranaceo inuolucro instar folliculorum, qui Iridum flores ambiunt, emergens, tribus tantùm foliis (si picturæ fides est adhibenda) constans, mucronatis, binas vncias longis, minimum digitum latis, dorso elatioris, cærulei coloris ad eò elegantis. vt cum centinella cæruleis floribus contendere possit: internâ parte ramosa quædam stamina in multas tenues fibras secta continere videtur rufi coloris, apicibus verò albis: infra illum addita erat alterius floris gemma suo membranaceo folliculo etiam inuoluta. Expressa autem fuerat hæc icon Constantinopoli à pictore industrio, de alterâ quam

quam pictor quidam Persicus è Persia attulerat, ubi nasci, & hanc vocari assererat. Constantinopolis verò esse ignotam hanc plantam. *Bolè* porro, Turcis florem significare, antè dicere memini.

IRIS VULGARIS VIOLACEA SIVE
purpurea hortensis & siluestris.

IRIS hortis nostris vulgarissima, radice per obliquum agitur crassa, rugosa, gustu acri consumptoque superfluo humore tandem odorata: caules cubitales & sesquicubitales, ramosi, teretes: folia vnciam lata aut latiora, rigida, striata, in cultratum mucronem aut gladii exētia: flores amœni, violacei, tribus foliis repandis, per oras infimas albo violaceoque variegatis, Costa interioris ad medium vsque folium crocatis apicibus villosa: totidem suriectis, obtusis mucronibus, & ferè rotundis, carinata inclinatione coeuntibus: intra quæ tria longè prædictis sex minora, diluore viola tincta, in summo fissâ, quibus posticâ parte totidem concolores fibræ, albicantibus apicibus apprimuntur.

Quandoquidem Cordus in Hist. sua nobis diligentissimè videtur Iridem vulgarem descripsisse, lubet eius descriptionem ubiungere, quæ ait: Iris quæ apud nos in hortis, vncis ac murorum coronis fertur, ab vno capite plura & erecta erigit cubito longiora folia, dura digitorum latitudine, recti uenia, inferioris in radicem capitibus consistēta, ceu ex omnibus vnum fiat, & sibi in nicem inserta, singulorum a-



perto & inciso ventre ceu carina alterius dorsum excipiente, superius verò ala modo in latitudinem explicata, & in mucronem gladii figurâ desinentia: è quorum medio caulis assurgit sesquicubitalis, rectus, teres, & glaber, veluti cinereo polline conspersus, facile abstergentibus cedente, quinque aut sex geniculis intersectus, ex quibus singula exeunt sine pediculo caulem amplectentia folia, inferioribus eò minora, quò summitati propinquiora: flores in summitate post medium Veris per interualla erumpunt, primùm conuolutis in turbinem membranâ, paulatim se in nouem folia explicantibus: ex his tria inferiora digitali sunt longitudine, circa exortum angusta, reliqua sui parte vncia multò latiora, deorsum inflexæ linguæ figura, foris liuidi coloris in cinereo, & iuxta principium viridia, intus verò purpurea, latis & lacteis venis se violalacco splendori miscentibus, maximè vbi versus exortum gracilescent: adhæret iis in interiori sinu inferioris lutei coloris & in longitudinem exprorecta lamina, oblongis pilis, hirsuta camp-

aliquam similitudinem referens: in summa totum folium Iridis omnes colores representat, vnde nomen inuenit, lanuginem cuiusque folii aliud paruum obteggit folium, in summitate in duas partes dissectum, ab utroque latere herbacei coloris, in medio liuido extante dorso: reliqua tria folia, & ipsa linguæ aut cochlearis formam habent, primis tamen latiora, & paulò breuiora existunt: & quemadmodum illa deorsum incuruata ascendunt, sic hæc sursum vertus reflexa iunguntur: color his est vtrinque in cinereo liuidus, quæ verò prioribus alterno posita adnectuntur purpuræ macula luteo colori insperguntur: durat ferè octiduum flos, deinde contrahitur, exciditur & decidit, inferioris oblongum, ac sexangularem folliculum reliquens, intus in tria loculamenta intersectum, in quibus rotanda sunt & oblonga femina. Radicibus nititur multis, inuicem in latitudinem sibi adnatis, dum digitorum crassitudine, geniculatis, in transversum striatis, per superficiem terræ sparsis, foliis modicè in flauo rubentibus, intus autem candidis, ex inferiori parte longas tenuisque fibras in terram agentibus, ex his aliquot, quæ adhuc nascuntur lutei coloris in fine aut capite existunt: grauitate tota herba, vt sambucus ferè, dum teritur, spirat, præsertim radix, quæ etiam gustata, cognitiui modo fauces exurit.

Siluestris Iris, inquit idem ordas, fatiua similis est, paucisque notis fatiua distinguitur, sicut Iris glaucæ minoribus & hyeme proflis non apparentibus, cum fatiua folia hyemis sequitæ cõtinuaciter resistant: eandem etiam quàm fatiua breuiorem fert, è quo flores ferè viginti diebus ante fatiua flores erumpunt, colore magis purpureo, quibus defluentibus, pollicari quantitate succedunt folliculi, sex lineis concauis in longitudinem striati, in maturitate tribus commissuris se aperientes, rotundo & cartilagineo femine pleni. Radicem habet digitali crassitudine, dodrante breuiorem, geniculatam, transversam à posteriore parte, singulis annis putredine tantum ferè amittentem, quantum ab anteriori parte ætatis capiti restituitur, nec fatiua in modum densum capitem constituentem. Sapore & odore atque aliis qualitatibus fatiua respondet. Nascentur editis & cliuosis locis inter arbuta: Liliolum Scheyber hense bey hellsch / quod omnium primò floret.

DE IRIDE VETERVM SENTENTIÆ.

IRIS [Consecratrix] Theophrast. passim ita delineante, odoratam adepta radicem: folium non vt Gladiolus, sed harundinaceum potiùs. Odorata autem radicis rationem calori in terra concluso imputare debemus. Verùm neque limosam, neque pinguem, neque lentam, glutinosamque terram esse oportet. Hac enim de causa Iris melior in Illyride, quàm in Macedonia est: in Thracia verò, ceterisque frigidioribus locis, ac minùs coctioni idoneis, odore penitus caret. Ager enim præpinguis, & humor multus & hyems vehemens prohibent. Tepidis tamen atque gracilibus minùs odorata creatur propter molliorem aëris. Floret & Consecratrix (Iris) ætate, & Lauaria dicta, flos aspectu pulcher, sed caret odore. Odoratorum igitur [quibus ad vnguenta vtuntur] in Europa, vt tractu frigido, nullum præter Irin inueniens, quæ tamen optima apud Illyricos exit: uon quidem parte mari-

Iris Illyrica cur me-
lior.
Macedonia.
Indora S.
bi.

Illyricis;

tima, sed mediterranea, magisque ad Septentrionem sita. Verum loci à locis differunt, ita vt producere meliorem possint. Non immeritò sanè ni reuerentia præstaret Nos in Theophrastum inuheremur, In Europa namque multa odorata proueniunt, Nardus Celtica, Phu, Asarum, & alia quæ hic recensere non statuimus. Finis Theoph. Guitus nullus ei accommodari nisi quod ablaqueatam soleant resiccare: radicula enim quas Thracia fert, videlicet quæ odore Nardo similes, & alia quedam paruum exilemque odoris gratiam habent. Virides enim aut nihil olent aut non æquè: siccatæ nimirum redolent vt Iridis radix.

Ille quoque non mittenda differentia est inquit Plinius lib. 21. c. 7.] odoramentorum multa nihil pertinere ad coronamenta: vt Irim atque Saliuncam, quanquam nobilissimi odoris vramque. Sed Iris radice tantum commendatur vnguentis & medicine nascens. Laudatissima in Illyrico. Et ibi quoque non in maritimis, sed in syluestribus Drilonis & Naronæ. Proxima in Macedonia longissima hæc & candida, & exilis. Tertium locum habet Africana, amplissima inter omnes, gustuque amarissima. Illyrica quoque duorum generum est, Raphanitis à similitudine, quæ & melior. Rhizotomos subtrusa. Optima, quæ sternumenta tractu (falsò legitur pro tractatu iuxta veteris manuscriptorum codicis fidem Cornar.) mouet. Caudem habet, cubitalem, erectum. Floret diuersi coloris specie, sicut arcus caelestis, vnde & nomen. Non improbatum & Pisidica. Et fossuri tribus ante uentibus multa aqua circumfusa, hoc veluti placamentum terræ bladiuntur, circumscripta mucrone gladii orbe triplici: & cum legerint eam, protinus in calum atcollunt. Natura est feruens, tractataque pustillas ambusti modo facit. Præcipitur ante omnia vt casti legant. Teredines non sicca modo verum & in terra celestimè sentit. Optimum antea Irim Leucæ & Elide ferebatur: iam pridem enim & feritur, nunc è Pamphylia. Sed Cilicium maximè laudatur atque Septentrionale.

Diosc. qui vnus duntaxat Iridis meminit, sic de ea disserit: Iris à similitudine arcus caelestis nomen habet. Folia profert similia Gladioli, maiora tamen & latiora ac pinguiora: Flores in caule æquali inter se distantia sitos, incuruos, varios. Aut (hic legitur Attico more pro 2. Lac.) enim albi, aut pallidi (ἀχρὸς Fuchf. vertit virides quam benè iudicent alii) aut melini aut purpurei, aut carulei conspiciuntur. Vnde ob varietatem caelesti Iridi assimilati sunt. Radices subsunt geniculatæ, solidæ, odoratæ, quas post sectionem in umbra siccitas, & filo transmissò reponere oportet. Est autem melior Illyrica & Macedonia: & inter has optima est, quæ densam radicem habet, & aliquantulum obrusam & ægrè fragilem, & colore subfuluam: & quæ valde odorata est, & gustu amara, & odore sincera, & non solum redolens: & quæ dum tunditur sternutationes mouet. Ar Africana colore alba, ad gustum amara, facultate secunda est. In vultuare verò teredines sentiunt, odoratiores tamen tunc sunt.

Matth. & Amarus scripserunt, se tum Antiquorum tum Recentiorum reperisse neminem, qui in simplicium medicamentorum libris, Iridis Astragalitis meminerit, idè quid certi hac de re proferendum, se non habere.

Ceterum Gall. lib. 1. de comp. med. sec. locos 8. ex Serano transcribens meminit Iridis, quæ cognomine Altragalitis dicitur.

Alibi quoque [lib. 10. & post eum Marcellus Medicus mentionem facit Iridis Chalcedoniæ & alio loco Iridis Illyricæ. Idem lib. 5. simpl. c. 2.]

Iris Græcum nomen (inquit Cornar.) apud Latinos retinuit, nostri ab odore *Dioscurus* vocant, vulgus Herbariorum Liliū caeleste, à colorum varietate quæ in floribus conspicitur, appellat. Sed quam idem vulgus intera Iris & Ireos distinctionem facit, iuxta vulgatum versum: Iris purpureum florem gerit, Ireos album, ea vanissima habèda est. At melini flores sunt, qui Cydonii colorem referunt. Illyrica Iris laudatissima est, post eam Macedonica, quam etiam Galenus lib. 7. *κερτὸς ἴριον* in Asclepiado quodam acopo habet. Sicut etiam Carthaginensem in quadam ther. lib. 2. de antid. recipit, quanquam eam quæ ex Libya magna sua ætate plurima afferbatur, tantum ab Illyrica deficere asserat quantum mortuum corpus à viuo: etiam si in aliis gentibus non ita multum Illyrica inferior reperitur. Sicut hodie de Italica & Gallica ac Germanica testari possumus.

Athenæus lib. 15. Deipnosoph. testis est Pliniū scribere Iridis flores Lupos nominari, quòd Lupi rictui librisque similes sunt. Iris radix autore Mesue simpl. purg. l. 1. c. 8.] est herba, quam *κερτὸς ἴριος* est Lilialem vocat author Græcus, cuius flos vel caruleus, ac verficolor, vt Iris arcus caelestis, vnde illi nomen, vel albus. Alterius radix vel optima est, si magna, dura, densa, crebrè genicularata, ex albo rubescens, odore ceu viola aromatico, sapore acris, & mordente. Veris initio collecta secundum bonitatis rationem flos obtinet, caruleus præsertim: albus enim ad omnia est imbecillior. Liliū caeleste, inquit Gorop. Iris est. Liliū Francis. Iris spei testera. Nimis audaces illi fuerunt, qui varia singularum herbarum nomina principis capitum in Pedacio adult. ademerunt. Corrupta esse pleraque fateor, vt in Iride factum, vbi legitur *ἴριος* seu ut Marcellus legi posse putat, *Talpida*. Quid clatius si legas *ἴριος* *ἴριος* *ἴριος* *ἴριος*. Iridem alii Elpida, id est, spem &c. Iris Iunonis dicta. Ternarii vis in Iride &c.

Iris siue Ireos siue Iridis in genituo casu profetas [ait Cord. in Diosc.] eadem est, quæ propter inepte, quidam tanquam diuersas distinguunt, Iris & Ireos. Est autem Iris Illyrica quæ radix quæ in pharmacop. Ireos & Germanic. *Dioscurus* appellatur: non quòd vere sit violæ radix, sed quòd odore violas imiteatur. Ea propemodum sola ab Authoribus cunctis aliis eius speciebus præfertur. Sed suas habet quibus ab Illyrica distinguatur notas. Est enim horribilior, odore inuencior, & multò maiore acrimonia gustanti molestior, fauceque grani Guiddii modo exurit, quæ propter caliditate quidem Illyricam plurimum superat: sed quantè hæc illa est superior, tantè etiam aromatica odore & sapore inferior existit. Vehementis quoque alium quàm Illyrica purgat. Est etiam in floribus differentia, siquidem nostra Iris purpuream fert florem, in arcus caelestis, colorem varietatem, vnde totum Iridis genus nomen inuenit. Illyricum candidam verò producit. An Cordus degustarit & viderit Illyricam virentem accipites heremus. Nostra enim Iris odoratior & siccata, ac siccatione multarum plantarum acrimonia & maligni-

Theoph. not.

Radix.
Illyrica
Macedonica.
Africana
Illyrica duplex.

Sternumenta mouet.
Pisidica
Cultigenda
superstitiosus modus.
feruore

Irim.

L
le
S
ra
In
no
su
D
en

Ca
ligni-

lignitas retunditur: illud etiam perpendendum an in Illyrica omnis Iris sit candido flore.

Placet etiam hic subicere descriptionem Iridis Tragi, ut Lectores considerent, an eandem cum Cordo intelligat: Iris (inquit ille), quae Gladiolorum omnium praestantissimi nunc censetur, radicem habet serpenteam ac contortam, quae supra terram potius quam intra humum conspicendam se praebet, nam primaria radix subter facet, nec humo contegitur, at radice illi adnata intra humum latent, à quibus candida & primaria radix nutrimentum recipit. Mox mensis inter folia quae gladii formam imitantur, caulis exit rotundus, florum vasculis seu calycibus oblongis & acutis conspicuus. His oblongis quos diximus calycibus maturitate ruptis, flos exit diuersicolor. Nam tria illius praecipua folia, ea parte quae versus terram inflectuntur, ex viridi & pallente colore diluta purpura, purpureis simul lineis, seu venis per hos ipsos colore ductis intus vero purpureo colores admixtis candidis, & puniceis lineis, media denique sui regione lutea lanugine supercilionum formam representante, emicant. His contraria tria alia in altum globi instar coacta sese attollunt, aequi coloris, ex purpura simul albicantis & lutei, non aliter atque reflexus splendoris auri fulgentis, aut cuiusdam admodum ex variis coloribus intertextis telae, Germani cum viderent vocant. In medio integri floris, tria alia foliola breuia, angusta, arcus caelestis instar, coloribus variis tincta apparent. Ex his quae de floribus Iridis Germanicæ diximus, colligimus illos nouem foliis, totidemque coloribus constare. Hi ipsi flores odoratissimi cum marcescere ac decidere ceperint, nullum post se velle semen, vel fructum (quod ego sciam) relinquunt: neque etiam passim hæc Iris, nisi plantata fuerit, reperitur. Ego namque omnes ferè Germaniæ regiones crebris, herbarum gratia, profectibus suscepit, perlostuati, nec vsquam locorum eam sponte nascentem inueni, nisi in altissimo quodam & graminoso monte non procul à Valentia arce sito, vnde euulsam in hortulos meos illam transtuli. Radix illius non perinde dura ac solida est, atque illius quam Genueensem dicunt, neque etiam aded odorata, licet feruentis sit saporis, & linguam guttata adurat, non minus quam peregrina, quo fit ut in plantis diuersas regionum magna constituat diversitatē. Quemadmodum enim frumenta & vina pro situ & locis natalibus ab inuicem differunt, ita herbae & radices pro ratione terræ in qua nascuntur, & cæli temperie, vel deteriores, vel meliores fieri consueverunt. Quanquam hæc nostra Iris, eaque quorundem vitium longè sit inferior, multum tamè affinitatis cum eadem habet, si formam & temperamentum consideres. Quapropter vocamus illam Iridem, non quidem Illyricam, sed Germanicam. Et alibi: Cæruleus verò, Gladiolus, radice, foliorum forma, caule denique ad Acori adulterinum ferè accedit, nisi quod flores huius [qui & ipsi tria folia sursum, tria alia deorsum vergentia, & in orbem pulchrè circumacta, obtinent] ex cæruleo colore purpurant, & nullo post se relicto semine decidunt. Dicimus insuper vtramque in caput 22. l. 4. apud Dioscor. collocandas, quo loco *Ἰρις*, quam nonnulli *Ἰριδία*, Irim syluestrem, Cacos, & Gladiolum vocant, descripta est. Quod si cui videatur *Ἰρις* [de quo alio loco egimus] vocandum, cum eo minimè cōtendendum existimamus. Gladiolus cæruleus Tragi, fortè idem cum Iride sylu. Cordi, id tamè

diligentiùs considerandum: nescimus cur ille non iunxerit Gladiolum suum cæruleum potius cum Iride quam cum Gladiolo flore luteo siue Pseudo acoro.

Iris nritur radicibus torosis, odoratis, & geniculatis, quas apud nos in Gallia (inquit Ruellius) adhuc exitu Veris terra erutas desiccant in orbes, & funiculo traiectas priùs, lixiuio macerant ad exhauriendam succi vim, quo tinearum iniuriis, quibus adhuc herentes sunt oportuna, minus pateant: dein siccatas recondunt. Perique curatas ad huc modum Iris taleas armariis induit, ut suo perquam iucundo odore vestes commendent: nec his præparandi Veterum vsus exoleuit. Inuenitur, inquit præterea, apud nos frequenter flos emaculati candoris, cuius radix cum Illyrica de odoris principatu contendit. Quod si vires quibus donatur radix libeat consulere, deprehendes quæ à Doctõibus traduntur, ad amissim respondere. Cum ergo tota Dioscor. pictura huic, quam Liliolum vocant caeleste, suffragari cognoscatur, eam esse Iridem nemo ibi inficias. Sunt qui pudendo errore aliam assignent herban recto, aliam casu paterno, ut Iris ab Ireos, tãquam purpureus color à niueo distingui putetur Herbariis. Verùm hæc opinio anilibus nugis adnumeranda, nec digna quæ esibetur, nec iam à pulchris & rudibus explodatur.

Quam vulgus inter Ireos & Iris distinctionem facit, ait Cornar. iuxta vulgarum versum

Iris purpureum florem gerit, Ireos album:

ea vanissima: Macedonicam Gall. l. 7. *Ἰριδα* habet, sicut etiam Carthaginensem in quadam theriacali lib. 2. de antidot. Iridem Raphaniticam Fuchii, Raphani quæ à similitudine Raphani sic est dicta, Gal. Paulus, Aëtius, Astragalitum, quod radix eius cum Astragali radice similitudinem habeat, vocant. Florentinæ quæ tantum Officinæ vtiuntur, Germanica non dissimilis sapore acri & mordaci. Iris in vniuersum fatiua & siluestris. Hæc duorum est generum: altera fatiua & vulgari similis, foliis ramen, flore, caule, radiceque paulò minoribus.

Iridem Illyricam noui præferri [inquit Martioli.] non quod genere vel specie à nostrate differat, sed quod cæli solique illius conuenientia præstantioribus pollear facultatibus. Satiua (ut à nostrate, arbitror) ex agrelli originem duxit. Sunt qui putent nullam Iridem domesticam reperiri, quod

scripserit Theophrast. nullum Iridum culrum accommodari. Sed si meo quidem iudicio decipiuntur, quandoquidem Theophrast. eo in loco non de omni in vniuersum Iride differit, sed de Illyrica tantum: quæ cum loci ac cæli clementia in Illyrico tractu optima spontè proueniat, non est necesse ut colatur. Præterea cum hodie Iris domestica passim in Italiæ hortis spectetur: silu. autem in pluribus montibus spontè nascatur, floribus & foliis fatiux longè minoribus, radice tenuiore, breuiore & aridiore, nulli quidem absurdum videri debet, si nos vtramque depingi curauimus. Sylu. plurima oritur in Goritiensi agro, Saluatino monte, & Iapidix collibus inter laxa, odore non ingrato, & in campetribus non longè à Sontii ripis. Recenti Illyrica destituitur. Sibi manifestè repugnare videtur Plin. quod lib. 21. c. 7. Raphanitem, quæ candicat, Rhizotomo quæ rufescit antepoluerit: c. autem 2. contrà, Iris ruffa melior est quam candida. Dioscor. præstat quæ subrusto constat colore. Cornarij Iridem Astragalitem & Astragalum idem esse existimar, quin & Plinio per Iridem Rapha-

Præparanda
di ratio in
Gallia

Raphani
Gal.
Astragal.
Florentina

Iris fatiua
vulgari.
Iris silu.
vulg. simi-
lia

Iris Illyri-
ca non dis-
fert genere
aut specie
à nostrate.

Theophr.
explicatur

Locus

Sylu. sua
spontanæ
sibi proue-
nit.
Illyrica de-
stituitur.

Iris Afragalus & Raphanitis non est Afragalus ut Galen. Cornar. Iris non meminit Gal. in simpl. Match notatur.

nitem Afragalum intelligi censet: verum ita Iridem Afragalitem à Galeno cognominatam esse putauerim, quòd radice refert Afragalum: quemadmodum Raphanitis à Plinio dicta est, quòd radice Raphanum representet. Iridem memoriæ proditam fuisse Galeno in lib. simp. med. nusquam reperi. Si *Iris siliu. Matthioli* tantum paulò minor est satia, & in eo tantum differt vt primò dicit, nulla opus erat figura, si verò, vt ait, sibi contradicens longe minor, icon parum eius demonstrat plantam. Quomodo scit an Iris Illyrica differat genere vel specie, si non virentem viderit & contulerit cum Italica. Idem in post. Com. lat. & Ital. cum magn. fig. Iris capitula edit oblonga Gladioli modo, crassiora ramem, in quibus semen concluditur rotundum Sesama magnitudine, quo fit vt si errore ducantur qui eadem nullam ferre semen contendunt.

Ireos Offic.

Iris cuius tantum radix à medicis commendatur, ea est herba, Amato hæc scribente, quam hodie officina sub nomine Ireos monstrant. Reperiuntur varii colores, in vnoquoque flore, candidi, pallidi, lutei, purpurei, vt plurimum cælestis, vt faciliè quis intelligere possit Iriam dici, non ob diuersitatem colorum in specie, sed in individuò porius. Quanquam non abs re esset quoque dicere, Iriam sic nominari, ob diuersitatem varietatemque colorum in specie. Quam Iriam quædam albos flores habeat, alia luteos, alia verò pallidos, nonnulla autem purpureos, vt Ferraria in horto Magn. Mirei Pii adnotauimus, & eas diligentissimis discipulis nostris indicauimus. Iud hanc sententiam verissimam esse, varia Diosc. Græca exemplaria attestantur: cui Plinius subseripit lib. 1. Natur. hist. cap. 7. quò dicit: Floret Iris diuersi coloris specie, sicut arcus cælestis, vnde & nomen. Ceterum Iris Illyrica, omnium consensu cæteris præfertur, & omnium est laudatissima, quanquam tamen in multis orbis, regionibus, minoris licet nominis nascitur: nempe in Hispania, Germania, Gallia, & Italia, quæ si non Illyrica, aut Mædonica, quibus primas & secundas Dioscorides adhibet: bona tamen censenda est, & eò magis quantò odoratior fuerit. Illyricæ verò, vt refert Plinius, loco à nobis citato dicitur sunt species, altera Raphanitis, ob similitudinem sic dicta quæ eius radix cum Raphano habet. Altera rhizotomos, quarum melior habetur, quæ ad subruborem tendit, vt in præsentì loco Diosc. tradit, à quo nec Plinius dissidet. Mat. Plinium (pergit Amatus) errantem ostendere nititur, quin tamen Matthioli ipse magis reprehensione dignus sit. Nam Plinius nihil quicquam à Dioscoride hæc in re variat. Plinium accusat cum innuere videatur, quod Raphanitis melior est Rhizotomo subrufa, adeò vt subrufam postponat non subruse, quam tamen Diosc. Iridem colore subrufo maxime laudet, & cæteris anteponat: At hæc tam parua sunt, vt paucis opus habeant responsis, præcipuè si literam legerimus, vt in codice antiquissimo ad hunc modum legitur: Illyrica quoque duorum generum est, Raphanitis à similitudine, qua & melior rhizotomos subrufa. Sic enim legendò omnis diluitur dubitatio. Nec enim aliud quam litera vna permutatur: vt faciliè loco, qua, perperam postea dictio, quæ, scripta fuerit. Sed esto phrasìs, vt in Frobenianis habetur codicibus: legatur, scilicet, Raphanitis à similitudine, quæ & melior rhizotomos subrufa, iudò contrarium, qui vel mediocriter in lectione doctrinaque Pli-

Iris Illyrica.

Defensio Plin. contra Matthiol.

miana versatus fuerit, depræhendet, quam dictio quæ, non refert aliud, quam Rhizotomos subrufa, quæ, & melior. Quod Plinius verò sic intelligendus sit, & quod cum Diosc. subrufam Iridem laudat, non aliunde comprobatum iri volumus, quam ab ipso Plinio, qui se ipsum declarat, & cum Diosc. subrufam Iridem laudat lib. 2. c. 20. quo Iridis profequitur iuuentur, dicens: Iris rufa melior quam candida: hæc Amatus.

Iris Illyrica figurà non differt ab Itala, nec alia in ea differentia cognoscitur, quam quòd tum Vere tum Autumno floret. Hanc autem plantam esse Hyacinthum Latinorum ex Palladio apparet &c. Quod ad verba Diosc. [pergit Anguill.] *ἴρις δὲ ἴρις καὶ ῥιζοτόμος* &c. ea non sunt vertenda vt quidam faciunt: Flores in caule æqualibus inter se spatiis distant, vt apparet sed verterem flores summo caule alterno situ &c.

Species [inquit in Antid. Med. dist. 5. cens. 11.] Iridis à Melue dictæ, passim reperiuntur: quarum radices in nostra Italia cum siccantur, ita nigrescunt & paræ deueniunt, vt vix præter corticem [si cum ipso cortice siccentur] quicquam de sua interiori parte seu alba odorata pulpa retineant: Si nec cortice verò, quasi ad nihilum rediguntur, cum siccantur. Quæ autem radices huiusmodi è plagis Orientalibus deferuntur decorticatæ, & siccæ, sunt carnosæ, & leues, tanquam si tunc recentissimè fuissent collectæ, quapropter nostratibus meliores indicantur. Huiusmodi enim plantæ, ferè omnibus notæ sunt. Quæ autem Illyrica dicitur, est species in Illyria, id est, in Sclauonia nascens, & est illa quam Diosc. meliorem esse testatur. Ipsa autem quam in nostro horto habemus, florem magis gerit quam Ireos, diuersi coloris, lineatum, viridem, huc cælestem, & rubicundum, vt est cælestis arcus, id est Iris. Folia enim exiliora, nec non & minores radices, sed virtutes [vt putamus] maiores, quam dictum Ireos habet. [Hæc Monachorum Iris Illyrica forte Matthiolystris minor.] Est etiamnum (præter præfatum) in Illyria & altera Iris, nostrati similis. Apuli vulgò *Spathulam* appellant, sed nõ fecidam, & à nonnullis *Lilialis* & *Lilium* dicitur. Quapropter quandoquæque Ireos reperitur scriptum, absolute scilicet, quod non significatur de albo, semper purpureum est ponendum. Et si haberi poterit de Illyrico administraretur: sin autem non, Orientale, vel nostras substituendum erit. Similiter quandoquæque reperitur scriptum Ireos, & non significatur de flore, semper radix intelligi debet. Folia enim [quod sciamus] non habentur in vsu. Item si queratur aqua Ireos, & non præcisè scribitur sublimata, semper succus radicis, vel saltem decoctio ipsarum (vbi deficiunt virentes radices) debet intelligi: (Idem censet Fuch.) Hoc etiam notandum in radicibus Ireos, scilicet quòd recentes quasi inodora indicantur, sicæ autem maximum & suauem spirant odorem.

Dodon. Gall. Iridis prima species; quæ licet duas proponat descriptiones satia: Iridis vnam tamen solummodò figuram exhibet: per primam intelligit Fuchii, ex quo de sumpta icon, Tragi & Match. primam quæ in hortis colitur: per secundam intelligit album profertentem florem, quam Iridem Florentinam vocat. Idem de Flant. Iridis species floris colore differentes complures esse Diosc. inuit, non in vno colore, vt Lacuna existimauit: sed in diuersis, vt testis est Musa, &c. Iris Matth. alia est satia eaque sel-

cæruleis vel niueis floribus. Cùm fatiua & siluestris in hortis reperitur, neque hæc opinor in illam cultu degeneret, specie eas differre existimandum est. Marthiolus in disquisitione loquitur qui simpliciter Illyricam ab Italica nihil differre dixit: Theoph. verba non intellexit. Iridem Apollonius ex Elide, ac Cilicia probat.

In Thracia ac reliquis locis frigidis & in Germania [ait Cronenburg.] odore penitus caret. In Officiis corruptè genitium pro recto vsurpant. Vanum quoque est, quod aiunt,

Iris purpureum florem gerit, Ireos album: cùm vna cadetque herba sit, licet aliunde inuenta, odorator habeatur: Qua gratia pulvis radicis cum armaris, & vestibus inspergi, non sine hilaritate, & eximia fragrantia consuevit. Sed dubitauerit hic aliquis quâ ratione istæ radices versute odoratiores fiat, cùm hæc quatuor sicca corrumpere soleat? Cui respondeo, id per siccitatem fieri, humore nimirum exhausto, ac veluti excocto, siccitas siquidem, autore Theophrast. odoribus contententior est, atque omnia in vniuersum odorata, eò inclinant. Hodie promiscuè Florentina & Germanica pro Illyrica malè vsurpatur. Herbarii Lilium cæleste nominare malunt. Biennium seruatur Mesue, aliis quinqueenniū. Iridem nostratam sine odore esse quis dicat? siccata enim suaviter olet, etiamsi macerata fuerit in lixivio ferente, quomodo solet à mulieribus fieri vt linteis gratum conciliant odorem: Florentina Iris vidualis non malè nobis videtur vsurpari pro Illyrica: potissimum pro ea quam obseruauimus aliquando vendi pro ea: vtraque enim radix non parum differt à Germanica, quæ siccata tota rugosa.

Ob coloris horum Iridis cælestis æmulam varietatem Priscæ Gæs hanc plantam Iridem vocauit, Græca nimirum origine, quibus vt annotat Lob. & Pen. *Iris*, etiamque *Iris spanya* & *spania* dicitur, id est, sacra, cælestis, arque admirabilis, qualem arcum fœderis post diluuium à Ichoua sancti narrat diuina pagina. Hodie cûctæ ferè Gentes deprauatè vocant, Germ. enim *Gilgen / Schwertel* / Flandri, Itali, Hispani Liliū. Galli etiam *Glareul*, propter florum cū Lilio & Gladiolo similitudinem. Quod idem vsu venisse Pœtis & imposuisse Historicis in Hyacinthis & Liliis dicitur. Multiplicem sortitur varietatem, non modò viribus sed etiam magnitudine, odore, & potissimum florum colore. Cuius multiplicis venusta mixtura, non modò in diuersis plantis, sed etiam in vniuersis duntaxat floribus spectanda venit. Elegantiæ siquidem hortensis amantes non modò purpuream (quæ vbiuis ferè Europæ ruri oritur, omniumque frequentissima visitur) sed etiam quasdam floribus candidis alunt, non item luteis vt quidam doctus putat.

Ab omnibus authoribus (si attestante Lobel. Ad. par. 2.) Iris Illyrica celebrata est & primum locum sortita. Florentina autem passim hodie nobis pro Illyrica obruditur, & pluris fit à mercatoribus quam Veneta, quia candidior & fragrantior: at tamen ex Illyria, hodie Sclauonia dicta, Iris Venetias deferri solet: quare Veneta, Illyrica legitima omnibus vno ore censetur: subrusti coloris, non candidi, etiam Plinii & Dioscor. suffragio, omnibus præferenda. Non multùm à Lusitanica biflora foliis differre licetis prodidit fidelissimus scriptor Clusius noster: pedali caule, raro ampliore, & flore Iridis Lusitanicæ forma, colore & odore persimili, paulò maiore

re tamen: radice nodosa, & gemulata, odoris dum recens est, ingrati, ac siccata satis grati, insipidi inibi gustus, postea tamen feruidi, faucibus ventris. Secundùm locum sibi vendicat Macedonica Plinio, longissima radice, tenui & albidâ: In quo quantum à Dioscor. differt & quomodo inter se conueniant fusè prosequitur: cui enarrando super se defusus, cùm iam ex aliis supra de hoc actum sit.

Iris apud Camer. hort. dicitur: Hyacinthus Virgiliti, Columellæ, Palladii, maxime secundum Anguill. In Illyria hodierno adhuc die eius floribus vtuntur in corallis quemadmodum Theophrast. & Athenæus quoque tradunt.

Tab. hist. & ic. Iris. Et Iris vulgaris 2. Iteia Iris sila.

Casp. Bauhin. Phyt. Iris. 1. siue vulgaris cærulea, variat colore floris vel cæruleo vel purpureo, cæruleo obsoleto, cinereove. Iris 5. siue sila. maior, quæ fatiua vulgari similis. Iris sila. Marthiol. in folio Lat. pag. 17. & Icon. 4. pag. 2. Irid sila. maior. Item Lacunæ. *Non separo* has tres Irides Tabern. quia non indicat discrimen. Marthiol. autem dicit sila. fatiua paulò minorem. Iris cærulea vel purpurea, alia vulgarior est obsoletioris coloris nec tam grandi flore, foliis & radice, nec etiam tam odorata hæc quàm sequentes. Iris domestica flore cæruleo quæ ab Illyrica non differt nisi quòd Illyrica sit odorator & bis floreat in anno. Cæterùm, falsum id esse comperimus, quod Adrian. Spieg. placet, Iridi nēpe florem esse sine fructu. In aliquot siquidem Iridibus fructum vidimus.

Iris. *Iris*, *spania*, *spania* ab admiranda cælestis arcus millecoloris imitatione, *spania* dicitur Galieno: *radix Illyrica*: sic enim legit Hadrian. Lun. apud Dioscor. pro *udens*, lubrico errore in scriptura Λ , quod geminatum fit M. Al. *Blaw gils gen / blaw schwertel / Violwurtz / himmelschwertel*. Belg. *Lisch ouerzer* Gall. *Flambe, Glazyeul*. Ital. *Gigito ozurto d' celeste*: *iros* & *tride*. Hisp. *Lirio cardeno*.

Incipiente foliorum defluuio colligendas radices docet Dioscorides. In sine Veris Iridem colligit Crescent. & siccat, perque duos annos seruat. Irim Illyricam parua & tenuissimam plantat Constant. ex recentibus plantis Ianuario vsque ad Aprilem mensem: Vulgarem & omnium ritissimam Iridem in omnibus, quas Clus. adiit, Prouinciis obseruauit, vel hortis, vel muris, aut etiam interdum rectis innascentem. Natalitiis gaudet non admodum feruidis vt Aphricæ, neque ita frigidis vt Septentrionum: sed in montosis temperatis & riguis, cuiusmodi ex Hispania hodie valdè odoratam laudatissimam ferunt, & ad fluminum crepidines canit Nicander Neronianam Illyricæ non maritimæ, sed Septentrionalioris & riguæ à flumine Macedonia, sic vocato.

Transtuli in hortum Ill. E. C. vbi non solum Vere floret, sed interdum Autumnno. Monspelii obseruauit florentem mense Martii & Aprili: In Italia non longè à Verona copiosè spontè ad sepes prouenientem: Florentinæ & Lugduni: magna copia à *la roche* in hortis florentem Aprili. Genouæ & Basileæ in hortis florètem Septembri anno 1571. Prouenit in vicinis montibus radice etiam odorata, unde mihi allata per D. Petrum Turherum Medicum Anglum. Audio abundè prouenire in Munchstein.

Vis omnibus excalesfactoria, extenuans, contra tussim efficac: humorosa qui agrè eiiciuntur,

crassitiam digerunt, vel attenuant: bilem, crassamque (crassa & cholera Plin.) pituitam ex hydromelite drachmis septem epota purgant. Solum conciliant, lachrymas ciunt, torminibus medentur. Eadem, pota ex aceto serpentium [& areanorum Scorpionum, in pane vel aqua addit Plin.] iustibus auxiliatur, lienosis, conuulsis, perfrictionibus, horribus, & quibus genitura [genituras absunt, Plin.] effluit. Menses ex vino pota pellunt. Decoctum earum fumarum fortibus vitiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaque in eis venarum spiracula, ischiadicis (& lumbis cum resina illinitur Plinio.) infunditur. Fistulas ac sinus carne explet [sarcotica est.] Radices ex melle glandis (glandis modo, scitè collyrii modo, ventunt) modo subdita partus extrahunt; quinetiam cocta & illita strumas veteresque duritias emolliunt. (Succo duritias omnes emollit. Plin.) Sicca quoque ulcera replent & cum melle purgant (capitis præcipue suppuraciones veteres.) Nudata ossa carne operiunt. Doloribus capitis cum aceto & rosaceo magna cum vtilitate illinuntur. Ad mota cum albo veratro, & duabus mellis partibus, lentiginis & vitia cutis in facie à Sole contracta emaculant. Pessis, malagmatis, & acopis inferuntur. In vniuersum, magni sunt ad omnia vsus.

Diosc. ergo & Plin. naribus subductam sternutamenta mouere tradunt. Sed hic (inquit Cornar.) subdita pro subducta falsè legitur: quod vitri etiam in aliis locis occurrit, velut alibi indicatur.

Addit Plin. Infantibus eam circumligari salutare est. Dentientibus præcipua est, in carumque vitio laborantibus instillata. Contra canum morsus ex oleo imponitur, & contra perfrictiones; sic & neruorum doloribus. Dolori capitis cum Coroneis Malis aut Struthis illinuntur. Crapulas quoque & Orthopneas discutit. Vomitiones cit duobus obolis sumpta. Ossa fracta extrahit imposta cum melle. Ad paronychias farinam eius vtuntur. Halitus oris commanducata abolet, alarumque vitia. Sedis rimas & condylomata, omniaque in corpore excrecentia sanat. Ex eo quod constat Iridem calidam & siccam ac tenuium partium, amarumque cum aliqua tamen dulcedine esse, concludit Galenus, eam vrinæ & menses prouocare, bechicum esse medicamentum, pleuriticis, peripneumoniacis ac purulentis congruens: conferre item comitialibus spasmodis, palpitationibus & tremoribus; ut & sinuosa ulcera carne implere, purgareque: lateris, iecoris, lienisue dolores sedare, vt & capitis: nec non genitura profluuio congruere & ad vteri fomenta.

Iris calefactoria & multum tenuium partium est [attestante Paulo] extergitque ac concoquit. Ad tussim itaque conducit, & humores in thorace eductu faciles efficit, & tormina sanat & ulcera fordida purgat. Pota verò cum aqua mulla alium euacuat.

Radix (vt nobis autor est Mesue) est calida sicca ordine tertio, acris: terget, coquit, resoluit, lenit, aperit obstructa, sedat dolores, pituitam crassam, & mistam illi bilem purgat, ac præter hæc aquas serofas, idque clementer. Materiam crassam, lentam, hærentem in thorace, ac pulmone, coquit, tenuat, ac promptè educit, visceraque omnia expurgat. Hepatis quoque ac Lienis, & vicinarum partium tollit obstructiones: affectus ab ea excitatos, hydropem, dolorem, tumo-

rem, duritiem, & similes sanat aut lenit. Omnes quoque tumores etiam duos, & strumas digerit, præsertim neruorum & iuncturarum maxime cum Betæ vel Brassicæ succo vel vino, & melle, & oleo chamæmelino. Cephalalgiam veterem sanat: præsertim cataplasmate imposta, & succo eius in nares attracto. Hic enim sternutamentum mouet, & per nares detrahit viam maximam excrementorum in partes alias, per meatus occultos aliqui defluxorum. Succus autem ex ea vt absinthio extrahitur. Cum sapa autem tussim veterem ab humore crasso, lento, factam, multum iuuat, & ab eodem spirandi difficultatem. Vterum præterea expurgat. Pessis quoque supposita vel emplastro admota, vteri dolores sedat, menses euocat, abortum facit. Ulcera antiqua, sordida, putrida purgat, terget, carne proba implet, quali etiam ossa nuda vestit. Ischiadi salubriter aut clystere initur, aut emplastro imponitur. Os si colluitur aceto cui in cocta fuerit, dentium dolorem sanat, & rheumatismum sistit: supposita item hæmorrhoidas aperit. Inuitam feminis vacuationem sumpta cohibet. Succus eius cum farina fabarum & cinerum illitus, faciem expurgat, eiusque maculas deterget. Oleum denique Irimum neruos & iuncturas firmat, spasmus ex replectione, Cephalalgiam, dolorem hepatis, splenis, renum, vteri, iuncturarum, thoracis & podagrarum, pleuriticam, peripneumoniam, oblitum iuuat, cataractum coquit, somnum conciliat temporibus inunctum: aurium dolores instillatum auri, natium graueolentiam ipsis iniectione corrigi. Fit autem *Oleum Irimum* ex floribus Iridis, & radicem dimidio, vt rosatum oleum & violatum. Ne ventriculum lædat, sumatur ex mulla & pauca spica, vel cum sero lactis, melle, & Mastiche: ad affectus autem thoracis, & pulmonis, cum sapa, vt dixi, propinatur.

Gladiolus qui cæruleos fert flores [duce Trago] hoc tempore vtriusque corporis partibus adhibetur calidæ temperaturæ herba, & expellentis ac resiccantis facultatis. Radix lurci Gladioli altringit. Aqua cærulei Gladioli stillatitia pota aduersus omne genus veneni, ad febres ardentis tempore pestis facit, nec non ad incensum Epas, & pleuriticum morbum. Radix eiusdem vino decocta & pota hydropem expellit, menses grahit, & calculum renum stillicidio vrinæ auxiliatur, aqua eius radice distillata trium aut quatuor cochlearium mensura, aliquoties per diem pota vsu gratiores est, sed in expellendo ea mala quæ recensimus non perinde efficax. Eadem tamen continuè & frequenter pota, obstructiones iecinoris soluit, vitia thoracis & pulmonis expellit, expurgatque, doloribus lienis & matricis ac torminibus opitulatur, aliumque soluit. In vniuersum magni ad omnia vsus est radix Iridis, nam non solum in vinum, & Ceruissam suspensa, hanc dulcem conferuat, illud verò iucundo cum odore, tum sapore commendat, sed & pistioribus ad parandum formentum triticeï panis magnoperè vsitata.

Præter vires quas illi adscribit Diosc. (si Martiolo credimus) aliis pluribus pollet, quandoquidem competum est, mansam oris halitum commendare: dentium dolores mulcere, si radicis decocto iidem foueantur: coquit item, abstergit, digerit, resoluit lenit, referat, expurgat, & dicitur: vulnerariis medicamentis immista sarcotica est. Radicis expressus succus bilem suam, pituitam, & aquas cutem subeuntcs pellit: hæmorrhoi-

rhoidas foru elicit. Radix ipsa contrita, & ex acero bibita, omnibus aduersatur venenis. Succus naribus infusus cerebrum à piruita mirificè purgat: ventriculo tamen nocet, cum per se rariùm bibitur: ideò quæ à peritis medicis exhiberi non solet, nisi ad nista mullâ & Indicâ Nardo.

Illyrica regio [ait Amatus] hodie Sclanonia dicitur ex qua hodie quoque ad nos Iris optima adfertur, quæ calida & sicca propè tertium gradum temperamenti locatur, & ex ea eclegma in Officinis contra pectoris vitia paratur. Nam rufi vilis est, & humores viscidos & contumaces extenuat: communis autem Iridos (nam Illyrica sicca ad nos defertur) succo contra hydrophem vitimur, non contemnendo profectò iuamento, vt curatione 23. Centuriæ primæ nostrarum curationum abundè diximus, vbi vnciam integram celestuarii è radice cum melle parati, pro alio subducenda propinamus. Imo & succi huius nostratis Iridis, ad vnciam vsque vnam, nonnunquam cum melle rosaceo colato, aliquando verò cum decocto Senæ, vel aqua mellis mixtam preberimus.

Nostratis succum, aiunt Aduers. Hydropticis propinant Medicelli (ex horum No. Wier. Obl.) freri quidam: incertum maiorène cruciatu an commodo ægros vexet. Exhibent autem, teste Fallopio, 311. aut 113. succi (radicis) Iridis, & educit aquam satis copiosam, sed tanto cum dolore vt sit mirum: ideò hocce remedio vti minime tutum, quamuis id commendatir Brassauola. Aquam distillatam è purpureis floribus Iridis cù speciebus Diatrionis anralon & Cinnamomo, vt efficacissimam in hydropticis commendat, teste Camer. Holerus & Gesnerus.

Ad Hydrophem valer succus radicis Ireos, debet autem capi agrestis [inquit Gatinaria] quia fortioris est resolutionis, Hireos etiam hortulanum vitliter operatur.

Dicit Gordonius quod sanat eos qui sunt possibiles sanari.

Vnguentum Irinum Diosc. ita parare præcipit: Olei lib. 73. & quincunem, Spathæ lib. 6. & beselem sumito, & Spatham amixtissimè aquæ heminis decem tenuissimè contusam, in ahenum ad olei immisam coquito, donec odorem contrahat. Deinde in craterem melle oblitum excolato. Ex hoc aromatis imbuto oleo primum Irinum præparatur Iride inspissato oleo, vel vt præscriptum est, macerata. Aut hoc modo. Olei lib. 70. & quincunem, ligni Balsami lib. 5. & sextantem contusi, velut dictum est, simul coquito. Deinde exempto Balsami ligno, Calami contusi lib. 9. & dextantem, Myrrhæ vino veterè odoratò maceratæ grumum iniicito: Postea acceptis ex spissati ita & aromatis imbuti olei libris 14. Iridis contuse æquale pondus immittito, & ad dies ac noctes duas finito, deinde fortiter ac violenter exprimito. Et si efficacius hoc esse voles, æquale Iridis pondus iterum atque iterum in ipso macerato, & excolato. Optimum est quod odore nihil aliud præter solam Iridem redolet. Tale verò est quod in Perga Pamphylia, & in Elide Achaia præparatur. Vim habet calefaciendi & molliendi. Crustas vlcetrum & putredines ac fordes repurgat. Et affectionibus circa vterum conuenit, & inflammationibus & præclufionibus. Facus item eicit, & hæmorrhoidas aperit. Facit & ad aurium sonitus, cum Aceto & Ruca & Amygdalis amaris. Et ad desillationes diuturnas, naribus ex eo illitis, & ad ozenas. Purgat etiam aluum cyathi mensura potum. Facit etiam ad val-

Tom. II.

uulosas affectiones. Mouet quoque vrinas. Et ægrè voméribus opitulatur digitis aut vomitoriis ex eo illitis. In anginis etiam illinitur, aut cum aqua mullâ gargatitur. Ita etiam in faucium asperitate. Datur item his qui cicutam, aut fungos, aut coriandrum biberunt. Irini præparatio satis clara est. Aërius & Paulus idem parant, sed spissamentis pluribus inditis, quàm Dioscor. in duobus parandi modis habet. Hodie simpliciter sine spissamentis paratum in Officinis habetur. Apud Strabonem libro 12. laudatur Belgica Iris, & vnguentum quod ex ea fit Silgesium appellatum. Quod dixit Cornar. optimum est quod solam Iridem redolet, in Græco habetur *anru* falsò pro *327*.

IRIS DALMATICA MAIOR FLORE
vulgariminitus violaceo.



Spectata Pulchritudinis, & magnitudinis est hæc Iris; caule bicubitali, reteri, minimi digiti crassitudine: alis crebris donato, in quorum extremis flores multissimi magni, toti cyanei, exceptis paucis in vnguim alis striis obliquis versicoloribus; alternorūq; foliorum simbria creta, angusta quidem sed elata: *folia*

verò, quàm in vlla alia in horto Ill. C. E. latiora, vncias tres lata nonnunquam: explicatas Aquilæ alas referunt, vltimo proximum sinu suo semper excipientes, colore glauca.

De hac ni multum fallimur Lobel. Obs. & Ic: Plant. p. 61. Leut. 87. Iris Dalmatica maior, cuius aspectus hilaris; perueniens foliorū exortus, lateratim traiectus, & radiatum alas Pauonis explicatas imitatus: floribus pluribus ex vno caule multis concauo alis, luculentæ magnitudinis, violaceis nitentibus senis foliolis, alternatiu etiã repandis. Viterâ Belgica hanc in delitiis habent; munere Cl. Medici Pancier Ducis Ferrariensis. Semen præfert in siliquis angulosis.

Iris Dalmatica maior Clus. Hist. vulgari forma & magnitudine similis, sed flos elegantior & vnicolor, atque in summo caulis fastigio & ramis confertim nascens: semen in breuiore siliqua angulosum, pallidum, & rugosum: floret Vere, sed seriùs aliis apud nos saltem. Et Iridi Asiaticæ cæruleæ, omnium Iridum amplissimæ, Iris maior latifolia tertia Clus. Hist. post. sive Dalmatica maior, non valde absimilis est, quam ante multos annos in Belgicam vsque misit Alphons. Pancerius, nisi quod flores concolores, summo caulis fastigio magis confertos habere videtur, iucundissimo spectaculo: semen etiam in breuiore capite minus, pallidum, angulosum, rugosum.

Tabern. icon. Iris Dalmatica maior, *Dalmatish* vielwurz. In hist. Vielwurz von Constantinopel. Iris Chalcedonica altera. Egregius Herbarius Tabern. vel eius Compiler, descriptioni Lobelii huius Iridis addit, ex consideratione figuræ non plantæ, ac præter mentem Lobelii & Clusii dicit habere folia nonnihil angusta & acuta: titulus in historia transpositus competit alteri figuræ.

C. Bauh. Phyt. Iris 7. siue Dalmatica.
Camer. hort. Iris Dalmatica Clusii, quæ forsitan ad Illyricam nomine loci posset referri.

Iris Asiatica cærulea omnium Iridum ampliss. Dalmatice affinis.

Descriptio Sena, septena, octonaque habet Altera folia, omnium Iridum amplissima, & in latum expansa, viridis cui ærugo permixta videatur coloris, multo se amplectentia, è quorum medio caulem promit sesquicubitalem, interdum etiam bicubitalem vel ampliorem, firmum, crassorem superiore, læuem, genicularum, multisque alis concavum, è quibus copiosi (nullam enim feraciorum conspexi) vaginulisque inclusi prodeunt *stres*, magni, novem foliis constantes, quorum terna inflexa tendentis sunt coloris, multis purpurascensibus venis ab infima parte, & staminèa fimbria flava in longitudinem & latera excurrentibus: bifida folia exalbescunt, gibbo tamen illorum dilute purpurascens: tria quæ sese attolunt folia, angustiore & ima parte quibusdam purpureis brevis venis distincta sunt, ubi verò se in latum expandunt subcæruleum habent colorem, dilutiorem adhuc quàm inflexa: & florum Sambuci odorem, grauiorem tamen, quodammodo amulantur: his succedunt rariore *siliqua*, siue *capita* crassa, magna, triangularia, & obtuso mucrone prædita, quæ maturitate dehiscencia *semen* coninere deprehenditur crassum, angulosum, durum, flavescens, superiori fetè par: *radix* crassa est, magna, nodosa, multis longis crassisque fibris donata, lateribus, vt reliquæ, se propagans, & si repurgata exsiccet, odorata.

Cum Clus. petiisset à Magn. D. de Vngna sibi mitti Constantinopoli *Alia Susani*, hanc confectus est, quæ magnam habet affinitatem cum Dalmatica maiore Belgis nuncupata. Est in Pann. ipsi Iris 2. Asiatica cærulea: in post. vero Hist. Iris Asiatica cærulea, siue latifolia maior 2.

Casp. Bauh. Phyt. Iris 9. Iridi Dalmaticæ affinis.

IRIS DALMATICA MINOR flore purpuræ dilutioris.

Descriptio Iridi Lusitanicæ seu bifloræ similis [inquit Clusius Histor. Hispan.] quam Pancius ad nos misit nomine Dalmaticæ minoris insignitam, nisi quod paulò angustiore *siliqua* videatur: flores purpuræ dilutioris, & terni aut quaterni in singulis caulis, oblongiori pediculo inhaerentes, *semen* in breuiore triangula *siliqua*, angulosum, pallidum & rugosum: flos fertus Vere.

Lobel. Obs. & Ic. Pl. p. 62. Teuc. 88. Iris Dalmatica minor biflora: Iridi facie, omnique sui parte persimilis, sed tota minor & flores dilutiores



Iris maior latifolia Byzantina Dalmatica à Pantio missa similis.

Iris maior latifolia 18. Clusii Byzantio missa foliis quinto generi (Iridis maioris latifol. siue Asiaticæ purp.) non dissimilibus, sed breuiore aliquantulum caule, in aliquot ramos diuiso, qui sustinent flores vaginulis emergentes, iam dictis paulò minores, quorum color medius inter secundi & quinti generis flores: radix quinto generi similis. Icon quam Clusius ponit pro iam dicta Iride est Icon Plantini p. 62. sub titulo Iridis Dalmaticæ minoris.

IRIS DILUTE CÆRULEA inuolucro albo, fortè Dalmatica.



Tabern. hiflor. & Ic. vielwurz. Iris dilute cærulea inuolucro albo.

Proponit Tabern. vel eius Compiler figuram non integram sine vlla descriptione, si stirps nona cur non describitur, cur Mathiolum imitatur: si liceat aliquid coniectari, suspicor posse ad Chalcedonicam referri, quæ ei

non nota, vt apparet ex descriptione Dalmaticæ, cui tribuit folia nonnihil angusta & acuta, quæ verba addidit de suo ingeniosus vir descriptioni Lobelii, considerata potius figurâ quàm planâ, cuius nomen in historia transpositum vt antè dictum.

C. Bauh. Phyt. Iris 4. siue dilute cærulea inuolucro albo Tabern.

Iris

Iris maior latifolia suo Damascena caerulea Clusio. 4.

Iris maior latifolia quarta siue Damascena Clusii, non dispar est foliis & radice Iridi Dalmaticæ maiori, quam N. V. Io. ab Hoghelande misit Lugduno Batauorum anno 1590. Damascenæ nomine, ipsi semine natam.

Cubitali autem biennio post aut paulò maiorem protulit illa *caulem*, in quo multi vt in Asiatica caerulea flores, totidem quot ea foliis, nec minùs amplis constantes, eiusdemque penè coloris, terna tamen inflexa paulò dilutiùs purpurascere & ad caeruleum colorem tendere videntur, atque magis complicari: terna bifida & gibba villosa simbria incumbentiâ, angustiora & cinerei quodammodo coloris: terna verò surrecta dilutioris caerulei sunt coloris, & latius interdum candicantibus venis externa parte cõspersa sunt: odor Asiaticæ similis. Hoc autem in eius aliquot floribus obseruabatur, vnum ex illis foliis quæ sursum atrolli solent, subtus perinde, atque inflexa albescere, etiam aliquantulum inflecti, similes coloris esse, & simbriam illam multis villis constantem habere. An porro singulis annis similes proferat flores, tempus docebit.

Iris Asiatica purpurea maior latif.

Folia habet similia Iridi secundæ (Inquit Clus.) siue Asiaticæ caeruleæ, paulò tamen breuiora, & angustiora: inter quæ exit *caulis* cubitalis, rotundus, digitalis crassitudinis, in aliquot ramos diuisus, qui promunt è membranaceis thecis flores superiore minores, non nihil odoratos, quorù labra, siue folia ad terram inflexa, saturationis sunt purpureæ, & infra circa vnguem, quâ videlicet hirsuta illa & pallescens simbria excurrit, variis venis distincta: his incumbunt tria alia latiuscula bifida folia, quæ candicantes ligulas tegunt: deinde è lateribus surgunt terna etiam folia, eleganti purpureo colore prædita, flori Lusitanicæ bifloræ ferè similia, latiora tamen: succedunt triangulares *stiquæ* obtuso mucrone, in quibus *semen* inæquale: *radix* tuberosa, Secundæ similis.

Est hæc Clus. Pann. Iris tertia, siue Asiatica purpurea, missa Constantinopoli nomine *Alaia Susani*. Huius iconem posuit in post. Hist. nomine Iridis latifoliæ maioris 54. quæ est Ic. Plant. pag. 59. sub hoc titulo, Iris nostras vulg. lib. 32. T. 85.

Casp. Bauh. Phyt. Iris 9. siue Asiatica purpurea Clusii.

Missâ etiam hæc Constantinopoli ab Ill. V. Dauide Vngnad. Florétque Maio.

Iris maior latifolia flore purpureo cum aliqua rubedine.

Iris maior latifolia sexta, quam ad sine (inquit Clus. hist. post.) Viennam misit Io. Boissot 1581. congener fuit Asiaticæ purpureæ. Similia enim folia habuit, caulem paulò maiorem, flores similes, aliquantulum maiores, inodoros, quorum terna surrecta folia aliquid rubedinis habere videbantur: radicis amplitudine conueniebant.

Iris latifolia maior purp. quibusdam Illyrica.

Iridis maioris latif. genus 7. in Francofurtensibus hortis obseruabat Clus. hist. cui Illyricæ co-

gnomen dederunt: longa autem latæque folia habebat, Dalmaticæ maiori penè paria, caule nò minùs grandem, nec rariore minorisue flores proferebat, nouem, vt reliqui, foliis constantes, quorum terna inflexa & terram spectantia, planè purpurei siue violacei, dilutioris tamen, sunt coloris, nullis, nisi circa infimam partem, venis distincta, simbria mediùm folii neruum occupante, albis staminibus, flauo apice præditis donatâ, tria surrecta folia eiusdem ferè, sed magis diluti coloris, vt & tria bifida ligulam tegentiâ, & simbriæ incumbentiâ: odor satis suauis.

Iris maior latifolia cui in flore crassæ vena purpureæ.

Iris maior latifolia octaua siue vulgarior altera, quam Clus. in hortis Francofurtensibus conspiciēbat, similia habet folia præcedenti sextæ Illyricæ cognominatæ, ab exortu circa *radicem* purpurascentiâ, *caulem* cubitali aut ampliore, multos è vaginulis, purpurascētibus radiis insignitis proferentem flores, nouem foliis constantes, quorum terna incurua multis crassis venis purpureis sunt notata, simbria ad labrum inflexum protensâ, capillaribus staminibus flauo apice præditis donatâ, terna erectiora plerumque bifida sunt, colorémque habent obsoletum, in quo purpureum quicquid magis vel minùs saturum elucet, alata angusta folia simbriæ incumbentiâ eiusdem cum surrectis sunt coloris, præter mediùm neruum in longitudinem excurraentem, qui ex caeruleo purpureo cit: odor florum Sambuci. Breuiter, Iridi obsoletæ Belgicæ valdè similis est.

IRIS LVSITANICA VERNA VIOLACEA & Clusii maior Latif. nona cum venis purpureis.



Iris Lusitanica verna Lobel. Obs. Dalmaticæ Iridi maiori cum foliis, tam caule & ternis quartulitæ floribus similis, sed colore omnino violaceis, seu purpureis saturationibus: cuiusmodi ipsam vidisse iuuat hoc Vere in Viridariis Ill. D. Io. vander Dief, & Mariæ Scherz. Icon. Pl. pag. 63. Iris Lus-

tanica Verna Teut. 89.

Casp. Bauhin. Phyt. Iris 18. Iconem eandem cum Plant. habet Clusius pro Iride latifolia maiore nona, cuius descriptio eiusmodi est. Mihi missam Bruxellis à N. V. Io. Boissot, Iridis maioris genus, quod Maio floret, quòdque breuiora quàm Iris maior octona habet folia, alioqui non dissimilia, nec minùs circa radicem, quâ inuicè amplectuntur, purpurascentiâ: caulem cubitali & ampliore, in alas diuisum, in quibus multi

Describe;

flores, totidem quot præcedentes foliis præditi, quorum terna deorsum inflexa per oras subcaerulea, circa vngues ex flavo candicant, deinde multis crassiluculis saturæ purpurae venis ab imo in longitudinem excurrentibus sunt prædita, staminum in fimbria superiori similis est: terna erecta folia candicantis ex caeruleo sunt coloris, eorum oræ quodammodo flavescent, vngues renuotibus venis distinguuntur, bifida & alata folia fimbriam regentia ferè ex flavo candicantior præcedenti similis.

Iris maior latif. angustioribus foliis, purpureis floribus minoribus Clusio 19.

Iris maior latif. 19. Clus. Byzantinæ magnitudine pat. angustioribus tamen foliis, quam à Boissot accipiebam, caule gracili, pedem & semissem, interdum etiam cubicum alto, in ramulos diuiso, quibus insident flores omnibus prædictis minoribus, tribus foliis ad terram inclinatis, dilute purpureis, tribus verò erectis obsolete purpurei coloris, qualis in vulgaris quodam genere conspicitur: radix non magna, nodosa. Eius flos mihi primum inspectus anno 1590. cæteris florantibus.

Iris maior latif. Romana caerulea Clusio 24.

Iris maior latif. 29. Iris maior 24. Iridi 23. siue Illyricæ pat. Viennam mihi missa [air Clus.] à I. Boissot Romæ maioris caeruleo flore nomine: etenim caulem, folia, radicem omnino similem habuit, anno verò 1585. florem etiam parem, exceptis tribus sutrectis foliis, quæ ad caeruleum colorem magis tendebant, fimbriaque inferiorum magis flavescente, & odore vulgaris Oxyacanthæ qui in præcedente ad bifloram Lusitanicam magis accedit.

Iris latifolia maior, cui oræ ad flauum obsoletum accedunt.

Iris maior latif. 10. Clusio, à Io. Boissot missa, paulò humilior, quam nona: flores gestans, ei forma quidem similes, diuersi tamen coloris: nam terna inflexa folia, licet illius foliis non sint disparia, oras ad flauum obsoletum accedentes habent, venasque paulò dilutiores, terna sursum erecta obsolete sunt coloris, ex flavescente & purpurascere mixti versicoloris, eius quam à Cameratio accipiebam, foliis non ab similia, paulò tamen dilutiora, circa vngues etiam magis flavescentia, & tenuioribus purpureis venis notata, angusta, alataque folia simili colore prædita, præter medium neruum qui magis purpurascit: odor etiam florum Sambuci æmulus. Pr. Iride modò dicta figura apud Clusium est quæ Icon. Plant. p. 59. ponitur nomine Iridis candidis floribus.

Iris latifolia maior cum oris purpurascensibus.

Iris latif. maior 11. Iris Clusio latifolia maior Vndecima, à Iohan. Boissot, similiter communicata decimæ paria habet folia, inter quæ cubitalis ferè & dicta æqualis affurgit caulis, ternos aut quaternos è vaginis viridibus, oras purpurascens habentibus, ferens flores, quorum color obscurior & saturatio, quibus nonnunquam insperzæ luridæ maculæ &c. Odor idem cum superiore. Paulò tamen hæc ferèius floret.

PLANTARVM

Iris latifolia maior flore versicolore

Iris latifolia maior 12. [quæ Clusio perit] præcedenti satis colore scribebat respondere Io. Boissot, & peculiare id habere, ut inflexa folia duobus diuersis coloribus secundum longitudinem sint discretæ, altera videlicet parte reliquorum foliorum colori respondente, altera diuerso: eamque à Bruxellensi ciue accepisse, qui semine natam ibi afferret, cum aliis Iridibus, quarum nonnullæ vnicum duntaxat folium variegatum habebant, quædam versicolorem tantum neruum medium folium secantem, eumque vel amplio-rem, & latiore, vel angustiore, ut mirum dictu sit quomodo Natura in his floribus ludat.

Iris latifolia maior versicolor caerulea dilutior Clusio 13.

Iris latifolia maior 11. Cuius Bruxellensium semine natam scribebat Io. Boissot instar duodecimæ varietate conspicuam, non ad eam tamen elegantem, sed coloris ex cinereo pallidius, ut versicolor caerulea dilutior dici queat.

IRIS ALTISS. BICOLOR CÆRULEO obsoleto cinereove mixta.



Rhæc Iris, proceritate vulgarem superans: flus non minus lata: floris autem suaviter odorati, & vulgari inuoris, non obuia amœnitas, cuius tria extrema folia repanda, tumma orti saturâ purpurâ tincta sunt, inde vsque ad fimbriam crocaram humani supercillii æmulam, saturis lineis purpureis longis canpunn album percurrentibus, utrinque autem à fimbriæ lateribus obliquæ ferrugineæ lineæ luteos margines distinguunt: terna quoque folia, ut in hoc genere fieri solet, introrsum curuata sutriguntur, colore magna parte ex ferrugineo cinereo obsoleto, imâ parte rigidiuscula lutea saturâ ferrugine gutrata: penitissima & vltima terna in colta foris intusque leuicula & sordida purpura pallent, utrinque lateribus luteo lurido infectis.

Lobel. Obs. Item in append. Iris flore caeruleo obsoleto cinereove. Plant. icon. p. 60. Itis flore caeruleo, cinereove polyflora, Lobel.

Basilæ in horto D. Felicis Plateri vidi Iridem maximam & pulcherrimam, cui flores non multum differunt à vulgari purpurea siue caerulea, folia repanda sunt caerulea, superiora nescio quem ruborem habent, dedit mihi plantam, quam plantavi in horto E. C. vbi nunc abundat flores

Heris Maio, cuius mihi videtur habere paulò minore speciem nonnihil variantem.

Iris maior foliis duobus coloribus distinctis, albo & viridi Clus. 16.

Iris maior latifolia 16. quæ ex eorum numero quas Boissot misit, Iridi maiori latifoliae 15, ¶ siue luteæ variegata; valde similis, & illius quidem semine natam putat Clusius: Folia tamen illi breviora & (quod rarum) magna ex parte duobus coloribus distincta, albo & viridi, sic quidem, vt albus per longitudinem excurrat, nonnunquam dimidiatum folium occupans, interdum ferè totum, aliquando eius duntaxat partem: iidem etiam coloribus interdum distincte vaginæ flores includentes: qui terna ad terram inflexa folia superiori similia habet ferè, stamina tamen fimbria tota flava est, bifida folia illam tegentia flava, cuius etiam coloris sunt terna illa sepe attollentia & tota ferè surrecta, vt in præcedente, infimâ autem & angustiore parte, purpureis velut maculis interne aspersa sunt: odor qualis in præcedente, nonnunquam ad eò imbec illis vt vix deprehendatur. Floret Maio cum superiore.

Iris exotica colore quasi pallido fuligine percussa Camerarii Clusio 14.

Clus. Pann. Iris 5. exotica Camerarii, siue obsoletior, quæ ex Iridi varia caulifera Pannonica nata censetur. Hist. post. Iris maior latifolia 14. cui ampla sunt folia, & latiora longioraque quam in præcedentibus, viridia admodum, rugosa, aliquantulum crispâ, mucrone nutante, è quorum in medio emergit cubitalis aut maior caulis, laevis, rotundus, viridis, in aliquot ramulos diuisus, qui è virentibus vaginulis satis amplos promunt flores, nonnihil odoratos, & ad vulgatis Oxyacanthæ floris odorem accedentes, quorum tria reflexa folia pallida multis crassis purpureis venis à foliis infima sede, & à fimbria, ad extremas oras sparsis, prædita sunt, labris etiam saturâ purpura nitentibus: tria illis incumbentia, sub quibus occultantur ligulae, coloris pallidi tanquam fuligine percussæ, vt etiam sunt tria erecta, sed magis luridi: nullum mihi hæcenus semen tulit, tamen si multos annos iam aluerim. Maturius paulò floret secunda, & color floribus aliquando saturior, interdum diluitor. Hanc nactus est à Ioach. Camerario Reip. Norib. Medico primario, vnde verò ille habuerit ignorat.

Casp. Bauhin. Phyt. Iris 12. siue exotica Camer.

Iris maior latif. pallescens ex albo cum purpureis venis.

Iris maior latifolia 17. Clusii, quæ à Boissot missa, pedalem habuit caulem, rotundum, geniculatum, binos aut ternos, ex membranaceis vaginis promès flores, quorù terna terrâ spectantia folia pallescens ex albo sunt coloris, multis purpureis venis ab infimâ foliorum basi, quæ angustior est, in latera, cum à fimbria, quæ flava est, ad extremas foliorum oras procurrentibus, quibus singulares, interdum binæ purpureæ maculae sunt aspersæ: bifida folia fimbriam tegentia alba sunt coloris, cuius etiam terna surrecta excepta eorum angustâ basi, quæ flauescens, multis purpureis venis in latera procurrentibus,

Iris maior latif. purpurea foliis repandis candicantibus, purpureis venis distinctis Clusio 21.

Iris Clusii maior latifolia 21. Non minùs nimis ampla habet folia quam 20, inter quæ caulis affurgit pedalis, teres, geniculatus, viridis, sustinens membranaceas thecas virides, per oras leuiter purpurascens, è quibus emergunt bini aut terni flores, iam descripto paulò minores, nouem foliis constantes, quorum terna terram spectantia ab imo angustiora, candicantia interioris, saturâ purpureæ venis eleganter distincta sunt, latiore verò parte omnino purpurea: villosa fimbria infernâ parte flauescit: supernâ purpurascit: bifida foliola sub quibus latet, floridi purpurei sânt coloris, vt terna folia surrecta: flos tenuiter odoratus. Hæc mihi inquit, nata est Francofurti ad Mœnum, semine spontè deciuo, & florem dedit anno 1592. Maii initio.

Iris Clus. 21.

IRIS FLORE ALBO.



Quæ purpuream vulgarem Iridem rectè norit, is nullo negotio hanc albam assequetur: nullam quippe in radicibus, foliorum floribusque forma differentia notabilem animaduertimus, in quibus tamen vniuscuique coloris non modicum est discrimen: folia enim colore ad glaucum magis accedunt, flores paucos, sed eo tamen grato odore præditi, lacteo candore percussæ sunt, extimorum costis non minùs quam Purpureæ extra virentibus, quibus intus lutea crocomata respondent, imorum autem foliorum margines luteæ striæ percurrunt.

Descriptio

Tradit Ruell. inueniri frequenter Iridis florem emaculati candoris, cuius radix cum Illyrica de odoris principatu contendat.

Cord. in Diosc. & Obs. Sylu. Iris Illyrica flore candido. Non placet Cordum Illyricam astruere flore albo, vt poitea dicitur.

Illyrici

Brunsch. & Gefn. hort. Iris flore albo.

Est autore Matthiol. in fatiurum genere, quæ niuei candoris flores profert, quam in pluribus Hæturicæ locis vidit, cuiusque radix fragrantia & virium robore Illyricam ferè æquat.

Dodon. Gall. Iris altera flore albo, Iris Florentina, Officinis Ircos: Gall. Flambe blanche, Germ. weiß Diollwurz & weiß Schwertel. Belg. witlich / quæ omnino præcedenti similis, foliis, canibus, forma florum & radicem, nisi quòd flores non habet diuersos colore, sed niueos: Radix paulò minor, & optimi odoris maxime sicca. Cur Florentina potius censenda sit ea quæ albo flore quam altera, non video, quandoquidè ibidem copiosa, nec etiam radix nobis obseruata

Iris Hebræi 114.

Dod. not.

minor, sed potius maior.

Plantin.
sonez nos.

Plant. Icon. p. 59. Iris nostras vulgaris candidis floribus. Lob. 32. Adu. 11. Teut. 85. Figura strigosa Iridis apud Plantinum non placet pro alba, albâ enim non vidi strigofam, sed cum crassis nodosis radicibus. Lobelius posuit eam figuram in Belg. pro vulgari silu. Iride; hinc forte accidit vt tr. C. Bauh. duas fecerit Irides albas.

Camer. in hort. Iris alba Illyrica vulgò, vel potius Florentina. Item apud Matth. German. Iris Florentina cum floribus albis.

Tabern. histor. & Icon. Iris alba weiff weilwurz. Item Iris Florentina weiff weilwurz. Duas proponit figuras Tabern. sed non demonstrat in quibus differant.

Tab. nos.
C. B. lapsus
Garr.

C. Bauh. Phyt. Iris 2. siue albo flore, Matth. sativa niuci coloris, Lob. nostras vulg. candidis floribus. Iris tertia, siue Florent. alba, Gesnero Florentina: Cordo Illyrica: radices siccatæ non contugantur & differt à præcedenti, quod hæc radice sit minore: Cur Frater separet Iridem Florentinam albam à Matthioli alba nescio: quum Florentia sit in Herturia vbi obseruauit Matth. flore albo: Gesnerus non dicit Iridem Florentinam cuius meminit flore esse albo: Florentia obseruauit frequenter vtriusque coloris radices quæ solent pro Iride Florentina vendi, sunt maiores, crassiores, solidiores, candidiores, odoratiores, quàm vulgaris nostratis: an regio solùmne sit tantùm in causa diuersitatis à nostra asserere non ausim, vel an sit species diuersa, vidi aliquando radicem etiã vendi pro Illyrica Iride, quæ sanè solida & odorata, sed minor Florentina: Cordi verba præcedenti capite adduximus, vbi non dicit an Illyricæ radix sit minor vel maior vulgari.

Iride alba aliquando primo Vete collem plenum reperit Camer. circa Priuæctum urbem in itinere Neapolitano. Vehementiores hyemes apud nos agrè ferre potest, & in primis à niue liquefacta, & rursus gelasente tutanda. Iris alba in Austria & Vngariæ hortis rarior, & Clusii tantùm operâ illis cognita, acceptis è Belgio radicibus.

Basilæa accepimus datam ex horto insignis Pharmacop. Joh. Heitzman, quam plantauimus Montb. in Horto H. E. C. eam primò videramus, Bononiæ & Florentiæ in horto Nic. Ferrarientis & aliis flore in totum niueo, exceptis apicibus luteis in medio foliorum: postea obseruauimus Geneuæ & Lugduni. Non videtur nobis propter colorem album particulatim vocanda Iris Florentina, quum vtrâque abundant Florentini, & vtramque indiscriminatim sumantâ bonitate autem potius vtramque Florentinam de nominari, non propter colorem: quanquam vtriusque radix soleat etiam candidior crassior & solidior vulgari esse. Narrabat mihi olim insignis Pharmacop. Valerîadus Dourez, qui in Illyria siue Sclauonia fuerat, Iridem ibi dari flore albo potius quàm purpureo, spontè in montibus prouenire & radicem similem Florentinæ virentem gustu esse, non minùs feruenti quàm nostras, eam quæ in humidioribus locis nascitur deteriorè quæ non possit siccare.

Iris maior latif. candida cum multis fibris purpureis Clusio 27.

Iris maior
larsf. 27.

Lata pedalisque fere longitudinis folia habet elegans aliud Iridis genus, Iridis Aicholtzianæ foliis prostratis similia, radicem etiam & caulem,

qui perinde atque in illa, ad foliorum latus ex radice nascitur pedalis, tenuis, in quo singulates aut gemini flores à vaginulis ex pallido virentibus prodeunt, forma Aicholtzianæ similes, sed colore variantes, nam terna folia propeudentia candicant, purpuræ exolete venis ab infima eorum sede per latera excurrentibus vsque ad extimam fimbriam subcæruleis villis constantem, tria autem incumbentia & ligulam siue staminina tegentia, alba sunt, earum tamen gibbo subcæruleo: terna sursecta etiam candida, & ab infimâ, sed multis purpureis venis distincta, donec in latitudinem expandi incipiant: flori successit triangulum caput binas pæne vicias longum, crassiusculum quæ quod maturitate dehiscens Iulio, semen ostendit rugosum, subfuscum, erui magnitudine: radix hieme folia non retinuit.

Floruit Aicholtzio primùm Maii initiò, Anno 1584. vnica quam habuit planta, eadem ateo- la in qua 25. Aicholtziana reposita erat, & quæ etiam oppositam areoleam occupabat. Itaque non dubium quin eius semine deciduo nata sit, tamen huius flos odoris gratia commendabilis non fuerit, qui tamen in altera deprehendebatur. Mirum enim in modum variant quæ ex femine nascuntur Irides, non secus ac præcocces & dubie Tulipæ, atque Papaueræ, vt longâ experientia didicisti.

IRIS LVTEA, FOLIIS FLORVM repandis variegatis.



A Mæna est florum huius Iridis elegantia, alterna ex extimis tota lutea sunt folia, nigricante purpura circum guttata; alterna pulcherrimè virgata, striis suprema folii parte intrinsecus atro sanguineis per album Campi discurrentibus: inferna verdè eiusdem faciei parte ad fimbriæ

crocatæ latera vtrinq;e minùs saturis lineis, crebris admittis concoloribus guttulis, luteolum campum obliquo ductu pingentibus, extrinsecus verdè ex luteo herbida sunt: intima terna folia bifida penitus lutea, tergo appressas habent ligulas herbidas apicibus lacteis.

Hanc sic describit Clusius. Iridi latifoliz maiori 15. rugosa sunt folia, minùs tamè lata, longa, & viridia quàm in 14. secundum radicem omnino interdum purpurascencia, è quorum medio caulem promit cubitalem, lauem, viridem, aliquot ramulis donatum, quibus insident flores è vaginulis emergentes, magni vel prostrati inodori, vel Oxyacanthæ vulg. florum instar odorati, coloris varietate commendabiles: nam tria folia quæ

quæ sursum spectant & atroluntur, raro se mutuo amplectuntur, aut cacumine nutant, sed plerumque (nisi marefcere incipient) recta sunt, vt in Iride bulbosa, nonnihil tamen conuexa, angustis oras, lutei coloris, quemad. & illa quæ ligulas fimbriamque contegunt: tria ad terram inflexa, circa basim & exortum pallent, reliqua parte candicant, multis tamen purpureis radiis ab ipsa sede ad extremas vsque folii (quod plerumque saturatius purpureo) cit in earum stirpium floribus, quæ circa radicem nulla purpura sunt suffusa) pallidas oras, eleganti picatura decurrentibus: villosa fimbria, quâ parte integitur, lutea est, extrema verò exalbida, pallentes ligulæ, magna triangula & obtuso aliquatulum mucrone prædita capita, *semen* Orob. magnitudine, fulcum, rugosum continentia: *radix* nodosa, vulgaris Iridis instar, totis flauescens, multis vtrinque nascentibus fibris firmata, quæ repurgata & exsiccata, odoratissima est, & cum Illyrica, quæ in Oâicinis habetur, odoris gratia contendere posse existimatur.

Est hæc ipsi in Pann. Iris 4. varia caulifera, Pannoniæ, sub quo titulo eam & Tab. exhibet. Lob. Obs. Iris lutea variegata. Icon. Plant. p. 66. Teut. 91. rara species. Flores sunt lutei Chamæridis Monspeliciæ tribus repandis foliis peregrinâ elegantia striatis, obscure violaceis. in Belgii hortis prouenit munere Clusii.

An Matth. Ital. eam magn. fig. Iris flore luteo, quam in multis hortis Bohemiæ vidit, & non vult intelligi Acorum vulgare: Oportebat demonstrare discrimen inter Iridem luteam & Acorum vulgare, si poterat.

C.B. Pny. Iris 6. siue sativa lutea, Matth. Iris sativa floribus auctis. Iris 10. siue varia caulifera, vel 4. Clus. Iris 16. siue lutea variegata Lobel. Iris 17. Variegata Camerarii silu. alia.

De hac Camer. hort. ait: Iris variegata è luteo & purpureo obsoleto flore, quem in locis natalibus non promit: in hortum verò translata, contra aliarum syluestrium plantarum naturam, altero anno floret, & quotannis postea, ac longè latè que ferpit. Idque verum esse experientia me docuit, cum eius generis plantas ex monte quodam Franconia propè arcem Comitum de Cassello mecum deportassem in hortum. Foliis est Acori vulgaris, id est, Aquaticæ flauæ Iridis, sed latoribus, & rarissimè vt aliorum crectis, sed plerumque mucrone languido & incuruo.

In montanis supra arcem Dini Georgii, herbido solo, & collibus Stamphen imminentibus, in Vagaria transdanubiana, aliquot miliaribus supra Posonium, primùm obseruabat Clusius, genus illud cuius folia purpurascens colore circa radicem non sunt persusa: deinde frèquentius vtrumque genus in Leytenberg monte supra maderstorf, & siccoribus pratis Sopromio vicinis. Crescit etiam in collibus non procul ab Entzestorf in Lange-thal, Magnif. D. de Entzestorf. Floret Maio: sub lunii finem maturum. Est mihi in Horto E.C. pulchra Iris primùm visa Basileæ: postea Sturgardiæ in hortu Ducis Wirtemb. Basileæ in hortu Guarini florentem vidi Maio: folia vulgari Iridi ferè similia, caules magni, flores lutei, qui in repandis foliis pulchras habent strias violaceas: habui Basileæ & Sturgardiæ.

Iris maior latifolia Ochroleucos Clusio 28.

28. Iris maior latifolia 28. multa habet folia, inuicem


amplectentia, cæterarum Iridum instar, vnciam lata, inter quæ pedalis geniculatus, teres, viridis exilit *caulis*, summo fastigio sustinens binas membranaceas vaginas ex viridi pallefcentes, è quibus emergit *flos* reliquis Iridum generibus forma similis, colore autem diuersus, nam ex albo pallefcit, siue *αχρολευκος* est, & terna repanda folia ab uno ad extremas oras flauescens sunt sunt distincta, fimbriâ albicante, sed quadantenus à bifidis foliis [quæ simili colore sunt prædita, gibba tamen dorsi nonnihil purpurascens] integitur, flauescens: surrecta folia ab uno gracilia, internâ parte multis in latera sparsis venis obsolete purpurascens sunt distincta, vbi verò sese in latum expanderunt, *αχρολευκος* sunt coloris.

Nullum in hoc flore odorem deprehendi: sed eius stirpem Maio florentem obseruabat Clus. Francofurti in Myleri Pharmacopœi hortu. Eî similem, nec vlla ferè in re differentem etiam alebat, soli flores discrimen faciebant, qui paullo candidiores videbantur. Non dubium est multò plura inueniri maioris Iridis genera.

Iris maior latif. surrecta floribus solis flauis & purpureis lineis distinctis Cl. f. 20.

Iris maior latif. 20. Clusio à Boissot missa, quæ biennio post duntaxat florem tulit, a Decima nomina, nec gracilitate caulis, qui in ramos etiam diuisus, nec angustia foliorum, nec raris differt: flores similiter magnitudine pares habet, sed diuersi coloris: nam terna ad terram inflexa, dilutis, & quidem obsoleti purpurei sunt coloris, multis saturatioris purpure venis à fimbria ad oras se spargentibus: fimbria flauis staminibus constata: terna illam tegentia obsolete flauescit: terna surrecta infernè angusta flaua etiam, sed purpureis venis distincta, latiore autè parte pallefcens coloris, quodammodò tamen suffulci, leuissimâ, & quæ vix apparet, purpurâ: Sambacianus odorem refert, sed paulo grauiorem.

IRIS LATIFOLIA MAIOR SVSIANA VEL Chalcedonica, flore maiore variegata Clusio prima.



Ena aut octona habet folia, Iridis Lusitanicæ biflore foliis non absimilia, mutuo sese vt in aliis Iridum generibus amplectentia: è quorum medio caulis exit cubitalis aut amplior, rotundus, geniculatus, digitalis crassitudinis, florem sustinens omnium quos vnquam in Iridibus con-

Descriptio

spexerim maximum, nouem, vt reliquorum, foliis constantem, colore tamen ab illis differente:

nam tria ad tertiam inclinata folia crassa sunt, inferiore parte omnino nigra, nisi quædam venæ ex purpura candidantes intereunt, ab infima basi ad medium usque, nigri panni instar, medium folium occupante, foris multo dilutiora sunt: terna illa minora eis incumbentia quæ ligulas tegunt, fornicata & bifida sunt, & eiusdem ferè coloris, paulò ramen dilutioris, licet ad obsecram purpuram accedentis: tria surrecta, palmatis sunt amplitudinis, & membranaceæ panè tenuitatis, plurimis lineis ab infima basi ad extremum usque folium excurrentibus, partim nigricantibus, partim ex cineraceo candidantibus, vt Americani Pauonis expansam caudam ferè imitentur, internè circa vnguem nonnihil hirsuta. Nullum odorem in hoc flore deprehendi, sed folia coloris varietate commendabilis est. Illi succedunt, sed raro admodum, capita trigona crassa, uncias tres, quatuor & quinque interdum longa, numerosum semen, rugosum, fuscum, Pisi ferè instar magnum, continentia.

Nomina

Iris maior larifolia siue Susiana Clusii, quæ ob floris amplitudinem & venustatem primum locum merito sibi vendicare videtur, Constantinopoli missa est *Alaia susani* & *Alaga Susam* nomine cum hac additione, *flori belli pintati, ch'anno bono odore*, h. e. eleganter picti flores boni odoris: atque *sa. si. r. bianco & negro*, id est, florem ferè ex albo & nigro varium: elegantem sanè florem comperimus sed nullum gratum odorem deprehendimus. Ego [ait Clusius] quia ex Susa, Susianæ Prouinciæ Metropoli, primum in hortos Constantinopoli vicinos ultra Bosphorum stros illatam puto (nam id nomen indicare videtur,) Susianam nuncupo. Hiemis iniurias difficilè fert in horto reposita reliquis Iridis generibus, quod, vt & plerique alii, nostro damno experiri sumus. Rarius etiam cæteris floret, & vnicum, vt plurimum, florem profert, Maio: semen maturum Iulii initio.

Lobel. Obs. p. 34. Iris Chalcedonica maxima variegata, luculè magnitudinis, maculis fortuitis, transversis & obliquis, giluis, cinereis & punnicantibus, foliis tantillum, gladii ritu, vndantibus. Cætera cuncta Iridi vulgaræ aut Dalmaticæ similia. Vidimus Bruxellis. Plant. icon p. 67. Iris Chalcedonica variegata L. 34. T. 92.

An Camer. hort. Iris Bizantina à C. D. Io. Aicholtzio communicata, quæ hyeme in scitilibus apud nos asseruanda est.

Tab. nos.

Tabern. icon. Iris Chalcedonica variegata *weilbourgmie mancherley farben yppflein besprencht*. Item Iris Chalcedonica 2. *weilbourgmie* von Constantinopel. Quam intelligat Iridem Tabern. vel eius Compileror nescio, non describit.

C. Bauh. Phyt. Iris 19. siue Chalcedonica maxima.

IRIS BIFLORA LVSITANICA flore violaceo Clusio 22.

Iris bifl.
Lusit. 22.

Iridi Lusitanicæ seu bifloræ 22. folia sunt vulgaris breuiora & angustiora: alioqui non valde dissimilia: in summo pedali caule flos è purpurascens vaginulis prominens, nouem, vt aliarum Iridum flores, foliis constans, violaceo omnino, siue saturatiore purpuræ coloris, qui in inflexis & propendentibus foliis intensius nitet, viollosa illa fimbria quæ donata sunt, prorsus can-

didè. Vnicum autem singulares caules plerumque florem ferunt, interdum, sed raro, alterum, rarissimè tertium, singulari quemque vaginula



inclusum, iucundissimi odoris, & Oenanthem Liliolum conualium cognominatæ gulantis: conspectus aliquando mihi eius flos duodenis foliis constans, vt interdum Natura in floribus luxuriat: semen angulosum, rugosum, in triangulari capite satis crasso, sed rarius fert: radix illi subest, nodosa, geniculata, solida; pollicatis crassitudinis, gibba, intus candida, ingrari saporis inritè, & paulò post feruidissimi gustus, multis fibris summè tellure hærens, & subinde in plures propagines è lateribus nascentes diuisa.

Nascitur multis Lusitanicæ locis supra Tabum vel pingui solo & in aruis, vt circa Conimbriam, celeberrimam Lusitanicæ urbem, vbi illam florentem mense Nouembri eruebam, vel salebrosi & lapidosi locis, vt circa Caxcays maritimam urbem & portum, vnde delectam Olyssiponem, ad amicos, deinde in Belgicam misi, & inter chartas repositam cum aliis plantis ipse detuli: nam licet integro anno istic latuisset, terræ tamen commissa in horto Ill. V. Caroli Audomati, sequente Vere floruit, postea etiam Autumno, cuius rei causâ bifloram cognominavi.

Lob. Obs. & Ic. Pl. Iris biflora Lusitanica, an Astragalites Aetii l. 13. c. 3. nostro Belgio, Hispanico delata solo, etiam in quilibet facta est: Vere & Autumno florem odoratum violaceum, singulis caulibus cubitalibus & sesquicubitalibus, singulum aut alterum, villosò candore fimbriatum proferens: densa breuique radice, frangentique contumace, facie & foliis Dalmaticæ similibus, sed magis sparsis.

C. Bauh. Phyt. Iris 13. Vere & Autumno florens.

Camer. hort. Iris Lusitanica biflora à Clusio depicta in Hispaniis & ad memissa.

*Iris Illyrica biflora similis Clusio 23.
flore purpureo.*

Non multùm à Lusitanica biflora (inquit Clusius) differre videtur, quam aliquando Venetiis accepit C. V. Io. Aicholtzius Iridis Illyricæ appellatione, in cuius cultissimo horto florentem Maio conspiciebam. Quina enim aut sena ex singulis radicis capitibus promittit folia, illius foliis simillima: caulem, raro ampliore, qui in summo è vaginulis purpurascens florem promebat Lusitanicæ forma persimilem, paulò tamen maiorem & tenaciorè, nec ad eò suavis odoris,

odoris, licet ad eam fatis accederet: nullum *ferre* obferuabam: *radix* nodosa & geniculata vt superioris, odoris, cum virens est, ingrati, exsiccata vero fatis grati: & insipidi initio gustus, postea tamen feruidi, faucisque vrentis.

Casp. Bauhin. Phyt. Iris 14. siue Iridi bifloræ affinis.

IRIS HUMILIS LATIFOLIA COLORE violaceo, & faxatilis eadem, nec valdè similis, Clusio primum genus. Chamæiris niuca.

IRIS FLORE VIOLACEO FOLIO VIRENTE, an Clusii 25. caule foliis nudo.



Iris quædam est, foliis latis virentibus, ad colorem foliorum Spatulae foetidae accedentibus, quæ striæ manifesta percurrunt. *Flos* culmo insidet dodrantali aut pedali, totus violaceus, sex foliis constans alternatim repandis, iuxta quorum cilia partim alba, partim violacea, striæ albæ excurrunt, sur-



Iris hæc pusilla plantula est, radice crassa, alba, rugosa, acri: à qua *folia* exeunt aliquot, Iridis vulgaris foliis similia; semunciam lata, duas tresve uncias longa: *caules* brevissimi, quadrantales: *flos* violaceus & purpureus, vt in Iride vulgaris, sed per omnia minor, nec odore aliquo excellens:

Hæc sic tradit Lobelius: Minima & rarissima omnium Iridum: radice plexu, substantia densa & colore Illyricæ non ab humilis, caule vero nullo, præsertim natalitatis, folio latiusculi rigido, mucronato, palmum alto, cuiusmodi Gladioli: flore, semine, siliqua, Xyridis foetidae.



Hæc mox quæ de terra assurgit humilis remanet, proindeque nonnullis Chamæiris nuncupanda videtur. Ex quo eam è Montpellierensi agro in Belgium & Angliam transiit, frigido humentique solo excepta non secus ac innuere calidarum regionum peregrina stirpes, soli & calis temperie varias subit mutationes. Caulis illi quippe dodrantalis nonnunquam pedalis, flores albi aut lutei, aut violacei, alibi caule vidui, dilute rubentes, violacei, striati, ex luteo pallentes, obseruantur. Commodam habet iconem Aduerf. Iris parvæ, qualis spontè provenit. In Obs. aliam ad cultam siue fatinam. Vtraque est Icon. Pl. pag. 64 cum his ritibus 1. Perpulillæ Iridis latifolix varietas. Clusius pro modo dictis Iridibus Iconem aliam ponit, nempe eam quæ est Icon. Pl. p. 6. sub hoc titulo. Chamæiris niuca aut candida Lobel. 33. Teut. 91. De Chamæiride autem Latifolia, de qua hic agimus, scribit hæc Clusius in post. hist. Iridis genus humilium in Lusitaniz faxosis & mari-

rectorum foliorum dorso singulo singula apprimuntur ligula, extremo bifido. Inter surrecta vero & repanda folia apices oblongi, cerulei, farinacei, papureis insident pediculis. *Radix* crassa, trantuerfa, internodiis distincta, plurimis fibris crassiusculis ad summam basim donata: substantia molli, aquæ, sapore amarissimo paulò post fauces vrente, nullo odore notabili virens.

Obseruata mihi primum in Vireto Nobiliff. D. Baronis ab *Aigle pierre*, cui ex Belgio allata dicebatur. Mihi ab hinc per plusculos iam annos in horto Ill. E. C. Montb. culta. Floret Aprili.

Considerandum an iam descripta sit Clusio Pann. sub Iride 7. siue caulifera purpurea. Et post. hist. sub Iride maiore latifol. 25. de qua inter alia hæc habet. Peculiarem autem habet hæc præter cæteras Irides notam, vt nulla folia per hiemem retineat, sed omnia flaccescant & exsiccantur, nudaque conspiciantur, deinde ineunte Vere noua germina proferat.

Casp. Bauhin. Phyt. Iris 12. siue hyme folia amittens.

Iris maior latifolia purpurea caule nudo
alia Clusio 26.

Iris maior latifol. 26. Clusii, sine dubio ex eius semine, quod cum aliarum Iridum seminibus & multarum radicibus, ante aliquot annos in Belgicam ad amicos Viennæ mittebam, prognata est elegans Iris, quam ex Anglia rediens florentem conspiciebam Augusto in horto Nobiliff. Viri Io. de Hoboke, archigrammatei Antuerpiani: per omnia respondebat 25. nisi quod folia circa radicem saturatius purpurascere mihi visa sunt: an porò hyme folia amittat, me fugit.

nâ aurâ afflatis locis supra Olyssiponem obseruabam, cuius folia eiusdem ferè cum Lusitanicâ biflora erant latitudinis, sed breuiora: radix illi similis, geniculata & obliqua: Flos mihi non conspectus, mentis enim erat Nouember, sed siliquas siue capita acuminata, inania in humili & vix suprâ terram assurgente cauliculo reperiebam triangularia, magna, pro plantæ proportionè. Similis verò plantæ semen ad Ill. V. lo. de Brancion missum est à Lobelio è Mompelio: ex quo natæ plantæ superiori ferè similes, quæ florem dederunt vel caulem dilutiorem & quasi caulestem, ternis labris deorsum inflexis paulò saturatioribus, aut candicantem omnino, aut palentè, cumque modò dilutioris & quasi exalbidi, modò saturatioris & ad flauû proximi coloris, aut purpureum siue violaceum, & illum etiam differentem: nam vnus color planè nigre violæ, alterius prona in terram terna folia, ab ipsa basi & exortu, ipsaque simbria flauâ; albas & satis vnas ductas habebant, & variegatum Limacis dorsum ferè referebant: semen in triangulis magnis capitibus, Orobi magnitudine, pallidum, rugosum, oualis formæ. Omnium verò flos in odoris Aptili plerumque aperitur cum sequentibus.

Pro Iride sua latifolia Clusius ponit iconem Chamæridis niueæ aut candidæ Lob. Icon. Plant. pag. 65.

C. Bauh. Phyt. Iris 21. Dodon. hist. Iris minor. Clus. Hist. Iris humilis latifolia flore purpureo siue violaceo. Item Pann. Chamæridis latifolia maior coloris saturatioris nigre violæ. In hist. post. Chamæridis latifolia. genus 1. Iris minor *niueæ* plerumque purpurea. Item apud Matth. Gerin. Iris sylu. humilior purpurea maior. An Tabern. Icon. Iris siluestris minor latifolia Flein breyblereydy hummel schwertel, cuius figura non placet.

Locus.

Plurima, auctore Lobelio, oritur in agro Norbonensî, locis aridis & saxosis, secus specum illam sesquimiliare Mompelio distitam, via quâ Frontignanam itur, in cuius, & rupium commissuris frequens adolefcit prope Ferulam. Est mihi in orto E. C. Montbelgardî.

IRIS HVMLIS LATIFOLIA MAIOR
acaulis. Clusio Chamæridis latifoliae
genus alterum.

Descriptio



Chamærides [inquit Clusius] prorsus *avou- rai*, siue excaules, nunc describendæ restant, quarum videlicet flores nullo caule sustinentur, sed succulentis & infirmis duntaxat pediculis inniuntur, vt Croci, Colchici, & similia. Istarum etiam duæ differentiz: Vna enim

maioribus latioribusque est foliis, Iridis maioris foliis latitudine vix cedentibus: Altera paulò minoribus & angustioribus, tamen Angustifoliae Iridis, quam deinde describemus, foliis latiora sunt.

Harum igitur maior breuius est foliis, intercedum tamen etiam pedibus, Iridis vulgaris modo latius, & secundum radicem magna ex parte purpurascens; inter quæ multi flores è vaginulis procedunt singulari pediculo dotanturque fulti, vulgari paulò minores, Lusitanicæ bifloræ æmuli, tum magnitudine, tum colore, qui saturatioris nigre violæ est, præsertim tria folia terram spectantia, quæ villosam simbriam, vsque ad bifida illa, quæ ligulas regunt, folia, ex cæruleo purpurascens habent, sub ligulis verò, siue staminibus, luteam: omnia autem florum folia, tam quæ sursum attolluntur, quam quæ repanda terram spectant, inferiore & sensili parte, albis quibusdam radiis variata sunt. Sunt autem eius flores, vel aliquantulum odorati, vel in odori: triangula capita magna, mucronata, in quibus semen orobi magnitudine pallescens, quod exsiccatum rugas contrahit & fuluescit: radix nodosa est, vt reliquarum Iridum, & adnatis se propagat. Illius semine nati est Boissoto Bruxellæ Chamæridis latifolia maioris genus, matri per omnia simile, præter florem, qui non purpureus, sed cæruleus elegans fuit.

Icon quam Clusius exhibet pro Chamæride latifolia maiore ea est Ic. Plant. pag. 65. sub hoc titulo. Chamæridis latifolia flore rubello Lob. Tent. 91. Non est acaulis quamuis talis in descriptione dicatur ipsa planta.

Lob. Obs. Irides Austriacæ humiles speciosis rubris floribus & violaceis odoratis Clariss. viro D. Brancioni Viennâ misit Clus. vnâ cum Chamæride purpureo odorato flore.

IRIS HVMLIS LATIFOLIA MINOR,
& eius varietates quinque.



Chamæridi latifoliae minori Clusio recte, breuiora angustioraque, paululum sunt filia, qualia Chamæridis Latifoliae Hispanicæ aut Gallicæ, de quibus initio huius capituli flores paulò minores: capita triangula & mucronata e- riam minora: semen minus. In floribus summa varietas: licet ferè

omnes simbriae villosæ supra stamina cæruleos habeant, infra verò vt in modò dicta luteos. Ex his verò paucas duntaxat adnotauimus, nam omnes, valde difficile.

Vna saturatioris purpuræ colore nitentem habet florem, interdum etiam dilutiorem, illumque odoratum, hunc minimè: ternis foliis quæ attol- luntur

luntur & inflexa quodammodo supernè se mutuo contingunt, in vtraque, modo orbiculatis, modo longioribus & bifidis.

Altera odorato est flore, cuius inferiora labra nonnihil purpurascunt, surrecta verò cærulei sunt coloris.

Tertia flos quodammodo ruber, interdum diluore & suavi quadam rubedine velutique carneo colore præditus est, præsertim foliis sursum erectis: villosa fimbria superior pars albicat, inferior lutea est: est autem odoratus, aut inodorus. Horum omnium stamina cærulea.

In quarta floris color pallescens, nonnunquã exalbidus: folia sursum spectantia ab ipso statim exortu in vitroque genere purpurascensibus quibusdam lineis decorantur, deorsum verò inflexa, in pallescens exalbida sunt, in albicantem autem viridi colore perflua: pallescens item Oxycantha vulg. floris odorem profusus emulatur: aliter etiam odoris.

Quinta solo floris colore à Quarta differt: is enim flavescit, & superiora folia purpurascensibus virgulis siue radiis exornatur, propendentia labra vel nigricante, vel dilute purpura in medio infecta sunt: odoratus huius etiam est flos. Stamina porò huius & quartæ alba sunt. Omnium verò foliola stamina & fimbria, magnam partem regentia, bifida sunt, binasque pinnas surrectas, ut ea quæ in Iridibus bulbosis, habent. Purpureæ præterea, albæ, & versicoloris folia secundum radicem plerumque purpurascunt.

Nascuntur omnes in nudis & apertis collibus Pannoniæ & Austriæ: Cæterum tamen insignem, inquit Clusius, varietatem ex femine deciduo sponte gigni non est dubium. Nam versicoloris semina à me in hortulo tertæ commissa (illius enim ob floris elegantiam periculum facere volui) & pallidas, & albas, & versicolores matris similes protulerunt, & alias præterea ad eam quidem accedentes, sed leuibis quibusdam notis inter se discretas, quales verbis exprimere difficillimum, verèque de iis illud Poetæ dici posse existimem:

facies non omnibus una,

Non diversa tamen, qualem decet esse sororum.
Clus. pro Chamæiride latifolia minore, prima, excauli, iconem proponit cui caulis foliatus, quæ in Iconibus Plant. pag. 62. posita est sub inscriptione Iridis violaceæ parvæ Lob. 13. T. 89. Est etiam cum caule apud Clusium ic. cui super scriptum, Chamæiris latifolia minor 4. quæ Icon. Plantini pag. 66. inscripta, Chamæiris altera lutea T. 91.

Iris humilis latifolia minor tenerima, Clusio Chamæiris latifolia minor sexta.

Chamæiridem latifoliam minorem sextam infra Budam in Pannonia Mæsæ finitima Decembri erutam, dum Constantinopoli Viennam rediret Ianuario sequente mihi (inquit Clusius) Stephanus von Hansen dono dedit, quam propter teneritatem fictili credidit, & ad eò diligenter fovit, ut Maii sequentis initio florem dedit: à Latifoliis autem minoribus iam descriptis nec radice differt nec foliis, quæ circa radicem non purpurascunt: nec eius flos illarum floribus dissimilis est, plurimum enim ad Quintam genus accedit: labra tamen propendentia obsoletum colorem pallido permixtum habent, & ab eorum ima parte vique ad extremam fimbriam quæ pallida est, purpureæ excurrunt venæ: pinnata

Tom. II.

terna folia quæ alba stamina tegunt, ex pallido albescunt: sursum verò erecta pallida sunt, circa imum tamen obsoletè purpurascensibus radiis aspersa. Illo quidem anno *1590* fuit. Sequente tamen breuè admodum caulem, vix ternos digitos supra terram eminentem habuit, cui insederunt bini flores. Eam cum reliquis ferè Iridum generibus, & selectissimis quibusque aliis stirpibus penitus corruptit anni 1585. asperissima hyems. Cæterum apud Belgas multò plura Chamæiridis latifolix genera aluntur, femine nata, præsertim Bruxellis. Inter cæteros autem Ioh. Meitens, illius urbis Medicus, diligentè culturâ summam in ista stirpe varietatem adquisiuisse perhibetur. Aliquot eorum genera communicabat mihi 1590. anno N. V. Jo. Boisson: sed cum quaedam perierint, an eum superiùs descriptis illarum aliquæ conueniant, nihil affirmare possum: duarum tamen quas conseruauit, & quæ biennio post florem dederunt: ut quamdam etiam aliarum, quæ in meo hortò spontè natæ, eodem anno floruerunt, historiam adiciam.

IRIS HUMILIS LATIFOL. MINOR ELE-
gantiss. variè picta, Clusio Chamæiris 7.



Chamæiris
latifoliam
minore 7. Boi-
sso? ad me mit-
tebat, inquit
Clusius eleganti-
ssimam: quæ
radice quidem
neque foliis à
reliquis differe-
rens, neque et-
iam floris for-
mâ: sed color
diuersus, & ad-
edè variè pi-
ctus, ut diffi-
cile sit, cum ex-
actè verbis ex-
primere: &c.
Flori succede-
bat longiuscu-
lum triangula-

Chamæiris

7.

Descriptio

re caput, quod plurius corruerunt. Florem cum aliis Chamæiridibus Aprili dedit nulla odoris gratia commendabilem.

Clusius iconem notam proponit.

*Iris humilis latifolia minor flore vario eius foliis
valde incuruis: Clusio Chamæiris 8.*

Chamæiris latifolia minor 8. auctore Clusio, à liquam affinitatem habere videtur cum septima siue elegantissima ei spontè nata Fracofurti: florem cum aliis dedit Aprili. Nouem autem vt reliquæ folia habet, quorum tria deorsum inflexa & terram spectantia, longa, & præter reliquarum in Iridum morem adedè incurua sunt, vt extremo mucrone floris pediculum auctra parte amplectantur: colorem verò habent infimâ partem flavescentem, deinde dilute purpurascens, saturatioribus tamen venis distinctum, ab infimâ basi & villosâ fimbriâ candicante, flavescentibus apicibus donatâ, quam integi bifidum foliolum exalbidi & pallescens ex dilute cæruleo colo-

Ppp 2

ris, quali etiam surrecta tria sunt folia: odor ferè florum Sambuci aut Thalictri.

*Iris humilis latifol. flore pallid., albican-
te & vario, an Clusio Chamæris
latif. minor. 9.*

Locus: Est nobis Montbelgardi in horto Ill. E. C. Iris parua latifolia flore ex luteo pallido & albicante ac vario, quæ nobis missa Vezuntione à D. à Belle fontane: Eam prius videramus non longè à Marnant in Burgundia in horto Nobilis ab Aigle pierre anno 1588. dorebat Aprilii.

Tempus Considerandum an hæc non tradatur per Clusium in post. hist. pro Chamæride latifolia minore nona, de qua ait: Quam à Iacobo Platreau accepisse scribebat Boissorus, radice, foliis, floris formâ, cæteris Chamæridibus erat similis. Eius tria folia terram spectantia *à respectibus* erant coloris, ah imo ad extremam vsque fimbriam purpurascens radiis aspersi: sub fimbria verò, quæ folium sese magis pandit, purpureâ maculâ erant notata, radiatum in latera se spargente, oræ autè erant exalbide: fimbria ab imo ad folii inflexionem flauis villis constabat, vbi verò purpuream maculam attingebat, albis: bifida folia eam tegentia alba erant, quemadmodum & terna folia sese attollentia, sed neruus medius in vtrisque *à respectibus*, infima pars surrectorum foliorum obsoletæ purpureæ radiis distincta, suprema verò, internè paucis notis leuiter purpurascens infecta: exerts autem licet odoris, coloris tamen gratiâ non carebat. Illi non dissimilis sponte nata Francofurti, quæ eodem anno flores dedit.

*Iris humilis latifol. minor flore vario
violaceo, Clusio Chamæris 10.*

Chamæris latif. minor Clusio. 10. Chamæris latifolia minor 10. mihi, inquit Clusius, Francofurti nata non inelegans, quæ semipedalem cauliculum proferebat, teretem, geniculatum, summo fastigio gestantem membranaceum folliculum purpurascens oras habentem: è quo emergebant bini flores non magni: nouem etiam foliis constantes, quorum tria repanda basi erant angustâ, foris purpurascens, internè autem candicante, & saturæ purpuræ venis distinctâ vsque ad folii inflexionem: labra verò propèdientia ad eò saturi violacei coloris, vt quodam modo nigrescere viderentur: *fimbria* villosa flauescens infimâ parte, reliquâ purpurea erat: terna eam integentia purpurei erant coloris, veluti & terna surrecta folia: nullâ autem odoris suauitate commendabilis.

*Iris humilis latifolia minor flore vario, foliis
inflexis candicantibus, Clusio Chamæris
latifolia minor 11.*

Clusius scribit Francofurti sibi natam Chamæridem latifoliam minorem vndecimam non inelegantem, quæ à tuberosa radice dodrantem aut pedem longa producebat folia, instar eorum quibus alia Chamærides sunt præditæ, lata videlicet & mucronata: inter quæ assurgebat cauliculus duas aut tres uncias longus, sustinens summo fastigio, veluti folliculum binis membranaceis foliis constantem: è quo prodibat flus nouem foliis præditus eiusdem formæ cum aliarû Chamæridum flore, quorum terna versus terram inflexa, latiora, candicantique coloris erant,

ab infimâ sede (quæ angustior) multis venis ex flauo purpurascens in latera expansis distincta, vsque ad extimam fimbriam, siue supercilium, usque deinde à supercilio ad extremas oras: quæ albescerent, crassioribus, & coloris purpurei nitidioris: terna verò surrecta, quæ inter illa nascebantur, infimâ parte valde erant angusta, venis quibusdam furui & luridi coloris distincta, postea in latû se pandebant, tenerrimæque erant, & exalbidi coloris: terna reliqua, quæ breuiora & in fornem conuexa, bifidæque erant, aliquantum reflexis sursum alis, ligulam pallentem tangebant, & fimbriæ siue supercilio trium propendentium & terram spectantium foliorum imminebant colorisque erant albi, cui subcaruleus color nonnihil admixtus, præsertim in ipso gibbo: odor nullus aut ualde exiguus.

IRIS ANGVSTIFOLIA MINOR Clusii quarta.

Est nobis Iris angustifolia sicca ex plantis Valerandi Dourez, dodrantalis, ac etiam minor



& maior: radice obliqua rorosa, sub qua crasse fibræ albæ: veterum foliorum vestigia multa, folia autem angusta graminea in acumen desinentia: caulis ipsis foliis breuior, in cuius suprema parte magna capita, seu siliquæ, quales in Xyride siue Spathula vulgari, ex tenui vagina procedentes: nec foliorum, nec florum formâ nec capitibus, feminæ, aut caule, & radice differt à Tertîa: humilior est duntaxat, eius etiam flores paulò minores, & angustiores, meâ quidem opinione, atque etiam dilutiores. Primâ tamen floribus saturatioribus. Illi porrò Iridis maritæ minoris nomen est impositum, quoniam non nisi locis maritimis spontè proueniat.

De hac censemus scribere Lobel. & Pen. Adu. his verbis: Iris maritima Norbonensis, an Medium Dioscoridis? &c.

Hæc autem planta eadem videtur cum Xyride maritima Hist. Lugd. de qua hæc tradit: Inter permulta & varia purgamenta quæ in lictora fluctus ciciunt, planta hæc sæpius reperitur, quam Xyrim marinam vocant Herbarii. Radice est longa, crassa, geniculata, cortice rufo obducta, multum fibrata: caule pedali, foliis vndique aggregatis operto, longis, virgatis, in cacumine mucronatis. In caulis fastigio tres quatuorve siliquæ prominent, & ipsæ rutescentes, angulose, seminibus sætæ velut compressu dilatatis, rufa membrana contextis, perspicua tamen vtrinque macula in medio nigra: cum manduntur lignosæ & duris, gustu subatringentibus.

Nascitur hoc genus Clusii quibusdam Hispaniæ & Galliæ Narbonensis locis maritimis, veluti non procul Valentia, & monte Setio vnde in Belgium delatum, sua varietate hortos istuc exornat, non minus quam Austriacos, Clusii operâ istuc à Belgio accersitum nam illo genere carebant Austriaci.

IRIS GRAMINEA CUI PEREVNT quotannis folia.



PUlcrum quoq; sui spectaculum oculis offert in tanta Iridum varietate, & hæc pusilla, ex cuius radice inodora, tenuiore & graciliore quam cæterarum Iridû; nodosa, nigro cortice tecta, obliqua, breui tempore magnum cæspitè occupante, vt cum difficultate erui queat, vales palmaris tenues sur-

riguntur: flor amœnus è subiecto calyce sex profundis sulcis, toridè que acutis porèis exarato, emicat, foliis quidem lenis aliarum more conitans, sed multùm diuersis: primùm enim tria extrema folia repanda, extremâ orâ albis violaceisque striis obliquis variata sunt, inde contractius folium quasi ex isthmo eluctarum paulatim latefeit purpurascens in lateribus, nullâ in medio hirsutâ fimbriâ, cuius locum supplet linea lata lutea itriis purpureis picta, cui extrinsecus respondens costa ex luteo virefcit: hisce incumbunt similiter repanda tria illa bifida folia, que in medio quidem è viola purpurascunt, à lateribus autem è diluto rubore ferè cinerea sunt, quibus auersa parte apprimuntur stantina latiuscula cultrata coloris ferruginei: hisce alterno positu interiecta sunt tria reliquis minora duplò folia, colore violaceo, neutiquam in summo, reliquarum more coëuntia, sed apicibus conuolutis à se inuicem distita. Odor nobis gratus Prunorum, & Clusio Armeniaci mali. Succedunt capita sublonga & turgida, valdè eminentibus costis prædita: Hanc vocamus gramineam propter folia tenuia angusta valdè, non rigida, virentia, longa, & quæ hyemè accrescunt. Clusius ait se huius Iridis duas differentias deprehendisse, vnam pedalem interdum adquirere caulem teretem, binòsque aut ternos in eo plerumque gestare flores, Alterius caulem vix dodrantalem superare altitudinem, & vnicum, magna ex parte florem proferre.

Est hæc Iris illa Illytica ab Hermolao vîsa Paduæ in horto Fælicis Sophiæ odore Pruni præmaturi.

Cord. Obs. sylv. Herba Iridis foliis Ollingero ex Italia pro Iride Illyrica missa. Iris sylv. altera Marthioli est foliis Gladioli longioribus, radice tenui, lignosa, geniculata, subrusa, inodoraque:

Tom. 11.

caule breui, flore cæteris longè minore, odore Armeniaci Mali. Constat hic foliis nouem purpureis, quorum extrema, superiore tantùm parte aureis pinguntur lineis: sunt qui hanc legitimam illyricam putent, in quorum sententiam etsi iam pridem deuenim, tamen rem longè aliter se habere postmodum comperi. Quandoquidem præferri Illyricam nouerim non quòd genere vel specie à nostrate differat, sed quòd cæli, solique illius conuenientia præstantioribus polleat facultatibus, quod docuit ante Galenû Theophr. l. 9. c. 7. Scribit iam Iris sylv. altera dicta; & in hortis frequens est, tum ipsius floris amœnitate, tum coloris præstantia, tum etiam quòd nouis delectentur homines. Syluestris vtriusque generis plurima oritur in Goritensi agro Saluatino monte, & Iapidia collibus inter saxa, odore non ingrato, quamuis etiam ambas viderim in campellibus, non longè à Sontis ripis. Iridem esse Illyricam Hermolaus Barbarus existimauit: sed ab Illyrica & legitima Iride eam differre, Antonius Muza in Examine simplicium, satis ostendit.

Illyrica dist. ferentia.

Nos (inquit Dodon. h. fl.) Chamæiridem nuncupauimus, antiqua desitutam appellatione, nisi forrè Iris sit Astragalites dicta, cui aliquatenus similis est. Iris perpusilla sylv. angustifolia Lob. Obs. quam iamdiu deserperunt, & vocarunt Chamæiridem Herbarti nostri, foliis gramineis, rigidis, spichameis & pedalis, pusilli gladioli similibus, floribus expallis, cæruleo iolaceis, aliquando purpureo iolaceis, nouem foliolis confatis: caulis palmaris & dodrantalis: radix gracilis, minimo digito duplò minor, acris, gustu Xyridis: in Germania & Belgio frequentior prouentus. Chamæiris autem inter Irides minima est, folia habet Gladioli minora, angustiora, pinguiora: radices foris ruffæ, intus candidæ, duræ, gustuque feruentes. Considerandum an sit minima Iris & folia an sint pinguiora quàm Gladioli, nobis non videtur.

Contra Hermol. Chamæiris

Dod. not.

Plant. Icon. pag. 69. Chamæiris angustifolia Lob. 34. Teut. 97.

Peregrina Iris Dod. non modò Belgio aut Germaniæ, sed & Italiæ, vt fertur, est: non nisi in horti reperitur. Floret Maio mensè: folia hyemè pereunt: Vere erumpunt noua. Prouenit vtraque passim in pratis Viennæ Austriæ vicinis ad radices montium sitis, præsertim quæ in altiore caulem assurgit, plurèsq; flores profert, nec differre putat Clusius (minorem saltem) ab ea quam Dodonæus Chamæiridem simpliciter, Lobelus autem Iridem perpusillam siluestrem angustifoliam, appellant, Belgicis hortis iamdiu familiarem.

Est nobis in horto Ill. E. C. Iris quædam parua cui folia hyemè accrescunt. Geneuæ in hortis habent: folia producentem ibi vidimus Martio & florentem Maio: Geneua adferendam curauimus & plantandam in horto E. C. vbi nobis floruit etiâ Autumno: Lugduni habebamus in horto, nec non alii: Placentiæ in Italia obseruauit in hortis, & Basileæ, audiui qui vocarent Grasslilgen, Lilia graminea: quibusdam Cosmofandalum dicta fuit.


Facultate & viribus hæc Iris acris & impensè calida est, aliisque Iridibus similis.

IRIS TENVIFOLIA MAIOR FLORE cæruleo & striato, Angust. 1.

PLurimum differt huius radix ab aliarû: Est enim & compluribus fibris albis, cum non-

Descriptio P P P 3

Descriptio



cultantia: reliqua tria violacea surciguntur.

Plant. Icon. p. 69. Iris sylvestris Byzantina peramœna. Teut. 97. Falluntur qui Irin n. siue angustifoliam mediam, siue variam Irin angustifoliam Pannonicam Clusii vario flore, Constantinopoli collectam putant, & ideo aut Illyricæ maioris, aut silu. Constantinopolitanæ cognomen illi in Belgica dederunt: cum Clusius non inde aduectam, sed in vlginosis pratis vrbi Viennensî vicinis erutam, & ipsius semina in Belgicam miserit.

Iris angustifolia altera quæ perelegans est nulli Clusio Hist. post. fuit inspecta anrè quàm in Austria proficisceretur: habetque cubitalia, interdù etiã longiora, folia, admodù angusta, minimi digiti altitudinem non excedentia, viridia, nõ tamen splendentia, summâ parte mucronata, infimâ verò quâ sub terra latent, purpurascencia, nullo ingrato odore, vt pleraque aliarum angustifolarum, prædita: caules habet sesquicubitales, nonnunquam bicubitales aut ampliores, rectos, teretes, firmos, licet intus cauos, genicularos, virides, summo fastigio in binos, aut ternos ramulos diuisos, quibus insident bini aut terni flores, Iridis bulbosæ versicoloris latifoliæ floribus formâ similes, odorati: quorum tercia folia deorsum inflexa, infimâ parte, & quatenus bifido alatoque folio ligulam occultente teguntur,

furu colore sunt, reliquâ verò parte (quæ in nonnullis breuior & latior est, in aliis oblongior & angustior) nunc candicante, modò purpureos seu violaceo colore, venis saturatiore purpureis, nitentibus per folii longitudinem excurrentibus, & simbriâ siue supercilio carentes: tria sursum erecta angustiora sunt, & cum bifidis illis exalbidas ligulas tegentibus, purpurei futuri siue violacei sunt coloris: breues deinde succedunt siliquæ, siue capita triangula, breuiora quàm in præcedente, neque adeò mucronata, neque geminâ costâ eminente prædita, quæ per maruritam nigricantem colorem contrahunt, & dehiscunt, semen inæquale, angulosum, non nihil compressum & durum continentia: radix nigra, tenuis, dura, nodosa, instar superioris, fibris duris & tenuibus prædita.

Clus. in Pann. & post. hist. præter modò dictam Iconem aliam habet, cui titulus Iris angustifoliæ 2. species altera, quæ non parum differe videtur, licet in descriptione nulla fiat differentie mentio.

Iridis angustifoliæ siluestris varietates, Belgarum sedulitate in nostris hortis (inquit Lobel. Obs.) cultæ visuntur, angustifolia & latiore folio sesquicubitali Irides: sed vtique flores terni & quaterni iuxta cauliculi cubitalis ramulos, cæteròquin cum superiore haud absimiles. Eas virentes primùm videndi copiam fecit in suo viridario peritissimus Allardus Rucius D. Medicus Insulanus: postea Ioh. Souue/ aliàs vogelsang: aliique non pauci. Quas Irides intelligat Lobelius errò affirmare non possum.

Primùm illam spontè prouenientem, non procul Vienna Austria: in pratis supra Himbergam, Eberstorf ad paludes, atque Austria prætenibus locis (ait Clusius) reperiebam. Mittebat postea ad me illam siccam, in Sudetum montibus erutam Ludo. Camerarius. Anno verò 1579. frequentissimam circa Sackturniam Ill. Comit. de Zrinio arcem, aliisque pratis vlginosis inter Muram & Drauum Hungariæ Cisdanubianæ flumina, quemadmodum etiam in Comitatu Saladiensi inter Lindvva & Mulam fluiuium obseruabam. Floret & semen profert eodem quo superior tempore. Iris hæc tenuifolia maior habetur in Horto Ill. E. C. missa Sturgardiâ.

IRIS ANGVSTIFOLIA FLORE ALBO.



Iris candidis floribus angustifoliâ, Lob. Adu. par. 2. Iridi Clusii vocata, siue Iridi angustifoliæ Clusii secundæ similem in pedibus Adonisidique hortis alebat Medicæstri Mattiacorum D. Cornelius Coorue, sesquipedalibus aut potius longioribus foliis, paruum digitem latis, in sesquipedali aut bipedale caule,

caule: floribus albis aspectu suauissimis donato, quorū terna repāda folia latiora venis siue neruis suauē rubentib. iucundē insignita sunt, nec non oris perpolitē breuioribus lineis concoloribus striata: aliis verō incumbentibus ternis, & totidē angustioribus surrectis foliis penitus candidis. Radice Iridis Clusii vocata, siue angustifoliæ secundæ non ab simili, multis fibris donata. Francoalle, vulgò *Franckdal* à Nicelao von *Brabāt* in Belgium primū missa.

IRIS TENVIFOLIA FLORE VIOLACEO,
an Clusii tertia?

Hanc apud D. Platerum vidi, *flo* duriore, solidiore, rigidiorēque, quā Iridis gramineæ, colore glauco Iridis vulgarioris, longitudine cubitali. *Caulis* cubitalis, *flores* gent intensē purpureos, paucos, foliis non ita vt vulgò videmus, reflexis, instar florum Iridis gramineæ: cui etiam similes sunt subsequentes *siliquæ* angulose. Nos Basileā Montbelgardum in hortum Ill. E. C. Wirtemb. transfulimus.

Considerandum an hæc sit Iris angustifolia tertia Clusii hist. post. de qua scribit: Ex radice nodosa multa producit folia firma longiora quā secunda, & prioris foliis magis angusta, saturaque viriditate prædita, non nihil etiam fœtida: inter quæ cubitalis assurgit caulis, firmus, aliquot flores proferens, Secundæ floribus longiores, & Primæ floribus parē similes, sed longē saturatione purpurā & quali nigrā præditos: quibus succedunt capita primæ capitibus similia, semine etiam simili plena: radix, vt dictum est, nodosa, dura, foris nigra, minimi digiti crassitudine, interna parte ex albo flauescens, antrorsum & in latera progrediens, aliarum angustifolarum Iridum instar, & tandem veluti in orbem sese spargens (quod omnibus Iridibus est commune:) multis fibris donata gracilibus, duris, siccis, lentis tamen, & fractu contumacibus, quarum anteriores & nouellæ crassiores, molliores & candidæ. Cæterum huic suæ Iridi tertiæ Clusius Iridis marinæ maioris nomen indidit quoniam iidem in locis cum quarto proveniat.

An Dodon. Hist. & in fol. Iris quam minorem siue tenuifoliam appellant, aliis quidem similis, sed minor aut tenuior, quæ folia habet breuiora, angustiora, nigrioraque, aut cæsi quasi coloris, quæ conficiata, grauiusculum reddunt odorem, Spatulæ fœtidæ propemodum persimilem, sed tamen minis graueolentem: caules similiter breuiores, sæpè vix cubitales: in quibus flores bini, terniue, alterni, colore cæruleo saturato, subinde Violaceo purpureo, formā aliarum Iridum propemodum similes nisi quòd ipsius foliola singula angustiora sint, & superiora contrā in se mutuo nõ ad eò recurrunt: sed ferè erecta cõstant: inferiora verò ac deorsum reflexa fimbriam non habeant: sed folan lineam luteam: quā tamen parte calyci proxima, non nihil hirsuta est: radices quoque obliquæ, nodosæ, & sibi inuicem implicatæ, & quandoque quādam aliarum densiores, longas, multasque fibras inferitis de nitentes, foris rufæ, intus subcandidæ aut sublutæ, gustu feruido, vt aliarum.

Nascitur in Germania, teste Valerio Cordo, & non procul. Floret eodem quo alia tempore. Videtur nonnullis Plinii Rhizotomos. Sed Rhizotomos Illyricæ est species & quidē præstantior, Plinio auctore: hæc verò contrā aliis o-

dore & potentia inferior, nec in Illyride sed in Germania reperitur: proinde non Illyrica, aut Rhizotomos, sed sui generis Germanica & tenuifolia quædam Iris, quæ Spatulæ fœtidæ species haberi possit si semen quod in siliquis gignitur, non vti aliarum Iridum planum, sed velut Spatulæ fœtidæ rotundum esset.

Cæterum potentiā huius radix vehementer calida feruēque est, facultate & viribus aliis Iridibus non inferior: ad eadem, ad quæ illæ, ea propter, præsertim recens, vitilis.

Vt verū fateamur Iridem Dodon. non possumus asserere eandem cum Clusiana 3, quia ic. à Dodongo propolita pro Iride minore, à Clusio ponitur pro Iridis angustifoliæ 2. specie altera: præterea ignoramus an eadem sit cum Cordi & Gesneri Iride tenuifolia.

IRIS TENVIFOLIA MICHELFELDENSIS
spontanea: fortè Clusii Angustifolia
maior siue prima.



Frequens est in palustribus Michelfeldensis prope Basileā spontanea quædam Iris, *caule* duos cubitos superante: *flores* magno satis, cæruleo, vel purpurascēte, *Siliqua*, magna, longa, foliis cubitalibus, angustis, angustioribus inquam, quā Gladioli. Hanc nobis Fr. Casp. Bauhinus loco dicto collectā misit.

Facilis

Descriptio

Considerandum an hæc sit Iris tenuifolia Cordi H. pl. [quæ Gesn. annotante, non procul Tiguro nascitur] tenuior fatiua, siluestri & Xyride, foliis dodrantalibus aut pedalis, semenciā latitudine nunquam superantibus, plurimis a dēso radicem cæspite assurgentibus. Caules fatiua Iridi similes profert, multo tamen graciliores, in apricis pratis cubitales, in frutetoso verò proceriores, flores foliorum numero positi & forma fatiua similes habet, nisi quòd minores magisq; purpurei sint, & flaua eucæ simili lanugine careant, cuius vices occupant: iuxta singula tria inferiora & inflexa folia, totidem lincētis in purpura coloris stamina. Radices subsunt multæ, transtuerse, graciles, in superficie nigricantes, & propter vetustas foliorum reliquias villosæ, intus candidæ, sibi ipsis implicatæ, a quibus prædictarum Iridum modo exeunt fibre & Cirri: tria, recentis adhuc folia medium inter syluestrem Iridem & gramen odorem spirant: Radices verò præscriptarum more fauces exurunt. Nascitur in apricis planisque pratis, & frutetosis ac humentibus campis &c.

Hæc puto (inqt Gesn. hort.) est quæ in pratis humidis quibusdā apud nos crescit copiosè: & seminæ quoque profert, Illyricæ similis, vt audio: com-

æuni vrbana vndiquaque minor. Eadem in hortulo meo iam aliquot annos durat. Ab hac differre puto duas siluestres à Matthiolo exhibitas, in montibus & collibus laxosis nascentes.

Tragus, fortè hanc tradit his verbis; In quibusdam humectis pratis & campis, quæ Rheno prope Vormatiam, & Oppenheimium oppida, adiacent, Gladioli cærulei quoddam genus inueni, cuius flores aquei penè coloris, sed cum cæruleo mixti videbantur esse, ternis versus terram inflexis foliis singuli præditi. Cæterum quod ad reliqua attinet, hoc est, folia, caulem, & radicem: Iridi de qua sequenti agemus capite, per omnia accedit hic Gladiolus, nisi quod tota sua substantia magis exiguus, & angustioribus foliis & acutioribus illà esse deprehenditur. Semen fert in oblongis ac triangularibus siliquis, non aliter atque Gladiolus luteus. Inter omnes Gladiolos nullus sanè extat, qui mihi quidem aptius ad Xiphion seu Gladiolum Diolc. referri posse videatur, quam hic ipse Gladiolus cæruleus exiguus, quem Germani flein blaw Schwerel vocant.

Iris angustifolia maior Clusii Hispan. Iris 10. Pann. Et Hist. post. Iris angustifolia prima & maior, quæ multa profert folia longæ, rigida, angusta, nigra, quæ compressa vel contracta, ingratum tetrumque odorem spirant, propemodum vt Spatulæ fœtidæ vulgò appellatæ folia, minùs tamen graucolentem: inter quæ caules teretes, oblongi & cubitales, interdum etiam longiores exurgunt, quaternos aut quinos flores ex vaginulis lateralibus prominentes, Iridis bulbosæ verticolaris floribus formà non admodum dissimiles, colore cæruleo saturatio: præditos, quibus succedunt oblonga capita trigona subrufa, multò firmiora, magisque cartilaginosa, quam latifoliarum Iridum, iis paria quæ in Tripolitana, angulis etiam eminentibus, & quodammodo geminis, quæ deficiente, semen duplici serie digestum, aliquantulum compressum & angulosum, ossæque duritiei, subrufescente membranâ tectum ostendunt: radices obliquæ, longæ, nodosæ, graciliores quam in latifolia, Tripolitana radicibus æquales, foris nigricantes, intus candicantes, aut pallescentes, sapore acri & feruido, multas longasque fibras spargentes. Istius genus inuenitur, iam descripto per omnia simile, præterquam quòd in eius foliis contractis nullus grauis odor percipitur.

Locus.

Primi generis primùm conspiciebat in Belgicis hortis cultam, deinde anno 1564. plurimam spontè nascentem in amplissimo quodam prato, flumini Rheno vicino, viâ quæ Mogutiâ Oppenheimium ducit, obseruabat: aliquot deinde post annos, herbosis quibusdam locis iuxta vias, & ad quorundam pratorum margines non procul à Manderstorf, quinto à Vienna Austria milliari, atque etiam apud Walterstorf: postremùm anno 1597. in pratis quibusdam Hungariæ apud Lindvva Ill. V. D. Banasy arcem.

Floret vtrumque genus Maio, interdum duntaxat Iunio, si asperior hiems præcesserit: semen maturum est Augusto.

Iris angustifolia flore violaceo, reflexis foliis lacteis, & purpureis venis variis. Clusii s.

Iris angustifolia.


Iris angustifolia quinta nec foliorum forma, nec radicibus multùm differt à maiore marina: nisi quòd folia habere non videatur tam atra viridi-

tate prædita: flores etiam plurimùm differunt: nam tria surrecta folia purpurei sunt coloris & violacei, tria verò reflexa, & terram spectantia paulò latiora sunt, & multis lacteis purpurei squamis alternatim permixtis ab ipso folii vngue exorientibus, atque secundum longitudinem & in latera se spargentibus, gratissimam varietatem exhibent. Floret cum marina, seriùs primà, Iunio videlicet mense, semen maturitatem acquirit Septembris initio. Hanc spontè nascentem non vidit Clusius, sed in Belgicis duntaxat hortis cultam obseruabat.

IRIS TRIPOLITANA FOLIIS longissimis flore aureo.

Proximis annis (inquit Clusius) Tripoli adferebat. Iridis genus quod 1599. florem protulit Amstelredamensi Ciui, qui eius caulem cum flore & siliqua ad me mittebat Iunio mense: ipsam etiam plantam biennio antè mihi communicauerat, quæ quidem etiamnum viget, sed florem nondum tulit: Est verò hæc Iris Tripolitana è celsiorum aut altius assurgentium genere, folia habens reliquis quas cõspexerim multò longiora, bicubitalia videlicet, mediâ inter latifoliam & angustifoliam latitudinis, vnciam videlicet lata, reliquarum Iridum foliis magis viridia, non tamen splendens, vt Xyridis: caulem habebat inter folia prodeuntem, quinque pedes longum, vel etiam longiorem, rotundum, firmum, licet non valde crassum, nodosum, & aliquot breuioribus foliis præditum: in cuius summo bini & terni flores è vaginis prodeuntes, nouè foliis in ambitu quodammodo sinuosis, constantibus, Iridis bulbosæ flauo flore floribus formà non dissimiles, aurei coloris, quorum tria maiora versus terram valde reflexa, & iis incumbentia tria alia minora alata ligulam flauam regentia, tria reliqua è lateribus maiorum prodeuntia, assurgunt instar illorum quæ in Iridibus bulbosis conspiciuntur, bilidumque mucronem habebant: floribus successerunt trigona capitula, in singulis lateribus geminà costâ siue neruo secundum longitudinem eminente, non dissimilia capitibus Iridis angustifoliæ maioris, similibus etiam feminibus plena: radix digitalis crassitudinis, nigricans, & nodosa, instar radicis angustifoliarum.

IRIS TUBEROSA BELGARVM.



Andem, Descri. Inquit Lobel. Obs. quæ nostris hodiè Iridem bulbosam nuncupant & perperam Math. Hermodactylum verum facit, cum Aldroando peritiores Itali pleriq; Dioscoriorum Lonchitidem sanxerunt, quod nulla extaret planta propius Lonchitidem adumbrans.

brans. *Folia* illi Hyacinthi poetici, portacea, striata, rigida, quadrangula, in mucronem cuspidatum fastigiata. *Flos* quadrantenus Iridis, cuius folia repanda, seu galerioli hiantibus comiciis personis similes, obscurè virentes, fimbriis nigricantes. *Semen* inuolucris clausum, (Lancea simile, triangulum Diosc.) angulosum. *Radix* tuberosa variè depacta: quæ in plures digitatum, flore marcido, propagatur: vnde Hermodactyli nominis occasio. Quem ad vinum depingi Bononiæ curavit benevolentia Cl. præceptoris Vlyllis, ab hac nostrate tantillum variare videtur.

Plant. Icon. pag. 98. Iris tuberosa Belgarum, Teut. 134.

Ad Irides pertinet (inquit Dodon in fol.) & quam tuberosam cognominari contingit: *filia* sunt huic oblonga & angusta, ferè Chamæiridis folia referentia: tenuis cauliculus: flos verò in cacumine erumpit forma Iridis, verumtamen & minor, & angustiorum foliorum, qui obscurè viret, ac, quo Iridis floribus fimbria loco, nigricat: capitulum satis magnum perfectò semine dependet, in tres rimas facilis: semen rotundum, Ochro minus, initò inalbicat: non vnius formæ radix, autè florem duo aut tres veluti bulbi coherent, hoc verò enaro in plures singuli extuberant propagines, quarum nonnullæ digitum referunt. Peregrina sitis est, quæ ex Orientis partibus, & vicinis Constantinopoli regionibus, & in Italiam, & in Belgium illata fertur. Iridis sylvestris genus esse videtur: atque idcirco à forma radicum, Iris tuberosa dici potest. Matthiolus Hermodactylon esse: alius Lonchitim priorem esse suspicatur. Cum Hermodactylo, quo Olicine vntur, à Serapione sic appellato haudquaquam respondet. Si autem idcirco Hermodactylus, quod radix digiti figuram quandoque refert, alium esse à Serapionis Hermodactylo oportet. Nam Colchicum Dioscor. Serapioni est Hermodactylus: ab hac Iride autem differens est Colchicum. Lonchitim verò hanc esse priorem, non ita quoque constat: Si etenim ex eo Lonchitis nomen habet, quòd semen triquetrum lanceæ cuspidi simile sit, hæc Lonchitis esse nequit: cum semen non sit triangulare. De facultatibus autem huius Iridis nihil scribendum occurrit.

Hermodactylus Camer. apud Matth. *quodammodo* dicitur, Atabibus *Sarungen*. Ital. *Hermadartilo*. Folia hic mittit prælonga, binò dodrantum, ac etiam longiora, Porri aut Asphodeli quadrantenus similia, longè tamen angustiora: breviora verò sunt, quæ circa radicem exeunt. Radices habet quatuor ex vna cademque basi prodeuntes, digitorum figura, colore subrufescente, albis in summitate vnguibus: caulis è medio prosilit tenuis, in cuius summitate oblongum prominet capitulum Pyri figura, Ephemeræ Colchici modo.

Oritur in Orientalibus regionibus, & in Arabia.

SPATVLA FOETIDA, PLERISQVE XYRIS.

CAP. XVI.


Nolentibus volentibus ab Equo ad Asinum, ab odore, inquam, grato, ad fœtidam, plerumq; Xyrin vocatam descendebus, hoc solatii occurrit, Deum & naturam nihil vnquam fru-

stra fecisse. Quemadmodum enim Asinus ad iter perficiendum, quamvis non tanto, tam celeriter, quam expedito cursu, vt Equus accommodet, atamen ad meliùs esse saltem necessarius est. Simili planè modo Spatula fœtida licet non ita iucundè ad cursum mundi huius faciat perficiendum, ad mala tamen plurima præcauenda & corrigenda multum præstat.

Radix itaque incurta, Dodon. in nouclis plantis, rotunda & veluti Bulbi aut Cera alicuius ca-

Descrip.

put, ex qua fibræ dependent crassiusculæ, veteribus & multorum annorum plantis, multæ, longæ, geniculatæ, sibi inuicem impletæ, magnum veluti cæspitem constituentes, denique vt forma, ita & æctimonia intentæ, ad Iridis accedit: *filia* multa cubitalia & sesquicubitalia, in cultratù mucronem desinunt, angustiora quàm vulgaris Iridis, atro vitore splendentia, fœtidum Cymicum odorem attritu obolentia: inter hæc *caules* plures glabri, crassitie mediocri per media folia recti assurgunt quorum singuli canaliculato calyci insidentem ferunt *florem* Iridis, sed minorem, nouem



foliis constantem, quorum tribus repandis ex purpura obsoleta albicantibus, virgatis, nulla fimbria villosa donatis, terna, modico intervallo imposita, fuliginoso colore, bifida, ligulas concolores occultantia: reliqua tria modicè erecta, ab exortu ad medium vsque circiter sulca, deinde ex albedo leniter purpurascantia: Lobelio flores dicuntur Iridis silu. ternis foliolis surrectis nec reflexis, purpura saturatiore Viola Martiæ, & in medio venis nulliòs luteis, & phœniceis: floribus succedunt *siliquæ* oblongæ, (vel vt ait Cordus silictris Iridis folliculis similes vtriculi, sed paulò maiores & triquetri,) quæ per maturitatem Pœoniæ instar dehiscentes *semen* ostentant rotundum, rubrum, minoris Pisi magnitudine, gustu feruido: *figuræ* adpositæ, quas iam

sculptas emimus non placent: *radix* non bene picta; apud Fuchium & Marth. quoq; non placet.

Hanc his verbis lib. 4. cap. 22. delineauit Dioscorides: Xyris folia habet Iridis, & latiora, & in cacumine acuminata: quorum è medio caulis erumpit cubitalis, satis crassus, in quo siliquæ sunt triangulares, & super ipsis flos purpureus, medio puiceo: semen in folliculis simile fabis, rotundum, rubens, & acre: radix crebris cincta geniculis, longa ac rufa.

Xyris apud Cordum, sine dubio est illa Iridis species quæ ab Italis spatula foetida nominatur, quam alii qui sine flore esse male crediderunt. Producit vero Xyris silu. Iridis species, folia caules, flores, & radices satiuæ aequalia & similia, nisi aliquid impediât, nam flores inagis saturatâ arident purpurâ.

Xyris et Gladioli species esse videtur Corn. quam officinæ spatulam foetidam appellant.

Si spatula foetida colore uti & flos responderent descriptioni Xyridis Dioscoridis, Xyridem assereret Anguillara.

Spatulam foetidam vulgò dictam Cordus & alii Xyridem Dioscoridis faciunt. Sed Diosc. Xyridi caulem crassum cubitalemque dedit, qui non est, inquit Gesner. in spatula.

Lobelii & Penæ Adu. de se scribunt, & Xyridem adstruunt, ac putant legendum apud Diosc. *xyris* pro *xyris*, radicem paruum. His porro testibus seueriores isti notarum exactores, vt plurimum indicant se nec multas plantas vernaculis natalibus eruisse, neque virium periculum multû fecisse. Dum enim nescio quid coloris & magnitudinis desiderant in radice & flore, nò meminerunt vtrâuis harum, vt plerâq; alias facillè non nihil, non ita magna de caula, mutari. Etenim si Iridis radices & flores colore, magnitudine, densitate, bonitate & odore adeò variat, vt eû Florentina si nostrâ cõponas longè aliâ colore & odore putes, quid ni possit tantilla mutatio Xyridi contingere.

Lobel. Oberu. & Ic. Plant. p. 70. Xyris agraria Theophr. Teut. 98. *xyris* siue *xyris agraria* Theophr. Adit. *xyris*, siue *xyris* appositè quidem *xyris* ob folii similitudinem, quasi rasorium cultrum aut nouaculam dixerit. Est enim illi folium, ancipiti nouacula similis, acutiore acie, & tenuiore rigidiorque quàm Gladiolus aut Iris mucrone. Lat. plerumque Xyris, Iris silu. & spatula foetida, tum ob eandem folii figuram (Spata enim gladium significat) tum quod grauem exhalet odorem, vulgò nuncupata est. Germ. welsch schmerzel & wurtelß frant; à cimicibus necandis. Belgic. wantluyfweyt, muldtsch & sinnende lisch. Gall. *spatule* ou *glaycul puant*. Hisp. *Ciris spadana*.

In Hetruria & aliis Italiæ locis spontè exit: apud Belgas [autore Dod.] vix aliis locis, quàm in hortis reperitur: florem edit Iulio & Augusto, semen Autumnò maruratur. Spontè nascens quibusdam præsertim Gallo-provinciæ & Angliæ, vbi quàm vberissima, prope vda prata & littoreos maris aggeres inspicere licet Lobel. Flores apparent Iunio & Augusto in Anglia. Passim Montpelii prouenit inter dumeta secus vias. Florentem vidi Maio, eadem mihi vîsa in orto Cl. V. D. Fuschii. Geneuæ habui etiam in orto femine turgentem Octobri. Patavii vidi in orto Iesuitarum & D. Triufani, & Pasqualigo. Venetiis in hort. Nob. Cornari. Veronæ in orto D. Alexandrini Serratii Medici & Nobilis, dicti Musardo. Ferrariæ in orto Monasterii S. Dominici à L'Angeli. Basilæ in hortis D. Doctor.

Fœlicis Plateri & Zvingeri cum fructu mensè Iunio. Habeo in orto E. C. cuius Stugardiæ in orto Ill. Ducis collegi femina.

Ea vi & acrimonia prædita est radix, tamen Corulam aut Cimices oleat, vt contra capitis vulnera [Diosc. quidem teite] faciat & fracturas: educat auculeos & omne telum extrahat cita dolorem: admixta flois æris tertia parte, radice Centaurii quinta, & melle, sanet tumores & inflammationes cum aceto imposita. Radix cum passo confusa bibitur ad cosuulsa, rupta, coxendicum dolores, vrine stillicidia, & alui profluvia. Semen ad ciendam vrinam efficacissimum est trium obolorum pondere in vino porum. Idem & lienem abluunt cum aceto potum.

Lobel. Ad alui profluvia bibitur non secus ac Rhubarbarum & Asarum: ventris fluores, materiam per vrinas deducendo & auertendo, supprimit: ceterum opilionibus & rusticorum plebi in præfectura Sömmereti Angliæ, huius radice decoctum, aut etiam insusum purgationes, Iridis modo, molitur. In omni alui profluvio nolimus experiri hanc feruidam radicem, fortè possit tolerari vsus in profluvio alui pituitoso.

IRIS PALVSTRIS LVTEA SIVE acorus adulterinus.

CAP. XVII.



IN obliquâ & complicatas radices agit multam fibratam, quæ propter superiorum vestigia & venenosas reliquias foris villosæ nigresque sunt, intus verò rubentes, substantia porosa, & cœu filis quibusdâ venosæ, sapore adstringentes strenuè nouis, quotannis oculis,

instar Typhæ aquaticæ gemma: *Folia* Gladioli, vel Iridis potius, longa, mucronata, quorum ea quæ propè radicem sita sunt subtrusa nonnunquam apparent: *caulis* duos cubitos æquat, & interdum superat, rectus, læuis, teres, spongiosus & interdum aliquousque inanis, in alas diuisus: *flore*: Iridum formâ ferè, lutei, inodori: quorum tria folia reliquis sex maiora, extrossum repanda, lutea, simbriciæ supercilium imitantis loco, & vtrinque adiacentibus foliis marginibus lineis nigris variegata: hecce intercedunt terna, alterno posita, surrecta, valdè angusta & breuia, tota lutea: sicut & intima quæ crista bifida reliquæque forma cum iride violacea vulgari conueniunt, solo colore illo luteo quo fulgent excepto, quibus à dorso appressa femina, ex luteolo rubedine quadam prædita: sapore est flos totus feruidissimo.

Xyris vera
Coras.
Spatula
foetida.
Flores contra
opinionem
quorum
rundam.
Gladioli
species.
Angul.
bitat.

Locus &
tempus.

du. *Suo non quidem primo occurfu, verum paulo post. fauces omni Pipere ardentius vrit: filiqua longæ, ut in Spatula, semina continent rufum, compressum Lupini instar. Odorem tota herba non spirat. Tragus semina tribuit luteum latum quod formâ viciniam compressam referat, saporis ingrati planè.*

Peruafum est omnibus Acorum esse quæ Cordo Geelſchwertel, sed à veritate distat hæc opinio. Hermolao Barbaro, Acorus falsò vocatur Iris lutea siue Pseudoacorus. Nostri Scplafari (inquirit Tragus cum Brunfel. & Manardo) & Magistri illorum contendunt Gladiolum luteum, Acorum esse à Dioscor. lib. 1. cap. 2. descri- ptum, sed nō a conueniat: Germ. Gälwasser gilgen / Liliam aquaticum luteum, & Draß & ruz & Gälſchwertel / hoc est, luteum Gladio- lum vocant, dicitur insuper in cap. 22. lib. 4. apud Dioscor. collocandum quo loco *verum* quam nonnulli *verum dicitur*. Iris, Syluestrem, Cacos, & Gladiolum vocant, describitur est. Qui Syluo fre- quens ostenditur, palustris Acorus est, insipidus, inodorus, non vtendus nisi Medicus imperaue- rit.

Apollin. qui vocat Geelstien, malè cum Hicli. Brunsch. Acorum purat, & deterius vires confundit vtriuſque plantarum, quæ multum inter se discrepant. Figura quam habet est apud Tragum pro *galeo* seu Gladiolo *peruleo* ni- more.

Fuchs. Icon. pag. 6. Gladiolus luteus, vel Aco- rus vulgaris, Geelſchwertel. Gladiolum lu- reum seu Iris luteam Officinæ perperam Acorò appellant: & maiore cum errore radicibus eius pro legitimo Acoro vtuntur: Plerique hac occa- sione Pseudo-Acorum nominant: Dodon. Iridem luteam sylu. aut potius Pseudo-Iri- dem nuncupare mauult, Iridi pro Acoro simi- liorem.

Gesner. hort. Acorus falsa, id est, Liliam aqua- ticum flore luteo.

Lobel. & Pen. Adu. Obs. & Icon. Pl. Acorus nostras palustris, id est Liliam aquaticum lu- reum Matthioli. 22. Butomon Theoph. Valerando Pseudoiris & Iris lutea Dod.

Cluſ. post. h. Iris palustris nonnullis, peritiores verius Butomon appellant.

Tab. Ic. & h. Iris palustris lutea, Geelwasser- ſchwertel.

Iris palustris lutea, Pseudo-Acorus, siue Aco- rus adulterinus, Geel Gilgen / Geelſchwertel / Geelwasser gilgen / Geelwasserſchwertel / Dra- ß & ruz / Belg. Geelſch & Boex boonen. Gall. *glayel* & *Flambe basse*, Angl. *Glads* don or false Acorus.

Nascitur vbique in palustribus aut his coniu- ctis ac vicinis locis cuiusmodi sunt rigua prata & stauiorum margines: Pseudoacorus passim locis paludosis circa Montbelgardum, prouenit copiose etiam in hortis quod maturum obseruauit Septembri. Montpelii vbi abundat circa aquas florer Martio & Aprili. Bononiæ ad montes Apenninos florentem vidi Apti- li, vt etiam in hortis S. Saluatoris. Basileæ & Lug- duni Maio, sicuti & Geneuæ vbi abundat circa *Arue*. Tiguri aliquando degustauit flores, qui mi- hi tantum ardorem & seruorem excitarunt in faucibus vt summam acrimoniam vix potuerim mitigare Oxycrato: radix autem insigniter a- stringit.

Radix lutei Gladioli, autore Tragō, vino dē- cōcta & pota, continuas alui fluxiones sistit, do-

lores vesicæ & coxendicis mitigat, & ad omnis generis sanguinis profluua facit. Acorus Offi- cin. rarò intra corpus assumitur. Sunt qui è flo- ribus eius aquam destillent, ad inflammationem oculorum. Alii Eclegmæ à radicibus aduersus cal- culum conficiunt. Nulli suaferim cum Trago

Trago
nut.

vsum tam acris floris ad inflammationem oculo- rum, nec tam adstringentis radicis ad calculum, noa benè etiam percipimus quomodo dolores vesicæ & coxendicis mitigare possit. Absurdum videtur quod Tuss. Ducketus ait radicem Aco- ri vulgaris cum caliditate aliquid adstrictionis habere, siquidem insignem habet. An verò ha- beat caliditatem nobis nondum constat. Inute- ratuſ est [inquit Turn.] error Medicorum &

Non est A.
corus
Turn.

Pharmacopœorum, herbam fumentium pro ve- ro Acoro formâ quidem similem, sed plurimum viribus differentem. Acorus calidus est in tertio. Gladiolus palustris (quem pro Acoro substituit) frigidus est, mirumque in modum obſtipans & adstringens. Gustus abundè monstrat eius radi- cem immensam adstringendi facultatem obti- nere: hinc est quod diuersam planè à Veri Aco- ri radice vim sortita sit: nam vt hæc tenuium est partium & facultate calida, atque aded detergit, extenuat, atque discutit, ita illa consistentia cras- sarum partium, & facultate frigida constringit, dicit, cogit & coarctat. Quare vinam non cit, vt verum Acorum, nec mentes euocat, sed potius

supprimat: sanguinem etiam vndeunque manâ- tem cohibet: proinde rectè Pandœt. author scribit, eum qui secum Acori radicem gesser, à nullo sanguinis profluuio corripit: & ex Recen- tioribus aliqui hanc facultatem Acori nostri ob- seruauerunt: atque hinc aded tradunt eius succum igne expressum, mentes nimium promanantes constringere posse, id quod certè de Acorò vero affirmare vanissimum erit.

Notatu digna historia occurrit apud Clusium, de Medico Viennensi magnæ auctoritatis viro: Clusi verba hæc sunt: Vienna magnæ auctori- tatis Medicus magnopere se mirari scribebat, me in Acori historia non adscripsisse eius radicis v- sum, sterilitatem mulieribus inducere: ego re- spondebam me magis adhuc mirari quod hæc scriberet, quum non ignoraret, neminem à Ve- teribus hoc Acoro tribuere. Sed bonus vir ad- huc in vulgari multorum opinione versabatur, qui eximabat Butomon, cuius radice nonnulli magno errore pro Acoro vtuntur, legitimum A- corum esse, quum tamen proſus dissimiles sint vtriusque facultates. Ex hac Hist. Clusii patet quanta in hæcū versentur omnes Iuniores Medi- ci (vt quondam Nic. Lonicerus ad Hieron. Monochium scitè verèque scripsit) qui herbarū & aliorum simplicium medicamentorum inda- gationem, non ad medicos, sed ad pharmaco- polas pertinere opinantur, fata interim hominū non suâ sed aliena fiducia gubernantes. Nos in- terim non existimamus Pseudoacori radicem sterilitatem mulieribus inducere, quinimò vi- lem putamus ad promouendam conceptionem mulieribus nimium humidis ac gonorthæa labo- rantibus. Radices [inquunt Aduers.] vt Doctus Belga ait, tantopere adstringunt, & planè Iridis facultatibus aduersantur, vt neutiquam futillè

Butom.

autor literis mandari, hæc vel dun- taxat appensas pressatque corpori quemlibet san- guinis fluxum sistere.

ACORVS VETERIBVS.
CAP. XVIII.

A pud Theoph. nihil obseruauimus, quod Acoro Dioscoridis respondeat, legitur quidem vox Acori historia sua lib. 1. cap. 22. ubi Gaza vertit Veneria, non bene nostro iudicio.

Acorum depinxit Plin. lib. 2. c. 13. dicens: Acoros Iridis folia habet, angustiora tantum & longiore pediculo, radices nigras minusque venositas, cetero & has similes Iridis, gustu acres, odore non ingratas, ructu (ruptu Vet. erutu) faciles. Optima Pontica, dein Galatica, mox Cretica, Sed prima in Colehide iuxta Phasin annem, & vbiunque aquosis. Recentibus virus maius [magis. M. fortassis, vires magis] quam vetustis. Cretice candidiores Ponticis. Sicantur tribus in umbra digitalibus frustis. Nec non inueniuntur, qui Oxymyrtinae radicem Acorum vocant: ideoque quidam hanc Acorum agrium vocare malunt.

Acorum folia Iridi similia habet [inquit Dioscor. lib. 1. cap. 2.] sed angustiora, & radices non dissimiles sed perplexas, & non in directum productas, sed obliquas vt plurimum, & superficie geniculis distinctas, subalbas (ὀψοδύκη), id est, interprete Ruellio, albicanter: potest tamen vocabulum, vt quidam volunt, significare, non nihil intus vel subter albicantes, Turn.) gustu acres, & odoris non iniucundi. Praestat autem Acorum densum & album incorrosum, plenum & odoratum. Hoc autem est quod in Colehide (ὀψοδύκη) & Galatia Aspletion appellatur.

Flores addit Serapio, & dicit esse Croceos.

Ceterum in Diosc. suppol. (Cornario teste) dicitur, Aliis etiam Chorus, aut Aphroditiis: Romanis Veneria, nonnullis Radix naurica, Gallis Piper a-Piper aqueum.

Vires Acori ex Veteribus quod attinet, traduntur ex post Calamum aromaticum vulgarem.

Necessarium sane non sane non solum, aut etiam scitu iucundum Equiuocum Acori & substituentum. Nam Calamus aromaticus officinarum plurimus est Acorum, quamuis Garcias & Acosta Calamum aromaticum verum siue Indicum non fuisse male censent. Habetur & Acori nomine Galanga maior & minor, & Acorus Qualecbeni in Epist. ad Math. Camer. apud Match. Germanic. loco Acori habet Acori vulgaris particularem speciem, in Thuringia: Lobel. autem Obs. Iridem luteam in Bohemia. Glab. stolium caruleum siue Pseudoacorum Triagus. Perperam quoque olim Pseudoiride lutea vsi sunt pro acoro. Haec à nobis traditur sub Iride palustri lutea, seu Pseudo-acoro. Anaxag. Theophrasti, Veneria, & Herba diueneri Anguill. Vbi Acorus apud Theoph. l. 1. c. 22. legendum ἀγορα vel ἄγορα, quod non animaduertit Anguill. nec Scaliger apud Theophr. obseruauit, nec Lobel. & Pena, nec Kober. Constant. Acorum sylvaticum dicitur de Achillea. Millefolia striatioti attribuunt nomen Acori sylvatici. Acorus sylvaticus Graecis Myriophyllon Apuleo: de quo sub Millefolio aquatico Math. Non desunt, qui Acorum (inquit Ruell. p. 283.) Oxymyrtinae radicem vocent, hanc vero Acorum siluestre. Alii vero Acori sylvestris nomen Anagallidi communicant. Acoro deficiente, radix Azari substituitur: Gal. Fuch. Borgar. quod non placet propter vim purgantem per inferiora & superiora, quae non tri-

buitur Acoro. Acori defectu ad statum & par & lenem iuandum, Cumini par pondus, & certam partem Aristolochiae substituit Auicenna, Syluius & Placorumus, Borgar. Faysanus in Gal. de simpl. lib. 6. c. 12. Pro Acoro, Radix Acanthi, Tract. quid pro quo ex Galeno.

CALAMVS AROMATICVS
vulgaris multis Acorum.

Quam nota Seplasis radix, & antiquum nomen, tam ignota multis saeculis exstitit plantae totius facies.

Ea igitur radix, quae olim sola erat in Officinis admodum vulgaris, habebat figuram plantae sub terra repentis, quae nonnquam excedebat longitudine palmum, quae tamen compressior erat, quam rotundior, geniculata (attamen

non crassa vt in Iride) intus alba, odore grato praedita, latis anna & acris. Multae foliorum partes siccatae, multaque reperiebantur, adhaerentes, Iridis arundinacea folia quadantenus praeseferentia: ex hortensi autem plantam sic describemus.



Radix longa, multis geniculis inaequalis, summa terrae obliqua haerens: externa parte candicans, quum sub terra

latet: supra terram extans, viridescens: interna parte candidissima, firma, arque amara, innumeris inferna parte adnatis fibris crassis & albicantibus, etiam odoratis donata: serpit autem & summa tellure sese diffundit, è lateribus, & singulis ferè articulis seu geniculis propagines alternatim in obliquum spargens, vt breui tempore magnum spatium occupent: folia surgant cubitalia & sesquicubitalia aequatens spatulae fortidae, angustiora, colore herbaceo, margine subinde rubente, & propter terram penitus rubentia, medià costâ clariore, (Clusio Iridis tenuifoliae maioris ferè, sed multò longiora, sapore subamato acris & aromatico, tritaque iucundo & aromatico spirant odore, quem etiam resuscata & exsiccata, vel post multos annos, inquit Clusius, renent, sub hiemis initium marcescunt, teres, sensim in acumen definens, squammulis imbricatis virentibus compactile, apicibus exsertis multis, laevis, prodians è sinu medio folii statim à radice cum aliis exorti, vt reliquis angustioris breuiorisque, ita & crassioris: Iulus vincus] aliquando teste Clusio,) sed rarissimè geminis: foliculis, dum se explicat pallidis, mucosis, inodoris, qua-

Acoros.
Iris.

Delictus

Aspletum.
Chorus Aphroditiis
Veneria.
Piper a-Piper aqueum.

Achillea
Millefolia
striatioti.
Millefolium
aquaticum
Math.

Anagallis.

quatuor foliis constantibus, plenus : is paulatim deinde incrementum sumit, donec humani ferè digiti longitudinem, crassitudinèque adquirit frequentibus tuberculis viridibus tam eleganti serie dispositus, vt recentem Pinastrum comũ emulari videatur.

Legit & in Mæotide odoratum nasci Calamũ Hermolaus, radice subalbida, & sine fistulis: plena intus & amara, specie Acori: de quo & falsi quidam sunt, Acorum eam putantes. Quantò autem amarior, inquit, tantò & calidior est Indico. Vtrumque tamen genus Acorum odore superat. Terebinthibus vt Acorum incessitur: omninòque vicarium pro Acoro est, ab Ionia, & Ponto, & Herculis Columnis, profusè apud omnes, qui mediterranea colunt Aphricæ, vt si eadem non sunt planè, maxima tamen germanitate visantur, vt autores plerique tradunt. Sed fallitur Hermolodum nostrum Calamum aromaticum vulgarem Diosc. putat.

Fallitur & Marcell. qui odoratum calamum, suã arate adeò notum esse scribit, vt non sit lógus de eo agendum. Apparet ergo Marcello non fuisse notum verum calamum, qui non erat tunc vulgaris, nec etiam nunc.

Hinc verius ait Sylius: Qui in Officinis calamus est, non Calamus, sed radix est, neque ea Calami, sed plantæ alterius: neque ex India videtur afferri, quia vili venditur, & sæpè recens multum cernitur, subalbus, non puluerulentus inter frangendum, ac viribus poltere indicant odor & sapor aromaticus. Acorus: quibusdam Calamus aromaticus: ignotus quibus adhuc est verus Acorus, eius loco vtuntur interdum Calamo odorato. Verus Acorus multorum iudicio nihil aliud est quàm radix que hodie in omnibus rotius Europæ pharmacopoliis, Calamus aromaticus appellatur.

Illi autem sententiæ subscribit Cordus in Dioscor. Vulgo, inquit, in omnibus Pharmacopoliis Calamus aromaticus est, sed nihil habet cum vero Calamo similitudinis, eam opinionem etiam ante nos oppugnant Marardus & parens Eur. Cordus: Vocatur in pharmac. absolute Calamus, aut cognomento aromaticus, neque geniculatus harundinis modo ex interuallo radices aut culmos habet, neque iubatam in summitate paniculam, sed magnum florem Iridi æqualem, colore luteum, caulèque & radices solidas: in summa Iridi cognata est plãta, nihilq; aliud quàm verus Acorus. Nihil mouet nos Hermolai Barbari authoritas, scribens se legisse in Mæotide etiam odoratum nasci Calamum radice subalbida &c. Calamus quem Barbarus describit idem cum vocato vulgo Calamo aromatico existit, idcòque non merito eos reprehendit qui Acorum esse putant. Hæc Cordus, quem miramur Calamo vulgari aromatico tribuere florem Iridi æqualem, luteum, quam nullum tamen florem ferat, sed veluti Iulium Iulo Coryli similem.

Brunf. germ. Tragus & Manardus Acorum eã esse radicem sentiunt, que Germ. Calamus / Lat. & Officinis Calamus aromaticus dicta fuerit, sed perperam.

Calamus Aromaticus seu odoratus verus (air Fuchf.) in officinis nostris non habetur. Nam qui hoc nomine venditur Calamus non est sed radix. Neque habet eas notas que illi à Dioscor. tribuntur. Siquidem Arundini similis non est, nec odore fragrantissimo præditus est: fistulis denique totus plenus nequaquam est, nec ex India afferitur. Qui igitur in officinis prostat, ra-

dix est, non quidem veri odorati Calami, siquidè vili pretio venditur, & sæpè admodum recens cernitur, sed eius qui in Mæotide nascitur. Porò cum hæc radix in commanducando glutinosa sit, linguam adstringens, amara & subacris, eiq; propemodum omnes veri Calami Indici notæ quadrent, profectò tuò, & citra vilius reprehensionem pro veto Seplasia in eius penuria vt possunt. Argumentum Fuchfii ab odore non placet, quia non videtur nobis deesse in vulgari Calamo odorato, in eo præterea adstrictionem non animaduertimus qualem Fuchsius asserit.

Cornar. hæc de Calamo ait. Calamus aromaticus siue odoratus officinarum genuinus est & non Acorum Diosc. vt quidam asserit, qui etiam hodie in officinis nomen retinet, & verus habetur, & nostri, sicut est, völsichende Calamus wurzel vocant. Quare non audiantur qui Calamum odoratum se nunquam vidisse asserunt, & non calamum, sed radicem, eãque magis albicantem quàm sulcam, siue russam, velut ipsi xipòv vocem interpretantur, pro Calamo vulgò vendi asserunt. Nam radicis Calami vsus est, nõ ipse calami. Verum descriptio Calami odorati, qua ab aliis calamorum generibus distinguitur, partim ad Calamum, id est, harundinem ipsã pertinet, partim ad ipsius radicem. Quod enim dicit optimum esse qui sulcus est ad radicem referendum est: quod frequentibus geniculis præditum ait, & assulosè in multa segmenta distinguitur & fistulã arancis plenam habere, [ad Calamũ:] quemadmodum etiam in nostris Calamorum generibus videmus: hodie subalbidus maxime probatur, quum aliàs ferè ad filium colorem declinet. Nos Cornarii distinctionem non probamus: Dioscoridem omnia de Calamo dicere, non de radice existimamus. Verisimile Cornarium nunquam vidisse verum Calamum aromaticum, nec etiam Calami aromatici vulgaris plantam integram, in qua nullus Calamus: Calamum verum habemus qui similitudinem habet cum arundine.

Non tamen probamus figmentum Matthioli in Calamo aromatico. Radicula enim (vt cum Theophrast. loquar) que in Thracia fert, videlicet que odoris Nardo similis sunt (xipòv & xipòv τῆς Νάρδος ἀποστοματικῆς πάλαι ὀνόμαζον) & aliæ quædam, que paruum exilèque odoris gratiam habent: videntur esse radices illæ, aut eiusmodi quas Air vocant Incolæ: nos falsò Calamum aromaticũ. Nascuntur enim in Thracia & Ponto. Calamus autem trans Libanum. Qui non ampliùs conuehitur ad nos.

Bachanell. de consens. med. dicit Verum Calamum non haberi, & pro eo accipi radicem Acori.

Acorum Dioscor. scit Lonic. officinarum Calamum, proque Acoro in El. Diacori sumit, quoniam sanè respondeat descriptio Acori Dioscoridis. Sed Lonicus non contentus figura vna, iterum aliam ponit, que olim posita fuerat à Matthiolo pro Acoro, & vocat Acorum Apothecariorum quasi different.

Helfricus: Acorus, Calamus Acori, Calamus, Galanga. Si Galanga eadem cum Acoro cur separat Helfricus.

Falluntur Monachi suspicantes Calamum Aromaticum vulgarem esse radicem veri Calami: Calamus aromaticus officinarum [aiunt hi] non est calamus, sed si quis dixerit quod hæc radix que recipitur in Officinis pro Calamo est radix ipse Calami: hoc fortassis poterit esse. Ve-

Substituitur
Seri Calami
ms.

Fuchf. not.

Cornar. la-
bitur.

Matth not.
Radicula
Thracia
Theoph.

Air.
Calamus
Aromat.
sulio.

Acorus non
Calamus.

Lonicus
not.

Helfrici er-
ror.

Monach.
error.

Calamus
Sulz fori.
Calami Se-
ri radix.

sumtamen cum petitur Calamus non est accipienda radix, nisi urgente necessitate in ipsius Calami penuria.

Non Verus Calamus. Calamum Aromaticum qui in Officinis pro Calamo venditur non esse Calamum odoratum Diosc. suspicantur Manardus lib. 6. epist. Fuchsius in paradoxis: & Hermetolus, qui hunc Acori vicarium fecit.

Equidem non video [inquit Alois. Mundell.] quomodo quorundam descriptio Calami apud Diosc. vulgari conuenire possit, tanquam ab eo longè aliena. Quare plurimum dubitamus ne

Acorus. verus sit Diosc. Calamus, sed magis ad Acori radicem accedat, quemadmodum etiam Manardus & alii nobiscum suspicati sunt. Pergit *Qualceben.* ad Matth. Calamum vulgarem, quem Acorum in tuis Com. affirmas nec malè, si florem Iridis similem in Acoro requiras (cuius tamen non meminit Diosc.) omnino metuo ne verus sit Acorus, quia ad vitigineæ floris modum efflorescit. Huic responderet Matth. Sole clarius Calamum vulgare nostrum nil aliud esse quam legitimam Diosc. Acorum.

Calamus arom. falso. Non similis Iridis. Crediderim cum Manardo aliisque nonnullis id omnino legitimam Acorum esse, quod non modo Septasæ, sed omnes in vniuersum Calamum falso odoratum vocant: Folia quæ integra ad nos

Tartarica. Contra Brassicam. Vage. Vg. Non genus Iridis. vna cum radicibus [vt hæc pictura demonstrat] è Constantinopoli allata sunt, ferè Iridis. Retulit mihi Io. Merula, qui pluribus annis degit apud Lithuanos, frequentiss. in Lithuania & circa Tartarorum fines: foliis Iridi æmulis: flore etiam simili, colore roseo purpurascente nulla ex parte vario: vocatur ab incolis suo idiomate *Tartarsch: Zelis*, id est, Tartarica. Non potui non maxime Brassicæ uolui admittari, quod sibi tam facile persuaserit vulgarem Calamum legitimum & Calamum odoratum esse à Diosc. Theoph. Galeno & Plinio descriptum. Idem in Com. Lat. cum magn. fig. & Italicis: Acorum legitimum quod falso Calamum aromaticum vocant foliis Iridi angustioribus, radicibus haud in rectum descendentibus, sed in obliquum actis, in caulium cacuminibus, vt affirmabat Qualcebenus, nucamenta, legitimæ Acori plantæ imaginem damus, quam Constantinopoli ad me misit Cl. Augerius de Bulbecke, è Nicodemia petita. Veritati se opponunt qui dicunt Calami aromatici radices Iridi non esse similes: delirant cum contendunt nihil aliud esse vulgaris Calami odorati radices, quam generis cuiusdem Iridis. Infaniat cum dicunt recentes calami radices omni prorsus sapore & odore destitui, & paulò post affirmant easdem recentes effollas esse amariss. & odore admodum ingrato: minimè hoc credendum iudico, vt qui recentiss. hæc radices degustauerim, ac etiam Tartaros compertum habeam sapidissimè pro obsonio cum pane deuotare: Legatur Anguillarii libellus. Hist. quoque Germ. Falnus/Acorum, Bohemicè prusi morec. Brassavoli porrò sententiam refutat Matth. his argumentis: Primum ex ipsa Calami appellatione, deinde ex eo quod dixerint Theophr. & Plinius non differre hunc formam à reliquis sui generis, id est, ab omni Arundinum genere, & forma Arundinem præ se ferre, odoratum tamen, non autem esse radicem. Quocirca Plinius Diosc. fortasse secutus dixit. Fistulæ (hoc est cavitati) inest araneum, quod vocat Borem: non autem radici, vt contendit Brassavolus araneum illud inueniri in vulgari illo Officinari. Præterea vulgare calami radices quas Acori esse cõsemus assulos nequaquã frangi pos-

Objectionem. Matth. argumenta non esse Calamum Verum.

sunt: sed transuersim, quemadmodum & Iridis. Ceterum has radices non esse calami, euidenter intuentibus apparet, quandoquidem etsi complures illius Acori radices habeantur, quæ sicca gerunt in cacumine folia, Iridi omni ex parte similia: nulla tamen vsquam inuenta est, quæ fecum Arundinis trunculum cacumini annexum deferat: nempe Acori proprium, non odorati Calami est, Iridis folia ferre. His itaque rationibus Fuchsi quoque sententia improbanda mihi videtur. Porro minimè compertum habeo Diosc. nedum Galenum dixisse aliquid odorato Calamo inesse amaritudinis, quam tamen in Acoro haberi Galenus prodidit. Præterea maior inest vulgari Calamo acrimonia quam suo referat Galenus.

Cronenburg. de comp. med. sentit cum Matth. non esse vulgarem Calamum verum & nos eo destitui. Nihilominus tamen concedit substituiere vulgarem eius loco non esse piaculum.

Amar. Lusit. se opponit Matth. his verbis: Post longam inuestigationem firmiter asseuero, commune in Calamum aromaticum verum esse Acorum. Ex India Lusitani nostri singulis annis adferunt, veluti Mercatores ex ipsa India per mare rubrum in Chairum, & Alexandria deferentes. Venetias portant, Calamis similem, vnde nomen accepit, odore suauis, & aromatico, album & subrusum, crebris geniculis, qui quum frangitur in assulas multas diffusit, fistulosus, araneolo illo albo plenus, nam quum mandatur glutinosus cum quadam adstrictione subamara sentitur, vt facile iudicare debeamus, Calamum odoratum vulgarem Officinis verum esse. Matth. credit Calamum aromaticum harundinem suæ Calamum, non verò radicem, esse debere: At mea sententia decipitur Matth. quum licet Theoph. & Plinius in Calamo odorato calamum & non radicem laudate videantur, alibi tamen Calami aromatici radicem desiderant, & eam cæteris partibus calami anteferant: Vt apud Plinium est l. 24. c. 11. In quo, quum Calami odorati iuuenta enumerat, inquit: efficacissima autem in omni harundine, quæ proxima radici: efficacia & genicula. Per quæ verba manifestè percipitur, quod ex omni Calamo siue harundine radix efficacior est pars: qua de causa Calami odorati radix quam Calamum potius in opus trahenda est, vt merito hæcenus pharmaco polæ, hac prætiola & exotica radice pro vero & gerinam Calamo odorato, vsi sint. Nec enim est quod alium desiderent, modo vulgarem recentem, minimè verò inueteratum habeant, quem ex odore & sapore facile discernere possunt. Quantum verò ad Diosc. eundem attinet, si quis introspicens cum accuratius expenderit, inueniet illum potius de radice loqui quam de Calamo, quum radix geniculata dicatur, calamus verò potius nodis cinctus.

Amato responderet Matth. in Apologia his verbis. Quod Plinius ait efficacissimam in omni harundine eam esse partem, quæ radici proxima, quis non videat de harundine non de radicibus intellexisse Plinium. Namque examinaturus quænam partes in vniuerso Calamo cæteris præstent, partes radicibus proximæ cæteris præstare inquit: quod facile prudens animaduortet lector. Nec enim aliam ob causam putat Plinius maiori vi pollere eas Calami partes quæ prope radices habentur, quam quod eadem sibi crassiores, vegetiores, robustioresque in omni harundine

genere reperiantur, quam in cæteris earundem locis: quo fit, vt etiam Calami ipsius genicula efficaciora pariter ipse existimauerit Plinius. Quippe & genicula robustiora sunt & crassiora. Quam ob causam Calamum illum prætulit Dioscor. quin dense fuerit geniculatus. *Quod* Calamum, non radices, describat Dioscorides, aperte quidem constat, cum ait: Calamus odoratus in India nascitur, melior est siluus, dense geniculatus, & qui assulosè frangitur, plenè araneorum fistulâ. Hæc ille. Quæ tamen perperam Lusitanus intelligit. Quippe Calamus in primis harundinem designat non radicem. Præterea propriè harundinis est pluribus constare geniculis, & assulosè frangi. Deinde fistula, in qua quiddam araneæ telæ simile concluditur, calamo tantum debetur, non radici, quæ folida, dura, lignosa, & vbique oclusa spectatur, in omni harundinum genere. Ad hæc siluus color Calamo sanè debetur, non radici. Quippe quòd radix in harundine perpetuò albicet. Ad id autem quod proprium sit radicis (vt ille contendit) vt ipsa geniculata dicatur, calamus verò potiùs nodis cinctus, Dioscor. ipse respondet. Quandoquidem is non modò quarundam plantarum radices geniculatas facit, sed etiam caules, & calamos nonnullarum stirpium reddidit geniculatos, vt faciliè quis certior fieri poterit, qui eius Codicè legerit in Hydriopere, in altera Cyclamino, in Gentiana, aliisque nonnullis. Plinius tritici culmis genicula quaterna, faris fena, hordei octona tribuit. Hinc libro senect. Culmo geniculato inquit Cicero. Constat præterea hæc radices ex Lithuania, & Tartaria finibus, quinetiam ex Ponto, vbi passim ferè proueniunt, ad nos conuochi. Quod maximo cuique argumento esse potest, eos proctas hallucinari, qui eas ipsas radices Calami odorati esse contendunt, quòd nullus extet autor (quod viderim) qui scripserit odoratum Calamum alibi prouenire, quàm in India & Syria.

Sed de his quid nobis videatur, intellige. Figura & descriptio Calami vulg. Acori postremò a Matthiolo, exhibita, satis demonstrat iconem non fuisse factam ad plantam missam Constanti-nopoli (vt ipse ait, sed potiùs arbitrio, vt quondam plures alias plantas: satis id indicant folia ad Iridem nimium accedentia. Non est quod cum furore (eius verbo vtimur) Anguillaram delirare dicat, qui dixerit generis cuiusdam Iridis, quandoquidem ipse olium scripsit ex Io. Metulæ autoritate flore esse Iridi similem; quæ sanè verba in postremis commentariis non debebat omittere si vera, si falsò addita, corrigenda erant: Nolimus tamen dicere cum Anguillara Iridis speciem, quamuis habeat non pauca cum Iride communia, & merito Iridi subnectatur, licet flores, iulis Corylorum similes, multum differant ab Iridis floribus. Argumentum Matthioli à trunculo Arundinis infirmum erat, quia deest etiam Iridis caulis: Matthiol. dicit partes mutilatas siccas reperiri: adherentes Iridi similes, Apollo autem arundinacea folia quadante-nus præ se ferre: nos vtrunque non malè dici posse existimamus. Theophrast. lib. 7. cap. 12. scribit Harundinaceum potiùs constare folium Iridi.

Argumentum præterea Anguill. ab odore gratiori in sicco Calamo aromatico vulgari vt demonstrat Iridis speciem & non Acorum, minus firmum est: Theophr. enim l. 6. de caus. cap. 17. non solum radices Iridis siccatas reddere ait,

sed etiam Arundinum & Iuncorum, & Gladioli.

Amatus Lusit. Matthiolum temerè reprehendit, & ascribit radici vulgaris Calami notas, quas Dioscor. vero Calamo attribuit: suspicor etiam non verum quod ait has radices ex India deferri.

Calamum vulgarem aromaticum existimauit Manardus esse Acorum, cum quo non sentit Anguill. credens potiùs aliquam speciem Iridis, ob quasdam partes quas habet conuenientes cum Iride: nempe quòd hæc radix sit coloris carni (incarnati) internè, & quòd habeat folia quæ ei videntur similia: quòd quò magis siccat, eò meliorem acquirat odorem, & cum carie corroditur odorem habeat grariorem, id quod dicit Dioscor. conuenire Iridi. Recens verò est ingratiissimi odoris & summe amara.

Aduers. Acorus Diosc. & Acorus Theophrast. Officinis falsò Calamus.

Radicem quæ inter aromata ex Oriente allata venditur vulgò pro Calamo aromatico sperabatur Cæsalp. flores & fructus, quales in Iride videntur, daturam vt folia, cum potiùs conuenire cum iuncis reperta sit, huic satis conuenit Costi Arabici descriptio, quamuis pauca eius notæ ab Autoribus tradantur. Sunt enim inæquales Costi radices & tuberosæ, vt patet ex Helenio quo adulteratur, & ex radice Rhodiæ cui Dioscor. Costum comparat.

Nostrorum Officinariù Calamus (inquit Clus. apud Garc.) nihil nisi radix est cui omnes notæ Acoro à Veteribus ascriptæ pulcherrimè conueniunt: Solebat Antuerpiam Vlyssipone aduehi Calami genus vsuali nostro simillimum, sed tetri odoris & saporis horridi. Quale genus tetri odoris fuerit considerandum; de eo verò quedam capite de Calamo aromatico vero

Bernard. Palud. in extrema Lithuania Tartaristi ab incolis appellari asserbat, quòd à Tartaris illius vsus primùm ipsis esset demonstratus.

Indocti practiçantes pro Calamo aromatico Antiquorum, inquit Tabern. vero Acoro falsò vtuntur, quem errorem confirmauit Cornarius.

Gerard. Angl. Acorus Officinis falsò Calamus; Bastard. or falsè Calamus.

Casp. Bauhin. Phyt. Acortis s. siue Officinarum Calamus aromaticus, huic volunt aliqui conuenire Costi Arabici descriptionem apud Dioscor. lib. 1. cap. 15. Alii Iridi volunt cognatum, alii cum Iusticiis magis conuenire statuant.

Viret hodiè planta, testis est Cæsalp. apud Sereniù. Magnum Ducez foliis valde odoratis gaudet aquis. Anno 1574. Clusio primùm inspecta est Vienna Austria legitimi Acori planta virens, munere Ill. V. Augeri de Boufbecke, Dauidis Vngnad, & Caroli Rym, qui ones Legatorum officio apud Turcarum Imperatorem defuncti fuerant. Hanc porro, cum febris patientissima, hiemis intemperiem non reformidet, quamplurimis communicabam, adeò vt nuic vulgatissima facta sit. Ingenti quodam lacu ad radices pæcessi montis iuxta Prusam Bithyniæ urbem spontè nasci intelligebant, & humidis locis gaudere, & secundum fluentia longè felicius prouenire quàm siccis experiebantur. Sed & C. V. Bernard. Paludanus, copiosè admodum supra Vilnam urbem in paludibus, extremâ Lithuaniam Moskouiã spectante inueniri referebat. Habeo in horro Ill. E. C. Montb. vbi se multiplicat, & iulos fert; à me apportatum Sturgardiã ex horro Ill. Ducis.

antè etiam attulerat Ill. meus Princeps ex Pfortzeim Marchionis Badensis. Vidi Lutetia in horto Io. Robini regii hortulani: Argentina in horto Di. Melchioris Sebitzii Medici, Sturgardie in horto Ducis Pharmac. insignis hanc plantandi ratione docuit: Calamus plantandus solo humido & arenoso & non remoto ab aqua: quotannis ex terra eximendus & abscessis radicibus summitates in terram reponenda, distantia palmi: hac ratione valde multiplicantur atque vt plurimum floret secundo anno à transplantatione, iulius ad est Iunio, Iulio & Augusto.

Vires

Vim habet Acori radix calefactoriam, decoctum ipsius potum vrinas mouet, ad lateris & thoracis ac hepatis dolorem, ad tormina item & supra ac conuulsa commodum. Lienis consumit. Prodest & vrinae stillicidio, & ad virulentarum bestiarum morsus & ad infellus velut Iris ad mensis ducendos. Succus radicis depurgat ea quæ pupillis tenebras offundunt. Radix autem & in Antidotos vtiliter ammiscetur, Diosc. Acori radice vritur Galen. quæ gustu acri & modicè amaro, odoreque non inuicundo, ordinis tertii in calefaciendo & exsiccano. Vnde constat quod facultatis calida est, & consistentia tenuis. Huic consentaneum est, vt vrinam moueat, & lienes induratos iuuet. Acorum in sua natural. h. passim commendat Plin. ad pectoris dolores, ad Tenesimum, ad duritias & collectiones omnes, ad contusa & euersa, & ad interiores feminarum morbos. Cùm radix Calami aromatici vulg. inquit Fuchsius, in commanducando glutinosa sit, lingua astringens, amara, & subacris, eique propemodum omnes veri calami Indici notæ quadrent, profectò & citra vllius reprehensionem pro vero Sepplaxia in eius penuria vti possunt. LeGorés considerent quæ Fuchsius de glutinositate & astringente in Calamo aromatico vulgari dicit. Acorus (autore Matthiolo) in vino aut hydromelite coctus, aut eius puluis inspersus & haustus, tollit à frigida pituita aut flatibus ortos morbos, quales sunt dolores colici, laterales, tusses, conuulsionones, obstructions hepatis & lienis: prodest is in quibus ex ictu, aut contusione sanguis coit, & difficulter vrinam reddentibus, difficulter concoquentibus datur quotidie Acori puluerizati, cum pari portione Cinnamomi ex vino absinthite calido. Vbi recentis Acori copia est, conditur Saccharo aut melle, quo modo ad nos importari solet, etiamque in Germania & Italia eadem ratione conditi consuevit, ad omnia prædicta esticax. Ex Acoro fit Oxymel ventriculo & frigidis insigniter vtile, hoc modo; In puluerem crassiusculum teritur, affunditur acetum, operculatur, post triduum ad dimidias coquitur, perque linteum transmittuntur; dein additur mel pro arbitrio: iterum coquantur ad acetum consumptionem. De hoc Oxymelite datur quotidie vncia vna cum suprâ dicto Acori decocto. Dodonæi ætate eclegmatis non absque fructu additur quando crassi, crudi, frigidique humores pulmonem & pectus occupant. Referebat Clusio Bern. Paludanus Tartaros plerumque circumferre hanc radicem, & aquam non bibere, quin prius Acori radix in ea fuerit macerata. Simile quidpiam de huius plantæ nomine etiam tradit Matthias à Michovv Sarmatæ lib. 2. cap. 12. Recentes verò radices suo cortice delibratas & diligenter repurgatas condire solent Constantinopoli, atque in vsum adseruare: manè enim ieiuni plerumque manducare solent aduersus corrupti

aëris contagia, vt referebat N. V. Philibertus de Bruxella. Condiunt etiam nunc in Germania Nobiles aliquot matronæ in domesticum vsum, & plerique Pharmacopœi, quorum nonnullos [adedò nunc vulgaris istic est planta] singulis annis ad centenâs libras colligere intelligit, & non contenendum ex ea quantum facere.

GALANGA MAIOR

Galangam maiorem radice est duorum pollicum, maioreve crassitudine, crebris pollicaribus apophysis subinde donata, cortice satis extenso, circularibus zonis cincto, fusco, aut rubente, substantia solidiuscula, cinerea, albicante, punctulis (quæ extrema sunt fibrarum) notata, matrice magis fusca, fungosaque, odore grato acuto, sed qui cedit Minori, vt & saporis acrimonia.

Galanga Clusii.



Galanga Acori.



Zingiberi similem, sed maiorem, nonnunquam capirula Hastulae regie modo proferentem.

Euch. Ross. pro Galgan (Galanga) habet nescio quam hibernicam iconem.

Lonic. sub his verbis: Grossen Galgan/ Galanga

langua maior &c. Figuram plantæ non vix ponit, quæ potius nonnulli ad Calamam vulgarem accedere videtur.

Galangam maiorem [ait Anguill.] Acorum esse censet Lonicerus, quæ opinio verisimilior quam Marardi. Turcis & Arabibus adhuc hodie dicitur *Vaere*, (legimus nos à Serapione *Rhulangen* dici, sicut ab Auenenna *Casirudar*) quo nomine Serapio Acorum appellavit: color qui attribuitur à Plinio a. cōro lib. 25. cap. 13. in Galanga reperitur: cur vocate fuerit hæc radix Galanga nescio, quia non est Arabum Galanga.

Scribit Matthiol. epist. ad Qualebenum, Toto celo errare eos qui Galangam Acorum esse contendunt. Brassau. Afferere Acorum Diosc. aliud non esse, quam radiceis, quam Offic. Mauritanos secute, Galangam vocent: ad eò vt maluerint cum Loniceo errare, quam cum Manardo bene sentire. Brassauoli secutum esse fuchsum: Eamque cum sibi nimis pumila videretur prioris Galangæ radices quam vt Acori referrent, ac propterea Brassauoli sententiam non probandam duceret, in suis de stirp. comment. alteram crassiore Galangæ, quæ iam pridem in Italianam fertur Acorum contendisse, verum eam non esse Iridi similem. Maiorem Galangam minore ignauiore, colore etiam diluore, minusque odoratam. Explodendam Monachorum in Mesuen scribentium opinionem, qui contra Brassauolam & Fuchsum quasi velle videtur Galangam potius odoratum Iuncum esse quam Acorum, quod tamen planè falsum. In post. Com. cum magn. fig. Lat. & Ital. addit aduersus Anguillaram, leuen. Corum rationem esse qui velint vno tantum inspectu Galangæ folio esse Acorum: tamen concedant facile folium illud fuisse Galangæ, quòd sciat hanc folio esse Cyperi latiore, vegetioreque, Iridi non omnino dissimili: Ait porò in hist. Germ. Galangam Diosc. & veteribus Græcis ignotam, eamque esse duplicem maiorem & minorem. Matthiolus olim asserbat Galangam non esse Iridi similem, nunc ait folia Iridi non admodum dissimilia: nò putò illi vquam vifam virentem fuisse.

Neque Acosta, neque Garcias ab Hott. Clusio satisfaciunt in Galangæ maioris descriptione, præsertim si ea quæ Europæ Officinæ vtuntur legitima est Galanga maior: etenim eius radices multò maiorem habent similitudinem cum Iridis, quam cum Asphodeli aut Zingiberis radicibus. Et certè omnino sibi persuadet Galangam nostram maiorem Iridis genus esse, huic fortè simile quod in sua Pannonicatum stirpium historia primum est, nihil tamen statuit.

Hist. Lugd. Galanga maior Penz. Item Galanga maior a Costa.

Castor. Durant. figuram Costæ habet, quam etiam nos ponimus, licet non placeat, quia insignem demonstrat varietatem si benè facta: quod vix puro.

Galanga maior fertur in Indiæ Iaua, duntaxat radice non femine, licet apud auctores aliud reperiat Garcias. Sed tamen & ex femine sata prouenit in India, in hortis, sed exigua quantitate, quanta videlicet acetariis & huius Genis vsui medico sufficit. Cum essem Parauii Galangæ maioris nomine plantam vidi in orto Nobiliss. viri Jac. Cortulii, Iridi valdè similem foliis & radice.

Calida est sicque rettio gradu: ideoque confert phlegmaticis & Stomachi humiditatibus, digestionem calore suo iuuat, cruditates statuit.

Tom. II.

que dissoluendo. Colicæ opitulatur, anhelitus suauitatem conciliat. Renes calcificat, semen, virgæque erectionem concitat, Serapio. Galangæ pulvis uaribus inditus, Cerebrum confortat: Confert etiam Cordis palpitacioni. Syncopas abigit. Vertiginosis ex plantaginis succo auxiliatur. Omnibus denique morbis à frigiditate ortis confert, Lonicerus. Insigne Pharmacum, quo nos [inquit Io. Agricola] intolerabilem cruciatum sedare adsumimus, qui nonnuquam circa vngues digitorum pedis cuiuspiam dolore inastimabili assigit, vt Paronychia dici possit. Accipio autem Scobem Croci Martis, sic Chymistæ Cuprum appellant, collige illam sub incude fabri cius metalli, misce ferè cum tantundem læuoris Galangæ, adpone dolenti loco, & illicò ingentem illum dolorem sedabis.

Ad eò autem vulgaris est, teste Acosta, apud Malab. arenses huius radices vsus, vt non modò in medèdis morbis eà vsurpent, sed in farinâ etiam conuertant, ex qua, seu nucis Indiæ lacte, nonnunquam Sura, aut Iagæ excepta, certum quoddam panis genus piunt in tenuium placentularum formam, quod *Apas* vocant: in delitiis est hic panis, præbentque iis qui ventriculi debilitate & frigiditate laborant in alui, doloribus, veri affectibus, & vrinæ difficultatibus: ac miram eius efficaciam experiuntur, siue ebhumores crassos & pituitosos, statimve aut arenulas in vreribus aut collo vesicæ congestas, vrinæ difficultas orta sit, vel etiam ex carnis excrecentia in ipso vesicæ collo aut meatibus nata. Præbent verò edendum huc panem, deinde haustum *Nimpa* (quæ Nimpa veluti aqua ardens est) concedant: in inguinibus verò suprâque pubem & collum vesicæ, folia Nymphææ decocta in aqua & maccrata, atque adhuc calentia applicant.

GALANGA MINOR.

T Aleolæ [quæ scilicet forma importari solent] minoris Galangæ digitalem, & minorem radiceis crassitudinem arguunt, vnde iunctæ crassitudinis apophyses pronascuntur, eà ferè formâ quæ Cyperi radices conspiciuntur, Zonulifq; circularibus, perinde vt maior, cinguntur, cortex exterior rufescens, ac multò odoratior: substantia interior, vt rubricam emulget, dura, compacta matrice parua solida, sapore & odore longè vegetiore generosiorque quam Maior, & feruore aromatico totas fauces abundè implente. *Eicon cum precedente habetur.*

Garcias hanc dicit ditorum palmorum altitudine frutescere, foliis Myrti, radice nò Josa.

Euchar. hoc titulo. Galanga, *Galgan* / figuram habet falsam, quam etiam posuit pro Cypero. Res. Ind.

Gesl. in cat. pl. Cyperus Babylonicus *Tar. d. 772*, *Galgan* (vult) / *Galengal*.

Matth. Galanga minor: Cyperus Babylonicus. Lonicerus sub nomine *Hem Galgan* / si eam habet figuram, quæ nonnulli ad calamum aromaticum accedere videtur. Cyperus Babylon. Loniceri not.

Afferit Garcias Galangam veteribus Græcis ignotam; Arabibus non satis perspectam: His *Calnegiam*, licet omnes Mauritanii & Serapio corruptè legat *Calangen* aut *Galangen*, eâque duplicem, alterâ minorem in China Lauandoa: alteram maiorem in Iaua Lantuaz. In India vtramque Lancus appellari. Auiç: & Serapionem exactam huius plantæ notitiam non habuisse hinc factum putat vt duo diuersa capita de

ea [quod etiam annotant Aduers.] scripserint. Antonium Musæ Leonceni testimonio, velle Galangam esse Acorum Veterum, sed non esse. Exploendam Monach. dist. i. c. 47. in Mesuem, opinionem, qui Galangam Schinanthi radicem velint.

Acorum nō est.
Monach.
Opinio
Schoenaut.
Caulis gal.
Iunci odorati radix
Monach.

Acorum.
Galanga minor
Surpanda.

Cyperus.
Folia Myrthi.

Galanga (inquit Acosta ex vers. Clusii) medicamentum visibus humanis valdè necessarium est, dignumque vt Pharmacopolæ in suis Officinis perpetuò habeant: vna minor, altera maior. Arabibus dicitur *Caulis gal.*, de ea confusè Auicenna, videntur Græci & Arabes, vt Auic. & Serapio, non habuisse perfectâ eius cognitionem: Bellunenſis in suo Dictionario ait Auicennâ scribere de duabus, licet tantum una. Opinio Monach. dum scribunt Galangam esse Iunci odorati radicem, à ratione longè abest, quam etiam redarguit Amatus in Diosc. Galanga minor adfertur ex China. Hæc aliqui dicunt esse Acorum: sed folia gladiolo non similia, Galanga non est radix Schinanthi vt voluerunt Monachi.

Gariophyl. Galanga minore vtendum in omnibus compositionibus suadet Cordus in Disp. in Atom. Gariophyl.

Galanga minuta siue minor quam vocant Officinæ, an sit Cyperi species potius quàm Galangæ aut Acori, est Lobel. & Penz. in adu. difficile statueret. Folia si sunt Myrthi, quidam aiunt, non parum ab utroque illorum etiamque maiore Galangæ dissidebit. Veriſſimile, aut diuersas putatas fuisse Arabibus vtramque Galangam aut non ad nodū notas Auic. & Serap. ac propterea eos caput duplex de ea intruisse: Lob. Obs. vbi figura ex Clusio 1c. pl. p. 53. H. Lugd. quæ absurdissimum esse dicit, Galangam Iunci odorati speciem statuere: & Tab. icon. Galanga minor.

Minor cum Rhabarbaro ex Chinarum regione in Indiam aduehitur.

Locus.

RADIX S. HELENÆ GALANGÆ species.

Descriptio



EX Florida radice quædam rotunda, ad nos importantur. Sunt ex longæ, nodis distinctæ, quibus dissectis perforatisque hinc Sphærule præcatorie, quæ siccatæ rugantur, osæque acquirunt durtiæ. Extrinsecus nigra, intus candidant. Cortex aded adhæret medullæ, vt vnum fiat cōtinuum.

Sapor eius aromaticus est & gratus vt Galangæ quædam species esse videatur: pollicari sunt crassitudine aut circiter. Herba verò parum habet caulis, & humi spargit ramos: folia fert ampla admodum viridia.

Nascitur communiter locis humidis in Flo-

rida.

Monard. par. 2. Ind. occid. l. c. 4. Pater noster de S. Helena, quia portu quondam proueniat ita dicto. In Clusii vers. Radix S. Helenæ, qui annotat ex descriptione facultatibusque huius plantæ colligere licere, ad Cyperi genus aliquod referri posse, sed videant Lectores quæ Clusius de Drackena scribit cap. sequenti.

Hist. Lugd. Pater noster, vel Radix S. Helenæ Monardi.


Calida est in sine gradus secundi, sicca in primo, aut aliquid magis. Herbam Indi lapidibus retunt, eaque vniuersum corpus balneaturi fricant: aiunt enim cutem adstringere, membraque roborare odoris gratia. Hocque sæpius faciunt, ob insignem vtilitatem quæ inde ipsis resultat. Puluerem tenuissimum eius tam Indi, quàm Hispanii in vino infusum ad ventriculi dolores, felici cum successu hauriunt.

DRACKENA RADIX.

CAP. XIX.

Radix Drackena ita benè descripta & depicta. Drackena apud Clus. de peregr. & Exot. vt nihil addendum videatur.

Londini (inquit) mihi donabat Gen. Eues



Frâcisus Drake quædam radices, cum tribus aut quatuor lapidibus Bezaar Peruanis, quas Aurumino præcedente [absolutâ nauigatione, quâ totum Orbem, superato Magellanico freto, circumiuerat] secum retulerat, illas summat apud Peruanos æstimationis esse asserens, propterea, illius

qui mihi eas donabat gratiâ, huic radici Drackenæ cognomen indebam, & ipsam in tabella expressam lectoris oculis proponebam.

Semunciali aurem hæc, magna ex parte, erat crassitudine, & prælôga, subinde in nodos & inqualia capita extuberans, arque in summis capitibus, veluti è crassis squamis contexta. Dentaria, siue veriùs *Drackena*, [quam cap. 22. lib. 5. mea Rarior. Pl. hist. describerebam] ferè instar, foris nigricans, rugosa & dura, quia resiccata, interiore parte alba: tenues fibras hinc inde adnates habebat, quædam crassiusculas, & maiusculas, duras & lentas, à quibus alii nodi dependebant: nullo manifesto odore præditam esse obseruabam, sed saporem habere deprehendebam nonnihil adstringentem & linguam exsiccantem inirid, diutius verò manducatam, tenuem suauemque acrimoniam in ore relinquere. Magnam quidem affinitatem habere videbatur cum radice S. Helenæ, de qua Nicolaus Monardes lib. Simpl. med. ex Occidentali India delatorum.


Scâ

Secundum N. Eliot, qui Drake in ea navigatione comitatus fuerat, Hispanos in Peru maximo in pretio habere, nec nisi difficulter redimi posse, referret, ab istis didicisset, folia præfens venenum esse, ipsam autem radicem, non modò illius veneni, sed etiam aliorum antidotum esse, & cor ac vitales facultates roborare, si pollinis in modum trita manè ex pauxillo vino sumeretur, ex aquà febris ardores mitigare; earum facultatum ratione, valde conueniret cum radicibus, veneno aduersantibus, de quibus eodem libro Monardes, in his tamen aromaticum saporem, & coloris gradum desiderabam, quem illis radicibus tribuit.

Hist. Lugd. Drakena radix. Tabern. Icon. Bezoardica radix. Noster Gener Io. Cherlerus anno 1606, ex Anglia Londino redeuns, munere celebris Pharmac. Jacobi Gareti attulit radices Drakenas, quas cum aliquandiu masticarem, a credinam molestam adhuc sentiebam, quam postea etiam deprehēdebam, & in iis, quibus anno 1609. Basileæ Cl. V. D. Iacobus Zyvingerus me donabat.

DRAKENÆ AFFINIS RADIX.

DRackene radices quodammodo affines videbatur [inquit Clus. Exot.] ex radices, quæ in ingente illa Prætoria nauis Protegem ex Orientali India reuēhente, & ab Anglicis Naucleris occupata, repererant fuerant. Et enim tuberosæ erant, & quantum ex earum forma colligere licebat, summâ terræ superficie repentes, multique vil-



lis & fibris obsita, fuliginoso colore prædita, nõnihil tamen ad flauum tendente, saluam, dum manducabantur inficentes & amaræ, foliorum quidem aliquos pediculos adhuc retinentes: qualia verò illa fuerint, nemo facile dixerit. Ceterum magni vsus apud Indos fuisse, verisimile erat, quandoquidem proreæ eas referret cum nobilibus aliis medicamentis in Orientali India naris. Iacobus Gareus cum sequente plantula rescicata mittebat.

Contrayerua radix.

Ex Charcis prouincia Peruana radices quædam venenis resistentes (inquit Manard. apud Clus.) aduehuntur, Iridis radicibus valde similes; sed minores, & siculnei folii odore. Hispani Indias inhabitantes Contrayerua appellant, quasi dicas alexipharmacum, quoniam earum puluis ex albo vino sumptus, aduersus omne venenum cuiuscunque tandem sit generis, præsentissimum est

remedium, vino sublinato excepto, quod solâ lætis portione extinguitur, vomitione illud reicere faciens, aut per sudores euacuans. Sed & a-matoria pocula, eo puluere hausto, educi ferunt. Ventris etiam animalia pellit. Gustata radix; aromaticum quiddam sapit cum acrimonia coniunctum: quare calida videtur secundo gradu.

ZEDOARIA.

CAP. XX.

Descriptio

Zedoaria duarum circiter vnciarum longitudine, minimo digito minor, foris cinerea, extensa, intus ex cinereo fusca, duriuscula, solida, tanquam concretus quidam succus, paucis apparentibus per substantiam fibris, sapore amaricante, & acri aromatico. Huic per omnia similis altera, figurâ duntaxat breuior, crassior, tuberosa.

Radicis peregrinam naturam indagantibus Veterum notæ se primùm offerunt annotanda.

De Zurumbetigitur, id est, Zedoaria, Serapio ex variorum autoritate ita scribit. Zurumbet sunt radices rotundæ, similes radicibus Aristolochiæ rotundæ, in rotunditate earum, & sunt similes in sapore & colore Zinziberi, & afferuntur de Zeni. Zurumbet est calidum & siccum in secundo gradu, & impinguat, impinguatione conuenient, & auferit ventositates. Et de proprietate eius est, quod auferit odorem Alliorum, & Ceparum & vini: proprietates eius est quod confert morbi venenosorum, & retinet ventrem, Resoluit apostemata propriè quæ sunt in matrice, & retinet vomitum & confert ventositati colicæ.

Ex Auicenna si roges, Zedoaria quid est? Respondet is: Porciones similes Aristolochiæ, minores tamen eæ, & est in sua virtute. Et melior quidem est illa, quæ cum Napello crescit, & eius vicinitas debilitat plantam Napelli. Item Zurumbet quid est? Est lignum simile Cypero sed est maius & minus odoriferum. *Natura*: Calida est & sicca in tertio. *Operationes & proprietates*: Resoluit Ventositates. *Decoratio*: Est impinguatua, & abscondit odorem vini, & Alliorum, & Ceparum. *Membra* anhelitus & pectoris. Est lætificatiua confortans cor. *Membra* nutrimenti. Retinet vomitum. *Membra* expulsionis, stringit naturam, & confert ventositatibus matricæ.

Venena: Confert mordicationi venenosorum vermium valde, ita ut propinquasit Zedoariæ. *Permutatio*: Ponitur loco eius in venenosis, quantum ipsa & medietas eius durungi, & dux tertæ ponderis eius de taraxacon syluestri, & medietas ponderis eius de granis Citri.

Auicenna igitur eadem vires recenset, quas Serapio ex diuersis autoribus suo Zurumbet assignat. Hoc tantum distat, quod Auicenna calidum & siccum ordinè tertio statuit. Serapio autem ex Aben Mesue calido & sicco duntaxat. Hic conferre moribus venenatorum, ille valde conferre moribus venenatorum vermium, ita ut ad Zedoariam proximè accedat. Quibus verbis innuit (inquit Hist. Lugd.) aliquid esse inter Zurumbet & Zedoariam discriminis.

Serapio de temper. simpl. cap. 261. Zurumbet aliud describit. Ex Galeno tradens id esse ex speciebus odoriferis, ac propterea admisceri in confectionibus aromaticis, & esse calidum & siccum prope tertium gradum, & in virtute sua simile Castæ lignæ & Cubebis. Et ex Possidonio Ci-

Zurumbet Arab.

Zurumbet.

Serap. m.

namomo Cubebam substitui posse: Et Paulum eadem quæ Galenus iisdem esse verbis. Malè autem pro Cassidonio legit Possidonium. Zerumber verò cum Pauli Arnabone idem faciat: ac eiusdem descriptionem subiungit auctore Isaac, Mesarugia & aliis, inquit: Est arbor magna quæ nascitur in montibus Lubnem, id est in Oriente, nullum faciens fructum, habens folia longa, quorum color est inter viriditatem & Citrinitatem, similia foliis salicis, & ita color est ramorum etiam, & habet odorem sicut odor Cirri, est calida & secca, & styptica, resoluit & stringit ventrem. Virtus eius est sicut virtus Nucis Mulcata, verum est subtilior ea. Quum sit sternutatorium cum eo, & oleo violaceo, confert dolori capitis feruido & humido, & confert stomacho & hepatis propter suam aromaticitatem. Ex quibus perspicere licet Serapioni Zerumbeth & Zedoariam eandem esse radices, nisi deprauata sint eius exemplaria; item aliud Zerumbet arborem. Auicenna verò diuersas esse plantas, ut qui Zedoaria radices Aristolochiæ radicibus comparant, Zerumbeth lignum Cypero: nisi hic sit Interpretum error, qui Zerumbeth Aristolochiæ radicibus, Zedoariam Cypero comparasse debuissent: præsertim cum eique Cypero similis est, eandem proterus tribuerit vires quas Serapio Zedoaria, ut ostendimus. *Hæc Arabes* de Zedoaria & Zerumber literis mandauerunt. Ex quibus expendere oportet, an duæ radices, quæ in Officiis Zedoariæ & Zerumber nomine veniunt, eæ sint quibus vsus sunt Arabes. Sed hic quid dicendum, ex sequentibus colligemus.

Zadura.
vsus
Arnabo.
Costus
Zerumber.
Zedoaria
rotunda.

Zadura, alii Zedoaria radice [de qua Serapio cap. 172.] nunc ferè nostræ aratis [inquit Ruellius] Medici, contra pestilentis caeli contagia videntur. Officinæ & Medicorum vulgus Zedoariam nominat. Zadura permultis Recentiorum medicamentorum compositionibus expetitur. Arnabo Mauritanis nomine Zerumbeti venit, qui de ea re parum sibi constantes Zedoariam alibi interpretantur, nomenclationis aucupio planè nobis imponentes.

Zerumber
Serap.

Vulgaris vsus Zedoaria Anguillaræ est Costus. Zerumber & Zedoaria rotunda res eadem sunt secundum Serapionem, hodiè potest videri Venetiis, quò saris adfertur. Zerumber (ut scribit Sylluius) Serapioni, Auicenna, alijsque, & Zedoaria, Actuario in aurea antidoto dicitur, *Zedura* eidem in *Diagnosibus*, & in diantho, alibi *Zedura* & *Zedura*: res est ac nomen barbarum Græcis prioribus incognitum. Est autem Zedoaria radix Aristolochiæ rotundæ æmula, sapore & colore zingiberis, calida sicca gradu secundo, eadè Serapioni dicitur zerumbet sine h.

Zedoaria.
Zerumber.
Zerumber.
Zarnabû.
Carnabium.

Idem sentire videtur Fuchs, qui de comp. medicam. ita scribit zadura, zaduaria, zudar, zadera & zaduar posterioribus Græcis appellatur, officinis zedoaria, Serapioni zerumbeth. Sapore ac colore ferè zinziberis. Quod Mauritanis zuruber nominatur, id recentioribus Græcis zarnabû zarnabadû, vel Carnabium & Carnabadium. Paulo auren Arnabo dicitur. Serapioni est rotunda & globosa, Aristolochiæ rotundæ radici similis. Hæc hodiè inter zedoarias longas ex India & Oriente afferuntur. Hinc est quod plerique zerumber interpretantur zedoariam simpliciter, sed minus rectè, nam adiciendum erat rotundam, ut discrimen à vera & longa zedoaria hæc adiectione innueretur. Quapropter pro zerumbeth, rotun-

da illa nobis vocata zedoaria accipienda erit. Faciem Zingiberis representat, inquit Matthiæ, radix illa quam Mauritanii, & Officinæ zedoariam appellant, odoratior tamen, amarifucula, neque adeò ut Zingiber acris. Huius nusquam, quod sciam, meminere veteres Græci, nisi Recentiores ab Arabicis edocti, nempe Agrius & Actuarius, eam suis medicamentorum compositionibus admisceant. Zedoaria [ut cap. 172. testis est Serapio] conuehitur è Sinarum regione ultra extremas Indiæ oras. Non desunt qui crediderint, quod Arnabo, de quo scribit Paulus, & Mauritanorum zedoariam vnum & idem referant medicamentum. Verum Serapionis, testimonio cap. 21. Arnabo apud Græcos nihil aliud designat, quàm zerumber apud Arabes: quippe quòd hoc loco de zerumber eadem scribit Serapio, quæ de Arnabo ante ipsum adnotauit Paulus. Est autem Arnabo, ut ex Serapionis autoritate memoriam prodidit Isach, arbor proera in Oriente proueniens. Quibus facile patet, Arnabo non modò zedoariam non esse, sed nec in Eutopam ad nos aduehi. Quo fit ut Cordus aberratè deprehendatur: quippe qui zerumber zedoaria genus existimet. Hunc fortasse secutus Fuchsius in lib. de comp. medic. non sine magno errore putat zerumbeth & zedoariam idem esse.

Cæterùm zingiberi aroma aliud simile Arnabo videtur, quod zedoariam Officinæ Arabes verò, zerumber vocant, à Græcis prætermissum, quia Carpesum Cubeba est, non verò zedoaria.

Diu existimauit Garc. zedoariam quæ celebrior est, eam esse quæ zerumba dicitur, & medicamentum est Persis expetitur, quod hinc [ex India] Ormuz deferret, inde Asiâ in minorem & Venetias: zerumber appellatur Arabibus, Persis & Turcis zeruba: in Guazarate, Decan, & Canara *Cathurra*: in Malaur *qua*. Copiosè prouenit in Malaur, Calcut videlicet & Cananor siluis spontè. Si autem pangatur aut feratur, plurimis etiam locis: inde à multis Zingiber siluestre appellatur, nec id sine ratione, quoniam eius folia Zingiberis foliis similia sunt, longiora tamen & magis aperta: eius item radix Zingibere maior. Radix eruta, conscinditur & siccat, deinde in Arabian, Persiamque deferretur, in Gida & Alexandriam; vnde postea Venetias & in alias regiones transfertur. Couditur etiam Saccharo, & Zingibere præstantior est.

Auicenna lib. 2. cap. 743. duntaxat Zerumba aut zerumber nouit. Sed quoniam eam vidit in frustra rotunda, interduum verò in oblonga, concisam ad Sinum Persicum vchi, duo genera esse existimauit zerumba & zerumber. Hæc etiam de causa folia, quæ non viderat, prætermisit: & quemadmodum ipsa radix ex India in alias regiones transferatur, duntaxat expressit. Er certè etiam hodierno die, diuersum est prærium eius quæ in rotunda frustra resecta est, ab illius quæ in oblonga concisa est, ut minores Zingiberis radices vilioris altimantur quàm prægrandes. Quod verò iuxta Napellum nasci optimam scribit, planè fabulosum est: quandoquidem Napellus vix hic reperitur [non sunt enim huius regionis siluæ procreando Napellus aptæ] & zerumba plurima, ut diximus, nascitur siluosis Malaur locis: tum etiam alijs multis sara prouenit: nec quemquam [tameñ diligentissimè perquisuerim] hæc radicem iuxta Napellum vidisse intellexi. Præterea ex reliquis Auicennæ iam adductis locis manifestum est, quàm sibi parum constet,

constet, vt facile hinc indicari possit cum Zurbumbet historiam planè ignorasse.

Serapionis autem legitimi Codices non habent additam expositionem Zerumbet, id est, zedoaria, sed ab interprete insertam verisimile est, qui differentiam inter Zedoaria & Zerumba ignorabat. Id ex sequentibus facile deprehenditur, cum ait, è Chinaram regione aduchi, raràmque apud Indos inueniri. Zerumba verò abundè in India nascitur.

Non defuerunt qui crediderint, Aruabo, de quo Paulus lib. 7. cap. 3. scribit, idem esse cum Zerumbet. Verùm ex vtriusque historia, satis manifestum est, diuersas esse plantas. Siquidem Aruabo Pauli arbor est procerà, suaui odore fragrans: Zerumba verò graminea est planta, vt modò diximus.

Cæterùm minùs sunt audiendi, qui aut Ben album & rubrum, aut Carpesium esse volùt: quoniam hoc vtrumque medicamentum huc non sine quæstu conuenit. Zerumba verò hinc in exteras regiones exportatur. Præterea longè diuersa est vtriusque facies à Zerumba.

Clusius apud Garciam ait Zeruba siue Zerumba forsitan erit ea radix, quam capite de Costo Venetiis adferri dixi, Zingiberi adèd similem, vt nihil supra, plerùmque tamen maiorem, & intus pallescentem. Inuenitur Antuerpiæ apud quosdam aromaticos Zedoariæ quoddam genus illis Blockzeval, id est, tuberosa Zedoaria nuncupatù, rotundum instar Aristolochiæ rotundæ, foris nigricans, interdum cinerei coloris, intus candidans, gustu visualis Zedoariæ. Idem in append. hist. Dodon. Gall. cap. 28. Zedoaria rotunda Arabibus Zurbumbet (quamuis Serapio describat aliud Zurbumbet arbotem) recentioribus Græcis Ζεδωρία, Offic. Galliæ Zurbumbeth. Belg. Ζεδωαρ bloef. Interdù reperitur cum Zedoaria vulgari, verùm ignari Pharm. reiciunt vt inutilem: Ex descriptione Isaaci apud Serapionem apparet Zedoariam Arabum diuersam à vulgari Officinarum. Rondel opinatur esse Dioscor. Costum 1. siue Arabicum: pauca notæ desciunt.

Zeduaria siue Zadura herba & zerumbet: Prostant [vt volunt Lobel. & Pena in Adu.] peregrinæ duæ radices in officinis, neutra Græcis memorata: & vtraque & nominis sic radices eiusdem meritò putatur. Eidem Lobelio alibi: Zeduarium Officinarum, Belgic. Blockzedoar videnti & habendi copia fuit Antuerpiæ.

Hist. Lugd. Zerumbet Serapionis & Zedoaria eiusdem radices partes. Zerumbet Serapionis Clusio.

Casp. Bauhin. Phyt. Zedoaria 1. siue longa que ad Costum Syriacum Dioscor. referenda. Zedoaria 2. (que Græcis recentioribus Ζεδωρία) rotunda. Vnam tantùm radicem censemus, licet formà differant, sed eiusdem radices partes diuersas. Zedoaria 3. siue tuberosa foris nigricans, zerumbet Serap. Clusio. Vnam Zedoariam existimo non tres: vt neminem inuenio qui duas rotundas faciat.

Vt ad colicos cruciatus, præsertim aduersum venenata, certissimus. Lob. & Pena Adu.

ZEDOARIA GARCIE.

Qvod nos hic [inquit Gare. lib. 1. Arom. Hist. cap. 42.] Zedoariam appellamus, Auicennæ lib. 2. cap. 752. (tametsi non noverit) Geiduar dicitur, aliud nomen ignoro, quia nascitur regionibus Chinensium prouinciæ vicinis. Magno

verò emitur Geiduar, nec facile inuenias, nisi apud Circumforaneos quosdam & circultores, quos Indi loques, Mauritani Calandares appellant, hominum genus quod peregrinationibus & stipè emendicando vitam sustentat. Ab his enim & Reges & Magnates Geiduar emunt. Est verò Geiduar magnitudine glandis, eiuisdemque ferè formæ, colore sublucido. Vnicum huius Geiduar fragmentum, quod circiter dimidiam vnciam pendebat, à Nizamoxa semel impetraui: sed id in Lusitaniam cum insigni lapide armenio missum, vnà cum nauì periiit. Ostenderam id priùs Pharmacopolis in Chaul & Goa: sed nemo illorum nouerat quid esset. Aliud paucillum apud istos circultores vidi: sed non emi, quòd fraudem meruerem. Vtile est autem istud Geiduar ad plurima, sed præsertim aduersus venena, & virulentorum animalium istus, morsusque.

Porro hoc medicamentum Dioscoridi incognitum fuit, cum etiam Auicennæ. Incognitum etiamnum Europæ esse putat Geiduar Clus. hic descriptum, & difficulter cognitum iri credendù est, ob eas rationes quas noster Author in medium profert. Nam quam Zedoariam vocamus, nihil minùs est quam Geiduar: sed ex Zerumba forsitan erit generibus, quam sequenti capite noster Author describit. Tametsi non desint, veluti in Costo diximus, qui eam inter Costi genera Diosc. descripta referendam censent.

Hist. Lugd. Zedoaria Garcia.
Casp. Bauhin. Phyt. Zedoaria 4. que Geiduar Auic.

ZINGIBER ET EIVS SILIQVA.

CAP. XXI.



Zingiberis Descriptione
radices pluribus tuberculis planis, vnciam aut se-scunciam longis, digitali crassitudine, angusta ceruice commissis constant eâ ferè ratione quâ Anemones radices, vestigiis foliorum ecu Zonis præcinctæ, cortice extenso, ex cinereo fulco, substantia intus cinerea, albicante, solidiuscula, fibris

longis & crebris intertexta, sapore feruido aromatico, Piperis æmulo. Prior nostra scõn est ex Lobelio parata, quam tamen reiecit, aliam vt veriorẽ ponens.

Zinziber sic describit Garcias. Est similibus Iridi aquaticæ aut Gladiolo [non Arundini] foliis, magis tamen nigricantibus: caule cum foliis duorum aut trium palmarum altitudine, radice etiam Iridis, non serpente, vt voluit Ant. Musa exam. simpl. At nec admodum acris est, præsertim eius quod in Baçaim natum est, ob niuiam, quæ dominatur humiditatem.

Zingiber sui generis planta est, autore Diosc. in Troglodytica Arabia magna ex parte nascens: cuius radices Cyperi modo parua sunt, candicantes & odoratae, atque Piperis sapore imitantur.

Non est [inquit Plin.] huius arboris (Piperis) radix ut aliqui existimaue, quod uocat Zimpiberi, alii uero Zingiberi, quamquam sapore simile.

Gingiber, ut in Plinii Codice legitur, herba est nomenclatura Barbara, antiquitati uiribus quam facie notior: ut cuius Diosc. radicellas duntaxat paruas ut Cyperi memorat, eui tamen non similes admodum & multo maiores sunt. Effigiem qua est tota Iridis aut Xyridis, ex uire nigricantibus foliis surrectis, hic datus, aiunt Lobel. & Pena Ada. nulli dum depictam, qualem alebat Antuerpianus Pharm. Guill. Driefsch. cuius munere accepimus: tamen si flores ut pote Septentrionali rigidoque caelo, nullos prompsit. Siliquam perelegantem habemus Morgano recens allatam ex Indiis Occidentis, pusillam Melegettae parem: sed triplici carina triquetra graciliorem, & admodum Xyridis siliquae accedentem: sed cortice capillulis obductam, albidam, intus operatam semine pari, lucido, Melegettas mansu facili, & multo gratiore, Zingiber prorsus testantur: sicut etiam qua siliqua haesit scapo arguit Zingiberis stipitem: quare omnes istas siliquas, Cardamoni esse plantarum consimilium, nec Zingiberi ab similia, non abs requidam peregrinator narrat.

Hinc Lobel. in Obstruibuit semen aromaticum subaltringens gustu, Zingiberis colore, album, Cardamomo maiori se ferè par, sed oblongius, minusque feruidum, in triquetra item siliqua, rugosa. duriuscula, villis quibusdam & cirris obducta, chamæridis pusilla siliquae non dispari. Libello autem de Balsamo ait, uiso Zingibere legitimo, perspicue percepi Zingiberis iconem munere missam à Dreisch Commentitiam & effictam è quodam ueteri Botanico Germano esse. Nouus uariarum rerum, rariorunq; Indicarum stirpium author Io. Hugo Lincoctus Barauus non nisi illegitimam zingiberis effigiem dedit, nos legitimam effigiem damus. Arundinem Vallatoriam pte se fert nuper enatam. Calcut ager profert zingiber, ut notat Vartomannus, quod laud dubie radix est, eruiturque nonnunquam pondò uinciarum duodecim. Nec omnibus est eadem amplitudo. Plus non agitur in profundum radix, quam ad ternos vel quater nos palmos, Harundinum modo. Cum eruitur Zingiber, relinquunt internodium radices in serobe, unde erutum est Zingiber, terramque radici aggerunt, seu femina eius radices, proximo anno eruturi fructum, id est, Zingiber. Qui Zingiber uiderunt in India, hac facie [id nos docente Ruell.] representant. Radix geniculatis serpit internodiis, crebroque ex iis & ex acumine nouas radices spargit: folia bis réue in anno fundit arundinacea, sed quae in breuiorem exilitatem fastigiantur: in totum Gramen dicunt emulari, nec quicquam in ea regione frequentius inueniri. Subdant nonnihil subesse discriminis in sapore quod maxime sentitur cum praecox vel intempestiua fuit messis. Oportunum legendi tempus cum folia inauerint, alioquin & teredinibus obnoxium est, & carie tentatur: Carterum [inquit Cornar.] quod Dioscorides radicales Zingiberis paruas esse dicit, quales sunt Cyperi, id est Iunci

quadrati: id etiam hodie in plerisque apparet. Secundum notandum est (inuentibus Moutachis,) quod Mesues in fine ipsius descriptionis docet nos cognoscere qualitates & notas boni zingiberis, dicens. Et sit zinziber album & mundum, & recens: dicit autem album ad differentiam illius quod uocatur esse rubei coloris: quod quidem non est purum sed tinctum cum quodam bolo, non Armeno (ut dicunt) atque uinum esset, quoniam inde minus malum proueniret: sed cum bolo Apuleis, seu alterius loci nostrae regionis. Tinguunt autem ipsi, non ut bonificetur, sed ut sit magis ponderosus, & ut impleantur foramina vermiculorum, ne uideatur perforatum, & non recens. Excusantes enim malitiam dicunt, quod ad meliorem ipsius conseruationem hoc faciunt, At tamen nos experti sumus, quod ita corroditur à tineis tinctum. Primum nempe zinziber est album, & quod quare in praesenti & sequenti descriptionibus, & aliis locis. Unde sequitur, quod tinctum siue rubrum, & non album zinziber, non est admittendum ad medicinam usum.

Aduehitur, inquit Mathiolus, Zingiber in Italiam copiosum ex Calcut magno Indiae imperio, atque ex Troglodytica Arabia non solum tractu temporis exicatum, sed & saccharo recentissimum asseruatum, vel quodam mellis genere, quod quibusdam è siliquis exprimitur. Id sane longe magis Veneto praestat: cum hoc officinarum mangonio ex aridis fiat radicibus, longo temporis tractu, modo acerrimo lixiuio calce, quernoque cinere parato: modo muria: modo dulci aqua maceratis & edomitis, quibus odor non modo deperditur, ac euanescit: sed & sapor & acrimonia subtrahitur. Illud uero statim cum è terra effusum nulla serè maceratione codiatur, Vires & facultates non exiit, sed eas seruat. Quamquam Brassauolus non rectè uelle uideatur, quod Venetiis magonizatum Zingiber gustantibus plus acrimoniae relinquat, quam illud quod recentissimum in India siliquarum melle, aut Saccharo conditum asseruatur, & cum aliis aromaticis generibus ad nos conuehitur. Quod quantum à ueritate & ratione distonet, si iudicare poterunt, qui diu in myropoliis uersati, rem omnino exploratam habent. *Mona, hi* de Carie contrarium asserunt contra Anatii dicentem: Aduehitur porò zingiber ex Insula Cananoris. Radix alba, quae ne euanescat, ac ueribus corrodat, terra quadam rubra aqua dissoluta inficitur, ac sic insectam, rubrum zingiber appellat. Recentes radices, saccharo aut melleo quodam liquore ab Appolline condiuntur, natali solo delicatiores, & hctilibus in Italiam apportantur, ut idem sit Venetiis & Mediolani, officinarum mangonio, ex aridis ueterascensibusque radicibus: Veruntamen facillime deprehenditur ex Brassauolo, quoniam ex recenti zingibere conditum, minus acre est, & gustu delectabile, ex ueteri autem mordicat, nec ita gustum faciat, ac in fine nonnihil, uelut filamentum, in ore relinquitur. Huius Math. uerba corumpit, nec sinceram hominis mentem assequitur, potissimum quod acris illum dixisse notet, Venetiis mangonizatum Zingiber, dulce autem uiride propria in patria conditum, quod si scripserit praedicta legentes diuidcent: Enim uero minus acre legitimum censet, id est minoris acrimoniae, sophistico comparatum, quod tum acerrimo lixiuio, ex querno cinere, calceque maceratum, modo muria, modo dulci aqua

Gingiber. Diosc. not.

Siliqua.

Cardamomi siliquis similes. Iconem suam priorem saltem fecerit Lob. Lincoctanus non illegitima non noua Lobeli.

Radices descriptio. Folia Arundinacea.

Zing. album Rubr. Bol. lerey. gium

Tomb. non dat ce

Br. repr.

Zing. rad. rubr. Zing. rubr.

macc-

modo muria maceratum, modo dulci aqua maceratum: in his etenim est odoris, ac naturae acridinis parte spoliatur, non potest tamé téporis curpiculo, nō extraneā, ac intima subeūtē induere acrimoniā, ex maceratione præter naturam imbuta, eaque acquisititia, acris quàm recēs asseruatū appellari, quod si aridum, non præmaceratam, condituram suffere, maiori profectō acumiue gustum vellicaret: Sicque Matthiolum etiam impugnat, quòd humiditas aquea in viridi Zingibere de qua Gal. 7. lacrimoniā heberat: ac nisi alios sales, recentiorū afferat, anagyrum mouebit, & à probatissimis viris facile refelli poterit.

Maximil. Trans de Molucis insulis Zingiber hoc modo (teste Clus. apud Garciam cuius descriptionem iam antè posuimus) descripsit. Zingiber verò passim in singulis Insulis huius Archipelagi nascitur: aliud feminatim, aliud spontè prouenit, sed quod feminatur nobiliss est. Herba similis illi quæ Crocum (Indicum intellige, siue Curcuma) fert, & eo modo eius radix ferè nascitur, quæ Zingiber est.

Nunc Zingiber [vt Acofta ex vers. Clus. delineat] trium aut quatuor palmorum magnitudine affurgit, foliisque est Milio maiori, quod lachryma lobi vulgò nuncupatur, admodum similibus, caule verò Asphodelini crassitie, ex multis foliorum inuolucris constāte, vt veluti exigua quædam arundo appareat: radicibus quodammodo Iridi similibus. Mirabilis est figura Acoftæ, quæ non respondet descriptioni, eaq; idèd omittimus: Cōpil. H. L. scribit foliis Lachrymæ Lob, seu Milii Solis: meliùs verò Clusius vertit, Milio maiori.

Hist. Lugd. Zingiber Penæ. Item Zingiber Acoftæ. Anton. Zigafetra narrat in insula Thidore nasci Zingiber, idque recēs panis modo, quòd recens acre non sit veluti est siccum, parua plantam quæ caules ferat palmum altos, folia item similia, sed angustiora & breuiora, quorum nullus vsus.

Plant. Ic. p. 70. Zingiber Lob. 37. Adu. 33. Teut. 99. Et p. 71. Zingiberis siliqua cum grās suis Lob. 37. Teut. 99.

Zingiber Græcis ζῆγγίβει: Germ. Zimber / Zingiber. Belgis, Genggeber / Gengber / Gember / Gingebar: Gallis, Gengembre, Zingembre. It. Gengeno, Zenzero. Hisp. Gengoure, Gengibre valadi. Aliis Gengur. Appellatur Arabibus (vt ait Garc.) Persis & Turcis Gengibil, non Zingibel [vt corruptè legunt Serapionis lib. simpl. cap. 336. exemplaria] in Guzarate, Decau, Bengala, cum adhuc recens & viride est, adra: siccatum verò, stulte: in Malauar, tam viride quàm siccū, imgi: in Malayo, aliaa.

Pharmac. Guill. Driefch alebat Antyverpiæ: Succulentè recens conditæ ex Indiæ variis locis, nec non Aphricæ finitimæ in Europam vltimam Septentrionalem & Meridianam vnum ferunt. Fliselingæ Zelandorum vidit Lobel. Obs. in horto Ill. Principis Mauritiū à Nassau, vbi alebat, folioloū, lateritius fragmentis rubris quo gaudet permixto. Perfamilis aut eiusdem Zingiberis radices ibidem duo Pharmacopæi. Nascitur Zingiber in omnibus Indiæ prouinciis Græciæ cognitis, semine aut radice fatum. Nam quod spontè prouenit, exigui est momenti. Optimum & frequentissimum est Malauaricum, Arabibus & Persis maximè experitum. Secundum locum obtinet quod in Bengala inuenitur. Tertium quod in Dabul & Beçaim, totaque eā ora maritima nascitur. In solitudinibus & mediter-

raneis vix crescit, neque inde ad nos adfertur. Inuenitur etiam in Insulis Diui Laurentii & Comaro, quæ Aethiopiæ sunt conterminæ. Inde sumperunt occasionem nonnulli, vt scriberent apud Troglodytas & Arabes nasci. Colligitur & eruitur Decembri & Ianuario, deinde aliquatulum siccatum limo obducitur, non quòd maioris sit ponderis, sed vt foraminibus obturatis, diutius sine corruptione in sua humiditate naturali conferuetur. Nam non probè obductum, teredini obnoxium est: Galen. lib. 6. simpl. è Barbaria conuehi scribit. Si per Barbariam Indiam intelligit, benè quidem, at si eam Africæ partem quæ nunc Barbaria dicitur, malè. Diosc. aurem lib. 2. c. 151. in Troglodytica Arabia nasci tradit: (Plin. in Arabia & Troglodytica:) Nascitur quidem apud Troglodytas & Aethiopes, sed adeò exigua quantitate, vt ipsis incolis vix sufficiat. In Arabia verò non nascitur, quandoquidem ad Arabes exportatur.

Radices Zingiberis præceptore Dioscor. eligi debent, quæ teredinem non senserunt. Celeriter enim, attestante Plinio, cariem sentiunt, quamuis in tanta amaritudine.

Viridi herba ad multa vtuntur, quemadmodū nos (inquit Dioscor.) ruta, in potionibus quæ cibo præmittuntur coquentes, & aliis cocturis ammiscentes. Vinū habet calefaciendi, concoquendi, alium molliendi, moderatè stomacho cōmodam. Facit etiam ad ea quæ oculorum pupillis tenebras offundunt. Ammiscetur quoque antidotis. Et in summa Piperis facultatibus quodammodo simile est.

Zingiberis radix [teste Galeno] utilis est, quam vtique ex Barbaria ad nos conuehunt. Excalfacit fortiter sed non statim primo occurſu velut Piperivnde sanè & ipsum minus esse subtiliū partitium partium quàm Piper existimandum, siquidem in tenues solueretur partes, & celeritè actū, vt illud, fieret calidum. Apparet enim illaboratam & crassiorè adhuc quandam ei inesse substantiā, nec eam siccam & reuolūtè, sed humidā potiùs atque aqueam. Quo fit vt facile perforeretur, cum scilicet recremētita insit humiditas. Neque enim quicquam eorum quæ aut plantæ sicca sunt, aut humida, sed elaboratam & familiarem contentia humiditatem, huic vitio obnoxia sunt. Idem vsu venit Piperi longo: Atque hinc est quod diutius perferat quæ proficiscitur à Zingibere aut Pipere longo caliditas, quàm quæ ab albo aut nigro. Nam sicut ab aridis calami flamma simul celeritè accenditur, & vndequaq; dispergitur: eundè in modū quæ à siccis potestate medicamenti editur caliditas. Atque prodit ab humidioribus, cui ligna sunt vitidia, & tardiùs accenditur, & durat diutius. Ex quo fit vt vtriusque medicamenti diuersus sit vsus. Siquidem vbi torum corpus celeriter excalfacere consilium est, ea tunc exhibenda sunt quæ & celeritè à caloris nostri contactu incallescant, celeriter quoque ferantur. Verum vbi partem quamvis refrigeratam recalfacere studemus contrā agendum, nimirum quæ tardè calescencia plurimo tempore perdurant, ea præbendo: Cæterum licet Zingiber & Piper album hac ratione [alii legunt longum] à nigro Pipere differant, non magna tamen est differentia: at Nassurtium, Sinapi, Thapsia, & agrestium Columbarum stercus maiori tempore perdurant. Radix Zingiberis condita ad affectus ventriculi frigidos confert, sumpta inanè jejuno ventriculo. Corrigit omnem ventriculi humiditatem, ac om-

Troglodyta

Zingiberis mesita.

Delecta,

Vires & vsus

nem corruptionem generatam in eo ob nimium esum fructuum. In Syrupo aut Saccharo condita confert tussis & refrigerationibus: peccus purgat, atque maturat pituitam viscidam & lentam. Valet contra obstructions hepatis, generatos à frigiditate & humiditate, memoriam inuat. Sperma auget & ad Venetem incitat. Denique Ginger calefacit ac vtile est in cibus, datum cum purgantibus vehementioribus, vt Colocinthide, Homodactylis & similibus, eorumque malitiam corrigit.

Calidum esse 2. gradu & nonnihil humidum Dodonæus statuit.

Inbecillo stomacho [aiunt Aduers.] vires instaurat, calorem fouet, aluumque emollit Diocoridi: nempe si maturæ, sed teneræ, recentisque radices comedantur, nondum exhausto humido lubricante & purgante, vt vidimus in Iride, quate vetustiores sicant potius & sistant aluum. Succulentæ autem recens conditæ, multa commendatione ex Indiæ variis locis, nec non Aphricæ finitima in Europam vltimam Septentrionalem & Meridianam venum teruntur: tamen iam vt emolliente exoletâ: maceratas lixiuio condiunt saccharo etiam nostrates Veneti, Antuerpienses, & alii Institores passim.

A multis, vt testatur Plin. ob. id, quod teredinem facile sentiant, radices Zingiberis condiri solite sunt. Quem ad finem Fuchi. & Cronemburg de comp. med. zingiber conditum Melux ita conficiunt. Recipiunt zingiberis recentis, si habere possint, aut saltem arte humectati, partem vnam, cum Sacchari partibus tribus, & coquunt. Sunt tamen qui zingiber humectatum cum saccharo clarificato triplo condiunt. Humectandum autem zingiber album, purum, recens, aqua frigida affusa. Qua ratione non solum radices, sca & fructus sicciores recentibus similes redduntur. Biduo enim sine coctione, in aqua frigida macerata hæc omnia intumescunt. Sunt qui zingiberis & aliarum radicum librâ vnâ coquunt in aqua, donec tenerescant, deinde tritas per cribrum setaceum trahunt, & denuo cum Sacchari libris tribus ad mellis consistentiam coquunt. Zingiber verò conditum intemperiem ventriculi frigidam & humidam sanat, & ab ea tardam ac deprauatam concoctionem, quæ cibos in acidam cruditatem corrumpit. Viscerum lubricitatem corrigit, flatu dissipat, alimenti in iecur & vniuersum corpus distributionem accelerat.

Zingiberis species Mechinum dicta.

Descriptio

Est mihi zingiber, colore externo magnitudine & figura ad vulgare zingiber proximè accedens, quemadmodum & saporis feruore. Verum consistentiâ est compactiori, duriori, paucioribus fibris intertexta, coloris ex cinereo nigricantis: de quo ni fallor Lob. Conditur etiam & prostat in Officinis alia radix Mechinum hodiè dicta zingiberi cognata, à quo nec maturitate aut improbitate differt, vt parum verè scripserunt, sed potius specie & concretionem, (caret quippe fibris & filamentis) perspicuitate, fuscedine, soliditate, & actiore gustu, nec teredinem exedit solita.

Lobel. & Pena Adu. & ex iis Hist. Lugd. Mechinum & zingiber fuscum Officinarum.

Secacul [inquit Rond. de cur. morb. in paraly.] est quod vulgò Mequicum appellant, radix humilima zingiberi, & conditur vt zinziger, sed est calidius, sine humiditate, quæ tamen reperitur

De Zingibere condito.

in zinzibere. Ob id zinziber patitur castem non Mequinum, qua nota distinguitur à zz. sicut etiam filamentis & villis quibus caret Mequinum, non autem zz.

ZINGIBERIS MECHINI RARA varietas.



Nec vult nobis vita antea hæc quam iconè exhibemus Mechini species, nuper adferri cepta, cuius Morganus aliquot emit libras. Vulgatum zingiberem aut Mechinum refert, sed elegantiore aspectu, colore Mechini, cortice zingiberis albi, sed squamatum geniculato, & ferè articulo veluti Doronicum: aspectu pellucido: gustu quam zingiberis multò actiore, & siccior: carie non exesa.

Lobel. & Pen. Adu. & Ic. Plant. Mechini rara varietas.

Hist. Lugd. Mechinum Penz. Rara Mechini species.

CVRCVMA SIVE TERRA merita Offic. radice Crocea.

CAP. XXII.



Curcuma generum promiscuè in myrotheicis reperitur: vna breuior, crassior: altera gracilior, longior: maxima longitudo vix duas excedit uncias, minima plus quam dimidio minor: in vtroque genere oculi subinde conspiciuntur & radicem nouæ propagines, adhuc zonæ citulares. Superficies rugosa, coloris crocei, qui in penitionibus partibus interior apparet, quo & aquam in qua maceratur aut saluam si malice-

res. Superficies rugosa, coloris crocei, qui in penitionibus partibus interior apparet, quo & aquam in qua maceratur aut saluam si malice-

sur aut saluam si masticeretur, tingit. Substantia solida & compacta, nec ita teredini obnoxia vt Zingiber, saper amarus cum acrimonia aromatica, non nihil ad zingiberis sapore accedens.

Garcia radix recens, intus crocea, foris Gingiberi permixta: vehementi amaritudine & acrimonia, dum recens est, caret: siccata vero acris est, sed non adeo vt zingiber, pitoque sine noxa posse sumi: foliis est Mulii maioribus, caulique foliaceo.

Acofta, in aiora latioraque habet Crocum Indicum folia quam Orchis Serapias dicta, colore foliorum Scilla, diluciora tamen & tenuiora.

Quid Plinio Dioscoridique fuerit Cyperus Indica herba, non facile fuerit ostendere, cum suo nomine nec Officinis, nec Herbariis quibuscuq; sed quodam potius ascititio & vulgari noscatur.

Defertur ad nos (Ruellii sermo est) ex India radix, quam officina Terram meritam appellant. Ea Gingiberi permixta sapienter inuenitur, & prorsus ezigiem eius refert, manducataque magnam Crocati liquoris vim reddere cognoscitur, pictoribus ideo optime cognita, & iis, qui pro phaleris equorum ea vtuntur. Siquidem inducta verum aut fulgorem mentitur, quare auri loco ad exornandas aeneas laminas opifices vtuntur. Hanc igitur Plinii Cypertidem, siue Diosc. Indicum Cyperum id esse, quod terram meritam officinis appellari modo diximus, non ambigimus: cum ex India cum Gingibere deferatur, ceteraque dotes ei ab iis Auroribus attributa respondeant, nec effectu reclamante. Namque si libeat vim eius experiri, inuenies partes pilositas ea perunctas confestim glabrescere, tam aperte pilos detrahit. Hanc Ruellius a cuius opinione non videtur discrepare Sylla.

Hoc interdum inter Zingiberis radices inuenitur (ait Fuchs. de comp. medic.) & Curcuma Seplafis nominatur. Porro Serapionis Curcuma, vt ex vtriusque Historie collatione patet, non est nisi Chelidonium maius. Quapropter de Serapionis sententia Chelidonii potius radice, quam Cyperi Indici Pharmacopoeis vtendum esset. Nihil autem refert vtro vtantur, quod Cyperus quoque Indica presentem Diosc. attestante, phlocthi vim illa exhibeat. Idem Monach. in Mef. Cronenburg. de comp. med. lib. 1. Apollo. & Clus. in sine Dodon. Gall. cui 1676-1685 videretur graece dicitur, Lat. Cyperus aut Cyperus Indicus Diosc. Offic. Curcuma, & Cornar. Colleg. med. Florentin. idem facit, quanquam videantur contrarii omnibus ferè reliquis cum dicunt de hac radice: Illud Curcuma Veterum esse non abs re plerique existimant. Idem cum superioribus sentit Amatus, qui dicit: Ruellius Cyperum Indicum, radicem quandam esse, quam officina Terram meritam appellant, ait, quam nisi Curcumam Officinarum intelligat, procul dubio errat.

Curcuma, quae a Veteribus Cyperus Indica dicitur, Cordo in Hist. duplicis est differentiae, videlicet longa & rotunda &c. Idem in Diosc. ait, Cyperus Indicus cui a Dioscor. tribuitur amaritudo, quam vbiq; Curcumam in Pharmacopoliis vocant, quidam etiam Terram meritam.

Officinarum Mauritanos secutarum Curcuma (ait Matth.) praefert omnes notas, quas Indico Cypero reddidit Dioscor. Quandoquidem Gingiberi similis, eius odorem ferè redollet, gustu subamarescit, & mansa Croci modo inficit. Quibus etiam illud accedit, quod depi-

latois medicamentis quibusdam admiscetur. Veruntamen sciendum est hanc non esse Curcumam a Serapionis Interprete pro Chelidonio descriptam: ipse enim nihil aliud pro Curcuma intelligit, quam Dioscoridis Chelidonium: quod fit, vt non desit suspicio erroris vel Interpretis vel Scriptoris, cum Curcuma neque Mauritania, neque Graecum sit vocabulum: Aphri enim Chelidonium Kauroch appellat, vnde palam est Curcuma pro Kauroch in Serapione deprauate legi. Quo factum est, vt priores tum Medici tum Seplafitii, qui nunquam haec perpenderunt, fuerint hallucinati: quippe cum eos lateret, cuiusnam plantae radicem, Indica Cyperus referret, Chelidonii maioris radicem esse crediderunt, ob Croci succi similitudinem. Itaque Serapionis deprauatam lectionem secuti, Indicum Cyperum Curcumam vocauerunt. Indici Cyperi meminit Serapio Dioscoridem secutus, proprio capite de Cypero. Ex quo aperte constat, Curcumam Serapionis deprauate inscriptam, Seplafiarum Curcumam, quae procul dubio Indicus est Cyperus esse nequaquam. Crocum Indicum, inquit Garcia in Canara appellatur *Mad*: sic etiam in Malauar, sed proprie *maniale*: in Malayo, *cimbei*: à Persis, *dar-zard*, quod lignum luteum sonat: ab Arabibus *habet*. Huius mentionem facere videtur Auicenna lib. 3. cap. 200. & Calednium siue Chelidonium appellare. Fieri autem potest, vt corruptum sit vocabulum, vocataque sit haec radix initio Arabibus *Aled*, quemadmodum & Indis, postea vero corrupte *Calednium*. Vt autem hoc facilius credam, me impulit, quod cum, caput de Curcuma siue Cucurmani lib. 2. c. 166. [quod etiam huic radice simile est,] scripsisse videam. Solet enim Auicenna de simpl. aliquo medicamento dubitans, diueta scribere capita. Neque eorum auctoritas me mouet, qui per Curcuma Chelidonium intelligi dicunt, quoniam crocea sit radice, scribatque oculis perutile esse, quae nota etiam Chelidonio conueniunt.

In nostris exemplaribus (inquit Clus. apud Garcia) Auicenna lib. 2. cap. 200. Chelidonium describit. Capite autem 166. de Chotcumani siue Chorchumuna agit, cum hac interpretatione: Est et fex olei de Croco. Officinatum Curcuma, Dioscor. Cyperum Indicum volunt Recentiores. Praeter nomina ab Orta enumerata ait Acofta ex vers. Clusii, Crocum Indicum, Arabibus etiam *Curcum*, Turcis *Suroth* appellati.

H. Lugd. append. p. 11. Crocus Indicus Acofta: Terra merita.

Tab. ic. Curcuma, Cyperus Indicus, Gilb. murtel.

Plant. ic. p. 72. Terra merita, Curcuma Pharmac. Cyperus Indicus Diosc.

Ceterum Curcumam seu Tertam meritam Officinas nos verum Indicum Cyperum statuimus. Nec illorum sententia nos mouet qui Galangam, Cyperum Babilonicum esse tradunt. Sicuti nec eorum, qui per Cyperum Indicum, radicem Chelidonii intelligi volunt.

Nascitur plurima in regionis Malauar parte, videlicet in Cananor, & Calecut. Prouenit etiam hic Goa, sed exigua quantitate. Magna eius copia ad Arabes, Persas & Turcos detertur: qui omnes apud se non nasci, sed ex India adferri fatentur.

De viribus haec prodidit Diosc. Narratur & alia species Cyperi in India nasci, zingiberi similis: quae commansa crocea & amara reperitur: illita autem, pilis corpus denudat. Est per se, ait Plin. Indica herba quae Cyperis vocatur, Gin-

giberis effigie : commanducata Croci vim reddit. Cypero vis in medicina psilothri. Illinitur pterygiis. Plinius non distinxit vires vt Diosc. quæ enim Diosc. attribuit primo Cypero, hic etiam secundo attribuit.

Hæc & nonnulla aliâ sic tradunt Auerf. At vires perquam similes quasdam habet [præter Croceum luteum quem mansu remittit] eum zingibere, tamen si gustu ignauiore, ingratiore, dote autem referandi viscera potiore: ideoque hodie plerique eum zingibere miscent ad Ictærum. Vis autem philothri illa feruida videtur elanguescere, longa temporis & locorû intercapedine, atque teredine, cui eadem obnoxia est, sed minus quam zingiber. Picotibus & Chymistis hodie frequens est. Croco indigeno [inquit Garcias] vulgò vtuntur ad tingendos condiendosque cibos, cum hic, tum apud Arabes & Persas, ob eam nimium causam, quod villiori ematur, quam noster Crocus, qui apud eos etiam prouenit: huius tamen etiam in medicina vsus est, præferim autem in ocularibus medicamentis: tum etiam ab psoram, si eum Mali aureæ succo & Cocci, siue Nucis Indiæ oleo miscatur. Ad eisdem affectus commendat etiam Auicenn. Cureuma.

C O S T V S.
CAP. XXIII.

Missâ descriptione Costi, genera & delictum ita delineat Diosc. Ex Costo præstat Arabicus, qui albus est & leuis, & plurimum ac iucundum habet odorem. Secundum locum obtinet Indicus qui plenus est & leuis, & niger, velut Ferula. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxus, odore nares percillens, Optimus autem recens, albus, plenus per totum, densus, aridus, non corrosus à teredinibus, non graue oleus, ad gustum mordax ac feruens. Vim habet calefaciendi, vrinam eiendi, menses ducendi, & ad vteri affectiones auxiliarem, & in pennis & perfusionibus ac fomentis. Contra viperarum morsus sextantem bibere prodest: & ad thoracis dolores, & ad conuulsa ac inflationes, cum vino & absinthio. Sed & Venerem stimular ex vino mulso: Ducit etiam lumbricum larum eum aqua, illinitur quoque cum Oleo in rigoribus ante febrium accessionem, itemque resolutis. Purgat & maculata Solarem illitus eum aqua aut [pro h leggit Marc. quod ad me atinet malo legere h quam ita legerit Gal. de simpl.] melle. Ammiscetur etiam in malgmata & antidotos. Sunt qui admistis Helenii Comageni radicibus adulterent. Quod deprehensu facile est. Neque enim ad gustum feruens est Helenium, neque odoris gratiam validam & nares percillentem exhibet.

Costus leuiculam, planè amatam, plurimam autem acrem calidam in se qualitatem simul & facultatem continet, autore Galeno, ad eò vt etiam exulceret, cum ex oleo corpus eorum quibus per circuitu rigor inuadit, ante accessionem illo confricatur: sic verò etiam in resolutis & Heliadicis, atque in summa in quibus excalfacere partem quamuis, ut ex alto in superficiem extrahere quippiam est opus, ad Costum configitur. Eadem de causa vrinas mensesque prouocat, & ad rupta, conuulsa, ac laterum dolores congruit. Porro ob amaritatem quæ illi inest lumbricos necat, ob eandem & ad contractas vel ex Sole maculas, & hæc Græci vocant, cum aqua

aut melle vsurpant. Inest item statuosa quædam illi temperie humiditas, per quam & Venerem excitat cum vino mulso. Hæc tenus Galenus. Libro verò de simpl. ipsi attributo quatuor Costi traduntur species, Ægyptius, Arabicus, Indicus, & Syrius.

Cæterum Theophr. inter ea [quibus ad vnguenta vtuntur] Costum reponit. Amaracium enim ex hoc fieri scribit. Acredinem quandam, inquit, cum caliditate moderatam habet.

Plinius de Costo sic paucis agit: Radix & folium Indis est maximo pretio. Radix Costi gustu feruens, odore eximio, frutice aliàs inuiti. Primo statim introiru annis Indi in Parale insula, duo sunt eius genera, nigrum, & quod melius, candicans. Pretium in libras 16.

Auicennæ species tres sunt. Arabicus est, inquit, albus, leuis, aromaticus. Alter est Indus, qui est magis leuis. Tertius est amarus, grauis odoris, qui nominatur garyophyllata. In quo à Diosc. dissentit, scribente tertium esse Syriacum, grauem, colore buxos, & odore feruentem.

Serapio de Costo omnia ex Dioscoride & Galeno excipit.

Officina Arabes secutæ Costum fecere duplicem, dulcem & amarum. Diosc. tamen & Plinius neque dulcis, neque amari mentionem vllam fecerunt.

Horat. Achæmenium Persicum dicit. Achæmenii enim Persæ dicti ab Achæmino Rege, vnde Costum venit.

Costus verus (si Bacch. credimus) non habetur, sed pro Costo quædam vulgaris radix venditur, nec inuenitur dulcis & amarus, vt vulgus putat, sed albus & niger, nunc Venetiis optimus venditur.

Costus amarus, siue Costus amara, siue Costum amarum (omnis enim generis Monachorum testimonio legitur) in Mesu. Antid. & in in multis aliis locis dicitur ad differentiam dulcis. Nec coniuendum eum assentibus dulcem Costum in rerum natura non reperiri, cum Costi sint plures species, & quod aliqua ipsarum dicatur dulcis probetur per plures non spernendos auctores. Nos autem non possumus determinare de Costo, quoniam adhuc nec Costum Amarum, nec Costum dulcem (supple veram) vidimus: quia hæc radix, quæ communiter hodierni aromatarii pro Costo vtuntur, non est Costus, nec Costi species: Etenim quilibet legens scripta doctiorum de Costo, clarè percipit, hanc officinarum radicem, non esse veram Costum. Dioscor. quidem, Serapio & Auicenna tres describunt Costos, Arabicam scilicet, Indicam & Syriacam: sed cum loquuntur de costo Arabia, dicunt, quod est albus, leuis & Aromaticus, & nihil de amaritudine tangunt. Quod autem subtricerunt, Macer & Constantinus aperte dixerunt, quod nõ est amara. Vnde Costus Arabica, quia non est amara, rectè dulcis potest appellari. Sed quia nec amara, nec dulcis vera habetur Costus, loco eius secundum Auic. ponitur medietas ponderis eius de optimo Pyrethro. Et secundum alios, loco eius ponitur Helenium, id est Inula vulgò dicta.

De Costo velut de re nota [ait Cornar.] Diosc. tradit, vt cuius radicem solini expeti conitet, id quod Plinius quoque dixit. Radix Costi gustu feruens, odore eximio, frutice aliàs inuiti. &c. Diuersa ab hoc (ait præterea) herba est itidem costus appellata hortensis, Piperitis aut siliquastum potius censenda. Ac quod

Crocus no-
str.

Costus d.
rubicus.
Costus
Indicus.
Syriacus.

Delectus

Adulterat.

Temperat.
Exulcerat.
Ad Ichia-
dem.

Ad lum-
bricos.

Nig.
Alb.

Costus
ger-
ner-
Costi
cis.

Costus
ger-
ner-
Costi
cis.

in potu auxiliari costum à Vipera morbis semun- & bene instructis per Germaniam Pharmacopo- liis, species deprehendimus duas, quarum altera Syriaci, altera Arabici Costi historia representat. Altera enim radix est dudum vt plurimum digito- rum latitudine, per transuerfum in taleolas se- &ta, colore candida, pondere leuis, gustu acris, a- romatica, acrimonia sua diu palatum oblidens, odore acris, iucunda, orisque halitum ad longum temporis spatium bonitate odoris commédans. In summa, nihil deest quod ad Arabici historiam atineat. Altera crassitudine iam dictam aequat: sed buceo colore, & pondere distat, odore tamé ac sapore Arabico omnino similis. Tales qui- dem sunt Arabicus & Syriacus Costus. Indicum verò nondum nobis videre liceit. Interim Phar- macopolis hortantur vt verum Costum emere studeant, & repudiet tandem aduleritium. Vul- gare illud Costu græde, rereritimum & rancidum saporem habens ex Helueticorum alpiibus & Ita- lia ad nos adfertur. *Matthæus Cordus.*

Illi autem contrarius est Matthiolus, dicens: Qui in myropolis passim habetur Costus adul- teris est: quippe nec vlla odoris suauitate eõ- mendatur: nec gustu ad eõ acri deprehenditur, vt ad motus exulceret, vt Galen. inquit. Proinde me- dicamentis, quæ Costum excipiunt non erit meo iudicio, imponendus, eum præterea nos planè la- reat cuiusnam plantæ sit radix. Caterùm Sepla- siari, si legitimum consequi nequeunt, à pseudo- costis abstineant, & Galenum, vel auctorem illi sequantur, qui si Costus defecerit, ammoniacum, vel helenium supponi iubet. Sunt insuper, qui Costi loco Angelicam Recentioribus vocatam supponendam existimēt: quorum sententiam ma- gis probandam censerem, quam eorum, qui Pseu- docostis vtuntur. Costum enim hæc radix non obscure refert: quandoquidem eximia illa odo- ris suauitate tam iucunde spirat, vt Angelicæ no- men sibi merito vendicasse videatur. Actis præ- terea est, nec amaroris omnino expers. Quapro- pter eos haudquaquam damnandos putauerim, qui Angelicam Costi genus esse crediderunt. *uæ Matth.*

Huic postremæ opinioni de Angelica consen- tit Collegium Med. Florent. Extant, [sic] scribente Fuchl. in officinis Medi- corum sub Costi appellationibus dulcis & amari radices duæ, sed à Veri Costi notis plurimum di- stantes. Nam nec candidæ, nec leues, nec gustu fermentes, nec odoratæ sunt. Suspicio est Mentha Sarraeceniæ, alteram falsam esse radicem. Nos vt speramus veras Costos dulcem & amaram in altera nostrarum stirpium hist. Comm. editione pectas dedimus. Nicolaus quoties citra adie- ctionem Costi mentionem facit, semper amarum appellatum intelligit, vt qui gustu feruidus sit. Cum paucis adhuc vera Costus nota sit, eius su- mendum succedaneum cum Galenò in suis anti- ballemonis, nempe Helenium, cum vtriusque i- dem temperamentum sit, nec viribus inter se di- scerent, vt ex ambarum stirpium historiæ colla- tione omnibus sit manifestissimum.

Tom. II.

Noster vulgaris Costus (inquit Cronenburg.) mendax est. Quando autem verum habere non possum [quem tamen in Officina Ioannis à Galè, cum Michridatium confarcinaret anno L. omni- bus notis supra scriptis, & vidi & gustau] tum ex succedaneis Galeni tantundem Ammoniaci, vel Helenii substituo. Vsum Pseudocosti planè inter- dico. Hodie verò in Officinis & myropolis, vt habet Anat. dulcis & amarus dicitur Costus, qui tamen amarum rancidum exhibeat, & pro eo her- bæ cuiusdam radicem capiant, quam hortulanâ Romanam, siue Mentham Romanam aut Sarra- cenicam Seplasiari vocant.

Multi sanè Sunt, qui statuê Zedoariâ vulgarè esse Costum. Sic enim Cæsalp. inquit: Costi ge- nus tertium quod colore buceo traditur fortè Zedoariâ fuerit vulgò appellata. Sed quod nobis videtur cum Calano aromarico vulgi satis con- uenit Costi Arabici descriptio. Adulteratur (Brunfel. in Onom.) Costus Enulâ campanâ. Ho- die pro Costo (inquit Cæsalp.) venditur Ferule radices, concisas in taleolas, sapore quidem fer- uente, sed sine odoris gratia: vt neque Costum nigrum dici possit quamuis Ferulæ simile. Co- stum Tragi est Petalires quam opinionem repro- bat Cordus Costus niger quibusdam dicitur Angelicæ. Demum cepitiam circumferri [no- tantibus in Monachis] & alia radix alba, ama- raque, quam nonnulli Medici Romæ Costum iu- dicauerunt, atque pro Costo vera medicinis ad- miscent. Sed a vera Costus sit ignoramus. He- lenium Comagerium nihil aliud est (vt vult Zving.) quam costus dulcis & albus Officinari, quæ & alium habent amarum & nigrum, qui quid sit vis scire potest. Quidam pro costo ni- gro exhibent Thapsiam radicem quæ vitanda.

Costus vul- gari. Costus Ge- ra. Succeda- nea. Ammonia- cum. Helenium;

Mentha hortulanâ;

Aequimoca- tiones Co- sti.

Costus sal- tus radice alba.

COSTVS ARABICVS ZZ. SIMILIS.



Radices sunt, quales à triginta annis penes me habeo pollicari et cas- siditudine, longi- tudine se- leuciali, aut diarum vni- diarum & se- mis, tuberosus extantibus hinc inde in- æquales, Zin- giberis in mo- rem, interdū digitatim fis- se: colore fo- ris intusque Zingiberis albi dicti, cõ- cretione non ita etiam dissimili, solidiuscula, fibris respecta; sapore amaricante grato, cum acrimonia sub sinè non ignata, qui cum Zingibere Lugduni solebat reperiri.

Costus hodie Lugduni frequens est Arabicus, qui Syluo missus est inde à Carolo Paludano Medico: non tamen quem Arabici Scriptores dulcem & amarum soli inuenerunt. Matth. legitimus costus arabicus apud Calceolar. Apud

Garciam Venetis adfertur Costi quoddam genus Gingiberis radicibus ad eò simile, vt nihil luprà, intus etiam fibrosum sed pallefcens, & eximie amaritudinis. Non defunt qui Zedoariam vsualem inter costi genera referant: & primum apud Diosc. descriptum Costum esse argument, quod multas notas habeat, quæ Arabico illius Costo pulchrè quadrent.

Hist. Lugd. Costus Syriacus & Arabicus.

Camer. hist. Germ. ad Epit. Matth. Costus Arabicus omninò zingiberi cognata radix, not. G.

Lob. & Pen. Adu. zingiberis effigie Costus Arabicus & Syriacus: Item radix quæ exiit è Syria & Aegypto Venetias asportari zedoarie effigie: primus omnium Valerandus Dourea verum Costum esse censuit, cui Gesnerus primum frustum inter magnam copiam zingiberis fortè repertum specimen futurum Venetias ituro dederat. Turæ insitiores persæpè venditabant Valerando rati esse zingiberem sylv. Ea Veterorum Medicorum collegio oblata ad eò placuit vt dignam censuerint quæ Theriacè infereretur anno 1573: Si cui propius zedoariam videtur exprimere noster Costus Syriacus Zingiberis radice simili & maiore, sua sanè opinione fruatur: nam & hanc dicunt ab vsque vltimis Oceani Orientalis Chinatum plagis in Persiam & Syriam, vbi etiam sed pauca oriatur, transmitti.

Tabern. Icon. & hist. Syrisch Costenwurzel. Casp. Bauh. Phyt. Costus 1. siue Arabicus Dioscor.

COSTVS INDICVS CLVSIL, quibusdam locostus.

I Ocostus nobis cognitus est radix pollicari crassitudine, cortice tectus crasso, rugoso, & inæquali, fusco foris, intus candicante, qui etiam color est reliquæ radicis, substantia verò solida; sapor amaricans cum acrimonia, quem mansu promit, vnà cum odore violaceo vel Iridis Florentinæ. Adhæret frustum caulis ferulacei, striati, fûgosa, & ex albedo fuluescente medulla copiosa factum.

Descrip:



ioris. Iam decem & quinque annis elapsis Venetias adferri cæpit. Costus ille nigrior eximia Iridis suauitate, mixta tamen cum tantilla hirci graueolentia. Antidotis minimè excludendus, nec gustu peramarus & ingratus.

Plant. Icon. p. 74. Costus facie radicis Centau-

rii maioris cum caulis ferulacei frustulo, radice pulla. Num Diosc. Indicus costus: Costus Indicus Clusii. Lob. 38. Teur. 104.

Garc. in ea est opinio, vt vnum duntaxat costi genus esse credat. Costus, inquit, Arabibus dicitur *Coff* aut *Cass*: in Malaca vbi eius plurimus est vsus, *Puchbo*, & inde, vehitur in Chinatum regionem. Græci & Latini ab Arabibus nomen mutuati sunt. Nam quod Serapio lib. simpl. cap. 318. *Choff* appellat, corruptum est exemplar, legendumque *Cass*; & quotquot conueni Arabes, cum nunc *Cass*, nunc *Cost*, nunc *Costi* vocant. Describitur autem Costus ab iis, qui viderunt, Sambucis effigie, & Arbuti aut Azimbræ magnitudine, florem odoratum profertens. Porro quod Arabes eius duo genera faciant, amarum & dulce: factum esse puto, quod hoc medicamentum cum recens est & incorruptum, nullius amaritudinis sit particeps, candidiusque perisat: vbi autem verustate corrumpi incipit, amaritudinem contrahit, sitque nigricans.

Non videtur Clusio in Garciam huius Costi descriptio cum Veterum Costo conuenire. Nam ex Dioscoride, inquit, satis manifestum est, illorum Costum radicem fuisse, cum ait: Sunt qui admittis Helenii Comageni præduris radicibus adulterent. Verisimile enim non est, fruticis tantam habere cum radice affinitatem, vt radice adulterari possit. At nostri auctoris Costus minimum radicis habet, & ferè nihil nisi lignum est suo cortice contactum. Quare aut Veterum Costum ignorasse dicendum est, aut Arabum Costum (si is quem describit illorum Costus est) à veterum Græcorum Costo diuersam esse plantam. Costi genus Antuerpiam è Lusitania inuehitur solidum, cortice cinereo, intus candicans, interdum verò cinerei coloris: odorata est admodum radix, violaceum siue irinum spirans odorem, præsertim dum manditur: ei caulis fragmentum quod è terra extat, plerumque inhæreere adhuc conspicitur, ferulaceum quiddam referens, & fûgosam medullam continens, vt facile appareat Costo nostri Auctoris plurimum conuenire.

An Amatus in Diosc. de hoc ait, dicens, Franciscus Lusit. qui Anconæ agit, mihi aliquot radices dedit, quas sub nomine Costi allatas esse dicebat, vt erant Venetias amicis missi, qui omnes verum Costum esse sensere &c.

Hist. Lugd. Costus Indicus. Matth. in post. com. Ital. Costus delatus ex India, vbi ipsi Indis *Coff* dicitur quem existimo verum Indicum Diosc.

Camer. ad Hist. Germ. & Epit. Matth. Costus Lusitanicus qui Iridem redolet.

Tabern. Icon. & Hist. Indisch Cost wurzel. Costus Indicus.

C. Bauh. Phyt. Costus 2. Costus Iridem redolens, an Indicus Diosc?

Nascitur circa Guzarate, inter Bengala, Delli, & Cambaya, in Mandou & Chitor: Inde multi currus onusti *Costis* aduehuntur in vrbe primariâ regni dictam Amadabar, quæ in difertis sita est, & in Cambayete non procul à mari sitam vrben: vnde postea per maiorem Asiâ, nonnullam Africæ partem, & vniuersam Europam deuehuntur.

Præcellit qui intus candidus est, cortice cinereo: inuenitur tamen etiam colore buxi, cortice pallefcente. Tanta est odoris fragrantia prædictus, vt pleriq; nares feriat, & capitis dolorem excitet: gustu nec amaro, nec etiam dulci, tamen iam senescens interdum amarefcet. Nam recens acri

acri gustu est, vt reliqua aromata. Hoc vtruntur in multis medicamentis Indici Medici.

COSTI MOLVCENSES DVO.

Rvpellensis Medicus Louanicus duas radices peregrinas Costum admodum simulates, Lob.&Pé. Adu. impertuiti quas acceperat à Naucleris è Molucis Insulis, quarum altera maior corticem referebat Sambuci adultioris & cineracei, rugis & plicis frequentibus, sapore & odore vehementi: altera minor radices Solani furiosi effigie, colore diluto pullo, gustu vrente, vt vix ardorem lingua ferre aut sustinere queat. Illis iam persuasum erat Costi esse speciem, tamen parum odorum esset, has autem

ambas Molucenses, minus odoras iudicio studioforum subdidimus.

Plant. Icon. pag. 73. * Costus Molucensis corticosus, rugosus: †, Costus effigie radices Solani furiosi. ‡, Molucensis lignosus feruidior Ad. 35. Teur. 105.

Casp. Bauh. Phyt. Costus 3, siue alius corticosus. Costus 4, lignosus feruidus. Costus 5, siue effigie radices Solani furiosi. An à Casp. Bauh. Ex duobus costis Molucensibus Lobelii in Adu. bene tres fiant considerandum.

Hist. Lugd. Costus Molucensis corticosus.

nus quam olim adferuntur. Ex præter hunc nullum alium habent Pharm. vero costo similiorem. Nostrati Inula per omnia est similis, nisi soliditate tantum differret: colorem habet in cinereo candicantem, saporem amarifuculum vt nostræ, non tamen aded a cremidque aded quoniam inueterascit antequam ad nos perferatur.

Lobel. & Pena Aduerf. Fusca, grauis, & inodora radix Helenii, compacta, concretionem ignota, quæ Officinæ hodiè abutuntur Pro costo.

Plant. Ic. p. 73. Costus Comagineus adulterinus Officinarum, Teur. 102.

Casp. Bauhin. Phyt. costus 6, siue amarus Officin. seu Helenium Comagenum Diosc. & Cordo Helenii Comageni radix: & Lobel. Ic. costus Comagineus.

An Tabern. Costus Officinarum amarus, Biter costen wurz.

COSTVS DVLCIS OFFICINARVM

Centauro magno cognatus.



RADIX Descript.

Rapud Camer. in Epit. notata D. Costi pharmac. species maior, solida, ponderosa & crassa radice, lineis à cætro radices ad superficiem ductis apparentibus multis, species videtur Centauri maioris, etsi odorem eius non habet, saporem verò subdulcem.

Confideretur quæ dicuntur

à Camer. de odore Centaurii maioris: illud etiam notetur: ad hist. Germ. ponit figuram notatam D. sed radicem non separari à Costo notato B. C. nec ibi fieri huius maioris Costi mentionem, vnde igitur tanta dissonantia.

Tabern. Icon. & h. Costus Officinarum dulcis Süss Costenwurz, ita dictus, quia nullum singularem saporem aut odorem habet, ponderosior & solidior est amato costo, contortus & rugosus: Non ausim asserere, costum Camer. & Tab. eundem. Vna tabella vtriusque figuras, proponimus.

C. B. Phyt. Costus 7. Costus dulcis Offic. Tab. Ic. p. 904. Costus Offic. dulcis. Camerario litera D. costi Pharmac. species maior.

COSTVS INGRATVS SIVE

Thapsiæ species:

NVper vendi cepit (autore Cordo in Diosc.) costi vice radix per transversum in taleolas las secta, crassitudine plerumque manum complens, foris fusco, intus candicante colore, cortice crasso, substantia rara & leui: odore, cum teritur, rancidam aliquam pinguedinem olens:

R r r 3



MOnuit Dioscor. quosdam pro costo Comageni Helenii, hoc est Inula in Comagenie Oriensis regione proueniens, radices vendere. Sunt enim nostræ Campana Inula densiores, quæ propter facile hodiè imperitis pro vero costo substituantur, ac hodiè non mi-

gustu supra modum acris, nauseosa, rancida, salivam creans & strangulationem comminans: non sine vitæ periculo lumitur: est enim Thapſia species in mōte Garzano effossa, ut ipsi ex Agyrtis audiimus, qui semen eius nobis attulerunt, in umbellis, fœniculi aut Anethi modo, enaturum, crassum, nigrum, in magnitudine & figura Tririci, sapore radicis suæ, quam Agyrtæ corrupto nomine vnâ cum Italis *Cassiones*, quasi Costum amarum vocant: foris imposita efficacius etiam vero Costo, & profundius attrahit ruborem, tumoremque excitat & exulcerat.

C. Bauh. Phyt. Costus octauus.

An Camer. ad Epit. Match. Figura notata A. Costus est amarus Pharm. leuis, albus, intus medulla per medium magna, lincis in cortice transversis, ingrato admodum & vitioso sapore, medicato tamen.

CANNA SIVE ARVNDIO INDICA,
quibusdam flos cancri.

CAP. XXIV.

Descriptio



Inquilina Orbi nostro, caule geniculato cubitum & sesquicubitum alto surgit: Foliis quam pro plerumque modo maioribus, cornicula chartacea conuoluta primo pulularum zmulantibus, quæ ubi explicantur inguiter apparent ampla, duorum palmorum latitudine, triu quatuorue longitudine, tenera, membranæ, modicè in acumen desinentia, à neruo medio secundum longitudinem decurrente, ex potrectis in margines agmine prædenso venulis obliquis: caulem summum ornant flores minio saluatore tincti, Gladioli haud ita absimiles, capitello verrucoso insidentes, quod delapso flore grandescit, triangulumque fit & veluti spinosum (inquit Clusius,) ut Ricini fructus, in quo continetur semen per maturitatem fuscum atrum, & rotundum, Fabæ Veterum, siue fructus Loti magnitudine: radix nodosa & crassioribus fibris stipata, alios radicis nodos adnascens habens, qui stolonibus etiam matri similes proferunt. Hanc etiam describit Clusius, nec ferè aliter.

Flos Cæci.

Cæcus.

Quo nomine Veteribus dicta sit hæc planta Clus. se ignorare ingenuè faterur. Nonnulli hæc errare, quia illius flos nondum apertus, cancri vulgè dicti chelas, formâ & colore referat, Florem cancri nuncupant: alii Cannam Indicam, quia ex America primùm delata sit, & eius stolonibus Cannarum siue harundinum modò nodosi sunt; appellare maluerunt: Hispani & Lusitani *Cænas* dicunt, à numero, quòd ex huius granis spherulæ ad numerandas preces idoneæ,

fieri soleant, non secus ac ex tenellis Malis Aurantiis.

Obf. p. 29. Arundo Indica, florida, Cannacorus quorundam. Et p. 639. Folia Cannæ Indicæ, quibus G. Elemi inuoluitur. Aduers. Lobel. & Penz. Arundo Indica florida, ambigua inter Cannas & Acorum nature & figuræ. Parum mihi videtur habere similitudinis cum Cannabis siue harundinibus & Acoro, nisi id propter radices dicatur nodosas.

Gesn. passim Cannæ Indicæ: Gladiolus Indicus, iisdem ferè quibus Cannæ, floribus, nempe croceis, Liliæ specie, ab Hispanis *Chena* vocata, Arundo Indica. Non placet comparatio Gladioli Indici cum Cannæ Indicæ, longè diuersus flos: Gladiolus autem Indicus Gesnero est Lilium non bulbosum flore luteo quibusdam dictum.

C. Bauh. Phyt. Arundo Indica latifolia.

Hist. Lugd. Arundo seu Cannæ Indicæ Clusii & Dalechampii.

Cannæ Indicæ Montbelgardii pulchrè mihi prouenit, sata in Horto E. C. ac floruit Septembri, eam habui Lugduni in horto, vidi etiam mense Septembri Batulæ paruum plantam in horto D. Fœlicis antè multos annos, & postea anno 1592. mense Nouembri repositam pulchrè florentem: mihi etiam antehac obseruata erat folio lato & oblongo mense Aprilis Bononiæ in horto ad S. Saluador. Doctus vir Georgius Perburger Patavii annotarat ex Di. Guilandini colloquiis, in horto Patavino Cannam de Indæ esse Cassiani Bassi Metocalanum: Frater etiam C. Bauh. annotauit se ita audiisse Guilandinum nominantem. Nos Elemi retiuam huius foliis aliquoties vidimus inuolutam.

Lusitania quibusdam monasteriis valdè frequentem videbam, inquit Clusius, sub stillicidiis ad muros satam, etiam ipsa brumâ florentem: nunc passim à rei herbariæ studiosis alitur in fistilibus, ornatus gratiâ, rarè tamen apud Belgas ad frugem peruenit, quòd ferè admodum germinet, nec hiemem ferè istic potis sit, ut in sequentem annum seruetur. Viennæ autem Austriæ, multis annis in fistili aiebamus, singulis flores proferentem, & probum semen interdum dantem, licet non adeò nigrum, ut quod in calidioribus regionibus crescit, sed fulci duntaxat coloris, mirificè etiam sese radice propagantem, adeò ut alternis annis fistili eximere, & nodos diuelleret cogere, eâ ratione, plures plantas ex vna adquirentes: verùm hieme in hypocaustum seu vaporarium recipienda erat, & proximo fenestræ vitæ loco, ut aere externo per rimulas ingrediente non nihil resici posset, frigidioris aperi aëris, atque etiam cameratæ cellæ impatiens, semel autem aut bis ad summum, singulis hebdomadibus, adfusa leniter aquâ riganda. Illud etiam in hac planta obseruabam, è vetustis stolonibus, cum marcescentes in vaporario præscinduntur, lachrymam exstillare albam, Tragacanthæ æmulam, subdulcem & lentam, atque in ipsis foliis istic etiam senescentibus, tenuè quoddam excrementum nitri sapore.

* * * * *

ORCHIDÆ

ORCHIS SIVE TESTICVLVS
in genere.

CAP. XXV.

Cum bulbis, Capa sc. Porro, Allio, Hyacintho, Asphodelo, Croco, Colchico, Tulipa, Lilio, Iride, atque aliis his affinitate quadam cognatis, & Orchides censere conueniat. De quibus Theophrastus hæc scripsit. Quod si vera sint, quæ mirabilia & rara de Scorpione herba narratur, iā & reliqua huiusmodi haudquaquam incredibilia dici conuenit, quæ aliarum plantarum viribus attribui videntur. Humanis ergo corporibus ultra illa quæ sanitatem, morbos, mortemque spectant, herbas quoque alias suis viribus quid conferre posse affirmant, vt puta generandi seminis facultatem, atque sterilitatem, & quosdam ex eodem valere vtrumque facere, sicut qui testiculus appellatur. Cum enim gemini sint, alter magnus, alter autem paruius, magnum efficacem ad coitum datum è lacte caprino tradunt, minorem verò obesse, ac inhiere. Habet foliū scillaceum (καλλιόδοιο) Laferis, verum leuius atque minus caulem simillimum (αυτοειδές) spinæ, quam Pirum vocant. Mirum ergo est, ab vna eademque natura, diuersitatem tantam vitium proficisci. Nam vim eiusmodi esse duplicem, absurdum putari minime debet. Tum enim alii quidam, tum Aristophylus Pharmacop. platanicus, vires quasdam cooperatas se habere dicebat, partim vt quis magis coire valeat, partim vt nihil penitus valeat. Id quoque se prorogate plus, minusve temporis posse, seu bimensē, aut trimensē: qua quidē herba vel ad temperandos, castigandosque adolescentēs aliquādo se vti aiebat.

Orchis, quam Græci Cynosorchin vocant, folia habet (ita describit Dioscor.) per terram strata, circum caulem & fundum, oleæ molli similia, angustiora tamen & læuia ac longiora: caulem palmi altitudine: in quo flores purpureos: radicem bulbosam oblongam, duplam, angustam velut oleæ, alteram infestius: & alteram plenam, alteram mollem & rugosam. Orchis autem altera, quam alii Serapiadem vocant, velut etiam Andreas (ὁ ἰσχυρὸς ἀπὸ τοῦ ἑνὸς ὄρου ἔστιν ἄριστος, Matth. exempl.) ob multiplicem radicis vsum. Folia habet Porro similia, oblonga, sed latiora & pingua, in alis incurua: cauliculos palmam altos: flores subpurpureos. Radix subest testiculus similis.

Cynosorchin, inquit Plin. aliqui Orchin vocant, foliis Oleæ mollibus, ternis, per caulem semipedis longitudinis, in terra stratis: radice bulbosā, oblongā, duplici ordine, superiore, quæ durior est, & inferiore quæ mollior. Idem etiam de altera Orchi Dioscor. sententiam exponit, partim item Theophrast. Sed inter pauca mirabilis est, inquit, Orchis herba, siue Serapias, foliis Porri, caule palmeo, flore purpureo, geminā radice; testiculus simili. Quidam folio Scillæ esse dicunt, leuiori ac minori, caule spinoso.

Ceterum Theophrast. locum mendosum esse testatur Plinius, vt rectè Hermolaus annotauit. Non enim Silphii, seu Laferis folium habet Serapias, vt Gaza conuenit, ἀλλὰ ὁ ἀπὸ τοῦ ἑνὸς ὄρου legens, licet id vulgata exemplaria habeant. Et enim Silphio folium est Apii, non Scillaceum, aut portaceum, vt Serapiadi.

Deinde quod sequitur de caule, & Gaza sic reddidit: caulem simillimum spinæ, quam Pi-

rum vocant: penitus falsum ac corruptum est. Siquidem spinosus huic herbæ caulis, Apio (Raphano silu.) inquit Hermol. non Piro similis est.

Cornarius tamen legendum arbitratur, ὅτι ὁ γὰρ ἰσχυρὸς ἀπὸ τοῦ ἑνὸς ὄρου ἔστιν ἄριστος. Sed nihil pronunciat, studiosos saltem admodnuisse vult, & ἀναρῶσθαι Plinium legisse: & radicis siue testiculi, ad ἄπιο radicem, quæ Pyri figuram habet, similitudinem esse: & ἀπιο vocem temerè ἀπιο acereuisse sibi videri.

Orchis [inquit Apul.] Græcis dicitur Satyrion, aliis Cynosorchis, aliis Extaricos, Erythron, Pannion, Serapion, aliis Orchis, Aegyptii Menem, Galli Vram, Itali Priapifcon, alii Orminale, alii testiculum leporinum nominant.

Multa [teste Rob. Cont.] Orchidis genera deprehenduntur, inquit quæ, quod Laferem refert odore, vulgò dicitur Benion. Orchis odorata Laferem, Benion.

Orchis Fuchsio dicta herba est, quod radices sibi iniucem haud secus atque duo testiculi cohæreant. Cynosorchis verò quoddam canum testiculis similem radicem habeat. Nota est herba vtraque Orchis & Herbariis & Officinis.

Nostris (ait Cornar.) priorem Snaben Fraut appellant: posteriorem Ragwurz / vtræque ab efficacia ad Venerem excitandam. Officina Testiculum canis vocant & cum Satyrio confundunt. Lectores ex sequentibus facile cognoscere possunt an duæ Orchides Diosc. ita notæ vt sibi persuadent Cornarius. Testiculum canis Satyrium.

Errant (Matthioli quidem sententia) omnes ferè huius ætatis Seplæ. quippe quoddam Canis testiculis legitimi Satyrii vice passim in medic. vrantur. Nam hæc plantæ [si Dioscoridi credimus] notis ac facie maximè inter se distant, quamuis viribus & facultate non longè sint dissimiles. Verè autè Satyrium hæcenus in Italia videre Matth. non licuit. Testiculorum porò in Ananienfibus montibus aliisque compluribus locis non modò duo inueniuntur genera: sed alia quoque longè plura, quibus & illud addendum esse existimaue rit, cuius radix humanæ manus similitudinem refert. In eo errasse videtur Fuchsius quod Satyrium triphyllum, perinde atque canis testiculus cum duabus radicibus pictura expressit contra Dioscor. delineationem. Hallucinantur præterea, inquit ille, vna cum Mesue Patres illi reuerendi, qui eius antidotarium commentari sunt: quippe qui malè sibi persuaserint, tot esse Satyrio radices, quot Cani testiculos. Verum in Dioscoridem consulant, & hinc quàm apertè decipiuntur, intelligent. Sed his facile errandi occasionem potuit dedisse Plinius, quem lib. 26. cap. 10. Orchin, id est, testiculum, cum Satyrio rursus confundisse constat. Matthiol. proponit aliquot icones Testiculorum sine descriptionibus quas difficilè discernere & potiss. ex magnis iconibus. Multa sanè Orchios & Satyrii genera in nostris regionibus (inquit Tragus lib. 2. cap. 32.) nascuntur, quæ vno vocabulo Germ. Margendrehen vocant, propterea quod nonnulla eorum folia maculata, ac lituis quibusdam fuscillata apparent: Anicula: alias, quæ plerumque variatè peritæ artium Stendelmours / Snabenfraut / & Creuztblumen / appellant. Theophrast. omnes sub ὁρχιον voce comprehenduntur. Diosc. duo Orchios proponit genera, quorum alterum ὁρχιον vocat, hoc est, Testiculum canis, alterum verò ἀπιοσῶσθαι cognominari tradidit. Nescio quid in hist. Germ. lib. 1. cap. 122. faciat figura Orchios: cum in contextu eius, nullam faciat mentionem.

ea merito in hist. Lat. omiffa fuit.

Orchis siue Testiculus, & Cynorchis satis notus est (vt sibi persuadet Anguill.) diciturque Herbariis Testiculus canis & c. glioni di canine: alterum genus dicitur Satyrium. Huius plantæ multa sunt genera: vni generi sunt tres testiculi cuius meminit Paulus Aeg. l. 4. c. 4. ac vocat herbam Serapiadem & Triorenum.

Herba Serapias.

Orchium herbam i. testiculum, multi vulgò Satyrion vocant non rectè inquit Gesn. in cat. pl. Orchis verò altera (ὄρχις ἑρπια) Serapias nominatur. Idem hort. ait, Testiculus vel Orchis alba, species quamplurimas complectitur: Radices omnium è gemino quasi bulbo conitant: qui in aliquibus palmatus seu digitatus est: reperitur species vna minor bulbo singulari. In hortos translata vix vltra annum a nifi durarunt aut ad duos ad summum.

Cast. Dur. ὄρχις & ἀρχιζώνιον. Testiculus, Arab. Shafi alkelb. Primus, vel secundus, vel uterque Cynorchis est a Diosc. descriptus, in cuius descriptione deprauate in Græcis exemplaribus legitur ἑρπια μαλακῆ pro ὄρχις μαλακῆ. Confirmat hanc Dodon. de flectionem, Theophr. & similiter Plin. vt antè dictum. Est tamen in vtroque autore huius Orchis descriptio deprauata. Pro

Plin. & Theophr. le. tio deprauata.

ὄρχις ὄρχις: siquidem, vt Marcellus legit, in nouulis Theophr. exemplaribus, quæ Gaze male conuersionis occasione dederit, perperam legitur ὄρχις ὄρχις. Sequitur deinde, τὸν δὲ καλεῖν οὕτως ὄρχις ὄρχις ὄρχις, ἢ ὄρχις ὄρχις, quod penitus corruptum videtur. Apud Plinium legitur, caule spinoso, & similiter deprauate: Cornarius tamen hac Plinii lectione fertur, ac Theophrasti locum hoc modo purauit restituendam: τὸν δὲ καλεῖν ἀρχιζώνιον ὄρχις ὄρχις ὄρχις. Quomodo autem hæc Theophr. & Plini corrupta loca restitui debeant expendendum relinquimus.

Eadem in generis tribu cum bulbis (testibus Lob. & Pena Adu.) Capraceis, Hyacinthis & aliis plerisque reponende Testiculi differentia: atque Satyrii, quæ longè plures sunt, quàm quot Prilecis memorata: omneque ab eillegie radice Orchis, ab effectu nonnullæ Satyria vocata, quòd Veneris incenitui essent præ ceteris bulbis, vti postea apud Latinos Plinium & Apuleium Veneris dicerentur: è radice tamen bulbo inita est distinctio. Vnicus namque bulbus Satyrii est, geminus vel didymus specie Orchidi, quorum Caninus, Vulpinus, & Hircinus, & insigniores indidè petita varietates.

Testiculi Satyria. Veneris bulbis.

Cornelius Gemma professor regius in celeberrima Louanienfium Medica schola sex & triginta Testiculorum icones arguta & propria manu affabè effigiatas Lobelio vt videre est in Obs. communicauit.

Orchidum genera. Ex Corn. Gemma.

Primum genus, inquit Gemma, est Cynorchidum: secundum Serapiadium: tertium verò Dactylidum, vel digiti vnus atque alterius speciem aptius præ se terentiū. Cynorchides voco duobus ordinibus præditos pectinum ritu, vt linguli veluti singulas manus, præ se ferant, interdū duobus digitis, interdum pluribus, qui si à radice reliqua præ se ferantur, tanquā processus meri vel apophyses, optimè congruent Diosc. notæ, vt Cynorchicos vel Canini testis, nomen imponi possit: atque ad hoc vnicum genus infinitæ species relegantur, quanquam quæ sub eodem insigni militant, potius fæminæi sexus ideam quàm masculam, repræsentent. Serapiades autem exactè visillis testis imaginem referunt, atque in hac præ-

cipuè animalculorum diuersissimorum species mirabili Naturæ fecunditate atque ludibrio depinguntur. Medium inter hæc genus est à Dioscor. quoque sub Cynorchide comprehensum, quòd etiam oliuis oblongioribus siue compressis bulbosæ partes illarum optimè congruant, nisi non similes esse puteemus, quia in oblongioribus digitis enitentur. Eorum etiam summorum generum species fusæ & exactè tradit idem Gemma, quibus recensendis hic superfedemus, speciarum de Orchidibus eorumque differentis deinceps acturi.

Ait Hist. Lugd. ad correct. Dodonzi: Priorem in Dioscoride lectionem agnouit Plin. Orchi Oleæ mollia assignans folia, & Theopit. vt ex eodem Plinio colligere licet, non de Cynorchis, sed de Orchi Serapiade hic verba facere videtur. Orchios genus Serapias ab Antiquis cognominatur aurore Diosc. quoniam radix ad multa vitilis sit. Sunt qui à Serapi Alexandrinorum Deo sic cognominatum velint, inquit Fuchsius, propter lasciuam impudentem quæ is Deus Canopi, vbi Templum & cultu & religione excellens habebat, colebatur, vt videre est apud Strabonem lib. Georg. 17.

Eadem H. Lugd. ex Dodon. hæc tradit: Officinae Orchies, Satyria nominant, & eorum bulbis legitimi Satyrii vice vtuntur. Præbulis occasione videtur Apuleius, qui nullam inter Satyria & Orchies differentiam facit, sed vtramque Satyrium cum vtroque Orchis, canis videlicet dicto, & Serapiade, confundit.

Orchis, Cynorchis & Testiculus canis, Camer. horti. Maior flore dilute purpurascente, siue incarnato. Medius purpureo flore, Minor guttato sanguineo.

ὄρχις aut ὄρχις Rob. Const. Κυνὸς ὄρχις & ὄρχις ὄρχις; Orchis, & Cynorchis. Testiculus canis, Offic. Arab. Chafi alkelb, seu Chafi alkelb. Germ. Knab-n kraute; Stendelkraut; Nagwurtz; & Vnfer frauen Erden. Gall. Satyrium, ou Couillon de Chien. Ital. Testiculi di cane. Hils. Cynone perro, Boh. restiawac.

Nascuntur in pratibus, collibus, siluis, montibus, vmbrosis, apricis, siccis, humidis, aliæ atque aliæ species; In lapidosis & arenosis locis Orchis seu Cynorchis Diosc. Legit eas Apuleius mense Iunio, vel Iulio. Varia genera Orchidum, in pratibus circa Montepelium florentia verno tempore conueximus: Circa Lugdunum etiam diuersa proeunt: nos particulatim describere negleximus.

Quæ Theophr. de viribus annotat vide antè. Orchios seu Cynorchios radix Dioscor. editur cocta vt bulbus. Et de hac narratur, maiorem radicem si à viris editur, mares generare: minorem verò si à fæminis edatur, fæminas. Illud in super narratur, etiam mulieres in Thessalia teneram cum lacte caprino bibendam dare, vt Venerem excitem, aridam verò ad inhiendam ac exoluentam Venerem: exoluique alteram ab altera si bibatur. Serapiadis verò radix inposita vim habet dissipandi tumores, repurgandi vlcera, & cohibendi herpes. Abolet & fistulas, & inflammata mirigat inposita. Eadem arida nomas fistis, & vlcera putredinosa, & in ore maligna sanat. Silit etiam alium cum vino pota. Narratur autem & de hac quæcunque de Cynorchis.

Eadem & P. in. tradit, Cynorchis radices eduntur vt bulbi cocti, in vineis ferè inuenti. Ex his radicibus si maiorem edant viri, mares generari dicunt: si minorem fæminæ, alterum sexum.

In Thessalia molliorem in lacte caprino viri bibunt ad simulandos coitus: duriores verò ad inhibendos. Aduersatur alter alteri. Orchis alterius radix maior, siue ut alii dicunt durior, ex aqua pota excitat libines: minor siue mollior è lacte caprino inhibet. Eiusque radices sanant oris vlcera, thoracis pituitas. Alum sicutum è vino pota.

Orchis, inquit Galenus & Cynosorchis eadem herba nominatur. Vis radices eius, quæ bulbosa est & dupla, humida est & calida, & gustantibus dulcior (duriuscula Hist. Lugd. malè) apparet. Verùm maior radix multam superfluum & flatuosam humiditatem habere videtur. Quare etiam pota Venetem excitat. Altera verò minor vice versatim elaborata est, vt temperamentum eius ad caliditatem & siccitatem repat. Vnde non solum ad Venetem non excitat, sed etiam in totum contra inhibet & reprimat. Et mox subdit. Orchis quam Serapiadem vocant, siccioris vini habet quam prior. Vnde ad Venetem non similiter idonea est: Sed imposita tumores discutit, & vlcera sordida purgat, & herpetas sanat. At siccata multò adhuc magis siccatur, vt etiam putredinosa & maligna vlcera sanat. Nam & subaltringuens quid habet. Et propterea cum vino pota, alum sicutum.

Camer. Radix Orchidum in vino stiptico cocta & rursus exiccata non laui successu datur in dysenteria.

SATYRIVM VETERIBVS IN GENERE.

Satyria duo tradit Dioscor. Vnum, quod simpliciter Satyrium vocatur ab ipso, quòdque alii Trifolium (*τριφυλλον*) dixerunt, quoniam vt plurimum folia tria (Marc. *ὡς δὴ τὸ ποικύλον*. Lac. verò legit in antiquo *ἑνὲ δὴ ἄς ὀπί το ποικύλον* *ἡσία φέρει δὴ τὴν νεκράσιν ἐνα*. Sic & Serap. & Orib.) ad terram refracta profert, à Lapatho, aut Lilio similia, minora tamen & rubicunda. Caulem habet nudum [*ἄκαυτον*] longitudine cubitale, florè Liliæ specie, album: radicem bulbosam, magnitudine (*ὄστρον*) Mali (num quantitate, num alia ratione simile) Malo velit Dioscor. valde ambiguum, Gemma, fuluam (*πύρρα*, fuluam potiùs, quam rutillam dici putat, idem Gemma) intrinsecus albam, velut ouum, gustati dulcem & ori gratam. Alterum, quod Satyrium Erythronium aut Erythraicum cognominatur, quòdque semen habet Lini semini [quis fecit an deprauato codice Græco pro *λινωσπέρμω* sit legendum *λινωσπέρμω*, vel *νεοσπέρμω*] simile, sed maius, robustum (*ἰσχυρότερον*) splendens, & laue. Est radice eius cortex subgracilis [Orib. *πικρὸς* id est, densus Matthiol.] & fuluus: interna verò pars alba, gustati dulcis, & ori grata. Nascitur in apricis, & montanis locis. Et hoc inter spuria Diosc. alii Melium aquaticum vocant, alii Extaticum, alii Pripapicum, aliis autem est Satyriscus, aliis Orchis, id est Testis Satyri. Romanis Molorticulum Veneticis.

De Satyrio ita Plin.: Duo Satyrii genera: vna longioribus, foliis quæ Oleæ, caule quatuor digitorum, flore purpureo, radice gemina ad formam hominis testium, alternis annis intus efflorescente ac residente. Altera Satyrio Orchis cognominatur & femina esse creditur. Distinguitur in truncodis & ramosiore frutice, radice fascinis vilis. Ego sane hic pro virili membro fascinum dictum accipio: vnde Horat. Ode 8. epod. Minusue laquet fascinū.

Nascitur ferè iuxta mare. Græci Satyrium, foliis Liliæ rubri minoribus, & tribus non amplius è terra exeuntibus tradunt, caule leui, cubitali, nudo, radice gemina: cuius inferior pars & maior mares gignat, superior ac minor feminas. Et a Satyrium Erythraicum aliud genus Satyri (Erythraicum appellant) semine viticis maiore, leui, duræ radice, cortice rubro intus album includi, sapore subdole: ferè in montosis inueniri.

Subiecit (inquit Corn.) & hoc genus Satyrii Plinius ad præcedens. Galenus verò & posteriores Græci Satyrium Diosc. posterius omiserunt. Dalechamp. ait Plinium miscuisse Orcheon, Satyriorumque descriptiones. Planta quæ Græcis *σατύριον* Latin. quoque Satyrium dicitur [inquit Matthiol.] Arab. *Gafialehaleb*, *Chafialtraleb* iue *Tararib*: Ital. *Satirio* & *Satirione*. Germ. *Stenzelwurz*: Hisp. *Satyrion*, & *Sapins de Rapsa*. Gall. *Satirion*. Sed quum Matthiolus autè dixerit verum Satyrium videre sibi non licuisse, cur tribuit illi inaniter vulgaria nomina.

Dolet Anguill. sibi incogitum Satyrium primum & secundum: Nec vix adhuc Herbariis vera Dioscor. Satyria benè cognita sunt. Nec ita obuium est, quam plantam per Satyrium Basilicum, cuius semen ad Epilepsiam commendat, intelligit.

Ainatus ait veros Satyriones adhuc desiderari.

Fuchium reprehendit Matthiol. quòd Palmas inter Satyri genera depingat, cum ponis inter canis testiculos sint repta vitanda.

Idem notat Mesuem & Monachos, quod Satyrii duos tribuant testiculos. Francisc. Alexand. verò ait contra Matth. Mesuem non dixisse Satyrium sine testiculo, n. vulpis duos habere testiculos.

Satyrium autem Matthioli primum à Calce. Satyrii quòd

olario ei nullum, teste Pona in descriptione motis Baldi Phallon Hollandicum est, cui adaptata tria folia Lapathi de eo agemus lib. 40. de Fungis, sub Fungo Phalloide. Satyrium quidem Erythronium dictum, volebat Val. Dourez esse medullam Nucis Cuciochoræ, vt monimus lib. 3. Est & Satyrium Erythronium quorundam bifolium flore vnico albo aut purpureo radiato, de quo hoc libro post Tulipæ egimus. Tulipa tandem rubro flore fortè est Satyrium Erythraicum auctore Gesnero: nos hanc opinionem improbauimus. Satyrium tamen triphyllum Dioscor. habet, quod conuenit cum Tulipa alba. Nunc

Hyacinth. stellaris dumerorum quibusdam Satyrium verum dicitur, & Satyrium Erythronium: quam opinionem Dodonæus in fol. reprobatur. Vltimò habetur Satyrium Eritaronium Matthioli à Ceruino missum, auctore Lobelio. Corn.

Orchis speciem, Satyrium primum existimat dicens: Satyrium noscunt & nominant etiam Officina, etiam si cum Orchi confundant. Noltri Stendelwurz dicunt. Syluius Orchis speciem somniat Satyrium, idem Monachi in Mef. idem Cordus in antid. ac propterea eum superbè reprehendit Francisc. Alex. Satyrium Trifolium Fuchii in Hist. pl. est Orchis species: De comp. verò medicam. ait nullum Satyriorum cognitum. Tragus sub Satyrii & Orchis nomine 19. plantarum species, ni fallor, comprehendit. Matth. ait omnes ferè Medicos huius ætatis & Sephasianos errare, quòd canis testiculos legitimi Satyrii vice passim in medicamentis vtantur.

Pro Satyrio quidam Manu Christi & Palma Christi vtuntur, Fuchio teste de comp. sed malè.

Satyrium
Erythraicum

Plin. nosc.
Matth. c. 1.

Fungus
Phalloides
Cuciochoræ
Nucis medullæ.

Hyacinth.
stellaris
dumerorum

Antibalbo-
mena

...at, ad modicum nullum impetum exci-
tat. Pro Satyrio substituit Fuchius radices Or-
chios vel Cynorchios. Cronemb. ait folere
Scplafarios Colonienses sumere Orchin Fuchii
mare angustifolium. Satyriorum vice solent
fufcipi canum testiculi, vt ait Amatus.

Opera praxiam ducit Tragus, paucis commemo-
rare, vnde Satyriones primam suam originem
trahere videantur. Non enim ex semine pro-
prio, vt sua fert opinio, hæ plantæ primam ori-
ginem ducit, sed ex alieno potius, hoc est, ex sper-
mate Turdorum & Merularum. Cùm namque
Vere appetente antequam Turdi terra nostra ex-
cedant, aues commiscetur, mira videas, maximè
cùm in Iuniperorum montibus, & pratis conue-
nerint, ita vt verisimile sit ex spermate horum, si
quando in terram fortè deciderit, Satyriones
primùm nasci. Nam quemadmodùm ex historia
illorum videre est, tertio demum anno Satyri-
ones primos proferunt flores, quos nullum vt di-
ximus semen contigitur. Deinde constat, Saty-
riones, nusquam lætius provenire, quàm in mon-
tibus Iuniperorum & pratis, in quibus locis au-
cularum eas suas querere assolent.

Vires

Satyrii Triphylli radicem bibere oportet in vi-
no nigro austero ad Opisthionum. Vtere præ-
ceptore Diosc.) etiam ipsa, si voles cum muliere
coire. Dicunt enim ipsam impetum ad coitum
concitare; Erythronium vero fertur non secus
atque Scineus libidinem excitare. Proditur e-
tiam, si modò radix manu teneatur Venere stimu-
lare, eoque magis si bibatur in lacte Ovis
colonicæ (in lacte Ovis M.) data, nervos inten-
dit: eadem ex aqua remittit. Altera tumores &
vicia partium carum erumpentia, cum polenta il-
lita sculat, vel per te trita. De Erythronio ait: Ve-
nerem etiam, si omnimò manu Erythraici radix
retatur [teneatur alii Cod.] stimulari narratur,
adeoque si bibatur in vino austero. Arietibus
quoque & hircis segnioribus in potu dari, & à
Sarmatis, equis, ob assiduum laborem pigriori-
bus in coitu, quod vitium profedamum vocant.
Et paulò post. In torum quidem Græci quum
concentrationem hanc volunt significare, Satyri-
onem appellant. Hæc Plinius.

Idem de Indi herba apud Theoph. Prodigi-
osa sunt quæ circa hoc Theoph. aut or alioqui grauis,
septuagena coitu durare contactu herbe cuius-
dam, cuius nomen speciemque non posuit. Pos-
sit itaque & hæc Satyrium appellari: sicut idem
Plin. Aristolochiam Polythizon esse dixit.

Satyrium, aut Triphyllum (inquit Galen.)
humidum & calidum temperatura est. Quamo-
brè gustu quoque apparet dulcè. Attamen recre-
mentitiam & flatuosam humiditatem possidet:
quocirca ad Venere concitat. Hæc verò & her-
bæ ipsius radix præstare potest. Porro, vt quidam
aiunt, ex vino nigro austero potum sanat opi-
sthotonum. Hæc de Veterum Satyris.

ORCHIS BARBATA FOETIDA.

Historia Orchium vsque ad eò obscura est
propter insignem varietatem, vt nesciamus,
quæ nobis præmittenda sit: videtur tamen Or-
chis quam barbaræ foetidam vocamus, à cate-
ris Orchidibus tot manifestis signis differre, vt
facile a quolibet, à cæteris distingui possit: quæ
oculatio vt ab ea incipiamus Orchidum differen-
tias recensere:

Eius igitur bulbi, & reliquæ plantæ partes, si
cum congeneribus conferantur plerumque ma-
iores videntur: quippe cùm *bulbus* iuglandem vnà
cum suo callo



caroso equâ-
res magnitudi-
ne obleruæ-
uerimus: *folia*
mulca, magna,
Liliacea, læ-
uia, & à radi-
ce, & in
caule, ad i-
psam vsque
ipicam ferè
nata: *caulis*
crassus spicam
denfam susti-
net *florum* ferè
tidorum: quo-
rum singuli pe-
diculo viridi
[cui appositum
foliolum sex-
tante longius]
intorto, ventri-
culo insident, calcari admodum breui, & viridi,
galea & alis toris ex albo virentibus, intus
purpureis punctis & striis notato: à la-
bello exterius albedo, interius purpurâ punctato
aruncus demittitur triplici cincinno vridanti
compositus, quorum laterales crispis breuioribus
que, & conuoluti interdum, mediis longior bis-
fidus propendet: odor grauis & viscosus: *semen* in
capsulis pusillum, vel vt ait Dodon. in valvulis o-
bligis triariis perexiguum.

Hanc cogitauit Dodon. scribens in Hist. Gall.
7. 2. 2. 2. Testiculus hirci, Gall. *Cuillon de Bouc*:
Bocacullens / vocatur etiam Testiculus leporis:
sine iudicio in Officinis vsurpatur etiam pro
Satyrio. Item hist. fl. & in fol. Tragorchis cui
folia maiora quàm aliorum Orchium, Testiculum
leporis plerique appellant, nos ab odore, quo hir-
cum dum in flore est, refert, 7. 2. 2. 2. & Hirci tes-
ticulum, dicere maluimus.

Lobel. Obs. Testiculus hircinus Adv. p. 62. Or-
chis Saurodes vel Scincophora, lacertarum emula-
tione, Corn. Gemma: siue Tragorchis altera, vul-
garis testiculus hircinus seu Tragorchis, & Lepo-
ris testiculus nostras Adv. p. 62. Lobelius duas ico-
nes proposuit vnus plantæ, cur autem diuersis
locis posuerit nescimus. In iconibus Plantarum
vnicam, eamque ponit quæ posterior p. 90.

Hist. Lugd. Orchis Saurodes vel Scincophora
Gemma, Testiculus Hircinus vulgaris.

Tab. Ic. & Hist. Orchis hircinus 1. & 2. *Bodæ*
hòde 1. & 2. Duas proponit icones: non ta-
men demonstrat qua in re differant: videntur sanè
duæ icones vnus plantæ.

C. Bauh. phyt. duas facit diuersas plantas: vni-
tulus, Testiculus 14. hircinus longiore angustio-
reque folio. Alteri autem, Testiculus 15. hircinus
breuiore, latioreque folio. Addit inter vtramque
non magnam esse differentiam: An ipse eam
animaduertit considerandum.

Solo pinguisimo nascitur, Lobel. Floret cit-
ca finem Maii ac ferè vsque ad medium Iunii:
provenit in collibus muscosis, præsertim inter
vmbrosas conualles. Circa Monteb. gardum læ-
pius vidi etiam in hortu Ill. E. C. priuquam ad or-
nare

nare curarem, sponte enim multis in locis proueniebat: Inibi flos Maio.

Dodon. in hist. Gall. dicit: odor multum olfacientibus capitis dolorem creat. Radix Testiculi succi plena, potissimum Testiculi hircini si edatur, aut cocta cum lacte caprino bibatur, Venereum excitat, roborat & corpus nutrit: Hecticis & iis qui alimento egent singulare remedium. Eum vero in Hist. Lat. pleraque omittere placet, ait autem: Nostra aras omnium Orchium bulbis ad Venereum excitandam vitur: & pharmacopœi compositionibus eò facientibus indifferenter quous admiscunt: præstantiores sunt Tragorchios bulbi. Assumendi autem non sunt ambo bulbi, sed durior, plenior & succi plus habens: flaccidior ac rugosior minus idoneus est. Est autè plenior, non semper qui maior, sed non raro minor, si videlicet bulbi colligantur priusquam stirps defloruerit: aut cum primum caulis erumpit. Nec etenim succulentior, alterum magnitudine superat, priusquam semen maturari cœperit. Nam alternis annis vnus bulbus intumescit, alter vero residet ac perit, ac cum durior ac succo plenior crescere incipit, alter flaccidusque contrahit, donec maturato semine vnâ cum foliis & caliculis subinde totus subsident ac pereat: eo qui interea creuit vegeto ac succi pleno: & vicissim. Cur Dodon. eligat potius fœtidus, an quia fœtet, ut Hirci qui talaces sunt: Quod ad nos attinet, nos existimamus odoris boui & grati potius roborare corpus, alere, & speciem augere quàm fœtida.

Omnia Testiculorum & Satyriorum genera [vt Trago placet] quæ Germ. Stendchourg appellant. calida sunt & humida. Nec debent nisi necessitas id postulauerit intrò sumi. Foris cataplasmatibus instar imponuntur. Radices roridæ & pleniores (sunt enim vt diximus nonnullæ vacuæ marcidæ & rugosæ) omnium Satyriorum, in cibo vel eclegmate vsurpatæ, ad Venereum stimulos addunt legnioribus. Vitilis est hæc medicina ad conseruandum & angendum genus humanum, modò ritè & quo debet modo vsurpetur. Rursus aridæ & maridæ Satyriorum radices Venereum inhibent, quo nomine cœnobitis qui castitatem vouerunt (vt hi loquuntur) vitiles fuerint. Paucos tamen in eo ordine hominum reperias qui id medicamentum experant. Radices plenæ in lacte caprino bibi possunt, aut cum albo Pipere & melle, instar Eclegmatis, confici ac assumi. Radices Satyrii maximè eius quod odoratum esse diximus cum vino & melle decoctæ, vlcera oris & quæcunque eius vitia sanant. Radices eadem tuscæ, & illitæ, inflammationes leniunt, ruinosos discutunt, vlcera fluentia purgât, sanantque veluti Aron & Dracunculus maior.

ORCHIS GALEA ET ALIS ferè cineris.

Hic bulbi fibræque appendæ haud aliis ab-
similes: folia duas vncias lata, quatuor aut
sex longa, quarerna aut quina: caulis dodranta-
lis flores sustinet in spicam digestos, odoratos,
quorum singuli pediculis seminalibus insi-
dentes, calcæ breuè exprimitur: galea alisque foris
cineris, intus rubentibus & saturatoribus pun-
nicis lineis striatis, quibus interiecta bina fo-
liola oblonga, valdè angusta, rubentia: labellum
oblongum, in bis binas alas rubentes dissectum,



intus albi-
dum, punctis
rubris pictis,
foris ex albo
ad purpuram
declinans: in
ricu apices
herbidi. Cir-
ca Montbel-
gardum abun-
dat in collis
pratis flo-
rens Maio;
Genex ite-
dem copio-
se.

Fuchs. hist. *Orchis mas*
latefolia.
Orchis mas
in vniuersum
maior quàm
semina, præ-
ceriorque, vt
pictura ipsa

pulchrè declarat. Icon. dicitur G. Breut Ina-
benfraut mensle. Is autem pro descriptione
sua Orchidis ponit descriptionè Dioscorideam,
non tamen indicans se Dioscor. descriptionem
ponere, quæ sanè non respondet iconi, folia enim
non sunt Oleæ similia.

An Trago, Satyrium mas quorundam, pri-
mum idemque vulgatissimum, Maio mense flo-
rens, quod in pratis reperitur, ternis aut quater-
nis plerumque foliis vestitum, Lili similibus.
Porò in duas species hoc genus, quod ad florem
attinet dirimitur. Aliud namq; flore comat pur-
pureo, aliud nino, còque Aristolochiæ vulgaris
flori consimili, &c. Eius autem Icon Fuchsianæ
similis est.

An Matthiol. in Dioscor. picturam habet no-
mine Testiculi, postremo loco. Camer. in Epit.
hanc iconem omisit, & aliam subicitur mutat
nonnihil descriptione: de planta autem, cuius i-
conem Camerarius exhibet sub Orchide albâ
calcarei longo agemus.

De nostra Orchide Dodon. Gall. Orchios pri-
mum genus, le premier coillon de chèn mastle
Orchis, Cynoforchis, *mas de chèn*, Testicu-
lus, Testiculus canis: Officinis Satyriones, quam-
uis parua sit similitudo. Foliis Lili conuallii, flo-
res odorati atque variegati Dodonæus ean-
dem iconem ex Fuchsio habet quam nos: ve-
rum lib. de flor. & in fol. mutauit iconem & nu-
merum, & dicit: Cynoforchis altera foliis laui-
bus, oblongis & latis est, sed quàm antecedentis
(Cynoforchios prioris Dodon.) minoribus & an-
gustioribus, quinque aut sex, nonnullis caulè â-
plectentibus, qui dodratalis est: spicâ densâ, bre-
ui, in qua flores multi, colore ex candore pur-
purascens, multis purpureis punctis, & inter-
iore partes obscurioribus copiosis exiguis lineis
ornati: formâ galeam aut hiantem cucullum
quoque referentes, dependente ex singulis velu-
ti animalculi quadripedis, aut homunculi exten-
sis brachiis & diuaticis cruribus absque capi-
te corpufculo, eodem ferè modo, quo ex Saturni
ore depingi solent dependentes pueruli: radices
substit duæ globosæ, nuclei Nucis Myristicæ ma-
gnitudine: adhærentibus ad annexum fibris ali-
quot crassis.

Loebel. Obs. Cynoforchis maioris secunda spe-
cies Aduers. pag. 62. Cynoforchis altera Dodon.
Angl. Doggis coddcs. Alia icon est in Plantis

Satyrium
mas.

Aliud flore
purpureo,
Aliud
Alid.

ni iconibus p. 175. hoc titulo, Cynosorchis maioris secunda species: & Cynof. altera Dodon. T. 214.

H. Lugd. ref.

Hist. Lugd. Orchis 7. species Dod. 5. Matthioli. Ic. ex Matth. quam non audemus dicere priorem Dod. lib. II. nec in post. hist. suspicamur potius secundam, cuius descriptionem etiam ponit hist. Lugd. sed malè nostro iudicio ad alteram iconem refert.

Tab. Icon. & Hist. Cynosorchis maior. 2. Grossefnabenfraut 2. Et post. Testiculus latifolius 5. Marthioli, Breyt Stendelmurg. Duae figuras vnius plantae.

C. B. Phyt. Cynosorchis tertia latifolia hiantecuculo.

Thal. Hircyn. Orchidis Dodonæi secundum genus.

ORCHIS STRATEVMATICA MAIOR.

Sunt & Strateumaticæ vel Anthropinæ dictæ quæ iudicio plurimorum cæteras pulchritudine vincunt: flores vt galeæ vel galeati homunculi rru-

Descriptio



à Maii auspicijs ad finem vsque.

Lob. Obs. & Ic. Pl. p. 184. Orchis Strateumatica, vel Stratiotes maior, siue Militaris C. Gemmæ, quam meritò Basilicam tertiam vocitare licet.

Hist. Lugd. Orchis strateumatica maior Basilica tertia Gemmæ.

Tabern. Ic. & hist. Testiculus 5. militaris Stendelmurg.

Orchin latifoliam alteram, quæ haud dubiè genus Orchidis amplissimis folijs est, Clusius non modò in siluis Nemethvivvar oppidi vicinis, sed etiam in Leytano saltu supra Manderstorf obseruabat, folijs quidem magnis & latis, sed infra superiorum amplitudinem, caule penè cubitali, magnis floribus spicatum congestis, eiusdem cum aliarum Orchidum floribus formæ, purpureis maculis asperis, exalbida galdâ flores singulos tegente, radicibus geminis, crassis, superiorem tamen breuioribus.

C. B. Phyt.

C. Bauh. Phyt. Orchis 18. bifolia altera Clusio, Orchis latifolia altera. Cur C. Bauh. vocat bifoliam? Clusius non scribit ralem esse, quinimò iconem, cui multa folia in post. hist. ponit quæ à Lobelio Strateumatica dicitur: eam autem ipse C. Bauhin. separans à Clusiana latifolia altera facit Orchidum 34. siue militarem maiorem.

ORCHIS STRATEVMATICA MINOR.

Cognatâ Strateumaticæ alterum genus (inquit Corn. Gemma), folio quidem lato, sed breuiore, comâ magis propendulâ, propiusque cõsertis floribus, & ad vnum latus nuntantibus galeis: color foris ex albo & cæruleo nonnihil cineritio mistus: habet maculas coloris puniceih: ad nos è montosis & asperis non procul à Bruxellensî ciuitate mittitur. Flos apprimè venustus vtrique generi, sed in odoris.

Lobel. Obs. p. 92. & Ic. Pl. p. 184. Orchis strateumatica inoi C. Gemmæ. Descriptionem Gemmæ posuimus, quæ respondet nostræ Orchidi galeâ & alis cinereis, pro qua tamen Lobel. etiam viderur habere iconem: diligentius hæc hist. examinanda.

Hist. Lugd. Orchis Strateumatica minor Gemmæ.

Tabern. Icon. & Hist. Testiculus strateumaticus minor 10. Stendelmurg.

C. B. Phyt. Orchis 34. siue militaris minor.

Strateumatica folio Liliifolij quàm simillima.

Præter iam dictas Strateumaticas, vel Militares, vidit aliquando Corn. Gemma & tertium genus folio lato, Liliifolij quàm simillimo, oblongo scilicet, & in mucronem subrotundum desinentem, cui flos Liliifolij lacteus planè columbarum effigiem alis exporrectis pedibusque quàm optime repræsentans. Gaudet montosis & aridis: floret eodem tempore cum Anthropinis.

CYNOSORCHIS PRIOR DODONÆI.



Cynosorchis prima species, Dodon. hist. fl. & in fol. folia habet lata, pinguia, Liliifolij propemodum similia: caulem pedalem, aut altiore, angulosum; & in eo flores copiosos, spicatum congestos, colore rubentis dilutæ purpuræ, cucullo aut galeæ parenti imiles, ex qui-

quibus parte inferiore lacinosum quiddam, canis aut alterius animalis quadiapedis exuio simile deprendet, dilute & ipsum purpurascens, punctulis magis purpureis respersum: pro radicebus præter fibras supra adhaerentes, gemini sunt bulbi veluti testiculi, formam aliquantulum oblongi, quorum vnus plenior ac vegetior alter rugosior.

Cynosorchis inquit Adu. omnium notissimus magnitudine, in pratis frequentissimus riguis, primo pillularum speciem habet Elleboris erumpentis, vel Colchici, deinde Lili conuallii aut vulgaris: folia exerit terna aut quaterna, lenta, crassa, & mucosa turgentia. Caulem verò sesquipedem longum, glabrum, nitidum, cauum in summo: spicato flore conspicuum, odoratum, purpureum, maculis albicantibus, atque pullis variegatum: radix geminis constat bulbis effigie testiculorum, quos quasi pubes supernè multæ ambiunt fibræ, quibus, non secus atque ipsa planta superior, bulbi alimoniam adipiscuntur, & alternis petennem: alteri nempe iam flaccido & vacuo, altero succedente turgido & succi viscidissimi limpidi pleno, albuminis Ovi, quasi foret semen genitale, magnitudo quanta maioris dactyli, in residuum Nucis iuglandis adulto: vieto verò, & rugoso multò minor, & situs inferior. Dulcis sapor, mucagineus, emplasticus, infusus, odor candidus, pellucidus.

Lobel. Obs. Serapias Diof. Cornelio Gemmae: siue Basilica Syderites vel Erythraea floris omnino purpurei, & aliarum omnium facile princeps. Cynosorchis nostra maior p. 62.

Icon. à Lob. & Dod. proposita similis admodum est Cynosorchis maiori alteri Lobelii & Cynosorchis tertio Clusii: neuter tamen certum aliquod discrimen tradere videtur: Lectorum præterea erit perquirere an hæc ab aliquo alio Botanico tradatur descriptione vel icone.

Hist. Lugd. Cynosorchis maior 3. Lob. Serapias Diof. Gemmae.

Tabern. Ic. & H. Cynosorchis maior, 3. Grossfnabenfrat: Icon eadem cum Dodonæo & Lob. descriptio autem diuersa à Dodonæi descriptione, quam Tabern. posuit pro suo Cynosorchide priore, vt dictum.

C. B. Phyt. Cynosorchis 2. latifolia, altera Liliifolia.

Thal. Harc. Orchidibus Dodonæi primum genus. Eiusdem alia species foliis quatuor vel quinque multò longioribus, dodrantalibus.

ORCHIS ORNITHOPHORA FOLIO MACULOSO Lob. Ic. Plant. p. 183. Teut. 219.

Orchis Ornithophoræ foliis maculosis C. Gemmae sunt, teste Lob. Obs. differentia accidentales plurimæ. Floribus: purpureis, purpurascens, albis. Foliis: prægrandibus, paruis, ovalis figuræ, ex lato in acutum desinentibus, ex acuto in amplum & rotundum.

Floret medio Aprilis ferè, & quandoque sub initium Aprilis vel finem Martii mensis.

Hist. Lugd. Orchis Ornithophora, foliis maculosis, Gemmae.

Tabern. Hist. & Ic. Testiculus 15. Ornithophorus satis latis foliis, striatis, valde maculatis, diuersorum colorum floribus, purpureis, albis, & ex purpureo pallido. Testiculus vulpinus, Süchse Tom. II.

hødlein. Folia lata cum neruis apparentibus, multis maculis aspersa, flores aui volanti similes, purpurei. Lectores considerent, an duæ icones & descriptiones vnus plante: non videmus occasionem cur Compilerator separarit capite.

C. Bauh. Phyt. Orchis 31. de qua Lobelius.



ORCHIS MAGNA LATIS FOLIIS, GALEA fusca vel nigricante.



Folia habet aut quinquè, magna, lanceolata, & tripalmata, vnicis circiter tres lata, striata, nitida, & præter hæc duorum foliorum in terra radicem: caulis striatus, sesquipedalis, superiora versus purpurascens, in quo strumthyrus maiusculorum, galea breui atropurea striata, quibus apprimuntur binæ ale concolores, calcari paruo, ad pediculum longiusculum contortum angulosimque appresso: ex pediculo pendet labellum exuias martis aut zebellini expansas, egregie exprimens, vnà cum crusculis & cauda aduersa parte ex albo purpurascens: intima floris penetralia rubro candidoque variata sunt: odor leuis non ingratus: sapor viscidus insauis.

Hanc obseruauimus in Ducatu Wirtembergico cum contenderemus per montem ex vrbe Dornstet ad vrben Nagel, florentem mēsis Maii medio.

Icon quam proponimus ex iis quas sculptas emimus quod radices & folia attinet, non malè conuenit plantæ descriptæ, veram flores non placent: considerandum an ab aliis Botanicis sit descripta.

ORCHIS ALIVS PVRPVREVS, ALIVS
ex rofeo candidus Trago siue quartus.

Satyrium
primum
Diosc. Tra-
go.



Testiculus
4 purpu-
reus alius
rofeo can-
didus.

mas quorundam, de qua egimus sub titulo Or-
chidis galea & alis cinereis.

Tragus autem sic describit: Quartus Testicu-
lus dum est generum si florem, quem alius pur-
pureum protius, alius verò ex rofeo candidum,
purpureisque ac exiguis maculis notatum pro-
fert, consideres. Planta est omni ex parte satis
magna, cuius viridia & mollia folia Liliū ferè
referunt: Radices illius quæ succulentæ sunt &
dulces binis oblongis auricularum ouis, aut vete-
ris galli gallinacæ testiculis, conferri possunt.

Considerandum an alius quispiam botanicus
huius Testiculi meminere, & inquirendum an
Tragus fortè intellexerit Orchion maiorem to-
tum purpureum, licet nostra icon ac etiam ico-
nes ambæ Tragi minus respondere videantur.

CYNOSORCHIS DELPHINIA MACV-
lofis foliis flore purpuro-violaceo.



inpritiis an conueniat considerandum.

CYNOSORCHIS MINIMIS SECVNDVM
caulem maculosis foliis, floribus purpureis.



Cynosor-
chis. Lob.
Ic. Pl. minimis
& secundum
caulem peda-
lem maculosis
foliis: floribus
purpureis,
Lob. Ic. Plant.
p. 175. Teut. 214.
C. Bauh. Phyt.
Testiculus 7.
morionis mi-
nor foliis ma-
culatis.

ORCHIS MAIOR TOTA
purpurea non maculata.



Gemino bul-
bo magno
donata est hæc
Orchis, altero o-
blongo: folia
quaterna aut te-
na, longa, lata, z-
uia, splendens:
caulis dodrantali-
s & cubitalis
crassus, in sum-
mitate purpurat-
cens: flores con-
ferunt multi pur-
purei, & interdum
albicantes, odore ferè nul-
lo: labello tripartito,
medio segmento proten-
sore, raris punctis
purpureis in

viridi albicantèue notato, alis foetis intusque
purpureis, calcaris satis longo purpurante. Hæc
etiam folio maculato reperitur de qua antè.

Fuchf. Orchis femina minor. Icon. p. 119. Or-
chis foemina altera, Sed mal. Fnabenfrant weis-
ble das ander, Minor est vt figura demonstrat.
Non placet Fuchfium iconem 4. loco ponere nec
demonstrare quâ in re ea Orchis differat à præ-
cedentibus, quæ nostro iudicio non erat sepa-
randa à secunda siue maculata Orchide.

Dodon. Gall. Orchios 4. genus, second conillon
de chen femelle, valdè simile foliis secundo (nobis
dicto, Orchis maior tota purpurea folio macula-
to): flores carnei coloris cū maculis paruis fuscis
(brunes:) Radices rotundæ, sublongæ, similes ouis
aurium, minores radicibus secundi. Dodon. Ico-
nem Fuchfii habet, an eandem plantam quam
nos intelligat affirmare non possumus.

Mat-

Mathiolus multos Testiculos describit, sed tantum icones proponit, & primo loco in vna tabella duas quae differre videntur, quod autem referendae nobis certe incertum, si licet coniecturari, accedere videtur vna ad Fuchianam antea dictam: De altera iconem eiusdem tabellae vix habemus quod dicamus, confetatur tamen cum Cynoforchide tertio Dodonei.

Hist. Lugd. Icones Matthioli duas in vna tabella proponit sub hoc titulo: Orchis 4. & quinta Dodonaei i. Matth.

Tabern. icon. & Hist. Cynoforchis maior prima *Grosfnabenkraut* / describitur à Dodonaeo & Matthiolo foliis latis pinguibus, Liliorum foliis valde similibus: caule anguloso palmum alto vel paulo maiore: flores spicae modo purpurei, galeam apertam referentes, labrum inferius punctis purpureis notatum: radix constat duobus globulis. Icon descripta est ex Matthiolo: descriptio autem ex Dodonaeo de floribus [nulla icon] sed diuersa à Matthiolo: Descriptionem Dodonaei conuenire cum iconem Matthioli dicere non audeamus, nec etiam scimus an exeat Orchis caule anguloso.

Item: Testiculus vulpinus 3. *Süschhöllein*. Compil. ponit iconem valde foliosam per totum caulem [qualem habet Matthiol. sub prima Testiculorum specie] hanc non describit, ea enim descriptio quae est tertio loco non pertinet ad Orchidè cui numerus tertius ascriptus: Iconum p. 665. pro testiculo 12. posuit iconem (sine descriptione) folioso admodum caule.

Casp. Bauhin. Phyt. Testiculus 6. morionis feminina alter.

Hanc Orchin florentem Aprili in pratis obseruauit propè Malsouiam Abbatiam: & prope *port de Roide* Burgundiae, praecedentem folio maculato, & non maculato, de qua hoc capite: vt & hanc cum sequenti in eodem prato. Maculatam collectam in monte *Bar* transituli in hortum Ill. E.C. Circa Monbelgardum & Besfordiam, circa duneta floret adhuc Maio.

ORCHIS ORNITHOPHORA FLORE colore herbaeco.



Item & quinta (inquit Dodon.) Cynoforchios quaedam species reperitur *foliis*, vt secundus (nobis dictus Orchis galea & alis cinereis) canis testiculus: *caule* pedali: *spica* longa: *floribus* colore herbaeco subvirentibus, ex quibus quod laciniae similè dependet, oblongum est,

& quasi quadrangulum.

Dodonaeus omnia icones & descriptionem quam habebat in hist. Gal. pro quinta, aliam in histor. flor. ponit, cui in fol. iconem addit plurimum diff. Tom. II.

ferentem, de qua Lobel. Ic. Pl. pag. 182. Teut. 219. Et Obs. Orchis Ornithophora, vel Ornithes folio laui C. Gemma. Testiculus noster papilionis alas expanse referens, Ad. p. 62.

An Lob. Ad. p. 63. Testiculus vulpinus foliis latiusculis & toto caule appressis, floribus Papilionones volantes, alisque passis se librantes amulantibus.

Hist. Lugd. Orchidis Dodonaeo quinta quaedam species reperitur: floribus caule herbaeco subvirentibus &c. Pro hoc quinto Orchide fortè malè posuit Hist. Iconem Matth. primam quam postea Iconem Lobelii & Dodonaei ponat sub titulo hoc: Orchis Ornithophora folio laui, Gemm. Casp. Bauhin. Phyt. Orchis 30. spica ex herbaeco subvirente.

ORCHIS ORNITHOPHORA CANDIDA.

Plant Icon. p. 183. Ornithophora candida Teut. 219. Vide h. Belg Lobel. C. Bauhin. Phyt. Orchis 32.



ORCHIS MINOR PURPUREA ET ALIORUM colorum cum alis virentibus.



Radix in testes duos rotundos, alterum superiorem, alterum inferiorem, diuisa, cum fibris aliquot adnatis: *fita* octo aut vndecim nonnullis, magna, duas vncias aut paulo plus longa, angusta: *caulis* palmum aut sesquipalmum altus vel altior: *Floribus* suauolentibus, vna vice se pendentes, rubentes,

Descriptio

labello latiore, quam praecedens, simbriato; calcarum etiam breuiore, saturatioribus punctis puniceis in albo carneis distincti: *ala* media parte virentes, magis tamen intus quam foris

reliqua rabentes, striati, singulorum florum pediculis appositum folium purpurascens.

In hoc genere duplex florum varietas reperitur præter iam dictam: vni enim labellam albi-ecat, vix tantillum purpurei habens, purpura fugiente punctatum, per reliqua cum iam descripta conueniens: alteri flos totus cum calcari albet, non nihil ad luteum inclinans: alas cum superposito folio striæ virides percipiunt; folium quoque floris pediculo appositum virefcit. Hæc Orchis multa in ludit magnitudine & colore.

Orchis Serapias.
Triorchis.
Triorchis mas.

Fuchf. Hist. *Orchis serapias* aut *serapias*, Paulo & Actio testibus, Græcis dicitur: *Serapias* Latinis: Germ. *Nagwürz*; Gall. *Saturium à trois conillon*. Triorchis Serapias mas. Triorchis manifesto ex ea appellatione argumento, quod non duabus, sed tribus testicularibus radicibus in terra nititur. Quo facile à prioribus discriminatur Orchidibus. Rem. Ic. Triorchis mas minor. Fuchf. ponit descriptionem Diosc. pro sua, non demonstrans esse Diosc. quod non parum displicet. Si Orchis de qua hic agimus reperitur cum tribus bulbulis sine testiculis, id euenit propter iuniorum plantam adiunctam & primum proueniente. Displicet & Dodon. qui in hist. Gall. huic Orchidi, in sua descriptione tribuit tres bulbos, licet non viderit, quod patet ex lib. eius florum & postrema historia, ubi scribit in nulla Orchide non contigisse plures videre quam duos bulbos.

Fuchf. mt.

Matth. in Diosc. quarto loco Testiculi species: In epit. pro tertio sine descriptione. In histor. Germ. pro secundo.

Dodon. reprob.

Poterit considerari icon Cynosorchis morionis femina Dodon. & Lobelij de qua antè: que videtur exprimere Orchidem de qua hoc loco agimus, multa respondent, eadem est etiam in Hist. Lugd. vt antè dictum.

An Tabern. Icon. & Hist. Cynosorchis morio 2. Gesprengt Habenfrucht: Hæc postrema Cynosorchis habet folia laeua, angusta, striata, similia angustæ Plantagini. Flores valde expansi, retrò pèdet veluti corniculam: eis foliola quædam auriculis Morionis similia. Icon Tabern. eadem est cum iconè Cynosorchis Morionis femine Lobelij in Obs. & Icon. Plant. de qua antè proximo titulo egimus.

Tabern. icon & hist. Triorchis mas minor Klein Nagwürz Mannlein. Icon modò dicta est ex Fuchfianis, qualis nostra, cuius descriptionem non ponit, & non benè separat capite proprio ab aliis Orchidibus: nullam ponit descriptionem conuenientem.

An Clus. in Pann. & hist. post. hanc tradit, cum scribit: Orchis colore vario, siue quinta, quatuor aut plura habet folia, summâ tellure iacentia, Belgicæ Orchidis quæ passim in pratis maturè purpureum florem fert, similia, sed nullis maculis aspersa: caulem palmarem, aliquot minoribus foliis septem: cuius summum, multi flores, exigua galeâ duobus foliolis constante, tribusque aliis foliolis galeam ambiuentibus, latiore barbâ propendente, & obtusiore calcari præditi, & in spicam nascentes exornant, coloris aut purpurei saturatioris, aut diluitoris, aut ferè carnei, atque etiam omnino albi, barbâ tamen plerumque vel exiguis, vel maioribus maculis saturè purpurascensibus aspersâ, interdum etiam profusè nullis, præsertim in lacteis floribus: semen vt in reliquis contortis vasculis continetur: geminas radices, vnam superioris anni flaccidiorem, alteram recentiore, succulentam, tegunt mul-

ta candida crassiuscula fibræ. Inueniuntur passim in pratis Viennæ vicinis.

Clusus pro sua Orchide quinta, ponit iconem Testiculi morionis maris Dodon. Hist. 8. & postrema, siue Lob. Obs. & Ic. Pl. Cynosorchidis morionis cui folia maculata: Considerandum an sit eadem cum nostra purpurea minore, cui alas virentes, quamuis C. Bauli. separet.

C. Bauh. Phyt. Testiculus 9. morionis foliis testibus non maculatis. Orchis colore vario Clusii. Testiculus 5. morionis femina Matthioli Icon. p. 559. Testiculi species tertia. Lob. Cynosorchis morio femina.

Hunc Orchin minorem cum præcedenti maiore obseruauimus florentem ex primis Aprilis in pratis humidis circa Montbelgardum: & propè Moruiliars flore albo & caruleo & albedo, hos etiam florentes Maio circa Montbelgardum transtoli in horrum Ill. E. C. Est ex primis speciebus Orchis vere florentibus, ac cum magno roto purpureo floret: Genææ quoque obseruauimus.

Locus Temp.

ORCHIS SIVE CYNOSORCHIS tertius Dodon. Lobel. maior alter.

NO Iconem quam hic ponimus cum aliis sculptam emimus, de qua Fuchf. icon. p. 18. Orchis femina angustifolia, *Schmal knabenfräule*. In hist. Orchis femina maior, vt pictura fatis demonstrat. Fuchsius iconem ponit tertio loco, siue vlla descriptione, non demonstrans qua in re ab aliis differat.



Dodon. Gal. Orchis tertii genus, *premier conillon de chens femelle*, magna & lata habet folia, Liliorum foliis penè similia: flores carulei [perfes:] radices rotundæ & sublongæ forma Oorum auium. superior rotunda & parua, inferior nonnihil

longior & crassior, vtraque saporis valde dulcis. Dodonæus iconem Fuchfianam habet in sua hist. Gall. Quo nomine tradat in hist. l. c. 61. asserere non audemus, nullam ibi figuram habet, considerandum an describat his: Tertia Cynosorchis species folia edit angustæ &c. Dodonæus in fol. eandem historiam habet & iconem, quam inscripsit Cynosorchis tertius. Hæc autem Icon est apud Lobel. Obs. p. 89. cum hac inscriptione Serapias Diosc. secunda C. Gemma, &c. Icon post. Dodon. & Lobelij tantam habet similitudinem cum Cynosorchide maiore Lobelij & priore Dodon. in post. hist. vt insigne aliquod discrimen statuere non possimus.

Hist. Lugd. Serapias Diosc. 2. Gemma. Orchis Basilica altera, Cynosorchis altera maior Lob.

Hist.

Tabern. Icon. & Hist. Cynosorchis maior 4. Groß Knabenfraut. Icon Tab. est eadem quae Lobelii & Dodonæi in post. hist. sed sine descriptione.

C. B. Phyt. Cynosorchis 1. latifolia floribus purpureis intus albicantibus.

ORCHIS MAIOR TOTA PURPUREA maculoso folio.



Orchis maior tota purpurea folio maculoso, quæ in re differat de- ptis maculis nigris in foliis considerandum ab ea quam ma- iorem totam purpuream non maculatam diximus: dicitur Fuchf. Icon. & hist. Orchis mas angustifolia, Schmal Knabenfraut Nieme / Al- terum genus angustioribus foliis quam

Orchis mas latifolia, & maculosis magis, flori- busque purpureis constat.

An Trago Cynosorchis mas, Testiculus quar- rus duum generum, de quo paulo antè scripsi- mus, alius roseo candidus.

Matth. Testiculi penultima figura ex Fuchfio sine descriptione. Figure tamen ex Plantino melius placent quam Fuchfii quas hic habemus.

Hist. Lugd. Iconem habet ex Matthiolo cum hac inscriptione, Testiculus morionis mas Dodo- næi, ibidem descriptio ex Dod. de floribus: addit- que, Orchis secundum genus facit Dod. Matth. Testiculum quartum.

Apud Dodon. Gall. Icon Fuchfiana: Orchis secundum genus primo (sive ei cui galea & alæ ferè cinerea) nonnihil simile, foliis tamen angu- stioribus, tenerioribus, cum maculis nigricanti- bus: Flores modò cærulei obscuri (pers. obscur.) modò niuei candoris, Radices oliuarum modo rotundæ: vna noua & plena, altera fungosa ru- gosa & flaccida. Idem hist. fl. & in fol. Testicu- lus Morionis mas, cui folia sunt quæque, aut sex, longa, lata, læuia, Liliæ foliis similia quædam mi- nora, superius maculis aliquot subnigricantibus signata: quorum vnum & tubin de alterum cau- lem quoque circumplectitur: caulis dodrantalis: flores in spica purpurei, circa umbilicum albidio- res, odorati, & aspectu grati, posterius cornicu- lum habent propendens, simile ferè corniculo Regiiæ floris: anteriori verò cucullum auriculatū & cristatum Morionis referunt. Nam cuculli cuiusdam & patentiæ galeæ modo flosculus hiæ, & angusta foliola, quæ à lateribus surgunt, auri- culas: quod verò è medio attollitur, cristam re- fert: radices gemini sunt globuli nucleo Nucis Myristicæ similes, supra quos fibræ exeunt. Si Do- don. eandem quam nos intelligit, consideran- dum an icon benè respondeat.

Tqm. II.

Tab. Hist. & Ic. Cynosorchis maculata Ma- rientreher Mänlein. Cynosorchis morio mas, Gesprengt Knabenfraut: Quinta species fo- lia sunt crassa & lata, multis maculis aspeisa. Flo- res prioribus similes, coloris nonnihil viridis, huic similes sexta foliis maculatis: quæ macule sunt ex nigro virides, flores albi & purpurei gra- ti odoris, similes capitii Stultorum. Icon prior Tabern. accedit ad iconem Matthioli, secunda ad iconem Dodonæi: quas autem plantas intelligat non asserimus adhuc.

C. B. Phyt. Testiculus 4. morionis mas foliis maculatis.

Orchis fatidissima Clusio.

Similem quintæ (Orchidi colore vario) obserua- bam [inquit Clusius in Pannon. & Hist. post.] in pratis vrbis Londinensi in Anglia proximus, vbi etiam in crebri n. grandiore paulo horum pur- pureorum spicâ terribili fetoris.

Casp. Bauh. Phyt. Orchis 13. fœditissima Clusii.

ORCHIDIS GENVS PARVVM FLORE proterus purpureo odoris suauissimi.



Quintum Testiculi genus Trago bipartitum est, vtrumque s. ho- vestitum Lilio simili: Flore emicans pur- pureo proterus, nec enim illas ostendit litu- ras, eoque in- star frumentor- um in spicatū desinente cacu- men: quod in hoc genere mi- nimum exiliè suauissimo cõ- mendatur odo- re, & ad Gario- phyllæam ac- les odor.

cedente. Nasctur vtrumque in asperis plerum- que montibus subter luniperos, terrâ forti & al- ba gaudens. Orchis quinta odorata, Das 5. wörtehend Margendrehen.

Tragus propriam huius habet iconem: con- siderandum an icon nostra ex empiriis pro ea poni possit, vel an aliquam ponens denotet Or- chidem.

Perpendendum etiam an à Clusio in post. hist. sic tradatur: Orchidis genus elegantissimum: si- que tertium binis crassis bulbis præditum, vno succi pleno, altero flaccidiore, quod in Orchidi- bus vulgare est: foliis longis, angustis: caule in- terdum pedali, spicâ florum eleganter, odoratâ, quorum galeola obscurâ purpura nitet, hiatus cum propendente labro candicant, purpureisque maculis, insigniuntur. Inuenitur in pratis Ne- meth-vyyvar Dn. de Bathyan vicinis, supra Ra- bam & inter flumina Muram & Drauum.

C. Bahin. Phyt. Orchis decimaquinta obscurâ purpurea.

ORCHIS MINOR FOLIIS TENUIORIBUS reflexis flore punicante.

Orchidis minor species Thalii, foliis est tenuioribus in terrâ reflexis, quinis, scenis, septenis sive: *causticulo* breui, digitali, quandoque dodrantali, tenui, spica breuior florum punlicantium pauciorum. Nascitur locis apricis circa Gerentodam.

ORCHIS PARVO FLORE RVBRO siue phœniceo.

Descrip:



Icones supra posita.

Orchis hæc palmo maior foliis pluribus non magnis, *caulem* multum amplexitibus: *floribus* veluti in spica sexcunciali longa, & penè vnciali lata, paruis, rubris, & penè vnius coloris: an fortè Testiculus morio rectius Dodonæi?

Icon quam ponimus est ex iis quas emim⁹, quæ aliquatenus exprimit nostram plantam.

Considerandum an de hæc scribat Clus. H. post. Orchis 2. cui folia sunt plura, quam latifolia alteri, angustiora: caulis gracilior, pedalis, flores rubri pulcherrimi, quales ferè in Belgico illo Orchidis genere videre memini, quod è pratis Lo-uano vicinis erubatur. Crescit in eodem iugo Græben pone arcem, & plerisque gramineis locis, inter flumina Muram & Drau, utum apud Sackturnya Ill. Comitibus de Zrisio arcè. Tradidit autè hæc prius iisdem planè verbis in Pannon. sub hoc titulo; Orchis flore rubro elegantissimo.

C. B. Phyt. Orchis 13. flore rubro elegantissimo rubro. Montbelg. mense Iunio florètem vidi.

TRAGORCHIS MINOR FLORE fuliginoso.



Ob. obs. p. 90. & Ic. Pl. p. 177. Tragorchis minor & verior C. Gemmæ, siue Coriosmites, vel coriophora flore intar cunicu: *Florè* est fuliginoso, figura, color & odor Cimicis, *folia* non absimil: minori Delphinio Satyrifco: gaudet itriguis: floret cum Delphinis. H. Lugd. Tragorchis minor & verior Gemmæ.

C. B. Phyt. Test. 16. siue hircinus minor.

Tab. Ic. Testiculus hircinus 3. minor, flein Boets hœdle. Icon quam his posuimus an respondere possit Tragorchis minori considerandum.

ORCHIS BATAVICA



Dodratali affurgit *caule*, quem tenuis aut quaternis ambiq angusta folia: sumus *caulis* fullinet breuiorè spicam florum elegantis intèius rubri coloris: trifido labro propendente.

Orchis 6. siue Batavica (Clus. Pann. & H. post.) ingrati odoris est, quam nò inceptè Tragorchin minorem nuncupari posse censet Io. Hogheladius.

Rara inuenta crescit in marinis aggeribus, interdum etiam reperitur circa Hagam Hollandiæ. In hortos autem translata, latius explicat florum comam, in metæ quasi formam desinentem.

ICONES ORCHIDVM QVARVMDAM.



Icones propositæ, sunt ex iis quas sculptas emimus, considerandum an sint plantarum diuersarum à iam traditis: insignis enim varietas est Orchidû. Sunt nobis sanè aliquot Orchidû differentie, quas accepim⁹, Argentina à Do. Vledario Chelio insigni Medico ex plantis vt existimamus Dj. Aggerii stirpium diligentissimi inuestigatoris, ac ab aliis, quas describere nunc non valeamus, nec pingere lubet, quia nihil certi proponere possumus, ac iguoramus vbi collectæ, & an sint iam descriptæ.

ORCHIS

ORCHIS MINOR ANGVSTIFOLIVS IN
suprema parte longis foliis.



Testiculi 16.
minoris
(Hein Knaben-
wurz) Tabern.
more solito nul-
lam exhibet de-
scriptionem. Si
Icon ad plantam
facta, notabile
est Orchis gen-
us, in eo differe-
rens à cæteris,
quòd folia supe-
riora iuxta flo-
res sint longa,
cùm aliis sint
breuia.
C.B. Phyt. Or-
chis 29. Tab. 16.
minor.

ORCHIS PARVIS FLORIBVS, MVLTIS
punctis notatis, An Clusio Orchis
Pannon. 4.



Berborum al-
tero oliuari,
altero rotundiori
fibræ adnascun-
tur vt in cæteris:
caulis selquipal-
maris & dodran-
talis, cui circũue-
cta folia quina
septenque, sel-
quiunciali lati-
tudine, longitu-
dine palmari,
quorum aliqua
repanda, alia
caulem inuol-
uunt: flores in spi-
cam satis breuẽ
confertim dige-
sti, ferrugineum
conum in fasti-
gio caulis aate-

quam explicentur amulantes, odore melleo: flo-
res singulares exigui, caleari herbido breuissimo,
galea ferruginea, alis vel totis herbidis, vel ex di-
midio purpurantibus, intus rubro punctatis: *La-
bellum* simile quodammodo animalculo quadru-
pedi tripartito vel quadripartito, alato, foris pe-
nitus albicante, intus creberrimis punctis fatura-
re purpureis notato: apicibus in rictu luteis.
An Trago: Tertium peculiare quoddam Sa-
tyrii genus, caulem proferens teretem & mollẽ:
folia Lilio similia: radices gemellæ & rotundæ,
exiguæ, flore copioso, ac racemi inftar coacti, for-
tis spadicco, intus verò candido & minutissimis
maculis asperso plenum. Gaudet humo argilloso
nasciturque tam in pratis quàm montibus. Pro-
inde Iunio mense florere incipit.

Nos iconem Fuchianam proponimus [que
non placet] de qua ille Icon. p. 320. Orchis angu-
stifolia femina tertia: *Schmal Knabenwurz*

weible das dritt. Verùm quam Orchidem in-
tellexit Fuchsius proposita iconè perquirendum,
quandoquidem nihil annotauit præter nomina.

Dodon. in hist. Gall. Iconem Fuchsi habet sub
hoc titulo Orchis quintum genus, *le tiers costil-
lon de chien femelle*: Valde simile est foliis fe-
cuudo (quod vocamus Orchin purpuream maio-
rem maculatam,) flores parui, simul conglome-
rati, externè coloris Castaneorum, internè albi,
plurimis maculis notati: radices duæ similes dua-
bus Nucibus longis & rotundis, vna maior al-
tera.

Dodon. in Hist. fl. & in fol. omisit hanc histo-
riam & iconem, quasi de planta incognita & que
non extaret olim scripsisset.

Clus. Pann. & Hist. post. sic describere videtur:
Quina aut sena sunt Orchidi quartæ folia: spicæ
elegantium pusillorum florum purpurascete ga-
leæ tectorum, prominulo labro & in quatuor bar-
bularum diuiso, albo, purpureis punctis distincto;
paruo calcari à tergo prominente, tenuis odoris,
sub quo, vt in reliquis Orchidibus torosum &
contortum est capitulum exiguum semen scobis
inftar continens: geminas radices habet testicu-
lorum modo efformatas, vnam plenam, alteram
marcidam, supra quas ex imo caule ortæ fibræ ex-
panduntur. Nascitur ad montis Glesensfeld im-
minentis radices, binis supra Neapolim Austriæ
miliaribus, abundantius tamen in montium te-
nuum gramine sectorum decliuantibus, supra Ra-
daun, Medeling, Baden, & plerisque aliis editio-
ribus siccioribusque locis Vienna vicinis. Illi si-
mitem eruebam montibus Greben proximis, sed
longè ampliorem, crassiorèque & longiore spicæ
præditam.

Icon que proponitur ab Hist. L. sub Orchide
quinta Dodonæi exhibita est à Dodonæo vt di-
ctum, & Fuchso. Verùm an ei conueniat descri-
ptio apposita ex libro florum pro Tertia Cyno-
forchidis specie, considerandum: quia Dodonæus
in fol. pro ea longè aliam iconem proponit, nec
scimus an descriptio ex libro florum Dodon. ei
iconi quam nos etiam habemus respondeat.

An Camer. hort. Orchis minor. Cynoforchis. Iocuz
Testiculus canis minor flore guttato languineo. tempus.

Circa Montbelg. abundat ac floret Maio: Ge-
neta: Obseruauit florentem Maio: Frater Casp.
B misit collectam in pratis propè Dornacum.

ORCHIS ROTVNDVS DALECHAMPII.




Est nobis in-
ter plantas
nostras siccas
Orchis rotun-
da Dalecham-
pii cognomi-
natus: quem
Hist. Lugd. sic
describit: *radi-
ce* constat ge-
mina, testicu-
lis simili, car-
nosa, superne
fibrata: *caule*
vnicò, cubitali,
rotundo: *foliis*
ad summum
tribus vel qua-
tuor, latis, ve-
nosis, pallidis,
Arundinis in-
Sff 4

star è caulis amplexu sese explicantibus : flore puniceo in capitulis globosis & aliquantulum compressis, non aliorum generum modo in thyrsulo longo & spicato emicante capituli vertici velut de industria affixo : Cliuosis pratis frigidorum montium gaudet.

Thal. sic describit : Orchidis species testiculatas radices minores obtinens : folia etiam aliquantulum minora quam cæterarum specierum, quatuor ferè, lænia, splendentia : cauliculum rectum, pedali non multum maiorem, in cuius summo fasciculus florum paruus conspicitur, non quidem spicatus, sed in umbellæ parvæ ferè modum explicatus : figura Schönoprafi.

C. Bauh. Phyt. Orchis 39. lutea globoso flore. Orchis rotundus Dalechampi. *Orchis rotundus* Dalechampi non est flore luteo, sed flore puniceo : nolum Orchidem Dalechampi locare inter pusillam [38.] Clusii & Frisiam (40.) Lobelii: Dalech. enim planta magna est, differunt præterea 38. & 40. colore.

ORCHIS SIVE TESTICVLVS maximo flore.



Apud Marthol. sine descriptione extat in Côm. cum magn. fig. Lat. & Ital. sub titulo, Testiculi tertii, Icon quædam cum maximo flore: in eadem tabella alterius plâta icon cui calcaria longa, quæ fortè ad Orchidem aliam calcari longo referenda. Apud Hist. Lugd. sub titulo tertiar speciei Marth. [vbi dictarum plantarum icones] extat iam dicta.

Tabern. Icon. & Hist. Testiculus 13. *Stendelwurz*, *Enabenfrant*.

C. B. Phyt. Testiculus 36. Tabern.

Pulchrum hoc genus Orchidis attulit nobis ex Italia Gener Cherlerus

ORCHIS FVCI FLORA, GALEA & alis purpurascensibus.

Foliorum huius, quæ Plantaginis angustifoliæ foliis respondent, alia reflectuntur, alia caulem ambiencia surguntur : in caule palmari & dodrantali flores rari calcaris expertes, *galea* & alis purpurascensibus, linea virescente à summo ad imum decurrente: quod, labelli loco est, amplum existit & pingue folium, fucum pulchre exprimens, colore fuliginoso & ad obiectum lucis hilariori vel tristiori, eleganti luteolarum linearum distinctu variatum, ac vt areolæ tres circulos, medio ferrugineo describant: rictu conca-

uo, viridi, supra quem in rostellato latet apice: lutei, ima Labelli ora luteola, ceu cauda, fusum reflexa, aversa parte albet, in ambitu ad ferrugineum declinans : *pedunculus* incurvus, ventriosus, cui appositum folium surrectum sesquiancia circiter longum, angustum.

Triorchis forma *Fuchsi*, *Ragwurz* meible. Orchidis Serapiadis seu Triorchidis alterum genus flores obtinet diuersis coloribus distinctos, purpureo videlicet,



candido, viridi, & nigricante : inferioroque parte fuci planè effigiem exhibet.

Orchis sexta Tragi. Das 6. *Margendrehen*. Testiculus sextus. *Satyrium* alterum Diosc. prouenit in asperis plerumque montibus subter luniperos, terrâ forti & albâ gaudens, radice gemella satis magna, binas Noces Myristicas repræsentante, dulci, succulenta, flore diuersicolore, nam constat is purpureo, luteo & viridi, qui tamen commiscetur. Forma floris ita se habet vt inferior illius pars crabonem, superior verò quæ capitulata & alata quodammodo esse cernitur, auctulam, repræsentet. Exiguus huius Testiculi genus (est enim hic magnitudine foliorum, caulium, & radicum differetia,) folia Allii fert, maius verò Lili.

C. Bauh. vult Testiculum 6. Tragi esse Orchidem Melittiam, de quo mox.

Triorchis Dodonæi Gall. Orchis Serapias scæmina. *Triple couillon de chien femelle, ou Mousche*. Germ. *Ragwurz*. Belg. *Rhagwortel*. Is in eadem Historia Gal. alargebatur & tribuebat tres bulbos in sua descriptione, quasi ipse obseruasset, & iconem Fuchsi proponebat: in hist. fl. aliam posuit, & in poster. duas nouas: illi quæ in lib. florum præponitur titulus, Orchis Serapias secundus minor: alteri, Orchis Serapias secundus maior.

An Lobel. & Fenæ Adu. *Vulpinus testiculus* minor foliis binis aut ternis caulem spithameum imum ambiens, summum verò floribus luteo-fuluis paucis, fucum colore & effigie præ se ferentibus: exigui binj subsunt testiculi.

Testiculus Vlpinus secundus Lob. Obs. p. 88. videtur *Sphogodes Gemma*. Nescimus cuius culpa in iconibus Plantini hæc figura ommissa sit, & alia postea p. 179. sub titulo iam dicto: de hac icone postea sub titulo, *Sphogodes* hirsuto flore. Item Obs. p. *Sphogodes* C. Gemmæ, Gall. *Musche guespe*, Belg. *weespe*. Testiculi vulpini varietas Adu. p. 62. Huius è sola magnitudine & foris intensi & remissi colore varietas gemina conspicua. Icon. Pl. p. 8. Testiculus Vulpinus maior & *Sphogodes* Teut. 27.

Histor. Lugdunens. Orchis Serapias secundus

us Dodon. Matth. Testiculus secundus. Sub dicto titulo Hist. Lugd. est icon & ex Fuchio. Est & alia eiusdem plantae sub titulo, Orchidis 2. species, est & Orchis Spherodes Gemma.

Tabern. Icon. & Hist. Testiculus 7. Sphegodes *Stendelwurcz*. Testiculus vulpinus 2. *stendelwurcz*. In descriptione. Folia quinque aut sex striata latiuscula, Plantagini angustifoliae nonnihil similia, quaedam reflexa, caulis palmatis, cum floribus quinque; vel sex, qui foliis aliquot constar, in quibus partes inferiores habent aliquid nigri, quod refert imperfectam apem. *Non placet* Compilatore ponere Testiculum modò ab eo descriptum, capite diuerso à Sphegode, quem non descriptit: si enim hic non idem, saltem erit valde similis. Huc etiam referendam censemus ineptam figuram cum flore quadripartito sine descriptione Tabernae iconum & Hist. cui titulus Triorchis foemina, *Nagwurcz weiblein*.

Casp. Bauhin. Phyt. Orchis 23. Fucum referens maior, foliis superioribus candidis & purpurascensibus.

Montbelgardi abundat florens Maio, etiam in horto Ill. E. C.

conueniat H. maifculam Romanorum eformant: aliam verò duobus locis coeuntes insulam Ouali figura, lignosam hirsutamque eic. cum scribunt.

Plant. Ic. pag. 180. Testiculus Vulpinus secundus Sphegodes Teut. 217. Lobel. Obs. p. 88. nomine Testiculi vulpini aliam posuit iconem, quae apud Dod. in h. postrema est nomine Orchidis Serapiadis secundae minoris.

C. Bauh. Phyt. Orchis 25. Fucum ferens tertia.



ORCHIS MELITTIAS.



Ob. Obs. & Icon. Plant. pag. 180. Orchis Melittias, siue Apis cadaucrum exprimens Belg. *Bienn* Teut. 217.

Hist. Lugd. Orchis Melittias Gemmae, quae videtur referre Orchin Serapiam Dod. in hist. stirp. Gall.

Tab. Hist. & Ic. Orchis Melittias, *Bif blumlic Gylwurcz*.

Casp. Bauh. Orchis 24. Fucum referens minore foliis subuirentibus: vel Orchis aperta referens. Orchis 6. & Satyrium alterum Diosc. Trago: Orchis Melittias Lobelio.

Orchidis tertiae Tragi meminibus nomini Orchidis Fucifloris, ubi eius descriptionem proposuimus, consideretur an & icon: perpendendum etiam nostra icon ex emptitis esse referenda, vel eadem cum praecedenti ad strigiosorem plantam minus concinne pictam.

ORCHIS SIVE TESTICVLVS SPHEGODES hirsuto flore.

Galea alaeque expandit virentes, tristiorique & obsoletere fuliginoso colore facum potius aut vespam quam apem praefert: *folium* infimum hirsutum, quod pro labello est, in quo non lutearum linearum, vt in illa, discursus vllus conspicitur, sed solummodò laeuidae duae reliquo folio lauiore, depressoque transuersa lineola

ORCHIS MYODES GALEA ET ALIS herbis: & Orchis Serapias tertius Dodon. & Myodes. i. Lobelio.



Folia tria, quatuor aut quinque, vnciam lata nonnunquam angustiora, longitudine circiter palmari: *caulis* tenuis, palmatis, bipalmatis & maior: *flores* sustinet ex pediculo surrecto, ventrioso, cui appositum folium ad ipsius floris cacumem vsque pertinens, raras, nullo calcar:

galea & alis colore herbaceo, reliqua parte muscae corpusculum affabre exprimente, prona parte albidis oris ferrugineis, superius verò colore fuliginoso, Zona subcaerulea septimo cingente, in ritu geminis corniculis stipato *apices* lutei occurrunt.

Lobel. Adu. pag. 62. Testiculus Vulpinus floribus muscam, sed colore rubiginoso obsoletoque & in aetate fusce dine purpurascens Fucum exprimentibus. Considerandum an haec conueniat cum icone sequenti de qua Lobel. Ic. pag. 181. Icon Obs. Orchis myodes prima C. Gemmae, floribus muscam exprimens.

Hist. Lugd. Triorchis Serapias tertius Dodonaei. Male impositus titulus Triorchidis, cum Dodonaeus dicat duos testiculos non tres vifos. Hist. praeterea ait: Orchis myodes prima Gem-

H. L. ad 4

ma viderur referre Orchidam Serapiam feminam Dodon. in hist. stirp. (Gall.) Conferenti non videtur nobis respondere.

Tab. not. Tabern. icon. & Hist. Testiculus muscarius 1. Stendelwurzg. Icon est eadem cum Lobelia: verum nescimus cur Compilerator hunc testiculum & ceteros separet capite proprio.

C. Bauh. Phyt. Orchis 26. muscæ corpus referens.

Circa Montbelgardum abundat florens Maio.

ORCHIS MYODES FLORE
grandiufculo.



Lobel. Obs. & Ic. Plant. p. 182. Teut. 129. Orchis Myodes altera C. Gemmæ folio lauiore & flore grandiufculo. An Lob. & Pena Aduers. vulpinus testiculus foliis Plantagineis, venosis, reflexis, &c.

Hist. Lugd. Orchis Myodes altera Gemmæ.

Tabern. Hist. & Icon. Testiculus muscarius quartus Stendelwurzg.

C. Bauh. Phyt. Orchis 28. muscæ referens maiora.

ORCHIS MYODES LVTEA.



Quadruplicem vulpinum testiculum meminetur Lobel. & Pena floribus quæsitum: Papilionis nempe, Fuci, Muscæ, postremi è colore qui luteus totus & ceteris rarior multò nec descriptus. Erueunt hunc Norbona ætuosis & aridis sterilibus, decliuis inter Cistum marem & Ilicem Cociferam, atque in herbis Gramuntia silua vi-

De obijano de cinis.

Lobel. in Obs. habet iconem multis annis antè à Dodonzo de flor. exhibitam pro Orchide Sera-

piade tertio, ea omiffa est à Lobelio inter icones Plantini: nescimus igitur an Lobelius benè posuerit Dodonæi iconem pro sua Orchide lutea: Dodonæus non tribuit suæ Orchidi florem luteum: An conuenire possit ea quam hic posuimus dubitamus, nos eam cum cæteris iam sculptis emimus. Apud Plan. Ic. p. 181. alia icon est non parum diuersa à Dodonæi & nostra cum hac inscriptione: Vulpinus testiculus siue Orchis Myodes lutea Narbonensis congener cum minimo Testiculo Vulpino, floribus muscæ colore & effigie præ se ferentibus, Teut. 218. In hoc titulo nos non intelligimus quid luteum dicat, & muscæ colore præ se ferre, muscæ enim vulgares non sunt luteæ.

Observauit Dalechampius apud Hist. Lugd. in editis montibus Orchidis genus humile, rarum, flore luteo, tribus aut quatuor foliis constans, cætera vulgò cognitæ simile, propè oppidum Monspelio vicinum Veganium nominatum, id genus nascitur.

Tabern. Hist. & Icon. Testiculus muscarius 3. luteus, Geel Stendelwurzg. Tabern. imitatus est Lob. assumpsit figuram Dodonæi, an bene iudicent alii.

C. Bauh. Phyt. Orchis 2. muscæ referens Lutea Lob. icon. p. 181. Vulpinus Testiculus Myodes luteus Norbon.

ORCHIS PARVA AVTVM-
nalis lutea.



D Vobis datur tri-bus foliis Plantaginis quin-queneruæ similibus, venosis, glabris, imò caulem complexis, donata est: ipse vero caulis iuncus, pedalis, interdum dimidio minor thyrsum gerit longum stufculorum pusillo-rum, ex herbido colore in luteum vergentium, sicuti moschi ferè odore fragrantium, è caule

appresso veluti calyce prominentium: bulbis caulino adhæret vnicus exiguus, à quo fibræ propagantur quibus vnicus aut alter bulbis pendulus adhærescit. Hoc Orchidis genus attulit nobis, non recordamur vnde, Gener Cherlerus: Talem Orchidem attulit nobis Guillelmus Vaisant Chirurgus ex Mesche in montibus Burgundia, franchises montagnæ dictis, vbi Burgundicè *passemes* vocant: Icon nostra quam iam sculptam emimus non malè exprimeret videtur: nos exillimus hanc depictam apud Lobelium Obs. & Icon. Pl. p. 187. Teut. 222.

An Clus. Paan. Orchis pusilla, pallida, odorata: & Hist. post. Orchis septima.

Tabern. Ic. & H. Triorchis lutea 1. & 2. Geel Ragwurz 1. & 2. An Gesner. Hort. Testiculi siue Orchidis species minor bulbo singulari, de qua prius aiebat, Satyrii species an Orchidis herba, quæ reperitur bulbo singulari semper similis alioqui cæteris, sed minor, foliis binis, considerandum: Monorchin dixeris. C. Bauh. Phyt. Orchis 38. odorata, radice vnica, rotunda, Pisi magnitudine, Testiculi species minor bulbo singulari Gesn. Orchis pusilla pallida odorata Clus. Orchis 41. Triorchis lutea foliis oblongis & glabris: Triorchis lutea C. Gemmæ Lob. pag. 94. Obf. & Icon. pag. 137. vbi bina iungatur figura at secunda intelligenda. Orchis 42. Triorchis altera lutea. Orchis minor Leodientis Lob. Obf. p. 90. & Ic. p. 137. C. Bauhinam tres statuere plantas constat, vnâ ex Clusio, duas ex Lobelio, perpendendam quot sint. *Suspiciamus* apud Lobelium duas icones vnus plantæ nec scimus an Clusii Orchis pallida diuersa sit, quamuis vniuersum tantum bulbi meminere, vti etiam in icone nostra vnicus bulbus appictus.

ORCHIS SIVE TRIORCHIS LVTEA
tertia oblongioribus radicibus.



L Obel. Obf. pag. 93. Triorchis lutea tertia C. Gemmæ a oblongioribus radicibus oliuariibus bulbis, Plant. icon. p. 136. Triorchis lutea tertia Geelragwurz 3. C. Bauh. Phyt. Orchis 43. siue Triorchis lutea radice oblonga fibrosa.

ORCHIS FRISIA HIRSVTA.



L Obel. Obf. & Ic. Plant. pag. 136. & Hist. Lugd. Orchis Frisia littoralis Gemmæ. Tabern. Ic. & Hist. Testiculus luteus, Orchis lutea, Geel Frabenfraut / quam Lobelius describit in suis Obf. & nominat Orchidem Frisiam littoralem, duo habet folia, bifolio similia, paulo minora quam Plantago angustifolia, aspera & hirsuta

cactu:caulis palmum altus: Flosculi multi ex luteo virides, vt in Hyacintho maiore: radices duæ paræ rotundæ. Icon est Lobeliana. C. B. Phyt. Orchis 40. lutea, hirsuto folio. Frisia littoralis Lobelio, vbi duas iungit, ac prima figura huic conuenit.

Orchis siue Triorchis lutea altera nonnihil hirsuta.

Triorchis lutea altera C. Gemmæ Lobel. Obf. & Hist. Lugd. folio est rotundior & latiore quam superioris, virentiore trifolia, & nonnihil hirsuta: videtur eadem aut congener cum Orchide Frisia Orientali: quæ gemina inferiora folia bifolia, Plantaginis latifoliae angustiora edidit, & in dodrantali cauliculo herbaceo siue luteo virentes flosculos in hortu D. Brancioniis.

ORCHIS SPIRALIS ALBA ODORATA.

D Vplici radice nititur bulbosâ, oblongâ, villosâ, ima versus acuminatâ, aliquot fibris donatâ. E cuius summo folia, vaginato pediculo vnicali surgunt viridia, pingua, femunciam lata, vniciam aut amplius longa, dorso crasso a uersa parte, quæ ex atro virentes venulæ ab imo ad summum conspiciuntur. Intra hæc colliculus quoque erigitur dodrantalis aut pedalis, teres, foliis acuminatis ceu vaginis vestitus, iisdem tamen vix ac ne vix quidem prominentibus. Flosculorum odoratorum thyrus, albidorum, clauiculatimque hærentium ita nutat, vt spirarum instar summa versus circumagatur. Hi interna parte ex luteo virent, ad latus verò duo foliola candida veluti alæ hærent: Vtriculi succedunt vt in reliquis ferè Orchidibus, parui puluerulento seminis referti. Thyrsus florum amaricat & iucundi odoris est.

Descriptio

An Trago Satyrium 7. minimum das Heinsse



Saturion / quod ait prouenire locis humidis Septembri. Reperiuntur, inquit ille, bina Satyrii genera admodum exigua, quorû flosculi auctulus volantes imitatur, coloris ex viridi lutei. Caules horû haud temerè digiti longitudinem excedunt. Nascentur partim in aprili

cis montibus Junio mense, partim verò Autumno appetente in vliginosis campis & pratibus. Tragus habet iconem respondentem nostræ Orchidis picatæ albæ, in sua descriptione intelligit fortè etiam leucam, quamvis non distinguat aut particulatim describat.

Brunf. Tom. 1. Satyrium odoriferum.

Cordus hist. Testiculus candidus odoratus minor. Et supra figuram, Testiculus pumilio Tragi.

Testiculus odoratus Dodon. Gall. vocatur, *Conill. & odoriferant*: Belg. *wolriechende Stanzdel cruyt* & *Hein Stanzdel cruyt*. Est hic Dodon. hist. fl. & in fol. Testiculus quintus odoratus siue pumilio nuncupatus, omnium foliis minimus.

Lobel. & Pena Adu. Testiculus odoratus, minimus omnium flosculis, odore Liliæ conuallii. Obs. Testiculus odor. Orchis spiralis C. Gemmæ. Icon. Pl. pag. 136. Teut. 221. Et Obs. Tetrorchis alba spiralis vel autumnalis C. Gemmæ. Testiculi odorati varietas: non aliud à superiore, sed ut plurimum oliuaribus oblongis bulbis donatur. Icon. Plant. pag. 136. Teut. 226.

Orchidem flore albo, odorato vel Spiralem C. Gemmæ ad Camer. hort. misit ex Silecia D. Fridericus Sebizius.

H. L. Testiculus odoratus Dodonzi. Tetrorchis, vel Triorchis alba Gemmæ.

Tabern. Icon. & Hist. Testiculus minor, odoratus, *Hein wolriechend* & *fnabenkraut*, cui folia inter Orchides omnium minima Plantagini non nihil similia: sed valde angusta & parua, colore viridi, caulis tenuis: flores multi parui, albi bene olentes: floret Augusto & Autumno. Et Triorchis odorata, *Groß wolriechend* & *fnabenkraut*. Non erat separanda capite hæc Orchis à precedente.

C. Bauh. Phyt. Orchis 44. Triorchis alba odorata oblonga radice Lob. Orchis 45. Orchis alba odorata minor. Satyrium odoriferum Brunfels. Satyrium exiguum & 7. Trago. Testiculus odoratus spiralis minor Lob.

Editis incultis & aridis locis plurimum reperitur: Augusto aut Septembri flores promit, Dodon. Sabulosis arenibus atque squallidis locis Notbonæ maritimis & Angliæ mediterraneis nascitur, Lob.

Autumno ante Vergiliarum occasum in arenosis, siccis & accliuibus pratibus interdum etiam humidis floret. Montbelgardi nobis occurrit Augusto & Septembri non longè ab horto ferarum, Vnde in horto Ill. E. C. transfuli. D. Turnerus Medicus Anglicus dedit nobis collectam Heidelbergæ. Circa Basileam ad Byrsch castrum haud ita infrequens.

Radix Orchidis potissimum odorati cocta in vino & paucò melle sanat vlcera putrida oris, inquit Dodonæus, qui cur huius facultatis non meminertit in postrema historia nescimus.

ORCHIS RADICE REPENTE.

Descriptio Pluchram Orchis speciem radice repente misit insignis Medicus D. Doldius, quem sic describit Camer. hort. Orchis minor *flosculis* albis, *foliis* crassis nigris, *radice* repente geniculata, & ubi folia emergunt, apparent pusilla rudimenta tanquam naturæ testiculos effingere conâctis. Nascitur spontè in opacis siluis, in ramens arborum, quæ longa vetustate emarcuerunt.



ORCHIS LILIFOLIVS MINOR Sabuletorum Zelandiæ & Batauiæ.



bulosos aggeres Hardemo proximos, in silua Terrea vulgo *Wdenbosch*. Idem sanè eor (inquit Lobel. Adu. par. 2. cum nostro nouo Satyrio Zelandico infra scripto, in herbatione olim reperito, cl. p. l. ætate 1603. iuxta aggeres fabulosos Walachriæ inter Pyrolam nascente, quod omnes quadam foliorum similitudine ducti, nec non flosculorum herbaceorum (nilabat memoria) & longiusculi seminis fuliginosi inuolucris, Orchidis Littoralis Frisiz, Orchin sabuletorum maritimorum diximus. Radix illi geminata, quandoque terna, sed rarò, altera alteri innata, foliaceis albis inuolucris tecta, intus viridis, gustu suauis. Infima fibrillis impacta sabuletis, arida, inutilis & flaccida. *Cauliculi* binum, tertium vnciarum: *folia* bina Liliacea duas vncias longa. E regione pagi *Ost-Capel*, id est, facelli Orientalis, à me vltimum collecta. In Batauis est Chama-Orchidis nouum genus aggerum Zelandiæ.

Figura non respondet descriptioni, potissimum quoad radices, quæ nihil simile habeat cum

Ad horros trā-
stus durat,
sed colore
acquirat magis
pallidum, nec
tam crassa ma-
nent folia.
Camer. hort.
& Icon. p. 35.
Orchis minor
radice repente.
C. B. Phyt.
Orchis 46. ra-
dice repente
Camer.

Ortu &
facie, cō-
pacti liq. qua-
marum serie
similium E-
riophoro Bul-
bo, fibrillis,
impactus fo-
lo; eminenti-
bus *bul-
bis* subtri-
ribus. Caulicu-
lus palmaris,
fibrillis, non
annotati fuerit
à Guillelmo N.
mercatore Ba-
tauo, qui hæc
descriptione
dedit Teuto-
nicè, & proue-
nire ait iuxta
maritimos fa-

Bul-
oph-
is.

Saty-
nona
land.

cum Orchidibus, in quibus fibræ tenues ex bulbis prodire non solent, sed supra & iuxta bulbos.

Orchis amplissima foliis binis splendidibus.

Orchis prima amplissimis foliis, quæ a nemine (vt suspicatur Clusi.) obseruata, bina habet folia, Ellebori albi foliis amplitudine non cedentia, aliquot venis à pediculo ad extremum vsque folium productis insignita, supernè virentia, infernè dilucentia, prorsus tamen splendens: caulem cubitalem, paucis foliolis sine inuolucris præditum, pentagonum: flores in summo spicatum coherentes, cuius autem coloris, cuiusve formæ ignorat, cum antequam aperirentur, plantam duntaxat obseruauerit: radices binas, crassas & parui Napi modo oblongas, supra quas infimo cauli inhaerent aliquot fibræ satis crassæ.

Solum inspecta est hæc Orchis Maio mense anni 1579, in decliuitate montis. in quo extracta est arx Ill. V. Balthazaris de Barthyan p. m. Greben nuncupata, inter Draum & Saum amnes, binis vltra Waraldinum miliaribus.

C. Bauhin. Phyt. Orchis bifolia latissima.

ORCHIS ALBA CALCARI LONGO.



Hermaphroditici Orchidæ hanc haud temerè dicas, vt quæ Cynosorchis & Serapiades dictas, quod quidem ad radicem formam accinet, medium quiddam obtineat. Radix enim duplici constat bulbo sublongo, pyriformi, productiore demissa fibra, quæ in capite alias plures a-

quæ crassas quaquauerfum exerit. A qua in imo statim folia insignia prodeunt duo vel tria, lata, plantaginea, minus tamen neruis insignita superna parte, læuia, saturè virentia. Reliqua verò octuplo vel decuplo minoras, angustioraque caulem nullo ordine decorant pedalem aut sesquipedalem, angulosum, striatum: Cuius summa flores spicatum occupant odoratissimi, albi, Papilionem expansis alis amulantes, quorum foliorum supremum leuiter erectum obtuso mucrone sub se bina in summo, inclinatione quadam coeuentia, herbaceo colore prædita comprehendit: lateralia duo alarum instar expanduntur: propendit autem longum folium, minus reliquis, album, & ferè herbidum, linguæ caninæ exertæ instar, quod, vt in priore similitudine maneamus, papilionis corpus referre dixeris: auctera floris parte prominet calcar longissimum, prope floris basin album, cætera viride: vniciuique autem pediculo inter herbidoque appositum est folium acuminatum: sapor foliorum amarus: Tom. II.

Radicem aqueus inspidus.

De hac Dodon. Hist. fl. & in fol. Testiculus siue Orchis Serapias, folia profert duo aut tria, læuia, latiuscula, at Lili foliis multò minoras: caulem dodrantalem aut altiore: flores in coararos, candidos papilionibus expansis alis quodammodo similes: &c. Eius icon est bifolia, Dod. incoen. foliis. olim in hist. Gall. lib. 2. cap. 46. ex Fuchsis erat trifolia, ac ei dicebatur Testiculus Vulpis: Gall. Couillon de venard Germ. groß Stendelkraut. Belg. Greet Stendelcruyt.

Σατύριον τριφύλλον Græcis, Satyrium trifolium Latinis, Officinis nostris (inquit Fuchsi.) incongnitum aut inusitatum: vulgò Testiculus Vulpis aut sacerdotis. Germ. Stendelwurz: Gall. Satyrium à trois feuilles, nominatur. Satyrio autem nomen fecerunt Satyri, qui primi lyuæstres dii colludentes nymphis per syluas & antra ad firmiorem Venerem herbam hanc inuenierunt. Trifolium verò, quoniam tria fert folia ad terrâ versâ. Folia tria fert Rumici aut Lilio similia, minora tamen & rubentia. Caulem nudum, longum, cubitalem. Florem Lilio similem, album. Radicem bulbo similem, mali modo extuberantem, foris rutam, intus omni modo albam, gustu dulcè, & origratam. Quod verò hic dicimus Lilio similem: non sic intelligendum venit quasi quantitati & tota figura Lilio similis flos sit, quando euidentissimum sit Liliū quantitate sua Satyrii florem multis modis superare. Denique nec figura etiam per omnia respondet: quare hæc similitudo ad colorem & floris essentiam vt ferè potius debet, quæ planè eadem est cum Lili colore & essentia, id quod conferenti hos duos flores manifestum fiet. Icon. pag. 408. Satyrium trifolium meiß Stendelwurz. Fuchsius non describit plantam cuius iconem exhibet, sed detorqueudo accommodare conatur descriptionem Dioscor. suæ iconi, quam hic ponimus trifoliam, vt, eam sculptam eminus, quod ei non commune.

Matthioli in Dioscor. cum magnis Icon. Lat. l. 3. cap. 126. picturam solam habet. e descriptione sub Testiculi specie tertia. In Ital. cap. 157. Ejus appingit tantum duo folia: sub eo tamen titulo in eadem tabella icones duarum plantarum.

Dicitur Lobel. Obs. Testiculus Vulpinus primus Angli hæres Bellosee. Hist. satyri. n. Icon. Plantar. pag. 178. Testiculus vulpinus primus cuius flores culices expriment. Lobelius in sua iconè duo tantum habet folia: is præterea aliam habet iconem partium differentem nomine Orchis Hermaphroditica de qua mox conuiderandum in quibus differat.

Hist. Lugd. Testiculi tertii species Matthioli in ea tabella ex Matthiolo duæ icones diuersarum plantarum, præterea Hist. Lugd. ponit eiuſdem plantæ iconem alteram sub hoc titulo: Orchis Serapias primus Dodona i: ponit & tertiam trifoliam, cum hac inscriptione: Testiculus vulpis Dodona i, tres igitur icones vnus plantæ sub diuersis ponit titulis.

An Thal. Hæc Orchis bifolia, flore purpureo & candido etiam in montibus passim ac pratis. Triplici autem differtate reperitur. Altera latifolia est, foliis orbicularibus ferè, vniciarum sex longitudine, quatuor latitudine: tertia breuiora omnia continet.

Camer. horti. Orchis bifolius, qui non nunquam trifolius nascitur, vnde Fuchsi. Dioscoridis Satyrium esse placuit.

Tabern. Icon. pag. 667. & Hist. lib. 2. pag. 324. Testiculus Vulpinus latifolius, Fuchs. h. b. l. c. n. f. l. c.

genblumen / Item Icon. p. 574. Hist. 355. Satyrium trifolium, Beckegeyl.

Tabern. in iconibus & hist. sui immemor quatuor diuersas tradit huius icones: ac Commentum videtur quod Ic. pag. 671. & hist. 355. habetur sub hoc titulo, Satyrium Triphyllū Sten-delyuere.

C. Bauh. Phyt. Orchis Serapias 19. bifolia minor flore Papilionem referens. Satyrium trifolium Fuchsi. Testiculus vulpinus prius Lob. variat, communiter quidem est candido: reperitur & purpureo. Huius binæ icones apud Tab. nomine Testiculi Vulpini latifolii & Triorchis maioris. Nos in hoc genere purpureo flore non obseruauimus, nescimus etiam cur C. Bauhinus Orchidem 19. iam dictam à 21. separarit, de ea scribit: Orchis trifolia maior. Satyrium trifolium Fuchsi: Huius duæ icones apud Tabern. Satyrii Triphylli nomine & sub Triorchi trifolia: inter hanc & Orchidem bifoliam minorē, parua nisi ratione numeri foliorum differentia.

C. B. mt.

Locus & Tempus.

Non longè Montbelgardo eundo Hericuriam. Obseruauimus præterea variis in locis, nominatim in valle montium aridorum dicta Griesbach, ubi florebat & Iunio odoratissima.

ORCHIS HERMAPHRODITICA bifolia.



Orchis Hermaphrodita secunda C. Gemmæ, Lobel. Obs. siue Orchis Psychodes (id est flore Papilionis) diphylla: oblongis crutibus, solo gaudet palustri: flos erumpit mense Iulio, omnino candidus, tenet, qualis Oreadam. Icon. Pl. p. 178. Sphecodes: fortè legendum Psychodes Teut. 216. Quantum & in quibus hæc differat à præcedente perquirendum.

Hist. Lugd. Orchis Hermaphroditica Gemmæ, siue Orchis Psychoides diphylla.

Tab. nat.

Tabern. icon. & Hist. Testiculus vulpinus 4. hermaphroditicus, siue hœdlin. Non placeat Compil. non subiungere hunc Testiculum Testiculo Vulpino latifolio suo. C. B. Phyt. Orchis 20. bifolia minor altera, vel Hermaphroditica.

ORCHIDIS GENVS QVIBVS DAM

Satyrium castatum. Item aliud genus cum quatuor radicibus.

Lob. Obs. p. 97. Satyrium castratum vel Eunuchum ex genere Cynosorchidis C. Gemmæ. Ic. Pl. p. 192. Teut. 225.

Hist. Lugd. Satyrium castratum Gemmæ. Tab. Ic. & Hist. Testiculus sextus, Castratus. C. Bauh. Phyt. Satyrium 15. cuius radix in dua



ORCHIDES, CVLICES MINORES triphylla.



Icon. Plantini p. 178. posita Ic6 cum hac inscriptione, Culices triphylla Teut. 217. Casp. Bauh. Phyt. Orchis 22. trifolia minor, Culices minores triphylla Lobel. Icon. 179. Vide descriptionem in hist. Belgica Lobelii.

ORCHIS BATRACHITES.



Lobel. Obs. Orchis Batrachites vel Batrachoides C. Gemmæ. Lobel. Obs. Belg. vers. fens. 1. Ranula à floribus figurata: Ex eorum genere quæ sexus ambigui sunt, ut & Hermaphroditicū Testiculum nō malè appelles. Sunt enim media inter Serapiades & Cynosorchides, maximè quoad formā radicū. Hist.

Hist. Lugd. Orchis barrachoides Gemma.
Tab. Ic. & Hist. Orchis barrachoides frefch
Blumlicht Geylhurz.
Caſp. Bauhin. Orchis 37. ſive Hermaphrodita.

Buzeiden ſive Buzydum Arabum.

Ait Auic. Buzeidem eſſe medicinam ligneam ſnam, in qua ſit virtus ſimilis virtuti Been. Et Serapio, Buzeiden, inquit, eſt ſpecies Satyriosis. Salomon Ebēhaſam.] Buzeiden ſunt radices duræ, albæ, ſimiles behen albo, conſert podagra, & doloribus iuncturarum. Et eſt medicina India; quā nos parum vitimur. Quidam verò detulere eam ad nos, & vidimus eam ſæpe. Aben Meſuai] Melius quod eſt ex buzeiden, eſt album, habens lignum groſſum, & multas rugas. Illud verò quod eſt ſubtilis ligni, habens ſuperficiem lenem, paræ albedinis, eſt non bonum, nullius inuamenti. Habix dixit ſicut iſte. Et dixit cum hoc, quod iuuamentum eius eſt ſicut iuuamentum hermodactylorum, ad remouendos dolores iuncturarum, & ad conferendum podagra. Meſarugia.] Buzeiden eſt calidum, auget in ſpermate. Et de proprietate eius eſt, quod laxat aquam citrinam. Sed illud eſt malum teſticulis. Et rectificatio eius eſt cum Sinapi, & melius ex eo eſt nouum. Et doſis eius, pondus eſt drachmarum duarum.

Digitri Citrini Arabum.

Aſahaſafra ſive Digitri Citrini ſunt, autore Auic. figuræ volæ manus colore mixto ex citrinitate & albedine duri & nonnihil dulces, quidam ſunt citrini & puluerulenti abſque albedine. Digitri trocei, vt exemplaria habent, ſunt gummi ſeu vena tinctorum: Rhafis.

PAMATA SATYRIA IN GENERE.

CAP. XXVI.

Sarabem Canisid: Græcis, Satyrium regium Latinis. Orch. Palma Chriſti. Arab. Buzeiden: Auic. Digitri Citrini. Germ. Creuzblumen. Gall. Satyrium royal. Palmam Chriſti propter ſimilitudinem quam eius radix cum humana habet manu dixerunt. Verum Satyrium, inquit Matthiolus, hæctenus in Italia videre non licuit. Palma Chriſti radices, Auicenna Digites Citrinos nunciat, etſi eas Digites citrinos eſſe perperam, nullaque, quod libro ſuo legerim, ratione ducti, negent Monachi illi.

Fuchſius Palmam Chriſti non rectè inter Satyrii genera depinxit, ſiquidem ea potius meo iudicio inter Canis teſticulos erat repreſentanda.

Palmis duabus Chriſtiadibus & Serapiadis (aiunt Lobel. & Pena Adu.) accenſer Triorchim Serapiada Aegineta (addere enim tertiam quandam videtur) terno donatarum didymo, quam aliam Palmam Chriſti opinabamur: tum quia ſucculenta minus, ſicciorque eſt, & vehementer deterget, interò forſitque vlceribus admota: tum etiam quòd Melancholicis, Quaternariis, Epilepticis, neruorum offaren, & pruitioſa ſaburra oppreſſis miram præter open, fluxum dyſentericū ſuſtat, quot qualeſque facultates Palmæ Chriſti Recentiores vendicant, [ne cuiquam imponat

Palmæ Chriſti vehementer purgantis homonymia,] dignandas ſanè Aegyptis Venerandæ Serapiadis dex Auguſto cognominæ: alioquin nihil attinuit à cæteris ſecreuiſſe, & Serapiadas nuncupaſſe. Rationibus hiſce faucebat ex lectione coniectura, nam vbi πολυκλονος multi vſus, legendum πολυκλονος multitudine radicem: & fortè vtrumque, multitudine multique vſus radicem inuebat, & mox inferius vbi Dioſcor. ἰσα θυμω ὀρχιδίς ὁμοίη, id eſt, Radix ſubeſt teſticulis ſimilis, aut puſillis teſticulis, legebam multiſida leniore inetatheū multò, quàm in ſuperiore capite, vbi pro Olea ſuffecerunt merito quidam Squillā teneram Pancratium. Verùm tamen ſi cui hæc minùs allubefcant Serapiades, exploret ſuperiorum Orchium facultates, quæ multò tamen vgnauiores & mucore elumbes magis videtur, aut alias aptiores adducat, & libenter vltro-indictas iſtas Palmatas Antiquis proſitebimur. Herbidos pratenseſque colles frigidiores amant tum minor tum maior, legimus etiam in Alpibus Rauiſburgi & Nozorei Germania. Maio flore & foliis exit: maior foliis ſimilibus, ſed latioribus Porri, mucronatis, ad terram reflexis, craſſis, interdum maculatis fulcis, & nigricantibus notulis: flores purpuraſcentis Cynoforchis adeò ſimiles ſunt, vt niſi propius ſpectes eaſdem putes. Radici item geminus eſt bulbos, altero eum modo, altero prægnante & ſucculento. vtroque tamè oblongiore, nonnihil compreſſo, & ina ſui parte in fibras inæquales ternas aut quaternas veluti digitatas abeunte. Hunc marem appellant. Fumina verò floribus candidis, vel e purpura rubicibus, dilateæ caruleis, cucularis, crebriores maculas purpureas & rictum oſtentantes habentibus: foliis minoribus, & inſperſis punctulis: radice conſimili. Sunt vt hiſt. Lugd. norat, qui vocant Palmam Chriſti Buzeiden, ſive Buzydum Arabum. Satyrii autem huiusce radices nihil minùs quàm ligneæ ſunt, nec ex India petuntur, vt voluerunt Auicenna & Serapio. Matthiolus Satyrium Baſilicum ſive Palmam Chriſti Auicennæ Digites Citrinos eſſe vult: At Satyriosis Baſilici radices duræ non ſunt neque troceæ, neque ad tingendam viles. Quare id à Digites citriniſ Aue. & Rhafis perſpicue diſſerre videtur.

Thalius harycn. pag. 12. Satyrium recentiorū Græcorum iuxta Doſonarium mas, alia Palmam Chriſti: Serapias mas Angliſ, Orchis autem ſemina Tragi. Atqui Satyrii huius maris cuius videlicet folia maculis deſtituuntur, diuerſe aliquid differentiæ in harycnyia occurrunt, quæ ſub duobus præcipuè generibus comprehendì poterunt, quorum alterum ſit latifolium, alterum anguſtifoſium: quorum etiam vltiorem tradit diſtributionem.

Orchis Serapias Lobelii Camerario hortii, ſeu Satyrium baſilicum aliorum, flore candido, dilatè rubefcente & rubello. Ex his tertium folia interdum maculis cruentis aſperſa gerit, interdum (An Plautini icon. pag. 188. Palma Chriſti mas) ſine maculis. Priora verò duo maculis in horto meo nunquam carent, neſcio an alibi etiam.

Satyrium Baſilicum mas & ſemina amarum eſt, referente Fuchſio, magis tamen amarū quòd maculoſis conſtat foliis. Ideoque non perperam cenſent Auicenna & alii quidam ex recentioribus medicis, qui calidum eſſe & ſiccum in ſecundo ordine tradunt. Vſus eius ad erogandam cutem, ad neruorum dolores, & contra noxia medicamenta. Ferrur & amulecum eſſe radix guſtata. Semen ex vino ſumprum nouem diebus, co-

Serapiades.
Orchidis.
facultates.]

Palma mas.

Palma feminina.

Non ſunt Buzeidum.

initiales sanat. In eundem effectum vinum diluatur herbe decocto. Scobs radices propinatur in vino ad arcendam quartanam, quam & vomitione curat paulo ante accessionem pota. Plura in praesentia rescire de huius facultatibus non licuit. Satyrii Basilici radices, Orcheos radices sapore & gustu referunt, quare & facultatibus similes existimantur. Niculus Florentinus capite de quartanae curatione vim habere ait & per superiorem & per inferiorem ventrem purgandi, & aduersus quartanas febres inueteratas, post purgationes radices partem pollicis longitudine tulam cum vino ante accessionem vtiliter exhiberi, hocque remedio tertio sumpto biliorum quendam post 44. aut 45. accessiones, a febre quartana fuisse liberatum.

PALMATA NON MACVLATA.

Pedalem hanc caulem erigit, in quo folia oblonga sesquiunciam lata, laeua, nullis admodum obscuris fugientibusque notis maculosa; flores spicati, purpuralcentes, alas pandunt utrunque purpurantes, interiectum autem folium galea æmulum non item: labellum dilute purpurascens, guttatum, tripartitum demittunt: calcar paulo ultra medium pediculi longitudinem protenditur: vnus vero cuiusque floris pediculo intorto adpositum est folium mucronatum, semunciale & sesquiunciale, nonnihil rubescens. Radix subest gemino digitato bulbo constans cum fetua dulcedine aliquantulum amaricans.



Icon nostra ex emptitiis non in omnibus placet: eam autem Fuchsius posuit pro Satyrio Basilico femina, & Digito Citrino Auicennae: eius descriptionem recitamus sub Palmata angustifolia purpurea. In Iconibus Fuchsi p. 410. figurae titulus est, Satyrium basilicum mas alterum Creuzmenile dea ander.

Considerandum an Tragus huius iconem habeat, hoc titulo, Orchis femina altera, Creuzblum / wablen / de qua scribit, Satyrii alterum genus, radix que formam representat binarum manuum inuerso ordine inuicem superpositarum, quarum recentior natum cum flore augmentum capit, altera marcescente. Nascitur hoc genus Orchis in quibusdam pratis & nonnullis gramineis montibus. Radices tam huius quam superiorum Testiculorum ferè dulces gustatae.

An Matth. in Diosc. Palma Christi, cuius radices Digito citrino appellat Auicenna, genus maius, quod Anania Vallis montibus inuenitur, & folia ferè lili habet laeua, patula, maculis quibusdam nigris resperfa: caulem rotundum, laeum: florem spicatum, varium, in purpura

Dodon. in
Mansib. des-
centia.

hendlenowur; Mannlein / Creuzblum.
C. Bauh. Phyt. Satyriion 4. basilicum pratense
latifolium: Satyriion femina Brunf. Palma

PLANT ARVM.

Christi mas laeufolito Lobel.

Obseruauit Genere foliis non maculatis. Flo- Locus
ret mense Maio in pratis circa Arce fluium. tempus,

PALMATA SPECIOSIORE THYRSO,
folio maculato.

Caulem pedem al-
tium & sesqui-
cubitalem ali-
quando erigit
subpurpureu,
in cuius fasti-
gio spicatum
dispositi flo-
res rubentes,
vel dilute pur-
purei, calcari
trientem pol-
licis circiter
longo, cristis
duab' erectis:
galea è duobus
foliis cui ter-
tium appres-
sum incumbit
composita; la-
bello in tres

lacinas diuiso, saturata purpura guttato, pediculo purpurascens, cui se nper appositum acuminatum folium è viridi nigroque purpureum: huius flores obseruantur & intentius purpurei & penitus quoque albi, folia plura qualia Orchidium vulgatissimarum, & à radice orta caulem ambientia, & è caule ipso nata, inferna, sublonga, satis lata, superna angustiora, alterno situ posita, crebris maculis nigris notata; radix ex gemino bulbo composita, quorum alter maior, effectus alter albus, vegetior, in quatuor aut quinque digitos abit, ad quorum coniunctionem propagantur fibræ. Sapor radices aqueus, viscidus, non sine leui amaritudine, folia multò amariora. Huius è foliis non maculosis petita varietas, nullo alio discrimine, conspicuo, de qua antè: Altera quoque varietas ex bulbo maiore tridactylo.

Icon nostra ex emptitiis non in omnibus placet: eam autem Fuchsius posuit pro Satyrio Basilico femina, & Digito Citrino Auicennae: eius descriptionem recitamus sub Palmata angustifolia purpurea. In Iconibus Fuchsi p. 410. figurae titulus est, Satyrium basilicum mas alterum Creuzmenile dea ander.

Considerandum an Tragus huius iconem habeat, hoc titulo, Orchis femina altera, Creuzblum / wablen / de qua scribit, Satyrii alterum genus, radix que formam representat binarum manuum inuerso ordine inuicem superpositarum, quarum recentior natum cum flore augmentum capit, altera marcescente. Nascitur hoc genus Orchis in quibusdam pratis & nonnullis gramineis montibus. Radices tam huius quam superiorum Testiculorum ferè dulces gustatae.

An Matth. in Diosc. Palma Christi, cuius radices Digito citrino appellat Auicenna, genus maius, quod Anania Vallis montibus inuenitur, & folia ferè lili habet laeua, patula, maculis quibusdam nigris resperfa: caulem rotundum, laeum: florem spicatum, varium, in purpura

albicanem, odore non ingrato : radices duas, quæ sanè testiculos referrent, nisi ramis quibusdã, quasi digitis, humanam manum exprimere viderentur. Icon à Matthiolo proposita non responderet eius descriptioni, potius videtur Icon nostræ Palmatæ cum longis calcaribus rubellis.

Dodon. de fl. Satyrium alterum maius : quod fœminam vocant, Satyrium alterum Basilicum dicitur.

Lobel. Obs. (& ex eo Hist. Lugd.) Serapias fœmina pratensis, foliis notulis inspersis, siue Palma Christi : Ad. pag. 63. Satyrium Basilicum alterum Dodon. Icon. Pl. pag. 188. Palma Christi Serapias fœmina pratensis, Teut. 223.

Tabern. Ic. & Hist. Palma Christi maculata. C. Bauh. Phyt. Satyrium 5. Basilicum pratense maculosum.

Thal. Harc. Satyrium fœmina, foliis maculatis palliis.

Palliis secus vias & in dumetis obseruatur : Cuiusmodi in locis utcumque obuiam per comitatum Montbelgardensem obseruauimus Maio & Iunio florentem. Eadem obseruata nobis in valle Griesbachiana ad thetinas acidas. B. silæ quoque dulcis in locis occurrit. In hortu Montbelgardensem translata maximo & latissimo florum Thyrso prodit, qui & palmam altitudine superaret. Cùm essemus Genevæ obseruauimus Florentem mensè Maio.

PALMATA MACVLATA.



NON in eam altitudinem excreuit in quâ precedens, r. adibus tamen tetradactylis conuenit, nec non foliis, nisi quoddã eidentis maculosa sint. flores verò purpureo colore præditi, saturisque punctis notati, cristas duas erigunt, alarum expertes : vnicuique autem flori appositum folium acuminatum saturatè purpureum.

Plant. Icon. p.

188. Palma Christi Serapias fœmina pratensis Lob. 95. Teut. 223.

Dod. de fl. Satyrium Basilicum alterum.

PALMATA ALBA.

PALMATÆ maculatæ flore albo antè meminimus quæ à præcedenti fortè solo colore differt. Icon quam his ponimus, ex est iis quas emimus iam sculptas, quæ accedere videtur lobeliana albæ, qui eam separat à præcedenti : de ea legitur Lob. Obs. & Icon. p. 69. Serapias candido flore montana maculatis foliis. Cynoforchis montana, folio maculoso C. Gemmæ, pratensis item eadem niueo flore crebra visitatur, cætera haud ab similia.

Tom. II.



PALMATA SIVE SERAPIAS PALVSTRIS latifolia flore albo subpurpurecente.



C. B. Phyt. Satyriū 2. basilicū maius latifolium.

PALMATA, SIVE ORCHIS PANNONICA floribus exalbidis, & alba Griesbachiana.



Hist. Lugd. Serapias candido flore Lobel. cætera haud ab similia Satyrio Basilico altero Dodonæzi.

Tabern. Icon. & H. Palma Christi maculata montana hendefens wury.

C. B. Phyt. Satyrium 6. basilicum montanum maculosum.

SERAPIAS palustris latifolia; Cynoforchis palustris platyphyllo folio latius, latoque flore albo subpurpurecente C. Gemmæ, Lobelio Obs. Præcior est Violacæ Cynoforchis Ic. Pl. pag. 190. Teut. 224.

Hist. Lugd. Cynoforchis palustris platyphyllos Gemmæ.

Tab. Icon. & Hist. Palma Christi palustris 3. wasser händlens wury.

ILLI primùm Lenalcentia filia tria, aut quatuor habet Orchis 7. Clusii in Pann. octaua in Hist. post. & ue Pannonica; diluorioris & quasi pallentis viriditatis, nullaque macularum aspergine notatis, ingrati saporis : Palmarem caulem amplectuntur aliquot foliola; in cuius summo fastigio flores spicatum digesti

Tet 3

nascuntur, exalbidi & quasi pallentes coloris, nullis punctis distincti, antennis morionum hiantibus cucullis similes, utrinque auriti, & latiusculo pallido labro propendente, posteriore verò parte corniculum habentes, vt *Consolida regalis*, aut *Linaria*, sed latius & obtusum, grauius odorati, florum *Sambuci* odorem referentes: ad horum exortum singula foliola nascuntur pallentia, & floribus colore respondentia: radices geminæ, veluti palmæ, in binos, aut plures digitos distributæ sunt, quarum vetustior fungosa, nigrior, & flaccidior est, altera candida, vegetior ac folida, paucis supra earum exortum nascentibus fibris.

Aliud genus est formâ, magnitudine, cæterisque notis illi par: sola varietas in floribus, qui in hoc purpurei sunt, foliola sub floribus nascentia etiam purpurascunt. Inuenitur utrumque genus non modo in Leytano saltu supra Manderstorf, aliisque Austriae inferioris siluis: sed etiam editioribus quibusdam pratis Viennensi saltui proximis. Floret autem Aprili, nonnunquam etiam Maio, pro mitiore videlicet aut rigidiore vernalis æris constitutione.

Locus & tempus.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 13. flore *Consolidæ regalis Sambuci* odore. Collegimus *Palmatam* florentem Maio & Junio, in valle fontium acidorum Griebbachiana ad Herciniam siluam cui radices & folia respondent iconi propositæ ex Clusio: Eadem est cui iam à nobis descripta *Palmata* flore albo circa Montbelgardum obseruata.

Palmata & Serapias Batrachites.

Lobel. Icon. Pl. p. 193. *Setapias Batrachites* vel *Myodes* Teut. 226.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 14. batrachites. Vide Hist. Belg. Lobelii.

PALMATÆ CVIVSDAM ICON.



Non occurrit nunc ad quam speciem *Palmatæ* hæc icon fit referenda, ea est ex iis, quas emimus iam sculptas.

PALMATÆ SERAPIAS PALVSTRIS leptophyllæ, violaceæ, maculata & non maculata.

Cynoforchis palustris altera C. Gemmæ, Lobel. Obs. serius florens, comâ violacæ, foliis interdum læuibus, interdum maculosis. Icon. Pl. p. 190. Teut. 224. Icon Lobelii non demonstrat folia tenuia, vel angusta esse.



Hist. Lugd. Serapias palustris altera leptophylla, Gemmæ. I. c. Serapias palustris 3. Gemmæ. Miror Compilatorem ex duabus iconibus à Lobelio propositis sub vno titulo, duas statuere plantas, vna ex iconibus representat plantam iuuenem, quæ caulem non protulit.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 3. basilicum maius latifolium alterum.

PALMATÆ ANGVSTO FOLIO vilissima palustris.



Cynoforchis palustris læui folio & angusto, seu leptophylla omnium vilissima C. Gemmæ, Lob. Obs. quæ Icon. Pl. 193. T. 226. Figura Lobelii non demonstrat folia angusta.

Hist. Lugd. *Cynoforchis leptophylla* Gemmæ.

Tabern. Icon. & H. Palma Christi palustris 2. wasser henden werg.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 16. palustre folio læui.

PALMATÆ SERAPIAS MONTANA folio læui.



Setapias montana folio læui. *Cynoforchis montana folio læui* C. Gemmæ, Lobel. Obs. & Ic. Pl. p. 191. Teut. 225.

Hist. Lugd. *Setapias montana folio læui* Gemmæ.

Tabern. Icon. & Hist. Serapias montana Berg Knabenfraut.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 11. basilicum montanum bicubitale.

Setapias montana folio læui Lob.

PAL.

PALMATA FLORIBVS IMPENSE RVBRIS.



Lobel. Obs. & Ic. Pl. pag. 191. Cynoforchis Dracontias foliis & floribus impense rubris C. Gemmae, floret circa finem Aprilis, aut initia mensis Maii. Nascitur in humidis, & viginolis, praesertim vbi nigrior terra est. Hist. Lugd. Cynoforchis Dracontius Gemmae. Tabern. ic. Tragorchis *Bofae* geyl. Male ponit Compil. hanc iconem sine descriptione capite separato ab aliis palmatis. C. B. Phyt. Satyrium 18. palustre foliis & floribus rubris.



Tabern. Icon. & Hist. Testiculus galericulatus, *Knabenkraut*. Compiler ponit palmatam hanc extra ordinem aliarum cum Orchidibus, cui bini testiculi, nulla addita descriptione. C. Bauh. Phyt. Satyrium 12. montanum bicubitale.

PALMATA CARYOPHYLLATA.



Plant. Icon. p. 194. Orchis Serapias Caryophyllata femine pregnans. Et T. 1. p. 277. Flos Orchidis Serapiadis Caryophyllatae sic odoratae descripte p. 226. C. Bauh. Phyt. Satyrium 1. basilicum maximum. Vide Hist. Belg. Lob.

PALMATA PALVSTRIS NEPHELODES



Cynoforchis palustris, Lophodes vel Nephelodes C. Gemmae. Flos illi communis ferè cum ceteris maculosis, proinde huic comunem appinximus deflorescentis Satyrii formam, vna cum corniculis quibus ferè atomon prorsus includitur, Lobel. Obs. & Icon Plant. p. 195. Hist. Lugd.

Cynoforchis palustris altera, Lophodes Gemmae. Tabern. Icon. & Hist. Palma Chnati palustris. 1. wasser bend len wurts. Casp. Bauhin. Phyt. Satyrium 17. palustre alterum maculatum.

PALMATA ANGVSTIFOLIA MACVLATA purpurea.



Palmatam quam obseruauimus in valle Griebachiana acidorum fontium, florentè, Iunii principio, foliis est angustis, macularis & non maculatis, quinque vel sex alternatim per caulem prouenientibus, inferiora latiuscula, vnei tamen multo angustiora, retrè

Descriptio.

PALMATA, SIVE CYNOSORCHIS MACROCAULOS GALERICULATA C. Gemmae.

Cynoforchis macrocaules, vel Conopsea, siue galericulata C. Gemmae. Floret circa mediū finemque mensis Maii vsque ad Iunii ferè medium. Lob. Obs. Flores in hac iconem multū habent similitudinis cum praecedenti nostra Palmata calcariibus longis. Hist. Lugd. Cynoforchis Conopsea.

flexa, quatuor vel quinque uncias longa, superiora, breuiora & valde angusta: caule cubitali, aliàs maiore, interdum etiam minore: flores multi, spicam breuiorem exprimentes, purpurei: radices pluribus digitis constant.

Icon quam proponimus est ex iis, quas iam sculpras emimus, quæ aliquo modo exprimunt nostram Palmatam angustifoliam.

PALMATA RUBELLA CVM
longis calcaribus rubellis.

Descriptio

Duplici nititur radice palmata, vigore vicissitudinario annuatim in iis pulcherrima observatione se exerente; nam ea quæ caulium pariter & fulcrum subministrat, tota flaccida apparet effetaque, quæ verò sequenti anno caulem producit, plena succulentaque, sapore viscido: plurimis aliocuin digitis uncias longis prædita sunt. Obseruari fanè nobis in vtraque ad viginti quatuor: infra supraque palmatas radices aliæ, crassitudinis fibrarum Helicbori: folia prodeunt palmum longa caulem amplectentia, angusta, qui cubitalis, scilicet cubitalis, atque etiam altior, quem parua & angusta quædam foliola stipant, suprema verò thyrus occupat peramænus dodrantalis plus minus, flosculorum rubellorum, calcari prælongo, & vnguiculis autum recuruo, præditorum, quibus dehiscens succedunt utriculi striati, semine puluerulento ferrugineoque: odor non vehemens nec ingratus.

Icon nostra est ex iis, quas iam sculpras emimus, quæ non malè respondet nostræ Palmatæ, & à Fuchio exhibita, nomine Satyrii Basilici maris primi.

Matth. in Diosc. Palma Christi. Descriptio non respondet iconi: in comm. cum Iconibus magnis Latinis, Palma Christi maior. Item Epit. p. 561. vbi etiam descriptio non conuenit cum iconi.

Matth. in Diosc. Palma Christi. Descriptio non respondet iconi: in comm. cum Iconibus magnis Latinis, Palma Christi maior. Item Epit. p. 561. vbi etiam descriptio non conuenit cum iconi.

Matth. in Diosc. Palma Christi. Descriptio non respondet iconi: in comm. cum Iconibus magnis Latinis, Palma Christi maior. Item Epit. p. 561. vbi etiam descriptio non conuenit cum iconi.

Matth. in Diosc. Palma Christi. Descriptio non respondet iconi: in comm. cum Iconibus magnis Latinis, Palma Christi maior. Item Epit. p. 561. vbi etiam descriptio non conuenit cum iconi.

Tabern. Icon. & Hist. Palma Christi minus, flein hendlens wurz Mannlein, Creuzblum. Palma Christi femina hendlens wurz weblein. Prima icon est ex Lobelio, altera est ex Matth.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 7. basilicum angustifolium, Palma Christi maior Matth. Orchis femina Trago. Satyrium 9. basilicum angustifolium tertium, Serapias minor rubello flore Lob. Nobis dubium an duæ plantæ, suspicamur vnam.

Palmatam quandam paruis flosculis rubellis & longis calcaribus in longis veluti spicis inueni Iunii principio in prato inter Masinunster & S. Germain. Transili Montbelgardum in Hortum Ill. E. C. Item inter Raupach & Befordiam Iulii principio, provenit etiam circa Montbelgardum: olim collegi Tiguri.

PALMATA MINOR ODORATISS.
purpurea siue nigra.



PALMÆ

Christi, siue Digitorum Citrinorum Auiæ. genus minus Matthiolo quod in Ananiam montibus habetur foliis constitit Croci: caule dodrantali, iuceo, leuique in cuius cacumine flos emicat purpureus, amaranthi æmulus, qui recens odorem quam suauissimum reddit.

Dodon. ex Matth. Satyrium basilicum minus. Satyrium basilicum alpinum, flore ex purpura nigro, tanquam adusto (vnde Brandlein nomen impostum:) odore omnium suauissimo, seu Syracis: quem etiam aridus & in pollinem tritus, diutissimè retinet.

Nos [ait Gesner. horti] etiam aliquando plantauimus Lansannæ: sed vix vltra annum puto in hortis durare, & semen inutile esse, sicut reliqua Orchis genera.

Bened. Aret. Palma Christi minor Matthiolo. Satyrii species odorata, & præstantissima Brandlein.

Minus modestè, inquit Adu. facit Sen ensis, qui hærentibus Citrinis digitos Auicennæ esse hæc Monachis conuiciatur, nullamque allatam rationem conqueritur: cum ipse ne vmbra quidem adferat vllius. Et vires Digitum Citrini huic asserit, magno incommodo eorum, qui hîdem illi adhibebunt forent.

Hist. Lugd. Palma Christi minor, Matth. Satyrium Basilicum minus Dodon.

Tabern. icon. & Hist. Palma Christi minor femina, flein händlens wurz weblein.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 10. basilicum angustifolium Alpinum, flore ex purpura nigro.

An Camer. horti. Orchidis Serapiadis siue Satyrii

Matth. in Diosc.

Cam. in Epit.

Hist. Lugd. 1791.

Locu. Temp.

tyri Basilici odoratissimo flore minimo quedam species alpina, coloris ex puniceo nigricantis, quem Dysentericis præbent frixum cum Ovis, vel in puluerem redactum ex vino propinant.

Satyrium basilicon minus odoratum in peregrinatione nostra Rhætica per Vallem Telinam inuenimus in monte Burmio, tunc nominatū fuit nobis G. Breente, & Italicè ibidē Morere. Cū essemus Mōspeliū delata hæc planta ex mōtib. circa Gangen. Genueæ cū tempore pestis inferuimus, inuenimus in monte Saleue. Huius exsiccati puluis (inquit Matthioli.) ex aqua ignitum chalyben experta, epotus (vt perhibent ii qui ita esse experimento comprobant,) dysentericis maximè prodest. Idem aquam præstare aiunt, quæ per vitrea organa ex iis elicitor. Radices huic similes, sed quæ alteri magnitudine cedunt. Excalfaciunt utraq; (vt auctor est Auicenna) siccantq; secundo recessu. Crassa corporis excrementa pellunt, faciēq; detergunt. Dantur maniacis magno iuuamento: quin & in nervorum affectibus. Seminis puluis drachmæ pondere ex vino potus, comitialibus subuenit. Item radices decoctum vino diutius commistum, quod bibendum paratur tam in prandio, quàm in cæna. Radices, Nicolii Florentini testimonio, febrē quartanam fugant: is namque earum tantum vsu Bilicium quendam curatum retulit.

SATYRIUM ERYTHRONIVM MATTH.

Satyrii Erythronii vocati radice, Mali effigie, coriæ tenui & rufo: candida intus pulpâ, sapore dulci, orique non ingrato, Damasco Syria missit ad me [Clusius] Cechinus Martinellus Rauenas Pharmac. præstantiss. & rei herbariæ admodum studiosus, cuius imaginem excudi curauimus.



Hist. Lugd. Satyrium Erythronium Matthioli. Hanc, inquit Adu. ostentabat nobis (quasi nunquam vidissimus) & penè inuitis risum excutiebat Iacobus Corrusus, dicens, se manibus duntaxat atrectando totum turgere Venereis libidinis.

Nos annotauimus historia nostre lib. tertio Valerandum Dourez exstimasse Satyrium Erythronium Matthioli esse medullam Nucis Cuphoræ.

OROBANCHE ET HÆMODORVM
Veteribus & in genere.

CAP. XXVII

Duplicem esse Veterum Orobanchen ex mox tradendis colligere licet. Vnam quæ

legumen sit, aut leguminum, Erui præsertim, virium & pestis. Alteram quæ cauliculus tantum sit sububer.

Hanc Dioscor. describit his verbis: Orobanche (Orobanchē) cauliculus est sububer, ad duos dodrantes (sesquipedalis,) & interdum maior, insurgens, foliis subpinguibus, hirsutus, tener, floribus subalbicantibus aut melini coloris præditis. Radix subest digiti crassitudine perforata, vt inde caulis rescicetur. Videtur nasci inter legumina quedam, & ipsa strangulare. Vnde etiā nomen accepit. Editur oleris modo crudus & coctus, ex patina velut asparagus. Quin & cum leguminibus coctus facere putatur, vt ipsa citius coquantur.

Inter reiectæ, alii legunt *κινυρα* alii *κινυριον* [Leonem] Cyprii *δυσπόλιον* vocant. In comitatu *λεω* [Lupus] nominatur. Sed ne stateram, quod dicitur, transgredi videamur, Theophrastum, qui primam & secundam Orobanchen seu legumen depingere videtur, adorimur. Quedam autem sunt [inquit lib. 8. c. 8.] perspicuè multorum communia, sed quia in quibusdam maiorem vim habent (*δυσπόλιον*, sic legendum sensu ita postulant, non *δυσπόλιον*, vt in publicis exempl. legitur,) horum existimantur, veluti Orobanche (Eruanga *Γύρα*) Orobi, Aparine Lentis. Sed Orobanche quidem Eruum vincit propter imbecillitatem, Aparine autem inter lentis benè nutritur: & ea quidem Orobanche quodammodo similis est, quia totam plantam aggreditur & veluti brachiis amplexatur: sic enim strangulat, vnde et nomen. Quod autem statim à radice Cuminum & Fænugracum (*κινυρα*) subnascitur Hæmodoron [*κινυρα*], vnicale est, nec dissimili caule, verum breuiore multo, & superne quoddam veluti caput habet, radicem autem subrotundam. Idem de Caul. 22. de iis scribens, quæ vicinas plantas intetunt, ait: Orobancha vocata Eruum necat amplexu compressuq; suo: & Limodorea [*κινυρα*] legedum Hist. Lugd.) Fænugracum interimit protinus radici adnascens.

Orobanches quoque leguminis in diuersis locis meminit Plinius. Est, inquit, herba, quæ Cicet necat & Eruum circumligando se, vocatur Orobanche, quam alii Cynomorion appellant, à similitud. canini genitalis: cauliculus est sine foliis [quod malè, vt dicitur, pinguis, rubens. Estur & per se, in patinis cū teneta est decocta. Et necatur cuminum ab imo dorso (legendum ab Hæmodoro Hist. Lugd.)

Illius & Galenus recordatur simpl. 8. & Ahim. r. his verbis. Aparine non modo non esculentia est, sed plantæ Lentis dum asurgit, vndiq; implexa, ipsam strangulat, suffocat & detrahit, non aliter quàm Orobanche Eruum. Sicca frigidaq; est temperaturæ primo ordine.

Sed Cornar. in Dioscor. teste, Plinii locus prior de Orobanche ex Theophrast. lib. 8. hist. transcriptus. Quod porro lib. 22. dixit sine foliis, nos *κινυρα* in Diosc. legimus, & foliis subpinguibus connectimus. Non enim penitus sine foliis est, sed in summo caule folia habet & inter ipsa flores prodeuntes. Nec ignota herba est, sed nomine peculiari caret, nisi quod vnfrant der *κινυρα* nostri eam appellant. Cornario subscritbit Dodon.

Orobanchē *Γύρα*, sic & Latine Orobanche, Erui angina [à Theod. Eruanga] ab Erui strangulatu nomen adepta est, nempe quod *κινυρα* id est, quod Orobanchen siue Eruum strangulat. Neq;

Cynomorion.
Leo Thyrse
ne
Lycor.

Orobanchē
Eruanga.

Orobanchē
Limodorea
Hæmodoro.

Cynomorion

Orobanchē
in genere.

ga etiam vulgò (quasi Necam dicere vellent) appellatur, rapiendo enim leguminum inter quæ nascitur, alimenta, ea suffocat & necat.

Hæc cum Thymo adnascatur, ait Marantha, Epithymi nomen sortita est. Orobanche Theophrasti an sit Cuscuta, ut vult Marantha considerandum. Orobanche Theophr. & Galeni fortè Conuoliulus niger Gefn. qui nobis Helxine femine triangulo dicitur. Videtur sanè Trago, quod præfens virium, Angina, seu Orobanche, alter Cuslus Serapionis sit, de quo cap. 41. ita scriptum reliquerit. Est secunda [Cusli sc. species] est nigra, & nominatur sic propter sui nigredinè, & habet semen nigrum &c. Nomina hæc adscribit Lebleb, & Volubilis minor. Cum verò Orobanche descriptio, quæ apud Diosc. extat, huic non per omnia quadret, iudicium candido lectori committit. Est præterea Orobanche Galeni & Theophr. fortè Helxine Cissampelos. Orobanche Diosc. Gefn. quad. p. 42. Aegoletrus Plinii [ni fallitur Gefn. quad.] Rusticis Malus flos, aliis Malus Henriicus dictus, perquam similis est Orobanche.

OROBANCHE FLORE MAIORE.

Descrip.



Cubitali altitudine exurgit & maiore, caule recto, tereti, hirsuto, pallido, aut luteolo aut subrufo, concaua: in quo non tam solta, quam foliorum rudimenta, angusta, longiuscula, seu ligula, celerrimè marcescentes rare: quorum etiam singulæ singulis floribus sunt subiectæ: flores in Thyris Orchidum more, sed ex longioribus interualis, Mellissæ Fuchsi, magni, hirsuti impensè, colore ex purpureo obsolero pallido (subalbido Matthiol.) rictum effigiantes, è quo prominet apices nigricantes staminum albidorum: labrum autem quod demittunt in tres lacinas est diuisum: ipseque

floris fundus melleo succo viscido madet. *Rubra* bulbosa è squamis compactilis, non admodum altè demergitur. Sapor eius admodum amarus. Flores verùm odorem spirant haud ita ingraturum.

Orobanche, quam vidimus [inquit Math.] omnibus notis legitimæ responder: et si scriptis mandarit Theoph. lib. 8. de hist. & 5. de Pl. caulis; Orobanche Eruum necare amplexu: ea tamen quæ à Diosc. representatur, & à Plinio lib. 22. cap. ultimo, nullo sanè amplexu, sed sua tantùm præsentia legumina, fegetes, Cannabin, & Linum interimit, quæ prope ipsum oriuntur: quam ob causam Ananites, quòd vicinas strangulet, *uerbam Lupi* vulgò appellat: nonnullis *Cada di Leone* appellatur: alius verò *herba tora* quòd vaccè eà deuorata [vt pastores factò periculo testatur] statim Taurum adeant. Sunt qui [vt loco citato scribit Plinius] Cynamorion eam appellent à similitudine canini genitalis: non inconcinnè representationem: nam si quis eam contempletur, glabro singularique caule proflientem, confarctos inter se flores, & quasi in glomum collectos monstrantem, genitalis canini effigiem referre perspiciet, quod in summo crassius, & veluti galericulo contractum cernitur. Ex quibus omnibus non meretè dicendum existimauerim, vel Theophratum hac in re deceptum esse, vel aliam à Diosc. & Plinio Orobanchem concepsisse. In postremis mutata figura. Frustra Matthiolus repetit Diosc. descriptionem nihil addens de suo, quasi non nota ei fuerit planta.

Orobanche, inquit Turnerus, in multis Angliæ locis prouenit, Variis quoque Germaniæ locis obseruauit. Inueni quoque sæpe numero radicibus Genistæ vulgaris pertinaciter implexam. Item iuxta Trifolium pratense marcidum quod enecauerat, vt ex fossione comperi, reliquis omnibus circumcirca Trifolii vegetis & vernantibus. Orobanchem interpretari licet Angl. *Chofestifæ* vel *Stranglemede*. Falluntur, qui Culectam credunt esse Orobanchem Diosc. Alii sine causa nuper Orobanchem nostram inter Satyria retulerunt. *Quid Matth.* contra Theophratum scribit (dicentem Orobanchem amplexu suo complexuque legumina enecare) solà præsentia suà id efficere, non placet. Quo modo enim legumina necet, solà suà præsentia cum venenata non sit? cum etiam ne venenata quidem plantæ eas inter quas nascuntur, interimant: Theoph. quoque & Diosc. repugnat. Fortè Matthiolus, quoniã nulla in Orobanche folia aut capreolos supra terram obseruauit, arbitratus nihil habere, quòd strangulare possit, exceptâ solâ præsentia: neque perplexas radicem fibras animaduertit, quibus non sine errore caret figura ab illo proposita; Tragus ramen rectè fibras expresserat, titulo Satyri Erythronii.

Reperitur planta Rapo Genistæ omnind similibus, caulibus fuscis [brunastres] & coloris lividi, altitudinis pedis, floribus formæ & coloris Rapi Genistæ: Rapum Genistæ sine dubio species est Orobanches [ait Dodon. Gall.] & Linnodori: ei autem similis planta est Diosc. *de. 6. 2. 27* Lat. Orobanche & Eruangina, non tamen Orobanche Theoph. sed *de. 1. 2. 27*, Limodorum aliis vt Phocioni, *de. 1. 2. 27*, id est, leguminum Leo. Idem Hist. legum. Limodorus cauliculus est pedalis aut maior, subrubens, fistulosus, fragilis: flores subcandidi aut sublutei vtricè immixtis floribus; haud multùm ab similibus: floribus succedunt

cedunt oblongi caliculi, in quibus semina minutissima candidantia & inutilia. Radices subsunt rotundae, turbinatae, digiti aut pollicis crassitudine, foris squamis nigricantibus contextae: intrus verò subcandidae aut subluteae: aridae verò cornu modo durefcunt. Theophrastus huiusmodi vitium *καυδοσχορ* appellat, veluti *καυδοσχορ* hoc est famen adferens, frugum enim alimentum ad se trahit, & perfectè adolefcere non sinit. Item Hist. in fol. Limodoron, seu Rapum Genistae, rota facie Orobanchen Diosc. refert, hoc solo ab ea differens, quòd non inter legumina exeat: sed ex fibris radicum Genistae quibus adhærescit.

Lobel. Icon. Pl. pag. 268. T. 2. Orobanche Hypogenista, & Rapum Genistae à similitudine. Ico eadem cum icone à Dodonæo proposita pro Limodoro siue Orobanche. Orchidibus quodammodo cognatum est *καυδοσχορ*, siue *καυδοσχορ* Theophrast. vel *καυδοσχορ* Diosc. & Cynomorion Plinii, cuius varia genera inveniuntur multis provinciis communia. Orobanches siquidem legitime illius Dioscor. siue *καυδοσχορ* Theophrast. variae sunt species. Aliæ enim latiores sunt, aliæ humiles, albæ, exalbidi coloris, aliæ flavescentis, aliæ fusci, aliæ subcærulei: nonnullæ aliarum radicibus adnascuntur, plurimæ per se subsistunt, & solæ inter alias plantas & gramina nascuntur: pleraque autem omnes unico simplicique caule sunt præditæ, interdum ramosum & multifidum illum habent. Omnium verò maxima passim in omnibus Europæ silvis nascitur, ut existimo: certè nullas adii, quin ipsam non repererim: eam, quia apud Belgas sæpius vulgaris Genistæ radicibus innascitur, Herbariorum turba Rapum Genistæ appellat, Belgæ *Eren Ræpe*, Hungari, quia rectè assurgit & firma est, *Misc gerythya* mistalem candelam, siue cereum appellant, quæ subcæruleo est flore, Cardui vulgaris inter segetes nascentis radicibus inhaerentem olim eruere meminimus cum Mompelii viverem.

Eandem habet iconem Clusius nomine Orobanches primæ quam nobiscum proposuerunt Dod. & Lob.

Ruellius Plinium secutus Orobanchen alteram Diosc. ita describit, ut cum leguminosa hanc confundat.

Ex emendato Theophrast. insigne in Pliniodem corrigendum. Legimus enim lib. 20. c. 10. Et necatur Cumminum ab imo dorso, cum legendum sit ab Hemodoro.

Tab. Hist. & Icon. Orobanche 2. *Erenwurzer*. *Sommerwurtz*.

Schvv. Orobanche Diosc. *καυδοσχορ*. *Sommerwurtz* / *Schmerwurtz*.

Prouenit in agris consitis Autena, Pisis, Fabis, Lentibus, & aliis ubi Genista non prouenit. In Belgio & arenosis maris litoribus non rarè reperitur Dodon. Nascitur in segetibus inter legumina: Etiam in syl. sub Fagis. Maio & Junio floret, Schvv.

Montbelgardi multis in locis vidi Orobanchè: Genæe florentem vidi Maio & Iunio passim *au plan palus*, & pratis: Basileæ etiam florentem Maio, ubi copiosè prouenit. Mompelii cum essem offendi florentem mense Aprili in monte propè Castelneuf, ut & alibi.

Orobanche, inquit Matthiolus, dicitur aliquibus herba tora, quòd vaccæ eà deuoratà (ut pastores facto periculo testantur) statim taurinum adeant. Orobanches maioris Rapum Genistæ nuncupata, resiccate & trita puluerem ex tepido

vino haustum, præfens esse ad Coli dolores remedium Belgæ prædicant, Clusius.

OROBANCHE FLORE MINORE.

Orobanches vulgari similis est, caule simplicè dodranti, purpurascente, hirsuto, foliorum acuminatorum squammatum incumbentium, præsertim circa ima rudimentis vestito: radicem fibras habuisse vulgari similes adhuc in planta sicca apparet. spica floribus constat con-

fertis cucullaris, labello apertè referente, calyce hirsuto multido, eiusdem cum caule coloris, subiectò senper uniuicuique floribus folio oblongo, acuminato, hirsuto.

Hanc Orobanches speciem ubi collegerimus non recordamur: describimus ex planta sicca: huic sanè conuenit figura Tabern. nostræ



quæ iam parata erat minus placet. Fortè ad hanc Orobanchen referenda quæ Mompelii obseruauimus.

Tabern. Icon. & Hist. *Sommerwurtz* / Orobanche prima Orobanche Matthioli floribus ex luteo pallidis, *Erenwurzer* dicitur German: Theophrast. *καυδοσχορ*, Cauda Leonis, Mala herba, Herba Tauri, & Herba Vaccæ.

OROBANCHE MINOR PURPUREIS floribus siue ramosa.



Ramosa est caule; sæpè verò etiam plures dodrantes, aut breuiiores, emittit caules, multò tenuiores, quàm Orobanches vulgari, rigidiores, resque, duros; rufescentes, hirsutos, in ramis subinde diuisos, foliorum duntaxat vestigiis quibusdam ornatos: Flores spicati, minores; purpurei, oblongi, hiantes; è multifido calyce emergunt, cui

longi, hiantes; è multifido calyce emergunt, cui

singulo singulum appositum foliolum acutum : sequitur *capitula* turgida puluifculo plena; *radix* rubrofa Auellanae magnitudine; fibrarū propaginibus donata. Sapor plantę aliquantulum amarus. Cæsalp. Orobanche alera ramoti.

Locus & tempus.

Camer. in hist. Math. Sommer wurz/ Ezeuenger, Orobanche.

Vidi Montbelgardi prope C. *urcelle* pagum in agro florentem Septembri, & primò prope Mōspeliū, vbi in fegetibus mense Aprili prouenibat. Basileę etiam vidi, præcipuè in agris Cannabi confitis. Non vbiq; vulgaris est, multis tamen in locis reperitur, vt in Thuringa: Camer.

OROBANCHE MAGNA PVRPVREA Montpeliulana.

Orobanche affinis, planta florens prope Montpeliū mēse Aprili in silua Gramont, cui digitalis crassitudinis altitudinis autem bicubitalis *caulis* adulescit totus purpurascens, cui serie quadam sursum vortum apprimuntur *folia* satis breuia, amplexicaulia.

Descriptio



Scapum obsident flores purpurei, Orchidis floribus similes, calcaribus breuib; singuli foliolo in-
recti: *radix* superiorem refert partem radicem Orchidis, nullis testicalis tamen aut bulbis donata. Sapor amarus, terretimus.

Lobel. (cuius icon non placet) calcaria nulla appingit. Eidem dicitur Orobanche maior è Gramontio loco Montpeliensium.

Considerandum an Clus Hist. pl. rar. huius meminerit nomine Pseudoleimodori Mompeliani, eius verba sequuntur cap. de Pseudoleimodoro Austriaco Nido auis affini.

OROBANCHE AFFINIS NIDVS AVIS.



DE Nido Auis scribens Tragus, ait flore esse & folio viduum, nihilque aliud esse quàm pingue & rectum Alparagū. Qualis verò nobis perfectior reperit *caulis* surrigebat modò singulari, modo dnos vel tres pedales, aut cubitales, albicantes: foliis vestitos concavis, pelucidis, stria-

tis, neutiquam acutis, vt Lob. figura docet, sed obtusis, superna parte quodammodo cordis figuram exprimentibus. Quorum summa *florum Thyrsus*, Orchidum modo & formā, occupat, coloris helui aut pallidi, qualis & foliorum rabidorum. Ac ocululi quidem ex breuib; pediculis, vt Tragus pingit: ad quorum exortum foliola parua singula sese exerunt. Vbi verò seaperiunt, Orchidum more hiant. *Galea* exigua, sub qua pitillum breue cum apiculis albicantibus: quod vtrinque ad latus bina foliola cingunt. *Labellum* magnum ima floris occupans canum intus. Nullus odor notabilis. Dehiscentibus floribus, vtriculi puluifcolorum succedunt striati, angulosi, residuis florum foliolis marcidis insigniti. *Radix* crassis fibris, succulentis, fragilibus, tota perplexa, nidorum auium structuram imitans, quorum extrema haud acuta obseruauimus, vt Lob. pingit in suo Nido auis, sed obrusa, vt Tragi & nostra exprimit. Sapor radicis ac totius plantę amarus, horridus.

Dodonæus considerata fortè icone Tragi tribuit flosculos, denegat folia. Dicit namque in hist. Gall. quibusdam Belgis *Vogelneß / Nid d'oiseau* est sine foliis, flores cum caule coloris ligni. Lobel. Icon. Plant. Nidus auis ex speciebus Satyrii abortiui, Orchis abortiua, Satyrium abortiuum, species Hypocisti.

Non dubium est Clusio quin Leimodori adnumeranda sit, ea quam Lob. Orchidem abortiuam Germ. *Morgendrehen / Belg. Vogelneß* appellant, quamque nonnulli Coagulum Plinii esse hariolantur.

Nidum auis inueni florentem mense Maio in monte *Bar* quod medio miliari à Montbelgardo distat, inuenimus etiam Maio in sylua Abietum, itinere Montbelgardo Porentuum ad radicem Abietis. Audio prouenire Basileę versus Augustam ad Rhenum: Tiguri cubitalem collegimus. Lobel. reperit in altis montibus *seuensis* in Gallia Narbonensi cū speciebus Dentarię, prouenit etiā in Belgio in syluis humidis. Hinc rectè Tragus; In Vliginosis & vmbrosis syluis nascitur Maio mēse.

OROBANCHE ET NIDO AVIS affine Pseudo *Nidus Avis* Austriacum violaceum.




Nidus Avis, Austriacum Clusii in Pannon. Pseudoleimodori in post. Hist. congenerem plantam Orobanche, quę superna parte ipsam æmulatur in moranis supra Badenenses thermas obseruabat, quę nusquā antea, quod meminerit, ipsi fuit cōspecta. Pedali assurgit illa *caule*, frequentibus secundum radi-

radicem foliis, tanquā vaginulis, involuto: spicā gestās florum quatuor foliis cōstantium, superiore in corniculum desinente, & promulscide quadam inter media folia prominente, cui adnatæ sūnt duæ tenues barbulae: floribus striata & longa subsunt capitula, semine exili & Orchidum simili plena: subrotundam radicem non habet, qualem suo haemodoro tribuit Theoph. l. 8. Hist. Plant. cap. 8. sed crassas, longas, & obliquas fibras habet, quemadmodum ea planta quæ vulgò Hel-leborines nomen obtinuit. Tota stirps saturo purpuræ & planè violaceo colore prædita est. Floret Iunio.

Lobel. Belg. Ic. Pl. Vogelonesti/ Nidus avis ex speciebus Satyri abortivi, Orchis abortiva. Satyrium abortivum, species Hypocistis.

Considerandum an Lobelius malè suo Nido avis eam iconem adaptarit, quam etiam miramur diuersis locis & nominibus propositam sine descriptionibus, quasi iconem tenus tantum ei fuerit nota planta, vel perpendendum an duas plantas confundat.

DENTARIA APHYLLOS MINOR
Taberna montani.



TENella est plantula Spithamea altitudinis, succulenta, alba, sine foliis: cauliculus articulorum quibusdam vestigiis distinctus videtur. Cuius summa sterculi tenelli aliquot occupant, ad Orchidis flores quam proximè accedentes. Radix alba est denticulata. In montibus crescit Augusto.

Hæc Tabern. Icon. & Hist. Flein faal Fraut.

Dentaria aphyllus minor. Videndum quantum differat ab Orobanche nostra alba.

ANBLATVM CORDI, SIVE APHYLLON.

AD Orobanches speciem quandam accedere videtur, hæc planta: quæ ex radice multiplici, mira squamarum denticularum congerie stipata, alba, molli, & succosa, caulom erigit minimi digiti ferè crassitudine, dorantalem aut altiorem, teretem, succulentum, fragilem, tenui membrana vestitum, aquea pulpa abundantem: Iuxta quem ex longis interuallis auriculæ quadam membranæ foliorum æmulæ prodeunt, aduersæ quidem, sed altera tantillum eminentiore. Tertiam & supremam coliculi partem flores occupant plures hiantes, eodemque modo, nutantes, & antrostium spectantes omnes, breui pediculo appensis, à quorum tergo pediculorum quoque exortum foliola muniunt. Floris colorem ex ruffo vel purpura candicantem dicunt: mihi hæctenus non visus. Illis succedunt vascula A-

Tom. II.

uellanæ ferè magnitudine, à pediculo ad mediū calice foliaceo subhirsuto, tenello, succoso & quadripartito vestiti: lineis quibusdam ac canaliculis quadripartita, semine rotundo oua pisciæ minima æmulante, densissime facta, quod maturum totum nigrum est, pappaverinum, sed sextuplo maius. Tota cæterum planta gustu est aquoso acerbiusculo, non sine aliquo amaritudinis sapore, quæ tamen in semine magis conspicua.

Cordo hist. lib. 1. cap. 10. addita hæc annotatio à Gesnero ut puto. Anblatum Germ. id est Aphyllon. Orobanchen aliqui putant, non tamen ea, sed ei similis. Nos aliquando Plinii Aegoiechro (quam herbam ni fallimur nostri rustici die böß blüm & den bößen heinrich.) esse putauimus.

Vult Dod. lib. frum. ad Limodori genus referendum Valerii Cordi Anblatum. Anblatum verò etiam Dentariam à liqua vocari scribit Martiolas. Casalpinius Dentariam vult esse Arachidnæ speciem: sed cum Theoph. Arachidna iudicio meo nihil cōmune habet: de qua inter Legumina sub Arachnida Honorii Belli.

Copiosè reperi Anblatum in Montbelgardesi monte Bâ: Medio Maio comperi in montibus vmbrosis sub arboribus eundo Potentruo S. Visanum: flores præterierunt & semina erant penè matura, transfuli in Hortum ill. E. C.

Præstans est ad rupturas, si in pollinem redacta herba drachmarum duarum ponderè in iuculo in quo Symphytum bullierit quadraginta diluculis continuis sumatur. Imponenda quoque herba ipsa fractura, debiteque liganda pars. Eadem ratione hausta vulneribus internis, variisque affectibus à defluxione ortis prodest. Magnus usus aquæ destillatæ in fluxionibus & Epilepsia, Camerarius. Adstringit, refrigerat & abstergit: Datur puluis in potu, ad effectus matricis & colicos, Casalp.

À R V M.
CAP. XXVIII.

BVlbose Allii radice, bulbis adnatis, nicitur. Bcãdida: à qua fistula exiit, oblonga, triangula, sagittæ dicta, sed latiora, minusque alata, supra infraque splendens, sed hinc minus, inde magis viridens, maculis nigris interdum respersa, gustu, ut & radix, acerrimo, & linguam cunctelli instar transadigente: inter quæ caulis surgit palmatis, teres, striatus, in cuius falgio è membranæ vagina longa prominet pistillum atropurpureum, in infima parte apiculatim corona arcuè cinctum, sub qua racemus baccarum, per maturitatem miniato colore pictarum, denso stipatu confertarum.

Vuu

Arium An-
tiqnotum.



Lupha.

Alimos
Thymos.
Dracontias
Colocasion

plin. nos.

Nō Arium.
Colocasion.
Arisarum.
Dracontias
lus ex-
guus.

Serpentaria.
Colubrina.
Iarus.

Dracontias
cus ar-
por Diof.

Ari folium, inquit Theophrastus, quod admodum amplum spargitur, est cum latitudine caui atque Cucuracæ, caulis, vt etiam flos, nullus. Radix inter genera multo magis carnosa, leuis & crassalatera tenuis atque neruosa, vt sanè quispiam dubitauerit, an inter radices hæc poni de-

beat: *Αῖον* quod autore Diofco. apud Syros Lupha dicitur, folia emittit Dracontuli, longiora (codex Bas. *μακροτέρα*). Anguill. ex cod. antiquo, Oriba. & Crat. *μακροτέρα*. Matth. omnia exempl. microtera) paucioribus distincta maculis (*μακροτέρα* i. immaculata) caulem dodrantalem, subpurpureum, pistilli speciei: à quo croceum semen [Dracontulo minori conuenit fructus croceus Cæsalsp.] radicem Dracontuli albam: Hoc autem inter Diofco. spina, alii *ἀριον*, alii *βυβων*, alii *δρακοντίαν*, Cyperi etiam *μακροτέρα* dicunt.

Plinius de bulbis agens, Arum omnino sic describit. Est inter genera, inquit, quod in Aegypto Aron vocant, Scyllæ proximum amplitudine, foliis lapathi, caule recto duum cubitorum, baculi crassitudine, radice mollioris naturæ, quæ edatur (estur CH.) & cruda.

Hermol. cui simpliciter Aros dicitur, quam dicitur pro Aro intelligat non demonstrat. Hæc à similitudine illa ad Dracontium, ab Officinis Serpentaria minor appellatur: itemque Iarus & Aron.

Plinius notant Marcellus & Cordus: ille quod Aron cum Dracontulo confundat: hic verò quod radicem magnam habere scribat.

Tragus tres tradit species: Vnum, Ari primum genus & vulgare. Alterum, inuolucro & pistillo ex albo lateolo. Tertium Ari genus cum nigris maculis. Deinde ait: Omnes vno consensu Herbarii, tradunt eam herbam, quam Germani Aron vocant, Arum esse Diofco. lib. 2. cap. 162. quod ille Lupham, Alimon, Thymon, Dracontium & Colocasion cognominat. Mihi verò non Aron sed *ἀριον* videtur esse. Arum quod sugillata lituris folia profert fortasse exiguus Dracontulus fuerit. Arum nonnulli, Serpentariam, Colubrinam, Dracontium minorem nominant. Dicitur apud Simonem Ianuensem, Iarus, Barba Aron, & Pes vituli.

Figura Matthioli fictitia ex Bisforta Rumice & bulbo.

Fuchio, cui Dracontulus minor Diofco. videtur Aron & Aris, Iarus Officinarum, Pes vituli, Serpentaria minor, & quorundam Sacerdotis virile. Anguill. asserit nostrum Arum esse Diofco. idis, ac apud illum legendum *μακροτέρα* & non *μακροτέρα*.

Arum, ait Amatus in Diofco. non vbique acre, inquit Galeno; Diofcoridi candida radix, Plinio nigra.

Arum describit Dodon. eiusque figuram exhibet, ac secundo pro Dracontio minore proponit, quod quomodo factum sit, non occurrat.

Diofco. videtur, ait Turner. ostendere Aron in sua patria, non fuisse ad eam ac apud nos comperitur. Galenus quoque scribit Aron candidum & siccum esse in primo: Quod autem apud nos prouenit, calidum certè est in tertio, vnde fortè dixerit quispiam, nostrum Arum, non esse Diofco. idis & Galeni. Verùm Galenus seq. verbis lib. 2. de alim. fac. duo esse testatur Ari genera, alterum mitius, alterum acrius.

Aron vulgare, [aiunt Lob. & Penz Adu.] est plebeculæ Barba Aronis, & Sacerdotis veretrum aut mentula, racemo purpura punicante miniatulo: foliis maculis nonnullis nigricantibus insignitis, vnde etiam Dracontium vocatur.

Gichereum seu Gigatum Cæalpino vulgò appellatum, foliis maculosis, maculis candidis vel nigris, corniculo pallecente fædi odoris, fructu croceo in æstate: radix tactu pustulas excitat. Diofco. hæc Dracontium paruum appellat, quam quædam superflua in eius descriptione ele-gantur, assumpta ex altera Draconia, is relectis aperit. erit historia. Plinius Dracontulum vocat, diuersum ab eo, quem vidit in Lusitania radice subrutula, quam quidam ab Aro non ditinguunt.

Arum vulgare, inquit Camer. horri. Aliud duriore folio, virente per totam æstatem, & aliud grande, pistillo albicante, rotundiore folio, itidem durante in multam hyemem.

Obseruauit C. Bauhinus Phyt. Aron vulgatum, aliud folio maiore & acuriore, aliud rotundiore, aliud duriore per totam æstatem virente. Sic eius quod maximo est folio, ipsius folii venæ omnes albicant, quod apud Italos frequens, aliquando maculis albis asperguntur. Reperitur quod nigricantibus lituris, aliquando purpureis signatur: quod verò apud nos vulgatissimum nullis maculis notatur. Sic & pistillus colore variat, alteri purpureo, alteri ex albo luteo colore est.

Arum. *ἀριον* offic. Germ. Aronkraut; pflaffen-pint; Teutscher Zunder. B. Calvoer. Gall. Pied de veau, Vit de chien. Ital. Aro & Cigaro. Hispano, Josa de yaro. Angl. Cocholb pint vel Kampe; vel Aron. Hung. Vlatragulya quibusdam.

Arum in Hæturia & in agro Coritiensi frequentiss. prouenit in campestribus, in vineis, in semitis propter sepes, præsertim in maritimis Senensibus. In Bohemia in montibus quibusdam copiosum admodum prouenit minus, Matthiol. Arum cum maculis nigricantibus vbique viatum, vix dum hieme exacta folia edit, Lobelius.

Aron Monspelii mense Martio & Februario prouenit: Mense autem Iulio fructu vidi ferentè ad formam racemi. Basileæ etiã abundat. In Italia habet tres species Ari, vna cū maculis nigris, aliã luteis, tertiam sine maculis, vt Parauii, vbi Ianuario, Februario, Decembri, Martio: Ferrariæ cum maculis nigris in monasterio S. Domin. à L'Angeli, Bononiæ mense Aprili cū maculis pallidis in monte Appennino è regione S. Mammam: Genæq; passim in sepibus quã itur Lanis virens Martio. Montelgardis passim in sepibus virens Martio, Aprili produens florem. Collectum in Lysse spontaneum. Cum nigris maculis plantati in hort. Il. E. C.

Quærit

Quærit Io. Fabr. quid causæ subfit, quod Aron, vulgaris aliqui herba in vicino illo (Curie Rhericæ) tractu nusquam reperitur, cum tamen inde ad vnum milliare in maxima nescatur copia, respondet has aliâque causas ad occultâ naturæ vim reiciendâs, vel potius ad ipsum naturæ magistrum & artificem.

Ari autem radix, auctore Theophrasto, cibo idonea est: & folia eiusdem (decocta in aceto mûdi nimirum possunt,) suavis profectò, & ad fracta utilis.

His addit Dioscor. Radix etiam decocta estur, quippe quæ minùs acris sit. Folia verò ad esum conuantur, & arida per se decocta manduntur. Radix, semen, & folia easdem cum Dracunculo vires obtinent. Priuatim tamen radix cum simo bubulo podagræcis imposita prodest. Ceterum eodem quo dracunculi radix modo reconditur, ac in summa ob mitionem quâ prædita est acrimoniam eius aprior est.

Plinius Ari vires medicas per longum exponit, quibus ex ipso recentendis superfedimus, eadem quæ habet ex aliis plenius tradidit.

Galenus ex terrea & calida essentia Arum cõstare dicit, & propterea extergendi vim habere, sed non forte in velut Dracontium. Esse igitur in siccano & calefaciendo priuè ordinis. Radices autem eius maximè vtilis sunt, inquit, & in cibo acceptæ crassos humores moderate sicant, vt exputationibus ex thorace idoneæ sint. Sed Dracontion ad hæc commodius est. Idem 2. de aliment. radicem Ari similiter vt Rapièci ait, ex aqua coctam, cum Sinapi aut aceto, oleoque ac garofolii quibusdam item in tritis, cum aliis, cum quæ ex calesco parantur.

Radix Ari, vt vult Tragus, eius maximè quod maculata habet folia, siue licca siue recens tusa, ac ad minùs drachmæ pondere sumpta, remediū est præsentissimum ac minimè fallax aduertis venenâ & peste: quidam tantundem adiciunt theriacæ. Succus herbæ expressus mensurâ cochlearis, aut maiore, potus, casum habet facultates: quod si illi parum acetii admiscueris, quominus linguam vellicet efficit: Atò in puluerem redactum, ac interdum drachmæ pondere cum binis sacchari drachmis sumptum, suspensionis prodest, crassam enim & lentam pituitam incidit, excretionibus iuuat, pulmonum & pectoris vitia purgat & ad tussim est maximè vtilis: idè remediū stomachum phlegmate, & atra bile infectum purgat: radix Ari siue recens siue arida, tusa ac sumpta, mulieres à partu validè purgat, potestque hoc pacto & iumentis purgandis exhiberi: eadem succus expressus & aqua destillata possunt. Tradunt etiam aquam Ari destillatam ramices sanare, singulis vicibus binis vncis aut minore mensura potam: ad pestem ac anthracè vix præstantiorem ac salubriorem herbam noui, ac folia Ari recentia imposita: eadem siue arida, siue viridia, ad inueterata & putrida pedum vlcera faciunt: aqua Ari & succus, quæuis vetera vulnera purgat sanatque. Ari folia cum radice in vino & oleo decocta, infectionibus calidis sicut sanant, & sedem præcidentem retrahunt: nonnullæ mulierculæ folia Ari catæis vermiculis scæntibus imponunt, quæ sit vt ab actis vermibus calèi hæc ratione à corruptione vindicari diutius durare possint.

Non desunt, inquit Matth. qui radicibus Ari Calozolari vtantur ad accendos a suis mensis Parasitos, & voraces Lurcones, carum puluèrem delicatis epulis admiscentes: nam vbi fauces oc-

Toni. II.

cupauerit, tam contumaci ardore afficit, ne posthæc quicquam vorare queat, nisi bubulo caprillouè lacte diutius gargarizato, aut recentibus butyro sensim deglutito. Abstergit Arum, attenuat, aperit, incidit & prouocat. Decocta radix melle excepta, medetur pectoris morbis omnibus pituitosis, expectoratenim valentissimè crassas lentasque excreationes, idè que asthmaticos maximè iuuat. Datur elixa, vel feruentibus cineribus tosta, vtiliter tussientibus, ex amygdalino oleo. Idque belle quoque præstat lac potum, in quo radix ipsa fuerit incocta. Illinitur eadem, aqua prius elixa, epiphoris, fugillatis, inflammatisque tonsillis, fabacea farina addita, & destruo subacta. Subigitur quoque oleo, & tumentibus hemorrhoidibus eodem illinitur: Radicis succus excedentia & contumacia vlcera curat, quemadmodum & narium polypum (omnia vlcera succus, Plin.) folia ambusta sanant. Dantur vtiliter feminis drachmæ duæ ad menses edacendos, & secundas pellendas ex vino. Nostrates mulieres ex Ari radicibus stillaritiis aquas ad faciem parant, quas ad faciem erugendam illustrandamque magnis laudibus esturunt. Id quod etiam efficaciter præstat insolaus radicem succus, cerussæ speciem referens, quem Gerla vulgò nominant, is siquidem mirum in modum carnem splendorem, & candorem conciliat.

Nunc quid Porta importet videamus: Aron folia distincta maculis habet, de honestum Lunæ macularum imaginè. Dantur vtiliter feminum drachmæ duæ ad sciendos menses. In Aron figacis naturæ artificio multiplici membrana nuntius factus. Partus omnium animalium extrahit, naturæ ostio circumlitum (idem Plinius,) & feminis vel radicis drachmæ duæ in vini cyathis duobus sufficiunt, si à partu non purgatur, ad secundas trahendas. Efigies Ari fructus ibidem. Calculosis confert (Io. de Mont. expert.) Ari herbæ & radicis contusæ succus cum vini cochlearibus tribus, quinquies ieiuno ventriculo assumptus.

Patet autem ex hæcenus dictis falsum esse, quod scribit Fallop. tract. de med. purg. simpl. dicens: Neuter Dracunculus, scilicet nec Aron, nec alter, qui nostris Serpenteria dicitur, est purgatorius, quamuis secundum opinionem Melius purgè. Sed utriusque sit non sunt in vsu. Sed liceat hic subiungere, quod Odrat. verù esse contendit. Vrsum, inquit, tempore suis latibuli nihil edere certum est: quippe quod neque exeat: & captus ventre intestinòque mani videatur. Natant eius intestinum, per inedia in ta conuenire, vt ad ductum prope cohereat: Itaque Vrsum latebrâ egressum, primum herbam Arum dictam degustare, vt intestinum laxetur, & hiet.

Fallop. m. 1.

ARVM BYZANTINVM.

Cum ante aliquot annos huius Ari tuber cum aliis tuberibus bulbisque Constantinopoli allatis, Viennæ acciperem, inquit Clusius, hærebam, vtrum ad Ari, an Arisari genus referrem: deinde cum folia profetæ cepit, primis duobus annis pro Arisari latifolio habui; ducente me in eam sententiam foliorum quadâ similitudine. Nam ea conspiciebam satis ad Arisari latifolii folia accedentia, nec valde mucronata, sed potius orbicularem figuram referentia; nec radicem valdè dissimilem. Verum postquam ea augeri cepit, digitalem longitudinem adqui-

Descriptio

Vuu 1



fuit, multis tuberculis inaequalem, & vnicialem aut amplio- rem crassitudinem, multaque proles adnatas habuit: folia irem protulit longè maiora, ad Arifoliorum accedentia, nec illis minùs splendentia superne & inferne: eius autem florem duntaxat videre con- rigit anno 1596. licet toto octennio antè alu-

item, singulis annis nouo Vere emergentem, atque interdum etiam ante brumam. In Vernis tamen folijs quandam differentiam obserua- ham, non quod ad formam & figuram attinet, sunt enim illa prorsus similis formae, sed inaequa- lis magnitudinis & [quod valde mirabar] in qui- busdam plantis, licet ex eadem matre abruptis, (vnicum siquidem tuber Constantinopoli acci- piciam) folia erant nigris aliquor exilibus maculis distincta, alia minime: rum etiam flos co- lore variat, nam planta maculis nigris notata fo- lia habentes, penicillum purpureum folliculo in- clusum habuerunt, alia verò candicantem Maio mense anni 1596. Atque postrema folia ante bra- mam plerumque germinare solent, alterius nouo Vere duntaxat.

ARISARVM LATIFOLIVM quibusdam.

Cap. XXIX.

Descriptio



parte, quâ pediculo adherent vtrinque pinnata, Arifoliorum instar, sed obtusioribus & quasi orbicularis angulis: inrerque pediculus duas vnicias longus, multis rubris maculis distinctus

emergit, cui oblongus flos insidet, monachalis cuculli, siue Aristolochiae floris modo efforma- tus, amplior tamen, extremâ parte fusci coloris qui deorsum radiarum tendit, in caretis albus, caninum olens, pistillum obtusum, incuruum, & veluti ex cucullo prospiciens continens: radix rotunda, globosa, Aro minor, foris nigricans, in- tus alba, aliquando etiam tuberosa & oblonga, inriò dulcis, deinde acris, minùs tamen Arira- dice (licet Vereres contra sentiant) fibris ali- quot supra eam expansis, vt in Orchidibus. Aliud eius genus etiam inuenitur paulò amplioribus folijs, & rotundioribus aliquantulum atque mollioribus, pluribus tuberculis se propagans, oblongasque & crassas radicales fasciis in larum & obliquum spargens.

Arisarum [ex Diosc. sententia] exigua herbula est, cuius radix Oliuae magnitudinem implet.

Eius mentionem fecit & ipse Plinius. Aris [in- quir] in Aegypto nascitur, similis Aro, minor tamen, minoribusque folijs, & vtiq; radice, quæ tamen Oliuae grandis magnitudinem implet: alba geminum caulem, altera, vnum tantum e- mittens.

Arisaron multò minus Ato esse Galenus ait, sed eodem acrius, radicem verò Oliuae magnitudinem habere: eadem verba vt assolet, transcripsit Paulus, nec plura de ipso tradide- runt.

Apud Hippocratem in l. b. de articulis, legitur vox *deis*, sed non pro herba, verum pro instru- mento scobina appellato. Galenus autem in glo- fisis Hippoc. inquit *deis* *scobis* *ut* *in* *de* *scobis*, *aria* *de* *scobis* *ut* *in* *de* *scobis*. Dicit itaque Gale- nus, non solum instrumentum, sed etiam herbâ esse, quæ *deis* appellatur. Nec intelligendum est villo aliquo loco, *deis* vocem, pro herba apud Hippocratem repetiri. Hęc igitur *deis* *scobis* an sit eadem quæ *deis* *scobis*, pro cetto affirmari non potest.

Arisarum nihil aliud, quam Aron paruum esse purat Cornarius, quid autem per Arum patuum intelligat non demonstrat.

Corruptè, inquit Hermolans, nomen Arisari herbae Medici, vt ab ipsis iam non Arisaros sed Afarus dicitur. Est & Aris herba Hippoc. ne- qualis sit, & an pro Arisaro capienda sit, non constat. Arisarum Plinius Erim [Arim,] sed vt credit Marcellus, corrupta ex Arisaro voce, ap- pellat. Dubitauit in Plinian. castig. Barbarus di- minutia ne forma non Arisaros sed Aris, quasi paruum Aron vocanda planta hæc sit. Sed vo- candam Arisaron esse Paulus testatur.

Arisarum Veronenfium Plinii Aris. Virentis Arisari magna copia Lobel. & Penam donauit Francisc Calceolarius. Idem in Adu. quod mirum ex Matthiolo iconem assument: ac applicant A- risaro suo Veronenfium: Matthiolus tamen non dicit suum Arisarum à Calceolario missum esse, cur igitur Matthioli figuram adaptant suo Arisa- ro Veronenfium, an quia Matthiolus dixit Arum minus missum per Calceolarium: cur in Belgio farum describunt, aliter quam viderint: flores tribuentes, quos non vident, quandoquidem ex radicibus quas dedit Calceola- rius aliam formam assecutæ sunt progressu tem- potis, indicium est Lobelium & Penn. suam des- criptionem concinnasse ad iconem Matthioli, quam pro sua ponunt præterito eius nomine, & non ad plantam quæ creuit in Belgio: nec pla- cet sanè libro Iconum Plantini, figuram Lobelii ex Ada.

Querit Io. Fabr. quid causæ subit, quod Aron, vulgaris aliqui herba in vicino illo (Curie Rheticæ) tractu nusquam reperitur, cum tamen inde ad vnum milliæ in maxima nascatur copia, respondet has aliâque causas ad occultâ naturæ vim relictas, vel potius ad ipsum naturæ magistrum & artificem.

Ari autem radix, autore Theophrasto, cibidonea est: & folia eiusdem decocta in aceto mândi nimitum possunt, inaus profectò, & ad fracta utilis.

His addit *Dioscor.* Radix etiam decocta estur, quippe quæ minùs acris sit. Folia verò ad esum conduntur, & arida per se decocta manduntur. Radix, semen, & folia eadem cum Dracunculo vires obtinent. Priuatim tamen radix cum vino bubulo podagricis imposita prodest. Cæterùm eodem quo dracunculi radix modo reconditur, ac in summa ob mitionem quâ prædita est acrimoniam eius aptior est.

Plinius Ari vires medicas per longum exponit, quibus ex ipso recentibus sup. videmus, eadem quæ habet ex aliis plenius traditur.

Galenus ex terrea & calida essentia Arum cõstare dicit, & propterea exurgendi vim habere, sed non forte, velut Dracontium. Esse igitur in siccano & calefaciendo primi ordinis. Radices autem eius maximè viles sunt, inquit, & in cibo acceptæ crassos humores moderate fecant, vt exspuitionibus ex thorace idoneæ sint. Sed Dracontion ac hæc commodius est. Idem 2. de aliment. radicem Ari similitur vt Rapediat, ex aqua coctam, cum Sinapi aut aceto, oleoque ac garotici quibusdam item intritis, tum aliis, tum quæ ex calesco parantur.

Radix Ari, vt vult Tragus, eius maximè quod maculata habet folia, siue sicca siue recens tusa, ac ad minùs drachmæ pondere sumpta, remediū est præsentissimum ac minime fallax aduersus venenum & pestem: quidam tantumdem adiuicium theriacæ. Succus herbæ expressus mensurâ cochlearis, aut maiore, porus, eadem habet facultates: quod si illi parum aceri admiscueris, quominus linguam vellicet efficit: Acon in puluerem redactum, ac interdum drachmæ pondere cum binis sacchari drachmis sumptum, suspensios prodest, crassam enim & lentam pituitam incidit, excreationes iuuat, pulmonum & pectoris vitia purgat & ad tussim est maximè vtilis: idè remediū stomachum phlegmate, & atra bile infectum purgat: radix Ari siue recens siue arida, tusa ac sumpta, mulieres à partu validè purgat, potestque hoc pacto & iumentis purgandis exhiberi: eadem succus expressus & aqua destillata possunt. Tradunt etiam aquam Ari destillatam amices sanare, singulis vicibus binis viciis aut minore mensura potam: ad pestem ac anthracè vix præstantiorem ac salubriorem herbam noui, ac folia Ari recentia imposita: eadem siue arida, siue viridia, ad iaueterata & putrida pedum vlcera faciunt: aqua Ari & succus, quous vetera vulnera purgat sanâque. Ari folia cum radice in vino & oleo decocti, infestationibus calidis ficus sanant, & sedem prociuentem retrahunt: nonnullæ mulierculæ folia Ari caseis vermiculis scætentibus imponunt, qui sit vt abactis vermibus casei hæc ratione à corruptione vindicati diuini durare possint.

Non desunt, inq. ut Matth. qui radicibus Ari Calozarii vtantur ad arcendos a suis mensis Parasitos, & voraces Lurcones, eorum puluerem delicatis epulis admiscentes: nam vbi fauces oc-

cupauerit, tam contumaci ardore afficit, ne posthac quicquam vorare queat, nisi bubulo caprillou lacte diuini gargarizato, aut recentibus butyro sensim deglutito. Absterge Ari, attenuatur, aperit, incidit & prouocat. Decocta radix melle excepta, in edetur pectoris morbis omnibus pituitosis, expectorari enim valentissimè crassas lentasque excreationes, idèoque asthmaticos maximè iuuat. Datur elixa, vel feruentibus cineribus tosta, vtiliter tussitentibus, ex amygdalino oleo. Idque bellè quoque præstat lac potum, in quo radix ipsa fuerit incocta. Illinitur eadem, aqua prius elixa, epiphoris, sigillatis, inflammatisque tonsillis, sabacea farina addita, & defrato subacta. Subigitur quoque oleo, & tumentibus hæmorrhoidibus cõnode illinitur: Radicis succus exedentia & contumacia vlcera curat, quemadmodum & narium polypum (omnia vlcera succus, Plin.) folia ambusta sanant. Dantur vtiliter feminis drachmæ duæ ad mentes educendos, & secundas pollendas ex vino. Nostrates mulieres ex Ari radicibus stillatitas aquas ad fucum parant, quas ad faciem erugendam illustrandamque magnis laudibus eferunt. Id quod etiam efficaciter præstat insolutus radicis n. succus, cerussæ speciem referens, quem Gerfa vulgò nominant, is siquidem mitem in modum carni splendorem, & candorem conciliat.

Nunc quid Porta impoeret videamus: Acon folia distincta maculis habet, de honestantium Lunæ macularum imaginè, Dantur vtiliter feminum drachmæ duæ ad ciendos menses. In Aro sigacis naturæ artificio multiplici membrana munitus fetas. Partus omnium animalium extrahit, naturæ ostio circumlitum (idem Plinius,) & feminis vel radicis drachmæ duæ in vini cyathis duobus sufficiunt, si à partu non purgatur, ad secundas trahendas. Elligies Ari fructus ibidem. Calculosis confert (Io. de Mont. expert.) Ari herbæ & radicis contusæ succus cum vini cochlearibus tribus, quinquies ieiuno ventriculo assumptus.

Pater autem ex hæcenus dictis falsum esse, quod scribit Fallop. tract. de med. purg. simpl. dicens: Neuter Dracunculus, scilicet nec Acon, nec alter, qui nostris Serpentaria dicitur, est purgatorius, quamuis secundum opinionem Metues purgè. Sed vtrūque sit non sunt in vsu. Sed liceat hinc subiungere, quod Odùt. verè esse contendit. Vrsum, inquit, tempore sui latibuli nihil edere certum est: quippe quòd neque exeat: & captus ventis intestinoque inani videatur. Narrant eius intestinum, per mediam ita conuenire, vt ad ductum propè cohereat: Itaque Vrsum latebræ egressum, primum herbam Arum dictam degustare, ut intestinum laxetur, & hiet.

Fallop. not.

ARVM BYZANTINVM.

Quam ante aliquot annos huius Ari tuber cum aliis tubetibus bulbisque Constantinopoli allatis, Vienna acciperem, inquit Clusius, hærebam, vtrum ad Ari, an Arisari genus referrem: deinde cum folia profectè cepit, primis duobus annis pro Arisaro latifolio habui, ducente me in eam sententiam foliorum quadâ similitudine. Nam ea conspiciebam satis ad Arisari latifolii folia accedentia, nec valde microtata, sed potius orbicularem figuram referentia: nec radicem valdè dissimilem. Verùm postquam ea angere cepit, digitalem longitudinem adqui-

Descriptio



issem, singulis annis nouo Vere emergentem, atque interdum etiam ante brumam. In Vernis rari-nen foliis quandam differentiam obseruabam, non quod ad formam & figuram attinet, sunt enim illa proflus similis formæ, sed inæqualis magnitudinis & [quod valdè mirabatur] in quibusdam plantis, licet ex eadem matre abruptis, (vnicum siquidem tuber Constantinopoli accipiebam) folia erant nigris aliquot exilibus maculis distincta, alia minime: rum etiam flos colore variat, nam plantæ maculis nigris notata folia habentes, penicillum purpureum folliculo inclusum habuerunt, alia verò candicantem Maio mense anni 1596. Atque postrema folia ante brumam plerumque germinare solent, alterius nouo Vere duntaxat.

ARISARVM LATIFOLIVM
quibusdam.

CAP. XXIX.

Descriptio



parte, quâ pediculo adherent vtrinque pinnata, Arisofoliorum instar, sed obrustioribus & quasi orbiculatis angulis: inrer quæ pediculus duos vncias longus, multis rubris maculis distinctus

suit, multis tuberculis inæqualem, & vnciam aut ampliorum crassitudinem, multasque proles adnatas habuit: folia item protulit longè maiora, ad Arisofoliorum accedentia, nec illis minùs splendèntia superne & inferne: eius autem florem duntaxat videre contigit anno 1596. licet toto octennio ante alium

emergeat, cui oblongus flos insidet, non achalis euculli, siue Aristolochiæ floris modo efformatus, amplior tamen, extremâ parte fusci coloris qui deorsum radiatim tendit, in cæteris albus, caninum olens, pistillum obtusum, incuruum, & veluti ex cucullo proficiens continens: radix rotunda, globosa, Aro minor, foris nigricans, intus alba, aliquando etiam tuberosa & oblonga, initio dulcis, deinde acris, minùs tamen Arisofoliorum (licet Veteres contra sentiant) fibris aliquot supra eam expansis, vt in Orchidibus. Aliud eius genus etiam inuenitur paulo amplioribus foliis, & rotundioribus aliquantulum atque mollioribus, pluribus tuberculis se propagans, oblongasque & crassas radicales sæpius in latum & obliquum spargens.

Arisarum [ex Dioscorid. sententia] exigua herbula est, cuius radix Oliuæ magnitudinem implet.

Eius mentionem fecit & ipse Plinius. Aris[quit] in Aegypto nascitur, similis Aro, minor tamen, minoribusque foliis, & vtique radice, quæ tamen Oliuæ grandis magnitudinem implet: alba geminum caulem, altera, vnum tantum emittens.

Arisaron multò minus Aro esse Galenus ait, sed eodem acris, radicem verò Oliuæ magnitudinem habere: eadem verba vt alloquitur, transcripsit Paulus, nec plura de ipso tradiderunt.

Apud Hippocratem in l. b. de articulis, legitur vox *arisa*, sed non pro herba, verum pro instrumento (cobina appellato). Galenus autem in glossis Hippoc. inquit *arisa* uocatur in *egypto*, *arisa* & *arisa* in *egypto* uocatur. Dicit itaque Galenus, non solum instrumentum, sed etiam herbam esse, quæ *arisa* appellatur. Nec intelligendum est villo aliquo loco, *arisa* uocem, pro herba apud Hippocratem reperi. Hęc igitur *arisa* non sit eadem quæ *arisa*, pro cæto affirmari non potest.

Arisarum nihil aliud, quam Aron paruum esse putat Cornarius, quid autem per Arim paruum intelligat non demonstrat.

Corruptè, inquit Hermolaus, nomen Arisari herbae Medici, vt ab ipsis iam non Arisaros sed Arisarum dicatur. Est & Aris herba Hippoc. nec qualis sit, & an pro Arisaro capienda sit, non constat. Arisarum Plinius Erim [Arim], sed vt credit Marcellus, corrupta ex Arisaro uoce, appellat. Dubitauit in Plinian. castig. Barbarus diminutiua ne forma non Arisaros sed Aris, quasi paruum Aron uocanda planta hæc sit. Sed uocanda Arisaron esse Paulus testatur.

Arisarum Veronensium Plinii Aris. Virentis Arisari magna copia Lobel. & Penam donauit Francis. Calceolarius. Iidem in Adu. quod mirum ex Matthiolo iconem assumunt: ac applicant Arisarum suo Veronensium: Matthiolus tamen non dicit suum Arisarum à Calceolario missum esse, cur igitur Matthioli figuram adaptant suo Arisarum Veronensium, an quia Matthiolus dixit Arum minus missum per Calceolarium: cur in Belgio satum describunt, aliter quam uiderint: flores tribuentes, quos non uiderunt, quandoquidem ex radicibus quas dedit Calceolarius aliam formam asseuerat sunt progressu temporis, indicium est Lobelium & Penn. suam descriptionem concinnasse ad iconem Matthioli, quam pro sua ponunt præterito eius nomine, & non ad plantam quæ creuerit in Belgio: nec placet sanè libro Iconum Plantini, figuram Labelii ex Adu.

ex Adu. vel potius Matthioli, & iconem Clusii poni sub vno titulo, ita vt sint vnius plantæ duæ icones. C. Bauh. Phyt. Arisarum Dioscor. Aris Plinio. Arisarum. r. latifolium maius, Arisarum latifolium alterum Clusii hist. Hisp. quod foliis est atroplioribus, mollioribus. Arisarum 2. latifolium: Arisarum latifolium primum Clusii. Arisarum latifolium Clusii, num idem cum Narbonensi Lob. Obs. Idem apud Matth. Arisarum Matthiol. Dracunculus alter, seu Hexicophyllos Cordi. Cordi Dracunculus nobis diuersus est ab Arisarum Matth. & est Arum Matthioli, de quo capite de Aro.

An Casalp. Aron paruum quod in locis asperis nascitur, & inter saxa pluriimum in monte Sancti Iuliani prope Pisas: &c.

Arisarum latifolium in collibus Lustanæ frequens salebrosus & lapidoso solo, in sepibus & iuxta vias: vbi Nouembri & Decembri floribus suis præditum cruebam, inquit Clusius, & arque etiam nonnullis Beturiz locis solo fecundo & pingui, secundum publicas vias & hortorum ageres, vbi Ianuario & Februario.

Arisari herba, autore Diosc. longè maioris est acrimonia, quam Arum. Vnde inposita nomas sinit. Colyria item ex ipsa fitur ad fistulas. Corrupte eadem indita conuisus animalis pudendum. Medetur vtraque [Aris Plinii] vlceribus manantibus. Item ambustis ac fistulis, colyrio immilla. No. nas sinit decocta folia in aqua, & postea rita rosacco addito. Sed vnum miraculum ingens cõtracto genitali, cuiusq; feminini sexus animal in perniciem agi. Amarus addit, multos tanquam pretiosissimi non secreto apud Germanos inferiores contra pestis contagia vti, quod fatis mirari non potest Clusius, quò in quoquidam eius tempore toti Belgio fuerit incognitum.

cium. *Lonic. Diosc. ἀρωμαξ*: Hisp. *Frayllilos yeruas*, id est Fraterculus: *Vilungheden*, vulgò genirale Monachorum. *Cast. Durant*. Pseudoarisarum. *Clus. Hisp.* Arisarum alterum & Arisarum angustifolium. *Gesner.* de hortis, Arisarum. *Anguill. epist. l. p. 176.* Arisarum foliis angustis. *Lobel.* Arisarum angustifolium cum fructu racemoso albo & corniculo purpurascente. Icon Pl. p. 559. Arisarum Angustifolium. *C. Bauh. Phyt.* Arisarum 4. angustifolium. Idem apud Matthiol. *Casalp.* Arisarum, corniculo cum sua theca purpureo.

Lobel. in hortis Belgicis, Gallis, & Anglis colitur. In Ericetis & Filicis Liguriæ præuenit. Anguillarius Matthiolo Patavio mihi, qui testatur est plurimum nasci in agro Romano: Hinc confirmatur quod Casalpini scribit, inter sepes non longè ab vrbe Roma inueniri. Clusius spore nascens, (vt ego qui sicum solum habeo foliū, quod Cortusius Patavii communicauit) non vidit, sed delatum in hortis aluit, vbi florere vidit Iulio & Augusto sine foliis fractum profert. Vix magis est latifolio Arisarum, neque tanta cura indiget.

Locus & tempus.

DRACONTIVM SIVE DRACUNCVLVS
Vetricibus & in genere.

CAP. XXX.

Δρακοντία, ὄζυζον (inquit Diosc.) aliis Aron, aliis Hæron, aliis Iaron, aliis Hieracium, [*isp. l. 10. 6.*] aliis Biaron, aliis Harmagion, aliis Cypreus, Romanis Colubra, aliis Maururia, aliis Singingialis: Caudem habet ignem, rectum, bicubitale, baculi crassitudine, varium colorem, vt Draconi similis sit, purpureis maculis abunde respersus. Folia fert Lapathi figura inter se impleta. Fractū producit in summo caule racemosum, cinerei primum coloris, vbi verò maturuit croce: ac punicei. Radicem habet magnam, rectam, albam, cortice tenui obductam.

De minore verò Diosc. sequentia prodidit: *δρακοντιον*, Dracunculus (alter Marcell. Dracuntium minus Hermol.) folia habet: Hedera figuræ, magna, maculas albas habentia, caulem rectum, bicubitalem, varium, anguem referentem, purpureis maculis respersum; crassitudine baculi: [quæ de caule hic posita, superflua sunt. Casalp.] fructus in summo racemosus, colore primum quidem herbaceo, maturus autem croceo, gustum mordens. Radix quodammodò rotunda est, bulbi speciem referens, Aro similis, corticem habens tenuem.

*Dracuncus
Im. alter.*

Plinius, qui Arum cum Dracontio confundit, plura eius genera facit. Nec sanè caret difficultate, ni quoque consulatione scateret, quod spartum Aëtius de Dracontio prodidit.

Dissonant aliquantulum in hoc genere Scriptores. Alii Dracunculum ab Aro separant, Alii idem existimant: Theophrastus Aro putauit genus esse sub quo species plures continentur: Dioscor. quatuor videtur fecisse genera. *Dracuncus maior*. *Dracuncus minor*. *Arum arisarum*: Serpentariam sunt qui vocent: Est & herba apud Hippocratem Ophis vocata cuius semen muliebribus medicinis vtile dicit. Quæ autem eadem sit cum Dracontio satis non constat. Idem Hippocr. Candidam radicem cum nominat Dracontii radicem, vt Gal. vult intelliges. Galenus, Paulus, Apuleius, Serapio, non nouerunt, nec cum & ni-

ARISARVM ANGVSTIFOLIVM.



Folia huius longa sunt, & angusta, instar ferè Plautaginis angustifoliae foliorum, viridia, splendens, quina, aut sena, post quas folios seu cucullus longior & mucronatus, retroflexus & albicans prodit, è cuius rima oblongus veluti vernis exilit, spithamæ interdum longitudinis, inæquus, coloris aut purpurascens, aut ex purpureo virescens, non ille quidem obrufus extrema parte, sed mucronatus: fructus racemi instar confertus, albus (non ruber, vt quidam) qui non obseruarunt, prodidit: vix terrâ emergens suo tempore sublequitur.

Huius picturam Matthiol. sub titulo Arisari alterius exhibet, non quòd probet (non enim vnum putat) sed vt de hoc aliorum etiam sit iudicium. Toin. II.

norem Dracunculum. Accredit Marcell. vnum tantum à Dioscorid. traditum, quamuis in cunctis & antiquis. Græcorum codicibus vtrumque eius caput legatur. Nos vnum tantum Dracunculum nouimus & quale exceptis foliis Diosc. in vtroque capite describit: nouimus & Aron. Quam Plinius triplex Dracontium sibi demonstratum esse dicat, Galenus autem vnum tantum norit, idque a ro simile videtur Cornario in Diosc. supposititium esse alterum caput, quod Dracunculum maiorem describit, ideoque ipsum hoc loco exemit. Nam omnino de eodem eadem traduntur, sed diuersis verbis, vt ex alio Scriptore id caput adscriptum esse appareat. Multi apud omnes tandem momenti sūt, quod vt Lugd. refert, in vetustissimis Latinis codicibus, vnicum duntaxat habeatur Dracunculi caput, alterius vestigium nullum.

DRACUNCULUS VNUM
Diosc. supposititium.

Dracontia duo, præter tertium, quod in aquatilibus locis gignitur, facit Dodon. maius & minus, & pro minore, quod non conuenit, Ari figuram proponit.

Apuleius Dracontion Draconteam appellat, & multa eius peregrina adfert nomina, quæ an maiori vel minori aut vtrique conueniāt, non explicatur: vt Pythonion, Alecepias, Anchomanes, Sauchromaton, aut Sauctomaton, Therion, Schoemos, Dorcadion, Thyphonion, Crocodilion, Theriophonon, Eminion.

Alterum caput, Dracontii maioris nomine inscriptum, quod neriō à nonnullis inter Dioscor. notha repositum est, tanquam legitimum agnouerunt, Orbasius, Marcellus, Matthiolus & Anatus Lusitanus; ac illud quidem priore loco collocant, hoc verò posteriore. Ego verò [Anton. Sarrac.] cum Serapione illud alterum, quāuis in codicibus nonnullis occurreret, cōsulcō prætermittit, tāquam supposititium, & ex Crateue, aliusue fortasse cuiuspiam scriptis perperam contextui Diosc. adiectum: maxime cum in vtroque capite diuersas quidem vtrunque voces, & vnam tamen eandemque historiam animaduertem. Si etenim singula expendamus, vix aliud occurreret discrimen, quā quod Dracontii folia Diosc. hederæ comparat, ille quisquis sit, lapatho: Itemque colorem fructus à principio herbaceum agnoscat Diosc. [falsò enim in Aldino exemplari & apud Orib. *χαλκίδι* legitur, *ἀπὸ τῆς χαλκίδος* ille *σπέρματι δὲ*, hoc est cinneraceū. Sed fortasse Diosc. ad folii colorem, leuorem, firmitatemque: ille ad eiusdem longitudinem respexit. Cætera, siue descriptionem siue vires spectes, serè consentiunt.

Porro si duplex est Dracontiam, quemadmodum Veteres testari videntur inscriptiones, maius inquam & minus: maius Dracontium id agnoscere possumus, quod in plerisque hortis visitur, Autoris nostri descriptioni aptè conueniens: minus verò, Aron passim circa sepes nasci solitum: Sic enim Serapio Dracontii duo constituit genera, vnum quod Dracontium simpliciter, alterum quod Aron appellaretur: ac idipsum inuere quoque visus est Theoph. dum tradidit Dracontii genus quoddam Aron appellari. Attamen quoniā cognatæ ac congeneres sūt hæ plantæ, ac viribus etiam iisdem præditæ, earum nomina nihil mirum apud Plinium & alios rei herbariæ Autores ferè omnes passim confundi: quod vel ante sua tempora factitarum testatus est ipse Plinius, lib. 24. cap. 16.

Δρακύνιον & *δρακύνιον* siue *ἰουγεν* Diosc. Lat. quibusdam Serpentaria, Dracontium & Columbrina: Arab. *Luf*, *Alluf*, Germ. *Schlangenfräut*:

Watterwurz & Drachenwurz Belg. Spectroscote, drachenvortele / Gall. *Serpentaire ou Serpentine*. Ital. *Dragonica*, *Serpentina*: Hispan. *Tragontia*.

Nomen quidem *Schlangenfräut* (Serpentaria) à figura sumpsit: caulis enim glaber purpureisque respectus maculis, verticillorū tacie corpus anguinum repræsentat: vel à cauda, quæ illi subtrita est & Draconis intorti in modo, inquit Herinolaus.

Dracunculus maior & minor Dioscoridis in vmbrosis circa sepes & maceris gignitur. Colligitur dum maturefcit, & succus exprimitur siccatque in vmbra. Radix quoque melibus (Herdeo maturefcente, Luna crescente Hermol.) elorāque particulatim concidit, & funiculo transfixa siccati in vmbra, atque ita recondi, solet.

Maior Diosc. Dracunculus excalefacit cum commixto vino. Elixix & tostus è melle in eclegma datur Orthopnoicis, tullientibus, ruptis, conuulsis, distillationibus pituitæ. In vino sumptus cupiditates ad Venerem mouet. Vlcera cacœthe phagedenæque sanar subactus cum melle aut illitus: maxime si cum vite misceatur alba. Collyriis quoque vtuntur ex eo factis ad fistulas cum melle. Item ad partus eliciendos. Vitiligines cum melle abigit. Polypos in naribus & carcinomata omnium generū dissipat. Succus ipse oculorum medicamentis asciscitur: caligines, nubes, & albugines discutit: herba & radix grauidis, quæ recens conceperint, abortum olfactu inferunt. Idem præstat triginta feminis granarū, vtrique si bibantur in posca. Quidam succum infundere cum oleo aurium dolori. Folia seu spissantia imposuere vulneribus etiamnum cruentis, sicut in vino decocta perniones habentibus. Eum qui folia manibus contriuerit ferri posse à serpentibus negant. Radicem quoque omnino habentem effollam animalia eadem fugiunt.

Expressus verò è minoris Dracunculi semine succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat: naribus etiam ex lana impositus, polypum abluunt: carcinomata illitu silit: triginta eius granarū, si in posca bibantur, abortus inferunt, odorem autem postquam flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare: radix excalefacit: orthopnoicis, ruptis, vullis, tussis, distillationibus, auxiliatur: humores peccoris excreta faciles reddit, siue cocta tostaque eum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delingatur: vrinam pellit, Venerem excitat, cum vino potus, Phagedenæ vlcera, & quæ cacœthe vocantur, tritus cum melle & Bryonia alba, expurgat, & ad cicatricem perducit: collyria ex ipso ad fistulas & enciendos partus fieri solent: qui radice suas manus perfricauerunt, à Viperis ferri negantur: illita ex aceto vitiligines emaculat: folia recentibus vulneribus linamentorum vice, conuenienter imponuntur: decoctus in vino permonibus appositus prodest: cascus foliis inuolutus, à putredine defenditur. Succus radicis ad nubes, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda coctæ, ad sanorum vitis, pro olerè recipitur: in Gynasialis insulis, quæ Balæares vocantur, coctam radicem cum melle multo in coniuuiis placentarum loco offerunt.

Dracontium teste Galeno, quiddam Aro persimile obtinet tum foliis tum radice: cæterum illo tum acris, tum amari: ac proinde calfacto-rium magis è tenuiorum partium: habet etiam leui-

leuculam quandam adstrictionem: cetera ad eadom ferè cum commendat ad quæ Dioscorides: addens fructum valentiorum esse non foliis tantum, sed & radice.

Idem Gal. 2. de Aliment. Dracunculi æquè atque Ari radices bis tereue elixatas, iis interdum in cibo offerri tradit, quibus crasserum lentiorumque humorum copia in pectore pulmonibusque congesta est. At Theophrast. lib. 7. hist. stirp. Dracontii radicem ad cibum ineptam ac prorsus medicamentosâ facultate præditam esse tradidit, hisce verbis: Radix Dracontii, & esui inepta & medicamentosa existit.

DRACUNCVLVS MAIOR VVLGARIS.



DRacunculo maiori profunde in terra depacta radix eius ferè orbiculata, volam implens, cuius lateribus parui bulbi plures, quibus le propagat, adnasci consueverunt, foris colore rubexo, intus candido, sapore feruido: caulis vnicus, rectus, pollicaris & crassior, cubitos duos altus, miraculosa colorum tergora

affabrè mentiens, è runcis conuolutis constans: ipsa verò folia pediculis dodrantalibus fungosis donata, in segmenta digitata finduntur, læuore & splendore Ari, crassitie & colore pari: è quorum medio eluctatus caulis vix digiti minimi crassitudinem æquat, è cuius scapo vagina pedalis exit, colore foris herbaceo, intus in purpura rubente, è sinu pistillum promens nigrum Ari pistillo maius, in mucronem acutiorem desinens: subsequitur fructus racemosus, granis per maturitatem rubentibus: Olor floris valdè fatidus.

Vtrumque (si Diis placet) Dracunculum Tridenti & Venetiis vidit Matth. Alterum quidem seu minorem & omnibus vulgarem, dicit esse foliis Hederaceis, albis quibusdam maculis conspersis. Nihil video similitudinis cum foliis Hederæ in Dracunculo maiori vulgari, quicquid dicat Matthiolus, repetens Dioscor. verba pro re à se visa, idque suo more.

Amato addita est per Constantinum icon Dracunculi Fuchsi, non tamen existimo Amatam hunc tradere, quin puto necire quid scribat.

Scribit Anguill. Veteribus fuisse duo genera Dracunculi, ex Crætea additum Dioscoridi caput de maiore, quod non sit ex textu demendum ve adulterinum. Dracunculum hunc maiorem esse Serpentariam nostram communem, nec hanc esse Dracunculum minorem Diosc. Videri Theophrast. de hac Serpentaria communi loqui lib. 7. cap. 11.

Dracunculi seu Dracontii aut Serpentaria: Species duas statuit Gesner. hort. cuius vnam in appendice tradit, quam vocat Dracunculum minore.

Theophrast. Dracontii lina.

Dracontia, Serpentaria maior quàm sit Diosc. Dracontium maius (aiunt Lob. & Pena) nullus inficias ibit. Nec vniuerso tractu Græcæ vlla alia Serpentaria &c. Nouellæ plantæ potuerunt Plinio persuadere plures vt constituerit species Dracunculi, miscerèq; Ari ac Arisari cognatas differencias, vt in Bechio aliisque locis illi contigit. Nec alterius plantæ videtur geminata descriptio apud Diosc. sed ab alio quopiam, paulùm diuersè descripta.

Diosc. gē. minuta dō. scripto.

Tabern. icon. Dracunculus minor. Klein Dracunculus aut Schlangeneurz.

Gerard. Angl. Dracontium maius, Great Dragens.

B. Bauh. Phyt. Dracunculus 2. polyphyllus, qui Diosc. maior videtur & Plinii. Apud Mart. idem.

Dracunculus maior apud Flandros & Gallos, Italosque, procerè crescit, inquit a matris. Nos variis locis obseruauimus.

Testis est Lobelius in Anglia aquam è foliis Dracunculi stillatitiam cum aqua Dracunculi cæsculenti, grassante peste, in via esse ad sudores prouocandos, si vtriusque ῥjss. cum Theriaca ῥj. sumatur. Dracontium calidum & siccum in secundo ordine esse dicit A. narsus, & alium quoque tentare, idque experientiam quotidinâ indicare, idèq; Manardum minus benè Mesuem taxare certum esse. Dracunculum viri habere aduersus serpentes scribit Io. Fabr. cuius rei argumento esse possit, caulis eius leuis, verficolor, maculis purpureis distinctus, ita vt angui similis videatur, quin & florem habere mirabilem, ori hianti exoræque lingue similem, sicut & Aron. Reliquæ vires antè tradite fuere.

Vires.

Manardii repræ.

DRACUNCVLVS AQUATICVS.



Non bulbosam aliorum Dracontiorum Arique more, radicem habet; sed digitalis crassitudinis, prælongam, geniculatam; transuerso situ limoso palastrostrum locord solo incumbetem, cui higitur ex articulis demissa fibrarum sobole numerosa, botrychi seu cincini instar. Folia ex iisdem enascuntur geniculis dodrantalibus hærentia, Hederaceis paria, figura quoque similis, nullis per ambitum angulis, in acumen desinentia, polita, venosa: in folii sinu, quod summo cauli innascitur, racemosus comprehenditur, ei similis quem Aron profert.

Descripta

scuntur geniculis dodrantalibus hærentia, Hederaceis paria, figura quoque similis, nullis per ambitum angulis, in acumen desinentia, polita, venosa: in folii sinu, quod summo cauli innascitur, racemosus comprehenditur, ei similis quem Aron profert.

Bellon. Ob. lib. 1. cap. 18. Dracunculus folio hederæ. Apud Cordun in Dioscor. quidam ar-

notat : Est ex alia species Dracunculi. Plinio wasser aren. Cordus in hist. lib. 1. c. 28. Dracunculus palustris. Fuchf. Icon. Dracunculus Plinii tertius, wasser Schlangentraut. Matth. Epit. cum Camer. addit. Dracunculus aquaticus, Italis *Serpentaria aquatica* : Germ. wassertraut. Turn. Dracuntium tertium variis in locis Germ. prouenit, ubi uocatur Flein Schlangentraut / in Anglia uero minime. Gesner. hort. Aron palustre Coldenb. Camer. Hort. Dracunculus aquaticus Plinii. Castor. Dur. Dracunculus aquaticus Italicus : *Serpentaria aquatica*. Dodon. Gall. Dracunculus palustris, quibusdam Arum palustre. Gall. *Serpentine d'eau ou aquatique*. Belg. *Drasfenworte*. Germ. wasser Schlangentraut / wasser Drasfenwurtz / hist. Lat. in fol. p. 329. Dracunculus aquaticus & palustris non abs re. Perperam uero Hydropiperi rubens dicitur. Describitur istud Dracuntium à Plinio l. 2. c. 16. & tertia eius species est. Lob. & Pena Adu. Aquatica Anguina siue Dracunculus. Ic. plant. Dracunculus arundinacea radice Plinij. Hist. Lugd. Herbarijs Dracunculus palustris, quem Arum palustre alij uocant. Gall. *Serpent arce d'eau ou aquatique*. Tabern. Ic. Dracuntium palustre, wasser Drasfenwurtz. Gerard. angl. Dracunculus aquaticus, wasser Dragenus.

C. Bauh. Phyt. Dracunculus 3. palustris, arundinacea radice Plinij. Item apud Matth. Dracunculus aquaticus.

Locus & Tempus.

Dracunculum aquaticum uidi anno 1595. mense Iunio in horto D. Sprengeri, postea habui Argentiarum ex plantis siccis D. Aggerij. Freriam C. Bauh. misit pulchram plantam uiccam, quam accepit Hamburgo, nascitur uirginosis palustribusque locis, & in ipsis paludibus ac pigris camporum riualis : solo macro & putrido maxime gignitur : pingui uero & lutofo nondum mihi uisa est nasci : Cordus. Iuxta riualos & labentes aquas frigidarum & calidarum regionum, ut in Belgio, Northmannia, Apuleia, & Hispania Granata, sponte emergere asserit nobis, qui in hortos suos transplantarunt : Lobelius.

Vires

Facultas huius Dracuntij aquarici, aliorum, atque ipsius Ari similis est, sed minus potens, minusque efficacis uidetur. Dodonæo & Matth. in Epitoma. autoribus.

COLOCASIA.

CAP. XXXI.

Descrip.



Radix tuberosa duplex, altera alteri imposta intercedere ceruice, ut lagenam imitari uideatur, alba, vesca, fibris adnatis se propagans; filia terna aut quaterna, Nymphaeae honorum figura & magnitudine, longis utrinque subrotandis alis, similiter donata, crassa

laeua, sed a uersa parte nerui obliqui in marginibus excurrunt crassiusculi, à neruo per longum discurante producti, quos uenulae intercedunt vindunt, pediculus autem crassus non extremo folij, sed aliquot digitos integro folio inseritur.

Meminit huius Theophrastus lib. 4. cap. 10. de plantarum historia, ubi ita scribit. Faba Aegyptia in paludibus, quaternae cubitae perficit : crassitudo digitalis est, similis calamo molli, non genicularo. Rimas intrinsecus habet tendentes per totum lili modo. Caput in cacumine orbiculari, uel parum fauo noui ab simile, inque singulis cellis linguatae fabae continentur, paulo super id eminentes, multitudine plurimum tendent. Flos papauer duplo maior colore roseus in plenum caput. Super aquam folia ad singulas fabas amplexa exeunt, fabam quamque conercenti amarum illud, ex quo pilula fit, inflexum patescit. Fructus ita se habet. Radix illi crassissima, harundine plenior, rimas similiter atque caulis habens : manditur & cruda, & elixa, & asca : coque cibo, qui incolunt paludes, vruntur. Nascitur itaque sponte uel plurima, exterum & seritur in limo palcis largè admixtis, ut descendat, in eo raptaque maucit sicque fabera faciunt. Si autem se mel apprehenderit, perpetuo manet. Radix enim ualida est, nec procul harundinum stirpibus, uerum spinis subhorrens. Quamobrem eam Crocodilus refugit, ne occurrere oculo offendantur, quoniam acute non uider. Nascitur haec etiam in Syria, Ciliciaeque. *habetur Theophrastus.*

Hanc amplissima emittere folia tradidit Plinius libro 21. cap. 15. ubi sic inquit. In Aegypto nobilissima est Colocasia, quam Cyamon uocant aliqui. Hanc à Nilo metunt : caule cum coctus est araneofo in mandendo : thyrso autem, qui in folia emicat, spectabilis : folijs latissimis, etiam si ad arbores comparatur, ad similitudinem eorum, quae Personata in nostris annibus uocantur. Adeoque Nili sui doribus gaudent, ut implexis Colocasiae folijs, in uariam speciem uasorum potare gratissimum habeant. Scribitur iam haec in Italia. *haec Plinius.*

Aegyptia Faba [ut Galenus auctor est libro primo de alimentis.] sicuti nostratrum magnitudine longè praecellit, ita & naturam humidiorum, magisque excrementitiam sortita est.

Colocasiam quae Aegyptiis *Culeas*, nemo floribus uel fructibus uquam praeditam uidit : unde semper multum miratus est Alpinus Dioscor. Aegyptiam Fabam flores atque fructus ferre, & eam item Colocasiam esse prodidisse.

Arum Aegyptium, Aegyptiis hodierno die Colocasia mella, Camer. horti. Viennâ, in alterum annum egregie uirebat, totaque planta acerrimi erat saporis.

Fabam Aegyptiam Matth. eandem cum Colocasia uulgo dicta nostro seculo non dabaturus esse, quamuis Matth. duos asserat diuersas plantas. In Faba eius Aegyptia flores & semina ad descriptionem picta esse asserimus, donec nobis aliquis ostendat plantam cum folijs Colocasiae uulgaris & cum similibus floribus & seminibus.

Arum Aegyptium Gesner. horti eruditiores quidam, ut Guilandinus & Marantha esse docent, quod aliqui nuper pro Colocasia habuerunt. Matthiolus hanc Fabam Aegyptiam existimauit.

Ari speciem illam [inquit Marantha] quam Aegyptium Arum eruditiores appellant : Colocasia

casiam bona pars materix medicæ Professorum esse omni asseueratione asseruat, quæ cum in Aegypto, nec non in Sicilia (vt audio) perfectissimè crescat, omnèsq; sui partes compleat: in Italia tamen neque semen, neque florem, neque etiam caulem vnquam squauius diuersis locis cõfita à multis sit; vel certè raro proferre est vis: hinc effectum est, vt eos multi acriter damnarèt, qui illam esse Colocasiam contenderent: nisi hoc solum argumento, quòd hæc planta caulem non proferat [quod non loci ratione, vitioque, in quo hæc formatricem vim debilissimam habet, neque vterius quàm ad folia extendenda potest, sed suapte natura cuenire existimabát], quasi verò si caulem proferret, Fabam Aegyptia dici debeat. Ergo hi rectè quidem [vt me fert opinio] illos reprehendunt, vt qui in errorem delabantur: sed non rectè reprehensione vtuntur: quando illa planta inter Ari species recensenda omninò sit: quod ex foliis & flore, quem nobis licet videre, à Luca Chino viro nobis inprimis charissimo, dum viueret, missum: qui, præter magnitudinem, nullam ab Ari flore dissimilitudinem habebat.

Anguillar. qui Colocasiam nostram asserit Fabam Aegyptiam Theophrasticeorum argumenta refutat qui aliter sentiunt: ridet aliquos qui attribuit semini quæ Dioscorides radici &c. De radice spinosa aliter scribit quàm Bellonius Obs. cuius verba hæc sunt: Colocasia in Creta & in Alexandria proveniens nominatur etiam Lotus & Fabæ Aegyptia. Perquisiuimus cur Vereres vocarint Fabam Aegyptiam eum nullas Fabas ferat. Erroris occasionem inuenimus, nempe quòd Herodotus de duabus plantis locutus sit ad Nilum provenientibus, quarum vna radicem habebat rotundam quæ erat Colocasia: Altera in capite quondam ferat quiddam Oliuaræ nucleis simile: reliqui post eum aurhores alter alreius vestigia sequentes ad arbitrium deinde descripserunt. Nam quod Theophrast. radicem illi spinosam tribuit, rem aliter se habere experientia ipsa docet. Diosc. Fabam Aegyptiam describens Theophrastum ferè fecutus est, & vtrumq; interpretatur Plinius. Facessant, inquit, Clusius qui Colocasiam siue Fabam Aegyptiam esse negant, quia flore & fructu caret, sed Arum Aegyptium esse cerebròsè & pertinaciter contendunt. Item apud Garciam: In hæc Lusitanis vocatur planta quædam amplissimis foliis, et si nonnulli Arum Aegyptium esse censeant, Colocasia potius nobis videtur.

Obel. & Pena Adu. Fabam Græcam & Aegyptiam apprime olim innouisse Theophrasto & Dioscoridat certum est. An vero sit ista quam Commentator sibi persuasit, fides sit penes Bizantiam picturam, quam subannant aliqui. Nos flores (legendum folia) & bulbi, Aromatis speciem esse monuerunt. Et vtinam otium non defuisset Matthiolo, quum illi ostendebatur vera Colocasia, nã ille accuratius stirpem verbis expressisset. Obel. Obs. figuram habet hoc titulo, Colocasia siue Fabæ Aegyptiæ species, Arum Aegyptium Dodon. & Recentiorum, Hisp. Mant. de nostra Senora, Icon. Pl. p. 59. Teut. 706.

Hist. Lugd. Lotus Aegyptia Dodon. Bry fratres Ind. Orient. par. 4. Icon pag. 15. Talasse, Arum Aegyptium Colex.

Dodon. in fol. pag. 326. & pag. 563. eam sub Aro Aegyptio & sub Loro Aegyptia pingit & describit, inquit C. Bauh. apud Marthiolum.

In Creta ad magnos riuos copiosam reperit

Bellon. Colocasiam spontè sine culturâ provenientem. Aegyptii quotidie ferè vescuntur: dicitur Colocasia, quæ per totam Aegyptum magni est reditus: nihil venalius, inter Gazaro & Rama: inuenit idem Colocasia abundantem plantitiam quam aquâ ex puteo rigabant. Er hæc quidem spatim traduntur à Bellonio. Apud Aegyptios non secus quàm nostri (inquit Alpinus) Rapis, agri Colocasis pleni, ibi spectantur. Belgio satam hiemis scæuitia deleuit. Frequens est multis Lusitanis locis circa riuos, ex Africa primum eò delata: vidit Clusius etiam omnium maximam & amplissimis foliis Hispani in horto arcis Regiæ, vbi que tamen & florem & fructum ferè negabant. Rauuolf. qui illam toto anno venalem Tripoli Syriæ conspexit, vt quâ incolæ frequenter vescantur, & tanta copiâ in Halepoli asserit, vt eius radice, non minor numerus hominum alatur, quàm in Germania rapis, licet illis, & flauâ pastinacâ non careant: addit in riuulis spontè nascentem obseruasse, florem autem vel fructum nunquam vidisse. Nullis etiam blâditis florem posse prolici tradit Lobelius. Colocasia est nobis in horto Ill. E. C. Moutbelg. Stutgardia delata, quæ facillè se propagat, vtrum Hieme reponenda.

Aegyptii Culcas radices in iure coctas atque alis multis modis in cibis paratas assidue cõtât, & eas tum crudas, tum coctas libentiss. Vires & Vius
Veni indulgentes mandunt, qui putant tum semen multum gignere, tum libidinem præualidè excitare, Alpinus. Per Lusitaniam valdè à mancipiis Aethiopiibus experitur, eaq; crudâ & coctâ vescuntur.

Aquam coæruans planta.

Apud Siberos nationem Americam inuenitur radix quæ supra terram eminent, amplissima habet folia, in quibus aqua continetur, non secus ac si in vase aliquo asseruaretur, vt emanare facillè non possit. Quin & ex radice dimidium sæpè cantharum aquæ expressit, Benzo.

In regione Saboris reperit Vlt. Schmidel. de nauig. Amer. nò. paucis in locis radicè extra terrâ protuberantem, quæ magna lara gerbat folia, aquâ referta, quam continent in tempus nec facillè effluit. Singule radices ferè mensuras dimidiatas continebant.

HETICH THEVETI. CAP. XXXII.



Hetich Theveti auctore Thæveto de Gallia Antartica c. 53. duo reperiuntur generâ: alterum cocturâ flauescit, mali Cydonii instar; alterum vero albefcit: vtrique filia sunt Maluacæ: semen vero nullû fert: quo fit vt syluestres isti Americani in taleolas dissectis radicib. & terræ denuò commissis propagent

Radices quædam videntur.

Locus

Defect.

Americano solo frequentes sunt hæ radices. Non aliud ferè Americanis in vsum cibarium eedit: itaque æquè vulgaris illis ac nobis panis.

Ocimum Plin.
rad.
Vingum.

Hetich Americum, Ocimum esse Plinius lib. 21. c. 15. putat Dalech. apud Hist. Lugd. pro quo apud Theoph. lib. 1. hist. cap. 11. meudolè legit Vingum. Sic Plinius: Manduræ & Ocimum, cui pauca folia minimaque, verum radix magna. Theophr. verò Folia eius magna, germen breue, *εραξ* non vt Gaza pusillum] radix longa, sapore præstanti cibo idonea, quæ pro fructu colligitur, cum amnis in alueum redierit, coque Deorum aras coronant. Quæ autem Theophr. folia ampla, Plinius pauca & minima dixit.

Robert. Const. in Theoph. vocem *hetich* corruptam dicit à voce *etich* Theophr. ac depingi in America Obliquomodo describit Theoph.

C. Bauh. Phyt. Rapum Americanum.

FAALIM THEVETI HELENIO
foliis similis.

CAP. XXXIII.




Uterfuntur. Huius herbe experimentum se vidisse ait in duobus commoribus à serpente, partim in terra degente, quæ illic *Alefah* vocant: cuius morsus adeò lethalis est, vt nisi statim succus huius herbe admoueat, necesse sit hominem interire.

Hist. Lugd. Faalim Theuet.

BATATAS. CAP. XXXIV.

TRiabuius plantæ sunt genera, quæ Beticam peragrans oberuabam (inquit Clusius hist. poster.) colore externo inter se differantia, etiam gustus suauitate: nam aut cortex externus quodammodo rubescebat, siue purpurascens erat [& hoc genus præstantissimum indicabatur,] aut palleſcebat, aut albus erat: singula tamen genera albam interius carnem habebant. Producent autem illa Cucumeris siluestris modo *sarmentis* humi diffusa, satis crassa succulenta, læuia, quibus inhærent *folia* vtrunque carnosa, ex viridi canescentia, Ari foliis, seu potius Spinachii, haud dissimilia: *florem* an *fructum* ferat, è nemine intelligere potui; *radice* autem sic fatio: ea plerumque dodrantalis est, grandis raphani nonnunquam amplitudine, nam memini Londini me memente



parte obtusiores, deinde sursum progrediendo graciliores.

In Hispania [Indiæ] insula, vt Cardan. scribit, Batata folio est Hedere, radix admodum vtilis fetigetis loco: crescit altitudine Erythrodani.

Anton. Pigafetta in lib. Nauig. *Battades* in Brasiliæ insula.

M. Fumee in Hist. gen. Ind. Occid. quæ Batatas radices dulces.

Vt Lobelio Obs. fidus Clusius testis est, Batatas Hispanorum, siue Camotes, aut Amotes, foliis est scabris, & reptantibus, multis, Cucumeris æminis æmulis. Plant. Ic. p. 647. Batata Hispanorum, Camotes siue Amotes.

Quidam Ignam putant esse Theoph. lib. 1. hist. cap. 11. *το ἀξονδὲς* siue *εραξ* *εραξ*, non, vt apud Plinium legitur, Aracos. Satis conuenit hist. radices Theoph. nisi Theophrastus scriberet folium non habere, neque foliis quicquam simile.

An Veteribus, inquit idem Lobelius, fuerit cognita hæc planta Clusius hæretac propterea nullum nomen Græcum aut Latinum addit: Hispani *Batatas*, *Camotes* etiam nonnulli, aut *amotes*, quidam etiam *acies* vocant, tamen non nihil, vt aiunt, inter se differant, sitque *Batatas* radix longè tenacior & suauior, Qui plura de hac radice vult consular Scaligeri exerc. 181.

Nunc adeo frequentes sunt in Hispaniis, inquit Manardus apud Clusium, vt singulis annis è Velez-Malaga decem aut duodecim longæ naues, quas *Carauellas* appellant, iis onustæ Hispalim inuolantur. Seruntur verò aut minores integra, aut maiores in frustra concisæ, solo bene culto, & in suos sulcos ducto, feliciterque nascuntur: nã intra octauum mensem in eam crassitudinem excreſcunt, vt edî, & in alios vsus parari possint. Iplio verò Clusio auctore spontè nascitur in nouo Orbe, vicinisque Insulis, vnde primùm in Hispaniam delatam ferunt: nunc in multis Beticæ maritimis locis ferunt, vel integra, vel in *tafcolas* secta, principatum autem obtrinet Malacæ nata, quæ & Gades & Hispalim, inò Vlyssiponem etiam vsque deferri solet. Habuit is aliquoties in Belgio satis recentes, sed quæ germinare noluerint, inò breui corruptæ sint, frigidior nimirum regione. Sed & quas Londini eruebat, diuturniore morâ [nam Viennam deferre volebat] antequam telluri comittere posset, corruptæ sunt.

Bata-

tasiam bona pars materię medicę Professorum esse omni asseruatione affirmat, quę eum in Aegypto, nec non in Sicilia (vt audio) perfectissimę crescat, omnęque sui partes compleat: in Italia tamen neque semen, neque florem, neque etiam caulem vnquam [quauis diuersis locis cõsita à multis sit] vel certę raro proferre est visũ hinc effectum est, vt eos multi acriter damnarēt, qui illam esse Colocasiam contenderent: nisi hoc solum argumento, quod hæc planta caulem non proferat [quod non loci ratione, vitiõque, in quo hæc formaticem vim debilissimam habet, neque vterius quã ad folia edenda extendi potest, sed suapte natura cuenire existimabāt,] quasi verõ si caulem proferret, Fabam Aegyptia dici debeat. Ergo hi rectę quidem [vt mea fert opinio] Jillos reprehendunt, vt qui in errorem delabantur: sed non rectę: reprehensione vtuntur: quando illa planta inter Ari species recensenda omninõ sit: quod ex foliis & flore, quem nobis licuit videre. à Luca Ghino viro nobis inprimis charissimo, dum viueret, missum: qui, præter magnitudinem, nullam ab Ari flore dissimilitudinem habebat.

Anguillar. qui Colocasiam nostram asserit Fabam Aegyptiam Theophrasticeorum argumēta refutat qui aliter sentiunt: rider aliquos qui attribuunt semini quę Dioscorides radici &c. De radice spinosa aliter scribit quã Bellonius. Obscuius verba hæc sunt: Colocasia in Creta & in Alexandria proueniens nominatur etiam Lotus & Faba Aegyptia. Perquisiuius cur Veteres vocarint Fabam Aegyptiam cùm nullas Fabas ferat. Erroris occasionem inuenimus, nempe quod Herodotus de duabus plantis locutus sit ad Nilum prouenientibus, quarum vna radicem habebat rotundam quę erat Colocasia: Altera in capite quodam ferebat quiddam Oliuarũ nucleis simile: reliqui post eum authores alter alterius veltigia sequentes ad arbitrium deinde descriperunt. Nam quod Theophrast. radicem illi spinosam tribuit, rem aliter se habere experientia ipsa docet. Diolc. Fabam Aegyptiam describens Theophrastum ferę fecus est, & vtrumque interpretatur Plinius. Facessant, inquit, Clusius qui Colocasiam siue Fabam Aegyptiam esse negat, quia flore & fructu caret, sed Arum Aegyptium esse cerebrosę & pertinaciter contendunt. Item apud Garciam: Inham Lusitanis vocatur planta quædam amplissimis foliis, ceteri nonnulli Arum Aegyptium esse censent, Colocasia potius nobis videtur.

Lobel. & Pena Adu. Fabam Græcam & Aegyptiam apprime olim innotuisse Theophrasto & Dioscoridi certum est. An vero sit ista quam Commentator sibi persuasit, fides sit penes Bizantium picturam, quam subsannant aliqui. Nos flores (legendum folia) & bulbi, Aronis speciem esse monuerunt. Et vti nam otium non defuisset Marthiolo, quum illi ostēdebat vera Colocasia, ne ille accuratius stirpem verbis exptessisset. Lobel. Obsfiguram habet hoc titulo, Colocasia siue Fabæ Aegyptiæ species, Arum Aegyptium Dodoni. & Recentiorum, Hisp. *Mant. de nostra Seniors.* Icon. Pl. p. 59. Teut. 706.

Hist. Lugd. Lotus Aegyptia Dodon. Bry frates Ind. Orient. par. 4. Icon pag. 15. *Talasse*, Arum Aegyptium *Cels.*

Dodon. in fol. pag. 326. & pag. 563. eam sub Aro Aegyptio & sub Loto Aegyptia pingit & describit, inquit C. Bauh. apud Marthiolum.

In Creta ad magnos riuos copiosam reperit

Bellon. Colocasiam sponte sine culturã prouenientem. Aegyptii quotidie ferę vescuntur radice Colocasię, quę per totam Aegyptum magni est reditus: nihil venalius, inter Gazaro & Rama: inuenit idem Colocasiã abundantem plantitium quam aquã ex puteo rigabant. Et hæc quidem sparsim irradiantur à Bellonio. Apud Aegyptios non fecus quã nostri (inquit Alpinus) Rapis, agri Colocasiis pleni, ibi spectantur. Belgio fatam hiemis seuitia deleuit. Frequens est multis Lusitaniz locis circa riuos, ex Africa primum eò delata: vidit Clusius etiam omnium maximam & amplissimis foliis Hispali in horto arcis Regiz, vbique tamen & florem & fructum ferre negabant. Rauuvsolf. qui illam toto anno venalem Tripoli Syrię conspexit, vt quã incolę frequenter vescantur, & tanta copiã in Halespocoli asserit, vt eius radice, non minor numerus hominum alatur, quã in Germania rapis, licet illis, & flauã pastinacã non careant: addit in riuulis sponte nascentem obseruasse, florem autem vel fructum nunquam vidisse. Nullis etiam bladiis florem posse prolici tradit Lobelius. Colocasia est nobis in horto Ill. E. C. Montheig, Sturgardiã delata, quę facillẽ se propagat, vtrum Hieme reponenda.

Aegyptii Culcas radices in iure coctas atque aliis multis modis in cibis paratas afficiã cõtã, & eas tum crudas, tum coctas libentiss. Veneri indulgentes mandant, quia putant tum semen multum gignere, tum libidinem præualidẽ excitare, Alpinus. Per Lusitaniam valde à mancipiis Aethiopiis expetitur, eaque crudã & coctã vescuntur.

Aquam conseruans planta.

Apud Siberos nationem Americanã inuenitur radix quę supra terram emittens, amplissima habet folia, in quibus aqua continetur, non fecus ac si in vase aliquo asseruaretur, vt emanare facile non possit. Quin & ex radice dimidium sapẽ cantharum aquã expressit, Benzo.

In regione Saboris reperit Vlr. Schmidel. de nauig. Amer. nõ paucis ia locis radicẽ extra terrã protuberantem, quę magna lata gerebat folia, aquã referra, quã continent in tempore nec facile effluit. Singulę radices singulas ferę mensuras dimidiatas continebant.

HETICH THEVETI. CAP. XXXII.



Hetiche radicalis se autore Theueto de Gallia Antartica c. 53. duo reperuntur genera: alterum cocturã fluescit, mali Cydoui instar, alterum vero albescit: vtriq; folia sunt Maluacea: semen vero nullũ fert: quo fit vt syluestres isti Americani in taleolas discissis radicib. & terræ denũ commissis propagent:

Florem ferre negantur.

Vires & Vius

Ad Venerẽ

Radices à quam reũ denter.

Locus

Defect.

Americano solo frequentes sunt hæc radices. Non aliud serè Americis in vsum cibarium eedit: itaque æquè vulgaris illis ac nobis panis.

Ocimum Plin.
viii.
Vingum.

Herich Americum, Ocimum esse Plinius lib. ii. c. 15. putat Dalech. apud Hist. Lugd. pro quo apud Theoph. lib. i. hist. cap. ii. mendotè legit Vingum. Sic Plinius: Manduræ & Ocimum, cui pauca folia minimaque, verùm radix magna. Theophr. verò Folia eius magna, gemen breue, *et* non vt Gaza pusillum] radix longa, sapore præstanti cibo idonea, quæ pro fructu colligitur, cum amnis in altum redierit, eoque Deorum aras coronant. Quæ autem Theophr. folia ampla, Plinius pauca & minima dixit.

Robert. Const. in Theoph. vocem herich corruptam dicit à voce *herich* Theophr. ac depingi in Americæ Obs. quomodo describit Theoph. C. Bauh. Phyt. Rapum Americanum.


FAALIM THEVETI HELENIO
foliis similis.
CAP. XX XIII.



A vrhore Theueto Helenio, foliis præsertim; similis est herba quæ *Faalim* vernaculâ linguâ nuncupatur in Mombaze insula, quæ olerum optimè sum & simplicium med. omnis generis feraciss. atque eorum potiss. quæ venenis serpentium omnium, quibus regio hæc abundat, aduerfantur. Huius herbæ experimentum se vidisse ait in duobus com morsis a serpente, partim in terra degente, quâ illic *Alefah* vocant: cuius morsus adeò lethalis est, vt nisi statim succus huius herbæ admoveatur, necesse sit hominem interiire. Hist. Lugd. Faalim Theueti.

BATATAS. CAP. XXXIV.

Tria huius plantæ sunt genera, quæ Beticam peragrans obseruabam (inquit Clusius hist. poster.) colore externo inter se differentia, etiam gustus suauitate: nam aut cortex externus quodammodo rubescerat, siue purpurascens erat [& hoc genus præstantissimum iudicabatur,] aut pallidescerat, aut albus erat: singula ramen genera albam interiùs carnem habebant. Producunt autem illa Cucumeris siluestris modo *fermenta* humi diffusa, satis crassa: succulenta, læuia, quibus inhærent *folia* vt cunque carnosa, ex viridi canescentia, Ari foliis, seu potius Spinachii, laudatissima: *florè* an *fructum* ferat, è nemine intelligere potui; *radice* autem sit latio: ea plerumque dodrantalis est, grandis raphani nonnunquam amplitudine, nam memini Londini me inuente



parte obtusiores, deinde sursum progrediendo graciliores.

In Hispania [Indiæ] insula, vt Cardan. scribit, Batata folio est Hedere, radix admodum vilis fetigetis loco: crescit altitudine Erythrodani.

Anton. Pigafetta in lib. Nauig. *Batades* in Brasiliæ insula.

M. Fumee in Hist. gen. Ind. Occiduz, Batatas radices dulces.

Vt Lobelio Obs. fidus Clusius testis est, Batatas Hispanorum, siue Camotes, aut Amotes, foliis est scabris, & reptantibus, multis, Cumeris asinini æmulis. Plant. Ic. p. 647. Batata Hispanorum, Camotes siue Amotes.

Quidam Igame putant esse Theoph. lib. i. hist. cap. ii. *to* *apaxo* siue *apaxo* *apaxo*, non, vt apud Plinium legitur, Aracos. Satis conuenit hist. radicis Theoph. nisi Theophrastus scriberet folium non habere, neque foliis quicquam simile.

An Veteribus, inquit idem Lobelius, fuerit cognita hæc planta Clusius hæretac propterea nullum nomen Græcum aut Latium addit: Hispani *Batatas*, *Camotes* etiam nonnulli, aut *Amotes*, quidam etiam *Aies* vocant, raneis non nihil, vt aiunt, inter se differant, sitque *Batatas* radix longè tenerior & iuuuor, Qui plura de hac radice vult consular Scaligeri exerc. 181.

Nunc adeò frequentes sunt in Hispaniis, inquit Manardus apud Clusium, vt singulis annis è Velez-Malaga decem aut duodecim longæ naues, quas *Carauellas* appellant, in onulæ Hispaniam inuehantur. Seruantur verò aut minores integræ, aut maiores in frusta concisæ, solo bene culto, & in suos sulcos ducto, feliciterque nascuntur: nã intra octauum mensem in eam crassitudinem excrescunt, vt edi, & in alios vsus parari possunt. Ipso verò Clusio auctore spontè nascitur in nouo Orbe, vicinisque Insulis, vnde primum in Hispaniam delatam ferunt: nunc in multis Beticæ maritimis locis feritur, vel integra, vel in taleolas secta, principatum autem obinet Malacæ nata, quæ & Gades & Hispaniam, imò Vhsiponem etiam vsque deferri solet. Habuit is aliquoties in Belgio satis recentes, sed quæ germinare noluerunt, imò breui corruptæ sunt, frigidiorè nimirum regione. Sed & quas Londini eruebat, diuturniore morâ [nam Viennam deferre volebat] antequam telluri committere posset, corruptæ sunt.

Bata-

Batatas in omnibus India prouincijs admodū communes, cibum multi alimenti esse existimat Monardes, mediāque veluti esse substantiā inter carnes & fructus, statulentas tamen: sed asatae flatus deponunt, praesertim si cum generoso aliquo vino edantur: ex iis etiam sunt Conferuae non minus gratae, quam Cydoniorum carnes, morselli, placentulae, & alia edulia gratissimi saporis: idoneae enim sunt ad omnis generis Conferuas conficiendas, & edulia. Temperatae sunt, & coctae vel asatae ventrem emolliunt: at crudae estui non sunt aptae, quoniam admodum statulentae sunt, difficultisque digestionis. Estur, teste Clusio, ab ipsis incolis, aut cruda, aut cocta: nunc Hispanis etiam in delicijs, ob saporis gratiam & tencritatem, praesertim si sub cineribus cocta, & exteriore tenello cortice repurgata, deinde in orbem concisa ex pauxillo uino, itillatiusque rosati liquoris & Sacchari momento edatur. Sunt qui ex oleo & aceto, & sale efficit: nec desunt qui radices recentes coctas, & repurgatas Saccharo condiant, & in usu seruēt. Sed & radix nō cocta, dum corrumpi incipit, si cultro secetur, non secus rosam olet, quam ipsa Rhodia radix. Quocumque modo condiantur asatae vel elixae, nulli crustulo, aut alio cuius edulio cedant dulcoratā mollitie, cutis aliquantō tenacior, quam tuberibus aut Napis. Comeduntur & cradae, viridis castaneae gustum tum imitantes.

acriusculi: asata uero, tenerior est castaneā, & pyri instar, cui grumosa substantia, edulis. Qualem caulem, aut folia habeat, non intelligebat.

Extat figura apud Clusium in post. Hist. duplex, titulo Inhame Lusitanorum, quarum minorem ponit Pl.



Icon. pag. 647. sub titulo *Ignames*, & ante eū Lobel. & Pena Aduers. de ea ita scribentes: Sifaro Anglico non parum accedere uidentur *Bartades* seu *Ignames* radices, quae in Insulis non procul nouo Orbe distitis, sūapte sponte oriuntur. *Postades* uernaculē tum indigenā, tum Hispani illic uocant, quibus haec in patria

& Veneris illicia frequētes ueniunt singuli bulbis, teretes, oblongi, Napum utrinque obrasum aequant, color pulvis illis foris, albus intus, sapor gratus ualde & tener, quasi Milii delicatioris, aut Fabae fresa, eoque gustu insulsi sunt nisi condiantur. Quae de uerbo ad uerbum recitat Hist. Lugd. sub Batatis Clusii, neglectā interim Lobelii & Pena Aduers. mentione.

Pet. Aluares Nauig. Igname radix ex qua fit panis. Munst. Colm. de Noua Africa, Igname.

Diui Thomae insularum ea asata & elixā uesci Vires intelligebat Clusius, cuiusque rei gratiā Lusitani quidam, qui multos isthic cum uiris, tum sœminas & pueros emerant, ut Vlyssipone pro mancipijs venderent, istas radices in naues intulerāt, in miserorum alimentum. Sale, aut aduers. aceto & oleo interdum edantur, & uino perfunduntur, nonnunquam coctae prunis.

Igname genus aliud.

Accipiebam inquit Clusius h. post. à Wilhelmo Parduyū radicem cum praecedenti *Igname* siue *Inhame*, ei nec forma, nec colore, nec magnitudine dissimilem, quam *Igname* etiam uocabat iulianus, qui illam ipsi dabat, licet aliud genus esse non inficiaretur: sed totius radice cortex magis inaequalis erat, & ueluti quibusdam tuberculis oblitus: è quibus tenues fibrae emergebant, praeterea radix summo capite, paullo crassioribus durisque, & pedalis siue palmaris longitudinis, fibris, seu uerius viticulis, magna ex parte spinosis, erat praedita. Nonnulli *Ycam Per.*

Considerent lectores quantum differat à Manihot & Iucca de quibus mox.

A G E S.

CAP. XXXV.

Agium species innumerae sunt apud Hispaniolae incolae, quarum à folijs & floribus uarietas dignoscitur: harum species una dicitur

BATATIS AFFINIS IGNAME siue Inhame.

Lectori non ingratarum fore existimatur Clusius si Batatarū historiae, alterius cuiusdam crassa radice descriptionem subiceret, quandoquidem India Occidentalis & insularum quarundam incolis familiari in usu est.

Varia autem interdum est formae radix illa, & *Igname*, siue *Inhame* appellatione ex



D. Thomae insulā, sub Aequatore sita, non procul à prouinciā Manicongo continente, delata anno 1596. radices habuit, quarum nonnulla pedalem aut ampliorem longitudinem aequabant, brachialem autem crassitudinem, uel etiam quarundam diametret esset quatuor uinciarum: pleraque dodrantalem longitudinem uix attingerent, nec earum diametret binas uinci is excederet: aliquot etiam breuiore, sed crassae, & in aliquot quasi breues napos infimā parte protuberantes, tectas omnes scabro & inaequali cortice, ut Aristolochiae longae legitima radices, & multis exiguis fibris sparsim nascentibus praeditas: ipsa radice substantia alba, lenta, & succulenta est, atque ueluti grumosa, tenera tamen, nec ingrati saporis, exiguū autem post momento nonnihil asperi &

Guana-guax, hæc est intus forisque albidâ : alia *Guaragies*, colorem habet violaceum foris, intus autem candidum , appellant alias Ages *Zaza-neros*, hi rubescunt foris, intus caudescunt, alias *Squinetes*, intus forisque albidâ sunt. Est *Tunna* : ubique violaceus. *Ubbis* flavescit pelle carneque. Est alia dicta *Arib. meix* pelle violacea, carne candida. *Anguamar* cute violacea est, interius albescit. *Guaccaraca* pelle caudescit, violasit carne. Sûr multa præterea, quæ nondum ad nos delata sunt. Ages colunt in insula Cuba. Magis pro ferculis aut fructibus utuntur, quam ad usum conficiendi panis : uti nostri rapis ; raphanis, tuberibus, Napis, Pastinacis. & huiusmodi rebus : Hanc Agium breuem Historiam Per. Martyr, lib. Ocean. pluribus in locis tradidit.

MANIHOT THEVETI, YVCCA & Cassia.

CAP. XXXVI.



Descriptio

Cazabi.


Manihot.

Yucca. PANI.

Panis genus, ut tradit Benzo, habent Indi Occidentales, quod *Cazabi* vulgò appellant Id ex *Arboris confectis*, radix est Napi crassitudine, quæ nullâ ex se semen fundit, sed cãnas tantum quosdam nodosâs & foliâs, viridibus foliis, ut Cannebis.

Thevet. de Gallia Antartica cap. 14. sub Manihot, habet quædam de Arbore succo venenato, ex qua farina & panis fit, ut videre est sub Arbore farinifera succi venenati. Leri hist. Amer. cap. 9. Manihot radix bona in farinam reducta & bene cocta, si aliter comedatur venenum est. M. Funce hist gen. India Orient. lib. 1. c. 28. In Hispaniola parant panem ex Yuccæ radice, cuius venenatam succum expriment. Item lib. 2. c. 71.

Yucca in Insulis Cuba, Hayri, & aliis, cruda lethalis est, in Insula S. Marthæ, salubris, comedunt crudam, rostam & coctam.



Ex S. Dominici vrbe accepi [inquit Manard. ex veri. Cluf.] folia herbe ex qua *Casani* fit. Catalani autem panis est, quo Indi tot seculis vitam sustentarunt & hodiè etiam vescuntur nostri Hispani : fit verò ex herba ab Indis *Yucca* nuncupata: cuius descriptionem, vires & noxas pluribus profecquitur, ut & Gomara Histor. gen. cap. 71. similia propemodum cum Manardo de Yucca referens.

Communis insulae Canariæ incolis pastus siue victus arborea radix quædam est [inquit Vesput.] quam in farinam satis bonam comminunt. & hanc radicem quidam eorum *Yucca*, alii verò, *Ygnam* vocitant.

Ceterum multa dicuntur esse Yuccarum genera. Vnam inter ea Lauius, æque aliud alio pretiosius est, quo Regulis edamum paratur. Sunt quibus venduntur nobisc, sunt & quibus populus.

Ugd. hist. duas habet figuras, vnam ex Theveto, nomine Manihot qualem exhibemus: Altera, nomine Yucca, de qua nihil præter figuram & nomen. Gerard. Anglus in sua historia cum Yucca, ut vult Lobelius, confundit aliam plantam de qua mox.

Brasilianis fit. quens est hæc radix Manihot, rotique America, inquit, Thevetus.

Radices, ait idem, Manihot Americani aut in mortario contundunt, tam siccas quam virides, aut radula ex amplo arboris cortice, lapillis duris vndique oblitâ, ut nos denratâ laminulis ferreis Nucis myristicis, in farinam redigunt, quam cribro excretam, adiectâ aqua, igni superpositam in vase calfaciunt, quoad Mannæ granatæ instar grumescat, cuius mirifica bonitas & nutriendi vis, potissimum si ca recens fuerit : vrunturque ut nos panem, tam cum carnibus quam cum pitibus.

FINIS LIBRI DECIMONNI





HISTORIA UNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER VIGESIMVS.

DE RAPVNCVLIS, CAMPANVLIS
ET HIS AFFINIEVS.

IAM de Rapunculis dixisse conueniet, si in istis ordo seruari debeat. Rapunculos dicimus, à radicum forma, quibus quia bulb. sa nonnihil amulantur, illis & subiungendis docimus. Habent & id serè commune inter se Rapunculi, quòd Campanaceos flores, venustos sane tanquam arborum communis facultie gerant.

RAPVNCVLVS VVLGARIS CAMPANVLATVS.

CAPVT. I.



VERNIS acetariis expetitus Rapunculus vulgaris, radice minimi digiti serè crassitudine, Napi parui similitudine, alba, dulci *filia* ex ohlongo per extremum rotunda, per tertiam spungatur, nonnihil incisa, hirsuta: *caulis* cubitalis & scquicubitalis, hirsutus, lactescens, foliis vestitus acutioribus, pediculo- rum expetibus: *floris* no- las imitantur, per oras laciniati, carulei, quos *vascula* excipiunt oblonga.



Rapunculus 4. siue esculentus, fortè Rapum silv. Diosc. & Plinij. Calsalp. Rapunculus vulgò. In hoc genere videtur apud Plinium Iasione seu Lasine, vt quidam perperam legerunt, teste Hermolao. Fuchium manifesto errore putare Rapum silv. esse Rapunculum vulgò dictum

Tom. II.

rectè annotant Matthiolus & Lacuna. Sed figura Matthioli nihil valet, nec per Glossatorem melior est reposita. Camer. apud Matth. Rapunculi, Pes locustæ Auic.

Schvv. Cat. Sil. Rapunculus aruensis. Rapum *Pes locusta* hortenfe, Germ. Rapünzsel vocatum, Tragus in *Sejer S. s. r. am.* interpretatur, Siser & Sifarum, de quo Colamel. *Rapum* lib. 11. cap. 3. & Iacob. Manlius super Theriacam *fil.* Auic. qui quidem putet, & non malè, minimum Naporum genus.

Seler. de coll. stirp. Rapum siluestre 3. flore Cala. h. c. uleio, die rächten Rapünzsel. Item Rapum silv. Rapünzseln, commune procerissimum. Idem de hort. ait esse Rapi silv. multa genera, quod tamen Diosc. simpliciter sic vecei videri sibi id, quod Tigurini vulgò Rapunculum nominent.

Lobel. & Pena Adu. Rapuntium paruum, Rapulum vulgò, Pes Locustæ Auic. Lobin Obs. scubit quod albis floribus variet *secus braggelste* Hannoniæ oppidulum.

Lonicer. hist. lib. 5. cap. 241. Rapünzsel. Rapunculum.

Dodon. Gall. picturam habet, ac scribit *rapunzel*, Ripa syluestris, Neoteris Rapontig, Rapunculum paruum: Gall. *Raponce*: Ger. *Hein Rapünzsel*. Belg. *cleyne aut ghemeine Raponcelen*. Et in Lat. de flor. Quantum genus Rapi syluestris facit, ac vulgò Rapunculum nominari tradit, quasi paruum Rapum. Anguill. *Rapunculi*. Fuchl. Rapum silv. vulgò Rapunculus Germ. *Rapünzseln*. Gall. *Raponce*, aut *Repurthun*. Clut. in Pann. & Hist. post. Rapunculus vocatur vulgaris. Brunfell. Tom. 2. p. 56. Raponeoli, sine descriptione.

Rapunculus vulgò dictus, etiam si tum homi-
X x

nibus sub primum Ver ad esum, cum aceto & oleo aciale, effodientibus: tum subhis, quibus gratissimus cibus est, etuentibus, raro comperitur ad eam altitudinem progressum, quam ipsi Diosc. attribuit: & si perueniat, à paucis cognoscatur, tamen à pleisque verum & genuinum sylvestre Diosc. rapum esse creditur. Nec nos (inquit Cornar. in Diosc.) nunc resellere volumus, quum aliud quod pro eo ostendamus, non habeamus. Rapunculus non respondet Rapo silu. Diosc. licet crebro & plerumque ad cubitalem altitudinem progrediatur, ac etiam excedat, quicquid dicat Cornarius. *Rapuncus* confundere Fuchsum cum Rapo siluest. testatus est Lacuna. Eorum autem sententia, qui putant Rapunculum, Rapum esse silvestre Diosc. repugnat Theophrastus hb. 7. c. 6. de plant. hist. quippe qui silu. Rapum radice consistere longa Raphani modo, breuique caule consistere sentit.

Cornar. not.
si & Fuch.

Locus & tempus

Rapunculus passim prouenit etiam in Horto E. C. Montbelgardi, ac tota hyeme viuet. Geneæ obseruauit colligentes Februarii principio. Monspelii florentem vidi Aprilis & Basileæ quæ itur Moutets Octobri: vt & Patavi: Nascentur in aruis non cultis, in collibus & pratis, quin etiam in hortis iam feritur, vt grandiores edat radices, Matth. Non modò hortis & fatis familiare vbiuis, sed etiam siluosis & satyibus tum frigidarum tum calidarum regionum, Lobel. Inter segetes prouenit. In hortis etiam ad acetariorum usum feritur. Æstate floret & semine pragnat, Schv.

Vires & usus.

In caliditate & frigiditate sicut Matth. in Epit. Cam. radix non longè abest à temperatis, imò nec in aliis qualitatibus. Estur etiam radix, ac pariter cocta in acetariis, quòd maximè gustui placeat, & appetentiam excitet. Creditur quòd radix elixa, & cum longo Pipere deuorata, lactis vbertatem in nutricibus faciat. Radix, teste Lobelio, candida, tenera, acetariis Veris quadragesimæ longè quàm Rapo aut Raphano delicatior. Lactis copiam augeri quædam nutrices elixa radice, ex Pipere sumptâ exploratum habent. Montbelgardi & Geneæ hyeme si non rigidior sit, vt & Vere, non solum radices in acetaria assumunt, sed etiam folia.

CAMPANULA PARVA, ANGVILLARÆ Cantabrica.

Descriptio

Campanula, quam Anguillara facit Cantabricam, radice est alba, crassiuscula, modicè fibrosa, subdulci, à qua exeunt cauliculi, non surrecti, teretes, virides, aut subpurpurei, quorum folia primo ortu aliquatenus Violæ Martiæ primis minoribus foliis similia, minora, ex femuncialibus & vncialibus pediculis, quæ mox laciniata fiunt heteraceorum instar in latumque magis proficiunt: ad progressu temporis, ea potissimum quæ superiorem caulis partem obsident, formam multum dissimilem acquirunt, quantumque iis de latitudine decedit, tantum & plius longitudine proficiunt, sic vt duos digitos longa euadant, vix culmum interdum lata: densa autem agmine caulem stipant, acrimonia nonnulla & amaritudine prædita.

Clusius sic describit. Alunt etiam summa illa iuga præsertim in rupibus & precipitiis, Campanula vel Rapunculi genus, cuius radicales fibræ valdè serpunt, & vicina loca occupant, subinde germinantes, & nouas stirpes procreantes: ha-

hent illa in iudicioribus folia, deinde statim alia angusta conferunt in ætate, Caryophylli secundo loco supra d. serpi. folis aded similia, vt incautos plerumque falliat, qui interdum cum suo ex parte emittit, Caryophyllam collegisse ex stimant. Emergit deinde ex harum medio gracilis caulis, in multos tenues ramulos diuisus, oblongioribus foliis, nullo seruato ordine nascentibus, septus: strobilus: è singulis ramulis dependentes profertens Campanula, sine Rapunculi vulgaris floribus formâ similes, vel elegantioribus e Jore præditos, vel summo purpureo colore, iue violaceo n. tentis, vel diluioe purpureo colore & quasi cinereo, conspurcatis, interdum etiam niteos:



capitula deinde Rapunculi vulgaris capitibus similia, aut potius illi Campanula minor, quæ cum in Belgica, tum plerisque Germaniæ locis, ad agrorum, aut siluularum margines, sub iuncibus secundum profundiotes & conuexas vias in vrbibus prouenit. Hinc Julio, interdum etiam

Auguano. Tota etiam lactescit.

Campanula siluestris minima siue a. putari possit hinc Rapi siluestris esse species, sed quia radix edulis non est, idè Dodonæo aliò referenda videtur. An eadem in hist. Gall. Campanula cantabrica minor & syluestris.

Clusius Pannoni. Campanula minor Alpina, vel Trachelii genus. In fol. Campanula minor Alpina rotundioribus luis foliis, capitulo Campanulae minoris, quæ in Belgica & Germania est. Quam Campanulam secundo loco intelligat Clusius nondum nos intelligere fateatur pro Campanula minore Alpina rotundioribus foliis.

C. Bauh. phytop. Campanula minor rotundifolia prima. Rapi silu. genus minus quod Campanula canulea Gesl. de hort. Campanula minor rotunda: aliis Phytrea, aliis Cantabrica Plinii lib. 25. cap. 8. alii Rapi siluestri. genus: floribus est communiter cæruleis, subinde candidis.

Clus. in post. hist. Iconem eandem proponit quam Lob. & Dodon. Schvven, etiam non facit dixeram Clusii Campanulam à Lobelii Campanula, quæ occasio vt hoc capite ponam Clusii descriptionem nec separem, vt facit C. Bauhinus, donec quid rectius fuerimus edocui.

Schv. Cat. Sil. Campanula minor rotundifolia Dod. Campanula silu. minima, Clus. Pann. Campanula minor Alpina.

Tavern. Rapunculus silu. minor 2. Kleine Nilschlöselin/ kleine Weisse Rapunclein: Tota lactescit. Item Campanula minor rotundifolia nuce flore, kleine weisse Nilschlöselin.

An Gerard. Angl. Campanula rotundifolia,
Roode leafed Bellflower. Campanula minor
alba. Little white Bellflower.

Campanulam parvam quæ Anguillaræ dicitur
Cantabrica, vidi Patavii in horto D. Cortusii, Ge-
neuz ad radicem montis Saleuz, incipientem flo-
re produceri in principio mensis Februarii. Ba-
filex ultra Rhenum in sylva quæ itur Birtzo flo-
rentem adhuc Octobri, Lugduni cum flore Sep-
tembri. Montbelgardi passim in vrbe abundat in
Arcis muris & portis, florens Iunio & Iulio.
Mense Augusto obseruauimus non longe à pa-
go Cron redeundo Porentro Campanulam
paruam siue Cantabricam Anguill. cum flore
albo.

Campanula minor rotundifolia
altera C. Bauhini.

C. Bauh. Phyt. Campanula 6. minor rotundifo-
lia altera. Clus. Campanula minor alpina: flos
nunc purpureus aut violaceus, modò colore di-
lutiore & quasi cinereo, interdum niueo. Clu-
sius in hist. post. in folio pro Campanula minore
alpina habet iconem Lobeli & Dod. quæ occa-
sio vt Clusii descriptionem reliquerimus capite
præcedente: Schvven. quoque non diuersam fa-
cit plantam Campanulam Clusii & Campanu-
lam Lobeli, vt antè demonstratum. Nos ad-
huc ignoramus quam plantam intelligat per
suam 6. Campanulam, nec scimus de qua scriban-
tur sequentia, Schv. Cat. Sil. Campanula minor
pratensis Casp. Bauh. Campanula minor. 2. twice
sen glöcklur/Schb. lecn. Hæc integra sæpe tegit
prata. Succus ex flore cæruleo expressus viridem
efficit colorem.

Campanula Linifolia cærulea, vel Rapunculus
Campanulatus Linifolius.

Campanulæ tertie Linifolia cærulea C. Bauh. in
phyt. ex radice tenui, emergunt caules quini, seni,
plures, paucioresque, palmares & sesquipalma-
res, graciles, rotundi, in ramulos non diuisi, foliis
oblongis, angulosis, lino silv. similibus, confuso
ordine insertè, at superne ferè nullis, septi, stoc-
culi è caulium summitate dependent, cærulei,
Campanulæ formâ, quibus succedunt capitula
Rapunculo vulgari similia. Hæc alunt potissi-
mum rupes & summa iuga montis wasserfall/
vbi eam ante annos quatuor collegimus.

Rapunculus 7. siue Campanulatus linifolius
Thalii, coliculos profert non admodum rectos
sed procumbentes, foliolos, brachiatis, adnatis
refertos. Folia ei primò prodeuntia sunt vncia-
lia ferè, subrotundiora, in mucronem tamen pro-
ducta, in ambitu leniter dentata, similia foliis qui-
busdam violæ tricoloris, quam vulgò Florem tri-
nitatis vocant: cætera, quæ caulem frequenter
ambiunt, longiora euadunt, sed tamen strictiora
existunt, lini foliis quodammodò affinia. Flores
plures, cærulei, olicati, in ambitu diuisi in hoc ce-
nuntur. Vbiuis autem hæc species frequens est.

Schv. Rapunculus silv. Campanulatus lini-
folius, kleine Rapunzeln/ kleine Glöckln/ A/-
peris & petrosis oritur. Quantum differat
Campanula Linifolia à nostra Campanula parua
nescimus, nobis quidem constat eam depositis
prioribus foliis rotundis acquirere folia Lini &
penè diuersam videri. Rapunculum 7. seu Cam-
panulati Thalii descriptio, non videtur malè

Tom. II.

quadrare nostræ Campanulæ paruz. Schvvenck.
tamen diuersum facit.

CAMPANVLA FOLIO HEDERACEO,
species Cantabrinæ Anguillaræ.



Enella est Descriptio:
plantula,
coliculis tenui-
bus palmatis
aut sesquipal-
maribus, ramo-
sis: per quos
filia tenera, hi-
lari virore per-
fusa, Hederæ vel
Cymbalaræ, sed
quorum laciniæ
sunt acuminatæ:
stoculus pedicu-
lo fili instar ten-
nui longiusculo
insidet, vni vni-
cus, gracilis, ob-
blongus, per
summas oras la-
ciniatus, cæru-
leus, cæteroque
pallidus.

A Fr. C. Bauh. accepi nomine Campanulæ
Hederaceo folio: Gener Cherlerus ait se colle-
gisse iuxta Aureliam in siluula palustris. Hanc ad-
nos (inquit C. Bauhin.) Lutetia Io. Henr. Cher-
lerus Philos. D. & nunc in Academia Nemausana
Philosophiæ professor, vnâ cum pluribus aliis
misit.

CAMPANVLA ROTVNDIFOLIA
minima.

Campanulæ 7. siue rotundifolia minima C.
Bauh. in phyt. herba est vix quatuor digitos
alta, quæ ex radice exigua, oblonga, albâ, ramulos
profert aliquot exiguos subrubentes & subhir-
sutos, cortice aspero vestitos, quos ambiunt folio-
la ex rotunditate oblonga, serrata, rigidiuscula,
quorum inferiora latiora: cuilibet ramulo qui
sæpè vnus, plerumque terni vel quaterni, stoculus
insidet vnicus, subcæruleus, deorsum spectans,
formâ calathi ex vno folio sexangulo, cui capitu-
lum foraminibus pertusum, vt in Campanulâ an-
gustifoliâ, succedit, iu quo semen minutum.

Hanc in Rhæcis montibus, cum Italiani An-
no 1577. pet eremus, Septembri mense, adhuc
floribus onustam inter saxa copiosiss. vidimus,
nec maiorem inuenimus, quam eum Patavii No-
biliss. Iac. Antonio Cortuso Patrio Patavino
ostenderemus, Cantabricam Plinii nominavit.

CAMPANVLA LINIFOLIA RARA,
flore cærulea.

Ara admodum videtur esse planta, caule est
R cubitali striato, foliis non ita multis vestito,
tenuissimis & quouis gramine angustioribus,
duas vncias longis, supernâ parte breuioribus
temerè positis, quo loco prouenente quædam pro-
pagines exoriuntur in minutissima foliola defi-

Descriptio

nentes. In summo rami vestigio flores sursum spectantes in vnum quasi glomerem congesti sunt, Campanulæ planè similes, in extremo dissecti. cærulei, vt sicca Plateriana insinuat, ipseque Cl. D.D.F. Platerus adserit. Hos flores Calyculi foliacei minimi sustinent.

RAPUNCULI GENVS FOLIO serrato rotundiore.

Descriptio



Complures statim à radice tollit caules, cubito altiores, nonnihil angulosos, subhirsutos, simplices, quibus ab imo ad summum adnascuntur alternatim folia nonnihil hirsuta, vncialia & fuscuncialia, femunciam circiter lata, puca vnciam attingunt, in acutum mucronem deficientia, per ambitum serrata, obliquis venis à medio nervo in margines exporrectis. Summus scapus flores ex interuallis profert, Rapunculi vulgaris floribus similes, calyculo exiguo pinnato persimili, ex pediculis vncialibus & fuscuncialibus tenuibus. Radix alba Rapunculi vulgaris crassitudine, multifida, longiuscula.

Rapunculum vocant plantam descriptam, vnde autem habuerit non recordor, similis, si non eadem, Argentinx 1599. Iulio sicca per Dum. Agerium demonstrata nomine Campanulæ prope Gestin in Styria collecta, in floribus siccis dicebat colorem fuisse diluè cæruleum, pistillus longus extra florem apparebat: Folia in principio caulium rotunda ferè, satis profunde crenata, breuissimis & vix conspicuis pilis obstita.

ERINOS, ERINEOS, VEL ECHINOS Veteribus & in genere.

Descriptio

Ἐρινός, quod aliqui Ocimodes [ἐρινοειδές] alii Hydreron [ἡδρον] quasi aquaticam herbam, Romani Ocimum [ὄκιμον] appellant, nascitur, autore Dioscoride apud fontes & fluuios, foliis Ocimi [ὄκιμοιο ἄμοια] sed minoribus (μικρότερα) Tragus putat legendum (μακρότερα), parte summâ diuisis: furculus quinis, senive dodrantibus: flore candido, semine nigro & acerbo: folia & caules lacteo succo turgent (ita Ruell. quam lect. probat Matth. & Dalech. Cod. meus Basil. & Paris. ἐπιδὲ μίαντες ἐστίν, liquore plenus:) Huius semen drachmarum duarum pondere ad mellis cyathos quatuor ammixtum, ad oculorum fluxiones sistendas illinitur. At succus aurium dolorem sedat, cum sulphure viuo & nitro instillatur.

Semen purgat. Ad oculos. Ad aures.

Herba quoque quam Græci Erineon vocant, inquit Plinius, videtur reddenda in hoc loco [post Caprificum] propter gentilitatem. Pal-

lum alta est, cauliculis quinis, ferè Ocimi similitudine, flos candidus, semen nigrum, paruum: tritum cum melle Attico oculorum Epiphoris medetur [duabus drachmis cum cyathis mellis Attici quatuor. Cumulatim decrepra: Hæc vetus lectio Com.] vtunque autem decrepra manat lacte multo & dulci: herba perquam utilis aurium dolori, nitri exiguo addito. Folia restunt venenis.

Echinus acerbus est & repellendi ac siccandi vi prædita, ait Galen. de simpl. & ex eo Paulus: qui præterea aquaticam esse scribit, cuius seminis drachmæ, cum mellis drachmis quatuor illitis, oculorum fluxionem sistant. Succusque ad aurium dolorem faciat.

Paulus bis eandem proponit plantam vt monet Cornar. primò ex Diosc. secundò ex Galeno: in eo, nostro iudicio, demonstrans sibi non cognitam plantam: facili lapsu apud Galenum per Amanuenles scriptum crediderim Echinus pro Erinòs, quod non animaduertit Paulus, quanquam Matthiolus Ruell. & Massar. dicunt in venustis aliquot Dioscor. codicibus legi Echinus: ad lit præterea à Nicandro in antidotis Erinon inscribi. Hinc non retentus fuerim Io. Agricola, cui herb. Erinus eadem est, cum Echino, licet Paulus diuersas faciat. Eodem Diosc. propter similitudinem, post Ocimastum descripsit. Sed quia lacte manat vt Caprificus, eodémque censetur nomine, ipsi subiunxit Plin. ipsamque Erinon vocans, ait eius folia venenis resistere. Quod vt doctè Constant. in Lexico notat, sumptit ex Nicandri Theriacis. Quin Scholiast. ex Diocle ἐρίων, ἑρίων dicit ostendit. Galenus de Erinò racens, Echino omnia tribuit, vbi ἑ, αὐτὸ ἔστι [addendum χαλδῶ] ἑρίων & ἑρίνη & ἑρίνη voces, idem in haerba exprimens significat.

Quæ Plinio Lactoris dicitur, quamque vulgò notam scribit, hæc & Lactaria & Anabula nunc dicitur. Eandem aut similem aliqui volunt, illi quam Militarem vocant. Et licet non desint, qui Diosc. Erinon faciunt, attamen Gesnero in catal. pl. congeneres non eadem videntur.

Est autem Erinòs herba appellata Cordo in Diosc. quòd Caprifici modo lacteum liquorem remittat, hodiè autem incognita est: quamuis Ruellius eam cognouisse videatur, qui hæc scribit. Est & apud Hippocratem Echini herbæ mentio. A Recentioribus Herbariis herba lactis appellatur, à quibusdam Lactoris, & militaris, aliis Ocimum aquaticum. Lactaria rura vocant, tridentalibus ramulis, quinis, senive foliis, Ocimo longioribus, parte supernâ diuisis, albo flore, semine atro, pusillo, acri, duto. Herba succo manat, lactis cum colore, tum dulcedine, vnde Lactariz nomen apud vulgus inualuit. Secus fontes & fluuios inuenitur. Has insuper euites præter eas, quas Diosc. Plin. & Galenus Erinò suo adseribunt, assignat. Succus cum sulphure, nitroque instillatur, discurit oculorum caliginem, vomitionesque ciet. Folia in cibo sumpta parienti præstant facultatem. Vultus ferro factum intra paucos dies imposita ex oleo sanant.

Cæterum non obscurus est Diosc. inquit Anguillata cap. de Erinò, cum ait ἐπιδὲ μίαντες ἐστίν ὁ κωμὸς ἑρίων πικρὸς, an intelligat simpliciter succo plenum, aut succo lacteo: de Tithymalis solet dicere ἐπιδὲ μίαντες ἀνωμαλὸν, quicquid sit, nullam noui plantam quæ Erinò respondeat.

Nunc quod reliquum est, Erini & Etinei nomen

Echinus

Ad oculos

Paulus

Erinòs dem c

Lactoris Anabula

Militaria Erinòs

Erinòs

men sequentibus tribuitur plantis.

Matthioli Erinon volunt aliqui esse Hieracii speciem, de qua nos agimus lib. 24. sub Hieracii Sabaudi genere.

Dalechampsius habet suum Erinum, quem hoc libro posuimus inter Rapunculos.

Erinum quidem existimant esse Estulam siue Tithymalum dulcem, de qua l. 34.

Querunt aliqui, an Noli me tangere sit Erinus, de qua lib. 21.

Rapunculus dicitur Erinus Nicandri & Dioscori.

Videntur aliqui existimare Rapunculum commune esse Erinon.

Erinos Columnæ ad Rapunculos referenda, cum eiusdem Erini siue Rapunculi genere minimo, de quibus libro præsentii.

Credit C. Bauhinus Elatinem Polychidem H. Lugd. eandem cum Erino minimo Columnæ, verum fallitur ut demonstratum lib. 29. sub titulo Alsine folio oblongo, hirsuto.

Erineon quidam putant esse Scrophulariam maximam radice fibrosa, de qua hist. l. 28.

Inter Diosc. atriplicitia Epimedio Erinei nomen tribuitur, Erineos pro Acino apud Plinium lib. 21. c. 15. quam Epitetron vocant, ut apud Dioscori. Epimedium ubi Erineos, Fab. Columnæ, cui Epimedium est Lunaria minor botryoides. Vide de his hist. l. 35.

Erineos, Erinus, Erineon, Erinia, Frina de Caprifico, unde Erinus herba nomen accepit, vide hist. l. 1.

ERINOS MAIOR FAB. COLUMNÆ, RAPUNCULO AFFINIS.



Radice consistat carnosa non magna, parum Raphanum æquante ad summum, candida, gustu suavi, ex dulci acerbâ, acetariis expetita, lactescente, in medio, vel imo parum extuberante, à qua folia exeunt primo Vere, Ocimi foliis similia, minora verò, mediù Ocimi foliis æqualia, per ambitum

ferrata, supernè hirsuta parum, atque viridia, infernè verò læuia, atque polita, albidioraque: caules postea ab radice emittit plures, secundum loci annique temperiem, pedales, vel maiores, angulosos, hirsutos: quos folia absque petiolis alternatim circumdant, longiora admodum, angustioraque, minusque ferrata, ita ut qui viderit plantam sine caule, atque postea caule præditam, diuersam absque dubio esse censeat, nisi domi cultam obserauerit: folia quidem, quæ, antequam caules ederet, habebat terram tangentia, marcida euanescent, nec in illa amplius inueniuntur. Ex foliorum alis ramuli exeunt, in

Tom. II.

in quibus sicut in caulibus flores Maio exeunt petiolis paruis hærentes, caui, quinque diuisuris in extremo dissecti, colore albicantes, & etiam purpurascetes, intus thyrsum habentes qui in tres curuas partes diuiditur: quibus siccatis florum basis extuberat, quæ hirsuta est, & in quinque viridia foliola desinit, semen perficiens Iunio & Iulio, fuscum, minutum, compressum, gustu acerbum, quod cum perfectum & siccatum est, per basis foramina quæ tunc peruia sunt, decidit. Tota planta ex radice, ad florum calyces vique lacte manat dulci, disrupta.


Tempus

In locis aquosis, fluuitorum ripis, ac vallibus, ad fontes: & in Montium radicibus vbique frequentissima.

Locus

Hisigitur videtur, natali, loco, formâ foliorum, lactis copiâ & sapore, quæ notæ priuatæ sunt, delineationi Erini Antiquorum respondere.

ERINOS FABII COLUMNÆ MINORI



Descriptio

ERini, siue Rapunculi minimum genus, noua est plantula atque pulchella ex D. Mariæ Virginis monte aduecta: quæ radicè habet paruum admodum, fibris diuisam, teneram, atque Rapunculo siue Erino à me depicto similem sapore, lactescetemque: folia emittit parua admodum, digiti longitudine, parè hirsuta, oblonga latioraque in summo, & per extremum serrata raris diuisuris, nam quæ proximiora sunt radici octo dentes circum habere videntur, superiora verò minus, atque floribus hærentia binos, caulem emittit ab radice, ex singulis foliis alis diuisum, ita ut stiticoſa videatur, angulosum hirsutum, tenuem: flosculos edit Aprili mense & Maio, inter folia, ex calyce parè hirsuto, in quinque folia desinente, ut in Rapuntio & Campanula pyramidalis dicta videntur, exeuntes, oblongos, cauos, similes Tracheliorum flori, purpureos, intus apicem vel thyrsum luteum in summo triplici diuisura intortum, ut in congeneribus, continentes. Semen perficit Iunio, & Iulio, minutum admodum, fuscum. Tota planta lacteo succo turget dulci, uti Rapuntium, ita ut gratus sapor palato.

An Erinos Cæsalpini, qui in adificiis nascitur riguis, palmi altitudine ramosa: foliis breuibus angulosis, vnguis latitudine: flosculos in alis fert, figura Rapunculi, exiles, subcandidos, aut purpurascetes: vasculum paruum figura Rapunculi, in quo semen minutissimum, lacte madet dulci.

C. Bauh. phyt. Erinon Columnæ refert ad Alsinem, verum ibi non reponendam capue de Alsine demonstratur.

Xxx 3

AVICVLARIA SYLVII QVIBVSDAM.

Descriptio.



MOx è radice sæpè plures fundit caules infimos dodrantes & cubitales, foliis vestitos mollibus, oblongis, per extremum rotundis, nonnihil serratis, crispis: è quorũ sinu flores inconditi exeunt pulchri, purpureo violacei, quinque constantes foliis, quæ Occidente Sole in turbinatum apicem coeunt, a-

picipibus in medio luteis, longis viridantibus foliis radiatim floris basi circumpositis, quæ summum postmodum coronant fastigium clauæ quadratæ vncialis quam delapsi flores relinquunt: radice singulari, tortuosa, lignescit.

Dodonæus qui in hist. Gall. hanc nostram præsentem plantam Onobrychin appellauit, aut de flor. tertiam quandam Campanulam humilem Anonymon non esse Onobrychin, quod quandoque suspicatus fuerit satis constare. Et hinc patet, quàm malè Lobel. Obs. sequuta sint Dodonæum, vocando eius & Belgarum Onobrychin alteram. Gesner. de col. stirp. sanè melius inscribit Auiculariam Syluii, Violam quandam anonymon. Iac. Theod. Icon. par. 2. p. 304. dicitur, Viola arvensis. Fraumen spiegel. Item p. 306. Pentagonion, Viola pentagonio fuisse esse Wesely. Duas habet figuras vnius plantæ, prior male, secunda bona, non debebat separare.

Malè etiam ab Hist. Lugd. Onobrychidis primæ Dodonæi nomine exhibetur.

Audui qui vocarent Auiculariam Syluii, herbam cubitalem, cui flores pulcherrimi angulosi, violacei, folia parua, subrotunda, mollia. Copiosè in segetibus prouenit, Montpelii vidi florentem Maio, Basileæ Iunio & Iulio: in agris inter Basileam & Hagene. Fr. C. Bauhinus obseruauit inter segetes propè S. Iacobum. Geneuæ habebam in horto pulchère virentem mense Aprili, florentem Maio & Iunio. Patauii obseruaui primò orientem inter segetes medio Februarii. Attuli Argentina semen datum à D. Friderico Meier seminandum Montbelgardi in horto E. C. quod factum Martio, prouenit & floruit Iunio. Massa serrata Cortuso in agro Patauino, afferente D. Ranzio Medico apud Fontem admirabilem.

TRACHELIUM MINUS MULTIS.

TRachelus, τράχελος à Græcis appellatur collum, atque aded tota spina à vertice vsque ad os sacrum, τράχελος τὸν κορυφῆν hoc est, ab asperitate: quæ nominis ratio & huic plantæ conuenire potest, nisi ob dotes nonnullas quibus

Trachelo profueua sit, Trachelium dicendâ videatur.

Trachelio autem minori radice sapore grato, caulis Rapum ramifolius, hirsutus, sed tenuis breuior, folia breuiora, angustiora, crenata, hirsuta parum, flores in ramulorum extremis, simul multi confertim, pulchelli, cærulei aut violacei, tanquam Campanulæ, oris in quinque lacinas disper-

titis. Gesner. de hortis ait, Ex Rapi sylu. generibus esse Vuularias quihuisdam dictas in pratis nascentes.

Dodon. lat. de flor. & in fol. scribit, Rapi sylu. tertium genus præterque Ceruicariam minoremdici. Gall. autem Trachelium minus, Petite Gamelle vocat.

Trag. Ceruicaria & Vuularia exigua, zapffenfräut, halßfräut.

Lobel. & Pena Adu. Trachelium minus siue Ceruicaria minor, cui folia aspera Rapuntii aut Saluæ, pilosa: flores densi, pulchelli. Obseru. Trachelium minus. Adu. p. 139. Trachelii varietates, Passim istud etiam asperis saxosis Anglæ & Gallobelgii siluosis fruticat: sed strigosius, hilarius & amœno aspectu: alioqui persimile & congener. Item Trachelium minus. Radice fibrosa purpurantibus floribus stipatur, alioqui cæteris haud simile. Icon. Pl. p. 326. Trachelium minus Lob. 176. Teut. 400. Lobel. nobis obscurus videretur. Iconem habet Trachelii minoris ramifoli, qualem habet Dod. & Clusius.

Camer. Icon p. 3. Rapunculus silu. umbellatus p. 94. [videlicet apud Thalyum,] cuius tres differentias depinxit congeneres eius quas auctor [Thalius] descripsit, quamuis non easdem. Quarum vna, nempe elatior signata. r. responderi iconi à nobis propositæ, quæ est eius quas emittimus iam scilicet.

Tabern. hist. & icon. Steingemsel/Symphytum petraum. 1. Confolida petraea prima.

Thal. Hærcyn. Ceruicaria minor Dod.

Clus. in fol. lib. 5. cap. 55. Ceruicaria Sphærocephalos. Trachelij genus floribus summo caulibus & ramorum fastigio confertim, & quasi pila instar in orbem nascentibus, cuius etiam secundum genus est paulò minus, flores singulares per caulem sparsos habens, præter sphaeras illas summo caulibus fastigio innascentes.

C. Bauh. phyt. Campanula 13. siue pratensis.

Schvv. Trachelium minus pratense umbellatum, Ceruicaria minor, flein halßfräut.

Abundat passim in pratis Montbelgardi, etiam in horto Ill. E. C. spontè, vbi copiosè floret Iunio, Septembri & Octobri, Basileæ quoque & Geneuæ obseruauit. Argentinae vidi in horto D. Frid. Meier, Iulio florens, flore purpureo cinereo & albo. Trachelio minori idem natales cum Locum maiore Lobeli] squalidorum marginum & montium pratorum Germaniæ & Angliæ sunt. Ceruicaria minor Dod. Thalo passim locis apricis maximè. In Silesiæ agris & pratis aridioribus frequentem scribit Schvv.

Trachelii minoris folia Rapuntii sapore primum Vere acetariis etiam adduntur, Lob.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Lobel. not.

Ceruicaria

exst. p.

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

Lobelia

TRACHELIVM RAOSVM FLORIBVS
pleritque singularibus.



Est nobis ne-
scimus unde
deplanta sicca,
ex Trachelio-
rum minorum
genere speciosa:
radix crassiuscu-
la, vncias qua-
tuor longa pa-
rum fibrosa: fo-
lia ad radicem
multa ex breui-
bus pediculis
vnciam vnā
vel duas longa,
mediam lata:
caulis hirsutus
pedales in ra-
mos diuisus,
qui desinunt in
folia breuia, lata,
ex quorum me-

dio oriuntur magnæ Campanæ purpureæ, ple-
rumque singulares.

TRACHELII MINORIS SPECIES DVÆ,
sive Rapunculus filu. umbellatus
maior & minor Thalyo.

Lacteo est succo, sicut reliquæ Rapunculo-
rum species. Duplex verò reperitur: maior,
quæ raris obuiam sit, ex vna radice numerosissi-
mos profert colicibus, tenues, teretes, scabros, hi-
spidos, sesquipedales, foliis plurimis, oblongis, hi-
spidis, angustis, fimbriatis, ac hispidis præditos, in
vmbella parua flores cæruleos continentes: se-
mine fuluente exiguo. Minor species locis arido-
ribus ac soli expositis, maximè verò arenosis
frequentior est foliis & caulibus breuioribus, vt
& vmbella sua cærulea:

Thal. Harc. Rapunculus filu. cæruleus vmbel-
latus maior & minor.

C. Bauh. phyt. Rapunc. 5. sive vmbel. latifol.
Thalyo, Rapunculus filu. cæruleus umbellatus
minor. Camerario Hort. Icon. 8. Rapunculus 6.
sive vmbellatus angustifolius Thalyo. Rapun-
culus filu. cæruleus umbellatus maior.

Schvv. Rapunculus filu. cæruleus umbellatus
angustifolius, quem C. Bauh. Nabelichr waldi
Rapungel vocat, dicitque Augusto flores ferre
in montanis recessibus ad Quissum fluium.
Quæ sit hæc planta nobis nondum constat: Ger-
manicæ linguæ periti confiderent an umbellatus
bene dicatur Germ. Nabelichr.

TRACHELIVM MINVS ALBVM.

Obseruabam anno 1596. Augusto mense in
cultis hortu Domini Friderici Meier, Tra-
cheliolum minus floribus albis non magnis, multis
simul in extremitate caulis, cubitalis, læuis: fo-
liis longo pediculo vncias tres longis, duos latis,
non in acumen desinentibus, vt cæterarum
Tracheliorum, sciratis, vix asperis, glabris.

Hoc ex sicca describimus. Idem verò suspicio
Tora. II.



fuisse quod an-
no 1600. adhuc
floreus Septem-
bri obseruati in
prædicti hortu;
cuius flores al-
bi vbi exsiccati
subcæruleum
colorem acqui-
suerunt.

TRACHELIVM ALTISSIMVM HIRSV-
TVM ASPERIVS, FOLIIS ANGV-
stis, floribus paruis.



Radice cras-
sa nititur
& subdulci, cau-
lem erigit bicu-
bitalem vel tri-
cubitalem, cras-
susculum, hirsu-
tum: foliis or-
natum angu-
stis, longis, ad
Echii folia acce-
dentibus, aspe-
ris: flores con-
fertim conglo-
merantur, vti
Trachelio mi-
nore, campanu-
latis, sed mi-
nores, cum ta-
men planta
maior.

Hoc Trache-
lii genus inue-
nimus 1592. mense Iunio floreus, inter Sultz
Alsatiæ & Zenne vrbes, artuli plantandum in
hortum Ill. E. C. Montbelgardii.

TRACHELIVM MAIVS PETRÆVM.

Radice lignosa, & rugosa colore pallido pur-
purascente exeunt cauliculi multi striatis
subhirsuti, cubitales, & cum rubore vi-
rides, qui inordinate emittunt folia oblonga, ce-
nata, nigricantia, suâ pariter hirsutie communi-
ta, parte pronâ potissimum, vbi etiam albicant,
& Saluæ folia referunt, magis tamen angusta
& mucronata, inter quæ paruula quædam folio-
la prodeunt: in summo caule sunt flores multi a-
ceruatim congesti, quemadmodum in vmbella-
ta Ceruicaria Penz: & inferius ex eodem globuli
quidam, at minori numero, & inferius magis in-
ter caulem, & folia, alii, & adhuc pauciores, for-
mam repræsentant illiolumiam dictæ Ceruicariæ;
sed minores, albi, & in quinque, & quandoquæ
Xxx



septem mucronatas scilluras diuisi: è quorū centro multa exeunt *stamina* sibilutea, quorū vnum modo Proboscidis egreditur, versus cacumen satis crassum, quod dum maturatur bifurcatum & aduncatum euadit: decedente Augusto florens conspicitur atque talis per plures dies cōseruatur. Vnde Pona hætenus semen minimè

obseruare potuit: inter rimas sflorum asperitiorum lapidum Baldi, solum circa Coronæ Templum pullulat.

**Vires & v-
sus.** Trachelium hoc non acre, non amarum, sed tantum adstringens esse sensu dignoscitur, multoque magis ipsa Cernicaria.

TRACHELIO MAIORI PETRÆO
Ponæ simile, si non idem.

Descriptio.



Nec hætenus nobis visa planta *caulem* surrigit [vt in sicca quam habemus apparet] cubitalem aut altiore, crassum, firmum, lignosum, incano tomento pubescentem, in ramos nullo ordine diuiscatum: *foliis* alterno situ vestitum crenatis, itidem tomentosis, sed magis parte auersa quæ & incana. Ipsa porro

cauli hærentia folia quædam vncialia, longiora etiam, semunciam ferè lata, quædam breuiora, præsertim & angustiora quæ in summo constituta. Quæ verò ramis hærent prædictis multis numeris minora, ramosum summitatem florum occupat glomer densus atque crassus, colore in sicca non satis apparente, facie quodammodò florum Petasites, è quibus *stamina* emicant prælonga, & quantum conuicere licet, nullus manifestus nec odor neque sapor.

Hanc plantam accepimus à Fratre C. Bauhino nomine Crisæ Galli Recentiorum ex monte Baldo: Longè tamen diuersa est à Crisæ Galli quia Campanulas fert, vt primùm animaduertimus 1609. ex pulchra planta Veronâ missâ per insignem Botanicum & Pharmacopœum Petrû Ponam. Nos quidem tenemus esse idem cum Trachelio maiori petraeo Ponæ, qui in monte Baldo eius iconem proposuit minis artificio-

lam, nam in ea pro foliorum crenis longi pinguntur pili.

TRACHELIUM TRAGOPOGI
folio montanum Fab. Columnæ.



Non è florum forma, natali loco, annique tantum tempore quo floret, sed & lactis copâ, substantiâ foliorum, & sapore totius plantæ, Tracheliorum varietati, sic à Recentioribus, quia tracheæ locis que vicinis medeatur, vt dictum, appellatarum, reddenda est hæc noua planta, in D.M. Vir-

ginis Monte, sic vulgò dicto, exoriens.

Radicem quidem habet crassiusculam albidam lactescentem, & ex ea plures propagines habentes *folia* angusta, longa, duriuscula, Croci aut Tragopogi formâ, & magnitudine. Veris sine *caules* pedales edentes subrubentes, atque hirsutos, quibus *folia* alternatim, rariâque hærent, in quorum summo sex aut septem simul flores purpurei Nolæ forma, Trachelii vulgaris modo, ex basibus singulis quinque foliolis viridibus constructis, exeunt: *fructus* atque *semina* Trachelio etiam similia Aestate perfricit. *Radix* perennis est, atque dulcis, esui apta, sicuti vulgare Trachelium, & Rapuntium.

Clus. in fol. Trachelij genus elegans obseruatum à Fab. Columna.

TRACHELIUM SIVE VIOLA
Calathiana Herb. Angl.



Cvr nulla præsentis plantæ descriptio à nobis adferatur, ratio est quodd ad herbâ iconè expressam, eam temerè more aliorum effingere nolumus. Siquidem nec viua in nostrum conspectum vnquâ venerit, nec nos, quod equidem ingenuè fateamur, linguâ Anglicanâ quâ à Gerardo pag. 365. describitur, calleamus, nec quispiam alius præter eum, Trachelium hoc delinearit. Vocat autem hanc Violam Calathianam, Angl. The true Calathian Dioler.

CAMPANVLA LYCHNIDEA.



Radice fibrosa longa, nigricans, neruum intus habens, in profundum acta, sapore dulci cum adstrictione. Ex ea ramulus fundit multos, rotundos, villosos, incanos, vix palmum excedentes, in quibus folia angustifolia pilosa, incana, per cauliculos incerto ordine distributa, leuiter adstringentia: in summo caulium vertice flores exeunt Campanellae similes, quales in conoluulo, rotundi, ex candido non nihil purpurei.

Lychnidis speciem, Myconus appellauit, à foliorum figura, & horum quadam similitudine: quamquam non tam calida sit, ac reliquæ Lychnides à Diosc. & Galeno tradite.

H. Lugd. Lychnidis silv. species Myconi: C. Bauh. Phyt. Lychnis 14. siue silv. Campanulæ flore.

In montibus & locis maximè siccis prouenire Myconus ait, nec alibi à se visam quam in montibus D. Mariae à Monteferrato. Floret Maio mense.



nor, magis fibrosa tortuosaque. An Theophr. l. i. hist. pl. c. 21. Iafone. An Plin. l. 21. c. 22. Iafone. olus.

Autore Gesnero hort. Germanis quibusdam inferioribus, Campanula cærulea, quæ Coudenberbius Rapi silv. quod Rapunculum vulgò dicunt, speciem minorem facit, eamque hortensem, Belle videre, siue Beluedere, vocatur.

Belle videre, siue Beluedere, vocatur.

Non desunt annotante Matthiolo, boni simplicista qui volunt plantam cuius figuram exhibet, esse verum Phyteuma: qua de re tamen adhuc aliis iudicium relinquat. Figura Matthioli depicta est ad siccam herbam.

Campanulam cæruleam satuum Dod. in hist. Gall. vocat. Germ. Blaw Cloefens: lib. de flor. & in fol. Campanulam hortensem maiorem, eoque nomine depingit: dicens: siluestrium Raporum species vulgò Campanula nominatur, plerisque Beluidere. Matthiolus Phyteuma esse existimat, ei tamen Iafone Theophr. & Plinii similior videtur. Non sanxit autem Matthiolus Campanulam horrensem esse Phyteuma, vt Lob. & Pena asserunt his verbis. Nos fratres Campanula duæ hottenses, Persicifolia, lactinosæ, flore volubilis: eis nolæ, cæruleæ, albidæ: Putantur merito Theophrasti Iafone, capitula insunt foraminulis peruia, quod imposuit Commentatori, qui idcirco putauit & sanxit Phyteuma.

Clus. hist. post. Campanula Persicæ [Mali] folio nunc cæruleum, modò album florem profrens, alibi verò Campanula angustifolia, siue Matthioli Phyteuma.

Tabern. Icon. & hist. Campanula angustifolia flein glöflein. An eadem Icon. & hist. Rapunculus 6. nemorosus 2. waldt Rapunzel. Item Rapunculus 7. nemorosus 2. waldt Rapunbel. Gerard. p. 367. Campaula Persiciflora pzeach lased Wolfflower. Item Campanula lutea hinfolia yello w Wolfflower: Fallus hic titulus pro Rapunculo nemorosus 3, Tabern. cuius icon à Gerardo proponitur.

An C. B. phyt. Rapunculus 8. siue nemorosus folio oblongo crenato, Tab. Nemor. 2. Rapunculus 9. siue nemor. breui folio crenato Tab. Nemor. 3: Huius aliquot species obseruare licet, vt & Thalius in sua Hareynia monet, huc enim eius secundus, quartus & quintus pertinent. Rapunculus 10. siue angustifolius non crenatus, Thalyo campanulatus nerifolius 2. Item Campanula angustifolia, Lobelio Persicifolia.

Rapunculis annuero, ait Thalius, stirpes illas lacteo succo præditas, ac Rapunculorum modo oblongioribus & lactescenibus radicibus, supernè protuberantibus constantes, & Campanulatos flores edentes, vnde Campanularum nomine communiter herbariis vocatè veniunt: quibus omnibus folia sunt Nerio similia, longior,

Phyteumæ:

Label Pen. not.

Matth. nob.

CAMPANVLA ANGVSTIFOLIA cærulea & alba.

Procera est ad cubitos duos, caule anguloso, rigido, ex atro virore splendente: folia stricta, non multùm culmo latiora, palmo longiora, rigida, leuiter denticulata, proximè cauli alternatim adnascuntur, æque eorum alis pediculi prodeunt, vnum, duos, aut plures flores sustinentes,

Campanæ vel Calathi figura, vt in Rapuntio, sed magis patulos, in quinque acutiores lacinias deliscentes, colore plurimùm cæruleo, rariùs albo, à piceibus concolombus: succedunt capitula, tribus foraminibus peruia, supra umbilicum sese tollentibus quinque foliis. Radix quàm Rapuntio mi-



giora ac latiora in quibusdam speciebus, in quibusdam etiam breviora ac angustiora. Hincque eas rapunculos *varios dicitur* appellant. Harum abquot species facillè admodum industriore herbarum perscrutatori patebunt, Ego verò recensebo hinc tot, quot illo in genere hæcenus per Harcytiani nostram mihi obseruare licuit. Rapunculus ergo Campanulatus Nerifolius *primus* cauleni habet setiquipedalem, teretem, parum striatum, inter folia adnata quædam seu brachiola explicarum: *folia* autem Nerii quincunciali longitudine, vncialique fermè latitudine: *Urem* Campanulatum, cæruleum, in ambitu orificii parum dissectum. Securus folia obtinet priora crebriora, pauloque angustiora, longioraque multò, utpote dodrantalia: caulem item crassiora: florem priora maiorem. *Tertius* &iple quoque folia exhibet angustiora, secundo tamen breviora: flores verò ampliores maiorisque, Cymbali alicuius patentioris in modum, in extremis oris diuisos. *Quartus* caulibus brevioribus, foliis item minoribus, quorum ea quæ radici propinquiora sunt, vnciarum fermè trium sunt longitudinis, dimidiæ autem latitudinis: quæ verò per reliquum caulis conspiciuntur, uis breviora sunt: flouibus est admodum patentibus repandisque, sed tertii minoribus. *Quintus* caulis est pedalis, paulòve procerior, alper, non admodum foliosus: folia verò sunt nigriora, vncias quatuor, aut quinque longa, vnam verò penè lata: flores cymbalares, minores, apert, ventre tamen eius non in rotundam cauatatem expanso, ut in illarum specierum floribus, quas iam recensui, videre est, sed plicato. *Sextus* Rapunculus Campanulatus aut Nerifolius minor, caules erigit pedales, angulosos, scabios: folia eius, ea videlicet, quæ radici proxima sunt, vnciarum quatuor longitudinem assequuntur, vnius verò latitudinem: reliqua quæ cauli appenduntur, triuncialia sunt, & breviora etiam: caules huic speciei in summum in brachiola diuiduntur crebriora, tenuiora, flores exhibentia Campanulatos, cæruleos, plicatos, in ambitu ad orificium diuisos.

Schvv. Campanula angustifolia cærulea maior Matth. *εὐπωρα* Diosc. Lob. Campanula Persici folia nostras Wald glöcklein / wald Cymbeln / Taubeglocken, Grosse Schellen. Campanula minor angustifolia flore albo, weisse wald glöcklein. Item Rapunculus *νερίοφυλλος* aut Campanulatus. Thal. wald rapunzel / wald Glocken. Miror non annotasse Schvvenck. quem Nerifolium Thalii ex iam recensitis intelligat.

Locus & Tempus

Campanula angustifolia flore cæruleo & albo copiosè prouenit in horto Ill.E.C. flore cæruleo inueni spontè florentem Iunio in Alsatia inter Sultz & Zenne Verbes, alibi præterea flore modò cæruleo, modò albicante variis in locis inter dymetra inueni. Geneuæ cum essem abundantem vidi circa Montem Saleuæ. & virentem ibi principè Februarii inueni, prouenit etiam copiosè non longè à Geneua in colle *La Bassie*. Campanula angustifolia maior Schvv. in collibus apricis & frutetis Iunio & Iulio floret, vsus neglecti.

Vires & vsus

Horti voluptatis causa habent, tamen si in oleo mandiqueat, Lobelius.

VIOLA MARIANA DODONÆI, QUIBUSDAM Medium.

Descriptio

Radix vesca, dulcis, alba, longa, crassa: quæ caulem emittit plusquam bicubitalem, tere-

tem, hirsutum, asperum, in ramos diuisum: *folia* Trachelii siue Campanulæ maioris, angustiora, longiora, bifida, crenata, & modicè per margines inspa: *flores* ramulorum extremitatibus insident, calathii seu Campanulæ sortati, maiores quàm Trachelii, ventrosi, oris in quinque laciniis diuisis, colore cæruleo seu violaceo, purpureo aut albicante, in quorum medio *stamina* latent lutea stibusque e-



rectior, luteo puluisculo resperfus: insidet autem totus flos *calathii* crebris thornis hirsutis inæquali, in quinque acuminata foliola floribus latentibus appressa distincto. *Semen* exiguum, spadicum.

Rapunculi *Diosc. crenat.* alterum genus grandius Diosc. Medico vocat: apud

quem autore Casalpino legendum Scridi [folia similia] ut legit Orbazius [ac etiam Ruell. & Marcell. & Marchiol.] non Scridi, ut vulgati Codices habent.

Gefn. Rapi sylustis genus maximum, quod aliqui Medion vocant.

Tabern. Hist. & Icon. Waß Marien glöcklein, Viola Mariana alba: & Braün Marien glöcklein, Viola Mariana purpurea: Medium, Germ. Glockenbüun.

C. Bauh. Campanula 17. Viola Mariana. Sunt qui Rapum silu. Diosc. alii eiusdem [Dodonæus] Raphanum silu. alii Medion Diosc. sed malè, autumant. Variat flore nunc purpureo, cæruleo: nunc suballido aut lacteo: Reperitur quoque flore pleno.

Gerard. Viola mariana, Mercurius violæ Centric Rapæ / Maricæ blew & white Coentric bels, & Viola Mariana flore albo. Rapum silu. Græcis *ραγγύλην ἀγρία*

Violam Marianam Recentiorum plerique Medion esse volunt, quamuis Viola Mariana, Dod. teste, non admodum respondeat Medio à Diosc. descripto. Quare non Medium, sed potius verum Dioscoridis Rapum silu. videtur (*ραγγύλην ἀγρία*. *R. n. pum*) quæ Græcis dicitur cum cuius descriptione magis

Dod. n.

Medion

conuenit. Cuius tamen descriptio superfluum quorundam accessione corrupta.

Viola Marianæ varietates tradit Cladius. Viola Marianæ quibusdam Medium creditur, vt plurimum quidem Violæ coloris flores gestant: sed tamen etiam albas, interdum exalbidis, nonnunquam cineræ coloris, atque etiam vesicæ coloris, hoc est, ex albo & violaceo, vel maculatim vel radiatim commixtos.

Violam Marianam Dodon. siue Medium quorundam habui Genevæ in horto. Basileæ vidi in horto D. Felicis Plateri: Patavii in horto D. Cortusii, Ianuario, is vocabat Medium: Bononiæ in horto di S. Salvador, albugo di S. Catharina: Montbelgardi ex semine mibi feliciter preuenit in Horto E. C. Bore penè candido & purpureo copiosius: primo anno non fert caules, vbi autem semina caules tulit perig. & semine delectuo se propagat. Nascitur, vt aiunt, in siluis & montibus, nec non in opacis quibusdam tractibus vt Matth. refert, plarilque Italiae ac Germaniæ locis: apud Belgas in hortis colligitur. Inno, Iulio & Augusto mensibus floris eius productio: semen interea ad maturitatem petuenit, neque enim simul sed particulatim floret.

Ceterum, quod ad facultates atinet, si Dodonæo credimus, radix Violæ Marianæ refrigerantis & nonnihil adstringentis est potentia: est, vt aliorum syluestrium Raporum, apta est, & non incommode acetariis additur.

MEDIUM DIOSC. RAVVOLF.



Inter frutescens in altum exurgit. Viola Marianæ Dodon. persimilis est planta, nec ita obuia cuius differentia apparet, præterquam in foliis quæ in hac diuisa magis, Cichorii instar. Flores etiã magis panduntur, octo foliis in orbem dispositis constantes: radicis austeritas maior quàm capitulorum seminum, quæ tamen

nondum erant matura. Rauvvolf.

Rauvvolf. Medium verum Diosc. & Mindium

Rhazis, cuius icon apud Rauvvolf. par. 4. N.º 284.

Medium Diosc. vel Mindium Rhazis foliis Plantaginis minoris, Hist. Lugd. Quæ malè conuertit

Wegwart vocabulum Germ. Plantaginem, cum sit Cichorium.

C. Bauh. Phyt. Campanula 18. Viola Mariana

laciniatifoliis, peregrina.

In profunda tenebrosa & aspera valle Libani:

Rauvvolf.

CAMPANULA MAIOR ET ASPERIOR folio Vrticæ.



Medium Descripção Mal Viola seu Medium quibusdam dicitur accedit: radix alba, Rapunculæ, sapore non mundigato, caules cubitales & altiores, hinc in quibus altera aut nascuntur filia Vrticæ, pilosa, acutiora: flores ex foliorum albis carulei, violacei, aut albi, nola similes, Marianaæ Viola, sed minores, calyce

parno, nec vt in illa tortilis annulato, in lacinias quinque, sicuti & flores, diuiso: stili triceps, colore purpurascens, albedo, vel herbaceo, surretchor, staminulis circumspatur luteolis.

Fuchl. Campanula Germ. Halßkraut hoc est, Ceruicaria. Gull. Gands usque Dine, ou Gantelée. Dodon. de flor. Rapum siluestre 2. Belgis Halßkruyt. Ceruicaria maior, Græcè γανδαρίων plarilque Vaular. In hist. Gall. Ceruicaria Item Læ. in fol. Ceruicaria maior, cuius flores aut colore candidi, aut dilute purpurei, vel ad ceruleum inclinantes. Huius species quædam est foliis aliquantò leuioribus: floribus elegantioribus coloris purpureo cerulei, cuius radix aliquot annis vitæ restat, & Vere regerminat.

Clus. in Pann. & inst. post. Trachelium foliis vrticæ, & Trachelium aut Campanula vulgò dicta. Campanula quibusdam herbariis vocata Archangelica.

Lobel. & Pena γανδαρίων, siue Ceruicaria & Vaularia, Belg. & Germ. Halßkraut. Trachelium siue Ceruicaria: Vaularia Tragi & Herbariorum. Campanula Fuchli & Archangelica quorundam. Trachelii varietates. Passim istud etiam asperis, saxosis Angliæ & Gallo-belgiæ siluosis fructuat: sed strigosius, hilari minus & amœno aspectu alioqui persimile & congener.

Thal. Harc. Ceruicaria maxima, foliis vrticæ maioris, caule serpente tubitah, floribus magis ceruleis, quandoque etiam albis.

Tab. hist. hb. 2. & Icon. p. 412. 413. & 414. Ceruicaria, Vaularia, Campanula maior 1. Halßkraut. Maior 2. Groß halß kraut. Tertia alba, Klein halß kraut. Ponit Taberna quidem icones: sed discrimen non tradit.

C. Bauh. phyt. Campanula 11. folio Vrticæ. Variat flore candido, dilute purpureo, vel ad ceruleum inclinante. Reperitur & strigosior. Campanula 12. foliis Vrticæ, sed leuioribus, Dodon. Ceruicaria maior altera.

Gerard. Angl. Trachelium 1. maius. cantabærie belß. Trachelium 2. maius albo flore. Trachelium 3. maius Belgarum Lobelii, dūrch Trote voort [Tab. Ceruicaria 4. alba.] Trachelium 4. minus Small canterburie belß. Tabern. Ceruicaria 3. alba.

An Gelnher. hort. Rapi syluestris genus mas

Ceruicaria alia species

Tab. not.

foliis ferè vrticæ.

Schvv. Trachelium maius purpuro-nioloaceum
Braune Glocken / Braun finger hirtlin. Tra-
chelum maius albo flore. Ceruicaria alba Tra-
go, Weiße wald glocken, zapffenfräut. Trache-
lum alpinum maximum. Ceruicana maxima, ac
hominis proceritatem sæpè assurgit.

Locus &
tempus

In Pann. Austria, teste Clusio, nullæ montosæ
sunt siluæ, quæ Trachelium vrticæ foliis subce-
ruleo flore non alunt: subluniora iuga, vt
Schneeberg & alia similia, idem quod albo flo-
re est. In Silesiæ pratis & siluis cæduis saltuosis
inuenit Schvvenckfeldius: maius flore albo in
conualibus ad Boberum vmbrosis Iulio floret.
Alpinum maximum, sæpè in foueis niualibus
vdis herbidis assurgit, Iulio flores campanulati
prominent.

Passim in comitatu Montbelg. prouenit Cam-
panula Fuchsi flore dilute purpureo, vel ad cæ-
ruleum inclinante, vidi etiam candido propè
Vise Burgundiæ, vnde transfuili in hortum Illust.
Principis. In monte Rößberg propè Nassim-
ster inueni florentem mense Octobri, Geneuæ
etiam florentem Maio, Basileæ mense Iunio ex-
tra portam Stein in colle ad sinistram, & aliis
locis multis, radices similes A sphodelo, in siliua
quæ itur Basilea in Bietze Marchionatus florens
Octobri: Vidi Pataui in horto Domini Cortu-
sij. Campanulam Fuchsi flore omnino albo vidi
in dumetis cundo Basileam prope Feuray pa-
gum, mense Iulio 1607.

Vires &
Temperam.

Gustu adstringit, vt hinc exsiccandi illi vini
esse quisque conicere queat. Adstringendi ha-
bet facultatem, ideo que decoctum illius vn-
cè ad oris exulcerationes, aliaque eiusdem mala,
quæ adstrictione indigent, confert. Vtilis etiam
haud dubiè ad alia quæuis vlcera, ob insignem
quam obtinet in exiccando facultatem, Fuch-
sius. Radices potè omnium horum refrigerantis
potentiæ sunt & nonnihil adstringentis, possunt
autem omnes vnà cum aliis in acetaris eda. Sunt
etiam qui Ceruicariæ radicem decoctum aduer-
sus incipientes oris & tonsillarum inflamma-
tiones conferte affirmant, Dodon. Radix alba tene-
ra in acetaris apta ieiunio verno præsertim, Lob.

CAMPANVLA SIVE CERVICARIA MA-
ior læuior, flore albo magno.

Descriptio



NObis de-
dit Domi-
nus Agerius
plantam nomi-
ne Ceruicariæ
maioris flore
albo, foliis gla-
bris, differt mul-
tùm à nostra
Campanula
maiore & aspe-
riore, ea enim
vix apparentes
habet pilos,
serraturæ etiam
minores, nec ita
inæquales, flos
Campanulæ a-
lioqui magnus,
albus. Tota
planta prædicta
minor atque te-
nrior apparet.

CAMPANVLA ALPINA GLABRA FLO-
re diluissimo cæruleo.



minora sunt quàm Campanula nostræ minore
flore, flores etiam paulò minores videntur in
vnum latus versis, ex breui pediculo nutantes.

CAMPANVLA SIVE CERVICARIA BO-
nonientis paruo flore.



INsignis & di-
ligens Botani-
cus Dominus
Doctor Ageri-
us Medicus
Argentiniensis
pulchram plan-
tam dedit nobis
nomine
Ceruicariæ Bo-
nonientis, vt
pote que Bo-
noniæ copiosè
proueniat. Ea
licèt non inte-
gra, bicubitalis
erat, caulis ro-
tundus, fungo-
sus, non nihil a-
spersus, folia pec-
caulem sine pec-
diculis hærent,
cum ferè amplectentia, in quo differt à nostra
Campanula repente flore minore, sunt etiam iis
latiora, latitudinis pænè trium vnciarum, longa
quatuor, plùs minus, serrata, infernâ parte albi-
cantes pilos habent valdè exiguos: summitas
quæ floribus vestita pedalis est, & quamplurimis
abundat Campanulis, quibusdam ex breuibus
pediculis cauli hærentibus, aliis ramulis breuibus
duarum aut trium vnciarum.

CAMPANVLA REPENS FLORE MINO-
re cæruleo.

CAMPanulæ Fuchsi assimilis, sed radice impor-
tuna petulantia reptat, alba, crassa sic latius
fibrata,

fibrata, gustu dulci, suavi: caules cubitum vnum
aur alterum alti, brachiati, subrubentes, ferè
glabri in quibus folia alternata, serrata, minimùm
hirsuta, nec aspera, vt Campanulæ iam dictæ, &
angustiora, quæ in caulibus quidem carent pec-



diculis, at in-
feriora, vt la-
tiora sunt ita
longis pedicu-
lis sunt appen-
sæ: ex foliorum
alis Campanulæ
singulares
prodeunt, vio-
laceæ, magni-
tudine & for-
mâ Rapuncu-
li fatium, apici-
bus cbloris, sti-
lo truncati, ca-
lyculis in quin-
que laciniâs,
quæ scilicet
sunt floris lac-
ciniæ, diuiso,
Floris verò se-
ctæ laciniæ pi-

lofæ conspicuntur. Nondum expansus flos pen-
tagonus est, interque angulos pulchrè carinatus.
Figura quæ Fuchiana est, nec prima folia haber.
nec in cæteris nimis affabrè picta. Tolerabilis ta-
men.

Gesner. de coll. stirp. Rapum minus suis radi-
culis serpens.

Dodon. de flor. & in fol. Rapi quartum genus.
Clus. in Pann. & hist. post. Trachelium aliud
mollioribus foliis, radice mitè serpente, cuius rei
causâ rei herbariæ studiosis est exosa.

Montbelgardii in Horro II. E. C. prouenit mihi
Campanulæ genus, radice reptante, quæ ita re-
plet areas vt vix eradicari possit: eandem vidi in
horto Di. Dauertii in Audincourt, & aliis pagis
vt Rath. Floret Augusto, Septembri & Octobri.
Basilæe copiosè prouenire obseruauit Frater.

Similes facultates ac temperamentum huic
Dodon. tribuit quod tribuebat Campanulæ Fuch-
sii, dicens, refrigerantis potentia & non nihil
adstringentis, ac radices edi posse in acetatis.

CAMPANVLA SIVE CERVICARIA ME-
DIA THALIO FLORIBUS CÆ-
ruleis paruis,

Cervicaria Media Thalii, locis montanis &
Soli meridiano expositis nonnunquâ pro-
dit, caule tereti, aspero, foliis plurimis amictis, mi-
noribus multò, viridioribus superius, inferius
candidis, lanugine vestitis, quali folia Althææ, si-
cut & folia mediam figuram inter Vrticæ maio-
ris breuiora folia & althææ referunt. Caulis vt
plurimùm vnicus est sine ramosis adnatis, saepe-
numèrò tamen in plures diuiditur brachiatus
virgulus. Circa medium serè caulis vbi maiora fo-
lia exoriri desinunt, frequentes æquebrosus adna-
suntur, ordine per certa interualla vsque in api-
cem caulis consequenter, ac ex alis peculiaribus
ad latera erumpentes, tenuibus quibusdam so-
liolis iisque incipitatis parum ac agminatim den-
seque sibi coherentibus constitutæ, ex quibus
longa serie in scapo flores crebri prodeunt ele-

Tom. II.

ganter cærulei, similes prioribus, sed multò mi-
nores.

CAMPANVLA PVLCHRA
à Toscano Carolo missa.



Huius 7a. Descriptio

Huius, non
altè quidem vt
illa demittitur,
sed innumeris
tamen fibris la-
rè cæspitem oc-
cupat, candidi-
tibus, lactifluis,
dulcibus, caules
còplures duo-
rum aut trium
cubitorum al-
titudine conca-
ui sunt, minimi
digni crassitudi-
ne, striati, mini-
mùm hirsuti:
folia Vrticæ,
Campanulæ
maioris quidem
formâ, hirsuta,

palmari & sesquipalmari longitudine, latitudine
palmari, in ambitu ferrata, alternatim ex certis
interualis cauli apponuntur: ex quorum alis
singulis singuli flores, partim sursum vergentes,
& partim deorsum inclinantes ex breui pedicu-
lo purpurascere, alibi cum cæruleo, calathis effi-
gie, siue Campanulæ, in quinque laciniâs longas
acutas partiri, foris glabris, intus hirsuti, oriuntur:
apicibus totidem luteis, stilo dilatiore qui in su-
prema parte in tres partes finditur, quæ circum-
flectuntur: Calix quinque cuspides longos ha-
bet: flore marcescente succedit magnum capie-
ulum Mespilo simile, deorsum inclinatum, in quo
semen. Folia inferiora erant in iconè nostra pin-
genda latiora.

C. Bauh. Phyt. Campanula 10. siue foliis Vrti-
cæ latissimis, quam in horro III. Ducis Vvitemb.
Montbelg. collegit. Clusius hist. post. & Lobel.
Obs. & Icon. plant. tom. 2. hanc videntur expri-
mere nomine Trachelii maioris Belgarum.

Toscanus Carolus Pharmacop. Stirpium stu-
diosissimus pulchram hanc Campanulam ex Bur-
gundia misit: quæ quotannis Montbelgardii in
horto III. E. C. floret Iunio & Iulio.

Locus &
Tempus

TRACHELIUM CANDIDUM ANGLI-
CVM MAIUS, FOLIIS FERÈ DI-
gitalis vel Campanulæ.

Semina venusta & rarissime plantæ ad Lobe-
lium misit D. Thomas Penneus Medicus Lon-
dinenensis: ex boreali Angliæ tractu delata, vbi co-
piosa & nusquam alibi, vel à quoquam obserua-
ta. Tota facie Cervicariæ maioris iam descriptæ
abfimilis, sed folia serè digitalis: Flores item Tra-
chellii vel Violæ Marianæ, candidissimi & maiores
& longiores. Caulis binum & ternum cubiro-
rum surrectus. Radix fibrata, crassiuscula, lacte-
fens, variè diuicatur. Semen Trachelii, sed
maius.

Descriptio

Lobel. Obs. Anglicum Septenttionale maius
Trachelium candidum.

Vyy



Gerard. Hist. Angl. p. 365. Trachelium Gigantum Anglis Giant Throatwort.

PYRAMIDALIS VALERANDI HIRSVTA.

Descriptio



PRimo anno mihi caulem non produxit, qui sequente demum anno in tantam excreuit altitudinem, vt facile laeueam æquaret, hirsutus, medulla alba succus, foliis vestitus infernè & supernè hirsutis, acuminatis, serratisque, Campanulæ Fuchsi accedentibus: flores longa serie, Campanulas imitati, Rapunculi vulgati haud maiores,

cærulei, per oras laciniati, ex vno pediculo plures.

Locus

Pyramidalis

Quum Lugduni Medicum agerem prouenit mihi in horto meo, ex semine per Valerandum Dourez affinem ex Sclauonia delato, ipse Pyramidalem nominabat.

PYRAMIDALIS LÆVIS.

Descriptio

LAcete turget radix, Rapunculi similis, testibili fertilitate, se multiplicans, etiam ex frustulo repullulascens: ex qua caules trium quatuorve cubitorum surgunt, leues: foliis vestiti glabris, oblongis, fortuitis crebris incisis, verum inferiora folia palmum aut sesquipalmum longa, palmo latiora, per extremum serè obtusa, & ea quoque glabra, raris admodum cæfatis dissecta, & vix dum serrata: flores à medio caule ad summum vsque fastigium cærulei campanulas oris laciniati expriment.

Videtur nobis Hist. Lugd. Pyramidalis nostræ læuis duplicem & descriptionem & iconem proponere. Ac primam quidem pag. 642. sub hoc titulo: Pyramidalis Rapunculi genus Dalech. Alteram, p. 827. quam Campanulam lactescentem maiorem Lobelii, seu Pyramidalem Lutetanam inscribit.

Campanulam maiorem siue maximam, teste

Dodonæo, sūt qui Columnar-

rem & quidem

Plinii iudicent,

cūm tamen

herbæ Colum-

naris nomen a-

pud hunc non

reperiat, Alii

Anthemum e-

iusdem faciūt:

sed legendum

lib. 26. cap. 8. E-

ranthemum,

quod Anthem-

idis species

est multūm à

Campanulis

differens.

Camer. hort.

Campana py-

ramidalis siue

lactescens 1757



1757, præ reliquis plurimo lacte scens.

Lob. Obs. Lactescens Campanula maior. Pyramidalis Lutetiana. Icon. Plant. pag. 397. Teut. 402. Tabern. hist. & Icon. Campanula Lactaria siue lactescens N. B. G. 16. Klein.

Gerard. Campanula lactescens pyramidalis Ereceple milk Bollflower.

C. Bauh. phyt. Campanula 2. lactescens.

Pyramidalis nomine ante plures annos, her-

bam vidi Basileæ in horto Domini Doct. Zvvin-

ken, vnde semen habui, quod satum Montbelg.

in horto Ill. E. C. prouenit, & sequenti anno se-

men tulit, hæc autem Pyramidalis differt à Vale-

randi Dourez Pyramidalis, hanc enim ad tantam

altitudinem prouenientem non vidi, præterea

folia differunt, in hac glabra, in alia hirsuta, quæ

etiam in hac non ita ferrata: radices vt Rapun-

culis, quæ facile se multiplicent.

RAPUNCVLVS MONTANVS, SIVE

Trachelium montanum.



Folia multa

propter

terram in qui-

bustam dua-

bus vncis lon-

giora, in aliis

quadruplo ad

Echium acce-

dentibus, ex

angusto princi-

pio sensim lac-

tescentia, sen-

simque deinceps

in acumen desinen-

tia, vtrinque

hirsuta, nonni-

hil crenata, co-

stata medium se-

cante. Inter

hæc surgit cau-

lis serè cubita-

lis, hirsutus, enodis, vno aut altero foliolo exi-

guo donatus: flores in caulis scapo superiore,

quinque aut plures, singuli in singulis pediculis

non admodum longis, magni, Campanulæ Fuch-

si similes, ex cæruleo albescentes, calyce hispido

basin complectente: radice crassiuscula & longi-

gulfu-

giuscula esuigrata.

Hist. Lugd. Trachelium montanura.

C. Bauh. phyt. Campanula 15. siue foliis An-

chuta. Inueni in peregrinatione mea Rhetica, cum D. Gesnero Burnonii, florentem Iunio. Hahui etiam Argentinæ ex plantis Agerii, qui collegit in montibus Styriae prope Celsicam Nardum.

TRACHELIVM PVMILVM ALPINVM, lanugine pubescens, singulis floribus ex singulis ramulis satis magnis.

Trachelium pumilum Alpinum Clusii, do- drantalibus est plantula cauliculo striato, in plures ramulos diuiso, quorum singuli sustinent flores satis magnos, cauum, Campanulae instar efformatum, in quinque angulos desinentem, quemadmodum vulgaris Trachelii, aut Campanulae vulgo dicta flos, cinereo colore praeditum: floribus succedunt capitula latis magna, trigona, nutantia, seu deorsum spectantia, quae continent semen vulgaris Trachelii femini non dispar, sed minus & exalbidum: folia quae per cauliculum sparsa sunt, latiuscula basi eum amplectuntur, & in oblongum mucronem desinunt: quae verò summâ tellure stirpi inhaerent, latiuscula sunt, & longiore pediculo innixa: radix pro plantae exilitate satis magna, candicans, superiâ parte in plura capita extuberans, & quibusdam fibris hirsuta: Tota planta lanugine pubescit, lacteo quae succo abundat.

C. Bauh. phyt. Campanula 16.

Nascitur in Schneeberg, aliarumque vicinarum Alpium iugis. Flores profert Iulio.

ALOPECVROS ALPINVS QVIBVSDAM Echium montanum Dalechampii.

Pollicaris crassitudinis habet radicem, sensim gracilescens, palmo longiorem, in apophytes aliquot abeuntem, teneram, ruhentem: caulibus leuipalmaris aut dodrantalibus, crassitie respundet radice, cauis, singularis hirsutus, crebris foliis vestitus, aliis palmum ferè longis, aliis breuioribus, potissimum superioribus, l. titudine femuncialis, hispida, ad Echii folia accedentibus: thyrsum trium vnciarum, aut palmarem, si manifestula sit planta, gerit, florum inter folia emergentium ex caeruleo pallefcientium, oblongorum, & per oras laciniatorum, erumpentibus è medio staminulis.

Hist. Lugd. Echium montanum Dalechampii: aliis Alopecurum montanum. Trachelium Dupontii, Clus. Pann. Ceruicaria maior tenuifolia, Thallio. Trachelium Dupontii, Clusii, & Ceruicaria maior tenuifolia, Camer. hort. Camps nula 14. foli. Echii, siue Ceruicaria maritima Tra-

gi. C. Bauh. phyt. cuius iconem expressam nondum vidit.

Alopecurum Alpinum quibusdam dictam, aliis Echii speciem, quod non placet, cum Geneuae esse, audui repertum in altissimis Sabaudiae montibus.

RAPVNCVLVS SPICATVS SIVE Comosus albus & caeruleus: iteque folio maculato.



Quasi partium Rapuntium, vel Rapunculum vulgus plantam indigitat, ob folium radi- cis, quae sapore & magnitudine cum culmi Rapunculo habet, similitudinem: alioqui folia sunt Viola Martiae, longis appendiculis, nonnunquam nigra micula notata, quamquam videas & stricta oblonga, in caule bicubitali, inani, anguloso, lacmanante: in cuius fastigio spicatus pulcher flos caeruleus aut purpurouiolaceus, ex multis corniculis circa basin in segmenta fissis compactus, huius flos albus cinereus, ve quoque reperitur.

Plant. Icon. p. 329. Rapuntium maius Alopecuri comoso flore, Lob. 178. Teut. 403.

Tabern. Icon. & hist. Rapunculus nemorosus. i. Wald Rapunzel.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. Rapunculus 2. siue spicatus albus, foliis maculatis mas, & non maculatis foemina, floribus albis cinereis. Rapunculum 3. siue spicatum purpur. Dod. Rapum silu. maius Lob. Rapuntium maius Alopecuri comoso flore. Rapunculum 4. siue spic. caeruleus. Trago Rapunculum silu.

An Castal. p. 19. c. 30. Duæ stoculos ferunt veluti in spica dispositos dense, quarum vna foliis Rapunculi constat: Alcea Archangelica minoribus.

Dodon. Gall. Rapum syluestre maius, Rapuntium maius & secundum. Gall. grande Rapunzel.



Germ. Groß Rapunzel. Belg. Grote raponces-
len. quod sine dubio est *Pharus* & Cauda vul-
pis à Theophrasto descripta, Lat. de flor. Rapi-
nquit, sylvestris sextum quoddam genus. Ra-
punculum sextum, colore aliàs candido, aliàs cæ-
ruleo, aliàs purpureo, nonnulli Alopecuron ap-
pellant: Sed alia est. Tragus describit flore caru-
leo: vocatque Rapunculum maius & Rapuncu-
lum sylvestre, Germ. wald Rapunzel. In hist.
Germ. Sic audere vnd gros Rapunzel.

Lonic. speciem globosam habet flore purpu-
rante. wald rapunzel/ groß wald rapunzel/
Rapunculum sylvestre.

Lobel. & Penz. Adu. Rapuntium maius Alo-
pecuri comosum flore: Lobel. Obs. pingit cum lon-
ga spica.

Gesner. hort. Rapi sylvestris genera in sylvis
ac montibus, quorum flores ceu in spica sunt,
alii cærulei, alii pallidi. An eadem de col. sit p. Ra-
pum sylu. floribus vnguium instar recurvatis?
Item Rapunculi sylvestris genus floribus cæru-
leis in se recurvis?

Clus. in Pann. & Hist. post. Rapunculus Alo-
pecuroides longiore spica, aut brevior, coidris
albi vel violacei.

Schv. v. Rapunculus montanus albus, Rapun-
culus montanus cæruleus.

Thal. Rapunculus sylu. communio, foliis Cer-
nicarie mai. mucronatus, caule cubitali, lævi, tere-
ti, flore spicato, ex viridi leniter albente: passim
in pratis & locis quibusdam montanis. Mihi vo-
catur Rapunculus sylu. spicatus albens: licet eius
speciem in Thuringiaca silva, floribus prorsus
candidis viderim. Eiusdem species floribus cæru-
leis, &c.

Camer. hort. Rapunculus flore purpureo, can-
dicante: spicato purpureo & albo.

Geneæ albus cum longa spica, varis in locis
& provenit, vt inter Vibem Montbelgardum
Charmontey, & in sylva le Chefnoy: habui etiam
in Horto E. C. à me plantatum, Rapunculum flore
purpureo & albo globoso, ferè vt in scabiosa,
foliis minoribus, quale Geneæ etiam vidi, vbi
provenit aliud genus cum longa spica plena sif-
culis albis in monticulo la Bassie. Hoc genus co-
ctum comedi in acetariis Montbelgardii: tale re-
perit Frater in monte Mucensii Basiliensium, Ra-
punculum spicatum reperi mense Februario in
montibus Euganeis Italia. Rapunculum flore
globoso Dalech. vocabat, ni fallor, Aphyllantes
genus, eum qui globosam habet florem: Ex vi-
cinis Montbelgardo locis magna Rapuncu-
lum spica longâ transfuli in Hortum E. C. Ra-
punculum flore albo folio maculato observaui
florentem Augusto, apud Fontem aridum S. Pe-
tri. Minus hæc est Lobelio obuiam multis locis
nec nisi montosis aut aliosis pratis & cõvallibus,
vt sunt Mindeni & Norbonæ Aquitanicæ vici-
nis pinguibus, etiam Belgii & Angliæ nemorosis.
Natales eius, inquit Schv. montosa & aliofa
prata, conualesque nemorosa. Iunio spica viget.

Radix, vt scribit idem Schv. venck. priusquam
caulem protrudat, elixa cum sale, aceto & oleo
macerata, cibi appetentiam parit, stomacho pro-
dest & vrinas elicit.

RAPUNCVLVS FLORE GLOBOSO
purpureo.

Descriptio

Vbitali assurgit altitudine caule satis gracili,
parte inferiore purpurascente quodammo-

dù, supernâ viridi cui inhærebant aliquot folia,
quatuor vncias longa, in ambitu serrata, dodran-
tali pedicelo in-
nixa, & ea quid-
em quæ infir-
mae parti caulis
adnata erant,
secundum pe-
diculum, vnciâ
aut pollicem
lata, deinde
sensim in mu-
cronem desin-
entia, quæ verò
medio cauli,
& summæ
eius parti inhæ-
rebant, longè
erant angustiora,
& breuiore
petiolo
fulsa, non mi-
nus tamè longâ
summum caulis
fastigiû desine-
bat in breuem & quasi orbicularem florum spicâ,
quæ folis staminibus ex purpurâ cæruleis, con-
stare videbatur: quibus deciduis apparebant cali-
culi pentagoni: radicem non adferebat, qui in ite-
nere obseruabat, quia erueri non poterat, inter
saxa & confragosis locis nascentem. Tota autem
planta lacteo succo abundabat, non secus ac reli-
qua genera.



Rapunculus Alopecuroides orbiculari penè
spica Clus. Hist. post. sine icone.

Geneæ collegimus globosum purpureum ca-
dice longâ. Locus

RAPUNCVLVS MINIMVS FOLIO TE-
nui gramineo.



Omnia Descrip-
tionum mini-
mum in monti-
bus Rheticis
inuenimus, cui
radix crassius-
cula: caliculus
tenuis duàm
vnciarum co-
mosum gerit
florem cæruleû,
Rapunculi spi-
cati: folia cau-
lem comitan-
tur, ipso penè
longiora, sili
instat tenuia,
numerosa.
C. Bauh. phyt.
Rapunculus 7.
sive umbella-

tus folio gramineo.
Florentem observaui Iunio in Rhætia.

RAPVN-

RAPUNCVLVS ALPINVS
partus comofus.

criptio.



Radice squammas veluti compacti, ex veteribus foliis residuis, vt in Nardo Celtica penè videre est, crassiuscula, sensim attenuata, præditus est: folia fundente numerosa, vnciam vnam aut alteram longa, culmum lata, ad Nardum Celticam accedentia, longis nixa pediculis: inter quæ cauliculus surgit, dum

vnciarum, non sine foliis quæ angustiora: cuius cacumini flores infident Rapunculi comosi, qui cærulei, quantum ex sicca planta colligere licet, stylis longis recuruis prominentibus: picta secundum eius magnitudinem, sunt tamen nobis plantula quædam paulò maiores. Hæc planta videtur habere nonnulla similia cum Rapunculo montis Baldi, cuius etiam vascula hæc pingenda curauimus, quia iam sculpta erat eius figura, vt paulò antè dictum.

Habui ex plantis Di. Agerii pro Rapunculo alpino Cam. flore cæruleo collecto, in Styriæ montibus.

RAPUNCVLO COMOSO SPICATO
aliquatenus affinis ex Baldo.

criptio.



Palmaris est caulis ad imum squammatum, foliis infimis Buttonariæ Bellidis cæruleæ dictæ similibus, superioribus Bellidis maioris profundè ferratis, latioribus quàm inferiora, qualia etiam in summo caule radiatim crebra flori subiciuntur, qui cauliculus comosus: singulares flores etiam masculi, vitem inflatum referentes, imà parte laxiores, albicantes, sensim

tenuantur in ceruleam violaceam per extremas oras crenatam, vnde longè florem supereminens, stamen tenue nigricans in tortiles veluti capreolos desinens emicat.

Hanc eandem plantam ni fallimur collectam

Tom. II.

in Bassauenstibus montibus accepimus à D. Agerio, in qua folia vndique serrata & latiora cum vasculis ad Rapunculi vulgaris vascula accedentibus, quæ curauimus appingenda in tabella Rapunculi parui Alpini comosi, qui nondum erat sculptus.

De hac planta hæc tradidit Ioh. Pona in descriptione montis Baldi. Trachelium petraeum minus in ipsius Baldi altioribus summitatibus, cuiusuis alius plantæ sterilissimis, inter præcipites illas cautes ab eisdem veluti cadentibus pendens, germinat. Eam susè describens, ac addens perennem & adstringentem esse plantam.

C. Bauhino, ùm Rapunculum n. sine Alpinum spicatum similem collectum in Baldo D. Guilandino ostendisset, is Rapunculum montanum, at Nobilit. Cortusum Cantabricam alteram Angularem nominauit. Eundem à Dre. Io. Needorffero accepit, vt apud Matth. scribit, cuius vna radix, quæ tuberosa, est inæqualis Rapunculo vulgato triplo maior: Ab eodem & duas alias Rapunculi species ex monte Sumano, necdum descriptas habet.

Icon nostra sicuti & descriptio factæ sunt ad plantam siccam, quam adhuc habemus, quæ delata fuerat ex monte Baldo per Abrahamum Bohchium Medicum, quamque Frater C. Bauhinus Basileâ misit.

Rapuncul.
montanus.
Cantabri-
ca 2.

RAPUNCVLS SONCHI FACIE
vmbellatus.

Guilland. de Mera Medicus rediens ex Pergrinatione Italica communicabat Rapunculum numquam antè Clusio inspectum, qui abruptus simulis erat, vt Rapunculus flore globoso purpureo, & sine radice, quam eximere non poterat. In pedalem autem excreuerat altitudinem, vel etiam breuiorem: plura, quàm Primum habebat folia, breuiore pediculo, eoque plano subnixa, supernè viridia, infernè exalbida, instar foliorum Sonchi, quibus valdè forma respondebant, erant enim, vtilla, in ambitu dentata, sed minor: summo cauli innitebatur veluti vmbella, longiusculorum calyculorum striatorum, in quinque angulos desinentium, in quibus stros, coloris non comperti, quia neque ipse Mera referebat, neque vllus, in rotâ plantæ umbellâ, restabat, ex quo coniecturam facere licuisset.

Considerandum quantum Rapunculus Sonchi folio Clusii differat à Rapunculo, montis Baldi antè dicto.

RAPUNCVLS CRETICVS PETROMARULA.

Herbam teneram lacte turgentem floribus cæruleis visui gratam Imperati, sic describit Honorius Bellus. Folia profert cichoracea, magna, profundè incisa, in orbem diffusa, saturè virentia, infernè splendens, ad purpuram aliquando tendentia, vt Cyclaminus, læuis, cum autem semine nata prodit, prima eius folia Violæ nigre foliis simillima sunt, rotunda, & aut nihil, aut parum dantaxat serrata: cauliculos autem multos habet, rotundos, striatos, bicubitales, aut tricubitales: quibus in nascuntur flores copiosissimi, purpurei, hyacinthi Orientalis florum æmuli, densè compacti, vt spicam, eamque magnam referre videantur: quibus

succedunt *semina* minutissima : *radice* firmatur magna alba, in alas diffusa, eduli, sapote rapunculi radicem imitante. Tota planta lacte abundat.

Rapunculus quem Creticum ac in acetariis gratum dicit Imperatus, herba est Creta siue Candix propterea dicta ibi *Petra Marula*. Rapunculi speciem à Nobiliss. Cortuso *Petra Marule* nomine accepit C. Bauhinus.

Petra Marula.



Lactucastraa.

quod lacte abundat. Et quia radix manducata, tum etiam caulis adhuc tener, Venerem stimulare vulgò dicitur, idè nomine obscuro *πετροχουλι* vocatur.

Rapunculi genus.

Rapunculi genus videtur Clusio. Hanc exhibet Io. Pona in descriptione Baldi, nomine Petromarula, seu Lactuca Petrea Cretica Belli.

Locus & Tempus.

Cretica planta est, & nusquam alibi quod sciat Hon. Bellus, spontè ptouenit, ea reperitur vbique in aruotum marginibus, secus vias lato solo, inter saxa & super parietes. Floret verò & aestatis principio, Maioque & Iunio arefcit tota, præter radicem, quæ Octobri foia proferre incipit, & virescitur tota hyeme.

ERINVS DALECHAMPII.

Descriptio

Locus.



Ocimum es-tratum.

canà lanugine propè verticem obductis, foliis ocimi, minoribus tamen quàm in primo genere, quod ocimum citratum Serapis vocat, in

ambitu minimè incisus, nec crenatis, iuxta caulium fastigia, *ἡ ἀνωθεν ὑπερὶ τῆς κορυφῆς*, inquit D. ofcorides, in longum & angustum veluti fissis penè instar Pinastr.

Quæ sit Erinus Dalechampii, vt verum cum Fratre C. Bauhino in phyt. p. 427. fatear, nondum mihi constat: hoc mihi valdè, quod Dalechampsius flores & semina pingere curarit, nec de seipserit: figura præterea non videtur respondere descriptioni, vnum enim habet caulem, cum Dalechampsius dicat multos habere. Sed & Fabio Columnà teste, non est Erinus quàm postemò Dalech. hist. lib. 9. cap. 171. proponit, solus minimè incisus. Ac an rectè suprà citata Dioscoridis verba vertentur, & vera sit ab ipso depicta planta, quilibet ex suprascriptis iudicabit.

Dalechampsii.

DIGITALIS PURPUREA.

CAP. II.



Est vbi cubis Descrip-
tos duos
superat Digita-
lis purpurea,
caule pollicem
crasso, angulo-
so, hirsuto, sub-
rubente, con-
cano, ex radice
fibrosa, amara:
flores in thyrsi
longioris mo-
rem: sequen-
tes ab vno cau-
lis latere, pen-
duli, breuibus
hirsutis pedi-
culis, quorum
singulus est ap-
positum folio-
lum acuminat-
um, calathi

aut digitalis sartorii munimenti effigiatura, colore foris coccineo, excepta inferiore parte quæ propter non nullam admixtam albedinem carneo est, intus verò similiter purpurei: inferiore parte (quæ & pilis longis obsita est) versicolore, albis maculis nigro guttatis: floris basi penitus adnascuntur *stamina* alba, aut purpurascencia, contorta, quæ apices didymos croceos guttatos sustinent: *stilus* tenuis purpurascens ex hirsuti oblongique petalorum mucrone protenditur, cui postea inclusum continetur *semen* minutum. *Folia* Verbasci opinionem rectè sustineant, oblonga, in acutum desinentia, hirsuta, in ambitu serrata, supernè atroviuentia, infetnè incana.

Digitalis purpurea Anguill. Fuchsius, quem rai- Fuchsius
ror non diligentius eam describere.

Hanc pulchre describit Dodon. Gall. non tamen addit figurà dicens: hæc herba vocatur Digitalis, Campanula syluestris & Nola syluestris: est, vt quidam scribunt, species Verbasci, Græcis dicta *λυχνίτις* & *ἁβυδάρις* cum qua magnà habet similitudinem: de flor. autem, satis commodè depingit & describit, dicitque: Fuchsius appositè Latine Digitalem nuncupauit, descriptio autem Lychnitis non conuenit.

Digitalem flore luteo & purpureo vna figura (quæ ad luteam videtur pertinere) & descriptione Tragus comprehendit, non distinguens plantas nisi colore florum, ac ait. Quod ad caules & foia attinet, posset hæc planta Verbascis ad-
iungi:

iungi: At si vel florem vel eius facultates spectes, videtur sanè ad Galiofin referenda, de qua Diosc. lib. 4. cap. 90. Nos Campanulam seu Nollam silv. nuncupamus.

An Ruell. lib. 3. hist. cap. 37. Baccharis herba, nostrates Officina non norunt, rura apud nos Diuræ Mariæ Chirothecas appellant.

C. Bauh. phyt. Digitalis 1. seu purpurea. Digitalis, inquitis, dicta à florum similitudine; qui digitale referunt: Sunt qui ad Verbafeum, alii ad Alismatis alterum genus apud Plinium referunt.

Digitalis purpurea *Daunlinis* Tabern. Germ. fingerkraut/ fingerhüt/ braun fingerkraut/ braun fingerhüt/ wald glöcklin & wald schell. B. Vinger boer cruyt. Gal. *Digitale, doigtier, gants nostre Dame. It. gantelli. Angl. foxe glove. Hung. Vy siu gyzeu siu.*

Digitalem purpuream habeo in Horto Exc. C. quam plantavi & seminavi, collectam propè Girarnegni vbi fodina argenti, copiosè etiam reperi inter Malmunster & S. Thamarix in monte Rofsberg, vbi etiam collegi semen, mense Octobri florebat adhuc sub arboribus, altitudinis hominis, ni etiam maior, cum foliis latis & valdè hirsutis: non longè à Lutea prouenit, & in montibus circa Thermas Plumbarias florens Iunio. Geneuæ habebam in horto, Bizantii vidi in horto Domini Doctoris Chiffleti, Basileæ in horto Domini Doctoris Fælicis Platèri: Bononiæ in horto S. Saluatoris al burgo di S. Catharina. Montbelgardi in Horto E. C. floret Iunio, Iulio, & Augusto, flore purpureo & panè rubello. Semine maturo Iulio: prope Castellum Passauent Ludrensis ditiois. Flore albo in horto Montbelg.


DIGITALIS FLORE MAGNO CANDIDO

Bleubitalis est planta, cui radix digiti crassitud. Ætine, alba: *folia* Digitalis purpureæ, hirsuta: *florum* magnitudo par, sed color lacteus, inferna parte intrinsecus punctis fuscis aspersis.

Icon. Plant. p. 572. Digitalis alba Teut. 674. Digitalem flore albo à se visam Basileæ scribit Fr. Casparus Bauhinus: Eam ego cum pulchro magno flore purpureæ similem habeo Montbelgardi in horto Ill. E. C. florentem Iunio & Iulio.

DIGITALIS LYTEA FLORE MAIORE,

folio latiore.



Minor hinc quam Purpureæ magnitudo: nec dissimilis radix: *caules* angulosi, nonnihil hirsuti: *folia* angustiora, longa, infernè neruis hirsutis rugosa, supernè penitus glabra, atroviuentia, in ambitu crenata, sapore subamaro & acri: *flores* Digitalis purpureæ parces, foris intusque hirsuti: sed colore, extrà quidem di-

lutè luteo, intus verò croco saturatiore, languidèque luteo versicolores.

Figuram Fuchsi Dodon. Gall. habet, non autem describit: sed tantum colore floris luteo distinguit à purpurea, licet foliis multum differat. Digitalis tertia eidem de flor.

An Digitalis lutea Anguill. Digitalis Fuchsi minor flore maiore, Gesner. hort. Digitalis maior flore grandifuculo pallido, Cæsalp. Digitalis lutea, Geelfingerhüt, Fuchsi. Thal. ac Tabern.

Cæsp. Banh. phyt. Digitalis 2. siue lutea magno flore. Sunt qui Calathianam Violam apud Plin. lib. 21. cap. 6. censent. Hæc non solum floris colore à purpurea variat, sed & foliis, quæ in illa Verbasco similia, in hac verò ex viridi nigricantia, sed lanuginosa.

Digitalem luteam flore maiori luteo reperi copiosè florentem Iunio inter Montbelgardum & Meruelze, eandem habeo in horto E. C. per me satam, vbi ex luteo pallido & albicante florens Iunio & Iulio: Bononiæ in Italia vidi in horto S. Seruatoris al burgo di S. Catharina: Quum esset Geneuæ reperi in monte Thuri mense Iunio cum suis magnis floribus, foliis latis & hirsutis: prope Castellum Passuunt in Ludrensi ditioe flore ex luteo albicante copiosè florentem Iulio vidi.

Locus & tempus

DIGITALIS FERRUGINEA FOLIO angustiore.



Tres aut quatuor cubitos altus est *caulis* mediocriter crassus, teres, leuis, cuius *scapus* summus in alas aliquot scinditur: *folia* Digitalis subluteæ angustifoliae foliis proxima, longa, angusta, acuminata, atroviuentia, neruosa, atersa parte subhirsuta, leui crenarum vestigio per ambitum incisa, alternatim cauli adnascuntur: *flores* longa serie thyrsoidè dispositi, Digitalis purpureæ, breuiore, rigidiores, foris toti hirsuti, ferruginei, intus eodem colore saturatiore & striis variegato picti, labro productiore villosa dependente, in medio ritu hiante latentibus sub superioris folii margine apicibus luteis: infidet autem floris recurua basis calyci stellato quinque radiis constante.

Descriptio

Digitalis giluo flore aliàs ferruginea, angustiore calatho, foliis atroviuentibus Lob. Obs. Digitalis ferruginea Ic. plant. p. 573. Teut. 675. C. Bauh. phyt. Digitalis 4. siue angustifolia flore ferruginea.

Anno 1592. primùm à me visa Digitalis quam Ferrugineam existimo vocari: floruit pulchrè in horto Ill. E. C. per me plantata: missa autem fuit planta per Insignem Medicum D. Christophoro.

Locus & tempus

rum Schwartze ex horto Ill. Ducis Wirtembergici Principis mei, cui præest, pulchra sanè planta quæ floruit Iunio & Iulio.

Vires

Tragus cum Digitalis amara sit herba, facillè colligi posse autumat, illam naturâ suâ calidam & siccam esse. Itaque vsum illius extare posse in iis, quæ ex calfactione, extenuatione, absterfione, & purgatione expollulant. Fucius asseueranter scribit, herbam hanc haud dubiè cum opus est extenuatione, absterfione, purgationis & obstructionis liberatione, efficacem admodum esse. Nam, vt testatur Galenus lib. 4. simpl. fac. cap. 17. amari sapores abstergunt, & expurgant, & quæ in venis est, crassitiem incidunt: quæ quomobrem menses etiam quæ amara sunt mouere possunt, vt ex thorace & pulmone pus educere: potest ergo hæc herba ferè omnia quæ Gentiana. Plurimi verò sit vulgarior illa & purpurea ad omnia vulnera sananda, inquit Aduersaria: de qua etiam in Obs. Lob. Somerseti Angliæ rustica turba huius decocto febricitantibus purgationes & interdum superpurgationes & vomitiones, humidioribus aluo, moliatur.

DIGITALIS FLORE MINORE, SVBLV-
teo, angustiore folio.

De scriptio



tanquam thyrsus longa serie effigiatæ, quam ortu diuerso, eodem tamen ferè omnes vergunt, dimidio minores Digitalis purpureæ floribus, colore luteo in herbaceum languente, idque tam intus quàm foris, labro intrinsecus villosa, quorum vnicuique ad pediculum folium acuminatum penitus glabrum est appositum. Semen in loculis aliarum huius generis more.

Gesner. de col. stirp. Digitalis flore minore, albiore: Eisdem hort. Digitalis maior flore maiore, cui fortè attribuendum nomen quod citat Spiritus vñd fraust. Dodon. de flor. Digitalis quarta flore subluteo. Digitalis lutea, Aduers. C. Bauh. Digitalis seu lutea flore paruo. Duas Lobelius Icon. pingit. Hanc enim nostram minore ramo expressit, quæ ad bicubitalem altitudinem apud nos excreuit, foliisque est longiore, & latiore, pallidiorèq; quàm sit Digitalis luteæ flore magno. Quam verò pingit oblongis angustisque foliis, necdum vidimus. Hæc censetur Damalo-

nium Dioscoridis, & primum Plinii. Fistula pastoris Auicennæ.

In peregrinatione nostra Rhætica cum Gesner. Lecus 8 tempus
nero Digitale cum floribus minoribus reperi, cui ascripti flores huic albos esse odoratos, folia satis solida, glabra, bicubitalem caulem & floruisse Iunio circa Valsart. Digitalis hæc Geneuæ ex vicinis montibus in hortum transtuleram, virebat mense Ianuario, florebat Iunio. Basileæ quæ itur Montets, in monte Montets, & iuxta Basileam extra portam S. Albani, florens mense Iulio. Frater obseruauit etiam in monte Munchstein vicino. Montbelgardi quæ itur Dur, & eundo Auevillars. In monte Rolsberg prope Malmunster inueni adhuc florentem Octobri, altitudinis trium circiter cubitorum, flores tamen minores multò quàm in Lutea quæ minor, huic folia glabra. Montbelgardi in Horto Il. E. C. mense Iunio, & Iulio & Augusto, florent pulcherrimè flores ex luteo ferè albi.

IESMINVM MEXICANVM, SIVE FLOS
mexicanus nulus.

CAP. III.



Iesminu Me- Deser
xicanum à natalibus dixerunt plantam radice nitentem, crassa, Madragoræ simili, cubitum longitudinem sæpè excedente, paucis fibris donata, circulos Mechoacæ instar si transuerfa secetur ostentante, foris nigra, intus alba, sapore primum fatuo, deinde nonnihil acri, & fauces vexante: quæ

terram versus in cernicem paulò minorè, rugosam desinens, caules deinceps plures producit proceros, quadrangulos, nitidos, nonnihil hirsutos, succulentos, qui in ramos diuiduntur, non illos quidem oppositos, sed 2/3es tuberoso ad ortum & veluti geniculato principio, mox alios aliosque eodem modo partituros, caulis instar quadrangulos: folia ramorum origini subiecta aduersæ parti ramo vacuo foliis respondent, foliis Solani Bellæ donæ similia, acutiore, auersæ parte nonnihil candicante, vtrinque glabra, sapore feruido & virente. flores Solis impatientes ex ramorum alis, eorumque fastigiis ex breuibus pediculis Conuolulvi maioris sed minores, eisdem vt illi integri, in calathum latiusculum, plicæ quinque habentes diffunduntur, sensimque in tubulum gracilem, globulo paruo folliculis multitudine amplexo inseruntur, colorum festiua & hilari varietate ludentes, iam lutei, iam puniceæ, alias puniceo luteo que confusis versicoloribus [quam varietatem in eadem planta est obseruare] fibratum citius è tubulo prominentibus, odore.

odore non insuau. Vnicuique flori succedit *semen* pulchrum magnum, Ciceris ferè, pentagonum, rugosum, nigrum, medullà alba, quod relicto folliculo suo exidit.

Et licet nunc adeò vulgaris sit notitià, vt nulla ferè sit opus acuratori descriptione, Clusi tamen Historiam, vt qui plura notatu digna obseruari assumere libuit. Primum igitur emergit Ocyzi quod Cereale nonnulli cognominant, aut Cereà Lutetianà ferè modo; deinde caulem promit cubitalem vel etiam interdum ampliore, pollicari crassitudine, succulentum, firmum, ex viridi flauescens, frequenter vt Balsaminæ caulis geniculatum, & in multos ramos eodemque similiter nodosos diuisum: qui ex ipsis prodeunt, non bini vtrique, & ex aduerso oppositi, sed singulares duntaxat, alternatim modò in vnam, modò in alteram partem vergentes, & quem primum seruarunt ordinem aut seriem, perpetuò ferè retinentes, hoc est, vt tertius, quintus, & septimus ramus in eandem partem spectent in quam primus: quartus verò, sextus, & octauus [si modò tot primariis ramis planta sit prædita] eodem latere nascuntur quo secundus: folia in singulorum ramorum nodis bina aduersis pediculis semper nascentia, Siliquastri foliis parè similia, viridia, satis carnosà, succulenta, circa pediculum ampla, extremo mucronata, quæ trita, Siliquastri grauem odorem, gustata verò, ingratum saporem, & tandem illius, vel foliorum Tabaci etiam acrimoniam propemodum referunt: flores in extremorum ramulorum alis singuli, longi, concaui, in quinque sinus, antequam aperiantur, complicati, explicati verò Tabaci foliis non valdè dissimiles, non tamen in mucronatos angulos, vt illi, desinentes, sed in obtusos, Conuoluuli florum instar, Tabaci etiam floribus ampliores, elegantissimè interdum purpurâ, siue Kermesino colore nitentes, non nunquam Lateritiâ, aliquando flauâ, aut pallentes, interdum profus albi, vel exalbidi duntaxat, non nunquam obsoletè rubentes aut flauescentes, sepius binis coloribus simul elucescentibus, vel purpureo mediam floris partem occupante, aut radiis modò purpureis alternatim totum distinguentibus, vel interdum magnis, non nunquam exiguis putrescentibus maculis vario situ & mixtura per totum florem, vel flauescentem, pallescentemue, aut album, candidantemue, vel obsoletum, aspersis, odoris satis suavis, & Narcissinum quidpiam referens, sex oblongis staminulis, stiloque paulò longiore è medio flore emergentibus: *valde* autem caduci sunt hi flores: nam cum octo explicari incipiunt posttridie sub horam octauam antemeridianam [per æstus præsertim sese contrahere incipiunt, florum conuoluuli modo: at temperiore aurâ, integro nonnunquam die expansi permanent, & sub noctem duntaxat contrahuntur: singulis tamen diebus alii recentes aperiantur, qui si integri quotidie decerpantur, & inter chartas reponantur [diu enim colorem retinent] atque deinde inter se conferantur, iisdem quidem coloribus constare deprehenduntur: ac eorumdem situ & mixtione, inter se variare, quisquis diligenter obserauerit, animaduertet. *Quæ* sanè insignis varietates, quotquot hunc florem obseruant in summam admirationem, non immeritò rapere debet: etenim diuissimè viret, & à Iulio mense ad Octobrem vsque [nisi pruinâ interueniant] ramosâ florum bobole luxuriare solet: calculi flores amplectentes, & in quinque mucronatas

lacinas sunt diuisi, virides & quasi membranacei, in quibus vnicum semen, nullâ membrana siue pericarpio inclusû, mucrone, cuius filio insedit obtulo, infima verò, quâ caliculo adhæret, parte, tanquam exiguâ coronâ ornatum pentagonum ferè, bacca myrti propè magnitudine, inuidè viride, maturitate fuscum, & quibusdam veluti tuberculis oblitum, spontè, vel tenui vento, vel leuissimâ cômotione decidens, nucleoque continens album, qui tritus in candidissimam, & amyli instar niueam friabilemque pulpam resoluitur: *radix* satis crassâ & *parauolis* est, intus alba, foris nigra, aliquot fibris prædita, gustu nonnihil acri, cui admista sit superficiali quaedam dulcedo. Eam licet annosâ in tridè censeremus [nam singulis annis nobis erant ferenda, hyeme radicem in horto relictam corrumpente] viuacem tamen esse, ab optimo & peritissimo viro Sebastiano V Volmaro Ill. D. V Virtemb. Pharmacopœo, & horti Medici tum temporis Præfecto, sumus admoniti. Is enim cum sub Autumni exitum aliquot plantas eruisset, & caule præciso, ex illis vnam, propter formæ elegantiam excicandam seruasset, initio autem Martii sequentis cuidam amico ostendere vellet, eam succulentam & quasi reuirescentem deprehendens, terrâ in fictili obruit, & paucos post dies folia proferte cepit, deinde circiter Cal. Iulii etiam flores. Cuius rei postea nos etiam aliquoties periculum fecimus, atque etiam alii nostro exemplo. Sed exigui momenti est compendium illud conseruandarum hyeme radicum: nam nouo Vere terrâ commissa, forsitan flores profert quindecim diebus antè quàm illa planta, quæ semine terræ eodem tempore credito, suâ naxat. *Aliud* autem genus habuimus, quod licet à superiore, caulis magnitudine & crassitudine, ramorumque situ & foliorum formâ non differret, color tamen stolonis & florum dissimilis est: nam dum primum terrâ emergit, caliculi foliorumque pediculi, vt Betæ rubræ iam recens nascentis, purpurascunt, manetque is color in adultæ etiam caule & ramis: flores verò rubente nitidissimâque purpurâ infecti videntur, sex etiam tenuia stamina longiorumque stilum continentes, eiusdem cum superiore odoris. Hi verò non mutantur, sed vnus perpetuò sunt coloris, & quem primi habuerunt, reliqui deinceps retinent: femina in caliculis singularia, superioribus respondentia: radix non dissimilis. Hoc genus è superiore femine, cui rubri flores infederant, originem trahere non est dubium, quia proximo anno & aliis subsequen-
tibus, vtriusque generis femina seorsim terrâ naucauimus, vt diligentius istam varietatem & colorum distinctionem obseruare possemus, & comperimus ex rubri floris femine nullas alias stirpes prognatas, quàm eas, quæ rubros flores darent. *Idem* periculum fecimus de grani flauo flore genitis, è quibus prouenire obseruauimus, quæ nullos alios flores darent, quàm flauos. Simile etiam de alborum florum femine factum periculum, ex quo natæ plantæ, albos quidem initid flores dederunt: sed qui sub Autunnum primum explicabantur duorum colorum euadebant, commixtis in eodem flore albo & purpureo, minus tamen quàm in versicolore primum descripta. *Illud* præterea obseruabam in ista distincta facione, ex solis plantis rubræ femine natis, statim ab exortus initio agnosci posse, quos flores sint datura: ex versicolorum autem, flauorum & alborum femine prouenientibus, nullum certum indicium, si mixtæ sint satæ, sumi

Admirabilis
est rubro
flore

Admirabilis
est
flore

Admirabilis
est
flore

posse, quia eiusdem omnes sunt coloris in tene-
 ra ætate. *Aliud* porò Rubræ generis mihi Viennæ
Iasmin rosso natum, semine ex Italia allato *Iasmin rosso*, hoc est
 Iasmini rubri, nomine: in fœcilibus quidem na-
 tæ plantæ, pusillæ & humiles erant, latè nihilominus
 ramos fundentes: quæ autem in orto
 latæ, superiori generi rubros flores gerenti longè
 ampliores, & latissimè ramos spargentes, eadem
 serie quâ in suprâ descriptis alternatim nascentes,
 eundemque ordinem seruantes, vt videlicet
 alternis in idem latus semper vergerent, atque
 spectarent, ipsi similiter cum suo caule admodum
 succulenti, & frequentibus nodis sine geniculis præditi,
 atque magna ex parte purpurascens: folia in hoc
 genere magis atra, magis splendens, interdum maiora,
 altera parte magis prominula, & inferius suum exortum
 in neruo habentia, similis tamen cum superioribus &
 odoris, & saporis: flores aliis forma pares, eodemque
 modo ex postremarum alarum sinibus nascentes,
 oblongiores tamen, tenuiores, & colore diluuius
 rubente, extremâ etiam parte nullis amplius,
 sex similiter staminula cum stilo in medutullo
 continentes, suauemque odorem spirantes: semen
 in caliculis, rubro alteri simile, hoc est, angulosum,
 & tuberculis oblitum, sed breuius & magis
 crassum: radix etiam breuior & crassior alterâ,
 interdum in binos aut ternos ramos crassos diuisa.
 Magis ferotina est reliquis, & nisi Solem valdè
 apricum habeat, vix ad frugem peruenit in
 frigidioribus regionibus. Ex radicibus tamen,
 per hyemem in fœcilis sicca terrâ pleno, conseruatis
 loco calido, plantas Viennæ habui, quæ maturum
 semen protulerunt: sed cum per meam absentiam,
 ex orto non essent erutz sæuâ illa hyeme anni
 1586. corruptæ sunt, & genus illud mihi
 intercidit: Lugduni verò apud Batauos
 semine peregrè accepto, denuò natum 1599.
 Sed illud mirum in omnibus his plantis &
 obseruatione dignum, quod, cum tabe secrete
 incipiunt, primùm folia, deinde integri ramorum
 articuli simul decidant, & circa nudos iam
 remanentes nodos, candida quædam efflorescentia
 interdum adnascatur, quæ temporis successu
 concreta, salis gustum referat: cuius postremæ
 notæ C. V. D. Ioach. Camer. pro nostra amicitia
 primus me admonuit. *Ceterum* peregrina &
 venusta hæc planta, varia pro regionum diuersitate
 obtinuit nomina: Etenim ex Hispanis semen
 primùm missum est, *Marabillas del Peru* appellatione,
 propter admirabilem florum in eadem stirpe
 varietatem: deinde *arreboleras* nomen inditum:
 ex Italiâ nunc Indici, nunc Mexicani *Iasmini*
 nomine, ob suauem videlicet eius florum odorem:
 Belgæ *Solanum odoriferum*, à foliorum cum
 Solani foliis similitudine, & florum odoris gratiâ
 vocarunt: Peruanos, à quibus initid semen ad
 Hispanos peruenit, *hathal indi*, crassâ & in palato
 formata pronuntiatione, nominare intelligo:
 Muliercule Viennenses, apud quas etiam in
 deliciis est, *Gescheket* Indiani *Geshblumen*,
 id est, versicolores Indicos flores nuncupant.
hathenus ille, qui videtur nobis fructus huius
 Mexicani floris malè Arbori tristi quondam
 appinxisse: eius autem figura meliùs placet quàm
 Plantini.

Cesalp.

Nympha

ctus racematus, vinolusque suo sapore, quem requirit Theophr. vires etiam non videntur conuenire. Melius sentit Camer. de hac plâta in hortoscribès: Gelseminum siue Iasminum Indicum, sub quo nomine cum primùm fuerit ex Indiis aliis communicatum, semper postea hoc nomen retinuit, quamuis sit planta sui generis, & pauca habeat cū Gelseminis communia. Magis propriè Flos Mexicanus à loco natali: *Quay, ut in dca* quidam ex Hispanico Marabillas.

Hist. Lugd. Iasminum rubrum Dalechampii, Flos coccineus.

Habui semina à Fratre C. Bauhino cum hac inscriptione: semen Indicæ plantæ pulcherrimæ. Habui à Volmaro insigni Pharmacopæo Ill. Ducis Vvrt. A. D. D. F. l. Platero, qui vocauit *Tau-manthin Peruvianum* & *Flaquerin Indorum*. A. Do. à Pf. fœr lap ex semine collecto in S. f. z. Accepi semen Stugardiæ quod missum fuerat ab Hortulano Ducis Florentini cum hac inscriptione *Merauglia di Peru maggior*. Item *Merauglia di Peru* flore albo. Accepi à Tossiano Carolo ex Burgundia cum hac inscriptione, *Flaculi Indii*. Semina hæc in orto Montbelgardico Ill. Ducis Vvrt. fata plantas aliquoties proferebat, quæ semen maturabant Septembri & Octobri, cuius plurimùm, vbi nigrescebat, spontè cecidit. Monitus à D. Camerario ramos in terram deposui qui apprehenderunt.

Scriptis ad Clusium Patavio amplissimus Vir Iac. Antonius Cortusius, eius quæ vario est flore radices binas drachmas intrid sumptas egregiè aquas educere. Quod è sapore iudicare potest autor H. Lugd. aquosa & humida est quædam eius portio: ignea verò, calidaque & sicca altera, quæ discutere valenter possit tu mores frigidos.

CAMPANULA SERPYLLI FOLIA Ioh. Bauhini.

CAP. IV.



Vitriculas Defecti
 habet fruticulosas Serpyllæ, longas, multas, in varios ramulos tenuiores diuisas: in quibus folia ex aduerso coniugatim posita, Serpylli æmula, iis tamen quædam maiora, alia minorâ, crenata, nonnihil pilosa, breuissimis pediculis adnata. Ex ramulorum extremitatibus pediculi oriuntur palmares fetidè, foliis nudis, in quibus flores binis ternis, deorsum nutâtes, Campanularum formâ, minimi digiti vngui magnitudine cedentes, colore, si rectè recorder, cæruleo.


C Bauh. phyt. Campanula g. siue Serpyllifolia Ioh. Bauhini.

LINIFO-

Hanc in Rhætia florentem astate inuenimus. Frater indidem siccam sine flore misit anno 1592. Gener Io. Henr. Cherlerus ex monte Göthardo attulit.

LINIFOLIA CAMPANULA
lutea.

CAP. V.



Folia per caules ferè sesquipalmares alterno situ, oblonga, angustaque, Lini facti foliorum amula, laui: caules superius in ramos abeüt qui flores gestant insignis magnitudinis, vnciã longiores, croceo colore micantes, calyce in quinque lógas aristas fissó, capitulo sequente Lini, sed magis tubinato: ra-

dis longa, crassa, lignosa, in plura capita tuberosa diuisa.

Depingunt & describunt Adv. ac sic denominant: Campanula lutea Linifolia Montis Lupi, flore volubilis. Hæc Lobel. Obs. videtur Viola Calathiana Plinii, flore luteo.

Hist. Lugd. Hyssopus nemorensis & lutea. Sciendum autem nos iconem solum H. Lugdunensis, huc referre, non item descriptionem, quam non congruit figuræ.

Plant. Icon. pag. 414. Campanula Linifolia, Teut. 500.

C. Bauh. phyt. Campanula 4. siue Linifolia lutea.

Cum essem Mnnspeßsü mibi allata ex proximis montibus Linifolia Campanula lutea. Gener Cherlerus attulit collectam in planitie propter montem Lupa

SOLDANELLA MONTANA
quibusdam.

CAP. VI.

Obliquam agit radicem, nigram, crassiusculam, tuberosam, multas longas fibras quibus terræ hæret, demittentem, filiatia, quatuor aut quinque pediculis è radice ortis dum aut etiam vnciarum nituntur, vncialia aut paulò maiora, cinctatæ rotunditatis, crassa, solida, atro vitore splendentia, in quibus nervi vix nisi ficis apparent obliqui: caulis inter folia surgit vnicus vt plurimum, vel duo, d odrantales, nudi, qui superius in ramulos paucos diuisi flores gerunt duos tréve, nutabundos, nolani imitantes, cæruleos, fimbriatos, stylo longiore prominulo. Succedunt cornicula vnciã breuiora,



striata per supremam oram crenata, semen continentis.

Hanc sic depingit Clus. Sena habet, aut octona folia, crassa, in orbem ferè circinata, Brasica marina, quam vulgò Soldanellam vocant, æmula, sed duriora, supernè viridia, infernè dilutiore viriditate splendentia, gustu primum exsiccante, dein-

de acri & ingrato: flores gerit in leui, nudo; gracili, subrubro, palmarique cauliculo binos ternos aut plures, purpure vel saturæ, vel dilutæ colore, inodoros, Campanulæ modo efformatos; deorsum spectantes, & propendentes, vnicofolio in quinque profundas crenas (quæ aliquantulum laciniatæ sunt) & totidem alias singulares, ditilio, constantes è medio protuberante veluti quodam umbone in longum stilum desinente; qui in vâsculum, vel corniculum potius euadit; oblongum, diuum, membranaceum, mucronatum, paruum, durum, virescens, simul congestum semen continens: radices fibrosæ, candicantes, ex vno veluti capite dependent, quod adnatis se propagat.

Est & aliud genus minore folio; neque circa pediculum, qui breuior graciliorque est, adè circinatæ, sed sensim ab ipso in latitudinem excrecente.

Inueniebatur etiam in ascensu montis Herrenalben in quibusdam vmbrosis locis quoddam genus amplifoliis, sed tenellis admodum, quæ parte inferiore non virebant, superiorum modo, verùm non minus rubescebant, quàm Cyclamini flore odorato folia. Soldanellam montanam Aduerf. sine flore pingunt, licet illi florem Gentianellæ minoris cæruleum assignent. Dalech. apud Hist. Lugd. florum picturam habet, sed malam. Vocat Lunariam minorem & Asclepiadem quorundam. Ic. Plant. p. 602. Soldanella montana. Teut. 715. Camer. apud Matth. Soldanella alpina. Violam alpinam foliis Afari minoribus hanc inscribit Gesner. hort. C. Bauh. Phyt. Soldanella tertia siue alpina rotundifolia. Et altera siue 4: folio misilis rotundo. Variat prior foliis & floribus: alia foliis supernè virentibus, infernè dilutiore virore splendentibus: alia foliis infernè virentibus: flos purpureus, nunc saturatior, nunc dilutiore, flore etiam niueo reperitur.

In arduis montibus & cælis Alpibus quæ Inf. purgum & Raupurgum ambiunt colligi: ac in quibusdam montibus Auenione non distitis magna gliscere copia audiunt Aduerf. Copiosè nascitur in Austria & Styria Alpibus; perpetuè nuncue obstitis, nusquam verò latiore, aut vberiore conspiciebam, ait Clusius, quàm in iugo Vvechsel nuncupato, supra Aichpang Magn. vici Eralm à Khunigspurg m. liberi Baronis: vbi

Locus & tempus

anno 1576. vnicam plantam lactei prorsus candoris flore inueniebam. Floret istic Junio, interdum Iulio, & Augusto, nuuium maturius aut ferius liquefcntium ratione. In hortos autem translata, etiam Aprili, vel cum Primulâ veris rubrâ floret : difficulter autem cicurari potest. Hanc herbam pulcherrimam florentem vidimus in montibus Rhæticis dictis Chempseche & Albula, Iulio mense 1601. Tunc fuit mihi denominata Cyclaminis species. Habuimus anno

1595, in Horto Il. E. C. Montbelgardi, allatam Argentina ex horto D. Friderici Meier.

Ex Theophrastinis illis æru/castoribus nonnullos huius foliis, cuticulâ summâ deglubitis, asciticisque abdomini admotis, aquas educete, & vulnera illicid mirificè que carne & cicatrice claudere, tradit Lobelius, quod non vidimus. Folium crassiusculum est, & subadstringens, amaricante sapore, Soldanelle planè simillimum.

FINIS LIBRI VIGESIMI





HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER VIGESIMVS PRIMVS.

HERBÆ SILIQVOSÆ, PLERÆQVE ACRES, INTER
QVAS MVLTÆ CVLINARIÆ.

POST Rapunculos, quid potius subiungi mereatur quàm Rapa, ac his consimiles Napi, Brassicæ, & huiusmodi alia? quas si pleræque in culinas acitas quis dicat, ut rumen impleant, ut ille ait, nulli reluctabimur. Illud potius Herbaria Studiosis ostensum volumus, omnes infrâ dicendas plantas id habere communes, ut semina siliquis inclusa gerant, acris sanè pleræque sicut & ipsa planta.

BRASSICA VETERIBVS ET IN GENERE.

CAPVT. I.



HORTIS & culinæ familiaris Brassica [*ραπα*] quam Theophrast. trifariam diuidit hist. pl. lib. 7. cap. 4. Ac primum quidem in eam, quæ crispata [*κροκύλλαι*], dein in eam quæ læuis [*λευκόφυλλαι*] habet folia: & tertiam agrestem [*ἀγροίαν*]. Videtur autem priorum [duarum] Brassicarum similiter & hæc esse differentia, quòd harum quædam nullum, quædam malum semen habent. In vniuersum autem crispata [*κροκύλλαι*] & meliore succo, & maioribus foliis est, quam læuis [*λευκόφυλλαι*].

Notandum autem non hîc solum Brassicam *πὴν ῥαπαρὸν* à Theophrasto nominari, & ita à Theodoro conuerti, sed alius etiam in locis scriptissimè, in quibus Scaliger *πὴν ῥαπαρὸν* pro Brassica vsurpat, & non pro radice neque radícula, quæ *ῥαπαρὸν* quoque à Græcis vocatur. Ipse etiam Aristoteles Brassicam interpretatur. Scribit enim lib. 5. cap. 19. hist. Nascuntur Erucæ ex viridibus foliis, maximè Raphani, [*ῥαπαρὸν*] quam nonnulli *κράμβη* [Brassicam] vocant.

Ad hæc & Athenæus lib. 9. *ῥαπαρὸν* Theophrast. *κράμβη* esse dicit, ita siquidem illic ait. Theophr. verò ad hunc modum scribit. [*πρὸς δὲ ῥαπαρὸν*] (*λέγω δὲ τὴν κράμβην*) ἢ μὲν ἐστὶν ἐλύρωλλον, ἢ δὲ ἄρεια: Raphanus, Brassicam dico, altera crispis est foliis, altera siluestris [scilicet Dalechampius].

Antiquos Raphanum Brassicam vocasse monstrat Apollodorus Carystius.

Raphanum sic vocare nos: ac hospitiis

Vos Brassicam.

Plinius negligentius legit, imò nec animaduertit quidem, quæ Theoph. ac Aristoteles de Tom. II,

Brassica scripserunt, ipse siquidem lib. 19. cap. 7. Raphano radici tribuit, ac rursus eiusdem libri c. 8. ad Brassicam quoque reculit, Catonem, qui illa ex Theophr. transcripsit, his verbis citans. Sed Cato Brassicæ miras canit laudes, quas in medendi loco reddemus. Genera eius facit tria: vnam [læuis Cato] extensis foliis, caule magno: alteram crispo folio, quam Papiniam vocat: tertiam minutis caulibus, lenem, teneram minimè probat.

Catonis Brassicæ?

Idem Plinius eadem tria genera lib. 20. cap. 9. reperit. In tres, inquit, species diuifere Græci antiquissimi. Crispam quam Selinada [legendum videtur Selinoidea, siue Selinoiden, ex Catone c. 157. vocauerunt, à similitudine Apii foliorum, stomacho vtilem, aluum modicè inollientem. Alteram læam, lætis foliis & caule exeuntibus. Vnde caulodem quidam vocauerunt, nullius in medicina momenti. Tertia est propriè appellata Cræbe, tenuioribus foliis, & simplicibus densissimisque, amarior, sed efficacissima.

Quòd verò Catonis sententiam de Brassicæ generibus clariorem reddam, verba eius ex cap. 157. adscribam. Nunc vti cognoscas genera earum, prima est læuis, quæ nominatur læuis, grandibus, & lætis foliis, caule magno, validam hæc habet naturam, & vim magnam habet. Altera est crispata, quæ à similitudine Apii *απιοειδὴς* vocatur. Hæc est & aspectu, & natura bona ad curationem, validiorque est quàm supra scripta est. Item est tertia, quæ *κράμβη* vocatur, minutis caulibus, tenuioribus foliis, & acerrima, omnium est istarum tenui succo vehementissima.

Idem Crispæ.

Cræbæ.

Atque hæc tria genera Brassicæ agnosçt etiam Eudemus Atheniensis lib. de cleribus apud Zzz

Halmýrida Athenæum lib. 9. nimirum quod Halmýrida [quia nisi in maritimis non provenit] *Leiophyllon*, & *Selinusium*.

nihilus Septinius contra, videtur duplicem Brassicæ statuere differentiam, speciosissimam, seu dulcem, quæ Cumis: & amaram, quæ in Alexandria oriatur. Quod autem semen in Alexandriam è Rhodo fertur in annum efficere brassicam dulcem, sed quæ post id tempus pro natura loci amarescat. Nicander in Georgicis:

Lenis quidem Brassica, interdum verò sylvestris obuia,

Cum feritur foliosus, in arcis hortorum pubescit:

Crispa verò, frutescens, Tyrio colore foliis nirentibus,

Aut Phanicis, & Halmýridi similis,

Cymis decolor, & aspera, similis est

Soleis, quas assumi mutat oris calcis.

Cæterum, tria iam dicta genera complectitur Dioscor. sub Brassica fatiua, sub qua etiam Ægyptiam habet, quæ propter amaritudinem in Ægypto non estur, ait Plinius. Addunt autem Dioscor. & Plin. adhuc genera duo, sylvestrem alteram, de qua paulò post: & alteram marinam, de qua Hist. n. lib. 15.

Sed & cætera genera complura sunt, pergit Plinius. Cumanò sessili folio, capite patulum. Arcinum altitudine non excelsum, folio numerosius, quàm tenuius. Hoc viliissimum existimatur, quia sub omnibus penè foliis stuticat cauliculis peculiaribus. Pompeianum procerius caule ab radice tenui, intra folia crasse scit. Rariora hæc angustioraque, sed teneritas in dote, si frigora non tolerat: quibus etiam aluntur Brutiani. pregrandes foliis, caule tenues, sapore acuti. Sabellico vsque in admirationem crispa sunt folia: quorum crassitudo caulem ipsum extenuat, sed dulcissimi perhibentur ex omnibus. Nuper subiere Lacuturres ex conualle Arcina, vbi quondam fuit lacus turrisque quæ remanet: capite prægrandes, folio innumeris. Alii in orbem porrecti, alii in latitudinem torosi. Nec plus vllis capitibus post Tritianum cui pedale aliquando conspicitur, & cyma vllis ferior.

Ex omnibus itaque generibus quæ ex cultu, locis & forma nomen adepta apud Plinium, duo nostris vulgò notissima sunt, inquit Cornarius: Alterum sessili folio, atque ita conflexo, vt omnia simul vnum caput efficiant. Quare etiam *fastuosol*, id est, caulem capitatum vocant: sicut etiam Græci *καυκίλιον καπαλιωτόν* dicunt: Alterum ex tentis foliis, caule magno, quod partim *Schlaüphen*, partim *Losen*, partim *Sträiden* appellant. Caulium itaque & coliculorum appellationem, de Brassica etiam nostri habent, in eo quod ipsam *föl* vocant, quamuis aliqui etiam *fräut* nominent, id est, olus, quomodo item *Lauten* appellatur, ob excellentiam.

Esti plurima sint Brassicæ genera, vt ex veteribus re rustice Scriptoris liquet, quatuor tamen duntaxat, quas hodie vñtatas esse scribit Fuchs. producit: quarum vna Græcis *λαύς* [lauis] nominetur, grandibus & latis foliis, caule magno: & Germ. *Breiten oder groffer föt* vocetur, Gall simpliciter *Choux*. Altera crispa, quæ à similitudine Apii *καυκίλιον*, id est, Apiana nuncupetur, vulgò crispa caulis, Germ. *Bräuser föl*, Gall. *choux crispés*. Tertia quæ propriè Crambe, minutioribus caulibus, & tenuioribus foliis, flore luteo. Germ. *Kleiner föl*, vt ab aliis discernatur, nominari possit, aut simpliciter, & sine adiectione *föl*, Gall. *Choux rouges*. Quarta, quæ

sessilis sit folio, & capite patula.

Brassicarum nobis nota hæc, inquit Gesner. hort. Alba, nigra, crispa, hirsuta & rubra, quæ non multum differt à nigra, ita vt sepius vna in alteram mutetur, quod Oligores testantur. Item: capitata Brassica hortensis vbinam spontè nascatur nescio.

Tragus præter sylvestrem, has recenset brassicas. brassicam fatiuam maiorem. brassicæ fatiucæ maioris speciem alteram. brassicam crispam, & capitulatam, de qua separatim egit.

Matthioli sua brassicæ genera Veterum accommodare studens ita scribit. Satiua brassica, Theophr. & Plinio authoribus in multiplici recensetur genere. Id quod & horri in Italia attestantur: nam in iis multiplex & varia crescit brassica. Inter quas nominatim & ea (brassica crispa) quam Plinius Sabellicam appellati tradidit, quæ crispis admodum foliis, Lactucæ modo in se concluditur, intus albicans, tenera, subdulcis, & quæ hac ætate omnium præstantissima habetur. Est & capitata conglomeratis vndique in orbem foliis, Plinio Lacuturis appellata, quæ vulgò *Capucei* dicitur. Est in superæ iis, quæ nostris Italiz hortis proueniunt, alia quædam [brassica raposa] cuius caulis Rapi in morem extuberat, manditurque subinde medulla, pingui iure incocta raporum modo. Huius non reperio meminisse Plinium, nec eo vetustiores alios, qui de hortorum rationibus scripsere, sicuti nec illius, quæ foliis admodum per ambitum laciniatis, minutimque intercisus assurgit.

Ex multis Brassicæ speciebus quatuor recipe-re videtur Camer. hort. Cypriam, siue Pompeianam [multifloram], quam vulgò *cauliflori* vocant: Rapicaulem, Apianam crispam, & Albam Genuesem quæ nobis Brassica ter uter scita.

Lonicerus meminit Brassicæ albæ, latæ, crispæ, capitatæ, & sessilis, sed, quod mirum, nullam describit.

Simili modo Ryffius osecitanter & ieiunè nimitis de Brassica solis nominibus certat. Quatuor, inquit, earum genera. Prima lauis [λαύς] *Breiter föl*: altera crispa, à similitudine Apii *καυκίλιον*, *fräuser föl*, vocata: tertia *καυκίλιον*, *Kleiner föl* & quarta *καυκίλιον καπαλιωτόν*, Latinis Brassica Lacuturis, vel tertia aut sessilis, siue capitulata, Germanis *Cappes* fraut, Gallis, Capini vel Cabini coles, nonnullis albi vocati, reliqua Brassicæ genera Galli communi vocabulo *Chouls* [caules] appellant. Facit & quatuor genera Amatus, quæ non describit. Horum genus alterum Lacuturrem & Caputium vocat. Hisp. *Repolho*, Colthes Morcianas: *Caputio*, Gall. *choux pommés*: Germ. *Cappes* fraut. Hæc in orbem porrecta ait, clausa & apprimè dura, per medium scita, in numero cernitur folio. Amati verborum testis fuerim, si ea de quarta, & non de secunda specie tradiderit.

Nostra ætas, vt ait Dodon. non paucas quoque obseruauit, vel colore, vel forma differentes; Brassicas. Quædam enim sessili folio patulæ sunt: aliæ contracto capitatæ, nigra non nullæ, pleræque albida, vel etiam saturato colore virentes. Iam & læui folio istæ: illæ verò crispo, aut laciniato. Est & in caulibus differentia. Nos de eius octo speciebus [Brassica sc. vulgari, fatiua, rubra capitata, crispa, selinoide, sylvestri Crambe dicta, capitata albida, Sabauda & cauliflora], quas depingit & describit seorsim tractabimus, vñ & de ea quæ sylvestris ab ipso inscribitur, & sylvestri perfoliata, quam Perfoliatam siliquosam vocamus.

Commemorat Aug. Gall. Brassicam, *Caulis o*
Verzi, crispis, capuciatu, Verzi fiori, Verzi rapi, & ca-
pucci ferrati.

De brassica duplici campestri Clusii agemus
sub titulo Perfoliata siliquosa; Caulis siue bras-
sica, quas Aduersaria tradunt diuersas, sunt hæc:

Alba, sessilis, glomerosa, aut capitata,
Lactuca habitus.
Eadem conuoluta & arctè oclusa,
apud Belgas, rubro colore, enematibus
aprior.
Sabauda, vulgò *Sauoye*, patula &
minùs oclusa, foris virens, intus al-
bicans.
Racemosa non globosa, vulgò Ita-
licè *Caults flore*, siue florida Pompe-
iana.
Laciniosa alba, & Rubra Cumanam
vulgatior.
Nigra, vnda nribus, crispis & lacinio-
sis foliis.
Marina multiflora, Syluestris, mono-
spermos.
Caulotapa, brassica peregrina, me-
dio caule turbinata & rapata.
Obseru. Brassica vulgaris satua, ca-
pitata, florida: botrytis tenuifolia, laciniosa. Et
Icon. Plant. Lactuca satua sessilis, siue capitata:
vulgaris satua, alba, sessilis, glomerosa, aut capi-
tata, lactuca habitus: patula crispata Sabauda a sili-
ua: Sabauda hyberna, florida botrytis, maxima
syluestris multiflora monospermos: Rapa Bras-
sica peregrina, caule rapum gerens, tenuifolia,
laciniosa, & fimbriata. Dalech. apud Hist. Lugd.
Brassicæ tria genera facit. Brassicam satua-
m, syluestrem & marinam. Nobis relictis dua-
bus posterioribus de satua hæc tantùm sermo sit.
Diuidit autem satuam in albam & rubram. Albæ
septem tradit species. Albam vulgarem seu læ-
uem satua: Albam crispam, capitatam albidam,
Capitatam polycephalon, Pompeianam aut Cy-
priam, Brassicam floridam Dodonæi, Asparago-
den, & Raposam. Rubræ agnoscit species 4. Ru-
bræ speciem primam, quam Cumanam vocat, &
Brassicam læuem Catonis, eamque primam om-
nium à Fuchio descriptam esse dicit: secundam,
quam Dodon. Brassicam Lactuorem appellet:
Tertiam, Dodonæo *σαλυσθηδν* Lat. Apianam di-
ctam: & quartam quam Dodon. nigra, sed Fuch.
Crispam & *σαλυσθηδν* Apianam à similitudine
Apii cognominet. Huic insuper adiungit Cris-
pam Tragi, & Tenuifoliam laciniosam Lobelii,
cuius gemina varietas. Brassicas suas Taberna in
duo primùm distrahit genera: in domesticum si-
ue satiuum, & syluestre, de quo pòst. Satui aliud
esse læue, idemque duplex, ex viridi album, &
rubrum. Aliud crispum, capitatum aliud: aliud
proliferum floridum, Italicè Caulifiori dictum.
In specie quidem recenset has. Brassicam 1. fòl-
fraut r. Brassicam 2. fòl fraut 2. Brassicam ru-
bram, Kottter fòl. Brassicam capitatam, Cappel-
fraut / Cappel fòl. Brassicam capitatam rubram.
Kott Cappel. Brassicam crispam fraut fòl fraut.
Brassicam proliferam, Büschel fòl fraut. Brassi-
cam crispam proliferam, Büschel fraut fòl. Brassi-
cam prolifera floridam, Blüten fòl. Brassicam
Anglicam, Englisch fòl fraut. Brassicam Sabau-
dam Sappoysh fòl, de qua dubitamus an eadem
sit cum Brassica capitata rubra: Brassicam Sabau-
dam crispam, Sappoysh fraut fòl fraut. Bras-
sicam tophosam, Büchel fòl. Brassicam Selni-
siam latifoliam, Breyt fraut fòl. Brassicam Selni-
siam angustifoliam, Schmal fraut fòl. Caulota-

pum, siue Rapocalem, Rüben fòl, & Caulora-
pium longum, Langrüben fòl, quas nos non fe-
paramus, & Brassicam rapicaulem inscribimus.
De quibus omnibus suo agemus loco, vt & C.
Bauhini 26. speciebus, ac etiam Hadriani Iunii
sex, inter quas & marinam numerat.

Brassica olus est vulgatissimum, ait Cæsalp. flo-
res pallidi aut candidi, color aliis virentior est,
aliis candicans: aliis ad purpureum vergens: cris-
pitudine & læuitas tum in genere virenti, quod ni-
grum vocatur, tum in candido reperiuntur. At
purpureum nequaquam crispum adhuc visum
est. Omnium crispis, inter nigra reperitur: Plinio
Sabellicum: Theoph. Crispum. In hoc genere Se-
linida & Apiana Plinio. Candida & purpurea
breuiore caule, sed qui magis crescit in caput foli-
is rotundioribus: Crispa inter candidas crescit
in caput oblongum, candida, tenerima. Læuis
non nisi ex iure pingui paratur. De hac Plinius
inquit, læuis constat foliis è caule exeuntibus:
vnde Caulodis dicta est, nullius in medicina
momenti: hinc sumptum vulgare nomen *Caulot*
apud nos. Quædam in caput rotundum crescent
Caputis vocant. Plinius Cumanum vocat. Qui-
busdam caulis in caput extruberat Rapi simili-
tudine vulgò *Tormentos* vocant &c.

Kαυλοβη (brassica) Græci, quasi *καυλοβη*, inquit
Suidas, quòd pupillas oculorum quas Græci *καυλοβη*
vocat, hebetet. In qua sententia fuit Columella
cum scribit.

Nunc veniat quamvis oculis inimica Cor-
ambles.

Et melius *καυλοβη* quasi *καυλοβη* dicta est, quòd
καυλοβη vel rectius *καυλοβη*, id est, quòd
crapulae fatietatque aduersetur, vt dicitur. Græ-
ci veteres etiam (vti dictum) *καυλοβη* vocarunt, ob
mutuam quandam amicitiam & affinitatem vi-
trique feminis, vetustioris præsertim, vtramvis
plantam generandi. Nicander Colophonius in
Glossis apud Beotos *καυλοβη* Brassicas nominari
ait. Hoc tamen Dalech. non ad alias, quàm capi-
tatas, vel eas, ad quantum radices velut Rapum
extuberet, refert. Brassica à Latinis appellatur,
quasi præfeca, inquit Varro, quòd huius scapus
minutatim præfecatur: siquidem nunc tonsili,
nunc cymoso caule spectatur. Sunt qui dictam
existimant quasi passicam, quòd ex caule minu-
tim præfecatur vt passa fiat, vel *καυλοβη* id est
à vorando dictam verisimile est. Est enim to-
ta à plebecula, tum cruda, tum cocta, vel muria fer-
uata: à Germ. fòl. Belg. fool: Gall. *Choux*. Ital. *Cau-*
li, *Caulis*: Hisp. *Verca* *Cullos*: Angl. *Cole* / *Colewurt*:
tee: Hungar. *Vörös* *fapústa*: Boh. *faposta* & *Eely*.

Nomina
linguarum

Cæterùm, Oulus hoc Lachrymis Lycurgi à Li-
bero patre vitibus adalligati natum prodidit
Nestor, in eo libro qui Alexicepos inscribitur:
perniciosa forsitan cum ea (Viti) odio flagrare
hæc fabularum inuolucris innuens. Vitis enim
& Brassica tantà laborant discordia, vt si in agris
olus hoc astutum Viti proficiat, vel vinum ex illis
proferat, vel ipsa contestum marcescat, vel certè
sarmenta eius contabescant. Tam pertinax inter
has plantas inimicitia, vt si deflexionis impe-
tu vna procidat, aut laxior in fauces decumbat
iniecto capiti Brassicæ crudæ succo in excelsu-
oris protinus resiliat. Si Brassicæ fuerit vicina Vi-
tis, luxuriantes eius palmites potius repandi cur-
uabuntur, quàm recti velint propius accedere
intestina non immemores discordiæ. Similiter si
quis feruescenti in olla Brassicæ vini paululùm
guttatim infillauerit ne amplius quidem exco-
quetur, sed suis viribus defuncta ad perniciem

trahetur. Vitem viam oleris huius odore fugari Theophr. affirmat, asstramque ad olus diffugere Varro tradit. Quin & brassicâ cortumpitur in dolio vinum si pore & odore, quod ætz foliis demeris restituitur. Brassicam inter olera, vt legere est apud Athenæum Mantin [vatem] Prisci vocarunt. Non autem solus Menander brassicam appellauit Sacram. Est enim apud Hipponactem in lambis dictum huiusmodi:

*Elapsus ille supplex Brassicam adorabat
Septisiliam, aut eam succosam Pandore
Sacrificabat Thargelium, antequam Pharmacum biberet.*

Iones iureiurando post Brassicam suam fidem adstrinxisse, constat ex sequentibus, Ex multis nominibus per Brassicam, te maximè diligo, inquit Ananius Teledides in prætoribus, per Brassicas hoc iuro, dixit, Epicharmus in terra & mari, itidem per Brassicam hoc asseuero. Eupolis in Baptis, Per Brassicam ita est. Iusturandum verò Ionicum hoc videbatur: nec absurdum fuit per Brassicam deicerasse quosdam, cum Zeno Citientis, qui Stoicam sectam condidit, imitatus iureiurandum. Socratis per canem conceptum, per Capparin iurauerit, vt Lampodus autor est in suis commentariis.

Locus & tempus.

Brassica in hortis passim coluntur. Frigidis verò & pluuiosis positio earundem optima. Salsis etiam aquis iurari brassicam, & iis rigatam meliorem fieri tradit Theophrast. quare nonnullos nitro aquz permixto aspergere brassicam, vt Aegyptios, atque ita multò dulciorem teneriorèque effici, sicuti & si priusquam coquatur, sale commaceretur, Martialis nitrata aqua viriditatem conseruari scribit his versibus.

*Nec tibi pallentes moueant fistula Caules,
Nitrata viridis Brassica fiet aqua.*

Palladius non nitratam aquam, sed nitrum ipsum inpergi iubet his verbis: Celenis coquitur virore seruato, si dum est trium vel quatuor foliorum, nitrum tritum cribello desuper spargas, vt speciem pruinz candentis imitetur. Brassica autem Plinio ex Columella toto anno ferunt, quoniam & toto fecatur. Vtilissimè tamen ab æquinoctio Autumni. Transferunt eum quinque foliorum est. Cymas à prima sectione præstat proximo Vere. Hic est quidam ipsorum caulium delicatior teneriorèque cauliculus, Apicii luxuria, & per eum [perinde] Druso Cæsare saltiditus [blanditus Ver.] non sine castigatione Tiberii patris. Post Cymam ex eadem Brassica contingunt æstui, autumnalèque cauliculi, mox hyberni, iterumque Cymæ. nullo æquè genere multifero, donec sua fertilitate consumatur. Tertia circa Solstitium, ex qua si humidior locus est, æstate, si siccior, Autumnno plantatur. Humor firmusque si defuere maior saporis gratia est: si abundauere, læuior fertilitas. Fimum asinum maximè conuenit. Est hæc quoque res inter operaganea, quapropter non pigebit verbosius persequi. Præcipuus fit caulis sapore ac magnitudine, primùm omnium si in repastinaro leras: deinde si terram surgentes cauliculos leces, à terræque proceritate luxuriosa attollentes se, exaggerando aliam accumules, ita ne plus quam cacumen emineat. Tritiarum hoc genus vocatur, bis computabili impendio tediòque. Cuicumque autem generi pruinz plurimùm suauitatis conferunt: & nisi obliquo vulnere defendatur medulla, plurimùm nocent. Semini destinati non secantur. Est etiam sua gratia nunquam plantæ habitum excellentibus thalmyridia vocant, quo-

niam nisi in maritimis non proueniunt, nauigatione quoque longinqua viridibus aduertatis. Statim defecti ita ne humum attingant, in eadolei quàm proximè siccato, obturatoisque conduntur, omni spiritu excludo. Sunt qui plantam in transferendo, alga subdita pediculo, nitro ve trito, quod tribus digitis capiatur, celeriore m id maturitatem fieri præsent. Sunt qui semen trifoli nitrumque simul tritum aspergant foliis. Nitrum in coquendo etiam viriditatem custodit: aut Apiciana coctura, oleo ac sale, priusquam coquantur maceratis. Est inter herbas genus inferendi, præciliis germinibus caulis, & ita medullam femine ex aliis addito [abdito M.]

Cyma

Quid autem sit Cyma in brassica declarat idem Plinius. Cymas, inquit, à prima sectione præstat proximo Vere. Hic est quidam ipsorum caulium delicatior, teneriorèque cauliculus. Et paulò post. Post Cymam ex eadem brassica contingunt æstui, autumnalèque cauliculi, mox hyberni, iterumque Cymæ. Celsus lib. 17. c. 27. Cymas, inquit, seu cymata prætoricos dicimus in brassica præcipuè coliculos. Vere appetente progeminantes, velut *κρυβαντα* sine sunt, id est, factus, ducta translatione à ventrem ferentibus fœminis ad brassicam, quæ ineunte Vere, turgens succo, & cum plurimùm cymosa folobè grauidà coliculos enititur. Cymæ, inquit Ruellius, sunt quidam scaporum delicatior tenetiorèque coliculi, quos à prima sectione præstant. Nec mo fugit recentes quorundam olerum geminatus, tunon esse, velut Armaraciorum, Sinapi, Naporum, Rapi, Cymas classicis Authoribus appellari. Cyma quæque licet in herbis sepe frequentius soleat usurpari, nonnunquam genere neutro Græcorum imitatione legitur, sit apud Columellam in carmine, quod hortorum cultui nuncupauit.

*Tunc quoque censeritur, toto que plurima terra
Orbe virens, pariter conferitur plebi, regique sumperbo:*

Frigoribus caules, & Vere Cymata mittit.

Et quod Galenus adnotauit *κυμα κρυβαντα*, *κρυβαντα* τὸ δὲ ἡριὸν τοῦ καυλοῦ ἐνομασθῆναι, *κρυβαντα* τὸ κρυβαντα, &c. i. e. Brassicæ igitur germen, quod [brassicæ germen] nonnulli *κυμα* nominant, per contractionem nominis trissyllabi *κρυβαντα*, &c. Eadem cymata prototomi caules appellantur à Galeno, quo loco est corrupta sine vulgaria exemplaria, quæ habent *προτομίου καυλοῦ ἀπὸ κρυβαντα* καυλοῦ β. *ἡριου ἀπὸ κρυβαντα* ἐπὶ ἡλιόφωτο, non dubium est quin legendum sit *προτομίου καυλοῦ*, & cætera. Id est, Prototomi caulis decocti cyathos duos ieiuno ad dies nouem exhibitos. Cuius auxilii ab Archigene ad renum affectiones præscripti efficaciac, & prototomorum caulium lectio à Dioscoride confirmatur τὸ ἄνθος (καυλοῦ) κρυβαντα, inquit, *εὐνομασθῆναι ἐπὶ ἀπὸ κρυβαντα*, & ἐπὶ ἡριόφωτο. Id est, brassicæ Cyma stomacho commodior quidem est, sed actior, & magis viam ciens.

Eorundem caulium meminit & Martialis.

*Et saba savorum, prototomique rudes. Item;
Quum mihi boleti dederint tam nobile nomen.*

Prototomis, pudet heu! seruis cauliculis.

Appellantur autem prototomi à prima sectione ac cæsurâ, quando videlicet ad feminis generationem augescentes succidantur, & in ciborum vsum veniunt. A Marcello caules Haplofiles à teneritudine, Græca appellatione, dicti sunt.

Quod autem Plinius ait. Sunt qui semen Trifolii, aspergant foliis: hoc dudum ex Constanti-

no Cz-

no Casare & Palladio Cornar. declaravit, parum animaduertentis fuisse, vt *τρίφυλλον γένος ἐστὶν ἀδύ-βη, in Trifolii semen conuertet.*

Brassica decimo à factu die se demonstrat, nisi femina quæ solo mandantur, vetustate sint ex-acta: tum enim in aliam degenerare stirpem Marcus Varro tradidit. Semen vetus tantum valet in quibusdam rebus, vt naturam commutet. Nam ex femine Brassicæ vetere saro, nascuntur Rapa, & contrà ex raporum Brassica. Secari non debet quæ sementi destinatur. Sed occurrit ingens discordiæ miraculum. Hoc olus vitem fugare diximus: Cyclamino & Origano, perareleat.

De Brassicæ latio ne hæc Coleus: Ante hie- mem excolitur terra & bene adæquatur, mense Februarii seratur semen Brassicæ, etiam si conge- lata sit terra ac etiam tecta copiosa niue, postea sparge supra finum Gallinarum: prouenit Brassicæ plantæ pulcherrimæ & optime ad trans-plantandum, quæ non corrumpuntur. Item circa diem à Matthia denominatum bonæ matres familiæ ferunt Papsamen aut Fholtsamen, si terræ possunt committere, vel antè terram colunt, de- inde circa diem Matthiæ ferunt, etiam supra ni- uem. Quædam in Martii terram madefactam miscent cum femine & ferunt in hypocaustis sub scamnis: vbi gelu præterit in terra ferunt. Ait idem, in Martio, Brassica alba capitata [weissen Fhol], feritur in Martii septimana, circa S. Vr- bani diem transplantantur, ager bis arandus: vna- que planta distet fetquipede, tribus septimanis post ad radicem cûmulanda terra & fodienda: plantando loco vbi meridians Sol parum lu- ceat, non enim facillè Solem tota die perfert.

Brassica fatua, vt scribit Diosc. alio commo- da est, si leuiter seruet facta edatur. Percoc- ta est, & magis quæ bis coc- ta, & in lexitio coc- ta est. Stomacho autem incommoda est. Et æliua acrior est. Quæ verò in Ægypto est, ob amari- tudinem edi non potest. Cæcipientibus tamen & tremulis in cibo auxiliatur: & noxas ex crapula & vino, à reliquo cibo sumpta extinguit. At Cyma ipsius stomacho commodior est, sed acrior est, & magis vrinam ciet. Eadem con- dita, stomacho incommoda est, & aluum turbat. Cæterum crudæ fuccus cum Iride & nitro deu- oratus, aluum mollit. Cum viho verò potus, morsus à Vipera opitulatur: cum scœnigræci farina & aceto, podagricis & arthriticis, fordidisque ac veteribus vlceribus, impositus prodest. Idem per septimum naribus insusus, caput purgat. Cain Lolii farinâ appositus menses ducit. Folia im- posita per se, aut trita cum polenta, faciunt ad om- nem inflammationem, & tumores. Ignescitem factos, & pustulas nocturnas, & lepras sanant. Cum sale verò carbunculos emarginant. Conti- nent etiam desiliuuium capillorum in capite. Ead- em elixa (ἀδύμια) & melli ammixta ad gangra- narum nomas faciunt. Si verò cruda cum aceto edantur, splenis profunt. Sin commandentur vt succus deuoretur, vocem interceptâ [ἀπικρασίς] & non retusam vt malè Ruell.] restituunt. De- coc- tum ipsius potum, aluum & menses mouet. Flos in pessulo appositus post partum, concep- tionem impedit. Græcè legitur τὸ δ' ἀδύμια ἀπικρασίς τῆς ἀπικρασίας πεπεμένη ἐν πύλιν, quæ sic Ruellius, flos post conceptionem in pessulo subditus, partum abortu vitiat. Semen maximè eius quæ in Æ- gypto nascitur potum, lumbricos expellit. Am- miscetur etiam in antidotos Theriacas. Et fa- tiem ac lentiginis depurgat. Caulis virides vnâ cum radicibus vsui, & adipe sullo vetere excepti

Tom. II.

ac impositi lateris diuturnos dolores sedant. Hæc Dioscorides, in quibus quæ de foliis mandu- catis tradit: Aclepiades, Galeno teste, de cauli- culis ad vocem interceptam præscripsit. Brassi- cæ viridis, inquit, cauliculos absterfos mandu- candos præbe, & quod instar palarum exucum est, expuere iube, succum verò delingere. Alia, Brassica succum cum melle coctum delingen- dum exube, auxiliabitur confestim.

Brassicam Athenis cibo parari solitam fuisse pro puerperis mulieribus commemorat Athe- næus, velut idoneum medicamentum quoddam, & aptam nutriendo corpori. Ephipp. in Ge- ryon.

Oleoque Brassicam in fasciculos collectam inco- quere.

Antiphanes in Parasito Brassicam memorat tan- quam vilem cibum his verbis.

Brassicam tamen vinctam coquunt, & dicit

Diphilus in Infatiabi:

Adueniat, quæcumque bona sunt afferant, us flati- tum:

Brassicam vinctam.

Apud Ægyptios in carnis statutum est, inquit A- thenæus, ante omnem cibum brassicam elixam (ad accendam ebrietatem) comesse, & ad compo- sitiones ita sese præparare. Multi sanè, vt ab e- bri- etate vindicentur, præsumunt Brassicæ semine: quam obrem Sybaritæ; vt inquit Timæus, antea quam potarent, Brassicarum esu se mun-ebant: Alexus.

Hæc bibisti plus satis: nunc graue caput,

Sentis, medendum est huic malo iciumio:

Deinde Brassicam tibi dabit quispiam

Elixirum.

Eubalus alchubi:

Vxor mihi Raphanum si tu afferas,

Hanc crapulam è vestigio discesseris

Ni fallor omnem.

Anaxandrides:

Si Lauabitis,

Raphanumque multum editis, hæc mox desinet

Vexare vos capitis grauedo: frontibus

Nubem insidentem rrsibus dispergite.

Nicochares:

In crastinum Raphani loco nos balneum

Quod crapulam sinet tuam parabimus.

Amphis:

Nullum remedium est ebriis paratius,

Quam si molesti quidpiam forte occidar

Sibi dè eremum mirum in modum illud disspat;

Raphanum vt non magis

Ad id valeat.

Brassicæ hanc facultarem Litteris mandauit Theophrastus, & hoc præterea, vitem etiam, dum viuunt, iudorem Brassicæ auerfar.

Cur autem crapulam sedet, id causa subdit A- ristoteles in probl. quia eius succus crudos hu- mores & vinosos in aluum attrahit, ac ipsa in ventriculo remanens refrigerat corpus, quo re- frigerato tenues humores in vesicam feruntur. Vnde cum humores vitæ abigantur, refrigerato corpore, illo crapulam sedant perspicuum est; præsertim quum sequax vini vapor humoribus deorsum conuersis deuocetur, & præceps ad imâ deuoluatur, qui sese effertens in caput, mentis arcem obsidet, & temulentiam grauitatemque creat.

Galenus ex Apollonio in dolore capitis ab ebrietate ad refrigerandum repellendumque, ro- faceum per se & cum aceto, aut hedera, aut Bras- sicæ succo præscribit. Quin & ipsa Brassicæ folia salda macerata, capitique circumposita, ac obli-

gata naturaliter ebrietati resistere ait.

Apud Græcos porro ad eodè frequentis fuit in cibo vsus Brassica, maximè quæ *καυθή* dicitur, vt bis cocta fastidiri cœperit, & apud Apicios in proverbium abiicit, *dis καυθή βδύρα* Q. quo etiam hodie vimmur, cùm remitterem atque iterum repetitam, non sine molestia, significare volumus.

Quid si hæc eadem illa sit, quæ tot exetcut, imò serè occidit, Grammaticos, illo Satyrnici senariolo vaticinante quantum crucis nostris olim Crucis poneret.

Occidit miseris Crambe repetita magistras

Antequam autem Medicos populus Romanus reciperet Brassicâ sexcentis annis ita vsus est, vt nullus morbus omitteretur quem non hoc oleret, Marco Catone id annotante, curaret. Ex quo vires eius persequi par esto.

Brassica omnibus oleribus antè stat. Eam esto, ait Cato, vel coctam, vel crudam. Crudam si edas, in acetum intingito, misticè concoquit, aluum bonam facit, lotiumque promouet, ac ad omnes res salubris est. Si voles in conuiuio multum bibere, cenareque libenter, ante cenam esto crudam, quantum voles ex aceto. Et item vbi cenaueris, comesto alia quinque folia, reddet te quasi nihil comedetis, biberisque, bibesque, quantum voles. Vt aluum deiciat quomodo paranda & edanda sit docet. Si verò acetè lotium it. Sumito Brassicam, inquit, conuicito in aqua feruente, coquito paulisper, vt siuberda fiet, postea aquam defundito non omnem: ed addito oleum, & salem, & Cuminum paululum in feno: facito paulisper, postea inde iusculum frigidum sorbere, & ipsam Brassicam esse oportet, vt quamprimum excoquat, quotidie id facito. Quæ vocatur *καυθή*: hæc septem habet bona in comestura. Et primum scito: de omnibus Brassicis nulla est Crambe tertia medicamento. Ad omnes tumores, ad omnia vulnera eam contritam imponito. Hæc omnia vlcera purgabit, sanaque faciet sine dolore, tumida concoquet, vulnera putrida cancroque purgabit, sanosque faciet, quod medicamentum aliud facere non potest. Verum priusquam id imponas, aqua calida multa lauato. Postea bis in die contritam imponito. Ea omnem putorem adimet. Si cancer ater est, is olet, & faniem spurcam mittit. Si albus, purulenus est. Sed si fistulosus, subtus suppurat sub carne. In ea vulnera huiusmodi tere brassicam, sanum faciet: nam optima est, ad huiusmodi vulnera. Et luctatum si quid est, bis die calida foueto, brassicam tritam apponito, cito sanum faciet. Si bis die apponitur, dolores auferet, & si quid contusum est, erumpet, si brassicam tritam apposueris, & sanum faciet, & si quid in mammis vlceris natum, & carcinoma, brassicam tritam apponito, sanum faciet. Et si vlcus acrimoniam eius ferre non poterit, fornam hordeaceam misceto, ita apponito. Huiusmodi vlcera omnia hæc sana faciet quod aliud medicamentum facere non potest, nec purgare. Et puero, & puellæ si huleus erit huiusmodi, farinam hordeaceam addito. Et si voles eam esse, confectam lautâ siccam, sale ac aceto sparsam esto, salubrius nihil erit. Quò libentius edas aceto multo spargito, mentham addens siccam, & rutam, & coriandrum sale sparsam: paulò libentius edes. Id bene faciet, & mali nihil sinet in corpore consistere, & aluum bonam faciet. Si quid antea mali intus erit, omnia sana faciet. De capite & de oculis om-

nia deducet, & sanum faciet, Hanc manè esse oportet ieiunum. Et si bilis atra est, & si lienes turgent, & si cor dolet, & si iecur, aut pulmores, aut præcordia, vno verbo, omnia sana faciet quæ intus dolent: eodè modum silphium in radito, bonum est. Cùm venæ omnes, vbi sufflatae sunt ex cibo, non possunt perspirare in toto corpore, inde aliqui morbi nascuntur, vbi ex multo cibo alius non it, proportione Brassicâ si vteris (vt te mo ne) nihil istorum vsu veniet ex morbis. Verum morbum articulare nulla res tantum purgat, quantum Brassica cruda, si eam edes cum ruta, & coriandro concisam. Sic & Laserpitium in rasum cum Brassica ex aceto oxymelli, & sale sparsa. Hac si vteris, omnes articulares morbus poteris expellere. Nullus sumptus est, & si sumptus esset, tamen valetudinis causa experiret, eam manè oportet ieiunum esse: Omnis qui in sonnifus est, hæc eadem curatione sanum facies. Verum aliam Brassicam, & vntam caldam salis paululum dato homini ieiuno. Quam plurimam ederit, tam citissimè sanus fiet ex eo morbo. Tormina quidem molesta erunt, sic facito. Brassicam macerato bene, postea in ollam conuicito, de feruefacto bene, vbi cocta erit bene, aquam defundito. Ed addito oleum bene, & salis paululum, & cuminum, & pollinem polentæ. Postea bene feruefacto, vbi se huerit, in catinum indito. Dato edat si poterit sine pane, si non, panis parum ibidem maledaciat, & si febrim non habebit, dato vt vinum atui cum bibat, cito sanus fiet. Et hæc, si quando vsu venerit, vt quis debilis fiet, hæc res sanum facere potest, si brassicam edet ita vt supra scriptum est. Et hoc amplius: Lotium conseruato eius, qui Brassicam est auerit, id calefacito, ed hominem demittito, cito sanum facies hæc cura, exper um hoc est: Item, pueros pusillos si laues eo lotio, nunquam debiles fient: & quibus oculi sunt parum clari, eo lotio inungito, plus videbunt. Si caput aut ceruicis dolent, eo lotio calido lauato, desinent dolere. Et si mulier eo lotio locos fouebit, nunquam in virosi fient. Hæc inter alia Cato, quæ malum formalis eius Minerua reddere, ne quid verborum eius deperiret, aut aliquid in detrimentum sententia omitteteretur, aut mutaceretur, quod dum nitiori orationis consulti volunt, fieri consuevit.

Brassica laudes, inquit Plinius, longum est exequi, cùm & Chryippus Medicus priuatim volumen ei dicauerit per singula membra hominis digestum, & Dieuches: ante omnes autem Pythagoras & Cato non paruis celebrarint. Cuius sententiam vel ed diligenter persequi potest, vt ne caur qua medicina vltus sit annis DC. Ro. populus. Cato crispam maximè probat, dein leuem grandibus foliis, caule magno. Prodesse tradit capitis doloribus, oculorum caliginis scintillationibusque, vel stomacho, præcordiis, crudam ex aceto & melle, Coriandro, Ruta, Mentha, Lasens radice, sumptam acetabulis duobus maturo: tantumque esse vim, vt qui terat hæc, validiorem fieri se sentiat. Ergo vel cum his tritam, sorbendam, vel ex hoc intinctu sumendam. Podagra autem, morbi que articularis illini cum Ruta, Coriandri, & Salis mica, ac hordei farina. Aqua quoque eius decocta, nervos articulosque mirè iuuat. Si fouerit vulnera, & recentia & vetera, etiam coccinonata quæ nullis aliis medicamentis sanari possunt. Fo-

ueri prius aqua calida iubet, ac bis die tritam imponi. Sic etiam fistulas eluxatas, & tumores euocari, quæque dissecuti opus sit. In somnia etiam, vigiliâque tollere decoctam, si ieiuni edant quamplurimum ex oleo & sale. Tormina si decocta iterum decoquatur, addito oleo, sale, cumino, polenta. Si ita fumatur sine pane, magis profuturam. Inter reliqua bilem detrahi per vinum nigrum potâ. Quin & urinam eius qui brassicam escitauerit, asseuati, calefactamque neruis remedio esse. Verba ipsius subiiciam, ad exprimentam sententiam. Pucos pusillos si laues ex urina, nunquam debiles fient. Auribus quoque ex vino succum brassicæ tepidum instillari suadet. Idque etiam tarditati audientium prodesse asseuerat. Et impetigines eadem sanari sine hulcere. Græcorum quoque opinionones iam & Catonis causâ poni conuenit, in iis duntaxat quæ ille prætermiserit. Biles detrahere non per decoctam putant. Item alium soluere, eandemque bis coctam sistere. Vino aduersari, ut inimicam vitibus. Antecedente in cibis cauere ebrietatem: postea sumptâ et apulam dissecuti. Hunc cibum & oculorum claritati conferre multum: succum verò crudæ vel angulis tantum tactis cum Attico melle, plurimum. Facillimè concoqui, ciboque eosentus purgari. Erasistrati schola clamant, nihil esse vitibus stomacho neruisque, idè & paralyticis, & tremulis dari iubet: & sanguinem excreantibus, Hippocrates cæliaci & dysentericis bis coctam cum sale. Item ad tenelimon, & renum causâ: lactis quoque vberetatem puerperis hoc cibo fieri iudicans, & purgationem feminis. Crudus quidem caulis si mandatur, parus quoque e-mortuos pellit. Apollodoros aduersus fungorum venena semen aut succum bibendum censet. Philistion Ophthalmicis succum ex lacte caprino cum sale & melle. Inuenio & à podagra liberatos edendo eam, decoctæque ius bibendo. Hoc & cardiacis datum & comitialibus morbis addito sale. Item Splenicis in vino albo per dies 40. Ictericis, nec non & phreneticis radicis crudæ succum gargarizandum bibendumque demonstrat. Contra verò singulum cum Coriandro & Anetho, & melle ac Piperis ex aceto, Illitum quoque prodesse inflammationibus stomachi. Item serpentium icibus, & fordidis vlcetibus, ac vetustis, vel ipsam aquam cum hordeacea farina: succum ex aceto vel cum vino Græco. Sic aliqui & articulis, podagrisque imponunt. Epinyctidas ac quicquid aliud serpit in corpore, inposita leuat. Item repentinas caliginis: has & si manditur ex aceto. Suggillata verò & alios liuores pura illita. Lepras & pforas cum alumine rotundo ex aceto. Sic & fluentes capillos retinet. Epicharmus testu & genitalium malis hanc vtilissimè imponi asserit. Efficacius eandem cum Faba trita. Item conuulsis cum ruta. Contra ardorem febrium & stomachi vitia cum ruta femine: & ad secundas. Et muris atanei morsus, foliorum aridorum farina alterutra parte exinanit. Ex omnibus brassicæ generibus suauissima est cynna, etsi inutulis habetur, difficilis in coquendo, & renibus contraria. Illud quoque non est o-mittendum, aquam decoctæ ad tot vsus laudatam fortèe humi effusam. Stipium brassicæ aridorum cinis, inter caustica intelligitur. Ad coxendicium dolores cum adipè peructis. At eum Latere & aceto in vicem psilochii euulsis illitus pilis: nasci alios prohibet. Bibitur & cum oleo subfernefactus, vel per se elius ad conuulsam & rupta intus, lapsumque ex alto. Nulla ergo

Tom. II.

sunt crimina brassicæ: imò verò apud eosdem animæ granitatem facere, dentibus & gingiuis nocere: & in Aegypto propter amaritudinem non estur.

Sed de brassicæ facultatibus disserit Galenus his verbis. brassicæ succum facultatem habet purgatricem, corpus autem ipsius communi siccantium ratione sicut magis, quàm ad deiciendum incitat. Quum igitur quæ in ventre continentur excernere voluerimus, è propinquo cacabo in quo cocta cum aqua fuerit, extractam ipsam protinus in vasa, in quibus oleum cum garo paratum fuerit, conicere conueniet: nihil autem retulerit, si sale loco gari sumperis. Quod si humentem alium siccare voluerimus, priorem aquam, vbi Brassica mediocriter cocta videbitur, effundentes, aliam calidam mox iniiciemus: ac deinde rursum Brassicam, quoad conuerberit, ei incoquemus, quod non facimus cum ventris deiciendi gratia lamitur: volumus enim hoc casu proprium ipsius succum omnem non deponere, sed quoad maximè fieri licet, retinere. Porro nihil quod coquitur proprium succum seruare omnino potest: quin potius omnem abiicit, si coctum diutius fuerit: brassica paucum habet alimentum, & edulium est non firmum, sed laxum. Succum habet non prohum, vt Lactuca, sed prauum & graueolentem. Quod verò ad urinas actinet, nihil ipsas, quod sciam, insigniter neque ptouocat, neque moratur. brassicæ germen quod nonnulli *xyza* nominant, minus quàm Brassica ipsa siccatur: tamen si aliorum olerum caulis temperaturâ verò plurimum est quàm folia sicciora, potissimum quum iam propè est, vt semen profundant. Et, brassica esculentâ desiccandi vim habet, cum esca, tum foris inposita, non tamen etiam admodum acrem. Alioqui & vlcera glutinat, & maligna vlcera sanat: præterea phlegmonas iam induratas, ac ægrè solubiles, & id genus quoque erysipelata. Eadem facultate epinyctidas & herpes sanat. Habet quiddam etiam in se absterlotium, quo lepras curat. Porro semen eius potum lumbricos interficit, maximè brassicæ Aegyptiæ: quantum scilicet ea temperatura siccior est. Sanè amara qualis semen particeps est: sicut videlicet alia omnia medicamenta, quæ ad lumbricos idonea sunt. Eadem facultate ephelidas & lendes, & quæcunque modicam absterfionem postulant, adiuvat. Porro caules brassicæ combusti cineres efficiunt admodum desiccantes, vt videlicet iam & causticam vim participent. Hac ratione ei veterem adipem commiscentes: ad inueteratos laterum dolores, & si quid eius fuerit generis adhibent: nam valenter digerens medicamentum efficitur. *hæc Galenus.*

Simeon Sethi: Malum, inquit, & melancholicum succum Brassica procreat, visum hebetat, & somnum per tumultuosâ insomnia interturbat. Succus eius aliquatenus purgat: corpus verò eius ventrem sistit. Quapropter in quibus humectam alium siccare volumus, ipsam modicè decoquentes, aquamque primam abicientes, confestim alteri aquæ feruenti indimus: nihil enim neque aëris, neque frigida aquæ quod bis coquitur tangere debet. Aestiva Brassica peioris succi est quàm hyberna. Urinam ducit, lumbricos interficit, & iis qui ex vino crapula laborant auxiliatur. Fertur autem ab humiditate ortam hebetudinem sanare. Cocta cum pingui carne, plurimum noxæ atque vitii amittit. Flos eius proprietate quadam semen genitale corrumpit

vero impositus, & mulieres concipere prohibet. Pulmonem lædit. Tradunt quoque si ante alios cibos assumpta fuerit, ebrietatem arcere. Et quod eius succus cum melle sumptus, magnificè defecationes vocis iuuat. Vulneribus imposita ea conglutinat, & malefica vlcera & induratas inflammationes sanat.

Brassicæ semen crassiusculè contusum, inquit Matthioli, & in carniū iure seruēfactum, potūmq; vnā cum ipso iure colico dolore laborantes præsentaneo remedio iuuat. Brassica tormina discutit, si bis edatur cocta, addito Cymini semine, Sale, Oleo, & hordeaceæ fatinæ polline: præsertim si sine pane deuotetur. Idem facit ius decoctæ cum vetere gallo. Item potest ieci norosis, lienosis, & renū calculo laborantibus. Prodest percocta tabidis, si frequenter edatur. Succus ex melle coctus visu clarificat, angulis tantū oculorum illitus. Datur succus vtiliter potandus aduersus fungorū venena. Cocta, & longo pipere aspersa vnaque cum iure sumpta nutritibus lactis vbertatem præbet. Caulium medulla ex tremore amygdalino decocta, & cum melle in eclegmate parata, datur lambenda magna vtilitate anhelosis.

Brassica, vt scribit Cardanus, triplici nobilitate præstat, nam cibus est & medicina, aded vt Romani non aliam nouerint tam in externis, quàm interioribus morbis: Vi tam egregia, vt incocta vasis in quibus aqua seruere solent, cutis ab illis auferat: partibus enim tenuibus & nitro similibus prædita est. Sapore aded suauis, vt à plerisque nobilioribus edulis præferatur.

Cæterū scribente Dodoro, Brassica omnis resiccantem & adstringentem facultatem habet, atque vnā nitrosam quandam vehementius abstergentem qualitatem: hanc autem succus aut decoctum eius sibi vendicat: substantia siue brassicæ corpus adstringentem & resiccantem retinet. Deporitur etenim brassica decoctione nitrosam hanc qualitatem quæ succo ac humido eius insidet: quam omnem auerit qua primò decoquitur, ad se pertrahit. Quam ob causam decoctum eius aluum mouet: veluti & succus si bibatur. Abiecto autem primo iure in quo decocta est, aluum brassica siccat & adstringit: alimentum autem corpori præbet exiguum: succum verd ingenerat non probum, vt pote crassum ac melancholicum, minus tamen crassum aut vitiosum, quæ alba sunt: quæ idcirco & aliis præstant.

De Brassica Baptista Piera sic cecinit.

Iam veniat solio Chryssippi Brassica crispo,

Vel patulo & leui, vel glomerata coma.

Prima salutaris, & ventrem lenire parata,

Bullierit modico si tamen igne, placet.

Omnibus ardor inest grauior tum & esca secundis,

Ne capiri noceant vina superba premunt.

Extumidam referant vesicam, agrumque lienem.

Hepes & obstruētum samineumque semur.

Arida Socraticam pareret ni Brassica bitem,

Iure erat in morbis omnibus illa satis.

BRASSICA CAPITATA ALBA.

Scuti vlt frequentissima est brassica alba scapitata, ita in hoc genere prima nobis describetur.

Caulē ergo hæc producit crassū, albican-
tam, crasso coituce teetum, medullā parum acū &



subdulci: *Folia* quæ primū erumpunt lata habet & ampla, subrotunda, nullis effatu dignis lacinis sinuata, longis crassis pediculis harentia, costis neruisque albicantibus intertexta. Quorum inferiora auulsa, aut fortè decidua, *stipitem*, relinquant densa vestigiorum serie rugosum & in-

qualem: Superna verd quæ remanent lata quoque & subrotunda, & ex vtriusque albicantia & cæcia, mutuo incubitu in *caput* maximum durissimum conglobantur: tam arcto complexu, vt difficilè separentur. Horum interiora planè albicant. Porò *glomer* appetente Vere, quo tempore semini ergo tranplantari solet, parum defuscens, è medio caulem erectiorem profert *floribus* luteis aut luteopallidis, quibus delapsis *siliquæ* longæ nascuntur teretes, acuminatæ: femina parietum medulloforum intersepu claudentes rotunda. Hęc mem non durant, nisi contra frigus maniantur. Rei familiaris potissimum hæc expeita, propter vsum, & quia diutius in cellis adseruari solent. Hęc interdum elegantissimā naturæ varietate ad 50. Capitula minorā fert, magni illius glomeris loco, vt inferius specialius tradetur.

Capitulum hodie dictum olus, Germ. *Capūß*, brassicæ genus est, inquit Cordus, quod Cumanum Plinius vocat: fissile folio & capite paululū, non tamen vbiq; similiter prouenit: triticanam, imperialem, *capitata*, *capitata*, suspicatur esse H. Iun. quam Nicander *capitata* nominat à tumidi ventris figura.

Fuch. Icon. Brassicæ 4. genus: & hist. brassica 4. fissilis, quam vulgus Caputolus caules quasi Capitulos appellat. Nonnulli brassicam albam & caules albos.

Dodon. Gall. brassicæ prima species alba: & Lat. in sol. brassicæ 6. inter albidas 1. quam vulgò Capitatum nuncupant: & à nonnullis brassicam Imperialem, brassicam Triticanam Plinii, quem appositè notat quoddam eius Caput terre aggregatione, tale fieri affirmet: quod non aggerando vel accommodando terram tale [pedale scilicet interdum] nascitur, sed sua natura, si tempore & loco idoneis transplantetur, capitatum efficitur. Ipse autem Dodon. olim Fuchianam figuram habebat quam nunc ponit pro rubra, & nouam habet pro alba.

Caulē capitulatum [quem Germani *Cappeca* vocant] ego [Tragus lib. 2. c. 53.] fatinæ brassicæ genus esse existimo, Quibusdam Caulis Imilis Imperialis dicitur. Alii Capitulum capitatum, Caulē capitulatum, & simpliciter Caulē vocant, Auicenna *Cambari* [quam vocem ego ad Betam pertinere suspicor.] Serap. *Cornub* vocat. Petrus de Crescentiis, Sambusium, Stephanus de Coruo, Carnebum appellat. Apollin. *weissföhl* & *fappis* fructus vocat, ac concludere vide-

tur Brassicam cum beta.

Gesner. hort. Brassica capitata.

Monach. in Mes. Caulis Caputii.

Lobel. & Pen. Aduers. Brassica alba scissilis glomerata. Obs. Brassica capitata. Icon. Plant. p. 243. Teut. 293.

Est Matthiolo in Diosc. capitata conglomeratis in orbem foliis, Plinio Lacuturris appellata. Brassica capitata, quae vulgò Capuci dicuntur. Item hist. Germ. Cappes / Brassica capitata, quaedam viridis, quaedam alba.

Tabern. Icon. & hist. Cappens aut Cappes Fraut / Brassica capitata Caulis capitatus.

C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Brassica i. siue capitata alba, Lacuturris Pinnii videtur: alius Cumana eiusdem: alius Tritiana. Brassica, sine pluribus capitibus conglomerata. Hæc non videtur separanda à priore, cuius videtur monstrum.

Cæsalp. Caputii.

Hist. Lugd. Brassica capitata albida, Tertia alba Brassicæ species: Gal. Chou capu, id est Caulis capitatus. Plinio Lacuturris est Brassica ut vult Matth. & Dodon. Brassica Tritiana. Sed verisimilius est Lacuturris nostram esse Brassicam capitatam candidam. Tritianam verò nostram esse Brassicam capitatam viridem. Est & alia Brassica capitata polycephalos, Quidam id terræ, cui semen creditur, vbertati ascribunt, quæ tam copiosum alimentum præbet.

Brassica capitata. Græc. κραιβή κεφαλή. Germ. Cappes & Cappes fraut / weiß köllfraut. Belg. witte Sluist foolen & Cabuisfoolen. Gal. Choux cabuz. Ital. Cabuzzo. Caulo Capuccio, Capuzzino. Hisp. Repollo, Culbes morcinas. Angl. Cabbage. Hung. Feyes Kapozta.

Copiosè colitur in horto E. C. ac aliis Montebelgardi Brassica capitata: longè maximam vidit Argentina: Basileæ abundanter colunt etiam in agris & in Allatia, habent etiam Lugduni: semel uidi Genueæ congelatas lanario. In Ducatu Vviterbergico ut circa fontem Admirabilem agris eâ conferuntur, mense Octobri ostendit mihi DS. Dr. Rontzius in Kircken Brassicam hæc in qua erant ad 50. capita parua magnitudinis Oorum, qualem curauimus depingendam: finilem polycephalon dicebat se habere Il. Cef. Vvrt. Hortulanus in Göppingen / tales mihi etiam aliquando in Allata hartenfchöyler demonstratæ in horto Nobiliss. viri Di. Io. Iac. Vvaldner à freudstein comparis mei. Hoc genere in plerisque Germ. partibus, Bawaria potissimum, autore Fuchsis per integrum anni curricula quotidie videntur. Alba & rubra nusquam maior proventus & fetura quam apud Belgas, ut testatur Lobel. videntur, qui naues onustas in vicinis Germaniæ, Angliæ & Hispaniæ regiones deuehunt.

Semen Caulis capitulati teres & fuscum, quod non peruerstum sit, tempore quadragesimæ Martio mense terræ mediocriter pingui committitur, è qua sexto aut septimo die erumpit, ac nisi frigoribus aut pulicibus terrestribus opprimatur, breui tempore augetur noua illa eruptio. Quamprimum verò recentis illæ & teneræ plantule [Germani Serzling appellant] quatuor aut quinque produxerint folia, id quod in Solfatio æstivali circa Festum D. Medardi fieri solet, tum euelluntur, ac in scisculis colligatæ aliis regionibus in quibus semen aut perinde prouenisse solent, communicantur. Deinceps verò rursus plantantur ex plantula, in terra pingui & probè starcorata. Semen huius oleris peculiari quoque

arte Hortulani elicere solent. Nā capita seu caules capitatos vnà cum radicibus euellunt, in quæ cellis vinaris summa cura conferunt in Martium vsque mensem, quo tempore capitulatum olus ad collum vsque, hoc est, crassus ille ac callosus caulis, humo rursus inscutur. Hoc vbi æstatis vim & calorem senserit, nouos emittit colliculos per capita superne erumpentes, viridibus & augustis foliis vestitos, Aprilique mense eum & arbotes florent, copiosè, luteo, & violis similibus flore comantes. Porro flos in longas tandem abit squas, rotundo & fusco semine refertas.

Hoc oleris in Germania in cibo, & hominibus ^{Vireset} & iumentis nihil frequentius est, ^{Vfus.} Quin ita vñs eius inualuit in plerisque locis, ut vulgus hominum maximè eorum qui amplam familiam alere necesse habent, vino potius quam hoc cibi genere carere velit. Non solum enim stomacho satis facit, ac famentis probè alit, meliorem sui & interna parte, præsertim eos qui eiusmodi cibo assueuerunt, sed & exteriora eius folia, cæteraque partes pabulo bubus exhibentur non ingratæ. Quamobrem quod ad mes [Tragum] quidem attinet, quicquid alii dicant, nolim sanè hoc genus oleris planè contempni, neque etiam facile omnibus indifferenter eum cibum interdiciere consilium velim, maximè iis qui illo assueuerunt, neque alio per inopiam vitare possunt. Consuetudo enim quæ in naturam sæpenumerò transit, repentinas mutationes omninò non potest ferre, teste Hippocrate. Hæc tenuioris fortunæ hominibus scribimus quibus per vitæ rationes splendidiorem epulis vesci non licet. Meo certè iudicio Caulis capitulatus benè paratus, conditus & coctus, multò salubrior est, condimentis illis peregrinis, & sumptuosis. Oluæ inquam, Capparis & Citrorum, quæ omnia ad eos potius pertinere videntur, quibus nihil nisi peregrinum placet, aspernantibus domestica, quæ ut passim obvia sunt, ita dubio procul magis salutaria. Sed ut palato suo isti blandiantur certum tamen est apud plerisque Caulem capitulatum ita in cibo expecti & vsurpari, ut ab eo se diuelli non patiantur, ut qui vtilitates eius, haud obscure deprehenderint. Nemo igitur non nouit caulem capitulatum coctum, maximè cum pinguis caribus & fuis, stomachum latrantem compescere, quamquam & in medicina vsum suum non contemnendum habeat. Brassica capitulata [ut moris est Germanis] in cibo stomacho æstuantem prodest, quare illa eos qui operas exercent vesci conuenit. Vtilis est & splenicis, cibi appetentiam inducit, sitim sedat. Folia huius inflammationibus & tumoribus vtiliter imponuntur, non aliter atque Beta. Ius conditæ brassicæ sacris ignibus singulari experimento illitum medetur. Quod ad reliqua attinet vide supra.

BRASSICA ITALICA TENERRIMA
glomerata flore albo.

Hæc caule & foliis adeoque tota inter albas ^{Descriptio} candidior, teneriorque videtur. Folia quoque quæ ampla sunt atque rotunda per se diluuiis virentia candicantibus venis intertexta sunt, quædam etiam eorum modicè crispæ ac vario contortu nonnihil rugosæ. Foliorum quoque pediculis breuibus auriculæ quædam foliaceæ adhærent. Flores albi quadrifolii uti cæterorum quos nonnisi tepidior Sole illustrata profert, quippe algidi frigoris impatiens, in iis arcto, so-

tum implexa glomertem laxiorem mitioremque efformans. *Etus* membra sunt ut reliquarum Lautior hæc, quippe tenerior, delicatioribus expectta, eorum potissimum qui eius norunt gratiam mensis apponitur.



De hac ni fallor Dodon. Alia capitata, albida quam Sabaudam vocant, oblongioribus capitibus, minusque arde conclusis, quæ si Vere explicentur, caules emittunt ramosos, floribus albidis speciosos.

Dodon. Gal. Brassicæ 2. species, quæ Sabaudica dicitur Plinio Brassica Lacuturria:

Gall. *Chou de Savoie*. Belg. *Sauoy kolen*. Latin fol. Brassica 7. Brabantis Sabauda brassica. Lobel. & Pena Adu. brassica patula, Sabauda vulg. intus albidis, foris virentibus foliis, floribus albis. Icon. pl. p. 244. Brassica Sabauda hiberna Teut. 294.

An Math. in Diosc. brassica crispa: Plinius eam Sabellicam appellari tradidit, quæ crispis admodum foliis, Laetæ modo in se concluditur, intus albicans, tenera, subdulcis, & quæ hæc etate omnium præstantissima habetur. Item Hist. Germ. *Bräuß föl frauß*/Brassica crispa.

Figura à Cameratio posita, aliam brassicam denotare videtur.

Tabern. icon. & hist. brassica crispa *Bräuß föl frauß*. An eadem brassica Sabauda *Säffoyß föl*. Figura est Matthioli.

C. Bauh. phyt. brassica secunda siue alba capite oblongo, non penitus clauso.

Hist. Lugd. Brassica alba crispa, brassica Sabaudica, *Chou de Savoie*. Dodon. Lacuturria, Catonis crispa, Plinii Sabellica.

H. Jun. Brassica Lacuturria Plin. B. *Sauoyß föl föle*. Gall. *Chou de Savoie*.

Tempus & locus

In horto Montbelgardi Ill. E. C. V. virt. excolimus, in quo florentem vidimus Septembri & Octobri. Hanc frigoris admodum impatientem tradidit Lobelius. Hyemis vigorem non sustinet, inquit. Dodon. neque ad Ver peruenit, nisi admodum clemens hyems fuerit.

BRASSICA SABAVDA RVGOSA.

Descriptio

Huius folia rotunda, rugosa valdè, ac ita quidem rugis inæqualia sunt, ut singula ceu ex vesicis aut valvulis quibusdam consimilibus congesta videantur, subtus extuberantibus atque prominentibus auerta parte, caulis ex brevibus pediculis hærentia, color foliorum ex luteolo quodam & atro viret, quæ pallidè viridantibus costis quoque intertexta sunt. Eadem etiam in densum globum coguntur, sed paruum, & candicantem, dum extremitates interim ob-



scutis virent. Flos luteus, semen ut in reliquis. Hyemem nos fert.

An Dodon. Lat. Brassica Sabauda cuius nomine figuram posuit, quæ non videtur responderedescriptioni.

Tabern. Icon. & hist. *Säffoyß föl*/Brassica crispa.

Lobel. Icon. p. 224. Brassica patula crispa Sabauda æstiva Teut. 294.

C. Bauh. Phyt. Brassica 9. siue alba crispa, Matthioli crispa, Lobel. Sabauda æstiva. Quibusdam censetur Lacuturria Plinii: alius eiusdem Sabellica, Matth. Gesner. hort. Lac. Brassica crispa Lugd. Brassica alba crispa Lobel. Brassica patula crispa. Sabauda æstiva Dodon. Brassica Sabauda Tabern. In hac magnam colorum varietatem observauimus: est nucea tota: est quæ candidissima, &c. *Hæc Frater*. Matthioli crispa an sit eadem cum Sabauda rugosa dubito propter descriptionem à Matthiolo positam quæ respondere non videtur alii diiudicent, nihil æstimo: Præterea varietatem colorum tantam non existimo cadere in brassicam Sabaudam æstivam, sed potius ad brassicam crispam laciniolam referendam. Est mihi Montbelg. in horto Ill. E. C. hyemem difficulter proferens: obseruauit quoque Geoplingæ in horto Ill. E. C. Virt. & in *Wörßen steig* in horto Ill. Comitum.

Locus

BRASSICA RVGOSA, LONGIORIBUS FOLIIS.

Folia ampla sesquicubitalia ex longis pediculis, inferiori parte amicta. Hæc quàm Sabaudicæ scriptæ diluente viore candidiorumque Costarum interceptu, candidior apparet, totaque rugosa, ac veluti sacculus referta est. Tenera quoque magis videtur, nec in capita cogi solet, ut Sabauda flore luteo hiemem vix fert.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. V. virttemberg. Locus

BRASSICA MULTIFLORA.

Preæmpla hæc quoque fert folia, cubitalia, longiora quàm brassicæ capitata alba, nec ita lata, nulla insigni laciniarum ditiusurâ, dilutè virentia, quædam etiam colore magis glauco, exteriora prælectim, neruis candicantibus conspicua, per ambitum ex longiuscula distantia densiculata, & veluti serrata. In capite glomeratur, sed mollius, minus densis foliorum incubitu formatum. Intra quorum sinum flores densissimo stipatu prodeunt exigui, pallidi aut candicantes, velut in umbella positi, qui cum cauliculis suis aspara-

Descriptio



asparagorum tenellis tene-ritudine & gravâ cettare videntur, at-que ob id lau-rioribus tan-tum patinis expetiti: Et ipsâ quoque Erucâ, huic apprimè con-colores, sapè eam depascun-ter, vt pro brassica, brassi-çæ cadauer re-linguant.

Dodô. Gall. brassica 3. siue Pompeiana: Neotericis Cy-

ptia: Ital. Caulisfiori: Gal. Chou fleuris, belg. Bloem Boelen. Idem hist. Lat. brassica 8. Caulisfloram nonnulli Cypriam vocitant, ea autem cum Plinij Pompeiana conuenit: videtur.

Lob. & Pena Adu. brassica florida aut potiùs racemosa, vel botrytis Pompeiana. Obs. brassica florida botrytis: Icon. Plp. 245. Teut. 295.

Cam. apud Matth. G. Blüm fôl/Italis Caulisfiori optima adfertur Genuâ, alis brassica Cypria, qui existimant Pompeianam Plinii: esui optima deli-cata, diu potest hieme in cellis referuari. Caulis floridus. Idem horti, brassica Cypria, siue Pom-peiana. Tabern. Icon. & hist. Blümen fôl/ brassica prolifera florida.

C. Bauh. Phyt. & apud Matth. brassica 7. siue cauliflora, Pompeiana Plinii: Theophr. videtur meminisse, dum scribit genus esse quod nullum aut paruum semen producat.

H. Jun. Brassica Pompeiana Plinii. Cypria Rem-berto. B. Bloem fôle. G. Choux fleuris. Ital. Cauli flores.

Hist. Lugd. Brassicæ albæ quinta species. Bras-sica Pompeiana aut Cypria. An Gesner. hort. brassicæ genus quod è Syria defertur, Conabit seu Conaur vulgò dictum.

Cæsalp. Genus capitatæ brassicæ à flore cog-nominatum, Cauli flores. Theophr. videtur nul-lo semine aut paruo.

Polyflora brassica sæpiùs nobis prouenit Montbelgardi, in horto Ill. E. C. V. virt. ex semine peregrino: verùm hieme reponenda, & vix se-men maturum profert. Sutzgardia: in eiusdem Chorto copiosè excolitur, & editur, vt etiam in E. C. hort. Gœppingæ: Vidi & in horto Ill. C. in Wiesensteig.

BRASSICA ALBA VVLGARIS.

Radix tophosa est, ex qua stipes qui foliis ner-ruorumque diuisura, atque intertextu, rubræ quodammodò respondet: folia tamen subrotun-da, ex longis crassis pediculis delicatiora viden-tur, in quibus in circuitu præsertim serraturæ quædam apparent. Tota planta albicat, & cælio quodam colore obducta est, auriculas habet vti prædictæ. Flos albus est.

Huic altera similis si non eadem quam hortu-lanus diuersam putat, vt pote cuius folia magna,



nonnihil crif-pa, interna verò quæ ad vmbilicum plantæ magis candicantia, aut certè maculis albis insi-gnita, quæ-dam etiam per ambitum leui-ter ferrata.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. brassica 6. siue alba vel viridis. Trag. brassicæ satua maioris species altera. Al-terum genus purpureo af-fine forma

foliorum candidorum ad caulem accedit ca-pitulatum, sed quæ in caput minimè extube-rent. Hoc quoque genus hyemem contemnit: Caulem fundit admodum procerum, vt qui vni-cus tot folia suppeditare queat quot ad sæculum requiruntur. Tragus Germ. describit cum rubra, Gesner. hort. brassica alba. Monach. in Mes. Cou-les albi. Lob. & Pena Adu. brassica laciniosa al-ba. brassica vulgaris & vulgati. ex albedo & pullo albicans. Matth. Germ. brassica leuis alba, Grünweiss fôl. Hist. Lugd. brassica alba vulga-ris, læuis, satua Theophr. Catonis & Plinii: foliis ex viridi casto candicantibus, flore tum luteo tum albo. Cæsalp. brassica læuis, Plinio caulodes. Hort. Lusit. brassica alba, weisser fôl. Sel. Sefada Byle fôal.

Genus brassica alba hyemem ferebat in horto, in fine Nouembris anno 1569. in ea ap-paruerunt adhuc Erucæ. Monspelii brassicam al-bam cum flore albo copiosè in hortis colunt.

Locus & tempus Flore albat

BRASSICA ALBA EXPANSA.

Albæ vulgati in multis adsimilis esse vide-tur. Verùm folia hæc fert ampla, ex longis & auritis pediculis, duorum aut trium ferè cu-bitorum, læuia, vix vllis lacinis diuisa, sed tan-tum nonnihil complicata aut conuoluta. Tota planta adeò expansa est ac patula, vt amplissimæ tabulæ conferti possit. Italicam putamus, nec existimamus hyemem perferre posse.

In horto Ill. E. C. Montbelgardi colitur: Octo-bris sine nondum caulem, nedum principium eius apparuit.

Locus & tempus.

BRASSICA CAVLORAPA.

AT rarior multò brassicæ illa species, quæ patulis foliis glomerem nullum facit, ve-rùm, quo solo signo facillè ab aliis separetur, bre-uis caulis, quâ foliorum comæ subest, in rapum esculentum extuberat.

Dod. Gall. brassica 4. hodie dicta Rapæcau-lis. Gall. chou raux. Belgic. ræpsfoelen. Et Lat. it

Descriptio

Descriptio

fol. Brassica 9. Rapocaulis vulgò. Brassica caule rapum gerens. brassicæ cuius caulis Rapi in morem extuberat, manditurque subinde medulla, pingui iure incocta Raporum modo, non reperit Matth. meminisse Plinium, nec vetustiores alios.



Camer. Germ. Matth. Rûben fol / Caulorapum. Italarum *Torzutos* Plinii Lacuterres. Idem hort. brassica rapicaulis.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. brassica 8. siue gongyloides, Rapius colis, Catoni fortè.

Caulorapum cinnamum virtusque naturæ vidit Scaliger, sed brassicæ radix

sub terra condita fuit, Rapum supra terram in stipite turgescerebat

Cæsalp. vulgò *Torzuti*, Plinio Lacuturres, capite prægrandes. Putat Gesner. hort. brassicam hirsutam Monachi in Mesuem esse genus illud cuius Matth. meminit, tanquam Veteribus ignoti, cuius caulis, inquit, Rapi in morem extuberat. Considerandum an Monachi non intelligant aliam.

Lobel. & Pena Aduers. Caulorapa, brassica peregrina, medio caule turbinata & Rapata. Icon. plant. p. 246. Rapa brassica peregrina, caule Rapum gerens.

Hist. Lugd. brassica 7. siue Raposa, Veteribus incognita [nisi sit Rapius colis Gatonis] *raposa* nominari potest.

Tabern. Icon. & Hist. Rûben föll / Caulorapum. Item lang rûben föll / Caulorapum 2. Nos vnam eandemque plantam facimus, idèoque non separamus.

Brassica pulchra quæ ad radicem magnum habet rapum, esui commodum. Non vique adè crebra est. Basileæ primùm vidi in horto Doctissimi mei Præceptoris Cæli Secundi Curionis. Albam hanc Brassicam habui Geneæ in horto pulchrè virentem Ianuario. D. Dalechampio dicebatur Brassica raposa & *raposa*. Montbelgardi fata in Illust. E. C. V. V. horto prouenit. Obseruavi cum essem apud fontem admirabilem in *wisen steig* in horto Ill. Comitiss.

BRASSICA MONOSPERMOS ANGLICA.

Descriptio **M** Vnere Domini Friderici Meyeri ex Anglia vsque adlata *semina* habeo, brassicæ monospermæ Anglicanæ, alia nuclei Cerasi magnitudine, alia altero tantò maiora, figura utriusque turbinata, & acuminata, & thorulis quibusdam secundum longitudinem donata, vel aliàs tuberculis asperata, colore cinereo.

Locus: De hac Aduers. inquit, locus est oriunda Angliæ maritimis ad Portlandiam Insulam, sed quia inculta, neglecta, hispidior multò, cibo tamen toleranda: cuius semine iam diu Medicus An-

glus hac parte exercitatissimus Turnerus nos donarat, eamque *uolucra* et, & *uolucra*, vocanda à semine singulari uoiebat.

Sunt enim in florum pallentium alborum congerie elegantia, densa, & umbellifera, multis in ramis *siliquæ* breuiores crassiusculæ, quibus singulis singularum inest semen. *Folia* eadem ferme quæ brassicæ nigre, sed crassiora & lætiore aspectu, & fimbriis undulatis plicisque admodum artificiosis.

Lob. & Pena in Aduers. brassica marina siluestris multiflora monospermos. Tabern. icon. & histor. Eng'ish kölsfraut Brassica Anglica.

C. Bauh. phyt. brassica 12. siue Angl. Tab. brassica 38. siue silu. maritima. Lobelio marina.

Hist. Lugd. Brassica marina silu. Monospermos Pena.

Prouenit mihi in horto Ill. E. C. Montbelg. ex semine misso ex Anglia per D. I. Gorgillum Scotum, ubi multis iam annis durat se propagans etiam furculis, folia valdè crassa, quæ interdum rubent: sapor non ingratus.

BRASSICA TOPHOSA.



Tabern. Icon. & Hist. büchel föll Brassica tophosa. Compilatori more suo pessimo sufficit nudam iconem omiſſa descriptione propo- nere. Natalem saltem annotasset, ac ita medium eam inuestigandi rei herbarum studiosis reliquisset, nec se suspectum figuram *et* rum reddidisset.

BRASSICA ANGLICANA MINIMA nueca.

Descriptio **M** Emerunt Aduers. Lobel & Pena, etiam in Anglia horto pusillam brassicellam, totam nuecam, præterquam extremas oras lacini-
fas fimbriatæque plicis crispantibus, & undulis

rugosis, purpureis asperis maculis, quas etiam ad corollas & olfactoriola nec tenda dum tenella adhuc est in hortis colunt.

BRASSICA NIGRA DICTA.

Dodon. Gall. brassica 5. qui ait, sub brassica alba comprehenditur brassica peregrina valde, quae dicitur nigra, *chou noir*. Caulis niger. Ital. *Negre caules*, Belg. *Schwoere foelen*. Lat. brassica 10. nigra cognominata, de qua dubitat an ad brutianum Plinii referenda sit. Figuram ponit Fuchianam, quam olim posuerat pro Crispo, idem facit Hist. Lugd. quae brassicam nigram Dodonæ vocat.



crasso, atropurpureo, ima parte verrucoso: aliis singulo, aliis in ramos diuaticato. Quæ sita fortuito positu stipitata, ex viridi rubentia, aliis sanguineo rubore aut obscuriore etiam tota perfusa, non sine obdactu nebulæ cuiusdam glaucæ: crebro crassarum venarum discursu rugosa, patula, sinuataque. Flores lutei cauli erecto ha-

rent: quos siliqua excipiunt palmates, in quibus semen rotundum. Huius folia patula manent, ac expansa. Hyemem perfert: ac tæpè præsertim culta, arboream acquirunt proceritatem firmitatemque, ac ita in plureis durat annos. Sæpè etiam laterales producit ramulos. Hyeme potissimum culinis expetita, ubi si quis extrinsecus præferat. Ramorum extrema aduentante Vere delicatioribus in acetaria expetuntur.

Trago Lat. & Germ. brassica, foel traüt, brassica latua maior, brassica latua primum genus.

Fuch. Icon. & Hist. brassica 1. genus, brassica lauis: *rela* Germ. breiter aut grosser foel. Gallis *Choux* simpliciter dicta.

H. lun. brassica Cumana, lauis, rubra, *rela* *reidum*: Al. Breiter roter foel. B. Groote roede fol Cloore. Gal. *Chou rouge*.

Dodon. Gall. Brassica rubra prima Catoni, Græcè *rodion*, Plinio brassica Cumana: Gall. *Choux rouge* & *puly*: Germ. Breiter roter foelen/ Belg. Groote roede foelen. Lat. brassica vulgaris latua siue prior. Theoph. *λεωσίδιον*: Plin. vno loco *rela*, alio Cumanam cognominat: eandem & caulodem quosdam vocitare ait: Cato hanc lacuam appellat, vulgò *Rubra Caulis*. Dodonæus Gal. Fuchianam habebat figuram, quam nunc ponit pro brassica minore: pro rubra verdè noquam iconem proponit.

Lobel. & Pena Adu. Brassica laciniosa rubra Cumana vulgarior. Obs. & Icon. pl. brassica vulg. latua, Anglis Keale & Cole: Gal. *Choux verds*, ou *collets*.

Matth. Ger. brassica lauis, Blatt oder Schledys foel fraüt/ rubra.

Hist. Lugd. Brassica rubra prima species, florem ferens altero anno, sicut & caulis capitulatus. Hæchyemis frigidibus rarissè dicitur, gustu aliquantulum amara ac salsa, maxime ubi adoleuerit hiememque attigerit.

Monach. in Mel. brassica siue caulis rubea, siue nigra.

Gesner. de coll. stirp. brassica. Taber. Icon. & Hist. Noter foel, brassica rubra.

C. Bauh. Phyt. brassica 5. siue rubra.

Hort. Lusit. brassica rubra, Brûner foel/ rottet fôl Koemisch foel. Sc. Boly Schaltet / Wodre Zaal.

Copiosè seritur quotannis passim in hortis Locus & vti etiam in horto E.C. Hanc brassicam per ali- tempus

Aaaa

BRASSICA CAPITATA RVERA.

Quod folia attinet alba siuilia quodammodo sūt. At colore magna varietate ludunt. Quædam enim atropurpurea, quædam atroviuentia, aut etiam dilutiùs viuentia: nonnulla quoque castio nebulæ asperu glauca sunt: At omnes rubris costis ac neruis intertexta. In caput quoque coguntur. Flores lutei.



Hyemem fert.

Dodon. Gall. brassica rubra 2. species: brassica Lacuturis, Gal. *Chou cabu rouge*. Belg. Koostens & Koode Sliyt foelen. Lat. in sol. brassica altera species, Brabant. Koostens vocant: Latine Rosaceam brassicam dixeris. Dodonæus pro hac ponit figuram quam olim habebat ex Fuchianis pro alba.

Lobel. & Pena Adu. brassica coiuoluta & occlusa apud Belgas rubro colore enematibus aptior.

Matth. Germ. Tabern. Icon. & hist. & Hort. Lusit. Noter Cappes fraüt, Brassica capitata rubra.

C. Bauh. Phyt. brassica 4. siue capitata rubra.

Hist. Lugd. brassica rubra 2. species.

Brassicam capitatam rubram habui ex Sultz, ex horto D. Clara à Rinack vxoris præfecti, quæ plantata in horto E.C. Môtbelgardi tulit pulchra capita colore rubro vario tincta, potissimum hieme reposita. Hiemem facillè perfert. In Belgio magnus eius prouentus teste Lobelio.

BRASSICA RÛBRA VVLGARIS.

Procerior hæc reliquis esse videtur. *stripire* namque veluti arborefcit alto, duorum, etiam, aut quatuor pedum, aut etiam cubitorum, Tom. II

tiannu

riptio

us & pus.

riptio

quot annos ex femine deciduo in muro è regio ne fenestrarum ædum in quibus moror duran- tem vidi.

BRASSICA CRISPA LACINIOSA

Descriptio



cristarum loco expetitas quodammodo repræsentent. *Cossa* plerumque etiam dilute purpurea sunt, sicut & ipsi caules *stos* luteus. In cibo rubus non inferiores.

Fuch. hist. brassica altera crispa, qua à similitudine Apii *crispæ*, id est, Apiana nuncupatur, vulgò Crispus caulis: Germ. Fraiser Föl: Gal. *Choux crispés*. Icon. p. 2. 234. brassicæ 2. genus.

Dodon. Gall. brassica rubra quattuor species, brassica Sabellica. Neoter. Brassica crispa, Gal. *Chou crispé*, velg. ghecronfelde köl. Et Lat. in fol. Brassica 3. Crispa: Theophr. *κρίσπη* nominat, atque inter brassicas primo loco refert: Catoni 2. est, Plinio Sabellica. Olim figuram Fuchsi proponebat quam nunc pro nigra ponit, & novam exhibet iconem pro Crispa.

Lob. & Pena Adu. Brassica nigra vndantibus crispis & laciniosis foliis: Obs. brassica fimbriata. Icon. plant. p. 247. Non reperit Matth. meminisse Plinium, nec eo vetustiores alios, brassicæ quæ foliis admodum per ambitum laciniatis, minutimque intercisissis assurgit.

C. Bauh. Phyt. Brassica 13. siue foliis laciniatis Fuchsi. Lob. fimbriata. Apud Matth. videtur mihi Frater sub brassica crispa Sabauda tradere varietatem colorum insignem, nostre brassicæ crispe latifolia.

Hist. Lugd. Figuram Fuchsi ponit pro nigra Dodonæ: brassicæ rubra 4. species: Nigram Dodon. vocat Fuchsius brassicam crispam: Gal. *Chou crispé noir*.

Tempus & locus.

Montbelgardi habemus in horto II. E. G. Wirtemb. eam obseruavi cum essem apud Fontem admirabilem in Visensteig in horto II. Comitum.

Brassica crispifolia præstantior est leui, inquit Porta ex Theophrast. quia siccor est, ob id lapidior.

BRASSICA LACINIATA RVBRA.

A Vulgari rubra descripta vix dum magnitudine variat. *Folia* potissimum faciunt differentiam, quæ profundis laciniis sinuatis non nihil

variant, iisdem modò in latiores, modò in minores rufus fectus, vt tota penè crispa videatur: idque potissimum propter minorem laciniarum contentum: rufus quoque *stos* luteus est. *Vascula* & *femen*, vt in reliquis. Hyemem & hæc caule in Montbelgardi in horto III. Ex. C. V. Wittenberg. haud fectus ac vulgaris illa scripta, eoque potissimum tempore mentis expectatur.

BRASSICA LACINIATA ALBA.



Descriptio

R Vbrata cinerea haud multum ab similibus proportione est, non penitus alba, caule interdum purpurescente: cui *folia* pallidè viridatia, glauca quedam nebula obducta sunt. Foliorum quoque laciniæ profundè quidem diuisis, minus tamen crispæ. Feit & hæc hyemem Montbelgardi in horto E. C. estque vt illa flore luteo, sed minus in cibo accepta, vt hortulanus perhibet.

Tabern. Icon & hist. vocatur Föl Fraut 2. brassica 2.

BRASSICA TENVISSIMA LACINIATA.



H Adr. Iun. brassica Apiana Plinii, Sabellica eidem crispa Plinii: *κρίσπη* Nicad. *κρίσπη* Theophr. *κρίσπη* Catoni: *κρίσπη* Athenæo, *κρίσπη* Plin. Al. Krauser Föl. B. Geroucs felde est gehacfelde Foel. Gal. *choux crispus*.

lenis angustifolia.

C. Bauh. phyt. brassica 14. siue Apii folio angustifolia. brassica 15. siue Apii folio latifolia.

Trag. Germ. & Lat. das ander Föl Fraut, cuius tria aut quatuor genera, Fraut Föl. Plinio Apiana aut crispa. brassica crispa seu Alpina, Te tia brassicæ fatiue species, cui folia crispa & per ambitum

tum incisa: in hoc genere quædam frequen-
tioribus & profundioribus, alæ rarioribus &
magis exiguis incisuris dissectæ apparent, ita vt
plura eius fastigia constitutere liceat.

Monach. in Mel. Caules crispi.

Dodon. Gall. brassica; rubra: Græcè *σπινθηρο-
δία*, Lat. brassica Apiana: Belg. ghehactelde Foez
Ien. Gall. *chou à feuille déchiquetée*. Et Lat. in fol.
Brassica quarta foliis fistis. Græcis *σπινθηροδία*;
Latinis Brassica Apiana dicta. Plinius Cris-
pam sic dictam vult à similitudine foliorum
Apii: sunt autem Apii folia haudquaquam cri-
spa, sed in variâs partes dissecta. Icon. plant. pag.
246. Brassica tenuifolia laciniata: Feut. 197.

Camer. hort. brassica Apiana crispâ.

Hist. Lugd. duas habet figuras, vnam sub titu-
lo, brassicæ rubræ; species Dodon. *σπινθηροδία*: al-
teram verò sub brassicâ crispâ Tragi, & brassicâ
tenuifoliâ laciniata Lobelii.

Brassicam habemus Montbelgardi in horto
Ill. EC. V Wirtemberg. tenuissimè dissectam, quæ
hycem perfert.

BRASSICA THYRSOIDES.

Erubrâ brassicæ genere est, patulis ex viridi
atrosubentibus foliis, subinde laciniatis, per
quæ passim lupinâ parte noua crisporum *foliolo-
rum* loboles confurgit, pulchris lemniscis, naturæ
lusu spectando, hinc inde exorientibus, nunc
breui amento tenuique appensis, nunc laciuscu-
lo petiolo hærentibus, atque etiamnum in alia
deinceps sercula struppisque luxuriantibus, *stori-
res, fistigata, semineque* ad brassicam rubram vulgari-
torem accedunt.

Taber. Icon. & hist. Büschel fôl frâut, brassica
prolifera. Item Büschel frâus fôl/ brassica proli-
fera.

Mira est 6. brassicæ species Hist. Lugdunensis,
quam Asparagodem esse herbarii censent, cuius
mentio fit in Geoponicis Cassiani Constantino
attributis. *Caulis & radix* eadem quæ in cæteris
brassicæ generibus. *Folia* nunc sunt laciniata, &
frequentissimis diuisuris incisa, & qualia brassicæ,
crispæ, nunc planè lata, & expansa. Eadem non-
nunquam tota virent, nonnunquam venis per
ipla folia dispersis, & media costa rubent. Huic
verò id peculiare est & insignis, quod ex foliis ra-
mulis multi breues, torosi, foliosi nascuntur, flo-
rentes suo tempore, & semen edentes, non ali-
ter quàm in reliquis plantis, ex caule, vel stipite,
quorum ramulorum cùm asparagis similitudo
fecit, vt hanc brassicam asparagodem Græci vo-
cauerint. Hi tenelli asparagi in iure aliquo pin-
gui, vt Capi, aut Verucine eduntur.

Casp. Bauhin. phyt. brassica io. siue ex cu-
ius foliis ramuli nascuntur. Dalechamp. Aspara-
godes. brassica n. siue Asparagodes crispâ. Ta-
bert. crispâ prolifera. Vnam tenemus esse
plantam, non duas.

Vidi in horto Admirabilis Fontis, & in *Bir-
chen* vrbe V Wirtembergica in horto D. I. Lutz
Pharmacop. dicitur *Federfôl/* satis ampla
mihi prouenit Montbelgardi in horto Illustr.
E. C. V Wirtemberg.

BRASSICA RVBRA MINOR.

Brassicæ tertia propriè vocatur Crambe à
Fuchsi in hist. minoribus *caulibus*, & te-

nuioribus *foliis*: flore luteo; Germ. *kleiner fôl*
vt ab aliis discernatur, nominari potest. Gall.
choux rouges. Icon. p. 235. brassicæ tertium ge-
nus.



Dodon. Gall.
brassicæ rubræ
quinta species
minor. Germ.
Kleiner Fôlen.
Gal. *petit chou*.
Belg. *Sdooren*;
Catonii propriè
choux. Omnium
minima silue-
stri penè simi-
lis, foliis primæ
rubræ, multo
minoribus, a-
lioqui omnino
similis, feritur
propter semen;
ex quo oleum
paratur, quod
venditur pro
Napi seminis

oleo. Dod. Gall. figuram non habet, sed eam pro
siluestri posuit ex Fuchsi. Dodo. Lat. brassica
5. minor natura sua siluestris: idcirco nec in ciuita-
tu desiderata: seminis autem causa præcipuè
feritur, ex quo subinde non exiguus quantus ac-
cedit. Hæc est Veteribus; quam Plinius propriè
choux dici affirmat. Pro hæc in hist. Lat. ponit I-
conem à Fuchsi positam pro brassicâ 1.

C. Bauh. phyt. brassica 17. siue siluest. Trago;
Sylt. Fuchsi.

Hist. Lugd. Postremum brassicæ rubræ genus
Dodonæi. brassica siluest. Item Brassica agræstis
choux de yebla, cui planè similis est tertia brassicæ
fatiuæ species Fuchsi. Figure ambæ sunt valdè
similes.

Trago Germ. Crambe vulgaris *Raichwals*
fôl frâut/der 4. fôl. Lat. brassica silu. foliis vulgari
fatiuæ penè consimilibus, sed magis exiguis &
asperioribus, gustuque amarioribus. Brassicæ
vulgaris seu siluestris.

BRASSICA SILVESTRIS.

Brassicæ trifariam dari digestionem superius
dictum est. In *Satiuam* quippe, *siluestrem*, &
Marinam. Et quia de Satiua hæcenus actum est;
sequitur vt Siluestris tractationem suscipiamus.

Siluestri, in sit Theophr. plant. hist. lib. 7. cap. 4.
solum leue, sed paruum atque rotundum. Hæc
ramis foliisque permultis condita est: adhæc
succum aspicuum & instar medicamenti habet,
quamobrem eo Medici ad aluum purgandam se-
pè vtuntur. Et rursus cap. 6. Nunc de siluestri, seu
ea quam aruensem vocamus, pariter indicare
tentandum est. Hæc aspectu vicina vrbæ est;
præterquàm quòd foliis minoribus, caulibusque
scabrioribus constat, & succo (quia sicior) po-
tissimum acriori, vehementiorique conditur;
caules sortitur rotundiores, leuioreque quàm
fatiuæ: & foliorum appendicem illa lata, hæc hæ-
bet rotundior, vt folium ipsum minus angu-
latum: nam cæterâ quidem scabrior tum cauli-
bus, tum foliis constat.

Brassicam siluestrem fatiuæ similem scribit
quoque Diosc. sed candidiorem, hirsutiorem &
amaram.

Celebrauit & siluestrem brassicam siue Erraticam Plinius. Hanc, inquit, alii Petream [quia in maritimis præruptis nascitur, Diosc.] vocant, inimicissimam vino, quam præcipuè Vitis fugiat, aut si non possit fugere, moriatur. Folia habet bina, parua, rotunda, læuia: plantis oleris similior, candidior satiuæ & hirsutior. Sed Plinius hinc vt notat Dalech. Marinæ & siluestris historiam confundit. Folia rotunda, parua, læuia marinæ sunt. Nemo bina esse tradit. Res ipsæ saltem hoc esse monstrat. Similitudo cum brassica hortensis, folia candidiora, & hirsutiora quàm in satiuæ, & (quod ait Diosc.) amara, siluestris brassicæ sunt. Videtur ramen Cæsalpino Plinius potius interpretandus, quàm confusionis hoc in loco arguendus. Ita namque scribit. Syluestris brassica spontè nascens, gustui ingrata, in maritimis asperis, qualis in scopulis illuc nascitur, foliis est ex candido purpurascens, similis satiuæ purpureæ, tanrùm minor, nec hirsuta, vt Dioscoridis. Hanc Plinius Petream vocat, eique folia bina tribuit, per quæ binas foliorum appendices rotundas intelligit. Theophrastus, vt ex eius verbis colligere licet, hirsutiem negat. Describit alibi Brassicam silv. Plinius, Theophrastum imitatus. Tertius, inquit, propriè Crambe vocatur, tenuioribus foliis, & simplicibus, densissimisque sed efficacissima. Albi Raphanum vocat, cum inquit, Græci tria genera fecerit foliorum differentia, crispi, læuis, tertium siluestre: nam sic Theophr. Græcè vocat quam Diosc. Cramben, & Læui Brassicam. Sed vt nostram hac de re dicamus sententiam. Theophrastum & Plinium nomine Raphani & Brassicæ siluestris, mantimam descripsisse Brassicam existimamus, vt loco dicetur loco.

Brassica siluestris traditur à Matth. in Diosc. foliis domesticæ similibus, sed Hyofcyami modo hirsutis, amaro acinuosu gustu.

Syluestris Dioscoridi nuncupata brassica, satiuarum minori quinto loco descripta [brassicæ nostræ rubræ minor] similis esset, ait Dodonæus, nisi hirsutior, albidior, ac sapore amarior foret: folia siquidem, flores, siliquæque satis respondent. *Subnomen à Diosc. Græcè dicitur à quibusdā Hamilridia: Lat. brassica sylu. & brassica rustica: Gal. Chou sauvage ou rustique. Germ. Zee solen: & Wilde zee solen: à Neotericis Caulis brassica marina, differens tamen à brassica illa, quam Diosc. hoc nomine inscribit, & Recentiores Soldanellam appellant, de qua suo loco. Assumit autem pro brassica silu. Dioscor. Dodonæus figuram, quam pro tertia, vel minore exhibuit Fuchsius.*

Tabern. Icon. & hist. Wilde foel, brassicam silu. vocat. Nullam autem ponit descriptionem, suspicor factam figuram ad Lobel. in Adu. Brassicam monospermon.

Locus. Nasci autem hanc in maritimis præruptis Dioscorides tradit: reperitur verò ait Dodon. & in multis Zelandiæ altionibus tumulis iuxta mare. In maritimis Sereñsibus, Argentario promontorio, aliisque cum Tyrtheni, tum Adriatici littoribus frequens nascitur. Hanc non longè à Tetracina vrbe, vbi quæritur Neapolim plurimam vidit Matth.

Vires Huius cyma, inquit Diosc. in lixiuio cocta ori non est insuavis. Illa verò folia vulneta conglutinandi, ac tumores inflammationesque discutienti vim habent. Brassica, autore Catone, certam maximam vim habet, eam arefacere, conterereque oportet hènè minutim. Si quem voles purgare, pridè ne cœnet, & manè ieiunio dato

brassicæ trita, decoctæque aquæ cyathos quatuor, nulla res tam benè purgabit, neque helleborum neque scamoneum, & sine periculo, & cito salubrem esse corpori. Quos diffidas sanos facere, facies. Qui hac purgatione purgandus erit, sic eum curato. Sorbitione liquida hoc per dies 7 dato, vbi esse volet, carnen assam dato. Si esse non volet, dato brassicam coctam, & panem, & bibat vinum lene dilutum, lauet tardò, vtatur vocatione: qui sic purgatus erit, diutina valetudine vteatur, neque vllus veniet morbus nisi sua culpa. Et si quis hunc tetrum, vel recens habebit, hanc brassicam erraticam aqua inspergito, apponito, sanum facies. Et si fistula erit, turundam intrò trudito, si turundam non recipit, diluito, succum exprimito, eum in vesicam indito, vesicæ calammum alligato & ita premito, vt in fistulam succus introeat. Ea res sanum faciet citò. Et ad omnia vetera vlcera, & noua, contritam cum melle apponito, sanum faciet. Et si polyypus in naso intraverit, brassicam erraticam aridam tritam in malum conuicito, & ad nasum admoueto. Ita subducto sursum animam quam plurimum poteris, triduo polyypus excidet, & vbi exciderit, tum aliquot dies idem facito, vt radices polyypi petasanas facias. Auribus si parum audies, terito cum vino Brassicam, succum exprimito, in aure in triduo tepidum instillato, citò intelliges te plus audire. Deinde impetiginis parçè brassicam apponito, sanam faciet, & vlcus non faciet.

Brassicæ silu. siue erraticæ, inquit Plinius, immenso plus effectus laudar Catò, adeò vt aridæ quoque farinam in olisitione collectam, vel odore tantum naribus tacta, vitæ earum graecolentiamque sanare affirmet. Hanc irrationibus medicis, melancholicis quoque ac vlcerebus recentibus, cum melle ita ne soluantur ante diem: strumis, fistulis, in aqua contritam, Chryssippus autor est. Et alii verò compefcere mala corporis quæ serpant: nomas vocant. Item excrecentia absumete. Cicatnes ad planum redigere. Oris hulecra & tonsillas manducant & coctam succo garganzato cum melle tollere. Item ploras & lepras veteres ipsius tribus partibus cum duabus aluminis in aceto acti illitis. Epicharmus satis esse eam contra canis rabiosi morsum imponi. Melius si cum lasere, & aceto acti. Necari quoque canes ea, si detur, ex carne. Semen eius tostum auxiliatur contra serpentes, fungorumque venena, tauri sanguinem. Folia cocta splenicis [splenicis c. h.] in cibo data, & cruda illita cum sulphure & nitro profunt. Item mammaram duritiæ. Radicum cinis vix in faucibus tumentis tactu medetur: & patotidas cum melle illitus reprimat: serpentium morsus sanat.

Brassica agrestis, vt notat Galenus, quodammodò calidior, siciorque est quàm domestica: ceu alia propemodum omnia agrestia sui generis domesticis vtraque facultate valentiora sunt. Quamobrem neque intra corpus citra noxam sumitur, vt quæ longius ab humana recesserit temperatura. Eadem de causa & gustantibus amarior est quàm domestica: quamquam domestica quoque acrimoniæ non nihil & amaritudinis contineat: sed vtramque agrestis habet validam: quæ etiam extergit, & digerit, quàm domestica valentius.

Est, ait Dodonæus, brassica siluestris calida, & quia amara, extergens quoque.

ACHANACA INDORVM BRASSICÆ foliis.

in has spinas de hisse, cum in summitate nullâ conſpiciantur.

criptio



Huius fo-
lia bifur-
cata & acumi-
nata sunt, Brâ-
ficæ amplioris
foliisſimilima,
ſed non ita
crâſſa, & te-
nuiore coſta, in
horum medio
fructus naſci-
tur oui magni-
tudine, colore
luteo, quem
Alfatd nuncu-
pant, alii Le-
ſachy, rominè
ſerpentis con-
coloris. Fru-
ctus is magno
apud eos eſt
in pretio. Tota

planta tibie hominis craſſitudine.

Hift. Lugd. Achanaca Theueti.

C. Bauh. phyt. Braſſica 19. ſive Braſſicæ folia petegrina.

In regnis Mely & Tombotu ad fluvium Se-
nega ſitis, Medici, *Biſſains* appellati, aduerſus
morbum, qui illic frequentius graſſatur, *Boro-zail*
nominatus, aut *Zail* Æthiopum lingua, qui ex
immodica Venere, cui multum obnoxii ſunt, or-
tum habet, herbe Achanacæ diſtæ decocto, vt
reſert Theuerus, poſſimum vtuntur. Morbus
autem is genitales partes plurimum occupat,
quæ in homine *Aſab*, in ſemina *Aſſabat* nomi-
nantur.

Braſſica folio Nymphae Caiou-a.

Vidi, inquit Leri hiſt. Amer. cap. 77. Braſſicæ
genus, quod ſilueſtres homines vocant *Ca-
iou-a*, quo in iuſculis interdum vtuntur: folia
ſunt ei lata & parè Nymphae ſimilia.

BRASSICA SPINOSA.

ptio



Eſt hæc C.
Bauh. Phyt.
Braſſica 16. [apud
Matth. 6.] ſive
ſpinosa, quam
cum integram
Patau in horto
Cl. Bemb non
viderit, eam vſ-
que dum integra
offeratur, ſic de-
ſcribit. Ramulus
eſt ſine foliis, aut
ſaltem obſcuris
prope caulis e-
xortum, in ſum-
mo caulis ſaſti-
gio ſpiræ tenues,
cauli concolores
digni articuli lō-
gitudine, ita vt
videantur folia

Tom. II

PERFOLIATA SILIQVOSA.



Eſquicubi-
talis & al-
tior eſt, caule
tereti, tenui, &
in alas diuiſo,
ex foliorum ſi-
nu prodeun-
tes: folia non
diuiſa, oblon-
ga, ſubrotunda,
Napi, colore
glauco, rigida-
la, pingua, fra-
gilia à caule vi-
dentur quâſi
tranſadigi, ſa-
pore oleraceo:
flores exalbidi,
Braſſicæ: ſili-
quæ perquam
longæ, angulo-
ſæ ſemen conti-
nent, Radix te-
nuis, alba, guſtû
Braſſicæ.

Deſcripſit



Trago Germ.
& Lat. perfolia-
ta altera, deſ-
ander durch
ivaçs. Et hæc,
ait i, hauddu-
biè ſecundum
Dioſcor. Co-
tyledon, ſed
vt Marcell.
vocat, Acetabu-
lum, aut Vmbi-
bicus Veneris;
[ſrâwers nabel]
& quorundam
Cymbalion:
Sed ego nun-
quam hæc ad-
miſerim cum

Trago pro Umbilico Venetis, Cotyledonève.

Braſſicæ agreſtis ſpecies alia [ſic enim propoſi-
tam à nobis plantam inſcribit Cordus, & ex eo
H. Lugd.] cubitalem habet caulem, teretem, gla-
brum, aliquantulum concavum, & in ramulos
diuiſum: folia ex intervallo ſingula proſert ſecus
ramulorum eruptiones, trium aut quatuor vicia-
rum longitudine, paulò anguſtiora, ſubrotunda,
glabra, & Braſſicæ modo carnoſa (in repetitione
verborum Cordi in Hiſt. Lugd. malè ſcribitur
corroſa.) flores Veris exitu candidos & oblongos
fert, quibus ſingulæ ſuccedunt ſilicula, digito lon-
giores, anguſtæ, & quadrangulares, oblongo, ni-
groque ſemine plenæ. Radice nititur exigua, li-
gnoſa, ſemelſtri & inutili. Folia Braſſicam guſtu
imitantur: ſemen verd amariuſ eſt, & aliquan-
tulum acre. Naſcitur pinguibſ aruis, lento &
glutinolo ſolo.

Dicitur autem Cordo Braſſicæ agreſtis ſpecies
alia, quia iam antè lib. l. c. 31. alterius meminir, de
qua paulò poſt, ſub Glaſſifolia Cichoroide, ſiue
Turriti 2. Cluſii.

H. A. Ined.
not.
Flos Ciliat.
dui

Hist. Lugd.
nat.

Brassica ca-
pensis.

Locus &
tempus.
Colleson
Hisp.

Et licet coeetur Hist. Lugd. Clusii Brassicam campestrem i. diuersam facere à Brassica agrestis specie alia Cordi, cum ait Clusius aliam pingit & descripsit: Id tamen contra mentem Clusii tentat, cuius verba hæc sunt, Brassica campestris [addit in post. Hist. flore albo] pedales habet caules, candidantes, rotundos, aliquot ramis præditos: folia ex interuallis, Perfoliatæ foliis non valde dissimilia, albicantia, & colore ferè Brassicæ vluialis: caulem sic amplectentia, vt tenellæ plantæ ad Perfoliatam plurimum accedant, gustu seruido: ramulos è lateribus prodeuntes, sustinentes flores aliquot albos, Brassicæ floribus similes, deinde cornicula longa, quadrangula, in quibus continetur semen Brassicæ semini minus, ex rufo fuscum: ita nuncupauit hanc & sequentem, tum quia in agris & campestribus nascentes cõspiciebam & mense Martio florentes, in Murciano agro, iuxta vias ad Eliocretam urbem vulgò Lorea dictam, vbi Martio florebat: tum quia quid Murciani *Colleion* appellabant, id est Brassiculas. Cordus hanc primam speciem non ignorauit: nam Brassicam Campestrem vocat, quam verisimile est apud suos in agris nascentem obseruasse, ac propterea agrestis nomen indidisse: non desunt qui Brassicam semine quadrangulo vocent ineptè: à corniculo potius, in quo semen, nam semen quadrangulum non est. Sed & hoc genus spontè crescens obseruabam magna copia in auiis Viennensis agri. Maio florens.

Plant. Icon. p. 396. Perfoliata Napifolia Anglorum siliquosa. Lob. 215. Teut. 432.

Taber. Icon. & hist. Perfoliata napifolia *Quercus* mit *Stodt* rüben.

Dodon. Brassica silv. perfoliata, quam alteram campestrem Brassicam nominant: nonnulli etiam montanam, vel perfoliatam. Huius etiam meminuit Camer. apud Thal. quando inquit: In auiis Thuringiæ non admodum diuersa Brassica silv. folio peræ Thalii nascitur, quæ cum Brassica campestri descripta à Clusio in Hisp. obseruationibus planè congruit.

Hort. Lusit. Brassica campestris Clusii. H. Perfoliata siliquosa, *Wilder Föl*.

A me fata in horto Ill. E. C. quotannis se renouat semine deciduo, eodemque maturo Augusto. Spontanæam magnam obseruauit in segetum agris: Ducatus Vvirtemb. circa Marbach, vbi Romanorum olim erant limites, mense Iunio florentem cum siliquis longis.

Eius acrimonia proximè ad Brassicæ facultates hanc plantam accedere indicio est, autore Clusio, & illà valentiorē forsitan esse. De huius facultatibus competum nihil habet Dodonæus, à nemine enim in cibum admittitur.

Perfoliata siliquosa purpurea Clusio.

Fl. minoribus est *virgis*, nec ad eò ramosis, cuius folia in summo aliquantulum serrata, reliquis notis à Prioris foliis non differunt, & fernido sunt etiam gustu: flores Prioris floribus similes, maiores tamen, Leucoii aut Hesperidis floribus magnitudine pares, colore autem Lunatiz græcæ flori, purpureo videlicet: *cornicula* succedentia prioribus familia & simile *semen* continentia. *Radix*, licet dura fibrisque quibusdam prædita sit, viuax tamen non est, sed prolato semine perire solet.

Clus. Hispan. & ex eo Hist. Lugd. Brassicæ campestris aliud genus, siue secundum. Hist. verò

post. Brassica campestris 2. flore purpureo.

Brassica silv. maior latifolia Thalio.

Radicibus constat inutilibus, lignosis, candidis: caule, sicut palmari, non admodum recto, rotundo, simplici, nonnunquam etiam brachiato, foliis mollibus, læuibus, subflauis, integris, sine incisuris aut sinuosis crispatis, mucronatis, duas vncias longis, vnciam latis. In summitate in exiguis pediculis racemus florum candidorum existit, ex oblongis vasculis Brassicarum satiatum modo prominentium: quibus deperditis siliquæ oblongæ pronascuntur, *semina* Brassicæ latius minora continentes.

C. Bauh. Phyt. Brassica 25. siue sily. maior latifolia Thalio.

Turritis vulgarior.

Nasurtio siluestri adiungitur planta, quæ Turritis vocatur: inquit Taberna, radice fibrosa, vt in Plantagine videre est: Ima ipsius siliquæ per terram hinc inde sparsæ iacent, Saluæ foliis confimilia: ex radice caules aliquot rotundi, exiguis, acuminatis que, & læuibus foliis donati, emergunt, quæ acetosæ foliis comparati possunt, in summitate caulium, multa exigua tenellaque foliola conueniunt, sicuti in [Saubertio] Hippuride, quæ velut ex aristis composita sunt. In caulis culmine exigui *stipuli* sunt conspicui, qui si deciderint, tenellæ acuminatæque residuæ manent capsulæ [stipulin]. Cur autem hæc planta Iberidibus annumerata fuerit planè me fugit, nisi fortè ob acrem ipsius gustum contigerit. Confaricator credidit se hinc demonstrare valde induratum, cum tamen ex icone, malè considerata, malè fingat descriptionem. Ex sticulis enim fingit perulas siue capsulas, ac ex siliquis facit folia quod facillè est animaduertere ex sequenti Clusiana descriptione.

Sic autem Clus. de Turrita vulgariori. Drabæ 2. & tertiæ congenet videtur planta illa, quæ vulgò apud eos qui stirpium cognitiõ & studio delectantur Turritæ nomen obtinet, ab extremorum caulium forma, qui in metæ aut pyramidis effigiem desinunt: habet verò prima, quæ & frequentior & vulgarior, conferta circa radicem folia, binas vncias longa, succulenta, hirta, & aspera, saturatiore colore viridi prædita: inter quæ pedales, aliquando etiam cubitales promittunt caules quos inordinata ambiunt folia, circa pediculum latiora, deinde in mucronem desinentia, succulenta & hirta: summo caule confertum nascuntur multi exigui flores, quatuor foliolis albis constantes: quibus discussis, alii apparent. caulis fastigio sensim, veluti in metæ formam, se attollente, vt tandem frequentibus longiusculis corniculis cinctum conspiciatur, quæ pusillum, rufum, acre semen continent: radix illi alba, multis fibris prædita, quam tamen viuacem esse non puto.

Tabern. Icon. & hist. Gerardo & Icon. pl. p. 220. Turritis. Teuton. 262. Turritia. vulgarior.

Spontè prouenit in plerisque Austris collibus lapidosis & salebrosis. Floret Maio, semen maturum est Iulio.

GLASTIFOLIA CICHOROIDES IOH.

Bauhini: & Turritis secunda Clusio.

Radice est annua medio criter crassa, alba, nonnihil purpurascens, fibrosa, subacris: *folia*, *gemma*:

Tabern.
darg.

Turritia

Descriptio

germinatione prima antequam caulem proferat partim laciniata; Cichorei vulgaris instar, vel Hieracii, alia nullo modo incisa, glauca, Matidis foliis similia, palmo saepe longiora semunciam lata lanuginosa, sapore acris & amaro: adulta & quae in caulibus sunt integra nulla diuisura incisa, glabra, vtrinque glauca, oblonga, ita pinnis alarum coeuntia, vt à caule perforari videantur, sapore Brassicae vulgaris. *Caulis* cubitalis, & bicubitalis, tenuis, colore herbaeco, admista aliqua purpura, multis ramis longis tenuibusque brachiatis: ex alis & summis ramis flores prodeunt multi simul iuncti ex pediculis semuncialibus, ex luteo in albidum languentes, odore nullo manifesto, quaternis foliis constantes, quae totidem foris circumstant, sed longè minora & virefcentia, mucronataque, cum illa subrotunda sint, in medio crocata stamina multa, cum stilò viridi. Succedunt tandem *Siliquae* longae, rectae, graciles, in quibus semen.

An Cordo hist. Plant. Brassica silv. virgata: 5. Si tamen nostram plantam intelligit, omisit in sua descriptione folia inferiora Cichorio similia.

An Thalia Harcyn. Brassica syluestris longifolia?

Huic fistilis est, ait Camer. in addit. Thalii, si non eadem, quae in Thuringia salubus locis æditis passim nascitur ab incolis Schoßkraut vocata, quæ tamen voce alibi alia planta appellatur.

An Clus. Hist. post. Turritis maior siue altera? Rarius, inquit, inuenitur prior, & vmbra magis delectari videtur, quare facilis in cæuis siluis quam apertis collibus (quibus prior gaudet) nascitur. Floret Aprilis & Maio. Huic valdè similis (nisi eadè sit) nata Jacobo Plateau, semine nescio vnde accepto. Illius ad me iconem etiam cum variis aliis mittebat. Non videtur ab similibus Brassicae virgatae Cordi. Describit & hanc Hist. Lugd. ac depingit sub inscriptione Sinapi albi. Hæc autem sunt eius verba: In asperis & saxosis hoc Sinapi adolescit, radice dura & solida, candida, brachiata, & nonnihil fibrosa, foliis proximè radicem in orbem sparsis, multis infectis Cichorii modo, adulto caule perennibus, & exarescentibus, in caule numerosis, læuibus, crassis, in cuspidè mucronatis, quæ caulem attingunt lunatis, caule cubitali, nonnunquam altiore, rotundo, infernè rubente, in ramulos multos supernè diuiso, flosculis multis scatentes, candidis, quibus succedunt graciles & prælongæ siliquæ, multo femine gratidæ, acris & seruidi gustus, eleganti specie siliquarum tanquam vallo quodam circa caulem & furculos erectarum: Floret Maio mense. Quidam Thalapsoos, alii Draba genus esse uolunt. Placet descriptio Hist. Lugd. quamuis in floribus colore nonnihil differat: ac Icon, licet folia inferiora quodammodò Cichorio accedentia habeat, nihilominus melior est nostræ emptitiâ.

An Iacob. Theod. Tabern. hanc intelligit per Vaccariam, suam par. 2. p. 298. *Rubblumen/ Ein art Marien rôßlin*. Icon Tabern. malè reponitur inter Lychnides, malè etiam dicitur German. *Marien rôßlin*, quandoquidem nihil habet cum iis commune: sunt enim huic siliquæ longæ & flores minimi, vt demonstrat eius icon, an sit autem nostra planta asserere non ausim, folia Cichorii inferiora appicta non habet quæ respondeant nostræ planta.

C. Bauh. Phyt. Brassica 20. siue silv. foliis circa radicem Cichorii modo insertis. Cordo Brassica silv. virgata, Sinapi album Lugdun.

Glastifolia mea Cichorioides abundat Mont-

belgardi in Horto Ill. E. C. Vvirtemb. spontanea florens Aprilis, & siliquas habens Iunio: tota hieme viret cum foliis Cichorii. Gargillus obseruauit circa Basileam in fabuletis ad Rhenum itinere Grentzachiano.

TVRRITIS PVLCHRA NOVA.



Caulis furcatus. Descripitiô

git tricubitali, striato, hilari virore perfuso, subhirtuto: foliorum inferiorum quædam tres uncias longa, angusta, circumquaque integra, pediculo longo, aliâ longiora, quatuor aut quinque uncias colligentia, pediculû versus profundiusculè incisa: at enim quæ per caulem conspiciuntur latiora & breuiora sunt, sextantaliâ circiter, caulem pinnulis complexa, Myagri foliis aliquatenus similia, sapore nullo euidente. Color omnium viridis, porro ex foliis vniuersiuiusque per caulem, cubitali serie sursum versus, ramulus prodit, vt in Glastifolia Cichoroidè nostra, cuius extremum occupant conteri flosculi exiles, foliolis oblongis albis constantes, fatuo sapore. Succedunt siliquæ longæ.

Hanc Argentina in hortu Dj. Friderici Meyeri florentem collegimus mense Maio, qui Turritium pulchram nouam denominabat.

Locus & Tempus

BRASSICA SILVESTRIS PRO-cera Thalia.

Hæc radice sulcitur multica, candida, lignosa. Descripitiô

sa, iuxta cuius caput in terra reclinantur folia quincunciali saepe longitudine, vnciali latitudine, hispida, integra, caulem crigit vnicum, plerumque saepe etiam in duos tresve aut plures alios iuxta radicem diuisum, bicubitalem, rectum teretem, flexibilem, iuxta radicem etiam parum hispidum, deinde tota reliqua parte læuè: cui folia appenduntur sextantali longitudine, vnciali latitudine, subcinerea, læuè, non hispida, vt priora, mucronata: quibus cessantibus, postea longo ordine, caule videlicet subinde procerius exrescente, in singularibus exiguis pediculis flosculi parui, candiduli protenduntur, iisque euanescentibus subnascuntur siliquæ ad latera compressæ, tenues, digiti longitudine, quibus numerosa semina paruaque continentur. Ex foliorum autem singulis alis non infrequenter noua adnata progrediuntur, & ipsa copiosos flores ac siliquas proferentia. Nascitur montibus apricis ac locis caduis, estque sapore amaro.

C. Bauh. phyt. brassica 21. siue silv. foliis circa radicem integris & hispidis, Thalia silv. proccera.

C. Bauh.

Lobel. Turritis. Aliquando & huius folia ad radicem, Cichorii instar, inserta sunt. An Turritis eadem sit cum Thalii brassica, vt vult Frater, adhuc dubius sum, de Turritis secunda dicit Clusius folia nonnihil crispâ & sinuosa, non tamen ait Cichorii instar inserta, de prima nihil etiam tale dicit, nec icon demonstrat: tamen, vt verum fatear, Turritim secundam malim referre ad Thalii Brassicam siluestrem longifoliam.

Brassica silv. foliis membranaceis Thalia.

IN Ienensibus montibus aliquoties, hanc obseruauit Thalius: iam verò dictis minor est, radice parua, candida, superuacanea, caule breui, geniculato, qui densè ambitur suis foliis, quæ membranaceæ sunt substantiæ, subtilia, & splendentia, læuia, vncias duas longa, vnam lata.

C. Bauh. Phyt. Brassica 22. siue silv. foliis membranaceis Thalia.

Brassica silv. folio Beta Thalia.

Descriptio

NAscitur hæc, inquit autor noster, copiosè in Hainleitta sylua non procul à Sondershusio sub sagineto. Radice constat lignosa, multifida, fibrosa que: folia betæ, rotundiori ambitu in tertæ superficie multa disperguntur, plumbei fulciue coloris, læuia, durioris membranæ instar, sextantalia, caules eriguntur teretes, selquipedales, splendentes, sulci, pauca, oblongiuscula, ac mucronata folia continentes, floresque candidos proferentes, exiguos, sed siliquas longiores cæteris speciebus.

Brassica silv. media Thalia.

Descriptio

BEuiores continet folia, numerosa circa radicem, vncialia, oblongiuscula, in obtusum mucronem sinientia, mollia, femuncialia latitudine: quæ cauli appenduntur dorstanti, ea parte quæ adhaerent vtrinque velut alares pinnulas prominentes habent.

C. Bauh. Phyt. Brassica 23. siue silv. media Thalia.

Brassica silv. minor Thalia.

FOLIOLIS multè minoribus, canis, coliculis quadrantalibus, siliculis angustis paruisque, Thal.

C. Bauh. Phyt. Brassica 24. siue siluestris minor Thalia.

RAPVMSATIVVM ROTVNDVM
& oblongum.

C A P. II.

Descriptio

RApis folia per terram sparguntur ampla, ad Brassicæ rubræ folia quodammodò accedentia, attouitenta, aspera, & ad costam vsque ferè laciniata, saporis holeracici: flores lutei: semen in siliquis rufum, rotundum, Brassicæ proximum: radix tessilis in ventrem amplissimum, capiti humano interdum paulò minorem extuberrat, tenuem fibram alimentum futuram demittens, aliàs pugillari par, aut etiam suppar, quibus vtrisque caro candida, firma satis, sapore acri, magis minuscule vegeto prædita: est etiam vnam genus longa crassa radice, non in ven-



trem extuberans.

Rapum
tam Veteres
scribunt.

quam Recentiores duo prima constituunt genera Satium & siluestre. Theophrasti quidem verba de Rapo satiuo hæc sunt. Rapum (ραπὸν) alii esse, alii non esse diuersitatem generis putant, sed mare tantum, feminamque differre, nasciq; ambas

ex eodè semine: sed vt effamineatur, raras deponere oportere: nam si densè positæ sint, omnes masculifecere. Quod idem futurum sit in terra vitiosa feratur. Quæ de caula semine satas plantas transferentes deponere. Semen quoque deterius, meliusve visu percipi posse: quod enim probum sit, tepere sentiri, quod vitiosum, crasum. Gaudere & frigidibus Rapam, & sic eam dulcescere putari, simulque incrementum in radicem, non in folia verti. Austrius atque serenit temporibus celeriter caulescere.

Plinius Theophrasti sententiam repetit his verbis. Raporum genera Græci duo prima fecere, masculinū nq; & ea ferendi modo, ex eodem semine. Deniore enim satas masculifecere, item in terra difficili, semen præstantius quò subtilius. Species verò aut in latitudine fundi, aut in rotunditatem gloriari: tertiam speciem siluestrem appellauere. Sed de Rapis &c. abundè dixisse poterat videri Plinius, nisi Medici masculini sexus facerent in his rotunda: latiora verò & concava feminini. Præstantiora suauitate & ad condiendum faciliora, quæ sæpius lata transeunt in marem.

Quod verò Galenus inter Rapum, quod ραπὸν est, & Napum qui κομὰς, non distinxerit, factum putat Cornarius, quòd Theophrast. (vt apud Athenæum habetur) βυνίδα non nominet, matem quidem vocet quoddam Rapum, & fortassis hoc βυνίς sit. Galeni verba hæc sunt. Sive ραπὸν vocare volueris, siue κομὰς hanc plantam, oleraceum in ipsa est id, quod è terra eminet, quod verò in terra continetur, radix. Rapi porò satiuū duplex esse genus planum fecit Nicander lib. 2. Georg. apud Athenæum:

Rapi, aduerte animum, genus duplex est, vt & Radicula:

Oblongum alterum, alterum rotundum, in aris hortorum conspiciuntur.

Dioscorides reedè distinxit Rapum, & nostris, inquit Cornar. adhuc hodie vtrumque agnoscent ac habent, latum & rotundum.

Tragus Rapa depingit & describit, dicens, Rapum vulgare cum oblonga figura masculinum, cum rotunda femininum ex vno & eodem semine gignuntur.

Ex Theophrasti colligere est, inquit Turnerus, Rapum satiuum 1. insigniter magnum esse feminam, alterum verò siue longius & frigidius,

sius, quod Plinius ait in latum crescere Marem. Rapum maius, orbiculatum seu turbinatum, Aduerfariorū variat radice terete atque rotunda, oblongiore, & Napo similiore effigie, sed maiore triplō. Hæc eadem, aut certè simillima Venetis olitoribus vānum fertur in forum. Hyeme purpura nitida & pellucida radice, gustu teneriore, suauiore, in acetariis cruda cum Eruca, Lactuca & aliis illic esitari solita.

Lob. Obs. p. 93. & Icon. plant. p. 197. Teut. 235. figuram habet Matthioli figuræ similem. Item aliam ex Matthioli cui titulus, Rapum cereti rotunda oblongaque radice, Aduerf. p. 66.

Tabern. Icon. & hist. Rapum orbiculatum, Scheibe rübe. Rapum orbiculatum minus, Flein Scheiben Klappen, Flein Scheiben rüben. Rapū longum, lang rüben. Rapum longum minus lang Stoppfel rüblin.

Gerard. i. Rapum maius Great Turnepe. Item Rapum minus, Smal Turnepe, Icones habet Tabern.

Sic & Cæsalpinus inquit, Rapæ quædam sessili rotunditate constant inuicendiores : quadam in rotunditate oblongæ sunt : aut color omnibus candidus. Theophrasto mas & femina. Plinius Græcos secutus duo prima genera fecit masculum & feminam.

Contra communē sententiam decernit Matth. dicens : Rapum satium in triplici differentia, sessile, longum, & rotundum : tamen Plin. literis mandauerit longum erraticum esse. Quædam colore purpurea. Matthiolum autem tunc non animaduertisse quid astrueret manifestum sit ex eius post. com. cum magnis fig. Lat. & Ital. Item. hist. Germ. quibus in editionibus Rapæ duo tantum commemorat, Rapum rotundum siue sessile & Rapum longum.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. Rapæ siue fatiua rotunda seu mas Theoph. & Plinio : variat radice, reperitur vel viridi, vel candido, vel puniceo colore, sic paruitate & magnitudine : communiter tuberosa est, tardè globi instar orbiculata : frequentius in latitudinem effusa, quare Tabern. quatuor habet figuras : Hæberur nunc quæ foris & intus flauescunt : sic & Bernæ quæ obloletæ nigra, vtpurissimum rotunda, rariùs oblongæ, quæ vulgaris dulciores sunt. Rapæ 2. siue fatiua 2. oblonga, seu femina Theophrast. & Plinio. Tabern. duas habet figuras. Hæc Calp. Bauh. Ego quidem Tabern. duas priores figuras refero ad Napum, ac separo à Rapo.

Schvv. Rapum longum vulgatius, Rapum oblongius Dodon. Rapum orbiculatum.

Quæ γογγύλιος & γογγύλιος item γογγύλιος & γογγύλιος Græcis. Latinis Rapum & Rapæ dicitur, vnde diminutiuum nomen apud Horatium Rapulum. Hebræis [teste nomenclatura Eliæ Leuitæ, Trag.] Laphet, Arab. seliem, Selgem, Selgiem, siue Alsegiem. Germ. Rûben. Belg. Rapen. Gall. Raue & Naneau. It. Rapa. Hisp. Nabo. Angl. Turnepe. Hung. Kapa. Bohem. Kzipa.

Græci quidè γογγύλιος aut γογγύλιος vocabulum à figura quæ plerumque rotunda esse solet, deorsertant : nam quod in rotunditate circum actum est γογγύλιος, hoc est γογγύλιος dixerūt. Et Hippocrates gongyli vocabulum pro globulis orbiculatis, qui deorantur vt catapotia, vrsupauit. Rapa verò quod ex terræ rure, quasi rapa, Varro ne teste, nominata est. Alii quod passim rapiatur, rapi nomen inditum esse putant. A Græcis tamen mansisse id nomen facile videri potest, qui chaphyn & rapyn auctore Athenæo dicunt. Ra-

pas Lacedemonios γαστέρας id est, ventres vocare Apollas apud eundem Athenæum tradidit. Sed Nicander Colophonius rapas Zacelidas appellari voluit. Amerias & Timachides non Rapas, sed Cucurbitas ita dici arbitrantur. A rapo rapina, Gallis Rabiere & Rapium desecatur, vnde raptio caules dixit Cato.

Locus & tempus

Rapum in hortis & aruis cultis potissimum æstate, Iunio ac Iulio mensibus, copiosissimè Genæ ferunt pro alimento tantū hominum, tum pecudum, satillæ maxima habent & abundanter vescuntur. Conferuntur etiam agri rapis Monrb. & in Horto Il. E. C. Vidi Gæppingæ Rapas allatas Vlnâ venales, quæ parte superiore rubeant mense Augusto. Sed & Octobri sine nactus sum alias ex hortu Il. E. C. Gæppingæ allatas, longitudinis cubiti & semis, ad palmum rubentes, quam partem dicebant supra terrâ extare. In Italia notissima præsertim apud Infubres, vbi statim post messem æstate Iunio ac Iulio [teste Matth.] mensibus in aruis secundo fertur : deinde mense Octobri terra eruitur : radix in aliquibus locis tam magna gignitur, vt plûs quàm centenas libras pendeat. Ad librarum triginta pondus nos sapiùs innumera Rapa vidimus in Ananienfi agro, longa, & colore purpurea.

Rapæ quamuis in vniuersum in omni aère habitabili proueniant, attamen solum putre & solutum pluribus iterationibus arari, vel rastris, larogque stercore fatiatum postulant. Nam id plurimum refert, non solum quod melius ea proueniunt, sed quod etiam post fructum eorum sic tractum solum segetes optimas facit, desiderant, nec densa nascuntur humo, sed campis & locis humidis lærantur. Loci proprietates horum semina commutat. Namque in alio solo Rapæ biennio lata conuertitur in Napum, & vicissim ex Napo fit Rapū. Semen Raparum trium annorum producit Brassicam, & contra Brassicæ Rapas, Riguis locis rectè à Solstitio feruntur : sicis ultima parte mensis Augusti, vel prima Septembris. Iugerum agri non amplius quatuor sextariis Raparum feminibus oblerendum est. Rapæ igitur duas fationes habent, sed meliorem mensis Augusti.

Cultura.

Si æstate ferantur ne Culex tenera adhuc protrepia folia consumat, puluis etiam, qui supra Cameraminuenitur, vel etiam fuligo quæ supra focos tectis inhæret, colligi debet : deinde pridie quàm fatio fiat, commisceri cum feminibus, & aquâ conspergi, vt tota nocte succum trahant. Nam sic macerata postero die rectè feruntur. Veteres quidem auctores, vt Democritus, præcipiunt semina omnia succo herbæ, quæ sedum appellatur, medicare, eodemque remedio aduersus bestiolas vti, quod verum esse nos experientia docuit. Sed frequentius tamen, quoniam eius herbæ minus larga est facultas fuligine : & prædicto puluere vtimur, satisque commodè tuemur his incolumitatem plantarum. Rapæ femina Higinus putat post tritum iacens adhuc in area paleis inspergi debere, quoniam fiunt vastiora capita : cum subiacens soli duntia non patitur in altum descendere. Nos istud sapè frustra tentauimus, itaque Rapum, & Raphanum, & Napum melius existimam⁹ subacta tera obrui. Locus frigidis, vbi timor est ne Autumnalis latio hyemis gelicidiis perturbatur, arundinibus humiles canterii fiunt, iisque virgæ transuerse imponuntur, & virgis stramenta supra iaciuntur, & sic à pruinis semina defenduntur. Vbi verò apricis regionibus post pluuias noxia incefferunt animalia, quæ à nobis appellantur Erucæ, græcè autè γογγύλιος nominantur.

Satis

tur, vel manu colligi debent, vel matutinis temporibus frutices oleum concuti. Sic enim dum adhuc torpent nocturno frigore, si deciderint, non amplius in superiorem partem prorupunt. Id tamen superuacaneum est facere, si ante saturationem semina, ut iam prædixi, succo herbæ sedi macerata sunt: nihil enim sic medicatis nocent Erucæ. Sed Democritus in eo libro, qui græcè inscribitur *πεί ἀρραβή* affirmat has ipsas bestio- las enecari, si mulier, quæ in mensuris est, solitis crinibus & nudo pede unquamque aream ter circumeat, post hoc enim decidere omnes vermiculos, & ita emori. *Hætenus Columella.*

Rapæ si serantur diebus calidis, autote Theophr. celerius caulescunt, semenque oculis reddunt. Item, si rarè serantur, magis grandescunt, ideoque ubi nimis spissè eius plantulæ natæ fuerint, cum aliquod robur acceperint, euelluntur aliquæ, ut ceteræ roborentur. Naporum medicina est. Inquit Plinius, siliquis unà seri, sicut Olerum Cicor: arceet enim Erucas. Quo si omisso iam natæ sint, remedium est ablynthii inspersus, & aizouū &c. Nebulis & pruinis, inquit idem, ac frigore vltro aluntur amplitudine admirabili. Quare non sunt in Gallia quàm in Lemouicis copiosiora, suauioraque, assatum supeditante eius regionis cælo nebulas, frigora, pruinaque. Frigore enim dulciora fieri existimantur, & grandiora. Folia quò plura adimuntur, eò maiores manent radices: Rapæ maledictin, ut in iis agris quibus sanè nunquam proveniat bonum frumentum, etiam si fimo multo emendetur. Colliguntur mense Octobri, cum radix humo perè extuberauerit: quod Nicander in Georg. hisce testari videtur:

*Rapæ collige Borea frigidibus iam dormita,
Hyemi gratas famulisque, tum demum orisisti.*

Vicia

Rapæ demum quia tenui & diluto cortice integuntur, facillè exsiccantur, imbecillesque ad perdurandum penitus sunt, idèd si terra cooperiantur, vsque ad ætatem, ut vult Theophr. durare & crescere possunt. Quæ verò corruptæ & marcidæ videntur calente aqua madefactæ reuiuiscunt, & ad esum aptæ redduntur. Rapi cocta radix, inquit Dioscorides, alit, inflationem parit, humentem ac fluxam carnem creat, Venetem stimulat. Decocto podagæ pernionesque fouentur: contritoque Rapo atque imposito iuuantur. Si excauatæ radici rosaceum ceratum adigatur, & feruente cinere eliquefat, exulceratis pernionibus proficiet. Cymæ eius decoctæ manduntur, & vrinam cient. [Græcè habetur, *ἡ δὲ ἔστι ἀπὸς ἀσπαραγῶν ἢ βίβρακων ἢ ἐφθὲ: ἐστὶ δὲ ἀσπαραγῶν ἢ βίβρακων.* Id est, ipsius Asparagus, &c. Plinius cymas dixit, vterque autem rutiones siue thyrifis caulibus inter folia ex summo Rapo emicantes intelligit.] Semen antidotis & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferunt, anodyna vocant, idoneum est, [*τὸ δὲ σπέρμα ἰς ἀρραβήν ἢ βίβρακὸς ἀρραβήν ἢ βίβρακον.* Id est, semen anudotis & theriacis, quæ dolores leniendi vim habent admodum vtile est.

Ruell. not.

Quare Ruellius minus rectè ἀρραβή quæ sensum doloris auferunt, interpretatus est: sunt enim ea *ραρραβή*, id est, stupefacientia, quæ sensum, non propriè dolorem, tollunt eximia sua frigiditate. Anodyna verò quæ non extinguendo sensum aut stupefaciendo, sed partes relaxando, & demulcendo dolorem leniunt & mitigant.] potum contra venena salutare est: Venetem concitat. Rapum muria conditum minus alimenti sufficit, sed multò magis appetentiam recreat. Diphilus Silphinius Medicus, Rapum, inquit apud

Athenzum, extenuat, acce est, agrè coquitur, flatusque gignit. Allum verò scillidus enquitur, & valentius extenuat. Huius meminit Eubulus in Ancylone hoc pacto: Allandum hoc Rapum asfero: Item Alexis in Fanatico: Alloquor Ptolomæum dum frustis Raporum asfo.

Rapum sale conditum magis extenuat, quàm elixum, ac præcipuè si addatur Sinapi, ut ait Diphilus. Veteres autem, ut auidiores cibi forent vsus Rapis fuisse aceto & Sinapi conditis, planum facit Nicander libeo 2. Georg. his verbis:

Abscinde radices Raporum, & corticem nondum exuicuum,

*Illaque purgas a vinumum seca, & insolaru
Exsiccat. paululum, inseruentem cum dengri-
setis*

*Aquam, & abstrahis, obrue multa muria.
Nonnunquam verò mustum album simul cum
aceto meritor.*

*Par pari, & in ollis sipara Rapæ sale reges:
Sapius autem insperfis vna passa acinis, psillio
vrinum*

*Sinapi mordax semen additur, cui si accedit
Aceti sex, halitu caput tentabit vel robustissimam.*

*Sic condita Rapæ muria tu hauries, & cum
tempesuum eris, præbebis cibus indigentibus.*

Porro eundem serè Rapi usum cum Dioc. tradit Plinius. Est & Rapo, inquit, vis medica. Perniones feruens impositum sanat. Item frigus vellit ex pedibus aqua decoctum. Et ius feruens podagris etiam frigidis medetur. Et crudum usum cum sale cucurque vno pedum. Semen illitum & potum in vino, contra serpentes & tnxica salutare esse proditur. A multis verò antidoti vim habere in vino & oleo. Democritus in totum ea abdicauit in cibus propter inflationes. Diocles magnis laudibus tulit, etiam Venetem eb eis stimulari professus: item Dyonisius, magis que si Erucâ condirentur. Totum quoque articulorum dolori cum adipe prodesse. De Rapis verò ut cibus idem ita scribit. Aliis vsus præstantior quàm his non est. Ante omnia namque cunctis animalibus nascuntur, necin nouissimis satiant turis alium quoque genera, magisque si decoquantur in aqua. Quadrupes & fionde eorum gaudet. Et homini non minor rapaciorum (melius ex vetere codice legas Rapitiorum) suis hntis gratia, quàm Cymarum: staccidorum quoque, & in horreis exicatorum, vel maior quàm virentium. Ipsa verò dutant & in sua terra seruata: & postea passa penè ad alium prouentum, famemque lentius prohibent. A vino atque messe tertius hic Tranfpadanis fructus.

De iisdem sic Galenus. Huius plantæ olera: ceum quidem est quod terrâ extat, radix autem quæ terra continetur, dura quidem est nisi coquatur, & non esculenta: aquæ autem incocta nulla plantatum congenerum minis nutrit. Hanc quoque variè vulgè apparant, aded vt aceto vel muria condientes, in totum annum ipsâ vtantur. Succum autem in corpus distribuit mediocri crassorem. Proinde si quis ipsâ liberalius vescatur, succum crudum asseruabit, potissimum. si ipsam minis iusto in ventriculo consercit Quod verò ad ventrem attinet, nemo ipsam, neque deiecite, neque fistere dicitur, præsertim cum cocta bellè fuerit. Cognitionem enim dututniorem postulat: eaque est laudatissima, quæ cocta bis fuerit, Quod si sumpta crudior fuerit, concoctu est difficilior, ac ac flatulenta, stomachoque noxia. Nonnunquam

quam autem & ventrem mordicat. Præterea scribit Galenus Rapi semen Veneream excitare, vt pote spiritum flatulentum procreans. Sic & radicem coctū difficilem esse, inflare, & semen generare.

His adiungenda Symeonis Sethi de iisdem sententia. Rapa admodum nutrunt, inquit, vrinam ciunt, inflant, genitale semen gignunt, fauces leniunt atque thoracem. Crebrior illarum vsus crassum humorem generat, & obstructions iecoris parit. Ventrem nec sistunt, nec mouent. Si cum aceto & sale edantur, appetentiam excitant. Horum semen tritum, & haustum magna copia Veneream fuscitat. Aiunt enim qui hoc ipsum semen cum calamintha & lemnia terra sumplerit, eo die neque veneno, neque venenati animalis mortu lædi. Appensum inguinum morbis peculiari quadam proprietate medetur.

Rapi domestici, auctore Matthiolo, radix ex-calfacit & humefcit. Semen vero calidum est, & sicum: cum autem etiam sit amarum, abstergit, aperit, digerit, atque flatus gignit. Constat experimento, semen valere ad varicolas & morbillos: nam potum semidrachmæ pondere, morbillos latentes ad cutim expellit.

Valet, inquit Schvv. semen Rapi longi ad faciliorem Scabiei, Morbillorum & variolarum eruptionem. Nam humores ad cutim propellit. ʒi. pondere potum. Rapi orbiculati sub cinere calente assi in sinu orbiculus calidissimus, post aures applicitus magnâ efficacîa reuellit, capitique & dentium dolores citissimè sedat magno secreto. Raporum longorum allatorum succus cum Saccharo ad tussim infantium vsus non contemndi.

Rapa non solum omnis status hominibus cibo & alimento, sed & quadrupedibus & cunctis animalibus pabulo nascuntur. Quid? quodd & Anfers, Anatæque fronde eorum gaudent. Decocta per se radix latiat, inflationem parit, flatulque, humentem ac fluxam carnem creat, modicumque alit. Quam obrem vt id vitii emendetur, solent nonnulli eam cum lacte decoquere, vt palato magis arideant, & efficacius nutriant. Nec desunt qui Rapa condiant, sicuti & Brassicas capitulatas: Baptista Fiera de Rapis, & Napis ita cecinit.

Sunt calida & rigido gaudentia frigore Rapa, Humidus hinc illis turgidulique liquor.

Gloria Nursims, siti entes cedere Napi Educet ipse licet vos Amiterius eger.

Cum sapiant Veneri magis hæc si crassa & obesa Cæna ea postremo lenta sub orbe ferat.

Ex Rapis, apud Crescentium sunt composita cum aqua, vt pro coquina tempore hyemis & quadragesimæ habeantur: vt etiam alia cum Aceto & Raphano, Sinapi, feniculis & sale: quæ apud ipsam videri possunt.

RAPVM SILVESTRE *ραπα αν αυλα*
Veteribus.

CAP. III.

Rapum siluestre [*ραπα αν αυλα*] in aruis nascitur, inquit Dioscorides, frutex altitudine cubitalis, ramosus, in summa parte læuis: folia habens læuia, digiti latitudine, aut etiam maiora: fructum in siliquis [*αεβοις*] verum apertis seminum inuolueris [*αεκαρπιος*], alia intus siliqua capitis species est [*αεκαρπιος βοειος*] in qua sunt femina nigra, sed intus alba. Ammifcentur in (megmata faciei & reliqui corporis, quæ ex farina Lupini, aut Tritici, [*πυριου*] aut Lotii, aut Erui sunt. Hanc autem Dioscoridis descriptionem

corruptam esse scribit Dodo næus, siquidem ea quæ de leuitate caulium ac foliorum, & seminis nigredine, ac interiore eius medulla candida traduntur, aliud pertinere dicit. Ast ego cur sententiam Dodonzi probem non video:

Syluestre Rapum sine Raporum, species, auctore Plinio, in aruis maximè nascitur, fruticosum in longitudinem radice procurrente, Raphani similitudine, folio anguloso, scabroque, semine candido, duplò maiore quàm papaueris, succo aceri: qui circa messem exceptus oculis purget, medeturque caligini admisto lacte mulierum. Hoc ad læuigandam cutem in facie, totoque corpore vtuntur, mista vrina pari mensura. Erui, hordei, Tritici, & Lupini radix ad omnia inutiles. Quæ postrema in publicis exemplaribus deprauiissima sunt: ea enim verba, mista vrina pari mensura & cætera, ad ea de quibus hic agitur nihil profus faciunt. Quare ex Dioscoride sic corrigenda. Hoc ad læuigandam cutem in facie totoque corpore vtuntur, admixto in finegmatâ, quæ ex Erui, Lolii, Tritici, aut Lupini farina fiunt.

Placent quæ Cæsalp. de Rapo sylu. prodidit his verbis: Plinius tertiam inquit esse Rapi speciem, quod idem Theophr. inquit. At Diosc. longè aliter describit Rapam silu. quam in hoc genere nequaquam adhuc vidi. Nec vllam adhuc Turn. comperit plantam, quæ per omnia Rapi silu. descriptionem expleret. Etsi enim Præceptores secutus, Rapunculum vulgatum esse, Rapistrum, seu Rapum silu. Dioscoridis putarit, penitus tamen perpensâ descriptione, in nullis non conuenire deprehendit, Quocirca cogitur & Matthiolus Fuchsii sententia refragari, qui manifesto errore putat Rapum silu. esse Rapunculum vulgò dictum: quippe quod illi minimè respondeat. Nondum noui, ait Anguill. Rapum silu. licet sit, qui dicat se scire in Italia prouenire, ego nunquam vidi.

Quod autem Matth. asserit silu. Rapis scætere vbique Hetruriam, nullis reclamantibus notis: Cur ohsecro eas notas non clariùs ostendit? Cur in post. com. non patefecit: cur aliud Rapum silu. tradidit. Sed hæc Rapa siluestria qualia sint, videamus.

RAPVM SILV. MATTHIOLI.

CAP. IIII.



Rapi silu. i. ^{Descriptio} ^{& Synon;} ^{maginem} ^{quam hic} (ait Matth. in post. com. Italic. cu mag. figuris, v^m Rapo Saluatico: & Lat. ac Epit. vbi Rapum silu. Sed ^{Rapam sil.} non Diosc. Et ^{non Diosc.} H. Germ. vbi ^{Locus} waldrüben vocat) appingi curauimus, et si syluest. Diosc. Rapum non refert, refert tamè plurimùm domest. Rapum sylu. nostrum, frequens in Bohemia in agrorum

Dod. vbi.

Semen vbi did. vbi.

Plin. vbi.

Matth. vbi.

Vires:

Matth. mor:

marginibus nascitur: exit folijs, caule, flore, semine, domestico simile, sed agrestioribus folijs. Radix illi inest Raphani modo longa, crassaque, sed sapore per omnia domesticum refert. Legitimum nasci copiosum in Hetturia diximus non quoddam ipsam vltquam à nobis visum sit, sed quoddam id ex aliorum relatione intelleximus. Nostri semen cum insigniter amarum habeatur & absterforia sit facultate prædium, alterius loco securitidis illini poterit, vbi cutem derergerere fuerit opus: quin etiam necandis vermibus vtile quoque fuerit. *hac ille.* Sed quantum fidendum sit picturis, assertionibus & descriptionibus Matthioli, vel vnicus hic locus satis demonstrat, non visam plantam dicit nullis reclamare notis à Dioscoridea: quæ occasio, vt suspicor, eius Rapum non differre ab eius Lampfana, ac etiam ab Eryfimo [per quæ intellige Rapisrum nostrum] ei non bene notis: quam opinionem augent, quod Glossatores, Patrocinatores & Simia Matthioli verbottenus eius duntaxat meminerint, nec demonstrarint veras notas quibus possit discerni à Rapisro. Vix etiam puto Lacunam scire quod scribat, quando dicit, *Nabo siluestre* sunt crassi & corpulentissimi, non tantum quantim satuii.

Lobel. & Pena Adu. Rapum sylu. non bulbosum. Est frequentissimum præsertim apud Flandros, Germanos, qui ferunt hoc, quod folia bobus pabulo cedant. Luxuriat enim tanto foliorum numero, vt radix iam non tuberosa aut Raposa, sed exilis nec ventriosa, vsquam sit, alioqui satiuæ rotundæ turbinatæ non dissimilis, sed discretu facilis, crispior, rugosiorque folio &c.

Lobel. Obs. Rapum silu. non bulbosum, Hisp. *Nabo satiuage.* Adu. p. 66. & Icon. 198. Teut. 216. Licet Lobelius assumat figuram Matthioli Rapis sylu. aliter pauld tamen syluestre aut aruorum Rapisru disenbit: quæ tamè de Rapo sylu. scribit possunt conuenire Rapisro, quod an ei bene notum reuocauimus antè in dubium.

Tabern. Icon. & hist. Rapum silu. Wild. Rüben: Figuram habet Matthioli non nihil mutata, & nihil præterea particulare.

Gerard. Angl. l. 2. c. 2. Rapum silu. Wilde. Turncpes. Tabern. iconem habet Gerardus.

C. Bauh. in phyt. Rapa 3. silu. & apud Matth. Rapum testum, Rapa silu. non bulbosa, Rapum silu. Matth. Rapa silu. Cæsalpino. Ego igitur aliò refero Cæsalpini Rapum silu. nempe ad Sinapi Ecbinatum.

NAPVS.

CAP. V.

Descriptio

Napus satiuus caule assurgit cubitali & altiote, multis alis concavo: folijs parte infima pinnis caulem ramoque amplectuntur, pediculis desituta, aut iis membranis hærentia: & inferiora quidem sinuata, superiora verò non item in acumen desinunt: flores lutei Brassicæ: semen quoque simile aliquatenus in siliquis longis, at radix rapitia est, minus tamen in ventrem extubrans, altiusque demissa, sapore carnis comparioris candidæ acriusculo.

Bunias

Matthioli

Napum Buniam Græci nominant, omnibus olim cognitam, nunc Medici, pace tamen etuditorum dixerit Ruellius, profusus ignorant: Sed mirum cur Ruell. non describat, & plantam, vt dicit, profusus ignotam, notis suis non manifestet.



Apud Athenarum habetur, Theophrastum *Cynizda* quidem non nominasse, cum Nicander eo antiquior eius mentionem fecerit, sed quoddam Rapum maiè vocasse, quod fortasse Bunias sit.

Nusquã porò, quod legitur, Napum descriptit Diosc. neque Plinius. licet hic ex Theophr. genera eius quinque faciat, de quibus sub Raphano.

Raphanidas enim Theophr. Plinius Napos esse putauit, atque ita transtulit. Plinius porò velut horum quinque Naporum generum oblitus, duas rursus differèntias facit, vt alter *Bovyon* de quo lib. 27. agemus, alter *Cynizda* appelletur, vtrumque confundens. De hoc inquit: Naporum alterum genus Bunias appellant, & Raphano & Rapo simile, seminis præclari contra venena. Ob id in Antidotis vniueri ipso.

Quia autem Napi in Raporum genere videntur esse, & Rapo similes (folijs enim & radice Raphanos referunt, caule verò floribus & semine Rapum æmulantur,] idè opinor Galenum, inter Rapu quæ *303. 304. 305.* vocatur, & Napum quæ *Bovyon* nullum statuisse discrimen, vt susus iam supra dictum.

Huc accedit autoritas Turneri, dicentis. Galenus Napos sub Rapis videtur comprehendere, nusquam enim in lib. de simpl. facult. factam inuenio mentionem, præterea Paulus Rapum & Napum coniungit. Et hinc fortè Cordus Napos Rapis congeneres esse scribit, densiores tamen, acriores, & minores. Inueniri etiam luteo & sericeo colore Napos in Bordsueldiano Brunfuiensis Ducatus agro, quibus præcipua laus & autoritas attribuitur.

Trag. Alterum satiuu Rapi genus, planè à vulgari diuerfum, Rapum satiuum alterum oblongum [prælongum dixisset, si memoria labi non voluisset] siue Napus, *Stiefelrüben*, *Baumholder Rüben*, *Stiefelrüben*, *Brotfeldische rüben* [malè, ab oppidulo e *sim Bortfeld* / vbi nascuntur, Bru' fuiscentes *Bortfeldische* nominant:] Verus Napus Veteru, Græcè *Cynizda*, Serap. Selen dictus.

Matthioli & Fuchsi genera duo sunt, variè interim diuidunt. Fuchsius enim in satiuu & siluestre distrahit. Napi, inquit, siue Bunias, quem Galenus & alii Veteres in Raporum censum reponunt, duo sunt genera, siluestre & satiuum. Satiuum quod forma proximè ad Brassicam tertiz speciei accedit, radicemque longiorem obtinet: Germani huius generis Napos *Tröden steckrüben* ben nominarunt. De siluestri mox agemus. Matthioli in album & flauum his verbis: Napi Theophrasto (vt somniat Matth. non enim recordatur Naporum Theophr.) & Plinio plura produntur genera, quanquam ego mea tempestate duo tantum repererim, nempe album & flauum.

Flauj

Flauitatem albos crassitudine superent, magis colore placeant: sunt tamen insipidiores, & gustui odid minis grati.

Matthiolus sequitur Lacuna, qui duas quae tradit species, albam, quam praefert in Italia, & luteam, quam in Hispania, vt teneriorem, qualis est ea quae provenit in Somossiera.

Dodon. Gall. Napus hortensis, siue domestica, Lat. Napus.

Napus quem *Nanonem* vocant, inquit Cæsalpinus, radix est in longitudinem extubetans, acrior rapa, amarior raphano: color aliis candidus, aliis buxeus.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. Napus i. siue sativa. Napum radice nigra legimus in horto Montbelg. Ill. D. V. Virtemb. quem colit frater Io. Bauhinus.

Gerard. Iconem Rapi rotundi Tabern. posuit pro Buniade. Iconem autem alteram Tabern. Rapi minoris, ille posuit pro Radicula sativa minor.

Græcis, *Bolias*, non *Bolior*, Lat. *Napus*, Germ. *Stiefrüben* / *Stiefelrüben*/ Saxon. & Brunf. *Bordfeldische Rüben*. Belgis, *Parische Rüben*. Gall. *nauer* & *naucan*, Ital. *naioni* & *napo*. Hisp. *nabicas*, *nabotengo* & *delgado*. Angl. *Nanew*. Hung. *Raro rpa*. *Buniade* appellacionem à tumente figura, quam præ se fert hæc planta, Græci deslexerunt: namque radix eius in amplitudinem excreuit, & in rotundum extuberat. Cuius, colles, verrucosaque loca *Cobus* nominant.

Napus deucexam amat, & siccam, tenuique propiore terram. Itaque glaucosis sabulosisque atus melior exit. Plinius pro Rapa de Napis hac meo iudicio scripsit. Napi verò Amiterum, quorum eadem serè natura, gaudent æque frigidis. Et alio in loco. Palma Romæ Amiterinis datur, inde Nursinis, tertia nostratibus. Et Martialis Murinas pilas appellat his versibus:

Nos Amiternus ager felicitibus educat hortis.

Nursinas poteris parcius esse pilas

Seritur, transfertur, semineque perficit, eodem quo Rapum tempore, & in alium locum deligi debere ex cuius semine nasciturum expectatur Rapum, certum est: eodem modo & Napus translatione desiderat. Nota tamen [vt cap. de Rapis iam annotatum] ex Plinio, quod Naporum medicina sit, siliquas vnâ ferere. Quo si omisso iam natæ Erucae sint, remedium est Absinthii vsus, decocti inspersus, & Sedi quod Aizoum vocant. In horto satis celestimè nascitur: tertio enim die erumpit, De Napis vide plura capite de Rapis, vbi quæ ex Columella citantur, his omnia conueniunt.

Buniadem habemus in Horto E. C. nec frequens aliàs est Montbelgati. Montpelii copiosum vidi florentem Vere: Lugduni & Genevæ Aprilis copiosè in cibis vtuntur, vt & Patavii vbi *Nanonis* vocant.

Cocta Napi radix in flat, vt rectè scripsit Dioscorides, modicum alit. Semen eius potum venenorum vires hebetat, ob id & antidotis admiscetur. Conditur murià radix. Galenus medicamenta simplicia, quæ in theriacam adduntur expendens, siluestris Napi semen ex Creta sumendum esse ait. Cui omninò ad stipulandum esse censet Matthiolus, quoniam Andromachus, nec sativi, nec siluestris meminit, sed dulcis seminis Napi, quod de sativi semine potius intelligendum videtur, quia in agresti nulla dulcedo intus, sed potius acris quedam amaritudo: in sativo verò contra. Præterea Iunior Andromachus, item Democritus

Tom. II

Napi tantum semen requirunt. Quibus accedit Dioscoridis autoritas, scribentis Napi semen si præbatur, lethalia venena inefficacia reddere, & antidotis admisceri. At fortasse Galeno compertum erat siluestris ex Creta semen peculiari quadam virtute aduersus venena pollere, atque ob id in theriacam addendum, quo tamen si destituatur sativi semine vtendum in antidotis esse censet Matthiolus. Id semen etiam, eodem Matthiolo auctore, necat interaneorum animalia ex limonum aut arantiorum succo potum: ex adianthi siue lentium decocto cum alia exanthemata, tum sublimia illa, quæ vulgò Morbillo vocant, ad cutim pellit, tum quod ab imis corporis partibus ad extimas partes morbificam materiam ducit, tum quod propria vi morbi malignitati resistit. Datur vultus cochlearis mensura ex vino, addito seminis lini drachmâ, ad ciendam vrinam. Ventriculi cruditates vomitione extrahit, si ex oxymelite & tepete aqua hauriatur. Summo perè etiam prodest nullis diebus eius seminis drachmam ex martubii decocto propinare ictericis, & aquæ intercuti incipienti. Externè Naporum idem vsus, qui Raparum. Napus in secundo ordine calidus est, & in primo humidus.

NAPVS SILVESTRIS.

CAP. VI.



Flores, siliquæ, Defecti

femina, Sativæ proxima sūt: folia crebrius dissecta, laciniatæque, nullis indidem pediculis cauli annexa. Verum radix sylvestrem naturam sapit: minor, & pollicis articulum parum superans, turbinata, saporis acris.

De Napo filii hæc Ruellius. Medici nunc suffeato quodam sylvestris Rapi seminio, Buniadis vice abutuntur.

A rubibus tamen quadam herba colitur Rapa, radicique similis, quam *Nauetam* appellant, foliis Rapi, latioribus, post adulescentiam Erucae modo laciniatis, cubitali scapo aut interdum altiore, radice minuscula, floribus eidem proximis, Rapitio caule cubitali vel altiore, cuius foliis non secus atque rapaceis vescuntur agri, præsertim cum rusticos olerum inopia premit. Eam cocta tum cruda aceto & sale condita deuorant. Nec eam crebro frondium autifluo coërent, quominus in caulem erigatur, quod in Rapis fieri certum est, vt in radice incrementa capessant, sed in scapo attolli patiuntur: nam vberiore seminis proventu non mediocrem questum faciunt. Semen huius calfactum trusatilibulque molis pressum magnam olei vim remittit, quò non ad obsonia modò, sed ad lumina quoque lucernarum vtuntur. Auiculas caucis reclusas, Carduales, Miliarias, Frigillas, & id genus similes, semine huius apud nos aucupes alunt.

Bbb

Fuchs. Napi alterum genus siluestre, Germ. *Rass* *feetriben*, foliis suis Erucæ non dissimile est, radice ampliore & rotundiore.

Tragus Rapum 3, siue siluestre, Wild rüben/ & feld rüben / sine icone, cui eadem tribuit, quæ Ruellius Naueta. Tertium, inquit, Rapum vulgari facit siluestris est species, quæ cibo non vsurpatur. Seritur illa quibusdam in locis, maxime apud Mediomatrices [his enim nubes è quibus nostris regionibus oleum conficitur, non in magna copia nascuntur,] seminis è quo oleum isti conficiunt gratia. Quod ad formam attinet, æquat hoc Rapi genus siluestrium Pyrorum magnitudinem, gustu amarum. Hortulani nostri in Autumno serunt, April deinde mense, veluti & satium Raporum genus, caules illius longi profiliunt, flore comantes violis simili, luteo, copioso. Sinapis instar. Folia eius antequam excaulescit satis molliora satiuo genere, & viridiora, qui sit vt Martio mense inter cetera olera decoquantur. Semen habet nigro Sinapi pectumile.

Dodon. Gall. qui depingit, Napis siluestris. Lat. qui iconem omittit, Napi silu. species, Gallia rurbus Nauita, Ruellio teste, appellata. Quæ ex non transplantati semine nascitur & solus & caule, reliquique Napum æmulatur, sed radice non crassa, oblonga quidem, & haud magna.

Aduers. Lobel. & Penz fuerit fortè Bunias siue Napis silu. quæ conquerantur deceptos Plinium ac Matth. quasi cum Bunio confuderint. Plant. Icon. 200. Bunias silu. Napis flore luteo T. 233.

Gerard. Bunias silu. Lobelii Wilde *Naueta*. Icon posita à Gerardo est apud Tabern. iconum p. 406. pro Rapo longo minore Lang Stropffel rüblin.

C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Napis 3, siue silu. ex non transplantatorum semine etiam nascitur.

Camer. apud Matth. Si Napi non transplantantur, vt Rapa siluestris siue, & possunt vocari silu. Napi. Hæcenus non obseruari lectione vel auditu Napis transplantari.

Rapum silu. Schvv. Rapum silu. Rapaceum semen, *Oris* *samen*. Autumno seritur feminis causa. Aprilis floret facrescente semine copiosius. Ex semine oleum extunditur pauperum culinæ inseruiens. Auicula eo pascuntur etiam. Ego suspicor intelligi Napum.

Tempus *Vitis* *Locus* Seritur in agris ad oleum, habemus etiam in horto E.C. In agris Montbelg. & vicinis pulchrè florere conspicitur mense Aprilis & Maio: radices subrotundæ sunt, modò longiores, quæ non solent ad cibum assumi, sapore Rapi. Folio autem magis accedit ad Napis vel Brassicæ.

RAPISTRVM FLORE LVTEO.

CAP: VII.

Descriptio

Tanta Rapis tri lutei, vbi adoleuit, cum Sinapi affinitas vt obiter intuentem fallat: radix alba lignosa: caulis cubitalis & bicubitalis, in ramos crebros diuisus: folia Rapitæ, sed quæ attrita non acri illo Sinapis odore nares seriant, sed oleraceo penitus: flos luteus, minimè diuersus: at in siliquis longè maximum discrimen: siquidem ex in Rapisstro duplè longiores conspiciuntur, quàm in Sinapi, nec vt illa quadrangulæ compressæ, sed multangulæ & turgidulæ: quibus dehiscentibus femina comparent similiter membranulæ mediæ adhaerentia, sed numero



plura, eaque lucida & nigra, cum Sinapis sint ruffa nec vello nitore perpolita, quibus tamen acrimoniâ parum admodum cedunt. Nostra figura Fuchianan non in omnibus placet, priora folia sinuata non bene demonstrat.

Ex Plinio & Theophr. ipsaque aded quælicunq; Diofcoridis de ruppione colligit

Cornar. Irionem non esse aliam herbam, quàm eam quæ inter segetes, Hordei maxime & Aueng, nascitur, & à nostris Hederich vocatur, respondens descriptioni Erythimi (Irionis) Diofcor. vt patebit conferenti cum ea quam ponemus postea post Ericas. Lamplana à Diof. nullis notis describitur, inquit Mattholus, quare dixerim cum Plinio inter silv. Brassicæ Lamplanam esse, pedalis altitudinis, luteis foliis, Napi simillimis, nisi candidior esset flore. Nascitur hæc frequentissima in Hetruria, Apulia, atque plerisque Italiæ locis, in præsertim campis, qui aratrum eo anno inimicè sensere, tametsi nobis hæc tempestate non fuerit, nisi virgente anno: penuria in alimentorum vltim recepta. In Hist. Germ. Wilde söl Lamplana floribus pallidis quales Brassicæ aut Rapæ. Egrege interpretis Diofcor. officio fungitur Commentator qui ait Diof. non describere Lamplanam: ipse etiam nullam descriptionem exhibet contentus figurâ, de qua dubitant Glossatores & Patrocinatores nec quicquam certi proponunt, quod non mirum. In Com. dicit Matth. flore esse Napi candidiore ex Plinio: In hist. Germ. flore pallido: Glossator appingere videtur flores & siliquas Rapis tri flore albo, idem facit Patrocinator, non tamen intelligit plantam, sed eandem nobiscum nempe Rapisstrum flore luteo. Mattholus præterea videtur capite de Irione seu Erythimo eandem plantam confundere in icone, folia enim & flores ac nomen Germanicum videntur cõpetere Rapisstro: ac talem fuisse opinionem Glossatoris satis apparet: diuersa Patrocinatoris vt dicitur sub Erythimo.

Camer. ad hist. Matth. Germ. Hederich. Erythimum vel Irion. Figura ex Fuchio non competit descriptioni Matthioli.

Lonicer. Hederich / Weidenrettich, wilder Senff. Annoracia, Raphanus silv. officin. Rapisstrum, *Cheria*, Ponticis Annon, Leucon: flore luteo interdum albo. Meminit idem c. 135. lib. 5. *des gelben wilden senff* [Sinapi silv. Lutei,] quod quò referamus non videmus, nisi sit Rapisstrum hoc luteura, figura tamen non placet pro Rapisstro.

Gesner. hort. Rapisstrum passim in aruis nascitur, idem quod Lamplana, vel cognatum agreste olus. Item in cat. Erythimum. Raphanus silv. Grecis Cheria, Latinis Annoracia, aliis Leucon, officinis

Matth: C B no. Camer. notant

Erythim. Gel. Irion. Lamplana. Sinapi. Inseum.

Cheria

cinis hodiè Rapistrum, ἡ ἄρα apud Theophr.
Hederich.

Sunt autore Cæsalp. Armoraciæ radices silue-
stres paræ ac prædura floribus luteis, cæteris
iisdem cum Radice siue Raphanide.

An Anguill. Erysimum vulgare? An eidem
Lampfana notissima nomine: apud Mediolanen-
ses di Landri, & Abrussios di Lafana, & in Græ-
cia maximè in Creta vocatur Lampfagida.

Dodon. Gall. Rapistrum Neotericis, quibus-
dam Sinapi siluestre. Gall. *Velar* aut *Tortelle*,
Germ. *Hederich*: Belg. *herich*. Videtur Erysimum
Theophrasti, quod Gaza vocat Trionum: non
autem Erysimum aut Irio Dioscoridis. Lac. in
fol. Rapistrum, nonnullis Sinapi silv. Germ. *Hed-
erich*. Figuram Fuchianam retinet, nec amplius
Erysimum Theophrasti dicit.

Rapistrum (aunt in Aduers. p. 66. Lobel. &
Pena) aruorum vulgè vocatum è Raporum cen-
su est, passim viarum margines & segetes ornans,
vbiq; præsertim Septentrionalium, floribus lu-
teis numerosis Brassicæ aut Rapæ, in caulibus
sesquicubitalibus folia insunt Lampfanæ aut Ra-
pi silv. Brassicæ virore & læuore non Erucæ, vt
debeant Irioi Diosc. radice tenui, neuiquam
fibrosa, gustu item Rapi siluestris, cuius facultates
prope sortita est, sed vehementiores, tamen
vsus neglecti aut ignoti. Neuiquam est Erysi-
mum Diosc. certè admodum affinis est Napis &
Sinapi: rufum namque semen Sinapi ementur
& vsus explet ruiticis. Item pag. 69. Item
p. 70. *λαμψανη* [Italis di Landri & di Lafana: Galls
Sauues blanches, quasi Sinapistrum album] Na-
pum siluestrem vocarunt olim. Olus syluestre
Plinii quo vixerunt Iulij Cæsaris milites, pepe-
ram Theophrasti Erysimum putatur à Dodo-
næo. Columella hanc inrellexit Lampfanam.
Senensis inferis alienis plumis ambigenus euo-
lat: *Miramur Nos Aduersaria dicere Rapistrum so-
lia habere Lampfanæ, cum ipsis autoribus sit
Lampfana: Præterea ea dicere, solia non esse E-
rucæ, cum dixerint Rapum habere folia laciniola
Erucæ: Nescimus etiã cur fibrant habere
folia Brassicæ virore & læuore, considerent qui-
bus nota planta, an talia sint folia: Hinc nobis o-
ratur dubium, an Rapistrum diuersum sit ab eo-
rum Rapo silv. non bulboso.*

Histor. Lugdunenl. Lampfana Matthioli. Et
Lampfana vera, falsè Theophrasti Erysi-
mum Dodonæo. Item Irio Matthioli. Tres
figuræ vnius plantæ, prior inepta ex Matthio-
lo, & tertia ex eodem, quæ videtur composita ex
Rapistro.

Tabern. Icon. & Hist. Lampfana flore melino:
Afer sol mut bleich geelen blumen. Taberna-
montani Compilator non demonstrat qua in re
differat Lampfana eius ab Armoracia siue seiden
rectig.

Icon. Armoraciæ Tabern. per Gerardum An-
gulum posita est pro Raphano silv. *wilde radisch*/
flores ferens luteos, verùm, vt postea dicemus,
Tabern. dicit de sua Armoracia, vocari Rapistrum
album: Gerardus præterea pro Lampfana &
Doctæ creffes ponit iconem Lampfanæ Tabern.
verùm ille satis indicat se ignorare quod scribat.

In descriptione tradit flores esse Hieraci, in Ico-
ne verò & in planta quam repræsentat flores
non sunt similes Hieraci: hoc etiã annotan-
dum, Lampfanam quorundam flore Hieraci
non esse referendam ad Nasturtium siue Creffes
Anglorum, vt ipse facit.

Tom. I L

C. Bauh. Phyt. Rapistrum i. siue luteum: Mat-
th. Lampfana: variat foliis, aliquando habet si-
nuata, aliquando non incisa, vnde quidam duas
species constituere volunt. Apud Matth. Quæ
pro Lampfana à Matthiolo pingitur, Rapistrum
esse aruorum ex eius epistolis satis liquet. Hoc
Rapistrum à similitudine cum foliis Rapæ di-
ctum videtur: est flore luteo, est albo, aliquando
etiã purpureo: i. Rapistrum luteum, Lampfana
Matthioli. Frater ponit figuram Matth. à Ca-
merario auctam siliquis & floribus vt mihi per-
suadeo Rapistri flore albo.

Schvv. Rapistrum luteum: *Erysimum* Cordo &
Raphanus silv. Lampfana Matth. Lampfana
Dioscor. Tabern. *Geelhederich* *Hedeurettig*/
Schönödseuf *wildseuf* *Raporum silv.* censu est.
An huc referenda sit Armoracia Schvvenckfeldii
dubitamus, (quam s icon Tabernamontani
possit conuenire,) quia Tabern. dicit vocari Ra-
pistrum album.

Rapistrum flore luteo, Lugduni obseruau-
mus, florens mense Maio, Geneuz Decembri, Ba-
sileæ cum flore & siliquis mense Octobri, in vi-
neis ad montem Moutets. Montbelgardi abun-
dat in segetibus florens Iunio & Iulio, Augusto
cum flore & semine maturo, provenit etiã in
horto Ill. E. C. Plurimum, inquit Schvvenck. in-
ter segetes hordeaceas & Rapaceas in uitis Agri-
colis luxuriat, vt interdum totos agros cooperiat
Iunio & Iulio.

Resiccantem autem ac extergentem, non ni-
hilque digerentem facultatem obtinet, Galenus
apud Dodonæum hanc esam malos succos pro-
creare scribit: Dioscorides verò plus alere ait
quàm Runicem, & stomacho viliorem: Co-
quantur autem, eodem auctore, caules foliaque,
& in cibum recipiuntur. Acrimonia pollet vt &
Nasturtium. Semen feruens & acre gustu, vrinam
prouocat.

Lecus & Tempus

Viret

RAPISTRVM MONOSPERMON.



Rapistri
mono-
spermi ramum
à D. Rychnero
Medico Basili-
ensi habemus
cui flores lutei.
Frater Caspa-
rus eandem
apud Matth. &
Phyt. talibus
describit: Ra-
pistro Monos-
permo ex radi-
ce longiuscula
albicante, pa-
rum fibrosa,
caules pedales;
quandoque al-
tiores, rotundi,
tenues, ramosi,
elegantè virè-
tes, leuiterque hirsuti exurgunt: folia humi spar-
sa crassa sunt, Rapi foliis similia, ad principium lac-
ciniata, dein subrotunda, leuiter sinuata & sub-
hirsuta: flores secundum cauliculos palmares &
tenues, velut in spica dispositi: quadrifolii, eleganter
lutei aurèiue, quibus siliqua succedunt rotunda
eleganter propter strias, per eas quemadmo-
dum

Descriptio

Bbbb a

dum in semine Coriandri discurrentes] in filamentum oblongum abeuntes; quæ quasi geminæ sibi insident, parte tamen superiore maiore, cum in ea semen paruum, oblongiusculum, sed vnicum [vnde ei nomen] continetur.

C. Bauh. apud Matth. Rapistrum 2. Phyt. quartum siue Monospermon. Huius semen nomine Lampfanæ monospermi D. Doldius misit, & hic Basileæ in horto D. Zuingeri Maio mente floruit.

Locus & tempus.

Hoc ipsum postmodum, sed multò strigosius [illud enim culturâ elegantius] in agris quæ Augustam Rauracotumitur, ad rubram domum obseruauimus: idem sed humilibus & valdè ramosum, foliis paruis, eleganter virentibus, in agris circa Huringen ad syluam inuenimus; & simile Montepelio vbi quoque spontè creuit habemus.


RAPISTRI GENVS AVSTRIACVM

Folia à radice spargit, hirtis pilis vndique obfita, sed potissimum & vel magis in aucta parte, profundis segmentis laciniata, quæ & ipsa crebris denticulis serrata sunt. *Caulis* verdè omni hirtutis caret. *Folia* item superiora quæ ad ramorum exortum hærent tota glabra sunt, non tot nec tam profundis segmentis dissecta, inferioris quoque multò minorâ. *Flores* in ramorum extremis umbellati, lutei. *Rapistri* vulgaris, sed minores: *Quos siliquæ* excipiunt. Hanc siccam nobis communicauit Agerius collectam in Austria inter segetes, non curauimus pingendam, quia non integra planta & quia nobis non benè notum Rapum silv. Matthioli, cuius figurâ non malè conuenire videtur.

RAPHANVS.

CAP. VIII.

Descriptio



Folia proximè ad Rapi folia accedunt, sic ut facillè verisimilissimis imponere possint: paulò tamen magis sunt sinuosa: cætera etiâ minus conueniunt. *Raphano* enim *floribus* purpurascens, quadrifolius, apicibus luteis: *siliquæ* crassiores, pulpofæ, in loculos toberosos, conuallibus interceptos, distinctæ,

in quibus *semen* rubrum, ac: *Radix* crassa, longa, magnitudine varia, alba, vel rubra, gustu acri & mordaci, recto vix surgit *caule*, cubitum vnum aut alterum alto.

Dioscor. duo Raphani genera facit siluestre & satiuum. Hoc ali Polyides Eryngium, Romani Radicem nostratam, Aphri *Thorsith* appellant.



Theophr. in *Raphanus* plurâ genera dicitur. *Raphanus* dicitur. *Radix* *Ve* *scrisus*

Distingunt hæc, inquit, foliis, radicibus, coloribus, saporibus, reliquisque eiusmodi. Vt Radicis genera Corinthium, Cleonæum, Liothasium, Bœotium, Amphimicè Corinthia adolefcit, quæ vel stirpe constat detecta: hæc enim sursum versus protruditur, nec vt cætera in terram

ampliarî solita est. Liothasium, quam Thraciam vocant, validissima aduersus frigora traditur. Bœotia dulcissima est, & figura rotunda, nec vt Cleonæa, prælonga. Quibus folia læuis, dulciores suauiorisque sunt, quibus autem scabra, acriores. Genus præterea redditur, quod foliis Eruce simile consistit. Radicis genera hæc notaerunt.

Athenæus Theophrasti locum hunc citat his verbis: Theophr. l. b. de plantis quinque Radicularum (*ραφανιδων*) genera esse tradidit: Corinthiam, Liothasiam, Cleonæam, Amorrheam, Bœotiam. Dicitur verdè à quibusdam Liothasiam Thraciam esse: Bœotiam dulcissimam omnium, rotundam figurâ: in vniuersum dulciores esse, quarum læuis sunt folia.

Cæterum, quoniam quæ Atheniensibus *ραφανιδων* dicitur, aliis nonnullis, vt & Callæ apud Athenæum *ραφανος* (quod autem Raphanum Radiculam dixerit ex Aristophane perspicuum est) appellatur: id obiter admonitum. Lectorem velim, *ραφανος* vocem plerisque antiquiores Græcos, vt ex Apollodoro Carystio docet idem Athenæus, libro 1. pro brassica vsurpasse: vnde Plinio erroris ansa, qui variis locis Raphanum cum brassica confundit, Raphano tribuens quæ Veteres illi de brassica prodidère, quemadmodum & lib. 19. cap. 15. napsis tribuit, quæ Theophrastus lib. 7. hist. cap. 4. *ραφανιδων*, hoc est de Raphanis, tradidit his verbis: Idem (Græci) Naporum quinque genera fecère, Corinthium, Cleonæum, Liothasium (non Liothasium, vt in vulgaris Theophrasti exemplaribus exaratum est) Bœotium, & quod per se viridè dixerunt. Ex his in amplitudinem adolefcit Corinthium, nuda ferè radice. Solum enim hoc genus supernè tendit, non vt cætera in terram. Liothasium quidam Thracium appellant, frigorum patientissimum. Ab eo Bœoticum dulce est, rotunditate etiâ breui notabile, neque vt Cleonæum prælongum. In totum quidem quorum tenuiora folia ipsi quoque dulciores: quorum scabra & angulosa, & horrida: amariore. Est præterea genus siluestre, cuius folia sunt Eruce similia.

Cæterum, Raphani radix (autore Theophr.) quæ ex carne & cortice constat. Contra Plinius ait: Cortice & cartilagine constat Raphani: multique eorum cortex crassior etiâ, quam quibusdam

dam arborum. Amaritudo plutima illi est pro eius crassitudine. Cætera quoque aliquando ligiosa. Scripsit Moschio Græcus vñu volumen de Raphano.

Vulgare & rotundum Raphani genus nobis esse videtur, inquit Tragus, quod Theophrastus Corinthium, Plinius Syriacum, vocauit. Quamquam & Bœotius Raphanus rotundus sit, teste Theophr. gustūque dulcior. At Raphanus prælongus quem Metensis ager fundit, Theophrasti nostrā sententiā radix est Cleonæa, Plinio Algidensis appellata.

Fuchs. Raphanus fatiua, Raphanus minor Officinatum.

Lonic. Raphanus, alius longus, alius rotundus. Matth. Radix illi varia, nam nonnullis longa, alba, teres, tenera, fragilis, nec admodum acris, quæ cæteris in Hetruria præstantior habetur: aliis quibus crassa, Napi penè figura, altera longè durior, acrior, & gustū ingratior. Differunt quoque colore. Namque & alba & nigra, vbiq; serè habetur. Sed hæc altera minùs frequens. Raphanus 1. Raphanus 2. Icones duæ apud Matth. vix mihi discrimen monstrare videntur.

Habet Camer. horti præter vulgarem Raphanum alium radicem nigra, qualis frequens est Argentina. Et alium radicem lutea.

Dux sunt Raphani species aut Lacuna: Domestici teneri, delicati, quibus vulgè vescimur: Siluestres, duri & asperi, Plinio Armoracia, Romæ dicti Ramoracii.

Officitanter sanè ac turpi errore Gesner. horti, cum Bern. Dissensio Plinium secutus tria Raphani genera, crispum, læue, & campestre statuit: Brasicæ hæc Theophrastus assignauit. Sed quod à Plinio Algidense dicitur, longum, succosum, ac transflucidum rectè in Raphanorum numero recensuit & esse scribit, in hortis inferioris Germaniæ tam frequens, vt nullum serè aliud norint: hoc apud Batauo-Phrysiis in eam magnitudinem crevit: vt viderit quod triginta libras penderet. Quamobrem minime mirandum, in Germania infantium puerorum magnitudinem æquare, Plinium scripsisse. Vulgaris est Raphanus, qui virilis brachii amplitudinem non excedit. Sunt autem hi transluccidi: & aded fragiles, vt in taleolas absque ferro confringi queant. Multùm ab acredine illa ac saporis vehementia, quæ secundum genus pollet, recedunt: & salugine imbuti, linguam vsque aded non vellicant. Alterum genus Rapi figurâ Syriacum appellatum, in superiori solùm Germania prouenit: vehementissimum & tenerimum, nec multâ humiditate redundans: quapropter parcius editur. Nam qui assatim ingerunt, præter frequentes ructus, rosionis quandam sensum in stomacho experiuntur.

Raphanum, inquit Amatus, Columella Radiculam appellat oleosis vulgatissimum genus, herba caule vno arboreo serè vt in Ruta conspicitur, asurgens: quare multorum Græci, *ῥαπανάκιον*, quasi olus arboreum nominant. Nec Gaza Theophrasti interpretis aliter verit. Huius tria Plinius memorauit genera, læue, crispum & campestre. Diosc. quoque trium mentionem facit, hortulani, siluestris, atque alterius Apios dicti. Amatus prælicenter in Raphani historia hinc inde oberrans diuagatur. Nunc enim falsis illis tribus Raphani Plinij generibus talpæ instar cæcus incedit: oculos mentis aperire debuisset, & considerasse hæc Theophrastum à quo Plinius sua mutuatur, Brasicæ tribuisse. Præterea Dioscorides non tria, sed duo Raphani genera fecit, quod per se clariùs est Tom. II.

quàm vt ostendi debeat. Dioscor. enim lib. 4. Apium, montanum aut siluestrem Raphanum, ab aliis solum ita vocari, tradit. Quæ occasio vt etiam ipse tanquam de toto genere diuersis, non tantùm capitibus, sed libris egerit diuersis.

Cæterùm non minùs turpi cæcitatē notā corrector eius, seu censor leuerus Rob. Const. inuenditur est, vt qui errores hos non annotarit.

Cæsalpin. Radix vulgè à quibusdam Radicula Græcis, quasi radix perspicua: est enim tenella ac fragilis, candida, sermè translucida, flores purpurei aut candidi. Radicis plures differentiz: nam quædam in longitudinem crescit, quædam in rotunditatem, has vulgè *Rauanellos* vocant, quorum alii cortice nigro constant, alii candido. Longarum quædam vasto cortice crasso, quigratiores est interno corpore: Hæc Armoracia vocamus, omnes fatiua. Theophrastus Raphanida vocat, Theodorius Radicem verit. Plinius, Raphanos vocat.

Turner. Genera fatiui Raphani duo, *Radice longa*, passim in Anglia & Belgio, quibusdam *Radice rotunda*, Rapo non absimili, frequentior circa Argentinam, nonnullis Radix Bœotia, aliis radix Syriaca, Angl. *Koûnde radice* / *Rape radice* raro in Anglia conspicitur.

Theol. Dorst. Raphanus minor vel communis radice interdum magna & oblonga, interdum verò rotunda & nodosa, flores serè candidos.

Aduers. Raphanus magnus & parvus purpureus. Lobel. Obs. duas habet figuras ex Matthiolo, vna hoc titulo Raphanus magnus Aduers. p. 67. primus Matthioli: alteri Raphanus minor purpureus Aduers. p. 67. secundus Matth. Figura mihi apud Lobelium videntur transpositæ.

Tabern. Icon. & hist. Raphanus rotundus, *Kûnder rettig* / Raphanus orbiculatus, *Scheibel rettig*. Duas icones ponit non indicans discrimen: Rapum tulerunt, potissimum secunda orbiculatâ radice.

Gerard. Pro Raphano orbiculato, *Rond radisch* ponit Iconem Tabernamontani: eandem & iconi Raphani rotundi inscripsit, Raphanus pyriformis, *peare sassion Radisch*: Præterea pro Raphano fatiua, *Garden radisch* ponit iconem Tabern. Rapi longi: pro Radicula fatiua minore *Schmal garden Radisch*. Icon. Tabern. Rapi rotundi minoris siue *Kûnde Wappen* ei dicti.

Brunel. Matth. in prior. comment. *Ryffio*, Camer. hort. Anguill. Gesner. de coll. stirp. & cat. *Raphanus*. Dodon. *Raphanis*, siue Radicula fatiua, Radicula fatiua minor. Hist. Lugd. Raphanus fatiua: Raphanus 2. Matth. Raphanus purpureus minor Lobelii.

C. Bauh. Phyt. Raphanus 1. siue maior, floribus purpureis aut candidis. Raphanus 2. siue oblongus: colore variat, noster albo est cortice: Italis tubello, cuiusmodi est etiam Montbelgardi. Raphanus 3. siue niger. Raphanus 4. siue lat. Raphanus 5. siue Byzantinus. Apud Matth. Raphanus præcox, alius serotinus: hicque albus & niger & rubens: albus, oblongus: ruber oblongus, qui fibras rubentes per substantiam discurrentes obtinet, habetur & radice lutea. Raphanus 1. Raphanus 2. *Hæc Frater*, cuius icones non mihi videntur monstrare differentiam.

Nicol. Abr. à Frambois. Raphanum, *raisfor*, & Rapum, *raue*.

Theophrasto, Dioscotidi, ac Galeno, aliisque Veterum Græcè *ῥαπανάκιον* dicitur: posteriores *ῥαπανάκιον* appellant: Antiquiores autem & Attici, Brasicam *ῥαπανάκιον* vocant. Latinis autem *ῥαπανάκιον* Radix & Radicula dicitur: Offic. verò *Raphanus*

nus. Serapioni, annotante Trago, *Fugal*, siue *Fugiel*, Auerhoi *Alphagel*, Hebr. *Zenon*, Rabinis & Thalmudistis *Fugla*, & conuersis literis *Pilga*. Germ. *Keerig*, Belg. *Nadya*. Gall. *Radis Raifort*: It. *Raphano* & *Radice*: Hisp. *Rauano* & *Rauanillo*, Angl. *Radisch*: Boh. *Räsetew*. Radicula *semen* Cælius à Marcellis Enspirito Bacanon dici affirmat: similiter ab Aëtio. Cornarius tamen Cacanon legit. Raphanus quidem *ἀρόνη* ἢ *ῥάφον* auctore Athenæo: id est, quod facile appareat, sibi nomen ascribit: nam tertio à satù die profilit. Radicis vocabulum, ut auctor est Vatro, è Græcia venit in Latium, cum Veteres Græci radicem dixerint, quam nunc Rhaphanum. Nisi quis forsitan arbitretur nomen accepisse, quod cæteras amplitudine superet, vel quam paucissimis magnitudine cedat.

Satio

Seri vult Raphanus, qualiter videre est apud Plinium, terra soluta, humida. Finum odit, palea contentus. Fugore adeo gaudet, ut in Germania infantum puerorum magnitudinem æquet. Seritur post Idus Febr. ut vernus sit: iterumque circa Vulcanalia, (Aliis circa ortum Canticulæ, aliis Calendis Augusti), quæ satio melior. Multi & Martio & Aprili serunt & Septembri. Incipiente incremento, confert alterna folia circumobruere, ipsos verò accumulare. Nam qui extra terram emittit, durus fit atque fungosus. Aristomachus detrahi folia per hyemem iubet, & ne lacunæ stagnant accumularet: ita in æstatem grandescere. Quidam prodidit, si palo adacto cauerna palea infernatur sex digitorum altitudine, deinde in semen simūque & terra congeratur, ad magnitudinem serobis crescere. Præcipue tamen salis [De brassica hoc Theophr. cap. 7. lib. 2. Causis.] aluntur. Itaque etiam talibus aquis irrigantur, & in Ægypto nitro sparguntur, vbi sunt suauitate præcipui. In totum quoque fallugine amaritudo eorum eximitur, sicutque coctis limiles. Ægypto mirè celebratur propter olei fertilitatem, quod è semine eius faciunt. Hoc maxime cupiunt terere, si liceat: quoniam & quasvis plūs quam à frumento, & minùs tribuit, nullumque copiosius oleum.

Gaudet autem [auctore Theophrasto] frigidibus Radix [*ῥαφανίς*], & sic eam dulcescere putant, simulque incrementum in radicem non in folia verti. Austrinis atque serenis temporibus celeriter caulescit. Hyeme cum maxime viget radix terrâ obrua, ut nullum imbrem admittat, ac directis quibusdam foliis mira crassitudine distenditur. Sed Raphanus quia nullam vim germinandi ab imis obtinet, alimentumque capit, quod non sursum transmittere apta sit: idcirco subitus crassatur, amplissimamque efficitur. Causa verò, ut nulla putredo, nulla corruptio accederet, humo congelitiz datur, quæ aquam arceat, & in totum, omne quod alienum est, admitti non patitur. Post æstatis Solstitium Iunio ac Iulio communè ssumè seritur.

Tempus & locus.

Raphanum vidi florentem Aprili flore cæruleo: Genex Nouembri, flore cæruleo & albo, ibidemque cum pauca cærulei parte Maio. Basileæ Raphanus est in vigore Augusto & Septembri. Lugduni principio Maii habent edules. In pago Tempa (inter Basileam & Otmersheim ad Rbenum serè sito) vidi Raphanum radice rotunda Rapi instar: ita ut non facile quilibet distinguere possit, nisi gustu, quem cum mense Septembri degularem, non videbatur differre à longo allato Argentina, vbi cum Raphanum quoque obseruau: talem quoque vidi in Malmunster,

qui loco humido creuerat, non poterat manū amplecti, ac sapore erat non admodum acris. Patui habent rotundum, breue, album, non vsque adeo acrem & rubium, sicut & nigricantem oblongum, satis magnum, valde acrem. In Passuant Abbatis Lutrensis in horto Domini VValther ab Andlav, vidi crassissimum & maximum ad magnitudinem cruris excresecens: talem habemus in horto Ex.C. Hortulanus hyeme reponendum seminat, huius radix sub terra tota latet, ac tota hyeme ad cibum adaptari potest vsque ad Veri: ut & alterum longum, tenerum, album, extra terram eminentem: cuius radices habentur edules Iunio. Et hic potest dici longissimum & præcedens crassissimum. Longissimum habemus genus cuius pars extra terram eminentem rubet. Raphanum nigrum attulit mihi hortulanus Ill. E.C. ex horto Gapping, duplicem, vnum paruum qualem aliquando vidi Argentinâ missum, & qui Montbelgardi etiam prouenit in horto Ill. Ex.C. magnus crassus est. Viderentur diliger tids non indaganti duo genera, verum tempus sationis tantum differentiam facit in radicis forma: veteri quæ mense Octobri datur. In omnibus autem probandis, Plinius maxime spectat caules. Immitium enim rotundiores, crassioresque: folia verò tristiora & angulis horrida.

Raphani siue radiculis vites, Diofco. declarat his verbis: Flatus gignit & excafcit: ori quidem gratas stomacho minime commodas: quos prætere mouet, atque vrinas ciet: alium quoque honam facit, si quis ipsam summo cibo sumperit, quippe quæ tum distributionem magis adiuet: præsumpta verò cibum suspendat: quare & ante cibum vomituris conuenit: quin & sensum aciem excitat. Euxa verò si sumatur, valet ad eos qui tussi diuturnè infestantur, qui que crassiores succos in pectore cumulant. At cortex ipsius ex aceto multo sumptus, vomitiones potentius mouet, hydropicis accommodatus: impositus etiam nummenosis est utilis. Cum melle verò normas fistit, & sub oculis luggillata tollit. Auxiliatur & à Vipera commorsis, necnon & Alopecias densas atque lentiginis cum Loliacea farina extent. Est & auxilio tam cibo quam potuiis qui à fungis strangulantur, menstruaque pellit. Semen vomitiones excitat, vrinas eicit, & lienem ex aceto potum extenuat. Decoctum anginosi cum aceto multo calente gargarizatu prodest, & contra Cerastæ morsum ex vino potum auxiliatur. Cæterum ex aceto illud gangrenas etiam valenter emarginat.

Raphani vis mira [reçedè hæc Plinius de Raphano tradit] colligedi spiritum, laxandique nitum. Ob id cibum illiberalis, vti que si proximè olus mandatur, fit verò cum Oliuis drupis, rarior vtilis fit, minùsque scetidus. Cocti dulcescunt & in Naporum vicem transeunt. Crudos medici suadent ad colligenda acris viscerum dandos cum sale ieiunis esse, atque ita vomitionibus preparant meatum: Tradunt & præcordiis necessarium hunc succum: quando phelisin cordi intus inhaerentem, non alio potuisse depelli comperitum sit in Ægypto, regibus corpora mortuorum ad scrutandos morbos insecantibus: Atque ut est Græca vanitas, fertur in templo Apollinis Delphis adeo cæteris cibis prælatum raphanus, ut ex auro dicaretur, beta ex argento, rapum è plumbo. Scires non ibi genitum M. Curium Imperatorem, quem Sannitum Legatis aurum repudiaruro afferentibus, rapum iocentem in foco inuentum Annales nostri prodiderit.

Locus & Tempus

Vires & vsus

re. Scripsit & Moschion Græcus vnum de Rha-
phano volumen. Viliissimi in cibis hyberno tem-
pore existimantur: isdemque dentibus semper
inimici, quoniam atterant. Ehora certè po-
liunt. Satiui decocti manè poti ad ternos cya-
thos, comminuunt & eiciunt calculos. Idem in
posca decocti contra serpentium morsus illi nun-
tur. Ad tussim etiam manè ieiunis raphanus
prodest cum melle: Semen eorum tostum ip-
sumque consmanducatum ad Lagonoponon
[Ilium cruciatus è flatu, & calculo:] Aquam fo-
liis eius decoctis bibere, vel succum ipsius, cya-
this binis contra phthirias, phlemoni ipsos il-
linire tulos, & liuori verò recenti corticem cum
melle, veterosis [Veteranum, siue animi, siue
corporis stupiditatem & ignauiam vocant: stolidum
Catullus, graue ac funestum Horat. appellat:
Catullus.

Nunc cum volo de tuo ponte mittere pronum,
Si pote stolidum reperire exire veterum.]
autem quàm acerrimos mandere, semenque
tostum dein contritum cum melle suspensiois.
Idem & contra venena profunt. Ceterò & Scor-
pionibus aduersatur: vel ipso, vel semine infe-
ctis manibus impunè tractabis: impositoque
Raphano Scorpionis moriuntur. Salutare &
contra fungorum aut hyoscyami venena æquè, vt
Nicander tradit. Et contra visum quoque dari
Apollodori duo iubent. Sed Citicis semen
ex aqua tritum. Tarentinus succum. Lienem item
extenuant: iocinoti profunt, & lumborum do-
loribus. Hydroticis quoque ex aceto aut sinapi
sumpti & lethargicis. Praxagoras & iliosis dan-
dos censet. Phlogisticis, & cœliacis (stomacho ta-
men aduersari Dioscorides testatur. Verùm cœ-
liacis prodest, quoniam viuas ciet.) Intestinum
vicerà [illa detergendo, alioquin irritant:] fan-
t: purulenta præcordiorum, si cum melle e-
duntur. Quidam adhac coquere eos in luto il-
litos malunt: sic & feminas purgari. Ex aceto
& melle sumpti, intestinorum animalia detrahunt.
Item ad tertias decocto eorum potio cum vino,
enterocelis profunt, sanguinem quoque inuti-
lem [In vesica concretum & intestinis: ex ma-
nificis, & vtero.] sic extrahunt. Medius adhac &
sanguinem excreantibus coctos dari iubet: &
puerperis ad lactis copiam augendam. Hippo-
crates capitis mulierum desuuiua defricari rha-
phanis, & super umbilicum imponi, contra tor-
menta vuluæ. Reducunt & cicatricem ad colo-
rem. Semen quoque ex aqua impositum, sistit
hulcera quæ phagedænas vocant. Democritus
Veneres hoc cibo stimulari putat: ob id fortas-
sis voci nocere aliqui tradiderunt. Folia quæ in
oblongis duntaxat nascuntur, excitare aciem o-
culorum dicuntur. Vbi verò acrior Raphani
medicina admota sit, hyssopum dari protinus im-
perant. Hac antipathia est. At aurium grauitati
succum Raphani instillant. Nam vomituris
summo cibo esse eos, vtilissimum est: (Dioscori-
des vomituris dat ante cibum: à cibo verò vt
roret ventriculum & cibi distributionem ad-
iuuet: hic itaque obliuiosè Plinius vomituris
summo imperat cibo.)

Sed Galenum audiamus de Raphano tum vt
cibo, tum vt medicamento, loquentè. Urbanus, in-
quit, homines solam radicula crudâ vt plurimum
ante alios cibos cum garo alui deiciendæ gratia
mandunt, quidam autem aceti quidpiam admif-
cent. Rustici verò cum pane sæpè numero ves-
cuntur, vt alius obsonijs quæ sua spontè proue-

niunt. Radicula autem caulè etiam ac folia
mandunt, sed coacti potius quàm voluntarii.
Radix aurem exiis est quibus asidue vescimur,
estque obsonium magis quàm alimentum: nimi-
rum quæ & ipsa cum manifesta calfactione ac-
tentandi habet facultatem. Nam qualitas æris in
ipsa superat. Vere autem caulè quendam, qui
in altum assurgit gignere consuevit, quemadmo-
dum & alia omnia quæ caulè sunt productura:
quem caulè elixantes mandunt cum oleo &
garo & cum aceto, vt Rapæ caulè, ac sinapi, &
lactuce, nutritque magis caulis iste, quàm cruda
radicula, vt qui in aqua acrimoniam omnem pon-
nat: paucissimum tamen & ipse habet alimentum.
Quidam autem non caulè modo, sed & radice-
las ipsas elixantes mandunt, non aliter ac Rapæ.
Et alio in loco, Raphanus, excalfacit quidem or-
dine tertio, desiccatur verò secundo. Quin & se-
men ipsam plantâ èfficacius est, facultas ei inest
digerendi. Itaque ad fugillata, & alia id genus
liuida, ob talem facultatem accommodum exi-
sit. Cæterum, cum Medicos, tum idiotas illos
mirari subit, qui à cœna crudos eos concoctionis
iuuandæ gratia edunt. Ipsi quidem se experientia
id abundè compertum habere dicunt, nullus ta-
men exemplum illorum sine damno potuit imi-
ri. *Hænnus Galenus.* Cuius equidem verba ed
libentius recitauimus, quòd non solum vulgi, sed
etiam Medicorum errorem lepidè notare videtur,
qui crudas Radiculas à cœna esitabant, iuandæ
concoctionis gratia: quibus quidem verbis
Dioscoridem obiter carpere videtur, quippe qui
hoc loco ita sensisse videatur, idque tum robo-
randi ventriculi tum cibi distributionis adiuuan-
dæ gratia.

Simeon Sethi discrepantes hæc sententias
adhuc distinctione componere nititur: dum
quibus alius facilè subducitur, quique flatibus
carè, iis vult exhibendas ante cibum Radiculas:
contra verò à cibo, iis qui flatibus laborant, qui-
busque cibus in ventriculo supernat, ac etiam
num difficilis est alius. Verum tamen neque hoc
ipsum quenquam citra damnum experiri posse;
cum Galeno crediderim.

Raphani recens minutim incisa radix (vt scri-
bit Math.) albo meraco insperata, & in farragine
calfacta, pubique admota, remorata in yrinam pel-
lit. Idem præstat eiusdem succus diuini vnciam
pondere ex vino Cretico haustus. Corticis
vnciam cum mercurialis pari pondere, citoci granis
quatuor, pulueris cassiæ odoratæ drachma, succi
fabiæ drachmis duabus, omnibus simul in mor-
tario contusis tenuissimo linteolo exceptis, yteri-
que ceruici adnotis, agrè parurientibus misicè
subuenit. Eiusdem radice succus cum oleo dul-
cium aut amararum amygdalarum, & vini albi &
colocynthis momento aurium sonitus tollit, si-
calidus instilletur.

Raphano autem comesto lacticijs esse vitan-
da, quòd corrumpantur & vitium inde contra-
hant, monent: Raphanus à cœna manducatu gra-
uem reddit anhelitum, si quis statim ab ea sum-
pta somnum caperit. Grauidis vt apud Dorthe-
nium legimus, non conducit, expellit enim fet-
um, trahit mens, educitque secundas. Succus
eius in ueteratis vlcetibus illitus, ea renouat gan-
grænamque in eis erodit. Idem præstat puluis
eius. Succus Raphani cum melle decoctus, atque
modico aceti admisto, percolatus, prodest con-
tra febrem quartanam, & contra oppilationem
lienis, si in potu sumatur. Cuiem subuentibus a-

quis, lienosique vtiliter Raphanus emplastris modo imponitur, vt Dioscorides testatur.

Raphanus domesticus esculentus, ait Fernelius, sine offensione vlla vomitione purgat, atque ventriculum blandè exinanit: quæcunque nimirum in eo crassa sunt attenuat, quæ lenta sunt detergit, ac demum stimulat expultrice vi sursum extollit, nulli ztati neque prægnanti in sensus. Teruntur autem radicis eius concisæ vnciaz duæ, affusaque mulla succis exprimitur tepidus offerendus. Seminis [quod efficacius sit] semuncia vel ziii similiter teruntur addita mulla aut fero lactis aut aqua hordei.

Radice[m] cum sale tritam in malignis febribus sub pedibus ligati testatur Schvvenckfeldius. Scribit Camer. apud Matthiolium Germ. si in excavatum Raphanum aqua Maioranæ immittatur, & pet aliquot dies sub terra defossus detineatur, atque illam visus debilitati mederi. Si in Raphanum cauatum veretrum immittatur, lapidem [teste Font.] ni magnitudo obster, trahet. Quidam in Raphano cauato crocum adiciunt. Nec solum calculi causa hoc fit: sed etiam in difficultate vrinæ ob crassum viscidum & glutinosum humorem, aut sanguinis trombum meatum obstruentem. Aqua Raphani radicis, hæc enim minutim coneditur, ac distillatur] per triginta dies mane ac vespere singulis vicibus tribus aut quatuor vnciaz pota medetur calculo, facitque ad aquam intercutem, modò ægrotus à nimio potu abstineat. De cætero vtilis ad omnes hæcenus recensitos affectus. Fit & ex succo Raphani expresso cum Sacharo aut melle *Syrupus*, apprimè idoneus calculosis lienosisque. *Oleum* quoque ex hoc parant ad dolores aurium, spinæ dorsii, atque renum, à frigiditate ortos.

RAPHANVS BYZANTINVS.

Descriptio

Raphani Byzantini semen habuit Camerat. hortu Constantinopolitani, qui postea tamen degeneravit in communem, ac solos flores ac semina protulit radice penitus lignescente.

RAPHANVS RAMVLA CRETENSIBVS dicta.

Descriptio

Raphani vulgati seu nostratis modo *scapum* erigit cubitalem aut sesquicubitalem, itidem brachiatum. *Folia* positu & ordine vt in prædicto, sed lzuaia, tenera, & præ glabritie nonnihil splendicantia, figurâ vt in illa varia. Quædam magis dissecta magis, quædam magis integra & subrotunda: suprema ad Lâpsanz quodammodò accedunt. E ramorum supremis alternato positu ex vnciali ferè pediculo flores dilutè purpurei emicant, raphani nostratis similes. Succedunt *vascula*, aliàs *uerruaria*, aliàs gemina, aliàs longa teretiâque, sed omnia in excavatum mucronem fastigiata, *semen* continentia Raphani, rotundum, in pulpa fungosa delitescens, sapore grato, minimum, aut etiam nihil, acris, ita vt ad auellanarum nucleorum etiam saporem quodammodò accedere videatur, quatenus ex sicco deprehendere licuit. *Radix* tenuis, fibrosa, candida, qualis quidem hæcenus nobis obseruata.

Ramulæ Cretensis nomine à fratre C. Bauhi. no semen accepimus quod fatum in hortu Ill. Ex

C. V. Vitæ. Montebelgardi non prouenit: postea Daniel du Vernois Medicinæ candidatus attulit nobis sine nomine plantam collectam Basileæ in hortu clariss. viri Domini Iacobi Zyvingeri pro Raphani specie rata: Nobis quoque siliquis cum seminibus nomine etiam Ramula Cretensis Basileæ in prædicto hortu collectas, communicauit Doctus Vir Conradus Pflitherus Basl.

RAPHANVS SILVESTRIS VETERVM.

De hac seorsim agendum duximus, eâ potissimum de causâ, quòd qualis sit, hodie non constat. Radicula igitur siluestris [*papæris a'zela*] quam Romani apud Diosc. Armoraciam vocant: *Folia* habet fatiæ [Eruce Theophr. qui Raphani quintum genus facit & siluestre vocat] similia, sed quæ ad Lampfanam propius accedant. *Radix* est gracilis, longa, subacris. Est [inquit Plinius libr. 19. c. 5.] etiamnum vnum siluestre [Raphani genus.] Græci Agrion vocant, Pontici Atmon, alii Leucon, nostri Armoraciam, fronde copiosius, quàm corpore. Idem lib. 20. c. 4. Raphanum siluestre esse diximus. Laudatissimum in Arcadia quanquam & alibi nascitur.

Porro tam folia, quàm radix, auctore Diosc. olerum vice decoquuntur. Excalfacta autem, vrinam ciet, æfluosique est. Vtilior, tradente Plinio, Raphanus silu. vrinæ duntaxat ciendæ. Cæterò, bilem detrahunt cortices in vino. Præter ea, quæ circa eos dicta sunt, stomachum purgant, pituitam extenuant, vrinam concitant. Est & latui [legendum siluestris] vus in Italia, & Armoraciam vocant.

Agrestis Raphanus, teste Galeno, in tertio ordine calefaciendi, & in secundo desiccandi fatiua efficacior est.

RAPHANVS SILV. MATTHIOLI.

Matthiolus, vt præ cæteris se, non dico Rhizotomum, sed quarumlibet stirpiura Rhizorichum [eradicatorem] ac Numen quasi omnificum ostenderet, ita de Raphano silu. in suis in Diosc. com. differit. Romani suam antiquam Raphani silu. appellationem retinent, qui ipsum primæ literæ Metathesi Ramoraciam appellant. Cæterum, cum syluestris fatiua longè durior, acriorque deprehendatur, Diosc. codex hic etiam mendis suspicione non vacat, vt pote qui Armatocia radicem reddat teneram, mollèmuè & subacrem. Fuchl. eam esse stirpem putat quam Raphanum rusticum nonnulli vocauerunt. Si is Romam nunquam profectus esset, nunquam [vt arbitror] in eitore[m] incidisset, spontè namque [ait in Epit.] prouenit in campestribus in agro Romano. Anguill. Raphanus silu. vocatur Romæ Aramoraci & Remolaci è Mazorchi. Per *Rauanus* [Raphanos] siluestris Lacuna intelligit duos asperos qui Plinio dicuntur Armatocia, & nomen antiquum conseruant, ac Romæ dicuntur *Ramoracei*.

Let. Armoracia: Castil. *Xaramago*. Ital. *Ramolacci*; *Matthiolus* qui temerè nimis Diosc. codicem mendo laborare scribit, non demonstrat quam plantam intelligat, nec eius Glossatores patroni & Simiz: meliùs sibi consulissent, & icone, aut saltem

Raphanus silu.

Eruca fo.

Lampfan.

folia.

Radix.

Agrion.

Leucon.

Armorac.

Vicos

Descriptio

saltem descriptione, quam plantam intelligerent, indicassent. Lacuna quidem videtur intelligere Raphanum fatium longum, crassum, duriorem, qui perhiemem referuari potest.

RAPISTRUM FLORE ALBO STRIATO,
Sinapi agreste album Trago.



Rapistrum flore albo striato folia habet Sinapi Erucae diuisura simili, hirsuta, sapore oleraceo : caules ramulosos, hirtos : flores albos, Eruca maioris, stris caruleis variegatos, apicibus luteis, siliquas pulchras, longitudine ferè digitali, vbi maturuere nodis instar caudæ Scorpionis distinctas, strias : in quibus pro

nodorum numero *semina* : radix satis tenuis, alba, aliàs simplex, aliàs multifida.

An Trago sinapi sylvestre ad aquas proueniens flore albo?

An Dod. Gall. Sinapi sylvestre [*sinapi ægyptiacæ*] quod idem cum Tragi Sinapi suspicor esse, quamuis figura ad Erucam maiorem pertineat.

An Turn. planta VVeissenburgi weisshederich, & quibusdam wildreutig dicta? Is quidem existimat esse Radicem filustrem Dioscoridis. Hæc ed loci semper inter Rapas nascitur, Rapistro similima, breuior, flore albo, radice exili, sapore aliquatenus & forma Raphani longi : folia incisa seu laciniata Raphani fatiui modo, leuiora non nihil quam Rapistri. Videtur Plinius hanc pro Lampfana sumere lib. 20. cap. 9. & falsò inter Brassicarum genera reponere : cùm inter Raphanos collocare debuerit. Siquidem Plinius multis locis Radicem appellat, Brassicam appellandam, vt lib. n. c. 23. & lib. 27. cap. 24. atque ita utramque plantam videtur confundere. Eius verba, quæ huc me inducunt, sunt ista, inter Brassicas sylu. & Lampfana &c.

Cæsalp. Lampfana, flore candido, Diosc. olus sylu. Plinio inter sylvestres Brassicas Lampfana, quæ Iulius vixit apud Dyrrachium. Lonc. Geiber wilder Senff [Sinapi luteum silu.] cuius figura, qui suo more necit quid scribat, videtur demonstrare Rapistrum, de quo hoc capite agimus. Plant. Icon. pag. 199. Rapistrum flore albo, Eruca folis Teut. 237. Tabern. Icon. & hist. Armoracia Weisshederich, quod quidam volunt Lampfanam, alii Raphanum silu. alii nominant Rapistrum album, quidam Armoraciam. Et alibi Rapistrum purpureum, Braun hederich. An Rapistrum flore albo fuerit benè notum Gimpil. Tabern. nos læcet, quia album non describitur apud eum nec an colore floris tantùm differat purpureum, annotatur ille alio qui pro sua in ðigni prudentia so-

let icones diuerfas exhibere plantarum solo colore differentium : Le Cores tamen considerent, an extet purpureum & diuersum ab albo, aliis notis quàm colore. Schvvenck. Armoraciam Tabernæ ad Rapistrum flore luteo refert, quod non improbamus, si consideretur icon : verùm nomen Rapistri albi non videtur conuenire, vt antè dictum, Item Rapistrum album, Raphanum silu. Lampfana seu Brassica silu. Matth. weisshederich. Ad iconem purpurei Rapistri Tabern. scribit Gerardus, Rapistrum aruorum Charlock aut Chardick, quam plantam intelligat perpendendum. C. Bauh. phyt. Rapistrum 2. siue album; hoc flore purpurascens etiam reperitur.

Floret passim in agris Iulio & Augusto, obseruauit etiam Montpelii, Geneuæ, Basileæ, Montbel. Locus & gardi passim in agris. Campis rapaceis cultis & tempus in cultis, sed rarius occurrit Schvvenckfeldio.

Semen, autore eodem, ex calcificandi, sicandi, abstergendi, & digerendi vi pollet.

Vires

ALSINE NODOSA DALECHAMPII.



In agro Montpelienfi plurima gignitur, radice simplici, longa, parum capillata, ex cædido flutescente : foliis propè terram multis longiusculis, angustis, Alsinæ haud multum dissimilibus : caulis multis, pedalis, flore albo, ex quinque foliis composito : semine in nodosis striatisque globulis multis, sepe ordine consequen-

Descriptio

tibus, & quasi veruculâ transfixis, peculiari ornind figura.

Hist. Lugd. Alsinæ nodosa. C. Bauh. phyt. Alsinæ 23. siue semine globolo.

RAPHANVS SYLVESTRIS, SIVE ARMORACIA multis.

Radix crassa, surculosa, repens, sapore feruidissimo : caules singulares bicubitales, concaui, striati, recti & rigidi : folia inferiora, antequam caulem proferat ampla, Lapathi, rugosa, vbi caulem autem profert, in eo folia palmum longa, vnciali latitudine aut paulò maiore, in ambitu profundè satis serrata, gustu mindis, feruido quàm radix : ex quorum alis surculi tenues prodeuntes flores sustinent positu & formâ Nasturtii palustris cum apicibus luteis.

Descriptio

Habent (inquit Turner.) Dioscor. & Plinius Raphani genus, quod Græcis dicitur *ραφανισ ἀγρία*, Lat. *Armoracia*. Ital. *Ramoracia*, teste Matthiolo. Tradit Dioscor. Radiculam silu, folia habere Raphani hortensis, nisi quòd ad Lampfanæ folia



crem, vt vulgati Codices Græci habent, quam emendationes legant *μακρὰ* pro *μαλακὰ*. At Germ. *Meerrettich*, radicem habet admodum acrem & mordacem. Quare nequit esse Radix silu. Dioscoridis.

Thlaspi maius, inquit Cordus in Dioscor. sine dubio est ea herba quam ego *Meerrettich* appello & Arabes *Nasturtium album*.

Brunfelsio: Armoracia aut Raphanus maior. Matth. passim in suis Commentariis. Thlaspi Crateux, Raphanus vulgaris, Raphanus rusticus, raphanus rusticus siue maior, vt vulgò. Cam. apud Matthiolum raphanus sylu. raphanus montanus, rarò reperitur semen, vnde Petrus Crescentius scribit femine omninò carere: docti vocant Thlaspi Crateux, & multi vocant Thlaspi magnum. In horto, raphanus rusticus, vulgò Armoracia.

Gesner. in car. plant. Armoracia vulgò raphanum *ραψανη* Theophr. sylu. Brassica, quibusdam Lampfana. raphanus sylu. Ponticis Armon, aliis *Leucón*: Officinis hodie raphanum vt quidam volunt, ego autem existimo *Meerrettich* esse Thlaspi alterum.

Tabern. Icon. & hist. raphanus marinus *meerrettich*, Thlaspi alterum Diosc. Sinapi Persicum, raphanus maior, raphanus cõdimentarius, raphanus obtoniorum Arab. *Nasturtium album*.

C. Bauh. phyt. raphanus 6. seu Thlaspi alterum Dioscor. Apud Matth. raphanus rusticus siue silu.

Gerard. raphanus rusticus. Schv. raphanus rusticus, raphanus magnus, & *ραψανη* Dodon. Armoracia Plinii. raphanus rusticus, Lapathi folio, videtur Lobelio & Penz in Aduers. capite proprio Molypdeia Plinii. Sinapi Persicum. Potest dici hydro-piper etiam hæc, quam nõnulli Lepidium Pauli & Plinii dixerunt. raphanus rusticus plebeculæ.

Lobel. Obs. figuram habet ac scribit, raphanus rusticus Thlaspi & Sinapi Persicum, Armoracia Tragi, Thlaspi Crateux Diosc. Lobel. in Obs. in Append. p. 495. Crassa radice raphanus rusticus florens, Aduers. pag. 135. & Obs. 173. Plant. Icon. p. 320. raphanus rusticus, crassa radice, Lapathi folio, Lobel. 173. Lobel. in Append. Teut. 304.

Nomina
Liquarum. Raphanus syluestris, siue Armoracia multo-
rum vocatur Hipp. de morb. mulier. *ραψανη*

propius accedant. Quod si verum est, errant quicunque plantam illam folio Rumicis, radice acerrima, Germ. *Meerrettich* & Angl. *Redcole* dicunt, Armoraciam aut Radicem siluestre putant. Nihil enim simile habent, Rumicis & Raphani domesticæ folia. Scribit idè Dioscor. Raphani sylu. radicem esse gracilem, teneram, sub-

acris. Gesner in Cat. *ραψανη* Theophr. Germ. *Meerrettich*: Gall. *Raisfort sauvage*. Angl. *Garfe Radisch*, *Montagne Radisch* *Great Raisfort* *Redcole* Gerardo.

Copiosè abunus in horto E. C. ob eius multum vsu in coquina hyberno tempore: abundat propè Lure spontè in agrois quorundam marginibus, abundat extra portam Helicirianam iuxta agros Canabinos, quã itur ad arces carnificis: odiosus in hortis suo reptatu. Genevæ in hortis floret Maio, Basileæ abundat in multis hortis, item Lugduni: vidi Patauii & Veronæ in hortis: passim humidis & vmbrosis hortorum locis, Schvvenckf.

Extremæ plantæ est acridinis, annotante Schvvenckfeldio: Aperit, pellit, incidit, prouocat, attenuat, abitergit. Teritur cum vino, aceto & melle condimentum vice. Appetentiam facit. Verum caput laedit, & nidorosas eruptiones mouet. Biliosis & caput dolentibus noxius. Vrinam & arenas valenter pellit, Menstrua prouocat. Io. de Monte Exer. Senex Monachus cum sentiret se calculis vexari Raphanum rusticum *Meerrettich* tenuiter infecabat, in linteolum reponerat, & in vino macerabat, & mane & vespere cum vellet ire cubitum poculum ebibeat per triduum, hoc solo remedio vsus non vexatus amplius fuit à doloribus ob calculos & arenas.

SINAPI VETERIEVS ET IN GENERE

CAP. IX.

Sinapi licet nec à Theophr. nec à Diosc. in genera diuidatur, aut describatur, Plin. tamen triù generum esse dicit. Vnum gracile: alterum Rapi folis simile: tertium Erucæ. Sed alia adhuc potest ex semine desumi diuisio, quod colore vel est albo, vel atropurpureo, vel rubro.

Cæterum, tria se obseruare genera scribit Ruellius, & ex eo Carolus Stephanus, quem sequitur Gesner. hort. Siluestre vbique spontè nascens, exilius, quod vulgus gallicum à minori proceritate *Sanelam* vocet. Alia autem duo numerosioribus, altioribusque ramulis brachiari, Rapo similia, sed folio minori & asperiore. Verum semen variare, in vno rufescere, in altero candicare ex toto. Hanc *Blancham Moustardam*, illam *nigram* rusticos vocare, vtramque verò communiter *Senecæ*.

Tragus capite de Sinapi satium [cuius alterum sulco seu pullo, alterum verò albicâte prægnat semine] & syluestre recipit, ibidemque plures plantarum sensus tradit.

Fuchsius quoque & post eum Ryffius, genera duo agnouit, non semine tantum, sed & foliis & floribus distantia. Primitum siquidem rapitiam frondem exprimere videtur, floremque luteum obunere, ac semen album proferre: Alterum verò in Erucæ folium laciniari, floreque albicante, & semine vesco pulloque constare, scribit.

Trium Plinii Sinapis generum meminit Matthioli, eaque in Italia obseruari scribit. Horum autem vnum [Sinapi eius tertium] quod tum folio, tum etiam semine tenui dicit, eraticum [H. Lugd. quæ Matthioli genera & figuræ recepit, Sinapi silu.] facit. Videtur hoc nobis Sinapi Erysimi folio. Alterum verò [secundum] quod Rapi fronde constat, cæteris maius hortense [satium H. Lugd.] vocat. De hoc dicitur sub Sinapi siliquâ hirsuta

hirsuta albo, non respondente descriptioni. Tertium [in inscriptione primum] & ipsum sativum [hortense H. Lugd.] statuit, semine albo, minusque acri. Dicitur & hoc Erucam maiorem.

C. Bauhinus vt & Camer. apud Matth. Germ. eandem Sinapis exhibuit species, nisi quod hic pro siluestri, aliam plantam dederit, quæ nobis videtur Eruca quorundam silu. repens.

Lonicerus aliter distinguit: in Luteum enim & album à flore sumpra varietate diuidit. Illud duplex rursus tradit, hortense & siluestre, ambo feminibus albis. Exhibet autem pro hortensi luteo, Sinapi album. Syluestre existimamus esse Rapistrum flore albo striato. Sinapi album, quod Græcè Euzonion, Latine Erucā vocari scribit, similiter in sativum & agreste dirimit. Satiuum album satiuo luteo: agreste album, agreste luteo, inquit præter flores in omnibus respondent. Pro Sinapi silu. albo ponit iconem Erucæ satiuæ.

Brinzel. duo Sinapis genera agnoscere videtur. Album & nigrum. Ita namque scribit. Erucæ album Sinapi est, nigro virtute caloris similis, aded vt sine damno in vltim venire vix possit, ni laetuca addatur, à cuius frigore ad temperamentum adducatur.

Dodon. Sinapis tria genera esse tradit: satiuæ duo, & siluestre tertium. Satiuo priori flores esse dicit cum semine luteos: alteri flores quidem luteos, sed semen è nigro subbrustum, interiore medullâ è luteo virefcens. Sinapi satiuum Dodonæi prius, quoad figuram, Erucam maiorem satiuam flore albo demonstrat: Alterum Sinapi album exprimit. Siluestre, cum Sinapi Eryfimo Tragi cognatum credimus.

Lobel. & Penain Adn. præter duplex Sinapi satiuum, Erucæ & Rapistrum, duplex quoque Agreste constituunt. Primum Apii, aut potius laueris folio, quod quale sit, fatemur ingenuè, nos adhuc ignorare. Et alterum Sinapi silu. minus, Itronis veri folio, aut Bursæ pastoris. Hoc si ex figura Lobelii Obs. & Icon. Pl. coniectari liceat, Sinapi Eryfimo simile fuerit. Lob. Obs. & Ic. plât. sub titulo, Sinapi satiuum Erucæ aut Rapi folio Adn. p. 67. iconem falsam exhibet, Erucam enim maiorem potius ex Matth. exprimit. Sub Sinapi etiam agreste Apii aut potius Lauaris folio Adn. p. 68. malè adaptat figuram Sinapi albi, vt dicitur sub Sinapi siliqua hirsuta, albo.

Cæsalp. Sinapis triplicem differentiam assignat. Rapæ folio, stoculis luteis, semine fuluo, satiuam & siluestrem. Tertiam, folio laciniato, floribus quidem etiam luteis, aut semine ex flauo candicante. Est hoc nobis Sinapi album illud vulgare, semine ruffo.

Atque has Sinapi differentias, vt & eas, quas C. Bauhinus in Phyt. inter Erucas recenset, cum nostris mox seorsim distinctius trademus. Plurimæ sanè præterea extant plantæ, quæ passim apud Autores Sinapis nomen sibi vendicarunt, vt Sinapi Persicum, Alliaris, Capparidis, Lepidium, Erucæ, & alia plura, de quibus singulis suo quoque pertractatur loco.

Apud Athenæum dictione Sinapi vsus est Nicander Colophonius in thoriacis:

Est vel Cucurbitulam eneam, vel Sinapi.

Idem in Georg.

Mordaxque semen Sinapi.

Et alibi.

Nasurtium verum, foliis nigrisque Sinapi.

Græci plerique *κιννα* & *κιννα*, Attici verò, vt apud Athenæum legitur *αδρυ* dixerunt, sic Galenus appellat, Paulus & Aetius. Dioscorides vtroque modo vocat, Latini *Sinapis* & *Sinapi*. Arabe

Cardel: Hebr. *Chardal*, quemadmodum in Cant. cap. 7. Rabi Salomon testatur. Germ. *Senff* Belg. *Mofstact*: Gall. *Moufharde*, *Senene*. Ital. *Senape*, Hisp. *Mofstaza*: Castal. *Mofstalla*: Port. *Mofstarda*. Angl. *Müsterd* & *Seuberye*. Boh. *Horcice* Hung. *Müstar*.

Notandum autem his nominibus & condimentum, quod ex huius plantæ semine conficitur appellari. Plinius Sinapi etiam à quibusdam Thapsi: ab aliis Saurion dici refert. Est autem tam Sinapi, quàm Napy sua ratio ac interpretatio. *Napy* etenim dicitur, autore Athenæo, quasi *ναπος*, quia *φύστος ἐστὶν ἡμῶν*, sine natura sit: velut Aphia, quia ob paruitatem natura priuarum sit. Quòd ob pusillam molem non esse, aut vix esse credatur. Alii Napi per priuationem, videlicet *Nimys*, quasi immitte dici volunt, quoniam acrimoniæ vehementis particeps sit. *Simum* verò, *ἢ σίμυτος τὸς ὄπας τὴν ὀδύνην*, quia olfactu oculos lædat. Et hinc fortè merito à Poëtis, fœtum factura, lachrymosa & tristis cognominatur, apud Athenæum Crates Cleonem ira percitum, contracta fronte, & indignandum, excandescensque innuens dixit:

Sinapi conspexit, & frontem contraxit.

Quod verò Gallis *Moufharde* vocatur, ex eo factum videtur, quòd cum multo Sinapi ad intinctum conteri soleat. Camerario tamen apud Matth. germ. *Mustarda* dicta placet quasi Mustum ardens, quòd ignea vi semen nares & cerebrum apprehendat, lachrymas excutiendo, nullo asperimi saporis præuio odore. Vnde natum apud Francos diuicibium, quo, cum insignem veteratoris astutiam indicare volunt, inquit, Callidiorem esse Sinapi.

Terram, vt inquit Palladius, diligit aratam, & si fieri potest, congestitiam, quamvis vbi que nascatur: sarculari debet assidue, vt respargatur puluere, quo fouetur: non minus gaudet humore: de quo semen legere disponis, suo loco esse patieris: quod ad escam parabis, robustius facies transferendo. In Sinapi vetus semen inutile est, satiuo, vel vsui: quod dentibus fractum, si intus viride videbitur, nouum est, si album fuerit, vetustatem fatetur.

Sinapis sementem auspicantur Autumno, Vere perficiunt, quinto die post satum comparet. Acetrum, inquit Plinius, sapore, ignei effectus ac saluberrimum corpori Sinapi, nullâ culturâ prouenit, melius tamen planta tratata. Quin è diuerso vix est fato semel eo liberare locum, quoniam semen cadens protinus viret. Eligere præcipit Diosc. quod non obaridum sit, & fuluum, & adustum: sed quod fractum intrinsecus viride, & velut succulentum sit ac cæsum colore. Tale enim recens esse & in vigore constitutum. Poterò Antiphanes excellere putat Sinapi Cytium: optimum commendat Ægyptium Plinius, probat Alexandrinum Galenus, Pythagoras principatum habere ex his quorum in sublime vis feratur, iudicauit: quoniam non aliud magis in nares & cerebrum penetret.

Sinapi in medicina multæ & magnæ vires: Nam, autore Dioscoride ad calcificandum, attenuandum, attrahendumque efficax est. Commanducatum autem valet ad pituitam capitis eliciendam. At succus ex aqua mulla, contra tonsillarum præduros tumores, veteresque & callosas arteriæ scabritias gargazatu prodest. Ipsum verò Sinapi tritum & naribus admotum sternutamenta ciet. Comitalibus quoque auxiliatur, & vulluz strangulatu oppressas excitat. Quin & les

thargieorum capiti defato illinitur. Ficus autem admixtum & impostum donec rubescat locus, valet ad toxendum cruciatus, lienes, ac in vniuersum ad quemuis diutinum dolorem, cum ex alto in summam cutem quidpiam extrahere est in animo, transfuso scilicet in alteram partem affectu. Alopecius etiam illitum medetur, faciem purgat, & oculorum sigillata tollit, cum melle, adipe, aut cerato. Cum aceto verò, lepræ & setæ impetigines eo perunguntur. Sed & contra febiles circuitus acridum bibitur, polentæ modo potui inpersum. Emplastis quoque extrahendi vi præditus, sique quæ ad ploram faciunt, vtiliter amullectur. Succurrit & auditus grauitati incertiisque sonitibus cum fico tritum, auribusque inditum. Ipsi verò succus cum melle ad oculorum hebetudines generatimque scabritias conuenienter iungitur. Ceterum exprimitur recenti adhuc semine succus, atque ita in Sole siccat. Vnus eius, vt scribit Plinius, etiam pro pulmentario in patillis decoctus, ultra intellectum acrimoniæ. Coquantur & folia sicut reliquorum olerum. Ad serpentium ictus & scorpionum tritum cum aceto illinitur. Fungorum venena discutit. Contra pituitam tenetur in ore mansum capitis pituitam elicit, ἀπορροήματα, Diosc.] donec liquecat, aut gargarizatur cum aqua multa. Ad dentium dolorem manditur. Ad vnam (ad tonsillas, diutiusque & callosas arteriæ scabritias succus mixtus cum multa gargarizatur,] gargarizatur cum aceto & melle. Stomacho vtilissimum contra omnia vitia, pulmonibusque. Excreationes facillè facit in cibo sumptum: datur & suppuriosis. Item comitialibus tepidam cum succo cucumerum. Sternutamentis caput purgat, aluum mollit, menstrua & vrinam ciet. Hydropticis imponitur: Cum fico & Cumino tusum ternis partibus comitiali morbo. Et vuluarum conuersione [strenuato Diosc.] suffocaras excitat odore, aceto misto: item lethargicos.

Calefaci & siccari ordine quarto, Galeno asserere.

Vox (inquit Cornu.) lithanicos, falsò pro retanicos apud Plinium supposita. Nulli enim sunt lithanici, sed retanicos affectio media est inter Opisthotonicorum & Emprosthotonicorum affectionem, utramque complectens: quando distentio aut rigor neruorum, antè & retrorsum contingit.

Symeon Sethi scribit Sinapi vim habere dissoluendi, & discutiendi humiditates quæ in capite & stomacho sunt. Conferre etiam lienis affectibus ab humiditate & flatu procreatis. Item quartanis morbis, qui ex adusta pituita contracti sunt. Ad hæc & podagris à pituita facilis. Officere verò visui, & calido capiti, & iecoti. Adnuare concoctionem & distributionem ciborum crassarum partium. Minuere quæ in ventriculo sunt humiditates. Illitum lepris eas in melius mutare. Linguas etiam humiditate grauatas siccare. Sic cum melle sumatur, tussis resoluitur. Cum caricis verò ischiadici illitum, & lenosis vtile esse: trahere enim quæ intus sunt ad corporis superficiem. Suffitum verò & incensum serpentes fugare.

Sinapi in scorbuto, inquit Marcel. Kitch. Transylv. vtilissimum est. Hinc nauta in magnis navigationibus copiâ Sinapi sese munire solent, eo tanquam præsentissimo prophylactico Theriacæ vrentes. Habet enim vim calfaciendi, extenuandi, dissoluendi & discutiendi humiditates in ventriculo & lienis affectibus, adnuat concoctio-

nem & distributionem ciborum crassarum partium.

Qui ex Tridentino agro in Germaniam multum comportant, auctore Matthiolo, Sinapi albo cadis impostum, & dulcedinem multum, conferunt. Folia (de vulgari Lobel. loquitur) tenera Sinapi in acetaria veniunt.

Quomodo porrò Sinapi ad condituras Salgammorum & ad Embammata præparari debeat docet Columella, in hunc modum. Semen Sinapis diligenter purgatum, & cribrato, deinde aqua frigida eluto, & cum fuerit bene lotum, duabus horis in aqua finito, postea tollito, & manibus expressum in mortarium nouum, aut bene emundatum concitico, & pistillis conterito, cum contritum fuerit, totam intritam ad medium mortarium contrahito, & comprimito manu plena: deinde cum compresseris, suffocato, & compositis paucis carbonibus viuis aquam nitratam affundito, vt omnem amaritudinem eius, & pallorem exaniet: deinde situm mortarium erigito, vt omnis humor eliquetur. Post hoc album acre acetum adicito, & pistillo permilceto, colatoque. Hoc ius ad Rapâ condenda optime facit. Ceterum si velis ad vsum conuiuiorum præparare, cum exanueris Sinapi, nudo eos pineos quam recentissimos, & amyllum adicito, diligenterque conterito in solo aceto. Cetera, vt supra dixi, facito. Hoc Sinapi ad embammata non solum idoneo, sed etiam specioso vteris: nam est candoris eximii, si sit curiosè factum. Hæc ille.

Nostri autem muscum semen nocte maccant aqua, deinde manibus expressum adiecto acetato pilâ rerunt, acerrimo ciborum condimento. Alii per vindemias cum nullo maderit semen conterunt, ita magnam acrimoniæ vim exiit, totoque anno serantur. Nec hodie quicquam huiusmodi ad intinctus vbiq;e cibis frequentius immiscetur, gratissimo obolorum condimento: nihil quoque frigidis diebus magis epulas videtur commendare. Quod si vel assidua consuetudine, vel esu, gratia ciborum exoleat, huius acrimoniæ fastidiosus gustum reuocant, & hoc velut irritamento elanguescentem appetentiam inuitant, quo velut igniculo morosis palatum titillante, vorandi moluntur audientem. Sed huius vis confestim in sublime fertur, vt ex Plinio diximus, nec aliud magis in nares ac cerebrum penetrat. Quare si modus abfuerit, huius odor naribus raptus, statim sternutamenta ciet, & vellicans sensum lachrymas elicit, quod & testatur Columella canens:

Sæpe læssenti sterum factura Sinapis.
Ad dolorem capitis sæpè recurrentem, caput & tempora, cum oleo & Sinapi parato pluries illinit VVirr. Empiricus. Sed aholuere oleum Sinapinum, etsi vbi ad summum excalefacere opus fuerit, maximam opem præstare valeat. Hoc autem non nisi collachrymantibus oculis exprimi potest: tanta enim est vaporis acrimonia, vt concepto vapote illud prodeant lachrymæ. Misceatur quandoque cum eo, quod è pistaceis nucibus elicitur: perungunturque eò genitalia in frigidis, vt felicius coeant, addito Lafere, & Moscho. *Aqua Sinapis* ex herba floreante Iunii principio destillata, pellit vlcera gingiuarum, ore sæpius ex ea colluto. Conducit ad membrorum Phthisim, si sæpius inde fricentur, inde enim vigorem, & carnem recuperant. Medullam ossium calefacit, si sæpius ex ea fricentur, & per se iterum siccantur. Prodest contra frigidum morbum articularum, si inde

Plinius cor-
rigitur.

si inde ficeantur & iterum per se ficeant.

SINAPI SILIQUA LATIVSCVLA GLABRA fem. ruffo, siue vulgare.

Ad cubitos aliquot exteſcit, caule imâ parte hirsuto, ſuperiore glabro, frequenſibus ramiſ brachiato, eoque tereti & ſungoſâ medullâ pleno: ſilia inferiora quidem lata, diſſecta tamen, Rapiſtiſ ſimilia, hirsuta, ſuperiora verò tenuiora & glabra, odore ſi terantur eodem qui in ſemine percipi ſolet: flores Erucæ minoris, & Rapiſtiſ lutei, ex quatuor ſoholis apicibusque mediâ occupantibus compoſiti, quos quatuor ſoliola pallido herba-



ceo colore prædita obuallant, odore ſuaui: hos excipiunt ſiliqua glabra, ſatis breues, Erucæ maioris ſimiles, ſed minores, ex breui pediculo, quæ commiſſurâ ratione, vt in illa, dehiſcunt, ſemina claudentes plâs minùs octo. cùm in Erucâ multò ſint plura, colore minùs obſcuro, & paulò maiorâ, in hoc à Rapiſtiſ ſeminibus diſſerentia, quòd ruſſa ſine nec lucida, cùm illa nigra ſint & nitida, cæterùm Sinapios huius ſemina tenui membrana ſeparantur, cui ordine adhærent, ſapore acci- radix candida, lignoſa, fragilis, ſtrata. Nullus, quod ſciam, bonam iconem exhibuit Sinapi de quo hic agitur, vixque ab aliquo rite deſcriptum videtur: propterea placuit id, & de nouo deſcribere, & depingere.

Brunſel. Sinapi. Cord. in Dioſc. Sinapi hortenſe, herba cum ſemine ſuo omnibus nota. Notat ibidem Geſner. ſatiuum à ſilueſtri culturâ ſolum diſſerre. Fuchſ. Sinapi vulgare omiſit.

Tragus Sinapi ſatiuum, Geſner Senſſ ſam. vnde garten Senſſ mit braunen ſamen. Miror Tragus alioqui Botanicum diligentem nec figurâ nec deſcriptione hoc Sinapi rite deſcripſiſſe aut diſtinxiſſe à Sinapi albo. At quidem Sinapi ſat. à duo genera, quorum vnum ſit ſemine pullo ſeu ſulco, de hoc loquens.

Lacuna proponit plantam Erucæ ſaciæ pro Sinapi primo, & deſcriptionem, quæ mihi non videtur competere Sinapi vulgari, ſed potiùs Erucæ.

Dod. Sinapi hortenſis ſecunda ſpecies. Neoteriſ Sinapi commune, Gallie Senene de lardin, ou Mouſtarde: Germ. Zamer ſenſſ. Belg. ghemlein Moſtaert: Item Sinapi ſilueſtre. Lat. in ſol. Sinapi alterum ſatiuum ex quo condimentum conſicitur, quo ad ciborum intinctus vntur cinnamoni. Item ſilueſtre. Non eſt Dodonæo in hiſt. Gallie. figura pro Sinapi ſecundo ſiue vulgari, in Lat. habet figuram Sinapi albi. Quid per Sinapi ſilueſtr. intelligat neſcimus, niſi etadat ſpontaneum: Is enim ſibi non conſtitit in hiſtor. Gall. proponit figuram Erucæ ſub titulo Sinapi Tom. II.

ſilu. in Latina verò appingit iconem ſilu. Matthioli, figurâ ſanè dux non parum diſſerentes.

Aduerſ. Lob. & Penz. Sinapi ſatiuum Erucæ, aut Rapiſolum, Gall. Senene de meſſique, Germ. Senſſ. Angl. Muſtard & Senbrye. Magis ab eſt Sinapi à Napo vitium acrimoniâ, quàm ſpecie, ſaciæ, vel nomine. Napi enim imite aut vehemens interpretantur, ſiliqua rapacea, ſemine minore, acerrimo, oleoſo. Item p. 63. Sinapi agreſte Apii, aut potiùs Laueris folio, Gall. Senene ſauage, Germ. wilder Senſſ Belg. wilder Moſtaert, rumbus ſemen nigrum penuriam fatini reſarcit, quod oſtendit flores & ſiliquas, ad ſatorum virtutemque riuiolos & depletas foſſas luxuriare ſolent.

Hiſt. Lugd. Sinapi hortenſe cæteris maius & vulgariùs nigrum Galli dicunt, ſiliquæ hirsutæ plenæ ſemine ruſſo, nigreſcente, calido & acri. Malè dicit ſiliquas hirsutas, malè etiam Erucam repræſentantem figuram poſit.

C. Bauh. phyt. Erucæ 8. Sinapi Apii folio: Sinapi gracile Plinio: Sinapi Brunſelſio: Sinapi luteum ſatiuum alterum pullo ſeu ſulco ſemine Trago. Sinapi agreſte Apii aut potiùs Laueris folio Lobeli. In ſemine diſſerentia apparet, aliud enim ſubruffo aliud albo eſt. Item apud Matth. Sinapi 2. Apii folio, gracile Plinio: Sinapi Brunſ. Sinapi ſat. luteum Trago: Sinapi alterum Matthioli, Lac. Cæſalp. Sinapi primum Caſt. Sinapi hortenſe Fuchſii: Dodon. Gall. & eodem in ſolio. Sinapi 2. ſatiuum: Sinapi ſatiuum Lugdun.

Sinapi ſilu. luteum Lonic. Si Erater non tradit locis citatis, Sinapi vulgare ſemine ruſſo, neſcimus vhi cùs meminerit aut quale intelligat, Brunſelſius tanè de vulgari ſcripſit: Tragus meminit eius in deſcriptione, nomine ſemins pulli ſeu fatini, non item cùm in titulo iconis poſuit, Sinapi luteum ſatiuum Cæſalp. ſenſſ. titulus enim hic & icon ſunt Sinapi albo ſemine. Lobeli Sinapi agreſte Apii ſolo deſcriptum in Aduerſ. an huius iungendum neſcimus, niſi dicamus eum intelligere vulgare Sinapi non cultum: figura quam Lob. eo titulo poſuit eſt Sinapi ſemine albo. Vulgare autem Sinapi ſemine albo reperiri non exiſtimamus, quod ſemine eſt albo, ſtaouè diuerſa eſt ſpecies à ruſſo, non colore tantùm, verùm etiam figura. Sinapi luteum Tragi cum vulgari non confundendum. Matthioli figura poſita pro Sinapi 2. non conuenit cum vulgari: Cæſalpini primum eſt vulgare: Lacuna per ſuum Sinapi 2. non intelligit vulgare, nec deſcriptione, nec figura. Fuchſius non tradit Sinapi vulgare: Dodonæo in hiſt. Gall. Sinapi hortenſe eſt album, diuerſum à vulgari, in hiſt. Latina Sinapi vulgare dicitur ei ſecundum, ſed figura non conuenit. Lugdun. hiſt. ſatiuum Sinapi eſt album. Loniceri ſylu. luteum non eſt vulgare, nec deſcriptio nec figura conueniunt, Lonicerus ſuo more omnia confundit. Figuram Sinapi vulgari conuenientem apud nullum Matthiolum, nec per C. Bauh. num actum, nec in cæteris editionibus video.

Conſiderent Lectores an Gerard. lib. 2. c. 9. per Sinapi ſil. Sinapi ſilv. wilde Muſtard intelligat Sinapi vulgare: quam ſi icon non reſpondeat, quam Tabern. poſuerat pro Erucâ paluſtri minori, quæ alioqui parum conuenit cum Sinapi.

Hoc Sinapi obſeruauit Geneuæ, florens Maio & Iunio, Auguſto, Monſpelli, Lugduni, Baſileæ, & aliis locis. Montbelgardi ſemine maturo Iu- Tempus & lio, proueniens etiam in Horto II. E. C. ac alibi Locis non ſatiuum: ſed ex ſemine variis locis ex impro- uiſo delapſo.

SINAPI ALBUM SILIQUA HIRSVTA
femine albo & ruffo.

Descriptio



Radix candida digitata est crassitudine, longitudine palmari, & sesquipedali, multas longas à lateribus fibras obliquas emittens: ex qua carles surgunt aliquot, duos aut tres cubitos alti, crassitudine pollicari, multis alis concavi, hispidi, inanes: siliqua Rapæ profundè linuata, pilis spinulifera supra infraque donata: flores, sua olerentes, Brasiliae, colore luteo: siliqua ex pediculo vicia longiores, asperæ, hirsutæ, in hoc ab Eruca differentes, cui glabræ, in latam cuspidem desinentes, qui excidentibus duabus siliquæ partibus remanet appensus, cum interiecta inembrana lucida, quæ solet separare femina pauca, rotunda, alba vel flavescentia, maiora quàm Erucæ, & Sinapi vulgaris, nec ita actria vt Sinapi vulgare: Sinapiam descriptum reperitur etiam semine ruffo.

Plant. Icon. p. 203. Sinapi agreste Apii aut potius Laueris folio, Lobel. 100. Teut. 241. Figura aliquomodo respondet non item titulus. Brun. Erucæ, (vasser senff) malè nostro iudicio.

Cord. in Diosc. & Zouen, Latini Erucam: Germani weissen senff vocant, quoniam simile per omnia Sinapi sit præterquam semine candido. Gesnerus ibidem ait: Errat Cordus nam quod Sinapi album Germani vocant, omnino Sinapi species est: Huic ad stipulatur Theop. Par. in Anato. viuo. Sinapium pro Erucæ hactenus, sed falsè, accepisti.

Fuchs. Hist. Sinapi primum genus rapitiæ frondem exprimens, flore luteo, semine albo, quod Germ. geelen garten senff nominant, Ic. Sinapi hortense, Zamer senff.

Trag. Sinapi luteum satium, Wäler senff, Zain end garten senff mit weissen Samen. Sinapi albicante semine. Hoc, inquit, quibusdam Erucæ est, Dioscoridi *Hyoscyris*. Atqui vt ingennè dicam, inquit is, quod sentio, ego Erucæ nomen vbiçque offendo, de Rucula, Germ. Naüsch, & non de albo Sinapi intelligo, neque quid hac in re Seplasiarii & Doctores ipsorum pronunciant, magnoperè sollicitus sum.

Lacuna. Sinapi secundum, foliis Raphani patulè minoribus, floribus luteis, siliquis hirsutis, semine albo, pharmacopæi interdum confundunt hoc Sinapi cum Erucæ. Quod in Pharmacopæis culpata Lacuna, ei euenit, confundit Sinapi cum Erucæ, vt suis dicitur locis. Figura quam ponit quadrat descriptioni, & in eo melius quàm Matthioli dicitur.

Lacuna.

Matth. Sinapi tertium: & ipsum satium est, se-

mine albo, minusque acti. In post. com. Italidem tradit, addens hoc semen dici *Rocheta*. Figura Sinapi albi est apud Matthiolum posita pro Sinapi 2. is non videtur agnouisse discrimen inter Sinapi & Erucam. In hist. Germ. in descriptionibus omnia confundit, in descriptione primi Sinapi, meminit siliquatam hirsutam quod nostro Sinapi albo competit, verùm eiusmodi siliquæ hirsutæ sunt in figura Sinapi eius secundi. Descriptio ibi nulla quæ in omnibus conueniat cum Sinapi vulgari semine ruffo, nec figura posita pro Sinapi tertio respondet Sinapi semine albo.

Idem in Epit. cum addit. Cam. Sinapi alterum Græcis *σινάπι* *λευκόν*. Italis *Senape*, siue *Senaura saluatico*: Germ. *Wäler Senff*. Cornicula ei hirsuta. Item Sinapi tertium. Italis *Sinape bianca* siue *Rocheta*: Gallis *Mouffarde blanche*. Semine est albo.

Ex epitome Matthioli apparet, cum confundere Sinapi genera & eorum nomina: Camerarius omnia figura Matthioli aliam ponit pro tertio Sinapi huc non pertinentem, est enim Erucæ siliqua repentis. Effigies à Camerario ad hist. Germ. posita quæ mutata, pro secundo cum siliqua hirsuta non displicet pro Sinapi albo, ac melius placet quàm Patrocinatoris, qui glabram appinxit. Sinapi illud, ait idem Matth. quod cum folio, tunc etiam semine tenui nascitur; erraticum est. Item in post. edit. cum Additamentis C. Bauhini. Erraticum folia habet tenuiora plura ex vno tanusculo prodeuntia, caulem rectum, firmum, asperum, hirsutumque, à medio ramosum: corniculis numerosis atque hirsutis. Nascitur locis incultis, in campestribus & inter iudera. Possit quæ existimare Matthiolum per Erraticum Sinapi intelligere non cultum, si non diceret corniculis hirsutis, præterea figura posita pro Sinapi primo Erucam potius denotat, præterea tam en figuris notis Glossatoris & Patrocinatoris Matthioli, qui siliquas hirsutas appinxere quæ non sunt hirsutæ, nec in Erucæ, nec in Sinapi vulgari semine subrustico. Icon à Matthiolo posita pro Sinapi 2. non conuenit cum vulgari, sed est Sinapi semine luteo siue albo, eadè cum Tragi & Fuchsi figura. Matth. in Hist. Germ. Sinapi primum, *Garten senff*. Rapis simile, flore luteo, siliquæ hirsutæ in quo semen Schwarz; roris; id est subrustum, Rapotum semini simile. Secundum Sinapi hortense, non ita altè crescit, foliis Sinapi similibus, flores interdum albi interdum lutei; semen *rörleechter*; id est, rubellum. Sinapi silu. prouenit in agris flore luteo, satium simile nisi minus semen *Korshwartz* subrustum. Matthioli. in sua hist. Germ. omnia obscuriora reddit: mutato ordine in descriptione & non in figuris, prima enim est quæ Erucæ similis, cui Camerari. in histor. German. & Epit. & C. Bauhinus addiderunt siliquas hirsutas: prius Sinapi conuenit cum vulgari si non diceret siliquis hirsutis: postea & siluestre aliquomodo quadrare cum non culco Sinapi. Secundum Sinapi satium quod referendum non videmus, consilia descriptio videtur: Figura respondet Sinapi albo.

Aduert. Lobel. & Penz Sinapi alterum satium Gallis *Senape blanc*: Belgis *Wyrt môsaert*: Germ. *Weisser senff*. Existimo Lobelio non fuisse notas differentias Sinapi, nec sciuisse quid esset Sinapi album: figura quam exhibet Obs. & Tepl. pro Sinapi agresti, Apii aut potius Laueris folio Adu. p. 63. aliquatenus conuenit nostro Sinapi albo, non item titulus. Cesalp. Sinapi 1. folio Rapæ, stoliculis luteis; siliqua breui, semine luteo. Sinapi; folio

folio Erucæ, floribus luteis, siliquis in latera incli-
natis, seminibus ex flauo candicantibus maiuscu-
lis, vulgò Rucum vocant.

Lonicet. Sinapi. Gelber Garten senff. Item
Weiß garten senff oder Zame Kanten: Euzo-
mos: Lar. Eruca. Confundit Lonicerus suo more
Sinapi album cum Erucæ: ac Sinapi albi duas pro-
ponit figuras ignorans quid scribat.

Dodon. Gall. Sinapi hortense. Sinapi album,
αὐτὸν κηράριον. In Officinis Belgicis Eruca. Gall. Sene-
ue blanc. Germ. Weisser senff / Belg. Wit Mostaert.
Item hist. in fol. Sinapi satuum prius in descrip-
tione, in figura Sinapi Satuum alterum. Sinapi
fatiui semè quod luteum & maius Belgii Officina
pro Erucæ semine exponunt: vulgò tamen Wit
mostaert sāt nominatur. Melius Dod. in hist. Gall.
posuit iconem, quàm in Latina, vbi pro hoc Sina-
pi ponit figuram demonstrantem potius Erucam,
& ea Icon quæ huic Sinapi conueniebat ma-
iò ponitur pro Sinapi fatiuo altero.

C. Bauh. Phyt. Eruca 7. Sinapi tapi folio, luteo
semine, sortè Diosc. & Theophr. alterum Plinii:
Sinapi primum Matthioli lib. 2. cap. 148. Sinapi fa-
tiuum Erucæ aut Rapi folio Lobel. Obs. p. 100. &
Icon. p. 202. Item apud Matth. Sinapi Rapi folio,
luteo semine, & Sinapi alterum Plinii. Sinapi. r.
Math. Lacun. Cæsalp. Sinapi Matth. in Ic. Gesn.
hort. Cast. Sinapi 2. species Dodon. Gal. Sinapi fa-
tiuua. fol. Sinapi hortense luteum Lonic. Sinapi
hortense Cordo in Diosc. Lugd. Sinapi fatiuum
Erucæ aut Rapi folio Lob. *Dioscorides dicit* Sinapi
eligendum valdè rufum, is ergo album vel luteum
non intelligit: cur hoc potius sit Theophrasti non
videmus: nec etiam cur Plinii alterum Rapii
fronde, id enim magis conuenit vulgari: Cur
Matthioli primum dicatur non animaduertimus,
quod Matthioli non tradit primo loco non dicitur
semine luteo vel albo: figura etiam posita pro Sina-
pi primo potius Erucam demonstrat. Nostrum
verò album in descriptione est tertium, & inter
figuras Sinapi. 2. Lacunæ quoque non est pri-
mum: pro eo enim posuit figuram Erucam refe-
rentem, descriptione autem quid tradat nescio,
puto cum confundere Sinapi cum Erucæ. Sinapi
verò semine luteo vel albo proponitur à Lacuna
pro secundo. Cæsalpino non est primum sed ter-
tium semine ex flauo candicante, eius enim pri-
mum est nostrum vulgare. Apud Gesnerum non
primum putat, sed illud Sinapi quod candicat.
Dodonæo in hist. Gal. non est secundum sed pri-
mum. In hist. Lat. Quidem est primum quoad
descriptionem: quoad figuram verò alterum. Icon
quæ posita pro primo, potius Erucam refert, quàm
Sinapi nostrum luteum siue album. Loniceri
luteum esse concedimus. Cordum per Sinapi
existimamus intelligere vulgare, non hoc de quo
hic agimus. Lugdunensium Sinapi hortense est
semine rufo nigrescente: ergo non huic conuenit
descriptio, nec etiam figura quæ Erucam imita-
tur. Sinapi verò nostrum album exhibet pro Sina-
pi fatiuo semine. Quod Lobelius ponit in Obs.
pro Sinapi fatiuo, non potest esse hoc, id constat
ex Adu. p. 67. & 68. vbi dicitur vulgare: figura
etiam à Lobelio posita non conuenit, quæ prius
Erucæ similis.

Getard. Sinapi fatiuum Garden Moulard.
Malè pro Sinapi albo ponit iconem Barbareæ
maris Tabern.
Sinapi album siliquâ hirsutâ habebam Gene-
uæ in horto semine maturo Iulio, hoc etiam colo
Montebaldardi in horto Ill. E. C. V. vbi ex se-
mine deciduo iterum viret Augusto. Semine
Tom. II.

ruffo semel tantum obseruavi, nempe Aono
1600. in horto prædicto, vnde nactus fuerim non
recordor.

SINAPI ERYSIMO TRAGI COGNATVM
siue simile.

Urbitalis est planta, radice nixa, crassiusculâ
Candida, paucis fibris donata. Cauliculos sur-
rigit pedales, cubitales, altiores, teretes, cana &
mollicella lanugine pubescentes, in ramos lon-
gos diuincatos: *Folia* inferna Erysimi Tragi, pro-
fundis laciniis diuisa: *superna* angustiora, sagittæ



minoris instar
alata, paucis
aut nullis laci-
niis dissecta.
Per cauliculo-
rum extremita-
ex pediculis
flores prodeunt
lutei quadri-
folii, Erysimi
prædicti flori-
bus maiorés.
Quibus siliquæ
etiam longio-
res succedunt
trientales serè,
angustæ, tere-
tes, caulibus
non appressæ:
semen conti-
nentes exi-
guum, sulcatum,
acre.

In Austria secus vias obseruata & lecta à D. A.
genio Botanico egregio & medico insigni Ar-
gentinæ. *Locus:*

Matth. Sinapi 3. Idem in com. cum magnis fig.
& editione vluma cum addit. C. Bauhini. In hist.
Germ. wilber senff. Sinapi silu. *Mhi* non bene
constat quam plantam exprimat Math. icone
proposita, pro Sinapi tertio: quia eius tertium
in com. quoad descriptionem attinet, est no-
strum Sinapi semine luteo siue albo.

An Lobel. & Pena Aduert. Sinapi silu. minus I.
rionis veri folio aut Bursa pastoris, atidis locis
intra margines & rudera, prope vrbes nascitur,
foliis laciniosis, admodum Bursa pastoris simili-
bus, sed acutioribus, minutioribusque laciniis:
Vmbellofi flores & siliquæ secundum summita-
tes Iriionis Diacot. caulis pedalis, sed tota planta
gustu Sinapi seruid. siua.

An Lobel. Obs. & Icon. Pl. Teut. 244. Sinapi
siluestre minus Bursa pastoris folio, Hist. *Moskæ*.
za siluage. Aduert. pag. 68. Lobelius assumpsit fi-
guram Matthioli.

C. Bauh. phyt. Eruca 9. Sinapi bursa folio, Erucæ
siue Rucula marina minor, & Sinapi 9. Tra-
go p. 103, lib. 1. cap. 32. Sinapi silu. minus, Bursa pa-
storis folio, Lob. Obs. p. 101. & Icon. p. 203. Luteo
& albo flore est. Item Erysimum 2. siue siliqua Erucæ?
Cur Erucam Tragi hic ponat nescio, ea enim
eadem est cum sua Erucæ: siue luteo flore, quæ
non respondet Lobelii Sinapi, vnde colligit luteo
& albo flore.

Hist. Lugd. Sinapi silu. Sinapi tertium Matthioli
erraticum quod Lob. & Pena appellant Sinapi
siluestre minus Bursa pastoris folio.

Dodon. in fol. Sinapi siluestre. Figura est Mat-
thioli, an respondeat eius descriptioni nescio.

Tabern. hist. & Icon. Weygenff. Erysimon 2.
Gerard. Angl. Erucæ sativæ nomine proponit
Iconem Tabern. sed malè.

SINAPI SYLVESTRE MONSPESSVLANUM
ramiato folio, flosculo luteo minuto,
siliqua longissima

Descriptio **P**er huius *caulis* sesquipedales, non nihil stric-
tos, teretes, fide, & solidos, *folia* conspicuntur
Denariis Leonis foliis respondentia tum ma-
gnitudine tum laciniarum diversitate, glabra aut nul-
lis ceræ. sicut dignis pilis donata, odore & sapore
acri prædita: *flores* lutei, parvi: *siliqua* dein o-

Locus &
Tempus.



tuntur densis-
sime & longis-
sime, admo-
dum acri femi-
ne referta.
An Catalp. I-
rionis species
altera amplior.
Hinc eandem
plantam aut fal-
tem v. l. d. simi-
lem attulit mihi
Frater ex horto
Paravino nomi-
nare Erysimi.
Floret & sili-
quas fert circa
Monspelum
mense Martio
locis siccis.

SINAPI MONSPESSVLANVM SILIQUA
aspera hirsuta.



Descriptio **S**tatim è ra-
dice lignosa
folia exeunt fre-
quentia, similia
forè Erucæ mi-
noris foliis, a-
cria: interque
hæc *caulis* ali-
quot palmares
aut etiam cubi-
tales, in rami-
los aliquot di-
uisi: *floribus* Si-
napeos luteis,
parvis, decidu-
tis *siliqua*
succedunt, cre-
bræ, vnciam lō-
gæ, teretes, as-
peræ, aliquæ
secundum cau-
les ramòve as-

pendentes, alie longè ab iis abscedentes & velu-
tu rectà foras proter sa *semen* claudentes minutis-
simum, saturatè influm.

C. Bauh. Phyt. Erucæ 15. siue Sinapi paruum sili-
quâ aspectu Fratus Io. Bauhini.

Mense Autumnno inveni inter Monspelum & Montem Esperon: nos paruum obseruauimus, Locus & Tempus
magnum obseruauit. Genet. Chertlens in vdis
fossulis inter Monspelum & Themas Bellelu-
canas.

SINAPI CLNEVENSE SYLVESTRE

Descriptio



Ita appello
spontaneum
quoddam Sina-
pi Generæ à
me obseruatū,
cui ex radice
simplici alba,
hirsute, multa
stetim ex-
coarctat *cau-
les* propter ter-
ram non nihil
hirsuti, ramosi:
per quos *folia*
Erucæ similia,
diuisurâ non
minùs frequen-
ti dissecta, ve-
rùm latitudine
Monspellulano
maiori ceden-
tia, diuisurâ e-

nam diuerti: cui èt *flores* Monspellulani floribus
sint maiores: *siliquæ* ex pediculo mediocriter
longo graciles, tres vncios longæ, *semen* bipaten-
tibus & alius claudunt tenuissimum rufum.

Idem forte est quod vidi apud Dominum Jac-
cobum Zwinggerum in horto flore luteo, foliis
tamen multò maioribus, cuius èt forè id cau-
sante.

SINAPI ECHINATVM.



Descriptio **S**icutibus
Sinapi fami-
liare est Sina-
pi Echinatum, cui
caulis sesqui-
cubitalis, teres
asper & pilis
rubris hirsu-
tus, multis alis
concauus: *folia*
ad Cichoreæ
sylvestris folia
accedunt, siue
Hedypnoïdis,
vel Hieracii,
interdum eius-
dem magni-
tudinis, aliàs ma-
iora: *flores* per
ramos copiosi,
Erucæ floribus

similes lutei, è quatuor foliolis compositi: quos
excipiunt *siliqua* breuissima, trientem pollicis vix
æquantes, sed crassæ, & quatuor costis cristatis,
in medio lacuna donatis pinnatæ, *semen* conti-
nentes. Hæc herba actimoniam non caret.

C. Bauh. Erucæ 15. siue echinata siliqua.
Hist. Lugd. Sinapi echinatum.

An Catalp. Sylvestris Rapa, de qua scribit
spontè in aquis nascitur: radice non crassa, nec
rotunda

rotunda, sed tenuis, & longa; vt Raphani syluestris: foliis Rapæ minoribus, hirsutioribus, similiter angulosis: caule breui, ramoso: floribus aureis, capitulis Fabæ magnitudine, angulosis: inus olesum quid continetur: vnico semine ob siliquæ breuitatem. Mihi omnia videntur conuenire cum Sinapi Echinato, quamuis Frater ex silu. Cæsalp. Rapa faciat Matth. Rapum silu. verum descriptio capitulorum sem. Cæsalp. non conuenit cum siliquis egregiè à Matthiolo pictis.

Floret in segetibus circa Monsesulium, mensis Martio, Aprilis & Septembri.

ERUCA MAIOR SATIVA ANNUA
flore albo striato.

CAP. X.

Alba, lignosa, tenui radice donata, saporis acri: caulibus subhirsutis cubitalibus & sesquicubitalibus: foliis Sinapi albi, minora, teretia, glabra, eiusdem cum radice saporis: flores quadriflori, è caruleo albidis, stribus nigricantibus pictis, quales Sinapi albo agresti Trago, ex calycibus hirsutis, siliqua ex breuibus pediculis glabræ, quales in Sinapi siluâ glabrâ, sed longiores à lateribus se apertientes: per membranam distinctæ, cui adherent multa semina flaua, maiora quam Sinapi iam dicto, minus etiam rotunda.

Theophr. Eruca meminit sativæ inter olera, cui tribuit radicem ligo-lam.

Dioscorides Erucam [ita enim Eruca græcè vocatur] domesticum non describit.

Plinius de Eruca inquit, tantam inesse in condiendis obsoniis suavitatem, vt Græci Erucam appellauerint.

Cord. Hist. Erucula



maior, cuius comoda descriptio. Gesnerus addidit figuram ex Trago. Trag. Eruca siue Rucula marina maior, Graefrauchen / Sinapi 8. Fuchsius huius figuram habet pro Sinapi altero genere, cuius etiam descriptio non malè quadrat: vocat Germanicè weissen garten senff, ait etiam eo loco perperam eos agere qui altero genere Sinapi pro Eruca vtuntur. Considerent autem Lectores an ritè distinguat Erucam à Sinapi. Is enim cap. 100. huius iconem iterum habet nomine Erucæ silu. & wilder weissen senff, vt etiam in Iconum libro. Huius tamen descriptio Erucæ silu. nullo modo conuenit.

Apollin. Weiss senff. Pro eo pingere videtur Erucam satiuam, an eam intelligat nescio. Ar guill. Eruca Dioscoridi Ibericè dicta syluestris.

Matthiel. in Dioscorid. pingit titulo Erucæ sativæ, cuius in com. Ital. post. aliam habet figuram, ac eadem tradit. Idem rursus eandem Tom. II.

habet figuram sub titulo Sinapi primi: quod in textu vocat Sinapi satiuum tertium. In post. quoque com. Italicis cap. 142. eandem tenet figuram quam olim habebat pro Sinapi primo, ac addit, Sinapi tertium vocant Erucam. Item. In hist. Germ. Weiss garten senff oder Kautsem. Eruca sativa. Idem etiam Erucæ figuram habet hoc titulo Gelber aut Roter Senff / Sinapi. Matthiolus mirè confundit historiam Sinapi albi cum Eruca maiore, vt & aliorum Sinapi generum cum Erucis, vt nullus se ex eo extirpare possit.

Si apud Matth. in Epit. & addit. Camer. sementinus pingeretur, & nihil hirsuti in siliqua, figura benè placeret: præterea figura posita pro Sinapi. Erucam melius refert quam Sinapi. Glossator & Pattocinator Matthioli pro Sinapi primo Matthioli figuram ponunt accedentem ad Erucam, sed non conuenit siliqua hirsuta apposta, neque Sinapi neque Erucæ.

Lonic. Weiss wilder Senff oder Wilde Rau. Lonicer nit. Erucæ Sinapi silu. album, siue Eruca syluestris. Stirpium imperitus Lonicerus Erucam à Sinapi non nouit distinguere.

Dodon. Gall. Sinapi silu. Sennefauage. Item alibi Eruca Romana, Roquette Romaine, Rooschê Kautsem. Lat. in fol. Eruca sativa, flosculi subul- Dodon lapsi. Non existimo Dodonæo notam Erucam satiuam, quia eius figuram posuit in hist. Gall. pro Sinapi silu. licet non respondeat descriptioni eius Sinapi silu. Erucam Romanam non absolutè describit, nec figuram apponit. In hist. Lat. Laudabilem figuram habet: sed non benè tribuit flores luteos: Præterea p. 694. pro Sinapi satiuo priore figuram habet multum accedentem ad Erucam satiuam flore albo, quæ non respondet descriptioni quam ibi ponit Sinapi satiuo prioris.

Lætin. Eruca sativa, flores lutei. Quamuis Lætinus cura ponat figuram Erucæ, existimo nihilominus ei incongnitam, quia tribuit flores luteos: præterea similem serè figuram ponit pro Sinapi primo: in descriptione dicit Sinapi habere flores albicantes cum forma crucis, quæ Erucæ videntur competere: vt verum fatear, puto illum confudere Erucam cum Sinapi.

Gesnero passim Eruca, Eruca flore albo. Erucæ hortensis.

Dorsth. Eruca sativa sermè similis vero Sinapi.

Camer hort Eruca maior.

Brunsel. & Cæsalp. Eruca.

Lobel. & Pena Adm. Erucæ sativæ duplicis meminere, quæque illis Eruca nostras dicitur vulgaris notissima, eam cum Hispanica comparauerunt, tanquam ex qua hæc facillimè percipiatur. Lob.

Obs. Eruca sativa, Erysimum Gesneri. Miror si nota fuerit vulgaris cur non demonstrant discrimen in colore floris in signe: tribunt enim Hispanicæ colorem luteum: nec video cur in Obs. posita huius Erucæ figura ex Matthiolo desumpta sub titulo Sinapi satiuo Erucæ aut Rapi folio, Adu. pag. 67. Hisp. Mostaza. Figura posita pro Eruca sativa demonstrat nostram vulgarem: apud Gesnerum per Erysimum, intelligo Erucam perennem flore luteo cultam. Plant. Icon. sativa. Lob. 101. Teut. 242. Apud Plantinum p. 202. est etiam alia figura ex Matthiolo malè posita pro Sinapi satiuo Erucæ aut Rapi folio Lobel. 109. Teut. 241.

Hist. Lugd. Eruca sativa. Similem figuram Erucæ habet Hist. Lugd. sub titulo Sinapi Hortensis, quæ non respondet descriptioni.

Nec placet Gerardum iconem altetius plantæ assumere ex Tabern. pro Eruca sativa.

Cccc

C. Bauh. pbyt. Eruca r. Eruca latifolia alba sativa Diosc. Idem apud Matth. Eruca Cordo Dioscor. Celsipino Eruca. Cordus olim apud Dioscorper Erucam intelligere videbatur Sinapi album, quemadmodum etiam vult ibidem Gesnerus.

Nomina
linguarum.

Erucæ Græcis: Eruca Romanis: Ægyptiis Erhretice: Afiris Afiris nomenclatur: Arab. Isgir, Ergir, seu gargar: Germ. Naischen, Belg. Nochet/ Nafette, Gall. Roquette, Ital. Ruchetta & Rucola: Hisp. Oruga & Aruga. Hæc autem nostras Germ. Groß Naischen: Trago wetsch senff, Belg. Noomsche Naischen/ Aigl. Great Koeck. Boh. Byhr horeice.

Erucæ dictum voluit, quod iura commendet, habeatque peculiarem in eis gratiam: quod dixit Plinius, in condiendis obsonis tanta est Eruca suauitas, ut Græci Erucæ appellauerint: Erucam verò, quod erodat: nam si degustaueris, os & linguam satis acriter vellicabit: Alii sic appellatam putant, quod vrendi licentiam nanciscatur, quasi dicas Vrucam, ut in e. versâ litera. Est etiam Eruca apud Latinos bestiola, quæ Græcis Campe dicitur. Weis senff vocant nostri (ait Cornar.) quasi dicas Sinapi album, eod quod silu. maximè Eruca semine, Hispani pro Sinapi vtantur. Quibus em conuiss Poëta hanc adornant, infra de viribus patebit. Theophr. meminit Erucam satiuam celerimè procuresse, Columella.

Erucæ salax secundo prouenit horro.

Plinius Æstate & Hyeme facillimè nasci, frigitum præcipuè contemptricem esse.

Frigitum
contemp-
trix
Locus &
tempus.

Erucam maiorem satiuam vidi Monspensili, Lugduni, Basilea, & Genæ in hortis florentem Nouembri, & tota hyeme virentem. Mont. belgardun horro E. C. vbi à me facta ex semine decido se renouat. Veronæ, florentem Martio obsecruauit. Nemausi studiosè colli à quibusdam obseruauit Gener I. Henr. Cherlerus, qui memores (vt illimet referunt) versus illius:

Exiit ad Venerem, arid. s Eruca maritima.

Vires.

Cruda Eruca, vt scribit Diosc. cotum largiore cibo concitat: ac ipsius quoque semen euilem est effectus. Vrinæ mouet, concoctionem iuuat, aluòque est accommodata. Semine in condiendis obsonis vtuntur: quod vti dicitur perennet, aceto lacte subaerum in pastillos digerunt, atque ita reponunt. Erucæ salutem & vsum medicum, Plinius explicat his verbis. Ducta est quàm Lactuca natura, conciliatrix Veneris: idcirco iungitur illi ferè in cibus, vt nimio frigori par feruor immixtus temperamentum æquet. Et alio in loco. Erucæ semen Scorpionum venenis & muris aranei medetur. Bestiolas omnes innascentes corpori ardet, Vita cutis in facie cum melle illitum: lentiginis ex aceto. Cicatrices nigras reducit ad candorem cum felle bubulo. Anunt verbera subituris potum in cibo, duritiam quandam contra sensum inducet. Putant suberita Erucâ si fricentur oculi, claritatem restitui. Tussim infantium sedari. Radix et us in aqua decocta fracta ossa extrahit: Tria sola siluestris Erucæ sinistra manu decerpita, & uita in aqua mulla si bibantur, regio morbo medetur. Galenus quoque scribit hoc olus mansuissimè calefacere: quare solum ipsum mandere, nisi Lactucæ foliis miscetur, non esse facile. Semen autem generare, & coëundi appetentiam excitare. Capiti etiam dolorem inferre, præsertim si quis ipso solo vescatur. Non solum autem supradictorum arthrorum, sed Poëtarum etiam testimonio Eruca stimulantæ Veneri rata videtur. Martialis.

Reuocans
Venerem

Et Venerem reuocans Eruca dicitur autem:

Columella:

Et que frugifero scribitur vicina Priape,
Exiit et Veneris arbor Eruca maritima.
Salacem Ouidius nominauit:
Nec nimis Erucas inbeo vitare salaces,
Item Lam. Lyppius 2.

Deuorat Erucas, qui cupit esse solax.

Folius, vt auctor est Martholus, coëctis, additòque Saccharo, tussibus pueris propinatur iulculum, quod tussim sedat, semen contusum ex vino potum, lumbicos interimit, timentem lienem inuit. Folia contusi palpebris imposita, visum acuant: semen cum melle mistum, maculas omnes & nauios faciei illitu tollit, efficacius verò addito felle vaccino aut bouino. Ossium fragmenta extrahit radix in aqua decocta & imposita. Ego præfero folia radiei quicquid scribat Matthiolus. Sunt qui pro certo, inquit Camerarius, afferant multos se annos ab apoplexia & eiusmodi affectibus immunes præstitisse puluere ex Erucæ & Cymini partibus æquahbus.

ERVCA ROMANA SEV GENTILIS SILL.
quâ argustâ, folio lato.

Notimberga à Domino Doldio pro Erucâ Romana seu gentili quotundam accepi herbam nostræ Erucæ, flore albo similem, foliis lauis, & caulis hirsutus, siliqua duertæ admodum, sunt enim tenues valdè & longæ, flores in sicca albicanti.



De ea scribit Doldius: Est & Eruca alia ab Anglicana in horro Cameratii, latiore folio rugosiorque, Verberæ lupinæ quoad inferiora similior, sed floribus albis, annua, quam Romanam vocant, an sit dubito, facerem hanc eandem cum Hispanica Lobelii si siliquæ non impedirent.

ERVCA SATIVA HISPANICA MAIOR
flore luteo.

Sativa dicitur cibus gratiores & nobiliores: Maior Hispanica vocata, à nostrau maioribus foliis silymbrii & femine nigro, floribus luteis, corniculo Sinapi maiore distat: hæc qua in condimentis lautior, vel ad Venerem vegetior eratis Gentilis vulgò vocata fuit: quo vocabulo Hispanica & Itala gens designat quamlibet rem aptam reddere hominem lautum. Monachi in Magalona insula maris Narbonensis, huius Gentilis Erucæ semine à Fatre quodam Hispano donati, quotannis hocce serbant & in mensis cuiuslibet vel maximo gula inuitamento vel blandimento præ-

Defertur

ferabant. Non eget vtriusq; fufioris descriptionis, quum vulgaris fit notiffima, & ex illa facillimè percipiatur Hispanica, Lobelius.

Lobel. & Pena Adu. Eruca maior sine Hispanica & Gentilis. Miror non demonstrari discrimen infigne in floribus: qui vulgari non lutei, feminum etiam color diuersus: eandem hanc facerem Erucam cum Romana descripta si filiquæ non impedirent: Monspelienfes Monachi hanc non habebant in hortis, quod animaduertirim: sed vulgarem præcedentem flore albo striato.

Magalonæ in monasterio nostro tempore, inquit Lobelius, supererat copiosissima Eruca.

ERVCA ANGLICA FOLIIS LATIS, FLO-
ribus minutis luteis filiquis striatiff.

ERUCA Anglica foliis latis, similibus Verbenacæ vulgò dictæ, sed laticus virentibus: floribus minutis luteis & paruum relinquentibus post se semen in striatiffimis filiquis, Camerarius.

Camer. hort. Eruca tertia Anglica.

C. Bauh. phyt. Eruca 2. siue latifolia Anglica.

ERVCA TENNIFOLIA PERENNIS
flore luteo.



Sylvestris E. Eruca radice alba, crassa, latis longa, ex qua multi procedunt caules, crebris alis. coccui, striati, parura hirsuti: folia crebris incisuris Dentis Leonis, aut argutioribus triaracii minoris diuisa, aliis Nasturtii, cuius etiam folia colore atrouitente & glabro imitantur, sapore feruido Satiuarum: & flores,

sed colore præditi luteo, serie simili dispositos gerit odoratos: filiquis succedentibus longis, angulosis.

Icon nostra quæ ex Fuchsio, in quibusdam non placet: & multò minus Lobelii & Camerarii Erucæ sylvestris quæ videtur potius conuenire cum Eruca nostra inodora.

Diosc. ἡ Ἰβερικὴ ἔρως [Erucam silu.] nominat, dicitque maximè in Iberia, quæ Occidentem spectet, nasci. Sed de silu. Eruca tam ex Diosc. quàm ex Plinio vide plura inter vires.

Fuch. Hist. Eruca hortensis seu satua: In Iconibus vocat etiam Erucam satiuam Zamer weisser senff.

Dodon. Eruca satua & bortenfis, Belgicè Wilde Kaffete. Lat. in fol. Eruca silu. Eruca siue Rucula marina minor, Flein raucken. Sinapi nonum.

Math. (qui figuram solam sine descriptione proponit) Camer. in eiusdem Epir. Lob. & Pena Adu. Obs. Ic. Plant. Teut. p. 144. & Lacune, Eruca sylvestris.

Anguill. Eruca in Italia Rucola & Ruchetta.

Gesner. hort. Eruca flore luteo, Erysimon hortense puto. Syluestris Eruca ab hoc Erysimone genere differre non videtur, Eruca syluestris Carolo Stephano. Item in car. plant. Erysimum, apud Italos Nobilis Eruca: *Erucæ generatiua.*

Hist. Lugd. Eruca silu. Et alibi Erysimum verum. Lugd. Hist. duas figuras vnus herba mihi videtur habere, prior est ex Matthiolo sine descriptione, altera est noua.

Carsalp. Eruca altera fruticosâ.

Lonic. Wasser senff/Sinapi aquaticum. Figura quæ apud Lonicerum est, conuenit cum Tragi Eruca, verùm non nouum Lonicerò sine iudicio de plantis scribere.

Tabern. Icon. & hist. Eruca silu. Wilde Rau-
sen/Wilder Weisser senff. Si Compilator intellexit vulgò dictam Erucam silu. vt omnia indicare videntur, indistinctè dicit suæ priori valdè similitudinè nulla facta coloris mentione, in primo enim dixit coloris esse albi, vulgaris autem est lutei: figura præterea non placet, quæ potius conuenit Erucæ nostræ inodoræ.

Gerard. Iconem habet Tabern. dicens, Eruca silu. flore luteo.

C. Bauh. Phyt. Eruca 2. siue flore luteo maior sylu. an Diosc. syluestris? Item apud Matth. Eruca maior syluestris Matthioli, Eruca sylu. Cur Erucam Tragi minorem siue eius Sinapi nonum ab hac separet & ponat nono loco sub Sinapi Bursa folio, nescio. Non placet cum assumpsisse figuram Tabernamontani.

Eruca tenui folia perennis flore luteo, siue syluestris Græcè ἡ Ἰβερικὴ ἔρως, Germ. Wilder senff/wilde ranschen, Flin Raucken, Wilde Kaffete. Gall. petite Roquette & Roquette sauvage. Ital. Ruchetta gentile & Rucola saluatica, Flisp. Oruga sylu. Angl. Wilde Rocter.

Passim prouenit circa muros & in muris acru-
denibus, flores Geneuæ adhuc copiosè mense Nouembri: Lueduni & Monspelluli Martio & Februario. Basileæ in hortis Iulio & Augusto. Montbelgardi à me facta in hortulo nico, ac etiam in Horto E. C. muros occupauit, in quibus durat, & præterea semine deciduo se multiplicat, hiemeque paritur, floret Iulio & Augusto.

Syluestris Eruca semine tradit Diosc. Ibericæ incolæ, maximè qui Occidentem spectent, pro Sinapi vti, esse potèrò, quàm satua, ad mouendam vrinam efficaciorè, & multò acriorè, quod facillè crediderim, siquidem feruido magis est saporè. Sed hæc contra mentem Dioscoridis sentire videtur Mæth. vt qui omnia ea, quæ de satua, siue priore Eruca à nobis tradita sunt, efficacius præstare scripserit. Magis, inquit, excalfacit, siccitatenuat, aperit, incidit, extrahit, extergit, pronocat, quàm satua, valentiùs tamen. Cocta & denorata infantium tussi medetur, addito saccharo. Proditum adhæc tria silu. Erucæ folia, sinistra manu decerpta, illicoque denorata, auriginosos sanguis, quo nolim vti remedio, quia superfluitiosum & vanum existimo.

ERVCA SYLV. ANGVSTIFOLIA
flore luteo.

Promit inflexis cubitalibus canaliculis flores luteos Erucæ syluestris. Cornicula filiquarum Sinapi sunt aut Nasturtii syluestris, vbi seminis acre, vti folia angustiora, Erucæ syluestris conco-



Eruca siluestris angustifolia.

loria, sed minime diuisa, Taracosis ferè paria, quæ Erucam aut Trionem sapient, quibus idcirco affinis natura putatur. In horto Coldembergii nostri (inquit Lobel. Obs.) non vulgus peritæ viti oritur.

Lobel. Obs. & Icon. Pl. Eruca silv. angustifolia.

C. Bauhin. Phyt. Eruca 14. siue angustifolia.

Hist. Lugd.

ERVCA MINIMO FLORE
Montpel.



Hanc nos Montpelu florentem circa Aestatem in quibusdam muris obseruauimus: folijs accedit ad Erucam luteam siluestrem, quæ in nostra iconone non bene in acumen desinunt: Flores sunt minimi lutei: siliqua vnciam longa.

ERVCA INODORA.

Descriptio



Eruca inodora mihi dicta, longa vitur radice, simplice, cum paucis fibris lignescente, satis gracili: caulis cubitum æquat ramosus: folia didantalia ferè, Erucæ luteæ silv. cultæ, quodammodo diuisa, quæquam inferiora lacobæ penè modo lateant: flores ex luteo pal-

lidi, quatuor foliolis constant: siliqua, vncias duas longæ graciles. Nullum ego in hac plantâ siue odorem siue saporem insignem animaduerti.

Tabern. hist. & Icon. Eruca silv. Wild. Rauschen; wilder weisser senff. Figura Tabern. exprimit nostram Erucam inodoram, sed descriptio Tabern. & nomina cætera non conueniunt nostræ Erucæ inodoræ. Sed hoc non nouum Compilatori figuræ non ponere suis locis, quanquam icon etiam Lobelii & Camerarii pro Eruca siluestri posita, hanc nobis melius exprimere videtur quam Erucam siluestrem ab iis traditam.

Erucam inodoram uoco herbam à me repertam florentem Iulio in terra argillosa vitium quæ sunt ultra Rhenum ad Burckheim generosi Baronis à Schvvende, vno milliari ab vrbe Buisfaco.

Eryfimo similis herba S. Alberti.

Herba Sancti Alberti (in fit Cæsalp. e. 65. libri 8.) vulgò appellatur quadam Trioni similis: caule striato, recto, cubitali, altiorique: folijs magis laciniatis, lauibus: sifofutis luteis, in summis ramulis rectis: siliquis fert grandiores, ac firmas: in quibus semen simile ptædictis: eo vtuntur ad fistulas:

C. Bauh. Phyt. Eryfimum 4. siue Eryfimo similis; leuis, laciniata, floribus luteis, Herba S. Alberti Cæsalp. Cæsalpini descriptio videtur continere in multis cum nostra Eruca inodora, eandem tamen asserere non auiim.

Eruca Vrbeuetana floribus albis, siliquis hirsutis.

Folij donatur maioris Erucæ, sed hirsutis: caulibus dodrantalibus: floribus albis: siliquis Rapi similibus, hirsutis: tota planta à tertio genere Sinapis (Sinapi albo) distat solum paritate, & florum albedine, Cæsalp.

Genus hoc Erucæ, inquit noster autor, spontè nascitur in parietibus, & rudetibus, frequens in agro Vrbeuetano.

ERUCÆ, SIVE ERYSIMVM

Veteribus.

C A P. XI.

DE Eryfimo [quod aliqui Chamæpion, Magi Heraculis Aphita, h. e. polentam, Aegyptii Ezerthmu, Romani Irionem vocant] Dioscor. licet satis clare scribat, dicatque hoc esse folijs Erucæ siluestris: cauliculis in lori modum sequacibus, & flexilibus, floribus luteis, siliquis in cacumine corniculorum figura & gracibus, vt Fænogracæ, quibus exigua concludantur semina, Nasturtii similia, seruidoque gustu. Attamen Plinius Eryfimum, herbam iam à Dioscor. descriptam, & inter plantas acres ab eodem recensitam, folio Erucæ siluestris, eum Irionem, quam à Græcis Eryfimon vocari dicit, & Theophrastus inter legumina connumerat, & Sefamo similem facit, Trionemque Gaza vertit, admodum inconsideratè confundit. Irionem, inquit, inter fruges Sefamæ similem esse diximus & à Græcis Eryfimon vocari. Galli Velarum [vetus codex Cornari Velum habet.] ppellant. Et addit: Est autem fruticolum, sclus Erucæ angustifolij pauld. semine Nasturtii.

Quia

Quia potro, Galenus quoque & inter simpli-
cia Iriosis semina facultate seruida ac calida Na-
sturtio acrimonia & ignea facultate praedito com-
parat: & inter alimenta Iriosem corporis essentia
ferre eiusdem generis cum Sefamo esse dicit, sed
esuiucundiorum, minus etiam alimenti corpori
praebere, & omnino deteriore esse: Perspicuum
fit, haec Eryfima inter se multum differre, et si Plin-
nius ea non distinxisse, sed pro eadem planta ac-
cepisse, videatur, quamuis idem medicamentis an-
numerandum potius, quam frugibus lib. 22. con-
terdat.

Eruca siluestris angustifolia Lobelii, vt apud
Hist. Lugd. videre est, Lugdunensibus Erysimum
verum videtur, sed male. Est & cum Erysimon
cum aliis Trago, quod Verbenam feminam vocat.
Hermolaus & Ruellius siluestris illam E-
rucam, quam Nobilem vocant Itali, Erysimum
esse dixerunt: quoniam sententiam Matthioli im-
probat, & duo alia Eryfimi genera, attamen sil-
sa, proposuit. Priori notas ferre omnes a Dio-
scoride traditas competere putat. Alterum,
cui folia sunt minora, cornicula paulo vegetiora,
magis genuinum esse censet. At Matthiolum re-
prehendunt Pena & Lobelius, quod Rapistum
vulgo à Rapi sapore & aliqua foliorum similitu-
dine sic dictum, loco Eryfimi prioris accepit,
quod neque Dioscoridis Eryfimi respondet, ne-
que cum Mattholi Eruca siluestris foliis simili-
tudinem habet. Tui odor, & sapor rapi non ad-
de vt in Eryfimo actis reclinant: praeterea Eryfimi
vires de quibus mox dicemus. Est & Eryfimum
Theophrasti quorundam, quod nos Fagottii
cum lib. 23. i. scribimus.

Erysimon Graecis dicitur, quod Lat. Erysimum &
Irio, German. hedrich wilder senff, Belg. witte
Mossiacr. Gall. Vclars de Latorrelle, Ital. Iriosa.
Hisp. Kimchaou. Hung. Besereu fii, hoc est, ama-
ra herba.

Erysimon quidem àνδρ' αὐτῶν ἐπέκειν, id est à multi-
plici foliorum sectione: nam Eruca modo laci-
niata conspicitur. Alii ab oleris praestantia di-
ctum volunt, quasi ἐρίμω, quod est pretiosum &
notabile. Nonnulli àνδρ' αὐτῶν ἐπέκειν, quod ob suam
caliditatem maxima trahendi facultate praeditum
sit. Iriosem autem Latini ab irraendo nuncupant,
quod ignea vi & seruido sapore irruat in
gustum.

Erysimum circa vrbes, domorum areas, autho-
re Diose. hortis que nascitur. Eryfimi semina si-
cum melle delingantur, tradente eodem, contra
thoracis fluxiones, purulentas excreationes ac
ruffes, mothum regium, & ischiadem, efficacis
sunt. Bibitur & semen contra venena. Ex aqua
verò aut melle illitum, prodest carcinomatis oc-
culis, duritiis, parotidibus, ac testium mamma-
rumque inflammationibus. In summa attenuat
& cassat. Ceterum ad elegnata redditur mit-
tius & accommodatius, si aqua maceratum tor-
reatur, aut linteo illigatum subactaque farina
oblutum inassetur.

De Eryfimi viribus Galenus sic scribit. Eryfimi
semen sicut gustu Nasturtio apparet simile, ita fa-
cultate igneum est & calfaciens. Potro vbi in ec-
legmate vti ex usu est, praestat aqua miceratam
refrigerare, aut linteolo inuolutum, & crassa pi-
storis circumlitum torrere. Vtile est cum ecleg-
mate ad promouendas crassorum lentorumque
peccoris pulmonisque humorum exuptiones.
Quin & parotidas induritas, & duritias ante
quas vberum & testiculorum iunat. R. fert Dio-
scorides quod cum aqua & melle cataplasmat

modo illitum oculis prodest cancris. Eadem tra-
didit Plinius, & praeter ea quaedam alia habet. E-
rysimum vtilissimum ruffentibus cum melle, &
in thoracis purulentis excreationibus. Datur &
regio morbo, & lumborum vitis, plenitudo, can-
crinibus, coeliacis. Illinitur verò parotidibus &
canceromatibus malis. Testium ardoribus ex aqua,
aliis cum melle. Infantibus quoque vtilissimum.
Item sedis vitis & articularis morbis cum melle
& fico. Contra venena etiam efficacis potum me-
detur, & suspiriosis item fistulis cum axungia ve-
tere, ita nehius addatur.

ERYSIMVM TRAGI, FLOSCVLIS LV-
TEIS IUXTA MUROS PROUENIENS.

Radix minimi digiti est crassitudine, lignosa, Descriptio
alba, acris, & Rapi sapore: caulis tuberculi,
hirtulus, seliquibus alius, foliorum ortu al-
tenuo stipatus, quorum forma ad Erucae aut Bur-
fis accedit: sunt enim altè si-
nuata, hirtuta,
& Burfæ foliis
non paulo ma-
iora, sapore ole-
raceo: stipes
puffilli, luteoli,
quatuor lobolis
constat: sicut
in silicibus lon-
gis atque re-
ctis continetur
puffillum, serui-
dum.



Cardo in
Diose. Vclars & Erysimon.
Irio: Germanis
schniddsenff, a-
bas schlissemff/
steinsemff, & uo-
perus, Irio, qui
a Dioscoride

hinc loco describitur & femina Verbenae etiam,
verum, vt ait, magno errore. Nam Irio. Sinapi co-
gnata est herba.

Tragus Germ. Eisenkraut daß weiblin/ das
Sibent senffkraut. Et quidem non placet nomen
Eisenkraut, exitum enim esse Dioscor. & Sera-
pionis Erysimon aut Iriosem. Quare confide-
randum proponit, an non Iriose melius conue-
niat quam Verbenae supina.

Fuchsius presentem hanc nostram plantam
exhibet titulo Verbenae rectae sive Maus, quam
in contextu alio nomine Crutam Galli vocari
scribit. Eisenkraut das wennie. Item Sinapis al-
terum genus sylv. Großer wilder senff.

Dodon. Gall. Erysimon Dioscoridis & non
Theophrasti, Latine Irio, quibusdam

Lonic. Eisenkraut weiblin/ numeratum inter
Sinapi genera: Lat. Verbenae femina. Item Irio &
Erysimon.

Gesner. hort. Erysimum Tragi vel Dodonae,
Verbenae femina non rectè dicta à quibusdam
cum Sinapis syluestris potius genus sit.

Brunfels. Verbenae femina. Hierobotanæ fem-
mina.

Math. passim in com. Erysimon, Irio. Et hist.
Germ. Irio, i. Hedrich. Fuchsius aperte etralle
existimat, qui Verbenae rufae florem luteum te-
buae: Errorem autem Fuchsi Brunfelsium forte

Verbenae
femina
male
Sinapi cog-
gnata

Verbenae
rectae
Verbenae

Verbenae
femina non
rectae.

Verbenae
femina

Fuchsi
Verbenae
rectae

*Erygeron.
Senecio*

*Matth. La-
psum Cary-
phon compo-
sita ex dua-
bus plantis*

Senecio

Matth. nov.

Matth. 1790

*Locus &
tempus.*

Viter.

secuti facile deprehendi posse putat, quod in suis comp. pl. primò editis pro Verbenaca forma eam plantam depinxerit, quæ à Diosc. cæterisque antiquis Scriptoribus Erygeron siue Senecio nuncupatur, tametsi mutata sententia lib. 1. de comp. med. Verbenacam petperam Sinapi acetam speciem esse contendat. *Matthiolus* suo more proponit figuram plantæ sibi incognitæ, quam puto compositam ex duabus plantis: priora folia & flores videntur facti ad *Rapistrum*, hinc fit vt *Camer.* proponat pro eo iconem *Fuchianam*, quæ *Rapistri* flore luteo: nomen *Germ. Hederich* eam etiam plantam notat: verùm siliquæ non conueniunt quæ *Erysimi* *Tragi* videntur: interea egregius *Commentator* eam figuram proposuit sine delinquone, in com. anni 1559. & anni 1583. quæ verò dixit in *com. Ital. cum mag. fig. & in histor. Germ.* quadrant *Erysimi* *Tragi*, cuius figuram *C. Bauhinus* apposuit *Matthioli*, [ea in parte multum dissidens à *Camerarii* sententia.] Non video quomodo *Verbenaca* flore luteo *Brunfelsii* & *Fuchsi* possit esse *Senecio* siue *Erygeron*, vt vult *Matthiolus*, ego mihi persuadeo [quod ei confectum] non intellexisse quid scriberet.

Lob. & Pena *Aduers. Irii* siue *Erysimum* *Dioscor.* *Angl. Cadloche* / *Medloche* Hic dicunt esse *Iriionem* quem *Medici docti* notis & experimentis commendat his verbis: *Dum postremò in Iriione commentabatur Senensis Dictator*, augurabatur non defuturos canes [sic se doctiores solitus nuncupat] qui se suæ imperitiæ allatrent: *Vtinam* habuisset ille canes similes non ad latrandum, sed vestigandum *Erysimum*, quod vel *Pharmacopæorum* *Monspeliensium* lixæ possint illi hodie in tuius & eudibus passim indicare: est enim ibi doctus & indoctis vt vsu frequentiss. ita nulplica & felici successu notissimum, sed in *Anglia* non item, quæ minus non minus obuia. *Nam ne Medicis* quidem aut *Pharmacopæis* peritioribus certum sit, quænam sit *Irii*: hoc factum, aut quia in vsum *Medicæ* nondum fuit hic deductus, aut quia à *Matthiolo*, cuius commentaria plerisque sunt veluti *Sybillæ* folia, *Rapistrum* vulg. à sapore *Rapæ*, & nonnulla foliorum similitudine loco *Iriionis* acceperunt.

T. Bernacon. & histor. Erysimum, *Irii* i. *vegesensiff. hederab.*

Gerard. Erysimum *Dioscor.* *Lobeli*, *Bauhen* *Æresc.*

C. Bauh. phyt. Erysimum i. siue *Irii* vulgatum. *Item apud Matthiol.* *Iriionis* nomine *Matthiolum* *Rapistrum* proponere, sunt qui statuunt, verùm ex verbis, quæ ex secunda editione adiciamus, colligere est eum intellexisse id quod vocamus *I. Erysimum*, siue *Irii*, vulgatum: *Irii* *Lactæ*, *Castori*, *Castalp.* [Lacuna etiam *Eruca* *salax.*]

Erysimum *Tragi* obseruauit *Geneux* cum flore mense *Maii*: *Monsipeli*, *Lugduni*, *Basileæ*, *Montebelgardi* passim & circa cancellariam in castello. in campis, sepulchretis, & riuosis, vt *Aduers.* perhibent, locis frequens, multis *Galliæ* regionibus notissimum, sed in *Anglia* non item quamuis non minus obuium.

Lobel. & Pena, tantas attribuunt ei dotes, quæ *asthmaticis* & *lædæni* pulmonum, vocique rauca etiam diuturna & propè inuidæ, sunt adeò præsentis præsidio, vt fidem sermè superent. Est enim inquit, moderata quædam tenuis subtilitas & incidentis, cum humidis abstergentibus partibus, permixtio, cuius beneficio crassa pituita citè & exsiccationem nimiam inuidantur, & incisa

propter statum nonnihil commixtam non magno conatu expectorantur & aliterguntur: *arteriacum* igitur est laudatissimum, nempe vnum & idem præparatum & educens: exempla facerunt quamplurima, quæ secundissimè tum præceptoribus, tum nobis postea successerunt. *Phonales* memini tum iuuenes, tum ætatis prouectæ, quibus sermè iam amissa voce & spiritu, limpida sonoræque vox pauculis diebus restituta fuit. Vno *Erysimo* & opera eximii præceptoris *Rondeletii*, qui primus vsum monuit. *Syr. de Erysimo efficacissimus*: cuius beneficio iuuenulæ decennio raucedine laborantes, percuratæ. *Erysimi* totius reuicis *M. Radicum Heleni*, *Tussilaginis* succo adhuc prægnantem, glycyrrhizæ an. vnc. ii. *Borraginis*, *Cichorii* *Capillorum* *Veneris* an. *M. i. florum cordialium*, *Anthos*, *Stochadæ* vel *Betonicæ* an. *M. sanis* *zvj.* *pasularum* mundatarum *zj.* incisis & contusis fiat omnium decoctio ex arte in sufficiens q. aquæ *bordei*, *hydromelitis*, & *zvj.* succi *Iriionis*, ad lib. duas vel tres: expressio distille *Sacchari* q. d. fiat *Syrupus*: quo diu & continuo vtendum purgato corpore.

ERYSIMON ALTERVM MATTHIOLI SI-
liquis paruis quibusdam Den-
taria.



*L*entas cubitque longiores tortuosas virgas proficit: siliqua inferiora quidem *Iriionis* *Tragi* foliis aliquo modò similia, profundè ad neruum vsque propemodum dissecta: reliqua verò, quæ per ramos crebra, leuiter laciniata, vnicaria plis minus longa: ex quorum alis siliquis lutei emicant quibus delapsis succrescunt siliqua crebra, modicè in arcum curuata, semencià longiore, plures ex eodem pânctoorunda; oitores: semen continentes copiosum, perparuum, rufum: radis alba lignescit, paucis fibris donata.

Pictor & Sculptor non bene imitati sunt *Iconem* quam imitandam proposueramus.

Matth. in *Diosc.* *Irii* alter, siue *Erysimum* aliud omnibus *Iriionis* notis præditum. In *Hist. Germ.* *Irii* 2. *Hederich*, qui ipsi videtur melius conuenire cum descriptione *Iriionis*. Sed *Iriionem* hunc, si bene notus fuisset *Matthiolo*, meo iudicio descriptisset.

Camer. ad *Matth. Germ.* scribit abundare propè mare *Venetorum*: existimatisque primò *Anguillaram* *Iriionem* esse *Veterum*. *Gesner.* hort. *Dentelaria* alia (*Irii* quibusdam seu *Erysimum* putata) in *Italia* sic dicta, quòd siliquulas serè *denticibus* similes toto caule emittat. An. *Anguill.* *Erysimum* siue *Irii*.

Matthioli

Matthioli æquanimitas, aiunt Aduersaria quasi lux imbecillitatis conscia, primo suo Irioni subdidit alium in postremo auctario, quem potioem primo putat, quia folia minora, & cornicula paulo vegetiora sunt, ut ex iconibus, inquit Commentator, patet. Sic nos auídos discendi huius mutæ sententię causam aliquã, vt solitus est, in secco deserit. Quid hęc folia minora, & cornicula vegetiora agant nescimus: vt vt sit nos benignè omnia interpretamur, nempetantum Virum [vt constantis animi opinionem, quam de se doctis viris suis Commentariis excitauit, retineret & foueret] noluisse quicquam demere, aut demendum esse suspicionem dare, sed humano more & prudentiã tacitè meliora, quæ à meliore tum suo, tum aliorum iudicio profecta essent, deterioribus subdere, quasque vniuersum opus de integro recoquere: Magni Ciceronis exemplo, qui se dedit recoquendum Moloni Rhodio oratori. Hac Aduers. ex quibus apparet nondum fuisse illis notum illud Erysimum.

Hist. Lugd. Irio altera Matthioli. An eidem præterea Saxifraga aurea Lobelii. Cæsalp. Irionis species tertia parua.

C. Bauh. Erysimum, siue plurima cornicula dicta habens. Apud Matth. Erysimum 2. siue plurimis corniculis iunctis. Videtur H. Lugd. Saxifragiæ Romanæ nomine proponere.

Inonem Do. Cortusio dictum vidi in horto Di. Gesneri, qui dicebat ab Italis vocari Dentelariam. Geneux & Montbelgardi habui in horto: sortè Dentelaria dicta eo modo quo Dens Leonis, à foliis, cui similia vel Bursæ pastoris, aut Cichorio fluestri, ita enim sunt denticulata, maximè prima, sed multò minora, Floret & semen profert Iunio & Iulio. Frater C. Bauhinus habuit Basileæ in horto patris. D. Cortusius misit mihi semen quod in Horto E. C. fatum hanc habebat inscriptionem: Iriion seu Erysimum. Gener Io. Henr. Cherlerus asserit crelere circa Monspelium copiosè.

DELPHINIUM MINVS CÆSALP. FLORE albo, siliquis longissimis.

Cauliculo simplici constat [inquit Cæsalp. lib. 8. cap. 67.] vltra dodrantem; in quo folia vsque ad medium sine pediculo hærentia, non lacinata, vt reliquis, sed tantum in ambitu serrata, dorso incuruo, vt Delphinium ob id dici possit, subhirsuta: in cacumine flosculi insunt candidi, & siliquæ longissima, numerosæ, rectæ, tenues: in quibus minuta semina: oritur in asperis, sed tamen riguis. Idem lib. 6. in fine c. 69. Patua planta, foliis Delphini effigie, curuo dorso. Fortè minus Delphinium inter affines Irioni descriptum.

ERVCA PVRPVREA, ALIIS CÆRVLEA, siue viola Petrea.

Radice nititur Eruca cærulea mihi dicta recta, palmari, alba vel subrubra, tenui, subacri, fibris aliquot capillata, matrice lignosa: folia per terram spargit plurima oblonga, hirsuta, Bursæ pastoris diuisurâ profundâ, crebrâ, sapore oleraceo quodammodò, colore viridi, aliquando inferna parte rubente: caules modò singularis, modo terni, quaterni, seni & plures, palmum nonnunquam superantes, interdum cubitales, hirsuti, striati, propter humum

purpurantes; supernè virentes; concavi, brachiati: in quibus ex interuallis folia, in finis a-



lis breuiora, latitudine iis parum cedentia nec tam altè vt plurimum laciniatæ flores ex ramorum lateribus & summo fastigio alternò sic multi insident pediculis semuncialibus tenuibus. tantillâ languine obfctis, odorati suauiter, cærulei aut purpurei, vel purpuroviolacei, albive, suauolètes, quaternis soliolis latiusculis con-

stâtes, staminula lutea cū stilo continentes: quib. decidentib. suboriuntur siliquæ oblongæ, glabræ, in quibus semen minutum, acre. Variat hæc ætatis ratione, nec non loci, prout lato solo surgit, vel squallido & sabuloso nascitur, ac sæpè iidem in mutis modò maior modò minor, foliis valdè varians. A plurimis annis hanc plantam Erucam denominauimus purpuream propter aliquam similitudinem foliorum cum Erucâ, & quia in muris primò inueneramus. Inter plantas secas Domini Agerii comperidi Violam Petream Dom-

Viola petraea

Hardero. C. Bauh. Phyt. Eruca 6. siue palustris cærulea maior & minor. Apud Matth. Eruca tertia siue cærulea.

Locus & tempus

Obseruauit hanc Erucam verho tempore, vt Martio, florentem in muris circa templum & Castellum Bessfordiensis, item Bantii in muris. Item circa S. Susanam pagum Ill. mei Principis circa rupes. Septembri florentem vidi Bessfordiæ, & Clarævallis muris: In Iste abundat in Vineis, in Sancti Hippoliti oppidi muris. Frater C. Bauhinus misit repertam Basileæ prope S. Iacobum atque Münchstein. Vidi etiam flore rubescens & albo.

VELLA ERVCAE FOLII FLORE violaceo.

Ignota hodie Vella, quæ in lib. simpl. med. ad Paterniacum Galeno attributo sequentibus describitur: Vella herba est foliis quidem minor, quàm Eruca, sed non dissimilis, flore violaceo: semen habet velut in folliculis oblongis, ordinis stipati, prout Nasturtii: & gustu calefactoria est; submordens, & viribus relaxans, vnde ad tussim veterem, & ad regium morbum cum melle optimè facit. Ex his autem manifestum fit hanc nec Plinij Gallorum Velarum (aut Velam, vt vetus Cornarii codex habet) quod Irionem inter fruges & quidem Sesamæ, similem esse, ac à Græcis Erysimon vocari dixit, esse posse. Nec (quod Nasturtium aquaticum Anguil. vult.) Sisymbrium secundum à Fuchsiò pictum. Vella sequidem h-

Viola

re violaceo esse dicitur. Trio autem flore luteo, ut & Nasturtium aquaticum albo. Nec, quam Velle Galeni Guilandino aliquando nomine exhibuit nobis Frater C. Bauhinus. Hæc enim nobis videtur Sisymbrium Cardaminis species quædam insipida.

Sisymbria
cardaminis
species quæ
dam insipida
est.

SIMAPI AGRESTE FLORE PURPUREO,

Descriptio

D Adice situmatur parua, tenui, fibrosa, parum sub terram descendente, albidâ, ex qua folia cæuant Chelidoni maioris incisurâ, distant quod nec succum luteum edunt, nec casta, sed viridia, sunt, aspera hinc lunc obrita, atque extremum folium non rotundum, ut Chelidonium, sed acutum habent, atque nunc ora sunt: caulis angulosus est atque alis multis diuiditur: flores edit purpureos, umbellatos, terè quatuor foliis constructos, Chelidonio parus: silique postea alternatim, frequentes, que hærentes, rectas, quarum extreme partes corium versus tendunt, quibus spica confusa videtur siliquarum duorum digitorum, quæ cum emicant incipiunt, flauescunt, atque vento flante, vel aliquo illas tangente, dissumpuntur ab uno, atque semina isculantur flaua Cardaminæ modo: parua, gustu acii: sicuti etiam folia.



Locus

Tempus.

Fab. Col. Sinapi agreste, Sinapi alterum agreste nostras.

Casp. Bauh. phyt. Erucario, siue Sinapi flore purpureo umbellato.

In valle supra eadem Diæ Manæ vitæ, inter Rubos, Cynocramben, Leonis dentes, & Ranunculos, oritur noua hæc, & elegantis planta, nec abibi oriri fert, nec se in Herbatiis hæc vidisse ait

Fab. Columna. Floret Martio, & Aprili mense perhicitur: nisi diligens sit cultor, huius semina non colliget.

ERVCA QVIBVSDAM SILVESTRIS REPENS flosculo purpureo luteo.

Descriptio

S Pithamam vnam aut duas altos habet caules, striatos; modicè pertusos interdum rubentes: quibus folia adnascuntur Nasturtio vel Erucæ parua, consumuntur etque crebris diuituris incisâ, latiora in inferioribus partibus, gustu oleraceo, colore atrouirente: flores parui lutei, quadrifolii, acii sapore: quibus succedunt silique cylindricæ, biciores quàm in Erucâ, longiores quàm in Radicula sylu. Dodon. cum qua magnam habet affinitatem: semen continentes minutum. Radix insigniter repens, albet, sapore magis ignauo quàm Raphanus.

Fuchsiæ. Sinapi primum genus sylu. florent

walder sessiff. In hist. Eruca sylu. In histor. Fuchsi descriptio conuenire videtur, sed figura eo loco



positâ longè diuersâ descriptione. Thal. Hæc. Ibetis Nasturtii folio altera floribus luteis. An Gesn. de hotiis, Nasturtium aliud palustre floribus luteis Sinapi fortè adnumerandum? Dodon. qui Erucam siluest. vocat, eandem cum Fuchsiõ figuram habet. Camer. in epit. Matth. Sinapi tertium. Ad H. st. Germ. walder sessiff.

Sinapi syluestre. Cur Glossator relictâ figurâ Matthioli aliam proponat valdè differentem nescio.

Taberna Hist. Klein wasser Rauesen. Eruca palustris minor. An Taberna intelligat Erucam nostram repentem asserere non auiam, quia Compilator non indicat cuius coloris sit flos: me etiam lateat quæ sit eius maior cui tribuit flores albos.

Gerard. Iconem Tabern. ponit pro siluestri Sinapi, unde Mustard, an hæc inquirant alij.

C. Bauh. phyt. Eruca 4. siue flore luteo minor sylu. Eruca 5. siue palustris luteo flore; Eruca palustris minor Tabern.

Hæc copiosè prouenit Geneuæ en plain palais: Morthebelgici ad ripam fluminis quæ uir Courrelle, & ad pontem, etiam in horto Ill. E. C. spontè, odiosa suo reptatu hortulano. Inuenit etiam prope Porentium loco arenoso ad fontem mirabilem dictum Cruseus, qui ueluti è puteo proueniens profundo, ubi interdum parum aquæ, ita interdum fons effluuiscit, ut torrentem magni consiliat, qui Porentium fertur, fons uis dignus. Obseruam Erucam hæc Basileæ, quæ uir Neynhaus, Lugduni in prato Bellecour. Circa Bessardam copiosè florens Lulio: Eruca syluest. Fuchsi copiosè proueniens & florens in horto Ill. E. C. Iunio 1603. prope hortum arborum peregrinarum spontè Sturgardæ.

RADICVLA SYLV. SIVE palustris.

E Ruca syluestri aliquatenus similis locis non multum solis Indit, quædam enim lata & serrata tantum, caule unico, subinde rubente, modò cubitali, modò tricubitali crassa, in ramos diuiso, maiore quàm Erucæ syluestris: foliis etiam latoribus, longioribus, quamquam non nunquam latis tenuiter dissectis, sapore Raphani, sed leuiori: flores lutei, minimi, multis numeris minores quàm Erucæ syluestris, silique interdum breuiores & crassiores, teretes: radix interdum unica cum suis fibris. Hæc planta affinis est Sinapi meo aquatico Patuino.

T. L. cit.

vistrum
maticum



Tabern.
Icon. & Hist.
Raphistrum a-
quaticum.
C. Bauh. in
Phyt. Rapi-
strum 3, Ge-
rard. Raphistrū
aquaticum.
Dodon. hanc
depingit & de-
scribit: ei dicitur
Raphani se-
cunda species.
Radicula ty-
uistris, quibus-
dam Radicula
palustris. Gall.
Raisfort sauvage,
ou Raisfort
d'eau, Germ.

Wilder Kästig. Belg. wilder Radics/ & watter
radies.

us. & Hanc obseruauit florentem Maio Geneuz: Mō-
belgardi in pago Courcelle cum flore Iulio & Au-
gusto: circa portem Vauiaucourt, nec non in Hor-
to E.C. Aquatica est planta. Frater C. Bauhiens
vidit Basileæ in siluis. Ex semine decido multum
se propagat.




folia eius magna,
profundè serrata,
& acumina-
ta.

Tabern. Icon.
& Hist. Eruca
palustris maior,
Grosß wasser
raütsen.

Gerardus pet-
peram iconem
Tabern. ponit
pro Sinapi sici-
uo altero.

Gerardus
ror.

SINAPI AQUATICVM
Patauinum.



QVod in Descriptis
quis &

propter aquas
inuentum Sina-
pi referat, ita
indigramus;
folia quidem
minutum disse-
cta, densura
Chondrylla à
Matthiolo ex-
hibita: quæ au-
tem iuxta radi-
cem singulariora
multaque cilli-
ca existunt, per
segmentorum
cras serrata: ra-
dices parui ferè
digni crassitudi-
re, sesquipalmū
longæ, teneræ,
albæ, paucis si-

bris donatæ, sapore acri & amaro, quo & folia
sunt prædita.

Talem obseruauit Patauii repetam ad Portam Lucis &
Liuiam in aqua & iuxta aquam, mense Februa-
rio: eius caules, ni multum fallor, attulit postea Fr.
C. Bauh. nomine Sisymbrii aquatici D. Cortulo
cauos, in varios ramos diuitos, cubitales, crassos,
in quibus secundum diuarcationes folia simpli-
cia, longa, angusta: in extremitatibus flores multi
lutei non magni, quibus videntur succedere sili-
quæ. Cum Radicula syluestri Dodonæ aliquid
similitudinis habere videtur, potissimum quod
folia inferiora attinget, non tamen eadem est.

RAPHANVS AQUATICVS
Tabern.



Raphanus
aquaticus,
wasser kästig/
Tabern. icon. &
Hist. multum dif-
fert à Raphano
vulgari sua radi-
ce rotunda, lon-
gâ, incuruâ, &
foliis acutis pro-
fundè incisis, Ra-
phani tamen ge-
neri assignatur
propter acrem
saporem.

Gerard. Ra-
phanus aquati-
cus, watter Ka-
stisch / flore lu-
teo.

Consideran-
dum quæ planta

hæc, & an ab alio aliquo autore tradita sub alio
nomine.

ERVCA PALVSTRIS MAIOR
flore albo.

striptio Radice nititur crassâ, lignosâ, asperâ: cau-
liculis donatâ pluribus, magnis, rotun-
dis, mediocriter altis: quibus insident flores
multi, exigui, candidi, quatuor foliolis con-
stantes: his decidentibus succedunt siliquula o-
blongæ, tenues: semen acris saporis includentes:
Tom. II.

CAKILE QVIBVSDAM, ALIIS
eruca marina, & Raphanus
marinus.

QVamuis tenuis, longa tamen satis est huius
radix: numerosos caules proferens dodrante
D d d d



Cakile Serapionis.
Eruca folio.
Napi flore.
Eruca marina.
H. Lugd. nat.

altiores, folia Resede, minorz, pinguiora, gustu acri, subfalso: flores peculiaribus turculis lateralibus insident, Eruca aut Brassicę positu & forma, colore purpureo: siliqua crassiuscula, breues, bina semina singula concludunt.

Anguill. & Lobel. Obs. Cakile Serapionis. Adu. & Icon. Plant. Cakile Serapionis. Eruca folio. N. pi flore, vulgò Eruca marina.

Hist. Lugd. tres figuras vnius plantę habet. Primę quidem titulum fecit, Nasturtium marinum. Alteram inscripsit Eruca marinam. Hanc autem Myconum ita vocasse dicit quòd sapore Eruca amuletur, & non nisi in maritimis nascatur: Catalanos *Eucas de Mar* appellat, Tertiam, Cakile Serapionis Synonymon fecit. Et quia hanc eandem plantę, vel certę similem dixit cum Eruca marina Myconi, magis notari subit, cur frustra tam suo, quàm emptoris impensu tot icones proposuerit.

Locus & Tempus.
Viris

C. Bauh. Phyt. Eruca id. siue marina, filiqua hirsuta cuspidi simili. Cakile herba, quam olim nominavi Raphanum marinum, propter odorem, saporem, & acrimoniam, quam cum hoc omnēs ferē partes communem habent.

Apud mare cum essem Monspelii florentem vidi, & siliquas ferentem mense Augusto. Genue in horto meo floruit Maio. [Montbelgardi] proremit mihi in Horto E.C. Vidi Heidelbergę in horto D. Sprengeri florentem Iunio.

Myconius frequentē se experimento obseruasse & competum habere scribit, aquam huius [Cakiles] stillatitiam tepidam, quatuor vnciarum pondere mane potam, colicis doloribus, nephriticis, & calculosis, mirē conferre.

CAKILE SIVE ERUCA MARINA
Latifolia.



NOBIS dedit D. Agerius nomine Eruca marinę folijs non incis collectę iuxta alteram a puo mare Adriaticum, folia huic laciniata quędam, sed non in partes paruas diuisa, vt in vulgari: sunt enim lata, & pleraque tantum sinuata.

SCOPA REGIA VETERVM.

CAP. XI.

SCOPÆ regia, Plinius de Violis verba faciens, Sgrauiem odorem assignat, non leuiorem ei, quam Calatham appellat, quanquam folia eius oleant, non flores. Idem vbi de Siderite terminem habet, ait: Nostricam, quę latissimo (latissimo vet.) est folio, *Scopas regias* vocant. Medetur anginis suum. Hęc Plinius de Scopis regis, quem non regias, sed potius *dissolutas scopas* tradidisse dixerim. Quod enim genus ei sit inter Violas Scopæ regię parum liquet. Est quidem Scopæ regię, secundum Hermol. in Coroll. Sideritis prima Diosc. de qua H.n. lib. 28.

Scopam regiam, faciunt Dioscoridis Bunium, Ruellius, Gesnerus ex scrip. Diosc. & Brunfels. in Onomatichico. De Bunio agetur lib. 27.

Scopæ regię dicitur de Tagete siue Gatyophyllo Indicano, auctore Gesnero in cat. de hoc lib. 25.

Scopam regiam Plinio Sideritum latifolium dictam esse Ruellius credidit, quę *Herba Carpentaria* vulgò dicitur: Et hęc est Barbarea nostra, de qua mox dicemus.

Scopæ regię Pand. est herba S. Iohannis quam Hypocicum lib. 29. inscripsimus.

Scopæ regię, quę apud Plinium demonstratur, ramis oblongis, folijs ex intervallo, lactucinis, sed rigentibus & lanuginosis: flore luteo, radice promissa, tenui iuxta Gesneri opinionem, fortē Pulmonaria Gallica fuerit, ac etiã Sideritis illa Plinii, Scopæ regię appellata.

Scopam regiam Sideritum quidem esse putat Dalech. apud Plinium, sed Achilleam cuius folia odorem multum spirant, non insuauem, verum medicatum, auctore Dioscoride, vt pro latissimo folio cap. 5. l. 25. legendum sit tenuissimo, vel quod magis placet, latissimum folium intelligamus totius plantę comam latissime se spargentem. Nam multis virgīs multum que spatii occupantibus ea planta surgitur. Coronis autem expectatur flos ex albo aureus. Quamobrem inter luteos flores hic à Plinio recensetur.


Scopam regiam quam Plinius inter Sideritides connumerat, Casalp. Scateam vulgè esse contendit. Videtur hęc nobis Gallitrichum latium de quo lib. 28. Hist. cen. Sed quod nos in tanta Veterum & Iunior. amicitate nihil habemus, quod certè concludamus, nullus equidem mirabitur, siquidem ab his nullā satis certā historia sit descripta.

BARBAREA.

CAP. XII.

Radice albā donata est, medio crassa & oblonga, sapore aciore: caules dodrantes & altiores, lirati, multis alis concaui: in quibus folia Raphanis minorā, laciniā extremā Nasturtii folium extremum emulante, atto vitore splendens, sapore minus vegeto quàm radix: flores parui, lutei: siliquę confimiles, multę, tenues, teretes, in quibus Dodonæo auctore, exiguum & colore rufum semen.

Hanc vocauit Ruellius Carpentationum herbam, & Gallorum Carpentariam, existimans Plinii Sideritum, folio latissimo, siue Scopam regiam. Fusch.



Fuch. Dicitur
Barbara herba
[S. Barbaren
fraut] Herba-
riorum.

Trag. qui
herbam S. Bar-
bara vocat, ac
Sinapi s. facit
flore luteo,
Senff fraut/
wasser senff.
Sylvestre ge-
nus Nasturtii
aquatici & Si-
napi rectè sta-
tuitur.

An Anguill.
Pseudo-buniū?
An eadem Sco-
pa regia quæ
inuenitur in li-

bris falsò Galeno attribuit̃.

Gesner. hort. S. Barbara herba, Carpentaria,
Gallis vulgò dicta, Nostris [Tigurenſibus] Nâb-
Freißig/aliqubus Scopa regia. Aut hic sibi videri
Matthiolum herbam S. Barbara vulgò dictam pro
Eryſimo pingere. Eadem in cat. pl. Baniū, quod
quidam interpretatur Wild Freißig/ S Bar-
barâ fraut: herbe au charpentier. Item Sideritis
Plinii latissimo folio.

Dodonæo, qui Barbaræam, ac etiam Nastur-
tium, & Cardamum hybernū vocat, ^{Leu de Solimon}
[salum Baniū] Dioſcoridis videtur, nec esse Si-
deritis latifolia, aut Scopa regia, vt aliqui putent.

Aduerſ. Lobel. & Penz volunt Barbaræam non
esse Pseudo-baniū vocandū, sed potiùs Pſeu-
dobuniadem. Et sic Lobel. Obſ. & Icon. Plantin.
ſcribit.

Videtur Hiſt. Lugd. Erucis annūmeranda her-
ba illa quam alicubi in hortis colunt & acetariis
immiſcent, & quam vulgares herbarii S. Barbara
herbam appellant.

Tabern. Ic. & H. Barbara mas & ſemina. Com-
pilator ponit duas icones vsque aded ſimiles vt
nullam demonſtrent differentiam, nec etiam in
deſcriptione vlla traditur. Getardus pro Barbara
poſuit iconem Barbarææ ſemina Tabern. & pra-
ter omnem rationem, pro Sinapi fatiua iconem
Barbarææ matris Tabern.

Quam plantam Franciſcus Indiæ, de qua mox,
inter vires intelligat per Scopam regiam, neſci-
mus niſi velit Barbaræam.

Ad Scorbutum laudat Marcus Miſchel. plantam
quæ Pſeudobuniū Dioſcoridis iudicatur, nec
non Nasturtium aquaticum mains.

In campeſtribus paſſim, teſte Fuchſio, naſcitur.
Maio & Junio menſibus floret, ac ſubinde in ſili-
quis ſemen profert in campis, ait Dodon. ac hor-
tis in quibus Olera ſeruntur, tum alibi veluti ſe-
cundum ſemitas ac vias quandoque naſcitur: To-
ta hieme viret. Locis inculis, vt vult Hiſt. Lugd.
maximè vliginoſis & aris humidis. Barbaræa
prouenit Montſpellii, Baſilæa florens menſe Maio,
Junio, & Octobri ad ripam fluminis Bierſe & in
parua Baſilæa ad portam Kiementhor in prætis:
Patauii & Bononiæ in horto S. Saluatoris albur-
go di S. Catharina. Genevæ virebat menſe Martio
in horto meo, & florebat Maio. Montbelgardi
paſſim floret Aprili; ſemen maturum Junio: in
horto E. C. quotannis ſe renouat ſeminè deciduo.
Barbaræam flore pleno circa Baſileam repertam;

Forū. II

& à fratre C. Bauhino datam, demonſtrauit mihi
Arnold. Gillenius.

Fuchſio guſtanti primùm ſubâcris eſſe, dein
parum etiam adſtringere videtur, vt calidam &
ſiccam eſſe nemo dubitare debeat. Vulnerariam
herbam eſſe & temperamentum eius & experien-
tia docet. His verò potiffimùm vlcibus mede-
tur, quæ impura ſunt, & in quibus caro ſuper-
creſcens fuerit: nam quia valentet ſiccata, ided ſor-
des extergere, & carnes minuere poteſt. Valde
ait Dodon. excaſcit ac ſeſcicat, vt pote ſapore
acris, & Naſturtio facultate aſſimilis, acetariis ve-
rò additur hyeme præſertim, cum Naſturtii copia
deſit: Medetur verò & eadem Scorbuto non mi-
nùs quàm Naſturtium. Semen admodum quoque
acte, calidum ac ſiccum, adeoque tenuium par-
tium, vt vnas euocet, & coherentes calculoſas
arenulas diſſoluat ac expellat. Calida & ſicca ſe-
cundum Lobel. initid ſecundi exiſtit: tertæ ſub-
ſtantiz nonnullius particeps, ided gatgarizatur
ad anginas pituitoſas & Vnas relaxatas. Succus
eodem Clymeni vice & titu exterſioris ſiue
mundificatiuis vulgò vnguētis ad ſordida vl-
cera miſcetur. Vrinam ciet, calculoſos & ſarctus Ve-
ſicæ decocto aut cibo pellit, vt Lauer, cuius ſer-
uè par guſtu. Inexplicabili cum agrotantium iuua-
mento apud Franc. Indiæ de Gatta, vomitoriū
medicamentum paratur, cum aqua ſtillata An-
tiorum immaturorum tepida, & ſufficiente quan-
titate pulueris Scopæ regiz, hoc quidem medica-
mentum mirabile eſt atque diuinum, & à pauci-
ſimis Medicis probè cognitum, quod podagricis,
Gonagricis, ac Iſchiadicis aſſectibus præcipuè
præſentaneo, & maximo eſt iuuaumento. Bilem
enim præſertim, & alios poſtea humores per ſu-
periora & per inferiora munditiis abſque com-
paratione expurgat, quàm Thlaſpi ab Aërio aded
in hoc caſu celebratū, nullum imprimi calorem,
ſerum non perimit, neque educit, vt effici Thlaſ-
pi, nullamque acrimoniam & mordacitatem hæ-
bet: quare hoc eſt medicamentum longè ipſo nô-
bilius, tutius, atque iucundius; vt experientia ſa-
piſſimè à me fuit comprobatum.

Temper.

Vires.

Vomitoriū.
Aqua ſtill.
Anticuru.

BARBARÆA MVRALIS IOH. BAVHINI

Barbaræa muraria radice lignoſa, albida tenuiſ-
ſimis fibris capillata, ſapore oleraceo eſt: caulis
teretes, hirsutus, interdum ruſcens, reſectus, peda-
lis vel cubitalis, ac etiam maior; ramolis aliquan-
do: ad cuius imum ſilia multa circumquaque
procumbentia, vt plurimum, vnciam longa, ali-
quando longiora, trientem vnciæ ſerè lata, ſubro-
tunda, hirsuta aſperuſcula, ſerrata, pediculis bre-
uiſſis aut nullis, interdum vbi cauleſcere potiffi-
mùm incipit, ſatis longis pediculis adhzret: in
caule minorâ nullo pediculo annexa, pinnata, ſa-
pore eodem cum radice: flores in ramulorum ex-
tremirate multi ſimul iuncti, candidi, quatuor
foliis conſtantes, apicibus in medio luteis, quibus
ſuccedunt ſiliqua copioſa, longæ, teretes, ſecun-
dum caulem ſurrectæ.

Deſcriptio.

C. Bauh. Phyt. Eryſimum ſ. ſiue Eryſimò ſi-
milis hirsuta non laciniata floribus albis, quam
cum Patauii D. Guilandino oſtendiſſet Dryo-
phanon Plinii (cuius lib. 28. cap. 9. meminit) &
Drabam alteram nominauit: ac Nobil. Cortuſus
Eryſimum tertium vocabat.

An Lobel. Obſ. Barbaræa, Herba S. Alberti Bo-
nionienſium. Hanc licet frater C. Bauh. ſeparet &

Dddd

mea Barbarea murali, vocetque eam in phyt. Barbaream 2. siue minorem, quam icone expressam nondum viderit, meo ramen iudicio, est vna eademque planta, idem minime separanda.

Locus & tempus ;

Floreret Vere Monspensuli : Genenez maiorin horro meo virebat tota hieme, nec primo anno caulem aut flores ferebat: at post semina proferebat Iunio: Copiosum inueni in mense Iulio in monte Thuirii cum siliquis plurimis longis in caulibus testis. In *l'Isle* Burgundiaz omnium maximam vidi in muris quibusdam & radicibus castelli, virens Ianuario & Februario: Montbelgardi in muris quibusdam Castellii inueni, nunc facta in Horto Ill. E. C. occupauit nouos muros & seipsam in illis propagat. Fr. C. Bauhinus obseruauit basileæ in muris mœniorum: attulit mihi Patauius.

DRABA LVTEA QVIBVSDAM.

Descriptio Ignola est radix, alba, minimo digito minor, sapore Raphani ruscicani, minus feruido: ex qua caules aliquot atcolluntur, recti, rigidi, cubitales & maiores, ramoli: quibus folia ab imo ad summum crebra alternatim adnascuntur, omnia vniformia, longitudine quadrantali & maiore, latitudine circiter vnciali, acuminata ex angulo principio, quæ pedicello breui adnectuntur, hirsuta, serrata, sapore remissiore quàm radix: *stipuli* Erysimi, luteoli, quadrupartiti: quibus succedunt *siliqua*: quæ in sicca illa (quam Pet. Turn. Angl. Heidelbergæ ad Neccarum collectam mihi attulit) semen clauderent tenuis, longum, striatum, rufum.

Solidago

Camer. apud Matth. Germ. & in horto dicitur Arabis quorundam floribus luteis, quam commodè referri posse putat ad Solidagines, quo nomine aliquando ex Anglia missa fuit.

C. Bauh. phyt. Draba 5. lutea strictissima longisque siliquis.

Locus & tempus

Videm vidi in montibus Rhæticis: Burnii Iunio mense florentem altitudine duorum cubitorum cum dimidio: quæ quia videbatur odorem habere Raphanis, tunc nominauit Raphani odorem habentem plantam: Stutzgardia in horto Ill. E. C. floret Iunio, vnde attuli plantandam in hortum eiusdem Cels. Montbelg.

DRABÆ LVTEÆ ALIQUATENVS SIMILIS

pro Spira missa ex Lusania.

Planta isthæc pro Spira Theophrasti fortè Clusio (lib. 1. plant. hist. cap. 53.) missa fuit Basileæ C. Bauhino, inde ex Lusania: cui iam sicca, caulis tenuis erat, fungosus, fractisque facilis non ligneus, vthæc quoque ratione censamus, non fruticem esse vllum, sed ex plantarum genere habendum; Drabæ iam dictæ luteæ aliquatenus similem, formâ porro caulis rotunda, nerui secundum eius longitudinem decurrentibus inæqualior reddita, moelò albedo, modò verò puniceo aspersus colore: *folia* per continuum caulis ductum, nullo ordine sparsa, duas vncias longa, in ambitu altrinsecus serræ in motu asperata, supernâ parte paulò saturatiore virore, vt infernâ d. luteore, tinctâ: neruòque subpunctico per folii medium spatium conspicuo satis donata, tenera siue admodum fragilia, ramus desinit veluti in spicam, aut vnam flosculorum exilium muscosam, angustam, duas circiter vncias longam, albidam, gustu amarifculam: Si spica siue vna in ramo quem habuimus late esset, non male exprimeretur per iconem Spira Theophrasti: Clusio: Lectorum erit rem diligentiùs examinare: ramum quem habemus dedit nobis Ba-

sileæ 1608. diligentissimus Botanicus Gillenius Hassicus Medicinæ D. cui dono dederat Frater C. Bauhinus. Historiam autem & Iconem Spira Clusii posuimus Promptuarii nostri siue Histor. gen. lib. 6.

SINAPI PYMILVM ALPINVM FOLIO Bellidis Clusio.

Sena aut septena, humi secundum radicem expansa, habet illa *foliola*, Bellidis foliis non dissimilia, teneriora tamen, & leui acrimonia prædita: è quorum medio, terellus & gracilis prodit *cauliculus*, raris foliis septus, palmatis, aut paulò altior, in cuius summo semina septem crant *stipuli*, quatuor albis foliis constantes, in quibusdam plantulis totidem sine flore *siliqua* siue *cornicula* satis magna pro plantule ratione, duplici serie, quemadmodum in Cardamine alterius & similium corniculis: *semen* continentia exigui, planum, rufescens, nonnullâ acrimonia prædit: *radix* summa trillure terpens, noua germina subinde profert.



Plantulam Cardamines æmulam, Sinapi pulchrum alpinum, an ad Cardamines, an ad Sinapi genera referre debeat, nondum apud se constituit Clusius.

Casp. Bauh. phyt. Sinapi 2. siue alpinum

marinum.

Obseruabat eam Clusius in Escheriano iugo scopulis inhaerentem.

DRABÆ LVTEÆ ALIQUATENVS SIMILIS pro Spira missa ex Lusania. BVRSIA PASTORIS, SIVE PILOSELLA siliquosa.



Affinis est hæc Bursa pastoris minima: *radix* vtilius, tenuis, & fibrosa, vbi minima non fibrosa: *folia* similiter per terram sparsa, nonnihil hirsuta, viridita, interdum nonnihil rubra, in minima minuta, quàm Alines minor. in alius vulgaris Alines magnitudinis, vel maiora, sunt etiam nonnunquam maxima Bursa pasto-

Descriptio

pastoria non laciniata: *caulis* interdum ad eò exiguus ut vnicam non excedat, aliàs etiam dodrantalis & maior, iuxta terram non nihil hirsutus & ruber, superiùs glaber & viridis, & nonnunquam foliis nudus, aliquando vno aut altero donatus, ramulos vel non ramulos: *folioli* aliquot albi ordine nullo, Bursa vulgaris: *siliqua* longæ, teretes & tenues, ex fatis longis pediculis.

Ad Myagros referendam censebat Gesnerus, ut patet ex annotatione ad plantam meam siccam. Existimo dictam fuisse Dalechampia Aizoon thelyphonum.

An Thalia, Pilosella siliquata maior & minor? Acrem habet (ait Camer. ad Thalii hist.) hæc plantula saporem instar Nasturtii, eam Gesnerus inter Myagri species retulit. Hucille, qui eius iconem habet in sine horti, sub titulo Pilosellæ siliquatæ. Ea facta est ad plantam siccam meam quam reddens Monspelio Gesnero miseram. Eiusmodi icones & descriptiones passim Camer. habet, quæ Gesnero præceptoris meo communicaram, mei tamen non meminit.

C. Bauh. phyt. Bursa pastoris 7. siue Bursa pastoris similis siliquosa. Pilosella minor Thalia & Icon. Camerarii.

Schvv. Bursa pastoris Myagri folio, *Wagelz* Fraut.

Monspelii in agris vitidionibus florentem observavi Vere: Genevæ mense Martio & Aprili: Bononiæ in muris palatii atque in iis locis medicis magnitudinis, ut pingitur à Camerario. Montebelgardii medio crem & ad muros horti ferarum maximam: inter S. Thamaris, urbem & Than ad Alsatiam, in ægris medio crem. Bedfordiæ in arce supra murum observavi omnium minimam, ita ut describerem aliquando pro planta particulari.

DE LEVCOIO EX VETERVM SENTENTIA.

CAP. XIII.

Leucoium (λευκοίον) notum est, siquidem Dioscoridi fides habenda est, sed est in flore differentia. Namque aut albus, aut luteus, aut cæruleus, aut purpureus reperitur. *Hermolaus & Marcellus* in hoc Dioscor. contextu ista verba, aut cæruleus, in Leucoio abundare existimant, putantque ascititia esse, ideòque extirpanda. His adstimulatur Fuchsius, ac Plinii auctoritatem adducit; qui lib. 21. cap. 6. Viola: plura genera enumerans, purpureæ, luteæ & albæ duntaxat meminerit. Marcellus (inquit Matthiolus) Dioscoridis interpreti subscribendum puto, qui Leucoium cæruleum hoc loco accrevisse suspicatur, vetustiss. Dioscoridis Longobardis luteis scripti testimonio nixus, in quo nullum planè de cæruleo Leucoii colore verbum legebat. Suspicionem hanc augent, eamque comprobant Oribasius & Serapio, quos item id verbum hoc loco non habere comperit in simplicium censu, cum alioquin reliqua Dioscoridis referant. Cæruleum Leucoion (reperit Cæsalp.) in hoc genere non visum, à solo Dioscor. positum, nisi superfluum fuerit id verbum, vel fortè Cyanus flos intelligendus. Caterum, dum (ὄλον τὴν μέλανον λευκοίον) radicem Leucoii nigri in lib. de nat. mul. in vino bibendam præcipit Hippocrates, μέλανον nomine purpureum haud dubiè designat, nam hic color propinè ad nigrum accedit. Sic & ἰσχυρόν Θεο-

Tom. II

phraсто dicitur, Viola mártia, à nigricantis purpureæ flore. Sic & cæruleus non alius indicatus à Diosc. esse videtur Cornatio, quam albus, qui leui robore amixto cæli colorem refert. Superest ut quod nostrum hac de re sit iudicium, liberè dicamus. Verba igitur illa, aut cæruleus, nullo modo penitus ascititia credimus, eam vel solum ob causam, quòd in cunctis Dioscoridis Græcis codicibus legantur. Ad auctoritatem Plinii respondetur Fuchsiò, Plinium non loqui de Leucoio loco citato, aut si loquatur, Leucoia à Violis non bene distinguere, & per purpuream Violam Martiam tantum intelligere: per albam vero, Leucoium bulbosum Theophrast. florum primum dictum. Quod verò Matth. in Italia natum non sciat, ac idèd Marcello subscribat, in epè facit, non enim vna fert omnia tellus. Latè siquidem patet naturæ vis, & admirabilis eius Maestas, quâ potest multa quancumque & vbi que variare & quæ nobis, nostro orbi, & sæculo negavit, aliis dedisse. Oribasium & Serapionem in depravatam exemplar incidisse potius dixerim. Dioscoridem porò per cæruleum Leucoion Cyanum non intellexisse, quod Cæsalp. post Hermolaum & Marcellum somnians, tum utrorumque florum differentia, tum folia, tum caulis, tum tota denique plantæ facies, clarè demonstrat. Cur denique Dioscorides voce disunctiua vltus esset, si, quod Cornario videtur, per cæruleum album indicare voluisset.

Stat igitur quatuor esse Dioscoridi genera, solâ florum colore discrepantiâ. Nec hoc mirum videri debet, cum & apud Tragum recentiore, quinque diversa Leucoii genera extant, à diversitate colorum apud Germanos sortita nomina, luteum sc. album, purpureum [braun] roseum, [leibfarb] & rubrum. Sed de his Inferiorum & nostris observatis differentiis seorsim tractabimus.

Leucoii (τὸ λευκοίον) nomen quamvis propriè Violam albam significet, si eius Græcam vocabuli compositionem spectes, attamè quorquot de his scriptetur, omnia Violarum genera cuiuscumque tandem sint coloris vnica hac Leucoii appellatione designarunt. Non est tamen quod per purpuream hic intelligas eam, quæ Græcis *ἰσχυρόν* & Latinis propriè Viola dicitur: nam earum alia ab his de quibus hic agimus familia est, si que tum qualitate tum facultate, adde etiam forma contrariæ. Homines enim illorum florum capti venustate & fragrantia, inquit Pena, ut vsum ad coronamenta sic nomen commune sanxerit, posteaque magis consuetudinem, aut florum similitudinem quam rationem securi, multos & varios flores violas nuncuparunt, idem nomen variis atque longè diversis plantis quales sunt Viola & Leucoia imponentes. Est & Leucoium bulbosum. Quæ omnia suis locis declarantur.

Hoc porò Violarum genus, ait Diosc. alii Regium siue basilion, Romani Violam albam, alii Augusteam, nonnulli Violam matronalem, aut Passerinam, aut Polyphuram vocant.

Hermolaus barbarus testimonio fretus Columellæ, Ligustriam Romanis hanc Violam vocatam tradit.

Dicitur Arab. nunc *Cheiri*, nunc *Alcheiri*, præ- Nomina posito articulo: Germ. *Veichen*. belg. *Violeren*. linguae Gall. *Violettes*, It. *Viola*. Hisp. *Violeras*. Quidam verò Violam albam [Leucoium] appellant, à foliorum canicie, non à florum colore, qui, ut dictum, aut albus est, aut purpureus aut luteus, aut quod cum nonnullis Adrian. Spieg. negat, cæruleus.

Tarentinus apud Ruellium Violam purpuream post Idus Martias, item Calendas Martias feri iubet; sed violam qui saturus est terram stercorata & repastinatum pedis altitudine in puluinos redigat, atque ita plantas hornotinas, serobiculis pedibus factis ante Calendas Martias, dispositas habeat. Semen autem Viola, sicut oleorum, duobus temporibus in aere sentur, Vere vel Autumn. Colitur eodem modo quo & cetera olera, vt iunctetur, vt fariatur, vt interdum etiam rigetur. Nascitur vitis modo è supernis quasi è puppi dicas non prorà.

Vires & Vfus.

Leucoium melinum.


Semen.

Ad secundas educendas, & sanguinem ex vteris pellendum, Leucoium semen tritum, cum vino bibendum exhibet Hipp. de nat. mul. & ad eadem eodem modo radicem sumendam tradit. Est autem Dioc. ex Leucoiis commodum ad medicum vsum cui color melinus, huius flores aridi decocti ad infusus, ad vteri inflammationes, & ad ducendos menses faciunt. Excepti vero cerato, rimas in sede sanant: cum melle feruida oris vlcera. At semen ipsius duarum drachmarum pondere cum vino potum: aut cum melle appositum menses, secundas, & fetus ducit. Radices cum aceto impositæ, lienem repuntunt & pndagricis profunt. Leucoium frutex vniuersus extergentem facultatem possidet, plus tamen flores, & inter hos qui sint siccinnes magis etiam quàm vitides, adeo vt oculorum cicatrices crassas extenuent. Tunc menses quoque eorum decoctum mouet, & lochia, partimque emortuum elicit: ac si bibatur abortum facit. Est ergo id medicamentum, vt si quod aliud, amarum. At si quis vinum eius vehementiam multà aquà admixta retundat ac mitiget, aut certè id genus aliquo, habebit & ad phlegmone non malum medicamen. Sic decoctum eius si non merum fuerit vteri phlegmonas, identidem persusum sanat, potissimum quæ diutino tempore ad ferri modum induruerit. Sic cum Ceruo vlcera agrè ad cicatricem proueniencia curat. Sunt verò etiam qui cum melle & ad Aphthas adhiheant, semen cum eisdem sit facultatis apertissimum est duarum drachmarum mensurà potum, tum mensibus ciendis impositum conuenire creditur partumque viuentem interficere ac mortuum euicere. Radices similis omnique facultatis, nisi quatenus crassioris sunt essentia, & magis terrene: cum aceto lienes induratas sanant. Nonnulli verò & phlegmonas induratas his curant. Extenuant, menstrua & vti nam ciunt. Sed, teste Plinio, minor vis est recentibus, ideoque tridis post annum vtendum. Lutea diuidio Cyatho in aqua tribus, menses trahit. Radices eius cum aceto illite sedant lienem. Item Podagrà & oculorum inflammationes, cum myrrha & Croco. Folia cum melle purgant capitis vlcera, cum cera rimas sedis, & quæ in humidis sunt. Ex aceto verò collectiones sanant.

Inter omnia Violarum genera, luteas calido ferè temperamento præditas esse; præsertim aridas, testatur Tragus. Flores harum recentes in aqua decocti & pnti, contra vuluz in inflammationibus valent. Succus oculis inditus purgat illos, & quæque maculas & caliginis discuit. Idem si è vino bibatur, non solum menses, sed & secundas, & emortuos partus extrahit. Neque debet exhiberi, nisi summa in necessitate constitutis. Aqua distillata, per diem bis pota, quatuor aut quinque cochlearium mensura, vitis hepatis & tenui apertimè conduxit, & Venerem stimulat. Per aliquot dies continuè vsurpata, omnia interna

membra roborat, sanguinem & nascentem exharat, dolorem sedat & quietem inducit. Cum melle oris vlcera sanat. Consetua huius cum aqua eius stillatitia crebro sumpta (vt rei huius testis est Camer. horti) præseruat ab apoplexia & iuuat paralyticos. Menses Oleum de Keiri, ex floribus, Lutei Leucoii conficitur Chamæmelinū, ac quod tenet, digerit, ob id dolores thoracis, sentulū, nernorum sedet.

LEUCOIVM LVTEVM VVILGO
Cheiri flore simplici.



Notissimū parietinis quod Cheiri cum Arabibus vocant Officinæ, radibus, sarculisque seu ramulis vberitina fruticantibus, lignosis, quos obsident folia nullis appenda pediculis crebra, vnciali & ampliore longitudine, ex angustio principio sensim dilata ta, virentia, aut canescentia, idque maximè prona parte, sa-

pore subacti: flores cæbris, lutei, valde odorati, sapore mihi ingrato, quatuor foliis constantes, staminibus senis stiloque chloris in medio penitus ferè latentibus. Succedunt stiloque longæ in quibus semen latum, rufum, gustu acris & amaro.

Matthiolo in prior. com. Leucoium in com. cum mag. fig. vt & apud Bauh. Leucoium aureum in hist. Germ. Leucoium luteum, Gelb negel vield / Cheyri Arabum. Trago. Fucht. hist. Gerard. Viola lutea Dodon. de flor. & in fol. Lob. Adu. Icon. M. Schv. Leucoium luteum. Obl. Leucoium floribus luteis.

Gesner. in cat. pl. Hesperis, Viola lutea, Barb. Hesperis Cheiri, nonnullis Herba Gallica, Leucoium, Viola alba & Leucoium Dioc.

H. Lugd. Leucoium aureum Matthioli, Plinio Viola lutea: veritè dici in Theophrasti periti Herbarii autumant.

Clus. Pann. Leucoium luteum satiuum.

Camer. horti. Leucoium flore luteo simplici.

Tabern. Icon. & Hist. Viola petraea lutea.

C. Bauh. Phyt. Leucoium ro. siue luteum solis virentibus, Brunfelsio in 4. p. 49. Leucoium. Quibusdam Theophr. quiddam lotus flos flammei, id est, lutei sit coloris.

Nonnulli videri, Leucoium luteum, Leucoium Notissimū luteum flore simplici, Arab. & Offic. vniuerso Cheiri. linguarum, siue Keiri. Germ. Geel Veylen / Geel Vee gel Veilichen. Belg. Geel violieren. Grein violieren / panetinas, aut saxatiles Violas dixerit Dodon. Gall. Violettes jaunes: Montb. Violettes de S. George It. Viola giara. Hisp. Violetas amarillas & Albelis. Angl. Waste Gyllofer, walbe löuer & Sroetg. löuer. Hung. Sarga Viola.

Leuco.

& Leucoium luteum floret Monspelii tota hyc-
me. Passim, vt Bassileæ & Montbelgardi in muris
copiosè prouenit, florens Aprilis, Maio, Iunio, &
Iulio, & Augusto videlicet in Horto E. C. Cla-
raualæ Septembri.

LEVCOIUM LVTEVM PLENO FLORE.



Non vide-
tur differre
ab eo cui flos
simplex, nisi
quòd diutius
durat, & magis
arborescit, quod
cultura faciendi-
nia florum lu-
xurians ei non
permittenda, a-
lio quæ facillè pe-
ririt, vti solet
Leucoium sim-
plex, postquam
siliquas pertul-
lit, quæ in hoc
interdum leui-
ter apparent,
sed ad frugem
non perueniunt,
quod hæcenus

obseruauerim, licet Pictor noster non visas sili-
quas nostræ iconi appinxerit.

Viola lutea multiplex vel polyanthos quam H.
Lugd. spectandam proponit, e si flore densiss. foli-
olis stipato & congesto, suauissimi odoris, nullis
siliquis, nullo semine, abeunte in floribus amplitu-
dinem eo succo quem siliquarum & seminis esse
oportebat, cultu & mangonio talem euadere a-
iunt, præsertim si tenellæ plantæ antequam flo-
ruerint sæpius transferantur.

Dodon. de flor. Leucoium flore multipli-
cante.

Lobel. & Pena Adu. Leucoium luteum duplis
floribus.

Icon. Pl. & Schvvenck. Leucoium siue Keiri
duplici flore multiplex Geselt geel Veiel.

Gerard. Viola lutea multiplex: Double Wall
flower.

Camer. hort. Leucoium flore luteo pleno.

C. Bauh. Phyt. Leucoium n. luteum pleno flore.

Leucoium luteum flore pleno, Vidi bifantii in
variis hortis, vt in horto Di. Abbatis de Van Prio-
ris in Telpach. Sturgardie in horto Ill. Ducis,
plantati in horto E. C. Montbelgardi. Bassileæ ob-
seruati in horto Di. Dis. Felicis Plateri, & D. Iaco-
bi Isele, vnde Montbelgardum attuli, floret Apri-
li & Maio: ramulis depactis in terram propaga-
tur.

Leucoium luteum arborescens

Leucoium accepimus Sturgardiâ ah Illustriss.
Nostra Ducissâ Sybilla Anhaltina vxore Ill.
Ducis Wirtemb. Principis mei Clementissimi, an-
te hæc non visum scribunt, ac florem simplicem in-
terdum pertinere ad amplitudinem monetæ
quam Iuliam vocant: nos adhuc tantæ magnitu-
dinis non vidimus, licet plantæ nostræ Montbel-
gardi florent & siliquas ferant. Quamuis ex se-
mine proueniant, propagatur etiam ex succulis,
quod flore pleno est.

LEVCOIUM LVTEVM SYLVESTRE
Clusii.

Sylvestre au-
stem caules
fundit multos
dodrantes &
ferè cubitales,
angulosos, stri-
atos, multis alis
concauos: folia,
alia quidem si-
nuata, semuncia
lata & angustio-
ra, vnciam & ses-
cunciam longa,
angusta, nullò
que modo inci-
sa, viridantia, in
hæcibus cultu
multò magis lu-
xuriant dupla
latitudine lon-
gitudineq: flo-
res multi cæccer-
uati leucoii lu-

tei satui, colore item luteo præditu, minores qua-
tuor constantes foliis, odore grato: postmodum
siliquæ nascuntur tenues Clusio, plano semine
plena.

An Lobel. Obs. Keiri siue Leucoium marinum
flore luteo, facie Keiri vulgè lutei: folia item viri-
dia: sed maiora, latiores & flauentia ex viridi, in
Belgii hortos translata.

Clus. Pann. Leucoium silv. Rhizoromæ mulier-
culæ: Wild gelbe Deyl vocant.

An Camer. Hort. & apud Matth. Germ. Leu-
coium silu. quod Norimbergæ passim in locis
montanis prouenit, cuius pulchram & raram spe-
ciem reperit Bononiæ? Thal. Harc. Leucoii lutei
silu. species, foliis dodrantalibus tenuioribus hor-
tensibus, &c.

Tabern. Icon. & Hist. sicut & Gerard. Leucoium
silu. 4.

C. Bauh. Phyt. Leucoium n. luteum silu. angu-
stifolium.

Leucoium luteum silu. satum in Horto E. C.
ex semine collecto in Gallia feliciter prouenit: Locus &
Tempus
florens Maio, Iunio, Iulio, & Augusto. Tale etiam
collectum à Genero Cherlero in Lio Venetorū,
& horto Patauino: D. Agerius attulit Bononiâ
Leucoium siluestre folio valdè angusto. Inue-
nit Clusius in montibus supra Badenses thermas
& in Leytenberg, locis Meridicis obuertis & sale-
brofis florens Maio.

LEVCOIUM LVTEVM SILV. PANNON.
ferrato folio, obtuso & acuto.

Leucoium luteum silu. ex Pannonia per D. Descrip-
tægerium delatum caules habuit ferè similes
præcedenti: folia in obtusum desinunt, in ex-
tremitate ramulorum flores multi glomerati lu-
tei, quales in præcedenti: An huius sit alia spe-
cies vel varietas tantum asserere non audemus,
Quum iconem nostram curauimus parandam nõ
erat nobis iam descripta planta: sed tantum
mus iam depictus, in præcedenti tabella.

LEVCOIVM HYEMALE ET DIV DV-
rans purpureum & roseum, ac
etiam album.

Descriptio **N**on tam florum, quam caulis & foliorum
color Leucoio nomen fecit: siquidem *falsa*
incondita semunciam aut vnciam lata, palmum
vnum aut duos longa, tota albent, obfusco mu-
rone, incana mollique lanugine pubent: *caulis*
cubitalis & sesquicubitalis, lignosus, in ramos
multos fissus, incanus similiter & tomentosus:



floribus extemis
tamulis herent,
ex oblongo ta-
lyce piloso e-
rumpentes, è
quatuor foliis
compositi, ce-
lore vel albo,
vel coccineo,
vel saturatiore
viola eo tradi-
ti: vnde *siliqua*
nascuntur pal-
mum circiter
longa, quæ
duos continent
seminum versus,
quæ compressa,
orbiculata, ruf-
sa, sapore prædi-
ta sunt acutif-
culo: *radix* li-
gnosa, alba. Por-
ro ex eo genere, quod *floribus* gerit purpurascen-
tem, specimen habeo quod *floribus* multiplici infu-
gne.

Figura nostra Fuchiana non vndique placet,
quia non arborecens picta.

Dioscor. *αλευριον*, flore purpureo & albo. Plin.
Viola purpurea & alba. Tragus Germ. winter
Violen. 4. Matronalis, weis per silgen braun. Viola
hyemales 4. alba, incarnata, subtra, purpurea.
Lat. Leucorum siue Viola purpurea, cærulea, ro-
sea, candida, Braun/rot, leibfarb Violaten, quæ
altero demum anto florent.

Dodon. de flor. & Hist. in fol. Leucii genus
candidum maius à folio non florum colore
nuncupatum, Belg. Stoevioleren nominat, flo-
re rubentem, candido, aut ex purpureo puniceo, aut
cinereo candidiorem proximo, subinde vano.

An Viola matronales Veteribus Græcis & La-
tinis cognita fuerint necne nondum compertum
habet Fuchius, Germ. dicitur weis ch veiel, Gall.
gyrstées. Tria sunt genera, candida, punicea, &
purpurea, nec differre admodum nisi solis flori-
bus videntur. Ibidem apud Fuchium Lugduni
excusum quidam addidit. Viola matronales ibi
dicitur, nobis Bacchares videntur. Fuchius qui
tres figuras posuit, non annotavit vllum discrimen
inter hyemalia & æstiva Leucoia, ponit tres
icones quæ potius demonstrare videntur æstiva
quàm hyberna, quas frustra fortè curavit pingendas
si colore tantum differant: nos eam quam
proponit pro Viola matronali purpurea huic capi-
tuli præposuimus, quia iam erat inter eas quas ce-
nimus & paulò melius accedit ad hyemalem
quàm alia dux quæ ad æstivam relegauimus.
Quam hic posuimus Hist. Lugd. non bene ponit
pag. 304. errore fortè typographi pro Viola ma-
trionali alba, quam nos Hesperidem vocamus.

Viola *αλευριον*. Leucoium, non à floribus al-
bedine, sed foliorum, canitie, cinereoque colore
dictum à Lobel. & Peræ in Aduers. videtur.
Etiamnum hodie, ut Dioscor. a quo vulgatil. cogni-
tionis illa triplex è floribus varietas: vbius pro-
pe modum Gentium: sed alba & purpurea cæru-
lea non nisi latu. Obs. Leucoium purpureum &
album, Leucoia Dioscoridis. Icon. Plant. Viola al-
ba & purpurea Teut. 329.

Tabern. Icon. & Hist. Leucoium album. 1. pur-
pureum 2. violaceum 3. weis ch Vieln/ weis/
Braun/veyel braun. Tres ponit icones, nec de-
monstrat in quibus differant, indistinctè de us-
tiam scribens, Compilator Tabern. Hæc præter-
ea Leucoia potuisset relinquere iuxta Leucoium
luteum.

Camer. hort. Leucoium album horten se futi. *Fructus*
cosum. Item rubrum & purpureum nec non ver- *floribus*
ficolor. Discrepan etiam quoddam statem vni-
cam durent quædam plantæ, quædam aliquot
annos. Atque insunt etiam purpureo ob colo-
rem dilutiorem & saturatiorem aliquot differe-
rentiæ.

Gesner. in cat. pl. Viola alba, Leucoion Diosc.
purpureum & cæruleum.

Corn. Leucoium nigrum Hippocratis.
Math. in com. cum mag. fig. Leucoium album &
purpureum. In hist. Germ. weis/rot/braun Veyel/
Leucoium album, rubrum & purpureum.

Histor. Lugd. Leucoium album & purpureum
March.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 1. folio incano maius
flore albo, cinereo, purpureo, rubro luteo, versifi-
colore. In hoc genere non puto extare luteum.

Gerard. Leucoium album, purpureum, viola-
ceum, weis ch purple violet colour Stoeke flower.

Leucoium hiemale & diu durans flore rosa-
ceo, Montbelg. in horto E. C. quod hieme tepere
nere oportet. Monspelu habent Leucoia mixta
ex albo & purpureo, alba & purpurea quæ in
herbis tota hyeme florent, vt & mense Martio
& Maio. Genue in hortis vidi florentia Osto-
bri & Nouembri alba Leucoia & purpurea, &
interdum in hortis hyemem perferebant, Martio
florentia: Lugduni varia habent genera, vbi et-
iam variegatum vidi. Bononiæ flore purpureo,
in horto di S. Saluator al burgo di S. Catharina.
Leucoium procehit Montbelgardi in hortis, folio
cinereo cum quibusdam cinis, vt in mari-
no Monspelano spontaneo, Junio & Iulio flores
albos odoratos & siliquas profertens.

LEVCOIVM PURPUREVM FLORE
pleno.

Speciosus est admodum *floribus* Leucii purpurei
siue violacei pleni, in ætatis non differentis
à precedenti hyemali purpureo simplici, de quo
Aduers. Lobel. & Senz: Mangonio hortotio, re-
petitæque crebriore transplantatione Leucii
purpurei, flores magnitudinem luculentam asse-
quuntur: multiplici singuli prægnant *seminibus*
fectura, Rosam moschatam æquante: sed *seminibus*
orba fit.

Icon. Plant. Leucoium siue Viola purpurea *Viola*
flore pleno. Rubrum Leucoium flore pleno, ma- *purpurea*
gno, pulchro, admodum iucundi odoris colitur,
teste Camer. apud Math. German. Belgii Valen-
tiana & Monte Henaut: inde in alia loca trans-
fertur, difficultet hyemem perfert, ac ex fursulis
propagatur.

Vidimus

Vidimus Lutetia mense Augusto flores in cultiff. horto Robini hortulani regii. Nobis prouenit Montbelgardi Leucoium purpureum flore pleno ex femine misso Argentina per D. Fridericum Meierum, creuit etiam ex fuculis, is etiã siccam plantam miserat.

LEVCOIVM AESTIUM FLORE purpureo & roseo ac albo.



Benis foliis emergunt, hyemalibus Leucous similibus, minoribus, tenerioribus, flore nunc purpureo, & roseo, nunc albo. Leucoii candidum genus minus quod Belgæ hette violcreu vocant, à maiore non forma, sed magnitudine folia differt: caules foliaque habet similia, sed minora: flores etiam non v-

nus coloris; sed vel candidos vel rubantes, vel punicantes, vti maioris: siliquis etiam & femina similia. Vocatur autem & hoc candidum à foliorum canitie, vti dictum.

Tragus Germ. Sommer violen/ Viola aestuales, Violarum tertium genus. Leibfarb/rot/bratun purpurfarb/weiß: Lar. Viola diversicolores aliose flore alia albo, alia roseo, nonnulla rubro, quadam purpureo.

Lobel. & pena Adu. Viola annotina, flores exoleti coloris in cœruleum vinaceum languescens ferens.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 2. siue folio incano minus, floribus candidis, rubentibus, punicantibus, vti maius, à quo solâ magnitudine differt. Sed quod Frater ex Dodon. hæc duo genera solâ magnitudine differre scribit, id approbare non possum. Differunt enim etiam in eo quod non arboreat: folia etiam prima differentiam aliquam ni fallor habent.

Alteram ex Fuchsi Iconibus ponimus, quæ pro ambabus esse possit cum etiam eas nonnisi colore differre tradat.

Hist. Lugd. Leucoium album & postea Leucoium puniceum Fuchsi rectius sic appellatum quàm Viola matronalis punicea, quo nomine Fuchsius pinxit.

Leucoium aestium flore purpureo & roseo in multis hortis feritur, vti etiam in E. C. Horto. ex femine variis ex locis conquisito: Stutgardia nomine Viola Lombardica: Vere satum floret Iulio, Augusto, Septembri: Autumnò perit, nec hiemem perfert etiam repositum, quod flore albo marcescendo acquirit aliquid purpurascens. Floret hoc genus, non quidem Vere apud Dodonæum, sed Ianio, Iulio, aut Augusto, & eodem quidem quo satum est anno: hyeme perit.

Viola matronalem albam, puniceam & purpuream admittunt calidas esse fapor foliorum &

radicis, qui acris est, abundè docet Fuchsi. Humiditatem autem multam, Galeo lib. 4. cap. 18. de simpl. medic. facult. teste, ed quod amara non sint, admittam habent. Incidendi & digerendi per habitum vim obtinent. Ideoque radix vt & folia decocta in aqua, conuulsis, difficultate spirandi laborantibus, & veteri tussi auxiliantur. Virinam & menses ducunt, sudoretque ciendi facultatem habent.

LEVCOIVM HIEMALE DIV DVANS. flore albo, folio viridi & luidoglabro.



Pari cù Leucoio, cui folium incanum, magnitudine est, siue caules, siue ramos, seu folia spectes: huic tamen folia glabra, atro viore splendent: flores suauolentes albenr, Leucoiam dicti formæ nec dissimiles bipatenres siliqua seminibus plena.

An Lobel. Obs. Leucoii maritimi species albi floris colore duraxat variatis, & folii

exillitate à Leucoio marino luteo, cui folia viridia in Belgii hortos translata.

An eadem Icon. Plant. Keiri marinum flore candido? Ic. enim non malè conuenire videtur.

Dodon. in fol. Leucoia nonnulla, quorum herbæ folia haudquaquam candida, molia aut lanuginosa, sed virentiora, ad lutei Leucoii foliorum leuitatem & colorem accedentia.

Camer. hort. Leucoium rarius, folio planè viridi, flore albo admodum odorato, quod per aliquot annos durat, sed hyeme est in cella asseruandum. Item apud Matth. hist. Germ.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 3. siue maritimum candidum.

Gerard. Leucoium marinum flore candido Lobelii.

Leucoium folio viridi, glabro, flore albo in horto Felicis Plateri, quod plantauit in horto Il. E. C. Montbelgardi, primo à satione anno rare caulem profert: apud nos hieme sub tectum reducendum: quædam plantas obseruauit eodem anno fatas Montbelgardi florentes Augusto: sed flore minori & minus specioso: Basileæ 1609. in horto fratris C. Bauhini hiemem pertulit. plantas artulimus Montbelgardum.

LEVCOIVM MARITIMUM MAGNUM Laui folium.

Leucoii maritimi radix priusquam caulescat, mollis, tenera, longa, crassa, alba, gustu acri non ingrato, Raphanum amulante: folia lata multa è radicis capite funduntur, foliis leucoii

Descriptio

Tempus Locus &



fatiui hortensis, paria, longa, laciniata, vnciam pene lata, caulis crassifuscus: quinque vel 6. vn. iatum; flores quadrifolij purpurei.

Tale Leucoiū obseruatū Mōspeli, idem etiam attulit mihi Frater caule cubitum excedente, crasso, cum siliquis longis & latiusculis villosis, omnium prima folia (vñ in satis obseruauit) sunt angustia, nō

laciniata, talia etiam superiora, sed breviora Clusio, flores odorati, coloris dilutioris purpuræ, sed quodammodo obsoletæ, in siliquis duplex ordo seminum planorum, subrotundorum, intercurrente membrana: radix multifida, non petennis, sed postquam planta florem & semen protulit [quod secundo plerumque anno, interdum & tertio fieri solet.] pent.

Lobel. & Pena Adu. & Icon. Pl. Leucoium maritimum maius.

Clus. qui in Hisp. & Hist. post. in fol. Leucoium marinum maius vocat: Assumpsit iconem Lobelii, cui ille Icon. Pl. p. 332. titulum fecit Keyri marinum flore caridido: verum ea icon diluitur foliis diuisis qualia suo Leucoio in descriptione Clusius tribuit.

Camer. hort. Leucoium marinum Clusii maius. Et apud Matth. germ. Leucoia in deserto reperi.

Pictura Hist. Lugd. quæ Leucoium maritimum maius vocat, facta est ad plantam siccam & agglutinatam, quam habemus ex Valerandi Dourez stirpibus: inferior pars plantæ erat acaulis Leucoii (vt nobis videtur) maioris, rami autem cum floribus & siliquis adiuuati ex minori Leucoio marino.

C. Bauh. Phyt. Leucoium s. maritimum purpureum sinuato folio. Tabern. Icon. & hist. Leucoium marinum, maius purpureum s. Groß braun Meer veyel. Gerard. Leucoium maritimum purpureum Lobelii, peple Sea stoet gillös flowers.

Locus & tempus

Obseruauimus ad mare Mediterraneum prope Mōspeliū florens Aprilij, vbi etiam Frater vidit florens Maio & Iunio. Gener Cherlerus annotauit in toto Narbonensi litoreo tractu obuium: In Stutgardiano Ill. E. C. Virt. horto, obseruauit florens adhuc Nouembri. Basileæ in horto Di. Zvingeri cum siliquis & flore Septembri. Ex semine prouenit Monthelg. in horto quod excolimus pro Ill. E. C. VV. quod anno 1597. non tectum hiemem pertulit, ac saporis erat acris accedentis ad Raphanum, flore purpurascente vario, id etiam reponimus hęc.

LEUCOIS AFFINE TRIPOLIUM ANGUILLARÆ, & Leucoium maritimum Camerarii.

Descriptio.

Prouenit Tripolium inter Scillam & Caribidim circa S. Georgium. Folia similia Plantaginis.



gini, angustiora, & crassiora, exiit & medio caulis palmorum altus, in tres ramos diuisus: flores similes Violæ matronalis: radix alba acris, odore Raphani, crassa, non odorata vt vult Dioscor. quia Cateuas legit simpliciter, quemadmodum & Plinius, vox igitur *Leucois* est superflua: Anguil.

Camer. hort. Leucoium marinum aliud, Tripolium Aloisii siue Crucigera. Icon. p. 24. Leucoium marinum.

Icon Leucoii marini Camerarii non mihi videtur respondere descriptioni Anguillaræ, non enim sunt folia Plantaginis similia.

LEUCOIVM MARITIVM anguil. folium.



Eradicata, lignosa, Descriptio. alba, cui plures crasse fibræ & plura capita esse solent, multi caules exoritur iuxta mare singulares vel remoti, multo tenuiores & candidiores quam præcedentis, palmares, dodrantalesve: folia breuia, parua, candida, nullo aut obscuro laciniarum vestigio incisa, quæ, vt ait Clusius,

mollia & incana, neque aded crassa aut diuisa, flores in ramulis superiori (siue maiori) minores, coloris pulcherrimè rubentis, & dum flaccescere incipiunt tauratiore, quales Leucoii vulgaris rubri flores, & odorati quidem illi, verum mundis superioe: siliquæ succedunt tenuiores multo, & breuiore quam in præcedenti, teretes: semine copioso minutissimo iusto relectæ.

Lobel. & Pena Adu. Leucoium maritimum minus, vehementius acedine linguâ vellicans quam maius. Obseruat. Leucoium marinum minus flore purpurante. Hesperis Theophr. quorundam. Icon. Leucoium maritimum minus angustifol. Teut. 400. Clus. Hist. & hist. in fol. Leucoium marinum minus, quod ob coloris in flore mutationem nonnulli Mompeliiani, dum istic esse Tripolium vocare solebant.

Hist. Lugd. Leucoium maritimum minus, radice

Tripolium Crucigera

Tripolium

dice parua, breui, candida, foliis multis. Leucoium maritimum minus hist. Lugd. facild nobis persuademus idem esse cum minori de quo hoc capite agimus, quamuis figura multum differat: quæ fortè facta ad plantam primò florere incipientem, prima enim folia non videmus, nec scimus an à quoquam picta: quæ occasio vt ad nostram iconem addiderimus separatim, folia ex Hist. Lugd. Hoc præterea notandum Leucoii huius minoris superiores ramos pictos sub figura Leucoii maioris, vt antè dictum.

Tabern. Icon. & Hist. Leucoium marinum 1. Heine rôtledre Meer Veiel. Item Leucoium marinum minus luteum 5. Heine geel Meer Veiel: primo Leucoio simile, excepto colore luteo. Compilator pro Leucoio luteo marino minore ponit iconem propositam à Clusio & Lobelio, qui colorem non tribuunt luteum: præterea Compilator vidit luteum, quod alii alio colore videntur: oportebat annotare locum vbi viderit, ac cur duas ponit figuras cum colore tantum differre dicat.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 5. maritimum latifolium; Lugd. Hist. maritimum minus. Leucoium 8. maritimum angustifolium, Clusio & Lobelio marinum minus, flore dilute purpureo, quandoque rubro & luteo. Cur non separemus Leucoium maritimum Hist. Lugd. à maritimo angustifolio antè diximus.

Gerard. Leucoium marinum flore candido Lobelii, White Sea stoeke Gilloflowers / & postea Leucoium marinum minus, Lob. & Clus. Small yellow sea stoeke Gilloflower. Gerard. icones Tab. habet: verum per priorem intelligit fortè Keiri marinum flore albo Lob. Icon. Pl. p. 332.

Dodon. de flor. Syluestre quoddam Leucoium humile & paruum, quod in Zelandia locis exit maritimis, ac iuxta Monspelium quoque vii Gellnerus scribit. Lat. in fol. Leucoium sylv. angustifolium, quod sub noctem odoratus est, & Hesperis esse creditur: quæ Plinio autore, nocte odorator. Camer. herb. Leucoium marinum minus.

Monsp. cum vidimus esse iuxta mare Mediterraneum florens Augusto, frater C. Bauh. Maio & Junio. Floret, autore Clusio, Julio & Augusto eodem quo satum est anno, deinde perit: Nascitur Mediterranei maris littoribus per Hispanias & Narbonensem Galliam multò frequentiss. Non modò Zelandia maritimis spontè nasci tradit Dodon. verum & in Narbonensi Gallia, ac pluribus per Hispanias locis maritimis Mediterraneis, cuius odor apud Hispanos sub noctem Occidente Sole intenditur, qui aliàs per diem exiguus.

LEUCOIVM MARINVM PARVVM
folio virente crassifol-
culo.

Paruum sanè est Leucoium mihi marinum denominatum à D. Frederico Meyer stirpium studiosissimo: cuius caules obseruauit tenues, palmares, folia perillos tara, quedam vncia digiti paulò longiora, non nihil sinuosa, succulenta, & crassifolia, glabra, virentia: flores latis magni pro herba proportione, purpurascetes, suc-



LEUCOIVM MARINVM CRETICVM
duplex.

Iosephus Galabonus, ex peregrinatione Cretica redux, lemen ad Clusium murebat Leucoii marini appellatione, è quo tres diuerse plantæ ortæ Earum maxima & prima, caules habuit procumbentes, rotundos, durissimos, multis ramis donatos, in quibus flosculi quatuor foliis constantes, initiò tubentes, deinde ex cæruleo purpurascetes, extremo bifidis, & cordis, vt vulgò pingitur, effigiem propemodum referentibus, quasi ex umbellâ, Ironis vulgaris instar, senam prodeutes, qui vbi floris folia coniungebantur, radiantem imitabantur flammam stellam: floribus successerunt duarum fortè vnciarum siliquæ sine cornicula tereti, in quibus semen oblongiusculum castanei coloris. Ipsius verò plantæ folia longiuscula fuerunt; à Thlaspi foliis non valde differentia, nullis [in caule præsertim] euidenti- bus crenis donata, crassifolia, & aliquantulum amara. Altera priori similis erat, nisi flosculos habuisset dimidio minores, & initiò prorsus albos, deinde tamen paulatim purpureum quidpiam contrahentes, sed nihilominus magis ad albedinem inclinantes. Floruit vtrique Iulio, medio Vere, hoc est, Aprilis fata. Tertia promebat initiò præcedentibus duabus longiora folia, euidenti- bus & conspicuis crenis secundum oras donata, Leucoii Dioscoridis Lobeliani instar, è quorum medio exiit cauliculus rectus palmari altitudine minor: quum florere incipit, nempe Augusto, à latere verò plures fundebat ramulos, in quibus flores, secundo generi ampliudine pares, colore tamen differentes. Nam propius accedebant ad Leucoii marini Lobeliani latifolii colorem, magisque purpurascetes erant, quam in primo genere.

HESPERIDES FLORE PURPUREO, AL-
bo & vario.

CAP. XIV.

Radicibus aliquot parvis, lignosis, & albis nititur: caules erigens cubitum & pluiquam sesquicubitum altos, hirsutos: in quibus alternatim folia Eruca, sed non ita laciniata, in ambitu serrata, acuminata, hirsuta, in virore nigricantia,

cedunt tenues
siliquæ: florens
vidi Argentinæ
in hortu præ-
dicti mense Iu-
lio, & mense
Octobri. A.
Thoma Plate-
ro Medico et-
iam datum
est.

sapote acrisculo : ex foliorum alis erumpunt ramuli, in quibus flores, formâ ad Leucoium luteum accedentes, odoris suauissimi, colore nunc albo, nunc purpureo, aliàs confusis cum albedine maculis purpureis variato : semen in siliquis longis continetur, ipsum oblongum, rufum, acce.

Leucoium. Viola purpurea

Fuchs. *de color.* Viola alba, *Cheiris* & *Keiri*: Germ. *Diell*, Gall. *violier*, Leucoium Dioscoridis. Hæc ille, qui duas figuras habet, alteram nomine *Viola purpurea*. Frustra duæ figuræ: præterea mirum eum has vsque ad hæc dissimiles plantas à Leucoio luteo, Leucoia facere.

Trag. Germ. & Lat. vocat Germ. lingua noster *Diolen*, eò quod hyemem ferre possint, aut ad discrimen alarum. *Gross Diolen*: scribitque *Hermol. Perficam*, *Parthicam* & *Peregrinam* vocare. Quod si præterea hæc *Viola* radicem haberet nigram & instar cornu duram, faciliè dixerit *Æthiopida* Dioscor. Verùm cum & in *Arcadia* *Æthiopia* nascatur tanquam peregrina planta, nihil statuere potest. Insignis sanè error *Tragi* existimantis *Violam Perficam* *Hermolai*, quando quidem is ibi *Gelseminum* tradit.

Trag nos.

Gesner. hott. meminit nomine *Viola matronalis* *Fuchsii* [sed ficto ab eo nomine,] *Viola hyemalis*, *Brabantorum* *moestibloemen*, *Tigurentium* *vsinst* *Hegele* & *Viola Hispanica* *Solerii*: Aliquos interpretari *Hesperidem Veterum*: flores ferre anno secundo, albo, interdum roseos, aut quod rariùs subrubentes.



Eruca

Dodon. de flor. *Viola matronalis*, coloris candidi aut rubentis, diluâtve purpurea, *Eruca* species videtur.

Locus.

Camer. hort. *Hesperis* nostras. *Lobelio* non placet dici *Violam marinam*. Consultè, inquit *Lob. h. us*, non faciunt, qui istam plantam *Marinam* *Violam Damascenam* & *Exoticam* vocitant, cum in *Nitobrigum montosis* & siluosis locis, etiamque in *Anglia* pratis fructet. *Obi. Viola matronalis* & *Damascena*, *Viola alba* *Tragi*. Et alia, quam suauiss. odoris totamque minorem & floribus albis alit in horto *Ioh. Muttonus*. *Icon. plant. Viola matronalis* siue *Damascena* *Teut.* 498

Hesperis

Clusius in *Pann.* & *Histor.* in fol. eandem cum *Lobelio* iconem habet pro *Hesperide inodora Pannonica* sili. De odorata autem alibi in lib. citatis ait: *Hesperidi* nomen inditum anthore *Theophr.* lib. 6. de causis plant. cap. 25. quòd non est plùs redoleat, quàm interdus, cui iustitragatur *Plinius* lib. 21. cap. 7. *Communis opinio* obtinuit, vt ea quam nonnulli *matronalem* *Violam* vocant, & quæ inter *Leucoii* genera referri debet videtur, *Hesperidis* nomen sibi proprium adsciberet: quoniam eius flos, sub vespetam præsertim gra-

Leucoium

to odote feriat, interdus aut nullum aut leuissimum spiret. *Matronalis Viola* dicitur quòd *matronis* at que *virginibus* sit in delictis.

Viola Matronalis

Violam matronalem vel *Violam Damascenam* & *marinam*, quorundam *Violam moschatellam* vocatam, albam & purpuream *Erucam*, *Thlaspium* aut *Rapunculum* gustu sapere scribit *H. Lugd.* quibus idcirco affinem naturâ & facultatibus proximam putat: cum tamen cum *Rapunculo* nihil commune habere videatur. Non bene præterea sub titulo *Viola Matronalis* albâ posita *Icon Leucoii purpurei* *Fuchsii*, vt antè de *Leucoio æstiuo* monuimus.

Hesperis nos.

Casp. Bauhin. phyt. *Viola matronalis* siue *Hesperis* prima hortensis: variat colore flosis, modò candido, modò diluât purpureo, modò rubro: habetur & minor floribus alhis.

Locus temp.

Schvv. *Hesperis* alba, *Hesperis* purpurea, *Prouenit* spontè in *Sequanorum* vallibus quâ *Rhenus* fluit sub sepibus, floret *April.* *Mato* & *Junio* mensibus. *Hesperides* vbique in hortis, *Tiguri*, *Basilea*, *Ferraria* obseruati: *Lugduni* & *Montbelgardi* copiosè, florentes adhuc *Septembri*, vbi hyemem solent perferre: *Patauii* virentes *Decembri* & *Ianuario*: *Februario* florentes flore purpureo. *Genevæ* virentes *Ianuario*. *Notatu dignum* *Hesperidem* putpuream senescentem interdum mutare colorem, & varium pulcherrimum acquirere ex albo & purpureo stitutum.


In *Syrupo Magistrali Comitisæ*, præscribit *Wict. de Scorbuto*, succum è floribus *Hesperidis* expressum, cum alis vocans *Danasiblimen*. Sunt autem hatum *Violarum* folia, gultu quidem acris & calida. *Eruca*, cuius species videntur *Dodonæo* sapore & facultate proxima. *Matronalem* porò *Violam*, tuffi, conuulsis, & difficulter spirantibus medicis traditur apud *Clusium*: vrinas insuper & sudores propelle, incidere, abstergere & digerere. *Semen acre, fuscum aut rufescentis, Erucam*, *Thlaspium* aut *Rapuncium* [*Rapunculum* *H. Lugd.*] gustu tota sapit, inquit *Lobelius*, quibus idcirco affinis natura putatur.

Eruca

HESPERIS PANNONICA INODORA.

Syluestre hoc *Hesperidis* genus, cubitali assurgit altitudine, dudum generum solis donatum,

Deseri



infima ex angusta ceruice mox dilatatur, tandemque in acumen desinunt, sinuatis neruis prædita, alia lata, scissilique basi cauli adnascuntur, utraque serrata, hirsuta, candidiora, mollioraque quàm in vesperide nostra vulgari: stipes ex quatuor compositi foliis, colore exalbicante, vel purpurascente, formâ tamen vrinâ cum sublequen-

quenibus longis torosis siliquis, *semineque* ruffo, cum vulgari hesperide conueniat.

De hac Clusius: Vulgari Matronali Viola adeo similis est, vt ex vtriusque collatione vix discrimen conspici possit. Flores in extremis ramulis copiosi exalbidi, qui ætatis successu purpurascunt: cornicula, semina, radix etiam ipsa cum vulgari omninò conueniunt: solo floris odore, cuius in hac nullam gratiam percipere potui, differunt.

Camer. hort. & Icon. Hesperis Pannon. à Clusio exhibita. An Gelnor. hort. Viola matronalis siluestris: Clus. Pann. Hesperis altera Pannonica inodora sylu. hist. in fol. hesperis tertia, hesperis filia. Clusii icon est eadem cum Lobelii iconè Obs. quam pro Viola matronali posuit.

C. Bauh. phyt. Viola matronalis, siue hesperis 2. filia. inodora.

Argentinae Dominus Vldaticus Chelius de dit plantam ex Agerii stirpibus sicis, cuius inscriptio erat, Viola matronalis seu Damascena Austriaca. Solet altero plerumque à germinatione anno, & à maturo semine, perire. Crescit passim Viennensi agro ad montium radices, & vinearum in collibus sitorum margines. Floret cum vulgari, nempe Maio & Iunio.

HESPERIS FLORE VIRIDI.

IN horto quodam Basileæ legit Frater C. Bauh. Hesperidem, quæ magnitudine quoad omnes sui partes à vulgata differt, dein floris colore qui viridis est, & sine odore. Inscribitur idè ab ipso in Phyt. hesperis: siue hortensis flore viridi.

An Schv. hesperis viridi flore, Viola matronalis viridi flore, Grün vinter Diolen, Iunio & Iulio florens.

HESPERIS COLORE INELEGANTI.



Basileæ in horto D. Chmelii collegi Hesperidem quam Clusii Alpinam primam denominabat. Folia serè sesquipalium longa, duarum vnciarum & semis latitudine, nonnihil sinuata, mucrone obtuso, hirsuta & aspera: flores quales in Hesperide vulgari, sed non expansi, coloris minimè hilaris sed pallidi, multis venulis di-

stincti. Sic describit Clusius, cubitali excreuit altitudine, multisque ramis prædita est, quos confuso ordine ambiunt folia, Matronali Viola similia, paulò tamen latiora, & crassiora, acridiusculo primùm gustu, postea acri & saluamiente, extremis ramis in oblongis pediculis insident flores similes, quatuor foliolis, vt illi, constantes, coloris

admodum inelegantis & obsoleti, & fului, in finitibus venulis ex atro purpureis intercurrentibus, odore interdum nullo, aut adeò tenui, vt vix narius percipi possit, sed sub vesperam gratissimo & suauissimo: flori succedunt oblonga, torosaque cornicula quadrangula, in quibus duplici ordine semen continetur, vulgari hesperidi simile, sub-ruffum: radix fibrosa.

C. Bauh. Phyt. Viola matronalis siue hesperis 4. montana pallida odoratissima.

Hesperis colore ineleganti prouenit in Horto Il. E. C. Montbelgardi Anno 1588. ex semine quod collegeram Stutgardia in horto Ducis: florem protulit Augusto eodem anno quo fata: & Septembri. D. Iacob. Mieg Medicinæ candidatus Basileæ nomine Keyri marini: Basileæ etiam obseruauit florens Septembri, in horto D. D. Martini Chemeleci Poloni.

Radix vltimum biennium non superat, sed postquam defloruit & semen tulit, perire solet, si tamen præcis caulis ad frugem peruenire non sinatur, noua germina interdum producit. Spontè nascentem & semine prægnantem primùm inueniebat Clusius in Praelenberg Hamburgensi monti vicino, Vngariaeque extremo quæ Austria spectat, mense Iulio anni 1566. Eius deinde semen terræ commissum subsequente Vere, plantas protulit, quæ altero anno duntaxat floruerunt Maio, & sequente hieme perierunt. Solent verò quæ semine nascuntur plantæ, floris colore multùm variare, nonnullis maternum colorem retinentibus, aliis aut dilutius pallescentibus aut magis obsoletum adquirentibus, omnia tamen folia crebris venis ex atro purpurascensibus distincta habentibus.

HESPERIS SYRIACA.



Diantia fluita, Descriptio
aut minora, palmum lata, valdè aspera & hirsuta longis nixa pediculis, obtuso mucrone nonnihil in ambitu sinuata. Flores in breuibus caulis figuræ quidem nostratis & vulgaris Hesperidis, sed colore fusco & lurido, multis venulis per eorum folia discurrentibus. Siliquis insignis longitudinis sequuntur recurua, torosa, semen duplici serie continentes.

Clusius dicit Hesperide iam descripta [quam nos flore ineleganti diximus] multò vegetiorem, ampliora habentem folia, crassiores caules maioresque flores, quatuor tamen foliis etiam constantibus, eiusdem planè coloris, sub noctem valdè odoratos, interdum odoris expertes: Cornicula multò crassiora, semen paulò crassius: Radicem non multùm absmilem.

Camer. hort. Hesperis Syriaca, quam alio nom. Eccc

miac vocant Leucoium Syriacum, Panonicæ similibus, sed crassior & minus proceræ, siliquis rotundis, & quasi geniculatis. Item Leucoium Syriacum, rectius Hesperis Syriaca.

Clus. Hist. in fol. Hesperis Syriaca.

C. Bauh. Phyt.

Viola matronalis siue Hesperis 5. peregrina siliquis geniculatis. Camer. Hesperis Syriaca. Huius iconem proponit, & aliam etiam Hesperidis Syriacæ nomine Tripoli spontè prouenientis addidit: verùm non videntur diuersæ, vt & ipsemet Camerarius innuere videtur. In horto Cl. D. D. Felicis Plateri legimus.

Locus & Tempus

Mense Iulio florentem vidimus & siliquas habentem Pfozheniæ Marchionatus in horto D. Grieningeri Pharmacopœi insignis. Obseruauimus etiam in Ducatus Vvitemb. Grenzten in horto D. Braun præfati pagi. In Syria maritima crescit, teste Clusio, cuius semen in Italiam allatum, deinde Viennam missum plantas produxit. Semen maturescere non potuit, quia ferèis floruerunt. Altero etiã anno perire solet eius radix.

HESPERIS SYRIACA ALIA.

Descriptio

Hanc Tripoli spontaneam inuenit Rauuolfus, & Camerarium quoque aridæ plantæ fecit participem. Videtur autem ob locos natales & exiccationem non nihil strigosior præcedente, alioquin parum diuersa.

Camer. Icon. Hesperis Syriaca, siue Leucoium marinum D. Rauuolfii. C. Bauh. Phyt. Non videtur diuersa à præcedenti Syriaca.

LEUCOIVM MARITIMVM latifolium flore cæruleo purpurante.

Descriptio



Alterum Leucoium marinum quod alunt horti quidam Belgii natiuis maritimis natalitius, non ita diuersis est felis, sed lationibus, hirsutioribus: styres cæruleo-purpurantes in palmaribus & lesquialmaribus coliculis: semen in siliquis minoribus multò Leucoii lutei.

Lobel. Obs. [cuius & descriptio est]

Leucoium marinum alterum latifolium, Icon. Plant. Purpureo-violaceum.

Hist. Lugd. Leucoium marinum alterum latifolium Lobelii.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 6. siue maritimum latifolium alterum.

Tabern. Hist. & Icon. Leucoium marinum cæruleo-purpureum, Blaw purpür braun / Gros Meer veelen.

Gerard. Leucoium marinum latifolium, Bread loaf sed Zea siocæ Gilsflower.

HESPERIS ALPINA SIVE MVRALIS minor repens.

Radix Alpina Hesperidis serpit obliquè, summo ferè capite hærens, fibras crebras subinde demittens, capita etiam plura habet: folia in orbem multa per humum sparguntur, ex angusto principio sensim lateſcentia, sinuata, & ferrata, candidantia, & hieme quædam rubentia,



Descriptio
pilosa, Barbaria muraria foliis accedentia, sapore acri prædita, at quæ per caules certantur, lata basi eos complectuntur, non nudis iam dictis dentata: cæterum flores in dodrantalis caulibus ramulorumque fastigii spio multi coæruati albicantes, quatuor foliolis cõstât, quos longa ferè sequuntur siliquis, duas tresue vncias

longæ, alàs ferè lesquialmares, angustas, compressile, in quibus duplex, interuentu membranæ, versus sinuum foliaceorum ruforum, saporis acris.

Noster pictor non expressit pro arbitrio iconem nostram, potissimum radicem repentem.

Clus. Pann. & Hist. in fol. Draba altera, siue 2. missa ab Alphonso Pancio Leucoii montani nomine. Drabæ foliis siliqorum formâ & colore similibus, subacido sapore inieciò, deinde acri: ramulis serpenticibus.

C. Bauh. Phyt. Draba 2. siue alba siliquosa. Draba 2. Clus. Draba 3. siue alba siliquosa repens Lob. Obs. 4. p. 463. & Icon. p. 261. tom. 2. Fratelli Joh. Bauhino Hesperis alpina minor. Hist. Lugd. Eruca muralis Herbariorum, sapore primo satuo, tandem subacri & mordaci.

Hesperidem alpinam collegi Septembri in rupibus inter Clarauallim & Ran. Semen etiam maturum in muris horti Castell. Claraualis: vidi etiam Salinis in muris horti Nobilis Vanferrant minorem florentem April. Frater Casparus Bauhinus misit Basileâ repertam in monte Blaauen. Lugduni nobis prouenit in horto nostro, Genevæ etiam florebat Ianuario & April. ac Nouembri. Florens Maio copiosè in muris S. Vrsanæ, vnde transtuli in hortum Ill. E. C. & floruit Martio. In parietinis, murorumque rimis & inter saxa nasci tradit Hist. Lugd. Inuenit in Tauro monte Clusius: meminit & Ferrariâ in Belgicam eimissam: floret April.

Locus & Tempus

HESPERIDI ALPINÆ SIVE MVRARIÆ affinis Draba succulenta.

Frequentibus etiam ramulis constat, ex eadem radice prodeuntibus, tenuibus, deinde in caput



caput extuberantibus : ex quo aliquot folia quasi in orbem disposita prodeunt, crassa, succi plena, atrâ viriditate splendens, Auriculâ vrsi flore carnei coloris & folii magnitudine ac forma fermè respondentia, sed nonnihil in lateribus dentata, acri gultu, & illic lingua vellicante : ex horum medio pedalis aut ma-

ior exit caulis, gracilis, quem per intervalla ambiunt & amplectuntur folia superioribus minorâ & ad petiolum latiora : flores spicæ instar supremum caulem ambiunt, vt in Priore, & quatuor albis foliolis constant : quibus succedunt teretia & oblonga cornicula, duplici ordine, rufum, pusillum, & planum semen continentia : radix tenuis & repens latè sese diffundit, & nouas plantas singulis annis producit, viuax, & totâ hyeme vi-

rens. Clusius & Lobelius eandem habent iconem, vt in an de eadem planta scribant asserere non audemus, diximus autem iconem Clusii & Lobelii nobis malè exprimere nostram Hesperidem alpinam siue murariam, verùm Clusii descriptionem non respondere hist. Lugd.

Arabis seu Draba altera Pena & Lobelii. Clus. Pann. & hist. Draba tertia succulento folio.

Crescit, inquit Clusius, in decliui montis Herthalen, supra Zeehof, villam Cœnobii Gaminensis, vbi serò floret : at in hortos translata, maturius, cum precedente, nonnunquam etiam ante hiemem. Luxuriat in hortis vbi semel sata. Lobel.

HESPERIDI ALPINÆ, MVRIARIVÆ similis surrecta & magna.



IN montibus inter S. Hippolytum & Mesche mensis Aprilis sine obseruau plantam trium penè cubitorum, ex radice crassifolia fibrosa, sapore aliquantum acri, exoriantur aliquot caules crassi, hirsuti, recti, superne ramulos rectos alternatim inter folia proferentes : folia iuxta terram ex crasso pedi-

culo dodrantalia ad Hesperidem vulgarem ac etiam murariam accedentia, sinuata, & nonnihil laciniata, Drabæ modò vtrinque hirsuta, alternatim lato principio caulem penè amplectentia, breuiora precedentibus, odore accedente ad Lepidium Pauli, sapore amaricante : in extremis ramulis multi flores cum quatuor foliolis albis adluteum nonnihil vergentes, in medio apicibus, externè minimis foliis viridibus ambientibus, siliquis succedentibus duabus vncis longioribus, nondum maturis.

Hæc eadem est fortè cum Hesperide alpina maiore aut valdè similis, quæ Lugduni & Genue nobis prouenit in hortis nostris, in qua siliquæ plurimæ Leuciorum ac Hesperidum, sex septemque vncias longæ, latiusculæ, compressæ, glabræ, semine compresso, latiusculo & penè quadrato.

In Icone nostra folia prima nimis angusta & acuta depicta sunt.

De hac fortè hæc tradit Lobel. Communes inter Sinapi, Buniadem & Thlaspi figuram & vires habet. Prouenit ea non procul Magdalensano, & caulibus illis cellulosissimis Galloprovinciæ, florèsq; Augusto promit luteos, Erysimi, nec siliquas dispares : in gracilibus ramis ad summum & inum vnâ è radice, digitum crassa, fibrosa, pedem longa Rapistris folia, Thlaspi aut Drabæ, leuter laciniata, albida & hirsuta, sapore Erysimi, aut Buniadis Barbareæ.

An Lob. & Pena Adu. Icon. Plant. & Hist. Lugd. Sinapi & Thlaspi media Prouincialis plantata.

C. Bauh. Phyt. Draba 4. Erysimi flore & siliquis Aduers. Sinapi & Thlaspi media. Fratri Io. Bauhino Hesperis alpina.

LVNARIA MAIOR SILIQUA ROTUNDIORE.

VLbonac caule assurgit bicubitali & tricubitali, in ramos diuiso, satis crasso, colore glauco aut rubente, hirsuto : folia vtriciâ, maiora aliquando duplè & triplè, hirsuta, serrata, opposita interdum, aliàs ad ramulorum propagationes singularia, sapore oleraceo : ramis infident flores multi sinuliuincti, vt in Brassica vulgari, pulchrè rubentes aut carneo colore præditi, striati, odore debili, vngue intus conspicuo & albicante, extrâ enim flos totus tubens, sine villo vnguis vestigio : stamina quatuor virescentia apicibus luteis seu chloris : hæc omnia excipit calyculus oblongus phœniceus è quatuor foliolis, duobus maioribus, totidem minoribus compositus : siliquæ oblongæ, latæ, figura luauis, compressæ, filum summa parte emittentes argenteâ bracteolâ exterioribus vtrinque laminas intercedente : semina tria aut quatuor orbiculata, compressa : radix strumosa seu glandulosa.

An Cordo Obs. sylv. herba hederae aut Cucumeraceis foliis. Ibi annotatum, Lunaria Græca fortè.

Gesner. hort. Lunaria Græca rotunda & longa Ollingeri. Rotundam, inquit, intelligo, cuius siliquæ sunt rotundæ : longam verò siliquis longis. Nascitur in montibus quibusdam, cum alibi, tum Helueticorum circa Glaronam & Curiam : species duæ sunt, vna floribus inodoris : altera odoratis : & hæc quidem editioribus tantum locis, nullo alio discrimine. Facilè semine prodit, duratque in hortis nostris : & folia [Viola nigra

Tom II

ferè similia maiora] per hyemem retinet. Anno secundo caulem sandit (& circumquaque fruticans latiore solo ad tres cubitos assurgit) cum floribus & siliquis latis, argentei nitoris cum maturuerint. In ea leuitate Lunæ faciem noctu representant aiant: inde nomen. Quo Veteres nomine plantam hanc dixerint, nondum constat, herbarii quidam *Bolbonac*, alii *Bulbonach* nuncupant, nescio quâ dialectico aut significatione, *Helli sutteren* vocant. Græca vnde sit cognominata nescio, nisi aut nomen aut res è Græcia in Italiam sortè primùm illata sit. Semen latum, compressum, rufum, & cum aliqua amaritudine acerrimum est: vnde *Thlaspi* generibus adnumerarim, & *Thlaspi montanum* appellarim: ad indicandum similitudinem formam, siliquæ præsertim ac feminis, facultates & natales, poterit & Lunare cognominari. *Accedit* sententia mea Dodon. qui *Thlaspi* præsertim *Cratæuz*, hoc esse putat.

Thlaspi montanum



Thlaspinon est

Non esse *Thlaspi Cratæuz* contendunt in *Adverf.* *Pena* & *Lohel.* his verbis: *Lunaria* vulgò nuncupata *Raphanitis* à nonnullis *Cratæuz Thlaspi* credebatur, sed eius acrimonia ad *Ischidicos* multò inefficacior: Et rursus *alibi*: *Bulbosa foliata*, *Officinæ Bolbonac*, *Lunaria Græca* Recentiorum, non est *Armoracia*, siue *Sylu. Raphanus Diof.* aut *Thlaspi latifolium Cratæuz*.

Lunaria maior, inquit *Camer. hort. Bolbonac* aliorum, flore cæruleo vel purpureo, *Thlaspi Cratæuz Dodonæi*.

Tabern. Icon. Viola Lunaris. 1. Monneyel. Schv. Lunaria Græca Recentiorum, *Silber blumen sutteren.*

Hist. Lugd. Viola latifolia.

Helperis. Viola Bulbonax. Lunaria Raphan.

Helperidibus affinis est (inquit *Adr. Spieg.*) ea quam *Viosani latifolia*, alio nomine *Bulbonacum*, & *Lunariam Raphanitim* vocant: item quam *Lunariam odoratam* & *regiam* & *Græcam*. Vtrique folia lata sunt: sed *Bulbonacæ* asperiora *Raphani* modo, & crenata. Græcæ vetò molliora & per ambitum serrata. Vtrique flos quoque *Leucoii quadrifolius*, purpureus, aut subcæruleus: sed fructus latus, foliaceus, serè que rotundus.

C. Bauh. phyt. Lunaria 1. siue maior siliquâ rotundâ: varians floribus purpureis & subcæruleis. Lunaria 2. siue maior altera Dodon. Lat. minor præcedenti & flore albo.

Locus & Tempus.

Creferre copiosè in salibus *Thuringiæ silvæ testis* est *Camerat. hort.* In *Silesiæ* autem hortis *Maio* & *Iunio* florere, *Schvvenckfeldius. Lunariam maiorem* in *Allatia Vvatvillæ* in orto vidi cum siliquis rotundis, semine maturo: *Patavii* in orto *Triuefani. Veronæ* in orto *Dominici Alexandri Serrati Medici: Ferrariæ* in *Monasterio S. Dominici à l'Angeli* *Borentem Martio: Bononiæ* in orto di *S. Siluator* al burgo *S. Catharina Lunariam maiorem* flore purpureo cum quibusdam frutibus albis. *Basilicæ* in hortis, *Florentiæ* in orto *Nicolai Ferrariensis fl. rentem Aprilis: Lugduni* habui in orto *Mais* nescitè *florentem*: & siliquis profertem: *Montbelgardi* in orto ill. eius *Celsi* abundat & *seipsum suo semine* propagat, primo anno non fert caulis nec floret: secundo vhi semen maturum perit.

Calido acrisque & amaro, vt tradit *Lobel. gustu est, præsertim femina. sed tamen radices acetatis, vt Rapuntia, manduntur, nec perinde sunt acres, vt Cratæuz Thlaspi radices traduntur. Absstergit mollicè, calfacit, vinam cit, vt Rapunculus. Semen tritum cum aquis appropriatis exhiberi Epilepticis scribit Schvvenckfeldius.*

Vires.

LUNARIA MAIOR SILIQUA LONGA.

L Atis hæc est *Lunaria præcedenti foliis, serratis, acuminatisque: flos* confimilis purpureus: at quæ etiam excipit *siliqua*, oblonga est, & quæ prædictæ *Lunariæ* siliquis latitudine multum cedat, binis vtrinque membranis mediâ argenteam spontè per feminis maturitatem relinquentibus.

Descriptio



Huius speciem cum siliquis longis ostendit *Dominus Agerius* cum hæc in scripturæ. *Viola latifolia odorata* folis exquisitè rotundis. *Vlmæ* pronens *Viola Lunaris* senlatifolia 2. *Tabein.* Hac factè videtur differre à præcedenti, folia *Tiliam maiorem* expriment, ac mihi lauiora videntur quàm cæterarum. Is

Lunaria folio rotundo siliqua longa

etiam demonstravit eam titulo *Violæ latifoliz* non exquisitè rotundæ sed oblongæ: illi sanè folium multò longius *Lunariæ* modo, qualis autem siliqua sit mihi non constat, videtur tamen diuersa ab ea cui nomen indidit à siliqua rotundiore.

Lunaria folio longiore

Lob. Icon. Lunaria Raphanitis, siue Bolbonac radice rediunta p. 396.

C. Bauh. phyt. Lunaria 3. siue maior siliqua oblonga.

Tabern. Icon. & Hist. Viola Lunaris. 2. Monneyel 2. Violæ Lunariæ. 2. radix.

Gesner. hort. & de Lunariis, Lunaria longa siliquis longis. Existit mo ea quæ ex Gesnero capite de Lunaria maiore siliqua rotundiore excerptissimus huc referenda esse.

Schv. Lunaria Græca perenni radice, malds veiclen, Sile.

Clus. in fol. Viola latifolia, Lunaria odorata. Camer. hort. Lunaria maior alia flore albicante odorato, perennis Helueticis, vbi quoque copiosè proterit.

Thal.

Thal. Hæc Lunaria Græca, Viola latifolia siliquis non orbiculari ambitu circumscriptis, sed oblongioribus: scribit apud eundem Camerar. perenni esse radice, & floribus albicanibus, odoratis.

In monte Saleux, non longè à Geneua abundat cum longis siliquis: translata in hortos hieme in perferebat, & virens Ianuario, florebat Maio. In monte circa Lacum Seben Abbatiz insignis nobilium Dominarum quatum sum Medicus, reperit cum siliquis Augusto. Spiræ anno 1595. Iunii 2. D. Teugenagel mihi denominavit & demonstravit Lunariam, quam vocat perpetuam radice, floribus caruleis, siliquis longis. Argentinz in horto Frederici Meier vidi siliqua longa Octobri. Basileæ in horto Dom. Zvingeri Septembri eandem obtinuit. In inonranis siluis Aultriz & Styriæ vicinarumque siluosis locis, atque etiam in Pannonia interamni, autote Cluio, spontè magna copia prouenit.

Semen abstergit & vrinas prouocat. Quidam in Helnetis Chirurgus ex Lunaria perennis confusus foliis & Sencilis parabat vnguentum Vulnerarium non contemnendum. Puluis feminis amarissimi, cum aqua appropriata exhibetur in Epilepsia, Camer.

ALLIARIA.

CAP. XV.



EX radice tenui, lignosa, alba, Allium obolente, caules prouit cubitales & sesquicubitales, tenues, subhirsutos: folia primum rotunda, Hederæ terrestris modo: mox nonnullum acumen assequuntur, serrata, sapore & odore Allii, mitiore: ex foliorum alis ramuli erumpunt, in quibus stoculi multi albi-

di, quatuor foliis constantes, in quorum medio apices ex viridi flauescetes: semen in siliquis longis angulosis, nigrum, oblongum.

Ruell. & Fuch. Alliaris & Alliaris. Sunt inquitis qui putè Scordotum hanc esse, falsi quadà odotis cognatione: siquidem Scordotis foliis est similitudine Quercus. Alliaris verò frondibus Vitiæ modo fimbriatis: Illa quadrangulo caule, hæc rotundo: illa flore subrubro, hæc luteo: Illa tantùm subolet Allium, hæc ita repræsentat, vt iusto Allii odore nares impleat.

Trago, pingenti & describenti dicitur Thlaspidium secundum Crateuz, videtur posse dici Cornuta Thlaspi species.

Autor Pandectarum Ranam marinam, Alliarium, & Pedem Asininum vocat.

Anguill. Rima Maria.

Lonic. vulgò Alliaris, Alliatas, Thlaspi Cornuta.

Gesner. hort. Alliastrum vel Alliastris Recentiorum.

Dodon. Gal. & Lat. Alliaris quorundam Scordotis, non tamen vera, quæ etiam Scordium dicitur. Querunt Adu. Lobel. & Penz. Num Cista Galli Herbariorum sit *Alliastrum*? an num potius Alliaris Recentiorum? & postea Alliaris, Pes Asini Pandectarum, an Alektorolophos Plinii?

Matth. Lacun. Lob. Obs. & Icon. Plant. Camer. hort. & Epit. Matth. Tabern. Cast. Hort. Lufit. *Alliaris*. C. Bauh. Phyt. siliolarissimo & subrotundo. Camer. apud Marth. Germ. *Alliaris*.

Alliaris Lat. Germ. knoblauch kraut / leuchel, Nomina leuchel kraut / Salskraut. Belg. loock / Sonder linguatum loock / Gall. L'herbe des aux, Alliare: It. Alliaris. Boh. Gesenowa hyliaua. Alliaris autem dubio procul dicta, quòd folia digitis comminuta Allium redolent, seu Potrum sectium cum Nasturtio.

Alliarium copiosè florentem vidi Monsp. mense Martio & Basileæ. Geneuæ virentem Decembri versus Cologni, & Februarii principio, què itur Saleux, florentem mense Martio in colle iuxta Rhodanum, & Maio siliquas ferentem Iunio cum semine maturo. Montheigardi passim spontè prouenit etiam in horto E. C. virens Februariario. Obseruauit Bononiæ & Patauui mense Martio. In Ducatu V. virtemb. non longè à fonte & Balneo mirabili circa pagum Boll / & Eychelberg / semine maturo Augusto.

Vrinam cir, teste Ruellio, si tecens in potu teratur. Sicca in vino coquitur, ad serpentium morsus, & venena omnia efficax. In rosionibus stomachi, dysenteria, contumacibus vrinis, ex nullâ duobus denariis datur bibenda. Lenram pectoris crassitiem digerit. Contra veterè rillum ex resina & melle sicca lingitur. Longis præcordiorum inflammationibus cerato collecta prodest. Podagras acri aceto circumlitas mulcet. Imposita menles excit. Vetera vlcera purgat & ad cicatricem ex melle perducit. Recentia quoque vulnera cogit farinæ conspersus. Excresecencia in corpore compefcit. Alliaris commodè totius succis, quæ embammata seu in tinctis vocant, adiungitur: debet autem aceto, sale, & gingibere condiri. Eiusmodi certè embammata, quæ hoc pacto vt diximus ex Alliaris conficiuntur, non sunt nimium feruentia, & Tragi quidem iudicio gratiora ac etiam vtiliora iis quæ ex Sinapi sunt, multè tamen illis mitior & vsu commodior existit. Vis plantæ huic à Matth. assignatur calfactoria & desiccatoria, verùm non adeo vehemens, vt in Allio. Attamen hinc certè colligi potest. quòd ea crassos humores extenuare, & lentos incidere valet. Semen emplastri modo impositum, vuluæque admotum mulieres vteri strangulatu oppressas liberat, & excitat. Semen tritum, naribusque impositum sternutamenta excitare cerebrumque purgare Tab. prodit. Herbam in oleo & aqua decoctam potà Asthmaticis subuenire scribit Cam. Sunt, Dod. testimonio, qui folia enematis incoquant, quæ vel ad coli, vel nephriticos dolores iniiciuntur: in quibus non modò flatus insigniter discutere, sed ex calculo dolores mitigare ac sopire feruntur. Excalfacit autem & resecat secundo ordine intenso aut tertio remisso. Alliaris singularem vim ac proprietatem, quâ putredini aduersatur, habet. Eademque vlcera putrida ac fœtida abstergit & mundificat, minori tamen cum efficacia quàm verum Scordium, Mirum igitur nemini videri debet, si nonnulli antiquorum Arabum præcipuè pto Scordio vero Alliarium sub-

Locus & Tempus.

Vires & vsus.

stiterint. Causa fortè fuerit quòd Scordium in illis regionibus minimè creuerit, neque nisi siccum & vt plurimum obsolecum haberi poterit, & Allaria apud ipsos prodeiret. Sed quia in exiccata herba parum facultatis & virium remanet, ideo ipsi in fine Aprilis aut ineunte Maio colligi, & postquam per diem vnum in vmbra exiccata fuerit, minutim incidi contundique in mortario, & prælo succus exprimi solet, qui in vitreis ampullis, superinfuso pauco Oleo, etiam ad tres vsque annos referuatur. Idem quoque sartagini succus infusus lento igne inspissari potest & ad eundem vsum in multis annos referuari. Magma deinde exiccatum & in cinerem reductum, aut ex eo Sal extractum maximo cum fructu mundificatiuis admiscetur. Succus verò siue simplex inspissatus vnguentis cataplasmatibusque inditur ad Gangrænam aliaque vlcera, putrida, foetida ac maligna, vti in tractatu Fabricii Hildani de Gâgræna & Spacelo videre est: Abstergit enim, vt antea monitum, mundificat & putredini resistit, parumque à vero Scordio discrepat.

Locus.

Colligendi tempus.

Succi præparatio & referuatio

Sal ex ea

Vfus

SISYMBRIUM CARDAMINE, SIVE Nasturtium aquaticum.

ERUCA facie folia profert viridia & atronitenta, sapore horrensis Nasturtii, mitiore: caules proceri ferè, striati, concaui, ex viridi ruherentes nonnihil: flores quadrifolii, albi, apicibus lateis: siliqua oblonga, bene habitæ: in quibus exigua semina, sulua, gustu acra: radices vicem suppleant, capillares fibræ candidæ, quas à caulibus imis demittit.

Variat, inquit C. Bauh. hæc prout humidioribus, aridioribusque locis enascitur: illud foliis ferè Terebinthini magnitudine: hoc triplo minoribus, quamuis viribus non discrepent: sic & tenuioribus foliis & simplicibus cauliculis locis ficcis reperitur.

Σισυμβριον ἢ *πικρον*, teste Dioscoride, sunt qui Cardamine, alii Sion etiam appellant. Est verò herba aquatica, quæ in iisdem quibus Sion locis provenit, Cardamine idem nonnullis dicta, quòd gustu Cardamum, id est Nasturtium, repræsentet. Folia primùm rotunda prodeunt: augeſcentia verò Erucæ modo finduntur.

Plinio (qui cum Sisymbrio priore Dioscori confundit, vt videre est n. n. g. lib. 28.) vocatur Sisymbrium in riguis natum, simile Nasturtio. Palsim verò ab omnibus hæc planta traditur.

Ruellius magnâ confidentiâ scribit neminem negaturum fore Sisymbrium Dioscoridis, esse Nasturtium aquaticum Officinarum & vulgi *Crescionem*.

Cordus tradit Sisymbrium hoc alterum Dioscoridis solo nomine priori simile. Nam Nastur-

tij potius quàm Ilius speciem esse. Quapropter etiam à Græcis *ναστούριον* Nasturtiarium & à German. *Brin freß* vocari, monè que Recentiores maximo errore Senecionem appellare.

Nasturtium aquaticum (referente Trago, Germ. & Lat. lib. 1. cap. 26.) *αγροκαρδίνιον* quidam appellant, quamuis ad pratense videatur hæc appellatio referenda. Iacob. Manlius Nasturtium agreste, Saturagi, Senation, & Lepidion vnius & eiusdem plantæ nomenclaturas esse censet. Non defunt (inter quos Simon Ianuensis est) qui Nasturtium hoc Thapsiam Indam, Scesfabram, Ozimû, Carmenû, Hoalmarâ, nûcupatâ velint, Lombardi (teste Mâlio) Cisonû nominât. Mefue Scisfabram, Ozimum maius, Serapioni cap. 7. Ozimum carmenum dicitur. Sunt qui Nasturtium aquaticum, Nasturtiarium Cardaminem, Sisymbrium, Sium & Lauer appellant. *Tragus* autem eorum sententiâ subscribit, qui Sisymbrium alterum Dioscoridis, Nasturtium aquaticum aut certè eam plantam esse affirmant, quam is Sion non odoratum, Crateuas artem *σιον*, & Plinius Thymbræum appellauit, qui fit vt Sion exitimet. Sed malè. Est enim Sion ipſius non odoratum, Anagallis aquatica, de qua suo agemus loco.

Autoribus Monachis, alterum Sisymbrium à Dioscotide descriptum quod est aquaticum, quòdque vulgò *Crescionem* & *Crescionem*, & Nasturtium aquaticum nominant, aliqui Cardaminem quasi Nasturtiarium statuunt. Nonnulli etiam [vt Dioscorides tradit] Sion.

Auicenna vocat illud Pupillam oculi, & Erucam aquæ, & Apium aquæ, & facit de eo caput quod est de pupilla oculi. Sed existimauit idem esse cum Sio: quia fecit aliud caput quod inscribitur de Sumio, vbi B. Lunensis pro Sumio vertit Sium, & pro pupilla oculi *Chare. th. sim.* vt supra quod est pupilla oculi: Et sequitur: existens in aquis itantibus, & in ipſo est bonus odor, & dicitur in cap. de Caf. & C. In cap. de Caf. autem scribendum Ch. realhain præfatum, quod est Pupilla oculi. Ergo ipsa duo capita sunt vnum & idem, vt legenti non est dubium.

Quibusdam hoc Sisymbrium aquaticum falso Lauer dicitur.

Erant Simon Ianuensis & Pandeſtarius scribentes Crescionem esse Diosc. Senecionem.

Iouert. in Præf. sua vocat Senecionem aquaticam.

Falli dicit eos Matth. qui pro Sio herbam *crescione*, vulgò vocatam, tam scilicet dulcem, quàm acrem, ac subamaram, in medicamentis vsurpant. Quippe quòd ea non alia sit planta quàm Sisymbrium aquaticum, quod, Dioscoride teste, aliqui Cardaminum, alii Sium appellant. Picturam huius Sisymbrii, vel Nasturtii aquatici habet Matth. sine floribus & siliquis, huiusque summitates videtur appinxisse suo Sio. Camerarius ad hiltor. Germ. aliam posuit figuram cum siliquis & floribus.

Anguill. dicitur Vella (cuius mentio fit in lib. *Vella Gal. simpl. Gal. attributis*) nihil aliud esse, quàm Sisymbrium 2. à Fuchsio pictum, quod est 3. Matthioli, Sium Crateus, Sisymbrium 2. Dioscoridis, quòd notum sit in Italia sub nomine *Crescione* & Senecion Serapionis. Considerandum tamen in Nasturtio aquatico florem esse album, Vellæ verò tribui florem violaceum, vt montimus cap. de Vella.

Dodon. Gall. *σιον*, Sium, Lauer, Gall. *Crescion aquaticum*. Lat. in fol. Nasturtium aquaticum. Sion Crateus. Lonie. Sisymbrium, Cardamine *Cræcorum*

Descriptio



Nasturtium

Senecio

Trag. mon.

Cresfo

Sion

Pupilla oculi

Senecio aquatica

Sium

Crescion dulcis, amara

Vella Gal. simpl. Sium 2. Diosc. 2. Diosc.

rum, Nasturtium aquaticum, Offic. Lacun. Silymbrium tertium, Silymbrium Cardaminon: Cronemb. de comp. med. Alterum Silymbrii genus, Cardamina. Io. Veyer. Nasturtium aquaticum maius. Marc. Hirsch. Nasturtium aquaticum minus, Græcis *σινυβριον καρδαμινον*, dictum Scorbuto *δι' τὸ ποσειδωνον*: Euch. Roessl. Nasturtium aquaticum, Senecion. Casalp. Silymbrium aquaticum.

Hist. Lugd. Silymbrium Cardamine 1. Cressio vulgaris Martioli.

Cræteuz Sion Eruca folium, Nasturtium vulgi [sic enim Adu. Lob. & Penz inscribunt,] quia non perinde odorato est gustu, vt Dioscoridis Sion, minisque medicato & acni sapore, idcirco Plebecula Nasturtium aquaticum, Cræteuz etiam *σινυβριον*, id est, parificandam dicit. Huius varietas duplex, vna minor æqualis ferè Dioscoridis Sioni siue Laueri, cui conuictor, & similis eatenus, vt non rarò rustici vtramvis pro vtralibet accipiant. Hoc Silymbrium ni fallor vocant alibi Adv. Cardaninem aquaticam & Berulam. Icon. Plant. p. 209. Teut. 150. Tabern. Hist. & Icon. Silymbrium aquaticum, Græcè *καρδαμινον*. Lat. Sion aquaticum, Nasturtium aquaticum, Anagallis aquatica, Silymbrium Cardamine, Lauer: Ital. *Gorgolestro*, Gall. *La Berle*. Hisp. *Kabacas*. Mirm lac. Theod. tot miscere nomina diuersarum plantarum: confundit cum Nasturtio aquatico nomina eius plantæ, quæ à plerisque Anagallis aquatica dicitur, quæ Germ. *Wasserpüngen*: & Gall. *la Berle* dicitur.

Gerard. Sium minus, Smal water Cresse. Græc. *σινυβριον*. Lat. Sium alterum & Silymbrium, laporis est Nasturtii satui. *Nesimus* quid venerit in mentem Gerardo vt poneret iconem Silymbrii aquatici. 1. Tabern. cum dictis nominibus Tabern. quod deterius, cum mox tribuere nomina Nasturtii aquatici Sio medio siue Pastinacæ palustri Tabern. ac id denominare malè Nasturtium & Silymbrium aquaticum.

C. Bauh. Phyt. Nasturtium aquaticum primum *σινυβριον* Græcè aut *καρδαμινον* Diosc. & Plini forte lib. 20. cap. 22.

σινυβριον Græcè seu *καρδαμινον* Diol. Silymbrium, Cardamine, siue Nasturtium aquaticum: Germ. *Brunkress* oder *wasser kress*: Belg. *wasser kress*: Gal. *Cresson*. Ital. *Sifenbro aquatico* & *Cressione*. Hisp. *Berros*, aut *Agriris*. Angl. *Water cresses*. Boh. *Kicicha* potocny.

Silymbrio montes plerique scætant, inquit Plinius, sicut in Thracia, vbi aquæ deferunt ex iis auillos ramos, seruntque. Item Sicyone ex suis montibus, & Athenis ex Hymetro. Simili modo & Silymbrium ferunt. Latissimum nascitur in puteorum parietibus, & circa piscinas, & stagna. In fontibus calidioribus aquæ supernatare, ac Maio mense ingruente flosculos admodum exiguos & candidos proferre, testatur Tragus. Silymbrium Cardamine siue Nasturtium aquaticum abundat circa Geneuam, vt in *plain palais*, vbi tota hieme viret iuxta fontem, ac eo in acetariis vtuntur. Obleruau in Italia inter Veronam & Castelfranc. Montepelii vult cum flore Martio mense. Montebelgardi multus in locis prouenit ac tota hieme viret, floret Iulio & Augusto.

Excælefacit, autore. Diosc. vrinas mouet, ac crudum erianum est. Purgat etiam lentigines ac vitia cutis in facie à Solis ardore contracta. nocte tota impostum & matutind detraçtum. Efficax est teste Plinio, aduersus aculeata animalia, vt sunt crabrones & similia. Sedat capitis dolorem:

Item Epiphoras. Alii panem addunt, alii per se decoquunt in vino. Sanat & epinyctidas, cutisque vitia in facie mulierum intra quartum diem, nobilibus impostum, diebusque detraçtum. Vomitiones, singultus, tormina, stomachi dissolutiones collihet, siue in cibo sumptum, siue in succo potum. Non edendum grauidis, nisi mortuo conceptu. Quippe etiam impostum eiicit. Mouet vtinam cum vino potum. Quos vigilare opus sit, excitat infusum capiti cum aceto.

Genus Silymbrium Cardaminem dictum, sicum quidem, tertii ordinis calefacientium ac siccantium esse dicit: humidum verò & vitide secundi.

Cum Raphano & Pettoselini radicibus ferto, ex albo meraco & butyro calefacto, calidòque pubi admoto, vrinas educit ac trahit, Matth. Sinecipiti illito veterinos inuat & præterim foliorum succo. Quod Plinius scripsit: quos vigilare opus sit excitat infusum capiti, cum aceto: Matthiolus air succum cum aceto naribus impostum id facere: dicit ex sententia Plinii vitandum grauidis, quia nimium pellat. Plebecula vt tradit Lobelius in quadrageno vens ieunio multum in acetariis vorar, ac potiomibus ad calculum accipit, nec malè cedit. Hæc herba ait Camer. in hist. Matth. est ex iis, quarum vtilis vsus est in obstructionibus & puridine hepatis & henis, idèd non solum hydropicis valdè vtilis, sed multò magis iis qui laborant Scorbuto morbo vulgari Saxonibus & Septentrionalibus, si per aliquot dies in potu detur.

SISYMBRIUM CARDAMINE, SIVE Nasturtium aquaticum flore maiore elatius.



Nasturtium hoc aquaticum caules habet infirmos graciles, canaliculatos & veluti intortos, cubitales & bicubitales, in ramulos aliquot circa summitatem diuisos: in quorum extremis flores simul multi vt in Nasturtio pratensi, eademque ferè magnitudine, pediculis semuncialibus & longioribus,

inodori, albi, quatuor foliis constantes, apicibus purpurantibus, stilo viridi: quibus succedunt siliquæ longæ, in quibus semen: folia ex interuallis alternatim in caule & ramulis disposita odore & sapore Nasturtii vulgaris, non nihil amaricante, alata, quorum singularia segmenta interuallo distantia, oblonga sunt & sinuata, atriplicis sylvestris ferè modo, infima verò vbi primum prodeunt, rotundiora, vt in Iberide Fuchii. Radix repit, hinc inde demissis fibris tenuibus.

Figura nisi iam facta fuisset meliorem curassemus parandam: Hanc autem plantam propter

magnam similitudinem cum Sisymbrio, Sisymbrium & Nasturtium aquaticum vocamus. De hac fortè Thalin Hare. sequentibus agit: Sisymbrii alterius secunda species, seu Nasturtium aquaticum, amarum, priori omnino simile est: nisi quòd grandius paulò assurgat, ac folia magis acuminata, longioraque habeat, & nigriora: laporis v. hementer amara, ita vt prioris modo in mensis recipi non possit, nisi decoctum, iuribus tamen prioribus abiectis tamdiu donec amaritudinem omnem deponat. Hoc autem antequam caulescat folia exhibet rotunda, ampla admodum, duarum ferè vnciarum. Ac vtraque species non rarè iidem in locis simul & semel reperitur.

Sion alterum sic vocante & scribente Camer. ad Histor. Germ. Matth. J abundat iuxta rivulos & locis humidis, potissimum in siluis, vbi vt plurimum reperit, caule tenero, lato, Nasturtium fontani tenuiore & delicatiore. Item in lib. Icon. siue Epit. Matth. Sium vulgare. Italis *Sio falso*. An Matth. intellexit per Sion quod olim pro vero exhibebat & postea pro falso, eandem plantam quam Camerarius, consideratione opus habet. In icone Matthioli flores minuti, folia Apiorum modo diuisa. In icone autem Camer. (quæ quoad folia potissimum, minus placet) non ita diuisa, flores etiam maiores: nos igitur quod antè diximus, Iconem Matth. figmentum ex diuersis plantis censemus. Hoc etiam hic notandum, descriptionem Camerarii posse conuenire cum Sisymbrio Cardamine minore.

Nasturtium
aquaticum
amarum

Camer. no-
sant

Matth.
figmentum.

Sinapi.

Nasturtium
riuale.

Cardamon
agrion.
Triale.
Sion.

Locus &
tempus,

An Trago Nasturtium aquatici genus, Sinapi sextum flore albo in litoribus & ad fossam gustu subamaro.

An Gesner. hort. Nasturtium aliud riuale circa saxa riuorum Stein fressch. A rero Nasturtium aquatici genus licetis diuisiue & acris. Item in cat. Nasturtium sylv. *de Jussieu* & *Stein fressch*.

An Lacunæ Sisymbrii aquatici alia species maior, vulgè dicta Borraxas, quæ reformidanda, quia aliqui eius esu mortui.

C. Bauh. Phyt. Nasturtium aquaticum flore maiore. Sium vulgare Matth. Sion Matthioli & Itolorum Lobelii.

C. Bauh. apud Matth. Nasturtium aquaticum altetum, quod amarum est & vltra cubiti altitudinem assurgit, foliis magis acuminatis, de quo Thalus.

Nasturtium prædictum obseruari copiosè ad riuos vallis Gribachianæ, vbi fontes acidi, & apud fontem acidum Hibelshaw, aliquid amaritudinis & hirsutici obseruauit. Vidi præterea inter Röhlgang & Pfulingen in Ducatu Vvirentbergico: inter Malmunster & Raupack: inter Bessfordiæ & Daniutin ad ripam fluminis, florens Aprilis & Maio. Frater Casparus misit aliquando collectum Basileæ ad riuos: Semel etiam vidimus, non longè à Molendino Montbelgardi iuxta flumen.

SISYMBRII CARDAMINES SPECIES quædam insipida.

Descriptio **C**aulis multi cubitales ac maiores, striati, glabri, caui: folia dodrantalia alternata, foliolis constant in alæ propemodum formam digestis, aliis aduersis, aliis alternatis, ad communem costam geminâ pinnâ caules complexâ annexis, vncialibus, ad Sisymbrium Cardamines flore maiore fo-



Matthiolum hanc intelligit per Vellum Anguill.

An Casalpino Accipitina altera si nilis prima (sive Seriphium Germanico:) foliis crassius diuisis, ad Nasturtium accedentibus, minoribus: flosculis candidis, siliquis prælongis & tenuibus. Descriptio Casalpini in quibusdam conuenit cum nostra planta.

Vidi in horto D. Friderici Meyet Argentinæ, vbi pluribus annis ad maturum durat, florens Maio, vti Montbelgardi in horto Il. E. C. vbi plantati.

Locus
tempus.

SERIPHIVM GERMANICVM SIVE SO- phia quibusdam.



longæ, filii star tenues, seminum loculos fortis ostentantes: ipsum verò semen minutum, rufum: Radix alba.

De hoc Tragus. Nihil refert, inquit, siue species Absinthii sit, siue Abrotani. Si Diosc. non diceret Seriphium in Ægypto prouenire, existimarem esse nostram Wormstrait, ac hoc pro eo veteres, vocabo Seriphium Germanicum, & Lumbricorum herbam. In Bauaria & Hassia semen hoc Wollfamen appellant.

Gesner. hort. Nasturtium genus sylv. quod Welsfamen vocant.

C. Bauh.

lia accedebus, sed Apiorum modo incisis, sapore nullo manifesto: flosculis per summos ramos confecti, parui, albi, apiculorum numero muscoli visi: quos siliqua excipiunt longæ, vnâ cum floribus insipida.

Hanc plantam C. Bauhinus collectam Patavii in monte Castelli, dedit nomine Vellæ Galeni Guilandino, fortè apud

Stella Galeni.

Descriptio

C. Bauh. phyt. Nasturtium sylu. Monophyl-
lon latiore & angustiore folio reperitur, quare
duas figuras habet Tabern. Thaliætri nomine, sed
Diofco. non est: nec etiam Scirphium Absinthium
vt aliqui volunt.

Tabern. Icon. & Hist. Thaliætrum, Herba So-
phia latifolia, Sophienfräut (Mänlein. Thali-
ætrum, Herba Sophia angustifolia, Sophien-
fräut wälsin. Hactenus aliqui Sophiam existi-
marunt verum Scirphium, aut Absinthium mari-
num, sed errant. Est verum Thaliætrum aut
Thaliætrum Antiquorum. herba Sophia quibus-
dam dicitur Eruca geratina.

Dodon. Gall. Thaliætron, Thaliætron & So-
phia.

Aduers. describunt ac dicunt, sitne Sophia
Chirurgorum Thaliætrum Diofco. Sophia vulne-
raria apud Septentrionales. Paracelsus nullum
non vlcus, se ea percuraturos pollicetur, qd di-
cerunt à Chirurgis practicis, qui ætate Guidonis
& Petri Argelate vixerunt. Quærit & Lob. Obs.
Eruca Geratina dicta Italorum an Sophia Belga-
rum: an num potius Matthioli Erysimum? Idem
alibi figuram habet hæc scribens, Sophia Chirur-
gorum sitne Thaliætrum Diofco. Aduers. p. 329.
Thaliætrum Dodon. vel num sit Eruca gerati-
na Italorum? Perperam Scirphium germanicum
Tragi, Fuchsi, & Cordi, Icon. plant. p. 735. Teut.
901.

Apud Fuchsin Hist. Lugd. impressa pictura est
sine descriptione cap. 123, hoc titulo: Nasturtium
syluestre. Oportebat apud Fuchsum relinquere
figuram cap. de Absinthio, existimabat enim esse
Absinthium Scirphium quod apparet ex siliquis,
quas attribuit Scirphio, qua in re merito repre-
hensus Matthiolo. Lonicer. scirphium frait/welsa-
men/habichs frait/Scirphium, vulgè Accipitri-
na, Officinis Santicum, Ital. *Seme santo*, Gall.
mort des vers, Hisp. *Semiente lumbrizes*. Sophiam
describit, & depingit si contulisset Santicum
Officinarium, siue semen Gal. & Hispanicè ab hoc
denominatum, vidisset se confundere duas plan-
tas.

Hist. Lugd. huius figuram habet sub titulo
Thaliætri Dodonæi, confundens hoc cum Thali-
ætro Antiquorum. Cæsalp. Accipitri-na vulgi.

Scirphium germanicum, quibusdam, siue So-
phiam copiosam, obseruauit Tubingæ & Stut-
gardia Ducatus Wirtembergici, vbi præceptor
meus Fuchsius vocabat Nasturtium sylu. Basileæ
etiam florens Iunio, propè S. Iacobum proueni-
re annotauit Frater C. Buhnius: Semine matu-
ro Octobri abundè vidi iuxta Castellum *Flori-
mont* siue Blumberg. Geneuæ multam & ex se-
mine deciduo virentem mense Martio. Mont-
belgardi est mihi fata in hortu Ill. E. C. florens lu-
lio. In Sabaudia frequens circa muros & rudera
vidit Gesnerus. In veteribus maceris, locis ru-
deratis, lapidosis, ac non raro arenosis, ac aliis
incultis exit, vbi semel nata singulis facillè recur-
rit annis. A Iunio in Autumnum vsque, & qui-
dem particulatim, floret: semen interea perfici-
ens.

Facultate, eodem tradente, Sophia resiccans &
adstringens est, & particeps alicuius frigiditatis.
Semen huius assumptum ventris fluores sistit:
aduersus dysenterias commendatur: sanguinis
profluxu reprimat. Cæsalp. ait: Semina laudas
ad lumbricos necandos, ab iis puto, qui ad Scir-
phium referebant.

SIVM SEV LAVER MATTHIOLO
siliquosum.

CAP. XVII.

Quandoquidem Matthiolus videtur habere
Sium, quo dicitur fictium, lubet particulatim om-
nia recensere quæ in suis in Diofco. Commentariis
annotauit.

Sium legitimum Diofco. in scaturientium fon-
tium riuus, quorum aquæ hyeme calent, æstate
verò frigescunt, plerumque nascitur, à nostrati-
bus Senensibus vulgè vocatur Gorgolestro, pin-
guis est planta, caule recto, foliis latis, in ambitu
ferratis, Olusatro similibus, sed minoribus & odo-
ratis, floribus candidis, semine corniculis incluso.
Rari admodum sunt fontium riuuli, quibus aquaticum
Silymbrium innatet, qui Sium etiã non habeant.
Plin. Sium cum aquatico Silymbrio confudisse vi-
detur: quòd Sto Silymbrii aquatica vires assigna-
uerit, nominis fortasse communitate deceptus.
Nam Diofco. testimonio Silymbrium hoc, quod
aliqui Cardaminam vocant, nonnulli etiam Sium
vocant, vnde, quòd fortè existimauerit Plinius
Sium & Cardaminam vnam & eandem plantam
esse, vni tantum in Sio vtriusque facultates reddidit.
Serapio Sium Senacion vocat: Græcis *σίου*: Lat.
Sium, Mauritani *Ror carbalini* & *Inhamenella*,
seu *Hamehanella*. Germ. *wassernerck*: Hispani
Rabucas, Galli, *Berle*. Item in Epit. Lar. edita
anno 1571. eadem Icon cum sequenti titulo &
descriptione. Sium vulgare, Italis *Sio fals*, caulem
edit striatum, ramosum, inanem, tenerum, fragi-
lemque: folia gerit Apii, non inhauiia, flosculos
in summitate albos, semine corniculis incluso,
paruo, mirutoque: radice supernacanea. Pro-
uenit tantum in aquis decurrentibus, atque, vt
Sion verum excalcificans est facultatis, quæ ta-
men imbecillior illi est, quàm legitimo Sio.

Matthiolus præter modò dictum Sium sili-
quosum, in sua Epitome iam dicta aliud proponit
vmbelliferum, cui tribuit nomina, quæ Siliquoso
Sio tribuebat. De vmbellifero autem suo capite
agemus: Sium siliquosum cum descriptione retu-
net Matthiolus anno 1583, in com. cum magn. fig.
quanquam icon sit non nihil mutata, folia mi-
nùs rotunda, nec ita ordine ferrata, præterea non
addit Sium vmbelliferum: in com. Ital. cum magn.
figuris 1568. icon est Sii siliquosi, sub titulo Sii
vulgaris: mutauit nonnihil descriptionem, omi-
sit enim quæ scripserat de corniculis, & aliam
præterea posuit iconem Sii vmbelliferi sub titulo
Sii veri. In *Hist. Germ.* 1563. cum magnis figuris,
Sii siliquosi iconem nonnihil mutatam habet, de
qua modò dictum, additis his nominibus *Bach-
püngen/wasser merck*: Sium. Ital. *Sio & Gorgole-
stro*. Gall. *Berle*. Boh. *patoc ruf*. Descriptio eius
non conuenit cum icone, tribuit enim in ea um-
bellas. Nomen *Bachpüngen* solet attribui Ana-
gallidi aquaticæ siue *Boccapungæ* quorundam.
Si liceat nobis candidè dicere quod sentimus, Ico-
nem cum corniculis ac siliquis falsam censemus,
& tres plantas per Matthiolum confundi, & Mat-
thiolo euenire quod reprehendit in Plinio &
alii, & confundere Nasturtium aquaticum cum
Beccapungo & Sio vmbellifero.

Camer. ad epit. Matth. pro Sio vulgari Mat-
thioli ponit iconem nostri Silymbrii Cardamine
dicti floribus maioribus, & in Hist. Germ. pro

Matthioli
errores p. 14.
164.

**Camer. no-
tatur.** Sio altero : quod non probamus, vt paulò pòst
dicemus. præterea in Hist. Germ. pro Sio & *Waf-
fermeret* [omisso nomine *Bachpüngen*.] & in
Egit. pro Sio vero posuit *Stum* *ymbelliferum*, de
quo inter *ymbelliferas*.

**C. Bauh.
not.** C. Bauh. apud Matth. pro Sio vulgari siue se-
cundo. ponit iconem *Tabern.* quæ *Matthioli* i-
conem imitatur, verùm eam plantam dicit esse *Vel-
lani* *Galenii*. *Anguillare*, quæ nihil aliud est quàm
Nasturtium aquaticum vulgare, de quo antè egim-
us & postea agemus. Is præterea pro Sio vero
iconem ex *Tabernam.* posuit quæ *Sii* *ymbelliferi*,
de quo dicto loco. Ad hæc quid *Lobelius* dicat,
videamus: *Sion* *Matthioli* & *Italorum*, inquit in
Obs. prouenit *riguis* & *riuulis*, vbi *Cardamine* fo-
lio ad *Nasturtium* hortense & *Cardamine* ac-
cedente. *Cauliculi* *pedales* & interdum *cubitales*.
Flores *albi*, & *Cornicula* *Sii* *Cræteæ*, gustanti
acres: *Plurima* hæc *Taurinis* *Pedemontanis* *colli-
um* & *montium* *riuulis*, vbi collegimus cum *Petro*
Rapalino *pharmacopæo* *Truerensi* *simplici-
um* *peritissimo*. Hæc *Lobelius*. Sed quam
plantam intelligat, nescimus, is habet iconem
Matthioli, quam nos *sicitiæ* censemus, ut ante-
hac dictum à nobis, nullam sanè nouimus plan-
tam affinem *Cardamini*, cui *folia* *sint* *Apii* *modo*,
qualia demonstrantur in *icone* *Sii* *siliquosi* *Mat-
thioli*. *Nostra* *Silymbrii* *Cardamini* *species* in *si-
pida* *accedit* *quidem* *ad* *iconem* *Matthioli*, *si* *folia*
Apiorum *essent* *diuisa*: præterea *desinitur* *sa-
pore* *aliquo* *in* *signi* *aut* *manifesto*.

Lobel. not.

**Silymbrii
Cardami-
ni. species
insipida.**

SISYMBRIUM CARDAMINE HIRSVTVM
minus flore purpureo.

Descriptio



Radices pro-
ferunt multas
capillatas, re-
nues, folia ferè
similia *Nastur-
tio* *aquatico*,
mollia, pilis
ornata, sapore
Nasturtii: *cau-
les* *multos* *do-
drantales* *ac* *e-
tiam* *minores*,
in principio
non nihil *hir-
sutos*, *stufu-
los* *paruos* *al-
bos*, quibus *su-
perueniunt* *sili-
que* *multæ* *lon-
gæ*, *tenues*, in
quibus *tenue*
semen *fuscum*:

Reperi: etiam, ni fallor cum cubitalibus cauli-
bus, inferius rubentibus, striatis, hirsutis, maiori-
bus etiam foliis videtur in humidioribus locis
variare.

**Nasturtii
aquatici
tertia spe-
cies.**

Considerandum an *Thalius* de hæc scribat. *Sis-
ymbrii* *alterius* *seu* *Nasturtii* *aquatici* *tertia* *spe-
cies*, nullam habet figuram: offendi extra aquas,
loco opaco, vltra *Vulkenridam*, radice candida,
lignosa, citris plurimis oblecta: circa quam in
teræ superficie densa, foliorum rotundiusculorum,
nigrorumque prioris speciei paulò mino-
rum, congeries late dispergitur, ex quorum me-
dio caules ortur plures, cubitales ferè, folia
oblongiuscula: continentes, ac flores frequentes,

candidos. Semina huic siliata sunt in oblon-
giusculis striatisque siliulis. Hæc ille.

In peregrinatione *Rhætica* collegi plantam
quam nominabam *Nasturtium*, longa
siliqua, folio rutaceo, florebat & siliquas
longiusculas incipiebat proferre *Iulio*, duas vn-
ctas circiter alta, radicibus tenuribus fibiosis: qua
sanè planta an sit diuersa vel eadem cum præce-
denti asserere non ausim. De ea autem hæc *Frater*
Phyt. *Nasturtium* 8. siue *alpinum* *matinum*
2. siliqua longa obseruauit inter plantas *Fratri*
Io. Bauhini. *Doflor.* *Theod.* *Collado* *Lantannen-*
sis *Medicus* *ex* *Rhætia* attulit quod *palmaltitu-*
dinem *æquat*, *foliis* *Rhæfedæ* *vulgaris*. *Nastur-*
tium 3. *aquaticum* *minimum*. *Cardamine* 49.
Dalech. *variat* *magnitudine* *fortè* *ratione* *loci*,
nam in *aquaticis* maior est, in *Vinetis* *verò* *Wil-*
ensibus *riguis*, vbi copiosè obseruauimus, minor
mistrò, vt & *Patauino*.

C. Bauhinus apud Matth. in *Diosc.* addita noua
icone sub titulo *Nasturtii* *aquatici* *minimi*, diuer-
sum facit à *Silymbrio* *aquatico* altero *Matthioli*,
ac mutata, ni fallimur sententia, quæ erit in *stio*
Phyt. vbi tradit *Nasturtium* 8. *alpinum* *mini-*
mum *secundum* *siliqua* *oblonga*, pro duabus
plantis: vnã tantùm nunc facit, ac sic de ea tra-
dit. *Nasturtium* *minimum* *siliqua* *longa*, quod ex
radice tenui, fibrosa, caules rariùs *palmares*, sed
minores, tenues, striatos emittit, circa quos folia
oblongis pediculis donata, pleraque tripartitò
diuisa, quædam tamen in partes quinque, vel
Rhæfedæ *vulgaris* *modo* *diuiduntur*. *Flores* *ob-*
tinet *albos*, *tenues*, in *summo* *comantes*, quibus
succedunt *siliquæ* *longæ*, *angustæ*, *exiguo* & *su-*
bact *semine* *referta*. *Variat* *ratione* *loci* in *a-*
quaticis *namque* *planis* *maius*, in *Vinetis* *riguis*
Wilensibus *milau* *Basilicæ*, longè minus reperit-
ur, cuiusmodi & *Patauii* *obseruauimus*. *Proue-*
nit *etiam* *in* *alpinis* *locis* *humidis*. *Dicitur*
Cardamine *quarta* *Dalechamptio*, *Silymbrium*
aquaticum *minus*, *Camer.* *apud* *Matth.*

Matth. in *Dioscor.* edit. anni 1554. *Silymbrium*
aquaticum *alterum*: vbi icon sine descriptione.
Epit. *Silymbium* *aquaticum* *minus*, *Ital.* *Crescens*
manere, folia & caules edit longè minores ramu-
lis numerosis: floribus pusillis, tenuibus, albi-
cantibus, in cacumine tantùm comantibus, non
solum in riguis & aquis prouenit, sed etiam in
hortis & secus vias. Inbecillus est altero: nam-
que minus calfacit & siccat: vbi verò alterum
non sit ad manus, hoc vti præstabit. In com. cum
magn. fig. addit esse lapote acuto. Idem in *Ital.*
cum magnis *Icon.* In *Hist. Germ.* *Nasturtium*
aquaticum 2. *bruu* *fræs* 2. *Si* *Matth.* *eandem*
plantam *nobiscum* *intelligit* *summitates* *in* *pi-*
ctura *non* *placent*, & denique tota icon.

Camer. in *hist. Germ.* *Matth.* & in *Epit.* omittit
Matthioli *icone* *aliã* *substituit* *pro* *Nasturtio*
2. *aquatico*. *Placet* *autem* *hæc* *Camerarii* *melius*
quàm *Histonæ* *Generalis* *ideò*, *assumpsimus*.

C. Bauhinus, vt pòst dicitur, *Matthioli* *Silym-*
brium *aquaticum* *hoc* *alterum* *idem* *facit* *cum*
Iberide *Fuchiana*, quod nobis non satisfacit.

An *Lobel.* & *Pena* *Aduerf.* *Cardamine* *siue*
alterum *Silymbrium* *Dioscoridis*. A *Cardamo*,
cuius acrimoniam velcentibus refert, dicta *Car-*
damine *fuit*, veluti *Helleborine* *ab* *Helleboro*,
tametsi propiùs accedit *Cra* *æ* *Laueri*, siue
Nasturtio *vulgari* *aut* *vero*, quàm *Dioscoridis*
Sto. *aut* *etiam* *quàm* *Silymbrio*: utsi *Dioscorides*
Silymbrii *fecerit* *speciem* *tubuerit* *quidem* *no-*
minis *plantæ* *menthæ* *hortensii* *similimæ*, atque
hinc

huic aquatica; ansamque Plinio confundendi
vires Laueris atque huius Silymbrii, quod Sion
etiam vocatur. Est enim fontem limpidorum
que riuulorum scaturit hinc ubi Sion, sed tota
tenella, gracillique: folia promensima, strata latius,
in nervis canaliculis totunde Eruca, aut
aquatici Nasturtii vulgaris: quae autem in caule
sesquipalmari vel pedali angustiora multo sunt,
etiamque hortenlis Nasturtii diuisura: floribus
summis albidis, acri gustu, ac in acetariis tamen
minoris commendationis. *Dubii sumus* quam
plantam intelligat Lobelius: apud Matthiolum
quem citat, est icon Silymbrii aquatici alterius
cum flore minuto & copiosissimo umbellam penè
referente, verum Lobelius in obseruat. icones
longè diuersas proponit floribus paucis & mag-
nis, quae Iberidem Fuchii expriment de qua
paulo post.

Gerard. Cardamine latifolia, Great Iodite
Schmoek. An Gesner. Nasturtium in vineis nascens
quod Nâbrefsch appellatur, foliosum, acre, Fe-
bruario florens.

Lacun. in Diosc. figuram habet Matthioli sub
hoc titulo, Silymbrium Cardaminis.

Hist. Lugd. Silymbrium Cardamine 2. Mat-
thioli. Item paulo post: Cardamine 4. Dale-
champi, Cardamine minima aquatica. Figura
Cardamines Dalechampi quodam modo placet,
& melius quàm Matthioli, verum melior Came-
razii quam exhibemus.

An Iacob. Theod. Icon. & Hist. Silymbrium a-
quaticum 2. Brunfress. Figura est Matthioli in
qua summitates non placent, vt dictum, si e-
dem sit cum nostra.

An Gerard. qui iconem habet Matth. ex Ta-
bern. Cardamine latifolia, Great Iodite Schmoek.

Paffim Montipeli provent, vbi flores & sili-
quas profert mense Februarii & Martio. Patanii
quoque copiosè proueniens obseruauit, & Gene-
uæ [vbi in acetariis ventur,] paffim & maximè
inter pontem Arne & Lanis florens April: Plan-
tas similes siccas habui à D. Tho. Platero Med.
Basileæ collectas. Hanc quoque Cardaminem
reperi, aut saltem simillimam maiorem prope
Mansunster loco vmbroso iuxta aquam ad muros,
& in propinquo montibus secus torrentes,
vt in monte Rotsberg virentem mense Octobri:
Fuere eadem, ni fallor, reperta Iulio cum siliquis
in peregrinatione mea Rhætica redeundo Bur-
mo, & in monte Vvesen Heluetiæ, cuius odor
tunc mihi videbatur esse Alii.



pediculis cau-
li adnexa, in-
tenuis por-
tionculas qui-
nas, septen-
as, & ter-
denas ad co-
stam vsque
disseda. Sa-
pore est to-
ta Nasturtii a-
quatici.

Trago in-
scribitur Na-
sturtium pra-
tense, gaidy-
blim, Nastur-
tium 3. At por-
rò posse voca-
ri Agriocardam-
num & Na-
sturtium agre-
ste: non au-
tem quod Dra-
bam suspica-
tur, multo mi-
nus quod sibi
perluadet ex
Nasturtio a-
quatico siue
Silymbrio pro-
creari, vbi se-
men eius per
inundationes
in prata reici-
tur: quot sunt
oblectio prata
& vitidaria que
non aluntur
fluminibus, &
tamen ea plan-
ta abundat.

Tragus nō

Fuchsius as-
serit, quod vo-
cetur Gr. Iberis;
Galeno & Paulo alio
nomine Lepidion: Haberis, Nasturtium agreste
Latinis, Germ. Gaidyblim, Gall. passe rage aut
Nastur sauage: non aliâ ratione quàm quod ple-
rosque, qui in illius notitiam nondum peruene-
runt infatuet: posse etiam commodè Germ. dici;
wilder fress: Dicit praterea manifestum fieri ex
flore lacteo, hoc est, ex albo purpurascens, her-
bam cuius picturam exhibeat esse Iberida. Fuch-
sius autem falli facile cognoscent, quibus nota e-
rit vera Iberis, & qui hanc contulerint cum Ve-
terum Iberide.

Fuchsi 27.
ror.

IBERIS FUCHSII, SIVE NASTURTIVM
pratense siluestre & flore pleno.

C A P. XVIII.

Eradice tenui & alba multi que fibris capilla-
ta, caulē profert singularem dodrantalem,
rectum, teretem, glabrum, & quasi contortum,
iuxta terram rubentem, qui in ramis diuiditur,
in quorum summitate flores simul multi vel albi
purpurascens, quatuor foliis obtusis veno-
sis constant, in quorum medio stamina lutea
fena cum stilo: quibus succedunt siliquae oblon-
gæ, atropurpureæ, semen continentes: folia duum
generum, inferiora enim per terram sparguntur,
rotunda, ex longis & tenuibus pediculis, in
quatuor quinque aut sex foliola rotunda diuisa,
ad costam per interualla adherentia: superiora
verò quae in caule sunt, quaternaria aut quina, sine

Dodon. Gall. figuram habet ac describit: dicens,
crocheton vaps aquin. Lat. Silymbrium Cardamine,
quibusdam etiam Sium, Gall. passe rage sauage,
aut petit cresson aquatique: Germ. Gaidyblim, wilder
fress, & wiserfress; Belg. Coeckoexbloemen
& Cleyn water fress. Herbariis quibusdam flos
Cuculi. Nasturtium aquaticum, non est Iberis, vt
quidam existimant.

Gesner. hort. Dodonæi Iberis, Nasturtium pra-
tense quoddam sylv. Item in cat. plant. Haberis,
Agriocardamon vaps aquin, forte Strein fress
sich.

Gualtero Ryffio est Iberis, sed planta quam i-
cone exhibet, non placet, nec nomen additum
Streinfressich.

Lobel. Obs. duas habet patum diferentes icones: Vni hæc ascribit: Cardamine siue Silymbrium alterum Dioscoridis, Adu. p. 71. perperam Nasturtium agreste siue Iberis Fuchsi, Cardamum Apulei & Nasturtium Italicum, Nasturtium syluestre Cordi, & pratense Tragi, German. Gaudichblum: Alteri autem iconi, Cardamine altera, siue Silymbrium Cardamine secundum, Iberis & Agriocardamum Fuchsi, Gaudichblum & wilder kreß. Flos Cuculi Dodon. Belg. Flein watter kresse, & Coclecoex bloeye, Gall. *passerage sauuage*: à coloris acrimonia. Exit hæc altera Cardamine pratis vdis Angliæ, Belgii, Germaniæ & frigidarum regionum, vbi Cardamine, quam foliis unis refert. In pedali caule vplurimum angularia folia exiliora Nasturtii hortensis siue Cardami similia. Flores lactei purpurantes Erucæ aut Napi, Cardamines prioris maioris, gustu vniuersa planta, & viribus Silymbrium referentes elysteribus & cataplasmatibus, Leptidii, Nasturtii, Sinapi, & congenerum herbariarum, coxendicorum commodè miscetur. *Obscurus nobis videtur* Lobelius valdè, non demonstrat qua in re differant duæ suæ icones: præterea in titulo secundæ iconis remittit ad pag. 71. Aduers. vbi non fit mentio Iberidis Fuchsi, quinimò fit ibi mentio Iconis Matthioli plurimum differentis ab icone Fuchsi: apud Fuchsum præterea vnica icon & descriptio Iberidis: Lobelius nihilominus hic in Obs. sub duobus duarum meminerit, videlicet minoris & maioris. Eadem iam dictæ binæ icones proponuntur in Icon. Pl. cum his inscriptionibus, Cardamine siue Silymbrium alterum Diosc. Lob. 106. Teut. 252. Item Cardamine altera siue Silymbrium Cardamine secundum Lob. 106. Teut. 252.

Hist. Lugd. vnus planta duas ponit & figuras & descriptiones, sub titulis: Silymbium Cardamine 3. Dodonzi. Cardamine altera, siue Silymbium Lobelii.

Tabern. Icon. Cardamine 1. Silymbium alterum Diosc. Gaudichblum/Wilder kreß 1. Cardamine 2. Gaudichblum/Wilder kreß 2. Cardamine 2. species altera floribus lacteis, Weiß gaudichblum. Figuræ duæ priores iuxta Lohelium, 3. addit. sufficiebat fortè vna. Figura Tabern. 1. Lob. 2. & quæ Lobel. 1. Tab. 2. Discrimen harum figurarum ostendit in Hist. quod primæ flores albicantes. Secundæ folia paulò maiora, nonnihil curuata, & quasi cochleata. Tertiæ flores nonnihil carnei coloris adscubit.

Gerard. l. 2. c. 17. Cardamine 1. Coefowe flowers (Lob. 1.) Cardamine altera, lacteis sinocæ (Lob. 2.) Cardamine 2. lactea Milk White lactis sinocæ. Cur Gerardus quinto loco ponat plantam quam alio tertio loco posuere, nescimus, nec etiam placet, cum colore differat tantum: fortè etiam eius plantæ incognitæ.

Gerardus notatur.

C. Bauh. Phyt. Nasturtium 4. siue pratense vulgatius, variat flore qui communiter ex candido leuiter purpurascit, aliquando prorsus albus est. Figura Tragi, Fuchsi & Matthioli in quarto, cum ea, quæ apud nos prouenit melius: quàm Lobelii & Dodonzi conuenit: Non tamen differentia inter Tragi seu Matthioli & Lobelii constituenda, Tabern. not. vt fecit Tabern. Flore etiam pleno habetur. Item Nasturtium 5. siue pratense alterum, Cardamine, siue Silymbrium alterum Diosc. Lobel. Et hæc florum colore variat: cuius nomine Tabern. duas icones nomine Cardamine 2. posuit. Item apud Matth. Nasturtium pratense vulgatius: Fuchsi

Hibetis. Silymbrium aquaticum alterum Matthioli: Cardamine altera Lobeli, Lugdunensi, qui huius tres proponi, licet vnus fiat planta. *Quamuis folia in Icone Matthioli responderent videantur Iberidi Fuchsi non tamen melius conuenire dicimus cum planta Icone Matthioli, quàm Lob. & Dodonzi, nec etiam eandem dicimus Matthioli plantam cum planta Tragi vel Fuchsi, nisi dicamus ineptam admodum & falsam tum iconem Matth. tum descriptionem: scribit enim epit. p. à C. Bauhinio citata, quod etiam demonstrat icon, flores tenues pusillos: Considerandum etiam an Iberis Fuchsi proueniat eo loco vbi situm Silymbium aquaticum minus prouenire ait quæ antè ex eo recentibus.*

Nasci tradit Fuchsius, Iberi incultis locis circa cinera & prata: Verno tempore apparere, April. potissimum in mensè & Maio, durare quæ ad exitum initia, quo potissimum tempore lacteam florem fundit: initio enim purpureo colore maculatus videtur, efficaciorumque vlam obtinet, quod tum semen etiam in siliquulis proferat.

Ibidem Fuchsi, siue Nasturtium pratense obseruauit Basilea in multis locis: frater C. Bauhinus extra portam S. Albanæ ad Basiam: in Mafinunster: Geneuæ inter Lany & Pons d'Arue in sepibus mensè April. Montbelgardi abundat etiam in Horto Ill. E. C. spontè Anno. 1593. Iulii 8. D. Fridericus Meier dedit Argentinæ in suo horto Iberidem Fuchsi, quam dixit pleno flore, nullam Bifantio per D. à Belle fontaine qui Nasturtium aquaticum speciem faciebat, plantam Montbelgardi in horto Ill. E. C. pulchre floruit septis.

Iconis & tempus

IBERIDI FUCHSI AFFINIS TRIHOLIA Cardamine.



Cardamine Defectiva Calpina trifolia nigricantibus ex purpura ramulis per tectam serpit, in quibus oblongo eiusdem coloris pediculo terna perpetuò folia immittuntur, circa pediculum angustiora, per neras latera & quasi nticulata, in ambitu nonnihil crenata, initio tenella & viridia, deinde dura, nigricantia, acidulo primùm gustu, postea acri: cauliculi teretes inter folia erumpunt ex purpura nigricantes, palmares, nullis aut rarissimis (quæ terna etiam eidem inhaerent) foliis præditi: flores extremis ramis insident, candidi, quatuor foliolis constantes, Cardamines pratensis, quam Fuchsius Iberidem nuncupauit, per similes: his succedunt roseæ & oblongæ siliquæ Dentariarum Corniculis ferè similes, sed minores: semine etiam minore, licet simili, plene: radix summa tellure serpit & tubide paruas candidasque fibras agit, sic vt facile ramulis tectâ obrutis pangi possit.

Carda.

Ad Cardamines siue Sisymbrii alterius genera referendam meminit Cluius ante multos annos ab Alfonso Pancio missam Machliniam *Sanchula* fo- lio nomine.

Eam commodius Lobelius inter Cardamines recensuit, trifoliamque cognominauit, de qua in Obl. hæc scribit: Cardamine trifolia, quibusdam hortis cultiorib. repertu facilis, Nasturtii Cardamines gustu & facie plantula palmaris Sisymbrii Cardâ. sed positu terno, Oxys Plinianę ritu, humi procumbente. Flos in pediculis albus lopyri vul- garis aut Cardamines. Radix multum fibrosa.

Inscribitur à Clufo Cardamine alpina i. trifo- lia: à Lobel. Hist. Lugd. & Gerard. Cardamine trifolia: Tabern. Icon. & Hist. 3. C. Bauh. Phyt. Nasturtium alpinum trifolium.

Inuenit Cluſius in siluosis montibus, nudo so- lo potius quam herboſo, ad Abietum & præalta- rum atborum radices, totâ hyeme etiam viren- tem. Floret Iunij, in cultis verò etiam April.

Anno 1571. Iulij 7. inter plantâs siccas Aggeſii Argentinæ reperi plantam [nullo tamen aſcripto nomine] quæ optime reſpondet figuræ Cluſij po- ſitę inter Pannonicas pro Cardamine alpina tri- folia.

IBERIDI FVCHSII ALIQVATENVS SIMI- lis Cardamine Dalechampii odorata.

Cardamine odorata radice est, crassiuscula, sensum gracileſcente, dodrantalis, granulis plurimis candi- dis, & Corian- dri ſemine non maioribus, tu- berosa, albâ Saxifragæ modo, multum fibra- ta, folijs Silym- brii Cardami- nes Dodonæi, humi ſtriatîs, amplioribus, nigricantibus, gustu acribus, sed odore cum manduntur tam luau. vt ad Cinamomum accedat: flore ac fructu est Na- sturtii.



Hist. Lugd. Cardamine o- dorata 5. Dalechampii: seu Nasturtium odora- tum, quidam Callitrichon Plinii lib. 23. cap. 11. esse putant.

In Sequanorum siluis, Abietibus & Piceis con- stis, Cardaminem odoratam vidit Dalechampius muscoso folo.

IBERIDI FVCHSII VEL NASTVRTIO aquatico affinis Cardamine alpina media Cluſij.

Cardamine alpina media, siue 2. Cluſij sine fi- gura, habet folia in orbem disposita, & duo- rum digitorum tranſuerſorum longitudine, pro- fundioribus crenis incisa, & laciniata, vti in Si- symbrii cardamine, siue Nasturtio aquatico Tom. II.

vulgò nuncupato, hirsuta & aspera, superne ve- luti cinereo colore aspera, inferne verò viridiora, sapore primum acido aliquantulum, deinde calidiuſculo: ex quorum medio prodit cauliculus dodrantalis aut amplior, tenuis, albos floſculos in in fummis ramulis ferens: deinde siliqua teretes, paruas: ſemen obſeuare non licuit: radix lon- giuſcula est, alba, quibusdam fibris capillata.

Nascitur in Styriæ inferioris scopulis ad Mo- nasterium Neuberq[quod Alpium iugo illi immi- nenti nomen impoſuit] in Styria inferiore. Flo- rebat Auguſto.

MYAGRVM VETERIBVS.

CAP. XIX.

Myagros, quem aliqui; Dioſcoride diſtante; Melampyron vocant, herba est ſerculacea. (Cyperus dicitur de cremiorum genere Surrac. legit. Plin. vesp. dicitur ferulacea) bicubitalis, folijs Rubiæ ſimi- libus, pallidis: ſemen verò gerit Fœnogræco [ſic Ruell. & Sartacin verſ. Lat. Sed hic in Græca pro- thæci Fœnogræco] malè *Myagros* dicitur, collo ſimile, retinet] ſimile, pingue.

Non eadem omninò Plinius taadit: Myagros herba ſerculacea est, folijs ſimilis Rubiæ, tripeda- nea, ſemen oleoſum, quod fit ex eo.

Paulus Aeginet. lib. 7. locis duobus diuerſis de hac eadem planta egit: at priore quidem *Myagros* [quasi Muscipulam diceret; siue Muscariam, quæ insidentes, siue præteruolantes muscas glutine suo implicet] appellat: poſtèriore verò *Miaros* (quod imputum ſignificat & ſordidum, cuiusmo- di Melampyrum est) nòminat: hic quidem Dio- ſcoridis, illic verò Galeni ipſiſſima verba refe-rens. Quare Cornarius hoc Pauli loco Myagros vbi- que merito legendum cenſet, & non Miaros; quòd alia non ſit herba à Myagros, ordinæque lectionis hic perturbatum eſſe, vt primum ha- beatur Myagri ſemen, deinde interpoſitis qui- buſdam ſequatur Miaros, quæ eadem ſit cum Myagros, & ſic reſtituendum eſſe ordi- nem.

Cæterum Melampyri nomen dubium putò, at ei euenite, quod multis aliis nominibus, vt vnum de pluribus plantis dicatur:

Præterea hoc loco fortè etiam legendum; vt admonet Cornarius, *Myagros*, vt etiam habet Paulus Aegineta lib. 7. cap. 3. Vel dicendum Me- lampyrum aliud Dioſc. aliud Galeni, cuius mem- nit lib. 1. de alim. & Theophrast. quod vocatur à Cornar. brandweizen, Triticum nigrum. Inceſ- tum eſt, quid intelligat Dioſc. lib. 3. cap. de Crægo- gono, per *Myagros*, vbi Plin. habet lib. 7. c. 8. ſpi- ce Tritici, & Theophr. *Myagros*, quod Ruellius lib. 3. cap. 64. ſuſpicatur corruptum, Cornario idè aſſerete, reponuntq; Melampyron. Fortè non intelligit de Myagros, quod mihi videtur veriſ- ſime; communius enim, vt puto, nomen apoſuiſ- ſet, videlicet Myagri; ſed de Melampyro Theo- phr. & Galeni, quam meam opinionem augent Plinij verba cum dicit. Crætagonium ſpice Tritici ſimile eſt, multis calamis ex vna radice emi- cantibus, multorumque geniculorum.

Myagri ſemine, inquit Dioſc. torrefacto & ru- ſo, virgas oblinunt, iſſque Lucernarum vice v- tuntur. Cæterum, hoc pingui (oleo) corporis ſca- britas expoliti, læuigarique conſtat. Galenus ſcribit Myagri ſemen pingue eſſe: nam, ſi runda- tur, oleoſum quid eſſundere, quod emplaſticam vim habeat: Diuerſam ab his facultatem tribuit

Herba ſer- culacea. Diuerſa lo- ca. Folia Ru- biæ. Semen Fœ- nogræci. Surrac. em- por. Herba ſer- culacea.

Paulus Aeginet. Myagros & Miaros.

Melampy- ron dubia. Melampy- rum.

Crætago- gono. Linnæus.

Vitis

Plinius huic oleo, nempe quod medetur oris ulceribus eo perunctis.

MYAGRVM DICTVM CAMELINA.

Descriptio

EX vno caule cubito altiores rami, tenues, teretes, recti, subhirsuti, fungosa medulla facti, ramosi: quibus alternatim latiore basi adnascuntur *folia*



turgidula, oblonga, cum quatuor angulis vel costis, *semina* continentia multa, oblonga, triangularia, Nasturtio minoria, coloris ferè Fœnugræci, saporis Nasturtii, quæ in ore retenta contrahunt mucilaginem quandam: *Radix* vbi adolevit lignosa non nihil & fibrosa.

Nostra figura officinarum depravata per Sculptorem: male enim omiffa pinnæ caulem amplectentes: flores nimis magni.

Tragus Linariam veram vocat, Linariam quintam, seu Quintam Linariæ speciem facit, scribens eam passim inter Lina reperiri, ac Lino ad eam similem existere, vt ab illo vix separari possit. Hanc potè à Ger. Dorr. i. e. Zzaniam, communi omnium vitiorum, quæ inter segetes enascuntur nomine appellari: esse Pseudolinum: Ruri in agro Vormaticensi Doler fraüt / & in Alsacia Frimmel & Hucl dici.

Idem postea lib. 2. cap. 15. ait. Plantam superiori libro inter Lunanas quinto loco descriptam: Sesami genus esse statuo. Tameñ descriptio Sesamæ, quæ apud Theophr. lib. 9. extat, huic nostræ plantæ non per omnia respondeat, vt rarè stirpem iouenias, quæ vno & eodem modo à diuersis Scriptoribus depingatur, hæc tamen obstare non potest quominus Sesamam nostram agnoscamus. Hæc ille, qui etiam inquit Plinii Sesamum, ac etiam Colmellæ, nec non Dioscoridis vti & Theophrasti: Titulus in Hist. Lar. figuræ est Sesamæ, Germ. *flachs* Dorrer / In Germ. *Sass* recdyt. vnde gemin *flachs* fraüt / *Sz* süñst *flachs* fraüt / Linaria vera, siue quinta. *Sed quæ Observo* tanta similitudo Sesamæ Tragi cum Lino vt vix separari possit: ipsa figura Tragi monstrat magnum discrimen, qui viderint Sesami plantam & semen, nunquam concedent Trago, hanc plantam esse Sesamum Dioscoridis, Theophr. & Plinii, vt ipse sibi falsè persuadet. Præterea Tragus non animaduertit non vbiq; neglectam hanc stirpem, quod infra patebit ex Ruellio.

Tragus 201.

Anguill. Myagron Diosc. in Italia quibusdam in locis *Senenzina*, in aliis *Darella* dictum.

Lobel. & Pena Aduers. quibus Myagrum, Germ. & Gall. *Cameline* dicitur, quod quidam minus Sesamum putarunt, scribunt ineptire Senensem, dum doctis nullà melioris historię commentatione aduerfetur, Pseudo nesciunt quid intrudens, quæ Vacaria videtur.

Dodon. frum. describit dicens: *Camelina*, Germ. *flachs* Dorrer & *flum* Dorrer, Gallis *Cameline*. Officinæ præterque Sesamum appellant, oleoque huius pro Sesamine vtuntur: est cereale Erysimum, quod à Galeno ac à Theophrasto *flachs* appellatur. Eadem quoque tradit in sol. vbi *Camelinam* siue *Myagron* vocat, siue Theophrastū Erysimon, & Myagron Dioscoridis. In Hist. Gall. lib. 4. cap. 35. depinxerat & descriperat, ibi vocabat *linum triticum* Theophrasti, *Linum triticum*.

Falli autem eos qui Myagrum Dioscoridis non agnunt, arbitrantur esse Sesamum, testatur Gesner. horti, qui primus mihi hanc plantam pro Myagro monstrauit, nec video quidquam quod magnopere repugnet.

Lacum Sesamum. *Lonic. lein* Dorrer aut *flachs* Dorrer, Græcè *Pseudolinum*, Officinis Sesamum.

Vt autem eò clariùs ostendatur, quàm cæcè Ruellius in Hist. Myagri circumagatur, portionem eius historię partem duximus ascribendam: Melampyron, inquit, est Triticum vitium esse Galenus fateatur, eius tamen exortu degenerare, nihil incommodi sentit. Hoc Sæculo Triticum peculiare fecit Theophr. Granum tamen innocens, nec sicut Lolium graue, ac caput tentans. Herba profilit tripedanea, surculosa, foliis Rubiæ pallidis, semen colli figuræ, oleosum: tostum hoc. vt Dioscoridi placet, tundunt &c. frequens Sueffioribus meis semine in colli speciem exprocreta: rura nostra *Camelinam* vocant, de qua in Myagro non nihil letiam erit dicendum. Myagron siue Melampyron herba surculosa, semen Fœnugræci &c. Myagron herba Plinio femellæ &c. Hinc rusticum in Gallia ferunt quamuis & sine spontis inter segetes inueniatur: Melampyron idem Græcis quasi nigrum Triticum dici crederent. Nostri vocant *Camelinam* aut *Camelinam*, semen senniculo simile in viticulis conceptum. Fateri cogit oculata fides, semen *flachs* hoc est Fœnugræci, non *flachs* i. e. colli, vt in quibusdam legitur exemplaribus] similitudinem referre &c. *Considerent lectores* an Ruellius non confundat duas diuersas plantas. Quod enim *Camelina* Myagros sit inquit Cornar. nondum satis probauit Ruellius. Melampyron esse illa non potest. Manet Myagros herba adhuc ignota, siue Melampyron siue Melampicon, eadem etiam vocetur. Mirum Ruellium priore loco semen colli figura dicere: deinde posteriore resellere. *Meretur* sanè Ruellius reprehensionem Corsarii: dum tribuit suæ herbæ diuersas figuras feminis.

Est hoc Matth. in prior. comm. Sesamum quorundam. Ceterum etiam hanc plantam pro Sesamo exhibuit, quod varia herbæ priorum de eo sit sententia: Sibi quidem, vt ingenue fatetur, pro legitimo Sesamo non placet quoddam historię refragerur, quam de Sesamo Theophr. & Plinius tradiderunt, sed eà saltem ratione depingi curauit, vt lectores admoneret, quod ea notis veri Sesami non respondeat, quodque in manifesto errore versentur, qui fecus opinantur. Eadem repetit in post. com. latinis cum mag. fig. omiffa tamen icone. Ait præterea in post. comment. Ital. scribere quidem Ruellium, Myagrum nasci in Gallia,

à suis vocari Camelinam & Camaminam, se tamen non audere Ruellio subscribere, quia hæcenus non viderit Myagrum in Italia. Cæterum eos haud dubie falli crediderit, qui putant vulgare illud aurei coloris semen, quod aliqui Drodam, Drodellam alii, nonnulli verò Dorellam dicunt, legitimum referre Myagrum. Is figurat ex prioribus com. ademptam huc reponit, ac præter iam dicta subdit. Non desunt præterea qui plantam, quam Pseudomyagrum appellauimus, legitimum esse contendunt. Verùm hæc Rubiz folia non gerit, sed Glasti, & semen Nasturtii. Figuræ titulus, Myagro falso. Idem in Hist. Germ. dicit: Quidam existimant Sesamum esse Lein Dotter aut flachs Dotter, quod mihi non placet, quia existimo lein Dotter esse vetum Myagron, de quo in in 40 libro. Idem in eadem Hist. Germ. figuram prædictam habet, ac dicit, lein Dotter aut flachs Dotter sumunt aliqui pro Sesamo, sed malè, vix diximus, melius cum Myagro conuenit, de quo Diosc. lib. 4. cap. 112. Vocatur etiam Pseudolinum.

atrh. nos.

Me silent ex allegatis vocis apparet Matthiolium non nouisse Camelinam Ruellii. Drodellam suam & suum Sesamum quorundam, vnam & eandem plantam esse, ac eum eâ figura malè picta dixisse habere folia Isatidis, ac hinc putasse Aduersaria Matthiolium Vaccariam intellexisse eâ figura, quod tamen ex prædictis non fit verisimile: Figura etiam Matthioli, quam in re accedit ad Linum vt mereatur dici Pseudolinum?

Camer. apud Matth. Germ. Myagrum quorundam: in Epit. Matth. Pseudo-Myagrum.

C. Bauh. apud Matth. Myagrum 1. siue satium. Myagrum 2. siue syluestre, aut Pseudo-Myagrum Idem in Phyr. horum meminit his verbis: *Mod. 3. 4. Diosc. lib. 4. cap. 112.* meminit, quod aliqui volunt idem cum Myagro vulgè dicto, ac Rubiz folia suo tribuit Dioscorides: & Plinius lib. 27. cap. 12. cui Myagros dicitur. Quibusdam tamen nostrum secundum Myagrum est Theophrasti & Galeni Erysimum: alius Sesamum ob seminis similitudinem & olei vberitatem. Myagrum 2. hortense: Myagrum Dodonzi, Cameline Myagrum Lob. icon. p. 224. Item: Myagrum tertium siue Myagrum syluestre, Sesama Trago, Pseudo myagrum Math. Hoc satum tantùm à superiore differre volunt, eum tamen illud foliis sic sinuatis, hoc verò Glasti folio non sinuato. *Qui considerabit* varietatem foliorum Camelinæ, & aliqua conferet cum Rubiz foliis, aliquam similitudinem inueniet. Paruum inuenio affinitatem seminis Camelinæ cum vero Sesamo. Ex figura malè picta Matthioli & ex eius verbis de Glasti foliis in ea iudicare non possum diuersitatem. Si statuendum propter figuram diuersum genus separandum etiam erit Tragi Sesamum, in quo folia non Glasti, sed ad Linum potius accedentia, & vt ipse ait, Lino ad eodè similia, vt ab illo vix separari possint. Ego igitur non separo: sed figuram Matthioli non placere dico accessu plantæ ei non bene perspectæ & cogitata. Tragi autem Sesamum factum ad strigosam aliquam plantam spontaneam & sicco loco natam: non propterea aliam.

atrh. nos.

H. Lugd. vnius plantæ duas habet figuras. Vni titulus est, Myagrum Dodon. Hoc, inquit, Ruell. & eum sequuntur Dodoneus, acque alii Dioscoridis Myagrum, quod & Melampyron vocati tradidit, esse putant. Altera inscribitur, Pseudo-myagrum Matthioli. Nec hoc, ait, Matthiolus sine tatione intrusit. Sant enim, qui legitimum Myagrum esse contendunt, ast eum folia Rubiz non

Tom. II.

habeat, sed Glasti potius, & semen ei sit Nasturtii, non Fœnugreci, ab eis distitit Matth. & non Myagrum, sed Pseudo-myagrum appellat.

Taber. Icon. Myagrum r. Hist. Myagtion, Chamalinum.

Gerard. myagrum Golde of pleasure.

Primum vidi Tiguri in horto Di. Gesneri: vidi Basileæ constitum agrum ante 30. annos in quo florebat & siliquas habebat Maio. Geneuz in horto meo pulchrè virebat & adhuc florebat Nouembri ex semine deciduo, hiememque perferibat. In Italia copiosè vidi, vt Patavii in horto publico: florens Martio & virens Febuario & inter Vicentiam & Villanouam: Monspelii abundat in agris. Circa Montbelgardum Myagro constitos agros habent ad oleum, quod dicunt caput graue, vidi ptope Granges quod quotannis semine deciduo se renouat, quodque maturum Iunii principio. Agros benè subactos (inquit Ruellius) stercolatoque hoc semine perinde quasi Napis setunt. In tanta est apud nos [Gallos] nobilitate, vt ruri nemo non conspiciat: Et iam suæ spontis inter segetes inuenitur. Assatim inter segetes Lini vbique locorum, maximè verò in Alfacia, & tractu Rheni, Tragus.

Rulticis nostris (inquit Ruell.) Camelina aut Virez Camamina, oleo distringedo, quam optimè cognita. Eius semen in arcis pauis rura flagris decutiunt, & vannis in auram vento silentem iactant, dum siliquarum recementa vanescant: tum trifolius molis subiiciunt versandoque subinde oleum exprimunt, quo non ad lumina tantùm Lucernarum, sed & ciborum quoque condimentis pauperes vtuntur, magno huius olei prouentu. Vix quicquam aliud ad eodè ab auiculis inuaditur, atque hoc semen, quod animaduertentes quidam, id colligere ac alendis auiculis referuare studuerunt. Oleum ex hoc semine conficitur longè præstantissimum, estque Tragi iudicio gratius & mundius Oleo Oliuæ. Sed non video ego quomodo præferri debeat, huius Sesami oleum, Oleo Oliuarum, vt Tragus præfert, dum sibi persuadet verum Sesamum, ac vires Sesami attribuit. Audio hoc oleum frigore non concrefcere. Modicè, vt Matth. annotauit, calefcit atque humescit. Accedit omninò ad Sesami vires semen auiculis gratissimum. Paratur & ex eo oleum similis facultatis.

MYAGRVM TVRCICVM.



Hoc longè Descriptò

tenerioribus virgulis, quam præcedens, nascitur, sed culturâ fructuosior fit ait Camer.] semen minus in vasculis vegetioribus profert. Herba eiusdem est ferè naturæ cum Myagro.

Camer. ad histor. Germ. & Epit. Matthioli. Pseudo-Myagrum alterum, species prima Myagri putati, quæ quia rarior est Mya

F f f 2

gni Turcici nomē fortitur ab hortulanis. Turc: *sz*
szher leindotter tenuis. C. Bauh. phyt. Myagrum
 4. siue syluestre altetum.

CAMELINA MYAGRVM ALDROANDŌ.

Descriptio

Est hæc ex feminibus, quæ ab Excellentissimo Aldroando ex Italia nobis attulit Illustr. Dux Wirtemb. Creuit in horto Montbelgardenſi ſata: Folia numeroſa à radice exeunt, longo pediculo hærentia, repanda, principio ſubangulo, oblonga, laciniata, qualia ferè ſunt Barbarez, coſta inſigni pallidè virenti donata, à qua nerui ſaturatio- ri colore exeunt. *Caules* inter hæc prodeunt multi, pedales, teretes, ac craſſi ſatis, lenticque, quibus folia præcedentibus ferè ſimilia, ſed ſuperius nullo pediculo hæret. Summitatibus *ſtrobili* inſident candidiſſimi tetraphylli, quales Scorodothlaſpi velut in vmbella diſpoſiti. Succedunt *caſula* ſublonga. *Radix* alba eſt, ſim plex, fibris tenuibus capillata. Odor foliorum herbidus, ſicut & ſapor, gratus tamen ſatis: Radicis verò ad Naſturtii ſaporem quodammodò accedit, ſed minùs acris, ac mitiùs palatum & linguam vellicat.

Nemini hætenus quod conſtet cognita aut deſcripta planta nomine *Cameline Myagro*, à D. Aldroando donata, ſi Anianuenſis vel hortulanus heneſcripſit.

Locus & Tempus.

Sata in horto Ill. C. V Wirtemb. Montbelg. Aprilis, floruit Iulio.

MYAGRO AFFINIS PLANTA, SILI- quis longis.

Descriptio

Huius plantæ *radix*, lignoſa, alba, ſimplex, fibris aliquot donatur, *caulis* plurimùm variat: eſt vbi vnciam parum excedit, frequentiùs altior, cubitalis vel bicubitalis, ſingularis, ſermis, ſtratus, ſubhiſutus & non nihil rubeſcens, medullâ ſabmuſcinâ plenus, in ſurculos aliquot diuiſus: *folia*, Cameline ſimilia, alternatim poſita, vnciam lata, tres quatuorve longa, ex anguſto principio ſenſim dilatata, ſenſim deinceps in mucro-

nem deſinunt, tactu aſpera, viridia, ſapore amaro prædita: *flores* parui, multi, conſerti, lutei, quatuor ſolitulis conſtantes, apicibus itidem luteis, breuibus pediculis inſident: quibus delapſis, alternatim ſuccreſcunt ſiliquæ tenues, vnciâ longiores, quadratæ, ſemen copioſum, tenue, oblongum, amarum, claudentes.

Icon. pl. Cameline, Myagrum alterum Thlaſpi eſſigie.

Hiſt. Lugd. ſunt duæ figuræ vnius plantæ. Prima, Sinapi amaram Dalechampii vocata. Altera,



Myagron aliud Thlaſpi eſſigie Lobelii: nec tres nobis videntur ſtirpes.

C. Bauh. phyt. Sinapi u. ſiue Hiſſopi folio, Sinapi amatum Dalecham. Myagron 2. ſiue ſiliqua longa: Et Leucoium 13. ſiue luteum ſylu. exiguis ſtrobulis. Viola lutea ſylu. Tragi, ſed vna. Sed ſic boni viri ſua dicant opera.

Tragus Lat. & Germ. Silueſtres Viola Luteæ. An Geſner. hort. Leucocii ſylu. genus minus?

Myagrum altetum Thlaſpi eſſigie Lobelii Obſeru. & Icon. Plant.

Compiler Tabern. duas quoque vnius plantæ ſub diuerſis titulis icones propoſuit. Ac primam quidem Hiſtor. lib. 2. & Icon. plant. 449. Eryſimon 3. Wegſenff 3. Huius iconem Getardus ponit pro Eruca ſylueſt. anguſtiſolia *Eryſimon* 3. *Erucæ ſilueſt.* *anguſtiſolia* *Myagron* 2. *Tabern.* *acis wormſeed*, Eryſimon Galeno & Theo. *Compla.* *phraſt.* Hanc plantam non obſeruauimus à *notatur.* *Cameline* *Eryſimon* *Gerardus* quoquam diſtam Camelinam. Gerardus iconem ex Tabern. habet, ac ei euenit, ni fallimur, quod illi, vt duabus iconibus vnius plantæ diuerſos tribuat titulos & diuerſas deſcriptiones. Aſt horum ſaltem in ſtirpium ignorantiâ meretur veniam.

Floret Iulio & Auguſto, inueni propè Chaſtenoy ad ripam aquæ propè Molendinum quæ ſitit Montbelgardo Bedfordiam, poſtea alibi locis ſiccioribus, tranſiit in hortum, vbi quotannis ex ſemine deciduo ſeipſam propagat. Inueni copioſè in pago Courchaton florentè in meſe Octobri. Sata in horto Ill. E. Celf. ſemine deciduo ſe propagat quotannis.

MYAGRON MONOSPERMON.


Descriptio

Craſſa & alba eſt *radix*: quæ *caules* profert aliquot, cubitum aut ſetquienſitum altos,

glaucos, teretes, laues, fo-
 lidos, medullâ
 candidâ ſar-
 etos, multis a-
 lis concauos:
folia Glaſti ſa-
 tiui ſuperiori-
 bus foliis non
 nihil ſimilia,
 nonnunquam
 laciniata ta-
 men, præſertim
 inferiora, ſimi-
 litèrque illis
 cæſia, nullo
 pediculo, pin-
 nis ſuis caules
 amplectentia,
 ſapore olera-
 o: *flores* lu-
 tei, quadrifolii,
 minores mul-
 tò quàm Braſſicæ, paulatim nec eodem tempore ſeſe explicant, ſiſis primulùm à calyce erumpentibus, aliis in ſemen abeuntibus, quod ſingulare in ſingulis ſpiculis burſulis, ſurſum ſpectantibus, & caulibus, ramuliſque appreſſis.

Casp. Bauh. Phyt. Myagrum 3. ſiue monospermon.

Aptid Fratrem C. Bauhinum vidi plantam non-
 Tempus
 mix



mine Myagri monospermi quam descripsit. Basileæ anno 1595. mense Augusto obseruati brachiatam cubitalem totam siccam seminibus onustam in horto Domini Doctoris Felicis Plateri, vnde accepi semina ferenda in Hortum Ill. E. C. Montbelgardi. Spontè ohseruauit spontaneam in agro inter Dampierre & S. Mauritium.

MYAGRO AFFINIS HERBA, CAPITULIS ROTUNDIS.

Mltos ex radice simplici, lignosa, productos caules, cubitales & bicubitales, hirsutos, fragiles, multis ali. dodrantalibus concauos, per quos, floribus tenuissimis, minoribus quam in Myagro, pallidis, longa serie succedunt alternatim disposita capitula exigua, Coriandro minor, semuncialibus pediculis herentia, per maturitatem nigra, in apiculum desinentia, à quo quatuor costulae minimum alatae ad pediculum vltique porrigitur: in singulis capitulis semen inest vnicum, flauum, oleaginosum, nullo sapore manifesto: folia Myagro similia, minora, hirsuta, aspera, nonnihil succulenta, quae per caules & ramis disposita, nullo pediculo, amplexicaulia, alas utrinque pinnatas proferunt, sapore viscido, & nisi obstat leuiuscula acrimonia, fatuo, in summa ex longis pediculis leuiter sinuata sunt.

Sunt autem plurimi anni, ex quo hanc plantam vocauit Myagro affinem cum capitulis rotundis. Semen huius missum à Domino Doctore Schvartzio Myagri nomine.

C. Bauh. Phyt. Myagrum 6. siue Myagro similis siliqua rotunda, quae Io. Bauhino creuit.

Camer. ad Matth. Germ. Myagri species cum rotundis capitulis, serè eiusdem naturae cum Myagro. Et Epit. Pseudo-Myagrum 3. species 2. Myagri putati, exilior, vasculis rotundioribus, alibi in arvis spontè nascens.

Annua planta flores & semina fert mactra cum Myagro, Iulio, & Augusto, ac quotannis se ipsam seminat. Myagro affinis cum capitulis rotundis & flore luteo in Ill. Princip. horto florens & virens cum suis capsulis Iunio 1608. Stutgardiz.

MYAGRO SIMILIS FLORE ALBO.

Numerosa statim à radice fundit folia, glabra, vncias tres longa ad Iberidis folia accedentia, laciniata nonnihil: Inter quae caules surgunt, medullâ facti, alis concaui: Quarum exortum, folia ambiunt alata, & veluti denticulis laciniata.

Flosculi in fastigiis candidi, exigui, quos vascula

Tom. II.



SESAMVM VETERIBVS.

C A P. XX.

Sesamum, vt Theophr. sparsim habet, pingue selt radice singulari cohaeret, numerosiore tamen, quam Milium: stirpe assurgit simplici, altâ, sursum vires suas omnes intendente: caule ferulaceo, multiplici quoque magis, & crassiore, quam Milium, calamo constat, vnde omnium, quae ex artibus sementibus ager recipit, Sesamum terrae molestissimum esse, plurimumque posse emaciare putatur. Flos etiam foliis constat. Totâ quadraginta diebus à sate consummat. Sua proprietate cernitur: nam semen gerit in siliqua magnopere circumseptum, modo peculati quam legumina. Sesamum viride nullum animal mandit, propter amaritudinem & grauitatem saporis, sed siccatum acceptius euadit, fructisque eius suauis efficitur, candidus dulcedine praestat, nam generis quoddam candidum.

Plinius tribuit folia sanguinea, caulem ferulaceum: semen in vasculis, ab Indis venire ait, ex eo oleum confici, colorem eius candidum: Simile hinc esse in Asia Graeciaque Erysimum, idemque fore, nisi pinguius esset quod Irio vocetur, medicaminibus annumerandum potius, quam frugibus. Et paulò inferius, Sesamam in calida maceratam exporrigi iubet, deinde conficari, frigidâ immergi, vt palea fluctuent, iterumque exporrigi in Sole super Linthea. Quod nisi festinatò peragatur, lundo colore mucescere. Dioscorides omiâ descriptione, vires eius inter fruges ita persequitur, Sesamum stomacho nocet, & animae grauitatem facit, si quando commanducata dentium committitur inhaerit. Admota verò neruotum crassitiem discutit, aurium fracturis & inflammationibus, ambustis item, & coli doloribus ac Ceraistae autem medetur. Capitis autem dolores ex ardore contractos cum rosaceo lenit. Sed & herba in vino decocta eadem praestat, sed maximè oculorum inflammationibus doloribusque prodest. Ex ipso quoque semine fit oleum, quo Aegyptii vtuntur. Sententiam verò verborum Dioscoridis serè explicat, inquit Cornarius, Plinius lib. 22. c. 25. his verbis, Sesama trita in Ovo sumpta, inhibet vomitiones. Aurium inflamma-

sequuntur subrotunda, acuminata, longo pediculo herentia, ad Myagræ cum rotundis seminibus accedentia. Radicula longa, alba, simplex, vel cum paucis fibris.

Inter Bono Locus. niam & Florentiam reperi cum floribus & capitulis. Dominus Agerius quoque Bononia delatam communi, cauit.

Radix
Caudex
Caulis
Flos
Semen
Sapör

Genus castidum. Figlia. Semen. Color

Irio

Sesamæ Virg.

¶ ¶ ¶

tioni illinitur, & ambustus. Eadem efficit & dum in herba est. Hæc amplius oculis imponitur decocta in vino. Stomacho inutilis cibus, & animæ grauitatem facit. Stellionum moribus resistit. Item vlcerebus quæ casæthe vocant. Hæc Plinius loco vulgata exemplaria vino, pro Ouo habent quod venisimilibus vetus Codex noster legit. Deinde in vulgaris est, amplius hoc, quod vetus habet. Hæc amplius, vt de herba accipiamus. Quod autem Stellionum moribus resistere dicit, Diosc. non habet, nisi Ceraften Stellionem reddidit. Actius certè lib. 13. cap. 12. ad Stellionis morsum, Sesamum vultet imponi tradit. Ita etiam Paulus lib. 5. cap. 10. Sed & artuum doloribus conuenienter imponi posse q̄ patet, vbi et cum per ō legi debet non x̄ per ō, quod intestinum crassum significat.

Galen. lib. 7. Simpl. Pharm. Sesamum, inquit, non parum viscosi ac pinguis in se habet. Vnde meatus obducit simulque molli, & moderatè calidum est. Eandem vim habet & Oleum ex ipso. Sed lib. 1. De aliment. ait. Pingue est Sesamorum semen. Quapropter etiam repositum cuiussem oleosum fit. Ob id igitur citò repl. eos qui ipsum edunt, eueritque stomachum, & tardè concoquitur & pingue alimentum corpori præbet. Hinc clarum fit vigorem & robur ventris partibus addere non posse: quemadmodum neque aliud quid de pinguibus. Est autem & crassi succi & ob id neque citò transit. Edunt autem ipsum solum non ita valdè, sed cum melle cocto in placentas efformant, quas Sesamidas plerique vocant. Inspergent etiam ipsum paribus.

Oleum Sesaminum, vt tradit Mesues, impinguat, semen auget, asperam arteriam lenit, & vocem ob id claram reddit.

Ceterum, vires, quas Sesamoidi Diosc. ascripsit. Plinius, dictatore Cordo, Sesamo assignauit, malè Sesamum pro Sesamoide in hoc auctore legens. Plinium autem, quod idem miratur, secutus est Ruellius.

Memorable illud est, quod Q. Cælius refert, militem, qui cum Alexandro Caucasum transiret, ac inopiâ frumenti, cuius nihil, aut admodum exiguum repetebatur, propè ad famem veniret, succo ex Sesamo expresso haud secus, quam Oleo artus perunxisset.

Sesamum quoniam à Diosc. non describitur, fit vt in eo demonstrando plurimum erretur. Si quis loca expendat de Sesamo apud Theophr. Dioscor. & Plinium, colligere est, nullam earum plantarum, quæ pro Sesamo passim ab Authoribus accipiuntur, esse verum Sesamum. Pior quidem Sesami nomine vulgò recepta, de qua hoc capite agimus vera videtur, sed vera certò affirmari non potest. Sesamum, qui abutantur Myagrum Dioscoridis non agnatum decipiuntur. In Sesami & Myagri explicatione, ait Guilandinus, mirum quàm Matth. cæcutiat, quando Myagrum esse, Sesamum primò à se loco locutum, nescit. Sesamum Cordi & Tragi, Sesamum Matthioli quorundam, dicitur nobis Myagrum Cameline. Non solum Officinis notum est hodie Sesamum, sed etiam quibusdam locis apud nostros inquit Cornac.] nascitur, & in cibi vltum venit, Lentis modo coctum: Appellare autem Schwæden. Sed decipiuntur, aiunt Cord. in Diosc. & Gein. hort. qui Sesami loco accipiunt Schwæden. Multum rei herbariæ consulissent, si, quod decussisset, indicassent quid per Schwæden intelligerent. Dicere quis posset eos ignorasse quid scriberent, aut saltem in se scribendum dor-

miuisse. Sesamines flores [Itali Sesminos vocant] Sunt qui à Sesamino semine dicitur grece non valeant, Cordus. De hoc lib. 1. sub Gellemino. Sesaminum cum Sesamoide confundit Plinius, vt dicitur, & enim secutus Ruellius.

Quare porò sit illud oleum de Sosyma (cuius meminit M. Paulus Venetus) paruos nigros faciens, considerandum alius reliquimus, nos nihil tale de oleo Sesami annotatum inuenimus, fortè oleum Sesami miscbatur cum aliis.

Officina pleræque Myagrum [sic] dicitur Sesamum appellant, ac malè eo, cuiusque oleo, pro Sesamo videntur, nobis attestantibus Matth. & Dodonæo. Sesami olei vice, quod exhibebat. Haly pueris quamprimum erant nati, ros scilicet vt consumimus oleo hui, quod etiam faciebat Valembertus. Sesamo deficiente substituit Tract. qui pro quo, Semen Lini.

Plinius notat.

Oleum.

Plinius error

Ruellius not Sesama

Æquiuoca.

Sesamum Myagrum

Myagrum Cameline

Corn. Cord. & Gein. hort. vixantur.

SESAMVM



Sesamum per Sædem cubitalem folia habet semuncialibus pediculis baccata, crassiuscula, ex atro virore nõnihil rubentia, oblonga, acuminata, subinde quoque sinuata: ex quorum alis flores emicant, calathiformi, oblongi, albi, hinc nascuntur siliquæ rectâ secundum caulem ascendentes, quatuor

costis donatæ: in quibus semen dulci albâ medullâ præditum.

Accepti à Cl. Paludano Sesami Indici Orientalis nomine, semina, alba, oblonga atque compressa, modicè acuminata, qualia præcedentis, quæ vix diuersa existimant. Quædam eorum pullo sunt colore, quædam fusco, sapore dulci.

Tametsi Sesami semen, à quo copiosum exprimitur oleum, Officinis nouissimum sit: pauci tamen reperuntur Seplasiarii, qui Sesami plantas viderint inquam, cum nullum, vel rarissimum, quoddam agros steriles reddat, feratur in Italia. Si quidem quod in Myropolis habetur, ex Græcia & Peloponneso ad nos conuehitur. Hæc Matthioli, qui in prioribus com. figuram exhibet hoc titulo, Sesamum aliorum, in post. verò hoc, Sesamum. At autem is: M. hi planta, quam pro Sesamo hic depingi curavi, quamque mit ad me Pisis Lucas Ghinus, si verum fatei debeam, non placet, quod Historiæ refugatur, quam de Sesamo Theophrastus & Plinius tradiderunt. Quare non ausim ego affirmare hanc geminum esse Sesamum, quid in primis culmum non gerat milio crassiorum, altiorum, non roseoeremque, nec radices longè plures, sed scapum sibi annulum, in quo siliarum more siliquæ gradatim exeunt triquetra, aut quadriquetra, in quibus semen: Deinde quoddam eius folia non rubescant, nec flos herbaceo

Gesaminum Sesaminum

Sesima leum.

Substituta Myagrum Oleum Mygd.

Semen Lini.

Descriptio

Sesaminum aliorum.

herbaceo sit colore. Hanc autem plantam depingi curavi, ea saltem ratione, ut illud lectores admonerem, quod ea, meo iudicio, notis veri Sesami non respondeat: quodque in manifesto errore versentur, qui secus opinantur. Non ausim inquit idem in Hist. Germ. dicere herbam hic pictam esse verum Antiquorum Sesamum, ut quidam existimant, potest verò merito dici Pseudo-sesamum.

Alt dixit sententiam suam Matth. videamus nunc alios, in hac planta pro legitimo Sesamo sit recipienda. Semen Sesami officinarum [ordiuntur in Adv. Lob. & pena] perpetuo nomine & vsu Sesamum fuit, quod satum vidimus adultum. Si ruborem desiderat in Sesamo Senensis, docti in illo pudorem, ut qui vnus plantulae fortè aridæ animaduersione, de Sesamo aduersus omnium iudicia sternerent. Sesamum vocatur Dodonæi hist. frugum, & in Ital. Camer. in Hist. & Epit. Matth. Lob. Icon. Pl. Tabern. & Anguill. cui & *susmani*, & in Sicilia *Gingulena*. Quam benè verò Wirsung. in ind. suæ med. vocat, leindotter semen Isaminum, Sessaminum, perpendant lectores.

Prosper. Alpin. (*Sempfen, Sempfen & Sesamum* dicitur) Histor. Lugd. vt & Camer. horto Sesamum verum. An Tragus de hac (sibi fortè non ritè cognita) Sesamus peregrina & ipsa iam pridem ad nos adportata est, noitratu per omnia ferè similis.

Sesamum & Sisamum, Sesama Latin. *Σησαμύον* Græc. Leindotter/ *flachsdotter*. Germ. Gall. *Ingoline*. Ital. *Sesamo*. Hisp. *Iorgilim & Alegria*. Arab. *Sempfen*, siue *Senfira*. Offic. vulgò *Gingulena*, Camer. Epit.

Sesami semen acceptum Lutetiâ à Chirurgo insigni Ruffio, seminari in Horto E. C. Habuè etiam semen à Fratre Casparo Bauhino & à D. Dorotheo Io. Schwartz. Vidi etiam Venetiis. Basileæ in horto Di. Dis Jacobi Zvingeri, à quo etiam semen habui.

Oleum quod Ægyptii *Sitis* appellant, ad cibos in frequentissimo est vsu. Planta decocto vtuntur in totu ad Ophthalmias, ad tussim, anhelitufque difficultatem, pleuritidem, perimeumoniam & tumores duros scirrhosos: mulieres pro vteri duritie infestatione faciunt, & vtuntur ad capitis fursures, liuorè (sue faciei): & ad tumores scirrhosos: planta & seminibus coctis cum melle, ad exsiccatos neruos, ad combustas partes, ad calidas inflammationes: Decocto in clysteribus ad colicos dolores, & ad emolliendam aluum: Ad mouendas menstruas purgationes. Seminis ad cibum vsus est antiquus, pauci est nutrimenti. Oleum facèntque eius bibere, vt impinguescant mulieres in balneis familiarissimum habent. Oleo etiam ad multa alia Ægyptii vti consueuerunt quippe ad cutis pustulas, asperitatem, atque omnem defecationem ex humore melancholico comitatam, tum epoto, tum in cibis frequentato, vel ipsi affectis partibus inunctis. Secretum apud quosdam ad cutis pruritus, eius quatuor vnicias multis diebus bibendam exhiberi, ad anhelitus difficultatem, pleuritim desperatam, perimeumoniam, ad mouendos menses, atque ad vehementes stomachi, intestinorum, vterique dolorum cruciatu demulcendos, intus & extra. Non solum hæc Ægyptiis manifesta fuerunt, sed multi alii ferè eadem memoriæ prodiderunt, vt est Rhafis, Auicennas, Haly, Serapio, atque alii. Sesami vires ex Antiquis antè sunt scriptæ.

TELEPHIVM VETERIBVS.

CAP. XXI.

Telephium, inquit Dioscorides Portulacæ simile est & foliis & caule: alas verò binas habet singulis foliorum geniculis inhærentes. A radice ramuli [addit Matth. Codex *εὐδα, λεπτά*, id est, angusti, tenues,] seni, septenive prodeunt, folis referti cœruleis (*κυανόχθον*, quam vocem Plinius non expressit, crassis, lentis, atque carnosis: flores denique lutei, aut candidi (Ver. tantum *λευκά*. Sed vulgatum lectorem rectiorem vult esse Goupylus, quòd in Telephio flores lutei spectentur, Sarrac.) Nascitur in vineis & locis cultis Vere.

Dioscoridis Notha tradunt, quibusdam semperviuum (syn. dici, Esse & qui Portulacam (syn. appellent, Romanos illecebram, Ægyptios Anoth, Aphricos Atitropiurim.

Telephium ita describit Plinius, vt ex Dioscoro transitulisse videatur. Verba eius hæc sunt: Telephium Portulacæ simile & caule & folis. Rami à radice septeni, octonive fruticant, folis crassis, carnosis. Nascitur in cultis & maximè inter vires.

Folia, auctore Diosc. ad sex horas imposita, vitiliginem albam sanant: verum postea hordeaceam farinam adhibere oportet. Tollunt & vitiliginis, ex aceto in Sole illita: sed vbi inaruerint, abstergi ea oportet. Eadem & Plinius, nisi quod in vsu ad vitiliginem dissentunt, & hac parte rectius Cornarii iudicio videtur hoc quod Plinius tradit: Illinitur lentigini, & quum inaruit, detetur. Illinitur & vitiligini terhis ferè mensibus senis horis noctis, aut diei. Postea farina hordeacea illinitur. Medetur & vulneribus & fistulis.

Telephio siccantem & extergentem facultatem adscribit Galenus, non tamen manifestè calidam, ita vt primo quidem ordine calefaciat, siccet autem secundo intento, aut tertii initio: proinde ad putrida vlcera conuenit, & leucas, & alphas cum aceto sanat.

Veniunt autem nomine Telephii plures plantæ: Ac primum quidem Telephium Guilandini, quod nobis placet & Telephium Scorpioides vocamus, de quo mox. Est & Telephii genus fruticosum peregrinum. An hæc Hist. g. lib. ii. Colutea Scorpioides minor. Nec est Telephium, Fabaria siue Faba pinguis, vt quidam volunt apud Matthiolum. Est enim hæc Anacamperos, de qua dicemus Hist. nost. lib. 35. Telephium Galin Glossis Hippocr. diuersum puto à Dioscoridis Telephio propriè dicto, & idem cum Semperviu siue Aizoi tertia specie lib. 4. Dioscor. quæ etiam Telephium dicitur: nos igitur non dicimus eum Cornario simpliciter Telephium esse *εγγενεῦβλεῖν*, vt dicemus capite de Sedo paruo ex flore luteo.

Folio Portulacæ.

Vires.

Telephii aquiuicæ, tiones. *Teleph. Scorpioides*, Colutea Scorpioides minor. *Anacampe* feror.

Sesam siue Semperviu, *εγγενεῦβλεῖν* cre.

TELEPHIVM SCORPIOIDES.

EX gracili radice aliquot emittit ramulos, palmares & sesquipalmares, tenues, teretes. folia rara, breui pediculo annexa, Portulacæ minoris succulenta, læuia, indiuisa, candicantia Crisalpi. quibus subsunt bina exigua, circinata, Coluteæ Scorpioidis, forma & magnitudine. Mihi

Descriptio

Montepeli videbatur vix habere saporem mani-
festum, nisi fortè paululum amarescentem : Iac.



Gargillius Sco-
tus, tamen an-
notauit esse sa-
pore acriusculo,
& aromatico, &
mansu odorem
in nares Abro-
toni emulum ex-
halantia: in sum-
mis ramulis
stosculi exigui,
lentis floribus
minores, persi-
mili tamen for-
ma, colore luteo:
quibus siliqua
succedunt Scor-
pionum caudas
imitatæ, crebris
internodiis in-
terceptæ, intor-
taque, auctore
Cæsalpino, Meli-
loto vulgati similes. Nobis videtur cum Doctissi-
mo Melchiore Guilandino hæc planta optimè
conuenire cum descriptione Telephii Dioscot. &
Plinii, quam antè posuimus.

Scorpioides

Telephium

Lunari-
borif-
siffa

Scorpioides
Matth.

Iconem huius nomine, Scorpioides sc. sed sine
descriptione ponit Matthæac ait : Suis notis ve-
ram Scorpioidem referre putamus : etsi non de-
sunt Viri Doctissimi, qui aliter sentiant, volentes,
Nicandri Scholiast. auctoritate hanc ipsam Tele-
phium appellari debere. At ego horum senten-
tiam prolixè nihil facio, quod nõ prohibeat no-
menclatio illa apud Scholiasten, quin rectius
Dioscoridi Scorpioides appellatur.

An de hac Anguill. loquitur, quando ait : Tele-
phium Crateuz nihil aliud est, quàm Dioscori-
des vocant herbarii Bõnonienses Lunariborif-
sam. Hinc nostræ dubitationi ansam præbet Gef-
nerus hort. qui dicit, Lunaria buriffa Emilii (sic
enim herbarii quidam Scorpioides Matthioli no-
minant, si benè memini) herbula est stoculis lu-
teolis: siliquis gracilibus, longis, articulatis, inflex-
is. Quæ Telephio nostro Scorpioidi quàm opti-
mè conueniunt.

Lacun. Loh. Icon. Plant. Lonie. qui & Scor-
pium Nepam à Diosc. vocati ait: Cæmet. in Hist.
Germ. Matth. & Epit. Cast. Scorpioides. Dodon.
Gall. & Lat. in fol. H. Lugd. Cæmet. hort. qui
& Telephium Anguillatæ vocat, Scorpioides Mar-
thioli.

Quærunr Lobel. & Pena Aduers. Scorpioides
[Matthioli depicta, non descripta] an Crateuz
Telephium? Ratio cur dubitent, est quòd vagum
& pluriuocum Telephii nomen sit ex Crateua &
Dioscoride. Aiunt autem Crateuz notas, vti re-
centiores doctores scitè monuerint, Scorpioi-
dem Dioscoridis lib. 4. calce penultima exprime-
re videri: nec sanè absre, nam facultates illi in-
esse eximias ad dissepulotica & inuicta vlcera,
quod & animaduersio facti periculi crebra teste-
tur. Recentiorum verò & Montepelensium Por-
tulacæ foliam Scorpioidem, vulgò sic dictam,
qui Telephii speciem coniectent, non in simà niti
ratione.

Cæsalp. Telephium vocat, scitibique ab Italis
Herbam amoris cognominari, ac à quibusdam
Scorpioidem censeri. Huius solum cum salua


Herba à
veteri.

applicatum cutim rubescere: aliquando & pustu-
las excitare: vnde nunc iocus puellaris in amore
explorando: si enim cutem rubefaciat, tantum
amoris putari iudicium: sin autem pustulas exci-
tet, odii. Et hunc vsum Antiquos Poetas Tele-
phio tradidisse, constare apud Theocrium, qui
ob id philtron appellauit.

Scorpioides
Iocus puellaris

C. Bauh. phyt. Telephium s. siue Dioscoridis,
sen Scorpioides, ob siliquarum similitudinem.

Scorpioidem veram, vt arbitratu Matthioli,
vidit primùm in Foro-Iuliensi agro in ciuitate
Austriæ, quodam in hortulo Cl. Medici Iuliani à
Marostica Teruillensis. Spontè in agris cultis
Montepeli circa Castellneuf provenit. Florentem
autem obseruauit mense Aprilis, Maio & Iunio, si-
liquas verò ferentem mense Octobri. Florens &
siliquis adhuc abundans in horto meo Geneuz
mense Nouembri: mense Aprilis ex semine deci-
duo iterum proueniens, flores & siliquas habens
mense Maio. Lugduni habebam in horto, Basileæ
provenit in horto Domini Doct. Platerii: Mont-
belgardii in horto meo, & in Horto Ill. E.C. flo-
rens Iunio & Iulio.



SCORPIOIDES EX SENTENTIA
Veterum.

CAP. XXIII.


Mænes herbulæ est, inquit Dioscorides,
foliis paucis: femine caudæ Scorpiionis ef-
figie. Illa Scorpiionum ictibus præsentan-
teo est auxilio. Ita Plinius: Ex argumento nomen
accepit Scorpius herba, si enim habet ad si-
militudinem caudæ Scorpiionis, folia pauca. Val-
let aduersus animal nominis sui.

Galenus verò excalescere quidem ordine ter-
tio, desiccare verò securdo scitibit.

Cæterum breuis hæc delineatio Antiquorum
facit, vt aliam atque aliam pro Scorpioidem herba-
rii exhibeant. Est suum Scorpioides Matthioli,
quod nos ad Telephium referimus, de eoque
iam iam egimus. Est suum Scorpioides Dodonæo
& aliis, nobis Scorpioides, siliqua campoide his-
pidæ de quo mox. Scorpiuri nomen, auctore
Dioscoride, sibi vindicat Heliotropium ma-
gnum, quod à nobis H.n.g.lib. 35. maius inscribitur.
Scorpioides species à quibusdam sit calendu-
la: sed falluntur, teste Matthioli: est Hist.n.g.l.25. n.g.l.25
Caltha.

Telephium
Scorpioides

Scorpioides
siliquæ
Campoides
hispidæ
Heliotropium
maius
Caltha



SCORPIOIDES SILIQUA CAMPOIDE
hispidæ.

EX radice plerumque singulari, setè buxæ, exi-
lyrecta, longiuscula, dodrantales vel pedales
ramulos paulùm humo surgentes emittit, vel per
tetram spatios, angulosos subhirsutos, ex quibus
enascuntur folia Bupleuri, pinguiora, minus ner-
uosa, albida, locis calidis, medicriter ipsissa, non ni-
hil hirsuta, longiusculis pediculis appensa, sa-
pore subacido prædita, Iacobo Gargillio Scoto, mi-
hi autem videtur habere aliquam acrimoniam: &
ex eorundem alis pediculis palmates & sesquipal-
mares, tenues, quorum summitati insident stoculi
li duo aut tres, vel quatuor, similes Meliloto Ger-
manicæ Fuchsi, minores, luteoli, quorum singulis
singulæ succedunt siliquæ hispidæ, per maturita-
tem fusæ, Erucæ, villosæ, in se conuolutæ, spiras
imita-

Descriptio



imitate, tuberculis semen falcatae Lunæ effigie continetur, gibbosa.

Dodon. Gall. Scorpioides. Belg. Scorpion fruyt, quibusdam hasenoere. Gall. Arville de Ligeze, Lat. n. fol. Scorpioides prior: ad Scorpioides accedit ac legitima Dioscoridis apparet: à Plinio Lat. n. Scorpionis herba appellatur. Løb.

Adv. Obl. & Icon. Pl. Scorpioides repens Bupleuri folio Dodon. effig. 43.

Tabern. Ic. & Hist. Scorpioides Bupleuri folio, Raupenfrucht. C. Bauh. Phyt. Scorpioides. s. siue Bupleuri folio. Est hoc quibusdam Clymenum Diosc. & Clymenum alterum Plinii, aliis Catanance.

Scorpioidem siliqua simili Eruca primò repertam Montepeli prope patibulum & Casteinau, in colle iuxta viam ad ripam fluminis: folia videntur habere aliquam acrimoniam: siliquis fert cum floribus mense Aprilis: hanc denominant Scorpioidem, non quidem Dioscoridum vidissem à Dodonæo depictam, postea observavi Tiguri in orto Petri Trigulacei Chunigi insignis. Genææ provenit in orto, floruit & semen protulit, quod Autumno germanans hiemem pertulit, virens adhuc mense Ianuario, postea emortuum nouo frigore superueniente. Basilea in orto D. Felcis Plateri florens & siliquas h. mens Junio mense, in orto Paris à Fratre satum Basilea. Patavii in orto Cortusii pulchrè virens mensis Martii principio. Montebelgardii fatù facillè provenit sed hiemem vix perfert, multò maius quàm Montpel. euadit: habeo in Horto E. C. vbi etiam in maiorem provenit altitudinem quàm Montpelii. In Oliuetis & aridis montosis Montepeli vicinis, frequens Lobelo occurrit hæc, alibi rara planta, nec nisi in hortis visitur.

SCORPIOIDES MONTANA V. M.

Scorpioides montanum Herbariis quibusdam etiam in altis & asperis montibus nascitur, radice crassiuscula, nigra, in fibras multas & breues se diducente: foliis, multis, longis, angustis, lanuginosis, Leucoio purpureo similibus, sed margine non incisus: caule palmum alto, foliola pauca mittente: siliquis tribus vel quatuor, caruleis, in exiguum, rotundumque capsulum, siue Corymbum conglobatis. Rara hæc planta est, montiumque solitudinibus inaccessis tantum familiaris.



Quum rara sit planta oportebat annotare locum particularem vbi provenit,

C. Bauhinus Phyt. Scorpioides s. siue montanum Hist. Lugd. quid?

HYPECOON VETERIBVS. CAP. XXIII.

Hypecoon Diosc. autore, aliqui Hypopheon vocant. Nascitur in frumento & arnis. Folium habet Ruta simile: ramos paruos. Vim habet respondentem Papaueris succo, Scribit Plinius Hypecoon in fegetibus nasci, foliis Ruta. Naturam eius eandem quæ Papaueris succo.

Hypecoon Rur. a folijs

Galenus: Hypecoon, inquit, frigefacientem vim habet, ex tertio ordine frigefacientium, vt à Papauere parum absit: Ita etiam Paulus. Non satis inquit Cornarius, norum est hodie quæ herbasit, de qua hic scribunt prædicti.

Temperamentum

Hypecoon Dodonæi, quod in purg. exhibit, cuique historiam Hypecoi Dioscoridis ascribit; Hypecoon siliquosum dicimus. Plantam verò Hist. Lugd. titulo Hypecoi demonstrat, eamque falsò Dodonæum in purg. Hypecoon Dioscoridis facere scribit. Thalesetrum paruum esse dicitur lib. 30. Nihil tamen minus est quàm Hypecoon Dioscoridis, quod Matth. in com. Ital. & Lat. cum magn. fig. & ex eo Camer. ad Hist. Germ. & Egit. Matth. Hypecoi nomine pingit. Alex. hæc est, vt videre licet Hist. nost. gen. lib. 23.

Hypecoi quipoca. Hypecoon siliquosum Thalesetrum

Alex.

HYPECOVM SILIQVOSVM.



Plurimos ex radice simplice, Gerani Robertani vel potius mosthati simula, tubescente, caules emittit laeues, pedales, in alas frequentes, circa summum divisos: folia maiore ex parte fundit quoque radix, Ruta syluest. tenuifolia aut Fumarie similia: flores lutei & tenis componuntur folijs.

Descriptio

duobus adiectis magnis, neruo viridi donatis, ex sublongo quadrangulis, quatuor siliquis interiectis multè minoribus, in quorum mediò apices. Semen oblongum fert, siliquis inclusum articulatis, tres, quatuorue vncias longis, rotundis, multumque falcatis.

Matth. in post. com. Ital. piceturam habet nomine Cumini silu. alterius sine descriptione.

Aduers. quæ describunt & depingunt, Cuminum alteram Dioscoridis siliquosum vocant.

Aduersariorum figuram & sicutum retinent Icon. Plant. & adhuc exhibent alteram, quam Cuminum silu. alteram siliquosum Lobeli inscribunt. Is autem Obs. eandem cum Clusio figuram habet, cui titulum facit. Cuminum silu. alterum Dioscoridis: Italorum Hypæcum Clusii & Dodonæi. Clusius porò, qui melius descripsit quam alii, potissimum florem, ait. Citum primum hanc plantam obseruarem, illud mihi visa est plurimum ad Hypæci Historiam accedere, quod Græcis *ὑπᾶκον* & *ὑπᾶκον* dicitur. Non desunt tamen qui ad Cuminum syluestre alterum Dioscoridis referre malint, licet facultates sint dissimiles. Vocatur hæc Granatensis & Murciansis *A-doria*. Cur tandem planta, quæ Græcis *ὑπᾶκον* & à nonnullis *ὑπᾶκον* teste Dioscoride, dicitur, pro Cuminò syluestri sit habenda, nulla occurrit ratio: pro hac tamen ad se missam Mathiolus refert, si Dodonæum non fallit pictura.

Camer. hort. Cuminum syluestre alterum Matthioli vel potius Hypæcum Clusii. Camer. in Hist. Germ. & Epi. Matth. Cuminum syluestre alterum, Græcis, *ὑπᾶκον ἀγριὸν ἐπὶ τῆς ἰταλίας*. Ital. *Cimino saluatico secundo*. Huius effigiem Camerarius ex nostra planta sicca, olim Gelfneris cum aliis plurimis communicata, depinxit.

Tabern. Icon. Cuminum silv. 2. Hypæcum Diosc. Gresser horn fummel. Item Cuminum siliquosum minus, Klein horn fummel.

Locus & tempus.

Hypæcum Clusii, Monspelu cum essem reperti cum flore & siliquis propè Lacum, non longè à Balneo, quod à Baleruch cognominatur: quod non magnum: aqua salsâ & ita calidâ ut vix quis calorem pati possit. D. Dalechampius cum ei demonstrassem transeundo Lugduno ex planta mea sicca cutauit depingendum: Gelfnerus ad meam descriptionem adscriptis. Securidacis aliquos malè adnumerare. Florens Iunio vidi Bislex in horto Domini Doctoris Faelicis Plateri. Inter semina quæ hortulanus Ducis Florentini Stutgardiam misit accipi nomine Hypæci Candæ: quod seminaui in Horto Illustr. Exc. C. Montbelgardi.

Securidaca

Hypæcum Candæ

DENTARIA QVINQUEFOLIA.

CAP. XXIV.

Descriptio

Radicem habet Coralloides prima, è squamatis denticulis compactam, albam, nitidam: caules cubitum alti, tenues: folia quina in idem punctum coeunt, Pentaphylli modo, oblonga, acuminata, circumcirca serrata, paucis neruo medio obliquis in marginem exportectis venis: flores summo caule hærent Hesperidum ex albo purpurascente colore, quibus & non absimiles superueniunt semen continentibus siliquis.

Hanc sic describit Clusius. Est dentata radix, que inæqualis & pluribus crassis squamis exaspe-

rata, & raris fibris inter illas nascentibus, prædita, ex qua prodeit caulis rotundus, pedalis, in quo per intervalla quina folia lor gicululo pediculo



subnixa, longa, in ambitu serrata, molliora quàm in superiore, neque adeò saturâ viriditate prædita: flores in summo fastigio iam dictæ floribus persimiles, quatuor videlicet foliis, Leucosi florum instar, constantes, colore dispari.

Dodon. de purg. in append. Violam appellat propter florum cum Leucosis similitudinem.

Camer. ad Hist. Germ. Matth. Dentaria dicitur: in Epi. Dentaria minor, siue Santicula quinquefolia. Ital. *Dentaria minore*. Germ. *Zanfraut*. Eidem in hort. Dentaria bulbifera Pentaphyllos. Clusio Dentaria 7. siue pentaphyllea 2. à foliorum vni pediculi inhaerentium numero, non ineptè fortasse dici posse videtur.

Huius meminit Iosias Simlerus ad finem Commentarii de Alpibus his verbis, *wilder sciff* herba eius nominis prior vno pediculo septena habet folia, supremo caule multos flores purpureos, & partim albos [albos ego, inquit Clusius, duntaxat conspexi] post quos cornicula subnascuntur semen continentia minutum [non satis exactè obseruasse videtur, nam Hesperidis semini dispar non est] in pressum: radix subest alba alabastris modo splendens, squamea. Nos Dentariam vulgè nominamus à forina radicum, quòd ex pluribus squamis, quasi denticibus componatur. Dodonæus ad Leucocium referre posse putat.

Locus & tempus

Macklinia nascentem conspiciebat at Clusius in cultis horto Ill. V. Io. de Brancion ex Allobrogibus & Italia acceptam. Ad cubiti altitudinem crescit cum Coralloide altera septifolia, umbrosa loca amat, & latices, primo Vere itatim emergit. Simlerus.

CORALLOIDES PRIMA, QVINQUEFOLIA.

CAP. XXV.

Radice nodosa, & in plurimos articulos distincta, tenuibusque aliquot fibris, ex articulorum distinctorum prodeuntibus donata, exeunt aliquot folia, longis pediculis nixa, in quinque profundas & ad pediculum vsque sectas lacinas, in ambitu crenatas, diuisa, scabra, & tactu aspera, saturè virentia: caulis pedalis aut amplior, rotundus, summo fastigio, quinos aut sexenos flores, bulbiferæ floribus similes getens, colore tamen paulò magis saturatè purpurascente, qualis ferè in floribus Violæ laetifoliz non viuacis, quam non nulli Lunariam Græcam appellant: succedunt capitula longiora semina plena.

Gelfner.

Gefner, in Hist. Cordi, figuram ponit & Kentmanno acceptam, dicens: Aliqui, ni fallor, Coralloidem Cordi, Saniculam albam vocant, alii temerè Aconitis adnumerant. Hac ille, qui si plantam hanc nostram intelligit, figura non placeat. Cordum etiam aliam intellexisse existimam. Idem de hort. scribit esse Saxifragam montanæ speciem, ac rursus eandem nomine Saniculæ foliis Pentaphylli maioris ex Matthiolo indigitat. Ibidem quoque Saniculam albam appellat, & Hesiacam ac Italoram Dentariam.

quam Galliam viâ, feruente bello inter Imp. Carolum V. & Gallie Regem Henricum II.

CORALLOIDES ALTERA SIVE SEP-
tifolia.



Altera Coralli aut alabastritis marmoris politi æmulam habet radicem obliquam, tuberculis inæqualem: caules cubitales: ex quibus orti pediculi foliorum sustinent duas aut tres coniugationes, quibus superadditur semper extremum instar: singularia verò folia oblonga, serrata, Coralloidis

Matthi. in Diosc. lib. 4. cap. de Symphito, hanc describit dicens: Recensetur à Germanis inter Symphiti genera quedam foliis Pentaphylli maioribus. In post. com. Ital. non solum describit, sed depingit quoque, titulo, Dentaria æretius.

Aduers. picturam habent non vsque adeò commodam, hoc titulo: Nemoralis alpina herbariorum Alabastritis, Coralloides Cordi: Meliorem hoc nomine habet Lob. Icon. Plant.

Clusius in Pan. hanc ita inscribit: Dentaria Matthioli, Pentaphyllos 4. Est hæc inibi sine descriptione. Eandem exhibet Hist. post. cum descriptione, quam hoc in loco posuimus, sub hoc titulo: Dentaria 6. Pentaphyllos 1. Sextam, inquit, Coralloidem alteram dixisse Cordum, nonnulli arbitrantur. Matthioli Dentariam minorem: mihi Dentaria *minor* prima à foliorum vni pediculo inhaerentium numero, non in neprè fortasse dici posse videtur: quemadmodum nec Dentaria *altera*.

C. Bauh. phyt. Dentaria 1. siue Pentaphyllos: Dentaria minor Matthioli.

Ni imperitor Taberna foret, grauem sanè censuram mereretur. Tres quandoquidem vnus plantæ figuras proponit Quarum, quam in hist. facit in ic. Dentariam quinquefoliã, & Consolidam Dentariam vocat. Cui in Hist. 2. titulum tribuit in ic. Dentariam alteram Matthioli appellat. Cuius in Hist. tertio loco meminit, ea ab ipso in Icon. Dentaria corallina altera nuncupatur. Egregius, mehercle, Botanicus.

Qui variis titulis lesiores ludere nouit.

Ceterum hæc & alia, quia radices habent Coralli æmulas, idè Coralloides & Alabastritis cognominantur. Sunt autem qui has ad solidagine referent & Symphita, alii inter Saxifragas, alii inter Saniculas recensent. Nobis in hac controuersia, hæc collocare integrum est, donec vel tu, vel alius aptiorem perquirat locum.

Ad Albuginarum Alpium radices supra Lemnium lacum, cum feruente spontè nascentem, obseruare memini (inquit Clusius) ante quadraginta annos, dum per Heluetios, è Gallia Narbonensia patriam redirem, præclusa per tel-

precedentis foliis sunt proxima, paulò maiora: flores similiter extremo cauli ex longis pediculis hærent magni, Leucioi aut prædictæ Coralloidis similes, è quatuor foliis compositi, colore niueo vel purpurascete, hinc sequantur in longis filiquis *semina* compressa.

Cuius descriptio hæc est. Hæc aliquot è radice exeunt folia, quina interdum, sed maximè ex parte septena, longæ costæ inhaerentia, foliorum Fraxini instar digesta, hoc est, vt ex aduerso bina semper respondeant, folium impar extremam alam occupet, omnia in ambitu serrata, diluuiis virentia quàm Sexta [Dentaria 1. quinquefolia] folia, & subtus candidantia: caulem etiam pedalem, rotundum, binæ aut ternæ foliorum alæ, iis quæ à radice prodeunt non dissimiles, ornant: eius autem summum, flores superioris floribus pares, quatuor videlicet foliis constantes, candidi tamen coloris: cornicula quæ succedunt, etiam paria, simile semen continentia: radix minus squamata, quàm præcedentis, Quinta (Coralloides Enneaphylli) radici semè respondens, & paucis crassioribus fibris firmata.

De Coralloide hæc & minore bulbifera hæc Cæsalpinus tradit: Duæ in montibus nascuntur frequentes in syluis, quas vulgò Dentarias vocant, distant inter se magnitudine: nam maior Folia fert ab radice diuisa in septem vt plurimum partes, Ellebori nigri modo, mollia, angulosa, Cichorii modo, inferius subcandida: caulem simplicem, cubitalem aut paulò breuiorem, in cuius cacumine vnicum folium, similiter diuisum sustinet, è cuius sinu ramulus attollitur, in quo flores candidi, vt Leucioi, & filique simplices, quod in hoc genere paucis contingit: radicem digiti crassitudine summâ tellure obliquè tendentem, frequentibus geniculis pulchrè dearticulatam, colore candido, splendens alabastriti modo, quasi dentes, vnde nomen assumpsit, quæ tamen vetustate nigrescit, sobolem à lateribus candidam ferens: hæc tantùm in altissimis nascitur. Minor ad decliuora etiam loca descendit,

*masor.
septifolia*

Descriptio

*Alabastritis.
rec.*

Locus

Dentaria
minor bulbifera

minoribus multo foliis, & in pauciores partes diuisis, in caule pluribus per intervalla dispositis: radices simili figura tenues fert, nigricantes: flosculos purpureos: siliquas exiles: peculiare huic in foliorum alis singulis sobole gignere, quæ sunt radice ex duobus aut tribus geniculis constantes, nigreæ veluti patua Mora, quæ in terram decedentes germinant, idcirco rard in hac reperiuntur flores & siliquæ, cum sobole apta nata sit facilis quàm semine propagari. Altera etiam est huic similis, breuior, non ferens soboles supradictas. Lycoctonum Ponticum Dioscorides vocat inter Aconiti generâ.

Dodon, append. putg. Dentaria altera. Et in fol. vbi exhibitam repetit: Viola dentaria altera.

Lobel Obs. & Icon. plant. Alabastrites altera, Dentaria altera herbarioitum: Coralloides altera Cordi. Hist. Lugd. Dentellata altera Dodonzi. Hi omnes pingunt cum quinque & cum septem foliis sub modo dictis utilis. Apoll. rad. i. Santicula alia. Gesnero hort. Saxifragie montanæ speciei altera cum septenis foliis in vno pediculo. Circa Sabaudiam [de vtraque loquitur] Pulmonaria vocatur.

Camer. hort. Dentaria bulbifera heptaphyllos:

Clus. Pann. Dentaria heptaphyllos 5. Hist. p. n. s. t. Dentaria 8. siue heptaphyllos, à foliorum numero, quæ in eodem pediculo nascuntur, hominata. Huius etiam meminit loco citato Iohannes Simletus his verbis, wilden senff, herba eius nominis altera quinquefolia habet vno pediculo florem qui Hesperidis purpurascens flore, vel Lunaria Græcæ in odora est, non vidisse [inquit Clusius] existimo, aliâs superiori non dissimilis: tota substantia vtriusque acrisse, Sinapi æmulans, aut Raphanum.

C. Bauh. Phyt. Dentaria 2. siue heptaphyllos.

Locus &
Tempus

Coralloidein siue Dentariam Patavii vidi Martio, quo tempore iam defloruerat. Montebelgardi in monte Bar Maio defloruerat: Septemfolia nunc in Hort. E. C. est. Basileæ Frater observavit in monte Mutensii Septifoliam. Prope Neufchâstel Burgundicæ in fine Septembris in colle iuxta pagum Dembelio virens adhuc cum foliis septem: Genue florebat Aprili & Martio pulchro flore cæruleo in horto meo: Copiosè provenit in monte Saleve. In monte Thuri vidi cum foliis septem, & cum foliis quinque mensis Iulii principio cum siliquis. Quidam rusticus Rizonotomus vocabat *Re du poumon*, id est, radicem pulmonis, à forma nisi fallor: Dalechampi faciebat Aconiti Lycoctoni genus.

CORALLOIDES ENNEAPHYLLOS

Clusii.

Descriptio

Pedaleis profert *caulem*, firmum, rotundum, lizuem, quem in summo terè ambiunt tres pediculi (rariissimè quatuor), singuli terna *folia* sustinentes, ampla, mucronata in ambitu serrata, saturatè virentia, gustu feruido: summum *caulem* exornant quini aut seni *flores*, quatuor foliis constantes, Dentariæ heptaphylli florum æmuli, deorsum spectantes, & propendentes, colore ex herbaceo pallescente: flores sequuntur oblonga *cornicula*, torosa, mucronata, qualia sunt Dentariarum Pentaphylli & heptaphylli cornicula, & in his etiam simile *semen*, hoc est, Hesperidis serè, sed crassius atque vitescens, quod dissiliens corniculis *exili* antè quàm probè instuum videatur, qualia præ-



Dentaria altera sine icono.

Clus. Pann. Dentaria 2. siue: *enidzom* ①: Dentaria coralloide radice. Hist. post. Dentaria 5: *ni- qom* ②:

C. Bauh. Phyt. Dentaria 4. triphyllus, quæ semper tria folia iuncta habeat. Dentaria puilla, Enneaphyllos.

Exit in vmbrosis Austriæ, Styriæ, Catlnthiæ, Pannoniæ que siluis, non modò ad montium radices, sed etiam circa mediam eorum regionem, vbi præaltorum arborum siluæ vbi plurimum, in Alpihus huiusmodi, desinere solent. Inueniebat Clusius, & ultra Drauum, in monte Greben imminenti, cum Quarto generè bulbifero (Coralloide minore bulbifera) a. que etiam Herciniâ siluâ Bohemiam ambiente.

Floret Aprili, vicinis Vjennæ Austriacæ siluis, & aliis humilioribus: semine prægnans est Maio. At in montibus feruis.

CORALLOIDES MINOR BULBIFERA



Inor *Coralloides* obliqua *radice* geniculatim incedit, candida, tenui, squamata: *caulis* sesquicubitalis serè, tenuior quàm vilius præcedentium: vnde exorti rari pediculi *folia* quina ad rachin adnexa sustinent, modò rectè à regione posita, modò alternatim, scilicet aut duas vncias longa, semunciam latiora: cæterum quæ circa caulis fastigium conspiciuntur, nullum talem obleruant ordinem, sed singularia fortuito posita, longè iam dictis magnitudine concedunt, non minus reliquis serrata: extremus caulis in pediculos multos abit, quibus hærent

stivus

flores, cuiusmodi sunt præcedentium, purpura (quam magna ex parte licci amittunt) diluente nitentes: *semen & siliquis* vt heptaphyllæ. Verùm & præter hæc omnia ad foliorum alas bulbi quidam, veluti in Lilio croceo bulbifero, adnascuntur, per maturitatem sigificant, ex quibus non fecus ac ex semine propagatur.

Loebel. Obs. & Ic. Pl. Dentaria Bulbifera. Clusius Pann. Dentaria. Hist. post. 4. siue baccifera. Cæsalpin. Dentaria minor Lycoctoni Pontici Diosc. & Theophrasti Aconiti genus. Vide antè verba Cæsalp. capite de Coralloide septifolia

Tabern. Hist. Dentaria 4. Icon. Dentaria septifolia. Ecce vocat Septifoliam, cum plerumque quina proferat, vt pictura eius & aliorum demonstrat.

C. Bauh. Phyt. Dentaria 3. siue baccifera.

Coralloidis pulchram speciem attulit Frater collectam in monte Castello Patavii. Anno 1595. Iunii 6. eandem n. fallor vidi Heidebergæ in Horto Di. Sprengeri cum bulbis in caule, quos accipi plantandos Montbelgardin Horto II. E. C. Misi etiam nomine Dentarie bulbiferæ: Habui etiam Argentina à Friderico Meyer.

Cæterum, nullas harum plantarum facultates Clusius comperit.

belluarum amicos fetoces, & mutuos hostiles congressus placandi.

Foliorum succus quâ pollet adstringendi vi, vt refert Dioscorides, sanguinis reiectiones supprimit, valet etiam ad dysenteriam, seu potui datus, seu etiam clystere infusus; fluorem quoque muliebrem sistit, subditus in pesto. Sed & hebra sanguinis è naribus profusio subuenit, iisdem indita. Est & vulneraria, sanguinemque supprimit. Acerrimum verò nidorem suffra reddidit, aded vt & serpentes abigat, & muscas eneeet.

Vim & usum medicum sparsim proponit Plinius: Vis eius tanta est vt iumentis discordantibus iugo imposita, asperitatem cohibeat. Lysimachia odorem fugiunt serpentes: Si ore sanguis reiciatur, siue feminarum utero. Lysimachia pota, vel illita, vel naribus indita, sistit: atque etiam recentibus plagis medetur. Capillum Lysimachia flauum facit.

Galenus. Lysimachia, inquit, adstringentem qualitatem prædominantem habet, ob quam & vulnera glutinat, & sanguinis è naribus eruptiones sistit, si nares eâ obturentur, & medicamentum est quod etiam alias sanguinis eruptiones cohibet, tum ipsa, tum adhuc magis succus ipsius. Quin & pota, & per clysterem infusa, dysenterias & sanguinis reiectiones & fluxum muliebrem sanat.

ACONITVM LYCOCTONVM DODONÆI siliquosum, ad Coralloides forte referendum.

LYSIMACHIA LVTEA.

Elus icon in peruetusto manuscripto Græco codice reperitur qui Vienna Pannonia in Bibliotheca à D. Maximiliano 2. Imp. Aug. instituta asseruatur. Folia ei sunt non omnino vt Platani, sed lata: *caulis* tenuis & læuis; *siliquis* tenues & oblongæ: *radices* non modò cirros, verùm ipsas Squillas marinas referre videntur. Lycoctonum tertium Ponticum cognominatum Dioscoridi esse potest Dodon. Hist. Lat. in fol. 456. Mihi videtur figura à Dodonæo ficta aut pessimè expressa: ac existimo à Barbaris ita effictam plantam partim ad descriptionem, partim ex aliqua planta ineptè, vt solebant Barbari: si considerentur siliquis & flores, fortè videbitur habere aliquid commune cum Coralloide: Dodonæi descriptio est fortassis ex figura. C. Bauh. Phyt. 332. Aconitum 3. siue Lycoctonum folis lœvatis, siliquis oblongis: an tertium Dioscoridis?

LYSIMACHION VETERIBVS.

CAP. XXVI.

Lysimachia, quam aliqui Lytron appellant, infit Dioscorides, *caules* emittit cubitales, aut etiam altiore, tenues, fruticosos, à quorum geniculis *folia* prodeunt salignis similia, gustu adstringentia: *stos* est fulvus aut eius. Nascitur in palustribus & secus aquas.

Inuenit & Lysimachus herbam Lysimachiam quæ ab eo nomen; teste Plinio, accepit, celebrata Erasistrato. Folia habet Salicis, viridia, florem purpureum, frut: coss, ramulis erectis, odore graui. Gignitur in aquosis.

Hæc Græcis *Λυσιμάχια* & *Λυσιμάχια* dicitur, Latinis Lysimachia, à Lysimacho Rege inuentore: vel à pugna diuimenda: id enim est *λύσιμα* certamen dicere. Est enim ei vis etiam



Svbrubente *Sradice* repitice, summo cepite hærente nititur: *caules* autem profter sesquicubitales & bicubitales, striatos, hispidos: quibus ad genicula adnascuntur *folia*, terna aut quaternaria, rariùs bina, Salicis latifolia, acuminata, supernè atrouitentia, infenrè magis candicantia. lanuginosa: *stoves* in extremis ramorum fastigiis lures, Hyperici acidi saporis, ex quin que foliis componuntur, totidem staminibus medium occupantibus, odore nullo. *Semen* Coriandro par, sapore haud legniter adstringente.

Fuchsio, Tabern. Turn. & Camer. ad Mist. Germ. Matth. pingentibus, *Lysimachia lutea*. Dodon. Gall. *Lysimachium verum*, seu *luteum*: Lat. fol. *Lysimachium legitimum*. Matth. Lacun. Cæsalp. Anguill. Camer. in Epit. *Lysimachia*. Gesn. hort. & Thallio *Lysimachium luteum*. Lonic. Geel Weerdich, *Salicaria*, *Lysimachium* Græcè.

Agnosce officinas & herbarios duo Lysimachia genera, purpureum & melinum scribit Corn. sed à Salicis foliis Salicariam appellare. Contra Anguill. negat esse duas Lysimachias diuersorum colorum.

FC. Lobel. & Pena Adu. Obs. & Icon. Pl. Lysimachia lutea, siue salicaria.

Ruellius modò hanc Lysimachiam asserit, modò aliam. Vnde eum nesciuisse quid scaberet, coniciamus.

Cast. Lysimachia falsa. C. Bauh. Phyt. Lysimachia siue lutea maior: Lysimachia Diofcoridis.

Lysimachia lutea, *Acou d'yon*, vulgò Salicaria. Germ. Geel Wederick. Belg. Geel Wederick. Gall. Corneille, Soucy d'Eau, perce bossé, ou Chasse bossé. Italis & Hispanis Lysimachia.

Locus & Tempus. Lysimachiam flore luteo Montspessuli obseruauit: Geneuz copiosè au plain palais propè Arue fluium: Basilea florentem vici mente Iulio extra portam S. Albani. Montbelgardi variis in locis, vt è regione areis in fossis: Item extra portam Helicurianam quam *Rachette* vocant. Est etiam in Horto Il. E. C. à nobis plantata.

Virg. Pro Suchaa Arabum fumunt Bononienfes in suo antidotario semen Lysimachia, præsertim lutea, cum sit præstantius quàm purpurea semen est. Serpentibus & muscis Lysimachiam aduersarii certum est.

LYSIMACHIA LVTEA minor:

Descriptio:



IN Pannonia collectam asseruo Lysimachiam luteam minorem cubitum altam, hirsuto caule, in quo ex certis intervalis terna radiata folia, quàm nostræ vulgaris minorâ leuiter acuminata, vncias tres longa, vnam plius minus lata: ex quorum alis inæquali longitudine exèit pediculi, aliàs non totam se-

munciam æquantes, hirsuti, quibus hærent flores lutei in quinque lacinas diuisi, apicibus totidem in medio luteis: folia, auctore Cluio, recentia acida sunt, deinde saluam cient, infimaque parte nigris punctis distincta sunt: flores enim grauitate odorati: radix geniculata, ex singulis vt plurimum geniculis nouas propagines produçens, & subinde agens, quibus telluri firmiter inhæret.

Clus. Pann. Lysimachia prima, Lysimachia altera flauo flore.

C. Bauh. Phyt. Lysimachia 2. siue lutea minor.

Argentina anno 1595. habui ex plantis D. Agerii Lysimachiam luteam minorem.

LYSIMACHIA ALTERA LVTEA Lobelio, flore quasi spicato.

Plant. icon. Lysimachia lutea altera, aut Lysimachia salicaria: Onagra quorundam.



C. Bauhin. Phyt. Lysimachia 3. siue bifolia, floribus globosis luteis.

Lysimachiam Locus secundam apud Platimum, vidi apud Fratrem C. Bauhinum, Basileæ anno 1594. siccam eandem habeo.

LYSIMACHIA PURPUREA quibusdam spicata.



Plures parit radices, digitales, lignosas, albas, caules ad hominis altitudinem læuore solo adolefcunt, rigidi, in alas diuisi, angulosi, subnibentes: folia vt plurimum bina ex certis intervalis, aliàs terna, Saligna, quàm luteæ Lysimachia strictiora, acuminata, sicco gustu: flores in spicis drantibus,

aut breuioribus, hilaris purpura oculo perstringunt, quorum singulis foliis constant, staminibus concoloribus medium occupantibus, ex calyculis oblongis striatis, subpurpureis.

Icon nostra ex Guariniana non multum placet, dubitamus etiam an hic ponenda.

An Trago Germ. Ein heidnisch wundkraut/ optima vulneraria herba reperta in equo per Lupum dilacerato. An Lat. Solidaginis species Bernadino de Rentzingen?

Matth. Lysimachia altera flore spicato: Centaurium magnum à quibusdam putatum. Lysimachia altera Lacunæ. Camer. Hort. Lysimachia purpurea, Tabern. Camer. ad Matth. Germ. Castor. Lysimachia flore purpureo Anguill. Cæsalp. Camer. hort. Lysimachia 3. Turnero. Gesner. hort. Lysimachium purpureum cognominatum flore rubro, non colore solidi, sed specie totâ diuersum à luteo. Dodon. Gall. Lysimachium secundum: Lat. sol. Pseudo Lysimachium purpureum alterum. Falluntur, inquit, qui pro Hepatoto colligunt: sed multò magis, qui ipsum Centaurii speciem esse rentur.

Lobel. Obs. & Icon. Pl. Lysimachia purpurea, fortè

fortè Pliniana. *Lyfimachia altera Matthioli.* Hist. Lugd. *Lyfimachia altera Matthioli.* C. Bauh. Phyt. *Lyfimachia 3.* siue spicata purpurea, fortè Phou. *Lyfimachiam purpuream* quibusdam flore spicato vidi Monspelii & Genevæ ac Basileæ florentem ad Brisam mense Iunio & Iulio. Monthelgardii abundat propè *Adincourt* & iuxta viam quâ itur *Souchaur*.

LYSIMACHIA PURPUREA
Pannonica.



NOstræ *Lyfimachia purpurea* spicata affinis. Pannonica *Lyfimachia*, caule quadrato, in oppositos ramos diviso, sed tenuiores: in his folia angusta acuminata, ex aduerso sita, nervo secundum longitudinem decurrente: in summo caule flores in longa spica coherent, quaterni fetè, aut singuli etiam alternati in geminis folioli sinu prodeuntes, colore purpureo præditis, his senis contexti, è calyce oblongo mitiore quàm in purpurea spicata nostra, striato, ad Calamenthæ calyces accedente. Rarè cubitalem altitudinem hanc *Lyfimachiam* sperare testatur reliquit Clusius, foliæque si mordeantur gummosa, deinde non nihil acrimoniae & amaritudinis exeret: radicem duram lignosam, multos caules singulis annis proferre, & subinde lateribus se propagare & multis fibris inherere.

Clus. Pann. *Lyfimachia 1.* *Lyfimachia minor* rubro flore. Casp. Bauh. Phyt. *Lyfimachia 4.* siue rubra non siliquosa.

Accepi plantam ex Agerii siccis Argentinæ 1595. quæ colore florum valdè placet, qui mihi cæruleus serè videtur, inscriptio erat, *Lyfimachia purpurea Pannonica Clusii*.

EPHEMERON MATTHIOLI.

PROdiit foliis oblongis, latis, duriusculis, veluti Isaidis, sed tamen minoribus, cauliculis compluribus rotundis, cubito altioribus, non absque adnatis: quos superius quinquefolii candidi conuectant *fesuli*, haud magni, successivè prodeuntes, semen succedit in rotundis capitulis exiguum, crassis & multis fibris capillatæ radices.

Ephemerum quod filii Irin appellant in Ananienibus montibus tam in prætis, quàm in silvis copiosè nascitur, vbi Indigenis vocatur vulgò *Giglio Matto*, hoc est, Liliolum stultum. Huic certè, nisi me fallit iudicium [inquit Matth.] omnes proflus notæ conveniant, quæ alteri Ephemerò à Dioscor. tribuuntur, & Gal. lib. 6. Ephemerum non Tom. II.



Matthiolum non descripti esse plantam vulgò non notam, si eam bene agnovit.

Plant. Icon. Lob. & Obs. Ephemerum Matth. vel potius Ephemerum spurium. H. Lugd. Ephemerum non lethale. Matth.

Tshern. Icon. Ephemerum Matth. Wiseri Zeitschen, redflumen.

Matthiolum aliud Ephemerum exhibet, quod in hortis Belgii aliter, quàm ab eo depingitur enatum est: verùm illud cum Ephemero Dioscor. patum, immò nihil convenit: Dioscorides Ephemerum ait à nonnullis appellari *leu dzean*. Aft maull Dodon. de purg. legere *leu dzean*. Nam si solum caulesque Lili, citius Liliolum silv. quàm siluestris Iris videtur nuncupandum Ephemerum Matthioli.

C. Bauh. Phyt. in app. Ephemerum 1. siue Matth. Ephemerum 2. siue Matthioli, vel potius spurium Lobelii. *Vix credimus* eandem esse, cum illi folia Lili & radix vnica digitalis tribuatur: huic verò folia & radix Isaidis ascribantur: imò figurarum nulla similitudo: verùm cum neutram viderimus nihil statuere licet. Idem tradit apud Matth.

LYSIMACHIA SILIQVOSA HIRSVTA;
maiore flore purpureo.



MUltis hirsutis capillatæ radice nititur, caules emittens tenues, teretes, rubentes, subhirsutos: folia sepe bina, non exactè aduersa, Salicis, crenis rubentibus incisâ, glabra, gustu viscido; aliquod coloris vestigium relinquente: flores longis, quadratis, hirsutis rubentibus siliquis in qua-

tuor foliola fatifcentibus infident, dilute purpurei, ex quatuor foliis cordatis striatis compofiti, in quorum medio fibræ ex leucolo herbis: *siliqua* præproprio ortu flores at teuerentes *semen* continent pulfillum; lantigine caudâ inuolutum.

Trago Salicaria altera purpureas ferens Viola3 Andree wederich mit braunen Violen.

Fuchf. *Lysimachia purpurea*.

Meminit huius Gesneri in fine Hist. Cordi cap. de Chamænerio, dum Chamænerii speciem describit, quam Delphinium esse putat: Herbatu quidam [inquit] putant esse quam *Filium ante patrem* appellant, quod siliquam & intus semen ante floris exitum ostendat, rectius si *partis ante ceptum* ab eis appellaretur. Iam apud à tere-ti, siliquula per extremum in expansum florem exeunte, Buccinariam dici audio. Ruellius Bel-lium cum Anupatæ confundit, Delphinium non existimo. Filius ante patrem vocatur, ab aliis (in Germania inferiori præsertim) Antoniana vel *S. Antonii herba*: Nostri Schoßfraut appellant: Dodonæus inter *Lysimachias* describit. Appelle-tur, si lubet Epilobium. Idem de hort. scribit Antonianam vel *S. Antonii herbam*, ab aliquibus Filium ante patrem, & aliis *Lychnidem maiorem* & *hirsutam* appellari.

Dodon. Gall. *Lysimachia* 22. Filius ante patrem, *Lysimachium purpureum* primum. Latân fol. Pseudolysimachium purpureum 1. Quæ por-tò de hoc tradit, cum ad intelligebant verbo-rum Gesneri iam dictorum conserte videantur, ea adscribere placuit. *Lysimachia* species habe-tur. & à Fuchio ante nos, inquit, pro *Lysima-thio purpureo* descripta: non est tamen legitimum *Lysimachium*, sed spurium ac Pseudo-lysi-machium. Qua de causa & alius maluit ipsum no-minibus Gesneri compellere, & Epilobion, aut Chamænerion vocitare: *S. Antonii* quidem, quod flos sit Leucioi similis super siliquam natus, *zaxa-que herba* verò à similitudine aliqua cum Nerio siue Rhodendro, præsertim altius assurgens, cuiusque flos è latioribus foliis compofitus exi-guam rosam æmulat. Idem verò & Antonia-nam dici à nonnullis refert: sed tamen & aliam ait Antonianam esse, quæ dentium dolori me-deatur. Nominatur verò & passim Filius ante patrem, propterea quod siliquæ appareant prius quàm flos. Censetur etiam à quibusdam Onagra Veterum, quæ & Oenothera siue Onuris. Dioscorides verò hanc ait esse fruticem prægrandem arboris instar: *Lysimachium* verò istud purpureum non nisi herba est, hyeme etiam inarescens tantum abest vt frutex sit, aut arborem æmulari queat.

Aduers. Lob. & Penz. *Lysimachia siliquosa*, Filius ante patrem. Lobel. Obs. & Icon. Plant. *Lysimachia siliquosa*, Delphinium Dioscoridis Dale-champio. H. Lugd. *Lysimachia purpurea* 2. Dodonzi. Tabern. Hist. & Icon. *Lysimachia siliquosa* 1. C. Bauh. phyt. *Lysimachia siliquosa* hirsuta magno flore.

Lysimachia siliquosa hirsuta maiore flore purpureo. Germ. Korr. & Braun weiderich. Gesn. Schoßfraut. Eidem Epilodium, Filius ante patrem, Antoniana, vel *S. Antonii herba*, *Lychnis maior* & *hirsuta* aliquibus, Gal. *Lysimachie rouge*, Dodon.

Filius ante patrem maior folio hirsuto, variis locis prouenit, circa Montbelgardum mense Augusto florenter vidi in ex Dale & Audincourt, paludoso loco, ac etiam in horto E. Cel. Prouenit

Onagra


Nominia

Locus & tempus

Montepelii: Basilea propè Moutets, & propè Bis-fam intra urbem, & extra portam S. Albani ad Bisfam eandem florentem vidi Iunio, Julio & Octobii. Frater obseruauit ad Rhenum extra portam Rihen. Ferrarie in Cœnobio S. Dominici à *P. Angels* vidi. Guilandinum vocare Delphinium mihi indicatum. Iuxta scrobium, solfarum, fluituorum, riuulorumque margines, aliisque humidis locis reperitur: quandoque tamen & in sicci-oribus exit, præsertim quod latioris folii florem gignit. Tota ferè æstate floret. Dodon.

Cætetum, vsum in Medicina [eodem referen- Vires: te] cum nullum habeat; vires quoque eius ac temperamentum cognoscere non contingit: Gesnerus tamen calidam & siccam secundo gradu iudicauit esse, atque ex diuersis constare parti-bus, nonnullis euidenter adstringentibus; aliis verò modicè abstergentibus.

LYSIMACHIA SILIQVOSA HIRSVTA flore minore.



Bicobitalis Descriptio ferè est, a-lis vix cubi-tum superans, caule rubente, rotundo; flati-m ferè à radi-ce in ramos plurimum op-pofitos bra-chiato: folia hirsuta, oblon-ga, crenata, modicè in acumen desinunt: sili-quis verò lon-gis infident flosculi exigui, longè minorè quàm descriptæ suprâ siliquosæ

hirsuta, coloris ex rubro pallentis, vel albidis: radix multis fibris est capillata.

Dod. Lat. fol. Pseudolysimachium purpureum minus.

Tabern. Hist. & Icon. *Lysimachia siliquosa* 2. C. Bauh. phyt. *Lysimachia siliquosa* hirsuta paruo flore.

Lysimachia hirsuta siliquosa flore minore, prouenit Montbelgardi, vt in Horto E. C. spontè.

Locus

LYSIMACHIA SPECIOSA QVIBVSDAM Onagra dicta, siliquosa.

Descriptio *Lysimachia* species reliquas proceritate superat hæc quibusdam putata Onagra, tres quatuorve aut plures cubitos alta, caule glabro, canaliculato, subrubente, copiosa medulla alba fungosa pleno, foliis multis ab imo ad summum, sicut & in ramis, donato, ad Salicis aut Nerii folia accedentibus, oblongis, mediocriter angustis, acuminatis, vtrinque glabris, rara quædam per ambitum crenatum vestigia ostendentibus, obliquis ad latera venis, à nervo medio secundum longitudinem decurrente deductis, sapore subadstringente & glutinoso, non sine aliqua ob-scura acrimonia: in ramis tuberibus longa serie nascit



nascuntur sili-
qua longa, qua-
drata, (ceu in
Lysimachia cui
Filius ante pa-
trem nomen)
rubentes aut
ex rubore in ci-
nereum decli-
nantes, subhi-
suta, bituluz,
in quibus se-
men papposo
tomento deli-
catissimo in-
uoluitur, per-
puffillum, ob-
longum cine-
reum, siliqua-
rum porro sa-
stigia in qua-
terna folia an-
gusta explicantur, flores sustinentia speciosos
Leucoii, purpurascetes, quorum medium occu-
pant stamina candida, apicibus rubentibus aut
luridis, pistillo longiore, in quatuor crucula de-
sistente. Radix alba, longè latè que repit, gustu
insipido viscosè que.

De hac Hist. Lugd. o'vayza, o'mbha, o'me, Dio-
scoridi, o'vobela Theophrasto, o'vaz est, o'vobels Gale-
no, Latine similiter Onagra, siue potius Oena-
gra, & Oenotheris, Oenuris à vino dicta. Fru-
tex est arboris specie, ita deserviente Diosc. ad-
modum magnus, folia habens amygdalæ similia,
sed latiora, & Lili foliis similia, flores rosarum
specie, magnus, radicem albam, longam, quæ sic-
cata vini odorem reddit. Nascentur in montanis
locis. Eadem Plinius tradit.

Franc. Calzol. insignis Phamacop. dicit in sua
montis Baldi descriptione, provenire ibi Ona-
gram, hanc fortè intelligens. Onagram quidem
siue Mulcibrutum in Venonensi Baldo Lobel. &
Pena sciscitatu sunt: sed id responsi tulerunt, nul-
lam repertam plantam quæ quadret Onagræ.

Nullum inquit Matth. in Diosc. licuit repetire
qui mihi Onagram, siue Oenotheram, aut Onu-
rin Dioscoridis, siue Oenotheram Theophrasti
ostenderet. Ad me scripsit Lucas Ghinus, se pi-
sè ex Apennino translata, foliis Amydalæ.
Quæ sanè omni ex parte Onagram referre vide-
tur, cæsi ipse quoque pro certo non ausit asserere
hanc legitimam esse Onagram.

Gesner. in sine Hist. Cordi, de pingens & de-
scribens vocat Elobii quintam speciem, quam pri-
vatim Chamænerion nuncupat. Aliqui verò
señt Fraut Igniatiam. Nec assentitur illis qui Ly-
simachii speciem hanc esse suspicantur. Idem ta-
men rufus de hort. Antonianam herbam, S. An-
tonii, Filii autè patrem, speciem maximam facit.

C. Bauh. phyt. Lysimachia 10. siue Chamæ-
nerion dicta, latifolia, flore cæruleo & albo, sed ra-
ridis.

Lysimachiam speciosam siliquosam, Dale-
champion Onagram dictam, vidi Basileæ spontè
& in hortis cum flore Iunio. Frater C. Bauhinus
observavit in monte Moutets. Mense Octobri
reperi in monte Balon, florentem Augusto. Ab-
undat circa Montbelgardum quæ situr Adin-
court, vnde transfuit in Hortum Ill. E. C.
Aqua in qua radix maderit in potu data, auctore
Diosc. feras mitigat & cicures reddit: illita quoque
maligna vlcera mulcet. Adiecit Cræteus, inquit
Tom. II.

Plinius, Oenotheridè, cuius aspersu è vino feritas
omnium animalium mitigaretur. Et per se Oeno-
thera effertur ita se se vlcera sanat, sita Oenobonon
Dioscoridis exponens. Huius radix, inquit Gale-
nus, arefacta vino sum quiddam redolet: Sed &
facultatis vini est maximè.

LYSIMACHIA LÆVIS.



Lævis no- Descriptio
Lævis no-
men me-
rit, rō quidd
nullis penitus
pilis sit obrita
sed quod vlg;
ædèd tenuibus
tam in caulibus
bucubitalibus
bus, altioribus
que, teretibus
que, rubentibus
ramosis,
quàm in foliis
(quæ bina oppo-
sita, ex inter-
teruallis, latius-
cula serrata)
donata sit, vt
oculorū aciem
ferè fugiant.
Sunt autem

subadstringente sapore folia: flores siliquis lon-
gis Lysimachia siliquosæ hirsutæ similes, sed foli-
orum instar lævibus, quibus flores insident mi-
niores dilutioresque, quàm in iam dicta Lysima-
chia: semen simile: radix multis fibris intertextis,
squammis stolombis se propagat.

An Aduert. Lysimachia siliquosæ altera spe-
cies?


An Dodon. Gall. Lysimachia secunda alia spe-
cierum minima.

Lysimachia, siue Filius ante patrem, lenis, flo-
ret mense Iunio. Eadem nomina à Gesnero huic,
ni fallor, attribuntur, quæ alteri hirsutæ quam
lævem maiorem vocat. Basileæ in sylvis observa-
uit Frater. Montbelgardis florens & semine matu-
ro Augusto.

Locus &
tempus

LYSIMACHIA SILIQUOSA

speciosa, angustifolia.



Superiori to- Descriptio
Sta quidem
facie similis, foliis
est confer-
tim multis si-
mul. coacerua-
tis, Linariæ foliis
& longitudi-
ne & latitu-
dine paribus:
flores consimi-
les purpuran-
tes; longis in-
canis iam dictæ
corniculis insi-
dent, minores;
radix repens
cum præceden-
tis radice con-
tinet.

Planta hæc
vt refert Hist.

Lugd. quæ Linariam rubram vocat, Herbariorum quorundam iudicio Therionarca est Plinii, fruticosa, foliis subuiridibus, flore roseo. A plerisque etiam an Delphinium sit Græcorum non sine causa ambigitur, quod huius folia incisa non videntur, qualia Delphinii à Dioscoride describuntur. At si diligenter notas à Dioscoride memoratas expendamus, à Delphinii historia parum distat.

Lebel. Obs. & Icon. Pl. Chamænerion Gesneri, Delphinium Buccinum Dioscor. Lyfimachia siliquosa varietas.

An Gesner. hort. Antoniana, Filius ante patrem minor, Schos fraüt.

C. Bauh. Phyt. Lyfimachia II. siue Chamænerion dicta angustifolia. Epilobium [*var. d. r. c. b. s.*] Viola super siliqua] sextum Gesner. ad Cordum.

Lyfimachiam siliquosam speciosam angustifoliam reperi Ger. euz iuxta fluuium Arut. D. Dalechamplius vocabat Therionarcam Plinii lib. 25. cap. 9. & alorum Delphinium. Frater Casp. Bauhinus atulit ex Italia nomine *Herba mora Cortulo*, & Chamænerii Gesnero.

Et quia dubitatur an sit Therionarca Plinii & Delphinium Dioscoridis, idè vires etiam adscribendæ earum plantarum veniunt. Therionarca Magica omnes seras torpescere, nec nisi Hyænx vrinæ aspersu recreari auctor est Plinius. Et alio in loco, Serpentes necat, inquit, & cuiuscunque admota seræ torporem adfert. At cum Therionarca dicatur, quod sit *var. d. r. c. b. s.* hac admota non seras omnes torpescere & serpentes necari sed venenatas tantùm bestias, & mortu idè venenoxias; melius fortasse dixisset Plinius. De Delphinio verò scripsit Dioscorides semine nihil vtilius bibi posse à Scorpione percussis. Aiuntque obiectâ herbâ Scorpiones resolui, atque ignauios torpescere: se. notâ verò eâ sese recolligere.

NOLI ME TANGERE:

C A P. XXVII.

Descriptio.



ta, in ambitu serrata, mollicella: ex quorum alis pedicelli teneri, in quibus ex duobus foliis sese

Summo caespite radices hgit fibrosas: à quibus caulis surgitur cubitalis, dilutissimè virens, inanis, & diaphanes, copiosum succum inspidum pressu remittens, per interualla geniculis, ad quæ toporum podagricorū zmulâ subinde tuberas; interceptus: folia Cynocrambes, latiora, obtusio-

explicat flores, Nasturtii Indici floribus assimiles; minores, corniculo intorto, ex flauo rubentes punctulis rubris saturatioribus guttati, in quorum medio exalbida staminibus succedunt siliqua oblongæ Chelidonii maioris; angulosæ, quæ mature scente semine leui contactu semine excusso dissiliunt, multis terrorem incutientes; Vermiculorūque instar conuoluuntur: Vnde Noli me tangere nomen inditum. Non in omnibus plateæ figura nostra Guarimiana.

Tragi qui in Hist. Germ. Springfraüt / eirt wild Ringelstraüt & wolffstraüt vocat, ac in Lat. Mercuriale 4. siue siluestrem alterâ, & Efulam 7. seu dulcem statuit, Leptophyllum Tithymalum appellat. Verùm hæc opinio penitus damnanda est, cum vix quicquam commune habeat cum Tithymalis: nec enim folia, nec flores, nec semina respondet, quod mecum Gesner. pluribus in locis sentit: Apocy non eminus appellans.

Lo. & Pena Adu. Pesticariam siliquosam vocant, cauendūque etiam præcipiunt, ne quis Mercurialem putet, eamque in eos vix legat, ut nonnulli hallucinati fuerunt. Negantque esse Senensis Phyllon: Statuentes potius esse alteram Efulam syluestri. Tragi: nec agnoscetes se Efulam istam Tragi tradidisse pro Pesticaria siliquosa.

Hist. Lugd. Pesticaria siliquata: An eidem Chrysa? Ac certè: Si Chrysa Hist. Lugd. non est Noli me tangere, erit ei valdè affinis.

Recordor à me hanc herbam primò visam in valle Leborana, inter Kapelslein & S. Matiam, vbi fodinæ argenti, cum ellem adnuc puer, cuius semen subito tuo saltu horrorem mouit. Inueni in mote propè Efl. b. n. Il. mei Principis, ac transfuli in hortum E. C. Tubingæ cum essem Fuchsius præceptor meus Mercurialis speciem faciebat: Basileæ vidi ad Pontis finem quæ itur Galinæ guen: in itinere ex Morat Basileam copiosè reperit inter Balsstätt & Wällsbürg; loco humido florentem mense Septembri cum seminibus maturis: Basileæ in horto D. Theoderi Zvinckes obleruavi florentem Iunio. Frater Casp. Bauhinus anno tauri prouenire in Munchstein. Tiguri in horto Gesneri vidi. Inueni florentem cum semine maturo Augusto mense in ascensu montis Ballon. Dy. Melchior Sbitzius Medicus Argentina mihi scripsit quosdam vocare Hydropticam à turgentibus folliculis. Viennæ Austriæ in siluula Wolff dicta reperitur.

Distillatam aquam ex herba Springfraüt Vires vel hirschemelden dictam Vrsilauiz in calculo renum misicè prædicant: Noli me tangere, articuli tutgiduli visuntur, ceu demonstrante natura in promouenda vrina eius usum plurimum valere. Hanc quoque in Oleo Liliorum aut alio decoctam applicari Gesnerus non putarit inutile. Folia eius aliquot viro stranguriâ laboranti vtiliter imposuit, ac miram etiam vim habere dicit in cienda vrina, ac aquam distillatam præsertim: quæ si copiosius hauriatur vel diabetem inducit. Folia quinque in pœculum vini nuper imposuit mulieri *var. d. r. c. b. s.*, & vino epotum melius habuit. Canis, cum dedisset iuculum in quo manipulus eius decoctus erat, per lesquioram postea copiosissimam reddidit vrinam, plunbus verò horis post etiam alius copiosè mota est: cuti imposta *var. d. r. c. b. s.* Impatiens herba facultate fertur petniciosa ac inter delecteria habenda Dodon.

BALSAMINA

BALSAMINA FOEMINA PERSICI
folia, vel Salicis folio.

CAP. XXVIII

Balsamina, quam foemina vocant, radice fibrosa & candida nititur: caulem autem habet enormis crassitie, cum altitudo cubitum saepe vix aequet, raro autem & parum superet: est is verò cortice aut ruffo aut rubefcente, aut herbido tectus, succo satuo pragnans, glaber serè, cum interiori rami, quos nullo ordine emittit, tomento leui vestiantur, foliis dense stipati, Salicis aut Persicæ, acuminatis, per ambitum serratis, succulentis, sapore amaricante præditis: è quorum alis flores simul plures, Impatiens herba Dodonæi [a' b' n' s' r' s'] profluit, calcarì longo ex carneo colore herbaceo, reliquis verò flos rubescit: fructus qualis Balsaminæ maris, acuminatus, verrucosus, in quo semen clauditur.

Matth. in post. com. Lat. & Ital. cum mag. fig. Camer. in Epit. Balsamina altera. Ital. Balsamina maggiore, siue foemina. Germ. Balsam Fraur weibel. Balsamina foemina Persici folia, Persicaria non multorum, Aduers. Lob. & Penz. Angwill. Balsamine altera, Itatorum herba di Sancta Catharina.

Gesner. hort. Balsaminæ vulgò dictam, Herbz noli me tangere cognatam suspicatur.

Trag. Balsaminæ alterum genus.

Cord. Hist. Balsamella, cui Gesnerus addit figuram, vocans Balsaminem peregrinam, alteram Fuchsi, Dodonæi foeminam.

Dodon. in fol. qui describit & depingit sub titulo Balsamina, ait, vulgò Balsaminam nuncupat: & quandoque neutro genere Balsaminum.

Plant. Icon. Balsamina foemina Persicifolia.

Tabern. Iconib. & Hist. Cam. apud Matth. Germ. & Hort. C. Bauh. Phyt. Balsamina foemina. Hist. Lugd. Balsaminum, seu Balsamina Matth. Balsamina Fuchsi: duas proponit Icones.

Balsamine foemina folio Salicis Montbelgardi factè prouenit in Horto E. C. non maturefcit quotannis semen, licet saepe. Basileæ habui in Horto Patris, apud D. Doctorem Fœlicem Platearum vidi florentem Iunio: obseruauit Estingæ & Patavii.

Putant quidam [id quod etiam scribunt] & hanc iidem esse cum altera Momordica viribus. Verùm Matth. nullam eius experientiam habet.

ISATIS, SIVE GLASTRVM SATIVA ET spontanea.

CAP. XXIX.]

Pollicaris huius radix albida, & lignosa ad cubicum aut sesquicubitum descendit: caules teretes, rigidòsque surigunt, ramosos: flores in ramulis lutei, crebri, exigui, ex foliis octo, maioribus, alternante situ cum minoribus positus: stamina lutea: capsula seminum nigricantes, linguæ aut similes, sed multò breuiiores, angustiorèsq. costâ longitudinem percurrente, secundum quam etiam aperiantur. Folia ad Cynoglossum accedentia, non nihil glauca, longa; ad cubitum etiam, glabra, quædam ex prioribus interdum hirsuta, ac etiam nonnunquam sinuata ad Hef-



peridis folia accedentia, quæ in caulibus & ramis sunt, nullo pediculo interueniente adnascuntur, pinnatis barbulis ad basin donata, glabra.

Duo Itatidis genera traduntur à Dioicotide: Itatis domestica

Dioici gener. ra duo

Itatis domestica

Glastum domesticum, Itatis domestica. Glastum syluestre. De domestico inquit: Itatis fatiuaque caret [Itatis domestica caret] quâ Lanarum Insectores vtuntur, solum habet Plantagini simile, verùm pinguis nigriusque: caulem altitudine duos cubitos excedentem.

Folium Plantagini simile

Itatis sil. Italis La. Italis pro. ximæ

Siluestris jam dictæ similis, sed folia habet maiora, ad Latuæ proximè accedentia: caules verò tenuiores, multifidos quadantenus rubentes, è quorum cacumine

folliculi multi dependent, quandam linguarum effigiem referentes, in quibus semen: florem melinum & tenuem.

Sciendum autem, quod secundum Dioicotide descriptionem, quæ hodie apud nos domestica est, siluestris sit apud Dioicotide: & è contrâ, quæ in aruis nascitur, domestica, angustioribus enim foliis constat, & paucioribus ramis, non tamen ea in vsu est apud Insectores nostri temporis, neque caulem adeò altum gerit.

Verùm, prædictas descriptiones erroneas esse & mendosas attestatur Cornarius. Ait enim melinum florem, & tenuiores ac multifidos caules; & in cacumine folliculos illos linguarum quandam effigiem representantes Isatin habere fatiuam, non siluestram. Contineri autem in iis semen nigrum Melanthio (ait Cæsalp.) simile. Sed & caulem duos cubitos excedentem, & non, vt quidam dixerunt, vnum solum cubitum superantem producere. At siluestram Isatin nigriora ferre folia, cauliculum minorem & crassorem, florem purpureum, aut caruleum: fructum asperum, cruciformem, semen includentem foliis paruis, & assiduè per interualla quinis distinctum.

Hoc modo legentibus, vt Hermolaus legit, nostrum Glastum, teste Cæsalpino, fatiua Isati ad amissum quadrabit: siluestris autem Isatis, ea

Herba S. Antonii

Planta fuerit, quæ vulgò herba S. Antonii vocatur ob effectum. Nos de herba S. Antonii agimus lib. 22. titulo Dentellaria Rondeletii.

Lactuca generosa. Brassica filia.

Plinius vitamque Itatin inter Lactucas siluestres recenset, cum autore Casalpino, apud inter Brassicas siluestres numerari debuissent.

Luteum Vitruuii folio. Vaccaria

Vitruvius (& cum lectus Cordus in Diosc.) ait Dalech in annot. apud Plinium, falsò putatur cladium esse luteum Vitruuii: Itatis adhuc à Lobel. depicta non alia est, quam Vaccaria, de qua lib. 29. Anil quod Fragolus describit, quòdque in Occidentali India coli asserit, nil nisi Itatidem Cladius dixerit. Cladium, ut ait Cornar. Gallica vox fuit Iuli Cæsaris ætate, hodie & Itali: & Galli *guadam* vocant. Marcel. Medicus Empyricus Vitrum appellari dicit herbam, quam Græci Itatida vocant. Si igitur Vitrum vox rectè legitur, ut Itatidem significet, vox Ruta, aut ut alii habent, cluta, in suppositiuis vitique falsò legitur, & frustra laborarunt qui pro ipsa Luteam quam Hol- ler. Geldam vocari ait) ex Plinio & Vitruvio substituere conati sunt: sed sunt hæ voces omnes merito nobis suspectæ.

Guadam Vitrum.

Itatin satiuam, inquit Ruellius, siue Cladium, quo Infectores lanarum vtuntur, Cladium olim Græci dixere, nunc *guadam*, vel potius *qualdum*, nonnulli S. Philippi herbam, alii Indicum, alii Pastellum. Caruleam spumam cortinis innatantem, Indum nostri vocant Infectores. Diosc. Egnen quoque vocari tradit, quam suspicor Ighen ab Hippocrate dici.

Ruta. Gluta

Lutea

Cladium

Guadam. Gualdum. Pastellus. Indum. Egnen

Ignis Hippocr.

Vitrum apud Casalp. Nitrum. Marcelli error. Pastellus. Pistellus. Nil Auzic.

An Indicum. Diosc.

Sunt id pehibente Dodonæo, qui apud Cæsarem & Plinium non Cladium, se Vitrum legendum esse existiment, nec delunt qui in Nitrum conmutent. Verisimilis Marcellum prn Glasto voce Gallica Vitrum pepererim scripsisse, quam Cæsarem aut Plinium pro Vitro Germanorum Glast, aut ab hoc formatum Glastum supposituisse. Extat Pastelli siue Pistelli nomen apud Plinium Valerianum lib. 2. cap. 3. Ab Auic. cap. 512. dicitur Nil. Natantem autem spumam, quam Itatidis dilutum, cum panni lanae vt tinguntur eructat, sunt qui Indicum & quidem alterum Diosc. esse existiment, quod tamen non omnino manifestum, nam ex Itatide efferefcence Indicum effertur Diosc. non asserit, sed ex æreis vasit actolli tantummodò habet.

Dioscorides, ait Constant. sub Itatidis nomine duas plantas completitur, tantum siluestres aut satiuæ apposite differentia. Vitramque suo nomine distinguit Plinius, satiuam glastum vocans, siluestrem verd Itaten: quem imitari potius deberent Interpretes, quam nomina confundere nullius auctoritate vitramque plantam Glastum vocantes.

Itatin satiuam & siluestrem, serè omnes vno ore nominant, sed pingunt Fuchl. Matth. Lacun. Lonic. qui etiam Lytrum vocari ait: Ryffius qui satiuam Glastum vocat simpliciter, siluestrem verd, siluestre Glastum: Amat. Dodon. Camer. in Hist. Germ. Matth. & Epit. C. Bauh. apud Matth.

Tragus pingens satiuam tantum siluestrem nihil differi e ait, nisi quòd non vbiq; locum plantetur. Contra Tabern. Icon. & Hist. siluestrem tantum exhibet. Lobel. & Pena in Adu. Glastum satiuam, & Glastum siue Itatin filu. nimirum & describunt, ac in Obl. & Icon. Plant. iisdem nominibus pingunt.

Itatis nomen. Lat. Cladium satiuam, & Itatis domestica. German. Weid & Endich Ryff. Belg. ling. wædt/ Gall. *guesle*, ou *Pastel cultivee*: Ital. *guado d. mesico*: Hisp. *pastel*: Angl. *Weed* & *wæde*. *Itatis* verd Glastum, seu Itatis filu. & spontanea, Germ. wild weid, Belg. wild weed. Gall. *pastel sauvage*: Ital. *guado saluatico*: Hisp. *pastel saluage*: Angl. wild wæde. Vitramque vocant Mauritanii *dili*, *dileg*, *vesne*, *chates*, *chais*, *alchar*, *aldem*, aut *adhlen* & *nil*, Sic & Græci *iodm*; Lat. Cladium & Guadam Ryff. Itatin. Germ. weid & Endich. Belg. weed: Gallic. *du guesle*, *pastel de Languedoc*: Ital. *guado*: Hisp. *pastel*: Angl. *wæde* & *wæde*: Boh. wayd indifferenter vocant. In Tholafana regione, inquit Lobel. virens herba *guede*, glebæ tabesactæ herbæ *pastel* vocatur, caruleus verd ille color, qui inde conficitur Indicum Germ. *Indich*, Carol. Stephan. domo rust. Gall. *garde* & *guesle* idem esse scribit, quod Veteribus Glastum & Itatis.

In Ducatu Wirtembergico Marbaci & Tubingæ vidi spontè prouenientem Itatidem: oblectuui etiam Basileæ Frater annotauit prouenire ad Rhenum extra portam Ruchen: Vidi prateream spontaneam in agris Aitatur: Satiuam vidi Parauii in horto publico, Basileæ in Horto Di. D. Felicii Plateri. Montbelgardi vidi serentes & transplantatos agros integros, habeo in Horto Il. E. C. quæ si ipsam propagat, semine deciduo: nescio an satiuam differat à spontanea, prateream ratione culture, primo anno non solet calefcere, caulem vbi produxit plerumque perit: floret Maio & Iunio. Britici ad Rhenum spontanea pukhrè virens Octobri & Nouembri.

Ceterum sentur in latus & pinguibus agris, copiosissimum in Galia Narbonensi & in Italia, vt in Vmbria, circa Nocetam, vbi oppidum est Guadam idè appellatum, quòd ibi Itatis copiosissima feratur, sicut & in Germaniæ agro Erphordiano. Ea permagnum quæstum iis regionibus adfert. Syluestre Glastum locis incultis & pinguibus prouenit. Maio & Iunio mensibus ambo florent. Vt olim ita & nunc Glasto satiuo Infectores lanarum vtuntur. In Neustria quoque Gallia, & apud eius Prouinciæ Bellocassios Glastum feritur, & celitur, diluuis quidem in panis tingendis quàm quod prouenit apud Tectosages, vulgò [en Loregois,] indigenis tamen valdè fructuosum, & vile.

Illita solia Itatidis, teste Diosc. tumores omnes discutiunt, cruenta vulnera glutinant, sanguinis profluvia sistunt: ignem sacrum, Phagedænas, putrescentia vlcera, & quæ serpunt, sanant, Syluestre Glastum eadem præstat: potu & illitu lienosis auxiliatur. Plura vide sub finem. P. lib. 22.



HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER VIGESIMVS SECVNDVS.

CAPSVLAS, SEV VASCVLA FERENTES HERBÆ, ACRES
& calidæ ferè omnes, vt Nasturtia, Thlaspi & similes.

A Siliquosis herbis haud ita longè recedunt, quæ minuta quaedam vascula ferunt pro seminii theca seu bursa: quarum multæ in superiori libro dici poterant, nisi hæc ipsa seminum receptacula notæ manifestæ distinkta fuissent. Proinde peculiari libro illas comprehendere libuit, quem tamen si quis vult appendicem facere prioris, ut omnium sit vna Classis, & illam rationem adducere possit, quod & hæc quoque pleraque acres ac calidæ sint.

NASTVRTIVM VETERIBVS.

CAPVT. I.



oc tanquam notum non describunt Authores: tantum ex attributis colligere licet aliquas notas. Dioscorides Iberibem foliis & radicibus duabus (odore) Nasturtio comparat: Erysimum semine flauo: Silymbriū aquaticum sapore acri. Galenus videt inquit venire in obsonia cum pane, quoniam eius mordacitas humiditatis admixtione moderata sit, non exurens, vt si siccum esset; semen quoque adurens, vt Sinapis. Theophrastus inquit satium esse, quando ait: mense Julio Nasturtium serere assolent: exit à satu die quinto: semen autem vetus celeritè provenit: constat acri succo. Genera huic minimè plura: diuersitatem enim generis ei deesse omnino volunt: Sed & Dioscorides vnius tantum meminit. Plinius duo tradit, ac alterum album, & alterum nigrius facit, sed nequaquam describit; meminit & siluestris, cui effectum maiorem ad omnia tribuit.

Καρδύλλου Dioscoridis spuria, nunc Cynocardamum, nunc Iberim, nunc Cardaminaceam seu Cardamanticam vocant; *Αγυπτίη Σαμολή*: Romani & officinæ *Nasturtium*; Barbari quidam Herbarii *Cressionem h. rrensem*, Apuleius Cardaminam, Serapio *Norph*, *Alchep*, *Marchita*: Auerrhoes *Alcharf*: Mauritanii *Naf*, *Alchep*, seu *Narf*: Germ. *kees* / *Gartenkress*: Belg. *kerse* / *haffkerse*. Gall. *Cresson*, *Cresson de iardin*, *Cresson alenois ou Nasturt* Dodon. Ital. *Nasturtio*, & *Agetto*: Hisp. *Nasturtio* & *Matpica*. Angl. *Werdin Cressys*, & *Towre Cressys*. Boh. *Kzericha*.

Nonnulli *καρδύλλου* Græcis dictum putant, quasi *καρδύλλου*, quod caput domer: nam arcem mentem.

Tom. II.

tis oblidens sua ferit acrimonia, & ignea vi perditum caput tentat. Aliis *καρδύλλου*, id est, quod pupillas coëuntibus oculorum palpebris abscondat, ita dici aiunt: nam luminibus admotum subinde cogit conuiuere. A quo *καρδύλλου* verbum declinarunt, quod conuiuere dicimus. Nec desunt qui dictum arbitrentur à πύλλου *καρδύλλου*, quod cor foueat, & in syncope cardiaca plurimum valeat. Id innuere videtur Aristophanes, cum ait, *καρδύλλου καρδύλλου καρδύλλου*; Editheri Nasturtia. Quid Nasturtiaris? Et, *καρδύλλου καρδύλλου*, *καρδύλλου καρδύλλου*, id est, qui acri sunt animo, iustique, qui; Nasturtia tuentur, id est, acuti cernunt. Nasturtium verò Plinio auctore nomen accepit à narium tormento. Et inde vigoris significatione Prouerbum id vocabulum usurpauit, veluti torporem excitantis. Quæ vulgarium Plinii codicum lectio cum vix tolerari possit, voce excitantis ad præcedentem gignendi casum non rectè relata, cum potius excitans scilicet significatio, siue prouerbium, legi debere videatur, Cornarius multò emendatius locum hunc legisse videtur, hoc modo. Et inde vigoris significatio prouerbio eius usum usurpauit, veluti torporem excitantis. Est enim reuera prouerbum, *εσθια καρδύλλου*, Ede Nasturtium, quod in socordem, ignauum, & liebetem dicebatur, propterea quod vim Nasturtio inesse credebant animi vigorem excitandi, vt ex Plinio dicemus. *Cresson* fortè dicitur, quia perenni sobole, summis feruoribus, vel etiam Brumæ rigoribus spretis, crescit. Francigenæ etiam *Cresson d'Alenois* ab alendo fortè vocant.

Omnis est teporis, loci, & cæli, teste Palladio, simun non desiderat: humorem, quamuis diligit, tamen deesse non curat. Si cum Lactuca

H h h

Locus

Vires & Tempus.

Seratur, nasci fertur egregie. Semen per quinque annos seruatur.

Nasturtium, inquit Plinius, in Arabia mira amplitudinis dicitur gigni. Idem cum Dioscor. optimum esse dicit Babytonicum. Aristophanes apud Athenum Milesium excellere putat.

Omnium semen Dioscoride autore est acre, excaesfacit, sto macho aduersatur, aluum turbat, tinea excutit, lienem immunit, parrus exanimat, menses cit, venerem stimulat, Sinapis & Erucæ simile intelligitur: lepras & impetigines absterget. Illitum cum melle lienem extenuat, fauos expurgat: pulmonum vitia extrahit, sorbitionibus incoctum: serpentium venenis potum restit, arque eas suffitu fugat: capillorum defluuia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit & rumpit: coxendicibus cum polenta commode ex aceto illinitur: tumores collectionesque discutit: ad suppurationem perducit furunculos, illitum cum muria. Herbae ad omnia eadem effectus, licet minor.

Plinius diffusius Nasturtii vires declarat, & in quibusdam Dioscoride dissentit. Nasturtium, inquit, venerem inhibet, animum exacuit. Aluum purgat, bilem detrahit potum ex aqua decem denarium pondus. Cum lo.mento strumis illitum oportumque Brassicae praclare medetur. Nigrius capitis vitia purgat. Visum compurgat, commotas mentes sedat ex aceto sumptum, lienem: ex vino potum, vel cum fico. Tullum ex melle, si quoridie ieiuni sumant. Semen ex vino omnia intestinorum animalia pellit, efficacius adhibito mēastro. Prodest & contra suspiria, & tullum cum origano, & vino dulci. Pectoris doloribus decoctum in lacte caprino. Panos discutit cum pice, extrahitque corpore aculeos. Et maculas illitum ex aceto. Contra carcinomata adiciunt O. uorum album. Et lienibus illinitur ex aceto. Infantibus verò e melle vtilissimè. Sextius adicit vltum serpentes fugare, Scorpionibus resistere. Capitis dolores contrito, & alopecias emendari addito Sinapi, grauitatem aurium trito imposito auribus cum fico. Dentium dolores infuso in aures succo. Porriginem & vlcera capitis cum adipē asferino. Furunculos concoquit cum fermento. Carbunculos ad suppurationem perducit & rumpit. Phagedenas vlcerum expurgat cum melle. Coxendicibus & lumbis cum polenta ex aceto illinitur: item Licheni: item vnguibus scabris: quippe natura eius caustica est. Siluestri verò ad omnia ea effectus maior. Hæc Plinius.

Dioscorides tradidit Nasturtii semen *αυωνισαν* *περσικου*, id est, Venerem stimulare. Plinius contra Venerem inhibere. Cui assentitur Florentinus in Geoponicis Constantino attribuitur, *αυωνισαν*, inquit, *πρεσβυτηριον* *αυωνισαν* *αυωνισαν* *αυωνισαν*. Et addit *αυωνισαν* *αυωνισαν* *αυωνισαν*. Sed quum hæc tum Dioscoridi, tum experientia repugnent, dicendum aut eos Nasturtii virtutes non rectè intellexisse, aut Codices eo in loco deprauatos esse.

Galenus perspicuè eius vires & facultates explicat. Nasturtii semen, inquit, adurentis seu causticæ facultatis particeps est, velut Napy. Proinde coxendicis & capitis dolores lenat, atque adeò rubrificationem elicit & excaesfacit sicut Napy. Miscetur quoque remediis iis, quæ exhibentur asthmaticis, tanquam scilicet id, quod crassos succos valenter incidere valeat, velut & Napy. Nam per omnia ei simile est. Porro & herba arefacta similem seminum possidet. Humida verò adhuc ac viridis, pro-

pter aqueæ humiditatis mixtionem, multò semine inferior est, adeoque tunc mordacitas eius moderata est, vt cum pane eo vti liceat. Hæc Galenus.

NASTURTIVM VVLGARE.

Racilis est radix paucisque donata fibris: ex qua primulùm enata folia minutis incisuris dissecta, Erucæ minoribus, adulta vel Erucæ modo diuiduntur, vel integra in margine duntaxat serrata crenatæ conspicuntur, sapore acri acerariis expectiæ: caulis singularis in alas nullas diuisus, colore est glaucò, rotundus, pede alior, ac etiam cubitalis: st. sculi albi vel purpurascens quatuor foliolis constat: Semen fuluun, vel, vt ait Dodon. ruffo colore rubens, seruido gustu in filiquis vel valualis paruis rotundiufculis, Thlaspi vulgatissimi, compressis.

Theod. Dorst. cap. de Nasturtio, tantùm de hortensi scribit, Nasturtii licet aquatici iconem



(sub his nominibus habeat: Nasturtium, Cardamum, Nasturtium agreste, Nasturtium aquaticum, Senecion, Fresse/ Garten fresse/ wild fresse/ Bruntfresse. Cauendum igitur imperitioribus ne vires, quas ibi tradit Dorst. Nasturtio aquatico, quod inibi pingit, ascribant. Is præterea diuersarum plantarum nomina confundit.

Simili modo Domus ruff. Car. Stephani & I. Liebault confusè de Nasturtio ait: Fresson de cailler & alenvis & la Berle, amant loca humida & fontium ripas & riuulos, nullam requirunt culturam in hortis præter continuam rigationem & aquam ad radicem: vtrique magna virtus. Quid sit cailler nescimus, videtur tamen intelligere Nasturtium aquaticum: Quid etiam ei Berle dubiū. Nasturtium aquaticum non alitur. Nasturtium hortense non requirit multam aquam & continuam: Vt paucis dicamus Liebaultius nobis videtur non intelligere nominatarum plantarum differentiam & culturam.

Gelner. hort Nasturtium maius album & minus nigrum. Syluestre persimile hortensi puto me in altis quibusdam montibus olim reperisse. Item in append. Nasturtium hortense, foliis valdè diuisis: hoc duplex ni fallor: minus scilicet ac maius, quod ad Ranunculi pratensis folia tum forma, tum magnitudine accedit. Nasturtium alpinum hortensi minori persimile: minus iam altero anno mihi durat & semina protulit.

Nasturtium antequam caulescat, folia habere modicè lara, diuisaque Marantha tradit: ar cum caulē ediderit folia mutare, esse enim tunc oblonga, tenuia, digiti longitudinem æquantia.

Suspicio

Plinius & Constantinus à Dioscor. dissent.

Descriptio

Dorst. Lap. s. s.

Liebaultius

Suspens Maranthæ non notum Nasturtium latifolium, quamobrem considerandum quam Iberidem intelligat de qua agit p.91. quam Diosc. dicit Nasturtii foliis.

C. Bauh. Phyt. Nasturtium n. siue hortense commune: Nasturtium album Plinio. Aliud est foliis simplicibus, quod læue & albus, vel subhirsutum, minus que album: aliud foliis valde diuisis, hoc maius & minus, aliud crispum & non crispum. *Subhirsutum* Nasturtium hætenus non vidimus: Meminit olim Gesnerus Nasturtii subhirsuti, vt videre est ex eius verbis postea positus sub Nasturtio latifolio,

Ruell. Cord. in Dioscorid. Corn. Brunsch. Matth. Lacun. Lonie. Ryff. Amar. Anguill. Euch. Roell. Braunfels. Carol. Steph. Gesner. coll. stirp. Gerard. Dodon. Gall. Lob. Obs. Tabern. Casalp. Apollin. Camer. ad Hist. Matth. Germ. & Epir. *Nasturtium*. Camer. hort. *Nasturtium nostras*. Trago, Fuchs. Dodon. Lat. Hist. Lugd. *Nasturtium hortense*. Lobel. Icon. Plant. *Cardamon, Nasturtium hortense*.

Nomina & Synonyma linguarum, vide antè. Nasturtiū vulgare vidi Montpelii florens Martio, Patavii virens Februario: Genevæ tota hyeme virens. Lugduni semine maturo Iunio, Basilea florens Octobri. Montbelgardi abundat etiam in hortis, vt in Horto E. C. tota hieme viret: vere tamen sceritur ad acetaria quod tenerius multò.

Duo Nasturtia quæ recensimus postea ab hoc vix differre viribus existimamus: facile patiemur etiam nobis persuadere huic ac eis conuenire vires à Diosc. & Galeno attributas, quas antè tradidimus. Vsurpatur passim ad ciborum condimenta & intinctus, & venit quoque per ætatem cum Lactuca atque aliis herbis oleo, aceto, & sale in menis. Attenuat, inquit Matth. in undat, appetit, prouocat, incidit, vrit & resoluit. Nasturtium hortense in cataplasmate resoluit carbunculos, arthritidem, ischiadicam, furunculos, & omnis generis apostemata, potissimum si aquificat fermetum. Succus Nasturtii insillatus auri, curat dolorem dentium à causa frigida. Semen masticatum & recentum in ore vtile ad paralytim lingue: in paralyti aliorum membrorum applicatur cum faculis semina in vino cocta: idem remedium confert, colica Laborantibus. Honestus quidam Mercator bibliopola Lugdunensis ætate consistente cum crudeli dentium dolore cruciaretur, & insomnis esset à triduo, lecto remedio modo scripto: succum Nasturtii calidum curauit in aurem instillandum: inde sentit magnum susurrum, sine dolore obdormiuit, à longo somno excitatus nullum amplius sensit dolorem: licet hoc medicamentum successerit, nolimus tamen temerè cuiquam præscribere, veriti, ne dum pellere vellemus dolorem hunc, alium deteriorem excitaremus, nempe inflammationem aliquam in aurè & potissimum membrane extense supra calcem quæ est in tympano, vereremur etiam attractionem humorum in eas partes sine inflammatione: in causa tamen frigida non improbaremus facculos semine calidos, vel ex ipsa herba, ac etiam masticatoria & collutiones. Belgæ Nasturtio cum pane & butyro mense Maio frequenter vescuntur. Facit ad graue illud malum, quod Scorbutum appellant: nec minor est huius, quam vel Cochlearia, aut Nasturtii aquatici in hoc morbo vis & facultas. Ex alio delapsis aut præcipitatis datum confert: sanguinem coagu-

Tom. II.

latum dissoluit, & ne alicubi in corpore coeat aut coaguletur præcauet: sudorem etiam mouet, vt Recentiorum experientia inuentum ac comprobatur. Cardamomi loco ponit Nasturtium Colleg. Forentinum. Aqua in fine Maii distillata, cum melle permista, lineis pannis in ea immeris variolis imponitur. In quem usum etiam manè ac vesperi cum aqua Fragorum permista bibitur. Eadem quatuor viciis pota discutit tumorem, pollit lumbricos ventris; Vlcera & tumores reprimat, si sæpius inde fricentur.

NASTURTIVM CRISPVM IOH. Bauhini.

Descriptio



Acies reliqua, siue caulium, siue florum alborū seminumque, cū Nasturtio vulgari conuenit: at folia plurimam differētis, miris modis laciniata, & crispis oris fimbriata; sapore & odore vulgatiore Nasturtii.

C. B. Phyt. Nasturtium 12. siue hortense crispū in frarris Io. Bauhini orto col-

Tempus

lectum. Nasturtium crispum primò vidimus in pago Tremou, in orto concionatoris I. Aran, qui dicebat ex Belgio allatum, à quo etiam habuerat Nobilis Vir D. Michael à Franckmont, ex iis hortis attuli plantandum in Hortum Ill. E. C. vbi viret Montbelgardi, semine turgens Augusto, floret, Iunio, se multiplicat semine deciuo.

NASTURTIVM LATIFOLIUM Dioscoridum Io. Bauhini.



Stinapi crassitudinis radicem habet, albam, lignosam, quam plurimas rigidas à lateribus fibras emittentem: caulem erigit crassitudine digitali; cubitalem, starrim à radice in crebros ramos diuisum densè fructiferum: folia infirma per terram sparguntur quinque viciis longa, sel- quinquencia circ-

Descrip.

citer lata: crenata, subinde circa pediculum nonnihil sinuata, & auriculata, quanquam hoc ra;

H h h 2

rius, superiora folia angustiora existunt, aliquando tamen infimis longiora: *flos, siliqua, semen, sapor, odor*, cuiusmodi in Nasturtio vulgari: flos interim suauem odorem spirat, cum nimirum quem Sinapios.

An Gesner. hort. in apped. Nasturtium Hispanicum, & Hist. vbi figura transposita, quæ non multum placet si nostrum Nasturtium latifolium intelligi vt suspicor.

Camer. apud Matth. Germ. folium depictum habet nomine Nasturtii latifolii, qualiter & in hort. vocat.

Tab. nat.

An Iac. Theod. Tabern. Icon. Nasturtium Hispanicum, & Hist. vbi figura transposita, quæ non multum placet si nostrum Nasturtium latifolium intelligi vt suspicor.

C. Bauhin. Phyt. Nasturtium io. hortense latifolium. Nasturtii Dioscoridei nomine à Ioh. Bauhino missum. Fortè hoc Nasturtium Hispanicum nomine Tabern. exprimere voluit: at figura non continet.

Tempus

Nasturtium latifolium simile formâ & gustu vulgari, demptis foliis inferioribus, quæ lata vt in Iberide vera Monspelii proueniète, primò habui Lugduni in orto, deinde Geneuz: postremò introduxi in Hortum Ill. E. C. vbi nunc viret totà hieme foliis latissimis, neminem scio qui descriperit: nec recordor vnde semen habuerim, à triginta annis in hortis colo: hiemem facillè profert.

THLASPI ANGVSTIFOLIVM FVCHSII,
Nasturtium sylvestris Ioh. Bauh.

Descriptio



Nasturtii vulgaris foliis similia, laciniata, multò tamen minora: ab Iberide huic ab simili differunt, vt pote cui folia infima per extremam oram serrata duntaxat aut crenata existunt & latiora: nam superiora, tenuia, angusta, Iberidis panè sunt odore & sapore vehementer acri: *flosculi* minimi albi, visum ferè fugiunt, ad Iberidis flores accedentes: quos nec dum delapsos *siliqua* numerosissima excipiunt ex longiusculis pediculis, parua, rotunda, compressa, & supremo margine filis: quibus dehiscentibus duo *seminula* ruffa oblonga cum valvulis excidunt, relicta membranula alba dissepiente: Dodonæus acris & feruens

semen dicit. In figura Fuchsiانا hic posita desunt folia inferiora.

Brunfels. Bursa pastoris minor, Klein Beschel fraut / Germ. communiter Seckel abschneden dicta, qui ex ea ludicrum faciunt.

Fuchs. Icon. & Hist. Iconem tantum proponit, sine descriptione, titulo, Thlaspi angustifolium.

Trago pingenti Thlaspidii genus, describenti Nasturtii quintum genus.

An Brallau. in exam. pil. aggreg. Iberidis species? Cornar. in Dioscor. Thlaspi alterum genus.

Matthiol. in post. Ital. com. in Dioscor. figuram habet Iberidis nomine, quam suspicor esse hoc Thlaspi angustifolium, quam opinionem confirmat nomen *wilden kress* in Hist. Germ. positum, vbi eadem figura, & præterea descriptio quadrans potius Thlaspi, quam verè Iberidi.

Retinuit idem nomen Germ. & eandem figuram Camer. in Hist. Matthiol. Germ. Iberidis nomine, vt & in eiusdem Epit. quam postea in Epit. malè iterum exhibet pro Lepidio.

Camer. not.

Dodon. Gall. cuius descriptio valdè icinua figuram Fuchsi habet, vocatque Thlaspi, Thlaspi angustifolium, & Thlaspi minus. Lat. in fol. Thlaspi minimum. Foliola inferiora non pingit Dodonæus, nec etiam habet figura nostra, quæ iam facta erat. Non placet quoque cum dicere semen valdè exiguum, non tamen minus quàm superiorum: Thlaspi eius antè dictum latius semina habet rotunda multò maiora, sicuti eius alterum, oblongum etiam maius.

Dod. not.

Osyridis folio Thlaspi minus hortense vulgare acerrimum vocant Adu. Lob. & Pena, & luteum ac album tradunt etiam in Icon. Plant. aîntique: Paulò diligentiores Pharmacopœci & Herbatii Angliæ & Germaniæ minorem speciem Thlaspi vocant & alunt in hortis ad medicum vsum, quia sit feruidioris gustus. Eius cæterò quin tota facies, ramulis multis, floribus, & foliis Thlaspi fatetur, eatenusque differre videtur, quia tota minor & tantoperè sarmentosa, vt scoparum vice sit ad verendum non secus ac Iberis, cuius etiam floribus albidis, crebris, paruis. Eadem in orto Morgani nostri, etiam luteis floribus viscebatur mense Junio. Item Hist. lib. 2. cap. 37. Iberis 2. Item cap. 38. Thlaspi minus Germ. diue 16.

Locus.

Apud Tabern. tam in Icon. quam in Hist. sunt duæ icones vnius plantæ: vna Iberidis nomine, altera Thlaspi minoris Germanici titulo. Nulla autem perfecta, nec descriptio alienius momenti: cur etiam Iberidem Germanicè *groß Beschelkraut* vocet, nulla est ratio.

Tab. nat.

C. Bauhin. Phyt. Thlaspi 29. sine Osyridis folio. Bursa pastoris minor Brunfelsi. Minus hortense vulgare Lobelio pag. 214. luteum est & album. Icon Lobel. apud Plant. videtur representare Thlaspi Fuchsi de quo hic agimus: verum non intelligimus cur Lobelius dicat Osyridis folio, flore etiam luteo non vidimus.

Schv. Thlaspi minus Osyridis folio, Lobel. Thlaspi Osyridis folio acerrimum & album, Clus. Alyssum minimum, Thlaspi minus Germ. Streinfrant / wegfresse / Klein Beschelkraut. Nihil videtur Schvvenckf. eam plantam intelligere, quam nos hoc capite tradimus: verum non cõuenit cum Alyssò minimo Clusi, diuersa admodum planta figurâ & temperamento, subacidum habere saporem dicit Clusius: dabitarum an bene notum ei fuerit nostrum Nasturtium sylvestre Thlaspi angustifolium Fuchsi, quod Nasturtium

Nasturtium

Aurtium silu. voco, Brunfels. Bursam pastoris
minorem, Flein Wesselsfraut / Germ. communi-
ter Seckel abschnieden Fuchf. Trag. Wessm
fraut Dodon.

Basilica copiosum obseruauit cum siliquis mense
Octobri & Nouembri ad hortuum Nosodochii
& versus papyracea molendina, ad fontem pro-
pe textorum panni fossas, & aliis locis, mense
Iunio florentem & siliquas habentem. Genex
versus Nosodochium & S. Geruasium, folia pri-
ma omnino vlgare Nasturtium imitantur, su-
periora ad Iberidem accedunt: florebat & cap-
sulas proferebat Maio. Et in Butcken ad mu-
ros spontaneum: A me Vere satum in Horto III.
E.C. floruit Augusto eodem anno: Inueni pro-
pe Bessfordiam cum flosculis & semine maturo
Septembri, Sturgardie sponte iuxta muros III.
E.C. horti borens ex valulis Maio mense. In
Alfatia in hospicio prope Bercken semine maturo
Iulio.

Non placet Brunfelsium huic plantæ easdem
tribuere vires quas Bursæ pastoris vulgari, huic
enim plantæ sapor insigniter acris. Caleface-
re & siccare quarto gradu (men, scribit Schvv.
& causticæ facultatis, esse, & ad calculum laudari.

IBERIS ET LEPIDIUM.

Veteribus & in genere.

CAP. II.

Quoniam in dubium magna verborum
contentione reuocatur, an Iberis & Lepidium
Veteribus sit vna eademque herba, idcirco hac de
re vno capite ambas hæc plantas complecten-
tibus problematicè agere libuit. Ac primùm
quidem, eorum opinionem, qui à nobis recedunt
& affirmatiuum tenent, adducere visum
fuit.

Herbam igitur, inquit, quæ à Græcis Iberis
dicitur, Paulus Lepidium, & ἀρχιγενήδιον, id est,
siluestre Nasturtium appellari scripsit. Aëtius
Cardamine, quia odorem, saporem, & figuram
Cardami, hoc est, Nasturtii habet, & Galenus
odore & viribus Cardamo simile Lepidium esse
dicit. Quare in Dioscoride ἰβερικὴ ἴστος καρδωμοει-
κὴ pro καρδωμοεικὴ falsò legi Cornarius existimat.
Galenus etiam Lepidium eandem esse herbam
cum Iberide, declarat his verbis. Damocratis
extat libellus Clinicus inscriptus, in quo versibus
Iambicis de tribus differit medicamentis.
Ac primò quidem eo, quod ex herba, quam ipse
Iberidem appellat, constat. Mox subiungit Gale-
nus. In Iberide medicum quendam amicum
suum hac herba curatum esse, quam ipse Damo-
crates Iberidem appellat, vt qui ipso visu her-
bam cognorit, nomen autem eius nullum audie-
rit, quin etiam id ipsum ignorari is, qui eum vi-
sum eius docuit. Verùm ex signis quæ scribit,
videtur Iberidem appellare, quæ à Græcis Lepi-
dium appellatur, à regione in qua amicus eius
curatus est, appellatione ducta. Damocratis
autem versus Iambici quibus eius effigiem de-
pinxit, hic Galenus subiicit.

Herba hæc ubique multaque frequens nascitur,
Monumenta iuxta antiqua, muros & veteres,
Tritasque quondam publicè pedibus vias,
Quas iuxta ararum duxit haud quis agricola.
Semper virescens, foliis Nasturtii,

Florentibus vere, attamen maioribus:
Caulum cubitalis longitudinis gerit,
Paulò minorem, aut rursus ampliorem, ab hoc
Aestate pendunt folia, donec multa hyems
Sarmenticiam deducat hæc ad imaginem, &
Dreicta & exsiccata deperant gelu.
Adnata radici eamenes ceteris alia.
Aestate florem fert colore lacteo
Multum, tenuem, variumque valde, cauliculis.
Ad quem sequitur semen penitus sic exiguum,
Visum ferè ut fallens, oculus quoque effugiat.
Odorem habet radice inde acerrimum,
Vero similem quàm maximè Nasturtio.

Addit rursus his Galenus. De hac Iberide etiam
Archigenes scribit, Lepidium ipsam appel-
lans. Dicit autem & splenicis, & ischiadi-
cis ipsam conuenire. Ad ischiades & perfrige-
rationes Hygieni Hipparchi authoritate
Herbam Iberidem quam aliqui Lepidium vo-
cant aut Agriocardamum (Nasturtium syluestre)
colligito &c. Cum igitur Iberis & Lepidium ead-
em sit herba, perspicuum est Iberidis caput cal-
ci primi libri Diosc. à nimis curiosis Librariis
vel Medicis, non à Dioscoride adiectum fuisse,
cùm is Iberidi locus non rectè assignetur, sed li-
bro secundo, in quo cum permittis plantis quæ
acri facultate prædite sunt, de Lepidio tractat.
Neque enim duobus locis de eadem herba dice-
re potuit Dioscorides. Adhæc in eius descri-
ptione corruptus est locus, ἰβερικὴ δὲ ἴστος καρδωμοει-
κὴ ἢ ἰβερικὴ, id est, caulem cubitalem aut minorem:
Deest enim vox καρδωμοεικὴ, vt sic legitur ἰβερικὴ
δὲ καρδωμοεικὴ καρδωμοεικὴ ἢ ἰβερικὴ, id est, caulem
longitudine cubitalem, maiorem aut minorem,
sic enim Damocrates habet. Sic & Aëtius
versum Damocratis, sed lege carminis soluta
recitans, & Archigenes in Epistola ad Aristonem
referente Aëtio, in qua iisdem planè verbis
Iberidem describit, vt vel ex Dioscoride extrip-
tisse videatur, vel ex ipso Archigene ad finem li-
bri primi Dioscoridis caput de Iberide aliquis
attexerit. Vidimus (ait etiam Matthiolus) pri-
mùm Iberidem extra ciuitatem Tridenti, vbi
vulgò dicitur alle Leste, effigie minurum, qua des-
bitur à Diosc. ac aliis pluribus Græcis autoribus.
Huius Gal. in simpl. censu nusquam separatim
meminit, sed hanc & Lepidium non nisi nomi-
ne differre prodidit. Quod idem etiam ex Damo-
crate & Hygieni Hipparchi auctoritate lib. 9.
de comp. med. secund. locos, circa finem, vbi de
coxendidi curatione agit, testatur his verbis: Si
coxendicum dolores leuare est animus, herbam
Iberidem quam aliqui Lepidium vocant, aut Na-
sturtium siluest. colligito: Ex eius certè sen-
tentia asserere non dubitauerim. Iberidem apud
Græcos eandem esse cum Lepidio Vnde perspi-
cuum est, hoc Iberis caput huiusce primi vo-
luminis calci accreuisse nimia vel librariorum,
vel medicorum curiositate. In quam sententiam
cum antedictis causis, ea ratio me potissimum
deducit, quòd constat, huius primi voluminis
calcem, non esse legitimum locum, in quo Iberi-
dis historia fuerit collocanda: quandoquidem
eiusmodi herbas Dioscorides lib. 2. ordinatè dis-
posuit, ac de eis differuit, vbi priuatim Lepidio,
quod Damocrati Iberidem existimamus, pro-
priam assignauit sedè. Quare aperte hallucinari
deprehenduntur Monachi illi venerandi, qui in
Mef. comm. scribere, cùm expresse contra Gale-
H h h h 3

leni & Pauli auctoritatem, & contra rationes, quas superius adduximus, aliud à Lepidio Iberidem esse contendant. Manifestè etiam aberrarunt Barbarus & Ruellius, cum Lepidium illud esse putauerunt, quod vulgus Herbariorum Raphanum rusticarum appellat.

Er hac illi qui affirmatum tenent: Sed antequam negatiuum, quam amplectimur, & veriorè adducamus, paucis de his duabus plantis Veterum placita examinemus. Iberis igitur, siue Cardamine Dioscoridis (Cardamantica aliis,) folia habet Nasturtii, Vere virentiora. Caulis longitudo cubitalis est, plus minus: locis incultis nascitur. Aestate porò lacteum florem promittit, ac tum quoque efficacior est. Radices binas habet Nasturtio similes. Lepidium verò, quod aliqui Gingidium vocant, herba nota est, quam muria cum lacte conditur: folia habet non tam mollia & candida vt Draba. *Plinius* de Iberide hæc habet. Inuenit nuper, & Seru. Democra- tes è primis medicentum, quam appellauit Iberidem: quanquam ficto nomine inuentioni eius assignato carmine. Nascitur circa vetera maxime monumenta, parietinâque & inculta itin- erum. Floret semper folio Nasturtii, caule cubi- tali, semine tam paruo, vt vix aspicì possit. Ra- dici odor Nasturtii. De Lepidio ait. Peregrin- num fuit Lepidium. Scritur à Fauonio. Deinde

Barbari
& Ruell.
lapsus.

Iberis.
Locus
Vfus

Lepidium.
Cultura.

Laurina
folia

quam fraticauerit, iuxta terram præciditur. Tunc runcatur stercoreatq;. Per biennium hæc. Postea in eadem fruticibus vtuntur, si non seuitia hyemis ingruat, quâdo impatientissimum est frigo- rum. Exit & in cubitalem altitudinem, foliis laurinis, sed mollibus. *Apud Galenum* in curatio- ne doloris Ischiadici legitur supra posita elegân- ter descriptio ex Democrate carmine conscripta in hanc sententiam. Iberis dicta à regione, in qua sanatus Medicus, herba frequens vbique iuxta muros & vetera monumenta, ac vias, semper vi- rescens: sed vere foliis Nasturtii minoribus: cau- lis cubitalis, paulò maior, vel minor: à quo æ- state pendunt folia vsque ad multam hyemem, donec gelu pereant: flos aestate lacteus: semen exiguum, vt vix cerni possit: radix odore acerrimo, vt Nasturtium.

Recentis ita Veterum placitis, Lepidium idè esse, cum Iberide non concesserimus Comario & aliis: Ex Plinio enim Dioscoridis fortè coarctato apparet magnum discrimen. Iberis inculta, Lepidium verò peregrinum colitur: Iberidi fo- lium Nasturtii, Lepidio folia Laurina: Iberidis radix tunditur disicte Plinio, Lepidio condi- tur Dioscor. Et quamuis dicat Galenus Iberi- dem Lepidium etiam vocari, non sequitur pro- pterea esse vnam & eandem plantam, nec legi- mus quenquam ex Veteribus id asseruisse. Idem nobis euenire videtur in Iberide quod in Cri- santhemo, quod deinde vocatur Buphthalmum, nomine alterius plantæ dictæ Buphthalmum. Cut remouendum sit vnum caput ex Dioscor. vt vult Cornarius, non video, nisi remoueat etiam ex Plinio & Paulo: Quam plantam intelligat per multos inuestigandum: Si Iberis eadem cum Lepidio Dioscor. vt vult Matthiolus: Dra- ba quam pingit Matthiol. non potest esse Draba, vt bene annotauit Anguillara & Guiland. cum dicat Dioscor. *δραβα ὁμοίη λεπτύριον, ἀπὸ δόρυς αὐτῆς ἐκ λευκόπτεα*, Maluimus igitur existimare Lepidium Pauli, Plinii, & Dioscoridis & Galeni idem esse.

Iberidem autem apud Diosc. Plinium, & ex Democrate Gal. & Paulum & alios, eandem plantam, que dicatur etiam Lepidium, diuersam à Lepidio modo dicto. *Patet Galenus* Iberidem eandem cum Lepidio esse, ait Cesalpinius, quod & Agri- ocardamon [siluestre Nasturtium] appellatum est, sed apud Dioscor. diuersa eorum mentio re- peritur. Lepidium fortè appellatur, quia Lepi- das (squamas leproforum) auferat. Patet autem ex Dioscor. Lepidium diuersum esse ab ea quam Iberidem vocauit: nam Iberidi vires in radici- bus: Lepidio in foliis: huius præterea vus in cibis: Iberidis nequaquam. *Err. r* autem putat eandem esse fluxit ex communitate nomi- nis, & virtum. Paulus Aegineta rem aperuit in- quiens. Ischiadicos in totum restituit sanitati Iberidis herba vus, quam Lepidium quoque, alii Nasturtium appellant. *Quis* verò apud nos fruticosa nascitur: foliis Lauri similibus, & mul- to amplioribus respondere, multa experimenta testantur, non solum in coxarum, sed in aliis quo- que diuturnis affectibus, & que sequuntur. Co- lumella Lepidii duo genera facit, syluestre, & fa- tium, fortè Iberidem pro syluestri accipiens. Solum anam dubitandi præbet, quod Dioscori- des Lepidium herbulam dixit esse, quod Iberidi magis quam Lepidio conuenit. *Sed* tamen Dio- scoridis Lepidium idem esse cum Plinii & Pauli Lepidio, ac longè differre ab Iberide colligi potest ex Draba, cuius folia Lepidio comparantur à Dioscoride. *Iberida* qui cum Lepidio eandem esse existimant, caputque de Iberide tanquam superuacaneum à Dioscor. volumine refecandū esse asseuerant: non ita fortasse licenter (autore Marantha) hoc pronuntiasent, si que cap. de Draba habentur, animaduertissent. Hanc enim vult Dioscorides folia habere Lepidii, sed molliora & candidiora, sed nulla est conuenientia in foliis inter Iberidem & Draba: vni enim lata sunt, illi satis angusta, & Nasturtii more inci- sa: si veram Drabam existimemus [vt certè vera est] plantam illam que ab omnibus ipsa existi- matur, & ab Andrea Matthiol. perbellè depin- gitur. In Iberide folia in prima geminatione eorum videtur descripsisse Dioscor. cum Nastur- tii foliis similia esse dicit: nam postquam caulè ædidit, nullam cum Nasturtio retinere similitu- dinem videntur: ita vt hæc solum ob causam multis diu incognita fuerit, & [vt verum fatear] mihi etiam non propter id solum incomper- ta diutius fuit, sed etiam quòd folio in eadem æta- te variare ita solet, vt vna eiusdem speciei plura alteri dissimilis penitus videatur. Scribit Diosc. Iberida duas radices habere, sed pluribus inueniri, non solum à nobis obseruatum est, sed à Da- mocrate scriptum, cum inquit:

ἀνάτα ἡ ραδίς τὰ μὲν κερνὸς ἄλλα.

Et hæc passim Marantha, qui quam plantam per Iberidem, cum ait: nam postquam caulem edidit &c. intelligat, mihi nondum constat. Lepidium Serapioni Setragi, ex Dioscor. herbula est vulgò nota, Damocrati Iberis appellata, ex Gal. vt e- tiam ab Archigene, in Epist. ad Aristonem, & Aëtio. *Quis* verò sola rominis appellatione disicte credantur Lepidium & Iberis, idè vel Librariorum, vel Medicorum curiositate, quod in fine primi voluminis legitur, Dioscoridi ac- creuisse putauerit Ruell. Manard. Marcell. ac Matthiolus. *Cardanus* tamen 3. contradicentiū ita arguit: Lepidium tanquam Iberida descri- bit Galenus, ergo &c. quale autem sit argumen- tum,

Iberis.
Lepidium
diuersum

Draba

Lepidium
Setragi
Iberis.
Iberis
caput apud
Diosc.

eum, nullâ liuoris lentigine, suis diiudicandum
scholasticis relinquitur Apollo.

Quam autem Lepidium ex Dioscoride herbu-
la sit, Iberis autem cubitalis (siquidem veritati
magis, quam autoritatibus credendum sit) nec
possunt, nec debent, Autores probi & eruditi
Apollinis opinionem non candidè amplecti, vi-
delicet Lepidium, ab Iberide diuersum ex Aë-
tio, olus esse in Syria folia habens Seridis angu-
stifoliz. Nullâ propterea sulciuntur ratione,
quâ Iberidis caput imprudenter arborum a-
ceruo Dioscoridi irrephisse tueri credunt, & quod
dissônâ in sitione eum his societatem, conforti-
umque inierit, propterea vel expungendum,
aut quo dissilierat restituendum. Quod verò
Galenus, atque Aegineta, priuatum huic Iberidi
caput aliquod nō dicarint à Lepidio separatam,
sciendum, quod Galenus Dioscoridi in simpli-
eibus vbique non responderet.

Eit autem ab hoc Lepidium Plinii dissimile,
in cubitalem exiens altitudinem, foliis Laurinis,
non autem Nasturtii.

Plantæ, quæ ἰβερὴ, καὶ ἀναρτίον, ἢ ἀργεῖον, ἢ ἀ-
ραγὶ Græcis dicitur; nomen Latinum est Iberis,
& Lepidium: Arab. Siet aragi, Afic aragi, seu
Sitharegi, & Hausab: Ital. Iberide, & Lepidio: Germ.
wilder Fress: Hispan. Nasturtio montesino, Gallic.
Chasse rage, passe rage: & Nasturtium sauvage.

De viribus Iberidis & Lepidii dicamus. Radi-
ces Iberidis binas Nasturtio odore similes, ca-
lesfaciendi & adurendi vi præditas, sed æstate
eum caulibus lacteum florem promat, efficaciores
esse, prodit Dioscorides. Et hinc Ischiadicis vi-
tiles, si cum axungia suilla fassa emplastri modo,
quaternis horis impolitæ fuerint: deinde verò
in balneum descendant, ac postea oleo ac vi-
no cum lana locum affectum perungant. Idem hoc
auxilium de Iberis radice præscripsit Damocra-
tes hoc lambo.

Hanc erutam larga satis cape copia
Aestare, nam tunc optima & fortissima est
Adhuc recens: siccata sit, sed debilior.
Tusam hinc probè (nam difficulter tunditur)
Pauca subaltemque excipies axungia.
Orurique toris, & maxime coxendici
Adhibebis, & ligabis, & sines duas
horas mulieribus, viris sed quatuor.
In balneo inductos, nec ollo ex vnguine
Nec smegmate ullo pinguiore collines.
Sudore sed modico exiliente, in solium
Merges, iubens perferre: nam mordacitas
Ingen, caloris sensus atque exoritur.
Verum hinc rigatos leniter perducito.
Ulati enim quamuis manibus sint plurimum,
Exibit at amen pedibus suis valens,
Quicumque consilium hoc bonum susceperit.
Ad multum oleum miscebis hinc vinum modi-
cum,
Et concuties, & illines locos eo,
Ac mox madore terso & pinguedine
Totum teges crus mollibus ru uelleribus.

Hos versus aperte declarat Plinius his verbis:
Radix Iberidis odor Nasturtii. Vfus ætate effica-
rior, & recenti tantum. Tunditur difficulter: co-
xendicibus, & articularis omnibus cum axungia
vtilissima, viris plurimum quaternis horis, scæmi-
nis minus dimidio adalligata, vt deinde in bal-
neis descendatur in calidam, & postea oleo ac vi-
no coctus perungatur: diebusque vicinis inter-

positis idem fiat, si qua admonitio doloris super-
sit. Hoc modo rheumatismos omnes sanat occul-
tos. Imponitur non in ipsa inflammatione, sed
inminuta.

Galenus eadem ex Damocrate refert. Radix
Iberidis, inquit, odore acerrimo est, vt Nastur-
tium, hæc intusa in magna copia (difficulter au-
tem tunditur, æstate & recens, nam tunc strissis-
sima) cum modica axungia adhibetur toti cruri &
maximè coxendici, sinitur per quatuor horas in
viris, minus in mulieribus, deinde auferatur, &
crus in balneo ponitur, post inungendum ex
oleo & vino, ac deinum terfa pinguedine, & su-
dore, tegendum mollilana, vt æger ambulet, &
suis pedibus obeat munia: si opus fuerit, tepe-
tendum post dies viginti.

Hoc sanè vtendi modo, & inueteratos capitis
dolores, & alias omnes quacunque corporis
parte inueteratas & ægè solubiles affectiones
ac resolutiones se curasse Damocrates, & omni-
nò vitia in quibus aliud remedio ex Thapsia vtun-
tur se hac herba pertransisse ait. Idem omninò ad
Ischiadas remedium Aëcius bis habet. Lepi-
dium, inquit idem Galenus, ex quarto est ordine
excalesfacientium, simile Nasturtio, tum odore,
tum gustu, tum viribus: sed minus eo desiccatur.
Cæterum apud Dioscoridem legit Cornarius,
καὶ ἰβερὴ καὶ ἀναρτίον, ἢ ἰβερὴ ἀναρτίον, & postea o-
leo cum lana locus perungatur, pro ἰβερὴ καὶ ἀναρτίον
ὄνο πῆς τῶπιος ἀναρτίον, hoc est oleum cum vi-
no locis illinatur: sic enim habent Damocrates
& Plinius, vt ex superioribus intelligitur. Sic &
Aëcius: ἰβερὴν δὲ ἰσχυρὰ κατὰ πᾶσι ἀνθρώποις, ἢ
μακροχρόνους, αὐτῶν τὸ ἰσχυρὸν ἐπιού καθύπερθε. Egressus
autem vino & oleo multo perfusus ac detersus,
coxendicem lanis puris tege. Et alio in loco.
A balneo ad oleum multum paucum admodum
vinum admisceto, & illinito.

Iberidem potè à Lepidio diuersam esse plan-
tam, vel vsus ambarum clarè demonstrat. Au-
ctores enim locis iam adductis Iberidis radices
solum præscribunt, ceu folia Lepidii duntaxat.
Vis foliorum acris & excalescens, inquit Dios-
corides, quapropter trita ischiadicis præsentissi-
mum est auxilium, si cum Helenii radice, quarta
parte horæ illinatur: lienosis simili modo pre-
dest: lepras eximit. Radix appensa collo, do-
lore dentium liberare existimatur. In quibus
verba illa, si quarta parte horæ illinatur, quæ
Græcè leguntur ἀνθρώπων αὐτῶν ἰσχυρὸν ὄνο, mēdo
nō carere suspicatur Cornarius. Cum enim ceteri
omnes Auctores, vt diximus, emplastrum ex Le-
pidio impostum, quatuor horas linendum præ-
scribant, credibile non est rectè hic legi, vt quar-
tam horæ partem imponatur: neque enim tam bre-
ui tempore vires suas exerere potest: & fieri po-
tuit, vt τῆσδε pro τῶσδε sit suppositum, quod
facile euenire potuit, si quaternarii numeri nota
δ, interpreti fuit exprimenda.

Potè reliquum Lepidii in medicina vsum, &
ex eius radice amuletum, Plinius aliter quam
Dioscorides refert his verbis, Vfus eius non sine
lacte. Lepidium inter vrentia intelligitur. Sic
& in facie cutem emendat exulcerando, vt tamen
cera & rosaceo facile sanetur. Sic & lepras & pfo-
ras tollit semper facile, & cicatricum vlcera. Tra-
dunt in dolore dentium adalligatam bra-
chio quæ doleat, competere
dolorum.

IBERIS.
CAP. III.

Descriptio Statim è radice alba, lignosa, mediocriter crassa, paucis fibris donata, crebros profert caules dodrantales & altiores, duros, frequentibus alis concavos: *folia* quidem prima longis pediculis appensa, semunciam lata, duas tresve uncias longa, per extremum serrata: superiora verò & que in caulibus tamisque, Linariæ foliis paria, angusta, acuta, nullo pediculo donata, nec crenà vllà incisa: sapor omnibus feruidus Nasturtii: *florès* extremis ramulis coaceruati hærent, candidi, Nasturtii floribus similes: *semen* continetur minimum in paruis thecis oblongis, quarum valuulas dissepit membranula.

Quam Fuchf. & ex eo Amatus, hoc titulo exhibet, non simpliciter Iberis, vt præfens, sed Iberis Fuchfii à nobis cognominatur. Hæc Matthiol. in Dioscor. neglecta descriptione picturâ exprimit priorè, Iberidis nomine: posteriore Lepidii Dioscoridis, ac Diosc. & Galeni Iberidem dicit, vt & Lepidium. Lacun. figurâ Matthiol. Iberidis nomine retinet. Idem

Matthiol.
Iberis.

in post. com. Ital. & Lat. cum magn. fig. eadem scribit. Figuram tamen aliam habet, quæ fortè non Iberidis: sed Nasturtii nostri syluetris siue Thlaspi tenuifolii Fuchfii. Plantæ illius iconem esse magis adhuc indicat Histor. Germanic. eius, vbi descriptio videtur esse Thlaspi tenuifolii & non Iberidis, præstitisset Matthiolus retinuisse figuram priorè licet non exactam.

Gelner. Iberis (sic scribendum siue aspiratione) à Matthiolo depicta.

Dodon.

Dodon. Gall. figuram Iberidis titulo exhibet non adeo commodam, potissimum quod inferiora folia concernit: quare meritò Lat. in fol. meliorem paulò restituit. Ait autem Galeno *iberis* à Plinio lat. Hiberin, Nasturtium silu. & similiter etiam Lepidium vocari. Existimari etiam herbam esse Græcâ dictam, de qua Apul. cuius ad Iſchiadicis vias quoque commendetur.

Ortus
ant.

Aduers. Lepidium herbula Dioscoridis, Damocratis & Galeni. Iberis Cardamantice Nasturticifolia: quæ irrepsit alienissimo loco Dioscoridis codici lib. 1. cap. vltimo. Paulus li. cap. de coxendice eam Iberidem, Lepidium, vel Nasturtium agreste nuncupari scribit. Lobel. Obs. Iberis Cardamantica: Gal. *creff. n. saunage* & *Passerage saunage*: Anglis *Sciatica* / *fresse* & *weide fresse*. Germ. *weider fress*. Hisp. *Nasturco saluage*. Italis *Nastur saluatico*. Icon. Pl. Iberis Cardamantica, Lepidium, Iberis Plinii.

Histor. Lugd. pingenti, Iberis siue Lepidium Matthioli, quod in contextu, doctissimorum, vt

ait, Herbariorum iudicio, Iberin veterum Græcorum, siue Lepidium esse dicit, *Nasturtio saluatico* Italarum: *Passerage saunage*, & *Creffon saunage* Gallorum.

Iberidis nomine pingit Camer. in Hist. Matth. Germ. & Egit. Thlaspi angustifolium Fuchfii, siue Nasturtium siluetre nostrum.

Taber. Icon. & Hist. Iberis i. cuius figura mala. C. Bauh. Phyt. Iberis.

Iuxta veteres muros & inculta iterum in Italia alibique pronenit: apud Belgas non nisi hortensis est. Ab Herbariis colitur in hortis. In Italia tamen & Gallia Narbonensibus locis incultis spontè nascitur, Hist. Lugd. Iberidem obseruavi secus vias in muris & marginibus agrorum Montpelii: Arelatæ & Florentiæ in Autumno floret & semen fert, toto anno durat. Lugduni spontè proueniens abundat, vitens adhuc & florens mense Septembris & Octobri. Tiguri in horto Gelneri satam vidi. Heidelbergæ mihi attulit Petrus Turnerus Anglus Medicus: ibidem etiam spontaneam obseruavi: Patavii passim circa mœnia virentem adhuc Decembri obseruavi.

Tab. mor.
Locus

Tempus

NASTVRTIOLVM ALPINVM CAPS.
Nasturtii vulgaris Joh. Bauhin.

Vncias altum est mihi dictum Nasturtium, radice lignosa, paucis fibris donata: *Colliculi* duo aut tres, per quarum summa capsula Nasturtii vulgaris, non dissimili ordine positæ: *folia* parua, simplicia, crassa, angusta, vnciâ, quantum animaduerti, bre-

Descriptio

uiora: *stipuli* parui, albi, vt existimo.

C. Bauh. Phyt. Nasturtium 9. siue alpinum minimum, capsula Nasturtii hortensis, quod habet Joh. Bauhinus.

Nasturtium mihi dictum inueni in Rhætiæ monte *Nombr*, propè Balneæ *muribus*: astate floreat & siliquas habebat. Ex herba sicca descriptum.

NASTVRTIOLVM ALPINVM
tenuissimè diuisum.

Nasturtium tenuissimè diuisum, aliàs trium vnciarum plantula, aliàs ferè dodrantalis (Clus. vncialis, *siliqua* habet minutissima, terna, quina, septena ad costam annexa [Clusio vitidia, gustu acri & feruido,] sic vt tota interim ala semuncia interdum non sit longior, aliàs vncias duas excedat, sapore feruido Nasturtii: *colliculos* habet plures, nonnunquam vnicum: in cuius fastigio *florès* multi sunt coaceruati, candidi pro planta

Descriptio

plantæ proportione magni, è quatuor rolibus pastorice minima: radix alba, crassiuscula, longa, fibris longis donata.

Clus. Pann. & Hist. post. Cardamine; sive alpina minima, quæ Gesnerus n. fallitur in Epistolis Nasturtium appellat. Hist. Gen. plant. p. 180. Thidipi mon-



tanum minimum Dalech.

C. Bauh. Phyt. Nasturtium, sive alpinum minimum primum.

Tabern. Icon. Cardamine alpina Alp. Caus. flum.

In ipsi scopatis summi iugi Schneberg, dum per niuem glaciali duritie constrictam ferreis vncis ad pedes alligatis Clus. delaberetur inuenit mense Augusto florentem, vbi nives iam primò dissolui incipiebant. Inuenitur autem & in Titolensibus atque Saliuburgensibus montibus teste D. Ioach. Camer. Ex Gesneri epistolis apparet etiam in Helueticis alpiibus nasci.

CORONOPVS RVELLI, SIVE Nasturtium verrucosum.

TERRÆ ap- primiti caules, nunquam surgentes, spithameos, ramosos, rigidulos; per quos folia laciniata, cæsura foliorum Nasturtii, nec ita dissimili aut odore aut sapore: *strobili* secundum caules minuti, albi; *seminum* loculi scabri, inæquales, lapulas imitati, quasi eelini parui muricari, quorum singulis *granum* vnicum nigrum gergato vitigineo ferè par: *radix* longiuscula, satis crassa.



ri, quorum singulis granum vnicum nigrum gergato vitigineo ferè par: radix longiuscula, satis crassa.

Math. in post. com. It. & Lat. cum mag. fig. asserit, Ambrosia (hanc non describit, quam non ritè vifam) à Cortuso missa genuinam aded referre, vt nihil in ea desiderari possit: ast decipitur. Cum esset Bononiæ D. Vlyses Aldroand. denominabat Holoostium Dioscoridis, Herbam Cænoram, eiusdem etiam opinionis erat Robertus Constantinus.

Camer. in Math. Germ. Ambrosia, falsò dicta

wartzenfress. Ambrosia à Matthiolo in com. Lat. picta, quæ à Cortuso missa, non potest bene agnosci ex figura: pro Ambrosia prima Matthioli missa est ex Italia planta quæ nihil aliud est, quàm Nasturtii syluest. genus: fieri potest Marthiolium suam ex hac planta adulta & seminibus abundante curasse depingendam. Eidem Epit. Ambrosia: hort. Coronopus repens Ruellii: Cornu ceruinum vulgè dicta herbula, quænam apud Veteres haberetur non audeo asserere, nisi forsitan, Pes sit miluinus, cuius Columella meminit, cuius sententia & Dalech. est, ita enim nobis presentibus vocauit. *Nasturtium autem nostrum verrucosum*, de quo Ruellius hoc loco agit non posse esse Coronopum Veterum sic probamus: Primum videntur non posse dici folia oblonga, cum sint multum dissecta & similia Nasturtio. Secundò non audiui eius usum esse in oleribus [quamuis fortè posset esse cum sit herba mollis.] Tertio non adtingit huius radix, sed est odoris & saporis Nasturtii. Quarto nihil habet simile cum Phyllo. Quintò folia non sunt similia Holoostio [si verum est Holoostium quod exhibet Ruellius] nec gramini. Sextò nihil simile habet cum spinis. Septimò longa melius possunt dici folia Cornu Cerui quam Nasturtii verrucosum, longa autem esse dicit Dioscor. cap. de Cænorante.

Lobel. & Pena Adn. Coronopus Ruellii, multò melius Coronopi species habita; quàm illa Serpentaria Matthioli. Item Cornu cerui alterum vulgi, Coronopus repens Ruellii, echinato seminum inuolucro, de quo dubitant an Coronopus Theophrasti? Sed iam clarum quod respondendum Lob. Obfurganti, Coronopus repens, an Pes miluinus Columella Ruellio: Ic. Pl. Coronopus repens Ruellii, & Cornu cerui alterum vulgi. Et postea Obs. & Icon. Pl. Ambrosia spontanea stugosior. *ut est diuersa faciat* Lob. nos tamen cum C. Bauh. vnam esse censemus. Quamuis & ipse in Phyt. duobus diuersis in locis eandem proponit; nunc enim Coronopum; siliu. repentem Nasturtii folio vocat: nunc Ambrosiam i. siluestre. *Præterea* non video cur Ruellii Coronopus, quæ ad Nasturtium accedit melius habenda sit Coronopi species, quàm Serpentina, vt vult Lobelius, quàm quæto similitudinem cum Coronopo maiorem habet quàm Serpentina. *Is demum* assumit figuram Matthioli, & titulum ei facit Ambrosia, quæ in re inter nos non continet: est enim nobis illa Icon Coronopi Ruellii.

Secundam speciem Pedis coruini fecit Dodon. Gall. asseritque proximè accedere descriptioni Coronopi Dioscoridis, quamuis Ruell. non possit induci, vt credat verum Coronopum: Et quia pulchre hanc plantam descripsit Ruellius, nominauit Coronopum Ruellii, Belg. Crayen Voer aut Raen Voer, Gall. *Pied de Cornu de Ruell.* Hanc suam opinionem tanquam errorem retractat in Hist. Lat. his verbis: Cornu cerui alterum repens: Ruellius qui hanc ante nos lib. 2. cap. 64. & cap. 134. descripsit, Cornu cerui quoque appellari ait, & Pedem Miluinum Columella esse suspicatur: ad Coronopi descriptionem aliquo modo accedere videretur, nisi quem Codex Cæsareus exhibet differens multum ab hoc Cornu ceruino esset, ac manifestè ostenderet legitimum Coronopum hæctenus fuisse incognitum. Quam ob causam Coronopus dici non debet, sed Cornu cerui alterum ac repens nomi-

Lob. l. 1. p. 177.

mandum: posset verò & Pseudocoronopus dici, si modo hæc appellatio retinenda.

Hist. Lugd. vnius plantæ tres figuras habet. Primam titulo, Ambrosiæ primæ Marthioli: alteram Coronopi Ruellii ex Dodonæo: tertiam Coronopi reptantis Lobel.

Tabern. Coronopus repens, Coronopus aruësis, Friedländer / Fränsen / seldt hürhorn / Ader hürhorn. Posteriora hæc Tab. nomina Germanica non placent.

Locus & tempus.

Montbelgardi spontè copiosè prouenit circa vrbem, vti etiam in Horto sil.E.C. semine decido quotannis se renouat: vidi in Allacia in Castello Eisenheim spontè, vbi Floret Iunio & Iulio, audio copiosè prouenire inter Basileam & Argentinam, & Basileæ in horro D. Dis Felicis Plateri. Lugduni habui in horro. Horbugin Il. E.C. in Allacia arce obseruauit. Geneuæ copiosè.

NASTVRTIVM SYLV. VALENTINUM Clusio.

Descriptio

Vnico hæc planta assurgit caule, sed statim à radice, supra solum, multis alis diuisis, hituto & aspeto, virente, rotundo, pedalis longitudinis: inferna salsua qualia sint pronuntiare non possum, quia iam in semen magna ex parte euaserat planta cum obseruabam, inquit Clusius, quæ tamen sub alis cauli inhærebant, tenuia erant & multifida, Nasturtii vulgaris, & legitimi, foliotum præne æmula, tenuiora tamen & viridia, acri gustu, vt Nasturtium: extremis ramis fert multos,



spicæ in speciem, congestos flosculos, quatuor foliolis pallescentibus constantes, in quibus rotidè stamina, quibus euanescentibus, succedunt stigmata breues, duabus valuulis siue vtriculis constantes cum lingula prominente, non quidem sursum erectæ, vt reliquarum congenerum, sed deorsum inflexæ, in quibus Nasturtii æmulum semen: radix est singularis, candicans, satis crassa, non tamen viarix, sed quæ singulis annis perit. Eodem loco, eodemque tempore, nempe Martio, florentem hanc plantam & semine iam plenam inueniebam, quo Alysson Galeni, Valentino videlicet regno & quia pleraque notas cum Nasturtio communes habere conspiciebam, Nasturtii nomen indidi: cui quantum ex gustu iudicauerit] perfimiles facultates habet. Hæc sententiâ, nomen immutare non debuere Lobelius, qui ipsam stirpem nunquam conspexit: nam plantis mihi antea ignotis & primum obseruatis, festinanter, & tumultuario quodammodo impetu nomina dare non soleo, sed prius

omnes illarum notas & reliqua necessaria mæturè perpendo, antè quàm aliqui stirpem certo nomine donare aggrediar, vt facile animadvertent, quotquot meas lucubraciones diligenter & sedato animo legent: malo enim interdum ipsas plantas inuoluntariè relinquere (vt mihi adhuc vsu venit in his commentariis) cum incommodo nomine applicando mihi ipse non satisfacio, quàm temere nomen aliquod, naturæ plantæ non satis respondens donare. Sed quam quæso maiorem affinitatem habet hæc planta cum Erucâ, quàm cum Nasturtio? Si quis vtramque stirpem sano iudicio conferet, inueniet profectò me, non sine probabili causa, Nasturtii siluestris nomen huic plantæ dedisse,

Clus. Hist. & Hist. post. Nasturtium silu. Valentinum.

Lob. Obs. & Icon. Plant. Eruca Nasturtio cognata tenuifolia.

Casp. Bauhin. Phyt. Nasturtium silu. Etucæ affine.

Nasturtium Peruansum foliis Lenticule.

Herbam habet Monardes ex Peru allatam Nasturtium appellatam, exiguam, foliisque habentem rotunda, Lenticulæ foliis paulò maiora.

Huius tritæ succus recentibus vulneribus instillatus, ipsaque herba superimposita, ea curat, & ad cicatricem perducit, haud leuis quàm Tabacum. Nasturtii est sapore, & valde calidæ temperaturæ esse videtur.

THLAPSI VETERIBVS ET IN GENERE.

CAP. IV.

Thlaspi, herbula est, referente Dioscor. angustis foliis, digitali longitudine, ad terram conuersis, in summo fistilis (dicitur in Marthioli ait, suspicor in Diosc. mendam subesse & hanc notam de folliculis legendam) subpinguibus: caulem autem remittit tenuem, duorum palmorum altitudinis, qui propagines paucas habet, & circa totum ipsum fructus est sublatas è summa parte (diuisus Marth.) in quo semen est simile Nasturtio (zaduo) disci figura (dicitur in Ruellius legisse videtur quædam quod vertit Lenticule effigie) velut compressum (in Thlaspi) ex qua re nomen habet. Florem verò habet subalbidiu: & in viis ac parietibus & sepibus nascitur. Semen eius acre (perit) est, & calefacit, bilênque sursum ac deorsum purgat, acetabuli mensura potum. Infunditur etiam per Clysterem in coxendico morbo. Ducit etiam languinem potu & internos abscessus rumpit. Mouet item menses & fetus perdit. Cræteus etiam aliud Thlapi recenset quod aliqui Sinapi Perficum (sinapi perficum) vocant. Habet hoc folia lata & magnas radices: sed & hoc infusus ad coxendicum morbum ammittetur. Cornarius in suis in Diosc. suppol. refert hoc alios Thlaspidium (Thlaspidium), alios Sinapi Perficum (sinapi perficum) alios Sinapi syluestre (sinapi syluestre) alios Myiten (Myiten) alios Myopteron (Myopteron) alios Datimophon (Datimophon) alios Bitrum (Bitrum) Aegyptios Suitempson (Suitempson) Romanos scandulacion (scandulacion) alios Capsellam, alios Pedem gallinaceum vocare.

Plin. Thlaspium duo genera facit: Vnum angustis foliis digitali longitudine, in terram versis, in cacumine diuisis, cauliculo semipedali, non sine ramis

Descriptio et Synonyma Nasturtium Peruansum facultates

Locus Vites

Thlaspium luid. Sinapi perficum.

tamis peltarum specie, semine incluso [fructu, forte deest Corn.] Lenticulæ effigie [Cornar. videtur Plinius legisse *καρναίου*,] nisi quod infringitur [*ἢ ἐν τῷ ἀσπίδι*] unde nomen. Flos albicat. Nascitur in semitis & sepibus. Semen asperigustus, bilem & pituitam vtrique extrahit. Modus fumendi, acetabuli. Prodest & ischiadicis infusum, donec sanguinem trahat: menses quoque ciet, sed partus necat. *Alterum* Thlaspi alii qui Persicum Napy vocant, latis foliis, radicibus maguis, & ipsum vile ischiadicorum infusio. Thlaspi ferè omnes in Theriacam immittunt, inquit Galenus, id quod ex Creta affertur & quod vbiq; nascitur, colore ex pallido flauum, figura rotundum, admodum paruum, vt Milio multoties cedat. Melius autem est quod à Cappadocia affertur inmittere, quod colore ad nigredinè multum discedit, figura autem non exactè rotundum est, & magnitudine multò maius quàm prædictum, habetque quadam sui parte, velut parvam quandam compressionem [*ἰσθμια*] à qua etiam Thlaspi nominatum est. Nascitur autè, vt hoc, ita etiam alterum in Cappadocia plurimum. Quare non simpliciter id quod à Cappadocia affertur optimum est, sed quod peculiariter in Sauro nascitur, dissimilèque est Cretico & passim nascenti.

Thlaspi semen [ait idein de simpl. med. facult.] habet & ipsum facultatem acrem, adè vt internos [intestinos Paul.] abscessus potum distumpat, menses prouocet, & (quod Paul. omisit) fœtum necet: ab inferioribus partibus iniectum ischiadicis dolores suat, sanguinolenta euacuat: Est alioquin & supernè & infernè biliorum humorum oxybaphi mensurà (acetabuli instar, Paul.) potum, euacuatorium.

Colligi scribit Corn. ex Galeno duplex esse prius Thlaspeos genus, & tertium esse quod Diosc. & Plin. alterum fecerunt. Cæterum quod Plinius semen lenticulæ effigie dixit, tum de lenticula legumine, tum de vase fistili ad lenticulæ similitudinem efformato, accipi potest: hoc & *φακὸς* & *φακίτης*, & *πυκνιθηὸς κακότης* Græcis appellatur, & fomenti gratia adhibetur, velut lib. 9. c. 1. comm. medicorum ostensu. Diosc. *δοκωδὸς* dixit, quod Plinius videtur *κακὸς δὲ* legisse. Thlaspi etiam à Lacertis, quæ iisdem incultis locis quibus hoc nascitur frequentes inueniuntur, Saurion præter alias ab hoc numeratas appellationes posteriores Græcos nominasse apud M. Virgilium legimus, quasi non satis à seminis figura, quod infractum & veluti contrasum videtur, indicasse id fuerit: nisi à notissimo insecto quod frequens in hac herba inuenitur adhuc indicaretur. Thlaspion Galeni & Thlasposis secundum Hipp. Robert. Const. in lex. græc. distinguit *θλάσπιον* & *θλάσπιον*, Sinapi Persicum vocat, & Pedè gallinaceum; *θλάσπιον* autem *εὐρ*, Thlaspi, genus herbar. Diosc. Sunt, inquit, qui vocent eam herbam, Thlaspidion, forma diminutua. Gal. generè scem. *θλάσπιον* Hipp. etiam *θλάσπιον* vocat. Apud Gottæum, cui herbula est semine Nasturtii, acri, quod mansum Sinapis modo linguam & os vellicet, Sinapi rusticum dictum fuit à plarisque, ab herbariis autem Nasturtium tectorum. Guill. Rhegin. Nasturtium eraticum appellat, ac Synapi sylu. esse negat, carpitque Manardum, dicens: ignotum adhuc nobis existimat Manardus, quod passim quidem in semitis frequens, vt apertè Dioscorides docet, quale nostrum reperitur: vulgatissimumque quibusuis colligitur, acre

ac mordax semen est, & vires habet causticas: misceturque in Theriacis veneno quouis profli-gando idoneis.

Thlaspi nomine tandem venit Thlaspi vulgatius, de quo mox dicemus. Thlaspi etiam aliud genus faciunt eam plantam quam Germ. apud Corn. *Besemtraut* vocant. Et in hoc etiam si ambigua res sit, tolerari possunt, quæ de re videantè. Thlaspi alterum Crateuas tradit, quod alii qui Persiconapy vocant, latis foliis, alii Pastoris Bursam vulgò dictam. Sunt & qui Thlaspi tertium genus, Sinapi Persicum dictum, Rhaphanum maiorem, syluestrem, & priuatim Armorationem vocatum, esse volunt. Sed in eo palàm falli videntur. Neque enim Dioscorides & Plinius de hoc siluissent.

Thlaspi *ἄγριον* *κακωδὸς* *nes.*

Bursa *ἄγριον* *pastoris*

THLASPI VVLGATIVS.



EX radice latis crassata & fibrosa, lignosa, alba, subacri, caules exturgunt hirsuti, teretes, rigidi, brachiati; quibus *filia* sine pediculo adherent, longa, sensim angustiora, reddita, serrata, sive crenata, gemina pinnula caulem amplectentia, sapore cum morlu acri: *stipuli* minuti, albi, multij; vt in Bursa pastoris dispositi, quatuor foliolis, constantibus, totidem virescentibus ea sustentibus; apicibus candidis: *capselle* præmaturio ortu flores occupant, foliaceæ subrotundæ, infractæ in summo, fissæ; in quibus *semen* acre, Sinapi aut Nasturtii, inquit Lobel. Ruell. ita describit: Thlaspi, sive vt aliis placet, Thlaspidion; quod

Diosc. & Plinius tradunt, esse nemo inficiabitur eam plantam quam vocant Herbarii Nasturtium tectorum, quod subinde nascatur in parietinis: alii syluestre: vulgus nostrum Sinapi rusticum appellat, quoniam digitis friatum Sinapi subolet. Hæc in scrobibus, semitis & sepibus inuenitur;

foliis in terram se conuertentibus, digitum longis, angustis, & quadratenus pinguibus, per extrema leniter incisis, caule sequepedem alto, agnatis in eo paucis calycibus capitulatis, breui pediculo nitentibus, quadam ligularum vel Cochlearium effigie, in quibus semen continetur Nasturtio simile, sed latius & velut infractum, Lunata plantarum specie. Calyx cum petiolo ligulæ formam exprimit, quæ tumidior vna parte fit, & altera pressior. Id quod in summo fructum in latus pandi designauit Dioscorides. Imò is repando dorso prominulus extuberat, aduersa parte funditur in laeum. Folia colis decumbunt in radicem. Semen acerrimi gustus deprehenditur, ita vt mansum Sinapis modo linguam & os velli- cet. (Quare vt Galenus scriptum reliquit, potum rumpit, hærentes menses ciet, partus enecat. Ifchiadicis auxiliatur, subter per sedem alio dirisifum, vt pote creuenta deiiciens strigmeria, quippe cum eximiè putget, bilem vtrinq; detrahit. Modus su nendi acetabuli mensura.)

C. Steph. not.

Eadem quæ Ruellius Car. Steph. tradit, quem tamen nominare non dignatur, sed pro suis venditat.

Cordus in Dioscor. Thlaspi minus, *Wesche Fressen* / vel *groß Weschenkraut* / & *wegfresse* vocat. De hoc ait in Hist. Thlaspi Cardamoides, siue Nasturtiarium semen habet copiosum, rotis ramulis adnascens in singulis pericarpis, iisque inferioribus connexis, superius aliquantulum concavis & compressis, geminum: figurâ & quantitate Nasturtii, colore rufum. Folia gustu vehementer acria sunt & Nasturtium amulantur. Semina autem glutinosum lentorem acrimoniæ commixtum habent.

Gesf. not.

Cordo per Gesnerium adaptata est icon ex Trago qui aliud tradit, Thlaspi nempe latâ siliqua.

Fuchs. not.

Fuchsius qui Thlaspi latifolium cognominat, non satis demonstrat quam plantam per Thlaspi, vt vocat, Thlaspidium, Sinapi agreste, Capsellam, Scandulaceum, Gall. *Senene Sauvage*, quod quidam Nasturtium tectorum, Sinapi rusticum & Butsam pastoris nomen, intelligat. Eius descriptio est repetitio penè descriptionis Dioscor.

Ruellius vt Cornatio placet, primus eâ herbam quæ ab Herbariis Nasturtium tectorum appellatur, Thlaspi esse censuit, & à vulgo Gallico Sinapi rusticum vocari dixit. Hoc ex Germanis nonnulli secuti, eam herbam *Bauren senff* (Sinapi rusticorum) appellant.

Thlaspi tertium descriptum à Dioscoride ex Crateua videtur Anguillatâ, optimè dici posse illud, quod depictum à Fuchio & Matthiolo, notissima in Italia planta.

Quæ Herba *βλάστη* Græcis, Thlaspi quoque Latinis dicitur Matthiol. pingenti, Barbaris Nasturtium tectorum: Italis *Thlaspi*: Germ. *Wesene kraut*: Hisp. *Puniquefo de flor blanche*: Gall. *senene sauvage*.

Scandulaceum. Sinapi.

Lacum in Diosc. qui Græcè *βλάστη* & *Σινάπι* *αγροί*, Lat. Scandulacei & Sinapi syluestre: Cast. *Mofaza saluage*. Franc. *Monsarde* aut *senene sauvage* vocat, per totam Italiâ legitimum Thlaspi censerit scribit.

Dodon. not.

Dodon. Gall. & Lat. Thlaspi alterum, Neotoricorum Nasturtium tectorum, & Sinapi rusticum: Germ. *Bauren senff* / aut *Baurenfress*: Belg. *Bauren mosiaert* / aut *Boerenfresse*. Hæc ille, qui videtur Thlaspi verum intelligere, quamuis ieiuna descriptio & figura.

Gesner. hort. Thlaspi verum.

Lobel. & Pena Adu. Obs. & Ic. Pl. Thlaspi vulgatissimum Vaccariæ folio aut Myagri pinnato, omnibus Thlaspi vocatum & receptum. In officinis in vsu est, & ad antidota pro vero accipitur Thlaspi.

Digna sanè Cæsalpini verba, quæ adscribantur. Folia fert ab radice Iberidi similia, longiora, ac similiter diuisa, in caule autem solum angulosa, pollicis latitudinis, caulibus propè cubitalis, ramis in summis tenuibus, parulis: flosculi candidi in cacuminibus: fructus specie & magnitudine Nasturtii, in extremo diuisi: semina intus subrotunda, nigricantia, acria: &c.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi, siue folio acuto. Hoc Matth. Lob. Dod. edit. Latina, pingunt foliis non crenatis: At Tragus, Fuchsius, Louic. Dod. edit. Gall. Tabern. foliis serratis, quemadmodum apud nos prouenit, nec licuit hæcenus figure Lob. similem videre.

Schvv. Thlaspi latifolium, Thlaspi officinarum *Groß seckelkraut* / *Groß Teschelkraut*.

Thlaspi vulgare circa pontem d'Arue Genæ habebam in orto cura semine & siliquis Maio, semine maturo Iunio. Basileæ in orto D. Plate- ri, Patavii in orto Triuefani, & alibi obseruau.

Montebelardi multis in locis spontè, ceu etiâ in orto Ill. E. C. ex semine deciduo se propagat. In Alsatiæ agris inter Basileam & Mulhusam abundat florens Iunio. In fossis, semitis & sepibus prouenire scribit Fuchsius, Maio & Iunio mensibus, floribus & semine prægnans. Thlaspi Cardamoidi tribuit Cordus radicem semestrè. Nascitur lutois & pinguibus aruis, secus vias inter fegetes, copiosissimè inque inter Golsariam & Hildeshymium in Saxonia legitimum reperiri in Italia certum est ex Matthiolo, siquidem eo maxime abundant & Goritiensis ager & Coradifcæ mœnia in parte quâ Sontius alluit. Nascitur & frequentissimè & acerrimum Pago S. Petri non longè à Goritia, aliisque circumstantibus locis semine perquam acri. Multò vberimè prouenit cultis & incultis aruis Italiæ, Germaniæ & Angliæ: sub ætatem florens, ait Lobelius.

Vires à Fuchio attributæ huic Thlaspi ex Dioscor. Paulo, Galeno & Plinio antè sunt à nobis scriptæ: Is autem scribit semen huius calefacere & exsiccare in quarto gradu: semen actè est, calefacit, siccantis est nature, attenuat, prouocat, incidit, vrit perinde vt Nasturtii semen, Schwenkf.

Locus & tempus.

Temperâ & Virtus.

THLASPI CAPSVLIS HIRSVTIS.



Requentes statim è radice simpliciter lignosa fundit caules humi sparsos, teretes, hirsutos, dodrantales, aut etiam cubito maiores, in alas aliquot filios: siliâ infima quidem longis appenduntur pediculis, Erucæ latifoliæ diuisurâ, superiora verò per caules crebra, nullo interueni-
te

Descriptio.

re pediculo lata basi hærent , Thlaspi vulgaris formâ , cui & flores albi similes , idemque ad eod est ordo numero farum capsularum infractarum , per summa fissarum , nisi quod paullo videntur maiores , pilis densis incanis oblitâ , singulæ bina femina continentes ruffâ , que liquore imbuta mucû lentum viscidum neque saliant : quod à vulgari Thlaspi quomodo distinguan non video.

Camer. horr. ni fallimur , Thlaspi secundum supinum hirsutum.


C. Bauh. Phyt. Thlaspi 9. siue villosum , Thlaspi pilosam Guilandinâ , cuius semen referente Cortuso , olim in Italia pro veri Thlaspeos femine vsurpatum fuit.

Anguil. Thlaspi Diosc. & Creticum Galeai. An Lobel & Pen. Adu. Thlaspi Syriacum , vel Græcum alteram , anguloso bifori pericarpio lentifolio , quod habuerunt Venetiis & c. nescientes sit ne illud veritiam Matthioli , quod ille nulla apta descriptione genera distinxerit , sed in chartas tantum negligenter picturas congesserit.

Thlaspi cum capsulis hirsutis in horto meo Mörbelgardi factum se propagabat ex femine deciduo itidem translatum in hortum Il. E. C. Frater C. Bauhinus atulit ex Italia pro Thlaspi piloso Guilandini.

THLASPI CVM SILIQVIS LATIS.

Vulgaris notitiæ est hoc Thlaspi , radice obliqua abasli- gnoia , sapore oleraceo , randoem subamaro : caulibus sesquipalmari- bus & cubito altioribus , angulosis , striatis , alatisque ; foliâ , sine pediculo adnascitur sinuata , pinnulis acutis productioribus in atro virentia , sapore inter Brassicâ



& Cepas , odore ad Allium accedente : flores pu- illi , Bursæ pastoris , albi , quatuor constant foliolis : quibus succedunt silique late , rotunda , compressæ , seu foliaceæ , glabræ , supremâ orâ bifidæ , in medio magis eminentes propter femina contenta , rotundâ , cum striis circularibus . Dodo- næo auctore nigricans , acre & feruens gustu , Milium etiam simul nonnihil respiciens .

Est hoc Trago pingenti Thlaspi , describenti autem , vulgaris Thlaspidia , & inter nomenclaturas , Thlaspi alterum , siue verum , quod ait Dioscoridem , ἡ δόσις ἢ ἡ ἀσπίδιος , ἢ ἡ σινάπις ἢ ἡ σινάπις ἢ ἡ σινάπις ἢ ἡ σινάπις . Sinapi persicum , Myrtin , Dasmophon , Myopteron , By- tron , Suitempsum , Scandulacium , Capsellam & Pedem gallinacum vocare . Portò meâ in- quir is , sententiâ , Thlaspi & Allaria , Nasturtium tectorum Serapionis ferit , quod ille Græcè Tafaphion vocari tradit . Ei ro- tunda , late , ac veluri conuassata erumenulæ vt in Atriplice , in quibus singulis , plerumque & nigra , & acri saporis femina , forma & gustu non

Fom. II.

multum à Nasturtio distantia . Non placent que dicit de forma feminis , quandoquidem multum differt à Nasturtii femine : Tragi icon adaptata est Thlaspi Cardamoidi Cordi , licet diuersum sit illud Cordi Thlaspi : vt verum fatear icon Tragi non vndique placeat , si is , vt nobis videtur , intelligit Thlaspi nostrum laris siliquis : is fortè tunc ignorabat differre à Thlaspi vulgari ac cum eo confundit iconè & descriptione .

Dodon. Gall. ἡ δόσις ἢ ἡ ἀσπίδιος , ἢ ἡ σινάπις ἢ ἡ σινάπις . Lat. Thlaspi , Capsella , & Scandulacium , quibusdam Myrtin , Bytron , Dasmophon & Myopteron . Germ. milder Fresse & wisselcrayr ; quibusdam Scorodochlaspi verum Dioscoridis . Lat. Thlaspi latum & primum ; Græcis Thlaspi à fructu , qui scutum exiguum infarctum refert : Re- centionibus Nasturtium tectorum , & Sinapi rit- ticum dicitur , Germ. Baurseuss , Baurseuss .

Matth. in post. comment. Thlaspi alterum vocauit , quod eius semen Thlaspi haud ab omni- videatur , nascique tradit in agro Pragensi , locis saxosis & asperis , ac florere medio Vere & Iu- nio mense . Figura quidem Matthioli mihi facis probatur : semen minus simile Thlaspi est : non facile in saxosis & asperis obseruari , sed in agris & cultis locis . Is in Hist. Germ. non posuit figu- ram nec eius meminit .

Nasturtium tectorum . Sinapi rit- ticum .

Locus . Marb. hor.

Camer. ad Matth. hist. Germ. & Epit. nouam posuit figuram pro Thlaspi 2. quod ait habere latissimas siliquas .

Lobel. & Penz in Aduer. dicitur Thlaspi , siue Nasturtium tectorum , Nasturtium syluestre , Scandulacea , Capsella , ἡ δόσις ἢ ἡ ἀσπίδιος ἢ ἡ σινάπις ἢ ἡ σινάπις , Germ. Baurseuss & Fress / Baurseuss ; Italis Thlaspi : Gallis Senere sauvage , Belg. boe- ren Fresse .

Lobel. Obs. Thlaspi Drabe folio , Icon. Plant. Thlaspi Drabæ & Chamelineæ folio . Aduersaria quoniam dicebant suam Thlaspi Drabæ folio habere semen oblongum , nigrum Nasturtii ; ego de alio Thlaspi intelligebam , donec Lobel : figurâ demonstrauit plantam quam intelligit , que profectò non habet semen vlla ratione sim- ile Nasturtio , nec oblongum , sed rotundum cum striis circularibus : vt verum fatear suspicor Lobelium confundere duas plantas , nec ei as- sentimur , Thlaspi quod exhibet siliqua lata meliùs conuenire cum Antiquorum Thlaspi facis vulgare , quod postea vocat Thlaspi vulgarissimâ .

Lobel. hor.

C. B. Phyt. Thlaspi 2. siue foliis & siliquis latis .

Schvv. Thlaspi lacius maius , ἡ δόσις ἢ ἡ ἀσπίδιος , Thlaspi Diosc. Aduerf. Thlaspi Cardamoides Cord. Nasturtium siluest. Scandulacem , Breit deschel fraut / Zeschel Fresse / Baurseuss . Si Schvv. meliùs contemplatus fuisset Cordi Thlaspi Car- damoides , dubio procul aliter sensisset .

Schvv. hor.

Thlaspi enim latis siliquis rotundis , foliis mollibus , glabris , obseruauit Basileæ in agris , quâ- itur Mourets cum floribus mense Octobri . Gene- uaræ cum siliquis & flore Nouembri , semine maturo Iulio . Hoc Thlaspi Allium olere vi- detur . Lugduni habebam in horto . Montbel- gardi in Horto Il. E. C. vbi feminauit , se conser- nat femine deciduo , pronem itiam in agris . Ma- io , Iunio & Iulio cum semine in aruis Silesiæ vi- gere tradit Schvvencckf .

Locus & tempus .

Vtrum Schvvencckf. viret obseruauit quâ scribit nescimus , dicit semen acre esse , bilem extrahere , potum internas suppuratiões ruan- pere .

DRYOPHONON PLINII.

A Vroris nomen merito sibi vendicat, vt qui ad primo his verbis depinxerit. Dryophonon similis herba est (Dryopteris) cauliculis tenuibus, cubitalibus, circumdatis vtrinque; foliis, pollicari amplitudine (vel latitudine, & longitudine. Latitudine potius intelligit Dal.) qualia Oxymyrtines, sed candidioribus, mollioribusque, flore candido Sabuci. Edunt cauliculos decoctos. Semine vero eius pro Piperis vtuntur.

Hæc paucis immutatis ita reddit Ruellius: Dryophonon olus syluestre Filicam speciei amulatur, ramulis setiquipedalibus, quos circumdant vtrinque folia, pollicari amplitudine, Rulco similia, nisi quod teneriora sunt, & candidiora, flore Sabuci lacteo, semine guta moriaci, vnde e vice Piperis vtuntur, conquiruntque cauliculos in cibis ad nodum gratos. Dryophonon Plinius Dryopteris simile fecit.

Myrtus memorialis, Vitis Idea angulosa.

Idem Officinis Guilorum Myrtum memorale appellari scribit, sed nullo modo cum Dryophonon conuenit Myrtus memorialis. Nos de hac egimus lib. 15. hoc titulo: Vitis Idea angulosa.

Thlaspi Creticum

Cordus Creticum Thlaspi putat, quod pro Draba Dioscoridis quidam monstrat, vt etiam annotat Dalech. apud Plinium. Verba Cordis hæc sunt.

Dryophonon siue Dryophanum aequiuoc.

Quædam exemplaria Arabam, alia Drabam, quædam etiam Arabidum appellant. Ceterum non male ait Virg. Mac. nullam esse apud alios Authores herbam hoc nomine. Plinius tamen eius mentionem facit sub nomine Dryophani. Arabis siue Draba secunda in Dodonæi opinionem est Dryophonon Plinii: Thlaspi Candide vulgi. Est nobis Arabis Dodonæi Thlaspi Creticum quorundam, de quo mox dicemus. Dryophonon Plinii peritiores, arbitrantur Rhas Plinii nonnullorum: Cluius: qua de re vide H. n. lib. 6. Authore Guilandino vt testatur, Casp. Bauhin. Barbatea muralis, de qua priori libro dictum, erat Dryophonon Plinii. Pro Dryophono tandem Plinii quidam [ait Dal. in annot. ad Plin.] Filicem florentem monstrant. Consule lib. 37. H. n. generalis.

Thlaspi Creticum siue Cas. dicitur quibusdam. Eius Plinius quorundam Barbatea muralis. Felix Jorrida.

THLASPI CRETICVM QVIBVSBAM flore rubente & albo.

Descriptio



Cæte quidam altitudinis aut prociore vnicò adolefcit, sed crebro aliarum stiparum vberim fruticæte, duro, lignoso, glabro, virdante: foliis tum caulis tum rami aniciuntur longis angustis, ex angusto principio sensim dilatatis, Iberidis folia æquantibus, non nihil in-

terorum crenatis, potissimum inferioribus, lapore fernido & subamaro: flores umbellatim congerunt dilute rubentes, vel vt ait Dodon. è cæruleo rubroque permixtis, vtrisque diluris, eleganter purpurascens, foliis quaternis, duobus maioribus, totidem minoribus, constantes: quos forsiquæ vel theæ excipiunt Thlaspios b. fide, infertæ, è filis stiliam præferentibus, quibus semen continetur, Dod. acre veluti Nasturtii. Radices plures, crassiusculæ, duræ, albæ.

An Angull. Thlaspi Cappadocicum Galeni Marthiol. in post. com. Ital. d. pingit sine descriptione, sub titulo, Thlaspi 4. figura non ad nodum probandi. Dod. gall. d. d. 3. Lat. Arabis & Draba, Plinii secudum quorundam opinionem, Dryophonon, Neotoricorum Thlaspi Candide, vocari etiam addit d. d. 5. vel A. r. 6. 15, lapsu facili ex d. in a.

Thlaspi Creticum siue Cappadocicum quorundam, si bene meminit Gesn. epist. quadam ad Occo. acrius amarissiq; est ceteris, siue Nasturtii, siue Thlaspios generibus. Is in horto habet herbam floribus & seminibus eisdem [fiores vtriusque quaternis constant foliolis: quorum duo semper latiora sunt, & alia duo minorâ,] foliis vero multitudine, quam Selanoidis nomine accepit: Ac dicit Dodonæum Thlaspi Creticum Arabam vel Arabin facere.

Lob. Obs. & Icon. Plant. Thlaspi Candide umbellatum Iberidis folio.

Camer. ad Marth. Germ. Thlaspi 4. Hort. Thlaspi Creticum flore purpureo & subalbido, amarissimo folio.

Casp. Bauhin. Phyt. Thlaspi 13. siue umbellatâ Creticum Iberidis folio, quorundam Dryophanon Plinii, aliorum Draba Dioscor. Et sane, inquit, descripto in multis conuenit, flore est purpureo, aliquando subalbo & luteo: habetur in horto Bombiano.

Schvvenckf. Thlaspi Creticum.

Propagatur, inquit Camer. non solum semine, verum etiam ramulis depactis in terram: Teneræ plantæ prius quam flores produxerint, in cella asseruatæ, altero anno florent egregie.

Julio & Augusto mensibus florem ac semen profert, Dodon. In Silesiæ hortis semen Augusto & Septembri maturum, Schvvenckf. Thlaspi Creticum vulgò dictum vidi florens Basilæ in horto Theodou Zyvingeri & aliis, florens Julio mense & adhuc Septembri. Genevæ fatû in horto meo ex semine misso per Zyvingerum, florebat Iunio. Sturgardiæ copiosum vidi: Sartum Montbelgardi in Horto Ill. E. C. facile prouenit, floret Augusto, Anno 1603. Julio in horto Il. Ducis florebat Thlaspi Creticum flore rubente, quod vulgare, & albo, quod nondum videtamus, dicebat se habere flore mixto.

Feruentis gustus: ac potenter, idcirco exalfaciens huius non minus quam Thlaspios semen, autore Dodon. qui præterea vires tribuit Drabæ, quæ postea recensentur ex Veteribus cap. de Draba.

Thlaspi Creticum siue indivisis seu Lini amarum,

Thlaspi Creticum appellatur herba, quæ etiam apud nos reperitur locis asperis in monte S. Iuliani: sicutus dodrapthalibus: foliis angustis, indivisis, seu Lini: capitula fert eacuminibus: in quibus flores stipati, subrubentes: & fructus in eodem capitulo stipatos, profundiori sectione, quam Thlaspi nigrum: seminibus intus flauis, amaris

Thlaspi Creticum

Thlaspi Creticum, Dryophanon, Draba.

Pre pag. 110. Repetitio

Locus & tempus.

Flore albo et mixto. Vires

maris & actibus : herba quoque amara est. Galenus meminit Cretici Thlaspios.

THLASPI VMBELLATVM
aruenſe amarum.

Sesquipedalis est & altior plāta, coliculis pluribus, ramosis, striatis, subhirsutis; quibus folia adnascuntur oblonga Iberidis, ex angusto principio sensim dilatata, & circa extremitatem cre-
nata, crassiuscula, subhirsuta, sapore perquam amaro, subacri; flores tanquam in umbella dispositi, quanquam inaequali ortu, ex albo putrescentes, aut etiam penitus albi, quatuor constant foliis, quorum duo maiora longiora, ita ut ex his vnum, simul vtrumque inferi equet, aut etiam superet, capsulae hirsuta, infractae, Nasturtii vulgaris semen co-



THLASPI VMBELLATVM TENIVITER
diuiso folio amarum Narbonense.

Thlaspi speciem, vel ut alii volunt Nasturtium sylvestre, quod cum Thlaspi umbellato aruenſi amaro pictum est, Anno 1561. & 1562. inueniebant Monspelio eundo ad montem Esperon, & versus oppidum Gangen, florentem inter saxa mense Octobri, & propē Caselinae: sinter Perons & Monspelium in marginibus agrorum mense Maio, & veniendo Lugdunum mense Iunio, si bene recordor: Planta autem est multum accedens Thlaspi umbellato aruenſi amaro: fo-

lius crassiusculis cum aliquot paruis lacinis siue portunculis, ferē floribus iisdem sed paulo minoribus. Est semispithamea: caulibus aliquot firmiusculi in ramulos diuisi: radix singularis crassiuscula, in fibas distributa: haec verba ascripsit Gesnerus: Scfamoides species minima, quae in meo horto mihi nata: vna Thlaspi rium in eo fallitur: Est mihi alia planta inter meas agglutinatas stirpes, pedalis, cum pluribus caulis ramosis, cui in summitate ramulorum flores copiosi, radix crassior. Scribit Gesnerus iuxta eam; quae sequitur Thlaspidium quoddam videtur, inest semen tenue, latiusculum, rufum, subamarum. Est mihi adhuc hoc anno inter siccas cum praedictis alia plantula monocloona, altitudinis quatuor: vnciarum, per totum cauliculum foliosa, in quatuor ramulos diuisa, tum copiose umbellato flore: eam Monspelio detulit Frater C. Bauhinus ac misit cum hac inscriptione, Thlaspi Candiae umbellatum Iberidis flore ex monte Ceti, florens Maio & Iunio: Haec autem tres planta sunt tantum vnius, sed varietatis occasionis loco. Hoc verò Thlaspi non mihi amplius vsum nisi inter meas plantas siccas, donec hoc anno 1607. conspectum, sed non agnitum ante florem emissum, in horto Theobaldi Noblot generi mei Pharmacop. II. E. C. quod prouenit ex semine Monspelio misso Doctissimo Medico, D. D. Danieli du Vernoy, nomine Thlaspi umbellati, quod praecedenti anno terrae commissum (multum euarians, ut solent plantae quae ex calidioribus locis in frigidiores transferuntur) per hyemem edurauit, & hos sequenti ineunte Aprili mense cauliculos primum protrudere cepit ex vna radice plurimos, striatos;

Descripio

Locus:

Descripio
Sesamoides species.
Thlaspidium quoddam.

Thlaspi
umbellatum.

Locus:

continent minutum, acre, C. Bauh. Radix lignosa, albidula, fibrosa. Haec planta accedit ad Thlaspi Creticum vulgo dictum.

Est Trago Thlaspidii aliud genus sine icone. Tabern. Hist. & Icon. Thlaspi amarum siue 10. Bitterbaurensis: caule tenui, sed robusto, flore albo instar Coronae.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi 14. siue umbellatum aruenſe Iberidis folio.

Basilicae in agris, mense etiam Octobri, & mense Iunio. Cum essem Geneuam inueni circa Thuirii copiose florentem Iunio, idque inter segetes. Montbelgardi variis in aruis, ut eundo ex Arbis Audincourt, & in agris circa la Chaux: transtuli in Hortum II. E. C. Floret Augusto, Sturgardiae colunt in horto III. E. C. Iunio & Iulio copiosum obseruavi inter segetes flore albo & putrescente in agris inter pagum Longewelle & celebrem Sanum siue Salubrem fontem II. E. C. Wirtemb. in comitatu Montbelgardenſi.

THLASPI PARVVM VMBELLATO
flore niuce odorato.

Thlaspi 4. (lege 5.) paruum odorato flore, quod Iacobus Plateau mitrebat, inquit Clusius Hist. post. humile est, ex femine natum, singularibus virgis assurgit, rotundis, in plures ramos diuisis, per quos ut per caulem, sparsa erant angusta & extremo mucrone serrata folia, Cretici foliorum amula, acti gustu praedita: summo caule & extimis ramis, nascabantur veluti quaedam in vnum caput congestae umbellae florum niuceorum, odoratorum, quibus successe-
runt theca Cretici Thlaspi vasculis similes; in

longa serie foliorum ad extimam vsque prominentiâ caulis donatos, folia autem ima sustinentur petiolo vnciali, superiâ in quatuor portiones crassiusculas, laciussculas, mediâq; sui parte sulcatis desinentes, media portio folia lumbâq; petiolo duas circiter vncias plus minusc longo prodeuntur, crenarumque impari numero pro petioli longitudine breuitateque differunt, ita quidè ut longiores pediculi 4. vel quinq; portionib. à se inuicem impari intervallo è regione collocatis distictique constant: breuiiores verò modò duobus, sed rarissimè, modò tribus, trifolii in modum, modò quatuor, modò quinque quoque, sed raritùs, disparique longitudine dotantur. Florere portò cœpit iam declinante Maio, erant verò flosculi in umbellâ circinnatâ morem numerosiores dispositi, vel intra caliculos adhuc conditi latentésque, vel iam se in apertum florem pandentes explicantésque, albidii, quaternis constantes foliolis, quorum externi ad instar amari Nasturtii duobus aliis longioribus foliis in ambitum sparsis, duobus verò aliis interioribus breuioribus absoluuntur, in media verò regione staminibus aliquot croceis decorantur. Folia degustata saporem amarum acrimque sensui offerebant, vt & flos mansus, remissiori tamen gradu. Superueniunt capsulâ & semen.

Pena & Lobel. Aduers. & Icon. Plant. Thlaspi hoc, Thlaspi alterum umbellatum Nasturtii hortenensis folio, Narbonense, inscribunt. Lobeli autem descriptio: vt & eius icon non in omnibus placet.

Id. Dalecham. videtur paulò melior, de descriptione taceo, quæ sic habet: Nasturtium sylvestre Dalechampii radice est longa, tenui, candida, fibrata: caulibus multis fruticat dodrantalibus, & si pinguis solum fuerit pedibus, folio est satiu, copioso, densius per annos congesto: flore in umbellâ ex albo purpurascente: semine in latis vaginis, Thlaspeos modo bifidis, gustu acris, & satiuum Nasturtium odore imitante. In agris frumentariis provenit, & lapidosi maritimesque.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi 1. siue Nasturtii folio peregrinum. Thlaspi alterum minus umbellatû Nasturtii hortenensis folio Narbonense Adu. *Cur primum* Thlaspi dicatur nescio, mihi potius videtur locandum post Thlaspi umbellatum aruense quod ego amatum cognomino: quibus benè cognita fuerit hæc planta considerent quantum similitudinis habeat cum Nasturtio hortenensi.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi Narbonense umbellatum, Thlaspe von Langedock mit vielen geharff blümenten.

THLASPI FOLII GLOBULARIÆ.

Descriptione Longè latèque serpit *radiculis* longis crassiusculis in aliquot capita diuisis nixum, quæ subinde reptando demissis fibris denudè radican- tur: *folia* per tetram sparsa, aut in eam reclinata, satis crebra, Globulariæ foliis quodammodo similia, pediculo vnius aut duarum etiam vnciarum, ad exortum rubente nitentia, vix totam vnciam longa, subrotunda, crassiuscula, atroviuentia, potissimum hyberna, sapore amato: *caules* palmares aut etiam longiores, teretes, glabri, per quos alternatim nascuntur *folia* coloris ferè glauci, pediculorum expertia, imâ parte caulem cõplexa, quo ferè modo folia Burfæ pastoris Persoliaræ folio acuminata. Summum caulis cacu-

men confertos sustinet *flores*, lberidis fucl. si in norens, nec ita dissimiles, maisculos, singulos quatuor foliis coloris lactei constantes, plusculis etiam apicibus in calyce viridante latentibus. Quibus succedunt *siliquæ* latiusculæ compressæ, burularum pastoriarum æmulæ, ex sinu suo apiculas exiguas emittentes. *Semen* complectentes sèbruffan, exiguum, acrisculum, & subamarum.

Clusius Pann. & Hist. post. Thlaspi montanum 2. siue Thlaspi Badenfe.

Visa planta florente, nisi iam ex Clusio figurâ habereim sculptam me absente, aliam proponerem, quandoquidem ipsimet Clusio non placet nec nobis.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi 8. siue Bellidis cæteræz folio.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi album supinum. *allegent* weis Bauren freis.

D. Dr. Martinus Chemnitius dedit Basileæ collectum in montibus prope Oelspurg: florentem vidi Martio in horto Ioan. Heitzman Pharm. Mense verò Maio reperi prope *S. V. sane* lapidosi locis cum flore & siliquis penè maturis. Clusius obseruauit in decliu montis illius glabri, qui vrbi Badenfi imminet, quarto à Vienna miliaria, florens Aprilis, semèniq; proferens Maio & Iunio.

Thlaspi folio rotundo.

Quod à Camer. hort. Thlaspi 7. rotundifolium Thuringiæ: & C. Bauh. Phyt. Thlaspi 7. folio rotundo nuncupatur: eius nullam adhuc reperi descriptionem: considerandum an sit Thlaspi nostrum foliis Globulariæ.

THLASPI FOLII GLOBULARIÆ AFFINE siue Alimefolia cum Myagri foliis.

AD Thlaspi Globulariæ foliis nobis dictum non nihil accedere videtur, sed hoc quàm illa exilius. Nam & *radix* longa, crassa, in plura capita diuisa, & *filio* numerosissima quibusdam albidis pilis obsita, quedam interdum sinuata: succulenta, crassiuscula, & oblongiuscula, humi sparsa, atroviuentia: quibus præteritorum foliorum filamenta substrata. Ex quibus *surculi* emergunt palmares aut altiotes, teretes, alterno foliorum angustiorum subpinguium atroviuentium quoque ex ima parte coliculum amplectentium positu donati. In surculorum diuisorum cacuminibus, *flosculi* quoque plurimi, lactei, quadristfolii, dictæ plantulæ foliis similes. Sapore est acris.

Huic

Thlaspi Umbellatû minus. Lobel.

Dalech.

Thlaspi Nasturtii folio.

C. B. nat.

Descriptione

Locus & Tempus.

Descriptione

Hæc plantæ accedit multum si non idem Thlaspi petraeum, Myagrodos Pona.

Quodnam sit Matthioli Thlaspi tertium, non possunt [inquit Camer. ad Hist. Matth. Germ.] diuinare, nisi illud sit, cuius semen nostris Officinis in vsum venit. Similia enim habet folia & radicem, quemadmodum ab eo pingitur: caules verò frequentioribus foliis sunt stipati, ramulis verò in orbem pulchrè digesti flosculi insidēt, neque etiam saxosa amat, quod de suo Matthioli scribit, sed pingui solo nascitur. Quod & Pennæus Londinensis Medicus in monte *Saleue* propè Geneuam in saxorum crepudinibus, reperit: foliola habet longiora, minora, iuxta radicem paulum crenata & aspera, atrouitencia. Semen rufum quemadmodum Nasturtii vasculis clauditur. Prouenit etiam in monte Ammam Heluetionum. Idem in Harc. Omisâ Matthioli saxatilis Thlaspeos iconem aliam substituitimus ex ipsa plantula depictam, quam antehac nemo atbitror exhibuit, donec Matthioli illud Thlaspi [tertium] nobis quoque innotesceret. Idem in Epit. Thlaspi tertium inscripsit. Sed nescio cur Thlaspi Officinari non potius referatur ad primum Matthioli quam ad tertium: nec etiam inuenio Matthiolum dicere tertium saxosa amare, pro tertio placet: nec illa planta Camer. respondet tertio Matth. cum mutabat iconē, oportebat etiam descriptionem Matth. in Epit. mutare.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi tertium: laxatile Camer. in Epit. Matth. Quod enim Matthioli Icon. pro Thlaspi tertio pingit, non rectè exprimit folia, quæ nimis longa & acuta: Quare Camerarii figura nobis probatur ex plantæ viridis cum figura collatione. Nos eius imaginem exhibemus in tabula Alines-foliæ cū Myagri capitulis.

In peregrinatione Rhætica cum D. Gesnero, anno 1561. Burmii cū essemus in monte Nombre reperi cum vasculis mensē Junio. Anno 1591. Frater C. Bauh. sine nomine ad me misit, qui scitibit, se in monte *wasserfall* copiosè collegisse. In altissimo monte trans Sanctum Vrsum ex præruptis rupibus, quas Rupes Sambra: vulgò vocant, loco cæterum aprico Maio florens, nec dum semen profertens, ex quo nostra descriptio.

excipiunt siliquæ foliaceæ, cordatæ, eleganti virore conspicuæ, minimi digiti vnguem latæ, lineâ quadam bipartitæ, & vt vno verbo dicam siliquis Thlaspeos latissimâ siliquâ dicto figurâ persimiles. *Radicula* duriuscula est & alba. Plantæ sapor subamarus non sine acrimonia quadam. Semen eius paruum, oblongum, luteolum, acrisculo est sapore, minime ingrato.

De loco in descriptione. Floruit ibidem Iulio & Augusto quo iam siliquæ & semina matura à Cherlero in hortum Mompelgardensem conicienda collecta.

Locus & tempus.

NASTURTIVM VEL THLASPI
maritimum.



IN sesquipedalem & ferè cubitalem plantam fruticat, lignosis, latis fragilibus, hirsutis subrubentibus ramulis, per terram sparsis: per quos *salsivocia*ta, perangusta, incana hirsutie obita, sapor Nasturtii: *sterculi* extremis ramulis congesti, albi, cum partibus quibusdam cyanæis, odorati;

Nasturtii similes: quibus, succedunt *capsella* parua, oblonge, utrinque acuminata: in quibus semen pusillum rufum: *radix* mascula, crassa, alba.

Et hoc illud est, quod Lobel. & Pena in *Aduers.* & *Icon. Plant.* Thlaspi Norborensis, Centunculi angustifolii, & Alyssi Italorum nomine proponunt, de quo aiunt. Fecerant iamdiu Itali Alysson quodpiam, eosque Commentator sequitur, lubenter, inquit, posuissim si habuissim: igitur factum bene, quod non habuerit, quippe doctiorum omnium Monspelienium suffragio Thlaspi hæc annumeranda non Alyssis. Sufpicor Nasturtium nostrum maritimum non per Lobelium disinctum ab Alyssis siue Thlaspi multorum. Icon & quadam in descriptione Lobelii conueniunt cum Nostro Nasturtio verò, quadam cum nostro Alyssis minore quorundam, Monspelienfes id diligentius perpendant.

Thlaspi maritimum Dalechampi sic describit hist. Lugd. Thlaspi maritimum idque minimum in maritimis prostrat, radice lignosa, longiuscula, in furculos diuisa, candida: caulibus multis, dodrantalibus, simplicibus, foliis multis, exiguis, angustis, longis: flore in summis caulibus copioso: semine flavo, lato, Thlaspi simili, acris, in loculis turbinatis concluso. Idem hoc Thlaspi alibi habet hoc titulo. Thlaspi Narborensis Penæ. Eadem etiam sub Alyssis Matth. ita scribit: Hanc Plantam Itali fecerunt Alyssum, vel Alyssi genus, quos secutus Matthioli lib. 3. At doctiorum omnium Monspelienium sententiâ Thlaspios generibus adnumeranda est, non

THLASPI CAPSVLA
cordata peregrinum.



Tom. II.

Plcherrium Thlaspeos genus hocce, primum Henr. Cherlero in Clariss. Zvingeri obseruatum, pedalem altitudinem adsequitur. *Caulis* in aliquot ramulos diuisus, *stipatur* lini facie, in summo obtusis, glaucis, temerè oppositis. Cuius vt & ramulorum eius extrema *flosculi* ornant exigui purpurei, quos

M. f. Lugd. neu. Alyssi. Sed Hist. Lugd. illo cap. Narbonense Thlaspi idem facit cum Matthioli Alyllo à quo non parum diuersum: capite autem 45. pro Thlaspi Narbonensi ex Adu. Lobelii & Pena. transcribit quæ scripsit, & iconem illorum ponit, hac ratione diuersas confundens plantas: culpa Compilatoris ignari stirpium.

C. Bauhin. Phyt. vocat Thlaspi 22. siue Alylson, dictum alterum & maritimum, aitque: etli Lobelius velit Thlaspi Narbonense Centunculi angusti folio, idem esse cum Italarum Alyllo, variat tamen. Hoc enim ab Italico differt folijs angustioribus, rarioribus, siliquis minoribus, longioribus, quod optimè exprimitur ab auctore Herb. Lugdunensis.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi Narbonense Centunculi angusti folio: Alylson Italarum.

Locus & tempus.

Toto anno viderur florere. Vidi florentem apud mare & locis arenosis & salfugine abundantibus, vt vno miliari à Monspelio mense Augusto & Aprili, & iuxta aquas mortuas mense octobri. Frater C. Bauhin. attulit mihi Monspelio cum hac inscriptione Thlaspi marinum florens Maio & Iunio.

THLASPI MINVS QVIBVSDAM, ALIIS
Alylson minus.

Descriptio



NON vna species facit occurrit hæc planta, aliàs pulilla admodum, aliàs dodrante maior, crebris virgultis duris fruticans, asperis & cinctis, in ramos fistis, & in terram aliquando reclinatis: folia in hinc, cum caulem non fert, oblonga, vncialia aut fuscuncialia, culmo latiora, admixtis sæpè aliis latitudine & longitudine iis cedentibus, quæ v-

traque caulescete plantæ ferè decidunt: superiora autem, quæ in caulibus & ramis factis sunt frequentia, admodum sunt angusta: omnibus porò communis color incanus, magis tamen parte inferiori, ad tactum asperitas, neruus vnicus folium bissecans, sapor fatuus: flores creberrimi, Thlaspeos montani lutei, multò minores: colore aliàs luteo, quam varietatem est vbi in eadem planta obseruare liceat: quibus scrie longa, vt in hoc genere fieri adfolct, capsulæ succedunt lenticulæ grano formâ & magnitudine pares, circumactò sulco in medio protuberantes, vbi femina subsunt pusilla, quaterna, singulis locellis membranulâ diffusis bina, ruffa, quæ humore madida mucaginem reddunt, radix demittitur lignosa, alba, plerumque simplex: annua stirps.

An Trago Nasturtii genus quartum Germanis dictum Hein Seckelstraur vel Tschelstraur quod aliter describit, aitque sub Thlaspidio comprehendit.

An Dodon. Gal. Thlaspi 4. cui folia longa, an-

gusta, aspera, caules lignosos, rotundos, flexiles, hofculos patuos, albos, siliquis latas, femina fusca, gustu valde calido, Nasturtii instar, adscribit: Hoc Thlaspi cut Dod. Lat. omiserit miror.

Hist. Lugd. Alylsum minus Dalechâpi vocat, de quo ait: In fabulosis crescit radice candida, parum fibrata, satis longa, cauliculis multis, rotundis, lanuginosis supra terram parum extantibus: foliis multis albicantibus & tanquam cinere conspersis, Aizoo minoribus, similibus, si non lata forent, gustu fatuus cum paucula adstrictione: flore in summis virgis copioso, luteo, semine Lini, minuto, ruffo, in loculis scuto similibus, duplicibus, membrana renui & pellucida distinctis. Si Dalechampii Alylsum idem est cum nostro Thlaspi minore quorundam, icon in Histor. posita non placet.

Thlaspi generibus quodammodo congener esse videtur Clusio Alylsum minimum, foliolo gustus subacidi, sed foliaum quodammodo cientis, flosculis luteis quinque foliis constantibus. An verò nomen aliquod vulgare obtineat apud eos populos vbi nascitur non intellexit, à finitatem autem habere videri scribit cum ea planta, quæ à vulgo Dioscoridis Alylson esse creditur. Nos suspicamur Alylsum minus, siue Thlaspi minus de quo agimus à Pena & Lob. in Adu. non distinctum à nostro Nasturtio, siue Thlaspi maritimo.

Thlaspi inquit Camer. & Matthiol. Germ. Jsimilis est plantula quæ quibusdam Alylsum dicitur, flore albo, in summitate luteo, hirsuta, &c. Idem ad Epit. Matthiol. ait. An veterum autorum hoc sit Alylson, cum aliis adhuc subdubito. Hæc ille. Proponit autem iconem ex Gesneri Iconibus, quam eandem esse plantam quam Matthiolus exhibet nondum concedo.

C. Bauhin. Phyt. Thlaspi 23. siue Alylsum dictum tertium luteum.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi minus clypeatū 2. Hein Schild Besenfraut. Figura Thlaspi seu Alylfi quorundam minoris malè ponitur à Tab. pro Thlaspi clypeato minore Lobelii, quæ nobis dicitur Lunaria biscutata minima.

Confundit Schvz. hoc Alylsum minus cum Thlaspi angustifolio Fuchsi, quod nos Nasturtii syluestre esse dicimus. Alylsum Matthioli, & minimum Clusii, Steinfraut, Hort. Lust. idem facit, at malè.

Genæ & Lugduni abundat florètur mense Maio: in Ducaru Wirtembergico propè fontem Admirabilem in monte Eichelberg flore luteo albo albescente, vbi marcescit Septembri. Môtbelgardii copiose in mea vinca, flore albo. Nusquam non crescit Viennensi agro ad aruorum, vinetorumque margines quibus à publica via separantur, quin etiam ficis & graminis agris nõ in modò Austriæ, sed etiam Morauia, & Pannoniæ. Floret toto Aprili, interdum etiam Maio.

THLASPI MONTANVM LVTEVM.

NON pauca huic cum Thlaspi quarto Dodonæi communia, potissimum verò folia oblonga, incana, maximè infernâ parte, aspera, ad oleæ formam nonnunquam accedentia: radix longa, lignosa, multifida, numerosa, humifusos, lignosos caules proferit, cinericeos, dodrantes & longiores: ac fl. res copiosè eo ordine digesti quo in iam dicto Thlaspi, multò maiores & saturatè lutei: capsellæ quoque non dissimiles, stilum è capite proferentesymbilico proeminulo

semen



semen clauden-
tes. In planta
sicca nullus sa-
por insignis ap-
paret, aliquan-
dum masticata,
postea tamen
habere videtur
aliquam acri-
moniam lin-
guam siccans.

Lob. Icon.
Pl. Thlaspi 20.
sive montanum
luteum.

Shv. Thlaspi
luteum repens
Lobel.
Thlaspi luteum
supinum mon-
tanum / Klein

Friedent Thlaspi Arenosa proreptat loca.

Thlaspi montanum flore luteo voco herbam,
quam fr. C. Bauh. scribit se inuenisse propè Bas-
ileam circa Birsfecken super rudera in monte.
Hanc eandem plantam mihi misit cum flore Iu-
lio mense ex Champagne Burgundix insignis
Pharmacopœus Tostanus Carolus, qua n. cu-
raui plantandam in horto Ill. mei Principis,
sed folio multo maiore ad Oleam acceden-
te, de qua planta scriberet floribus esse Kei-
ri siue Leucoidi lutei, eiusdemque odoris, florere
vere. Floruit Montbelgardi roto Iunio &
Iulii principio, quo tempore siliqua apparuerunt.

THLASPI MONTANVM MINIMVM Monspeliensum folio laciniato.

Ignosis, albis, prolaxis, multifidis radiculis
nititur, ex quarum capite furculi emergunt
numerosi, interdu vix vnciales, aliàs trium qua-
drone vnciarum altitudine, ramosi, congesti, exi-
les, albi: quibus paulatim delabentibus sensim
succedunt longiore intervallo disticta siliqua, Mi-
lii grano æquales, ex rotundo oblongæ, in duos
loculos interueniente candida membranulâ di-
uisæ, ex pediculis longiusculis pendentes: semi-
na minuta, rufta: folia tum ex radice statim,
tum ad caulium, ramorumque diuisiones, vncialia
vel semuncialia, in profundas angustissimas lac-
cinias ad costam vsque incisâ. Sapor acer.


In Boutonnet iuxta Monspelium, à Genero
Cherlero collectum.

Leucoium luteum montanum supinum Pona.

Plantam nobis misit diligentissimus Pona, An-
no 1609. cui inscriptio Leucoidi lutei montani
supini, ea sanè habet similitudinem quandam
cum Thlaspi nostro montano, siue Thlaspi su-
pino luteo Lobelii, folia tamen omnia rotun-
diora; iuuenis est planta quam misit, in qua
pauci rami, vix duas vncias longi, radix crassius-
cula qualis in prædicto Thlaspi, cum fibris qui-
busdam.

THLASPI CAPSVLIS SVBLONGIS incanum.

Ex radice satis crassa: cubitum longos ac e-
ciam longiores, lentosque ramos, & planè li-



gnosos, ruben-
tes, erectos
producit, in ra-
mulo aliquot
diuisos: silia
priora longa
quatuor vncias,
& vnam
lata, superiora
Leucoidi lutei,
incana aut in
nigro virentia;
subhirsuta, sa-
pore oleraceo,
subacri; flores
inæquali licet
pediculorum
tenuissimorum
ortu in umbel-
la dispositi, al-
bi, quatuor fo-

Descriptio

liis cordatis constantes, staminibus in medio lu-
reolis: capsula succedunt sublongæ, hirsuta.

An Matth. in post. com. Lat. & Ital. cum magn.
fig. Thlaspi tertium: Figura sola sine descriptione:

Thal. in Hærcyn. Thlaspi Matthioli tertium.

Camer. ad descriptionem Thalii addit: Passim
quoque nascitur apud nos hoc Thlaspi, sed vi-
detur parum congruere cum Matthioli pictura
3. Thlaspeos, quod in saxois nasci ipsemet asse-
rit: hoc verò nunquam eiusmodi locis inue-
ni, sed potius circa sepes & alibi strigoso
gramine obductis areis: idèd in nostra editio-
ne, omisa Matthioli saxatilis Thlaspeos icone, a-
liam substituimus ex ipsa plantula depictam; quâ
ante hæc nemo, vt arbitror, exhibuit, donec Mat-
thiolum illud Thlaspi nobis quoque inueneret.
Hæc Thalij descriptio benè conuenit cum
Thlaspi nostro incano: an idem Matthioli, asse-
rere non aulam, siliquæ etiam non vndique plâ-
cent: præterea Matthiolum ponit tantum titulum
Thlaspi tertij cum figura: nec video eum eius
meminisse in contextu, aut dicere in saxois na-
ci: de suo Thlaspi altero id dixit, quàm benè, di-
cetur sub historia Thlaspi cum lara siliqua: de
Thlaspi saxatili Camerarij sub nomine Alline-
folij cum Myagri capitulis.

An Camer. hort. Thlaspi 6. incanum fructi-
sum Franconiz?

An Lobel. Icon. Thlaspi album supinum. I-
con. Lobelij mihi videtur non vndique vera.

Lobel. Obs. & Icon. pl. Thlaspi incanum Me-
chliniense, finitimo Mechliniz ruti fructu O-
leræ folijs, multisque summo diuisis hirtis ramu-
lis, pedem & sesquipedem longis, stios albus & in
pericarpis rotundiuseulis summum caulem am-
bientibus exiguum semen minus cæteris.

Clusius in Pann. & hist. post. Thlaspi incanum
Machliniense, Thlaspi genus à nonnullis Mach-
liniense cognominatum, folia habens vntiam
longa, dimidiam lata [inæqualiter & inordinatè
amplectentia caulem pedalem aut amplio-
rem,] cineracei coloris & acris saporis: cau-
les in ramulos diuisi, extremis albos flores pro-
ferunt, quatuor bifidis folijs constantes, in ca-
put cõgestos & quasi umbellatim nascentes, qui-
bus decussis, paulatim illa capita succrescunt &
producentur, vasculaque ostendunt mucrona-
ta, breuia, semen continentia: radix albicans,
fibris, quibus prædita est, sub terrâ latè serpitis
Drabæ instar:

Taber & Lobel. not.

Tab. Ic. & Hist. Thlaspi duodecimū, siue album lupinum 2. Hgēndt weiß bauren senff. Icon Tabernæ ferē eadem quę Lob. apud Pl. cui nomē respōdere non videtur: pingit enim plantam surrectam prōn supinam. Compilerator mihi videtur descripsisse secundum iconem.

An Schvv. Thlaspi album lupinum: Tab. Thlaspi album 1. & 2. Lob. Thlaspi album lupinum, weißer weg aut Bauren Senff/ Vratill. weißer weg kresse/vbi secus vias extra pagos passim provent: Aestate florefcit & semen fert. Calefacientis & siccantis naturę. Herbā incensā pestis tempore aëris vitia corrigere vulgus credit. Miror cur dicat primum & secundum Tabern. primum enim album, est montanum vt annotauit Clusius, ac nos etiam obseruauimus, parua planta, non lupina, nec apra igni, vt est secundum: si Tabern. eandem intellexit [quod nos suspicamur esse] is habet iconem Lobelii mutatam non nihil: titulus quo lupinum dicit non placet, id non demonstrat icon. C. Bauhin. Phyt. Thlaspi 9. siue album lupinum Lobelii. A Fratte non scribitur an ei notum. Considerandum an eius 17. folio incano, flore albo, sit idem cum nostro Thlaspi capsulis oblongis.

Locus. Vius. Schöyner.

Locus & tempus

A D. Sprengero habui Heidelbergā semen pro Thlaspi incognito, satum Montb. in horto Ill. E. C. primo anno floruit ac hieme perit, quod in cista repositum sequenti anno floruit per plures menses, ac secundo anno durauit. Hoc idem reperi spontaneum iuxta Gœmreheim cum flore & siliquis Iulio, vbi in quibusdā plantis in multis caules, in aliis in pauciores exerefecit, ad tres cubitos eandem etiam reperi. Nascitur plerisque Austrię & Morauię locis, secus vias, & agrorum margines, graminis que incultis locis non minus quam in Belgica Thlaspi genus illud, quod nonnulli Machliuensis cognominant, quia iuxta Machliniam Belgicę celebrem urbem plurimum nascatur publica via quā Antuerpiam itur.

Thlaspi arborefcens folio viridi. Spitz vbi Camera Imperialis, in horto cultiss. rariss. plantis D. Tegnagel Adfessoris, Thlaspi vidimus anno 1595. mense Iunio arborefcens, fruticosum, folio Linarię, verum non acuminato, sed in extremitate obtuso, succulento, crassiusculo, glabro: sapore acri, Rosculi coloris non recordamur.

THLASPI SEMPER VIRENTIS
species candida.

Descriptio



Mihi insignis Medic^o Christ. Schwartz anno 1591. mense Aprili plantā ex horto Ill. D. VVirtemb. cui præest, quam vocat speciem Thlaspeos semper virentis, quam plantaui Montbelg. Ea erat ramola cū multis foliis oblongis, incanis siue candidis, flores in umbellis albi, siliqua parue subrotundæ.

An Camer. hort. Thlaspi 4. semper virens biflorum, folio Leucoii.

Hist. Lugd. Thlaspi montanum candidum Dalechamp. alterum. C. Bauh. Phyt. Thlaspi 16. siue Leucoii folio incano, quod inter fratris Joh. Bauhini plantas tantum obseruauimus.

THLASPI FRUTICOSVM ALTERVM LOB.



Quum effimus cum Ill. nostro Principe Duce VVirtēb. Heidelbergę anno 1595. insignis & diligentissimus stirpium indagator & Pharmacopœus D. Sprengerus dedit nobis ramū plantę pro Thlaspi fruticoso Lobelii altero, palno longiorem, tenuem, cuius folia alternatim disposita, vnciā breuiora, vix

culmum lata, in acutum desinentia, & albidā siue cinerea, in superiore caula parte ex longiusculis pediculis alternatim capsulae sublongę, in quorum extremitate cuspis, in extremitate flores plurimi umbellam representantes: vascula similia Thlaspi quod vocamus siliquis sublongis incanum, similes flores, eadem vtrorumque dispositio: folia autem diuersa. Nos curauimus pingendum nostrum ramum iuxta Lobelii iconem, qui suum sic tradit: Folio est Thymbre hirsuto: cauliculos emittit plures pedales fruticis specie, e quorum summis flores albi & femina in compressis folliculis.

Clusius iam dictum vel valdē simile sic describit: statim à radice multas emittit virgas inæquales, frequentibus ramis donatas: folia illius angusta, mucronata, nullo seruato ordine, caulem & ramos ambiunt, satis manifestę acrimonię: extremi rami multos albos Rosculos in caput ferunt, quibus excussis, subsequuntur plantę thecæ in spicę speciem nascentes, superioribus similes, duobus vtriculis constantes, in quibus semen: radix crassiuscula, dura, non viuax.

Lobel. Obs. & Icon. Plantar. Thlaspi fruticosum alterum. Miror ita icionē descriptum, nec anuotatum locum vbi proueniat, ego vt antē dictum, Heidelbergę accepi à D. Sprengero siccę plantę ramulum, dicebat esse Thlaspi fruticosum Lobelii: folia rara, angusta, vnciā digiti breuiora, acuta, cinerea: capsula oblonga cum cuspidē, similes Thlaspi incano siliquis oblongis, Rosculi maiusculi, albi in sicca planta.

C. Bauhin. Phyt. Thlaspi 27. siue Thymbre folio fruticosum.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi fruticosum 2. Cluf. H. post. Thlaspi 5. [legendum 6.] Hispanicum flore albo.

THLASPI

THLASPI FRUTICOSVM FOLIO
Leucoii marimi minoris.

cripio



Vitæ numeroſæ ſparſæ, crebris Leucoii minoribus foliis: flores candidi, copioſi, & ſemen compreſſum Thlaſpi parui. Radix lignoſa, fibroſa, in Belgii hortis.

Lob. Obſ. & Icon. Plantar. Thlaſpi fruticosi folio Leucoii marini. C. Bauhinus Phyt. Thlaſpi 26. ſiue Leucoii folio fruteſcens.

Tabern. Icon. & Hiſt. Thlaſpi fruticosum folio Leucoii minoris, Baumh. & Baur ſenſſ.

LEVCOIVM CVM SILIQVIS
rotundis flore luteo.

cripio



Plures ex radice candida, fibrata, mediocriter craſſa, caules proferre cubitum altos, reteres, leuiter hirsutos, & in multas alas diductos: folia ſeminciam plus minus lata, palmum longa, ſubhirſuta, & nihil incana; flores extremis ramis copioſe congeſti hærent, parui, lutei, quadriſolii: quibus ſuperueniunt utriculi rugidi medium diſſepiente

membranula tenui, cui adherent ſemina, foliacea, orbiculata, ruſſa, Leucoii granis ſimilia.

Cluſ. Hiſp. & H. poſt. Eruca peregrina, Leucoium ſemine rotundo vulgè quorundam.

Lob. Obſ. & Icon. plant. Patauinum Leucoium marinum.

Tabern. Hiſt. & Icon. Leucoium marinum luteum malus. Groß geel Merveyeln.

Hiſt. Lugd. Eruca peregrina Cluſii, Patauinum marinum Leucoium Lobelii.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 7. ſiue maritimum luteum, ſiliquis rotundis.

Gerard. Leucoium marinum latifolium Broſad leafed Gilloflower.

Leucoium cum ſiliquis rotundis denominated hanc plantam, quia foliis ſubhirſutis, albidis, &

ſemine compreſſo magis accedit ad Leucoia quam ad Emicas, à quibus diſſidet non parum. Lugduni habebam in horto, Ibi etiam curauim depingendum. Montbelgardi in horto Ill. E. C. ſatum mihi prouenit, ac primo anno floret, hiemem perſert, nec perit poſtquam tulit ſemen. Argentinè vidi virentem Octobri in horto Frederici Meieri. Valerandus Dourez annotauit, Aprili menſe floret & in maritimis Iſtriæ & Illyriæ paſſim prouenire, D. Jac. Zvinger ſuſcepit mihi anno 1595. ſemen cum hac inſcriptione, Leucoium Patauinum Lobelii quod mihi prouenit & reſtitutum hiemem pertulit, floruit Iunio, Iulio, & Auguſto, quo etiam tempore ſemen maturum. Creſcit quibuſdam Caſtellæ locis inculcatis, & ſecus vias, vbi Maio floret. In Belgiam allata non niſi Iunio & Iulio.

LEVCOIVM SPINOSVM, SIVE
Thlaſpi ſpinofum aliis.



Dodrantali ferè eſt radice, craſſiſculâ, contorta, lignoſâ, foris prope modum ſulcâ, iatus buxâ, in plura capita facellente. ſtipes lignoſi, crebri, duarum, triumue vnciarum, aut paullo longiores, ſulco, aut incano, portæcœ corticâ veſtiti, in ramos frequenter diuiſi, alii in ſpinas longiuſ-

Deſcriptio

culas, rigidas, mordaces, rectaſque abeunt, poſitu & formâ Pimpinellæ ſpinofæ: folia per imos ramos pauca, per ſuperiores conferta, incondita, Thlaſpion montani lutei, ſemincialia, atque vncialia, vix culmum lata, inuicione obtuſo, craſſa, incana, ſapore Braſſicæ acriuſculo: extremis tamulis hærent ex mediocribus pediculis, gemino ordine viridantes capſula capitulis Myagri ſimiles, bifores, diſſepimento membranulâ lucidâ in duos loculos diſtinctâ, ſemen continens ruſſeſcens, rotundum, compreſſum, guſtu acri.

Lob. Obſ. Icon. Pl. & Hiſt. Belg. Thlaſpi fruticosum ſpinofum Narbonenſe.

C. Bauh. Phyt. Thlaſpi 28. ſiue ſpinofum.

Tabern. Icon. & Hiſt. Thlaſpi ſpinofum, Stender Thlaſpi/ oder Baurèn freß.

In iſtis præruptis montis Lupi ſaxis & cautiſſimus G. Cherlerus collegit Iulio ſiliquis ferentem: dudum habui, verum exiſtimabam eſſe Leucoium Patauinum ſpontaneum, conſideratis capſulis & non ſpinis.

Huc non malè poſſet reponi Galatiuida quam Honorius Bellus dicit ſpinofam, foliis eſſe Leucoii albi, floribus albis, ſiliquis rotundis. Verùm de ea lib. ſi. circa finem.

LEUCOIVM LVTEVM SPINOSVM.

Descriptio



Leucoium Creticum, quo nomine appellem, inquit Clusius, dubius sum. Nata autem est hæc planta etiam Iacobo Plateau, semine peregrinè accepto. Illam certè nascentem non vidi, sed iconem ipsius manu delineatã ad me mittebat cum breui descriptione idem Plateau. Eam videlicet crescere ad cubitalem aut maiorem altitudinem, & in multos ramos duros & lignosos spargi, quos cingent folia confertim nascentia, ineam & cineracei coloris, per oras nonnihil dentata: & sparsim in ramis multos flores nasci, flauos, quinque foliis constantes: eos autem ramulos initio latis tenellos esse, paulo post tamen, duros & spinosos enadere. Quale semen eius esset, non adscribebat, sed duntaxat sciscitabatur an Hippophæstum Dioscoridis esse posset. Sed cum Dioscotides suum Hippophæstum, humilem herbam esse asserat, sine caule, sine flore, inanis. tãtùm capitulis, foliisque spinosis, radículas habere molles & crassas, è quibus, foliis etiam & capitulo succus exprimitur, & in vsum adferretur, non video quã ratione hæc planta eius descriptioni accommodari queat.

Quoniam portò folia, Leucoii marini foliis non valde dissimilia habuisse videbatur, Leucoii spinosi appellationem obtinere posse arbitror, donec aliud magis aptum, & ipsi plantæ conueniens reperiat, tamen si flores eius pluribus foliis quàm Leucoiorum flores præditi sunt.

Miror apud Clusium titulo Leucoii spinosi additum Creticum, quandoquidem in descriptione non dicit Creticam stirpem, sed aliud ibidem tradit Leucoium Creticum, quod non spinosum.

THLASPI FOLIO ALLIARIÆ.

Descript.

Hæc folia infima lata & rotunda sunt: quæ autem superius in caulibus quos à fibrosa, obliquè acta, serpente, alba, tenui, lignosa, Alliumque obolète radice, plures emittit, teretes, leues, & cubitales, altioremque, folia inferiora sunt Alliariæ similia, alia ad Napy folia quodammodò accedunt, oblonga, auersa parte cæcia, aduersã in luteo virscentia, duabus pinnulis subrotundis caulem amplectentia, sapore oleraceo, nonnihil ad Cepas quoque accedente, è quorum alis rami enascentur, similiter foliati: flores Nasturtii aquatici, albi, quadrifolii: siliquæ vno loculo donatæ, subrotundæ, nulli fissurâ, semen continent singulæ singulum, flauum.

Obel. Icon. Plant. Camer. hort. Thlaspi Pannonicum. Clus. Pann. & Hist. post. Thlaspi mon-

anicum peltatum. Icon non ad eò feliciter in Belgica expressa vt necesse erat. C. Bauhin. Phyt. Thlaspi 4. sius Glattifolio.

Thlaspi Pannonicum primò vidi Argentinæ apud D. Fridericum Meyer, deinde Sturgardix in horto Ducis vnde attuli plantandum in Hortu Ill. E. C. vbi feliciter hiemem pertulit & floruit tota æstate, ac deinceps se propagat, folia inferiora similia sunt Alliariæ. Inuenitur vmbrosis locis ad arcem Steichenstein, & quã iter est ex ea arce ad Sieberg, nusquam alibi Clus. obseruatum: nunc verò eius operã, missis Viennæ eius Plantis, & semine ad amicos, Belgicis & Anglicis hortis in quillum factum. Floret Iunio, semen Iulio & Augusto ad maturitatè peruenit.

Locus Tempus



SCORODOTHLASPI VLYSSIS Aldroandi.



Scito, hercule, nomine Scorodotylaspi plantã hanc vocauit Cl. Vlysses Aldroandus rerum Naturæ sagacissimus vltigator, & apud Bononienses Phyllis celeberrimus: Hic Illustriss. Princeps D. D. Fridericû Duces VVirtemb. & Teceensem, Comitem Montbelg. & c. Dominum meum Clemensiss. eum Italia


Descript.

illas oras lustraret, multis peregrinibus seminibus exoticarum plantarum donauit, inter quæ & hoc fuit, quod sequenti anno in horto Montbelgardenti dicti mei Principis confutum in talem excreuit plantam, qualem modò describam:

Radice nititur singulari, albã, paneis fibris donata: ea veluti in capita diuicatur numeroso foliorum stipatu longis pediculis prædita, quæ ex principio angusto sensim ouatam figuram acquirunt, & subrotundo ambitu finiuntur, quorum priora foliis Bellidis quodammodò respondent, quædam leuiter lacinata, quædam paucis denticulis, alia ferè nullis donata. Color virens est, plusculis ex costa neruis excurrentibus. At quæ alterno

no posito cauliculis hærent *folia*, præsertim suprema, minimis cu alis caules amplectuntur. Cauliculorum fastigio *stolati* insident albi, parvi. Bursa pastoris vulgaris, quatuor foliis constantes, cum apice in medio, quos bursa sequuntur obliquæ, subrotundæ, cordatæ, non multum compressæ, ad Thlaspeos cordati burfus accedentes. Tota cæterum planta Allium redoler manifesto odoratu, ac etiam non tacta. Radicula & folia oleraceo gustu prædita sunt, grato, & vel tantillum acredinis sapidæ in faucibus relinquente, non sine halitu Alliariæ, unde apto nomine insignita ab excellentissimo Aldroando, cui viro hoc nomen obleruantia ac memoria *scymnus* lubentes reliquimus, eiusdemque vestigia historiarum nostrarum, tum alibi sæpe, ex merito tanti viri imprimere volumus. Noua est hæc plantula, nec à quoquam, quantum nobis quidem constat, hæctenus prodita. Unde nec alibi celebrata nominibus quam iam prælibato.

Montbelgardi. in horto Ill. C. Wirt. quem excolimus fata produxit flores & siliquas Iulio.



cautibus: *foliis* sinuosis, *hederaceis*, *car-nosis*. *Flos-culi* candidi & *semen* exile, in quibus gustu & habitu Thlaspi exprimunt.

Lobel. Obs. & Icon. Plant. Hederaceum Thlaspi.

Casp. Bauh. Phyt. Thlaspi n. siue repens Hedere, quod nondum videre licuit.

THLASPI ALEXANDRINVM
Cortasi Ioh. Bauhino.

ALISSVM VETERIBVS ET IN GENERE.

* CAP. V.

Varia est apud auctores Alyssi historia. Er quidem ex Dioscoridis sententia *αλυσσον* frutex parvus [*scymnus*: Ruellius addit vnicaulis] est, subasper, folia habens rotunda, circa que fructus, duplisis scuti figura, in quibus semen est aliquantulum latum. Nascitur in montanis & asperis locis.

Hoc, vt opinor, ab Alyssio Plinii discrepat, is namque videtur Rubiam minorem Alyssum facere, cum enim de Erythrodrano, seu Rubia maiore, dixisset, subiungit. Distat ab eo, qui Alysson vocatur, foliis tantum, & ramis minoribus.

Aliud insuper & Actius describit his verbis. Alysson aiunt esse Sideritim heracleam appellatam, que iuxta vias nascitur vbique, purpureum florem habens, & folia crassiora. Actij opinionem tuetur etiam Paulus. Cornarius autem diuersas herbas rectè statuit Sideritim heracleam, & hanc que propriè Alysson vocatur: quum illa impropiè, & tamen ab affectu, idem nomen adepta sit.

Galenus quoque de diuerso ab his Alyssio ex Asclepiadis autoritate loquitur. Alyssos, inquit, herba est Marrubio similis, sed asperior & magis spinosa (aculeata), circa pilulas (orbiculos) florem ad cæruleum vergentem profert.

Cæterum, *αλυσσον* Græcis, similiter Alyssum Latinis dicitur, quoddammodo à cane rabido mirificè iuuet, autoribus Galeno, Actio, Paulo, Plinio & Paufania.

Alyssi decoctum, inquit Dioscorides, potum singultus qui sine febre sunt soluit. Idem facit & detentum, aut naribus admotum, At cum melle tritum, lentiginis & maculas Solares depurgat. Putatur & canis rabiem sanare, cum cibo contusum & exhibitum [*αλυσσον κυνος ιδιου, σκυρατον ιδιου κωνος εδδεν*. Lat. ex vet. cod. *λυσαδον-της ιδιου σκυρατον εδδεν κωνος εδδεν*, commorosos à rabidis sanat contusum & in cibo datum.] Sed & id domo suspensum salutare esse dicitur, tum hominibus tum aliis animalibus, ne fascino lædantur. Quin & punicæo paniculo alligatum, pecorum morbos abigit.

Quod verò de singultu ille, idem Plutarchus



Milit ad me aliquando Cl. V. Dn. Cortusius plantam hoc titulo, *Thlaspi Alexandrino*, bella planta. Est autem herba dodrantalis, ex radice singulari quaternos caules emittens, teretes, glabros, multis alis cœcaus: ad quorum diuersiones propagationeque, superiote præsertim parte, *folia* singula vel

Pertoliata, ramos amplectuntur, subrotunda: ramorum extremis longa serie vtrinque ex breuibus pediculis appenduntur *siliquæ* circinatæ, quales ferè Thlaspeos tenuifolij Fuchsi, maiores, in mucronem leuiter obtusum desinentes, quas secundum longitudinem percurrit costa, à qua vtrinque valuula bipatentis siliquæ dehiscences abscedunt, dissepimento medio relicto, inque singulis valualis singula *semina* compressa, tustia, ex latiore basi in acutum desinente, videtur habere aliquid commune cum Thlaspi Hederaceo Lobelii.

C. Bauh. Phyt. Tlaspi n. Alexandrinum Cortusi. Io. Bauhin.

THLASPI HEDERACEVM.

IN Portlandia peninsula, Cornubiæ vicino portu Plumoune / aliisque maritimis Angliæ cautibus, repens herbula, dodrantalibus & spithamæis gracilibus *cauliculis*, striatis, puni-

scripsit, τὴν δὲ ἀλύσον κελαιένην ἐσπίνην ἐν λαβύρτι
εἰς τὴν χεῖρα ἀνοίει, οἱ δὲ ἐν σπέρματι ἐλάττει, ἀπαλλάτ-
τοῦται λυγρῶς: Id est, Alyssum herbari manu re-
nentes solum, alii vero intuentes, singulæ libe-
rantur.

Galenus dilucidius eius facultates declarat.
Mirificè iuuat morfos à cane rabido. Sed & iam
rabienti data sæpè ipsum sanauit. Et hæc quidem
facultas ex similitudine totius naturæ constat,
experimentoque solo cognoscitur, nec ratione
percipitur. Alioqui ex vlu comperitur modera-
tè siccare ac discutere, & aliquantulum exterge-
re. Hæc ratione & vitiligine.n & maculas faciei
à Sole prognatas expurgat.

Ac acne coninorfos, Plinio etiam teste, rabiè
sentire non patitur, potus adalligatù que. Miri
est quod additur, sanieum conspecto omninò frati-
cie licari. Infanti sanari ex veteri codice Corn-
legit, qui ta.nen non infaniam, sed singultum le-
gendam ex Plutarcho putat. Ex Galeno, inquit
is, & Plinio clarè patet, commotis à Cane ra-
biofo fraticem siue herbam Alysson auxiliari:
Vetèrè Dioscor. verba ita iacent, vt ipsius canis
rabieum sanare dicere videatur: ἀλλὰ τὸ αἶμα τῆς
νύκτος ἰσθῶσαι, καὶ γὰρ τὸν ἐδύσκατον ἐν δόξῃν: nisi ἄλλο τι κωδὸς
eam rabieum que ex Cane homini inducta sit ac-
cipere velinus.

ALYSSON SILIQUA LATA ASPERA
quibusdam Lunaria flore luteo.

Descriptio



Alysson
Diosco-
ridis putata
herba, radice
simplice & li-
gnosa, candi-
cantique niti-
tur, sapore præ-
dita feruido:
ex qua plures
eriguntur ca-
ules, recti, rigi-
di, incanà lan-
nugine hirti,
qui eis fastigiū
in ramos ali-
quot abeunt,
in quibus flo-
res numerosi,
parui, melini,
Erysini flori-
bus magnitu-
dine & formâ similes, ex quatuor foliolis contex-
ti: quibus delapsis siliquæ oriuntur ex oblongo
rotundatæ, villo atpero rectæ, compressæ, semen
claudentes similiter compressum: siliæ gemi-
natione prima ex oblongo rotunda, postmodum
in longum protractiora, in obtusum mucronem
desinunt, nonnihil sinuata, Leucioi foliis imilia,
albicanria, hirsuta & tactu aspera, sapore olera-
ceo prædita.

Dodon. Gal. Alysson Neotericonum, quorun-
dam Lunaria maior.

Gesner hort. Alyssos Dioscoridis Dodonæo:
Lunariæ maioris species aliquorum. Lunariæ
Græcæ similes producens siliquas herba Alyssos
cognata. Et de coll. stirp. Lunariæ species. Lu-
naria lutea. Alyssos quorundam. Lunaria à
Gratarolo missa. Itē nō de Lunariis. Ab Vlyf-
se Aldroando herba missa, Lunaria appellata. A-

lysson Dioscoridis existimatum.

Lobel. & Pen. in Adu. Alysson, & nonnullorum
Lunariam appellant, & dicunt, nullâ melius A-
lyssos Dioscoridis quadrare. Iidem cap. de Thla-
spi Narbonensi, Alysson Belgarum & Franco-
rū vocant. Lobel. Obs. & Icon. Plant. Alysson Diof-
coridis putatum.

Cæsalp. Lunaria tertia, Alysson Dioscor.

Hist. Lugd. Alyssum Dodonæi, Recentiorum
quorundam Lunaria maior. Alyssum Dalechan-
pii.

Casp. Bauh. Phyt. Lunaria 4. siue lutea aspera:
ἀλύσον. Dioscoridis.

Hort. Luisit. Alyssum Dodonæi, Lunaria lutea
siue Græca.

Alysson siliqua lata, aspera, Lugduni mihi e-
rat in horto. Basilee in hortis siliquas fert lunio
mentis, Septembri semine maturo: mihi etiam
obseruata est in hortis Parauii Bernardi Triuefa-
ni: Ferrariæ Monasterii S. Dominici à l'Angeli.
Bononiæ vt S. Saluator al burgo di S. Catharina.
Flotentiæ: & Parme Nobilis Ant. Ludatæ flo-
rens April. Montbelgard. in horto Il. E. C. hie-
men perfert, semenque abundat Augusto & Se-
ptembri, florens adhuc Octobri.

ALYSSON ANGVILLARÆ.



Hoc nomi-
ne inter
Valeradi Dou-
rez plantas her-
bam Maenio
fruticofam, ra-
mis, duris, li-
gnosis, tereti-
bus, hirsutis: fo-
lia similia Thla-
spi minori, vel
Alyssos minori
quorundam,
laciota, asperiora
hirsuta, subro-
tunda, in obtu-
sum acumen de-
sinentia, siliq. e-
câ sunt dispositæ
serie quâ in iam
dicto Thlaspi,
hirsutis pedi-
cellis hærentes, com-
pressæ, circumatæ rotundita-
ris, in umbonem modicè protuberantes, triplo
maiores quàm Thlaspi modò dicti, multum aspe-
ræ, stilum exiguum e summo proferentes, mein-
branulâ lucidâ valualas determinante. Semen
quale sit, nequeo animaduertere: nec quales
fuerint flores autem, licet adhuc videri adint, asse-
rere: videntur tamen lutei vel pallidi fuisse.

Matth. in post. com. Ital. pingit hoc Alyssum
ex sicca procul dubio planta, ac ait. Cum sciam
multos bonos Simplificis plantam, cuius figurâ
apponimus, verum Alyssum existimare, appone-
re volui: quamuis non respondeant omnes notæ.

An Lobel. & Pen. Adu. & Icon. Plant. Thla-
spi Græcum propinquius fortè Dioscoridis Poli-
gonati (Poligoni) folio aut Oleæ, Lentis semine?

Considerandum sinè quantum differat hoc
Thlaspi ab Alyssos, de quo Anguillara epit.
12. pag. 217. An Cæsalp. Thlaspi quoddam genus
in monte S. Iuliani in Pisana, floribus luteis: fru-
ctu lato ac valdè depresso, diuino specie duorum
nummorum?

An

A. C. Bauhin. Phyt. Thlaspi 21. siue Alysson dictum primum. Matthioli Alysson Icon. 4 p. 498. Thlaspi Græcum propinquius Diosc. Polygononati folio aut Oler, lentis semine Lob. icon. p. 213. flosculis albis interdum luteis? Apud Lob. in Adu. & Pl. Icon. legendum Polygoni folio & Typographi errore positum esse Polygonati fati apparet, quæ obscuro similitudo Polygonati cum olea? in descriptione præterea dicuntur folia pusilla, glauca, albidæ, Leucoii lerei, sed multo minora: quæ sanè nihil commune habent cum Polygonato: Miror hoc non correctum. Quisnam scripsit de duplici colore florum?

bat Gesnerus, obseruauimus Monspelii cum effemus secus viam quæ itur Frontignanum & ad montem. propè *Castelnou* non longè à fluuiio: hanc eandem priùs videramus in peregrinatione nostra Rhætica cum Gesnero in monte Burmio vicino, cum semine maturo Iunio mense. Genex? fata in horto nostro primò pullum caulem protulit, tota hinc integrè folijs abundauit & sequenti anno maio Maio mense floruit. Frater C. Bauhinus Monspelii florentem etiam Maio & Iunio obseruauit. Montbelgardi in hor. Ill. E. C. Wirt. eodem anno quo fata, floruit & semen maturuit Augusto & Septembri, hiemem pertulit: semen fuit mistum per fr. C. Bauhinum. cum hac inscriptione, Thlaspi species Bononiæ. Basileæ vidi florentem cum semine maturo Augusto in horto D. Dis. Jac. Zvingeri. In partibus Monspelienibus hoc Thlaspi collegit Lobel. & minorem Lunariam alteram vocitabat. Hæc primùm culta in hortis Italicis & peregrina credita. Supra Badenenses thermas, viciniquè collibus, adeoque totà illà collium catenâ, quæ per Leytenberg & supra Manderstorff ad Danubium vsque versus Orientem excurrit, copiosè authore Clusio nascitur.

Locus & tempus

Cum Leucoio, purpureo præsertim & albo, in folijs & viribus nonnulla hæc communia Lob.

LVNARIA BISCUTATA.



Biscutata Lunaria caules habet exiles, pedales, & cubitales, tenues, teretes, in alas aliquot diuisos, paucis folijs donatos: ea enim magna ex parte statim ex radice mediocriter crassa [Bursa aut Malua Lob.] exorta perterram sparguntur, palmum longa, & breuiora, paullo semenciâ la-

tiora, sinu ita aspera, hirsuta, ca hirsuta [Lobelio albent, Hieracii aut Leucoii, sed minora:] alarum extremis flores coaceruati tenuissimis hærent pediculis, luteoli, parui: at quæ hos sequuntur pericarpia pulcherrima, foliacea, peltata [semè pellucida Lob.] didyma, ad ligulam extra scutulam quoque prominulam adnexa, quorum singulis singula clauduntur femina latiuscula, orbiculata, compressa, ruffa (Leucoii purpurei & albi sapore & eligit potius quam Nasturtii Lobel.)

Et hæc est illa, quam Lobel. & Pena Adu. Thlaspi patuum Hieracifolium, siue Lunariam luteam Monspel. & Leucoium luteum marinum (Biscutellam, addit Lobel. in Icon. Pl.) Lunariam minorem alteram vocitant. Huic nullus locus certior quam inter Thlaspi omnium iudicio putatur. Hæc primùm culta in hortis Italicis vocabatur Leucoium marinum non ita magnâ similitudine.

Clas. Pann. & Hist. post. Thlaspi clypeatum. Thal. Leucoium montanum.

Camer. hort. Thlaspi bifulcatum, vel Lunaria bifulcata à Clusio & Lobelio depicta. Crescens copiosè propè Capuam, folijs aliquantulum diuertijs, ferè Napi vel Rapistræ, altitudine sesquipedis non multò minor.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi minus clypeatum 1. Flein Schud Thlaspi.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi 24. siue biscutatum maius folio crasso hirsutissimo.

Lunariam biscutatam seu Didymi, vt nominat-

LVNARIA PELTATA MINIMA quibusdam ad Thlaspi referenda.



Inter Valeraudi Dourez plantas sine nomine plantulam pulchram reperi-mus quam etiam Gener Cherlerus articulur collectâ in Nemaufensi agro: Ea palmo breuior plâcula, radice simplice, lignosâ, vnde plures pullulât colliculi, simplices aliâs, aliâs etiam alis concavi, in terram repandi, tenues, asperi, ex rubore obscuro incani: per quos foliola alternata, aspera, & inferiore præsertim parte incana, Thlaspi minoris folijs similia, sed multis numeris minora: flosculi luteali summis hærent colliculis & ramulis, quos densò agmine stipati consequuntur orbiculi foliacei, glabri, maiores quam Thlaspi dicto: sub quorum umbone minimum elato semen coërcetur singulare, minutum, rufum.

Descriptio

Thlaspi alterum minus Clypeatum Serpilli folio Narbonense; nuspiam Lobel. & Penæ visum, nisi in agro Norbonensi Monspelienisque, locis squallidis, sabulosis, prope pusillas Anchusas.

Casp. Bauhin. Phyt. Thlaspi 25. siue Clypeatum minus.

k k k k

BURSA PASTORIA.

CAP. VI.

Bursa pastoris nonnunquam palmaris, pedalis, & cubitalis interdum planta, radice nititur recta, alba, fibrosa, sapore subdulci & nauseoso: à qua prodeunt folia oblonga, modò integra, aliàs profunde in ambitu laciniata, nonnihil hirsuta, pediculis ferè vicialibus, cum superiora in caulibus nec pediculis quidem habeant, immediatè adhaerentia, inter folia exurgit caulis vnus, ternis, quaternis, qui rursus in ramulos diuiduntur, qui à medio ferè ad summum vsque fastigium

stipulos nullo ordine emittunt, pedicello tenui semunciali, paruos, albos, ex quatuor foliolis constantes, & in medio staminibus aliquot lutea habentes, interdum corymbatim in summo caule quasi umbellam conficiunt: quibus succedunt seminum receptacula ex acuto principio in latiusculam bifidam crumenulam



Descript.

definentia, semina Brunfelsio parua & nigra. Hæc magnitudine & foliorum diuisura mirè ludit, vt quis diuersas possit suspicari species.

Guido not. Guido, nimis licentiosè Galeni locum interpretans ait Polygonum esse virgæ vel Bursam pastoris: Polygonum & Bursa pastoria multum differunt.

Euchar. Reesl. Bursa pastoris & Pera pastoris. Brunfels. Bursa & Pera pastoris maior, cui descriptiones Dioscor. de Polygonia & Sanguinali minime quadrant.

Cord. in Dioscor. Bursa pastoris, Flein Sassekraut, id est, Bursa pastoris minor.

Trag. Bursa pastoris, Bursa pastoris maior & vulgarissima.

Cornar. in Diosc. credit Bursam Pastoris vulgi Medicorum esse Herbam Medicam. Sed Descriptio Medicæ Cornarii non conuenit cum Bursa pastoris vulgi Medicorum, suspicio mihi aliqua oritur de Crista gallinacea, vel Cornarium nescire quid scibat, stirpium enim non fuisse peritum suis ex libris satis apparet: vulgi autem Bursa pastoris vel Christa gallinacea nullo modo conuenit cum descriptione Medices.

Mathioli qui sine descriptione pingit, ait non defuisse, qui Thlaspi & Bursam Pastoris vulgò dictam, vnam & eandem esse plantam existimarint sed eorum sententiam prorsus explodendam merito censet. Licet enim figura similis esse concedatur, attamen quod Lactuca monet, viribus & temperamento multum differt.

Cæsalp. qui Bursam pastoris vulgi inscribit foliis Erucae, semine exiguo & flauo, sapore sub-

semisub-
are

cri: at totâ herbâ insipido & glutinoso, ait apud Antiquos inter Thlaspi genera numerari. Id autem Thlaspi descriptionem Dioscoridis partim ostendere: nam folia in cacumine diuisa, & fructus in extremo latos huic plantæ magis conuenire. Ex Galeni historia colligere licere Bursam pastoris esse Thlaspi deterius. Ac Bursam nostram pastoris Capsellam dici inter cætera nomina Dioscoridi ascripta.

Fuchs. hist. & Icon. Dodon. gall. & lat. in fol. Bursa pastoria. Gesner. hort. Bursa pastoris maior & minor. Bursa pastoris, Thlaspi fatuum. Lobel. Obs. & Icon. Plant. Bursa pastoris. Cam. hort. Bursa pastoris eleganti folio instar Coronopi repentis. Eidem in Matthiol. hist. Germ. & Epit. vt & H. Lugd. Bursa pastoris. Tab. Icon. & Hist. Bursa pastoria maior. Item Bursa pastoria minor.

C. Bauhin. Phyt. Bursa pastoris prima maior folio sinuato. Secunda Bursa maior folio non sinuato, Bursa pastoris folio integro. De qua ait: Natura lusum tantum existimabamus, verum cum aliquot annis idè obseruauerimus, à priori distinguendam censuimus. Tertia Bursa pastoris media, Tabern. Bursa pastoris minor.

Schvv. Cat. Sil. Bursa pastoris maior, Siles. Teeschelkraut / Sassenkraut / Hutterkraut.

Bursa pastoris, vulgò Officin. & It. Bursa pastoris, aliquibus Pera pastoria, & Pera pastoris, nonnullis Herba Cancri, Crispula, Sanguinaria & Sanguinalis dicitur, nec iniuriâ, [vt videtur Trago] cum sanguinis eruptiones sistere possit. Videtur tamen ipsi non Sanguinalis sed Sagminalis esse legendum, quod si firmum esset, certè hæc planta non procul à Verbena prima Dioscor. distaret. Nihil tamen affirmat. Inuenimus nos manuscriptum per Leodigarium Ritzianum Bursam pastoris esse Io. Frisio in Dictionario Lonicitum alteram Plinii, Germ. Teeschelkraut / Teeschelkraut / Hutterkraut / & Hirtensekel: belg. Borselens cruyl. Gall. Bourse de pasteur ou Berger & Tabouret. Geneuens. l'herbe d'Espingler. Castil. Pany quesillo. Hung. Pastor & Zenyé. boh. Fodossfa.

Bursa pastoriæ vidi florentem Martio, Patavii Februario. Genevæ passim Ianuario, Martio, Maio, Nouembri. balilea florentem adhuc Octobri, Lugduni abundat. Montbelgardi floret Martio, ac interdum tota hieme etiam in horto Il. E. C. spontanea, ad hortum ferarum vidi florentem Aprili, folio non sinuato, an perpetuo talis nondum obseruavi. In Ducatu VVirttembergico circa fontem Admirabilem florens Augusto, In monte Teck Octobri. Secus vias locis desertis & incultis, ac in ruderibus vt plurimum spontè prouenit: & quandoque maior, lubinda verò minor, & omnino exigua. Floret, viget, ac semen perficit totâ æstate.

Vires huius non vulgares celebrantur, ex acetone enim, id scribente Fuchsiò, trita collectionum inflammationes refrigerat, ac eò confluente humores cohibet: imponitur sacris ignibus & quibus stomachus æstuat. Succus eius purulentis auribus infunditur: cruenta sanar vulnera, mirè efficax est in comprimendis omnibus sanguinis eruptionibus. Bursa pastoris siccata, ait Tragus, vino rubro vel aqua pluuiali, in qua chalybs cadès extinctus fuerit, decocta, ac pota, dysentericis ac lientericis, fluxiones alui cohibet, vrinæ sanguinolentæ medetur, sanguinis excretiones, mensuramque abundantiam profluuii sistit, omniumque

Thlaspi
genus:

Nominâ

Locus &
tempus

Vires

umque internorum viscerum quasvis erôsiones sanat: eadem aqua destillata per aliquot dies continuos mensurâ quatuor aut quinque cochlearium pota efficit. Errhinon ex lineo panno factum, succoque herbæ idem factum ac naribus inditum, sanguinem sistit: idem succus, vel aqua etiam destillata, vulneribus recentibus collendis vtilissima sunt: Multi in ea sunt sententia, vt credant, sanguinem è naribus aliusue vulneribus manantem cohiberi, si herba saltem, apud cum hominem incaluerit.

Bursa pastoris, autore Matthiolo, ex refrigerantium est, exsiccantium & adstringentium genere. Quapropter prodest trita & emplatri modo impolita inflammationibus & sacris ignibus, decoquitur pluuiâ aqua: cum Plantagine & Armenio luto, bibiturque eius decoctum ad intestinorum difficultatem, & ad cruentas excreationes. Sistit mensium abundantiam, si eius & Perficariæ decocto insideant mulieres: esturque ad idem, & contra denique omnes fluxiones efficax est, tenui puliculi circumlita & in oleo fixa: additur in emplastris, quæ ac capitis vulnera componuntur, & in vnguentis copulibus: ad gonorrhæam accipitur vicia vna succi è recenti herba expressi, cuius si copia non detur, dupli n iuris decoctæ nec herbæ, additis camphoræ granis tribus, bibiturque diebus aliquot continuis. Succus cum Aezoi succo aur acetio mistus partium calidas collectiones, & sacrosignes extinguit. Sunt qui scribant Bursam pastoris Icterus profigare, si simul folia, flores, & Theæ calcis indantur, vt nudum pedè cõtingat, eoque modo deambuletur: decoctum in collatione omnes sanat faucium mores. Succus vtiliter podagræ calidæ pudendorumque fetuidis tumoribus illinitur. Celebris ad Languinè sistendû & fluxiones repellendas, succo potio in sputo sanguinis & dynteria, trahitur & super varos ad sanguinem inde fluentem. Cæsalp. Herbam ex aceto terit & carpo adhibet vt fluxum sanguinis sistat, & rigorem tertianæ compescat. Bursa pastoris frigidam & siccam in tertio gradu censet Lacuna, ac idè restringere omnem partem, & reprimere omnis generis fluores.

Lacuna bellum mouet Lob. eumque cum pluribus aliis taxat, dicens: Guitu non perinde vt Thlaspi acris, sed exiccante potius quàm refrigerante. Nam qui quia sanguinem sistat (sistit autem strenuè) frigidam faciunt, infelici argumento videntur, etenim umbellæ, floresque gustanti aliquid acrimoniæ inveniunt, indicioque sunt siccando colligendoque sistere, vt portii succus, vitriolum, vitrica: non refrigerando: trita carpis imponitur, additâ Plantagine, ad tertianas spurias, purgato prius corpore. Ad hæmorrhagiam sanguinis ex quacunque parte fluat Bursam pastoris contusam, cum aqua frigida applicat Timot. Rosl. parti vnde fluit, & subito cessat. Si è naribus fluit aut ex alio capitis loco, apponit capitis pulibus, subitoque supprimit. Aquam destillatam Bursæ pastoris aut decoctum eius menstruos fluores & dynterias rubras potam compescere scribit Brunfels. Sic & pefsum ex corone factum & succo eius intinctum naribus inditum sanguinem inde fluentem sistere. Herbam gestatam cum naturali calore tepefacta fuerit, idem quoque facere pehibet, quod difficulter credimus, & quia res herbaria certè infinita est, id aliorum obseruationibus iudiciis & experientis conferendû relinquitur.

Tom. II.

BURSA PASTORIS PARVA
folio glabro, spisso,



Bursa i-
sta parua Descrip
ethradice vni-
câ, sed in tenuiore sub-
diuisa: folium
primum sim-
plex, rotundum,
paruum, alia
Bursæ maioris
more aliqua-
tenus laciniata,
crassa, glabra,
vix sextantalia: cauliculi
singuli vel
plures, dodrâ-
rales, ac etiam
minores: si
culi multi simul,
albi: sili-
qua rotundio-

res quàm in vulgari. In foliis nullum manifestum saporem animaduero, in summitatibus ingratus est.

Plant. Icon. Pastoria bursa minima.

Tabern. Icon. & Hist. Nasturtium petrarum, C. Bauh. Phyt. Bursa pastoris 4. siue minor: Bursa pastoris 6. Tragi sine icone. hinc autem Bursa pastoris cum non sint vascula, vt vult Tragus, acinis peporum similia, merito existimo Tragi Pastoriam bursam 6. huc non referendam; sed ad sequentem.

In eue Mafmâster, Than, & Fraußmatten inueniuntis Aprilis sine Bursam pastoriam hanc, antehac non visam; reperi quoque in maris quibusdam inter Remiremont oppidum Lotharingiæ & Plumarias Thernias, paruum, singulari caule. Nobis etiam dara sicca Argenting à D. Vldarico Chelio Medico insigni. Basileæ ad margines aruorihm vteunque raro, præsertim extra syluam propè Wyl pagum obseruauit Gener Chelersus.

Locus &
tempus

BURSA PASTORIA MINIMA,
oblongis siliquis, verna, loculo, oblongo.



Bursa hæc Descriptio
minima,
radice est tenuis-
sissima & radicem
fibrosâ: à
qua per terrâ
sparguntur
silia multa in
circulum ob-
longa & angusta,
& mucronata,
vix vnciam longa
interdum rubentia,
hirsuta, viridia
modò, modò rubè-
ria, oris per extremû
aliquot arenis
incisis, sapore pri-
kkkk 2



Barbarea, cauli apprimis, sed abscedentes diducit: flores singulis ramis multi coherent, patui, albi, quos excipiunt serie longa loculi burse pastoris sublongo loculo similes, bifores, qui in medio striam habent, quorum altrinsecus abscedentibus valuis semen apparet minutum, relicta dissepiete membranula.

Hanc plátam cum liccam ante 30. annos misissem D. Gesnero, ad eam annotavit, videri referri posse ad Myagri sylv. speciem. Sed perinde est sine ad Myagron, siue ad Bursam pastoris referas, inquit C. Bauh. in Phyt. qui huc inter Bursas pastoris sextum locum dedit, ac Bursam pastoris loculo oblongo maiorem appellat.

Montepelii Martio florentem & siliquis ferentem legi, quo mense etiam Basilicæ locis campestribus siccoribusque proacnre solet.

Bursa pastoris affinis herbula foliis Thymi.

Humilis quedam herbula affinis Bursæ Pastoris, copiosa in Sicilia & in Plumbinenti agro fecus vias: ramulis dodrantalibus multis humi procumbentibus: foliis Thymi, rotundioribus, candicantibus, subhirsutis: quæ *st. scutos* fert tota hyeme candidos, veluti in capitula aceruatos, in summis ramulis, odore quasi simillimo flavo mellis, fructus minutos Iberidi similes: Planta insipido sapore constat, vt Bursæ pastoris, Casalp.

DRABA VETERIBVS.

CAP. VII.

Authoritate Dioscoridis *Δεδρα*, herba in cubiti altitudinem assurgit tenues spargens *virgas* & ab utroque latere *solia* veluti Lepidii, teneriora (*αμαρότητα*, quod etiam significat molliora,) tamen & candidiora. In summa vero parte umbellam quemadmodum Sambucus [*εικον*] quæ flores habet albos (*αλβη νευδη*, vulg. *νεστα*) (tenues,) ac sic etiam Manardo legi placet: Huius herba coquitur cum prifana, maxime in Cappadocia. At fructus [*καρπος*] ipsius aridus, Piperis (*πικροπερος*) loco obsonis miscetur. Et quoniam hæc postrema, At fructus *ερε*, Plin. de Dryophono tradit, Cordus coniectura ductus (non quidem sat probabilis nostro iudicio,) Drabam Dioscoridis cum Dryophono Plinii vauum & idem esse existimat.

Scrapio Drabam, Oribasio Braben dictam (inquit Sarrac.) Nasturtii generibus annumerat, & Nasturtium Orientale appellat. Cæterum inter notha Aldini exemplaris, hoc ipsum caput,

vt Hermolaus habet, cum Arabidis herbae inscriptione repetitur, ita vt Arabis & Draba vnius & eiusdem plantæ diuersa nomina fuisse videantur.

At ab hac opinione alienus est Cornarius ac Drabam herbam supposititiam esse in Diosc. & ab aliquo adscriptam existimat: eò quòd bis in hoc libro habeatur, tum hoc loco, tum ad finem post Glastum ante Telephium intrusa. Sed istic Arabis appelletur, & aliàs eadem de ipsa tradantur, iisdem etiam verbis: vt nec de nomine, nec de re fitis constat: maxime quoniam apud nullum alium Scriptorem, neque Drabes, neque Arabidis herbe mentio fiat, altero sanè ex altero corrupto. Quare non videt, quantum fidei debeat haberi his, qui Nasturtium Orientale, vel Babylonium esse Drabam dicunt: aut etiam Cuminum syluestre.

DRABA MVLTIS FLORE ALBO.



VIx cubitū superat

Descriptio

Draba, *carle* rotundo, striato, ex radice lignosa surgente, multiplice: quem *solia* alternatim basi imà amplectuntur, oblonga, vnciam & sesquunciam lata, sinuata: *caulium* fastigia in creberrimos abeunt sarculos, & ipsos quoque foliosos: quibus umbellam insident *stoberti* candidi, quibus delapsis *capsule* suboriuntur, corculum imitata ex cono stylum exiguum prominentes, quæ binis suis loculis toridè *semina* parua ruffa continent.



Nascitur, inquit Matth. in Ananienſi agro planta foliis Lepidii non dissimilibus, & umbellâ ferè Sambucii, Drabam ad amulſum referens, quemad-

modum & in Galliis nasci Ruellius testatur.

Camerarius cui ad Hist. Germ. Matth. & Epit. Arabis siue Draba dicitur, habet folium in sua icone valdè hirsutum, nos talem hirsutiem non Kkkk 3

obseruauimus. Pannonica (sive Draba hirsuta est, verum pili breuiss. eaque non solum serrata, sed etiã laciniata, vt obseruauimus in planta nobis per Agerium dara pro Pannonica in Austria collecta. Monspelienii concolor nobis videtur & eiusdem formæ. Eidem in horto Arabis verior.

Lobel. & Penx Adu. Obs. & Icon. Plant. Arabis siue Draba. Hiit. Lugd. Arabis seu Draba Matthioli. Casalp. Draba. Clus. Pann. & Hiit. post. Draba vulgaris 1. folio in ambitu dentato ex viridi cinereo, sapore acrisufculo &c.

C. Bauhin. Phyt. Draba prima umbellata: quã ait Matthiolum, Lonic. & Lugd. dentatis pingere foliis, quod hætenus in ipsa planta obseruauit: at Lobelium, Castor. Clus. licet hic dicat dentata, foliis integris delineare.

Nomina

Draba multis flore albo, græcè *Αραβίς*, *Αραβή* & *Δραβή*, Arabis siue Draba, nonnullis Nasturtium Babilonicum & Orientale. It. *Draba*. Ger. *Turfsich* Freß: Gall. *Drane*.

Locus & Tempus.

Drabam Monspelii in marginibus quorundã agrorum iuxta urbem: Patrum in horto publico & apud Cortusum florere vidi mense Martio: Frater florentem obseruauit Maio. Nulli ferè agrorum margines circa Viennam, totãque adeò inferiore Austria, hac plantã, non sunt oblit, quæ subinde in ipsa etiam atua latè irrepit. Florer Maio & Iunii initio, semen sub Iunii finem maturum est. Meminit Clusius etiam hanc plantam legere in Insula illa quæ facit Rhodanus in duo cornua diuisus inter D. Aegidii Fanum & Ate-latem, dum Massiliam proficisceretur.

DRABAE SPECIES GLABRA.

Descriptio

Pro Drabæ specie dedit nobis plantam D. D. Agerius Argentinenis Medicus, collectam in horto Bononiensi, quæ multa habet similia cum Draba ante descripta, excreuit tamen penè ad duos cubitos, quantum colligimus ex plantis siccis, an vnum vel plures ferat caules ignoramus, ii tamen sunt concaui, glabri: per illos alternatim caulem amplectentia folia serrata vel laciniata, sed minora multò longitudine & latitudine, in ramos superiores partes diuiduntur, qui longiores quidem: sed minus se expandunt: *stipuli* minimi albi: quibus *capsula* succedunt parua.

DRABA MINOR CVM ORBICVLARIBUS CAPITULIS.

Descriptio

Draba minor: Drabæ genus minus Clusii sine iconè, multa promit à summo *radicis* capite *foliola*, longis pediculis nixa, aliquantum angulosa, villis quibusdam obstita, inter quæ gracilis exilit *cauliculus*, palmaris, paucis foliis longioribus præditus, qui à medio ferè ad summum orbicularibus capitellis onustus est, membranulã in binas partes diuisis, *semen* exile, fuscum, continentibus: *radix*, pro plantæ exilitate, satis crassa, paucissimis fibris donata: viua vbi arbitrat, nam præcedentis anni cauliculum adhuc retinebat ea planta, quam Gulielmus de Mera Medicus, in itinere obseruatam, & inter chartas repositam, floribus tamen carentem, Clusio Francofurti donabat Anno 1593.


LEPIDIVM PAULI.

CAP. VIII.

EX radice digitali repente surgit caulis singularis, rectus, gracilis, læuis, fungola medulla factus: bicubitalis & altior: *folia* Mali Citria, sepiùs maiora, in ambitu crenata, rigida, ex vitidi in luteum vergentia, sapore Sinapios: *stipuli* pusilli, copiosi, albi, apicibus herbidis.

Ambæ nostræ icones sunt ex Guarinianis, quam autem plantam denotet secunda, nondum nobis constat.

Facile autem nobis persuademus plantam



quam hic tradimus, nempe Pipertin, esse Lepidium Plinii Dioscot. Galeni, & Pauli, diuersã plantam ab Iberide Dioscot. Plinii & Democratis, vt monuimus antè capite de Iberide: in quo nobiscum sentiant plures, vt Marantha.

Quæ autem Veteres tradiderunt de Iberide & Lepidio, item æquiuocationes, nos tradidimus antè.

Herm. hanc fortè existimat in Diosc. Lepidium Columella sitiuum, Plinii peregrinum

Lepidium, Raphanum in Pannonia dictum, Pauli Lepidium. Ruellius ad radicem siue Raphanum reculit.

Lepidium Antiquorum, Piperitis &

Siliquastrum Plinii multis putatur, quam secutus sententiam aliquando est Brassauolus: nunc verò mutauit, & Pauli & Plinii Lepidium existimat, ac etiam Dioscoridis, distinguit enim ab Iberide eiusdem. Serapionis & Arabum etiam Sceiteragi facit, ostendens Auicennam postremo loco de Sceiteragi confudisse Iberidem & Lepidium. Vocat præterea Pencerellam.

A Cordo descenditur & vocatur Lepidium siue Hiberis maior. Item Piperina & Zinziberina.

Lepidiũ



Lepidium Columella sitiuum Plinii regr.

Raphanum

Lepidium Piperitis

Siliquastrum non est.

Sceiteragi Arabum. Auicennam error: Pencerella Piperina, Zinziberina.

Lepidium, inquit Tragus, est Germanis dictum pfefferkraut, hoc est, Piperitis Senfferaut: nam ad Sinapi referti posse neminem latere puto.

Matth. in Diosc. non potest non admirari, quod tam facile crediderint Hermolaus, Manardus, ac Ruellius illos secutus, Lepidium eam plantam esse quae vulgo in Italia appellatur Raphanus; nisi nostratam Piperitum, quae proculdubio Plinianum refert Lepidium, Raphanum vocauerint.

Fusch. ab Iberide distinguit Lepidium, vulgo herbariorum Piperitum.

Lepidium Diosc. & Piperitum Anguill. diuersam facit à Galeni Iberide & Lepidio.

Lacun. in Diosc. vocat Lepidium Plinianum & Pauli, & Piperitum vulgi.

Gesner. hort. Lepidium Aeginetæ, Senfferaut, Romæ Crapinella dicta.

Apoll. rad. i. in Triphera Saracenicæ magna, Lepidium Plinii, Iberidem Pauli secundam. Idem cum Piperite maiori, vulgo herba Pueræ [si herbulae nomine dignaretur, sique Actio non reclamaret] cum Anguillario Dioscoridis Lepidion concluderet.

Piperitis Neotericorum seu quorundam siluestris Raphanus, Gall. Passerage, Germ. pfefferkraut / Belg. peper crust / Videtur Lepidium Pauli & Plinii, non item Dioscoridis: Non est etiam Piperitis Plinii, licet interdum ita vocetur.

Lobel. & Pena in Adu. merito tuerent Ruellium aduersus Matthiolum cap proprio de Lepidio, dicentes: Piperitis, Galliae plerumque passerage, Pauli etiamque Plinii Iberidis siue Lepidii notas explere: futiliter Senensis Barbaro & Ruellio insultat quum lapsos dicit, vt putarint Raphano Italici dictum Lepidium esse: perspicue Ruellius hunc errorem detexit. Hodierna die vocatur Raphanus aggregatis Officinis & mulierculis Belgis: Gallica plebecula etiam nomine Raphani syluestris Piperitum seu Lepidium vocitat, vt mouet Ruellius Matthiolum decipiens, nequaquam deceptus. Lobel. Icon. Plant. Raphanus sylu. offic. & Lepidium Aeginetæ vocatur: Idem ait & in Obseru. vbi etiam Lepidium maius Cordi & Tragi nominatur.

Hist. Lugdun. Lepidium Pauli & Plinii, Lepidium à Diosc. proflus diuersum. Lepidium Pauli & Plinii primum, siue maius, à Recentioribus Piperitis nuncupatum.

C. Bauh. Phyt. Lepidium i. siue latifolium.

Hort. Lust. Lepidium Pauli Aegin. & Piperitis cum Brunfelsio, tum (non est autem Piperitis Plenii acerrimo gustu linguam vellicante) ab Offic. Raphanus sylu. [non ille quidem de quo post satium diximus, neque Raphanus rusticus] sed qui à Gall. Passerage nominatur.

Lepidium siue Piperitis Geneuæ in hortis copiose prouenit & serpit admodum: in horto meo pulchre, denique tota hieme virebat, florbat mense Iunio. Spontè prouenit apud fluium Montpelii. Lugduni, Basileæ, & Montbelgardi in hortis meis & alioere stotens Iunio & Iulio, suo reptatu in areis infesta hortulanis, Parauit in horto Musati, vidi & Ferrarise in Cœuobio S. Dominici à L'angeli.

LEPIDIVM NON REPENS.

Radix fibrata, ex qua folia oriuntur primum palmaria & setquipalmaria, angustiore principio, penes pediculum sextantalem aut quadrantalem, sensim dilatata ad ternas circiter



Lepidio Pauli aliquatenus similes.

Per lignolos ramos, inæquales, buxcos, variè diuaticatos, folia Ocyimi foliis respondentia, acuminata, hirsuta, sapore acrisulo: flores extremis ramulorum confertim congesti.

Locus & tempus

Descriptio

DENTILLARIA RONDELETHI.



St. Jones Descriptio

Smultos, setquicubiales emittit, strigatos, nigricantes, in alteros ramos crebro diductos: folia pininis caulem coplectuntur, glabra, atroserentia, seruidi saporis, Conyze foliis paria, per extremos ramulos multis numeris minoras: flores cacuminibus hærent Kkkk 4.

acervatim congesti, oblongi purpurei, calyce hirsuto. *Semina* magna nigra, acris.

Gesner hort. Dentelaria Montpelii dicta, & alio nomine Flammula: An de hac loquitur etiam Gesnerus in sine hist. Cordi cap. de Chamæneriis? Clus. Hisp. Anronii Nebulifensis Lepidium. Quorundam Molybdæna, hoc est, Plumbago Plinii putata, vulgò Herba S. Antonii dicta. Narbonensium suo tempore Dentelaria appellata, Granaticis vulgi *Bélezæ*. Lob. & Penæ Adu. Obs. & Icon. Plant. Dentaria vel Dentelaria Rondeletii & Narbonensium: Aeginetæ Lepidium itidem putatum: Molybdæna Plinii. Cæsalp. Itacis sylvestris Herba S. Antonii. Camer. hort. Molybdæna seu Plumbago Plinii, Dentelaria Rondeletii: Romæ, herba S. Antonii, Italia *Crepantella*, in Illyria *Cæcurida*. Tabern. Ic. & Hist. Plumbago quorundam, *Stodtfray / was / ser pfeffer* / cui plantæ non conveniunt nomina Germanica. Clariff. Vir. D. Vlysses Aldroandus, cum Bononiæ essem, vocabatur Plumbaginem Plinii. C. Bauhin. Phyt. Lepidium 3, seu Dentelaria.

Sunt 28. anni, quum stirpis huius (cuius tum florum & fructus accuratam picturam à me desiderabat, meque adhortabatur ut gnauiter in hocce Herbario pergerem, sicut & ipse in suo faciebat, addens bonam esse inter mortales eiusmodi contentionem) descriptionem cum ipsa planta mihi D. Gesnero nomine Dentelariæ Rondeletii, uti tunc vocabant Montpelii, ubi florentem obseruabam mensè Septembri. Vidi præterea circa Arelatam, & vno circiter miliati ab Auenione, iuxta castellum Papæ. Lugduni habebam in horto. Mihi etiam visa Basileæ in horto insigni D. D. Felicis Plateri, vnde transtuli in Hortum Ill. E. C.

Vires Herba acris. Radix ad dentium dolorem commendatur.

COCHLEARIA.

CAP. IX.

Descriptio



Cochleariæ radix subest crassiuscula, recta, cui adnatæ fibræ aliquot longæ, albæ, à qua statim oriuntur folia multa, pediculis secundum terram purpurantibus, duas uncias longis, crassa, succulenta, modicè in cochlearis ferè modum cana, saturato virore prædita, supina parte profundo neruorum discurfu sulcata, rotunda, aliàs angulosa: at quæ in caulibus nascuntur, oris reflexis magis funciaciata, longioraque & sine pediculis, gemina ala, libera tamen caulem amplectentia: caules à radice plures, an-

gulosi, subpurpurei, in ramulos subdivisi, dorantales & minores, maiores verò eum semen proferunt: flores multi, candidi, quaternis foliis constantes, multique staminulis croceis cù stilo viridi: succedit in siliquis. semen. Torius plantæ sapor acris, Nasturtium respiciens, sicut & odor.

Dodon. gall. cuius figura non placet, Latine Cochlearium vocat, Germ. *Köpfelkraut*: Gall. *Herbe aux chœlliers*: Belg. *lepelcruyt*.

Britannicam veram, Britannicam Plinii, Scimus, inquit Lobel. & Pena in Adu. visam esse Herbam Cochlearis, verùm neutquam Plinianæ descriptioni congruit. Lobel. Obs. Cochlearia Batava: Telephium Lacunæ, Thlaspis & Nasturtiis affinis. Icon. Pl. Cochlearia Batava.

Gesner. hort. Cochlearia, vt & Io. VVierq, quam Telephium aut Britannicam esse negat.

De hac Hadr. Iun. in nomencl. rei herbariæ: Britannica Plinii, Herba Bataviæ peculiaris: quam Frisios monstrasse Romanis milicibus tradit, vt putat, quòd confines Oceano Britannicæ velut propinque eius nomen dedicauerint: in quo linguæ impertita fallum puto, quum vocis originem referendam existimem ad Breiten / ita dicuntur cæspites è quibus aggerum moles aduersus maris impetum surgunt, in quibus copiosè provenit.

Hodie Cochleariam indigitamus, quòd in oblongis foliis extremis in Cochlearii formam rotundetur. Hollandi inde *lepelcruyt* / & *lepelbladen* appellant. Non desunt qui Telephii nomine eam designari malunt.

C. Bauh. Phyt. Cochlearia folio subrotundo.

Marcus Hirschcherus in rhæf. Cochleariam duplicem facit Britannicam & batavam.

Cochlearia semen accepi anno 1590. à fratre Casparo Bathino, quod Autumno satum & hyeme repositum in cella pulchrè virens remansit, & Maio caput florere, folia familia primis foliis barbaræ: remanet in horto, hiemem profert & quotannis se semine deciduo propagat, & primo Vere caulem producit, florens Martio & Aprilii in horto Ill. E. C. Montbelgardii.

Cæterùm facultatem habet, teste Dodonæo, calidam euidenter & siccam, virenti Nasturtio sapore & qualitate persimilem. Malo quod Scorbutus Germania nuncupat, efficaciter medetur, in lacte aut vino decocta, & aliquot continuis diebus epota. Tales plantarum species in quaque regione à Deo creantur, quales hominibus & animalibus ibidem natis maxime cõveniunt. Quod oculatus testis multis documentis monstrare possem, inquit Solenander. Imò tam confidenter hoc nixus comperimento sæpenumerò probavi, ex plantarum nascentium frequentia me ferè animaduertere posse, quibus morbis popularibus, nimirum *Scorbutus*, quælibet Regio subiecta sit. Obseruamus hoc ipsam apud Danos, Phytios, Hollandos: quibus Scorbutus dictus morbus frequens, istius quasi proprium medicamentum, Cochleariam scilicet, copiosè provenire.

Cochlearia minima.

Dominus Böhsteter Medicus ostendit mihi Pfortzhemiz in horto Dj. Soceri Grünigeri Pharmacopæi Cochleariæ genus paruum, florens cum siliquis mensis Maii 20. anno 1595, quod dicebat sibi inissum nomine Britannicæ, ac diuersum putabat.

tabat à præcedenti genere: folia autem non multò maiora quàm in Alfine vulgari præferbat.

PIPER INDICVM, SIVE CALEUTICVM, SIVE PIPER SILIQUASTRUM.

CAP. X.

Piper Caleuticum, sive Capsicum oblongius.

Descriptio



Capsicum siliqua latiore & rotundiore.



torto, insident exalbidi, septenis foliis striatis constantes, medium occupantibus violaceis apicibus, totum autem florem in ea parte amplectente calyculo viridi in mucrones aliquid acuminato. Siliquæ succedunt, nunc longæ corniculorum instar habentes, vel rectæ, vel incurvæ: nunc breves & contractæ, per maturitatem punicantes, vel atrorubentes, nitidæ: semen copiosissimum continent compressum, rotundum, folium. Radix brevis nec caule crassior, numerosissimas à lateribus fibras circumquaque spargens: nulla est plantæ pars quæ a-

crimoniam non sit prædita, sed præter reliquas indomitus est ferissimum & siliquarum feruor vrentissimum.

Siliquastrum, Fuchsi sententiâ, convenientissimo nomine à Plinio lib. 20. cap. 17. dicta est herba hæc, à siliquis nimirum magnis & oblongis quas producit.

Eadem etiam ab eodem Piperitis, quod semen eius gustatum Piperis saporem & acrimoniam præ se ferat, nominatur. Alia tamen est ab ea quam vulgò Piperitum appellant, ut monuimus. Sunt qui Piper Hispanum, alii Piper Indianum, nonnulli etiam Piper Chatechut vocant & Bre-silicum. Auicenna, zingiber caninum Fuchsi, Trago, atque aliis videtur esse: Dodonæo Actuarii Capsicum, fortè quoddam semen comestum mordeat, à *ziziflo* mordeo. Siliquastrum autem Plinii esse, herbam cuius picturam damus, vel inde constat, quod Plinius Castore Siliquastrum demonstrat, caule rubro & longo, dentis geniculis, foliis Lauri: semine albo, tenui, gustu Piperis. Et alio in loco: Panax Piperitis saporem reddit, & magis etiam Siliquastrum, ob id Piperitidis nomine accepto.

Piperitis vulgæ

Hanc Piperitidem cum Fuchsi in quatuor distinguimus genera: In Piper scilicet Caleuticum nigrum & rubrum, seu maius & minus. Præter quæ, alia sunt bina, quorum primum, maioris discriminis gratia, Piper Caleuticum sive Capsicum oblongius; alterum Capsicum siliquæ latiore & rotundiore inferibimus. Alii alias differentias notant in siliquis, ratione formæ & coloris. Formæ quidem, quæ tum longa, quæ vel crassa, vel gracilis & incurvata: tum brevis, quæ lata, vel rotunda, & denique (ut prodit Camer. hort.) pilosâ caule, pilis albis prædita, latioribus foliis, fructu longo, plerumque in acuminatam longam appendicem desinente, flore quoque quàm in aliis maiore: Color aliis initio niger, aliis viridis, in maturitate autem, aut croceus aut rubicundus. Cætera in his omnibus non valde dissimilia sunt.

Monard. ex vers. Clus. Axis seu Capsicum (-ni vers. Ital. Axis aut Pepe d'India,) Piper Indicum (Americum potius Clus. cuius omnia genera aliquando vidit colore flavescente,) folio viridi, Ocymo latifolio simili, flore albo; fructu diuersæ formæ, oblongo, rotundo, Melopeponis formâ aut Cerasiorum.

Credidit cum Ruellio Gesnerus id omnino esse Mauritanorum Cardanimum vel Cardamenum maius, quod nos Piper Indicum appellamus, attestante Matthiolo (pertinaciter nobis contrariâ Lacuna,) eum nec sit Serapionis, nec Auicennæ Cardanimum.

Matth. German. Piper Indicum sive Caleuticum: siliquæ unâ digitum longa: rotundâ alterâ.

Camer. ad Hist. & Epit. Matth. duæ figuræ: priori titulus Siliquastrum sive Piper Indicum; alteri, Siliquastrum varietas triplex.

Apud Cordum, qui Peperirim, sive siliquastrum Peruvianum cognominat, est annotatum, esse Capsico fortè, aut Cardamomo Arabico cognatam plantam. Ibidem Gesner. ex Trago figuram apposuit.

Idem Gesnerus passim, Capsicon recentiorum Græcorum, Piper rubrum, Piper Indicum, & Cardamomum Arabum, eius opinio, vel afferentè Clusio, sufficienter refutatur à Matthiolo.

Lobel. & Pena Adu. Capsicum Actuarii, sive Caninum 22. Auicennæ, Caleuticum Piper recentiorum.

ribus. Lob. Obs. vnam habet figuram hoc tit. Capsicum [Tab. Ic. Siliquastrum.] Piper Indicum: & alteram, Capsicum breuioribus siliquis. Et postea Capsicum, Piper Indicum longioribus siliquis: Piperitis Cordi. Siliquastrum Plinii & Tragi: perperam longum Dioscoridis. Icon. Plar. Capsicum Actuari, siue Caninum Zingiber Auicennae: Calecuticum Piper, siue Piper Indicum longioribus siliquis.

Nomina luguar. Casp. Bauh. Phyt. Capsicum 1. siue siliquis longis recuruis. Capsicum 2. siue siliquis oblongis. Capsicum 3. siue pilolo caule. Capsicum 4. siue siliquis latis, cordatis.

Piper Indicum, Calecuticum, Brasiliauum, Americum, siue Capsicum *z. l. x. v.*, Siliquastrum Plinii, & Piperitis: Germ. *Indianischer oder Calecutischer pfeffer / Schotenpfeffer / Persischer pfeffer*: Belg. *Bresile peper.* Gall. *poivre d'Inde, & Poivre d'Espagne, & de Bresil.* Ital. *Pepe d'India.* Boh. *pepe Judyansky aut Turecky.*

Locus & Tempus. Piper Indicum siue Calecuticum, siue Piper siliquastrum vidi Basilea in hortis mense Nouembri cum pulchris longis siliquis: Geneue etiam. Montbelgardi in Horto E. C. prouenit mihi cum fructu magno longo, & cum fructu magno breui.

Capsicum hoc ita Piper Indicum diligentissime colitur tota Castellâ cum ab Hortulanis, tum à mulieribus in aduam sitarum pensilibus hortis. Meminit etiam videre Clus. anno 1536. maxima copia cultum in suburbanis Brunnae vrbs celebris in Moravia, quo cultores non contemnendum questum faciunt: est enim apud vulgus frequenter in vsu. Sed & haec omnia genera aliquando vidit colore flauescente in Luitania, moasterio quodam circa Olysiponem.

Virentur eo totâ Castellâ per totum annum cum virente, tum sicco pro condimento & Piperre. Valenter exalfacit atque delicat, inquit Fuchsius, id quod feminis insignis acrimonia, & foliorum amaritudo euidentissime monstrant, ut certe non temere plerique hoc femine loco veri Piperis vtantur, ut quod eadem facultates haud dubie habeat. Dodonaeus hoc Piper Indicum calidum siccu inque esse ordine tertio, eademque quae Fuchsius de eius viribus tradit, quibus addit eos cibos quibus miscetur, croceo colore infici, ventriculum exalefieri, ciborum coctionem promoueri, strumas, ceteraque oedemata discutit, eodem cum melle illito maculas faciei lentiginisque deleri, frequentem tamen eius usum noxium esse, quod malefica quaedam vis eaque occultâ praedicum sit, quâ canes, si id comederint, interimunt. Piperitis, inquit Plinius, quam & Siliquastrum appellamus, contra morbos comitiales bibitur: vtilis gingiuis, dentibus, oris suauitati & ructibus. Auicenna Zinzibet caninum, canes interficere scribit: calidum esse ordine secundo, siccum primo, recens cum semine tritum cutis & faciei maculas lentisque abstergere, durorum tumores digerere. Particulatim concisum (inquit Monard.) & iusculo maceratum, meliorem saporem edulsi conciliat, quam Piper vulgare: ideoque eius vsus est in omnibus in quibus aromata ex Moluccis insulis & Calecutio delata commendantur: in eo solum differens, quod illa multis aureis emuntur, hoc sola ratione acquiritur: nam in vna planta colliguntur aromata in totius anni usum, minore dispendio, & maiore commodo. Flatus discutit, vtile pectori & perfrictionibus, calefacitque & roborat partes internas. Caliditatis & siccitatis in quarto ferè

gradu patriceps, siliquastrum decoctum ritè paratum aquas hydropicorum educit. Indi nonnulli vnguentum quoddam ad confirmandos dentes conficiunt ex vnionum feracibus conchis & huius plantae foliis gremitis vna, & aqua maceratis, donec calcis candorem referant. Eo illitos dentes aterrimos reddunt, simulque absque dolore semper conseruant, ut tradit apud Camer. hort. Benzo Mediolanensis lib. 1. c. 3, historiae noui Orbis;

PIPER SILIQUA PARVA BRASILIANVM



FRuticosum hoc Capsici genus, obferuatum à Clusio apud Moardem, cubitalibus ramis, virentibus, foliis hortensis Solani ferè, aliquid angustioribus: flore candido, exiguo, ut Solani hortensis, fructu in longis pediculis paruo, per initia viridi, deinde nigrescente, ubi maturuit, rubro,

continente multa femina lariuscula alterius Capsici modo, ram feruidi gustus, ut fauces aliquot dies incendat gustatum.

Idem eodem loco figuram exhibet, cui titulum fecit, Capsicum Brasilianum, atque hoc Lusitanos vocare *Primenta de Bresil*, hoc est, Piper brasilianum.

Lobel. & Penz. Aduers. Capsici varietas, multò breuioribus, rotundis, turbinatis, eodem semine praegnantibus, Augusto & Septembri maturans siliquas.

Lob. Obs. Capsicum breuioribus siliquis. Pl. Icon. Capsicum, Piper Indicum breuioribus siliquis.

Matthiol. Hist. Germ. lib. 2. cap. 87. Pipet Indicum paruum & rotundum.

Hist. Lugd. Capsicum brasilianum Clusii.

C. Bauh. Phyt. Capsicum 5, siue siliquis rotundis Ceraui formâ, aliquando latioribus, aliquando angustioribus est foliis, hoc pingit Tabern. Ic. pag. 359. Siliquastrum rotundi angustifolii nomine. Hocque plerumque surrectis est cauliculis.

In nonnullis Lusitaniae locis floret, & fructu profert toto Autumno, & in calidioribus regionibus etiam hyeme. In Brasilia abundanter, multipliciter in vsu esse intelligebat deseripcionis auctor.

Piper siliquosum magnitudinis baccarum Asparagi.

Parua sunt grana, Alparagi vix maiora, sed oblonga, quippe ouata, cuticulâ contexta miniata, splendete, vti Plendocapsici fructus. Intus penitus feminibus scatur oblongis, flauis, compressis, per ambitum angulosis, quae si uel lingue adhaereas

De tripi

Locus & Tempus.

Descriptio

bæss quemadmodum & ipsas baccas tritas aut disceptas, mirum quam insigni acredine eam adoriatur ac vellient. Sanè Pseudo-capsici aliquid genus nouum & peculiare esse facile crediderimus. Thomas Platerus Medicus perdoctus, attulit nobis ex Hispania, aliæque per multa exotice elegantie causa gratissima, leuimus Montbelgiam horro Ill. C. Wirt quem curamus excolendum.

Piperis Indici paruum genus filiquis oblongis.

Basilæ in horto D. D. Fœlicis Plateri, mense Nouembri obseruauit cum flore & filiquis penè maturis paruum genus Piperis Indici siue Capsici, cui *folia* similia Alsine maiori, non multo longiora vnciâ digiti, si pediculum demas subrotunda, *filique* parue eiusdem longitudinis.

Idem est vt existimus, cuius accepimus filiquas rubras à D. Friderico Meyer, cui titulus, Piper surrectum minus, quod repositum in Hypocausto hoc anno 1605. durat cum frugis spe.

ANIL SIVE NIL INDORVM COLOR.

CAP. XI.

A Nil Arabibus Turcis, omnibusque iis Nationibus dictum, vocatur in Guzarate vbi fit, *colis*, nunc verò plerique *Nil*: Herba est, quæ scribitur singulis annis, Ocymo similis, eodemque modo colligitur, & siccata maceratur. Hanc deinde probe contusam & in panes coactam, per aliquot dies siccandam exponunt: & siccata viridi colore prædita videtur: quæque magis exsiccat, eò magis ad cæruleam tendit, donec tandem in cæruleam exsiccatur siue Venetum colorem enadat. Id Anil probatur quod maximè purum est, quodque visu. n. arenæ modo non remanet, sed in tenuissimam farinam diffunditur. Alii id præferunt, quod in aquam coniectum fluitat; Lene igitur esse debet & benè coloratum.

Pro Ocymo Mangiticam habet auctor [Garcias,] inquit Clusius, quod vocabulum quotquot Lusitanos consului Basilicum seu Ocymum interpretati sunt. At mihi iniqua admodum ista comparatio videtur, siquidem non solemus ex Ocymo pastillos conficere, sed potius ex Isatide quæ huius plantæ descriptione multò elegantius quadrat. Sed hinc Fragosâ inscitiam mirari licet qui in Rhapsodia sua (quam ex Orta meaque in eû annotatiuncula, tum etiâ ex Monarde, maxima ex parte contexit, malignè suppresso omnium nomine) nugatur me velle Mangiticam eandem plantam esse cum Isatide, quam existimo pluribus notis cum Anil Garciae descripto potius conuenire, quam Ocymum, cuius folium Anil depingit. Sed an quæso Anil quod sic eulumniat? postea describit, quodque in Occidentali India coli afferit, cum Ocymo peculiarem quiddam habet: Imò ipsam nihil nisi Isatidem describere, vel mediocriter in re herbaria versatus facile iudicabit.

Costæ Ital. Anil Arabum, Turcarum quorundam mercatorum Nil, Herba; ex qua fit color cæruleus.

Camer. Hort Nil siue Anil egregia planta ex qua fit Indicum.

C. Bauh. apud Math. & Phyt. Isatis 4. siue In-

dica.

Herba est in insula Iaua, ait Linschot. de hac verba faciens, quam Indi *Enger* vocant, ex qua suum Anil parant. Crescit ea in locis syluestribus sine omni cultura. Eadem contusa Bombacem quoque tingunt. Folia habet ea herba Rosmarini similia, sed non tam longo est virgulto, surrecto interim velut Thymi.

Nos Hist. nosl. l. ii. arborem quandam foliis Coluteæ, nomine Anil exhibuimus. Anil nomine missa planta Clusio est Sebam Alpini de qua libr. eodem.

Appendix ad Caput vltimum Libri xxi.

Cum per loci angustiam nobis inibi non licuerit Isatidis absolueret historiam, quædam & hic de ea substituimus: nec abs re, cum etiam cum Anil aliqua sit illi conuenientia, & hic liber præcedentis sit velut Appendix.

Præter igitur vires quas ex Dioscoride tradidimus, quædam ex Plinio, Galeno, & aliis substituemus.

Glastrum, inquit Plinius, sanguinem sistit: phagedænas & puriscentia vlcera quæ serpunt sanat: item tumores ante suppurationem. Contraignem factum radice vel foliis prodest, vel ad henes potum. Simile Glastrum, inquit Plin. in Gallia vocatur, quo Britanorum coniuges, natusque toto corpore oblitæ, quibusdam in facie & nudæ incedebant, Aethiopum colorem imitantes.

Omnes verò, Cæsar ait, se Britanni Glastrum insciant, quod cæruleam efficiat colorem, vt ea ratione truculentiores visu, & aspectu formidabiliores & horridiores hosti sese ingerant in præliis: Propterea Martialis cæruleos Britannos indubiè dixit, ait:

*Claudia cæruleis cum sit Rufina Britannis
Edita.*

Horat. Epodon. 16.

Nec fera cærulea domuit Germania pube.

Cæruleam vocari dicunt interpretes, ob cæruleum oculorum colorem, omnibus ferè Germanis communem.

Turpis Romano Belgicus ore color.

Antiquos verò Germanos herba Glasca ad tingendos crines vlos fuisse prodidit Ouid. de arte.

Fœmina canicem Germanis insicit herbis,

Et melior verâ, queritur arte dolus.

Isatis satiuæ Galeno, quæ vruntur Tinctores, facultatis est valenter exsiccatis, nondum tamen mordentis. Est enim simul amara, atque adstringens: proinde magna vulnera corporum durorum glutinat, etiam in capitibus musculorum fuerint, vel sanguinis proflauio laborantibus partibus vtiliter illinitur: tumores œdematodeis mirificè digerit, simul ac reprimat, & aduersus omnia vlcera maligna, & cacothæ mirabiliter resistit, etiam si putrescant, exedantur ac erodantur. At si nonnunquam pro ægri natura valentior appareat, foliis eius tritis miscere, aut panem, aut hordeaceam farinam, aut triticum, aut polentam, pro vincente nimium in vno quoque affectu. At Isatis syluestris manifestè iam acre quiddam rum gustu, tum affectu profert. Valentius enim quam satiuæ siccat, valentiusque humidis etiam putredinibus resistit, ad cæteram iam dicta deterior, quoniam moderatius & minus mordaciter siccat. Vlceræ namque tabæ

irritantur his remedijs, & phlegmone inflamantur. Cæterum ob potentiorē facultatem lientis quoque vtilis fuerit, cum altera imbecillior tantum professe non possit.

Fernelius Meth. med. lib. 7. Glastum ponit in suo Emplastro ad Herniam.

Vtramque Isatin vino decoctam & potam icinorolis vtilem esse scribit Tragus, ita tamen vt simul extrinsecus decocto foueatur Hepar.

Quo. a. anno Glastum primum terræ madatur, præsertim si tempestiuus sequatur imber, quater extinditur, sarculo duobus digitis sub terra adactis, quo tempore folijs nascitur Plantaginis similibus, partim supra terram nonnihil extantibus, partim humi procumbentibus. Anno deinde proximo Triticum eidem agro mandatur, qui Glastum aluit, non enim Glasti prouentu is emaciatur, sed lactificatur potius: & ex radicibus quas firmas & altius impactas aratri culter nequit proficindere, ac extirpare, cum segete pululant Glasti caules, qui in alteram sectionem semen præbent, maioris quàm Triticum pretij.

Hæc illis subiicienda quæ ante de eius Satione dicta sunt.

Pastillos è Glasto hac ratione fieri testatur Carol. Steph. Decerpta folia in pistrino subiguntur, pressa inuertuntur, & seorsim in vase collocantur, inclinato, vt fanies exilluat: denuò eadem mola subduntur, & tum demum in globos digeruntur viginti aut 24. vncias pendentes, in Sole, aut si id per æris inclementiam non licet, in clibano siccandos: hocce globos quidam in diem D. Martino sacrum in horreis asservant, post in puluerem redigunt, & in aceruos aggerunt: quoniam verò sæpenuerò acerui calorem concipiunt, sæpius commouendi erunt, & recentia aqua affusa quantum opus videbitur, probè humectandi: vt enim nimia aqua proluuie submerguntur, ita vicissim parcius affusa aqua comburentur: his igitur factis, iidem illi pulueris Isatidis acerui in longas porcas digerendi, & quarto aut sexto quoque die inuertendi, quoad probè refrixerint, extraque omnem concipiendi caloris metum fuerint positi: quæ in re summa est

adhibenda diligentia, alioqui si incaluerit Isatis viribus exiit: atque hæc quidem omnis postquam executus fueris, in arcam rectè pauitā inferes, quoad vendendi tempus sese offerat, quo autem diutiùs in aceruos aggregata fuerit Isatis, euadit præstantior. Tholotates autem, quorum ager vberem Isatidis prouentum reddit, non cõsueuerunt globos in puluerem redigere, sed folia in dolium capacius coniecta prælo subiiciunt, vt sanie herbaceam excludant: ex relicto magmate globos cogunt, Solique exponunt æstino siccandos: ex quibus in cortinas coniectis Lanæ cæruleum colorem saturationem dilutionemque pro Infectoris arbitrio imbibunt.

Alium modum conficiendi pastillos tradit H. Lugd. his verbis: Excisa folia & in aceruos congesta post biduum aut triduum, in rotundo paulimento, quadratis strato lapidibus, dētata mola lignæ subduntur, quam oculis piano tactis verfat equus: Sequitur equum circumeuntem villicus, qui palā herbam à mola dissectam in lapides referat, & conuertrat, vt à prætereunte denuò molā frangatur. Vbi satis obtritum Glastum videtur, rustici manibus comprimentes, fanies succosa vt eliciatur, quæ principid nigra attamenti ferè modo, in cæruleum post colorem abit, globos ex herba rufa conficiunt, quantum capere & amplecti vtraque manu possunt, & eos partim infolatu, si cælum sudum est, siccant, propè molam, & arcam vicinam: partim, si pluit, aut obstat tempestas humidior, in perticis sub tecto ædibus rusticorum affixis, & ad Orientem vel Septentionem versis, ordine dispositos, quos duratos & exiecatos condunt fassis, & ad vsum eius tincturæ seruant, quæ nigro colore pannos inficit. Semine Glasti manio, vel aliàs trito, & salua vel alio liquore madido, apparet statim color è cæruleo purpurascens quo indigenæ manicaui coriū nondū sordidū tingunt. Est enim illis vt & olim Britannis, gratissimus eius coloris aspectus. Cæruleam spumam innatantem, quam igni feruescentes eructant cortinæ, *Indum* nostri vocant Infectores, & ad pictorum vsum siccant.

FINIS LIBRI VIGESIMI SECVNDI.





HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER VIGESIMVS SECVNDVS.

MOLLIENTES ET HOLERACEÆ PLERÆQVE.

Mensura & culinaria beneficia in unam classem cogere hauri sinit Botanicus noster ordo. Cōgenērūm & Affīnīūm scietatem ad formā & fructus similitudine assimamus. Dīctā sunt multa holeracee in præcedentibus. Dicuntur & plures in sequentibus. Ast hoc libro Maluaceas. & his quodammodō similes. certè præsertim holeraceas, aut non valde ab illis alienas enarrabimus. Vbiq̄ue studiosè Rhizomatosis consilium volumus. Si quis melius digerere possit, faciat.

DE MALVA SIVE MALACHE VETERIBVS,
& in Genere.

CAPVT. I.



MALVA [de herba, non de arbore nobis sermo est] ex opinione Theophrasti, in altum se attollit, atque mensibus senis, aut septenis in arborem transit, ita, vt longitudine, crassitudineq̄e haste instar grandescens, commodè ad vsū baculi veniat: tempore verò longiori exacto pro ratione magis quoque incrementa capessit. Alibi de Malua inquit: Annuo caule constat, inter olera non nisi cocta manditur: Maluæ folia à Sole atque Sideribus affici sentiuntur. Assidue namque circumaguntur cum Sole, seque eodē inclinant, quò Sol perfertur. Causa verò in detractiōne humoris est. Eodē namque inclinatur, quò Sol humorem feruificans prouocauerit.

Lucius Columella idem hexametro hoc testatur.

Et Moloche pro no sequitur qua vertice Solem.
Quo loco obseruandum est, cum dicit Maluam Solem sequi, id in minori Malua maximè videri. De siluestri ait, à Medicis Althæam vocari: Theodoros Hibiscum vocat, de qua infra dicemus.

Dioscorides Maluam satiuam [ῥοσολίαν] recenset inter olera, Malachen [μαλάχην] vocans, ad cibum magis idoneam, quàm siluestrem. Sed neutram describit, tanquam notissimam.

Apud Plinium non vnum satiuæ genus, sed duo esse traduntur, totidemque siluestris: hæc amplitudine foliis discernuntur. Maiorem Græci Malopem vocant in satiuis: alteram ab e molliendo ventre dictam putant Malachen. E siluestribus, cui grandæ folium & radices albæ, Althæa vocatur ab excellentia effectus, à quibusdam A-

rithæa: reliquum genus siluestris non describit. Ex his colligere licet nostram vulgarem Maluam quamvis non colatur, in genere domesticæ apud Antiquos extitisse: Alterum verò genus quod spectaculi gratia seritur in hortis, Malopen esse apud Plinium, quam videtur intelligere, cum alibi de Malua loquens inquit: in Arabia tradunt auctores Maluas septimo mense arborescere, baculorum vsū præbere exemplò.

Depronipta autem hæc sunt ex Theophrasto, de ea quæ cultu arborescit. Ex Theophr. igitur colligimus, id quod apud nos seritur, satiuum alterum genus fuisse apud Antiquos. Quod verò Theophr. statuit Maluam in arborem transire, hoc non concedimus, sed omninò dicimus esse particulare genus, nec vnquam culturâ in arborem abire. Sume quam voles Maluam, colere, proceriorem quidem, at nunquam arborescentem, nec specie à pristina differentem efficies.

Galenus siluestris & hortensis quoque meminit, ac priuatim eius, quæ ἀνὰ τὸν ἔσπερον nuncupatur.

Sunt ergo Maluæ plura genera. Est enī Malua hortensis, siue satiuæ: & Malua siluestris, non quæ in siluis, aut asperis locis, sed quæ in incultis sua sponte nascitur, quam Dioscorides vocat, quæ vox incultam & inelaboratam terram significat, qualis in semitis, pratis, aliisque huiuscemodi ruris & agri partibus est. Et siluestrem hanc Maluam, vulgarem hoc capite intelligimus, non Althæam, nec Alceam, de quibus postea dicemus.

Differentiæ quoque multæ, ex florum figura & vario colore. Alia enim rubras, alia candidas, alia in purpura albicantes Rosas producit. Et has rursus atque illas, vel multiplici foliorum cog-

turā conrantes. Ex ipsis Maluæ foliis. Vna siquidem folio sinuato, altera rotundo, nonnulla etiam cisp̄o cernitur. Vna rursim aliis attollitur, altera pumila est & humi iacet, de quibus posthac agemus.

In genere omnis Malua à Græcis *μαράνη* dicitur, à Lat. Malua, ab Arab. *Chubeze* seu *Chubas*: & semen illius *Bizeri Chubetz*: Trago, Germ. papelen. Belg. *Maluwe*; *fressens cruyt*: Gall. *Mauine*: H. sp. *Maluas*, Angl. *Mallow*; Boh. *Slyz* Hung. *Malua*.

Vt porro Malua Latinis, quasi Molua quòd alium molliat, dicta est, auctore Varrone, ita Græcis *μαράνη* ab emolliendò ventre, quia *μαράνη* mollire significat.

Plinius maiorem à Græcis Molopen vocari in lauiis, alteram Malachen, scripsit. Athenæus *μαράνη* Atticè dicit, in multis autem Antiphani & Epicharmi exemplaribus *μαράνη* per *o* scriptum reperiri memorix prodidit.

Antiquos Malus cætetorum olerum modo veluti solitos fuisse, subduendæ alii gratia, vel ex Theophr. constat. Vnde Martialis:

Vires & vltus Aluum subducit

Exoneraturis ventrem mihi villica Maluas;

Attulit, & varias quas habet hortus opes. Et Vesere lactucis, & mollibus utere Maluis, Nam faciem durum Phæbe cæcantis habes.

Ex Diosc.

Quare scripsit Dioscorides, Malua fatua esui longè aptior est siluestri, stomacho adueisatur, alium iuuat, sed multò magis caules: interaneis & vesicæ vitilis. Cruda folia cum salis exiguo manducata ægilopas ex melle sanant: verum cum cicatr'em trahere cœperint, eà demum citra salem vtendum est. Contra aculeatos apum vesparumque ictus illita efficax est: eadem cruda cum oleo trita peruncti non feruntur: vlcera manantia in capite, si sua è lique cum vrina sanant. Sacrisignibus ex ambustis decocta folia tritæque vtilissimè ex oleo imponuntur. Eius decoctum vuluas in sessione mollit: prodest erosionibus vesicæ, & intestinorum, vuluæ, sedisque, clystere infusum. Ius decoctæ cum radice sua contra omnia venena auxiliatur, si continuò à biberibus reuonatur. Contra phalangiorum morsus remedio est. Lac euocat. Semen in vino potum, addito Loti siluestris femine, vesicæ cruciatus lenit.

Ex Galeno

De hac perspicuè dissentit Galenus his verbis. Quemadmodum *heredum*, quæ Lactuca agrestis est, ab hortensi, ita Malua agrestis à fatua differt. Planta enim congeneres eò inter se differunt, quòd agrestis quidem siccitate, fatua verò humiditate saperat. Porro succo Maluæ lentor quidam inest, quod Lactucæ non inest, à refrigerandòque abest perspicuè. Id quod etiam æquam edas intelliges, si vtrumque olus vicissim calido alicui affectui, vt erysipelati, cataplasmatibus modo applicueris, quòd etiam vulgò faciunt, tenera folia diligenter ad exactum lauorem conterentes. Senties enim in hoc cataplasmate Lactucam quidem manifestè refrigerare: Maluam autem calorem quandam habere moderatum ac æpidum. Cæterum hoc olus facillè subducitur, non modò propter humiditatem, verum etiam propter lentorem, & potissimum quando quis cum oleo & garo copiosam ipsam sumperit. Nutrit autem & ipsa mediocriter. Et rursus, Malua agrestis digerentis paululum & emollientis leniter est facultatis. Hortensis quantò plus habet aqueæ humiditatis, tanto facultate imbecillior est, fructus eius tantò validior est, quantò & sicciot. Porro huius generis est quæ Dendromala-

che nuncupatur, sed efficacissima comprehensuram in digerendo.

Plinius diffusius virtutes Maluarum explicat. In magnis laudibus Malua est vtraque, inquit, & fatua & siluestris. Omne solum in quo feruntur pinguis faciunt. Huic contra omnes aculeatos ictus efficacior vis præcipuè Scorpionum, vesparum, simulumque, & muris aranei. Quin & trita cum oleo qualibet earum peruncti antè, & habentes eas non feruntur. Folium impositum Scorpionibus terrorem adfert. Valent & contra venena. Aculeos omnes extrahunt illita cruda cum nitro, potæ vetè decocta cum radice sua leporis marini venena resingunt, & vt quidam dicunt, si vomatur. De insidit mira & alia traduntur. Sed maximè si quotidie quis succi ex qualibet earum forbeat cythum dimidium, omnibus morbis cariturum. Vlceramnantia in capite sanant cum vrina putrefacta, lichenas & vlcera oris cum melle. Radix decocta sicutus capitis, & dentium mobilitates. Eus quæ vniti caulem habet radice circa dentem qui doleat punge, donec desinat dolor. Eadem strumas & parotides panosque, additò hominis salinà purgat citra vulnus. Semen in vino nigro potum à pituita & nauis liberat. Radix manmarum vitis occurrat, adalligata in lana nigra. Tuffim in lacte cocta, & forbitònis modo sumpta, quinis diebus emendat. Stomacho inutiles Sextius niger dicit Olympias Thebana abortiuas esse cum acipe anferis. Alii purgan feminas siccis earum maris plenæ mensura, in oleo & vino sumptis. Vuque constat parturientes foliis substratis celeniis foliui, protinus à partu reuocandum ne vulua sequatur. Dant & succum bibendum parturientibus ieiunis, in vino decocta hemina. Quin & semen æthum adalligat brachio, genitale non continentium. Adeoque ex Veneti nascuntur, vt semen vnicaulis aspersum genitali feminarum auiditates augere ad infinitum Xenocrates tradit. Item tres radices iuxta adalligatas tenesmo & dysentericis vtilissimè infundit. Item sedis vitis, vel si foueantur. Melancholicis quoque succus datur cyathis ternis tepidus, & infantibus quaternis. Decoctæ comitialibus hemina succi. His & calculosis, & inflatione, & torminibus, aut opisthotonico laborantibus tepidus illinitur. Et sacrisignibus, & ambustis decocta in oleum folia imponuntur, & ad vulnerrum, impetus cruda cum pane. Succus decoctæ neruis prodest, & vesicæ, & intestinorum rosionibus. Vuluas & cibo & infusione emollit in oleo: succus decoctæ pori meatus suaves facit.

Vires ex Plinio.

Mira de eius facibus etc.

Scribit Simeon Sethi, Maluum ventriculium facillè subire, non solum propter humiditatem, verum etiam propter lentorem, atque imprimis si cum oleo & garo offeratur, vino quo editur tempore ittorata. Vesicam, thoracem, pulmonemque iuuare, & raucam vocem lenire. Siluestris Malua, vt ferunt, comesta dolores ex vesparum ictu tollit. Si quis morsus à vespi aut apibus, succo Maluæ præsertim siluestris perungitur, confestim dolore leuatur: Dicitur etiam huius decoctum potum lapides contere, somnum conciliare, facillèque partum præstare, si mulier eà crebrius vtatur. Illa inflammationes lenit, & que indurata sunt mollit. Illud Maluz peculiare est, vt vesparum & apum ictibus imposita, dolores leuet. Maluæ herbæ nomine sequentes insignimus plantas. Vulgarem florè maiore & minore, seu folio sinuato & rotundo. Maluum Stellæam: Maluum trimestrem cum vnguibus purpureis.

Ex Simeon Sethi.

Malva speciem Cobes. Malvam roseam, siue hortensem. Malvam Crispam. Malvam arboream: de quibus ordine. Sed plures adhuc (de quibus suo loco) apud Botanicos Malva titulo habentur plantæ. Ait enim C. Bauhinus in Phyt. Altera Malache è silv. cui grande folium & radices albæ, Althæa vocatur. Sic Harch. in Euch. Althæam à Galeno Aaadendromalachen (arborescentem Malvam) vocari testatur. Scribit Camer. hort. Bastinacam (Germ. addo) agrestem in pratis nascentem, Malachen agriam dici.

Et Casalp. per Malvam caule altiori ferè ad Malopen accedentem, Althæam, quæ Sida cognominatur, intelligere videtur. Sed & Malva Theophrasti Tabernæ. & aliis nihil aliud est, quàm Althæa Theophrasti, vel lutea. Nec Malva Hispanica, aut Malva silvestris alia est ab Alcea. Sic penitis nihil differt Malva quærna ab Alcea tenuissimè secta. Eadem quoque est Malva Veneta cum Alcea Solisæqua. Matth. in consp. It. titulo Malvæ quartæ, quam non describit, Geranium maluatum exhibet. Tandem quam alii Malvam equinam vocant, Petasites mihi dicitur. Cur demum cum Ruellio & Lonic. Anagyridem nonnulli Malvam terrestrem vocent, mihi non constat.



tantum mentionem fecit, sic in hist. vna solum descripsit, quam Malvam silv. rectam vocat, cui per Gesnerum figura conueniens addita.

Erraticam, seu siuefrem (pappell) Malvam in duas distribuit species Fuchsius: in sylvestrem pumilam, & silv. elatiorem, In figuris autem eius diff-

crimen non ritè apparet, ac videntur vnus esse planta potius quàm duarum.

Et licet Tragus vnicam habeat figuram, nempe eandem cum Fuchsi pumila, hoc titulo, Malva vulgaris, Gemein kâß pappeln. In descriptione tamen distinguit vt Fuchsius, eam autem pingere videtur quæ magnum florem fert.

Cornar. in Dioc. Malva silu. alia altior.

Dorsth. sub his nomenclaturis: *malva d'ap d'herbes*, Malva, Malva minor, Lien capræ [Porta scribit Malvæ folia Magos Lien capræ appellare, ob eam quam cum liene similitudinem habet,] Muris vrina, duas habet icones, quarum vna refert Malvam minorem flore maiore: prior verò videtur diueta plantæ quippe Calthæ aquaticæ.

Malva quam Antiqui *Ommorbiatam* appellauerunt vulgaris ad eò notitia est, inquit Matth. v nulli ferè repeniantur qui eam non nouerint. Bellum sanè dictam. Nulli non ferè nota Malva Matthiolo, illo excepto, qui non nouit in vulgari Malva vnam maiori flore, alteram minori, qui sibi persuadet Italicam arborescentem calrorum mangonio talem esse: quum sit diuersa, vt postea diceretur: tueantur Matthiolum Glossatores & Detractorinos si possunt.

Lacun. solam minorem videtur pingere ex Matth. cum tamen vnam humilem, alteram elatiorem statuat.

Gesn. hort. Malva agrestis maior & minor.

Dodon Gall. & Lat. vtramque Fuchsi figuram, iisdem titulis exhibet.

Lob. & Penz. Adv. Malva silu. vulgaris procerior: Item Malva silu. minor. Lob. Obs. & Icon. Plant. pingit ambas, ac vocat, Maluam vulgarem proceriorem: Item Maluam silu. repentem pumilam.

H. Lugd. Malva vulgaris Matthioli: Malva silu. pumila repens: & Malva silu. maior.

Tabern. Icon & hist. Malva silu. maior, & Malua silu. minor.

Camer. hort. Malva vulgaris duplex, maior & minor. Eidem ad Hist. Germ. Malua minor. Et Epir. Malua, Malua maior & minor.

Schvv. Malua silu. pumila albò flore *par d'ay d'yeu*. Malua officin. Malua silu. procerior *Malua d'yeu*. Malua silu. recta Cordi.

C. Bauh. Phyt. Malua. siue sylu. folio rotundo. Malua Brunfels. Trago prima, Lob. pumila. Malua 2. siue silu. folio sinuato. Brunfels. equina.

MALVA VULGARIS DVPLEX, VNA
Flore maiore, altera minore: vna
folio sinuato, altera
rotundo.

Qvàm vulgaris est hæc Malva, tam est vtilitate multà commendata: radicem fortita sanis tenuem, eximi candoris, dulcem gustu & labrico lentore vitædam: caules ad cubitum interdum excrecunt hirsuti, sububentes, per humum reptantes: folia rotundata, nonnihil laciniosa, pilosa, atrouerentia, in ambitu crenata, in caulibus

folia laciniata: flores parui inter folia exeat ex pallida purpurea albican-tes, purpureis lineis striati, quinquifolii, citris purpurascensibus medium occupantibus: semen compressi orbiculi vmbilicati instar habet, gustu perquam viscido, fatuo. Altera procerior dicta in hoc à precedenti differt, quòd flores speciosiores, Alceæ, purpurel, maiores. Semen, radix, consimilia.

Est mihi Malua data per D. Agerium Bononiæ collecta cum hac inscriptione, Malva vulgaris maior flosculis minimis, Cobel Plinii: hæc pilis longioribus & calycibus nonnihil differre videtur, quæ varietas fortè est à natura loci.

Quemadmodum Cord. in Dioc. Malvæ silu. Tom. II.



Lien capræ

Muris vrinæ

Dorsth. lapidus

omninores

Matth. kâß

proch.

C. B. nor.

Lacun. not.

Trago altera species. Le b procerior: hzc in genere domesticum fuisse apud Veteres videtur: Et apud Matth. Malua i. siue sylu. folio rotundo quam Theophr. coqui & cibo idoneam, esse scribit. Figuram ponit ex Tabern. quæ cum minore flore, cur autem potius eam quàm quæ cum maiori flore, ignoro, satis magni videntur flores in figuris Matthioli.

C. B. par.

Nomina linguarum

Locus & tempus

Vires & usus.

Temperamentum

Dentes

Fauces exasperata. Rauceo

Anres

Partum promouet

Purgat

Omnium orbex. Malua omnimorbua.

Rauceo

Stranguria

Pernices vesicatorum

Malua folio sinuato flore maiore Græcis *μαλὴ ἀγρία*, à Dioſc. *μαλὴ ἀγρία*, à nonnullis *αἰσχροπύρα*, quasi doloris mitigatur: item & *μαλὴ ἰσχυρὴ*. Oſiriaca. Dodon. Germ. *Reſpappel* / *S Joh pappel* / *wilde rotbe pappel* Sileſ. Gall. *Malua ſan- uerge*. Aut Malua ſono rotundo flore minore, *Genſ Rößl* aut *baſen pappel*, *ſlein vndt gemein pappel* Belg. *ſlein Maloimeſ* Gall. *petite mal- ue*, *Mont. des ſurmagets*, Hung. *Köz malua*.

Sylueſtris Malua prior in culis locis exit, ſolo tamen ſecundo, non ſterili, iuxta vias, hortorum ſepimenta, agroꝝum margines, locis non nihil humidentibus. Proxima non raro in rudibus, ac aliis perinde incultis ac neglectis locis reperitur. A Iunio menſe in multam ætatem flores profert, interea tamen ſemen ratum ad maturitatem peruenit. Malua pingui delectatur loco, & humido, gaudet lætamine hortorum. Malua Mont- pelli frequens: Baſilæ florentem vidi Maio & Iunio ac Octobri extra urbem & intra urbem. Lugduni & Genex proueniunt. Montbelgard paſſim ac etiam in Horto Ill. E. C. vtraque prouenit ſpontè ſupra ſinum, aut culta in orto.

Vires ex Dioſcor. & Galeno videant Lectores, quas referendas exiſtimamus ad modò prædictas noſtras Maluas. Maluæ radix ſicca [calida & humida, Port.] inquit Matthiolus, die vna in aqua macerata, & deinde madida papyro circumuoluta, & ſub cinere ſeruenti decocta, & iterum ſiccata, vtiliter uſurpatur ad dentiſicia: mundat enim affricta dentes, & gypſeam materiam ſoluit. Foliorum & radicum decoctum gargarizatu exaſperatas fauces lenit, mucago verò acrimonias emendat: Feruaſceta folia in cibum aſſoſita rauce- dines expediunt, ex oleo autem, ſale, & recenti butyro aluum citant. Fir è foliis cum ſalignis frondibus tritis præſtantiffimum medicamentum ad venenoſorum morſus. Succus auribus inſtil- latus dolorem ſedat. Decocta vnà cum radice ad lentotem uſque datur potanda agrè parturienti- bus magno iuuamento: id quod etiam præſtat ſuccus ſelibræ pondere hauſtus. Semen ex vino rubro potum nauſeam tollit. Cauliculi molles decocti delibratique comeduntur ex aceto, & oleo, & ſale, A ſparagorum in modum, prima ſtatim menſa, ad citandam aluum. In ſumma, Malua ad multa utilis eſt: ideòque non immeritò Antiqui Maluam *Omnimorbiam* [omnium orbicem] appel- lauerunt. Datur vtiliter ſuccus potandus melan- cholicis ſex vnciarum pondere, ac inſanientibus vnciæ octo propinantur.

Ad rauceoſinem recipit Bapt. Codronch. aq. ſtil- latie Maluarum ꝑvi. Aceti ſcylit, ꝑiit cuius por- tiunculam ſingulo die per horam vnã vel alteram, non ſemel agrum per nares attrahere iubet. ſed etiam bis, prout opus ſit. Et hoc erithum à ſe experientiâ comprobatum ſcribit. Maluam vulgarem maiorem & minorem cum Allio vino incoquant ad tertias & bibunt contra ſtranguriam: Hodie Maluarum decocto vti ſolemus in Clyſteribus ad aluum citendam & vtiſas. Aelianus ſannâ Maluæ ſucco ſuffuſâ lacertis & ſimili- bus inſectis perniciem aſſerti perhibet.

MALVA STELLATA.

Malux pulchra species, cui caules tenues, Descrip- cubitales vel bicubitales, ramofi: folia



priora in tene- la planta sunt ex longis pedi- culis parua, ro- tunda, serrata, vbi autem ado- leuit per ramos ex brevioribus foliis, in ſans magna, in tres partes diuiſa, quorum quæ- dam legitime expriment: ſa- pot ingratus, nõ- nihil viſcoſus: ſus magnus pur- pureus ſtratus, quinque foliis cordatis con- ſtans: in medio piſtillus albus ex multis apici-

bus conſtans: eius calyx prior membraneus vti & ſecundus, in quo cuspides tres ſtellam quo- dammodò exprimentes: ſemen quale vulgariſus Maluis. Totã planta hirtuta.

Argentinx primùm vidi florentem & cum ſe- mine maturo ſeptembri, in orto D. Frederici Meiet Argentinx, qui Maluam ſtellaratã nomi- nabat, is ſemen à Domino Agerio vt audio acce- perat.

Locus & tempus

Malua stellata

MALVÆ TRIMESTRIS FLORE CVM vnguibz purpureis.

Pedali altitudine creſcit hoc Malux genus, Descrip- caule rotundiuſculo, tereti, viridi, lanugine tamen aliquantulum obſito, quem rara & nullã certã ferie diſtributa ambiunt ſolia, tenella, viti-



dia ſuperne, in- ferne diluſiora inſimo cauli ad- nata, circinatæ ſermè ſunt ro- tunditatis, in ambitu ſerrata, ſupremum cau- lem & ramulos amplectentia an- guloſa ſunt, ad foliorum Althææ formam penè ac- cedentia: flores ſummis ramulis inhxrent ſatis magni, quinque foliis extimã parte lunati, con- ſtantes: purpura- ſcentis coloris, vnguibz ſatura- tione purpurã in-

ſeſtis, prodeuntibus ex umbilico ſtaminibus palidis, villis purpureis: ſemen in foliaceis capi- tulis planum: radix eſt parua, candicans, tenui-

buis fibris prædita; annua tamen, aut potius trimestris, quam sublequens hyems corrumpit.
 Huius liccã plantam suis floribus onustam & charã implicatam mittebat ad Clusium N.V. Ioannes Hoghelandus anno 1592. ex qua subiectam iconem delineari curabat.

MALVÆ SPECIES COBES.

CObes, Malvæ species non inelegans futura, quantum ex rudimento colligere Camer. hort. poterat, si ad frugem pervenisset, Clar. V. D. Paludani ex Syria reducis munus. Semen reliquarum Malvarum femine minutius.

Cobes etiam semẽ ego quondam recepi, quod fatum in horto Ill. E. C. Montbaldardi, sed non provenit.

C. Bauh. phyt. Malva nona Syriaca, Cobes Camer. quod Paludanus ex Aegypto allatum, Kobes nomine Patavij communicavit.

MALVA ROSEA SIVE HORTENSIS.



& purpureascentibus prædita, in multa foliola flori cõcoloria sese explicante: modò multiplici foliorum sætu luxuriantes: insident h̄i autem

calyci geminato; canã lanugine pubescenti, semperque post se relinquunt, in passillis formam compressum. Radix longa, alba, lentum mucorem remittit, non alio quàm Maluæ sylvestris sapore.

Huius etiã species invenitur folio amplo, ficus: profundè laciniato.

Cordo Malua hortulana, rara visu, ac quasi ignota, & Romana Malua dicitur.

Trago in inscriptione Malua Romana, & inter nomenclaturas, Rosa nobilis, Hortensis Malua, Metensium Rosa ultramarina, Malua Theophrasti & Dioscoridis (apud quem huius nomina hæc sine) *Μαράθη*, Anthema [à Pythagora, Dodon.] Diadema [à Zoroastre:] Chocortem [ab Aegypto.] Capra lien [*αἰγὴς σακχῆς*] Muris cauda [*Υρίνα*] Dodon.] Malua hortensis:) Moloche Veterum (quod videre fit in Aulularia Plauti) Malua Romana Arabum, aliorum Molochia, Maluchia aliorum arborea (cuius semen Kizeri Katmi vocat:) Hebræorum Chalmuth, & Harni, teste Atuch Monstieri. Est, inquit in descrip. colore floris candido, roseo, rubro, & ex rubro nigricante, simplici & multiplici foliorum textura. Hæc Tragus, ego non aufferere hanc esse Maluam Theophrasti, inclinatum animus in aliam.

Fuchl. Malua hortensis Dioscor. & Galeni. Corn. Malua *ροσμή* Diosc. Malua hortensis.

Math. Malua folio nigro flore Rosarum effigie tubente, candido, vel subrubro: Malua arborea. Et in hist. germ. vt & post. com. cum magn. fig. Malua maior, & Malua maior altera. Bene sibi consulit Math. qui in post. com. ceu & Camer. in eiusdem Hist. Germ. quod in Epit. fecerat, Maluam roseam non amplius vocant arboream, ac melius, quàm eius Patrocinator.

Lacun. Malua hortensis, flore purpureo, & albo: Græcorum Dendromalache, Lat. Malua arborea. Sed vt iam dixi, hanc Maluam nec arboream, nec Dendromalachen ferentem.

Dodon. gall. pingenti Malua sativa: Lat. Malua hortensis, & Malua hortensis multiplica flore: de qua ait. Ad differentiam aliarum *Μαράθη* [Malua hortensis:] dicitur à nonnullis vctò Rosa ultramarina, & Rosa hyemalis. Atque hæc est illa, quam in Maluaceo caule fundi Plinius tradit: folia oleracea (perperam in plerisque exemplaribus, Olex, aut oleacea) habens, quam *Μοσχεύον* vocant. Appellari autem hanc Maluam nominibus ex Trago adscriptis inter spuria Dioscor. reperitur.

Gesn. hort. Malua Romana quorundam, Haftula regia Apulei, flore candido & rubro, simplici, vel multiplici. Et in cat. pl. Haftula regia Apulei, Rosa Autumnalis vulgi, Maluæ genus *διδέμα*, quod non concedimus ipsi.

Rectè meo iudicio dubitant Lob. & Pena in Adu. Malua rosea fruticosa, an Galeni *ἄγανθου* *μαράθη*? Lob. Oberu. & Icon. plant. duas ponit figuras his titulis. Malua rosea fruticosa: Malua rosea multiplex.

Camer. hort. Malua hortensis siue Romana, Bismalua vulgi, flore simplici & pleno, multiplici colorum differentia. Reperiuntur enim candido, dilutè purpureo, siue vt vulgò vocant incarnato, rubro, puniceo, nigricante. Atque hæc posterior differentia primo anno raris floret, & vix durat ultra triennium.

Hist. Lugd. quinque proponit figuras, licet tot non erant necessariae, sub his titulis: Malua maior. 1. 2. Matthioli, Malua rosea simpliciore flore: Malua rosea multiplex. Lobelij.

Varietat.

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Malua romana

Totidem & Tab. habet. Quorum 1. Malua arborea, siue hortensis. 2. Malua arborea alba multiflora. 3. Malua arborea flore nigro multiplici. 4. Malua rosea multiplex. 5. Malua rosea simplex.

C. Bauh. Phyt. Malua 5. siue rosea folio subrotundo flore simplici, Malua hortulana Brunfels. Romana Trago, Rosea Lohelio: Hæc Malua fatua est apud Antiquos: Malua quæ cultu arborefcit Theoph. Plinio Malope: flores candidi, rubentes, & hi modò saturati, aliàs purpuræ modo relucentes, non tardè omninò diluto colore: sic & ex rubro, nigricantes. Malua 6. siue rosea folio subrotundo, flore pleno, Lohelio Rosea multiplex, in flore multiplices differentie, hinc tres conones apud Tabern. Malua 7. siue rosea folio Ficis, Tabern. peregrina. Item Malua 8. siue arborea Veneta dicta, Arborea. Matth. Icon. quoad iconem: & Malua maior eidem fol. Lat. Malua maior vniculis Matth. Icon. quoad descriptionem: & Malua maior, altera eidem Lat. in folio. Eadem apud Matthiolum Malua 2. maior siue rosea folio subrotundo, flore simplici quæ Malua fatua est apud Antiquos. & quam cultu arborefcere scribit Theoph. Malua 3. siue rosea folio subrotundo, flore pleno. Malua 4. maior altera siue arborea Veneta dicta flore cæruleo. Quis obsecro credet Maluam vulgarem in huiusmodi ratione in Roseam mutatam, quis præterea vidit roseam in arborem transiisse: aliam ego cum Theophrasto, Plinio, & Matthiolo vidi, non hanc.

C. B. n. r.

Nomina linguarum

Locus & tempus

Vires & v. fus Porrigines Erysipelas

Jo. Liebau r. r.

Malua rosea, seu hortensis, Germ. (Gerren: vnd Römisch pappeln [Romana:] herbst vud winter Rosen [Rosa Autumnalis, vidernalis, siue hyemalis] Erntrosen: / ac si Rosam honoris diceret, Belg. winter Roosen / herbst rosen. Gallis Rose d'ore mer, Malua de iardin, ou estinee. Ital. Malua maggiore. Matth. in com. Ital. Angl. holy horte.

Malua roseam ex semine variis in locis collecto, ac etiam nobis misso, seimus in horto E. C. Montbelgardi, cuius diuersos habemus colores. Genus habui flore candido simplici rubro simplici, candido multiplici, & rubro multiplici, florentem Iunio ac etiam Nouembri. Basileæ etiam in hortis vidi, Patauii in hortis, vt Musati. Bononiæ in horto S. Saluator al burgo di S. Catharina. Primo anno caules non profert sed secundo, postea vt plurimum perit, fert alioqui hyemem. Stutgardia in horto Ill. C. V. Viremb. & in horto ad fontem admirabilem cum variis coloribus pleno & simplici flore obseruau. Apud Frider. Meier florentem Septembri folio Ficis, flore cæruleo simplici, quam ex Italia misam dicebat. Foliu sapor viscosus.

Malua hortensis flores coquunt in vino veteri, vt legimus apud Camer. hort. quo porrigines abluunt & sanant. Vtuntur etiam ad erysipelatis ruhores compescendos, imprimis rubentibus Rosis, imitati coloris similitudinem. Ego florum decocto feliciter vtor in siccitate & ardore linguæ & faucium. Et quia in dictis floribus nullam agnosco adstrictionem, nondum istelligo, quo successu Jo. Liebaut ad fluxum menstruorum nimium Malua roseæ flores præteribat.

MALVA CRISPA.

Altitudo huius plantæ, licet breuioris vitæ, quanta homini, caule crasso, siculo, non nihil anguloso, viridanti, glabro, rigido, aliquantum

concauo, & in ramos fissio: folia palmaribus & dodrantalibus pediculis, altera parte hirtis, altera glabris appensa, latitudine memorabili, breuibus pilis donata, non tantum laciniata sunt, ve-



quo succedunt in orbem congesta, Malua iam dicta: radice subest dodrantalis aut longior, alba, medio crista crassa, sapore, vt & reliqua planta, glutinoso.

Lob. Obs. Malua crispa vulgi & vt etiam Pl. Synon. Icon. Malua cristatis oris. Dodon. Malua crispa. Tabern. Icon. & II. flor. Malua crispa, fraus pappi peln. Casp. Bauhin. phyt. Malua 4. siue folis crispis.

Camer. hort. Malua crispa siue laciniosa Cordi, Arborefcere videtur, quamvis tantum sit planta semestris, de qua scribit hæc, Malua Oriente Sole hiat. Occidente clauditur. Pythagoras, vt refert Alianus, res sua digne, cibus in dromy [folium Maluae esse sancti] dixit lib. 4. var. hist.] nimirum quia mysteria sua in hoc olim scripturabant sacerdotes. Gesn. hort. Malua crispa, Malua Romana quorundam: Althæa crispa & minor Ollingeri.

Cordo in Diosc. Malua hortensis, Malua Romana: Malua sinosa crispitudine, Malua Dioscoridis. Hanc eidem describit in hist. sub titulo Malua hortensis laciniosa, cui Gesn. apposuit figuram inscriptione Malua hortensis crispa.

Genus mihi provenit in horto, virens Octobri & Nouembri, postquam semen pertulit e-mortua, semine deciduo quotannis se propagat, ac è semine deciduo prouenientem ibi vidi hyemem perferre. Basileæ vidi in horto D. Dis Theodori Zvinkeri, Montbelgardi in horto E. C. florentem vidi Iunio & Iulio.

Malua crispæ magnam emolliendi vim præ a-vires: liis tribunt Cameracius.

MALVA ARBorea.

Malua arborea stipite adolescit crasso, ligneo quaternum aut quintum cubitorum, perenni, folia amplissima, Maluae repentis modo sinuata, sed lanuginosa Althææ mollitie, flores secundum stipitem Maluacei, parui.

Ethacilla est Malua arborea, quam Rauu volff. Halepi ab incolis veteri Arabico nomine nauur dici scribit, sub cuius gratiosa vmbra deambulare liceat. Idem meminit Malua arborefcens alce-

fius

terius, qua Alceam arborifcentem folio virente, infertis inscripsi.

Galenus nostro iudicio hanc ab adreos vocavit, cuius verba ante recitamus, vt & Plinii & Theophrasti.

Catalp. Malua quaedam arborifcens, & Aradendromalache Galeni.

Camer. hort. Malua arborea.



lens, dicitur esse interdum ad 8. vel 10. cubitos assurgens. Tam alibi in Italia, tum frequens in itinere quo itur Pisâ ad portum Liburni ab eodem aliquando inuenta.

Geln. Malua arborea. In Append. Malua Arborefcens. Dendromalache Galeni.

Maluam quæ in aliquibus locis in Italia arborifcit, nil aliud esse quàm factam colorum magonio in tantam magnitudinem assurgentem ignoranter sibi perfuadet Matth. dicit: Maluam quæ in arborem degenerat vidi Grignani ad Benaci ripas in quodam Monachorum cœnobio, vbi eorum otio & cultu tantam sibi obtulerat amplitudinem. Hæcille. Ego verbè facillè dederim alicubi Maluam arboream ita humilem esse, vt in altum se non attollat, sed cultura deinde arborifcat: verùm nunquam concesserim Maluam vulgarem sine magno, siue paruo flore arborifcere: colant Glossatores & Patrocinatores Matthioli, videntur quid impetrabant: cultura maior euadet & elui aptior: fere arborea nūquam fiet, nec etiã eundem florem nascifcetur, vt rectè etiam statuunt Lobelius & Pena.

Primo vidi Estingæ apud insignem Pharmacopœum Volmarium: postea Monspelii in quibusdam hortis. Creuit mihi Geneva in horto: Basileæ Frater C. Bauhinus habuit in horto. Montbelgardî à me facta in horto E. C. primo anno creuit, ad altitudinem quinque cubitorum circiter: reposita, floruit sequenti anno: flores parui: aliquot annis durat, modò diligenter reponatur.

ALCEA VETERIBVS.

C A P. II.

Quæ inter se affinia sunt, quasi catenâ quadam merito connectuntur, atque hinc Alcea & Althæa seu Bisnialua de necessitate Maluarum tractationem quoque consequuntur.

Alcea igitur, auctore Dioscoride, & hæc siluestris Malua species est, habens folia filia, ad verbenacæ foliorum similitudinem: caules tres aut quatuor foliorum plenos addit Plin. qui corticem Cannabi similem habent: florem paruum Rosa similem: radices albas, latas, quinque aut sex, cubitales, obliquas adiungit Plinius, qui eam nasci scribit in pingui solo, nec in secco.

Radices, inquit Dioscorides, eum vino aut aqua potæ, dyfentericis ruptisque medentur. Plinius: Vfus radices ex vino vel aqua dyfentericis,

alio citæ, ruptis, conualfis. Et Alceæ radix collectiones discurit. Et paulò post. Sp. allicis, tremulis, opisthotonicis Alceæ radix bibitur ex aqua mulsa. Sic & rigores exaltatit. Et, Alceæ sicæ farina torminibus pota cum vino resistit. Galenus Alceam in simplicium catalogo prætermisit. Paulus ex Dioscoride, Alceam siluestris Maluæ speciem esse dixit, quæ cum vino pota dyfentericis & rofiones sanat, & magis ipsius radix. In hoc tamen Paulus à Dioscoride & Plinio diffidet, quod Alceæ, id est, rofiones, habet pro his quæ Hippocrati, id est, rupta, Diosc. & Plinius appellauerit, vt fortasse præter in Paulo, pro Alceæ legere oporteat.

Pauli l. d. d. suspensa Paulus cor. rigitur

ALCEA VVLGARIS.

Elquicubitali & maiorem altitudinem vbi saltequitur, & h. oculibus hirsutis, asperis, fungosa meauilla factis: folia Maluæ vulgaris succedat,

Descriptio



maiora, ad pediculum vsque plenumque in tria, quinque, aut sex segmenta diuisa, atro-nitenti, hirsuta: & ex eorum alis, pediculis quadrantalibus hirsutis appenduntur flores rosæ speciosi, purpurascente carne oive colore, quinque foliis triariciis compositi, quorum medium occupat racemulus apicum albicans: summa contin-

eta compressi caseoli formam emulantur, & ceu vulgaris Maluæ: radix digitalis longæ.

Cordo, Trago, Fuch. Matth. Apollini, Iacuna, Hæchio, Lonic. (cui etiam Herba Simeonis, sed eius icon mala.) Dodon. gali. & Lat. in fol. Lonicæ. vbi & speciei minoris meminit, & Catalp. Alceæ. Alceæ.

Brunfels. Alceæ Dioscoridis, & Herba Simeonis dicitur: Ruellio, Russica Althæa, vel Bisnialua siluestris. Trago Alceæ, siluestre Maluæ genus, Malua altera, Malua siluestris, Barbari Cauda Leonis, & Peristerion quorundam. Corn. Alceæ Officinæ & Herbar. Malua, & Malua siluest. species. Io. Agric. Vngarica herba, Theod. Dorth. Dens Leonis, Hermanni Comitæ à Nouenare Lagopoda Dioscoridis.

Synon. Herba Simeonis Lonicæ. Alceæ.

Alceæ Dioscoridis.

Herba Simeonis.

Alceæ.

Malua off.

Alceam, inquit Matth. passim ferè in Italia, aliam Bisnialuam, alij Maluam syluestrem, non nulli etiam Maluanfem agreste nominant: Alceæ Galenum meminisse non reperio, nisi lib. 7. simplic. vocet Maluam syluestrem.

Ait Cronemburg. de comp. med. Alceam Dioscoridis quosdam perperam Maluam Theophrasti existimasse.

Amat. in Diosc. Alceæ, Herba Hungarica. Item cent. 2. curat. 52. Alceæ, Malua Vngarica.

Anguill. Cannabis sylu. facit, ac dicit, Herbarij vocant Hungaricam, alij Alceam: quamvis utem non sit Alceæ, conantur tamen demonstrare descriptionem conuenire.

Cæterum, xarræcis a gela siue Cannabis sylu. dicitur, quòd (vt Dodon. vult) ex cortice Cannabino persimili, funes intorquetur queant.

Alceæ Dioscoridis.

Herba Simeonis.

Alceæ.

Malua off.

Maluanfem agreste.

Error quorundam.

Herba Hungarica.

Cannabis sylu. cur dicitur.

Lobel. & Pena in Adu. Vulgaris Alcea, & Malua syluestris. Lobel. Obs. & Icon. Plantar. Hort. Lusit. & Clus. hist. post. Alcea vulgaris. Hist. Lugd. Alcea Matthioli: Alcea vulgaris Lobelij.

C. Bauh. Phyt. Alcea. r. frue vulgaris maior. Schyv. Maluam syluestrem, Alceam dictam scribit *Σαυρόδρακον* à colore, quod firmiter dyfenteriz & ruptis medeatur, Rothe pappeln/berz leudre.

Nomina linguarum

Alcea Græcis & Alcea Latinis. Germ. Sygmarzwurz/ Sigmonds wurz/ Hächleuchren/wilde pappeln/Schwaugen pappeln/ Bruntel' felzig Cordo, vulgò Herba Simconis, Belg. Sigmarz cruyt. Gall. *Bismalve* vel *Gurmauve saunage*. Ital. *Bismalva*, *Malua silvarica*, *Malua uisifaluarico*, *Bion vischio*. Hisp. *Malua montesina*, & *Malua di Vngria*. Boh. *Felzß lowen Zan*.

Locus & tempus

Alcea vulgò prouenit Montbelgardi extra muros horti Illust. E. C. & prope pagum *Nammal* in Comitatu Montbelgardenfi, inter pontem *Fantacourt*, & *Dampierre* florens Iulio, copiosè circa *Matthai* Castellum: Mithi uisa est etiam Montpelij ac Geneue. In Ducatu VVirtembergico ad fontem Admirabilem florens Augusto mense.

Vires

Ruri notam dicit Schyv. in cultris campestribus, agrorum, scrobiumque marginibus, iuxta vias lepes, & semitas; floret Iunio & Augusto.

Ex emplastico medicamentorum numero esse Alceam, & folia quæ glutinosum quid ac lentum habent, & etiam radix ipsa, quæ glutinosa, dulcis & modicè adstringens apparet gustantibus, abundè monstrant. Hinc factis consistat Alceam citra insignem, tum caliditatem, tum frigiditatem siccare, ac plandè emplasticorum consistentiam obtinere. Celebratur ad caliginem oculorum ab empiricis, vt non desint qui credant radicem Alcea, è collo suspensam aciem oculorum supra modum acuerè, & tueri posse. Et hinc fortè nomen indeptum germanicum *Hochleuchren*: Syluestre Maluz genus, quam Alceam vocari *Tragus* dixit, si herbæ & radice vino vel aquà decoctum bibatur, torminibus intestinorum remedio est, ruptis & conuulsis conducit, & opitulatur. Breuiter, Malua Romana, Alcea, Malua vulgaris, & *Hibiscus*, omnibus calidis doloribus totius corporis apprimè conducunt.

Caligò oculorum

Inflammationes

Maluz: flore melino: fructu Maluz: radice fibrosa, alba.

E syluestribus (Maluis) inquit Plinius, cui grande solum, & radices albæ, Althæa vocatur.

Malua sive Plinio

Synonyma vt & alia nonnulla in appendice huius libri tradentur.

Nomina linguarum

Græcis *Σαυρόδρακον* & *Αραβος Σαυρόδρακον* dicitur: Arabibus, *Chirini*, *Charini*, *Chalthine*, & *Rosa Zammiri*: Germ. *Zbisch* *Zybisch*/ heylwurz, *Stoetwürtz* & *Sammerpappeln*. Belg. witte hienst/ vunde witte Maluë: Gall.



Guimaclue, quodd glutinosa fit Malua: Ital. *malua uisco*: Hisp. *Hierua cannamera* & *marmara*: Angl. *Mâsche* *Mashow*: Boh. *wyßky* *Slegz*: Hung. *Seyer* *Malua*/ h. e. alba Malua & Mazola.

Locus & tempus

Copiosa nunc est Montbelgardi prompens Maio, florens Iunio, in Horto E. C. nostra opera, ha-

betur etiam in aliis. Montpelij obseruau spontè prouenientem prope mare: *Basilæ*, *Geneue* & *Lugduni* in hortis. Nascitur locis vlginosis & pinguius, humenubus, & palustribus pratis, & in fossis. Floret Iulio & Augusto mense.

Vires

Multiplieem eius in medendo vsum ac vtilitatem declarat *Dioscor.* his uerbis: Decocta Althæa in uino aut aqua mulsâ, aut per se pota efficacax est contra vulnera: item ad strumas, parotidas, abcessus, mammarum inflammationes, contusionés sedis, inflationes, neruorum rigores: si quidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta, vt dictum est, adiecto sullo adipe, antanserino, terebinthinæ, vt malgmatiss lentor fiat, facit ad vuluz inflammationes, præclusionéque in pestis subdita. Decoctum eodem fungitur munere: onera vuluz, reliquiasque à partu extrahit. Decocta siccus ex uino potus succurrit vrinæ difficultati, calculosorum cruditatibus, dyfentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis.

Vulnera Strumæ

Vulua

ALTHÆA SIVE BISMALVA.

C A P. III.

Descriptio

EX Maluarum familia prærogatiuam tulit Althæa, vtilitatis multiplicis nomine commendatior, radicibus multis nixa, benè habitis, albis, nu cagine lentâ, quam manu macerationéue deponunt, rurgidis: canles bicubitales & proceriores, teretes, tenues, hirsuti, angusto tubulo peruii: in quibus folia alternata Maluz vulgaris. longiora, sinuosa, serrata, mollicello tomento incana, ex alis flores proferunt, Maluz vulgans surrectæ, colore albo tantillum ad carneum declinante, quinque foliis constantes, in quorum medio stylus 4. apicibus purpurantibus & obsok tis floridus erigitur: semen pashilli compressi rit u vt in vulgari relinquitur.

Althæa Dioscoridis.

Dioscorides Althæa folia tribuit, vt *Cyclamino* rotûda, lanugine canescentia: florem roseum: bicubitalem caulè: radicem lentam, intus albam.

Hibiscene Theoph. stylus.

Theoph. de *Hibisco* inquit: Folio Maluz, maioritamen, pilosiorique: caulibus mollibus gustu

Plinius Maluarum vsum Medicum, de quo iam diximus) suscipis persecutus, tandem addit, Althæa in omnibus supradictis efficacior radix, præcipuè conuulsis ruptisque. Cocta in aqua aluum fistit. Ex uino albo strumas & parotidas & mammarum inflammationes tollit. Panos illita. Eadem arida in lacte decocta, quàmlibet perniciosæ tussi medetur. Hippocrates vulneratis, sicut tubusque defectu sanguinis, radice decoctæ succum bibendum dedit: & ipsam vulneribus cum melle & urina, item contusis, luxatis, tumentibus, & muscularis, neuis, articularis imposuit: & Asthmaticis ac dyfentericis in uino bibendam dedit. Mirum aquam radice ea addita addentari sub dio, atque laetescere. Efficacior autem quò recentior. *Hæc Plinius*, quorum quadam etiam *Dioscorides* habet. Verùm quod aquam radice Althæ

Althæa addensari atque lactescere dixit, id iam ex Dioscoride atque Theophrasto protulimus, ut ex eis non immeritò dubitet Cornarius an lactescere rectè in Plinio legatur, & non potius lentescere, aut coalescere. Idem Plin. qui illa de Althæa prodidit leorsum aliquot locis de Ibisco, ut ab Althæa diverso scripsit. Hibiscum, inquit, à pastinaca grauitate distat, damnatum in cibis, sed medicinz vile. Et Pastinacæ simile Hibiscum, quòd Molochen agriam vocant, & Aristolochiam, vlcerribus cartilaginis, & ossibus fractis medetur, folia eius ex aqua pota aluum solouunt, serpentes abigunt. Apum, vesparum, crabronum icibus, illita medentur. Et mox, Celsus & podagris, quæ sine tumore sunt, radicem eius ex vino decoctam imponi iubet. Et medetur lichenibus Hibisci radix cum glutino & aceto acri decocta ad quartas. Quæ in re Plinio apertè refragantur Dioscorides & Galenus, cæterique Græci, qui Althæam Ibisicum siue Ebiscum vocauerunt. Sic enim Galenus. Ebiscus siue Althæa, est autem Malua agrestis, facultatem habet digerendi, laxandi, phlegmonem leuandi, mitigandi, concoquendi difficiles coctû abscissus. Radix portò eius & semen cætera quidè par foliis modo agunt, verùm tenuiorum partiû, magisque ex siccatiorum, adhuc magis exteriorum facultatem, ostendunt, ut & vitilignes detergant, & semen renum calculos confringat. At radicis decoctum ad dysenteriam, diarrhæam, & sanguinis reiectionem aptum est, nempe cùm adstringentem quandam facultatem habeat. Et de Maluis agens. Huius generis est & ea quæ Dendromalache nominatur: sed efficacissima prædictarum in digerendo, appellatur etiam Althæa.

Aquâ destillatâ Althææ erosiones intestinorum ex dysenteria, aliaue cholera caussa profectas perlanat, Tragus: asthmaticis propinatur vtiliter: Radix minutim concisa, inque lacte aut aqua decocta, quousque in puluem euadat, & emplastri ritu imposita emollit, & maturat quæcunque vlcera, quæ spontè sua suboriuntur, quale id est quod in manibus sapenumèr nascitur, & à Germanis Sas Mittel nuncupatur, nec non alia huic similia, quæcunque corporis parte oriuntur. Oleum ex foliis Althææ compositum, omnes apum & vesparum aculeatos icibus perlanat, illitu. Idem possunt folia per se. Semen in puluerem redactum & cum rore, qui Maio mense excipitur, temperatum, vitilignes & maculas faciei emendat. Radix aut semen in aceto decocta ac calida in ore retenta, dolori dentium auxiliatur: proinde apud Medicos equarios magni nominis & vñs est hæc radix. Hæcille. Tumores duri si sint minores tolli tradit Saxoniam impositâ radice Althææ maceratâ in aqua ardentis, aut Oxymellicæ.

Althæa Thuringiaca Camerario. Hanc D. Doldius Norimbergâ misit: ac similem Montepelio à Io. Henrico Cherlero habemus.

cuius folia sunt incana & mollia, in tres laciniâs maiores diuisa: flores etiam paulò minores [quàm in Pannonica] Belgicæ floribus magnitudine respondent; sed colore differentes, nempe qui toti carnei sunt siue incarnati, multis intus staminibus nigricantibus: cæterâ vulgari similia: gaudens humilis (in Pannonia) locis & secundum rivulos sitis, floribusque Iulio, Cæs. Bauh. Phyt. Althæa tertia, siue laciniato folio, tertia Clusio.



ALTHÆA FLORE GRANDI ALCEÆ, Thuringiaca Camerario.

DE hac Althæa flore grandi Alceæ, seu, ut in Iconibus ab ipso inscribitur, Althæa Thuringiaca, dubitat Camer. hort. an altera sit fortassis, aut tertia ex Pannonicis Caroli Clusii? Sed durii sumus & nos, relinquimusque aliis liberum certiora perquirere. An igitur Clusii Althæa



Clusii. Althæa Thuringiaca Camer. Hanc D. Doldius Norimbergâ misit: ac similem Montepelio à Io. Henrico Cherlero habemus.

ALTHÆA SPECIES VULGARI similis.

Althæa Pannonica tertia Clusii hist. post. forma non valdè dissimilis Pannonicæ 2. (siue flore grandi,) sola in floribus differentiâ, qui minores sunt, vulgatis tamen floribus aliquantulum maiores.

Moloch agria Aristolochia

Lichenes Plinius Dioscor. Galenus compositus

Dendromalache Althæa

Aqua Radix Althæa

Althæa

Oleum Semen

Althæa

Althæa

Althæa

Althæa

Althæa

ALTHÆA ARBORESCENS

Descriptio



IN arbuscula proceritate excrevit Althæa, ob id arborescens dicta, stirpibus lignosis firmis, cortice tomento lo vestitis: folia Maluarum minorum magnitudine, albas leuiter sinuata, albas Althæa modo, in nonnihil oblongas laciniâs cæsa, candidantia, lanuginosa, pediculis longis villosis, nixa: ex quorum alis ex-

oriuntur flores Maluæ vulgaritatis succedunt pares, purpureiscentibus unguibus & ad radicem hirsutis, folio instructo calyce, in quo postea orbiculis circumactorum summam nigricantium pellicula alba connectorum succedunt.

Synon. Althæa fruticosa Clusii

Lob notatur

Alcea cannabina Clusius reprehenditur

Lobel. Obs. Althæam arborescentem, seu Althæam fruticem Clusii eandem tanè existimat, cum Althæa arborescente in Aduersariis descripra. Clusius autem suam Althæam fruticem seu Althæam fruticantem, à Lobelio Althæa arborea nomine exhibet, ea nobis aliquando Melchioris semine peregrè misso prouenit, stoloniibus singulis annis Hyeme marcescentibus, & Ast semen quod mistum Clusio, non fuit Althæa arborea Lobelii, ei enim stolones non pereunt Hyeme. Ea de qua loquitur Clusius est Alcea Cannabina. Scio ipsam perseverare in sua opinione & Cannabinam suam ab ea separare, quam Lobelii putat arboream: an benè iudicent alii, de Cannabina plura sub Alcea.

Idem rursus Lobel. in Icon. plant. diuersas ita tuere videtur, siquidem eas separat, ac sub diuersis titulis sculptas proponit. Nunc enim Althæam arborem Olbia in Gallo-provincia: nunc fruticem Clusii, vocat.

Consultat sibi hacin parte Compilerator Hist. Lugd. qu. Clusii Althæam fruticem 1. & Pennæ & Lob. Althæam arboream, eadem tabellâ comprehendit, ac Althæam lignosam Dalechampii cognominat.

C. B. not.

Contra, sed malè Casp. Bauh. Phyt. Althæam 4. siue frutescentem folio rotundiore incano: Althæam fruticem Clusii & Lobel. in Obs. Althæam lignosam Dalechampii, ab Althæa sua 5. siue Althæa arborescente folio acuto, Althæa arborea Olbia Aduers. separat, ac dicit: Hanc licet Lobelius cum præcedente eandem faciat, diuersa tamen est: utramque habemus: huius enim flores minores, folia etiam non ut præcedentis mollia nec rotunda, sed acuminata &c. quod ex figura facillè est colligere. sed si C. Bauh. figuram Lobelii in Aduersariis diligentius considerasset, deprehendisset utique eam non esse bonam, sicut plures minus bonas habet. Sunt nonnihil rami ab ipso Lobelio dono dati nomine Althæa lignosa propè Hircos ad iustam arborem

prouenientis, in quibus folia superiora in tres partes acutas diuisa, in cæteris non differentia: mihi data etiam per Valerandum Douez, & ea, quam hæctenus obseruauit ut mihi persuadèa, ac cum ipso Lobelio. cui potius credendum te interpretantem eandem Lobelii Aduers. & Clusii variare autem arborem Althæam etiam in eadem planta ut faciunt cætere Althæa ac Maluæ. Flores in pictura Aduers. ex sicca planta malè picti satis demonstrant non minores fuisse, quàm in Clusii figura: nec etiam si rami ex planta quæ in Prouincia prouenisset paulò minores haberet flores, ac folia minis mollia, sed paulò rigidiora, hoc faceret differentiam: vidimus quotidie quantum immutentur apud nos plantæ, quorum semina ex calidioribus regionibus delata: anni quoque tempus facit mutationem.

Aliquando recepi Lutetiâ à Domino Rasse semen cum hac inscriptione: Althæa frutex, ex quo alletes magni ex Oriente flore rubro: fortè floris colos, præter magnitudinem aliud genus à præcedenti denotat.

Tabern. not. Tabernæ Hist. & Icon. in quibus mutata est nonnihil prior icon, vnius plantæ, Althæa arborescentis Lobelii, & Althæa arborescentis Clusii, duas habet figuras, cum tamen vnica sufficisset.

Collegi Stetgardia in horto vnice Nouembri semina, quæ Montbelgardi in horto Ill. E.C. fata, ex quibus excreuerat ad altitudinem duorum hominum pulchra tanè arbor quæ hieme domo tecta conseruatur, & folia retinet, & denuò Maio floret. Eam etiam vidi Pförtzemi D. Güningeri in horto pharmacopœi. Basileæ apud Dominum Zwingetum: Lutetiæ in horto Robini nostri. Quibusdam in locis, teste Lobelio, & fetidioræ celo [quale in marinis Gallo-provinciae ad Olbia] prouenit tanto fruticat, ut ad sepes constitutas satis sit. Tantùm iuxta urbem Horiuelan extremis limitibus Valentini regni Murciano finitimi obseruauit Clusius, Martio florentem, an verò perpetuâ esset fronde, cum Hispanicarum stirpium historiam scripsit, ignotauit. Multis autem post annis, ex ea stirpe, quæ à Joh. de Casabona missa Francofurti ad Mœnum nata est, deprehendit plantam folia non abiecere nisi alius nouis enatis: ut præterque stirpes perpetuâ si hodie virentes facere solent. Frigidioribus etiam locis hyemem perferit.

Locus & Tempus

ALTHÆÆ SPECIES, QVIBVSDAM ARBOREA ALTERA, VEL BRYONIZ FOLIO.



ANNO 1602. prouenit nobis in horto Montbelg. foliis rotundis quæ reposita hiemem perulit & excreuit anno 1602. ad altitudinem hominis, foliis & floribus paulò minoribus: caule ex viriditate lucente: ramis veluti fatina aspersis, quibusdam ex superioribus foliis subtus magis candidantibus, quibusdam

quibusdam longiusculis sine lacinis.

Anno etiam 1602. verno tempore facta, ad altitudinem penè cubiti excreuit, cuius folia ex longis pediculis rotunda, coloris Althææ, in inferna parte candidiore, caulibus tomento candidis.

De hac fortè Clusius hæc scribit. Nata forsitan hæc planta [Althæa frutex,] semine, quali me donabat superiore anno Ioseph. à Casabona, Althææ arboris duorum generum appellatione, recens ab ipso in Creta insula collecto. Vni ex amicis quibus communicabam, prouenit planta, quæ sequente anno, valdè adoleuit: nam ramos protulit bicubitales, cortice viriditæ, cui in persâ est plurima incana lanugo, seu potius tomentum, vt in priore quod descripsi genere: folia etiam habet incana, angulosa, & per oras dentata, illis tamen maiorâ: flores minores, Althææ vulgaris florum magnitudinem vix superantes, quinque foliis cõstantes, instar reliquarum Maluarum, coloris rubri valdè diluti, & ad carneum (si ita vocare licet) inclinantis, multis staminibus ex albo pallefcensibus, in oblongiusculo & crassiusculo stilo nascentibus, & vmbilicium occupantibus: floribus defluentibus succedunt plana capita, vt in vulgari Malua, semen in orbem serie quadam distributum continentia.

An Camet. Hort. Althæa arborefcens, vel potius fruticosi perennis planta, alia ab Hispanica Clusii, & fortassis eadem cum Prouinciali Penæ, sed non exquisitè picta. Ego Hispanicam Clusii & Penæ eandem puto, diuersam ah hac, nec hanc etiam ad Tabernæmontani arborefcentem refero, sub cuius inscriptione eam anno 1595. Heidelbergæ communicatam memini.

C. Bauh. phyt. Althæa 6. siue fruticans foliis Bryoniæ perennis. Ramum ex horto Domini Camerarii ad nos misit, inquitis, Doctõr Doldius arborefcens temperuicentis nomine, cuius etiam fit mentio in horto Camerarii p. 12. Althæa arborefcens nomine: at ne quis censeat eandem cum Althæa arborem Olbiæ Lobelii.

Mihi missum semen per Dominum Christophorum Schwartze Stutgardia inter femina quæ pro Creticis miserat: Dominus Casabona idem mihi tranfmisit, cui titulus erat, Althæa arborea 2. ex Candia, foliis ad satis amplam magnitudinem excrefcens. Argentina vidi in horto D. Feiderici Meier florentem Septembri, Montbelgardii in horto Ill. E. C. prouenit, & repõsita sequenti anno floruit Augusto, Septembri, & Octobri, sed semen non maturuit propter Aestatis & Autumnii pluuiosam constitutionem.

ALTHÆA SIDA DICTA QVIBVS DAM.

Sida nomine planta folium habet circumscriptione Abutili putati, ex rotundo in acutum mucronem desinens, delicatum, molle, villosum, & per ambitum serratum. Flos magnus Maluæ rosæ florem æquat, oblongus in siccâ planta, staminibus in medio longis, colore præditus, vt volunt Aduersaria, purpureo, saturatiore quàm Præoniæ aut Maluæ satiuæ, aut Cytini, iuxta & in summis cauliculis videntur tempore vindemiarum vtriusli rotundi, oblongi, phæo, vel pullo colore, Aristolochiæ effigie, prægnantes Smyrni semine, aut Milii colore & magnitudine. Radix hortensis Maluæ: aut cubito tum duorum.

Dodon. Lat. in folio, Althæa 2. Althæa peregrina quædam species apud Belgas tantum hor-

tensis: fructu tuberoso, rotundâ ferè ac globosâ, quinqueangulari tamen specie: radice quali Althæa. Nonnulli, inquit, Sidam esse volunt. Sed quia Sida aquatilis est (stips, capite quàm papa-



Figura Lobelii nullam plantæ quam hic tradidimus partem benè exprimit, Lobelium tamen intelligere plantam de qua agimus satis apparet, cum ait, Althæam esse hortensem Dodon. apud quem figura mihi placet.

Nec meliorem Lobelio Tabern. Icon. & Hist. nomine Althææ palustris, Wasser Eibisch/ exhibet.

Casp. Bauh. phyt. Althæa 7. siue palustris. Sida Theophrasti maior Bembi.

Nobis prouenit in horto Ill. E. C. Montbelgardii: verum non floruit: aliquot annis repõsita durauit, quotannis caulibus exsiccatis.

ALCEA ARBORESCENS GLABRA, Keemia dicta.

Fruticis modo assurgit, stolonibus lignosis, cortice nigricante obductis, quali etiam vestiti



prædita sunt vngues purpurea floridior, quàm in

Sida non est!

Althæa per lustris

Lobelii taxat

Tabernæ

Locus

Descriptio

Sabdaniz flore, infedi: ex umbilico prodeunt multa flamina flava, & stilus albus multifidus. Semen non vidimus. Radix crassa, longa, intus, vi & caulis albicans.

Synonyma

Camer. hort. Alcea arborefcens, cuius duplicem inter icones figuram habet eodem nomine, ac eius Rauvolfium meminisse dicit in suo itinere nomine, Malua arborefcens. Ego autem huc non refero Maluam arboream Rauvolfii, sed ad veram Maluam.

Sida minor.

C. Bauh. Phyt. Althæa palustris septimæ altera, flore minore caruleo &c. Eideim Alcea 7. siue arborea. Alcea arborefcens Camerani, quorundam Kefnia. Syroum dicta. Item: Alcea 7. siue Synaca Lutetiâ habita à Robino. Hæc mihi vna planta non tres, donec demonstraretur discernen.

Hyper. Chetmo planta Synacæ dicta species Alceæ, fruticosa, quæ in Synac colitur ad oculorum oblectationem. Chetmo planta Synacæ & Cretica species Alceæ arborefcens. Cluf. Althæa frutex 2. Ratum & elegans, seu tertium Althææ fruticans genus.

Locus & Tempus.

Pulchrum hanc plantam primùm vidi Lutetiæ in horto Joh. Robi iohannis regi. Postea romine Ketmæ in horto D. Frid. Meyer Argentinz. Vidi in horto D. Jacobi Zvingeri Bâleæ: ac eius ramum habeo cui Frater Casp. Bauhinus ascripsit nomen Ketmæ & Sida minoris Theophr. Bembo.

Sida minor

Cluf. raris. Cluf. raris.

ALCEA PENTAPHYLLI FOLIO vel Cannabina.

Descriptio.



Herba hæc altitudinè excedens, coliculis est alperis, lentis, in plures ramulos diuisis: folia Cannabinis satis similia, ex pediculis brevioribus, in tres partes seta longis, median longissimam, reliquis vtrinque breviores, quæ sæpè iterum in nuntos subdividuntur: sic non tantùm tripartita, sed modò quinquepartita, diuersi modè ctenata, hirsuta, nigricantia, minùs alpera Cannabinis, sapore viscido: flores interdum singuli, interdum bini ex longis pediculis vel ramulorum potius extremitatibus, Alceæ vulgaris similes, minores tamen, quibus ex idem bnis succedunt capitula, qualia in Malua vel Alceæ, parua, foliolis obuoluta, in quibus semina Maluæ crispæ, nigra: Radix perpetua, cuius pars vna maior, alia minores, extra & intus alba, gustu admodum viscido.

Synonyma.

Quamvis Alceæ alteri satis conueniat Alceæ descriptio apud Diosc. & Plinium, magis tamen videtur Galapino conuenire Cannabis syluestris.

Camer. hort. Alceæ Cannabina, secundum nonnullos Cannabis filu. Diosc.

Lob. & Penæ Aduerf. & Icon. Plant. Alcea fruticosior Pentaphylli folio.

C. Bauh. Phyt. Alcea 6. siue Cannabina, Cannabis filu. Dioscoridis.

De hæc Clusius Hisp. & Hist. post. in fol. scribit, nomine Althææ arboreæ Lobelii. Quam doctus inquit, Lobelius Althææ arboreæ nomine exhibet, ea nobis aliquando Machliniæ nata semine peregrè misso, feliciter prouenit, atque ex radice crassa lentaque, qualis in Althæa vulgaris, duriore tamen & quodammodò lignosa summa parte, aliquot stolonos protulit humana proceritas, qui aduemente bioma marcescebant, singulis flos de anis nouo vere plures protrudebant: deinde Augusto demum producentes, semen Septembris: quo à ventis excusso & deciduo, alia etiam stupes spontè renascebantur. Quod verò non sit Lobelii Althæa, quod sibi falsè peritædet Clusius, vel ex eo manifestum sit, quod in Lob. Althæa stolonos non marcescunt, nisi tota plâta simul pereat. Et licet ab hæc Alceam fruticosa cannabina no folio capite sequenti separet, ei tamen alletiri non possum, quamvis quod de flore maiore scribit nostræ plantæ non conueniat. Ceterùm Icon, quàm proponit Clusius, est eadem cum icone Cannabinæ Alceæ Lobelii.

Nata mihi est in horro Ill. E. C. Montbelgardi, ex semine Patauo à Cl. viro D. Iac. Antonio Cortulo misso, nomine Cannabis syluest. quorundam addente, nec Altheam, nec Alceam esse. Semen matuit Augusto & Septembri, quo tempore florentem adhuc obseruau. Miliùm est & eius semen Stutgardia nomine Alceæ Venetæ. Primùm autem vna mihi est in horto D. Cortuli.

ALTHÆA THEOPHR. FLORE LVTEO, quibusdam Abutilon.



Cum Altheæ vulgaris de mollitie palmæ certat, quod Abutilon vocat, radice parua, albâ, libris aliquot adnatis dooatâ, subdulci: caulis foris tomento molli totus est oblitus, pingue quid attrētantis manibus alinens, incanus: cortici, qui facile delibratur, subest lignum Saligni instar, candidum & durum, medullam succulentam viridem continens. ex caule folia nullo ordine nascuntur, pediculis paluibus, & minùs lata, circinate rotundatis, nisi in mucronem acutiorem desinerent, lanugine incanâ & insigniter mollè obducta: ex horum alis rami producuntur: indidem flores itidem prodeunt, Garyophyllatæ aqueæ, intencæ crocei, striati: è quinque folis compositi, medium occupante apiculorum

radice duntaxat expressus. Ipsa verò decocta per-
nionibus occurrit. Albx succus epiphoras sedat
fonti illitus: aluminis paucò admittit ignem sa-
cium, sine oleo trita scilicet, adustis medetur. Et
contra eruptiones papularum, coctâque eadem
contra vlcera quæ serpunt, illinitur, & alopecii
cruda, & vlceribus quæ in capite manant. Succus
eius cum melle naribus inditus caput purgat.
Coquitur & cum lenticula addito aceto, vt ven-
trem molliat. Validius cocta fluxiones stomachi
sistit, & ventris.

Galeno verò auctore succus betarum tergendum
vim habet manifestam ad eò, vt ventrem ad ex-
cernendum incitet, & stomachum interdum
coadit, præsertim quibus naturâ sensu exactio-
re præditus est: ob idque edulium id stomacho
est noxiu, si largius sumatur: corpori autem ab
ipsa, vt ab aliis oleis, paucum alimentum accedit.
Verùm obstructum hepar Maluâ magis aperit,
& multò magis si cum Sinapi aut omninò saltem
cum aceto mandatur. Lienosis item eodem
modo sumpta est vile medicamentum. Et, beta
nitrosa facultatis particeps est, quâ tum digerit,
tum exterget, & per nares purgat. Caterùm cocta
nitrositatem omnem exiit, sitque leuiter discutiens.
Porro ad detergendum digerendūque
validior est beta alba: nam nigra adiunctum ha-
bet quidpiam adstrictiōnis, & magis in radice
quàm in aliis partibus.

Ex Simeone Sethi betæ succus mediocriter ab-
stergit, ventrem etiam ad effluxum proritat, &
stomachum aliquando velliat, eorum præsertim,
qui huc valdè sensibilem habent. Quapropter e-
dulium est stomacho infestum, si plurimum co-
medatur. Exiguu est eius alimentum sicut cæ-
terorum olerum. Vtilis verò est ad icteris ob-
structiones cum aceto comesta. Pari modo si eda-
tur, & lienis obstructio nibus bonum fit medica-
mentum. Constat autem beta ex contrariis fa-
cultatibus: lucus enim eius calidus est, ventrem
constringit, & sitim adfert. Eius verò corpus cras-
sarum partium, statuosum, concoctu difficile, &
frigidum, ventremque sistit: maximè si aqua in
qua eòctum est, subinde abiciatur.

Ad betarum cocturam vinum & piper expeti
scribit Martialis his versibus:

*Ve sapiant faruæ fabrorum prandia Betæ
O quam sapè perer vina pipèrque coquus.*

Præterea eiusdem betæ radicibus coñditis v-
tuntur. Conditur autem beta in aceto hac ratio-
ne, cum foliis & radicibus integrum eradicandum
betæ olus, aquâ deinde benè, necnon etiam cul-
tro mundandum: in aqua ex hoc bulliendum,
& transuerim in particulas secandum, posito ve-
rò in vase aliquo figulino, aquâ reiectâ, sale carni
vel grani Iuniperi condies, huius superinfuso ace-
to, cyato vho atque altero pleno, pro betæ quan-
titate.

Nihil in culinis beta hortensistequentius esse
testatus est Tragus. Nam in cibo vsurpatur. Tem-
peramento calida est beta, maximè quod ad radice-
m attinet, id quod hinc manifestum fit, cum e-
niñ succus naribus excipitur, adurit, & sternuta-
mentâ proritat. Beta in cibo sicut Spinachia para-
ta facillimè est concoctionis, iisque inprimis
conducit qui stomachi imbecillitate laborant. betæ
hortensis plantulæ recentes cum radicibus le-
uiter bullitæ, & ex aceto postea deuorata cibi
appetentiam adferunt, sitim compescunt, chole-
ram in ventriculo reprimunt. Debet verò eius-
modi cibus æstate potissimum vsutari.

Bayrus emplastro è radicibus betæ curat acho-
res.

BETA CRETICA SEMINE SPINOSO.

Betæ Creticæ folia nostrati non multum diffi-
milia, nisi quòd vix ad eam magnitudinem



quantum ob-
seruare licuit,
proueniunt, eg-
teroqui satis
carnosa, per ex-
tremum rotunda,
aut saltem
obtusâ, - iuxta
pediculum an-
gustum non ni-
hil ala: sifculi
parui, lutei, spi-
cati in ramorū
extremitatibus:
ebini circa cau-
lem nascuntur
ex foliorum al-
lis in tres spi-
nas radiatas de-
sinertes, costis
pulchris dona-
ti, transuersisq;
cancellis reticu-

laci, quorum vnicique semen inest vnum oblon-
gum, pellicula ruffa tectum, medulla alba. Rami
multi cubitales vel minores ex radice annua su-
pra terram se extendunt.

Si hæc non iam vsurpasset nomen betæ, ad La-
pathum vel Spinachiam potius referrem. Casp.
Bauh. phyt. beta 6. siue Cretica semine aculeato.

Betam Creticam semine spinoso vidi Basileæ
1595. Augusti sine semine maturo in horto Do-
mini Iacobi Zvingeri, quod attuli ferendum
Montbelgardi in horto E.C. quod prouenit. Ac-
cepi etiam à D. Phil. Seb. Sprengerio nomine betæ
spinose Candia.

BETA LATICAVLIS MONSTROSA.

Admirandæ betæ monstruosæ, quam H. Lug-
dun. picturâ exprimeret curauit, cuius caulis
est quatuor digitos latus, circa quem parua sunt
folia, & quem totum semen operit, sed in eius fas-
tigio ita densum: vt caulis prospèctum adimat.
Aliquando propè D. Ramberti oppidulum Allo-
brogum in pingui quodam prato talem vidit
Dalechampius siluestris Cichorii caulem.

C. Bauh. phyt. beta 7. siue lato caule.
Nos quia in monstris plantis numeranda
est, eam meritò à præcedentibus sepatauimus;
nec pingendam quidem esse duximus.

SPINACHIA MAS ET FOEMINA.

Fætu gustu tota est planta: radix tenuis, al-
ba, folia Dentis Leonis, latiora, profundè si-
nuata, minùs tamen crebris laciniis, pinguiscula,
& farina tenui Atriplicis modo resperfa: caules
fistulosi, striati, in alas diuisi: flores in alis & cau-
libus, à medio setè vsque ad fastigium, creberrimè

Mmm m

fi, ex herbido purpureo, scilicet: semen aculeatum, & vt nomen docet, spinosum: aliàs Lentis modo compressum, orbiculatum & innocens.

Veteribus incognitus olus



Hoc olus Veteribus (quod mirum est) incognitum fuisse videtur, cum de eo nihil illi, quod legatur, literarum monumentis tradiderint: vel forsitan quod cibo, quàm medicinæ potius natum esset, nec quicquam illustre fortitum, ob id ingenii legnitie obscurum, vel quodd, vt conici potest, nondum in vsum vulgi, literato-

rùmque cognitionem eo fauore venerat, qui eorum quæ sua fuerunt memoriâ, prorsus intactum nihil intentatumque reliquerunt. Non enim silentio tam frequens olus ab ætate voluissent, sed potius celebratum in lucem prodere. Monspelii præceptor Rondeletius, blitum Veterum vocabat, quæ opinio in illo non penitus dissoluit.

Blitum Veterum Olus Hispanicum

Seutlomalache Ruell.

Seutlomalapathum Gesf.

Sexum Spinachia

Genera Spinachia

Trago Hist. Germ. & Lat. vocatur Olus Hispanicum, Spinachia altera seu vulgaris, & Spinachia siluestris. Seutlomalachen, inquit Ruellius, recensens Græcia fecit olus, quasi dicas Maluaceam betam, quod, vt reor, parentum adulterio natum existiment, Veteribus inauditum, fortè quodd figura, & dèticulato seminis habitu netam, & mollitia Maluam mentitur. Sed fortè Seutlomalapathum, ait Gesf. hort. hoc est, mediæ inter betam & Rumicem naturæ, potius quàm Seutlomalachen appellandum. Spinachiam manifestum habere sexum scribit Scaliger. Coniicio autem marem ab eo intelligi illum, cuius semen spinosum est: fœminam sine spinis. Ab his non penitus dissona sunt, quæ apud Camer. hort. & Hist. Lugd. leguntur. Spinachia genera duo, satiuum, & siluestre. Satiuum item duo, mas & fœmina, Mas semen fert, fœmina floret quidem, sed seminis infœcunda sterilefcit.

Rumex domesticus Lapath. hortense Amatus & Casalp. hallucinans

Boulapathum non est

Non est Blitum Hippocrassi

Spinachia describitur & pingitur à Lob. & Penâ Adu. Obs. Ic. plant. Dod. Hist. Lugd. Fuchf. qui & Spinacium olus vocat. Brunfelsio. Camer. in Hort. & Hist. germ. Matth. qui Spanachiu inscripsit. Tabern. Ic. & Hist. Amato, atque Matthiolo.

Amatus quidem domesticum Rumicem siue hortense Lapathum, Spinachiam nostram esse sibi falsò imaginatur, quod & Casalp. sentire videtur. Quare merito Robert. Constant. cum hallucinari scribit dum sine autoritate aut ratione hoc contendit: Constantino in eo adstipulantibus Grapaldo & Matthiolo.

Falluntur & ii, qui Plinii Boulapathon apud Dodonæum esse existimant: Lapathi siquidem genus Boulapathon est: radicis tantum altitudine ab aliis differens, vt ipse refert. Nec quinquè Hippocrassus Blitum est, quod veluti linguam esse scribit lib. 2. de morbis mulieb. Nam necet subditia

istud refertur, quæ rubrum fluxum muliebrem reprimunt ac sistunt. Talis autem Spinachia facultas haudquam est adstrictione omni carens. Nec est Chrysolachanum, vt vult Monardus.

C. Bauh. Phyt. Lapathum hortense alterum, seu Spinachia semine spinoso. Idem apud Matth. Atriplex 2. Lapathum hortense alterum, Spinachia mas quibusdam. Item Phyt. Lapathum 4. siue hortense alterum, seu Spinachia sterilibus. In Matth. Spinachia 3. sterilis.

Spinachia siue Spinacia & Spinaceum olus, Ncmina quod Latini appellant, σπινάχιον recentioribus linguarum Græcis dicitur, ab Arab. & Sorap. Hispanac: à Germ. Spuer oder Winetsch: belg. Spinagie: Gall. Espinaches ou Espinars: It. Spinaci & Spinace. Hisp. Espinaca: Angl. Spinache: Boh. Spinak:

Spinacia quidem & Spinaceum olus ab insigni feminis spiculis nota, quod tan glabræ, & mollis herba semen in spinas occalescat. Spinacia verò sumpto nomine à raritate, quod raro illo medici vterentur. Quibus hæc vocabula displicent, Atriplicem Hispanicam sem vocant, Mauritani Hispanach, id est, Hispanicum olus, fortasse quod inde primùm duxerit originem, ad ceteras tandem nationes translatum: quidam Seutlomalachen.

Spinachiam colimus Montbelgardi in horto E. C. marem & fœminam. Passim in hortis feritur nullum solan respuens, cum Martio & alio tempore, tum Septembri mense, exeurs septem à satu diebus, folio primùm triangulo, molli, mox intubæco, non horrens Hiemis frigora, quæ si iniqua nimis, Inlandis foliis conseruantur: vt Vere cibum suppeditet, quo tempore semè profert: Hæme enim restat: Martio verò satum intra duos menses perficitur, hinc Iunio & Iulio flores & semen edit.

In culinis, teste Trago, nihil ferè frequentioris est vsum, pulvis ex Spinachia recentis confectis. Temperamento illa frigida & humida est, cibo & medicinæ accommoda. Pulvis Spinachia aluo astrictiori profunt, potestque id oleris in omni penne ægritudine cibo deligi, nam meo indici inter omnia culinaria olera Spinachia laudatissime est, & gratissima. Spinachia aluum emollit, gutturis asperitati medetur, & aride tussi confert, teste Constant. Succus & aqua distillata Spinachia pota, calorem restinguit, stomachi rosiones mitigat, & lac elicit. Spinachia cataplastatis in stomacho & epati imposita, inflammationibus illarum parcium prodest, doloremque tollit. Eadem ictibus scorpionum, & araneorum imposita succurrit. Spinachia primæ refrigerantium & hæmestantium classis, nec omnino vacat nitrosa qualitate Camer. Aluum emollit, melius Atriplice suppeditat alimentum, sed aluo parum hærens facile exigitur. Flatus colligit, & vomitiones con-

cit, nisi excrementis humor abiciatur: ventrem decocti iure proluit. Citra aquam coquitur hoc olus, quod magnam vim humoris inter coquendum remittat, & veluti proprio contentum iure alienum apernetur. Ibitur eius succus ad scorpionum & araneorum ictus, ac etiam vulneri illinitur: quinetiam cocta lenit exasperatas fauces: sed nauseam facile parit, nisi Zinzigere, aut alio consimili conditur: Recipitur & inter cruda acetaria recens enata.

SPINACHIA SEMINE NON PVNGENTE; Folio maiore rotundiore.

Longè maior maioribusque est foliis, quàm Delictipno Spinachia vulgaris, nec non rotundioribus, cæteris qui

Ncmina linguarum

Locus & tempus.

Cultura

vsum

Tempus.

Vomitiones con-


Beta candida.



Beta nigra.



Beta radice rubra crassa.



Tom. 1.

Aenus recensit ex-ternæ faciei necessitudo intercedit. Verum cum & ipse emollientes sint & holerae hic collo care volumus.

Beta quam ex radicis & foliorum argumto candidam vocat, radicem lignosam habet nimium digiti crassitudine, mediocriter longam, candidam: folia dilutius virent, Lapathi crassa & succulenta, sapore nitroso: caulis duos cubitos altus, aut etiam maior, gracilis, striatus, multis alis concavus: in quibus longa serie fuscis exigui, ex foliorum alis, apicibus luteis constantes, quinque calycum foliolis obulati: semen rotundum, & culpa superficie alperum, fuscum. Huic per similia Nigra dicta, foliis brevioribus, atrovirentibus. Itemque & ea quæ vulgi Rubra est, foliis rubentibus. At Rubra alia non tantum foliorum discrimen agnoscit, sed & radice quæ ventriosa, Napi instar, intus fortique sanguineo colore saturata est.

Reperitur & Lucea à iam dicta radice buxæ solum differens. Ornant præter has Ill. E. C. Virt. hortum duæ alix: Una albis, latissimisque costis ornata: altera verò rubris, quarum semen Argentinâ mistum, quæ facile percunt.

Dioscorides & Galenus duo genera tantum faciunt, *nigram* & *albam*.

Theophrastus candidam sapore præstantiorem esse tradit, pauciorumque leminum, quam Siculam quidam appellaverint: caule carnosio: radice singulari, & carnosâ, longâ, crassâ & rectâ, vt Rhapsani: suavi, vt etiam nonnulli mandant. Siluestris etiam meminit in genere Carduorum aculeatis foliis non constantis.

Beta hortensiorum, inquit Plinius, lenissima est. Eius quoque à colore duo genera Græci faciunt, *nigram* & *candidam*, quam præferunt, parvisimili feminis, appellantque Siculam, candoris fanè discrimine præferentes, vt Lactucam. Nostri Beta genera faciunt, Vernum & Autumnale, à reponibus fatiis: quarumquam & Junio seratur. Et mox rursus, Mura differentia si vera est, candidis foliis alios modicè, nigris inhibet. Item lib. 20. cap. 8. Est & Betam siluestrem idem scripsit, quam Limonium [vt Theophr. Jovocari tradit, & Neuroidem, multò minoribus, tenuioribusque foliis, ac densioribus, vnde cum capè caulium. Sed hanc Diosc. non novit, Limonium à Betis valdè distinguens. Et Galenus siluestrem non esse dicit, nisi quis Lapathum seu Rumicem ita nominare velit. Quibus verbis Galenus tam plausiblem ac receptam Platonis sententiam in Timæo ambiguum nobis effecit, fatuus omnes plantas olim fuisse feras, neque à se ipsis cultu differre. Cùm enim, inquit Scaliger, Lapathum à nobis multò studio huius rei gratia cultum, nunquam induerit Beta faciem, aut saporem, etiam nunc hærenus in illius sententia, non omnem plantam mittent, fuisse prius agrestem.

Ceterum, videas hodie quæ peritissimos vocari cupiunt, qui quid inter sit inter Betam & Blitum, nec legendo in libro, nec in horto oculis manûe contrahendo discernere queant. Apud Monachos in Mesiam ita scriptum habetur. Herba quædam [Blitum Indicum] habet folia Betæ, siue, quod idem est, Blici. Hos igitur Betam cum Blito confundere dubitationi nullus est locus.

Porro varii varias siluestris Betæ nomine inscribunt plantas. Nam Limonium Tragi, quod Germanos Betam pratensem [Wisen Mangolt] vocare scribit, est Titfolium palustre Dodonæ, de quo lib. 17. diximus. beta siluestris speciem facit Dodon. Lampsanam: eandem Lohelius Lampsanæ nomine depinxit. betam silu. distortam esse Gesner. in cat. pl. iudicat. Sunt etiam, qui betæ silu. speciem Pytolam facere non verentur. Alii, vt Lonic. confundunt betam sylu. [Limonium Tragi] cum Pytolâ altera. Myosotis, Auricula mutis, vt tradit Gesn. in cat. pl. existimatur à Medicis Germ. beta siluestris. Aliis, vt Casalp. beta silu. Plantago [maior] vocatur. Nonnullis, et ceteris Anguill. Plantago aquatica. Gesner. adhuc in cat. pl. beta silu. nomen Potamogeto adscribit. Lapathum ait Galenus, licet appellare betam agrestem. Sed & Cardium pratensem multi betam silu. faciunt.

Betam primam nobiscum appellant *candidam* Matth. [qui tamen hoc titulo *nigram* proponit, ex transpositione & incuria Typographi, & ex Matth. H. Lugd.] Trag. quæ hanc agrestem seu er-

Dioscor. & Gal. genera

Candida Theophr. Sicula

Ex Plinio

Beta nigra & candida Sicula

Limonium Beta silu.

Plin. resatur

Beta præteritissimos

Blitum

Trifolium palustre Lampsanæ Bistorta. Pyrola vera.

Myosotis

Plantago Plantago aquatica Potamogeto

Lapathum Cardium pratense Beta crassa

riticam Betam censet:) Fuchf. Dod.galk. & Lat. in fol. Cord.in Dioscor. Lacun. Hist. Lugdun.& Schuyverckfeldius. Betam albam Turn. Gesner. hort. Lonic. Lob. Obs. & Ic. plant. Hort. Luf. Camer. hort. Epit. & Hist. Matth. germanic. Betam alteram. Cæsalpinus. Betam Brunfels. & Tragus pingens. Betam 1. siue albam Cæsbauh. ad Math. in Phyt. 4.

Beta nigra Betanigra nominatur à Matth. (qui uti dictum hoc nomine albam pingit.) Trag. (apud quem perperam siluestre Beta genus creditur:) Fuchf. Dodon. gall. Gesn. hort. Lacun. Castor. Histor. Lugd. (quæ cum Matth. eam transposuit, ac candidam dicit:) Cæsp. Bauh. phyt. & hort. Lufatiz. Schvv. vocat Betam nigram à foliorum colote ex obscuro magis virentium: Betam vulgatiorem: Betam rubram Dod. Lat. in fol. Lonicerus. Betam Taberna.

Beta rubra Rubra meminerunt Brunfels. Tragus. Hanc infetibit Lob. Obs. Ic. plant. & Hist. Lugdun. Betam rubram vulgatiorem, Betam 2. siue rubram vulgarem. C. Bauh. phyt. & apud Matth. pro Beta 2. seu nigra pingitur.

Beta rubra & radice crassa Beta rubra radice crassa ea est, quam Matth. nomine Rufæ ita exprimit: In Germania tamen habetur & Rufa, non modò solius, sed etiam radice, quæ illi Raporum oblongorum magnitudine extuberat: colore aded rufescente, ut eius succus viuum sanguinem reierat. Hanc Lob. Obs. & Icon. Cæsp. Gesn. hort. cui & Scutostaphilinum: Camer. hort. Epit. & Hist. Matth. Germ. & Schvv. cui etiam Rapum rubrum dicitur, Betam rubram vocant, Dodon. gall. & Lat. in fol. Betam nigram Romanam: C. Bauh. phyt. & apud Matth. Betam 3. seu rubram radice crassa: Corn. in Diosc. Rapum fatuum rubrum.

Hist. Lugd. rectè vnicam descriptionem duabus figuris accomodat, non enim ex ab inuicem differunt, licet diuersis titulis inscripserit. Vocat nunc Betam Erythrothizon Dodonati, nunc Betam rubram Matthioli. Fuchsius, inquit ea, inter Raporum genera recenset, & Rapum rubrum vocat, cum tamen Rapi species non sit.

Beta lutea Beta lutea traditur à Camer. hort. Est hæc ea, quam Gesn. hort. flauam nuncupat, Cæsalp. Betam 4. radice buxæ. C. Bauh. Phyt. Betam 5. siue luteam.

Compositum Manifestè veritati contrariatur Corn. qui solium ex radicibus, & non etiam ex foliis Betam albam & nigram dignosci posse falsò contendit. Hoc quidem facillè verum foret, si omnes in re herbaria, ut ipse, cæcuterent.

Dorstenium Dorstenium Betam nunquam gustasse, ne dicam vidisse, credimus. Brassicam liquidem pro Beta monstrat.

Nomina linguarum Quod olus Græcis simpliciter βέτανος, vel βέτανος vocatur, id Latinis Beta dicitur: Atab. Deika & Celb. Hebr. Teradin, Germ. Mangolt/ pieffen/ Rômischföhl/ piefföl/ & Romgrafi: Belg. Biete: Gall. Bete, portee, reparee, & lotte, Ital. brèola, Hisp. Aselgas, Angl. Betis, Bohem. Manholi. Hung. Cæsla. Cum adiectione verò, Gr. λευκὸν ἢ μέλαν βέτανος, Lat. Alba vel rubra aut nigra Beta, Germ. Kott oder weis mangolt: Belg. witte oder Koodde Bierre: Gall. blanche ou rouge bete. Angl. white od et Redde Betis. Particulatim verò Beta radice rubra, crassa, Græcis βέτανος ἰσθηρὸν. German. Kott Mangolt/ Kott Niben, quasi Rapum rubrum dicas, Beyersck Niben. Rapa Bauarica, fortè quòd copiosa inibi aut crescant, aut aliis present, & Kotte Sodlatwürgen. Gall. des Benders. uges, Ital. Bietela rassa. quòd porro Græci ab impillu

nominarunt: etenim cultus ratione quadam incrementum capescit arboris, neque vlli hortensium latitudo foliorum maior. Betae nomen sibi adscinit, quoniam figuram β litteræ græcæ dum semine turget, referre videtur. Nam summitatem in cacumine reflexam obtinet. Id quod testatum nobis reliquit Lucius Columella in suo carmine de cultu hortorum ita canens:

Nomine tum Græco, scilicet et a proxima prima, Pangitur in ceta docti mucrone magistri: Sic & humo pinguis ferax a ruspibus ista Depremitur folio viridis pede candida Beta.

Et quamuis Sicula cognomèto Beta solummodò candida veniat, ut Theophr. & Plin. memoriam prodiderunt, tamen nunc extrita litera vnà, fetè omnibus nostri sæculi Medicis Sicla, omnis Beta nominari cepit.

Betae ex cultu arboris crescere scribit Theophrastus, germinare radicem à latere: Julio, ut cætera, quæ Sementis postera vocent, ferendam: æstate sexto, hieme decimo die erumpere: ex semine paucas provenire anno primo, sed longo tempore pòst pullulare, anno se. sequente & tertio, eas aquis salis iuuari, & iis rigatas meliores effici.

Montepelii colunt Betas valdè magnas albas & nigras, sed vique passim in hortis feruntur. Rubra verò radice crassa multùm in Germania prouenit: Omnes recentitas differentias Montibelg. in horto Ill. E. C. V. Wirtemb. quendam colebant.

Beta nigra, ut scribit Dioscorides, coquitur cum Lentis, ut ventrem listat, quod magis radice eius præstant (genus id cibi πικροκόκκω Veteres appellarunt.) Candida alio vtilis est. Vtraque tamen propter nitrosam humorem, quem habet in se, noxi est succi. Vnde succus earum cum melle naribus inditus, caput purgat, aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radices & foliorum, furfures lendèsq; deterget: pernidens solum mitigat. Crudis foliis vitiliginis nitro antea perfictas, alopeciarum inanitates, scalpando prius exasperatas, atque depascentia vlcera illini prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro ambustisque cocta medetur.

Plinius de betis, ut de olere & alimento hæc tradit. Vtilis iis & cum Lente ac Faba, idemque qui oleis, sed præcipuus vtilitas exciteur acrimoniam Sinapis: Medici innocentem quàm olus esse iudicauerunt. Quamobrem appositam non nemini degulare etiam religio est, ut validis potius in cibo sint. Gemina iis natura & oleis, & capite ipso exiliens bulbi. (Nam cum foliis humi sparsis caulis ex: illorum medio prodire incipit, eius capit gustu & callosa quadam firmitate bulbo simile esse videtur.) Et paulò pòst.

Mira differentia si vera est, candidis solui aluos, modicè nigris inhiberi. Et cum brassica corrumpitur in dolo vini sapor, odore betae foliis demersis restitui. Sed idem alio in loco vltim medicum ex beta præscribit, tum ea quæ Dioscorides, tum alia recensens. Nec beta sine remedio est, vtraque. Siue candida siue nigra radix recens & madefacta, suspensa funiculo contra serpentium morsus efficax esse dicitur. Candida beta cocta, & cum Allio crudo sumpta, contra tineas. Nigra radices, ita in aqua cocta portiginem tollunt, atque in totum efficacior esse traditur nigra. Succus eius capitis dolores veteres, & vertigines, item sonitum aurium sedat, insulsus iis: ciet vrinam. Medetur dysentencis iniecta, & morbo dyenterico. Dolores quoque dentium sedat illius succus: Et contra serpentium ictus valet, sed huius radice

Sicla

Calura

Locus

Vites & luf

Caput purgat succos. Lentes

Alopecia. Vlcera.

Vires ex Plinio

Vinum ubi re Beta restituitur.

Serpentium morsus

Tineas

Vertigo

Dysenteria. Morb. v. g.

radice duntaxat exprēssus. Ipsē verò decocta per-
nionibus occurrat. Albā succus epiphoras sedat
fronti illirus: aluminis paucō admittō ignem fa-
crum, sine oleo trita scilicet, adustus medetur. Et
contra eruptiones papularum, coctā que eadem
contra vlcera quæ serpunt, illinitur, & alopecis
cruda, & vlcibus quæ in capite manant. Succus
eius cum melle naribus inditus caput purgat.
Coquitur & cum lentacula addito aceto, vt ven-
trem molliat. Validius cocta fluxiones stomachi
sistit, & ventris.

Galeno verò auctore succus betarum tergen-
dim habet manifestam adeo, vt ventrem ad ex-
cernendum incitet, & stomachum interdum
mordicat, præsertim quibus naturā sensu exaltio-
re præditus est: ob idque edulum id stomacho
est noxium, si largius sumatur: corpori autem ab
ipsa, vt ab aliis oleis, paucum alimentum acced-
dit. Verum obstructum hepar Maluā magis aper-
rit, & multo magis si cum Sinapi aut omnino sal-
tem cum aceto mandatur. Lienosis item eodem
modo sumpta est vtile medicamentum. Et, beta
nitrosæ facultatis particeps est, quā tum digerit,
tum exeret, & per nares purgat. Cæterum cocta
nitrositatem omnem exiit, sitque leuiter discuti-
ens. Porro ad detergendum digerendumque
validior est beta alba: nam nigra adiunctum ha-
bet quidpiam adstrictiōnis, & magis in radice
quā in aliis partibus.

Ex Simeone Sethi betæ succus mediocriter ab-
stergit, ventrem etiam ad effluxum proritat, &
stomachum aliquando vellicat, eorum præsertim,
qui hūc valde sensibilem habent. Quapropter e-
dulum est stomacho infestum, si plurimum co-
medatur. Exiguum est eius alimentum sicut cæ-
terorum olerum. Vrilis verò est ad iccoris ob-
structiones cum aceto comesta. Pari modo si edat-
ur, & lienis obstructionibus bonum fit medica-
mentum. Constat autem beta ex contrariis fa-
cultatibus: succus enim eius calidus est, ventrem
constringit, & sitim adfert. Eius verò corpus cra-
ssum partium, flatuosum, concoctum difficile, &
frigidum, ventremque sistit: maxime si aqua in
qua coctum est, subinde abiciatur.

Ad betarum cocturam vinum & piper expeti-
scribit Marrialis his versibus:

Vt sapiant sacus fabrorum prandia Betæ
O quam sapi poter vina pipérque coquus.

Præterea eiusdem betæ radicibus conditis vt-
tuntur. Conditur autem beta in aceto hac ratio-
ne, cum foliis & radicibus integrum eradicandum
betæ olus, aquā deinde benè, necnon etiam cul-
tro mundandum: In aqua ex hoc ebulliendum,
& transuersim in paruculas secandum, posito ve-
rò in vase aliquo figulino, aquā reiectā, sale carui
vel granis Iuniperi condies, his supernis aceto,
cyate vno atque altero pleno, pro betæ quan-
titate.

Nihil in culinis beta hortensis frequentius esse
testatus est Tragus. Nam in cibo vsurpatur. Tem-
peramento calida est beta, maxime quod ad radi-
cem attinet, id quod hinc manifestum fit, cum e-
nim succus naribus excipitur, adurit, & sternuta-
menta proritat. beta in cibo sicut Spinachia para-
ta facillimæ est concoctionis, usque inprimis
conducit qui stomachi imbecillitate laborant. betæ
hortensis plantulæ recentes cum radicibus le-
uiter bullite, & ex aceto postea deuorata cibi
appetentiam adferunt, sitim compescunt, chole-
ram in ventriculo reprimunt. Debet verò eius-
modi cibus æstate potissimè non vsurpari.

Bayrus emplastro è radicibus betæ curat acho-
res.

BETA CRETICA SEMINE SPINOSO.

Betæ Creticæ folia nostrati non multum diffi-
milia, nisi quod vix ad eam magnitudinem
quantum obseruare licuit, proueniunt, cæ-
teroque lapidis carnosa, per extre-
mum rotunda, aut saltem obtusa, iuxta
pediculum angustum nonnihil ala-
ta: stolis paruis, luteis, spicati
in ramorū extremitatibus:
et hinc circa caulem nascuntur
ex foliorum alis in tres spinas
radiatas desinentes, costis
pulchris donati, transversisque
cancellis reticu-



lati, quorum vnicuique semen inest vnum oblon-
gum, pellicula rufa tectum, medulla alba. Rami
multi cubitales vel miretæ sex radice annua su-
pra terram se extendunt.

Si hæc non iam vsurpasset nomen betæ, ad La-
patham vel Spinachiam potius referrem. Casp.
Bauh. phyt. beta 6. siue Cretica semine aculeato.

Betam Creticam semine spinoso vidi Basilea
1595. Augusti sine semine maturo in horto Do-
mini Jacobi Zwingeri, quod atrili ferendum
Montbelgardi in horto E.C. quod protentit. Ac-
cepi etiam a D. Phil. Seb. Sprengero homine betæ
spinosa Candie.

L. apathum.

Locus & tempus

BETA LATICAVLIS MONSTROSA.

Admirandæ betæ *μανιχαυ* 3, quam H. Lug-
dun. piscuræ exprimeret curauit, cuius cau-
lis est quatuor digitos latus, circa quem parua sunt
folia, & quem rotum semen operit, sed in eius fas-
tigio ita densum: vt caulis prospectum adimat.
Aliquando propè D. Ramberti oppidulum Allo-
brogum in pingui quodam prato talem vidit
Dalechampius siluestris Cichorii caulem.
C. Bauh. phyt. beta 7. siue lato caule.

Nos quia in monstrousis plantis numeranda
est, eam mentè à præcedentibus separauimus,
nec pingendam quidem esse diximus.

SPINACHIA MAS ET FOEMINA.

Atuo gustu tota est planta: radix tenuis, al-
ba, folia Dentis Leonis, latiora, profunda si-
nuata, minus tamen crebris laciniis, pinguiscula,
& farina tenui Atriplicis modo respersa: canes
stulofis, striati, in alas diuisi: flores in alis & cau-
libus, à medio ferè vsque ad fastigium, crebertimj
M m m m 3

Vires ex Galeno

Obstructio hepatis

Ex Simeone Sethi

Obstructio iccoris

Corrigentia Betam

Beta condenda v. a. 110

Temperat.

si, ex herbido purpalescentes: semen aculeatum, &, vt nomen docet, spinosum: aliàs Lentis modo comptessum, orbiculatum & inno cens.

Veteribus incognitum olus



Hoc olus Veteribus (quod mirum est) incognitum fuisse videtur, cum de eo nihil illi, quod legatur, literarum monumentis tradiderint: vel forsitan quoddam cibo, quàm medicinæ potius natum esset, nec quicquam illustre fortitum, ob id ingeni segnitie obsecrum, vel quoddam, vt conliti potest, non dum in vsum vulgi, literato-

rumque cognitionem eo sæculo venerat, qui eorum quæ suâ fuerunt memoriâ, prorsus intactum nihil intentatum que reliquerunt. Non enim silentio tam frequens olus ab elere voluissent, sed potius celebratum in lucem prodere. Monspelii præceptor Rondeletius vltimum Veterum vocabat, quæ opinio mihi non penitus displicet.

Blitum Veterum Olus Hispanicum

Seutlomalache Ruell.

Seutlomalache Gesf.

Seutlomalache Spinachia

Genera Spinachia

Trago Hist. Germ. & Lat. vocatur Olus Hispanicum, Spinachia altera seu vulgaris, & Spinachia siluestris. Seutlomalachen, inquit Ruellius, recens Græcia fecit olus, quasi dicas Maluaceam betam, quoddam, vt reor, parentum adulterio natum existimant, Veteribus inauditum, fortè quoddam figura, & deturcato feminis habitu betam, & molitua Maluum mentiretur. Sed fortè Seutlomalachen, ait Gesf. hort. hoc est, mediæ inter betam & Rumicem naturæ, potius quàm Seutlomalachen appellandum. Spinachiam manifestum habete seorum scribit Scaliger. Coniicio autem marem ab eo intelligi illum, cuius semen spinosum est: feminam sine spinis. Ab his non penitus dissona sunt, quæ apud Camer. hort. & Hist. Lugd. leguntur. Spinachia geneta duo, facium, & siluestre. Satiui item duo, mas & femina, Mas semen fert, femina floret quidem, sed feminis infæcunda sterile scit.

Spinachia describitur & pingitur à Lob. & Pen. Adu. Obs. Ic. plant. Dod. Hist. Lugd. Fuchf. qui & Spinacium olus vocat. Brunfelsio. Camer. in Hort. & Hist. germ. Matth. qui Spanachium inscripsit. Tabern. Ic. & Hist. Amato, atque Matthiolo.

Rumex domesticus Lappath hortenfe Amatus Cæsalp. Callucianorum

Boulapath non est

Non est Blitum Hippocrati

Amatus quidem domesticum Rumicem sine hortenfe Lappathum, Spinachiam nostram esse sibi falsè imaginatur, quod & Cæsalp. sentire videtur. Quare meritò Robert. Constant. eum hallucinari scribit dum sine autoritate aut ratione hoc contendit: Constantino in eo ad stipulantis Grapaldo & Matthiolo.

Falluntur & ii, qui Plinii Boulapathon apud Dodonzum esse existimant: Lappathi siquidem genas Boulapathon est: radicis tantùm altitudine ab aliis differens, vt ipse sciet. Nec quoque Hippocrati Blitum est, quod veluti linguam esse scribit lib. 2. de motibus mulieb. Nam inter subditia

istud refertur, quæ rubrum fluxum muliebrem reprimunt ac sistunt. Talis autem Spinachia facultas haudquaquam est adstrictione omni carens. Nec est Chrysolachanum, vt vult Monardus.

C. Banh. Phyt. Lappathum hortenfe alterum, seu Spinachia femine spinoso. Idem apud Matth. Atriplex 2. Lappathum hortenfe alterum, Spinachia mas quibusdam. Item Phyt. Lappathum 4. sine hortenfe alterum, seu Spinachia sterilibus. In Matth. Spinachia 3. sterilis.

Spinachia siue Spinacia & Spinaceum olus, quod Latini appellant, recentioribus Græcis dicitur, ab Arab. & Serap. Hispanac: à Germ. Spinet oder Binesch: belg. Spinagies Gall. Espinches ou Espinars: It. Spinacci & Spinace. Hisp. Espinaca: Angl. Spinach: Boh. Spinak:

Spinacia quidem & Spinaceum olus ab insigni feminis spiculorum nota, quoddam tam glahræ, & mollis herbæ semper in pinas occalecat. Sæpius verò sumpto nomine à raritate, quoddam raro illo medici vterentur. Quibus hæc vocabula displicent, Atriplicem Hispaniensem vocant, Mauritanii Hispanach, id est, Hispanicum olus, fortasse quoddam inde primum duxerit originem, ad cæteras tandem nationes translatum: quidam Seutlomalachen.

Spinachiam colimus Montbelgardi in hortis E. Camer. & fœminam. Passim in hortis feritur nullum solum respiciens, cum Martio & alio tempore, tum Septembris mense, exiens septem à latu diebus, folio primum triangulo, molli, mox intubaceo, non horrens Hiemis frigora, quæ si iniqua nimis, Juglandis foliis conseruantur: vt Vere cibum suppeditet, quo tempore semè profert: Hieme enim restat: Martio verò satum in terra duos menses perficitur, hinc Iunio & Iulio flores & femina edit.

In culinis, teste Trago, nihil fetè frequentiotis est vltus, pulchritudo ex Spinachia recenti confectis. Temperamento illa frigida & humida est, cibo & medicina accommodata. Pultes Spinachia aluo astrictiori profunt, potestque id oleris in omni pene ægritudine cibo deligi, nam meo iudicio inter omnia culinaria olera Spinachia laudatissima est, & gratissima. Spinachia aluum emollit, gutturis asperitati medetur, & arida tussi confert, teste Constant. Succus & aqua distillata Spinachia pota, calorem resinguit, stomachi rofiones mitigat, & lac elicit. Spinachia cataplasmatis instar stomacho & epati imposita, inflammationibus illarum parcium prodest, doloremque tollit. Eadem in febribus scorpionum, & araneorum imposita succurrit. Spinachia primæ refrigerantium & humectantium classis, nec omninò vacat nitrosa qualitate Camer. Aluum emollit, melius Atriplicis suppeditat alimentum, sed aluo parum hærens facile exigitur. Flatus colligit, & vomitiones concitat, nisi excrementitus humor abiciatur: ventrem decocti iure proluit. Citra aquam coquitur hoc olus, quoddam magnam vim humoris inter coquendum remittat, & veluti proprio contentum iure alienum aspernetur. bibitur eius succus ad scorpionum & araneorum ictus, ac etiam vulneri illinitur: quinetiam cocta lenit exasperatas fauces: sed nauseam facile parit, nisi Zinzigere, aut alio consimili conditur: Recipitur & inter cruda acetaria recens enata.

Nemina linguarum.

Locus & tempus.

Cultura

vltus

Temper:

Vomitum mouet.

SPINACHIA SEMINE NON PVNGENTE: Folio maiore rotundiore.

Lingè maior maioribusque est foliis, quàm Spinachia vulgaris, nec non rotundioribus, cæteroqui



cæteroque mollior & fatuo sapore similibus: quemadmodum & floribus proximè circa caulem ad pediculorum exortu multos: at femina subsequuntur conglomerata multa veluti in racenulum, lenticulis ferè paria, torunda, nullis spinis horrida, cinerice coloris.


Trago est hæc Oulus Hist.

panicum 1. nobilissimum, siue Spinachia 1. nobilis, Spinachia sativa folio Lapathi seu Boni Henrici, caule Betæ, semine nequaquam spinis horrente.

C. Baub. Phyt. & apud Matth. Lapathum alterum semine non spinoso, tertium Atriplex. Spinachia semine non spinoso.

Spinachia semine non pungente, folio maiore, rotundo, rarior habetur, cum Hiemem non facile ferat. Passeres & aliz aues seminum huius valde avidæ.

BONVS HENRICVS.



Oxylapathi buxæ crassa radice nititur: sed tenuiores complures caules emittit, striatos, partim erectos, partim lupinos: folia triangularia, Atriplicis, atroviuentia, farina tenui respersa, sapore non nihil nitrolo: flosculi in thyrsis, muscosi, herbidi, semen rotundum Raphanino superat.

Trag. quem bonum Henricum

cum cum Fuchio inscribit, & Rumicem vntuosum, [Schmerbel] vulgarem vulnerariam herbam Germanos [gemein wunde kraut] nonnullos etiam Serpentium vel Colubrinam radicem [ob folia, quibus vestitur, Ari aut Vngulæ asininæ similia,] vocare dicit: Rumicem tertium siluestrem Dioscoridis quem ille Plantagini similem, & in terra iacentem dicit cum Fuchio esse iudicat, ac pro Spinachia sylu. lubens habet.

Totam Bonam, Spinaciam facie, seu bonum Henricum magni ducunt Aduers. Lob. & Penz, ita namque de ea loquuntur. Sed Totâ bona per-

Tom. II.

quàm optima, magisque vtu quam vllâ peccitiâ recepta, Mercurialis credita fuit iamdiu à plebe mulcularum, aut illis non multò peritioribus Pharmacopœis Anglis, quam adhuc incitiâ magis pertinacitâ quam vlla ratione fouent, quia fauit illis euentus. Siquidem est huic plantæ deterforia facultas multò quam Mercuriali tutior in morbis feruidis, nec tamen est ignauæ in attrahendo facultatis, cibus verò multò Mercuriali grator, tamen si plusculum statuum habet, & non ita procul à Spinacis natura abesse videtur. Lob. Obs. Tota bona, Spinachia facie, Rumicis 3. genus Fuchii, 2. Turneri. Eidem Icon. plant. Tota bona, siue bonus Henricus.

Dodon. gall. & Lat. in fol. qui sub Tota bona describit & depingit: Ait bonum Henricum à singulari quadam vili facultate vocari: veluti & perniciosam quandam plantam Malum Henricum appellent, de quo alibi dicendum.

Camer. Epit. & Hist. Matth. Germ. Tabern. Icon. & Hist. Brunell. & Hort. Lusit. Bonus Henricus. Thalyo Tota Bona Dodonzi. Atriplicis genus intermedium. Clusio Tota bona. Gesn. coll. stirp. Lapathi seu Rumicis genus, vulgò bonus Henricus vocatum. Atriplicis silu. species. H. Lugd. Lapathi silu. 2. genus.

C. Baub. Phyt. Lapathum 5. siue vntuosum folio nonnunquam maximo instar Aaronis. Se ignarum botanicum ostendit Dorst. dum sub Colubrinæ nomine post iconem boni Henrici & Huius nominat.

Bonus Henricus, G. Gütter heinrich, Schmere Nomina bel. Belg. Algoede & Cammeckens oere. Gall. linguarum Tote bonne 1. Tota bona, vti vocant Lob. & Dod. bon henry. Ital. uerba insarinata. Angl. English Mercury.

Bonum Henricum multis dictum vidi Montepelii, allatum ex montibus circa Gangem, florentem mense Maio. Geneuæ quâ itur ad montem Thyri copiosè offenditur: Basileæ inter portam cineream & lapideam mense Octobri florens, Montbelgardi copiosè Iulio.

Vulneraria herba est bonus henricus, ac mirificè ad fordida purganda, ac glutinanda vlcera confert, sicut appensa etiam ac trita vulneribus imposita, vermes qui in iis nati sunt excidere faciat. Hæc Fuchius, quæ Camer. in Matth. Germ. tribuit Atriplici fatidæ. Sed Fuchio subscribit Dodonæus: ac insuper Dodonæus testatur folia cum oleis cocta, atque esitata, lubricam reddere alnum. Præfertur, vt videre est apud Matth. ad venenosorum animalium ictus. Radicis succus illius scabiem sanat, & cutis maculas extergit, præsertim si cum aceto misceatur.

Bonus Henricus Synonymus

Lapathum vntuosum Dorst. not.

Nomina linguarum

Locus & Tempus.

Vires vlcera Vulnera

Vires vlcera Vulnera

DE BLITO IN GENERE.

CAPVT. IV.

Theophrastus olus hoc scribit vtraque parte fructificare, scilicet cacumini, & lateribus, idè copiosius, proterius enim nodis singulis, semen insidens, racematim gerit: caret radice illa singulari, quæ in rectum tendit, sed continè ab extremo multas crassas, prolixiores quàm Atriplex gerit, lignosas.

Quamuis autem Diosc. Plin. & Galenus nullas bliti proponant differentias, attamen plures esse cum aliis, tum à nobis obseruatum est, de quibus posthac dicendum erit.

BLITVM RUBRVM MINVS.

Descriptio Satis magnam radicem pro planta ratione habet, tubentem, fibrosam, ex cuius capite plures caules oriuntur, supini, rubentes: & in his folia multa. Solani hortensis, minora, nervosiora, colore atrouerente, sapore fatuo: ex quorum alis secundum caulem numerosi nascuntur flosculi, ex herbidis & mucosis fibris compositi, obtutum ferè eludentes.



Synonyma

Tragus, à quo cap. de blito primum describitur, vocat blitum nigrum, Atriplicisque silu. genus facit: & dicit posse vocari Atriplicem fimariam [Nissinlten.]

Atriplex
triplex
f. var.
ls. minus
ubrum.
ls. rub.
optum

Aduers. Lob. & Pena blitum minus rubrum. Lob. Ic. pl. blitum rubrum supinum. Dod. Gall. blitum rubrum paruum. Camer. Hist. Matth. Germ. blitum rubrum: & Epir. blitum rubrum minus. C. Bauh. Phyt. blitum 4. siue minus penitus rubrum.

Locus

Seritur in hortis, ac etiam in iis spontè prouenit, vt & praesertim in iis locis in quibus sinitus peccorum aliquandiu asseruatus fuerit.

BLITVM PVLCHRVM MAGNVM,
album.

Descriptio

Est hoc simile rubro, nec ab eo nisi colore differens, caule vt illud asurgens unico, magno, sumo, ad duos trève cubitos erecto, albo: sed foliis maioribus, nisi locus interdum atidior diuersitatem faciat.

Blitū
nigrum
vell. tax.
r. Turgō

An Hermol. blitum candidum? An Ruellio, qui partem suæ Historiæ desumpsit ex Hermol. cuius tamen non recordatur, blitum candidum, quod Turgon in Narbonensi Gallia esse scribit, aut malè, meo iudicio, videant Lectores. An Matth. blitum album: cuius figura ex Fuchsio desumpta videtur, ac alterius esse planta.

vel. not.

Quam Aduersaria Lob. & Pena blitum maius album vocant, vereor ne cum blito 3. Tragi confundant, cui folia Ocyini tribuit. Dodon. Gall. ni fallor, hanc describit primo loco, ac vocat blitum magnum album, figurâ autem, quam ponit, blito 3. Tragi debetur: Lat. fortè in fol. sub blito maiore, iconem Lobelii, quæ melius conuenit, proponit.

cus

Gesn. hort. blitum latium album. Hist. Lugd. bliti albi maioris titulo blitum 3. Tragi ex Matth. depinxit. C. Bauh. phyt. Blitum siue album maius. Hort. Lus. Blitum album.

In Burgundiorum *Vauluse* vidi: ac plantam Montibelg. in orto F. C.

Blitum album minus.

Radicem agit profundam, crassam, fibris multus constantem, euulsu difficilem, albam, in iuperiori parte nonnihil rubescentem: caules plures, in principio aliquantum rubentes, ad doctantem, pedemque plurimum per terram sparsos fungosos, succi plenos, albos, ferè rotundos, nonnihil striatos, fractu faciles, foliis alternatim dispositis: inferioribus, breuiore pediculo, superioribus maioribus longioribus, oblongis, subrotundis, in extremitate obtusis & fissis, ex viridi nigricantibus, ornatos: ex quibus ad cubitalem vel amphorem altitudinem pro ratione loci vnus eleuatur, desinens veluti in spicam, principibus florum bliti, vel Amaranthi maximi similem, floribus & seminibus plenam. Ramulis etiam in foliorum exortu insident flores sine pediculis, racematim coherentes, virides: odor ex viridate quodammodo grauis: sapor quoque viscidus. Herba inter hortorum vitia valde odiosa, quia se expandens alias suffocat.

Atriplex
fl. siue
fimaria.

Corchorus

Trag. Blitum 2. seu Atriplicis silu. genus alterum: Atriplex fimaria propter rationem iam dictam. Lob. & Pena Adu. Blitum minus album. Dodon. Gall. Blitum minus [à la tige verte] Camer. ad Epir. & Hist. Matth. germ. Blitum album. Hanc Gesn. mihi Corchorum vocabat.

Locus

Montbelgardi abundat passim Blitum minus album vel potius viride. Geneæ quoque frequens: Tubingæ, ac Tiguri, in agris non cultis secus itinera, in hortis & areis.

Vires

Blitum nigrum seu Sanguinaria illa, à mulierculis nonnullis in dysenteris & sanguine sistendo vsuatur. Succo eius expresso minui vice in scriptiõne vsurpasse sarpè in puerili ætate lemmunit Tragus. Refrigerat, inquit Matth. humectat, & emollit. Mentes remorantes prouocantur, mole & secunde educantur, si semine vapore decocti calidi suffiantur, aded vt vapor ad vterum ascendat.

Dysenteria

Succo ad

scribendum

Facultates

Menfes

BLITVM ERECTIVS, SIVE

3. Tragi.



Plutimis fibris radice, parum altè demissis, nonnihil rubentibus, quo etiam colore predicti sunt caules quadrati, doctantales aut cubitales, ex succi, ramosi: in quibus nascuntur folia ex interuallis modo aduersa, modo Ocyimifolia acuta, aliàs obtusa, minus crebra quàm in aliis blitis, ex quorum alis & in ramorum extremitatibus racemati flosculi coherent purpurascetes: sublequent: paruo semine nigro Portulacæ, sanguineo florido colore exafficti tingentæ. F.

Descriptio

gura Fuchiana non in omnibus placet.

Synon. Hanc pingit Tragus hoc titulo, Blitum Mater: ac pro Blito, [Sente Nisi Niten] describit, ac addit: Est & hæc Atropis siluestris species, herba innoxia, quæ inter cætera olera non raro legitur, potest fieri vt Bliti sit species.

Fuch. nat. Fuch. Hist. & Icon. figuram Trago similem habet, verum descriptio ex Hermolao ad aliam plantam pertinere videtur.

Deid. nat. Dodon. gall. figuram Fuchii habet siue Tragi hoc titulo, Blitum, vltre. Descriptionum autem quas Dodonæus posuit nulla conuenit. Latin. in fol. eandem ponit & describit, sub titulo, Bliti minoris.

Mat. nat. Matth. picturam habet quæ videtur facta ad imitationem figuræ Fuchii, cui titulum facit, Blitum: videtur tamen non respondere descriptioni aut plantæ quam existimamus eum intelligere. In comm. Ital. eandem figuram habet sub titulo Bliti albi: Item in H. st. Germ. Mirum cur ponat duas figuras, cum dicat Blitum album iisdem foliis provenire quibus rubrum.

H. Lugd. nat. Iam dictam Matth. figuram proponit etiam H. Lugd. sub hoc titulo: Blitum album maius, altius descriptio non conuenit.

An Geln. hort. Læius meminerit nomine Bliti siluestris lectoribus considerandum relinquo.

Anguill. & ex eo H. Lugd. & Lobel. Obs. Polysperon Cassiani pass. Ic. Plant. Polyspermon, à feminis, vt in Obs. contendit, florisque muscoli botrydi non dissimili scæturâ, quibus onusti numerosi cauliculi.

Geneuz pronemiebat in hortis: Montbelgardi faris vulgaris: spontaneus etiam in Horto E.C. femine maturo Augusto. Montpeli quoque obseruauit.

BLITVM MAXIMVM, SIVE AMARANTHVS MAIOR, femine albo.

Descriptio



Blitum maximum in hominis altitudinem excreuit, caule crasso, canaliculato, subrubente, ramis crebris stipato: folia Amaranthi, acuminata, sed maiora, ex viridi purpurascencia, rugosa, insipida: flores tum è summo caule extremisque ramis, tum è foliorum alis emicant, in spicas palmares & sesquipalmares digesti, easque frequentes, & iuba inlata non nunquam in larum luxuriantes, colore fuliginoso, aut purpure obsoleterioris, stam: pallis luteis, quibus femina: succrescunt minuta, alba, Milii excoctiati æmula.

Synon.

Et hoc est illud, quod Matth. in post. comm. cum mag. fig. It. & Lat. Blitum maius vocatur.

Hist. Germ. apud Camer. Blitum Vngaricum & Epit. Blitum. Et Icon. Blitum rubrum maius. Dodon. Lat. in fol. Amaranthus maior floribus obfoleti coloris: Lobel. & Pena in Adu. Blitum maius Matthioli vocant. Lobel. Ic. plant. Amaranthus maior floribus panniculosis, spicatus, purpureis.

Geln. hort. Amaranthi specie s maxima, femine albo, *Peynachia* Italorum fortè. An eidem ex Monachis, Blitum Indicum vel Topiarium, planta ex Indis nuper inuentis allata.

Tab. Icon. & Hist. Blitum Indicum. An de hoc Pet. Circa c. 40. par. i. Cheronici, *Quinnia*, [vt vult Clusius] ex qua potionem parant, aut elixâ vesuntur.

Cæsalp. Bliti genus aliud, siue peregrinum, de quo ait: Scitur hodie in hortis non solum ad cibos, sed etiam magis pulchritudinis gratiâ, ob coloris venustatem, grande est, specie ferè arborea: folia sunt Blito longiora, rubentia, caulis crassus, striatus, ruberofusque, ad quaternâ cubita accedens, ex alis, & ex summis ramis paniculæ longissimæ excreuit ac tenues, colore nigricantis *Rolæ*, specie floris Amaranthi, sine odore: femina in eis multa continentur, candida, Panico exliora, quæ in cibos veniunt. An hæc Ety simum fuerit apud Theophrastum inter fruges, quod Trionum veitit Theodoros, Plinius Irionem vocat?

H. Lugd. & Cast. Blitum rubrum maius. Cæsp. Bauh. Phyt. Amaranthus maximus, siue cristatus: Apud Matth. Blitum maius Matthioli. Hort. Lus. Amaranthus purpureus maior.

Blitum maximum siue Amaranthus maior femine albo simili Milio excoctiaco, Geneuz interterum excedebat altitudinem hominis: Lugduni etiam in horto meo florebat Septembri & Octobri: quæ silice in hortis variis vidi florens Iunio. Montbelgardi in hortulo meo, & Horto E.C. statim facillè provenit. Aliquando a ceppi nomine Amaranthi Indici: floret Augusto, femina maturo Septembri. Habetur etiam in fistilibus ad fenestras opacandas.

AMARANTHVS PURPUREVS.

Descriptio
Flori eximia venustatis Amarantho purpureo, radice crassa, Bliti, succulenta, è rubore candicans: caulis singularis, purpurascens, potissimum propter rectam, striatus, alternis alis concavus, cubitum, aut sesquicubitum altus: folia Bliti, acutiora, minus vt plurimum rugosa,



arrouirentia, per margines non nihil rubentia, sapore fatuo: è quorum alis magna gratia flores coccinei pediculis suis insident tactu læues, modò cui spicæ singulares, modò coniuncte plures, quorum si singulares sumas flosculos, quinis foliis rotidèq; apibus constat, Semen per maturitatem nigrum, paruum, nitidum



cateroqui mollitie & fatuo sapore similibus : quemadmodum & floribus proxime circa caulem ad pediculorum exortu mucosus : at in racemulum, lenticulis ferè paria, rotunda, nullis spinis horrida, cineritici coloris.

Trago est hæc Ols Hif.

panicum r. nobilissimum, siue Spinachia r. nobilis. Spinachia satius folio Lapathi seu Boni Henrici, caule Betæ, seminio nequaquam spinis horrente.

C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Lapathum alterum femine non spinoso, tertio Atriplex. Spinachia femine non spinoso.

Spinachia femine non pungente, folio maiore, rotundo, rarior habetur, cum Hiemem non facile fecat. Passeres & alia ante seminum huius valde auide.

BONVS HENRICVS.



Oxylapathi buxæa crassa radice nititur: sed tenuiores complures caules emittit, striatos, partim erectos, partim lupinos: folia triangula, Atriplicis, atrouirentia, farina tenui respersa, sapore nonnihil nitroso: strobili in thyrso, mucosi, herbidi, semen rotundum Raphanido super.

Trago, quem bonum Henricum

cum cum Fuchio inscribit, & Rumicem vinctuosum, [Schmerbel, propter vinctuosa folia] vulgarem vulnerariam herbam Germanos [gemein wünder fräut] nonnullos etiam Serpentium vel Colubrinam radicem [ob folia, quibus vestitur, Ari aut Vngulæ asinina similia,] vocare dicit: Rumicem tertium siluestrem Dioscoridis quem ille Plantagini similem, & in terra iacentem dicit cum Fuchio esse indicat, ac pro Spinachia sylu. lubens habet.

Totam Bonam, Spinaciæ facie, seu bonum Henricum magni ducunt Aduers. Lob. & Penæ, ita namque de ea loquuntur. Sed Tota bona per-

Tom. II.

quàm optima, magisque vtu quàm vlla peritiã recepta, Mercurialis crederet iamdiu à plebe muliercularum, aut illis non multò peritioribus Pharmacopœis Anglis, quàm adhuc incertiam magis pertinacia quàm vlla ratione fouent, quia fuit illis euentus. Siquidem est huic plantæ deterforia facultas multò quàm Mercuriali tutior in morbis feruidis, nec tamèn est ignaui in attrahendo facultatis, cibus verò multò Mercuriali gratior, tametsi plusculum flatuum habet, & non ita procul à Spinaciæ natura abesse videtur. Lob. Obs. Tota bona, Spinaciæ facie, Rumex Rumicis, genus Fuchii, 2. Turneri. Eidem Icon. plant. Tota bona, siue bonus Henricus.

Dodon. gall. & Lat. in fol. qui sub Tota bona descabit & depingit: Ait bonum Henricum à singulari quadam vtili facultate vocari: veluti & perniciosam quondam plantam Malum Henricum appellent, de quo alibi dicendum.

Camer. Epit. & Hist. Matth. Germ. Tabern. Icon. & Hist. Brunfels. & Hort. Lusit. Bonus Henricus. Thalyo Tota Bona Dodonæi. Atriplicis genus intermedium. Clusio Tota bona. Gesn. coll. stirp. Lapathi seu Rumicis genus, vulgè bonus Henricus vocatum. Atriplicis silu. species. H. Lugd. Lapathi silu. 2. genus.

C. Bauh. Phyt. Lapathum 5. siue vinctuosum folio nonnunquam maximo instar Aaronis. Signarum botanicum ostendit Dorst. dum sub Colubrinæ nomine ponit iconem boni Henrici & thû würg nomine.

Bonus Henricus, G. Güter heinrich. Schmezer Nomina bel. Belg. Algoede & Cammefens oore. Gall. linguarum toute bonne i. Tota bona, vti vocant Lob. & Dod. bon Henry. Ital. herba insarinata, Angl. English Mercury.

Bonum Henricum multis dictum vidi Montepellii, allatum ex montibus circa Gangem, florentem mense Maio. Genex quæ itur ad montem Thuyri copiosè offenditur: Basileæ inter portam cineream & lapideam mense Octobri florens, Montbelgardi copiosè Iulio.

Vulneraria herba est bonus Henricus, ac mirificè ad fordida purganda, ac glutinanda vlcera confert, sicut appensa etiam ac trita vulneribus imposita, vermes qui in iis nati sunt excidere faciat. Hæc Fuchsius, quæ Camer. in Matth. Germ. tribuit Atriplici fræida. Sed Fuchio subscribit Dodonæus: ac insuper Dodonæus testatur folia cum oleribus cocta, atque cistata, lubricam reddere aluum. Præfertur, vt videre est apud Matth. ad venenosorum animalium ictus. Radicis succus illius scabiem sanat, & cutis maculas extergit, præsertim si cum aceto misceatur.

Bonus Henricus Senes Aduis

Lapathum Göttingum Dorst. not.

Nomina bel. linguarum

Locus & Tempus

Vires vlcera: Vulnera

Ictus Genes nati Scabies

DE BLITO IN GENERE.

CAPVT. IV.

Theophrastus olus hoc scribit vtraque parte fructificare, scilicet cacuminib. & lateribus, idè copiosus, protinus enim nodis singulis, semen insidens, racemati gerit: caret radice illz singulari, quæ in rectum tendit, sed continuè ab extremo multas crassas, prolixiores quàm Atriplex gerit, lignosas.

Quamuis autem Diosc. Plin. & Galenus nullas alio proponant differentias, attamen plures esse cum ab aliis, tum à nobis obseruatum est, de quibus posthac dicendum erit.

M m m 4

Nomina linguarum ^{Βλαῖτον} olus hoc Graeci duxēte, Latini blitum: Aegyptii, vt inter Diosc. notha legitur, ^{Εχθλορι-} Echthoripa. ^{παμ, αλι} Pam, ali Kiplam, Daci Bles vocant: Arabes ^{bachala} bachala ^{laminia}, & ^{bachale} bachale ^{alicamiae}, Geim. Meyer Blit würtz Apollinari, vñd Korhneyer; Galli ^{blette d'Espagne}, Fuchl. du blit, ^{breyon} Sabaudis: Ital. ^{blito biondi}, & ^{kierelone}, Hisp. ^{bredos} & ^{bledor}: Angl. ^{wilde sine} Orrage: Boh. Blyt.

Plinius Bliti nomen ad ignauiam & fatuitatem referre videtur. Blitum in eis videtur, inquit, ac sine sapore, aut acrimonia vlla. Vnde conuicium foeminae apud Menandrum faciunt mariti. Dicuntur etiam saepe Hippocrati ^{καρται οὐ ἀπονηκται} siderati, stupidi, & attoniti.

Festus à ^{βλαῖτον} deducit. Est autem nomen cuiusdam pitcis omnino inutilis, & qui nulli animalanti est esui: licet & inertem, stolidum, stupidumque designet, & Antiqui ^{καίτηες} mureidos, stolidos, bardos, fatuos, bliteoſque dicant: indeque conuicium apud Gallos in vulgus emanat: locordes, nulliusque momenti homines ^{belitres} & ^{blitres}, Graeci imitatione nominantes. Videntur Latini, Betam pro specie Bliti, aut pro Blito ipso accipere, nisi, vt ait Lobelius, lepidissimus Martialis non bene noscat discrimen illo distincto:

^{vt sapiant fatua} &c. de quibus antè. Blitum non tantum in incultis prouenit, sed & in hortis feritur, quod cum semel natum fuerit, ipsum se per multa saecula feminis deiectione reparat, vt, etiamsi velis, vix possit aboleri: fatumque semel pluribus annis restitili fertilitate prouenit, nec runcati, nec farriti flagitat. Martio mensetur, florētque mediaestate & Autumno seminēque praeſtans est.

Blitum estur oleis modo, inquit Dioscorides. Aluo vtile est, nullius iam medicina vsus. Blitum & Atriplex auctore Galeno, alius oleribus sunt aquosiora, & qualitatis expertia: quo fit, vt non ex solo oleo & garo ipsa madant, sed acetum etiam iniiciant: nam alioqui stomacho sunt noxia. Olera autem huiusmodi ad facilem deiectionem sunt propensa, praesertim si cum humiditate lubricum quiddam habeant: Porro alimentum corpori praebent exiguum. Et, Blitum olus est esculentum, humidum & frigidumque temperaturae in secundo maxime excessu à temperatis. Hippocrates contra, ^{βλαῖτον} scribit esse ^{στυμνόν} & ^{διὰ τὸν κρύον} id est, calidum esse, & ad excernendum non incitare: Imò fluxum muliebrem rescicare.

Plinius inutile stomacho esse ait: ventrem aded turbare, vt choleram faciat aliquibus. Dicit tamen aduersus scorpiones potum è vino potuisse, & clauis pedum illini, item lienibus, & temporum dolori ex oleo. Hippocratem menstrua sibi eo cibo putare.

Blitum album Tride ntina rura ^{Bredone} vulgò appellant, vt scribit Matthiolus, & à nonnullis è cibum admittitur. Primum aqua decoquant, dein affuso oleo, vel butyro, in sartagine frugunt, additis Allio, & Omphacio, vel aceto, sed is cibus, vt is vsu sefe comperisse testatur, vomitiones mouet, ventriculi & intestinorum tormina facit, & alui fluxiones ciet excitata bile. Mitum igitur, si Hippocrates, Galenus, Plinius, Matthiolus, veta scripserunt, quod dixerit Dioscorides blitum aluo vtile esse, nullius in medicina vsus.

Blita haec numerantur. blitum pulchrum rectum magnum rubrum. Rubrum minus. Pulchrum magnum, album. Album minus. Erectius, siue 3. Tragi Maximura, siue Amaranthus maior, semine albo. Sed & haec ad bliti genera

referuntur. Amaranthus purpureus. Amaranthus pannicula speciosa cistata. Simphonia Dalech. siue Amaranthus tricolor. Est praeterea nobis blitum 4. Tragi, Atriplex, Pes anferinus dicta. Item & alitum 5. eiusdem, nobis Atriplex, dictus Pes anferinus alter, siue ramosior. blitum illud ferendum à quo apud Platutum blitea meretrix cognominatur, dicemus Atriplicem ferendam. Nec est vt quidam falsò putant Spinachia blitum. Officinæ quoque non raro cum blito betam confundunt. Errant demum qui putant Cynoctamben esse bliti genus.

BLITVM PVLCHRVM RECTVM MAGNUM RUBRVM.

Facilis adoleſcentia, radice pollicari fatua, vt tota planta, caule blitolo, intus extraque sanguineo rubore perfuso, concolorēque succum pressu remittente. folia setaceis mucosa, magis rugosa, qua caelum spectant ex rubro nigrescunt, pro parte hilariū rubent: flosculi mucosi secundum caulem, apiculis allidis constant, semen Atriplicis syluestris, vel Amaranthi nigri, nitens.



Defcriptio
An Lob. blitum rubrum
Apollinari notatur
Fuchf. noe.
Lob. not.
An Poreta rubra Ruell.

An Aduerf. Lob. & Perx, Blitum rubrum intensè rutilis sanguineis caulibus, foliis ex rubro luentibus, & l. con. plant. blitum rubrum. An Dodon. gall. blitum magnum rubrum sine icone? An Lat. pingenti blitum rubens: Est Apollinari sub nomine Blit würtz pictura mala, quae videtur aliquatenus blitum maius exprimere. An Hermol. quod Fuchsius affirmat: blitum siue blitus [Graeci etiam bleton] rubens: An Matth. blitum rubrum, qui in post. comm. it. pingit hoc titulo, blita rosso: in Lat. blitum rubrum: in Hist. Germ. Rotter meyer: aut Blitfräut: An Lob. Obl. cum Matth. hoc pingit hoc titulo, blitum? An Anguill. blitum nigrum, cuius meminit Alexander Trallianus lib. 8. cap. 7? An Ruell. qui pattem suae historiae & Hermolao sumpsit: blitum rubens & rubrum olus, vel poreta rubra vulgò: Sed videant Lectores ne fortè Poreta rubra Gallis sit beta rubra. An Gesn. hort. blitum peregrinum, vel blitum fatium rubrum, vel blitum vulgi.

Taber. & Hist. blitum. C. Bauh. phyt. blitum 3. siue rubrum maius. Hort. Lusit. blitum rubrum. Vidi Basileæ in horto D. D. Faelicis Plateri, cuius semina Montbelgardi terrae commisi, quae plantas protulerunt Julio & Augusto mensibus florentes, seminique Octobri matureſcentes, seque ipsas quotannis ex deciduis seminantes.

Locus & tempus
Bliti

Blitum rubrum & album maius & minus. Blitum erectius.

Maxima siue Amaranthus maior. Purpureus pannicula speciosa. Tricolor. Duplex pes anferinus. Spinachia. Beta Cynoctambe.



fibrosa. Nec alia Atriplici fatiur rubra facies, nisi quod sanguineo colore tota picta est.

Diosc. Atriplicem, Chrysolachanum vocat, & olus cognitum, idque in fatium & siluestre, vt etiam Plin. & Galenus, diuidit.

Theophrastus radicem lignosam tradit, vnam altè descendentem, vnde alie exeant, copiosè fructificare, nam

protinus nodis singulis semen in sidens racematum gemit à latere & in summis, semen foliatum, vt in Laferpito.

Sed licet Atriplicis duo genera tantùm tradant Diosc. Plin. & Galenus, fatium & siluestre, attamen dari & tertium, quod est Maritimum, nemo inficiabitur: cum teste Marantha, ex frondium, seminum, radicisque similitudine liquidò appareat, non habere aliam differentiam, nisi quod salso gustu sit, propter maris contiguitatem, foliaque subalbida habeant, quod omnibus maritimis euenire solet. Sed misso silu. & maritimo, de fatino hoc cap. tractabimus.

Fuchsius itaque videtur vnicà descriptione & figurà, quam Atriplicem hortensem subscripsit, ambas proponere. Tragus Atriplicis fatiur tria fastigia facit. Scribit enim quandam proferre folium rubicundum: aliam ex luteo languescens, postremam nigricans.

Videtur fac. Theod. Tabern. cum Hort. Lusit. in eadem specie rubra ponere tres colores, aliter quam Tragus: certum est albam permanere albam, & rubram rubram, quicquid dicat Theodorus. Nos ponimus duas figuras quia ex Fuchsianis erant sumpta.

Matth. qui alias solùm domesticam nominat, in rust. gem. Atriplicis Graminis modo virentis, rubra vt ignis, & pallidè lutea meminit. Anguill. Atriplex domestica. Lonic. cuius figura disphicit, rubram, albam & virentem tradit. Gesn. hort. Dod. gall. Atriplex fatiur, alba & rubra. Non esse autem cum Trago Matth. Lonic. & aliis Atriplicis fatiur tria constituenda fastigia docet Dodon. Lat. in fol.

Lob. & Penz. Adn. Atriplicis fatiur duplicem consistunt speciem. Vnam, quam Chrysolachanum vocant Dioscoridis tum Antiquiores tum Postiores, cui folia marcescentia à luteo vel flauo in aureum vergant. Alteram, folio & flore purpuream, liuentem.

Catalp. Atriplex, folio colore ex viridi pallescente. Camer. hort. Atriplex purpurea grandis, semel facta postea decedente semine proueniens. Hist. Lugd. vnicam licet Atriplicis fatiur exhibeat iconem, albam tamen & rubram recipit. Albx, inquit, folia cum tenella sunt, candicant, cum adolentur, colore ex viridi in luteum e-languescunt. Alterius folia, caules, flores in rubro fuluescunt.

Alph. Moresch. Atriplicem improprie sanè Tom. I

Chrysanthemum vocat, quod hæcenus apud neminem me legisse memini.

C. Bauh. Atriplex hortensis alba. Atriplex 2. hortensis rubra: ad Matth. Atriplex 1. hortensis rubra. Atriplex domestica: & ab hac differens, colore potissimum, hortensis alba.

Gerard. Atriplex fatiur alba: Atriplex fatiur purpurea: pro qua ab ipso malè ponitur icon pedis anserini 2. Tabern.

Præsens planta Latinis in genere dicitur Atriplex. Græcis, ατρίπις ἢ χροσολάχανον [aureum olus] Arab. Cat. aff. seu Caraf. Germ. Molten/Milseu. Belg. Malde. Ital. Atriplice, & Armola, Trapese Reppice & Treppice: Gall. Arrouches, Bonnes Dames, prendes femmes. Mont. des Arabes. Bizont. Des Ar-moue. Gen. ur. & Iuleses. Hisp. Armolles: Angl. Orrage seu Oreche: Boh. lebeda.

Atriplexum, vt Festus refert, appellabatur ab Atriplicis Erymos atro, vt aliqui putant, colore. Verim à voce Græca potius quàm ab atrore fluxit nomen. Nam Atriplicis olus ατρίπις Græcis dici Columella testatur, Hippocrates ατρίπις appellat. Hesy-chius ατρίπις, quod ατρίπις ατρίπις, & Suidas ατρίπις [Atticis, d literam in t mutare frequenter amantibus] ατρίπις ἢ ατρίπις ἢ ατρίπις, id est, quod itatim in amplitudinem adolefac: si quidem octauo à satu die proflit, confestimque incremento proficere conspicitur: fidem celeris augmenti facit ereptum in confinio cæteris herbis alimentum. Ac ne in hortis quidem iuxta eam nasci quicquam tradunt, nisi languidum: χροσολάχανον, id est aureum olus græci appellant, quod auri colorem representet. Alij tradunt ab aureo sine luteo flore nomen hoc inuenisse.

Atriplex alba & rubra hortensis, non nisi fati prouenit, assiduòque humore satiri amat. Frequens Montbelgardi etiam in Horto E.C. Genue obseruauit paruas plantas virentes, ex semine decido Ianuario, & florentem vt aliàs conseruit Iunio & Iulio: Porentuui magnas areas Atriplice ferunt, & maiori in vsu quàm Montbelg. In hęcimæ hortis rara admodùm Atriplex, frequentissima autem apud Insabres feritur, à runcolis in hortis & in campis. Hæc inter coquinarias herbas ocysimè assurgit, nam post quindecim dies à satone vsurpatur in coquinis & tantum Vere edulis.

Atriplex, vt scribit Dioscorides, cocta est vt Vites olus, alium mollit: panos discuit siue cruda, siue cocta illinatur. Semen cum aqua mullà potum regium morbum sanat.

Atriplicis, vt oleris, in cibis vsum cum Blito declarat Galenus, qua de re antea diximus. Vsum medicum & temperamentum alibi sic explicat. Atriplex frigida & humida temperie est, humida quidem secundi ordinis, frigida verò primi, quam vtique tepidam esse caliditatem posuimus, cuiusmodi Rosis inest: non tamen adstrictiois est particeps, sed aqua est, & minimum terrena, similiter ac Malua. Quin & ventrem similiter permeat vt illa, ob lubricitatem. Hortenses autem Atriplices & Malua quàm agrestes tum humidiores, tum frigidiores. Quare phlegmonis & phygethli incipientibus, gliscentibusque & mollibus etiamnum, ac velut feruentibus hortenses: videntibus autem ac declinantibus, & indurescentibus commodiores sunt agrestes. Semen eius abstergendi vim habet. Itaque ad morbum regium ex hepate obstructo obortum vile est. Ex quibus sanè verbis tota Dioscoridis sententia declarata est.

Atriplex & siluestre est, inquit Plinius, & fati: N n n n

Nomina
linguarum

Atriplicis
Erymos

Locus &
tempus

Morbos
regi
Temper.
ex Galen.

Atriplex
genera
Vicia
nam
et
Reticuliferum

Fuchsius
Atriplex
duplex
Tragur
plex

Tabern.

Lonic.
not.
Error
mult.
eorum
Atriplex
fatia
non
trifastigia

H. Lugd.
not.

Nona se-
cundum
Pythago-
ram

Solon nota-
tur

Vuluarum
Gitta
Canthari-
da

uum, accusatum à Pythagora tanquam faceret hydro-
piscos morbóque regios, & pallorem, coque-
returque difficillimè: ac ne in hortis quidem iux-
ta id nasci quicquam, nisi languidum culpauit.
Addidere Dionysius & Diocles plumos gigni
ex eo morbos: nec nisi mutata sepius aqua co-
quendum. Stomacho contrarium esse, lentigin-
es & papulas gignere. Miror quare difficulter
in Italia id nasci tradiderit Solon Smyrnaeus.
Hippocrates vuluarum vitis id infundit cum
Bera. Lycus Neapolitanus contra cantharidas
bibendum dedit. Quibus subiicit ea quæ Diosc.
& Galenus tradiderunt. Syluestri, inquit præte-
rea, capillos tingunt, & ad suprâ dicta vtuntur.

Hippocrates quibus genitura in vtero immo-
ratur, ibique putrescit, & molestiam exci-
at, Atriplicis agræstis semē [ad. d. G. d. p. m. n.]. vel sec-
cum cum melle delingendum offert.

Scribit Serapio Rhazim vidisse hominem quæ-
dam, qui ex Atriplicis semine duarum drachma-
rum pondere sumpto, tam crebris vomitionibus
tum alui eiectionibus, ad eum vexatus fuit vt ad ex-
tremam vitium imbecillitatem deuenerit.

Et Matthioli pharmacopœum quendam se
nouisse ait, qui ad rusticos purgandos Atriplicis
tantum semen exhibebat, quod si non sine mo-
lestia magna aluum ciebat abundè, ac simul etiã
crebros vomitus prouocabat. Quam facultatem
quum scribat Matthiolus, paucis hæcenus cog-
nitam, ea tamen à Plinio non prætermittenda l. 20.
cap. 20.

Matth. not.


ATRIplex SYLVESTRIS.

Descriptio **Q**ui satiuam Atriplicem nouerit, is nullo ne-
gotio & hanc siluaticam si nouerit spontis
sue Atriplicem: quæ caule anguloso strigiosior non
ita adolescit: foliis serè rhomboidæis, sinuatis,
quæ inferiora, superiora verò longiora, quædam
parum sinuata, alia in totum sinuata, xerampe-
linis, per margines subinde rubentibus, pulu-
culo farinaceo resperfis: flores racematim mul-
tiosi per ramos visuntur, quibus semina succedunt
parua, rotunda, compressa, læui nitore nigrican-
tia. Figuræ sunt Fuchsiæ, nec admodum placet
vnam etiam ex illis habet Dodonæus.

Synon.
Atriplex
stercoraria
Atriplex ex-
sigua

Icones

Matth. 1a.
2a. 17.



Atriplicem
sylv. hortensi
omnibus præ-
pè notis res-
pondete scri-



non distare specie à domestica aiunt. Lob. Obs.
Atriplex silu. vulgarior (hoc vocabulum in Ic.
plant. non habetur) sinuata. Is autem iconem
penè eandem habet cum Matthiolina postrema
cui summitates cum lappulis. Videndum an refer-
enda potius ad nostram Montpelianam cum
lappis.

Thal. Atriplex sinetaria maior. An Casalp.
quod C. Bauh. affinat, Cynocrambe tamis cu-
hito minoribus, candidantibus: foliis veluti cye-
reæ resperfis, alioqui Atriplicis silu. sed minoribus,
ac tenuatis, Metcunialis modo, seminibus race-
matosis, sine flore, exiguis & rotundis?

Tabern. penè figuram sine descriptione, hoc
titulo: Atriplex silu. 1.

Gerardum pro Atriplice silu. ponere polyper-
mon Tabernæ non placet, & præterea pro Atri-
plice marina iconem Atriplicis siluestris euadem,
sed excusandis vt qui non exactè nouerit, ac
ideò miscuerit.

Lonic. Atriplex silu. maior. H. st. Lugd. Atri-
plex silu. 1. Matth. primæ editionis. hort. Lusit.
Atriplex sylv. vulgarior sinuata. C. Bauh. Phyt.
Atriplex 4. siue silu. altera. Eccc Frater apud
Matth. non immediatè eam post satiuam collo-
cat: cur cum Lapatho hortensi commisceat. An
Atriplex Lapathum: & è contra Lapathum Atri-
plicem quis vnquam dixerit?

Atriplex silu. Gerem. Scheiß Miltren vud
Miltren w d Miltren / Ziffer Miltren. Belg.
Wilde Melde. Gall. Arraches sauvages. It. Rep-
pice saluatica. Angl. Wilde Treche / Selau. Florea
Loheda. Nunc in Græcia secundum Anguilla-
ram silu. & domestica indifferenter Atriplex &
Chrysolacano vocatur.

Atriplex sylv. Montbelgardii etiam in horto
Ill. E. C. Montpelij. Geneuæ, Basileæ & alibi, vias,
senetas, scrobes, agrorum margines, vrbium
mœnia, & fimeis, vbique locorum occupat, flo-
rens vt satiuam Junio ac Iulio; & subinde Augusto,
quo mense & Septembri semē maturat paruum,
nigritum, luperueniente gelu quotannis perit.

ATRIplex ANGVSTIFOLIA
laciniata minor.

Tabern. Icon. & nist. Atriplex sylvestris 1.
Si Tabern. collegit & nouit, cur non de-
scripsi

Atriplex sil-
uatica

Atriplex sil-
uatica

Tabern. not.

Gerard. not.

C. B. not.

Nomina
linguarum

Locus &
tempus.

Camer. no.



scripsit. Nec placet Camerarium Atriplicis silv. 3. titulo apposuisse iconem sine descriptione: præterea Matthiolum non meminit Atriplicis tertiz. Si figura facta est ad plantam, de qua hic agimus, vt suspicor, folia oporteret esse sinuata non aculeata.

An Thal. Atriplex fimetaria minor.

quod Casparus Bauhinus Phyt. aſſerit, ac Atriplicem silv. 5. facit, siue minorem.

ATRIPLEX SILV. FOLIIS INTEGRIS racemosa.

Descip. & Synonyma



Camer. ad Hist. Germ. Matth. Atriplex silv. 2. Icon autem proposita à Camerario non parum differt à Matth. icon: appingit enim racemulos non lappulas, vel potius laticusculos folliculos. is non describit.

Casp. Bauh. Phyt. Atriplex 2. siue sylvestris folio sinuato. Apud Matth. Atriplex 5. Atriplex silv. 2. Matth. Lug. Taber.

Atriplex silv. Cordo in Diosc. Casal. Atriplex sinuata Lobeli. Erater assumit figuram Tabern. quæ mihi diuersa videtur à Matthioli silv. 2. acetiam hist. Lugd. & Lobel.

Obseruauimus vltis in locis in Sundcouia circa fimos.

ATRIPLEX VVLGARIS ANGVSTI-
folia cum folliculis.

descriptio: **O**blucius huic vident folia, vt prædè attrahunt, ad Polygoni folia proximè accedentia, latiora, acuminata, subinde [quanquam rariis] laxissimè sinuata; excreſcit autem ad cubitalem & sesquicubitalem altitudinem: flos radix, Atriplicis silvestris sinuata: folliculacea fert pericarpia, sæpè etiam rhomboidea, conferta, quæ dehiscentia semen ostentant, singula singulorum, rotundum, compressum.

Est hæc Matth. (qui non describit, nec disci-

Tom. II.



men ostendit) in comm. cum mag. fig. Lat. Atriplex silv. Ital. Atriplice satiuo. 1. Hist. Germ. atriplex 2. Wilde mellen. Lob. adv. & Ic. Plant. Atriplex silv. Polygony, aut Helixines folio. Dodon. gall. Atriplex silv. minor: Lat. in fol. Atriplex silv. humillima; ramosior, foliis angustioribus; floribus; seminibusque prioribus respondentens. Casalp. Atriplex silv. breuior satiuâ, folio simili, sed minore, ac nigriore; eoque circa summum caulem tenuiore, & sensim longiore, seminibus similiter depresso, nigris. Camer. hort. Atriplex silv. Polygony folio. Hist. Lugd. Atriplex silv. 1. Matth. Polygony folio 2. editionis.



C. Bauh. Phyt. Atriplex 12. siue angustio centinodix folio, Dod. Silv. altera Lob. Polygony aut Helixines foliis. Folis communiter oblongis, angustis, non sinuatis: reperitur tamen aliquando foliis ad principium striatis abs donatis. Apud Matth. Atriplex 7. siue angustio Centinodix folio. Atriplex silv. 1. Matth. inter maiores figuras, inter minores enim non expressit. Dodon. Atriplex silv. humillima & quarta.

Montbelgardi & Baileæ prouenit in vinetis Locis & agrotum marginibus.

ATRIPLEX SYLV. MONSPESSVLANA
cum pulchris ihuolucris.

Folio est breuiore (quo multum differt ab Atriplice Matth. 1.) albicante, sinuato, Atriplicis vulgaris, breui pediculo constante: inuolucris feminum angulosis; quodammodo Cynoglossæ nostræ topiariæ similibus, intra ramulos & foliorum pediculos prodeuntibus; semen includentibus paruum, compressum, nigrum; lappis etiam multo maioribus; nec velut in spicas desinentibus: ita vt habere aliquid videatur similitudinis; quod lappas attinet, cum Atriplice prima silv. Matthioli in post. figuris, melius tamen accedat ad secundam, quam facili exstimamus.

Descipia

An Atriplex
filu. 2.
Matth.

An Matth. in com. cum mag. fig. Lat. & Ital.
Atriplex (sylv. 2. ? In hist. Germ. Atriplex sylv. 2.
Wilde Melten 2? An Lobel. Obs. & icon. Atri-
plex silu. sinuata? Camer. in Epit. & hist. Germ.
Matth. Atriplex silu. 2. Hist. Lugd. p. 536. Atriplex
silu. 2.

C. B. not.

An C. Bauh. Phyt. Atriplex 3. siue silu. folio sinuato? Hanc, inquit, Atriplicis silu. hispida paruz recte nomine à D. Doldio accepimus: eandem Montpelii Augusto mense frater Ioh. Bauhinus collegit. Apud Matth. Atriplex silu. lappulas habens, à nobis primum descripta, cauliculi leuissimè hispidi. Hæc frater. Ego quidem anno 1561. Montpelii collegi, & descriptionem nisi Dò. Gesnero cum ipsa planta, ast nihil hirsuti aut hispidi obseruauit. Considerandum an Dò. Doldius suam hispida dixerit à capitulis & inuolucris angulosis feminum.


ATRIPLEX HALIMOIDIS LOBELII.

Descriptio

Synonyma

Locus

Atriplex halimoidis Aestiuæ est, caules edens æternum & quaternum cubitorum, & folia Halimiflores & semina racinosa cæterarum more. Mihi primum visa in viuidario Ioh. Mutoni Neruentis Pharm. Semitas & rudera amat, Lob. Obs. C. Bauh. Phyt. Atriplex n. Halymi folio.



ATRIPLEX ARBORESCENS.

Delicatio

Semen quoddam ad nos misit Lutetiâ Robinus Botanicus Regius, nomine Atriplicis arborescentis insula Cælix dicta. Istud ferè magnitudine Milii est, cinereum, rotundum ac modicè compressum, hylo candicante, sapore faruo, nec effatu digno.

Scribit hanc plantam semper vitæcâ à nobis feminata est Montbelgardi in horto Ill. E. C. Vittemberg: quem colimus.

ATRIPLEX MARITIMA.

Descriptio



nitis crass.

An Cordo in Obl. silua, Atriplicis silu. genus, gustu salsum Matth. in com. lat. & It. & hist. germ.

Atriplex maritima humi spargit caules cubitales numerosos, ex crassa satis radice exortos, totos albicantes, per quos & folia candicantia sinuata, Pedis anserini similia. Flosculi per extrema potissimum ramulorum racematim congesti, flores Portulacæ marinx imitantur. In icone à nobis pteposita radix picta

(qui dicit Diosc. & Galen. huius non meminisse.) Dodon. Lat. infol. H. Lugd. Atriplex marina, & Metten.

Lobel. & Penz Adu. Atriplex marina repens &c. Lob. etiam Obs. & Ic Plant. Atriplex marina repens. Sed repentem dicere non conuenit: spatiosa est supra terram, non repit.

Camer. hort. qui ait rubro & herbaceo semine inuenti] Epit. & Hist. Matth. germ. Atriplex marina.

An Cynoctambes 3. genus, in maritimis visum ramis humi procumbentibus, candidis foliis, ueluti puluisculo argenteo aspersis, rotundioribus?

Gerard. ut antè dictum, pro Atriplice marina Matth. figuram Atriplicis silu. demonstrat, quid pro quo.

C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Atriplex 9. siue maritima.

Atriplicem maritimam habeo à Valerando Dourez. Jac. Reinaudeto, fratre C. Bauh. qui Venetias atrahit ex Lio. Frequentem offendit scribit Matth. Tegesti ad salinas in maris litore: Lob. in mariis mediterraneis & Adriaticis nusquam non obutam, humi stratum.

Vis Atriplicis marinx quæ cæteris Atriplicibus, Vires sed propter salsedinem, quæ referta est magis quidem aluum citat, magisque abstergit si è carnis iure decocta edatur, Matth. His addit Camer. Digerit, incidit, attenuat, liquat, à putredine vindicat, aperit, & abradendo expurgat. numentem ventriculum licet, hydriopicos iuuat, pingues extenuat. Atriplex marina primum crescens in Aestuans Veneris, vnde quandoque citheram parant ad conficienda vitra.

ATRIPLICIS MARINÆ SPECIES Valerando.



Atriplicis aliâ marinâ habeo datam à iam dicto Valerando Dourez Pharmacopæo cui hæc ascripta. Atriplicis marinx species, Polyperon Bassi quorundam. Hæc vâdè similis Atriplicis syluestri vulgaris, nisi eadem.

ATRIPLEX FOETIDA

Vix humo tollit caules, ut plurimum, ramosos, dodrantes, aut etiam maiores: quos vestiunt folia ex rotunditate modicè in acumen desinentia, potissimum superiora, in inferioribus quædam sinuata, farinaceo puluisculo asperso candicantia, odoris virosi ingolerabilis, ut qui



qui vel accu-
tu leui manus
ita inficit vt
longo tempore
vix possit elui.
Flosculi racem-
osi Atripliciu
aliarum sylue-
strum modo.
Radix gracilis
fibrata.
Cord. hist.
Garofum, A-
grestis Atriplic-
is mima (for-
te minima) spes-
cies, Vuluaria.
Garofum au-
te dubio pro-
cul ex eo dicit,
quod *ra'ev*, si-
ue liquamen

dicitur. Angl. *Stinlin* Ocach. C. Bauh. Phyt.
Atriplex 10. siue *scetida*.

Atriplex *scetida*, quæ a nobis Montbelgardi,
Genevæ, Basileæ & Lugd. observata est, iuxta pa-
rietes provenire dicitur, & locis sabulosis, præter
tempus
tum quæ lotio canum sæpius asperguntur. Ætate
media floret, editque semen. Vbi semel ad hortos
translata diutius recurrit.

Ex vtero laborantibus gravitate odoris pro-
desse posse testatur Dodonæus. Fœminis stran-
gulatu vulvæ oppressis, conferre creditur, maxi-
mè si umbilico imponatur. Bonus hic Henricus,
inquit Tragus, vermes in vlcibus putridis ani-
mantium quadrupedum natos excutit certissimo
experimento, si herba tusa vlcibus imponatur
id quod non semel ipse vidi. Sunt qui vermes
euci dicant, si herba solum adalligetur iumento.

Locus
Vires
Vulva str
Stulatus
Vlcera p
trida

ATRIPLEX, DICTA PES
Anferinus.



Perisimilis
Descriptio
Est Atriplici
sylvestri si-
nuatæ vulga-
tiori, sed huius
flos ampliora
laxius & rariis
sinuata, ac tui-
rentia, caput
granante odo-
re prædita: flos
racemosus A-
triplicis iam di-
ctæ. Semen exi-
guum, rotun-
dum. Radix li-
gnescit fibrosa:
caulis crassus,
cylindricus, cu-
bitalis.

Tragus hanc
inter Solana refert, & Solanum 4. venenosum
& fusiolum, Schweins rodt/Mortem porco
Sciv. plag. supplicium satum, ab effectu expertas
vocare tradit ancillas. Idem & cum eo Fuch.
Dod. gall. & Lat. in fol. Tab. Gerard. & Gesn.
de coll. Itup. (qui tres & Chenopodium Plinij
vocant) pedem anferinum nominant.

Synonyma
Sola na
venenosum
Chenopodium
Mat. 104

Math. in post. com. It. & Lat. cum mag. fig.
Atriplex sylv. 3. Icon sine descriptione.

Lob. & penz Adu. Atriplex sylv. (siue pes an-
ferinus) latifolia. Obs. Atriplex sylv. latifol.
lc. plant. Atriplex sylv. (siue pes anferinus), lati-
folia, lacris lacrimis.

Atriplex
latifol.
Cynocrambe

Hist. Lugd. frustra duas icones proponit, ac H. Lugd.
deterius diversis capitibus. An Thal. Atriplex no-
fimentaria grandior? Casalp. Cynocrambe ge-
nus alterum, quod Hermol. testatur apud Pli-
nium Chinopum esse: i.e. Herbam similem An-
ferino pedi. C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Atri-
plex 6. siue silu. latifolia, Cynocrambe, non au-
tem Dioscoridis.

Nemina
linguarum

Atriplex dicta Pes anferinus, cognominatur
à Germanis Gänß fuß / quibusdam Sciv oder
Schweins rodt / & Sciv. plag. Belg. Gänßen
vot. Gall. Pied d'oye. It. Pied di' Ocha. Ang. Goose
se foote.

Secus veteres parietes, vias, semitas, alibi que
incultus as desertis humenibus non nihil locis

Locus

Synonyma
Garofum
Vulvaria

Atriplex ca-
nina.
Solan Hen-
ricus.
Stinum A-
triplicis.
Error Tra-
gi, ac Lon-
gers.

Tragium
germanicum

Atriplex
urcina.
Garum olens

Infamis
horatu

Fuluaria

Atriplex o-
lida
Cynocram-
be.

Conyza
Dioscoridis.
Casalp. lap-
sur.

piscium redoleat.

Tragus Atriplicem caninam & scetidam, &
Blitum scetidum, & Blitum Henicum appella-
t. Germ. güt oder stolz Reintich / hundsmiten.
Vicum, inquit, Atriplicis potius est, quam quid-
uis aliud.

Sed & Lonic. hanc Boni Henrici (Güter Hen-
rich) nomine describit, nullam cum Trago po-
nens figuram, ac nomina Boni Henrici male as-
cribens.

Dodon. gall. Tragium Germanicum, quorundam
dam Vuluaria: Lat. in fol. Garofum, Atriplex
scetida.

Gesn. hort. Atriplex altera, Garofum.

Lob. Icon. Plant. Atriplex pusilla, olida, Hirci-
na, Vulvaria vocata. Garum olens. De hac aiunt
Aduersaria: Est in Nitiobrigum agro, alitque locis
quàm plurimis herbula Atriplicis accensenda, se-
cus vias frequentissima, tenera, paruula: humi
demissa folia candore micant, quasi polline in-
terpersa. Hanc notissimam fecit odor, & ferè
infamis: odoratu namque hircus terrore spi-
ritus opplet nares, quo imbuti quæritur permul-
ti se meretricum impuros oculos subodoratos
esse: planèque referre odorem illum virosum
quem prosituta libidinis cortea ex impura col-
luvie congesta spirant. Inde vulgè Fuluariam di-
cunt: atque autumant: hac illitas vestium
muliebrium plicas canes fagire, atque arrecto ve-
terro Venens astu actos, illas amplexas cupere
inire, præsertim in templis vbi tetrius odor spirat,
& minis ventis distatur. Hæc vulgi sunt, tota ci-
bis abdicanda. Lob. Obs. Atriplex olida, Vulva-
ria, Garum olens, Garofum Cordi.

Casalp. Cynocrambe affinis herbula folio mi-
nimè serrato: sine flore: semine racemoso, exi-
guo, rotundo: vulgè Conyina, nam redolet mu-
liebria: videtur Conyza tertia apud Dioscori-
dem. Sed quod huic plantæ Casalp. florem negat,
error est arei.

Vulvariam apud Hist. Lugd. à scetido odore
Tragium vocavit Dodonæus. Gall. Herbe de Bouc.
Quia verò duo sunt alia Dioscoridi Tragii gene-
ra, ad horum discrimen Tragium Germanicum
cognominavit. Alii Atriplicem caninam dixe-
runt, quia eam ex vrina canum nasci putant.

Hanc Tabern. Vulvariam (Schamfräu /
Wauzenfräu) appellavit, dicta nomina in Hist.
ferè omnia adscribens. Gerardo, Atriplex olida

Tom. II.

frequens exit, viget ac floret vnà cum Atriplicibus reliquis. Hanc Lugduni, Genex, nec non Montbelgardi obseruauit.

Vires: Herba planè lethalis & pestifera maximè si à subus deuoretur, Fuchsio & Trago auctoribus. Facultate frigida & humida est, & quidem non minùs Atriplice: sed vti apparet, etiam amplius refrigerans, secundo ordine.

ATRIPLEX DICTVS PES ANSERINVS
alter siue ramosior.

Synon.

Chenopodium Pes anserinum.
Rorror Gerardis



pluce purpurea ponit pedis anserini 2. figuram. C. Bauh. Phyt. Atriplex 7. siue sylu. latifolia altera acutiore & nigriore folio.

Locus In antiquis areis & fossis fimi ac pagis inuenitur.

PARIETARIA.

Erym Descriptio



stilo euoluere coneris, subfultum excusso pulueris impetu spectaculo iucundo, se expandunt repanda, in medio *seminis* rudimentum circumdantia. *Radix* fibrosa. Est hæc maior & minor.

Hanc nostram parietariam Helxines nomine delineat Dioscorides his verbis. Cauliculos profert tenues ac subrubentes, folia Mercurialis, hirsuta: circa caules velut exigua femina, aspera, vestibus adherentiõ.

Math. Brunfels. (cui & Parietaria, & septima Synon. Partheni species) Anguill. Fuch. Dod. gall. Gesn. hort. Lacun. Lob. Adu. Obs. & Ic. Plant. Turn. (cui & perdicion) Castori. H. Lugd. Casalp. Camer. Helxine. Trago. Lonic. Cord. in Hist. Dod. Lat. in fol. & Tab. *Parietaria. Helxine altera & Muralium*, Cord. in Dioscoridem. Per *Herbam venti* Fuch. Adolph. Occo. Cord. Apollo. Luminare maius, & alii Helxinem, siue Parietariam intelligunt.

Ελξιν & περδικιον Græcis, Helxine, Perdicium & Perdicaria Lat. vulgò autem & officinis Parietaria, aut corrupta voce Parietaria appellatur & Muralis: Extant verò eius & alia nomina, cum apud Diosc. & Plinium, tum apud Apuleium & passim alios, vt Sideritis, Heraclea seu Herculana, Vitriaria, Vrecolaria, Veratrium, Ixine siluestris, Chlbadum, Polyonymon, Elitis aut Alitis, Amelxine, Eufine, Amorgine, Sucotachon, Plyphuaccon, Melampeton, Cittampelon, Anatetamenon. Diosc. Plinius & Apuleius Parthenium quoque appellant. Sed animaduertendum est Plinium huius nominis homonymia deceptum, duas herbas diuersissimas confundere, nimirum Parthenium Dioscoridis, & Helxinem hanc nostram, siue Parietariam.

Dicta autem est Helxine, quòd aspera foliorum hirsutie, asperoque semine, tenaci nexu vestimentis obus adherat. Perdicium, à perdicibus, quæ eam elitare solent: Parietaria, quòd in parietinis exeat, atque eadem de causa Muralis & Muralium. Herba vitri, Vitriaria, Vrecolans & Vrecolaria, quòd tergendis vireolis, vasisque vitreæ efficacis sit. Dicitur Gem. tag vnder *Wach*, Nomina non tamen ea, quæ luteis purpureis & similibus floribus insignis est (S. *Peters fraut* / *Mau fraut*. Belg. *Olaf cruyt*. Gall. *Parietarie*. Hisp. *Terna del muro*. It. *Parietaria*: Angl. *Pellitory of the Wal*.)

Nascitur iuxta muros, parietes, sepes, in rudibus, ac subinde in vineis, ac ipsis muris. In hortis etiam plantata ita prouenit, vt inde vix abigi possit: Maio mense exit: Iulio, ac Augusto semen profert: radix hieme solà restat. Intro duxi in Hortum E. C. ac etiam in meum, vbi hiemem perfert ac non solum se radice multiplicat verum etiam semine: Patauii passim prouenit: Montepelii toto anno viret in muris: Montbelgardi verò pereunt folia & Martio mense prorumpunt. Lugduni vidi virentem Septembri & Octobri. Genex non longè à Porta *Rue* in sepibus & in variis hortorum muris.

Vim habent folia Helxines refrigerantem, auctore Dioscoride, & adstringentem, quare imposita sanant ignes sacros, condylomata, ambusta, panos incipientes, omnem inflammationem ac tumores. Succus eius Cerussa admixta illitus serysipelata & herpetas sanat, & podagras cerato cyprino, aut adipe hircino exceptus: prodest & tussiditurnæ succus cyathi mensura haustus. Tonillis quoque inflammatis vtiliter gargazatur & illinitur, aurium dolori cum rosaceo instillatus prodest.

Helxine inscit lanas, inquit Plinius, sanat ignes sacros & vicera quæ serpunt (in vulgatis exemplaribus verba hæc, & tumores collectione quæ pèperam

perpetam leguntur ex priore versu repetita) & guttura incipientia turgescere. Item veterem tuffim cyatho hausto, & omnia (in ore tumida, sic enim legendum) sicut tonsillas: Et aurium dolores cum rosacco. Eadem exemplaria habent varices cum rosaceo, nullo sensu. Helxine enim cum rosacco in varices nihil agere potest, nec eius facultatis meminerunt Dioscorides, neque Galenus. Vetus eodex arietes vocem habet, sed itidem corruptam & nihil indicantem. Quare locum sic, vt posuimus, Cornarius emendauit ex Dioscoride.

Abstergendi & leuiter adstringendi vim cum subfrigida humiditate illi tribuit Galenus ad predictos affectus etiam commendans. Facit, inquit Aëtius, ad alopecia & impetigines herba ipsa per se assidue afflicata. Aperit & hæmorrhoidas sedis, & fistulas sanat, & sinus occludit cum modico sale trita, & cataplasmatibus modo imposita. Ex his intelligere licet multos melxine abuti, qui eam in frigidis vitis pro fomento vsurpant, cum refrigerandi constringendique videri prædita sit. Ceterum cum adstringendi facultas ei quoque insit (est enim gustu nitroso, bliteo, & superficie abstergente,) potest etiam calculosis, & iis qui difficultate vrinæ laborant exhiberi. Succus enim eius trium vnciarum pondere haustus auctore Matthiolo suppressam vrinam mirè prouocat, eademque super tegula calefacta, vinoque Cretico irrorata, & pubi illita, calculosis & vrinæ difficultate laborantibus mirè auxiliatur. Potissimum, inquit Fuchsius, si aliquid quod maiorem abstergendi vim habeat, admisceatur. Sic Aëtius hæmorrhoidas aperire tradit, si cum sale cui detergendi vis insit, trita apponatur. Multi hodie vsus est in enematis ad ventris & vteri dolores paratis, & ad balnea, absterfioni accommodata. Eiusdem vis magna est ad recentia vulnera sananda. Si enim recens semi contusa vulneri alligetur, tertio die soluat, non erit opus alio vti medicamento. Succus in ore detentus dentium dolores mulcet. Stillantia eius aqua faciem abstergit, & nitorem addit.

OCIMASTRUM VERRUCARIUM.

EX radice tenui, fibrosa, sulca, caulis surgit singularis, teres, subhirtus, geniculatus, ex viridi rubescens, nitidus: folia ex articulari aduersa, Solani vulgaris, acutiora, atrouerentia, aut ex viridi purpurascens, per ambitum leuiter sinuata: flores in thyrsulis pulchelli, quadrifolii, colore carneo, bifori inuolucro, antequam patefiant, cœditi, staminibus concoloribus medium occupantibus subiectis, birsutis globulis, postmodum in lappulas abituris: quorum singulis modo vnum, modo bina semina oblonga recluduntur. Nostra icon facta est ad plantam ramolam.

Trago germ;

Lappula siluestris. Ocimi foliis herbat, Heliotropii genus, Gesn. aliquando putabat: nunc de hortis Ocimastrum verrucarium appellat. Lob. Obs. & Ic. Plant. Circæam Lutetianam dicit. Tabern. Ic. herbat Diui Stephani. Hist. Lugd. Circæam Dalechampii. Sed non placet planta hæc pro Circæa Diocle. In descriptione etiam Dalechampii sunt, quæ in ipsa planta non obseruatur. Schvv. est Circæa domestica, Ocymastrum verruc. Item, Circæa siluatica, helxine filii. siue fluuiatilis Tab. [Thal. legendum] vasa tag vnd Thade: minor est tota & tantillum rubens. Solani naturam emulatur.

C. Bauh. Phyt. Parietaria 3. helxine filii. seu fluuiatilis & riuatilis maior & minor Thalyo quid est? Item Solanum 9. Solanifolia, Circæa diocle, ratione loci variat. In monte Fræco multo minor est vix palmi dimidium æquans.

Ocimastrum verrucarium Montbelgardii in sylua le Chesnoy: item in sylua inter Elibon & Meligni Danigon (vnde in hortum E. C. transfuit.) Basileæ in syluis, nec non Geneuæ, & propè Malmunster, riuis & viginosis gaudet, locis opacioribus frequens. Inueni etiam ad putridos arborum truncos. In hortis reptatu suo odiosa.

MERCVRIALIS MAS ET

fœmina.
CAP. V.



Nann 4

Ocimastri in
Syrac.
Circæa C. H.
Circæa
Herba S.
Stephani,

Circæa

Helxine
filii.

Helxine riuatilis.

Locus &
Tempus.

Descriptio

MERCURIALIS MAS ET fœmina. CAP. V. Mercurialis masculina fœmina filia minime distinguunt, que inter se similes ad Parietariae folia accedunt, sed glabra, atre virore splendens, & in ambitu serrata, sapore nitroso calidiusculo & nauseoso: caulibus vtrique angulosis spiliamini, ac etiam maioribus, geniculatis, lœues: ex foliorum alis fœminæ quidè ligule recte emicant, tenues, quas vetucillatum ceu in Græcia ambiunt flosculi glomerati, muscoli, qui in quatuor foliola herbida sese explicantia, circos apiculorum, luteolorum aut herbidorum ostentant (nullo succedente semine pereunt.) Mari autem ex iisdem

Ex Acio
alopecia

Error mal-
orum
adstringit
iustus
Calculus

rimam
pouet

emorrhoid-

ulnere

olor den-
um

descriptio.



buli

stro.

alis breues pediculi oriuntur, quorum singulis testiculata bursula, nonnihil compressa, hirsutaque infidet, gemina femina recludens [Dodonæo ad Aparines & forma & asperitate accedentia, compressiora tamen.] Radix utriusque tenera & fibrosa.

Est Mercurialis sativa & siluestris. Vtraque mas & femina. Nos hoc capite vulgò receptam siue sativam prosequemur: siluestrem, seu repentem, quæ Cynocrambe dicitur, sequenti capite traditur.

Mercurialis, vt tradit Dioscorides, folia Octimo similia habet, Helixæ cognata, sed minorâ, ramulos duplici geniculorum nodo cinctos, alarum caua multa, densa: fructum femina copiosum, tacemosum, mas è foliorum sinu dependentem, paruum, rotundum, ceu binos testiculos vnâ coherentes: frutex est dodranalis aut minor.

Plinius de eadem re paulò aliter scripsit. Linozostis siue Parthenium Mercurij inuentum est: Idèò apud Græcos Hermupœan multi vocant eam, apud nos omnes Mercuriale m. Duo eius generâ, masculus & femina, quæ efficacior.

Fuchs. Matth. Dod. gall. & Lat. in fol. Gesn. hort. [qui de coll. stirp. Linozostin vocat:] Anguill. Lob. Obl. Lacun. Lonic. Castor. Tab. Camer. hort. epit. [vbi Mercurialis simpliciter inscribitur] & hist. Matth. germ. Hist. Lugd. Mercurialis mas. Trago, Mercurialis 2. vel testiculata aut testiculata. Lob. Ic. plant. Linozostis, Mercurialis mas. Cordo in Diosc. [cui & Phyllon Arithenogonon] & Turn. Mercurialis mascula. Brunfels. Mercurialis, & sexta Parthenii species. Cæsalp. Mercurialis fructum ferens. C. Bauh. phyt. & ad Matth. Mercurialis 1. siue testiculata. Schvv. Mercurialis sativa mas, testiculata.

Matth. Fuchs. Turc. Dod. gall. & Lat. in fol. Lacun. Gesn. hort. Lob. Obl. & Ic. plant. Cord. in Diosc. Castor. Tabern. Camer. hort. epit. & hist. Matth. germ. Hist. Lugd. Mercurialis femina. Trago, Mercurialis vulgaris & i. Cæsalp. Mercurialis florens. Cord. in Diosc. Phyllon Thelygonon Theophrasti. C. Bauh. phyt. & apud Matth. Mercurialis 2 siue spicata.

Matth. ait non deesse, qui velint Phyllum à Linozostis [Mercurialis non differre. Verùm se non posse cum illis liberè consentire. Sed hanc tanquam erroneam opinionem in postremis comment. Ital. & Lat. merito omisit.

Anguill. Dioscoridis caput de Phyllo corruptum esse scribit [quod tamen non demonstrat] admiscens, quæ Theophr. dixit de Arithenogono & Thelygono, quæ dux plantæ, sunt Mercuriales duæ.

Tragus & Dorst. utramque vnâ icône exprimitunt.

Apud Ryff. in Diosc. figura Cynocrambes posita pro Mercuriali mas, & femina, Mercurialis pro Cynocrambe, Mercurialis mas pro femina.

Hier. Brunsch. ineptam habet figuram, in edit. anni 1595. quæ postea iterum ponitur pro Consolida media. Aduers. Penæ & Lobeli mares & feminam agnoscunt, Linozostidumque, seu Parthenium, & Mercurii herbam appellat.

Græcis ἡμετέρας παραδένειον ἢ ἡμετέρας [Hermubotane, aut vt Manlius legit, heri potana] vel ἡμετέρας [Hermupœa, id est, Mercurii herb.] Latinis Mercurialis [Mercorella Patern.] quoddam Mercurio inuenta sit, vt ait Plinius. In Orbis Med. compendio Lineum costium habetur, pro quo tamen Linozostis sit. legendum, vt Tragus prudentè rimet. Sic & Linozostia super El. de Sebesten & Ellenitii, reperitur. Alibet Auerth. Phyllum Theophr. Dod. Germanis Büngele frucht / fümars, Mercurius frucht. Trago winter grün. Belgis Büngele frucht, Mercuriac. Gallis de la Mercuriale. Ital. mercorella. Hisp. mercuriale & friguamorta. Anglis French Mercury, Mas Theophr. Græcè ἀρρηθρῖον, Femina verò ἀρρηθρῖον appellatur. Notandum autem esse adhuc & aliud Parthenium, & apud Dioscoridem quoque aliud Phyllon.

quo tamen Linozostis sit. legendum, vt Tragus prudentè rimet. Sic & Linozostia super El. de Sebesten & Ellenitii, reperitur. Alibet Auerth. Phyllum Theophr. Dod. Germanis Büngele frucht / fümars, Mercurius frucht. Trago winter grün. Belgis Büngele frucht, Mercuriac. Gallis de la Mercuriale. Ital. mercorella. Hisp. mercuriale & friguamorta. Anglis French Mercury, Mas Theophr. Græcè ἀρρηθρῖον, Femina verò ἀρρηθρῖον appellatur. Notandum autem esse adhuc & aliud Parthenium, & apud Dioscoridem quoque aliud Phyllon.

Reperitur Mercurialis in hortis olitorijs, vineis, aliisque locis humentioribus ac vmbrosis, seculis horum atque vitorumque sepentia. Tota Aestate utraque viget: Augusto mense semine prægnans est mas: In femina enim nondum videtur femina, sed tantum flores. Hyeme plurima parte intercidit.

Vtraque Mercurialis Medicis, Sepiasiatris omnibus, atque etiam mulierculis notissima est subnitroso sapore, & nonnihil viroso succo putgante & medicato, ad multa perquam vtili. Vtraque enim, autore Dioscoride, alium mouet, oleum modo comesta, cocta in aqua, & ea epota bilem & aquosa ducit. Creduntur præterea femina foliata & pota, post purgationem pudens appositâ, vt femina concipiantur efficere: mascula verò similiter adhibitis, mares generari.

Plinius de medico vtiuque vsu paulò aliter quam Dioscorides tractauit, eundemque fusiùs ex Hippocrate declarauit, qui etiam hodie in libris illius extat, maximè eo qui de sterilibus inscribitur, & in duobus de morbis muliebribus. Verba Plinii hæc sunt. Mirum est quod de vtroque genere eorum proditur, vt mares gignantur, hunc facere, vt femina, illam. Hoc contingere si à conceptu succus protinus bibatur in passo, edanturque decocta ex oleo & sale, vel cruda ex aceto. Quidam decoquunt in nouo fictili cum Heliotropio, & duabus aut tribus Allii spicis, donec percoquantur. Decoctum dati iubent & herbam ipsam in cibo altera die purgationis muliebris per triduum, quarto die à balneo coite eas: Hippocrates minus laudibus in mulierum vsu prædicat has. At hunc modum medicorum nemo nouit. Ille eas vuluæ cum melle, vel rosaceo, vel inno admouit. Item ad cunctos menses, ad secundasque. Hoc idem præstare potu sicut dixit. Instillauit auribus olidis succum, innoxitque cum vino veterè. Aluo folia inposuit & epiphoris. Stranguriæ & vesicis decoctum eius dedit cum myrrha, & thure. Aluo quidem soluendæ vel in febrî, decoquitur quantum manus capiat, in duobus sextans aque ad dimidias bibitur sale & melle admisto, nec non cum vngula suis aut gallinaceo decocta. Salubritus purgationis causa putare alicui utramque dandam per se, siue cum Malua decoctam. Thoracem purgant, bilem detrahunt, sed stomachum lædunt.

Mercurialis, inquit Galenus, vtuntur omnes, ad ventris purgationes duntaxat. Verùm si quis eius periculum facere voluerit in cataplasmate, sanè admodum eam esse digerentis experietur facultatis. Hæc Galenus. Eiusmodi enim enematibus frequentissimus est vsus. Et multis in locis Pharmacopœiam multum vtuntur melle quod Mercurialis vocant. Succus expressi libris tribus incoquant mellis boni libram vnâ cum semisse, vel libras duas ad enematâ, & muliebra enanthimata: Obseruatum est Verucas omnis generis vtiuque Mercurialis folijs tolli vel earum succo. Item vtiuque

Mercurialis sativa & siluestris Mas & femina

Mercur. Diosc.

Ex Plinio Linozostis Parthenium Olinio Hermupœa Genera duo

Synon.

Mercur. simpliciter Mercurialis mas

Phyllon Arithenogonon Parthenii

Mercurialis sativa

Matth. hal. lucatur

Anguill. not.

Ryff. taxatur

Brunsch. not.

Nomina linguarum

Locus & tempus

Vires:

Miraculose

Vulua

Menses. Sec. ad a

Sit Anguilla

Thiorax Ek Galeni Enema bib. gradatur

Mel mercurialis

Obseruatum est Verucas

utriusque semen cum Absinthio decoctum ich-
tericos mirifice iuvare, malis quoque serpunt succum
cum aceto mederi. Quae ante M... lura literis
mandavit Ruellius.

CYNOCRAMBE VETERIBVS.

CAP. VI.

Cynia
Mercuria-
lis silv.
As croc.
mascula.
Hæteras
no.
Vites.

CYNocrambe siue Cynia, quam aliqui Mercu-
rialem ^(masculina) silv. masculam vocant cauli-
culum duorum palmorum altitudine emittit, ce-
nerum ^(siccum) mollem Sarrac. subalbidum: fo-
lia Mercuriali aut hedere similia, ex intetualis
subalbida: semen solius adhaerens paruum, rotun-
dum. Vim habet caulis & folia, tum pota; tum
olerum modo in cibo accepta, alium mo-
nendi. At decoctorum iusculum, bilem & aquo-
sa ducit.

Verum huius Cynocrambes cum neque Theo-
phrast. neque Galenus, neque Paulus, neque Aëtius
meminerit, videtur Cornario hoc totum caput
ex præcedenti temerè repetitum Dioscoridi ac-
creuisse & superuacuum esse, ac redundare. Ad-
dulterinum caput est, inquit Marcellus, maxime
cum in vetustis codicibus minime repetiatur. Cy-
nocrambem autem Ruell. eandem cum Atriplice
sylv. facere videtur, sed male, præsertim, quod
Diosc. de silv. Atriplice lib. 2. de Cynocrambe
verò ad finem quarti, tanquam de diuersis plan-
tis tractauerit.

Atriplex
sylv. non est
contra
Ruell.

Sed Galenus, Paulus & alii, atque etiam Diosc.
alterius Cynocrambes mentionem fecere sub no-
mine Apocyni de quo suo loco.

Est verò Cynocrambe Honor. Belli & Casp.
Bauh. nohis Alfine foetida de qua Hist. n. g. l. 29.


Cynocrambe Gerardo Anglonon bene dicitur
de Phyllo Hist. n. libro præsentis. Est tandem
alia Cynocrambe siue Mercurialis siluestris, de
qua iam agendum.

Cynocram-
e Galeni
& Apoc-
yni.
Alfine fo-
etida
byllon fo-
n incano
don poss.

CYNOCRAMBE MAS ET FOEMIMA
siue Mercurialis repens.

descriptio

Plurimis fibrosis radiculis perennibus &
lenis, sapore nonnihil dulci sed fastidioso,
per terram reptit Cynocrambe tam mas quam fo-
mina, neruo
duro fibrarum
Hellebori in-
star factis: cau-
lis surriguntur
aliquot, teretes,
concaui, longis
internodijs ge-
niculati; peda-
les, præpter ter-
ram purpuraf-
centes: folia ad
articulos, hinc
opposita læuis-
sima, lanuginosa,
folijs Mercuri-
alis vulgaris
similia, tenera;
duas aut tres
vicias longa,
inferiora tamen
multò minorâ



sunt, acuminata, in ambitu
ferrata, pedicu-
lis breuibus, gu-
stus nauseoso, ex
foliorum alis
pediculi exerit,
in mari quidem
breuiiores, qua-
tuor vel quin-
que, vnciales
aut feminales
ac maiores, bre-
uiiores alios in-
terdum à latere
proferentes,
quibus insidet fo-
sculi herbaceo
colore præditi
ternis foliolis
constantes, quo-
rum medium
occupat loculamenti
seminum rudimentum,
ex
tius acumine emicant apiculi bini corniculati
extrosim reflexi: loculi hirsuti compressi, in ge-
minos testiculos, Lentis magnitudine diuisi, se-
mina bina continent dissepimento membrata
distincta in vno pediculo tergmina: Atri-
nocrambe foemina ex foliorum alis pediculi sur-
rigitur tres 4. aut quinque vncias longi tenuis
striati, in quibus floeculi in spicam digesti, multo-
si, ternis foliolis herbaceis compositi, in quibus
staminula aliquot herbacea: qui nullo succedente
semine intereunt. Dodonæo tota herba vitæ
odoris ingratum redolet.

Anguillara ait Cynocrambem sibi incogni-
tam.
Canina Braslica, ^{rustica}; siue cum Matthio-
lo, Cynocrambes nomine, Cord. in Diosc. Mercu-
rialem silv. & quidem cum Matthiolo Trago,
Amato, Aduersariis & H. Lugd. masculam tantum
proponit; In hoc enim genere inueniri femi-
nam negat, sed non absque errore, Eam autem
falli ac foeminam haberi, ipsemet in Historia pa-
lam facit. Inibi namque errorem suum agnoscat,
ac duas describit, Vnam quidem titulo Mercuri-
alis masculæ syluestris, altera. n. verò foemina, cui
Gesn. figuram addit. Is præterea in Diosc. in
hac herba demonstranda Ruellium errasse scri-
bit, id quod Matthiolus clare demonstrat.
Videtur, inquit, Ruellius existimasse Cynocram-
ben eandem herbam esse cum Atriplice siluestri.
Qua in re (si ita credidit) aperte errasse depre-
henditur. Differt enim ab Atriplice silv. non mo-
do folijs & facie, sed etiam caulis proceritate. Si-
quidem Atriplex silv. quandoque ad duum cubi-
torum altitudinem assurgit. Cynocrambe verò
binum palmorum longitudine contenta est.

Error Cor-
di.

Ruellius er-
ror.

Atriplex
silv. non est

Cynocrambe nihil aliud est, inquit Corn. quam
siluestre Linosytidis genus. Hanc Officinae salis
Atriplicem silv. vocant, vnde quidam, Wildtmel-
den / Gheissmeldeii nominant.

Linofolius
Officin. est

Dodon. Gall. quamuis solum marem pingat,
tamen Cynocrambes foeminam quoque statuit.
Lat. autem in fol. duntaxat vnus meminit, ac fi-
guram Plantini sub titulo Cynocrambe, Mercu-
rialis siluestris ponit, ac describit, atque eam ha-
bere femina masculæ Mercurialis: tamen in eius
icone sunt præditi flores foeminae, quasi essent flo-
res maris. Ego sanè hæcenus non oblerauit ex-

Dodon. in
xain.

fœminæ floribus, matris semina provenire.

Wesl. la. p. su. Castagnaria. Castragula

Extr. alius

Atriplex facta. Lib. reprub.

Ryff. icon craniposita

Cynocrambe sine Mercurialis repens ma

Cynocr. 2. sine Mercurialis repens fœmina. Nomina linguarum

Locus & tempus

Vires

Fallitur Gesn. hort. qui Mercurialis agrestis marem duntaxat esse asserit, ac ab Italici Castagnariam, vel Castrangulam vocari tradit. Idem præterea in cat. plant. Cynocrambem Brassicam caninam, Cyniam Officinariam, Atriplicem silu. & Springfraut vocitat. Quod nomen germanicum ira conuenit, ac si prunum silu. Acaciam dixeris.

Lob. Obseru. & Ic. plant. figuram habet cynocrambes marem & fœminam experimentem, an verò laudabilem iudicent alii. Is, aliàs priuatim nec maris, nec fœminæ meminit.

Ryffius in Diosc. malè habet pro cynocrambe figuram Mercurialis fœminæ proprio errore vel Typographi. Cynocrambes enim maris figura est sub titulo Mercurialis maris.

Matthiolo cynocrambe, cuius Galenus non meminit.

Fuchf. Amat. Dodon. gall. & Lat. in sol. Lobel. Obs. & Ic. plant. Cast. [qui nullius momenti figuram habet.] Hist. Lugd. Euch. Fab. Columnæ, Apollini, Cynocrambe. Fuchf. icon. Camer. hort. Epit. & hist. Germ. Cynocrambe mas. Eidem histor. Germ. Thal. Mercurialis siluestris mas. Ttag. Lonnic. Mercurialis siluestris. Catalp. Mercurialis alpeya vel montana. C. Bauh. Phyt. Mercurialis, siue silu. testiculata, apud Matth. cynocrambe i. siue Mercurialis montana testiculata. Schvv. Mercurialis siluatica *Κυνοκράμβη* Dioscor. cynocrambe Matth. & Dodonzi.

Camer. hort. epit. & histor. Matth. germ. Thal. cynocrambe fœmina. C. Bauh. phyt. Mercurialis 4. siue silu. spicata. Apud Matth. cynocrambe 2. siue Mercurialis montana spicata.

Κυνοκράμβη *μαρμαίνα*, *Ανοζόσις* & *πύλα* Græcis, Latinis cynocrambe, Brassica canina, cynia & canina etiam simpliciter, ac passim Mercurialis syluestris: Aphris *harmas*, aliis *afumeslabon*: Germ. *hunds fôl* / *hunds frauc*, vnde *wildt Bîngel* / *fraut*. Belg. *wildd Mârcuriael* / *wildt Bîngel* / *crûyt*. Gall. *chou de chien* & *Mercuriale sauvage*: Ital. *Mercorella bastarda*. Hisp. *Verca perruna*. Angl. *wild Mercury*.

In syluis ac aliis perinde vmbrosis gignitur, vires, vigetque eodem quo altera Mercurialis anni tempore.

Cynocrambem marem & fœminam obseruavi Geneuz prorumpentem Martio & April: Basileæ eùm esse in monte prope Moutets virentem adhauc Octobr. & mense Iunio iuxta Leurack, & in monte Wasserfal: Abundat mas cum femine Maio in Montbelgarden si monte Mohbar.

Facultate Mercuriali alteri respondet, si præstat quæ Dioscor. scribit [vide antè.]

PHYLLON EX VETERIBVS.

CA P. VII.

Phylli meminit Theophr. de plant. hist. lib. 9. cap. 19. vbi ita scriptum reliquit: Quædam ad procreandum marem, aut fœminam valere traduntur: eamque ob causam herbari aliam [scilicet] quod nec Plin. nec Gaza agnouit, hic vetò herbam quandam simpliciter reddidit. matificam & fœminificam facientes, marem & fœminam dixerunt, sibi inuicem similes, & Ocy mi figuram habentes ambas: fructus fœminificæ muscolo flori Olez similis, pallidusque, Alterius figura nupet ex muscolo flore incipientis Oliuz cohærens sibi, geminûmque testiculorum hominis modo.

Plin. & Gaza reprub.

Ocy mi figuram habentes ambas. Fructus Olea

Dioscorides ex Crateua tradit Phylli duo genera. Phyllon, inquit, quod alii Elzophyllon, Bryoniam nominant [sunt qui *βρυον* legant, quod musci modo exeat, qui *βρυον* Græcis dicitur] in saxosis nascitur. Ac illud quidem, quod Thelygonon (quasi fœminiparum) dicitur, folium veluti Bryon, Olez pallidius gerit, sed colore magis herbaceo: caulem tenuem, breuem: radicem gracilem: florem album: semen Papaueris maiusculum. Arrhenogonon (Matiparum) iam dicto simile, nisi quòd semen differt: habet enim racemosum, ei quodammodò simile, quod postquam defloruit Olea, primum emergit atque conspicitur. Perhibetur autem, Arrhenogoni potum mare generari: Thelygoni verò fœminas. hæc memoria prodidit Crateuas: quanquam talia mihi videtur historia tenus, tanquam famà auditione ne accepta, proponere.

Diosc. gener. duo. Elzophyllon Bryonia

Thelygonon

Arrhenogonon

Crateuas not.

Plinius eadem serè prodit: in codicibus tamen eius non Arrhenogonon, sed Arsenogonon corruptè legitur.

Plinius hæc corruptus

Galenus, Paulus, & posteriores Medici Græci, inter simplicia, Phyllon non recensuerunt, fortè quòd nullum eius vsum, vt Cornario videtur, Medicum viderent, & ei, quem priores de ipso tradiderunt, parum fidei haberent: Aut, quòd non fecus illis ac nobis fuerit incognitum. Quo fit, vt mirari non liceat, si adhuc quoque legitimum nondum sit comperitum.

Galenus & Paulus Phylli non meminerunt

Videtur quidem Ruellius existimasse Persicariam, quam maiorem cognominant, esse Phyllon. Qua in re aperte fallitur: siquidem Persicaria illa humenibus ac virginosis locis prouenit: Phyllum verò in saxosis nascitur, vt Diosc. testatur. Qui tamen & ipse, vt eius verba accuratè expèdit inhaeret, nullam huius herbe cognitionem habuisse deprehenditur, nisi eam, quam ex Crateuz historia habuit. Non defunt tamen, qui velint Phyllon à Linozoiti (Mercuriali) non differre, quòd pluribus tum notis, tum facultatibus sibi inuicem respondeant. Verùm cum iis consentiendum non est, quòd, vt iam antè quoque dictum est, Mercurialis folia habeat Ocimi, Helixinz cognata, non autem Oliuz: florem herbaceum non album: quòd nascatur passim in hortis etiam & vineis, non saxosis tantum: quòd de his denique seorsim diuersi si que capitibus scripserint Dioscorides & Plinius, vt pote de rebus inter se differensibus.

Ruell error

Mercurialis non est

Ex Theophrasti potè verbis colligit Matthioli, Dioscoridis codicem esse deprauatum, quandoquidem Theophrasto Theligonum non nascitur musci modo, neque solum habet Olez viridius, vt in Diosc. scriptum legitur: sed fructum quidem fert in modum musci Olez, pallidiorem tamen.

Dioscoridis codex deprauatus

Susplicantur quidam apud Hist. Lugd. duarum herbarum eandem & repetitam esse delineationem, quare Diosc. caput de Phyllo vtramque Mercurialem marem & fœminam exprimi, quòd vtrumque omninò erroneum est.

Error quorundam

Alii alia Phylla adiuuenerunt. Est enim Phyllon quoddam Arrhenogonon, & Theligonon folio incano Monpessulanum quod Dioscoridis putatur Dodonæo & aliis, vt paulò post videre est.

Est vt suum Phyllon Dioscoridis Agerio, de quo dicemus hist. n. g. lib. 29. sub Garyophyllo holosteo tomentoso.

Phyllonea planta, quam Matthioli in Saluacino monte inuenit, nobis Cynocrambe fœmina est: Non enim cum Pegæ & Lob. Adu. Noli me tangere.

tangere eandem suspicamur.

Phyllon Amatus censet ni multum fallimur
Ophyoglosson, de quo lib. 8.

Folium [αὐλλων] herbari, & matrem & foeminam
αὐρρογόνην καὶ θυλογόνην esse putat Gesn. in cat. pl.
quam Einblat vocat. Hanc nos Bisfolium mi-
nus, siue Ophry esse dicemus lib. 31. Meritò au-
tem de hortus Germ. eos increpat Gesn. qui Sedum
ferratum cum Celsp. & H. Lugd Phyllum cogno-
minant & statuunt. Quod autem idem Gesn. in
descr. montis fracti in sine lib. de Lunaria; Sedum
alpinum minutis folis cinereum, Phylli genus fa-
cit, minds conuenit.

Alia adhuc duo Phylla Dalechampia apud
Hist. Lugd. pingit & describit, vocatque primum
simpliciter Phyllum arthenogonum: Alteram
verò Arthenogonon maius quod noa Phyllum
Dalechampia, musci genus inscribimus, de quibus
lib. 87.

Phyllon Hippocratis Lithicum & Aethiopicum
Silphium est, quod traditur lib. 27. οὐδὲν idem
vocat olera condimentaria; Rutam, Mentham, A-
pium, quae aliis dum emebantur, adici solebant.
In Aetio saepe Phylli voces leguntur, pro Folio, &
folis Malabathri.

De Leucacantha in genere dicitur, quod no-
tha voce Phyllon adpellitur. Est tandem Leuca-
cantha aliqua quam Phyllon alii cognominant,
nos verò, eub. lib. 26. patet, Cardium marianum
appellamus.



Ab Aduerlati-
tis ambo pin-
guntur his titu-
lis: Phyllō mas,
seu Artheno-
gonum Mari-
parum & The-
ligonum Phyl-
lon, siue Femi-
niparum. Lo-
bel. in Ic. Plant.
eandem figu-
ram tetinet, li-
cēt non valdē
bonam ac Phyl-
lon theligonon
& Phyllon ar-
thenogonon in-
scribit. Sed in
Obs. plantē omi-
sit, Arthenogo-
non, Phyllon

matrem, Theligonon foeminam vocans.

Matth. in post. comin. non dubitat, quin Phyl-
lon à Cortulo missum sit verum Phyllum. Eum
autem mirari sibi, si is Phyllum nouerit, cur non
describat, sed tantum pingat.

Dodon. Lat. in fol. foeminam pingit, ac idcirco
Phyllon Theligonon meritò ascripsit. Duorum,
inquit, generum Phyllon est; mas & foemina, ve-
lut Mercuralis.

Phyllum duj lex est Veteribus, inquit Clusius.
Quod Theophrastus mariticum [αὐρρογόνην] id
Diosc. Foeminium [θυλογόνην] facit. Praeterea Theo-
phr. [cuius sententiam potius sequimur] Phyl-
lo Ocimifolia tribuit. Diosc. Olez. illud inter alia
ei cum Mercurali, Cynocrambe, & Heliotropio
minori commune est, vt cruce radices tempore
succeslu caeruleum colorem contrahant.

Icones nostrae quae ex Clusio desumptae nobis
absentibus (licēt non deessent plantae ipsae) cor-
ruptae fuere per pictorem & sculptorem.

Camer. in Epit. & hist. Matth. germ. ambo pin-
git vocans in hist. Phyllum matrem & foeminam,
Welsch Bingelkraut. In Epit. αὐρρογόνην καὶ
θυλογόνην. Sed temerè nimium, meo quidē iudicio,
Dioc. on. is contextum huic Phyllo ascripsit, qua-
si absque controuersia atque errore Dioscoridis
Phyllum diceret. Figurae autem positae à Camer.
sunt Gesn. cui miseram ante multos annos plantas
siccas cum descriptione vtriusque. Sed quae tanta
Camerarii ingratitudo, vt nec mei, nec Gesneri
mentionem fecerit. Cuculum sermè dixissim in-
gratum.

H. Lugd. Compilerator non animaduertit se
duas vnus figuras plātē proponere. Phyllū enim
Theligonū Matth. & Phyllū Theligonū Theoph.
quod eum eisdem Theophr. Phyllo Arthenogo-
no ponit, est eiusdem plantae.

Tab. icon. & hist. Phyllon mariticum, Welsch
Bingelkraut Das männlein. Phyllon foeminifi-
cum, Welsch Bingelkraut Das Weiblin.

Gerard. Cynocrambe Doge Mercuric. 2. Phyl-
lon Theligonon, Chil. Dreus Mercuric. Icones
duas Phylli habet ex Tabern. Quis autem ex
Phyllo testiculato fecit Cynocramben, vt facit
Gerardus.

Cast. Durant. Phyllum.
C. Bauh. Phyt. Phyllon 1. & 2. siue testiculatum
& spicatum: Arthenogonon & Thelygonon.
Nascitur vtraque, vt scribit Clusius, multis H.

Phyllum Ge-
rard.
Matth. Wo-
nerat.

Camer. to-
merat

Ingratitudo

H. Lugd.
Hist.

Cynocram-
be

PHYLLON ARRHENOGONON ET
Thelygonon folio incano
Monspensul.



Ubitalea &
pedales habet
caules multi-
tos totos candi-
do tomento
pubescentes &
per ztatem li-
gnaescentes qui
in ramos ex ad-
uerso positos
ordine certos
abducuntur: fo-
lia oblonga sub-
rotunda, cras-
sifuscula, neruo-
sa, mollia, lanu-
ginosa, incana;
ad articulos o-
siuntur: strobili
minutissimi, in mare
quidem ad iun-
cturas breuibus

pediculis nixi, vix apparentes ante fructus, sunt
duo apices ochrea colore pallido. Fructus autem
sunt gemelli, testiculati, vt in Mercuriali mari, Cyn-
ocrambe & Aparine, villosis loculis compre-
herfi: foemina, inquit Lobelius, vti minoris Helio-
tropii exiunt, immatura albida, matura verò
Cyane nient colore, rotunda & quam Papa-
ueri maiora, gustu feruida, & non nihil pinguis.
Radix lignola, exilis: In foemina flores spicati ta-
cemosique, veluti in Mercuriali foemina.

Monspensibus haec planta meritò Phyllon
Dioscoridis appellata est, quamuis Εὐαβοῦδας vo-
cati tradit propter similitudinem sortè quandam
eum Olea: folia enim habet oblonga & candidatio
vt Olez: Item Βρωμαίος propter florem mulcosum.

Voli me
angere
Phyloglo-
sum

Bisfolium
minus
edum ser-
asium
edum alpi-
um mini-
mum foliati-
terium

Phyllum
Dalech.
musci genui

silphium
Olera

Malaba-
thrum
cucac.

Carduus
arianus

descripio

on.
don
se.

spaniæ & Galliæ Narbonensis locis secundum vias, vbi Aprilis, interdum maritimus, floret. In Belgio verò non nisi æstate: & singulis annis ex semine deciduo germinat apud nonnullos rei herbariæ studiosos. Has plantas vidi circa Monspelium virentes, florentes, & semina ferentes mense Aprilis, Maio, Iunio & Augusto. Phyllon vidi in horto D. D. Felicis Plateri Basileæ, quod culturâ maius euadit, Genevæ mihi provenit in horto.

Vires

Cum rabi-
bit morsu

Arthenogoni potumasculi lexus heri partus, vt Thelegoni semineî, Theophrastus & Dioscorides scriptum reliquere. Similicentenses vtriusque decoctum omnibus animalibus à canerabido demorsis propinant, magno successu, vt inquit. Granatensibus verò, Mauritaniis præferunt, ad muliebres morbos magno in vfu est.

CORCHORVS VETERIBVS ET in genere.

CAP. VII.

Corchorum oleraceis adnumerat Theophrastus, qui ob sui amorem in proverbum (quod ali sic, *Corchorus inter Olera*) abiit, cuiusque folium Ocimum emulatur: Plinius iis, qui spontè nascuntur, quibus pleraque gentium vescuntur in cibis. Corchorum, inquit, Alexandrini cibi herba est, conuolutis foliis ad similitudinem Mori. Præcordiis, vt ferunt, vtilis, alopecisque, & lentigini. Boum quoque scabiem celerrimè sanari eâ inuenio apud Nicandrum & serpentum morsus anequam floreat. Sed cum Theophrast. Corchorum Ocimi folio esse dixerit, mirum est Plinium ex alio fortasse autore scripsisse Corchorum herbam esse conuolutis foliis ad similitudinem Mori. Quare quidam legunt, (si scilicet qui corchorum Pilotellam maiorem esse concludunt, de qua suo loco) commacularis foliis, ad succi Mori similitudinem, quæ in ea perspicere liceat.

Alexandri-
ni cibi her-
ba

Thl. taxat-
ur

Lectio di-
uersa: Cor-
chori, Cor-
chori. Cetero-
morsu male

Equiuoca

Anagallis
anagallis

Blitum
Tragus

Pilotella
maior.
Pisciculus
quidam.
Corchorus
sive Melochia

Sed varia lectio est Corchori. Suidas enim, quod magis probo, κέρχουρ habet, κέρχουρ Helych. & Varinus. Notat etiam Hemolauis κέρχουρ & κέρχουρ apud Græcos multos legis, verum id mendosè. Ceterum multis hac ætate cum Plinio Anagallis Corchorus dicitur, quorum opinionem non probo. In Anagallide enim folium non est anagallis. Corchori cuiusdam (non tamen Veterum) nomine Angelicæ, speciem, quam repentem inscripsimus, intelligit Gesn. horti. Idem Bliti speciem quandam (Blitum 1. & 2. Tragi) facit. Dalechampius Corchorum esse suspicatur plantam eam, quam pro Myosotide (auricula muris) maiore Tragus depinxit ac descripsit, quamque nos Pilotellam maiorem quorundam vocauimus. Lycophron falsus est, κέρχουρ putans esse pisciculum quendam, Etatophone teste. Est enim vti dictum, olus quoddam agreste, & vile in Peloponneso. Diuersum ab his profertur Corchorum, Molochiam Setapionis quorundam multi statuunt, quibus & nos facillè subscripsimus. De hoc igitur agendum.



maioribus, duarum aut trium vnciarum longitudine, lescunciam latis, per ambitum ferratis, quæ parte imâ barbulam vtrinque vnam, seu apophysin ligulæ intiar tenuem possident. Siliquæ breui pediculo hærent, singulares, quatuor aut quinque vncias longæ, striatæ, sensim ad mucronè vsque attenuatæ, complures secundum longitudinem portiones dehiscentes, semen claudentes copiosum, cinereum, angulosum, paruum, gustu viscidum. Flores, teste Alpino, parui sunt, crocei, Leucois minores.

Prosp. Alpin. pl. Egypt. Melochia. Camerar. hort. Corchorus siue Melochia. Olus iudicum. Hic inter icones ex Gesneri typis semen & folia cum barbulis exhibet, quæ in Loheliana pictura fuerunt ommissa. Lobel. Obs. & Ic. plant. Corchorus Plin. Molochia Setapionis quorundam. C. Bauh. phyt. Corchorus.

Melochiam seminari in horto E.C. ex semine nullo per Fratrem C. Bauhinum qui mihi etiam Locusticam plantam attulit. Augulti sine nondum floruit. Crescit copiosè in hortis Halepi.

Semina Melochiæ sunt in maximo vfu apud Egyptios ad omnes affectus, quibus semina Altheæ conducere competuum est. Nam Melochia facultate planè similis Altheæ videtur, proinde ad suppurandos, resoluendos atque emolliendos tumores duros, eius maximus vfu est, habet etiam maiorem visciditatem eius mucilago quàm Altheæ. In cibis nihil est ipsa Egyptiis familiaris, decoquunt in aqua vel iure carni, ex eius cibo multi malè se habent, parum nutrit, & succum viscidum gignit ex quo difficiles viscerum obstructions. Foliorum decoctum est pectori amicum, ipsum enim humectat, ex quo siccis altheæ perisque tussibus præsentaneum cum saccharo candido est auxilium, atque agrè spirantibus. Semina pondere duarum drachmarum sumpta copiosissimè purgant omnes humores. Alpinus. Ravvolffius acidi saporis herbam dicit, cui si credendum prædictis contrarias habet facultates.

Tempora

Vires

Facultas

Althea

Tamara

Cibus

Althea

Egypti

Decora

Tusis

Semina

Purgant

DE LAPATHO, OXYLAPATHO, & Hippolapatho, Veterum sententia, & in genere.

CAP. VIII.

EX instituto hoc in loco de Lapatibus agemus, scilicet Beta enim, & Blito his intercedit affinitas, in semine, foliis, atque ad tota planta. Adde quo demolliens est & holzacea.

Lapathi generis est, inquit Dioscorides, quod in palustribus nascens, durum & aliquantulum in extremis acuminatum. Est & alterum

Lapathum

Oxylapathum

Lapathum

alterum

CORCHORVS SIVE MELOCHIA.

Descriptio Vbitali leui caule hanc plantam obfetuam, foliis Cynocambes ferè vel Mercutialis

alterum hortense, primo non ex Orib. legitur, non in omnibus, cui sectioni subscribit Plinius & Matth. nec legerim in antiquioribus non simile cum Hist. Lugd. simile. Tertium siluestre est paruum, simile Plantagini, molle, humile. Est & quartum genus, quod aliqui Oxalidem, aut Anaxidem, aut Lapathum (αἰθῆρας, silu. Lat. ex vet. cod. addit.) vocant. Cuius folia siluestri & paruo Lapatho similia sunt: caulis non magnus: Semmen subacutum, rotundum, acre, in caule & propaginibus. At verò Hippolapathum, olus magnum est, in paludibus quoque nascens. Dioscor. haecenus, qui quinq; Lapathi genera, non eo quo solet, sed perturbato ordine descripsit.

Plinius sibi minus constans modo Lapathum fatuum, modo siluestre Rumiace vocat. Lapathum, inquit Galenus, potest quis siluestrem Betam dicere, cum simile sit, non tantum gustu, sed facultate, hortense Betæ. Quandoquidem verò Beta iucundior est Lapatho. ob id magis homines ipsam edunt. At Oxylapathi, & qualitem, & facultatem, nomen ipsum indicat: Est enim Lapathum acidum. Hippolapathum autem in paludibus nascitur. Confundere videtur Galenus Oxylapathum, quorum hoc est ab ἄξω [aceto seu acido sapore] illud ab ἄξω, acutus, propter folia acuta. Tria autem Lapathi genera Gal. ex toto agnoscit, Lapathum simpliciter dictum, Oxylapathum, & Hippolapathum.

Theophr. qui duo Lapathi genera tradit, silv. & vrbatum, Oxalidem cum Oxylapathis quoque confundere videtur.

Actius brevis est & obscurus in Lapathi generibus annotandis. Vlcus, inquit, canis rabidi perfundatur radice Lapathi, quod Oxalidem vocant, decocto. Siluestre Lapathum est foliis in acutum tendentibus, radicem habens oblongam, veluti Raphanum paruum.

Aucenna & Serapio Lapathum omne sine discrimine Acetosam nominant, perperam subscribente Matthiolo, ad saporem referetes, quod ad foliorum figuram retulit Dioscorides.

Admirans & admirans [vt videre est apud Hist. Lugd.] Græcis dicitur, qui Rumex Latinis, Barbaris Lapathion. Lapathum autem ἀνὰ τὴν ἰσπανίαν dictus est, quod valet exinanire, & pro ventre leuare usurpat. Lapathum Arabes Hamadh, uandh, seu Hamad appellant: Itali Rombece & Lapatio, Germ. Zimpffer. Hisp. Labaca. Ceterum Oxylapathum non ab acore & acido sapore, sed ab acmine foliorum appellatum asserimus. Oxalidem autem propriè Romani Rumiace appellauerunt, forsitan quod ab ea succus non aliter atque mamma, quam Rumem Veteres dixere, sitientibus exugit soleat, nam foliorum acor à quibusdam hauritur, vt lac ab agnis, qui in suis matribus subumantur. De quo Virgil.

Fecundisque Rumex, Malus, Violaque virebat.

Nisi quis à teli similitudine ductum nomen existimet, quod Sparo cognatum in modum pedis recuruatur, cuius meminit Lucilius:

Tum spara, cum Rumiace portantur, tragula porro.

citante Nonio. Adfertur tamen & hic versus à Festo, sed pro Rumiace habet Murices. Hippolapathum Græci quasi grande Lapathum dicunt, magnis ampliq;ne rebus Bu & Hippo præponere soliti, à boue & equo excellentis magnitudinis animalibus magnitudinem mutantes, velut etiam in Hippomaratho & Hippofeliao: & Tom. II.

apud Plinium in bumasto Vua, & Bumelia Fraxino: itemque apud Theophrastum.

Lapathorum historia ex Veteribus relatâ, superest vt ex iisdem eorum virtutes adscribamus. Omnium olus decoctum, inquit Diocor. aluum mollit. Crudum illud cum rosaceo aut croco Melicerides discutit. Semè syluestris & Oxylapathi & oxalidis cum aqua aut vino vtiliter contra dysenterias, coliacos affectus, stomachi fastidia, scorpionumque ictus bibitur. Si quis etiam in potu præsumat, nihil illi scus patietur. Radices ipsarum ex aceto & eruda illitæ, lepras; impetiginos, scabrosque vngues sanant. Sed antea locus aceto & nitro in Sole perficiendus est. Pruritus decoctum earum sedat, si eo foueantur. Coctæ in vino si cum iure colluantur, aurium dentiumque dolorem mulcent. Strumas parotidasque discutunt, si cum vino decoctæ illinantur. Lienes autem cum aceto. Aliqui vuntur radicibus contra strumas, vinculo collo eas appendentes. Tritæ & appositæ femininarum fluxiones sistunt. Decocta cum vino & potæ regio morbo correptos emendant. Calculos vesicæ comminuunt. Menfes cient. Scorpionum ictibus auxiliatur. Hippolapathon eadem cum antè dictis Rumiace generibus vires obtinet.

Eadem serè & Plinius. Vbi autem iure exiguo habet, lego ego thure exiguo: Et vbi melicerias, lego meliceridas: Vbi potu vino, lego semine ex vino potu.

Lapathum, referente Galeno, nemo crudum edent, sicut neque Betam. Oxylapathum verò crudum edunt rurales mulieres picâ laborantes, aliquando etiam pueri gulosi. Sed hæc de Oxalide dicta credimus, cum qua Gal. Oxylapathum confundit.

Nunc scito Lapathi varias esse significationes: Ac primò quidem denotat simpliciter sumptum quocumq; Lapathum. Quale est Lapathum acutum nostrum siue Oxylapathum: Lapathum vulgare folio obtuso: Lapathum sylv. magnum vulgare: Lapathum acutum minimum: Lapathum fatuum: Lapathum maius Hippolapathum siue Rhabarbarum Monachorum: Lapathum maximum aquaticum, siue Hydrolapathum: Lapathum aquaticum minus, Lapathi. folio rotundo alpinum: Lapathum anthoxantum: Lapathum acutum crispum: Lapathum marinum sinuatum: Lapathum fluitans longo serrato folio: Lapathum linguineum, siue Sanguis Draconis herba, de quibus singulis ordine iam iam venit agendum. Est & Lapathum Oxalida nuncupatum, nobis Oxalis maior folio longo. Docti quidam Acetosam rotundam (Oxalidem folio rotundo) Lapathum esse tentur, ali indocti. Lapathi species minor celeno, Oxalis minima. De Lapatho Persicaria vulgò dicta vide lib. 38. Vocant Lob. & Pena in Adv. Fontalem crispam, pusillum Fontilapathum & Lapatiolum tenellum, inconsideratè, Hallucinantur, qui cum Amato contendunt Spinachiam esse Lapathum fatuum. Lapathum Dioscoridis tertium, non est Bonus Henticus, vt quidam volunt. Apud Gesn. in ascript. Diosc. falsè habetur Phyllitium esse Lapathum siluestre.

LAPATHVM ACVTVM SIVE Oxylapathum.

Ad cubiti & sesquicubiti altitudinem excrescit, caule multis alis concavo, striato, subtruncato, basi in orbem dilatato, & in apicem subulato, & in apicem subulato, & in apicem subulato.

Lapathum siluestre. Oxalis Anaxidis

Hippolapathum.

Plin inconstans.

Galenus Lapathi.

Theophrastus notatur.

Actius notatur.

Asic & Serapionis asinus.

Nomina linguarum.

Oxylapathum unde dicitur.

Hippolapathum & Lapathum.

Vices & usus in genere. Ex Dioscor. Aluum molli.

Melicerides Dysenteria.

Lepra Strumæ

Morbus vesicæ. Calculus. Menfes.

Plinius corrigitur.

De Scipio



bente : folia
Bete, longiora;
rugosiora, &
nonnihil in
ambitu crispata,
modò acumi-
nata; aliàs su-
brotunda, sa-
pore subacido:
flores mulco-
si, copiosi ex
fibris compo-
siti : quibus semen tri-
quetrum suc-
cedit, mem-
branis foliis
ternis ex viro-
re rubescenti-
bus conolu-
tum. Radix do-
drantalís cir-
citer, crassitu-
dine digitali, crocea, sapore amaro.

Gels. hort. Lapathum silv. Oxylapathum vocatum, à foliorum figura acutiore, non quidem omnibus Lapathis, sed nonnullis. Ex de coll. Lapathum cuius radice vñs est ad scabiam.

Cord. in Diosc. Lapathi 3, specet; Oxylapathon, Rumex acutus, Lapathum acutum, siluestri simile, nisi angustiora & acutiora haberet folia.

Lob. & Penz. Adv. Lapathum acutum, siue acutifolium, nusquam non in pratibus. Lob. Obsetu. & Ic. Plant. Lapathum acutum; Oxylapathum, qui figuram habet, quæ non multum placet. Nostram emimus iam sculptam ex Fuchsianis quam etiam retinet Amatus.

Dod. gall. Oxylapathon, Rumex acutus, Lapathum acutum Offic. Et Lat. in fol. Lapathum. Lapathum silv. siue Oxylapathum.

Fuch. Lapathum 1. Diosc. siue Lapathum acutum Offic. Oxylapathum cuius quamvis anceps in acidum saporem, vel acutam figuram, videatur significatio, tamen nomen à foliis, quæ in mucronem desinunt, recepit videtur.

Brunfels. Hiero. Brunsch. & Apollini, Lapathum acutum, Oxylapathum. Helfrico, Rumex sylvestris, *rad. pedon. a. 7. 2. 10.* Wirsung, Rumex, Hippopolapathum, Officinis Lapathum acutum.

Hist. Lugd. Oxylapathum Diosc. primum Lapathi genus, Offic. Lapathum acutum. Aetio, Sylvestre Lapathum 2. in aquosis nascens, folio admodum acuto, quod Oxylapathum Dioscoridis rectè opinatur.

C. Bauh. Phyt. Lapathum 7. folio acuto, Oxylapathum Dioscoridis, & Plinii. Apud Matth. Lapathum acutum, & Sida sylvestris Auicennæ.

Schvv. Lapathum acutum, *εξυλάπαθον* Dioscor. Lapathum acutum Offic. Gels. Spiz / Ohfsenzunge Spiz. Hort. Lus. Lapathum acutum, Oxylapathum acutum, Gels. Ohfsenzung / Glindwurz.

Lapathum acutum, *εξυλάπαθον*, Germ. Grindwurz / Trag. Spiz ampffer / wilder ampffer, mangelwurz, wilder mangolt, Sreiffwurz, zurer wurz, Belg. pauch & paerdich / Gall. pavelle, Ital. Rombre lapario, Hispan. paradella, Lapacca, & Romaza, Angl. doct.

Montbelgardi Oxylapathum siue Lapathum commune passim prouenit etiam in horto E. Cel. spontè: obseruauit Montpelii: Basileæ cum semine

menfe Octobri, Geneæ, virens mensis Februarii principio. Martio mensè, vt habet Tragus, folia emergunt, appetente Iunio floret, spontè sua gignitur in hunc usque hortus, palustribus locis, pratibus & circa fossas.

Ex Oxylapathi radicibus aqua destillatur, quæ ad pustulas, alphas, ionthos, vitiliginas, lichenas, omnèque denique cutis, præsertim faciei, maculas delendas plurimum facit. Decoctum Oxylapathi ex vino diebus aliquot potum aurigenam pellit & cutim pristino nitore restituit. Credunt quidam (ex superstitionis) lippite nunquam eos qui Rumicis sylvæ radicem Lunâ de crescente effossam tecum portauerint: Hist. Lugd. Radix Lapathi acutifolii ad lotiones, fatus, & linimenta, etiamque intro in decoctis, vsurpari Officinis solita, vt & ramuli & folia.

Vires. & vñs. aqua. Cuius & faciei macula. Decoctam. Superstitio. Radix Lapathum acutum tenent.

LAPATHVM VVLGARE FOLIO obtulo.

Foliis supernè retusis, breuioribus quàm in Lapatho acuto, rotundioribus, à quo, teste Lobelio, semine, caule, flore & radice vix discernendum.



Lectores perpendant quale describit Matthiolus; in post. comm. cum magna fig. Lapathum spontaneum, an descriptio fortè non facta ad plantam, si ad plantam facta an possit conuenire Lapatho cui solum retulim.

Descriptio- nem Matthioli Historia Lugd. H. Lugd. posuit pro Lapatho satiuo Tragi, & figuram Matthioli Hippolapathi pro eo Lapatho contra mentem ipsius Matthioli.

An Anguill. Lapathum siluestre, foliis cæteris rotundioribus: C. Bauh. phyt. Lapathum 6. folio subrotundo, Lapathi tertia species Dodon. Hist. Gall.

Idem locis nascitur, quibus vulgatissimum circa rudera & areas.

Lapath. fol. subrotunda.

Locus

LAPATHVM SILV. MAGNVM vulgare.

Lapathum Rumex agrestis quidam qui à Pharmacopolis Lapathum nunc dicitur, à Germ. hasen ampffer / Cassè wüurz, & Butter ampffer / Butter laticch, quoniam rustici Butyrum eius foliis inuolutum in vrbes venale ferant: non desunt etiam qui Buglossum eum vocent, Missenorum & Wittenbergensium Saxonicum Germanico vocabulo decepti, autore Corrado in Diosc.

Tabern. Icon. & Hist. Hippolapathum siluestre, wild Mangelwurz, aut Meüwen wüurz.

Descriptio

Schvv. Lapa-
thum vulga-
rissimum, Lapa-
thum Officina-
rum. Ohsen-
zünge, Butter-
bletter / Ohn-
bletter / Grind-
wurz. Herba
vulgaris noti-
tia.

Hippolapa-
thum non so-
lùm in palu-
stribus prou-
enire vidit Mat-
th. sed etiam in
montibus, iis
praefertim in lo-
cis, vbi pecudes
diutius stabula-



ri solent, & vbi eorũ si non pinguescit solum, illi
plantæ omnino respondens, quæ sub Rhabar-
bari nomenclatura, passim hodie in hortis ac vi-
ridariis colitur. Loc s humidioribus in areis
pagorum ad stabula plerumque reperiri tradit,
Schuyvenchf.

Radices, eodem autore, trita illinuntur con-
tra scabiem aliisque cutis infectiones. Addunt
vnguetis quibus capillos fluos reddunt, capi-
tisque surfures abstergunt. Folia calidis deflu-
xionibus vultus imponuntur. Pares obtinet
cum Oxylapatho vires: nec ab eo distinguere vi-
detur Dioscorides.

patho maiori, siue Rhabarbaro Monachorum;
quadantenus similis est, at folia tenuiora sunt
pinguiora & molliora, ac etiam magis exigua;
quare inter olera reliqua ob dulcedinem suam in
culinas recepta est. Rumicem domesticum, Sa-
baudienfes Lampe & Lampade vocant. Gesn.
hort. Lapathum hortense in Sabaudia tantum vi-
dit circa Laufannam & alibi, vbi Lampe vocatur
vulgo, Lapathum maximum est, quod aliqui apud
nos in hortis ferunt: Rhabarbatum Monacho-
rum. Cord. in Diosc. Lapathum, Rumex fatuus
Garten ampffer.

C. Bauh. Phyt. Lapathum hortense siue secun-
dum Dioscoridis, Rumex hortensis, vel fatuus
Tragi, quem Hippolapathi silu. nomine pingit
Math. Ital. & ex eo Lugd. p. 606. Lapathum satiu-
um Lugd. 601.

Cur dicatur à fratre Lapathum satiuum Tragi
pingi per Matthiolum pro Hippolapatho ani-
maduertere non possum. Tragi Lapathum folia
sunt magis exigua, Matthioli autem Hippolapa-
thi folia Rhabarbaro omnino respondent: in eo
imitatus est Hist. Lugd. vbi Lapathum satiuum
Matthioli & Lapathum Tragi idem esse tradun-
tur, & confunditur cum Hippolapatho Matth.

Confarinator Hist. Lugd. Lapathi descriptionem
ponit ex Matthiolo, deinde ei iungit Tragi & Ges-
neri fortentiam de Lapatho satiuo: praestitisset
posuisse descriptionem ex Trago, vel date nouam
herbæ quam dicit in Lapas vocari. Cut icones e-
iusdem plantæ Matthioli diuersis locis posuerunt
pro Lapatho Latino Matthioli, cuius assumptam
descriptionem, prout iconem à Matthiolo non
propositam pro Lapatho satiuo sed Hippolapa-
tho: cur dicit Lapas rura in hortis colere: deinde
in hortis non ferri? Cùm hæc signis confuso ap-
pareat, nos lectioribus indicandum relinquimus
an utraque icones Matthioli non sint referendæ
Lapatho vulgari silu. maiori, descriptio autem ex
Matthiolo, Lapatho folio obtuso: Nomen *Lapath*
in historia Lugd. amphibologiam habere videtur:
Sed vt liberè dicam quod sentio: suspicor Tragi
& Gesnerum pro Lapatho hortensi Laufan-
nensi obseruasse Rhabarbarum Monachorum
primo anno satum, quod tunc delicatius est quam
sequentibus, si quis nos aliter doceat rem gratam
faciet

Lampe vff.
Lampade
Sabaudio-
rum
Lapathum
max
Rhab Mo-
nacherum

Hippola-
thum

C. B. nor.

H. Lugd.
nor.

Compn.
nor.

LAPATHVM ACVTVM MINIMUM

Omnibus
partibus
minus est Oxy-
lapathum vulgato
cetera ei simili-
mũ: interim hoc
peculiarè habere
videtur, quod
statim à radice
ferè caulis in alas
incipit diuidi, in
quibus flores ex
ceteris interual-
lis verticillatim
nascuntur nuf-
coli, luteoli, sin-
gulis ferè verti-
cillis appposito
foliolo ligulæ in-
star: quo verti-
cilla tamen ex-
trema carent.



Lob. Icon. Plant. Lapathum acutum minimum.
Tab. icon. & H. st. Hort. Lusit. Lapathum mini-
mum. C. Bauh. Phyt. p. 185. Lapathum 8. siue mi-
nimum.

Circa Montebelgardum prouenit locis humidis
floreus Iulio & Augusto.

LAPATHVM MAIVS SIVE RHABARBARUM Monachorum.

Hominis
proceritatem
interdum
assequitur, caule
surgens striato,
rubente, supe-
riora vertus in
numerolos sur-
culos diuiso, flo-
ribus serie longa
per totos ferè
ramos multosque
semine subse-
quente angulo-
so, foliis mē-
braneis circum-
dato: folia pé-
dalia & sesqui-
pedalia, lata, a-
cuminata, dura,
rigida, rubentia



Descriptio

LAPATHVM SATIIVM LAPAS.

Veta hortensis Rumex, quam Laufannæ Sa-
baudienfes omnino prouenire scribit Tragus, La-
Tom II

furfum aliquando reflexis oris nonnihil, vt Canalem quendam imitentur, pediculis tubentibus longis. Radix proluxa, crassa, multis adnatis fibris donata, intensè crocea.

Synon. Rhabarbarum horrorum

Quod vulgus Europæ [ait Syll. de simpl.] pro Rhabarbaro passim in hortis ferit. Lapathi genus omninò videtur licet radicis colore Rhabarbaro nonnihil sit affine, viribus tamen plurimum abest. At cum reliqua Rhoi vtriusque historia nemini scribatur, coarunere nequeas, congenerem plantam, vel degenerem & diuersam, nisi ex partis vnius natura.

Differentia Rhab Monachorum à cæteris Rumicibus

Tragus in H. st. Germ. Rhabarbarum Monachorum ait esse herbam peregrinam, piumm in Hircinia silua reptantem, a postea in cœnobis Monachorum excultam, vocatque Hippolapathum & Rumicem grandem, ab aliis Rumicibus in eo tantum differre tradens, quòd folio & caule magis rubeat & prociore sit.

Hippolapath. Rumex grædus

Geln. hort. Lapathum maximum, Rhabarbarum Monachorum dictum: idem aut omninò proximum Hippolapatho in palustribus locis, aut montanis nascenti.

Rhab. Serium magno ecore

Lapathi vel Rumicis speciem, quam in plurimis Germaniæ locis ferunt, magno errore, ait Cord. in Diosc. verum Rhabarbarum esse credunt.

Ande hoc Monardes de simpl. noui orbis lib. 3, ex versione Clusii. Planta quam multi in Hispania Rhabarbari nomine seuerunt Rumicis folia obtinens, cuius genus illam esse existimo, quoniam secundus Rumex rubentem habet radicem.

Patientia Cegi

Lob. & Pena Adu. Satiuum Hippolapathum latifolium vulgi, & Rhabarbarum Monachorum, Obl. Hippolapathum satiuum latifolium, Rhabarbarum Monachorum, Patientia vulgi, Icon. plant. Hippolapathum satiuum latifolium & Rhabarbarum Monachorum.

Dodon. gall. Lapathi 2. species ἀπὸ τῶν ἡμετέρων, Rumex satiuus, Rhabarbarum Monachorum Neoteriorum quorundam, & Galeni Hippolapathum. Et Lat. in fol. Hippolapathum, Rhabarbarum Monachorum.

Fuchs. Lapathi 2. genus Dioscoridis: Lapathum hortense, Oxylapatho dissimile, non quidem in vniuersum, sed duntaxat in foliis, quæ Serapione teste, multò sunt latiora Rhabarbaro Monachorum.

Lapathi latifolia longæ & rotundæ formæ

Lapathum latifolium [inquit Camer. hort.] tam longâ quàm rotundâ formâ vocant, Rhabarbarum Monachorum, quod Veteres Hippolapathum, in dupla dosi exhibitum nihil purgat. Item Lapathum satiuum: Et alibi: Rhabarbarum Monachorum. Considerent autem Lectores, quâ in re differat Lapathum rotundâ formâ à Lapatho rotundifolio: præterea perquirant discrimen Rhabarbari Monachorum à Lapatho satiuo.

Camer. not.

Patientia

Gortopis in Vertumno, Patientia vulgò, cui nomen de Græca voce ἀπαθῆναι i. vacuo, factum. Est eidem Herm. meth. lib. 9. Lapathi genus, delicatius & tenerius cæteris, quod vulgus Patientiam nominat, de quo tritum proverbum: Lapathum non in cuiusvis hortu proventire.

Proserpius

Hippolapathum. Rhabarbarum. Purgat.

Tabern. icon. & hist. Hippolapathum satiuum. Rhabarbarum hortorum, à peregrino non ab simile, quod [vt à medicis fide dignis Matthiolo relatum est] bilem deicit, quamvis peregrino sit longè infirmius. Ait is præterea in post. commen. Ital. esse aliud Rhabarbarum potius fistulum, quàm verum, quod vulgò vocant Rhabarbarum Monachorum. Sed nullam facultatem veri Rhabarbari

Rhab. sat. sum. Rhab. Monachorum

habere, licet contrarium crederent aliqui. Idem in hist. vocat Hippolapathum verum siue Rhabarbarum Monachorum.

C. Bauh. phyt. Hippolapathum 14. siue latifolium Rhabarbarum Monachorum dictum, Hippolapathum Dioscor. Gal. & Plinii. Rumex vrbani Theophr. Rhapontico substituitur.

Lapathum maus, siue Rhabarbarum Monachorum: Germ. Münd Rhabarbarum. Galli. Rheubarbe des Moines, la Patientie. Belg. Patientie Burg. Chou lachou.

Folia mense Martio emergunt, appetente Iunio floret: & spontè semine le pro pagat. Hippolapathum hortense Matthioli scribitur à pluribus spectaculi causis in hortis & viuidanis: siluestre spontè nascitur in palustribus. Nos in variis Germaniæ, Galliæ & Italiæ locis obseruauimus.

Rumicis, qui Rhabarbarum monachorum vocatur, radix purgandi vim obtinet autore Fuchio, si in puluere redacta drachmæ pondere sumatur. Neque id mirum admodum, cum etiam Dioscor. ipse omnium Rumicum olus decoctum alium mollire, atque decoctas eorumdem radices cum vino, regio morbo correptos emendare, ob bilis nimium per inferna educationem, testetur. Quomodo verò eâ vti deceat, Tragus te docet.

Magnam virium, inquit, hæc radix cum pauxillo Zingiberis sumpta, phlegma & bilem pertinenter euacuat, hoc modo. Rad. andæ drachmam, Zingiberis scrupulum, in puluere redige, sime ieiunus in iure calido. Pro Rhabarbaro qui substituitur, duplici dosi veniunt. Radix d'gerit, abstergit; prouocat, mundat, appetit, non nihil adstringit. Bilem flauam & serofos humores educit. Folia tenera in oleis eduntur ad emblicendam alium. Radicis succus, ait Matthiolum, cum sulphure illitus scabiem sanat, cum Lupinorum ved. farina lentiginos, alios, & alias cutis infestiones exteric. Radicis dulcium, ex vino paratum præstat ad pellendos renum calculos. Idem facit sicca radice puluis: drachmæ pondere ex meraco potus: quin etiam ex marubii decocto haustus auuginem curat.

Rhabarbari succedaneæ.

Folia. Radix. Succus rad. Diluendum rad.

LAPATHVM MAXIMUM AQVATICVM siue Hydrolapathum.

Magis licue in fibras diducta est radix, quàm vel Oxylapatho, vel Hippolapatho, foris nigra, intus buxæ: cum notabili adstructione americani: canites surgunt ad cubitos duos, flore & semine Lapathi acuti, cum & filia similia, sed longitudine serè sesquicubitali, læuorâ, minusque rugosè, saepe leuter culpacis oris, subacida, & strenuè adstringentia.

Dodon. gall. Lapathi quinta species, hippolapathum magnum aut Rumex palustris: Gal. Gr. de Parelles, u Parelles des Marees: Germ. Wasser ampffer: Belg. Grotte patet / aut watter patet. Et Lat. in fol. Lapathum, siue Rumex 3. Hippolapathum dictum folio amphiore ac maiore satiuo. Idem postea hydrolapathum vocat, in fossis ac serobibus requirendum. Eam autem hydrolapathum non nouisse, commonst at figura, quam pro Lapatho satiuo proposuit. Hippolapathum etiam vocant Cordus, Tragus, & Lobelius. C. Bauh. Lapathum 11. aquaticum folio cubitali. Apud Matth. hydrolapathum silv. Matth. & Cast. Lapathum palustre Tabern. Schv. Lapathum palustre maximum siue Lapathum 11. nippolapathum silv. Matth. Rumex

Dod. not.



Locus & tempus.

Vires Ero r quovundam.

Vberus Vlcera.

aquaticus, Groß wasser oder weicher ampffer wild Alünd Rhabarbarwurtz.

Maximum Lapathum aquaticum prouenit in fossis vrbis, id existimo variare à vulgari Oxylapatho propter situm, qui facit vt diuersa videatur planta ob insignem foliorum amplitudinem. Nasctur aquosis palustribus, ac stagnantibus locis & fossis humidiorebus.

Quidam Antuerpiani & Galli audaculi Sepiasiatii ad medicos vsus sufficiebant ehen rubro, cuius facultates & rotas non minus adumbrat teste Lobelio, quam Limonium. Radix crassa, crocea lenit aluum. Ictericam disciuit. Folia Podagricis calidis, & vlcericibus vtiliter imponuntur fluentibus, Schvvenckf.

LAPATHVM AQVATICVM minus.

Locus.

Hic etiam aquae sunt natales, aiunt in Adv. Lob. & Pena, sed non nisi limpida & fontanæ, trans quas è fundo exerit



Fontilapathum pusillum aquaticum minus.


Locus.

tilapathum, & Lapatholum vocatum tenellum.

Lob. Tabern. & Hist. Lugd. C. Bauh. Phyt. Lapathum 12. aquaticum minus. An Gesn. hort. Lapathi genus silv. quod circa lacus Tigurenfis ripas nascitur in ipsa etiam aqua, Schv. Lapathum palustre minus Hydrolapathum minus.

Folia miscenda colligebant sedulo quidam Pharmacopei Narbonenses, praesertim Nemaufi ad vnguenti Martiati nominum & rerum farraginem confusissimam, tuebanturque semper Tom. II.

idem, non aliud generis Lapathi, miscendum esse illi vnguento.



LAPATHVM FOLIO ROTVNDO Apinum.




Descriptio

Lapathum Listud radice furculosa & longa nititur, cuius singuli surculi pluquam pollicare crassitiam facile assequuntur, rugosi, & fibrosi, flanescentes intense, sapore amaro: caulis bicubitalis & tricubitalis, cauus, profundis sulcis exaratus, rubescens, aliis multis donatur: folia Bardanax, notabilis latitudinis, rotunda, glabra, pediculo rubente & striato appenduntur: flores muscosi copiosissimi alas ferè totas obsident, ex herbis tribus foliolis apicibusque multis luteis compositi: quibus semina succedunt triangularia, non nihil rubentia.

Gesn. hort. Lapathum siluest. circa Friburgum Heluetiorum, foliis ferè rotundis. In app. Lapathum rotundum, Rhabarbarum appellatum propter similitudinem aliquam. Anguill. Lapathum rotundum, quod non vult dicere Rhabarbarum. Lob. & Pena Aduers. Obs. & Ic. plant. Hippolapathum rotundifolium, Pseudo Rhabarbarum. Figura non multum placet. Camer. hort. Lapathum rotundifolium, quod nonnulli Rhabarbarum existimant. H. Lugd. Hippolapathum rotundo folio Lobel. Pseudorhabarbarum Recentiorum. C. Bauh. phyt. Lapathum 15. Hippolapathum rotundifolium. Schvvenckf. Lapathum domesticum rotundifolium.

Nascitur, autore Clusio, in omnibus iugis Alpium Stiriacarum & Austriacarum, praesertim circa humidiora illa loca, ad quae armenta stationem istam habentia aestiuis mensibus aquationis gratia conuenire solent frequentissimè. Olim in peregrinatione mea Rhætica cum D. Gesnero inueni in Rhætia alpiibus, habui etiam Geneæ in horto allatum ex vicinis montibus vbi durabat cum foliis amplis rotundis. In horto Ill. E. C. plantatum se propagat.

Nomine Rhabarbari utebatur Lazatus à Vires Schvvende, qui aiebat purgare, si ad duplum Rhabarbari exhibeatur.



LAPATHVM ANTHOXANTHUM.

Lapathum silu. 4. Dalechampij, eam plantam quidam esse putant, quam nonnulli Panaces Chitonium folio Lapathi, flore aureo, à Plinio dictum esse arbitrantur. Radice est breui, furculosa, fibrosa, dura, lignosa: caulis duobus

Synonyma Lapathum rotundum.

Pseudo Rhabarbarum.

Lapathum domesticum rotundifolium.

Locus

Panaces Chitonium

auritibus, angulosis, palmi altitudine: foliis Oxypalathi, oblongis, angustis: flore in summis ramis aureo. Vnde Antoxanthoni id est, lutei floris Lapathum nuncuparent.

Locus



Casp. Bauh. phyt. Lapathum 10. filustre flore aureo.

In fossis & viginosis locis prouenit. Nam & C. Bauhino hoc ad palustria circa Norimbetgam collectum transmitit D. Doldius.

LAPATHVM ACVTVM crispum.

Synonyma

T Abetn. Icon. & Hist. Lapathum acutum crispum, Frausß Spiz mengelybürg.

Caf. Bauh. phyt. Lapathi folio acuto folia sepe angustiss. oblonga & crispata. Schevenckf. Lapathum acutum crispum, *das rauhe Spiziger kraus* set ampfer.

Locus

LAPATHVM MARINVM SINUATUM.



Elegans hæc Lapathispecies, cauliculis emitit humi procumbentes, alias obliquè erectos, dodrantales, in ramulos diuisos angulosos, atque striatos, quibus folia vncialibus se. è pediculis hærent, alternatim posita, laciniata, duabus insignibus laciniis imam partem in totidem appèdices diuidèntibus, figurâ oblongâ, è quo-

rum ramulis ramulorum exortus est: qui velut in spicas longas ex semunciali interuallo, *rosentus* minimos aggestos habent, ostetei coloris & ex luteolo virente, quodammodo albicantes. Radix ruffescens, simplex f. è paucisq; fibris donata.

Gener Cherlerus Junio florentem collegit prope *Aiguemortes*.

LAPATHVM PVLCHRVM BONONIENSE sinuatum.



pondente, subrotunda: caulis palmaris: in eo calices hispidi geniculatim dispositi.

Pvlchrum Planè est Lapathû quod à diligentiss. stirpium indagatore D. Agerio Medico Argentinenfi accepinus collectum Bononiæ, ex crassa radice multa folia, pleraque duarum vnciarum pediculis tetraibus eiusdem penè longitudinis proferens, vnciam lata, in medio profundo utrinque sinu rel-

LAPATHVM FLVITANS LONGO serrato folio.



Flus radice est geniculata ex singulis geniculis fibras emittit, quibus vado saharet, primis internodiis rubescens: caules edit multos, rotundos, quinque aut sex cubito longos, in aqua fluitantes: folia palmata atque eò amplius longa, angusta, in ambitu crenata, alternatim per caules nascentia, gustu sauo & sicco. In cau-

lium vertice thyrsus eminet eâ prorsus specie, quâ in Potamogitone visitur. Nasctur in vadis annium pigriorum, vt Aranis.

Oxylapathum aquaticum Dalechampii. Casp. Bauh. Phyt. Lapathum 13. in aquis fluitans foliis crenatis. Lapathi genus silv. Gesneri.

LAPATHVM SANGVINEVM, SIVE sanguis Draconis herba.

Facilis est huius à Lapathis reliquis discretio, sanguineo succo quo scaret, neruis per folia Lapathi minoris, acuminata, crebris discurrentibus, vatroque inplexu ruborem atro sanguineum virentibus folis conuariantibus: quorum succus & manus

Descriptio



Synon.

Varietas

& manus & alutam primum purpureo, mox in caeruleum degenerante colore tingit, quo simul & pediculi foliotum uterent. Reliqua effigiatura non ab similibus Lapathis acuto, nisi quod magnitudine superatur.

Dodon. gall. Lapathi quarti species altera, parva & siluestris, tota rubra, floribus & seminibus. Reperiti autem in hoc genere tota caudata

instar nivi affirmat. Rubram autem à Latinis Lapathum nigrum appellari scribit, à modernis Sanguinem Draconis. Gall. Sang de Dragon, Germ. drackenblut. Et Lat. fol. Lapathum si. siue rubens: Lapathum nigrum & nigrum Rumex. Perpetam inquit, faciunt, qui succum humis, qui ex hoc instar vini rubentis exprimitur, Sanguinem Draconis vel esse suspicantur, vel nuncupant,


H. fl. Lugd. Lapathum siluestr. tertium. Tertium Lapathi sil. genus Diofco. indicatum, Lapathum nigrum & Sanguis draconis. Lobel. & Pene Aduer. Obi. & Icon. plant. Lapathum sanguineum. Camer. hort. Lapathum sanguineum siue Sanguis Draconis, Græcis ἐρυθρὸν δαμάσκον.

C. Bnh. Phyt. Lapathum 9. rubens. Apud Matth. Lapathum sanguineum. Cur leucus censetur eorum H. fl. Lugd. non potius imitatus siticonem Camer. quam Iobeli nescio.

Hort. Lusit. Lapathum sanguineum, Sanguis Draconis herba.

Locus & Tempus. Sanguineum Lapathum à me satum Montbelg. in horto M. E. C. facile prouenit & secundo anno caulem profert, semine deciduo se multiplicat & propagat, floretq; Iunio: B. siler & Lugdum habuit in horto. Bononie vidi in horto di S. Saluador al B. treg. di. S. Catharina: Tubingæ cum essent apud Fuchium ei dicebatur Sanguis draconis. Septentrionis hortis sponte etiam oritur, rarus in alidis plagis.

Folia alutua cident in iusculo, aut expressis succus sanguineus totius plantæ, Lobelius. Gustu nitrofiore quàm Oxylapathum esse deprehenditur. Reliqua sunt cum eodem communia. Semen puluerisatum & in aliquo decocto astringente potum singularem habet efficacitatem in sistendis nimis mensibus & similibus fluxibus, Cameratius.



re prædita, cum aditione admista, sputum etiam tingit commansa.

De coplura ex Veterum & Recentiorum Sententia in huius secundi Tomi Appendice.

RHABBARBARVM.

CAP. X.



Crassa radices talez sunt, quas utraque manu interdum vix complētus, cortice nigilante obducta, circularibus Zonulis rugose, valliculis tiber bulque inæquales, medio ceter graves et si substantia non nihil interrim sit fungosa, crocea, crispolinearum rubentium discursu veluti undulata, non sine albedine aliqua

Descriptio Coriæ

Substantia

Sapor

admista, sapore amaricante haud ingrato nec vehemente, cum evidente adstrictione. Liqueorem cui infunditur colore croceo tingit.

Hic Rhabbarbarum tantum describimus, plura de ceteris ex Veterum & Recentiorum Sententia in huius Secundi Tomi Appendice tradidituri.

OXALIS VVLGARIS FOLIO

CAP. XI.

Hic libro Oxalides sine imponant. Quantum enim accedat ad Lapatis, vel hortulans notum est, à quibus plerique Lapatis nomine veniunt. Oxalis igitur vulgaris folio longo, cubito altiores promit caules striatos, concauos, in alas diuisis: filia B. fortæ in nora, acuminata, quæ pediculo adherent falcata pinnave, succulenta, atrouerentis, sapore acido: flores & semina in Lapathi acuti: Radix fibrosa, lutea, strenuè siccante & astringente sapore.

Desinencia


Brunt. Acetola & Lapathum acetosum.

RHAPONTICVM.

CAP. IX.

Descriptio Rhapontici radix, quam ostendunt S. plaxæ, Raphani medicis castitudi: e est Rhabarbaro grauior, compactior, nigro, fuscoque cortice obducta, secta per transversum spicas ostendens, colore vario, minus quàm rubro quàm Rhabarbarum, amarore vix euidente & ferè dulci sapore.

Semina
Aceto-
sa
Lapathii
acetosae.



Anagyris
apressis.

Lapath. a-
cutum.

Oxalis can-
didā.

Maia &
maia.

Nemina
linguarum

Vires. Tē-
peramentū

Ventriculo
commoda.
Febres bilio-

Apud Hier.
Punfch. in e-
dit. anni 1550.
malè cum Ace-
tosa iungitur
Vnifolij figu-
ra.

Lonic. Ta-
bern. Dod. gall.
& Lat. in fol.
Cæfalp. Oxalis,
Acetosa, & Cor-
do in Diosc.
cui etiam La-
pathi siue Ru-
micis quarta
species. Fuchf.
hiflor. Lapathi
quatum ge-
nus Oxalis.

H. Lugd. O-
xalis maior, La-
pathi fylu. genus 4. Dioscoridis [vt & Trago] alijs
Oxalida, alijs Anaxyrida, aut Lapathion agreffe
[αγυριδιον] vocatum. Plinij siluestre genus [Lapathi]
Oxalis dicta, Latinis Rumex, nec alia Lapatha
Ætio, Lapathum Oxalis vocatum.

rob. & pena Adu. & Ic. Plat. Oxalis siue Lapathum, Oxalida, Acetosa. Obseru. Lapathi, Oxalida. Anguill. Lapathi siue Numicis species, & Gal. lida vocata, aliquibus Lapathum acutum. Cast. Acetosa maior. Adolph. Oeco Sup. vng. mart. Lapathiolum 1. Acetosa. Gesn. hort. Lapathorum species minima, Oxalis dicta maior, pratensis, longioribus folijs. Item Append. Lapathi genus minus, acidiorque Oxalis dicta, cuius semen difficulter colligitur, nam subito decidit, priusquam probè maturefcat.

Amat. Oxalis, Acetosa, Oxylapathum Galeni, hortense, latum. Camer. Epit. Matth. Thal. Oxalis maior. hort. Lus. Acetosa maior vulgaris.

C. Bauh. Phyt. Acetosa 1. Pratensis. Lapathi quatum genus Diosc. & Lapathum filu. Plinij. Apud Matth. Acetosa pratensis seu Lapathum 4 Diosc. Aliquando media foliorum parte per longitudinem candida: nonnunquam vtrinque ab exortu duplici sagittali figura.

Schvv. Acetosa maior vulgarissima & Gal. Diosc. ἀγυριδις, Acidus Rumex, Lapathum, Oxalida.

Matth. in Diosc. Oxalis vulgè offic. Acetosa appellata. Illud Lapathum quod ab acido succo & Gal. Græcis dicitur (cui id silentio inuoluat Diosc.) duorum est generum, maius nimirum & minus. In com. cum mag. fig. Oxalida.

Oxalis, Græcis ὄξαλις & ἀγυριδις. Gal. etiam ἀγυριδιον 1. acidum lapathum, siue acidus Rumex. Offic. Acetosa. Germ. Sauwramppfer. Belg. Sürtele/ Zurinck. Gall. Oxaille, & Oxaille, à nonnullis Agrette & vinette, à lugd. Salierre: It. Azederas. Angl. Sorrel. Hung. Solka/ Solau/ Las puch, Keisaltza Szawi.

Vbiq; & pratis & hortis quolibet anni tempore vigere scribit Lobelius: vt & nos obseruauimus.

Recentiores Acetosam statuunt esse frigidam & siccam in secundo; inquit Fuchsius. Digerit, addit Schvvenc. k. aperit, incidit nonnihil humores lentos. Ventriculum & suantem refrigerat, appetitum ciborum excitat, Iecinoris calorem contemperat. Biliosis ac pestilentibus febribus aduersatur. Radix Hepatis ac Mesaraicarum solut

obstructiones, in febribus vtilis. Semen medicamentis additur cordialibus. Aqua destillata & succus in frequenti sunt vsu febrientibus contra æstum, sitim & lapsum appetentiam. Aëstius mensibus Acetosa ciborum multorum vtile condimentum.

Semen. A-
qua.
Succus

Oxalis CRISPA.



Descriptio
Hæc natali loco, tempore, & cre-
cendi modo à
priori nihil pla-
nè vanat, quàm
quòd natura
folijs crispis in
hac mirè ludat.
Eam autem icone
expressam
exhibere statui-
mus, ne hifto-
rix generali tem-
metè quid de-
sit.

Synon.
Taber. Icon. Oxalis, Frausfer ampffer. Cæsp. Bauh. Phyt. Acetose pratensis folia crispantur aliquando vt pingit Tabern.

Oxalis SILVATICA maxima.

Descriptio
Dvorum cubitorum circiter altitudine est
caulis, striatus, folijs ex intervalis certis ami-
ctus, singularibus, lequipalmariis, vncias tres
latis, acuminatis, glabris, inferioribus verò duplò
maioribus, acido sapore præditis.

Synonyma
Thalij lap-
sus.
Oxalidem maiorem Broccenbergensem, nihil à communiori differre scribit Thal. nisi quòd loco vlginosiore nata paulò amplior existit, quod neutiquam Thalo concesserimus. Est enim in nostra quædam differentia, quæ non à solo loco pendet.

An Camer. Acetosa Hispanica grandiss. folijs?

C. Bauh. phyt. Acetosa 2. montana maxima, folijs maioribus & rugosioribus quàm pratensis. Oxalidem maiorem Thalij appellare videtur. Oxalis 5. montana, Oxalis altera Cæsalpini. Montana scilicet, folijs ad Spinachiam accedentibus.

Schvv. Acetosa alpina siue maior montium, Bergsam ampffer, vulgari est similis præter folia, quæ latiora & magis succulenta, nonnihil amaricantia.

Oxalidem sylvaticam maximam Montbelg. in horto Ill. C. V. virt. plantatam habui, ex syluis delatam: prius videram cum esse Geneuz in monte Thuri maiorem & rugosioiorem pratensem, quæ ibi etiam præueniebat. Frater in montibus Helueticis & Sabaudicis prouenire dicit, Schvvenc. plurimam ad riuiolos montium altissimis locis herbidas.

Oxalidis maioris radicibus mulierculæ ignaræ imponunt, quòd croceæ admodum sint, pro Rhabbarbo vulgari eas obtudentes, Thalij.

Locus &
Tempus

Oxalis

OXALIS FOLIO AMPLISSIMO GENICVLIS TUBEROSIS.

Descriptio Oxalidis genus in iugo Wechfel Clusius obseruabat, satiuo multo maius, foliis valde amplis: cui hoc peculiare erat, vt in caulis nodis & geniculis, subinde veluti tubera quaedam adnascerentur, de quibus folia tandem sese explicarent: quae tubera tellure obruta [periculum enim fecit] sui generis plantas protulerunt. Synon. Clus. Pannon. & Hist. Oxalis amplissimo folio. C. Bauh. phyt. Acetola 4. geniculis nodosis.

OXALIS TUBEROSA RADICE.



Descriptio Oxalis tuberosa, terram supra, Oxalide praeterea refert: foliis partis magnitudinis & tormae, alii caulem alii suis complexis, alii longiore pediculis nixis. Flos stamineus, luteolus, racemosus. Lobelio teste, radicibus tuberosis Filipendulae vel Oenanthis perquam spectabilis. Oxalis exotica, foliis, caule & femine hortensis, quam toto habitu praefert. Synon. Lobel. Obseru. & Ic. Plant. Camer. hort. Hist. Lugd. Tabern. Oxalis tuberosa. C. Bauh. Phyt. Oxalis 3. tuberosa radice. Locus & tempus Heidelbergae in horto Di. Sprengeri vidi florentem Iunio folio longiore. In Belgii rara & Generosis D. Brancioni a Do. Pancio Ferrarienti medico missa Lob.

OXALIS FOLIO ROTVNDIORE repens.



Descriptio Ledit subinde haec foliis modò rotundis, ferè Cochleariae vel Chelidonii minoris proximis, modò alarum appendicibus donatis, aliàs Sagittae instar mucronatis pinnatisque, veluti Spinachiae foliorum extremum, colore glauco, pinguiusculis delicato; acore praeditis: caules inanes, cubito longiores: stoculi è fibris componuntur ex lu-

teo rubentibus; vt in aliis, quibus & semen respondet. Radix tenuis reptat vt & caules, sapore minis acido, sed magis sicco quam folia.

Hist. Lugd. Lapathum alterum siluestre, tertium Dioscoridis Lapathi genus, paruum, plantagini proximum, quod docti quidam vulgi Acetofam rotundam esse rentur.

Ruellio lib. 2. c. 49. Acidula aut minuta Oxalis, vulgò dicta Gallicè Ozeille menue: Oxalis altera Hederae foliis. Oxalis hortensis minor, Ozeille rotunda, Ozeille franche & Ozeille Romaine, Oxalis rotunda.

Lobel. & Pena Adu. Obs. & Ic. Plant. Oxalis fatia franca rotundi folia repens, Romana vocata, quia praefertur cunctis gustu & aciditate deliciaiore.

Amat. in Diosc. Oxalis 3. folio hederaceo, Biscuta Recentiorum. Huius, inquit Rob. Const. apud Amatum, hortensis Oxalidis aliud est genus cuius nec Diosc. nec Amatus meminit folio sc. rotundo & carnosiore. Sed Roberto non assentit dum dicit Amato non cognitam Oxalim folio rotundo, nisi mihi demonstretur diuersam esse quandam folio hederaceo Oxalidem.

Gesn. hort. Oxalis rotundioribus foliis, Lapathi species minor, siue Oxalis alteri minori cognata quam aliqui Acetofam Gallicam vocant.

Camer. hort. Acetofa rotundis foliis.

Cesalp. Oxalis tertia mediae magnitudinis rotundioribus foliis.

C. Bauh. Phyt. Oxalis 7. rotundifolia, aliquando sunt quaedam folia non angulosa sed in acutum desinentia: habetur & gradissimis foliis, quae Acetofa Hispanica Camer. Camerarius non statuit varietatem vt Frater, sed separat interposita alia specie. Tab. icon & Hist. Oxalis rotunda, siue rotundifolia. Hort. Lus. Acetofa rotunda franca. Schvv. Acetofa Sabaudica, Oxalis Gallica Romana, Oxalis rotundioribus foliis Gesneri.

Plantam in horto E. C. ac prouenit etià in aliis. Obseruauit Basileae in hortis, Lugduni, Geneva, aliisque locis plurimis: in quibusdam verò in muris.

Sapidissima est, & aqua inde destillata retinet acidum saporem in se habens vtiliter datur. Succus eius acidus embarrumatis praecipue utilis.

OXALIS MINOR ACVLEATA

Candia.



Descriptio Ramulos copiosos, plures dorantes & cubitales humifusos, vndatum flexuosos, graciles striatos, producit, colore propter terram rubente, alioqui viridi: folia pauca, Oxalis verucinae, pinnis mutila: flores ex interuallis per totam ramorum serè longitudinem mucosi, luteoli: quibus semen succedit triquetrum, purpure

scēs, triplici membranula aculeata circumclusum, contorto latiusculo succulento pediculo appendens, radix purpurea gracilis summā terrā haret.

*Acetosella
Cretica*

C. Bauh. Phyt. & apud Math. Acetosella. sive Cretica femine aculeato: In horto Illustr. Ducis Viutemb. qui Montbelgardi colitur.

*Locus &
tempus*

Inter femina Stutgardiam missa per Dominum Iosephum de Cassa bona fuit semen cum hoc titulo, Acetosella aculeata minor Cardiz, ea fata in Horto Ill. E. C. Montbelgardi Aprilis sine dodrantales cauliculos produxit cum foliis paruis longis sive auriculis, floruit Iunio, semina matuta Iulio, quæ aliquid habent similitudinis cum Tribulo terrestri, sed multo minora, nec ita pungentia: præterea adeest pars longa incurua tenuis vt in Caltha.

OXALIS PARVA AVRICVLATA
repens.

Oxalis minima prolixas habet lignosâsque radices, valde fibrosas, rubentes, huc illuc

Descriptio

teptantes, in plura sæpè capita diuisas, quæ folia emittunt oblonga semunciam aut vnciam longa, ad imum auriculata, gustu reliquorum instar acido. *Flosculi* longos efficiunt racemos, triangulo semine subsequente.



*Synon.
Lapathini
Rumen*

tolæ forma & sapore simile, multo tamen minus, in agris nascens.

*Oxalis mi-
nima*

Trago Getm. & Lat. Oxalis minima, Lapatholum, & Acetosella, radice & semine asperi & acerrimi saporis, caule & folio acido vt vulgaris.

*Acetosella
Oxalis ouina*

Lonic. Acetosella. Tab. icon. & Hist. Oxalis ouina, Schaff ampffer. Adhæc Oxalis minima 1. Klein Sauter ampffer. Item Oxalis minima 2. Gar Klein Sauter ampffer. Dod. Lat. in fol. Oxalis minima, Acetosella.

An Cæsalp. Oxalis quæ spontè nascitur gracili solo, tenuis herbula? Camer. Epit. Math. Oxalis minor. Hort. Iul. Acetosella minor ouina. Item Acetosella minima.

*Oxalis lan-
ceolata*

C. Bauh. phyt. Oxalis 8. aruenfis lanceolata, hæc ratione loci maior minerve reperitur; hinc Tabern. duas pingit icones p. 446. Oxalidis Oumæ & 447. Oxalidis minimæ 1. nomine. harum minor etiam in montibus Euganeis reperitur. Oxalis 9. aruenfis minima non lanceolata. Oxalis minima 2. Tabern. Qui censuerit [inquit Frater] hæc referendam ad præcedentem minorem faciliè assensimus.

*Oxalis mi-
nima*

Schvvenckf. Acetosella Lanceolata minor. Oxalis minor nobilior Schaff ampffer / Speß ampffer / Klein edler Sauter ampffer: palato gratior

quàm vulgaris: Acetosella lanceolata minor, Oxalis aruenfis seldè ampffer: Aether saluter ampffer: quæ semine cum prægnat tota rubra apparet.

nist. Lugd. Oxalis minor Matthioli. Oxalis minor tenuifolia sinuata, veruecina nuncupata, omnium acidissima, *ozeille menue, & ozeille de brebis Gallicæ.*

Lob. & Penæ Adn. Obl. & Ic. plant. Oxalis tenuifolia sinuata veruecina. Belgis Scaepè sive sel, id est, Acetosella veruecina, quia gustu acido pecori non ingrata.

Getm. hort. Oxalis altera minor, Lapathi species minor. App. Oxalis oblongioribus foliis & præterea similibus, sed tenerior.

Matth. in Diosc. Lapathum minus, Oxalis altera, succosa, foliisque maioris acidior. In hist. Ital. cum magnis fig. Oxalide minore. In epit. Oxalis minor, *Oxalis parva*. Ital. Acetosella, Saccula & Sannicula.


Minima auriculata multis in locis prouenit ac habeo plantatam in horto E. C. suo reptatam odiosam. Tanto luxu, ait Lobelius, sabulosis Brabantia, Picardiz, Nortmanniz, & Angliz impotuna, vt fegetes ericet, vires aut incimentum præpediat, sulco purpureo seminum, caulium, & foliorum colore solum ipsum operiens. Sabulosis & incultis agris florentem Maio obseruauit Tragus. circa Glaronam Getm. locis siccis, & lapidosis ad pedes montium circa ripam Limogi.

*Locis &
tempus*

Refrigerat, aurore Matthioli, ac siccat perinde ac altera: digerit, & incidit. Omnia bellè potest; quæ maior, nec infirmioribus pollet viribus.

*Tempus
Vires.*

OXALIS AFRICANA.



Elegantissimè hæc planta præ reliquis Oxalidibus, tum varietate, tum raritate conspicua est. Vix cubitalem adæquitur altitudinem, tamis oppositis succulentis brachiata. Ad quorum exortum folia extunt gemina, opposita (aliquando etiam singularia). A triplicis sive spinachiz figurâ, sed longè, &

Descriptio

vel portulicæ ipsa, crassiora. *flosculi* summitatibus hærent ex luteolo virentes & rubello quodam, figura Oxalidis vulgaris, solâ magnitudinè differentes, quippe maiores, ex recuruo pediculo penduli. Quibus *vascula* succedunt magnævncialia, setè triquetra, pinnata, rutilo quodam conspersa, triangulari & semine Oxalidum intergerinis parietibus continencia: *radix* simplex, alba, faucis fibris donata. Tota cæterum planta gustu & aciditate delicatiore reliquis congenitibus præferenda.

An de hac Ptolep. Alp. de pl. Egypt. Zacinth. Oxali

Oxalidem, qua eius insulæ Pharmacopœi ad medicinam utebantur, inspexi, admodum à nostris Oxalidibus omnibus diuerſam, quippe exilis herba ipsa est, foliis paruis, crassis, oblongis, Calthæ foliis amulis, gustum ve nostra acido sapore feriens.

C. Bauh. Phyt. Oxalis 6. Calthæ folio peregrino Alpini.

Martii sine fata Montbelgardi sub finem Maii adoleuit, pauloque pôit ad magnitudinem peruenit. Misum erat semen Lutetiâ à Robino Herbano regio nomine prædicto.

HERBA IOHANNIS INFANTIS OXALIS folio.

Hic præternitenda non videtur ea planta, quâ vti sunt ii qui Hispaniam noam primi subiugarunt, in curandis vulneribus. Cuius usum Monardi primus ostendit Indus quidam hispani famulus, nomine Ioannis Infantis, à quo hæc planta denominata est. Est autem exigua, foliis Oxalidis, aliquantulum villosis, siue hispidis.

C. Bauh. Phyt. herba Iohannis Infantis, Monardis. At Castor Durantes p. 228. iconem habet.

Viridis exigua præmanis aut tita, vulneribusque imposita, sanguinem sistit, & eaque conglutinat. Nervorum aliarumque partium vulnera digerit, & mundat, & demum ad cicatricem perducit. Iisdem viribus pollet sicca in pollinem redacta: quæ ad vulnera carne explenda viriditiam præfertur.

FAFOTRITICVM.



Cum Oxalide & Fagotriticum propter foliorum & feminum similitudinem, quamcum illa habet, coniungi desiderat. Rubente caule ad duos pedes aut altius surgit, striato, læui, & in ramos aliquot diuiso: folia ex longis pediculis rubescentibus, uedera, atrouerentia, sapore fatuo: ex quorum alis singulantes exeunt pediculi trientales, aut quadrantales, & tenues, qui flosculos in muscariis sustinent primùm colore carneo, deinde albo præditos, quorum singuli quinque constant foliis, apicibus rubentibus. Semen triquetrum, nigra gluma obductum, farinam candidissimam conuenit, inspidum. Radix lignosa, alba, longa, multis fibris donatur.

Cord. in Diosc. Frumentum genus folio hederaceo. Tragus Ocyum Veterum Diosc. Plinii & Platina facti, ac ab alijs [citò] teste M. Varrone dictum scribit, sed quam bene, ostendunt Matth. & Dodonæus.

Cord. in Diosc. Frumentum genus folio hederaceo. Tragus Ocyum Veterum Diosc. Plinii & Platina facti, ac ab alijs [citò] teste M. Varrone dictum scribit, sed quam bene, ostendunt Matth. & Dodonæus.

Existimavit aliquando Auguill. Formentone esse Gramen Parnassii, sed meutò mutauit sententiam, agnoscens (sed & hoc malè) esse Ocyum M. Varronis.

Lonicæ, cui Frumentum vaccinum dicitur, duas exhibet figuras, cum tamen vna fuisse cisset.

Mertiholi itaque iudicio, Dodon. Tabern. Camer. & nostro, Frumentum Sarracenicum (ita enim illi in iust. gemm. inscripti) Veteribus est incognitum. Quare errant quicumque cum Trago & Anguill. Ocyum veterum esse scribunt. Ex plodenda Lonicæ opinio, teste Matthiolo, in suis in Dioscor. comment. quòd Frumentum Triticum, siue ut alijs inter hos Castor, Camer. in Epitom. & Hist. germ. Matth. placet, Sarracenicum quod Tridentina rura vulgò appellant Formentone, & Foro Iulienſis Sarraceno, Ocyum esse existimat. Quisquam abertasse deprehenditur, quòd huic plantæ omnes odorati Ocyi facul-tes reddiderit.

Apud veteres quidem nullum habere nomen, nec Ocyum quidem esse, siue illud Dioscoridis, siue alterum Varronis & Columellæ, vel inde constat, quòd, attestante Dodonæo (quin Hist. gall. Tragotrophon, de Frument. autem & Hist. Latin. Fegopyron vocat) Ocyum Dioscoridis herba est odorata: Fagotriticum verò planta sapore & odore fatua. Sic & Varronis, aliorumque rei rusticæ Latinorum Scriptorum Ocyum, non alienius herba genus, sed pabuli nomen est, ex segetibus videlicet, ac leguminibus, veluti Varro lib. 2. cap. 21. de Ocyo scribens, testatur. Id genus pabuli sunt, in quæ, segetes virides factæ antequàm siliquæ letant Item & Plinius lib. 8. cap. 16. Apud antiquos, ait, erat pabuli genus, quod Cato Ocyum vocat quo ciebant (exemplaria pleraque minùs bene scribebant) aluum bubus, id erat è pabulis, segete vindi dissecta, antequam gelaret. Sura Manius id aliter interpretatur, & tradit Fabæ modos decem, Vicia duos, tantundem & Eruli in iugero Autumno misceri & feri solitos meliſis & Avena Græca, cui non cadit semen admixta: hoc vocitatum Ocyum, bonæque causa feri solitum, Varro appellatum à celebritate proueniendi ait. Ex quibus sanè euidenſissimum est, Fegopyron propriè Ocyum non esse: sed fugeum nouam, veteribus vel non cognitam, vel non vitatam, vel sic legatam.

Frustra quaerit Lob. in Adu. & Obs. vbi Lamp. lanam veram quòrundam asserit, malè, An Belgarum Dositheus [Triticum Sarracenicum] sit Erysimum Theophrasti, id quod in Ic. Plant. non absque errore manifesto inscriptione suâ concludit.

Lobelium sequitur Gesl. in cat. pl. & H. Lugd. eodem errore Frumentum Sarracenicum Erysimum Theophr. & Irionem Plinii cum impetioribus esse scribentes, Qua de re lib. 21.

Tabern. Icon. & Hist. Ocyum cereale & Tragopyrum. Formentone Casalp. C. Bauh. Phyt. Panicum 6. siue Frumentum Sarracenicum, cui etiam apud Matth. vbi inter Tritici genera reponit & quintum facit.

Græcè φηγοπυρον [Phegopyrum, Fegopyrum, aut Fagopyrum, quam vocem laudat Had. Iun. Latine Fagotriticum dixerit, seu Triticum faginum quòd fagina glandem, & formâ triquetra & colore sor- dido, licet quantitate multò minus, quodammodo refert: Et sanè meliore ratione, quam si Erymon vocis ad hirci pabulum, Tragotrophon, Tragopyrum, & Triticum hircinum retuleris. Alii frumentum Sarracenicum appellare malunt, quæ

Formentone
ne
Frumentum
Vaccinum
Lonicæ not.
Fam Sarracenicum
Trago & aliorum
Lonicæ opinio
explora

Error alius
Ocyum
Veterum
non est

Lab. nitra-
ur
Lamp. lana
Non Erysi-
mum
Theoph.
Error Ges-
neri
H. Lugd.

Nomina
linguatum
Triticum
fagina

Locus & Tempus

Vires vulnera

descriptio

nonyma
mentum
hederaceo
mum
atum

Heydenborn Boeckweizen / Buchweizen/winde
Grütz. Belg. Doctweyde Büeckweyden / vinn
Boeck Weete. Gall. De la Dragee aux Chervix &
Blé. It. Fromentone. Sarcino. Angl. Bedwebeate
Vundt Bokweate. Bohem. Posafu.

Locus

Tempus

Vires

Inflamma-
tio biliosa.
Tolera

Vissima.

Virus
Pulverenta.
Viscra

Panis

P abulum
vimentora
herba vici-
dit.

Nascitur qualicumque solo, neque vllum quan-
tumvis aridum, macrumque respuit: gaudet im-
bribus. citò provenit, celeriter maturascit. Bis
in anno feri potest: Nempè Vere Martio aut A-
prili: ac Autumnò post messera pabuli causa.
Plerisque Germaniæ locis & Brabantia Campa-
nia vulgare: Italia etiã non incognitum. Fa-
gotriticum sæpius feliciter in horto Ill. E. C. pro-
venit florens Junio, Julio & Augusto. Copiosè
obseruavi in Ditione Marchionatus Badensis
Retelana in agris inter Basileam & Bunzen pa-
gum. Monspelii & Tiguri florens Septembri.

Autore Matthiolo calefacit, & humectat, ve-
rum non multum à temperatis distat. Farina ex
lacte decocta præstat illita ad biliosas inflamma-
tiones. Rura non solum ex ea panes pifunt,
sed pulcem quoque conficiunt, quam polentam
vocant, quæ non ingiatus est cibus, vbi rectè fiat,
& caseo & butyro aspergatur. Ptilianam quoque
exutis granorum putaminibus, è granis parant
& ex carniũ iure decoquunt ad esum. Fegop-
pyron, ait Dodon. Tritico, Secali ac Hordeo mi-
nus nutrit, plus tamen quàm Milium aut Pani-
tum. Pulmentaria ac placenta quæ ex eius farina
conficitur, facillè concoquuntur, citò descen-
dunt, alimen tumque copiosi adferunt, exiguum
quidem, non tamen malum aut vitiosum. Panis
qui ex eo aliquando, cogente annonæ penuriã,
coquitur, aut farinam eius admixtam habet, hu-
midus est, citiusque descendit, ac flatulenti plus
obtinet, quàm ex Secali coctus. Herbam vici-
dem priusquam semen maturuerit, boues iumen-

taque pascuntur. Semen gallinæcum genus pa-
stum cuiusmodi pinguescit.

Semen p
bulum g
meris gal
pascit.

LUNARIA MAGORVM.

Arabum.

A foliis sinuatis [inquit Lobelius Observ.]
Lunari crescenti similibus hæc rara planta



hæc rara planta
Lunari nomen
adepta, à perit
teci herbaria,
quam non nisi
conuallibus Al-
lobrogum inter
montem illum
præcellum, vul-
gò Mont Senis
vocatam, & D.
Io. Mantum ver-
naculè S. Jean de
Morieime, colle-
gi, nominè que
Lunariæ donauit,
alii quò disce-
natur ab aliis
Lunariis, Lunari-
am Magorum
Arabum dixere.
Exeunt Martio
tenella filia à ra-
dice lignosa fle-
xuosa, cinerea, Oxalidis francæ rotundifolia prim-
ulum euimpentis similia, Thlaspi hedetaceo
serè patia: flores & semina necdum nobis visa.

Descip. &
Synonyma.
Lunaria.
Lun.

Inserpti
rari.

Icon. Plant. Lunaria Magorum Arabum.
C. Bauhinus Phyt. Lunaria Oxalidis rotundæ
folio, quam nondum videre licuit.

FINIS LIBRI VIGESIMI TERTII.





HISTORIA VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER VIGESIMVS QVARTVS.

LACTVACEÆ, INTYBACEÆ, CÆTERÆQVE ID GENVS,
quarum flos in pappum abit.

Proximè dicentur Papposa, & ipsa non parua *haleracearum* societate stipata. Semen lanuginis est
quam Pappum vocant. Nomen Græci dedêre, quia nascensia florum capitula numerosâ diuiduntur
lanugine, ipsis seminibus insidente.

LACTVCA, THRYLAX VETERIBVS.

C A P. I.



N Veterum scriptis cum pluri-
m Lactucarum mentio fiat
nec etiam pauciores Neoterici
assignent, de his in genere quam
dam præfari Botanici noster
ordo nos coëgit.

Lactuca igitur à lactis co-
pia nomen adepta gratissimum olus est, reneritu-
dine, ac dulcedine cæteris prælatum: numero-
sis constat ab radice foliis, ac lactis, se inuicem cõ-
pactili serie amplectentibus, idcirco quæ in medi-
tullio clauduntur, albidiora sunt, ac teneriora:
quia ab iniuriis externi ætis & Solis pro-
tegentur: cum caulescit amara redditur, & lacte
mader: caulis assurgit densis foliis, rectus, & cras-
sus [aculeis quibusdam horrens, id quod & foli-
is, quæ terram spectant, vsu venit, maximè ubi
aliquantulum conseruerint, addit Trag.] qui in
cacumine funditur in ramos candidos, in quibus
pauca sunt foliola, subrotunda, ac viridia: *flos-
culos* gerit in cacuminibus pallidos, qui in pap-
pos transeunt: *semina* subsunt oblonga, & com-
pressa, aliis candida, aliis nigra.

Lactucam in satiuam & siluestrem distinguit
Dioscorides. Satiuam quidem, cui nemini non
notam, non delineat, sed medicum eius vsu
duntaxat adscribit, de quo infra, vt & Brassica
syluestri. Nominat verò idem & Lactucam mari-
nam, quæ à satiuâ profusum distidet, ac Solda-
nella hodie à Medicis & Pharmacopæis nuncu-
patur: de hac egimus libro 15.

Theophrastus lib. 7. ac 4. cap. plura genera esse
scribit. In genere Lactucarum, inquit, candi-
da dulcior, atque tenerior, cuius tria genera

reddunt, Latè caule, Rotundicaule, & Laconicum:
huic folium Carduo simile: & recta
ampla, & caule minimè brachiata est: in-
ter latas adedò quædam laticaulæ sunt, vt pro-
valuis hortorum hinc nonnulli vntur. Quæ
verò lactis admodum copiosa, & folio pusillo, &
caule candidiori consistit, siluestri similis est.

Plinius Theophrastum sequutus inquit: La-
ctucæ Græci tria genera fecere: vnum laticau-
lis, adedò vt hostiola olitoria ex his factitari pro-
diderint: folium his paulò maius herbaceo, &
angustissimum, vt alibi consumpto alimento:
alterum rotundi caulis: tertium sessile, quod La-
conicum vocant. Alii, inquit, colotis & tempo-
ris satus genera discreuere: esse enim nigras, qua-
rum semen mense Ianuario seratur: albas, qua-
rum Martio: rubentes, quarum Aprili: ac om-
nium carum plantas post binos menses differri:
diligentiores plura genera faciunt, purpureas,
crispas, Cappadocicas, Græcicas: longiora his foli-
a, caulisque lati: præterea longi & angusti,
Intubis similes: pessimum autem genus, cum ex-
probatione amaritudinis appellauere Picrida:
est etiamnum alia distinctio Atræ, quæ Meconis
vocatur, à copia lactis soporiferi: quanquam
omnes sonum parere credantur. Apud Antiquos
Italix hoc solum genus earum fuit, & idedò La-
ctucæ nomen adepta: purpuream maximè radici-
cis Cæcilianam vocant: rotundam verò ac mi-
nimè radicis Astylida [Astylida Athen. quasi
vrbanam,] quidamque Eunuchion: quoniam hæc
maximè refragret Veneri. Est [hæc omisit Cæ-
salp.] etiamnum quæ vocatur Caprina (Marina
ex Corn. Hist. Lugd.) Lactuca. Ecce cum maxi-

Lactuca
Lactuca
Genera Plin
Lactuca
Rotundis
caulis
Sessile seu
Laconic
Nigra
Alba
Rubentes
Purpurea
Crispa
Cappado-
cica, Græ-
ca
Picrida
Meconia
Cæciliana
Astylis
Eunuchion
Caprina

mè capit interepere satius admodum probata quæ Cilicia vocetur, folio Cappadociæ: nisi crispum, latiusque esset.

Quod de laticaulè scribitur, aliquando hor- torum valuis eius caules vtilis ob amplam lati- tudinem, non videatur mirum: vidit enim Cæ- salpinus inter Anchufas caulem aliquando in speciosam laticitudinem creuisse: paucis foliis, vt pote nutrimento in caulem ablumpto: multò autem magis id Lactucæ coningere potest: habi- tor enim multò est eius caulis.

Marth. mor.

Satiuam Lactucam in tria diduxit genera Tra- gus. Eorum primum est, Lactuca satiuua ma- ior: alterum Lactuca crispà: tertium, quæ & ipsa crispà dicitur, pulcherrima est.

Excaulis, siue sessilis.

Matthioli in priorib. comm. plura quidem ac diuersa agnoscit genera, qualia verò illa sint post. comm. cum magn. fig. & Hist. germ. ac etiam Epit. cum addit. Cameracii doctrinæ suæ consu- lit, dum crispam conglobatis in orbem foliis, te- neramque inueniti scribit, ac etiam duram, patu- lam, lactescensque haberi, esse etiam quam à lato caule laticaulè, & à rotundo Rotundi- caulem, & quam sessilem (excaulem Ryff. qui triplicem hanc differentiam habet) quod humi procumbat, appellauerint Græci: se verò in Ca- pitatam, Rotundam & Crispam (ita etiam Fuch- si. distinxit & Lonicer.) diuidere: dif- ferre etiam foliorum colore, nam aliam satu- ratè viridem esse, aliam subviridem, aliam sub- candicantem, aliam eruentis maculis respersam, è Cypro allatam: esse & quartum quoddam ge- nus, cui in cibo prima laus sit, Romanum vulgò vocatum.

Cypria. Romana.

Dodonæus gallicus Lactucæ satiuæ quinque tradit species, dicitque earum primam absolutè Lactucam vocari: secundam à Plinio Lactucam crispam appellari: tertiam verò Lactu- cam Laonicam & sessilem ab eodem Plinio; à Columella Beticam, à modernis autem capita- tam nominari: Quartam speciem, esse Cecilia- nam Columellæ: quintam tandem eiusdem Cy- priam seu Plinii Græcam: & has duas species modernis esse incognitas. Ast Dodon. Lat. alias differentias habet: ait enim culturæ mangonio non raro folia Lactucæ hortensis in aliâ speciem transformari: vel enim crispam & Crispam à Plinio, Cecilianam à Columella cognominari: aut ita in se in orbem contrahi, vt capitata Brasili- cam zinzulari videatur, & vulgò Capitata, Sessilem, Plinio Laonicam, Columellæ Beti- cam, Crescentio Romanam vocari: atque hu- ius quidem media ac interiora folia ex diluto admodum luteo colore inalbicare: præter has verò & aliam quandam Lactucam esse folio ob- scurè virescente, aut, vt Columella dicat, viridis coloris: quam Plinius Nigram appellet, iam & quandam fusci, ac veluti purpurei, coloris, si- ue ex albedo rubicundam, hanc Rubentem, ni fallatur, Plinium nominare: ac addit paulò vi- frâ: Purpurei folii, siue ex albedo rubentis, Cy- priam esse Columellæ, Plinii Græcam. *Vides Dodonæi.* Dodonæi varium & mirabile capit. Is in Hist. gall. Crispam Plinii, à Cecilianâ diuersam sta- ruit, nunc in fol. Lat. vnam & eandem pronun- ciat.

Capitata, seu sessilis.

Lactuca folio obscuro virescente.

Ensa.

Dodonæi.

lob. in Actu. quatuor adscribit Lactucæ sati- uæ varietates. Satiuam folio Scariolæ: Sessilem siue Capitata, rugosis crispi Brassicæ foliis (ha- sum datum solum meminit in Obseru.) Roma-

nam dulciorem, nigriore & Scariolæ hortensis folio, semine nigro: & Crispam, non capitata.

Has quatuor differentias agnoscit etiam Schvvenckfeldius: additque quintam Lactucam fuscam, nigram Cæsalpino cognominatam.

Plures his differentias adfert Tabern. Lactu- cam absolutè inscriptam, capitata, crispam pri- mam [hanc nos eandem facimus cum eiusdem in tybacea crispâ, crispam secundam, Intybaccâ Intybaccam crispam, & marinam, quæ est capi- tata, priusquam caulescat.

Differentia Tabern.

Hult. Lugd. videtur recipere Lactucam sati- uam, Crispam, Capitata, & Romanam. Sed cur illam solum satiuam inscribit: nonne & cæ- teræ tres satiuæ sunt?

H. Lugd.

Cæsalpinus has differentias statuit. Semina, inquit, aliis Lactucis candida, aliis nigra: diffe- rentia quoque & in foliis: quædam enim latio- re folio constat: quædam longiore; quædam crispo: quædam plano: quædam in ambi- tu sinuato, ac valdè crispo, quam priuatim Scarolam vocant: cuius similitudine Lactucas & Scarolas vocant, Tunicarum plexus intrica- tos, cernicem, & capum ornamtes: Alia Capu- tia cognominatur, cuius folia clauduntur ad ca- pitis ciliigiem: differunt quoque colore, quædam enim alba, quæ frequentior est: Alia rubra, ac si vinum solis esset aspersum: Alia nigra: semina autem nigra & huic, & rubræ, cæteris autem candida. Harum autem expositionem cum Vete- rum Lactucis partim claram esse, partim cur- riosorem [laboriosorem intelligo,] videri scri- bit.

Scarola

Caputia

C. Bauh. Phyt. ex Cæsalp. sua mutuasse nobis videtur, cuius verba hæc sunt. Diuidimus Lactu- cam satiuam in Crispam, Rotundam, Capita- tam, Romanam, Cypriam: folio enim alia est latiore, alia longiore, alia crispo, alia plano, alia sinuato, alia colore rubro, alia purpureis macu- lis asperso, alia obscurè virescente, Sic & Ca- pitata colore differt: alia enim alba, alia rubra, ac si vinum foliis esset aspersum, alia nigra: his- que duabus posterioribus semina sunt nigra: al- iis verò candida.

Er hæc in genere dixisse sit satis: ab vniuersali- bus ad particularia descendamus.

Lactucæ simpliciter dictæ nomine duplex in- telligenda venit. *Sativa* & siluestris. Satiua quædã est vulgaris capitata & nõ capitata & alia rubra: alia Romana dulciore: alia longo, & valdè angu- sto folio: alia crispâ dissecta. *Syluestris* quædam folio lato, succo vitoso, quædam folio lato, suc- co vitoso, quædam Endiua dicta folio laciniato, dorso spinoso, alia murorum flore luteo: alia purpureo, & his affines, de quibus ordine.

Æquiuoca Vulg. cap. Cy. non cap. Rubra Rom. dulcis Syluestres plures.

Describitur ab his diuersa Lactuca syluatica purpurea syluestris sc. *Epithymus* Thalii. Est hæc siluatica nostra Lactuca purpurea. Lactuca er- ratica, *isid. dicitur in Actu.* Dioscoridis est, si Trago cre- dimus, qui eam ab Apuleio Lactucam siluaticam dici ait: Hæc à nobis Hedychnois Fuchsi inscri- bitur. Idem Tragus Lactucam minorem *isid. dicitur in Actu.* Dioscoridis, ad Lactucam silu. pertine- re scribit: Vocatur hæc à nobis, Hieracium mi- nus Fuchsi præmorâ radice. Per Lactucam Leporinam Apulei intelligimus Sonchum læuè & asperam Fuchsi: In Syr. de Cichorio Lactu- cæ sylu. nomine sumit Ioub. Pharm. Sonchum asperum. Est Lactuca Leporina Apulei Trago Hieracii species parua. Lactucam siluaticam Apulei credimus esse Sonchum tertium siue re- pentem.

Hieracium
nus 1.
Femula
Serie ado-
rata

pentem. Lactuca minor Dod. gall. est nobis Hiera-
cium minus primum. An Capanule species, Lactuca
filu. genus in muris Gesn. de coll. stirp. Primi-
lula veris odoratam Italoru vulgus Lactucā sil-
vestre vocat: l. 10. Accedere vult Dod. Olus albu
Lactuca, quod Valeriane campeltris specie
facit Camerarius, Lactuca generibus vocatur à
nobis Locusta herba. Hist. n. g. lib. 27. Lactucam
petraam Creticam Belli inscripsimus Rapuncu-
lum Creticum Petromerulam, l. 10. Lactuca ca-
pitata quorundam est Galega de qua lib. 17. La-
ctuca Afini, Pandectario, Muscellina herba, procul
dubio est Anchusa. H. n. g. l. 31. Lactuca nomen
attribuitur etiā Lathyridi, vt videre est ex
Trago lib. H. n. g. 17. Lactucam caprinam Latiui,
Mimio autore, Tithymalum nominant, H. n. g. lib.
34. Herbam lactarian foliisimam Græcos Tithy-
malum myrtiliten vocare scripsit Vesalius, l. 34.
Lactuca marina Latinorum & præcipue Corn.
Celi est Tithymalus patalyus lib. 34. Lactuca
Solissequia est Tithymalus Heliotropius lib. 34.
Byron Lactuce foliis, est muscus marinus, di-
ctus Lactuca.


Locusta
herba.
Rapunc.
Cretica.
Galega.
Anchusa.
Lathyria
Tithyma-
lus
Tithym.
myrtilit.
Tithym.
patalyus.
Heliotro-
pius
Muscus
marinus

LACTUCA SATIVA VVLGARIS CAPI-
tata & non capitata.

Descriptio



Varietas



synonyma

Com. 11.

Lactucas
admittunt no-
sterarum men-
surarum princi-
pia subdulces,
solum Endiuiz
amplo, rugoso,
lacte prægnā-
re, per primā
adolescēciam
grato, tandem
amaro & ci-
bis abdicato,
quod sit vbi
caule scit plā-
ta: ceterum
folia aliās in
caput conglo-
bantur, aliās
patula dehil-
cunt: caulis
in ramos sin-
ditur crebro
deinceps diui-
dendos: quor-
um extremis
suscult harent
lutei, parui, ex
squammato
capitulo pro-
sistentes, qui-
bus in pappo
faculentibus
semen tucere-
scit patuum,
vtrinque acu-
tum, ohlongū,
compressū,
coloris ciner-
rici.

Tragus si-
guram habet
eandem cum
ea quam hic

posuimus, cui titulum hunc fecit. Lactuca cri-
psa & lata, fraus vnde breytter Lactich. Est au-
tem ipsi ex tribus sativæ Lactucæ generibus præ-
mum & maximum, latissimis foliis, ex viridi ni-
gricantibus, quemadmodum Beta maior, ac ver-
lus medium cōiuntibus, non aliter quān Brassi-
cæ capitata: semine subalbido: hanc vocat in
margine Lactucam 1. siue sativam maiorem. Es-
se etiam in hoc genere scribit nonnullam foliis
candidis, quæ & ipsa in caput quoddam coëat.
Alterum Tragi genus, Lactuca 2. siue crispa,
folia acquirit satis longa, quercinis similia, inci-
sa, herbucei coloris: semine nigricante.

Lactuca sativa cuius imaginem dat Fuchf.
folia Intybo sativo haud dissimilia habet: hanc
rotundam vocat, Germ. Breitter Lactich. Est
alteram foliis, quæ crispa admodum sunt, duntaxat
à priore variate tradit, aliās per omnia simi-
lem, Latine crispam vocari ait Germ. krauser
Lactich, Lactuce commune & crepue, à Columella
lib. 1. cap. 3. Cecilliana η & Beticani. Fuchf. autem
duo hæc genera vna icone complexus est: & ter-
tiam capitatam non nisi foliis suis, sed que dum
paululum creverunt, à prioribus differre scribit,
ac Latine Lactucam capitatam: Germ. Grossen
weissen Lactich nominat.

Lact. ro-
tunda.
Crispa

Nos figuram ex Fuchlianis quæ placet pro
vulgari hic ponimus. talem etiam proposuerat
Tragus: quam proponit pro Capitata, licet etiā
conuenire possit pro vulgari, & pro capitata po-
ni vbi caule scit, eam autem (capitatum) poni-
mus postea pro Romana, quamuis pro ea non sit
posita à Fuchio, qui eandem habet figuras sub in-
dem nominibus.

Icon:

Dodon. gall. Lactuca prima foliis longis, plan-
tis, latis, semine albo: Lactuca simpliciter dicta.
Secunda foliis similibus vituli menterio, Plin-
io Lactuca crispa, Gallicè Lactuce crepue, Belg.
Ghecronckede lettuce. Tertia glomeratis
foliis, Plinio Lactuca Laconica, Lactuca sessi-
lis Columella. Lactuca Betica, Neoricis La-
ctuca capitata: Gal. Lactuce pinnæe ou restue. Is
vtramque Fuchii figuram habet: quam autem
pro Crispa ponit, propriè crispa non est: nec e-
tiam Fuchf. pro sola crispa posuit. Nos illam fi-
guram, quam sativam inscripsit, pro Lactuca
Romana, non quod de ea Dod. scribat, exhibe-
mus. Dodon. Lat. in fol. Hottentis siue sativa
Lactuca folio oblongo, lato, læui: quæ culturæ
mangonio folia ita mutat, vt vel crispentur, aut
ita in se contrahantur, & capitatam Brassicam
æmulari videantur: Lactuca sativa Galeno & Dodon.
vbi dicitur, à nonnullis composita: à Pythagoricis
Lactuca: Belgis Salter. Huius generis cum fo-
lia crispantur, Crispa Plinio, Cecilliana Colum-
ella: foliis in vibem coactis, Plinio Laconica,
Colum. Betica, Petro Crescentio Romana, Belg.
Crep salter.

Lactuca
Lact. cri-
psa
Dod. n. g.

Prior figura quam sativam inscripsit non in-
telle conuenit vulgari, cum caule scit, amissis pri-
oribus foliis posset fortè accommodari & Roma-
næ nostræ. Quam ponit pro Crispa non probo:
folio enim est laciniato descriptioni non respō-
dens. Tertia figura est Capitata: priusquam cau-
lescat.

Thridacina
Marsilius
Eumuchris

Did. n. g.

Martiol. in prioribus comment. has nostras
Lactucas intelligit, cum è pluribus ac dineris
generibus, quandam conglobatis in orbem fo-
liis, crispam, teneramque nominat, & alteram
duram, patulā ac læuēscētem. Figura autem
quam vbiq; proponit Marti. pro crispa, mihi
videtur non crispam demonstrare, sed eam quæ
Pppp 2

Mart. n. g.

rotundam in post. vocat, eadem etiam in postremis pro Lactuca florenscente ponitur: ea etiam icon quam olim profuerat pro florida. quamque in hist. German. florenscentem facit, respondet Fuchsianæ, quæ pro Romana Matthioli [de qua p[ost] p[ost] poni potest.

Lonic. has pingit nomine Lactuce rotundæ, & Lactuce seffilis.

Corn. crispam ac rotundam Lactucam vocat, & alteram Capitatam candidiorem illa.

De presentibus Lactuce speciebus loquitur Geln. de hort. cum ait, Est lactuca crispa (ni fallor) eadem que seffilis & capitata: excaulis, Pythagoricis Eunuchion, mulieribus Atylis (sic enim legendum), Cilicia aliquibus, & Latifolia crispa, latiorque Cappadocia, admodum probata. Capitata quidè genus minus, in hortis nostris est, maius Balileæ, præsertim apud Cæl. Secundû.

Lobel. Obs. & Ic. Plant. Lactuca sativa (vocabulum hoc omittit in obs. folio Scariola. Item Adu. & Ic. Plant. (vbi iconem ponit que posset convenire Lactuce Romanæ.) Lactuca crispa non capitata, que eadem cum iam dicta esset, nisi illi esset folia reductiora, contractiora, & bullatis rugis crispata: vnde rota tenerior & olere gratior habetur. Semine alioqui & reliquis partibus, à superiore non differt. Et rursus Adu. Obs. & Ic. Plant. Lactuca sativa seffilis, siue [tria vltima vocabula in Obs. non habet] capitata, rugosis [desideratur hæc vox in Obs.] crispis Brasiliæ foliis: & hæc supplenda sunt in Icon. Plantini.

Cæsalp. Lactuca folio latiore: quædam longiore: quædam crispa: quædam plano: alia capitata: quædam alba frequentior.

H. Lugd. tres icones habet: priori titulus Lactuca sativa. 2. Lactuca crispa Matthioli. Prior verò floridæ Matth. altera est etiam Matthioli vulgaris nondum florens. 3. Lactuca crispa Dod. & Fuchsii, eâ figurâ comprehenditur veraque Matthiolina: eam autem ex Fuchsio proponimus.

Tabern. Hist. & icon. lactucæ, Lactuca, siue prima Fopflati. Lactuca capitata siue 2. Lactuca tertia siue crispa 1. à prima tantum differens foliis crispioribus. Figura quam posuit Cöpiator mihi non videtur competere descriptioni, est enim folio laciniato.

C. Bauh. Phyt. Lactuca 1. siue sativa lactuca florenscentis Marth. icon. Item Lactuca 6. siue capitata. Apud Marth. Lactuca crispa que capitata & non capitata: est illa crispa Matthioli &c. Item Lactuca tertia, Lactuca sativa Dod. gall. & fol. Lugd. Cord. in Diosc. Lactuca florenscentis Marth. Lacun. Lactuca sativa Lobel. Lactuca Gesner. Cæsalp. Camer. Tabern.

Gerard. Anglo Lactuca 1. sativa, Garde lettuce. Lactuca 5. capitata Cabbage lettuce.

Schvv. Lactuca lata, Lactuca crispa, & Lactuca capitata.

Locus & tempus

Lactuca vulgaris non capitata & capitata passim, frequens præsertim Genevæ, Balileæ, Lugduni, & Montbel. vbi vna mili candidiori, alia viridiore colore vulgatiore: copiose coluntur Lactuce in Horto E. C. vbi interdum hiemem perferunt: Monspelii Lactuca non capitata abundat, capitata tantæ magnitudinis, vt vna patinam satis amplam repleat. Tota hieme ibi in vsu. Porentuti in horto D. Ritneri optimas & magnas conglobatas degustauimus Iulii principio, dicebat se habere eum pluribus capitibus:

anno 1609. habemus cum tribus capitibus, quæ vix differre videntur à cæteris capitatis, capita tamen minorâ; alteram tamen speciem semilimarim, quandoquidem ex particulari Fuchsianæ nobis provenit quod Hortulanus accepit.

LACTUCA RVBRA.

Cæsalp. est Lactuca rubra, ac si vinû foliis esset alperium: hoc gen' laciniis foliis constat ac patulis, dulcior excreis, sed durius: idcirco recentia tantum folia secant, regerminat enim diutius antequam caulescat: semina ei nigra.

C. Bauh. Phyt. Lactuca 3. siue maculosa; Lactuca 5. Dodonæi, Lactuca rubra Cæsalpini. *ff. Synon.* errore verlatur Dodonæus, ait enim Lactucam foliis rubentibus Nootericis incognitam, quæ Cypria dicitur & Plinio Græca; Dodon. verò notam non fuisse existimo.

Lactucam habemus rubram in Horto Ill. E. C. quæ interdum hiemem perfert: aliquando attriti ex Sultz Alsatia: provenit nobis etiam semine Italico nobis per Illust. C. Witt. dato cum ex Italia rediit.

Locus & Tempus.

LACTUCA ROMANA longa dulcis.



Enim nomen Descriptionio hortis nostris innouit, folio dulci, oblongo, modicè laciniato, & infernâ parte secundum costam spinulis armato: flore & caule Lactuce nostre, sed semine succedente nigro. Figura quam posuimus ex Fuchsianis inediocriter exprime mihi videtur Romanam, idco etiâ

parandam non curauimus. Lobel. & Pena Adu p. 36. Lactuca Romana dulcior, nigriore & Scariolæ hortensis folio, semine nigro.

Tabern. Hist. & icon. Endiuic lactucæ, Lactuca Intybacea.

C. Bauh. Phyt. Lactuca 2. siue foliis Endiuicæ. Lactuca 2. Tragi, Lactuca Intybacea Tabern. Item Lactuca 4. siue folio obscurius virente, Lactuca nigra Cæsalpini. Lactuca Tabern. confideratâ figurâ mihi videtur eadem cum Romana à me dictâ: quâ mihi videtur Tragi secunda diuersa, quia ait foliis esse Quercinis incis: ita Italia non representat figurâ Tabern. Cæsalpini nigra non male conuenit cum Romana.

Synon.

C. B. not

An Tragus hanc sub nomine maxime Endiuicæ comprehendit non distinguens à Lactuca siluestri lato folio, necio, ignoro etiâ an culturâ possit mutari in Romanam, quæ cum siluestri communis

munes habet spinas in dorso & alia quadam.

Cæsalp. hanc Lactucam nigram vocat, eique folium angustius adseribit ac productius, plani, colore viridi, qualis in Cichorio: non surrigi hanc in caput ait, nisi vinculo alligentur folia: sic enim candidissimam reddi, & fragili teneritudine ceteras vincere: semine rubro.

An Dod. Lat. Lactuca quædam folio obscurius virente, aut, vt Columella ait, viridis coloris, quam Plinius nigram appellat.

Gesn. hort. Lactuca Romana nascitur in quorundam hortis educari solita.

Marchiol. in Dioscor. cum mag. fig. Lat. & Ital. Quartum Lactuce genus, cui in cibis prima laus, Romanum vulgò vocatum, foliis maioribus, pinguioribus, viridioribusque: id in ouatum caput extaberat, vbi in cacumine ligerur, & ceteris tenerius albiusque euadit, & presertim si terra circumducatur ad acumen vsque.

Gerard. l. 2. c. 34. Lactuca Intybacea, lumbard lettuce.

Schvvenckfeldii nobis videtur Lactuca Intybacea Endiuicem latit. / Roman Salatz / a vulgari ditata folio nigriore, nec perinde scabro, semine nigro: tota tenella, gustu dulcior, eaque gratior, aprior ventri mouendo. Videtur & eiusdem Lactuca fusca, Lactuca nigra Cæsalpini. Schmarzer Salate / florentiner Salad. Sed illud miramur, cur dicat minus palato sapere, vt Lactucam capitata, seu scissilem, quam tamen ait primam in acetariis commendationis. Non video ego quo nodo possit simul & semel in codicis subiecto subsistere, esse primam commendationis, & minus sapere. Quis nisi homo deprauati gustus ei, quod palato minus sapit, primas tribuat?

Lactucam Romanam longam dulcem primam vidi Basileæ, postea Genæ obseruari copiosam in hortis, vnam candidiorem, alteram nigriorem, vtrâq; dulcem cum paruis quibusdam spinis in costa: vidi etiam in Watt. viller: semen solet esse nigricans: Montbelgardi in Horto E.C. prouenit nobis vtroque colore, nempe foliis ex viridioribus & ex pallidioribus.

LACTUCA LONGO ET VALDE ANGV-
lito folio.



litis ramosis: flores & semen cum Lactucis vul-
Tom. II.

Hic Lactuca f. lita à radice statim oriuntur multa, palmum aut sesquipalmum longa, vnciam vnam aut alteram lata, superiora verò vt breuiora, ita angustiora, spinulis quibusdam per margines donata, vtrâque verò acuminata: caulis cubitalis & sesquicubitalis

garibus eadem, sed semini color fuscus.

C. Bauh. Phyt. Lactuca 5. siue longifolia à fratre Io. Bauhino accepta. Et alia quædam huic valde similis, quam Cast. Durantes pingit, ac Lactucam Gallicam nominat, non tamen candet.

Synonyma

Obseruauimus hanc Lactucam quibusdam in hortis inter Bedfordiam & fodinas argenti in Girardmegni, ac alibi, vt in pago Tremoy: Plantata Montbelgardi in horto Ill. E.C. se propagat semine deciduo, quod maturum Augusto.

Locus & Tempus

LACTUCA CRISPA LACINIATA.



Od. Lat. Din folio quoad figuram non autem descriptionem, Lactuca crispa.

Synonyma

Tab. Hist. & Icon. frausser latit. Lactuca crispa, p. 174. Item frausser Endiuicem latit. Lactuca Intybacea crispa. Duas figuras habet meo iudicio vnius plantæ Compilator: prior figura non respondet descriptioni: Altera figura destituitur descriptione.

Tab. not.

C. B. not.

Alteri figura destituitur descriptione.

C. Bauhin. Phyt. Lactuca 8. siue crispa altera, Intybacea crispa Taber. Item Lactuca 7. siue crispa latioribus foliis varians. Recedit à me Frater. Separat enim ille, quam ego non separo, iungit autem quam ego separo. Ei autem apud Matthiol. Lactuca non capitata dicitur, Lactuca crispa Tragi, D. d. gall. & Lat. Lugd. Cast. Tab. Fuchsio, Lob. Icon. Cæsalp.

Proposit hic Frater iconem Tab. Lactuce crispe 1. ad quam an sit referenda crispa Tragi, Dodon. Gal. Lugd. Fuchsij & Cæsalp. dubito.

Lob. Icon. Lactuca crispa non capitata. Gerard. Lactuca 2. crispa. Curled lettuce. Lactuca 4. Sabanda crispa Sauoie lettuce.

LACTUCA CRISPA ET TENVITER
dissecta.

Potissimum in suis est discrimen, quæ obscure virentia, non vt precedentium Lactucarum integra, sed laciniis tenuibus incisa, vsque undulatum intro forsâque flexis reflexisque crispa. Flores conueniunt.

Descriptio

Tabern. Hist. & Icon. frausser latit. Lactuca crispa secunda.

C. Bauhin. Phyt. Lactuca 7. siue crispa. Lactuca crispa Tragi. Lobel. Icon. pag. 421. latioribus & paulò angustioribus foliis variat, quare duas icones proponit Tab. icon pag. 422. & 423. Nos contra Fratrem non separamus Tabern. priorem crispa ab Intybacea, vt antè monstratum: Lobelii etiam crispa potius ad præcedentem referimus.

HISTORIAE PLANTARVM.

Scarola.



Focus & tempus.

Nomina linguarum in genere.

Satio. Locus

Qua transplacentur.

Tempus sationis.

An Trago Lactuca crispa & tertia, Frausj laticif in descriptione tertio loco exhibitae?

Crispa. Lactuca quaedam in ambitu sinuata ac valde crispata, quam priuatim Scarolam vocant: a cuius similitudine Lactucas & Scarolas vocant, tunicatum.

plexus intricatos certuicem & carpum ornantes. Lonicerus huius solo nomine meminit, & vocat Frausj laticif.

Gerard. Lactuca 3, crispa altera, Small emled lettuce.

Lactuca crispa Geneuae prouenit in hortis: Montbelgardi habemus in horto C. Wirtemb. hiemen ferentem. Watywilli atulinus semina. Basilea quoque obseruauimus.

Quae a Lat. Lactuca vocatur, a Graecis δελος dicitur, a Recentioribus, ut Simeone Sethi, δελος vel δελος, & δελος, quanquam siluestre olus quoddam proprie δελος appellari Galeenus scripserit, Pythagoticis δελος, Enochium, quoddam coctum auerant, mulieribus vero Astylida: Hebraeis, teste Aruch Monstero, Chafaret, Mauritanis Cherbis, seu Chas: Aui. Albace: German. Salat laticif & Schmalz Kraut/Belg laticif, & absace: Gall. Laitue; Hisp. Lechugas, betenga, & absace: Ital. Lattuca Angl. lettuce: Boh. Salat & loyfa. Hung. Salata.

Lactuca, ut Crescencius credit, feri & trasplantari potest ferè toto tempore anni in terra pingui bene subacta per se vel mixta cum aliis herbis, & quae sata fuerit Autumno vtiliter plantatur mense Decembri circa areas aliarum herbarum quae tum feruntur. Ipsa enim non timet gelu, sed roboratur ex eo, & erit bona post hiemem cum aliis herbis quousque semen producet. Sed quae de natura paruarum, non transplantantur. Quae vero sunt ex magnis quae Romanae dicuntur, quae habent alba semina, trasplantari debent, ut crescant & dulcedinem habeant, multum iuuantur irrigatione tepore siccitatis. Scribit Lactuca toto anno, sed Martio & Aprili mensibus porissimum, binis mensibus inter semen plantamque & maturitatem. Prouenit a satu, inquit Theophrastus, die quarto vel quinto, recisa regerminat, cuius regerminati caules suauiores: nam dulciores, quamdiu teneri sunt: quidam hos magis lactuosos esse, primos autem magis amaros, & minus concoctos: tadic breuis, maxime vniuersis: quia caret multiplici radice; sed tantum fibris cohaeret: translata breuioris est radicis, quam sata: quia ex lateribus magis mittit: semen lanugine continetur. Transferri autem debet, auctore Columella, cum sex foliorum erit. Locus quidem apricus, & maritimis optime Autumno ponitur: mediterraneis, & frigidis contra, hyeme non aequè commode dispergi-

tur: sed & huius quoque radix sicut lini debet, maioremque copiam desiderat aquae, sicut fit tenerioris folii. Sicut autem compluta Lactuca generis, quae suo quaque tempore feri oportet: Ea enim quae fusca, & velut purpureis, aut etiam viridis coloris, & crispis foliis, vti Cracillana mente lanuzio rectè dicitur. At Cappadocia, quae pallida, & pexo, densoque folio vter, mense Februario: quae deinde candida est, & crispissimi folii, ut in provincia Batica est sinibus Gaditani municipii, mense Martio rectè pangitur. Est & Cyprii generis ex albo rubicunda, leui & tenerino folio, quae in Idibus Aprilis commode disponitur. Ferè ramen aprico celi statu, quibus locis aquarum copia est, penè toto anno Lactuca feri potest: quae quò tardius caulem faciat, tùm aliquod incrementum habuerit, exiguam testam media parte accipiat, eo enim quah onere coëctia in latitudinem se diffundit.

Si verò & bona specie habere velis Lactucas duobus antea quam es ablaturus, comas ipsarum, h. e. supernam partem, iuxta Constantinum Carlatem, ligato: sic enim albæ & speciosae erunt. Inalbat ipsas etiam arcua supernè infusa. Si verò velis Lactucas facere concavas & foliosas, & in caulem non exercere, sed humiles, & ad terram depectas esse, trasplantata s rigabis: quum autem altitudinem palmi habuerint, circumfodies ipsas vt appareant radices, & stercore bubulo recenti oblitas obrues, & statim rigabis. Vbi autem increuerint, germen acutissimo ferro fude, & testam non picatam impone, quò in latitudinem, & non in longitudinem augmentum capiant.

Vt autem Lactuca habeat in se Apium, & Etucam, & Ocyumum, & alia huius generis ab eadem radice, caprinum aut ouillum sterces Didymus accipit, & quantumuis paruum sit perforat, & induritiè euacuat, seminaque dicta, aut quaeunque velis, in euacuatam partem dense indit, & in profunditatem non minorem duorum paruorum deponit, stercore tenero ac raro praesubstrat, deinde tenui terra aggesta, & sensim aqua rigat, atque etiam vbi enatum fuerit semen irrorat, assidue sterces inspergendo, & postquam in caulem excreuerit, multò plus diligentia adhibet, nasciturque Lactuca cum iuicetis simul seminibus concreta. Alii duas aut tres caprini aut ouilli stercores pilulas constringunt, & semina ipsis admiscunt, eaque simul in lintecolum miteunt & rigata desodiunt, aliaque item curà adhibita Lactucam multiplicem & variarum specierum habent.

Reddetur Lactuca odorata, si Citrii semen in eius semen imponatur, & sic feratur.

Lactuca fatiua, vt scribit Dioscorides, refrigerant, stomacho grata habentur, somnum conciliant, aluum emolliunt; lac euocant (augent Corn.) verum decoctae magis alunt. Stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen assiduus libidinum imaginationes in somno compefcit, & Veneri testragatur (at semen ipsius potum, his qui assidue semen per somnum effundunt, auxiliatur: & coeundi appetentiam avertit. Corn.) Ipsa verò frequentiores in cibo claritati oculorum officunt [si assidue edantur visus hebetudinem inducunt.] Muria condiuntur, cum in caulem exierunt, vim quandam nascuntur succo lactis siluestris Lactucae similem.

Est, inquit Plinius, quidem natura omnibus refrige-

Scarus crispus pariscularis.

Cuitara mangonia.

Inalbatio.

Sesilis. Odor alioquinus.

Vires & Glus in genere. ex Diosc.

Diosc. Garia ledio

Ambustis.
Vlcera.
Egrius sic.
Lutissio

Error quorundam.

eleni laborato-

refrigeratit, ideo estate gratè stomacho fastidium auferunt, & cibique appetentiam faciunt. Diuus certè Augulus Lactuca conferuatus in agriudine fertur prudentià Muti Medici. Somnum faciendi, veneremque inhibendi, æstum refrigerandi, stomachum purgandi (roborendi Dalechamp), sanguinem angedi vim habent, quoniam & inflationes discedunt, ructusq; leues faciunt, concoctiones adiuvant. Cruditatem ipsa nequaquam faciunt, nec vlla res maiorem in cibis auiditatem incitat inhibereque eadè in causa alterutraque modus est. Ambustis profunt recentibus, priusquam pustule fiant cum sale illita. Vlcera etiam quæ serpunt, coërent in nitio cum Aphronitro, mox in vino trita. Igni facio illinuntur. Conuulsa & luxata caulibus tritis cum polenta ex aqua frigida leniunt: eruptiones papularum cum vino & polenta. In cholera quoque coctas patellis dederunt, ad quod vtilissima quàm maximi caulibus, & satia maxime Lactuca, & amara laetensque, quam meconidem vocauimus. Hoc lac & oculorum claritati cum muliebri lacte vtilissimum esse præcipitur: Semen fatiurarum contra scorpiones dari: Semine trito ex vino porto & libidinum imaginationes in somno compefci. Quidam tamen frequentiores in cibo officere oculorum claritati tradiderunt.

Sed de iis accuratissimè Galenus. Plarique Medicorum, inquit, hoc olus, vt Ficus Autumnalibus fructibus præulerunt. Nam inter ipsa aliud melioris succi non inuenias. Quod porro nonnulli vitio verterunt, id ei in præcipuum laudem cedit, dicentes scilicet eam languinem & quidem multum generare. Et si ita res verè haberet, nõ modò nulli olerum, sed ne optimi quidem succi, ac maximi nutrimenti edulis esse secundum. Si verò quia permultum è Lactuca sanguinis cõgeratur, idcirco dammandam eam censeant, facillimè huic malo occurrì potest: quippe quum vlcensibus, & liberalius exerceci, & cã parciis vti integrum sit. Hæc ergo aduersus eos qui olus hoc non rectè vituperant. Illud porro scire cõuenit, omnibus aliis oleribus paucissimum sanguinem & vitiosum generantibus, ex sola Lactuca non multum quidem, nec vitiosum, haud tamen omni ex parte laudabilem gigni. Vt plurimum quidem crudà ipsa vlcuntur: estate autè cum iam in semen proruptura est, in aqua dulci præcoquantur cum oleo, garo, & aceto assumunt, aut cum aliquo ex condimentis, obsonisue, præsertim iis quæ calco constant. Plerique etiam antequam excaulescat in aqua clixa vruntur, vt ego iam facio, ex quo dentes mihi deteriores esse ceperunt. Nam amicus quidam meus cum olerè hoc à longo tempore, me vt familiari cibo vsum fuisse sciret, videretque post mandì à me citra magnam molestiam non posse, cocturæ rationem indicauit. Etenim in inuenture quoniam os ventriculi bile eferuescebat, æstus moderandi gratià Lactucà vtebar. Cum autem ad proectam ætatem peruenissem, olus hoc contrà quàm in inuenture, somnum iam omni studio & industria accerfenti auxilio fuit. Quippe qui etiamnũ iuuenis læcubrandi gratia vigilis dedit operam esse assuecetam. Declinante iam ætate ipsa ex se in somni, grauius hoc incommode afficiebat. Aduersus quod vnicum mihi præsentissimum remedium Lactuca vespere comman-

dueta fuit. Frigidum ergo humidumque succum profert, non tamen vitiosum. Itaque, sicut a lia olera, à iusta concoctione non excidit, neque alium cohibet, vt neque impellit. Atque hæc illi non immeritò accidit, quum nec aultera, nec acerba sit, quibus facultatibus in vniuersum alius sstitur, quemadmodum à fallis, acribus, & omninò abstergendi vim habentibus ad excretionem concitatur, quorum nihil lactuce inest. Et alio in loco. Lactuca humidum est frigidumque olus, non tamen extremè, siquidem edendo non foret, verum maximè secundum aque, vt sic dicam, fontana frigiditatem. Proinde ad calidas phlegmones accommodum est, & parua & leuia erysipelata, non tamen ad maiora. Est etiam edulium siti aduersum. At semen potu genitura profluuium cohibet, quamobrem iis datur qui libidinis somnis vexantur. Præterea Galenus alibi ex Archigene recensens olera, quæ stomachicis in cibo conueniunt, in iis habet Lactucas, & *peronos*, quas meconides lactucas conuertit Cornarius. Appellatur meconis quoddam Lactuce atra genus, à copia succi, & lactis saporiferi, similitudine quadam cum Meconio, hoc est, papaueris succo: *peronos* enim Papauer Græcis dicitur. Lactuce succus, auctore Matthiolo, ex rosaceo fronti & temporibus illitus, non solum febrientibus somnum conciliat, verum etiam capitis dolorem mulcet. Gargarizatur vtiliter ex Punicis mali succo, ad colu mellæ inflammationem. Testiculis illitus feminis profluuium cohibet, præsertim addito caphuræ inomento, sed venerè extinguit. Idem præstat eorum semen ex Papauerini feminis cremore hantum, atque etiam ardoribus vrine opitulatur. Cauendus Lactucarum succus suspitiosus, sanguine excretus, pituitosusq; & iis maximè qui liberis dant operam.

Huius itaque diuersis ob causas, diuerso etiam tempore varius fuit vsus. Antiquitas enim quod ebrietati obluet vretur, eamque prohiberet, in cœnæ sine sumebatur: post verò ad conciliandã appetentiam, in cœnæ principio sumi cepta est, vnde illud Martialis extat.

*Claudere quæ cenas Lactuca solebat auorum
Dic mihi cur nostras inchoat illa dapes?*

Hac nunc quoque æstiuo tempore plurimum vitimur in acetariis. Herba multum salubris, Vnde Columella in carmine.

*Iamque saluari properet Lactuca sapore,
Tristitia quæ releuet longi fastidia morbi.*

Et Paulus Aegineta l. i. ipsam optimi succi sanguinem facere testatur. Lactuce caulem, seu truncum in vsu esse saccharo conditum integri prodidit Iouberus. Confectura sæpius est sicca, demulcendæ siti optima. Si quis (ait Constant.) vini radicem Lactuce satiuæ euillam ex terra ante Solis exortum, latenter sub stratũ agri ponat, ipsi somnum inducit. Ipsa similiter quoque folia quinque numero, aut tria, aut vnum, somnũ adferent ægroto, clanculum sub puluinar posita, ita vt partes à caule auulsa ad pedes ægroti spectent, superina verò ad caput ægri vergant. Quicquid præsumperit Lactucam, & aquarum varietatibus in peregrinationibus non consensabitur, neque offendentur: neque verò ab ebrietate tentabitur, quisquis ipsam præsumperit. Ceterum Lactuca assidue comesta visus hebetudine cohibet, & visus claritatem inducit, præsertim si sit dulcis: & multè quidem in cibum acceptè, ventrem soluunt, paucè verò sstunt, & grauedinem mitigant.

Succicem
paramentia

Phlegmone

Ex Marti
thiolo

Febri.

Columella
inflammã
tio

Succus
quibus no
xius sit
Lactuca
dicitur post
ex antea
nam

Caulis sic
chero con
ditus
Superstitiu.

Novas a
quarum a
uerit

LACTUCA SYLVESTRIS LATO folio, succo viroso.

Descriptio

EX radice minimi digiti crassitudine, candida, paucis fibris capillata, caule tricubitali & aliori adolefcit, tereti, leui, inani, ramofo, lac perquam amarum, & tetrum saporem ex radicis & caulis vulnere fundens:



folia infirma lata, Intybo fatiua proxima, nigricantia, in ambitu leuibus spinulis quasi serrata, superiora, Lactuce syluestris modo, Fuchfio & aliis sinuata, qua terram spectant spinulis per costam longitudinem hispida: si res conferti, Lactuce colore luteo, calyce squamato, subrubente: semine ex pappofo tomento pendulum, nigrum. Sculptor picturam nostram corrupt.

Obis anam [filu. Lact 12a] folio breuiori (βραχυπτερο) quam fatiua est, ait Theophrastus, idque consummatum aculeatur, & caule simili modo breuiore perficitur, succum acrem ac medicatum habet. Nascitur in aruis, carpitur succus per mellef. Aiuat eo purgari hydropem, caliginem ab oculis atteri, & argema tolli cum muliebrilacte.

Aγρη δειδαζ Dioscoridis similis est fatiua, sed ampliozem caulem habet, & foliis candidiozem (λευωτερον) quam fatiua est, aut Theophrasto legendum (βραχυπτερον) breuiora vel ασπιδιου nigriora) & graciliozem & asperiozem: est vero sapore amara. De Lactuce sponte nascentis primo genere Plinius, quam Caprinam vocant, plura dicentur inter vires. Hae forte est illa maxima Endiua Tragi, siue i. seu maior, foliis Lactuce quadante nus similibus, linguam referentibus minime incisis: femine omnis Lactuce femine magis nigricante: &c.

Tragi figura ponitur apud Cordum in histor. lib. 2. c. 134. pro Lactuce agrestis, quamuis Cordus inibi de hac non scribat.

Loniceras eandem figuram habet ex Trago hac inscriptione Endumen (Endiua), de qua ait. Endumen aut Antisten / & Gansdiesel & leber diesel, vulgo Endiua, species Lactuce, qua quidam volent esse Lactucam siluestrum, Gallis & sterem dictam.

Lob. Adv. Lactuca agrestis, Scariola hortensis folio, Lactuce flore, opii odore vehementi, soporifero & viroso: Norbonae apricis locis: Lactuca altera siluestris Rondeletio: & Lactuca filv. vera. Icon. Plant. Lactuca agrestis.

H. Lugd. Endiua Tragi: Thesion Dalechampii: Item Lactuca filv. vera Dalechampii, cui adscripsit saporem insigniter amarum.

An Endiua maxima.

Lactuce filv. veræ Dalechampii descriptioni [inquit C. Bauh.] subiungit H. Lugd. alterius Lactuce filv. historiam ex Pena, sine icone tamen: que tamen Penæ Lactuca ab hac diuersa non est. Eandem & terribiliter pingit addita descriptione sub Thesio Dalechampii.

Camer. hort. Lactuca filv. Anglica, grandis admodum & alta, odore proflus Opii. C. Bauh. phyt. Lactuca 12. siue filu. odore viroso, Thesium Theophrasti creditur.

Lactuca siluestris vera Dalechampii in rupibus lapidosis saxosisque locis nascitur, ubi durum solum paucam terram contigit: nonnunquam ex rupium ipsarum rimis exilit. Vidi Geneuæ, & in Than Alfatie, ac habeo Montbelgardi in horto ill. C.

Nunc de huius Lactuce facultatibus dicendum. Viribus aliquantulum Papaueri similis est, inquit Dioscorides, vnde lacteum eius succum aliqui Meconio permiscuerunt. Aquam per alium elicit potus in aceto mulso succus ad duos obolos: argema, caliginemque repurgat: contra adustiones efficaciter illinitur cum lacte mulierum. In summa somnum allieit, doloris leuamentum prestat, menses trahit: contra scorpionum, & phalangiorum ictus bibitur: Semen non aliter quam fatiua libidinum imaginationes in somno auoluit, ac venerem arect. Succus ad eadem valet, sed viribus infirmior. Reponitur in in scitili nouo lac eius, antea, vt in aliis liquaminibus moris est infolatum.

De hac Plinius ita tradit. Lactuce sponte nascentis primum est genus eius, quam Caprinam vocant (marinam,) qua pites in mare deiecta protinus necantur qui sunt in proximo. Huius lac spissatum mox in aceto pondere obolorum duum, adiecto aque vno cyarho hydropicis datur, quibus verbis exprimere voluit illa Dioscoridis καθαρην δειματ' εδωκετο ποδεις &c. Aquam per alium elicit potus in aceto mulso, &c. Essid. dem succi vsuum medicum Theophrastus habet eo loco, quem supra citauit. Ex quo & hac Plinius descripsit, additis quibusdam aliis. Succus omnibus [siuaticis] candidus, viribus quoque Papaueri similis: carpitur per mellef inciso caule: conditur in scitili nouo. Sanat omnia oculorum vitia cum lacte mulierum. Arect nubesulas, cicatrices, adustionesque omnes, praecipue caligines. Imponitur etiam oculis in lana contra epiphoras. Idem succus alium purgat in posca potus ad duos obolos. Serpentium ictibus medetur in vino potus. Et folia tosta, thyrifque triti ex aceto bibuntur. Vulneri illinuntur, maxime contra scorpionum ictus. Verum contra phalangia commisto vino ex aceto. Aliis quoque venenis resistunt, exceptis quæ strangulando necant, aut iis quæ vesica nocent: item Psymmithio excepto. Imponuntur & ventri ex melle & aceto, ad detrahenda vitia alui. Urinae difficultates succus emendat. Cratetas cum & hydropicis obolis duobus in aceto & cyarho vini dari iubet.

Hæc verò Galenus tradit. Iis qui veneris somniis vexantur agrestis Lactuce semen exhibetur, cuius colligitur succus, argema caliginisque expurgans, tum adustiones cum lacte muliebris inunctis.

Quæ argema Theophrastus, Dioscorides, & Galenus dixerunt, Plinius cicatrices videtur conuertisse. Ad Theophrastum Dioscorides addidit, & mellef i. mellefius succum illini, Galenus & mellefius quod idem est. Sunt autem mellef & mellefius.

Locus & tempus.

Vires & Vfus.

Succus.

Somnum conciliat.

Menses.

Semen.

Ex Plinio

Hydropis.

Plin. not.

Collectio succi. Oculi.

Urina difficultat. Ex Galeno

Semen & nerea.

913

pus, seu *Endivia* oculorum ulcera. Caterum, per aduisiones hoc in loco qui igne, vel quouis alio modo ambusta accipiunt, vehementer errant. Auctor *Endiviae* Galeni in scripta definit *Endivia* esse, cum superior tunnicula in superficie inusta viceratur, aut etiam paulo altior viceratio fit, ob magni floris influxum. Unde non male adeo iussio dici potest.

LACTUCA SILVESTRIS SIVE ENDIVIA multis dicta, folio laciniato, dorso spinoso.



Incondita habet per caulem folia, Sonchi diuisura, laciniata, & ferrata, spinis secundum costam auersa parte donata, anaxo lacte praegnantia: caulis vero bicubitilis & maior, in principio spinosus: qui in summo in multos abit ramulos, quos flores ornant parui, lutei, lactucaeci, in pappos degenerantes. Huius Lactucae quaedam mihi species obseruata folio non laciniato etiam per caules.

Olus illud agreste, quod praeter Lactucam satiuam (*Endiuia*) apud Pergamenum in Asia, *Endiuia* nomine in viis ipsis nasci: & locis fossarum eminentioribus, & praeterea riguis ac pleurisque incultis, inueniri tradit Galenus, sine Lactuca haec siluestris, nec ne, cui integrum erit diligentius perquirere, per nos licet. Nobis satis sit ea de Thridacina illa Galeni, hoc loco adscribere, quae ab ipso de ea apud Cord. referuntur. Exiguum autem id olus est, instar Lactucae hortensis nuper euata, amariorisq; quippiam praese fert, & multo magis dum adolefcit: vbi autem caulem iam produxerit, saporem amarum habet, vel manifestum. Haecenus Galenus.

De nostra planta loquitur Cord. in Hist. cap. de Lactuca falso Endiuia vocata, dicens: Lactuca agrestem Galeni tempore Gracis Thridacinen appellatam hodie vbiq; in Germania a veritate aberrantes Intybum & Endiuiam tamen Medici, quam Pharmacopola vocant. Eius caulis folia proferit statim a terra ferè in profundos sinus excavata, quorum anterior pars in mucronem desinit. At Bremae in Saxonia, ea folii portio non in turbinem fastigiatur, sed in rotunditatem exiit. Figura quae Cordo per Gesnerum ex Trago addita est, non conuenit descriptioni, sed potius Lactucae siluestri folio lato, succo viroso.

Tragus lib. 1. cap. 86. figuram non multum dissimilem habet a Fuchii figura, vocatque Lactucam siluestem, & Lact. silu. primam, *Endiuia* a *Endiuia* Dioscoridis, & Condriillam Galeni. Eadem eadem Trago cap. 89. dicitur vulgaris Endiuia, Dioscor. Seris & Intybus altera angustio-

ti folio, atque posse germanice vocari tamen Endiuia & Genßzügen / Scariolam autem & Scariolam a Scapione dicitur, ac de ea scripsisse Plinium.

Crediderim ego Apollinaræ per Genßzügen & Endiuia intelligere hanc Lactucam siluestræ: verum ille pingit Sonchum nomina quoque forte confundens in alia impressione.

Lonic. hanc pingit l. 5. cap. 69. sub titulo *Endiuia*, atque veteribus Medicis & Apotecariis dici Endiuia. Eius postea ponit descriptionem c. 70. quamuis figura non respondeat, quae Sonchi non alpera Fuchii est. Hanc appellat *Endiuia* / atque esse Endiuia siluestem. Figura autem quam ponit pro Lactuca siluestri non placet, nec etiam descriptio satis demonstrat, quid velit: confundit omnia suo more.

Fuch. Hist. & Icon. Matthioli in prioribus com. in Dioscor. itemque in postrem. cum mag. fig. lat. & It. In Hist. germ. ac Epit. Camer. Dod. gall. & Lat. in fol. *Lactuca siluestris*.

Corn. in Dioscor. lib. 2. cap. 111. Lactuca silu. genus, adeo Intubum, aut potius Serin Lactuca similem, referens, vt officina ipsam Endiuia appellat.

Lob. & Pena in Aduers. Seris do. nescia, altera Lactucina Dioscoridis amara, angustifolia, officinis iam olim sola Endiuia agnita & recepta, perperam Recentioribus Lactuca siluestris putata. De hac inibi scribunt. Speciem hanc incultam Seridis fatiue, non varietatem facinus. Est enim foliis, dum primum pullulant & emergunt altius, Scariolae hortensis: postea adultiora in effigiem Dentis Leonis sinuantur dentatis oris, & nonnullis quasi in dorso spina aculeis, vt in nostra vera siluestri Lactuca: Caulis quaternum cubitorum, hispidus, vnicus, rectus, lacte turgidus, floribus luteis, pallidis Lactuce donatus: amaro gustu, & praesertim vetustioris, acri radice, puilla, fibrosa, Seridis hortensis, Syrupo de radicibus miscenda consuetudine Practicantium; quos doctissimos Barbatos, tam proteruè quam inscite, quidam declinatores putidi rident, & spurcis conutiis lacerant, quod hanc plantam Endiuia veram putarint, & etiamnum vsu super non modò ad Syrupos de radicibus, de succo Endiuie & alios Nicolai, sed etiam stillaritas aquas ex ea coficiant, quibus suas Rhabarbari macerationes parent. Esse quippe nimis calidam, amaram, ingrati, quidam illorum reprehensorum, alii autem esse silu. Lactucam, nec aliam se nosse dicunt. Sed enim qui institutum perpenderit veteris Barbarorum nostrorum schole, animaduertet illos magna ratione & experimento neutiquam contemnendo fultos. Quippe non solum hanc Endiuia, aptiorem esse decocto succo, & stillatitia ad intemperies, obturationes hepatis, & primarum venarum, sed etiam macerationes Rhabarbari, Myrobalanorum, & similibus medicamentorum: cum enim sit paullo tenuiore & minus excrementoso humido, melius reserat & abstergit: tum etiam intima rerum maceranda peruenit, nec calore exuperat, aut amarore nocet, cum eius amaror non sit a calido, aut saleem non calidus, vt norunt cultioris Philosophiae periti, & studiosi conciliare apud Galenum, & Auerrohem, questionem de Opio, Meconio, Papauere, Lactuca, & non parum multis aliis amaris, multum tamen frigidis. Quin Dioscoride docente Serides siluestris stomacho meliores fatiuis, quia ipsi estuantem & tenore resolutum resocillant: in pi-

Apollinaræ

Lonic. r. preb.

Lactuca silu.

Seris do. nescia. Error Recentiorum

Radix Syrupi miscenda

Endiuia vera

Lactuca silu. institutum veterum approbatum

Descript.

ariet.

in Olus agreste Galeni Thridacina

Endiuia silu. Gal.

fn. not.

Endiuia silu. Condriilla l. diuia

bis vorata, & foris adnotata. Et nota huius melius congruunt Endiuiz siue Seridi amara angustifolia, quam Lactuca agrelli. Seridis species, quam Sonchum arboream, siluestremque quidam putarunt, nihil Lactuca simile habet, praeterquam lac & semen. Pharmacopoei hanc ubique pro siluestri Endiuia agnoscunt & vsurpant. Capite tandem de Soncho aiunt. Propinqua aded est sonchi natura Endiuiz, vt multi etiam hodie putent spinosam Endiuiam nostram esse Sonchum asperam: verum tres cum notissimas habeamus Sonchos, illam Endiuiam officinarum retinuimus.

Lob. Obs. Endiuia vulgarior officinarum, Seris domestica, altera Lactucina Dioscoridis amara, angustifolia. Icon. Plant. Seris domestica, Lactucina Diosc. Offic. Endiuia.

Thal. Lactuca silu. Cordi ac Tragi.

H. Lugd. Lactuca siluestris Matthioli. Hanc [inquit Hist. Ruell. lib. 2. cap. 69. passim ab offic. Endiuiam dici tradit, id quod etiam Fuchsius Matth. & Dod. perhibent: verum non sine magno errore Lactucam hanc silu. Endiuiam dicit, ac pro ea medicamentis immisceci. Desinant quos [inquit Fuch.] hac pro Endiuia vti Medici, si modò rectè consultum agis cupiunt.

Cæsalp. Endiuia silu. de qua Nicol. Florentinus, qui eam recipit in lyc. de Cichorio cum Rhabbarbo.

C. Bauhin. Phyt. Lactuca siue silu. costâ spinosa.

Gæcis in genere *βελία ἀγρία*, Lat. Lactuca siluestris, Endiuia multis dicta, folio laciniato, dorso spinoso, & à quibusdam Setriola per duplex rr. quòd serræ modo acutas spinas folii costâ à tergo habeat: à Zoroastro vt memini legere apud Dod. gall. Pherumbrum appellatur: German. wilde er satid: Belg. wilde satowre: Gall. *Laitée sauvage*: It. *Lattuca saluatica*: Hisp. *Letuga saluage*.

Nasci hanc secus vias, agrorum & pratorum margines, tum & iuxta scrobes, autor est Dodonæus; repetiti & in vineis, ac hortis, in quibus olera feruntur; facillimè autem, vbi semel facta sit, singulis annis recurrere. Lactucam nostram hanc Geneuz vidi virentem hieme ex femine deciduo. Monspelii incipit provenire mense Martio ac ibi abundat, sicuti & Basileæ: Lugduni verò, vbi ad altitudinem hominis excreuit, Februatio & Martio. Ibidem obseruavi foliis non laciniatis prioribus longiusculis.

Recentior ætas, vt Dod. perhibet, loco Intybi hac non infeliciter vtiur: Nam ad iocinoris inflammationes & morbum regium confert; calorem siquidem contemperat, & meatus expurgando aperit. Semen huius idem, quod Lactuca satiuæ potest, & Veneri restagatur.

LACTUCA SILVESTRIS MVRORVM
flore luteo.

Descriptio **A**ffatum lac fundit tota planta, quæ ex radice digitali, amara, caules perquam tenues erigit, cubitales & sesquicubitales, læues, subrubentes, subinde inanes, aut certè medullâ fungosa plenos: ad quorum genicula oriuntur folia profundè laciniata, extremâ laciniâ triangulâ hederaceum folium referente, colore quâ terrâ spectant purpurascete, interdum flosculi in ra-

mulis exigui, Lactucæ, plures congesti, colore luteo, quinque foliis constant, totidemque concoloria statim in medio exiunt, postmodum aliorum more in pappos abeunt.

Anguill. Herba Scariolæ siluestris species, cuius meminit Galen cap. de Lactucis. Gesu. apud Cord. lib. 2. cap. 61. Lactuca siluatica luteis floribus. de hort.



Lactuca silu. flore luteo: alia in siluis humidis crescit ad quatuor aut quinque cubitos. Sonchus fortè arborefces Dioscoridis: species vna folio oblongo, subdulci & grato gustu, anguloso, floribus luteis. In append. Sonchi genus læue, Lactuca illa [vt doctiss. Iuuenis Iohan. Bauh. nos monuit] silu. Anguillaræ, cuius meminit Galenus. Lob. Obs. & Icon. Plant. Sonchus alter folio profundis laciniis sinuato, hederaceo. Tabern. Icon. & Hist. Sonchi genus u. Sonchus siluaticus 4. Cæsalp. Herba quædam in ruderibus nascens, à Plinio inter Lactucas siluestris Hieracia vocat. Camer. hort. Sonchus luteus varius. C. Bauh. Phyt. Sonchus 5. siue læuis alter, vel Lactuca murorum lutea. Item: Lactuca 10. siue Lactucæ species silu. Gesnero. Er. Frater has quidem sciunxit, ego autem (quia Gesnerus non separat, & quia ignoro quæ sit) ambas iungo. Eadem apud Matthioli. Sonchus læuis alter, vel Lactuca murorum lutea: Intybus siluestris 3. Trago: Sonchus læuis altera Matr. Cast. & Lugdunenisis. Intybus 3. Tragi, cuius nos descriptionem posuimus sub Soncho non laciniato, folio est parlongo, angusto, flore luteo & multiplici ac maiori duobus suis Intybis siluestribus, siue Sorchis. Hæc non conueniunt Lactucæ murariæ: proponit Frater iconem ex Tabern. quæ probanda pro Lactuca muraria, sed quæ nihil mihi videtur habere commune cum Soncho læui alterâ Matthioli: nec cum vlla iconum à Matthioli propositarum pro Soncho.

Lactuca murorum silu. provenit Montbelgardi in muris Castellis, & siluis vmbrosis, florens Iulio. Basileæ obseruavi itinere Dornacum in wasserfall ad duos tresve cubitos excrefcentem Augulo cum semine maturo, ceu etiam prope portam lapideam dictam. Frater C. Bauh. qui nescio quâ occasione Choadrillam 2. Dioscoridis nominat, Geneuz in teetis, & parietibus mense Decembri virentem conspexit.

LACTUCÆ MVRORVM AFFINIS
Sonchus Dendroides Dalechampii.

Radicem habet crassam, nigricantem, ex qua radice multæ prodeunt: caules bicubitales

Sonchus arborea. Endiuia silu.

Endiuia spinosa

Lactucina Diosc.

Nomina linguarum

Setriola.

Pherumbrum

Locus & tempus

Vires & vsus.

Flosculi

Synon.

Lact. silu. Anguillar. Sonchus

C. B. nov.

Locus & tempus.

les, atque interdum altiorem, teretes, foliis stipatis linois, seu per ortas ex intervallo infectis, latis, Quercui hand abimilibus, lacte dilucentibus. Rami in caulis nulli sunt, sed ab imo scapo ad summum usque non procul a singulorum foliorum exortu, singuli nascuntur petioli, tenues, qui multos flores sustinent luteos, quales sunt aliorum Sonchorum, aut Lactuæ, qui tandem in pappis abeunt.

Hic Sonchus Dendroides, i.e. arborefcens Dalechampii, est tertium illud Sonchi genus, inquit H. Lugdunensis, cuius capite de Soncho tertio loco Dioscorides meminit. Sed hic serupuli ac dubitationem rei barbaræ studiosis præfens descriptio Dalechampii iniicit, cum dixerit, ramis nullis, sed foliis tantum & floribus huius Sonchi caules ornat. Dioscoridis autem Sonchus tertius, iuc arborefcens [Dioscoridis] latis constet foliis, que quidem caulem in ramos excutem distinguant, ceu quidem in Dioscor. latino legatur. Sed hunc serupulum ex Græco codice ita eximendum esse iudicat, & ὁ ἴσχυρος ὁ ἴσχυρος, ὁ ἴσχυρος ὁ ἴσχυρος. Quæ sic fideliter conuertisset Rutilius. Alter Sonchus, etiam tener est & arborefcens, & larifolius: sed caulem folia distinguunt.

Sonchus hic Dalechampii habet multa communia cum Lactuâ murorum: verum tamen si descriptio & icô Dalechampii vera est, necessarîo differunt. Vtinam Dalechampii particularem locum, ubi repererit, annotasset: possit ibi perquiri. Lactuam sanè murariam sæpius obseruauit in saxosis frigidorum montium cliuis, ubi Dalechamp. suam Sonchum dendroidem prouenire scribit.

C. Bauhin. Phyt. Sonchus 10. siue arborefcens, Dendroides Dal. multum cum Lactuâ murorum conueniens.

LACTUCA SILVATICA PURPUREA.

Lactuâ siluatica purpurea, caule est bicubitali & altiore, glabro, tereti, medullâ alba pleno: quem sita ex intervalis alternatim veltunt, sinuata, glabra, tenella, subter glauca, supra vitentia, nullo aut breuissimo pediculo donata, angusto principio, mucronèque inferiora quidem, vncias duas circiter lata, palmum longa, superiora vix vnciam sæpè lata, & quâ caulis adhæreret interdum latiora quàm inferiora, pinatæque, sapore nullo excellenti: caulis in ramos aliquot diuiditur, atque hi rursus in alios minores, qui flores sustinent Lactuæ pares, & quinque foliolis contextos, sed colore hilari


purpurascente; qui in pappum facessunt, semine oblongo, gracili: radix subest pollicaris, à qua multæ longissimæ dependent fibræ, sapore grato, dulci, cum tenuisculo amarore prædite.

Cels. apud Cordum lib. 2. hist. cap. 61. (vbi pulchra figura) dicitur, Lactuâ siluatica purpureis floribus. De hort. Lactuâ silu. in filis nascens, purpureo flore, Sonchus Dioscor. fortè. Item: flore. Sonch. arborefcens Dioscor. puniceo flore.

Clas. Pannon. & Hist. post. Sonchus 2. Sonchus læuis purpureo flore.

Tabern. Icon. Libanotis Theophrast. sterilis. Sonchus siluaticus, waldlatrich. Hist. wald late rich/an Libanot. Theoph. seu Rosmarinum infrugiferum: item Hist. sine iconè, Sonchi 10. genus.

Camer. hort. Sonchus cæruleo flore. Trago, Lactuâ flore purpureo, late rich mit braun rot blumlein Thal. Lact. siluestris spitzberg.



Casp. Bauh. Phyt. Lact. 9. siue montana purpureo cærulea maior. Huius generis, inquit, est Sonchus 2. Clusii, quem cubitalem dicit, nostra verò Lactuâ ad tres & etiam ad quatuor cubitos exurgit: quare hæc Clusii Lactuâ

montana purpureo cærulea minor dici poterit.

Gerard. Anglo, Erysimum siluestre. Pro Erysimo Gerard. habet iconem Tabernamontani, cui titulum fecit Libanotis, de qua antè: sed malè: nihil habet commune cum Erysimo.

Lactuâ siluat. flore purpureo obseruati Mörbelgardii in monte Eshon: aliquoties seminaui & plantauit in horto Ill. E. C. Abundat circa Mafmunster & Rotenburg. Genææ mihi visa in montibus Salen & Thuri, & plantata in hortis florens Julio, ceu & in montib. circa Tigurum. Basileæ in montibus circa Dornacum, wasserfall & Moutets, florens Augusto & Septembri. D. Doldius misit Norimbergæ nomine Lactuæ silu. Erythranthemii Thalii. Monte quodam prope Stolbergam (iugum harcynicum quod vocat, die harschê) copiosa est. Vidit Thal. eandem cretram montes Semanæ siluæ in principatu Hennebergensi habere.

Synonyma Lact. silu. purpureo flore.

Sonch. purp. flore.

Libanotis Theoph. sterilis.

Error Gerardii

Locus & tempus.

SONCHUS CÆRULEVS LATIFOLIVS.

Asurgit Sonchus cæruleus latifolius caule bicubitali & altiore, crassiusculo: folia laciniata, in triquetram laciniam Hederacei folii æmulam, in ambitu serratam desinunt: summus caulis hirsutus, thyrsium gestat florum, Sonchi familium, sed cæruleo colore nitentium, in pappos celeriter fatiscendum: hunc dedit frater C. Bauh. sicum ex Allatia delatum. Eundem autem

Descriptio

Sonchus Dendroides Dalechampii Sonchus arborefcens Diosc.

Enall. v. pich.

cum Soncho cœruleo Clusii suspicamur, cuius hæc est descriptio.

Cubitali, aut ampliore existit caule, rotundo,



striato, lanugine obfito, intus cauo: quem ambiunt multa folia, ampla, aliquot profundis laciniis utrinque diuisa, extremo mucronata, latiore pediculo caulem amplectentia, in ambitu nonnihil dentata, subtus aliquantulum incana, lacteo succo plena: plurimos in summo caule flores profert, purpurascen-

tibus & villosis petiolis inhaerentes, vicenis foliis, vt plurimum constantes, elegantissimi coloris cœrulei, qui per maturitatem in pappum cum semine cinereo exiguo euanescent: radix pollicatis est crassitudinis, oblonga, non in profundum acta, sed obliqua, candicans, dura, veluti internodiis distincta, multas circumquaque fibras crassas agens, & viuax, singulis annis nouos ex latere caules profert.

Synon. Sonchus laevis cœruleus flore

Soncho-Cichorium. Icon.

Camer. bot.

Clus. Pannon. & Hist. post. Sonchus laevis cœruleo flore 1. C. Bauh. Phyt. Sonchus 8. siue alpinus cœruleus.

Camer. hort. Sonch. cœruleo flore: Soncho-Cichorium. Camer. non describit suum cœruleum, figura tamen artificiosa est, exprimens plantam siccam, quam à Fratre accepi, quæ occasio, vt potius ex Cimetatio eutauerimus patendam nostram iconem, quam ex Clusio, cuius vnicum florem exhibemus. Cameterium pet alcerum cœruleum intelligere putamus Lactucam siluaticam purpuream: luteus verò varius quis sit nobis nobis nondum constat.

Tabern. ic. & hist. Sonchus laevis 4. flore cœruleo, blauer basenfel.

Thal. Intybus κατὰ φύσιν, horticina, cuius folia referunt imaginem aliquam Sonchi laevis, floribus cœruleis, interdum protus candidis: foliis tamen in plures lacinias quam prior discissis.

Locus.

Abundè nasci vidit Clus. variis locis vmbrosis, in quibus florebat Iulio & Augusto, quo mense etiam semel ad maturitatem peruenit. In hortos translatus, maturius multò, imò interdum mense Iunio denuò floret. Thal. quibusdã Horticinæ locis repetit. In Alsatia montibus altiss. Iulio & Augusto florere, semenque profertre Casp. Bauhinus scribit.

Lactuca foliis Peruvianæ.

Delinatio rudis

Folia huius erant, quasi Lactucæ primæ enata & adhuc tenellæ, similique virore prædita, quæ gustata insipida deprehendebantur.

Synonyma

Monardi ex veris. Clus. & H. Lugd. Herba ad renem morbos vilis. C. Bauh. Phyt. Lactuca 15.

siue Lactucifolia renalis.

Admodum vilis est ad tenuem affectus à calida causa provenientes, eius succo cum rosaceo vnguento mixto, parti dolenti illiro, & ipsius plantæ foliis superimpositis: in ctylispelate autem & inflammationibus succus illius valdè conferre dicitur; nam inflammationem tollit & dolorem mitigat. Ex foliis coniecturam facit Monardes perfrigidam esse herbam.

Lactuca ex Peru.

Lactuca siluestris vocata apud Monardem, cuius folia Lactucæ foliis erant similia, ex atro virentia, ex Petu mittebatur.

Monardi ex veris. Clus. & H. Lugdunensi dicitur Lactuca siluestris pumila. C. Bauh. Phyt. Lactuca 13.

Huius foliorum decoctum diutius in ore, quâ parte dentes dolent, retentum, dentium dolorem tollit. Idem præstat foliorum succus dentium cauis instillatus, herbâ superimpositâ. Sapore admodum amaro est: caliditorem existimat auctor, quam in primo gradu.

Lactuca Hispanica nomine missa, laciniata.

Lactuca hæc ex semine in capsulam ligneam tertâ oppletam coniecto succreuit anno 1609. Iulio, Iulioque mensibus. Radix eius vnica, longa, in imo tenuissima, tenuisque ad summum vique crassescit, pluribus non procul à summa eius parte lateralibus radiculis, capillaceis fibris donatis constabat: caulis post hanc triquetret, digitalis crassitudinis: folia omnium primo ex imo nascencia, breuiora, laciniis potissimum duabus latioribus conspicua sunt, secunda longiora, etiam præter alias profundas lacinias duas obtinent, cæteris longiores, alarum ad instar altitius expansas, si que lubinde folia amplexicaulia, succedentia foliis iuxta caulis ductum progeminatae solent, in sui medio longo netuo constantia, donec in summo caule post folia maxima sensim miuora multò videntur, tenerrima, leuique attractu lacteum succum reddentia: folia cæteroquin omnia simul cum caule concolore in luteam palliditatem deuegunt, sapore donata simili, quo Lactucæ capitatae, nec dulci vt Romana, nec amaricante, vt quædam Lactucæ.

Eiusdem Lactucam hætenus non vidimus, prouenit nobis anno 1609. sata ex semine per Fratrem chatill. missò, titulo, Lactucæ Hispanicæ vetæ. Eadem etiam prouenit in eius horto Basileæ, vbi à nobis inspecta hoc anno.

Egtegius vit D. Frideticus Meier Argent. in car. Plant. sui horti notat Lactucam Hispanicam pro planta non vulgari.

INTYBA, SERIDES, ET CICHORIA ex Veteribus. CAP. II.

DE Intybis, Seridibus, & Cichoriis Veterum Lacturi, eorum valdè deprauatam, & præsertim Dioscoridis consusam lectionem ita retinimus. Σέρεις διασημωμένη καὶ ἰντιβίς, sic Ald. (ita etiam vult Lacuna:) at in Patissien. ista desiderantur. Sartac. ἰντιβίς καὶ ἰντιβίς, παρὰ τὴν ἰντιβίς καὶ ἰντιβίς: &c.

Hunc autem Dioscor. locum sic vetro. Scris duplex

Duplex, quarum vna quidem siluestris, Picris (siue a nara) quæ Cichorium nominatur. Alia vero (siluestris sc.) est foliis latioribus, & stomacho gravior, quam hortensis. Huius vero (hortensis scilicet) duplex genus. Vnum Lactuca similis, & lara folia habens. Aliud angustifolium & amarum (vel subamarum:) Omnes sunt adstringentes, refrigerantes, & stomacho commoda, &c. Postea ait. Et maximè siluestris (Picris seu Cichorium, & alia latioribus foliis, &c.) stomacho commoda.

Corn. le Pio
improbatur
Mirum Cornarium sic vertere. Seris duplex est, Ex quibus siluestris, quæ Picris & Cichorium nominatur, latiora folia habet, & stomacho magis commoda est quam hortensis. Et huius duæ species sunt, Altera enim Lactuca &c. Cornarius tria tantum Seridis statuit genera sua versione, vnum siluestre, duo hortensia.

Hermol.
Hermolaus quatuor statuere videtur suâ versione, vti etiam Anguill. & nos fecimus nostrâ. Ait enim Seris fatiua (silu.) quam Picridem aliqui vocauerunt, Ægypti Agon, Romani Intubum siluestrum. Dudum & ipsa generum traditur, quorum quod siluestre est, Picris, eademque Cichorium dicitur. Alterum folio extensiore, gultuque gratiore, quam hortensis. Iterumque hoc (scilicet hortense) in species duas distrahitur, vnam Lactuca similiorum &c.

Ruellii
serpis.
Ruellius aliter vertit. Seris dudum generum est. Altera siluestris, quæ Picris & Cichorium vocatur. Altera fatiua, latioribus foliis constat, stomacho quam hortensis vilior. Quæ (hortensis sc.) iterum in duas species digeritur, vna foliolariore, &c.

Hoc loco malè *ἰσχυρῆτα* pro *ἰσχυρῆτα* habet Matthiolus ex libro simplicibus Orbisâsi dicaro: in quo etiam errauerunt Sarraenus, & Hermolaus. Verisimile enim est hortensia ori gratiora esse, quia minus amara siluestribus. Præterea infra ait Dioscor. *ἀπὸ τῆς ἰσχυρῆτας*.

Cichorii descriptio potest desumi ex descriptione Chondrillæ: apud Dioscoridem, de qua post.

Matth. nos.
Serapionis versio habet affinitatem cum versione Cornarii: constituit enim tres species tantum Endiuæ, vnicam tantum siluestrum, non tot siluestris, quot domesticas, vt asserit Matthiolus.

Ex Plinio
Cichorium
Greffon.
Pancratii.
Hedypnos.
Intybi historiam illustrare videntur, ea quæ scripsit Plinius lib. 20. cap. 7. Cichorium refrigerat, inquit, in cibo sumptum, quod quidem propter singularem salubritatem aliqui Chrelton appellant, alii Pancration. Et siluestre genus, alii Hedypnoida vocant, latioris folii. Diligentiores plura genera faciunt [Lactuca:] purpureas, crispas, Cappadocicas, Græcas. Longioris hoc folii, caulisque lari: præterea longi & angusti, Intubi similis. Nec ex eodem genere (Lactuca) possunt dici, neque ex alio Intubi, hiemis impatientiores, virtusque præferentes, sed caule non minus grati. Seruntur verno plantæ eorum, vltimo Vere transferuntur. Est & Erraticum Intybi, quod in Ægypto Cichorium vocant, de quo plura alias. Intubi quoque (pergit Plin. lib. 20. cap. 8.) non extra remedia sunt. Erraticum apud nos quidam Ambugiam quædam exemplaria & Celus Ambubefam, Corn. Jappellauere. In Ægypto Cichorium vocant, quod siluestre sit. Sarcium autem Serim, quod est minus & venosius. Et siluestre genus, alii Hedypnoida vocant, latioris folii. Seris & ipsa Lactucis simillima, duorum generâ est, silu. melior. Nigra ista & æstiva. Dete-

rior hyberna & candidior: vtraque tamen stomacho vtilissima. De Cichorio in genere loquitur lib. 21. cap. 17. ita scribens. Cichorium & similia circa terram folia habent, germinantibus (germinant, vt.) ab radice post Virgilias.

Seridem subamarum esse olus, & magis quod siluestre est, ac ob hoc ipsum Picrida ab aliquibus appellatum, à quibusdam verò Cichorium nominatum, testatur Galeus. At ambas, Seridem fatiuam & siluestrum, adstringente qualitate participare, velut etiam Chondrile, quam & ipsam Seridis speciem esse tradit. De viribus plura infra.

Sed & Seris appellatur etiam à Græcis (Constantino, Paulo, & Actio *ἰσχυρῆτα*. Ophicæ autem & barbarum Medicorum genus *ἰσχυρῆτα* vocem in Taraxacon corruptum ut. Seridis, Intubi, Cichorei, Endiuæ, & Scario. te nomine exhibentur Cichorium siluestre & fatiuum.

2. Intubum fatiuum latifolium, angustifolium, & crispum. *Intybum*

3. Hedypnois, Cichorii genus siluestre Plinio. *Hedypnos*

4. Chondrilla quam aliqui Cichorion, aliqui Serim appellant. *Chondrilla*

5. Chondrillæ altera species à Matthiolo ad Cichorium etiam refertur.

6. Lactuca siluestris, quæ hodie sub Endiuæ voce vruntur, quamuis non sit vera Endiuæ. *Lactuca silu.*

7. Intubi nomine, malè in Virgilio quidam auctores intelligunt, auctore Hermolao. *Inty.*

8. Cichorii nomine veniebant solùm siluestria olera, Iulio Polluce auctore: quæ & gracilia & tenuia cognominantur in Ouidio. *Olus silu.*

9. Cichorium reuertum siue siluestre floribus exiguis luteis, inquit Dodonæus, non abs re Hyofiris, aut (vt quædam exemplaria) Hyoficris esse existimatur. *Hyofiris*

10. Endiuam suam maiorem, siue Serim, aut Intubum latifolium habet Tragus, quam nos Lactucam Romanam longam, dulcem nostram esse suspicamus. *An Lactuca Romana dulcis?*

11. Intybum siluestre duplex Tragi, Scarioლა seu Serriola dictum, Sonchus aspera à nobis inscribitur. *Sonchus aspera*

12. Præter iam commemoratas Intybi siluestris species, aliam quandam ad muros repete in commemorat, & hanc Sonchum radice repente nominamus. *Sonch. radice repente*

13. Cichorea candida & rosea Tragi à Cichorea caerulea (Cichorio siluestri) ab eo primo loco descripta, colore tantum differt. *Cichorea candida & rosea*

14. Cichoram tertiam habet Tragus Iuream, quæ est Hieracium maius. *Hieracium maius*

15. Cichorea quarta eiusdem quæ sit nondum mihi apparet. Eius tamen tertie varietatem solùm esse credimus. *Chondrilla viminea.*

16. Cichoram quintam Tragi, nos Chondrillam vimineam fecimus. *Chondrilla viminea.*

17. Pro Endiuia seu Lactuca siluestri potest vsurpari Lactuca leporina Apulei, inquit Tragus, eamque inter Cichoreas & Intyba refert, descriptam cap. de Lagopo tertio loco cap. 38. lib. 1. *Lactuca leporina*

18. Matthiolus Endiuam crispam, vt vocat, distinguit ab hortensi latifolia in sua hist. plant.

19. Intybacco generi sunt, teste Matthiolo, qui adscribant Cyanum, de quo agimus l. 26. H.n.g. *Cyanus*

CICHORIVM SILVESTRE ET fatiuum.

Radice pollicari, lacte pregnanti: quæ tortuosos suos caules profert eodem succo tur-

Descriptio



maria insigniterprehenditur:radix, caules, folia, flores: per culturam maius & mitius euadit: in spontaneo interdum caulis monstruam acquirit altitudinem.

Est, inquit Mare. Virgilius, Cichorion peregrina Græcis vox, quæ omnia Intyborum genera simul indicat. Esti ab aliquibus ad amarum Intybum contracta fuit. Nec quicumque videtur in antiquis scriptoribus circa congeneris plantæ huius appellationes certum. Accertè ex eo facile est colligere, nullam in his, nec Græcis, nec Latinis, certam perpetuamque appellationem esse: sed in Græcis Cichorium nunc agreste, nunc satiuum Intybum indicat: Picridem semper agreste: quemadmodam Serim plerumque satiuum. In Latinis Intybum modò satiuum, modò agreste: Ambubeiam autem agreste semper. Nec fore antiquos auctores legentibus aliquid vilius, quàm præcedente rei coniecturâ, contra quàm in cæteris fit, non ex vocibus res, sed ex rebus intellexisse. Solus Celsus lib. 2. cap. 29. de utroque genere agens, ad certas voces in medicina rem contraxisse videtur: satiuumque Intybum, siluestre Ambubeiam appellasse. Censèretque Marcellus, quoniam graui periculo in medicina hæc variantur, satiuum in Græcis Serim, in Latinis Intybum. A greste in Græcis Picrida aut Cichorium in Latinis Ambubeiam semper appellari: vt certa nominum ratio certam legentibus rem indicaret, nisi in medicæ materiæ nomenclatura audacior videri aliquibus timeret.

Luminare maius vocat Endiuia alteram & Cichoream, & Endiuia magis amaram Auicennæ: Intubum quorundam, aliorum Solsequium, Sponsam Solis, Intubum erraticum Plinii, Rostram porcinum: videtur etiam nominare Scatiolam agrestem & Bartifescere.

Cronenburg, in syr. de succo Endiuie Serim siue Intubum erraticam, vel silv. Picridem Etii, & Cichorion Celsi, Latinorum quorundam Ambubeiam & Ambubeiam, offic. Cichoream nominat, dicitque Tragus lib. 1. cap. 91. in sex differentias hæc plantam digessisse, vbi postremam iure satiuam asserat, siquidem in Hollandia & alibi, vt rerum, omnes pharmacopolæ in hortis eam diligenter curent, hiemis patientem: foliorum stipitibus lanugine molli vestitis. Sed errat Tragus non loquitur de Cichorea culta, sed Intubo satiuo, à Cichorea culta differente, de qua verba facit Cronenburgius. Tragus loco ci-

gidus, hirsutos, varièque in ramis duaricatos: folia Dentis leonis, profundè incisa, aliàs integra, aut quàm leuissimè dissecta, crispâ, pilosa: flores successiue emicât ex foliorum supremorū alis & caulū laterib⁹, Dentis leonis, sed colore cæruleo, interdum albo: tota planta a-

tato dicit. Erraticum Cichorium cæruleo flore, Cichorea 1. siue cærulea [in quo genere, rarissimè tamen, inueniuntur plantæ, quæ partim candidum, partim roseum gerant florem] est herba solans, quæ Varro Solsequium, Heliotropium, & Egyptis Agon dicitur: Cichorea satiuæ & erraticæ [hanc pingit solo Cichorea nomine: pro illa Intybum exhibet satiuum,] pertinent ad caput Dioscoridis de Seride, potestque fieri, vt apud Theoph. lib. 7. cap. 7. & 11. Intyba & Porcellia vocentur.

Recedit à Trago Cordus in Diosc. lib. 4. cap. 19: ita scribens: wægmart herba dicta Germanis, vulgò creditur esse Heliotropium, sed falsò, cum sit Cichorium, i. e. Intyhum agreste: erroris causam protulit Plinius, qui cæruleum florem Heliotropio tribuit. Idem lib. 2. cap. 160. ait. Intybum siluestre, quod Cichorium & Picris ob amantudinem vocatur, & Amargo à Gaza in Theoph. interpretatur, in pharmacopoliis Cichorea nominatur: flores habet cæruleos, qui serè semper Solem versus inclinantur, vnde etiam à quibusdam Solsequium siue Heliotropium appellatur, quamvis Heliotropium diuersa sit ab Intybo siue Cichorio, & suis generis, herba. Describit hanc Cord. hist. sua lib. 2. c. 66. de Cichorio siue Agresti Intybo cui apposuit figurâ Tragi Gesnerus, cui de hort. etiam Intybum agreste dicitur: In cat. pl. Ambubeia, Intybus agrestis & erraticus, Seris & Picris.

Subscribit Cordo Amarus, qui hanc lib. 2. enart. 126. titulo de Endiuia [plures enim dicto loco ac diuetsos titulos habet,] intelligit, vbi græcè οὐκ ἀγρία, καὶ εἰς, & ἄγριος vocatur; latine Cichorium, Intubum agreste, & Ambubeia. Is autem pro Seride siluestri, Intybū satiuum exhibet.

Brunfels. tom. 3. Rhapsod. 33. Solsequium Cichorium facit, ac ex Intyborum genere esse pronunciat, quàm bene autem Solsequium faciat etiam ex Fuchsio patet. Rudissimus, inquit, error quorundam, qui hanc [Intubum silv. siue Cichorium inscribit] Heliotropium esse contendunt: cum tamen primùm folia repugnent, quæ non sunt Ocymo similia, neque candida, sed nigricantia magis: deinde non (semper) candidum, sed magna ex parte cæruleum florem habet. Radix denique eius, vt Heliotropii, non inutilis, sed experientiâ teste, mirè efficax. Quibus omnibus accedit manifesta cum aliis satiuis Intubis similitudo, quæ vna satis docet Intubum esse siluestre: & non Heliotropium: vt quorundam temeritatem non satis mirari queam, qui contra apertam veritatem, & omnium Medicorum consensum, secus pronunciare audent. Siquidem species est erratici Intybi, à Plin. lib. 20. cap. 8. memorati, quæ Græcis ἄγριος dicitur ἄγριος, Lat. Ambubeia, vulgo herb. & offic. Cichorea; siluestris (addit Dod. gall. qui eam hoc titulo pingit: Intubum silv. Cichorium, facitque Cichorea & Seridem tertiâ) gall. Cichoree saniaige, Germ. wild wægmart, Belg. wilde Licoreyc. Cichorium & Intybum (inquit Dod. lat. in fol.) eiusdem generis sunt, Sed Intybum satiuum, Cichorium verò siluestre. Et hoc duplex est: Vnum latioris folii, Hedychnis Plinii: alterum quod amariū est, ac ἄγριος Dioscoridi dicitur; Lat. Intubum siluestre, Intubum agreste, Intubum erraticum, & Chicorion; offic. Cichorea, Germ. wægmart [quasi viarum cultos, vel wægmart squod peregrinis quasi viam indicare videatur, Fuchs.] hindleuff/ & Sonnenwibel, Cordo: Belg.

Cichorium
vix
generale

Synon.

Belg. Cicoreye: Gall. Cichorée, It. Cichorea, Tor-
nafole, Lob. Girafole, Radicula, Radichio, &
Radechio, Tabern. Hifp. Almormes & Cichoria:
Angl. Cycforye: Boh. Cierbaf & Czafalfa: his
addit Nomenclator Pannon. Intyrum filu. cæ-
ruleo flore hungaricè Napra nezô fu vocari: Pon-
lon. Pödrosyff, Tabern. Arab. Dundebe.

Matthiol. in Dioscor. lib. 2. cap. 125. duas figu-
ras ponit, quarum alteri titulus est, Intybus
filuestris, siue Cichorium: alteri Cichorium fati-
uum. Seris fatiua, dicit is, in Italia in hortis
colitur, folio erraticæ ampliore: in Seridum sil-
uestrum genere ea etiam Seriola dici possit, que
passim in hortis colitur: Plinio Cichorium ipsu
propriè Ambugia, vel Ambubeia dicitur. Idè eod-
dem capite, Chondrilla titulo Cichorium pro-
ponit, vt & in eodem cum mag. fig. lat. & ital. ac
præterea aliam iconem Intybi minoris, ac aliam
Cichorii domesticæ, & aliam Cichorii siluestris.
In Hifp. germ. similes figuras priorum commen-
tatorum habet: vnam quidem sub hoc titulo:
Garten wegwart / milder Scario: Intubus
erraticus, siue Cichorii n hortense: Alter-
am sub hoc: feld wegwart: Intubus erraticus,
siue Cichorium siluestre: dicit etiam vocari
Sonnenwibel / Heliotropium.

Nos Cichorii iconem vnam proponimus tan-
tùm, & hanc ex Fuchsiânis, que iam erat parata,
viderique sufficere pro Cichorio silu. & fatiuo.
non enim ita mutatur cultura, quin similitudi-
nem magnam retineat cum spontaneo: nobis id-
eò non inultrùm atridet icon Matthioli Cicho-
rii fatiui siue domesticæ: placeret potius pro eo
planta, que proponitur in comm. cum mag. fig.
pro Intubo minore. Duplicet quòd Chondrilla
suam. confundat cum Cichorio, quod satis pa-
tet ex icone, quam postea in Hifp. germ. reiecit
non subrogata meliore.

Corn. in Dioscor. Siluestris & erraticus Intu-
bus dicitur. Lonic. wild wegwert, Cichorium
agreste. Lacuna, Turn. (cui & Intubum silu. 1.)
Cord. hifp. Gefn. cat. pl. Eur. Cordo. (cui & Intybu
silu.) Cichorium.

Cichoria nostra intelligit Anguill. per Diofco-
ridis Serides duas primas: vnam, que Picris &
Cichorium vocatur. Alteram latiore: ambas
siluestris: primam spontè nasci tradit, que si co-
latur, facite folia latiora, & in Italia dici li Ra-
dichi. Idem cap. de Chondrilla ait, Taraxacum id-
dem esse cum Cichorea: id patere ex Auicenna.

Lob. Adu. Seris silu. Picris, Cichorium. Item:
Cichorium fatiuum cæruleum, Picris eadem.
Obs. Seris silu. Ambubeia. Item: Seris fatiua. I-
con. Plant. Seris, Picris, silu. Cichorium. Item:
Cichorium fat. cæruleum.

Tabern. Icon. & Hifp. Cichorium. Item: Ci-
chorium fatiuum. Et: Cichorii fatiui altera icon.
Et tandem: Cichorium album fatiuum. Cicho-
rium (inquit is in Hifp.) vocatur in genere à Dio-
scoride, Theophrast. Gal. & aliis, *μαγνη, μαχάριον,*
μαχάριον, μαχάριον, μαχάριον, μαχάριον,
Const. *μαχάριον,* Plinio Intubum erraticum, Chreston, Arabugia, &
lib. 2. de remed. Citroxinum, Marc. Emp. Intybus
rufficus, Gaza Amargo & Ampulla: Nic. My-
repto Heliotropium cæruleum, Cello Ambubeia,
Guil. Placentino Rostrum porcinum, Petro
Cresc. Sponsa Solis, aliis Amica Solis, Solsequiū
cæruleum, Endiuia silu. Seris erraticæ, Serap.
lib. de temp. simpl. cap. 145. Taraxacon: Auicenna
Taracum, aliis Arab. Taraxaten, Tarase-
qui, Tarfequi, Taraxacorum, Alteraxacon, que
nomina Arabes à verbo græco Troxinum mu-

tuarunt: dicitur aliàs etiam à Steph. glossogra-
pho Haliabbatis, & à Serap. Hundebe, Humdebe
& Sualben, Dundebe & Dumdebe, que nomina
orta sunt ex græca appellatione Intybi, que quid-
dem tam hortense quàm siluestre Cichorii de-
notant. Arabes enim siluestre Cichorii Tara-
xacon & Altaraxacon solum nominant. Cicho-
rium flore est cæruleo, qui secundum Solem cõ-
uertitur, qui manè oriente Sole se paulatim aper-
it versus Orientem, circa Meridiem planè aper-
tus, sursum Solem respicit: postea se conuertit
ad occidentem, & occidente Sole omninò oc-
cluditur, & clausus noctu manet donec oriatur
Sol. Et licet cœlum nubibus sit obductum, attamè
possunt ex hoc flore dici partes obseruari. Vt en-
nim nubes Solis cursum impedire nequeunt, sed
lumen solum terræ tollunt: ita priusio radiorū
Solis quidem impedit quominus flos recludatur,
sed cursum eius herbe minime retardant, quod
inter naturæ miracula reponendum, & hinc Sol-
stitialis herba merito nuncupatur. Secundum
Cichorium est flore albo. Tertium est pulchro
flore, colore rubello, leibfarb, Cichorium pur-
pureum. Quartum est Cichorium cultum vulgari-
simile, nisi quòd cultura maius & cibus com-
modius, flore cæruleo. Cichorium fatiuum 3. m.
wegwart / Cichorii fatiui altera icon. Quintum
Cichorium album fatiuum. *Compiler Tabern. Comp. 8.*
abique necessitate multiplicat figuras, quatuor
non erat opus: color enim nullam facit differen-
tiam, que figura exprimi queat: Verum quidè
est cultura nonnihil variari Cich. erraticum.

Camer. apud Matth. germ. Cichorium fatiuū,
vel hortense. Item: Intubus siluestris.

Hifp. Lugd. Intubum silu. angustifolium. Et:
Hypocheæris Dalechampi. Due figuræ apud H.
& dua descriptiones vnius plantæ.

Et hoc à Casp. Bauh. etiam annoratum. Sed is
non animaduertit Historiam insuper aliam fi-
guram proponere, cui nomen fecit, Intubum
silu. latifolium, Cichorium latifol. Matth. Seris
fatiua Lobelii. Huius quidem folia sunt integra,
qualem differentiam in descriptione nostra tra-
didimus.

Gerardo Anglo Hieracium latifolium quoad
figuram, non autem descriptionem. Is figuram
Cichorei, siue Intubi erratici Tabernamontani
malè ponit pro Hieracio. Item: Cichorium fati-
uum, Garden Succorie. 2. Cich. fat. latifol.
Broade garden Succorie. Item postea: Cich.
siluestre, mulde Succorie. Gerardus ex Tabern.
Cichorii & fatiui altera icone facit Cich. latifo-
lium, quasi alia sit species: Cichorii fatiui albi icon-
nem Tabern. ponit pro Cichorio siluestri.

C. Bauhin. Phyt. Cichorium 4. siue fatiuum:
Cichorea fatiua Tragi lib. 1. cap. 91. flore albo &
cæruleo, quare huius tres icones apud Tabern.
Item: Cich. 5. siue officinarum: Seris, Picris
Diosc. Cichorea Theophrast. Intybam erraticum
Plinii. Eidem apud Matthioli. Cichorium dom-
esticum flore cæruleo & albo. Item: Cichorii
silu. offic. seu Picris. *Ego cum Fratre Cichorium*
fat. non separo ab erratico, qui cultura tantum
mutat nonnihil: si non colatur, quod fuit fatiuū,
iterum sic erraticum. Tragi autem Cichorcum
fatiuum huc non refero, sed ad Intubum, siue
Endiuiam fatiuam, quod demonstrat etiam fi-
gura.

Thal. Intybus silu. seu Cichorium silu. flore cæ-
ruleo, duplicis differentia. Altera enim constat
folio profus integro: Altera in lacinias dis-
pto. Illius species, rariùs tamen, aliquando flo-

Hundebe
Humdebe
Sualben.
Dundebe
Dumdebe

Solem se
quirit

Herba sol
stialis

H. L. nos

Hieracium
latifol
Err
rar Gerat.
ds

Gerardus
nos.

C. B. nos

Yeon Au-
chorum.

Matth nos.

Error
Matth.

Seris du-
plex silu.
Anguill.

Chreston.
Ambugia.
Cichoximū.
Intybus ruffi-
cus. Am-
pulla
Amica solis

TARAXACŪ.

re candido sese offert, vt ad Hareyniam circa Wernigerodam.

W. h. venchf. Cichorium silu. albo flore, Cichorium album.

Locus. Cichorium siluestre, inquit Dodonæus, non modo in hortis siluitur, sed & per vniuersam Germaniam, tum & alibi secus vias ac locis incultis exit: ac potissimum folia habens profundioribus infuris laciniata; quod & reliquis amarior est. Iulio & Augusto mensibus præcipuè cum floribus reperitur: semen interea pericitur. Cichorium obseruauit Mompeli florens Junio; Basileæ, quâ itur Moutets Octobri inter portam cineream & lapideam intra & extra vrbem, & ad ripam fluminis Bursch & alibi. Vidi Lugduni & Patani, quibus in locis copiosus varias radicem elixarum in acetariis mense Ianuario & Febuario. Tanta est Cichorii similitudo cum Dente Leonis Veris principio, vt difficile sit discernere has plantas. Cichorium flore albo cultum Montbelgardi habeo in horto E. C. ex semine Sturgardiâ misso, seipsum ex semine decido multum propagauit, & non cultum ab erratico non differens, licet in loco culto proueniat.

Naturæ miracula. Flos Solsequii, vt Brunfels. annotat, seu Cichorii, iniectus formicarum cumulo in rubrum vertitur colorem, idque magno naturæ miraculo.

Vires & virtus. De omni Seride Dioscorides hæc prodidit. Refrigerat vtraque & adstringit, stomacho utilissima: aluum sistit cocta, si cum aceto assumatur. Siluestres stomacho meliores: quandoquidem æstuantem ipsum, & quem imbecillitas vexet, cibo leniunt. Cardiacis per se aut cum polenta, vtiliter illinuntur podagris, & oculorum inflammationibus auxilio sunt: herba cum radice illinunt, percussis à Scorpione subuenit, igni sacro cum polenta medetur. Succus cum ceruisa & aceto, valet ad illius eorum, quæ refrigerationem desiderant.

Succus. De Seride eadem ferè Plinius. Vtraque stomacho utilissima, præcipuè quem humor vexat. Cum aceto in cibo refrigerant, vel illita, discutiantque vel alios morbos quam stomachi. Cum polenta siluestrium radices stomachi causâ forbentur, & cardiacis illinuntur super mammam sinistram, ex aceto. Omnes ex & podagris vitales; & sanguinem reicientibus. Item quibus genitura fluit: alterno dierum potu. At de Intubis & Cichorio. Intubi quoque non extra remedia sunt. Succus eorum cum rosaceo & aceto capitis dolores lenit. Idem cum vino potus iocinoribus, & vesicæ, & epiphoris imponitur. Et mox: Cichorium refrigerat in cibo sumptum: & illitum, collectiones, succusque decocti ventrem soluit: iocinori, & renibus, & stomacho prodest: Et paullo post. Quod quidem propter singularem salubritatem aliqui Chreston appellant, alii Pancretion. Et siluestre genus, alii Hedyphnoida vocant latioris folii. Stomachum dissolutum adstringit cocta, crudaque sistit aluum. Et dysentericis prodest, magis cum Lente. Rupta & conuulsa vtroque genere iuuantur. Item eius genitura valerudinis morbo cessat. Ita etiam quæ nomina & facultatem clarè distingunt.

Chreston. Sicut etiam in horto Mompeli florens Junio; Basileæ, quâ itur Moutets Octobri inter portam cineream & lapideam intra & extra vrbem, & ad ripam fluminis Bursch & alibi. Vidi Lugduni & Patani, quibus in locis copiosus varias radicem elixarum in acetariis mense Ianuario & Febuario.

mo excessu. Porro domestica Seris magis etiam, quam agrestis refrigerat, sed & humiditatis multæ admistio siccitatem extinguit: verum vtraque adstringens qualitas est particeps. Et alio in loco. Cichoria & Seris cibarii generis sunt: nam apud nos rustici hæc edunt & cruda & cocta. Vt ut etiam in Erasiltau abundè in affectionum circa aluum curatione. Facultas horum oleum suffrigida est, & subamara, ac modicè adstringens. Et propter has facultates optima sunt pharmaca calidis temperaturis hepatis: nam præterquam quod moderatè refrigerant, robur etiam visceri addunt per adstringentem facultatem. Præterea committuras oculorum venarum in sima visceris parte, ac eas que in gibba sunt, extergens. Neque verò frigiditas intemperies magnopere lædunt, quemadmodum quæ frigidam humiditatem abique adstrictione aut amaritudine habent, facere solent.

Cichorii decoquitur herba & radix, apud Tragum, vino aut aqua, & calidum bibitur id decoctum, aduersus obstructions iecoris, lienis, sed in principio hydropis, & malo corporis habitu, [Græcis *νεφροειδα* dicitur] hoc remedio vti conuenit: ad eadem valet aqua distillata, imprimis verò æstuantis stomacho, & ardentibus febribus, imbecillitate cordis utilis est. Folia Cichorii cærulei abcessibus, tumoribus & inflammationibus, nec non pudendorum pustulis imposita, dolorem mitigant, ardorem extinguunt, calidæ podagris commodissima. Verum aduersus iam commemoratas affectiones aqua distillata maioris est momenti, si ea in lintecolis lineis excepta affectibus partibus imponatur, maxime verò hoc pacto usurpata anthraci auxiliatur. Aquæ è floribus cæruleis distillata, inflammationibus & caliginis oculorum imposita, potenter remedium adfert.

Coniunctum quoque de omni Seridis specie Matth. agit. Intybus, ait, & Cichorium selectissimum præbent medicamen immodicè calenti hepati, quoocunque tandem modo usurpata, siue foliis recentibus crudisque aut coctis comestis, siue succo, aqua stillatitia, aut decocto hausto, siue, siccorum foliorum puluere assumpto: modicè enim refrigerant & adstringunt, robur & tonum iecoris conferuant, cuiusque venulas obstructas expediunt, idque amaroris causa: totâ substantia hepati familiaria sunt, non tantum in calidis eius affectibus, verum etiam frigidis ex vino albo cum Petrofelino, aliiisque similibus calidis plantis diureticis decocta & pota: folia cocta ex aceto comesta gonorrhæam reprimunt. Decoctum Cichorii ictericorum facidos colores delet bibitum: semen contrafactum, & vino haustum ante insultum febrilem, cum mitiore reddidit, & tandem percurat. Ego huius folii plantæ ex aqua decoctum egenis sæpè propinaui in febribus vtiliter: efficacius erit remedium, si Cichorii cum floribus tumas M. j. & minutim concisum ex vini albi generosi lib. a. decoquantur ad medias, bibatur colamen manè calidum, quatuor aut quinque horarum ieiunio sequente: eodem modo diebus aliquot iteretur. Quibus natura calidius hepatis, dolores capitis & catharus generat, vinum aqua stillatita diluunt: radix eiusdem saccharo, condita, hepatis calorem terperat. Aqua Cichoriei cum lacteis imposita singulare creditur ad curandam pestifera remedium. Foliorum eius decoctum cum rosato & aceto rosaceo cephalicam appetitum lenit. Scabiam tollunt & eu-

Cibus.

Temper.

Viscerum obstructions. Aqua distillata.

Ardens febres.

Abscessus: Tumores.

Anthrac.

tem emaculant, ex contusa Cichorii radice offu-
le cum aqua rosacea.

Cichorea appositâ sedat Bayrus dolorem ca-
pitis, & æstuationes à Sole factas. Flores Cicho-
rii ad calculum destillari meminit Gesnerus. Ioâ.
de Monte exper. commendat ad oculorum
calorem & roborem aquam stillatitiam: de
qua vide plura cap. de Linaria lib. 29. Idem tes-
tatur radices coctas cum carne & cas certum
remedium esse contra omnes fibras. Radix Ci-
chorii silu. flore albo, si certo tempore effodiatur
ab obstetricibus peritis, creditur partum ac-
celerare subitrata parturientibus, vt scribit
Schvvenckfeldius. Plura de viribus qui seire
volet, legat Matthiol. germ. & historiam Taber-
namontani.

INTYBVM SATIIVM TRIPLEX.

Intyb. sativ. latifolium.



Intyb. sativ. angustifolium.



Corn. Diosc. Intubum satium lata folia ha-
Toan. II.

bens, corruptâ voce Endiua vocatum. Et alterû
angustis foliis, Scariola appellatum. Satius In-
tubus, quem priuatim Plinio teste lib. 20. cap. 8.
Serin nominarunt Veteres, in duas à Fuchio di-
strahitur species. Quaru vnam latiore folio

Intyb. sativ. crispum.



constare scri-
bit, ac Lactu-
cæ similiorem
facit, Intu-
bûmque sat.
latifol. siue
Endiuiam in
hist. & icon.
in scribit, quâ
air in omni-
bus pro vera
Endiua debe-
ri vsurpari of-
ficinis. Nam
quâ hodie sub
hac voce vtâ-
tur non esse
verâ Endiua,
sed Lactucam
silu., vt suo
dictum loco.
Alteram, quâ
Intubum sati-
uum angusti-
folium, siue

Scariolam inscribit, angustiora habere folia, &
subamaram esse tradit, ac diminutio à Seris no-
mine Seriolam dici testatur. Nos Fuchii binas
admittimus icones, non enim diuersam ab Intu-
bo crispo statimus, licet non parâ, ratione cul-
turæ, in his reperiatur varietas. Sufficisset quidẽ
vna ex Fuchianis, sed quia iam erant sculpræ,
eas Lectorum oculis nobis subicere placuit.

Exhibet eas quoque & Amatus, ac quidem sub
Seride siluestri, Intubum satium latifolium pro-
ponit: sub Seride autem satium, eiusdem Fuchii
Intubum satium angustifolium. Nomina autem
que Seridi suæ siluestri adscribit, ei non conue-
niunt, sed Cichorio, de qua re antè. Amarus au-
tem de suis Seridibus à se icone exhibitis loqui-
tur, quando ait. Domestica verò Endiua duplex
est, altera latifolia, hortis familiarissima, & quæ
tertiâ obruta, alba reddita, hibernis mensis, oxe-
læo & sale, cruda, & cocta anteponitur, quanquã
vniuersâ Hispania, sic paratam eam nunquam,
quod sciam, viderit. quam aliqui Endiuiam, alii
verò Cichoriam vocant. Altera verò arctioribus
foliis Endiua, à Seri Seriola, post verò Scariola
nuncupata est. Cæterum ab Intybo, siue Intyba
corruptè Endiua deducta est.

Hæc est illa Cichorea satium Tragi, Seris sati-
ua angustifolia Dioscoridis, quo nomine & In-
tybus vocari meruit, potestq; fieri vt apud Theo-
phrast. lib. 7. cap. 7. & 9. Intyba & Porcellia vo-
cetur. Cordi in Dioscor. Intybum satium. ab I-
talis Endiua satium vocatum. Cordi in hist.
(cui figura Tragi addita) Cichor. satium ab Ita-
lis Endiua hortensis, seu simplicitè Endiua
nuncupata. Matthiol. in Dioscor. Intybus hor-
tensis. Et: Intybus hortensis alter. In com-
m. cum mag. fig. Lat. & It. Intubus maior, & Intubus
minor. *Endiua magiore* & *Endiua minore*. In-
tubus crispa. Et quoque tertium Intybi hortensis
genus, amplo, foliosoque cespite proueniens, fo-
lis magnis, sed vbique in ambitu crispis ac sim-
briatis, caule cæteris maiore, crassiore, tenerio-

reque, in acetiariis expetitur reliqua cum ceteris paria sunt. In Hist. germ. Intubus fatuus maior, seu Endiua, Endiuier. 2. Intub. fatiu. minor *Garren Scariel* / vera fatiua Scariola. 3. Endiua crispa, *Große krause Endiuen*.

Matthiolum ponit [Fuchsum imitatus] duas icones valde similes pro diuersis plantis, eiusdem estimarim, nec demonstrat, qua in re differat Intubus alter à Cichorio fatiuo: cuius icon etiam similis in comm. lat. & ital. cum mag. fig. pro Intybo siue Endiua minore ponit diuersam iconem: folia enim laciniata appingit, ea placet pro Cichorio.

Dod. gall. Intubum fatium latifolium, Cichorea domestica 1. Endiua aliorum, offic. Scariola. Intub. fat. angustifolium, Cich. sar. & hortense offic. Cichorea domestica. Lat. in fol. Intub. fatium, *cius prior*, *cius huius* ab Auic. ac Serap. Taraxacum ab Italis Scariola nuncupatur, quam appellationem pleraque O. sic. seruant, quæ & Scariolam ipsam quasi Seridem hand perperam vocitant, sed minus rectè Scariolam per duplex rram Scariola Lactuca siluestris est. Dodon. non amplius meminit Intybi fatiui angustifolii, quod mirum.

Dod. not.

Gesn. hort. Intybum (Endiua vulgo) Italicum latifolium, quod ad acetaria hiemis terra obruitur: Cichorium fatium.

Lob. in Adu. Seris, siue Intybum fatium latifolium, Endiua, & Scariola officinis. A Cichorio nõ tantum cultus, sed etiam genericè differentia distat: nullo enim neglectu, transiotione, aliouè incommodo visa fuit vquam in siluestrè aut Picriam Cichorium degenerasse, aut hæc ad speciem huius Seridis promouisse. Et manifesta radicem differentia, est enim Cichorii bene habita, carnosa admodum, grata: Endiua verò fibrosa, penè nulla, nulliusque vsus in cibis, alicubi tamen in quibusdam compositionibus. Lob. Obs. & Icon: Plant. Intybum fatium latifolium, Endiua & Scariola. Omnia hæc postrema vox est in Ic. Plantin.

Seris horten-

Anguill. Seris hortenſis 2. Diosc. Endiua nostra [italica] alba.

Lonic.

Lonic. Scariola fatiu. latifol. Intub fat. latifol. Cichorea sar. latifolia.

Tabern.

Tabern. Icon. & Hist. Intybus maior, *Groß Endiuier*. *Esels, Aels huius* & *Wegwart* Plinio & Latinis authoribus Intybum, Intubum, Intybus aut Intubus, Intybum fatium aut domesticum, Seris fatiua & Cichorium domesticum, Herbariis Endiua, Endiua maior, End. fatiua siue domestica Romana. Serap. & Arab. Dunbebe, Dumbebe Humbebe, Hundebe & Endela, Boh.

Intybum

Serbaf / Polon. *Volertz* & *Melertz* in Candia Endiui. 2. Intybus crispa, *frauß Endiuen* / Endiua crispa: Belg. *Heerolde Endiue*: crispitudine foliorum à præcedenti tantum differt. 3. Intybus minor, *Hein Endiuier*: cui nomina græca prioris similia, hodie vocant *cius*, Serium & Scariola, Herb. Cichorium sar. minus, Seris minor, Endiua minor, intybum angustifolium, Endiuiola, practicus Scariola, Neapoli dicitur *Scarola*: Hisp. *Seraya Enuida*. Primo similis nisi foliis esset longioribus & amarioribus. 4. Intybus minor flore albo, Scariola alba, & Scariola alba: præcedenti solo flore albo differt. Monuimus autè plantam solo colore differentem non mereri propriam figuram.

Endiuiola Romana.

Camer. ad Matth. germ. Endiua, Intybus fatiuus 2. Endiua crispa. *Große krause Endiuen*. In Epit. Intubus maior. Item: Intubus crispa: Camer. proponit tantum duas icones nouas non tres vt faciebatur Matth. quasi vna sit superflua.

Gerard. Anglo, Intubus fatiua *Garde Endiue*. 2. Endiua crispa, *Curled Endiue*. Item: Intybum silu. *Wilde Endiue*. 2. Intybum silu. lati- *Gerardus* fol. *Medowe Endiue*. *Gerardus* omnia con- *Preb.* fundit.

Tabern. fatium facit silu. & minus album fat. silu. latifolium: Tabernamontani icones sunt plantarum solo colore differentium.

H. Lugd. Intubum fatium latifol. Item: Intub. fatium angustifolium Matthioli. Et: Intub. fat. angustifol. Dodon. si [hæc duo sunt vnum:] Item: Intubum crispum.

C. B. Phyt. Endiua 1. siue vulg. latifolia: Seris domestica latifol. Dioscoridis: Intubum & Seris hyberna Plinio que Theoph. *Wegwart* censetur: ac cuius etiam meminit Plinius lib. 21. cap. 15. floribus est cæruleis, raro candidis. Endiua 2. siue crispa. Endiua 3. siue angustifolia, floribus cæruleis, aliquando albis, cuius causa Tabern. duas habet figuras. *Apud Matth.* Intubus maiot. 2. Intubus minor, 3. Intub. crispa. Endiua siue Intybum fatium, cuius antea quoque monuimus, propter solum & culturam maius & minus efficitur: crispa verò transplantatione & mangonio hortulanorum.

C. Schyvenck. Cichorium Italicum, Cichorea fatiua. *Cichorium Italicum.*

Intubum fatium, à nonnullis Endiua, ab Italis Endiua & Scariola, quam appellationem pleraque officina seruant, dictum, à Græcis *Wegwart* appellatur; à German. quibusdam Scariol, vulgò Endiuier; Lonic. *breyt oder groß Wegwart* oder *wegwart*; Belg. *Endiue* / *Endiue*; Gallie. *Endiue ou Scariole*, Hispan. *Endiua*, & vt Dodon. ait, *Serraye*; Angl. *Endiue* / *white Endiue* / vel *garde Endiue*. Intybum crispum: Germ. *frant Endiuier*, Belg. *Heerolde Endiue* / Gall. *Endiue cresques*; It. *Endiua crispa*, Angl. *Curled Endiue*.

Seritur Intybum in hortis, & quod Vere fatum Locus & celeriter adoleſcit, ac ipsa Æstate floreat semina Tempus.

profert, ac deinde intercidit. Iulio verò fatum in Hiemem restat, Septembri aut Octobri tertà obrutum, colligat prius foliis, niuis instar candidum redditur, ac deinde mensibus hybernis mensis aliorum acetariorum loco inferitur. Id quod Plinius [ait Dod.] haud ignorasse videtur lib. 20. cap. 8. vbi Seridem duorum generum esse tradit: nigram æstiuam deteriorem; & hibernam candidiorem. Omnes Intybi siue Serides in Italia vulgaris sunt notitia: Lætiior multo exit, inquit Lobelius, è semine Italico, aut cuiuspiam regionis meridionalis, vnde solent lere: quidam Brabantii, Angli, & Germani Oltiores: simul ac terna, quærnæue foliola eruperunt, in solum pinguius lætamine multo trāsmouetur, lætiterioque frusto media onerantur folia, quò latiùs se porriganr luxurientque, quā industriā amarorem exiit, graniamque init cum hibernis mensis ad acetaria, seruat obruta terrā, simeto, stramineque.

Hoc olus vt Hieme tota albis & carnosus foliis suis in acetaria veniat, sapore gratissimo, colere sit debet, authore Gesnero. Circa finem Iunii feret non admodum angustè: deinde cum ad duos palmos, seu digitos octo excreuit, tempeſtate sicca, euellens cautè ita vt manu radicem inferius, i. e. remotius à capite apprehendas, & simul corrupta folia si quæ sunt separabis, & rursus plantabis, ita vt vndiquaque duobus palmis minimum distent: & folia etiam principio sui non nihil

Satio:

Cultura, & mangonia.

nihil in terram mergantur. Postea initio Hiemis, antequam nix ingruat, rursus euulsas plantas in cella vinaria seruabis, hoc modo. Soli aliquod spatium ad duos digitos terrâ recenti operies, huic plantas Intybi impones duabus aut tribus radicibus simul iunctis, donec spatium istud repleueris: tum rursus eas terrâ operies, & sic alternis. Aliqui in vili aliquo vase ligueo, cum terra vti dictum est, alternis instrata, seruant in hypogeo. Galli & Itali in hortis terrâ obruere & seruare solent: sed apud nos in hortis & gelatut facillè, & pluuuis deinde putrefcit.

Basilæa primò vidè in hortu præceptoris mei Cælii Secundi Curionis, tandem habui in hortu Geneuæ, vbi in transplantatum parum ferrebat folia lata, partium dissecta, florebatque Iunio & Iulio, non facillè ferrebat Hiemem, ideòque arenâ obruebam. Colmaria in Alfatia vrbis Medicus D. Iacob. Weckerus nô euellere è terra, sed inuoluebat stramina & circumaggerabat terrâ. Montebgardii tardiùs ferunt, transplantant, ligant & Hieme in arenam reponunt.

Magis quàm agreste refrigerat.

CICHORIUM VERRUCOSVM, SIVE ZACINTHA Hieraciis adnumerandum.

Descriptio



Radium humo tollit caulis graciles dodrantales, aut etiam cubitales, intus fungosos, ramulos ad quorum latera sessiles adnascuntur raris fl. culti, alii etiam ramulorum extremis, luteis: quibus in pappos euanescentibus, succedunt pericarpa pulcherrima verticillatim radiata, Lupini feminis magnitudine, in quibus semen copiosum, Laetue par, non ita compressum. Folia oblonga Dentis Leonis, laciniata, multa per terram sparguntur, in ramis pauca: radix longa, multis fibris donata.

De hoc Cicchorio loquitur Matthiol. in post. comm. cum mag. sig. cum ait. Est & alia Cichoracei generis planta, quam quidam Zacintham yocauerit, nobis autem ab effectu Cicchorium verrucosum appellare licuit. Radice hæc nititur Rapunculi figurâ, subnigricanti colore, adnatis circumquaque capillaceis fibris. Folia habet Cichorei, verum paulò asperiora: caules cubitales & quandoque maiores, tenues asperiusculosque, in quorum summitatibus flores oriuntur aurei, cichoracæ speciei, quibus flaccescentibus semen remanet subnigrum, capituli instar, circumquaque secundum longitudinem secti, Melopeponis modo.

Lob. in Adu. Verruca Condrilla: de qua ait: Condriillam Cicchorium illud siluestre, quod Zacyantham, vsque peregrinitatem affectans, vocat Commentator, certum est o riri in Italia,

Synonyma Cicchorium

Zacyntha, Cichor., Verrucaria

Verruca Condrilla

ne igitur è Zacyntho insula græca eam euocer. Cæterùm, dum Lobelius hoc in loco Matthiolù carpit, ipse ridendus reprehenditque videtur, vt cui non fuerit Zacyntha Matthioli nota: perperam enim putat eandem cum Chondrilla priore Clusii, id quod in Obs. scriptum reliquit, dicens. Verrucaria Chondrilla, Chondrilla prior Diosc. Clusii, Zacyntha Matth. It. Cichoria verrucaria, & Mazza di canallero, & Mazza ferrata, Angl. Gumme Succory.

Clus. Cicchorium verrucatum, Zacyntha, de qua ait. Zacyntha Matthioli, seu Mazza di canallero Italorum nihil commune habet cum Condrilla nostra priore, Dioscoridis legitima (Hedypnoide Montepellana) vt quidam censent, Zacynthæ, siue Cichorii verrucarii, iconis, quæ apud Matthiolum ineptè expressa est, facie decepti &c. Quæ res ad eò me cogit, vt Cichorei verrucarii legitimam iconem proponam, omissâ Matthioli falsâ.

Gamer. hort. Zacyntha siue Verrucaria Matthioli, Cicchorium verrucarium Gesnerii:

C. Bauhin. Phyt. Chondrilla 8. siue verrucaria. Cicchorium verrucotum satum Montebgardii anno 1581. prouenit. Hoc acceptum refert Calzolari Matth. qui plantam ad ipsum misit.

Mira huius plantæ facultas est ad tollendas verrucas. Siquidem scimus [inquit ex Calzolari Matthiol.] nos nonnullos, quorum manus verrucis admodum numerosis scatebant, sanatos esse, deuoratis in acetario semel tantum huiusce Cichoracæ plantæ foliis. Idem præstat eius semen, tribus diebus drachmæ pondere deuoratum, dum se cubitum recipiunt verrucosi. Parù certum est, authore Lobelio, semel voratâ, quod ait Commentator, & multi de aliis plurimis fabulantur, delere verrucas: illita verò posse certum, & commune illi est cum quamplurimis, quarum succo exuruntur aut exsiccantur verrucarum radices & appendices, tum calidis vt Tithymalo, tum frigidis vt Plantagine, Equifeto, intermedis vt Heliotropiis, de quo nomen verrucariæ testatur idem.

Matth. ca. 24. 24. 24.

Lob. repetit.

Cicchorium verrucaria. Non est Condrilla prior Diosc. Clusio contra Lobelium Matth. scilicet

Locus

Vires & Vires Verruca

Matth. not.

CICHORIUM SPINOSVM.



Cicchorio spinosò folia indidem pluta, ceu ex eodem puncto, alternatim oriuntur, Cichorei, angustiora, sinuata, virentia: caulis glaber in ramulos diuiditur rigidiusculos incòditos, multifariam diuaticatos, in duras abeuntes spinas, Tragacathæ aut potius Aspalathi Mòspeliensis imitatione: flores

Descriptio

ad ramorum diuaticationes, ipsorumque ad eò surculorum cacuminibus impositi, cerulei, denticulatis folijs constantes, duplò triplòque quàm

Cichorei vulgaris, minores: cui semen simile: habemus Cichorium hoc tanta copiam caulium pedaliū se diffundens, ut caput penē ambitu æquet.

Descriptio
Bell.

Locus

Caulis.

Flores

Semina

Chicorium spinosum, ait Honor. Bellus, frutex est in maritimis proueniens, sicisque collibus, & arenosis locis: folia ferens Cichoracea, profundē diuisa, crassiora tamen & minora, magisque amara, quā Cichorei vulgaris: caules dodrantales, albos, in orbem diffusos, crebris albis spinis scateantes, crinaceum quemadmodum Echinopoda totā facie representans: flores inter spinas Cichorio similes profert, colore cyaneos: quibus succedunt semina Cichorei: radice firmatur singulari, magnā ut Cichorium. Recens semine nata, autē quam in caulem abeat, in acetariis manditur, sed durior & amarior est Cichorio. Vocatur vulgō *spinosa*, h. e. Hydriæ spina, quia vulgariter in tota Creta fictilibus hydriis vtuntur ad hauriendam aquam ē fontibus, quas hāc herba obcurant, ne mures aliūdie animal intus penetrare possit, videtur enim ad hoc munus ista planta à natura formata: nam semper rotundā figurā cernitur. Hydria vulgō dicitur *spinosa* & *spinosa* spinam significat, nomine ab *spinis* corrupto: quibusdam insulā locis dicitur etiam *spinosa* h. e. Radichium stuidam, ob similitudinem, quam cum Cichorio habet, quod in Græcia vulgariter *spinosa* vocatur, & stabe, quæ dicitur *spinosa*. Huius vsus in defectu Cichorei.

Chondrilla
spinosa
Cich. spinosa
sum.

C. Bauh. phyt. Cichorium spinosum. Apud Matth. Chondrilla spinosa, Cich. spinosum D. Doldii. Ferd. Imper. Cicoria spinosa, Cichoreæ omnino similis, si excipias caules spinosos: herba Cretica. Io. Ponz. in Baldo, Cichorium spinosum Creticum Belli.

Locus.

Semen in horto Ill. E. C. terræ commisi quod dederat Frater Neapoli ab Imperato Pharnacopæo missum. Gener Io. Henric. Cherlerus attulit Patauiū, vbi colebant Cortusius & Bembus nomine Cichorii spinosi. Verū ea planta nondum protulerat flores, suaque habebat folia. Floret Iulio & Augusto, folia amara non lactescunt, & citō pereunt, etiam reliquis plantæ partibus elegantē virentibus.

HIERACIUM STELLATUM.

Descriptio



AD cubitalem altitudinem assurgit, tenuibus coliculis & ramosis, tantillā lanugine, nisi propter terram, vix hirtis, non sine foliis multis: folia primū erumpentis Hedypnoidis, & pingui solo palmari & plusquam seque palmari longitudine, sextantali & quadrantali latitudine, nonnihil sinuo-

sa, hirsuta: flores simplices, parui, Lampanæ, lutei: quibus succedunt *seminum* stelle radiatæ hirsutæ, quæ postmodum falci in modum incuruantur: tota planta lac manat.

Hieracium hoc stellatum mihi mittebatur aliquando per D. Doctorem Schuuarzium Stut. Synonymi gardiā pro Astragalo Plinii.

A Lobelio in Obs. inscribitur Hieracium Narbonense siliquā falcatā. In Icon. Plant. Hierac. Narbon. falcatum. A Tabern. Icon. & Hist. Hierac. Montspeliacum & Narbonense, habet *franz* non *Montpelier* oder *Languedoc*: Hierac. 10. A Gerard. Anglo, Hierac. falcatum Lobelii, *Prosofod hanf ewede*. A C. Bauh. phyt. & apud Martli. Hierac. 19. siliquā falcatā.

An Cæsalp. Ragadiolo similis, cuius semina stellam representant.

Abundat in loco pingui Mospelii ac circa Bononiam; Montbelgardi in horto E. C. Iunio, Iulio & Augusto.

Hieracii affinis Ragadiolus edulis.

Folii constat tenuioris Cicorii, sine lacte, & sine amaritudine: *stosculos* fert luteos in alis foliorum, & *semina* longa, & adunca: representantia autem pedes: ipsa herba dodrantalis, humi procumbens, ramosa: floris foliola ex medio semine videntur erumpere; cum tamen ex summo oriatur: nam reliqua pars vagina potius est seminis.

Cæsalpino descriptionis auctori dicitur vulgō Ragadiolus, *Ragadiolo* in Hetruria, qui assumitur in cibis crudus, ut Cichorium.

Cichorio similis Spagnin Americaurorum.

In America insula Madagascar, sive S. Laurentis, auctore Theueto, prouenit cordialis herba, quā Spagnin vocat, similis Cichorio siluestri nostrati [Gallie videlicet,] quam applicant vulneribus, & morui viperarum, & aliorum animalium, & venenatorum educit venenum.

SONCHVS MINVS LACINIOSA

mitior, sive minus Spinosa, & asperior sive spinosior,

CAP. III.



LACTE tota planta turget amaro, *caulis* inanis, cubitum altus & maior, hominē interdum altitudine excedens, ramosus: folia parum laciniata, tenera Endiuæ ferè, spinulis in ambitu donata, sed parū aut nihil pungentibus, caulī immediatē adnascuntur flores lutei, Hieracii, sed calyce

calyce glabro, qui celeriter in pappos abant, radea longiuscula, multis fibris donata : Huius similis parum aut minimam laciniata acutis & rigidulis horrens spinulis.

Theophrastus Sonchum in genere nominat, eumque inter spinosa foliata numerat, in cuius caule cum ramulorum proventu vna flosculis quoque quidam emergit : peculiari inter Acanthaceae : qui conceptus non spinosus.

Dioscorides postquam duo Sonchi genera facit, describitque : in fine capituli tertium addit. Vnum, inquit, siluestris, magis aculeatum : alter mollius, (περὶ ἀπὸ τῆς δεξιᾶς) esculentum : canis anguloso, canis (κατὰ) quae dictio quidem in vulg. codicibus non legitur, sed eam habent vetusti codices & Orb. Ergo non erit, ve aliqui putant, ex Plinio duntaxat reposita, Matthiol.) aliquando fibrubens : folia habet per intervalla in ambitu diuisa : eorum facultas refrigerandi, modicè sub stringens : vnde conferunt stomacho estanti, & iussu summationibus, & quae sequuntur : in hinc autem addit : Alter Sonchus, qui & mollis, arborea specie constat, & lato folio : totia autem caulem cingunt : & hic quoque eadem praesert.

Sed & Plinius duo genera facit album & nigrum, Lactuce similia a nobis, nisi spinosa essent, caule bicubi anguloso, intus cauo, sed qui fractus copioso lacte manat.

Galenus ait Sonchum postquam perfectè ab solutus sit, ex spinosis plantis esse.

Sonchi genera duo agnoscit Herbariorum pars maior, id quod eximè dicèdis clarè demonstramus.

Quia autem Cornar, duo tantum Sonchi genera ex Dioscor. agnoscit, eorum Dioscoridis ita legit. Sonchi duo genera sunt. Alterum agrelius & spinosius : alterum delicatius & quod editur, & quae sequuntur. At Sonchus delicatus ille ar boreum refert, quae lata folia habet : Priorem nostri Genesijstel (Carduum Anserinum dixeris) vocant : posteriorem hasenfol, id est, olus Leporinum. Quidam Palatum leporis, quod sub co lepus in aëtu latebras quaerit. Sed quam bene ita legit, videant doctiores. Ego praeterea palatum leporis existimo dicendum non palatum, quia leporibus gratus cibus. Corn. etiam suo more Sonchum distinguit.

Cord. histor. Sonchus asper maior & Sonchus asper minor, caule pedali, foliis per ambitum maioris modo spinulis horrido. sapore amaro.

Mitor autem Tragum diligentem stirpiū Germanicarum indagatorem ita negligenter descripsisse Sonchū vt dūcile sit intelligere quid velit. Quae dicit de radice serpente non conueniūt Sonchis asperis dictis multis, quia eis non repunt : sed illi qui multis dicitur Hieracium : cui Soncho multa etiam conueniunt quae in postrema descriptione ponit. Sunt (inquit Fuchl.) qui Lactucellam & Lacteronem appellant, à copioso lacte, quo canlis eius dilectus diluunt.

Fuchsius (quem sequitur Amatus, cuius figuram etiam exhibet) suo more non describit particulatim, nec distinguit Sonchi alterum genus siluestris, aculeatus & nigrius, quod Sonchum asperam in Hist. & Iconibus inseribit, à Soncho non aspera : Icon quam proponit est Sonchi folio minus laciniato, quantum nos ex eo proponimus.

Dodon. gall. Sonchus siluestris, aspera. Sonchi species 1. Lat. n. m. Lat. in fol. Sonchus asperi spinosior alter asperior ac siluestrior cognomi-

natus. Item Sonchus, asperior marinus. Figura Dodonaei gallici est folio non laciniato fuchsi, cui non responderet descriptio. Latino est Sonchus asper, qualis Lobelio, non laciniatus.

Casalp. Sonchus latiore folio ac minus folio.

Gesl. eat. pl. Sonchus siluestris, spinosior, 272. Xos 272. Xos, wilder hasen foli / Seudistel. De coll. stirp. Sonchus agrellis marginibus foliorum aculeatis. Item Sonchi genus silu procerum, luteis floribus, subdulce, foliis non dissectis, angulosis, rotum laeue, sine aculeis. Item Sonchus pinguis caulibus & nervis rubicundis. Sonchum nigrum Gesneri peccius repono sub non laciniato, quia mihi in Sonchorum genere spinosior & nigrior videtur non laciniatus.

Job. Aduerf. Sonchus aspera vulgi, flore Hieracii, totius Dentis Leonis : aliàs Duplaci & Lactuce, an Dioscoridis arboreus Sonchus tenerior latifolia? Cae. roitam Latini & Itali etiam nam vocant, & canini spinum anserinam. Spinosa namque sunt omnes Sonchi, sed quaedam horridiuscula aculeis, quaedam perpassillis aut nullis ferè vitunt. Quam am duc frequētiores maiores spontè cultis & incultis legibus & vineis : minoribus obaera. Asperi prae vocant, caulem erigit quaternum & senum cubitorum : vni folia laciniata Dentis Leonis, Alteri verò Lactuceae. Obf. Sonchus laeuis tenerior latifolia. Icon. Pl. Sonchus aspera vulgi flore Hieracii foliis Dentis leonis, aliàs Duplaci & Lactuce. Itē Sonchus tenerior aculeis asperior aut horridiuscula. Icon. Pl. Sonchus laeuis tenerior Icon proposita à Lob. in Obf. responderet Fuchianae à nebis propositae.

Hist. Lugd. Andryala maior D.J. Item Sonchus laeuis latifolius Lobelii. Item Sonchus asperior Lobelii. Non placet Hist. diuersis capitibus scribere de Andryala & de Soncha.

Andryala maior Dal. (inquit Casp. Bauh.) Icon Sonchi asperi Fuchii, & Sonchus laeuis latifolius Lobelii sunt idem.

Thal. Hircyn. Sonchus laeuis maximus (scilicet cubitalis, foliis dodrantalibus, cretatis parum, sed non profundè dissectis, in ambitu spinosis, sinuatis.

Schauenckf. Sonchus asper, 272. Xos 272. Xos, Carduus nullus, Cichorium porcinum. Endimia spinosa (scilicet) Seudistel.

Sonchus aspera folio non laciniato, spinosa valde : Genesij Iunio : Basileae quoque prouenit & Monspelii, florens Aprilis. Montbelg, frequens in Horto Ill. E. C. Wirtemberg. curi spinulis molliibus, ac etiam hominem altitudine excedens loco humidiori, florens Iunio.

SONCHVS LACINIATVS NON SPINOSVS & spinosus.

Pama, fibrosa, albāque radice nititur : caule cubitali & ampliore, intus concavo, purpurascēte : flos longa, laeuis, ferè glauca, & Dentis Leonis diuisura, latiora, teneriora, lacte praegnantia, alternatim prodeunt, aliās pediculo longo, aliās nullo, sed latiore basi caulem amplectentia, in circuitu quasi dentate, in quibus vel nullae spinae, vel molles : flores foliis lutei, Dentis leonis minores, quorum extrema folia aerea parte purpurascūt, & in pappos abeunt. Semen paruum oblongum, & in fusco tubens. Sonchus laciniata saepe spinis horret ac multum variat, vel foliis amplioribus, spinis minus rigidis, vel minoribus.

ra
regeridis
no. c. reff.
nitur.

error quo
undam

onchi duo
erbario
um.

eritium
onchum
g. at
orn
ardus
seruus
lus lepori
um
alatum
poris
orn. v. c. f.
atur
alatus
poris

rag. 24
utur

us. 27
lunt not.

Dod. not.

Gesl. referit
lur.

Spina an
serina.

Lob. reff. 272.

Andryala
maior Dal.

Locus &
tempus:

Descriptio

bus foliis, rigidioribus spinis.

Describitur autem Cordus hac Soncho leni aut laui, Sonchum nostrum laciniatum non spinosum siue mitiorem. Tragus

Sonchus laciniatus non spinosus.



Sonchus laciniatus spinosus



Zaus duo genera.

Matthioli errores plures.

de eo quicquam, quod equidem legimus, memoriae prodiderunt Theophrastus, & Plinius. Ait idem in comm. cum mag. fig. lat. & Ital. Folia utraque Sonchus profert Cichorii modo laciniata in aspero crispata, aspera, & pungentia, fibrubentiaque. In laui vero leuia, & spinis nullis rigida. Huius duo habentur genera: quae tantum foliis aliquatenus differunt, nempe eorum alterum laciniatis habetur foliis, minus quoque laciniatis, ac etiam magis extensis. 1. Sonchus aspera. 2. Sonchus lauis. Sonchus lauis altera. *Nic opus haberet Matthiol. spongia maxima glossatorum & patrocianiana pro expungendis erroribus. Quam olim posuit pro Soncho aspero sine descriptione, ac in postremis retinet, est laciniatis Söchus mitior non spinosus, cui tamen in postremis tribuit*

folia aspera & pungentia. Quid proponat pro Soncho plano in primis com. & postremis pro laui altera asserere non auiam. Lectores considerent an intelligat Sonchum lauen Lob. de quo agemus sub Soncho Terraecepoli. Quam proponit in postremis pro Soncho laui nescio, nisi sit noster Sonchus radice reptatrice, de quo postea, quem etiam pro Hieracio maiore exlubere putamus. Matthiolus non sibi constat: nec distinguit bene suos Sonchos.

Lac. in Diosc. Sonchus asperus, Sonchus lauis: proponit duas similes icones, non possum animaduvertere qua in re differant, sunt autem Sonchi laciniati non spinosi.

Lonic. S. and. s. f. Endiuiua filu. Item Chondrilla alia species Dioscoridis, quorundam *sand. s. f. s. f.* Lonicus nescit suo more quid pingat, scribatque. Duae icones habet Sonchi laciniati: primo loco descriptio non respondet iconi, describit enim Lactucam filu.

Dodon. Gall. Sonchus tenerior non aspera. Söchus lauis prior, Brassica Leporina, Sonchus tenerior. In Hist. Gall. est icon Fuchsi folio laciniato spinoso, cui non respondet descriptio: In fol. Lat. Sonchus lauis figura qualis Lobelio, folio laciniato non spinoso.

Sonchus (inquit Cæsalp.) quæ vulgò Cicerbita vocatur & alicubi Crespinulus; Quaedam in vineis frequens & in aruis locis cultis: Alia in rudibus nascitur: Quaedam in collibus vmbrosis & siluis nascitur. Quaedam in montibus caule bicubitali.

Camer. ad Hist. Matth. germ. & Epit. eiusdem tres nouas icones proponit à Matthioli diuersas. Prima titulus est in Hist. Sonchus aspera (Sonchus in Epit.) Alteri Sonchus lauis: Tertia Sonchus lauis altera. Harum prima, quæ melius placet, est foliis laciniatis, acceditque ad nostram laciniatam lauem, siue minus spinosam: quæ verò lauis inscribitur spinis pluribus scætet: tertia quæ sit, adhuc me latet. Hanc ait Camer. vulgò vocari Cicerbitam, & in Italia Crespinum & Crespinulam.

Gesn. cat. pl. Sonchus candidus tener & esculentus, *szyses idu d. h. g.*, quem Diosc. Cicerbitam à Romanis dici prodiderit, quod nomen adhuc hodie in Hetruria seruetur, ab Herbariis nonnullis Leporis palatium vocari, quod fortassis eadem Apulei Lactuca Leporina fuerit. Item Sonchi genus 3. tenerum, arborefcens, à solo Dioscoride descriptum. *szyses tres o xui r. u. r. e. s. i.* Ipsi autem hasen fôly latiore folio. De hort. Sonchus asper & lauis, Lactuce quaedam species siluestris.

Lob. in Adu. Sonchus lauis laciniatis foliis, Germ. *hasen fôly*: Belg. *hasen latave nude*. It. *Cicerbita s. f. s. f.* Oleracea tamen esse potest, tamen quia non colitur non manditur. Obs. & Ic. pl. Sonchus lauis vulgaris foliis laciniosis, Dentis leonis.

Clus. Hist. post. Sonchus lenior vulgaris prima (est eadem cum Lobely icono), Sonchus lenior vulgaris secunda. Clusius has binas lenioris vulgarissimi Sonchi species non describit, sed eas in unum finem tantum in illo capite rarioribus Sonchi generibus præfigit, vt hæc ab illis commodius ab inimice fecerit & distingui possent.

Hist. Lugd. Andryala minor Dalechamp. Söchus Fuchsi. & Dodon. alter hamilior, tenerior & spinis cærens. Item Sonchus lauis laciniatis foliis

Lac. nor.

Lonic. gnatus.

Dodon. Gall.

Camer. ad Hist.

Cicerbita. Crespinum. Palatium leporis. Lat. leporena. Apulei.

H. Lugd. nor.

foliis, Lob. 1. Sonchus Asper Matth. 1. Sonchus laevis 3, Sonchus laevis altera, Matth. 4. Quod ante dixi iterum nunc dico, displicere historiam ponere Andryalam alio capite, quam capite de Sonchis. Icon pro Andryala minori est Fuchii quae non caret spinis, indicante ipsa icone: carent spinis Sonchus Lobelii laevis, & Matthioli asper, quas duas icones eiusdem plantae existimo. Cur duas leues ex Matthiolo ponat nescio, cum sit tantum ea quam olim pro laevi primo, & postea pro laevi altero pingit.

Tabern. Icon. & Hist. Sonchus asper. Cicerbita aspera, Gänzfistel / Sänwdistel / wilder Hasenföl. Item Sonchus laevis latifolius, Breyter Hasenföl. Sonchus laevis alter luteo luteo, Geeler Hasenföl. Sonchus laevis tertius flore niueo, Weisser Hasenföl. Non displicent Icones tres Tabern. pro Soncho laciniato minus spinoso: foliis variè ludit haec planta.

Frater C. Bauh. pro Soncho aspera Matthioli, ponit iconem Tabern. folio laciniato spinoso, pro laevi laeuem Tab. laciniatum.

Schuenckfeld. nos.

Schuenckfeldius vt stipulat Synonymis incedat, idem bis ponit, & quidem primo graecum, *σύνχρητον* Secundo Latinum, Sonchus esculentus. Et haec ab iniuicem more suo separata, tanquam diuicta sonent. Tautologiam committit, numquid doctè sentit?

Locus & Tempus

Sonchum non spinosum laciniatum vidi Mōspeli: vt & Basileæ adhuc florentem Octobri, extra urbem inter portam Stein & Eschen. Geueus passim in horticis florens Nouembri. Montbeig urdi passim spontè, etiam in Horto E. C. folio laciniato spinoso.

Nomina linguarum in genere

Sonchus in genere vocatur à quibusdam Cicerbita, & Lactucella, teste Cordo in Dioscor. Germ. *Schwelke* & *Hasenföl*. Brasica leporina, item *Sänwdistel* / *Geisdistel* / *Mosdistel*. Belg. *hasel latronwe* / *Gansendistel* / *Mielckwey*. Gall. *Laijeron* & *Laijeron*, *Palais de Lieure*. Ital. *Lattucella*, *S. nicho*, *Cicerbita* seu *Crespino*, *Cripini* & *Latifoli* Lob. nisp. *Corayas*, *Cerrayas*, *Cerrathas*. Cicerbita & *Sänwdistel*. Boh. *Miles*. nüg. Sonchus asper, *Bastisch*, Sonchus laevis *Pie Fef*. *Σύνχρητον* Graecis dicitur, sic & Lar. Sonchus, *ἀρόνη* *σύνχρητον*, id est, quod salubrem fundat succum.

Sonchi Erymon.

Cicerbitam à Romanis vocari, quo vocabulo etiam hodie necturria vitur, in quibusdam Dioscoridis exemplaribus legitur. Sed nomen id recens Dioscoridi attributum putat Ruellius, cum nusquam à Latinis usurpatum inueniatur. A Recentioribus etiam Lactucella, eademque fortasse quae ab Apuleio Lactuca leporina nominatur, quod cum leporem animus deficit, estu hanc sibi solet mederi, Galli *Laijerons* à lactis copia nominant, & leporis palatum, *Palais au lieure*, quod hoc animal vt ab estu vindicetur, & caloris propulset incommoda, solet sub ramis eius decumbere.

Cicerbita nomen Dioscoridi attributum.

Hi Sonchi nascuntur in hortis, campis, & vineis, Aestateque florent.

Vires & Temperis. Ad inflammationes & Venenationem idoneum.

Vtriusque vis refrigerat, inquit Dioscorides, modicè adstringit, æquanti stomacho, & inflammationibus illi profunt. Succus eorum stomachi rofiones forbitione mitigat: lac elicit, in vel lere appositus sedis ac vuluæ collectionibus opitulatur. Tam herba quam radix illita vibratis à scorpione ictibus subuenit.

Galenus de Sonchi viribus hæc scripsit. Sonchus vbi adoleuerit, ex spinosis plantis est. Cæterum viridis etiamnum & tener estur, perinde vt cætera olera siluestria: Temperamentum e-

ius quodammodo mistum est: Nam & adstrictionis cuiusdam est particeps, & siue cataplasmatibus modo illinatur, siue edatur, apertè refrigerat: postea verò quam planè ressecatus fuerit, terreste eius temperamentum redditur, modicam habens caliditatem. Quæ præterea Plinius scripsit scire operæ prætium est. Estur & Sonchus, vt quem Thefeo apud Callimachum apponat Hecale, veterque albus & niger, Lactuce similes ambo, nisi spinosi essent, caule cubitali, anguloso, incus cauo, sed qui fractus copioso lacte manat. Albus cui est lactis nitor vtilis orthopnoicis, Lactucarum modo (ex embammate addit Cornarius ex veteri Pliniano codice.) Erasistratus calculos per vrinam pelli eo monstrat, & oris graucolentiam commanducato corrigi. Succus trium cyathorum mensura in vino albo, & oleo calcfactus adiuvat partus, ita vt à partu ambulè grauide. Datur & in forbitione. Ipse caulis decoctus facit Lactis abundantiam nutricibus, colorèque meliorem infantium: vtilissimus iis que lac coire sibi sentiant. Instillatur auribus succus, calidusque in itraugitia bibitur cyathi mensura, & in stomachi rononibus cum semine Cucumeris nucleisque pineis. Illinitur & sedis collectionibus. Bibitur contra serpentes scorpionèque, radix verò illinitur. Eadem decocta cum oleo in Punicis Mali calyce, aurium morbis præsidium est. Hec omnia ex albo. Cleomporus nigro prohibet vesici, vt morbos faciente, de albo consentiens. Agathocles etiam contra sanguinè tauri demonstrat succum eius. Refrigeratoriam tamen vim esse conuenit nigro, & hac causà imponendum cum polenta. Sic enim Cornarius ex eodem veteri codice.

ex Plinio

Album

Plin illu. stratur. Calculum Partum suuat Lac generat caulis

Stranguriam

Soncho nostri vtuntur hyeme in acetiariis, inquit Matthiolus, præsertimque eius radicibus, quæ cum tenera sint & dulces, mensis expertuntur. Lacteus liquor è caule manans datur potadus [Lectores considerent quomodo liquor lacteus excipiendus & potadus, ægrè spirantibus, & asthmaticis. Idem auribus instillatus dolorem tollit, præsertim in malicorio cum oleo decoctus. Tam herba quam succus ad ætuosas stomachi lincinationes & hepatis biliosas obstructions vtilissima: obid Tertianis & putridis febribus conuenit. Sonchus laevis vulgaris non differt facultatibus. Ex vino stomachi fluxionibus medetur. Suspiciosos & Asthmaticos iuuat & stranguriam sanat. Succus auribus instillatus earum dolores mulcet.

In acetariis

Stomachum

Obstructiones biliosas. Febre putrida.


SONCHVS REPENS MVLTIS HIERACIVM MAIVS.

Sonchum repetem voco, quem multi Hieracium maius, cuius radices longè latèque repentes non nisi difficulter euelli possunt, perennes, lactifluæ: caulis bicubitalis vel longior inferiori parte glaber, ibi demum pilosus, vbi in ramulos diuidi occipit: folia & per terram sparsa & quæ cauli adnascuntur, Sonchi laevis foliis similia, palmaria & plerumque bipalmaria non admodum lata, profundis laciniis incisa, spinis mollicellis donata, colore ferè glauco: flores quam Sonchis reliquis paulò maiores, lutei, hirsuta foliorum atro rucentium compage coërecti, qui tandem in pappos abeunt. In icone nostra Fuchiana radix repens deest.

Descriptio

An Cordo in Diosc. Hieracium maius, in tyb agrestis species, Germ. *wilde serwidistel*.

Hierac. minus Fuchsi.



Fuchsius cum Hieracii maioris figuram ponat in Historia, itemque Iconibus sine sufficienti descriptione, iudicamus eius Hieracium idem cum nostro Soncho repente.

Picturam eandem, quam nos ex Fuchio habemus, exhibet Dod. gall. pro Hieracio maiore, siue primo, quod graece vocari tradit ἱερᾶκιον τὸ

μαζα à Lat. quibusdam Sonchiten, Lamplucam, & Sichelean.

At arch. 10. prob.

Sed & Matth. in prioribus comm. figuram Fuchsi habet pro Hieracio maiore, sine tamen descriptione. In post. lat. & It. item Hist. Germ. & Epit. [hic vox minus omilla] Cameratii, eadem figura eodem titulo ponitur.

An Lob. in Adu. Sonchi tertia species à Matthiolo picta? Idem in Obs. & Icon. Plant. imaginem figuræ Fuchsi similem habet, in inscriptione, Hieracii maioris.

Lacuna. no.

Figuram quoque ferè eandem cum icone Fuchsi habet Lonic. hoc titulo: habichs fraut, aur wilde sawdsiel. Graeci, inquit, Hieracium maius h.e. Accipitrinam, Apuleius Lactucam siluaticam, Pharmac. Cichoream luteam, vocant.

Hist. Lugd. Hieracium minus Dalech. maius Matthioli.

Sonchi nostræ repentis sub Hieracio maiore solam picturam sine descriptione exhibet Lacuna.

Clus. Pannon. Sonchus; Sonchus læuis altissimus, seu & Hist. poster. ubi Sonchus læuor Austriacus quintus altissimus inscribitur.

Tabern. Hist. & Ic. Sonchus 2. siue læuis angustifolius, son den fraut, hasersöl mit schmalen bletern. Item: Sonchus arborelscens, Baum son den fraut.

Thalio Hieracium maius, siue Sonchites.

Camer. hort. Hieracium latifolium Matthioli. An Camer. per hoc intelligat plantam quam demonstrare videtur figurâ Matthioli, dubito. Lectores perpendant. An Cæsalp. Hieracium magnum.

C. Bauh. Phyt. lib. 3. Sonchus luteus calyculo hirsuto: Sonchus terrius, vel Sonchus læuis altissimus, Clusio: Sonchus arborelscens Tabern. Item postea Hieracium maius primum, Hieracium maius Fuchsi, Lobel. Obs. & Icon. nisi vna planta & non diuersa.

Schvv. Sonchus arborelscens, ἱερᾶκιον τριπέδες Dioscoridis, à vulgari magnitudine differens.

Sonchus repens, multis Hieracium maius, seu ἱερᾶκιον aut ἱερᾶκιον, Germ. Groß habichs fraut: Gall. Grande Cichorée jaune: Belg. Grot hauts fruits: Dod. & conueniunt Tabern. Angl. hawke roode Lobel.

Nomina linguarum

Locus & tempus

Inuenitur Sonchus læuis altissimus Clusii in paludosis salicetis & harundineris, iuxta pisci

nas, stagnantes aquas supra Badam Austric vrbem, via quæ Napolim Austriæ ducit, & supra Triebvinkel pagum, Floret Iulio. Sonchus repens, molesta suo reptatu Montbelgardi in horto ill. C. W. & in agris prope Audincourt ad Dubium abundat, & passim libi. Geneuz quoque obseruatur, florens Iulio & Augusto.

Cum porro hæc planta Sonchi sit haud dubiè genus, iidem etiam facultatibus præditam esse vtilissimè est.

Facultates

SONCHIS AFFINIS TERRACREPOLA.

Radice[m] habet Intubo similem, parum fibratam, candidam: caules multos, cubitales, foliatis: folia Intubo familia sunt, candidiata, minus infecta ac laciniata, succo lacteo manantia, gustatu suaui, licet nonnihil amara sint: flos luteus in pappos euanesce[n]s.

Descriptio

H. Lugd. Crepis Dalechampi. ἑρπυλλοειδὴς Crepis (inquit Histor.) est Theophrasto, i.e. in caule

Dalechampi



foliata, cuiusmodi cum sit hæc planta, & eam seruatoadhuc Crepidis nomine Crepalo vocent Itali, & Terracrepalo, Crepidem esse Theophrasti indicauit Dalechampius. Oculi siluestre, in Hetruria, antea Cæsalpino, Terracrepolum vocatum, Dioscorides Hieracium paruum appellat, Plinius & Theophrast. Crepidè vocant.

Terracrepolus. Hieraci paruum

Nascitur spontè in aggeribus terrenis agri Montspeliensis, satù verò cultu in hortis nostris (Lugdunensibus) inquit Dalechapius. Oriri eam scribit Cæsalpino in collibus saxosis & in ædificiis: florere tota Ætate: Hieme nequaquam perire: nam regenerare à latere. Vidi ego Auinioni, & Lutetia in horto cuiusdam Monachi.

Locus & tempus

Herba Terracrepolus in cibis cruda ex oleo & aceto [vt ipsemet Auinioni vidi] expetitur, nam dulcis est & subastringens.

Vires

CHONDRILE VETERIBVS.

C A P. IIII.

Aliqui, vt Dioscorides tradit, Chondrilen Cichorion, & aliqui Scrin vocant. Eius duo sunt genera: Prior quidem folia & caule[m], & flores Cichorii familia habet: vnde & speciem Seridis syluestris esse ipsam quidam dixerunt: sed in totum tenuior est. At circa ramulos ipsius reperitur gummi simile Mastiche, magnitudine Fabæ. hoc cum Myrrha tritum, magnitudine Oliuæ in linteo appositum, menses ducit.

Cichorion. Scrin.

Herba

herba ipsa una cum radice confusa, ammixto melle in pastillos efformatur, qui diluti nitro addito, vitiliginis dererunt. Gummi verò etiam pilos agglutinat. Sed & radix recens ad eadem facit, si in ipsam acus tingatur, & pilis admoveatur. Commoda est etiam ad viperas cum viâo pota. Et succus ipsius aluum fistit, coctus cum vino & potus, aut per se ipsum. Est & alia Chondrilles species. Foliis habet circumrosium, oblongum, per terram stratum. Caulis succo plenum. Radicem tenuem, acutam, leuem; rotundam, substantiam, succo plenam. Vini habent concoquendi & folia & caulis. Succus autem pilos in palpebris agglutinat. Nascitur in terræ cultæ locis.

Chondrille alia.

Vires

Plin. nat.

Condrilem speciem Seris esse, Galenus in Seris tractatione dixit: quam etiam, vt & Diosc. & Cichorion, & Serim vocari tradit. Plinius utraque species inter se confundit, & quæ Diosc. duabus, ipse tanquam vni attribuit. Præter vires autem à Dioscoride recensitas quas etiam habet, tradit: Aliquos feminis & oculis, generationique virosum contrariam putasse. Inter vulgares in cibo herbas etiam Chondrillam recenseri. Chondrillam amaram esse, ac acri in radice succo.

Chondrilla, iuxta Rob. Constantini mentem, est herba Cichorio similis, ob idque *χικωρίδιον* quidam vocarunt: apud Gal. & Paulum *χικωρίδιον* scriptum, apud Diosc. *χικωρίδιον*, apud Plin. Còdrillon sive Condrielle, & alibi Condrylla, quæ melius scribitur per *χικωρίδιον* monente Gesnero, qui suspicatur apud Theophr. pro Andryalia legendum Chondrilla. Hæc dicta fuit, *χικωρίδιον*, quod est grumus, & *χικωρίδιον* quod continere significat, quasi continens grumos, quos Masticha similes esse ait Dioscorides.

Theophr. corrig.

Chondrilla Erymon.

Chondrilla species plu. nes.

Chondrillaceorum generis plantas plurimas passim, easque diuersas admodum specie reperire licet apud Authores, quæ vix quilibet facile & dextrè certis nominibus Thaliò teste, à se inuicem distinxerit: præsertim cum rei herbariæ Scriptores, Intybacorum ac Chondrillaceorum [quorum tamen vbius ferè locorum ac terrarum ingens copia sese offert] historiam nondum accuratè examinari: Solis enim aut nominibus proposuerunt: aut etiam folis nudisq; descriptionibus delinearunt, non adhibitis iconibus: aut saltem appositis figuris & nominibus descriptiones earundem neglexerunt. Solo nomine proponit C. Bauh. Phyt. Chondrillam 16. sive spinosam. Hanc, inquit, integram cum nondum habeam, eâ nominasse sufficiat. Nec dum scio quæ sit Chondrilla illa, ein wild Endmien art Gesneri in cat. pl. Item Chòdrilla altera, ein Gänßzugen art, quas solùm nominat.

æquiuoca Chondrilla arulea. lutea. Vinica.

aciniata quadam Chondrilla ubente flore. odr. cretica semia crispa Chondrilla halis. seracium minus hirsutum

Cæterùm è diuersis Au-
thorum Chondrillis, est nobis quædam, quam cæruleam inscribimus. Est & alia lutea cognominata. Sed & Chondrillam vimineam à iam dictis diuersam statuimus. Occurrit præterea Chondrillis affinis quædam laciniata, an Trinciatella Camerarij Chondrilla adhuc quædam existit hirsuta rubente flore. Sed & Chondrilla Creticæ nomine quædam nobis missa est femine crispæ, de quibus nunc ordine dicam. His subiungimus Chondrillas quasdam ex Thaliò, quas ex foliis nudisque descriptionibus, non adhibitis iconibus discernere admodum edit operosum. Tragus in super lib. 1. cap. 91. duas tradit Cichoreæ luteæ species, tertiam & quartam, quas Chòdrillas Dioscoridis facit: Nos Hieracium minus

hirsutum. Chondrilla Thaliò *χικωρίδιον* duplex, maior & minor, ac rursus alia species cui folia magis in laciniis diuisa existunt, An Hieracium 1. Dod. minus, & longius radicatau Lobelii: Galenus, inquit Anguillara, meminuit cuiusdam Chondrillæ de qua non locutus Dioscorides, quæ nihil aliud est, quàm planta quibusdã dicta Taraxacon, Hedypnois nostra, siue Dens leonis, Chondrilla altera Dod. Thaliò. Chondrilla prior Clusio plurimum accedere videtur ad primam Dioscoridis Chondrillæ speciem. Est hæc nobis Hedypnois Montpell. Chondrilla secunda Dioscoridis Rauuolfii, est nobis Conyza marina. Chondrillæ alterius Dioscoridis genus aliud eiusdè Rauuolfii, est Conyza marine affinis. Chondrillam alteram Dioscoridis Fabij Columnæ, exhibemus pro Cichorio bulboso. Chondrilla Galeni, si Trago non sit contradicendum, est *βελιζαρία* Dioscoridis, Lactuca siluestris Fuchsi. Chondrilla alteram speciem Dioscoridis, *σαυδιστιλ* Loniceri l. 5. cap. 74. (qui eandem antea posuerat pro Endiuia siluestri) diximus ante Sonchum non asperam. Quidam curiosi apud Monardem volunt Tragopogonem Hispanicum siue Scorzoneram, Chondrillæ esse speciem, cuius mentionem facit Dioscorides, verum multùm differunt. Chondrillæ nomen sibi vendicat Cichorium verrucosum: Item Cyanus, Caranace quorundam, & Cyanus folio Ceterach quorundam. Est tandem Chondrilla à nobis inuenta folio non dissecto.

Hedypnois siue Dens Leonis

Hedypnois Montpelliana

Conyza marina

Conyza marina aff.

Cichorium bulbosum

Erüca, silu.

Sonchus non aspera

Scorzonera

Cichorium verrucosum

Cyanus, Caranace

CHONDRILLE VEL CHONDRILLA cærulea.



Chòdrilla cærulea caules erigit cubitales, recetes, leues, fungosâ medulla referros, ramis fatris frequentibus brachiatis: folia priota palmata aut dodranta- lia, laciniis ad Cichoreum accedentia, glabra, & pene glauca, superiora autè profundioribus laciniis incisa, leuius

Descriptio

etiam aliàs dissecta, glabra: in summis ramorum flores, crebri, radiati, cærulei, ex calyce lógo squamato, in quo semen nigrum longum latum: radix perennis simplex, longa, digitali crassitudine, paucis fibris donata foris tenui & nigro cortice vestita: intus candida, carnosa, tenera, & admodum fragilis. Tota herba lacteo turget liquore, & gustu dulcis est. Chondrillam nostram cæruleam Cordus in hist. inscribit Chondrillam tenetam. Matthiol. in suis comm. Chondrilla 1. & Chòdrilla 2. De prima ait. Siluestris (veri, in comm. Ital. cum mag. fig.) Cichorii species Chondrilla est: gracilioribus tamen foliis, caule, floribus, ac

femine. Frequentissima hæc non modò in Hec-
teuria: & secus vias virefcere, ac suo tempore
florefcere confpicitur: nec minùs etiam quàm Ci-
chorium in acetariis recipitur, quamuis a-
mator sit. Vifitur & alterum genus (ait de
fecunda) huic [primæ] non longe difsimile, fo-
liis tamen non ita in ambitum laciniatis, nec a-
dèd in mucronem definentibus. Hæc à la-
cteis vberitate, quo in omni parte, præfertimque
radice redundat, à noftris vulgò Lattaioula voca-
tur. Rura eam fuis acetariis pro Cichorio indiffe-
renter admifcent. Gall. 8. simpl. Chondryllâ Inrybi
fpcciem: libro autem 2. alim. nec Intybo nec Ci-
chorio, fcd Lactuce fimilem fecit. *tinam* Glofso-
tores & Patrocianates Matthiolo ac eius Simia
lucem aliquam atuliffent, vel errores Marthioli
detexiffent, fi potuerunt intelligere aut animad-
uertere, ipfe nunc lubens tacerem: nec veritarem
detegendo odium mihi crearem fautorum Mat-
thioli: vt dicam quod fenitio, Matthiolum fuo
more de incognitis fuo nomine fcripiffie mihi
perfuadeo. Figura quam exhibet in com. citatis
Lat. & Ital. pro Chondrilla. Cichorium planè
demonftrat filuefcere, ficut & ipfa defcriptio: [ex
Cichorio fortè elicta planta quales plures habet]
quod idem putauit cum Chondrilla: In hift. ve-
ro Germ. longè aliam exhibuit iconem quæ Hie-
racium repræfentat. Quod 2. figuram attinet ea
vbi que fimilis. Verùm defcriptio multùm variat,
in com. tum Lat. tum Ital. dicit folia non
ita laciniata nec in ambitum definentia, quæ ver-
ba non continentur iconi propofite: meliùs ref-
pondet defcriptio Germ. Falſum quod dicit
ex Drofc. Chondrillam eſſe ſpcciem Cichorii, ita
enim ait Dioſc. *αἰδὲ αὐτὴ τῆς ἑτέρας ἀγρίας ἀ-
τὸς ἴσται.*

Camer. hort. Chondrilla purpureo flore, radi-
ce craſſa, naſcens in montanis locis Milnia ſive
Hermundurorum propè vrbes metallicas. Item
Chondrilla flore cæruleo, Italis *Caccia lepore* co-
gnominata. Quæ autem fit Chondrilla purpurea
Camerarii à ſtirpium ſtudioſis auidè ſcire deſi-
deramus, per cæruleam exiſtimamus Camera-
rium intelligere eandem quam nos de qua hoc
capite agimus, quamuis apud Matthiolum in
Hift. Germ. eiusdemque Epitome nullam propo-
nat iconem hanc referentem. Chondrilla eius
prior eſt Matthioli referens H. craciua. Chon-
drilla alterius nomine exhibitæ icon, iconem
Matthioli non repræfentat, cuius autem fit plan-
tæ nondum mihi conſtat.

An Lotic. malam figuram exhibenti, Chondril-
la, quam Endiuia ſpcciem dicit? An Anguill. E-
piſt. 7. Chondrilla Patavii Caccialepore dicta?
Dod. gall. Chondrilla, Condrilla ſpecies 1. Con-
drillon & Condrilla Plinii, Cichorium & Seris
nonnullorum. Modernorum Condrilla maior.
Lat. in fol. Chondrilla altera. Caſt. Dur. Condrilla
etiã Italis & *Terracrepolo*, Arab. *Candarel*, flore
modò cæruleo, modò albo: Condrilla prima.
Item, Condrilla altera.

Lob. & Pena Adv. Belgarum Condrilla cæru-
lea, Cichorii ſilv. aut Eruce ſilv. d. u. ſura. In Ta-
bella, Condrilla Belg. *Toraxacon* Offic. Obſ.
Chondrilla cærulea. It. Pl. Condrilla cærulea
Belgarum.

Caſalp. Condrilla in aſpetu ſaxoſis naſcers
Lactuce ſilueſtri maximè ſimilis, floribus cæru-
leis, qui color in nullo alio genere ſilueſtrium
adhuc viſus: Condrilla à Dioſcoride primo loco
deſcripta, Chandras Theophræſti, Chandralia

Theodori.
H. Lugd. Chondrilla 1. Matth. Chondrilla 2.
Matthioli, an Chondrilla rara Lobelii? Proponit
Hiftoria iconem Matthioli Cichorio ſimilem, &
alteram valdè lacinoſam: nullam lucem adfert,
ſed ineptè inquirit an Chondrilla rara Lobelii,
quæ planta plurimùm differt, nec eius generis
dici poſeſt.

Tab. icon. & hift. Chondrilla cærulea 2. Chon-
drilla latifolia cærulea. Alba ſolo colore albo dif-
fert à cærulea. Latifolia differt magnitudine radi-
cum & caulium, & quòd folia latiora, non ita pro-
fundè ad neruum vſque incifa. Chondrilla dicitur
Serap. l. ſimpl. c. 43. Candarel, Amiron, & alibi
Cadaron. Non etat opus iconè albæ ſi tantùm
colore differt, vt ait Tabern. ſuſpicio non diuer-
ſam ſpcciem latifoliam, quia non annotat vbi
obſeruarit, fortè luſus tantùm nature.

Caſp. Bauh. Apud Matthiolum pro ſecunda po-
nit latifoliam cæruleam Tabern. quæ in Phyt. eſt
3. Quam cur ſubſtituat Matthioline ſecunda igno-
ro, ei enim ſimilior, ſi non eadem Chondrilla
cærulea prior Tabern. Quæ etiam occaſio vt ſecũ-
dam chondrillam Matthioli dicat latifoliam non
video, cum folia ſint in iconè Matth. tenuiùs laci-
niata, quàm in prima.

Chondrilla vel Chondrilla, *χονδρύλλιν*: Germ.
flein ſonnenwirbel/aliquibus ſleinwirbel, cord.
Blaw Condrollen fraut. Tab. Gall. *Letteron*, Hiſ-
pan. *Letugas* & *Lechugas* & *Lerugas* & *Liechugas*
dentre los planos, Lob. Ital. *Terracrepolo*, Condri-
lla, Matth. Boh. *Focy Lecce*.

Chondrillam cæruleam primùm repeti in mō-
te prope Tubingam prouenientem cum eſſem a-
pud Fuchſium qui tunc Chondrillam mihi nomi-
nauit. Vidi copioſè Biſantii paſſim in muris. Ex
ſemine Bizantio allato prouenit Montbelgardii in
horto E. C. florens & ſemen proferens Iulio. Eo-
dem anno quo ſata. Prouenit in colliculis vbi ter-
ra argilloſa propè Baſileam. Naſcitur & alibi edi-
tis apricifque vineis & montibus, ſolum amàs al-
bicans, pingue & calcario lapidi mixtum: vt an-
notat Cordus.


CHONDRILLA LVTEA.
Deſcriptio
Lacteo ſuc-
co abundans, in laui
& glabro caule
folia habet, ad
Sonchum lacu-
em acceden-
tia, multò mi-
nora, diuiſu-
rà ferè Con-
dryllæ cæru-
læ, extremit
laciniè paſſis
aliſ librante
ſe in ære ci-
coniam expri-
munt, per ſeg-
mentorũ au-
bitum den-
ticulata, quod
notaru dignũ
hacque notã
non florens facilè à Chondrilla cærulea diſcerni-
tur.

H. Lugd. re-
preh.
Tab. noni

C. B. mor.

Nomina
linguarum

Deſcriptio



non florens facilè à Chondrilla cærulea diſcerni-
tur.

Lattaioula

Intybus.
Lactuca

Matth. er-
ror.

Caccia-
lepore.
Cam. not.

Chondrilla
Plinii.
Terra-
crepola.

tur: ex horum sinu ramuli exeunt, quorum singulis flus vnicus infidet, Sonchi, luteus, in pappos euanescentes.

Condrilla
Coronopi
tenusifolia
lutea.
Condrilla
2. Diosc.

Math. met.

Lob. in Adu. Condrilla Coronopi aut Cyani tenuifolia lutea vinearum, quam nonnulli alteram Condriillam Dioscoridis esse putarunt, nec sane ita abfimiilis: Ego cum Montpelii effem anno 1572. Condriillæ, vel Sonchi speciem feci, ac quidem per plures annos mihi persuasi esse Chodrillam Matthioli secundam, quia in Hist. Germ. scribit eam flore luteo conspici: verum pauca fides habenda figuris & descriptionibus Matthioli. An Thalh Condrilla altera Matthioli in tenuis lacinias profundè dissecta, nonbus luteis, duarum specierum maior & minor? Herce vt dictum, quid Matthiol. pingat pro Chodrilla altera, mutauit figuram & aliam reposuit.

Locus & Tempus.

Montpelii floret mense Februario & Martio in muris nata. Spontè totà Æstate calidiorum regionum vineis & oliuetis glareosis passim obuiam esse scribit Lobelius.

CHONDRYLLA VIMINEA.



Pullant primum per terram in orbem sparsa filia magna, Hedyppoidis lacinias, glabra, quæ in caulem surgente planta marcescunt: ipse verò caulis propter terræ densis spinulis totus horret, atque ad cubitos duos aut tres assurgit, frequentibus ramis vimineis variè diuaticatis fruticosis, foliis aut nullis aut raris, usque gramineæ tenuitatis: flores extremis ramulis hærent lutei, Lactuceæ pares, nec formâ dissimili, semine succedente itidem Lactuceæ pari, verum nõ compresso, sed rotundo ferè, striato, oblongo, cinereo, cum tomento villoso appenso. Radix subest simplex, pollicatis & crassior, glutinosissimo lacteo succo abundè prægnans, cubiti aut sesquicubiti longitudine, non ingrata dulcedine prædita. Totam plantam amaro esse gustu tradit Columna, eam fusè describens.

De Chondrilla viminea Cæs. alpinus loqui crediderim, cum, inquit, ad Condriillas reduci potest quædam in collibus & vineis, & aliquando in aridissimis vetustis frequens: radice valdè succosa, & acri: foliis ab radice Cichorii tenuiotes, hitfutis: caule recto, cubitali, propè radicem aspero, superne læui: ramulos fert rectos: in quibus foliola tenuia, non incisa, quasi Poligoni: flosculos pallidos non in summo, sed à lateribus, qui euanescent in pappos: in huius ramis aliquando videntur tuberculi nigri, ex concreto lacte geniti.

An Cordo in Dioscor. Chondrilla altera, G. seruidifol: An eadem in Hist. Ixopus intybacea Tom. II.

Ande hac loquitur Cæs. alpinus

An Ixopus Cords.

herba quam ibidem describit, propè senam plurimam prouenire tradens.

Ad eius historiam à Cordo traditam adscribit Ixops Er. Gefnerus nomen à liquore, quem Græci opon vocant, quem Ixi, i. e. visci instar, viscosum habet, confingere: se similem herbam in solo argilloso ad pedem montis vidisse, foliis ferè Plantaginis minoris: radice, cum arida sulchur, Iuniperum ferè olente.

Trago Cichorea quinta & maxima siue procerâ, καὶ ἐπιπλήν Dioscoridis. Lob. & Pena Adu. & Ic. Plant. Condrilla viminea viscosa vinearum. Clus. hist. Condrilla 2. siue viminea. hist. post. Condrilla 2. siue viminialis, Codrilla viminialis virgis, Condriillæ genus alterum vimineum, Iunquerina Salmaticensibus vocatum, aliis Atuniera. H. Lugd. Condrilla viminea viscosa Penæ. Tab. Ic. & hist. Chondrilla iuncea, viminea, arvensis, Bica condriilen / Aker condriilen. An eadem in H. Condrilla lutea quinta sine iconè: C. Bauh. Phyt. Chondrilla 1. siue iuncea, viscosa, arvensis: prima Diosc. Fab. Columnæ Codrilla, Chondrilla 1. Dioscoridis: nam tota viscosa, atque albo succo est referta, & si quamlibet partem flectas, radicem, folia, caulem, ramos, flores etiam, ex rima vi orta lacteus succus exit, qui concrefcit paulò post Mastiches duritie, & colore, (imò & odore, quod mirum, nec vllis aliis Condriillis euenit:) sed postea longo tempore nigrescit.

Cichorea maxima. Condrilla Diosc.

Circa Montpelium prouenit florens Æstate & Autumno. Basileæ apud Rhenum quæ itur Crenzact florentem vidi Maio, & Octobri in agris ad portam D. Ioannis. Brisaci copiosè floret, & semen maturat Octobri & Nouembri. Prouenientem plurimam, ac Iunio & Iulio florentem vidi cis pontem Castrî noui Montpelii. Cõspexit nascetem Clus. Salmaticens non modò agro, post menses in aruis & ad eorum margines, sed plurimis aliis regionibus: copiosè per vniuersam Pannoniam, & variis Germaniæ locis.

Locus & tempus.

CHONDRILLIS AFFINIS QVÆDAM laciniosa an Trinciatella?



Chodrillis vel Hieraciis affinis, cui è radice crassa lãga prodeunt aliquot capita, ex quibus multa folia vncias duas, longa, laciniosa, quorũ pars extrema subrotunda, leuia, & satè crassa, spissæque caules uncei, ramosi, cubitales, interdũ multò minores: in eorum extremitati-

Descriptio

bus flores singulares masculi, lutei, in pappos desinentes: hæc herba lactescit sine amaro.

An Camer hortii, Trinciarella, quo nomine ex Italia accepit?

C. Bauh. Phyt. Denti leonis similis Trinciarella Camerarii. Item Sonchus 6. laevis angustifolius Lob. laevis Matth. De Sonchis consule scriptit Marthiolus, maximè verò de laeui.

Locus & tempus.

Nostram obseruauimus Montpelii & eius speciem minorem propè Gigam florentem Aprili. Trinciarella Camerarii eo ipso quo setitur anno flores & semen producit, & si per hyemem in fictili seruetur etiam in plures annos perdurat: alioquin radices, quae dulces quoque sunt, vt vniuersa planta, primo frigore laeduntur & intereunt.

CHONDRILLA HIRSVTA.
rubente flore.

Descriptio



Plures ex eadem radice, simplice, alba, dura, fibris donata, lac fundente, caules attolluntur pedales & cubitales, solidi, lactiflui, renues, striati, singularibus foliis donari: quorum singulis singuli insidēt flores monocloni, colore ex albo purpurascēte, densē

foliis per extremam oram crenatis stipati, ex calyce thorulis hirsutis canicularo, cui ad basin haud secus atque in Hedypnoide prominula appōsita folia, eaque glabra: ea porrò florum subinde est praematura secunditas, vt vix seminalem longitudinem assecuri caulium rudimentis, iam tum capitula florum praeludia innāscantur: folia vel à radice statim vel ab imo caule per terram sparguntur, [nam in caule reliquo rariora sunt] Hedypnoidis laciniis, quibus magnitudine tamen cedunt, vttingue hirsuta, odore graui: succedunt femina longa, renuia, cum pappo.

C. Bauh. phyt. Chondrilla purpurea fertida. Chondrilla 6. Chondrilla hirsuta rubente flore apud fratrem Io. Bauhinum visa: An Chondrilla tora hirsuta Camer. de hortis? Huius & altera species duplò ferè maior, caule ramoso, folio latiore, flore eodem. Dux sunt in Phytopinace eiusdem plantae descriptiones.

Variis in locis vidi: in horto verò E. C. W. fata Aprili floruit Iulio & Augusto mensibus, anua est planta, Frater C. Bauhinus obseruauit Basileae in horto D. Zvingeri.

CHONDRILLÆ CRETICÆ
nomine missa femine crispo.

Radix Dentis leonis: caules spinulis hortidi, variè nulloque ordine in alas diuisi: Folia

lactuca syluestris: Flores Sonchi. Semen pulehrū, incuruum, ex ceruice denticulata in rostellum pulchrum delineans, per maritimitatem rufum.

An camer. hort. Hieracium Creticum, pro Endiua lutea missum, semine curuo, aspero, vnguium modo. An Gesn. hort. Hieracium maius Creticum fatuum Patauio missum? An Casp.

Hieracium.
Creticum.
Endiua
lutea.
Anthracē
Intubacē
C. Bauh.

Bauh. Phyt. Hieracium 10. Intubacēum flore magno albido?

Locus & Tempus.

Breuis zui planta ante hyemem, imò antè Autumnum etiam, perit: floret Iunio & Iulio: Semen iisdem mensibus maturat in horto Montbelgardi. Montpelii soli florentem obseruauit O. Goboti.



Chondrilla foliis hirsutis, flore unico magno, luteo.

Chondrilla hæc species est foliis sesquiuntiam latis, longioribusque, in terræ superficie ad radicis summum dispersis, hirsutis, in ambitu laciniatis, caule cubitali, ampliore que, tereti, striato, recto, florem vnicum profertente, magnum, luteum, in alabastrino velut calyce detentum.

Descriptio

Chondrilla radice candidulâ, floribus luteis paruis.

Chondrilla hæc species radice candidulâ, exiguâ, spatium fibratâ: folia priora circa radicem dispergens, tria, quatuorue, oblonga, ex tenui pediculo protensa, integra, non dissecta, paucis ac exiguis quasi spinulis in ambitu prædita: quibus superadduntur mox alia tria, quatuor, quinæue, longiora, in laciniis [que tamen maiore intervallo se inuicem dirimuntur, atque in altera Matthioli specie,] diuisa, hæcque rursus confimilia alia, sed breuiora, pauciora & aliquantulum tenuiora per caulem [qui obliquè distortetur ac teres quidem est, sed euidenter striatus, cubitalis ferè] consequuntur: flores huic sunt lutei, parui. Reperitur in locis patensibus montium.

Descriptio

Chondrilla maior & minor, flore Tragopogonis luteo.

Chondrillarum generis species quædam maior, caule procerò, striato, bicubitali, qui in summo in aliquot brachia diuiditur, quorum quodlibet florem singularem profert luteum Tragopogonis floris instar. Folia caulis excrit pauca, longo intervallo se consequentia, longa, lata: quorum inferiora in ambitu patum subinde excinduntur, superiora verò profundius circumroduntur, infrequentius tamen id quàm in Chondrilla secunda Dodonæi accidit. Huius reperitur & alia species

Descriptio

HIERACIA VETERVM.

CAP. V.

Hieracii, vel Hieraciæ fœm. gen. vt apud Aetium & Homerum legitur (referente hermol.) magni & parui meminit Dioscor. his verbis. Hieracium magnum caulẽm producit asperũ, subrubrum, spinosum, cauum: folia habet ex interuallis rariũs fissã, Sôcho per ambitum similia: flores melinos in oblongis capitibus. Vim habet refrigerantem modicè adstringentem. Quare stomacho aũtuanti, & inflammationibus commodè imponitur. At succus si forbeat, stomachi rosiones mitigat. Herba ipsa cum radice imposita, à Scorpionicis auxiliatur. Hieracium paruum folia etiam ipsũm ex interuallis fissã per ambitum habet: caules producit teneros ac virides, in quibus flores melini circulum absoluentes. Vim habet & ipsũm eandem cum prædicto. Plinius lib. 20. cap. 7. de Lactuce spontè nascens generibus agens. Ex his, inquit, rotunda folia & breuia habentem, sunt qui hieraciam vocẽt quoniam accipitres scalpendo eam, succoque oculis tingendo, obsecritatem quam sentire discunt. Est igitur ex Lactuce generibus hieracium.

Hierac. magnum
Diosc.
Sôcho fr. mile

Vires

PARVUM.

Lactuca spontanea
Plinio.
Hierac. unde dicitur.

Lactuca

Galenus in simpl. centũ id præterit, velut sub Lactuca comprehensum. Ita etiam Aëtius & Paulus.

Idem Dioscoridi (inquit C. Bauh. Phyt.) Accipitina, ab accipitæ qui *ἰεραξ* nomen habet, cognominatur. Dicitur & *συχίτης*. Hieracium quidem ab accipitæ nomen habere testatur Turnerus, sed propterea fortè quod pappi eius vitiles sint ad vomitum accipitibus ciendum.

Accipitina,
Souchus

Hieracii nomine plures donantur plantæ, facie & facultatibus admodum diuersæ. Plinius enim (teste C. Bauh.) hoc inter Lactucam siluaticam refert, & cum ea confundit.

Æquiuoca

Lactuca silv.

Quam nos Lactucam muralem luteo flore inscripsimus, Cæsalp. hieraciam vocat. Condriam Creticam Geln. de hortis hieracium maius Creticum fatium appellat.

Lactuca muralis
Condriam
Creticam

Buglossum luteum an sit hieraciũ maius Creticum, querunt nonnulli: verũ frustra. Est hieracium cum capitulis Cardui benedicti.

Hierac. cum capitulis
Cardui benedicti

Reperitur hieracium quoddam Sabaudicum montanum, cuius meminit Lob. in Adu. Obs. & Ic. Plantar. Item Camer. hort. & Casp. Bauhin. Phyt. hieracium grandius apud Belgas Clusii, Cichorium luteum montanum angustifoliũ hirsute asperum C. Bauhin. Phyt. eiusdemque Cichorium luteum pratense hirsutum, est hieraciũ maius nostrum hirsutum asperum.

Hierac. minus
radice præmorsã

Est hieraciũ affine Cichorium luteum. Hieracium maius Fuchsi, Dodon. Lobel. Lonc. Camer. Thalii: Casp. Bauh. & aliorum, est Sorchus repens nostra.

Sorchus repens
Hieracium magnum
Generatum

Hieracium magnum venenatum à Pona missũ, an eiusdem in Baldo hieracium Intybaseum flore carneo?

Hieracium foliis & facie Condillæ Lobelii, est hieracium minus quorundam.

Hierac. minus
quibusdam

Hieracium minus alterum seu Morsus diaboli, à nobis inscribitur, hieracium minus radice præmorsã.

Hierac. minus
radice præmorsã

Pilosellam maiorem Gallorum Pontani Thallio, seu Costam herbam in Italia, alibi *Ingrassiam di Paris* vocatã, vt arbitratu Cameratii, depinxit Clusius inscriptione hieracii latifolii (huic titulo nos addimus) ramosi, hirsuti.

Hierac. latifolium
ramosum
hirsutum

Qui vulgo in Hetruria Terracrepulus vocatur,

R r r r 3

Species flore consimili, caule item, sed foliis destituta: ea verò pauciora numero humi recumbunt, quorum prima lata quidem aliquantulum sunt, sed subrotundiora, reliqua longiora conspiciuntur, ac in ambitu circumrosa, sed non profundè, nec admodum crebrò.

Memor alia
Huius generis & minor reperitur species, radice parua, lignosa, fibris paucis constare: caule unico, recto, cubitali, ac aliquantulum proceriori, tereti, tenui, læui, foliis carente, quæ solummodò humi reclinantur, numero sex, septem, octo, nouem, decem, pauloque plura, quandoque quadrantalibus, in ambitu circumrosa modicè. Florem itidem hæc Tragopogonis æmulum profert & vnicam.

Chondrilla caule hispido, nodis multis prædita.

Descriptio Chondrillæ alia species, paulò ab hinc iam dictæ minoris (huius scilicet generis) speciei fermè æmula: radice parua, fibratã, nigricante: caule crasso, striato, parum hispido, nodis multis prædita, ex quibus emergunt folia oblongiora, viridiora, circumrosa aliquantulum, scabra, hirsuta dorso prædita.

Chondrilla caule cubitali aspero, floribus pappaceis.

Descriptio Chondrillæ species caule cubitali, aspero, striato: foliis quadrantali longitudine, humi sparsis, quaternis, quinis, senis, septenis, in ambitu circumrosis modicè: iis verò, quæ caulem conscendunt, excisis, ita vt in ambitu euidenter laciniã inde relinquuntur: floribus paruis, pappaceis, agminatim in summo caulis confitis, quorum singulis peculiari petiolo innititur.

Chondrilla minor foliis in dorso rubentibus.

Descriptio Chondrillæ cuiusdam minoris species, radice singulari, quandoque & bifida, medioeriter crassa, digiti parui longitudine, fibratã, nigra: folia exent parua, læuia, carnosa, oblongiuscula, inter gra, recurua, angusta, in dorso rubentia, numero quaterna, quina, sena, septena, octona etiam quãdoque. *Coliculum* producit incuruum, rubicundũ, digiti minoris longitudine, vnico donatum flore luteo, Tragopogonis fermè aliquid modo. In pratibus pinguioribus nascitur.

Chondrilla parua, flore singulari, caule foliis proorsus destituta.

Descriptio Chondrillæ paruæ species, radice parua, fibrata, ex nigro subrubente: foliis quadrantali longitudine, humi procumbentibus, asperis, medioeriter latis, viridibus, confractũ facilibus, senis vel septenis, nonnunquam octonis: caule palmari, paulò longiore, tenui, tereti, aspero, modicè cacumen recuruaute, foliis proorsus destituta: flore singulari, simili Chondrillæ Dodonæi alterius.

Chondrilla foliis in ambitu quasi spinosis.

Descriptio Chondrillæ alterius alia species, radice candida, lignosa, inutili: caule cubitali, minorè que vt plurimum, tenui, striato: foliis donato paucis, viridibus, oblongiusculis, mollibus, integris, in ambitu quasi spinosis, flore luteo. In Stolbergenibus apricis montibus.

nobis, Sonchis affinis Tetracrepola.
 Hieracium longius radicatum Lobelii, est Hieracium nostrum minus Dodon. longa radice.
 Hieracium intybaseum Tabern. dicitur nobis Hieracium macrocaulon iuncum.
 Haberur & hieracium maius latifolium Clusii, & alterum genus angustioribus foliis.
 Hieracium Britannicum Clusii, quod Londini Cichorium montanum nuncupabant, an uieracium latif. montanum Geneuense.
 Hieracium montanum latifol. minus Tabernanontani, appellamus hieracium latifol. glabrum ex valle Griesbachiana ramofum.
 Hieracium est nobis γ , alpinum hirsuto folio, Clusio quodammodo incano.
 Hierac. montanum vel sextum Clusii, & aliud genus foliis nonnihil laciniatis.
 Hieracium minimum vel octauum Clusii, est Hieracium nostrum florem inclinans: Hierac. Lobelii facie Hedypnois.

Hierac. macrocaulon iuncum.
Hieracium maius latifolium Clusii.
An Hieracium latifol. montanum Geneuense.
Hieracium montanum
Hieracium florem inclinans Hedypnois

Hieracium Narbonense.

Hierac. stellatum Cichorium bulbosum.

Dracunculus.

Hieracium maius Dioscoridis Tragi, uieracium minus Gesn. de hort. coll. stirp. & in Car. pl. Lonie. Cordi in Diosc. & Euch. Roellin. recte a nobis inscribitur Hedypnois, siue Dens Leonis.
 Inter alia hieracia est nobis Narbonense rotundifolium monoclonum.
 Hieracium foliis & floribus Dentis Leonis Lobelii, hierac. siue montanum laciniato folio Clusii, an hieracium monoclonum hirsutum.
 Hieracis affines Intybi Species tredecim tradit Thalius.

Clusius quoque dubitat in Pann. an eius Scorzonera 4. siue humilis fibrosa radice sit referenda ad hieraci genus aliquod. Inscribitur haec a nobis Trogopogonis species, siue Scorzonera &c.
 Hieracium Narbonense falcata siliqua nominamus hieracium stellatum.
 Sed & Cichotium bulbosum in Aduersariis Lobelii Hieracium marinum Dioscoridis alterum cognominatur.
 Genus tandem inter ascriptitia Dioscoridis Dracunculum Hieracium appellat.

HIERACIUM MULTIS, ALIIS
 Cichoreum luteum, hirsutum & glabrum, vel minus hirsutum.

Hieracium luteum hirsutum.

Descriptio



Facie tota Cichoreo syluestri proximum, radices crassas habet & longas, fibratas, lac fundentes amarum: unde caules plures surgunt cubitales & plusquam bicubitales, multis alis concaui, canaliculati, rubentes, aliis admodum hirsuti, aliis fere glabri, inanes: folia ortu primo tam Cichoreaceis si-

milia, vt distinguere sit difficile, praesertim in eo genere quod folia habet hirsuta: sit enim nonnunquam, vt, praeterquam per nerui longitudinem, reliqua folii pars glabra sit: sunt ea autem Cichorii modo sinuosa, aliis Dentis Leonis ritu profundius incisa: flores pediculis singuli donati, Lamplante fluxum forma, nonnihil maiores, sili-

hieracium luteum glabrum seu minus hirsutum.



lirer lutei, ex capitulo canaliculato hirsuto, qui in pappos abeunt. Semen relinquuntur minutum, striatum, fuscum. Icon prior a nobis proposita est ex Fuchisiani: secunda Lobelii ab eo pro Hedypnoide Plinii exhibita.
 Dodon. gall. Hedypnois, Intybi 4. species, Hedypnois Plinii, German. Geel wegwart, Gall. Cichoree saulne. Belg. geel Cichoreye. Descriptio Dod.

Icon:

Synon: Hedypnois.

Geel wegwart, Gall. Cichoree saulne.

Belg. geel Cichoreye.

Descriptio Dod.

obuenit cu nostro hieracio, ubi locis cultis & humidioribus prouenit, licet figura flos maior videatur, & in descriptione minor dicatur flore Dentis Leonis.

Lobel. in Aduers. Hedypnois Plinii, Cichorium luteum pratense, Dentis Leonis flore, hieracii folio: & an eadem sit Verrucarium Cichorium, luteo flore, & sulcatis capitulis: Obs. Hedypnois Plinii, Aphaca Theophrasti. Lobelium nesciuisse de qua planta scriberet satis ex eo apparet quod dubitat in Aduers. an sit Cichotium verrucosum, & in Obier. cum putauit Zacintham eandem plantam cum Condrilla Clusii. Figura quam assumpsit pro Hedypnoide Plinii est ex Dodonao. Plant. icon. Hedypnois Plinii & Aphace Theophrasti: Cichorium luteum pratense Dentis Leonis flore, hieracii folio. Item hieracii folio. Item hieracium foliis & facie Condrillae. Prima figura est Dodonaei minus hirsutum demonstrans & cultum.

Hedypnois Plinii.

Aphaca Theophr.

Lobel. nat.

Matth. in hist. Gerun. & Epit. iconem habet hapro Chondrilla s. Klein Sonnenwubel, qua retinuit Cameracius quae nobis videretur exprime-re porius hieracium, de quo hic agimus quod penè glabrum.

Aphace:

An Cam. hort. Chondrilla tota hirsuta frequens in massa, quam in cibo coctam, & acerarii quoque inftar condita, auidè comedunt: Item hieracium foliis & facie Chondrillae Lobelii: An Chondrillae nomine intelligat hieracium hirsutum asserere non auiam: lectores diiudicent.

An Thal Intybi syluestris seu Cichorii sylu. flore luteo species quarta.

Lectoribus considerandum relinquo an Tabern. Dens Leonis terra de qua in Icon. & histor. non sit eadem planta cum Dodonaei Hedypnoide. Is autem in hist. per hieracium Chondrilloides idem

idem forte intelligit quod Lob., verum exactam descriptionem non habet, quâ distinguat ab aliis, nec iconem, sed pro icone, sub N. n. nescio quo errore scriptam, Blauw habet, sicut hieracium caruleum: in descriptionibus nullius coerulei hieracii fit mentio.

Cichorium luteum
C. Bauh. Phyt. Cichorium 9. siue luteum alterum, vel Hieracium minus glabrum. nedypnois Dod. nedypnois Plinii. Item hieracium 14. siue Chondrilla folio maius: Apud Matthioli. hieracium maius Matthioli. Fuch. Dod. gall. Lac. Lob. Castori, Tab. hieracium magnam Calsalp. hieracium minus Dalemchampi: Lugd. Taxacon maius Loniceri. Frater proponit pro Hieracio maiori Matthioli iconem Tabernamontani Hieracii maioris: verum ea distert multum à Matthioli iconem, à Fuchsiana, à Dodonæi, à Lacunæ, à Lobelii, à Dalecham. & Loniceri: hi enim omnes proponunt iconem Sonchi nostri repentis. Descriptio apud Calsalpium non videtur malè conuenire Soncho nostro:

C. B. not.
Gerard. Dens leonis Cichorizata, Succorie den de lion. Item Hieracium maius Dioscor. Great banse weede. Iconem habet propositam à Tabern. pro Dente leonis certa, sicuti etiam Hieracii eo titulo exhibiti: cur titulos mutat absque figuris?

Dens leonis
Lonic. habet sicuti wilde sawdissel sicuti maius, Accipitina, Apulei Lactuca silu. Pharmacopœorum Cichorea lutea. Lonicerus Hieracii historiam habet, quæ nostro Hieracio maioris hirsuto conuenire posse videtur, licet figura non respondeat, est enim Sonchi repentis.

Gerard. not.
An Clusio in Pann. & Histo. post. Hieracium grandius apud Belgas. An Thalia Intybi siluestris, seu Cichorii siluestris flore luteo, foliis integris, species quarta: Hieracium multis, hirsutum valdè, Generæ abundat flore mense Maio. Montpelii Martio & Aprili. Montbelardi abundat in Horto E. C. flore in Iunio spontaneum, semine cum pappis decidentibus Iulio. Id etiam Basileæ inueni cū flore mense Octobri quâ tur Montets, & propè fluuium Birsam, hoc glabrum est, aut saltem non ita hirsutum vt aliud quod maius hirsutum dicimus, modò paruum modò magnum. Hieracium vulgare glabrum copiosè nascitur in agris Basileensibus, vbi florere solet adhuc mense Nouembri.

Locus & tempus.

HIERACII PARVA SPECIES HYOSERIS angustifolia aspera.

Descriptio



EXigua, sed crassiusculâ donatur radiculâ, succisâ nonnihil, ac si præmorsa esset, pluribus fibris ornata: foliis longis & angustis, hirsutis, in terra spatibus: caulibus duobus aut tribus, glabris, è radice procedentibus, nõ multò plus palmum longis, versùs superiora, vt plurimum; in bi-

nas alas diuisis, quarum extremitatibus insidet flos vnicus luteus, plenus, fatis magnus: tota planta amaricantis est saporis, Tabern.

Tab. icon. Hyoseris angustifolia: hist. hyoseris altera, Flein sercklein fraut / hyoseris angustifolia. hyoseris fœmella. C. Bauh. Phyt. Hieracium 22. siue minimum angustifolium.

Synonyma
Hyoseris angustifolia siue fœmella

Lucos multum amat: frequens etiam in solo arenoso, gramineo, & fecus vias.

HIERACIUM PVLCHRVM.



AD Dentem leonis laciniis & Cichoriū siluestre accedūt huius folia, formâ & hirsutis prima verò minus laciniata, alia alternatim per caulem, at saporem nullum manifestum gustanti offerunt; quòque altiora cò minorâ redduntur: Caulis vnicus, rectus striatus, cubitalis hirsutus, foliis alternatim orientibus amictibus, quæ sine pediculo latam habent basim cum alis: flores in cacumine numerosi, ex pediculis propriis, hieracii similes, lutei, in pappos facellentes: radix non magna cū fibris aliquot crassiusculis. Hoc hieracium vidimus montpelii florens Maio.

HIERACIUM ERVCÆFOLIVM hirsutum.



Hieracium à Genero Cherlero nobis delatum, quod vt hieracium nostrum pulchrum singulari assurgit caule ad altitudinem pedalem, penicillis hirsuto, foliis vestito etiam hirsutis, vniculis, aut sextantalibus, cineracei coloris, laciniis Cichorii Erucæ circumosis, extremo folii ferè triquetro. Flos

in summo caule vnicus aureus maiusculus.

HIERACIUM PVLCHRVM RAMOSVM Sprengerianum.

Inter secas meas herbas plantam perelegantem

sem adferuo fescuibitali altitudine, nec-
dem integram, pilosam, aliis minoribus ramis, al-
terno situ ex longa distantia brachiata, ad quo-
rum alas *haerent* infernè quidem ex principio an-
gulo longa, ac
dodrantalia, &
rè fescunciam
lata, profundis
& amplis incisuris
ordine quoda-
m serrata, ac
penè laciniata,
neruo insigni
per medium ex-
currente: super-
nè verò *folia*
breuiora lato
principio ac ve-
luti alis caulem
amplectuntur
perfoliate in-
star. Flores in
summitatibus
lutei quales in
Hieraciis in sin-
gulis ramis qui-
bus, seni, plus minus, qui temporis progressu in *pap-*
pos fatiscunt. Tota planta pilosa potissimum in
extremis ramis in quibus pili longiores: Pictor
non satisfecit nobis, pauciores pinxit flores.



Lin.

Locus &
tempus

Hanc plantam collegimus Heidelbergæ in
cultissimo horto insignis Pharmacopœi & Bota-
nici D. Sprengeri, florentem Iunio.

SONCHVS LANATVS
Dalechampii.

Descriptio



IN cubitalem
altitudinè &
ampliorem ex-
crefcit, *foliis* per
caulem crassif-
culum pilosum,
que fortuito di-
spofitis, dua-
rum triumue
vnciarum longi-
tudine, culmi
latitudine, non-
nihil sinuatis &
subinde veluti
cotrofis, ad
cyani folia non-
nihil acceden-
tibus neruo vi-
nico fecundum
longitudinem
excurrente, ro-
mentofis, nullo

pediculo nixis, ad quorum radices ramuli enaf-
cuntur: superior pars caulis ramofior in pluri-
mos furculos molli lanugine obfitos dimaricatur:
flores gerens aureos Erigerontis, tandem in *pappi*
fatifcentes, calycibus circumdatos, tomento deli-
cato & molli pubefcentibus: *radice* nititur satis
crassa & longa, non multum fibrofa, planta ficca
nonnihil amara: Iuterduum hæc palmaris est foli-
is minoribus laciniatis.

Varietas.

Hift. Lugd. Sonchus lanatus. Quidam Mollugi-
nem appellant, quamvis à Plinii Mollugine

diuerfifit.

C. Bauh. Phyt. Sonchus n. villosus luteus. *Molluga.*
Monspelii propè Peraux inueni, in faxofis & *Locus &*
apricis, florens Iunio mense. *Tempus.*

Tota planta lacteo fucco turget, Cichorii mo-
re, gustuque amaro prædita est, sed minùs quàm
reliqua Cichorea, quorum & facultatem obri-
uet, licet imbecilliorum.

HIERACIVM LATIFOLIVM MONTA-
num Geneuense folio Conyza
maioris Monspeff.



CAules edit *Descriptio*
plures cubi-
tales, ac ce-
tiam maiores,
cauos, crassos,
hirsutos, qui
superius in ali-
quot breues ram-
ulos diuifi,
flores gerunt
luteos, magnos,
Hieracii capi-
tulis asperis
pates: rãdem
in *pappo* euanes-
centes: *folia* infima
Conyzae Mon-
spesulanæ ma-
ioris foliis pa-
ria, palmari
circiter longi-
tudine, vnciam lata, sinuata nonnihil, & quasi
terrato, per caulem alternatim sunt disposita, cau-
lem modicè amplectentia, hirsuta, potissimum
parte inferiore, minùs ramè aspera quàm Hier-
acium asperum. Radices fibrosæ, crassiusculæ,
nigricantes & crassis capitibus. Suspiciamur
hoc traditum à Clusio pro Britannico.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 6. siue Conyzae folio
caule purpurascente. Hieracium Britannicum
Clusii. An Hieracium montanum maius latifo-
lium Tabernamontani? Hieracium Tabern. sepa-
ro à Clusii & nostro Geneuensi: quia Tabern. fo-
lia non habet Conyzae: sunt etiam Tabern. autore
folia tenuia & mollia, siue non rigida.

Hieracium latifolium inueni in montibus cir-
ca Geneuam folio Conyzae Monspesulanæ ma-
ioris. Hieracium Britannicum Clusii, impenfè
amara est planta, nusquam spontè nascens ipsi
eonspecta: sed Londini duntaxat, in hortis Do-
ctiss. virorum Ioannis Richeri & Hugonis Mor-
gani Pharmacopolarum Regionum, ex boreali-
bus Britannicæ regionibus, in quibus spontè cre-
scit, delata. Floret Iunio & Iulio, semen Augu-
sto maturum.

Hierac. Co-
nyzae folio.

C. B. nar:

Locus.

HIERACIVM PANNONICVM LATIFO-
lium 1. Clusio, Pilosellæ maiori, siue Pul-
monariae luteæ accedens, macula-
taria & non maculatum.

HVIC quina aut sena sunt *folia*, humi strata,
lata, Intybo satiuo latifolio non multum *Descriptio*
dissimilia, per ambitum nonnihil sinuosa, inter-
dum etiam laciniata, mollia, hirsuta, nigricanti-
bus

bus maculis sapsimè infecta, interdum minime, lacteo succo turgentia: è quorum medio



fimo flatu dispergitur: radix illi minimi digiti crassitudine, nigro atque crasso cortice obduta, lactei succi plena.

Clus. in Pann. & Hist. post. Hieracium Pannonicum siue latifolium primum.

Camer. hort. Costa herba in Italia alibi Ingrassia di porci, & quantum ex icone cognoscere possum, conuenit cum Hieracio latifolio Clusii. Item Hieracium latifolium Pannonicum. Item apud Thaliam, Pilosella maior Gallorum Thalii, quam ut arbitratæ, depinxit in Pann. Clusius cum inscriptione Hieracii latifolii.

An Thal. Harc. Pilosella maior Gallorum, si cut plantam nominabat?

Tab. icon. & Hist. hieracium phlomoïdes wül habi d'fraur: is macularum non meminit.

Assumptissimè figuram Clusii, in qua 4. tantum folia, quia defuit nobis vitens, postea Deo fauente melior icon proponetur.

C. Bauhin. Phyt. Hieracium 2. siue latifolium hirsutum macularum.

Gerard. hieracium 1. Clusii, The first haufe weede of Clusius.

Inuenitur plerisque hungariæ, Austriæ superioris, atque Morauie montibus, gramineis & simul apricis locis, siccioribusque pratis. Inueniebam etiam (inquit Clus. in post. hist.) & maculis liuidis, & nullis maculis insignito folio, siccioribus circa Francofurtum pratis. Floret Maio, semen plerumque maturum Iunio.

Hieracium minus latifolium Pannon. 2. Clusii.

Cubitales atque etiam cubitales interdum sunt huic caules, firmi, rotundi, quadam lanugine obfiti: quos inordinata, siue confuso ordine nascèntia, multa ambiunt folia, tres uncias aut amplius longa, vnum lata, mollia, in ambitu dentata, lacteo succo plena: summus caulis in aliquot ramulos finditur, sustinentes imbricata capitula, è quibus prodeunt flores lutei, denis, duodenis, aut pluribus foliolis, extimà parte incisus, constantes: medium occupantibus multis luteis fibris: radix minimi digiti crassitudine æquat, multisque tenuibus fibris capillata, singulis annis augetur, & ad latera nouos, frequentioresque saules profert.

Eius genus inuenitur graciliore caule, angustioribus, & vix semunciam latis foliis: in reliquis conueniunt.

Clus. Pann. & Hist. post. Hieracium maius latifolium siue Pannonicum secundum. Synonyma

C. Bauhin. Phyt. hieracium 3. latifolium foliis mollibus & dentatis.

Nascitur cum sequenti in extremitatibus sicciorum pratorum inter vepres, etiam ad cædarum siluarum margines. Locus

Hieracium maius angustifolium Pannonicum 3. Clusii.

Cubitales & huic assurgunt caules, rotundi, superioribus minus crassi, & frequentiore asperiorè- que lanugine obfiti: quos similiter ambiunt confuso ordine multa folia superioribus angustiora, breuiora, atque etiam dura, nec minus lacte turgentia, summus caulis diuiditur quoque in ramulos imbricata capitula sustinentes, è quibus exoriuntur flores superiori ferè similes: radix non adeo crassa quam superioris, sed non minus fibrosa, nec in nouis proliis educandis minus fertilis. Illius etiam genus alterum obseruauit author angustioribus foliis & multo longioribus, licet non minus duris, quod aliquot tota quodammodò facie ipsi respondet. Descriptio

Clus. Pann. & Hist. post. hieracium maius angustifolium, siue Pannonicum tertium. Varietas

C. Bauhin. Phyt. hieracium 4. angustifolium caule aspero. Synonyma

Hieracium alpinum hirsutum folio 5. Clus. quod annuò incano.

Aliquot sunt huic folia è radice prodeuntia, vncialis ferè latitudinis, oblonga, molli crispaque lanugine admodum hirsuta, & quodammodò incana, lacteo succo prædita: è quorum medio caulis pedalis plerumque emergit hirsutus, quem per interualla ambiunt folia superioribus breuiora, at triplo latiora, & in mucrone desinentia, non minus quam illa hirsuta, aut lacteo succo prægnata: vnicum in summo fert capitulum



è multis hirsutis & incanis foliis compactum (nonnunquam in lateribus alterum & tertium) quod in florem sese explicat hieracii floribus similem; multis foliis luteo colore præditis constantem, qui deinde in pappos suo breui & nigro semine euanescit: radix nigricat, multis candidanibus fibris prædita est, & singulis annis nouos caules profert. Tota planta admodum amara est. Descriptio

Clus. Pann. & Hist. post. hieracium 5. alpinum Synonyma

Coff. a. Ingrassia di porci. Pilosella maior Gallorum.

Hierac. phlomoïdes.

Locus.

Descriptio

hirsuto folio. An porro (inquit Clul. in post. hist.) ea planta quam Dalechampius Sonchum lanatum appellat?

Iocus & tempus.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 5. montanum hirsutie incanum. Camer. hort. Hieracium 5. Pannonicum. Gerard. Hieracium 5. Pannonicum. Clusii, kind of hairy weede. Tabern. Ic. & hist. Hieracium la. chum montanum.

Inuentura. In herbosis Alpium iugis, ubi Iulio, interdum etiam Augusto floret: at in hortis Maio, semen vero Iunio perficit. Prouenire obseruauit Tabern. in Deschgeburg, & in Schwarzwald [Harcynia] in supremis montibus inter Greyßbach, Auzegast & Ribelsauer fontes acidos.

LAMPSANA VETERIBVS.
CAP. VI.

Lampsana (ita tradente Dioscoride) siluestre olus est, plus alens, stomachoque vtilius, quam Lapathum. Huius folia & caulis cocta eduntur. Hanc Romani Napium, Aegyptii Euthine vocant, Graeci, inquit Herimolauus, Lamfanem.

De Lampsana Plinius lib. 19. cap. 8. hæc scribit. Nec non olus quoque syluestre est trium foliotum, Diui Iulii carminibus, præcipue iocis militaribus celebratum. Alternis quippe vertibus exprobrauere Lapsana se vixisse, apud Dyrrachium, præmiorum parsimoniam cauillantes. Est autem id Cyma syluestris. Et rursus de eadem lib. 20. cap. 9. Inter syluestres Brassicæ & Lapsana est, pedalis, hirsutis foliis, Napii simillimis, iussu candidior effert flore. Coquitur in cibo: aluum leniter emollit.

Galen. lib. 2. de alim. de Lapsana nihil dixit, velut sub Brassicæ generibus comprehensa. Verum 7. simpl. Pharm. Lapsana, inquit, si edatur malum succum gignit. Si vero imponatur, extergendi ac discutiendi vim quandam habet.

Lapsana porro nomine plures non solum, imò penitus diuersas meminimus diuersos Autores referre planras.

Dodonæus Lampsanam statuit plantam, quæ teste Lobelio potius Hieracii congener, aut Sonchis cognata videtur.

Pro Lapsana Cornarius exhibet Brassicæ, quæ opinio non placet, vt indicatum est lib. 1. H. n. g. Veram Lapsanam Lob. Gesn. & alii Rapistrum flore luteo esse existimant, post Rapas à nobis lib. 21. descriptum.

Rapistrum album Lampsanam vel lapsanam vocant Riff. in Diosc. Turn. in Herb. Angl. Gesn. de coll. stitp. & in cat. pl. ac Schuenckfeldius.

Lapsana vera quorundam, Ocymum Veterum Tragi Lob. Obl. est Fagotriticum nostrum. Nau. Lam Rob. Const. in Lexico est Apium. Lapsana cur dicatur Eustach. & Euchario Roeslin de galla, mihi non constat. Lapsana agreste olus Cordi, ex Brassicæ genere, Germanis Rinkel appellatum, quo se apud Dyrrachium victitasse milites Cæsari in triumpho exprobrauerunt, quid?

Napium Euthine.

Lapsana.

Aequiuocæ

Lampsana Dodonæi.

Brassicæ

Rapistrum flore luteo.

Fagotriticum. Apium. Galla.

LAMPSANA DODONÆI.

Lac fundit amarum vulnerata, siue radice quam habet albam & digitalem, siue caulibus quos

supra cubitum grigit, hirsutos rubentes, ramosos, concauos: siue foliis denique, quæ Barbareæ dicuntur instar formata habet, sed mollicella, hirsuta: flores autem stellati, lutei, Hieracii, sed parui: qui in pappo illi similiter abeunt.

Dodon. gall. Lampsana, ab aliquibus Napium appellata. Ruellio, ni fallor dicitur Chrysolachyum Plinii.



Synonyma
Napium.
Chrysolachyum Plinii.
Gesn. hort. Sonchis cognatum olus, Figurensibus Nilschey vocatum.

Lobelio in Aduers. Lampsana Dodonæi, qui ait perperam à Dodonæo Lampsana nomine esse exhibitam, quia neutiquam Sinapi, Napis, aut Brassicis congener, sed potius hieracii. Obs. & Ic. plant. Lampsana, sed hoc mirum cur Lobel. nunc faciat

Lampsanam, cum in Aduersariis negarit, nec sine ratione.

Camer. hort. Lampsana Dodonæi, lætescens planta, passim obuia, in Prussia Papillaris nominata.

Tab. icon. & Hist. Sonchus siluaticus 1. wildt Sonchenfraut: Sonchus siluaticus 2. Sonchus siluat. 3.

Gerard. Sonchus siluaticus weed Sowthistle. C. Bauh. Phyt. Lampsana, varians foliis, aliquando profus integris, aliquando in laciniis aliquot diuisis: an hanc Diosc. intelligat cogitandum. Item: Lampsana 2. siue siluatica, Sonchus silu. 2. Tabernamontani. Ego has duas non separo: lusum enim naturæ duntaxat esse existimo: quod de Tabern. tribus speciebus etiam dictum sit.

Schvv. Lampsana, 2. eu. 1. don Dioscor. papillaris, C. B. nat. wild Sonchen fraut / Rein kôl / Nilschen. Fo. 6r & Tab. liis integris & laciniosis.

Parietinis, ruderibus, aruoribus & hortorum marginibus frequentem tradit esse Schvvencfeldius: quod & ego obseruati.

Efficax est in sanandis papillis exulceratis, unde & nomen Papillaris sortita esse videtur. Resiccatur, abstergit, & digerit. Papillas exulceratas imposita sanat.

HIERACIUM CAPITVLIS CARDVI
beadicti, maximum Buglossum echinoides quibusdam.

Multifida radice nititur, crassitudine digitali, albâ, lac amarum fundente: caulibus bicubitulis radice crassitie æquat, striatus, rubens, densissimis spinis acutis, rigidis, sed facile caulem relinquens horrens, succum itidem lacteum è vulnere fundens, ramis compluribus brachiatus: folia Buglossæ, sinuosa, longa, multò magis spinis minacibus horrida: flores Hieracii, crocantes, in pappo faccilentés, è calyce, thorulis hispida

Descriptio

pidis canaliculato. Nostram iconem melius pictam sculptor corrupit.

Tabern. Icon. & Hist. Hieracium Echiodes, Buglossum luteum, habet fract. Geel Obsensung genant.

Lobel. in Adu. Buglossum Echiodes luteum, quod pluris faciunt muliercula Anglae, quam Buglossum Echiodes luteum Hieracio cognatum. Catp. Bauh. Phyt. Buglossu s. luteum: An Hieraciu maius Creticum sativum Gesa. Fraxtra quaerit Frater, non est hieraciu Creticum sativum G. L. neri ut satis apparet ex historia Chondrilla Creticae semine crispo. Hieracium capitulis Cardui Benedicti maximum mihi provenit Montbelgardi in horto E. C. Eodem anno quo ista planta caulem produxit, floruit Augusto, Septembri & Octobri: Annua est planta isoplam seminis, florit Iulio & Iulio. Bauh. in horto D. Felicis Plateri collegi semina matura sine mensis Augusti. Heidelbergi vidi in horto Electoris.



Hieracium capitulis Cardui Benedicti maximum mihi provenit Montbelgardi in horto E. C. Eodem anno quo ista planta caulem produxit, floruit Augusto, Septembri & Octobri: Annua est planta isoplam seminis, florit Iulio & Iulio. Bauh. in horto D. Felicis Plateri collegi semina matura sine mensis Augusti. Heidelbergi vidi in horto Electoris.

HIERACIUM ASPERUM MAIORI
flore in agrorum limitibus.

Statis crasse Radices multitudine, compluribus sibus donatae, colore ad buxum inclinatae, lac fidentes amaro sapore, verum non insigni praeditum: caules ex eadem radice multi surgunt, teretes, striati, rigidis pilis asperi, ramosi, lateum succum manantes, cubitales, bicubitales & altiores: folia inferiora quidem duobus palmis interdum longiora, sequiunciam lata, acuminata, primum atro viridia, post de coloris intentione non nihil remittentia, hispida, acuminata, sinuata per margines, & aliquantulum crispa: superiora vero alternatim caulibus adherent, minor, acutiora, ceteroquin similia: sapor utriusque subamarus: flo-



rora quidem duobus palmis interdum longiora, sequiunciam lata, acuminata, primum atro viridia, post de coloris intentione non nihil remittentia, hispida, acuminata, sinuata per margines, & aliquantulum crispa: superiora vero alternatim caulibus adherent, minor, acutiora, ceteroquin similia: sapor utriusque subamarus: flo-

res suis singuli pediculis modo longis, modo brevibus, posteriores prioribus, ut in Impia Plinii, altioribus insident, Tusfilaginis floribus pares, lutei, foliola exteriora maiora, crenata, ex capitulo ex longis foliolis multis squamato, subaspero, quod delapsis floribus inferiore parte in ventrem canaliculatum turgescit, semen claudens lanugine oblitum. Cum Hieracio maximo capitalis Cardui benedicti multa communia habet hoc hieracium, quod aliquando Cichorii asperum vel spinosum crederem. Figura nostra ex Fuchianis non in omnibus placet pro nostro hieracio aspero: folia non satis sinuata.

Trago Cichorea (wegwart eadem in histor. germ. tertia & quarta flore luteo, foliis asperioribus spinulis horrentibus: radice longa luteum succum manante, qui in gummi quasi glutinosum coagulatur, semine subluteo: ad Condrillam Diofcoridis referenda.

Thalio in Harc. Intubus silu. seu Cichorium silu. flore luteo, passim ferme in tota harenia vulgare, duplex. Aliud foliis integris: quod rarius foliorum ratione subdividitur in quatuor species: Aliud diuisis.

Tab. Ic. Cichoreum luteum, Geel wegwart: Hist. Cichoreum luteum primum. Eadem in hist. Cichoreum luteum secundum. Item Ico. Hieracium Intybaceum asperum, Rauch wegwartem habet fractur. Hist. Hieracium novum, Collata descriptio & figura Cichorei 1. lutei respondere videtur cum nostro Hieracio, quod Fuchsius, cum Tubingae esse vocat Intubum luteum tertium. Quale sit Cichorium luteum 2. quod non de pingit, sed tantum describit, asserere non possum. Si quis tamen duo haec Cichoria lutea Tabernamontani, ad Hieracium de quo c. sequenti agemus, velit referre, id eius iudicio committimus. Hieracium eius Intybaceum asperum huc collocatum volumus.

Gerard. Cichorium luteum yellow Succorie Hyofiris Plinio, Lobel. hedyinois. Item Hieracium asperum, Scharpe haute weede. Gerardus iconem Tab. habet Cichorii 1. lutei: verum an intelligat nostrum Hieracium asperum maiori flore, vel sequens, lectoribus considerandum relinquo. Asperum eius idem est cum eo quod ex Tab. proponimus.

C. Bauhin. Phyt. Cichorium 7. seu luteum patense hirsutum. Cichorea lutea vel 3. Trago. Cichorium luteum Tabern. foliis variat, aliud integris, aliud diuisis: illius ratione foliorum quatuor species, qua de re Thalys. Item: Cichorium 8. siue luteum montanum angustifolium, hirsutia asperum, quod Intubum tertium Fuchsius fecit, Scariolam tertiam Cortusius, Hieracium Intybaceum asperum Tabern. Non separo adhuc Cichorium 7. & 8. Bauh. donec mihi constet aliqua certa differentia inter haec duo: & an vnaqueque suam differentiam semper seruet, nolim tamen negare duas species, iudicent alii.

Hieracium quoddam asperum vel spinosum mihi aliquando Cichorium luteum nominatum, provenit passim in agrorum marginibus circa Montbelgardum, ac etiam in horto Ill. E. C. florens Iulio, Augusto, Septembri, & Octobri mensibus. Frater C. Bauhinus mihi Basilea nomine Scariolae tertiae Cortusii. Provenit in Rossberg prope Masimmsfer. In Ducatus Wirtembergici monte Teck & Bol in agrorum limitibus. In Allatiae asperis collibus secus agros & vineas, apud Mediomarcis vero in montanis pratis vbertim gigni scribit Tragus.

Hierac. Echiodes. Buglossum luteum

Lingua bovina lutea

An Hierac. Creticum C. B. ngr.

Tempus

Descriptio

Cichorium luteum. Icon.

Synonyma Cichorea flore luteo.

Intyb. silu. si lutea.

Cichor. luteum

Intubus luteus

Hyofiris Plinio

Gerardus scence

Cichorea lutea

C. B. ngr.

Locus & tempus

HIERACIUM RECTVM RIGIDVM,
quibusdam Sabaudum.

Descriptio



Synon.

Intybus.

hirsuta, atrouirentia, alternatim posita: radix dura, longis fibris donata.

Lob. Adu. Hieracium Sabaudum montanum. Obseru. Hieracium Sabaudum. Iconib. plant. Hieracium alterum grandius. Tubingæ cum essem præceptor meus Fuchsius faciebat Intybi speciem.

Militaris Lactaris.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 18. siue angustifolium fruticosum. Hieracium Sabaudum Lobelio. Hoc Parauii laticoribus & hirsutioribus foliis & caule reperitur, quod D. Guilandinus Erinum Matthioli esse asserbat, & apud Galenum Militarem, apud Plinium Lactaridem, dicit.

Hierac. mont. angustifol.

Camer. hort. Hieracium alterum grandius Lobeli, rectum & fruticosum.

Tab. icon. & hist. Hieracium montanum angustifolium. Berg habichtkraut mit schmalen blettern. Hieracium 15. Sabaudum dictum.

Locus & tempus.

Gerard. Hieracium intybaceum. Endites haufe meede. Eceur proposita icone Tabern. mutat titulum Gerardus?

Hieracium dictum Sabaudum quibusdam, in Sabaudia obseruauit. Montbelgardi abundat propè vites & in pratis, florèt Iulio & Augusto, planta uetiam in Horto Ill. E. C. Passim reperitur in montibus ad Rhenum & circa Heidelbergam & in Ostwald, sabulosis & petraeis locis, potissimum circa montanas arces Strakenburg & Schönburg, in Harcynia.

HIERACII SABAVDI
varietas duplex.

Descriptio

Accipimus à fratre C. Bauhino Lactaridis siue Erini Matthioli nomine plantam siccam accedentem ad hieracium Sabaudum, si non idem: in foliis tamen discrimen, vel lusum: in caule cubitum excedente, folia, priora, alternatim disposita, vncias duas longa & pollice angustiora, ovalia ferè, non crenata, qualia à Matthiolo pinguntur superiora, quosdam dentes habent, hirsuta sunt. Flores similes Hieracio Sabaudò, lutei, in pappo euanescentes. Idem nobis misit cum hac inscripitione Plantam cuius etiam i-

conem damus, Lactaris & Militaris Plinii, Erini Matthioli species, Guilandino Parauii. Hæc sanè multum variat si non diuersa planta in caulibus cubito altioribus hirsutis, folia alternatim quali sita, uersâ potissimum parte hirsuta, tres pollices longa, duos lata, in acumen delincentia, pulchras habent lacinas acutas, quæ in superioribus ramis breuia sunt & lata, in ramorum extremitatibus flores quales præcedenti.

An Erinus Matthiolo? Non est Erinus, teste

Hieracii Sabaudi varietas 1. Erinus quibusdam Mart. dicta;



Hieracii Sabaudi varietas altera.



Columna, quæ à Matthiolo

depingitur, mutila planta, sine floribus, quam nemo nisi ab eodem depictam vidit, præter ipsam, qui se manus lacte infecisse eâ extirpatâ asserit. Sed certè folia ab ipso depicta Dioscoridis Erinum non referunt, verba quidem illius non percepit, nam folia incisa in superiore parte, foliorum scilicet intelligitur, non caulis ut perperam sicte depinxit. Commentatoris inquit in Adu. Lobelius, impudenciusculi commentum licet deprehendere & ridere. Is namque quum sibi visam & lectam ad riuulos aquarum, adè lacteo succo manantem, ut eo manus inficere posset: palam & audacter legitimum Erinum asseuerasset, non verbis ausus

Synon.

Matth. ap. pino exploratur.

Diosc. explicat.

Matth. carpitur.

fuit describere: sed pingendam curauit plantabili in vulgus Pharmacopæorum icone, quinis, nec pluribus, erectis de cespite caulibus: Ocyini folio, bino, non nihil crenato, per interualla donata, nullâ additâ prorsum, quæ dubiam vel fidem, plantam fulciret, historia: cuius picturæ quum eum pudnisset, postremo de vltimis Commentariorum interpolationibus curauit expungendam, nullam interea in huius miscellæ subrepticam locum suffecit: ac ne verbulum quidem subdidit, quâ id de causa dempsisset.

Lact.

Lacuna Matthioli exhibet figuram falsam atque vocari Erinum: barbarice Herbam lactis, & Lactariam, nonnullosque per Erinum Balsamitam maiorem intelligere.

Cast. Dur. Erinus, Basilicum aquaticum. II. Lugd. Erinus Matthioli. Sed & Lonic. figuram malam Matthioli habet lib. 5. cap. 341. vbi masser Basilien / Erinus & Echinos Dioscoridis, Ocy-mun aquaticum vulgi, Lactor, Herba lactis, Militaris, & Anabula cognominatur.

C. Bauhin. Phyt. & apud Matth. facitur se ignorare quid sit Erinus Matthioli, pro eo autem ipsi ostendebat Guilandinus Hieracium quod Sabaudi nomine Lobelius proposuit.

A Lonicero pingitur sub titulo hasentöl/ vocaturque in descriptione hasenlartich / Lactuca leporina, hasenstrauch / oder Semmel / Sö-chus non aspera, Lactucella, Cicerbita, & Laitze-ron Gallorum.

Lact. lepo- rina. Cicerbita.

Lacuna nomine Hieracii minoris, quod quodam Dentem Leonis vocare scribit, solam proponit figuram. Verum Hieracium hoc non solet dici Dens Leonis sed è contra Dens Leonis quibusdam existimatur Hieracium minus.

Lacuna no. 1

An Anguill. Lactuca leporina Apulei, Caz- zalepre, & Hieracium minus Dioscoridis. Item postea. Hieracium minus, Romæ & in Hetruria Caz- zalepre, quo in cibis & potissimum in ac- tartis vtuntur.

Ab Caz- zalepre Angull.

Lob. Aduers. [vbi & morsus Diaboli vocatur:] Obs. (vbi ipsi Lagopus & Lactuca Leporina Tragi videtur) & Ic. Pl. Hieracium minus præ- moria radice.

Taberu. Icon. Hieracium minus Dioscoridis: Hist. Hieracium secundum: & postea inter no- mina, *lepidum tragou* & *isidourum unedi* Dioscoridis, Accipitri- na minor Herbariorum, Sithileade & Sithellade Africanorum, Hispanorum *Coyon de Galbo Hierua*, i.e. herba testiculi galli, Ic. Hier- acis *minus*, Angl. *lytle hasse mede* / Belg. *has uifcruyt* / Germ. *flein habichstrauch*. Item Icon. Hieracium nigrum, *schwarz habichstrauch*, Hist. Hieracium tertium. Adhuc Icon. Hieracii minus, Lactuca leporina *hasenstrauch / hasen- lartich*: Hist. Hieracium quartum. Tandem Icon. Hieracium aphaeoides, *habichstrauch*: Hist. Hieracium quintum, quod Aphacæ Theophrasti simile sit.

Accipitri- na minor Coyon de Galbo Hierua Testiculi galli

Hierac. Aphaeoides Icones 4. Tab.

Figura 4. Gerardii Hieracium minus Hierac. nigrum. Leporinum Aphaeoides Picris Theoph. Amara Gaza.

Camer. hort. Hieracium minus Matthioli, spö- tanea herba: Gerard. lib. 2. cap. 1. proponit icones Taberu. sub his titulis, Hieracium minus Dioscor. Hieracium nigrum, Hieracium lepori- num, Hieracium aphaeoides.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 16. siue minus, Ic. Hieracium 15. siue Chondrilla folio minus, Hier- acium Aphaeoides Taberu. Apud Matthiol. Hieracium minus.

Hort. Lus. Hieracium minus præmorsâ radice, Lactuca leporina *hasenstrauch / hasenlartich*.

Hieracium præmorsâ radice inueni Geneuz in pratis circa *Arne* fluuium, floret Iunio, Julio & Augusto. Frequentissimè circa Basileam. In Ducatu Wirtembergico, ad fontem Admirabilem floret Augusto, Septembri & Octobri.

Locus & Tempus.

HIERACIUM MACROCVLON IVNCE- um siue minus primum Dodonæo.

EX radice crassâ, albâ, amarâ, succo lacteo prægnante, complures exeunt caules cubitales, interdum triebitales circiter, angulosi, laues, atronitentes, concaui, in ramos aliquot diuisi: flores singulis circulis insident singuli, Hedyppo- idis, lutei, ex squaroso modicâque hirsuto capitulo emicantes, *femine* succedente rusto, longo, ad tactum nonnihil aspero, cum papposo tome- to: folia pleraque omnia ex radice statim orta per terram sparguntur, Sonchi laciniati, interdum plus minusve laciniata, in obtusum mucro- nem desinentia, tenera, hirsuta raris & longius- culis pilis, nonnihil amara.

Descriptio

Dodon. gall. Hieracium minus primum inscri- psit, dixitque appellari à nonnullis Intybum a- greste, aut Lactucam minorem, Germ. *flein has- bichstrauch* / Belg. *Elein hanichstrauch*.

scilicet

HIERACIUM MINVS PRÆMORSÂ radice, siue Fuchsi.



PER terram spargit silua longa quædam, ad radicem parum laciniata, sic vt interdum laciniæ opposito situ respondeant, aliàs verò non item, sedque ex brevioribus, vel longioribus interualis, hilari vitore splē- dentia, sapore & succo lacteo cum eiusdem classis aliis cō- ueniens, si quibus donata pi- lis, ii rari funt:

inter hæc caulis erigitur modò vnus, modò plu- res, cubitales & sesquicubitales, nudi, striati, ina- nes, circa summum in alas aliquot diuisi: qua- rum singule singulos sustinent flores luteos foli- osos, è calyce oblongo, modicè squamato, in- cano, lanuginoso. Radix fibrata, inâ parte præ- morsâ nigricat, per cætera candicans, lacte tur- gida. Hæc sanè planta insigniter variat magni- tudine & laciniarum diuersitate.

Fuchsi. Hist. Hieracium minus. Tragus nullam habet figuram sui Hieracii minoris, Morsus Diaboli appellati, eandem autem figuram, quam Fuchsius & Dodonæus habent, ponit cap. 88. sub titulo Lagopi *hasenstrauch*, vnde transpositio- nis suspicio: inibi enim descriptio non videtur quadrare figuræ.

Sed & Matth. in Dioscor. eandem habet figu- ram, cui inscriptio est, Hieracium minus: inter- rea pro suo more non describit. In com. Ital. & Lat. cum mag. fig. ceu & Epit. Camer. eandem quoque retinet, descriptionem quidem apponens, sed quæ non quadrat figuræ: folia enim non sūt asperiora quam in Cichorio. Nec ea mutat in Hist. germ. Camerarius, sed descriptionem inibi diuersam addit, quæ non facit mentionem aspe- ritatis foliorum.

Hæreo an Hieracium minus præmorsâ radice benè fuerit notum Gesnero de hortis, dicenti: Pro Hieracio minori Matthiolus herbam Söchis cognatam exhibet, quod ad vires parum interesse puto à Dente Leonis.

Tom. II.

Descriptio

Varietas

Synon.

Lagopus

Matth. ta- natur.

Camer. no.

Sonchus

Dens leonis

Lob. Adu. Obf. & Icon. plant. Hieracium longius radicatum.

Tab. Icon. Hieracium Intybaceum. *wegwarzen* / *habichfraut* : In hist. Hieracium sextum.

Item Hieracium machrorhizō, *habichfraut*: in hist. Hieracium leptimum. Item icon. Hypochæris, *Porcella*, *föreflein* *fraut*: hist. Hypochæris:

C. Bauh. Phyt. Hieracium 8. iue Dentis leonis folio, radice oblonga. An Apargia Theophrast. 7. hist. 9. Hieracium 9. iue Dentis leonis folio alterum vnicaule. Hieracium 6. Tabern. Hieracium n. iue dentis leonis folio minus, Hypochæris Tabern. Autē dixi curiungam prædictas plantas, verum nescio quare Hieracium 6. Tabern. dicatur vnicaule, quandoquidem in descriptione ramulosam faciat, & figura quoque indicet.

Gerard hypochæris, *Porcella*, *Swines Succocic*. Item Hieracium longius radicatum, *lang rooted haufe weede*. Icones Tabern. habet.

Montspeliū obseruauī florens mense Maio ad ripam fluminis propē Castelnou, vbi in pratis solet prouenire. Genere in muris. Montbelgardi etiam in horto Ill. C. Witt. spontē, semine maturo Iulio, ac florens Augusto. Frater C. Bauh. Basileæ collectum misit nomine Hieracii longius radicati.

HIERACIUM FLOREM INCLINANS.

Delicatio



Radix compluribus fibris donata lacinarum subamarum: folia in orbem per tetram spargit multa, Dentis leonis, hirsuta, aspera, spithamea & longiora, alia caulibus adnascuntur: atque hi plures ex radicis capite oriuntur, nonnūquam in ramos diuisi & foliis donati, alii nudi, tenuiores, simplices sesquipalmates & bipalmates: sed

enim tum hi, tum illi terram versus nutant repandi, spinulis rubentibus, vt & foliorum dorsa colta, asperi, flores hieracii, lutei, nutant, in pappo abeuntes: ad radicem florum caules crassescunt interdum quā parte se contorquent: semina longa sunt, nigra, inuoluta quibusdam partibus humilibus seminibus longioribus Calthe.

Lobel. Icon. Pl. Hieracium facie Hedypnois. Teut. 288.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 17. iue minus alterū capitulo inclinato. Hieracium 21. iue minimum latifolium. Hieracium minimum, vel 8. Clusio.

An Clusio in Pann. hieracium 3. iue minimum: hist. post. hieracium 9. iue minimum?

An Tab. Icon. hyoseris latifolia, hyoseris mascula, flori serotini fraut: In hist. hyoseris. 1.

Gerard. Anglo hyoseris mascula Male Swines Succocic.

Prope Montspeliū obseruauī florens Aprili & Maio vbi caules solent esse simplices: Montbelgardi in horto Ill. C. à me factum, folia maiora, minus laciniata, caules diuariantur, floret etiam Iulio. Basileæ collecti semen matuum Augusto in horto D. Iacobi Zvingeri.

HIERACIUM MONTANVM maius latifolium.



Radice nititur breui, nigro-incana, succisa, digitum minorem crassitudine equate fibris multis, albis, in extremitate bifurcatis donata, lacte pregnante, saporis multum amari: foliis longis, latis, crispis, ex albo incanis, rigida lanugine obductis, Hieracii Echiodis folii in modum effigiat, sed duplo latioribus, breui petiolo herentibus, caulem amplectentibus, præsertim inferioribus, breui petiolo herentibus, acuminatis. Intret folia ad finem Augusti procedit caulis rotundus, asper, pilosus, spithameam vnam & median longus, quandoque in duas aut tres alas diuisus, in quibus capitula crassa exoriantur, multis foliolis constantia: florem producentia luteum, plenum, qui cen alii huius generis in floccum abit, ac unā cum semine nigro ventis dispergitur. Tota planta lacte turget.

Tabern. icon. hieracium montanum maius latifolium: hist. Hieracium 13. iue montanum maius latifolium Groß Berg habichfraut mit breuten bletteru secundum.

Gerard. Chondrilla Hispanica, flore purpureo. Quam plantam intelligat Gerard. nescio: icon est Tabern. qui non designat Hispanicam sed Germanicam plantam floris lutei, Icon hæc erat ponenda c. 12. pro Hieracio latifolio, Broad leaved haufe weede vbi pro eo male ponitur figura Cichorii Tabern.

Hier. fa. 12 Hedypnois

An Hier. minimum Clusio.

An Hyoseris latifolia & mascula Tabern.

Locus & tempus

Descriptio

Synon

Hort.

Hort. Lus. Hieracium montanum maius latifolium Groß bletcherid hapichkraut.

narynie funnis montibus incola, inter Griefsbach/ Antegast/vvndt dem Ribelsawer/ Saurbrunn.

HIERACIUM LATIFOLIUM GLABRUM ex valle Griefbachiana.



Priorē hęc emulatur, licet radix minor sit, & folia angustiora, & paulo breuora, inferiora etiam longiori prædita sunt pediculo, cetera verò pediculo carēt, caulem amplectētia, ad exortum angustiora quā prioris, tenera, mollia: caulu ambit in quinque, sex, aut septem stammina, quibus singulis flus infidet vnicus, luteus, præcedentis floribus par, sed paulo minor: tota planta amara est.

Tab. Icon. hieracium montanum latifolium minus, Flein Berg habichkraut mit breitem bletzen: In hist. hieracium 14. hieracium latifolium montanum minus, hieracium 7. sine latifolium glabrum.

Gerardo hieracium montanum latifolium, Great leaved haufe weede.

Locus & Tempus. Hieracium latifolium glabrum obseruauit in valle Griefbachiana Maio florens, vt & Tabern. descriptionis author.

HIERACIUM LATIFOLIUM PRÆMORSA radice, caule singulari, Pilosella maiori affine.



Syluas amat, foliis palmatis, quibusdam breuioribus, aliis longioribus, vix vnciā latis, quædam dētata in margine, breuissimis pilis, & quibusdam cōspicuis donata, aliis manifestis, quædam in acumen desinunt: caulis dodrantalis ac etiam cubitalis, vnicus ramus, nullis ra-

Tom. II.

mis diuisis, sine foliis, multos in summo cacumine cōgestos flores luteos sustinens, ad instar Pulmonariæ Gallicæ, qui tandem in floccos abeūt, ad singulas diuisiones foliolum tenue angustum. Radix fibrata & præmorsa.

Hoc nostrum hieracium videtur habere multam communia cum Inybo ἀπυρόζου Thalii in hærinia de quo paulo post.

Hieracii speciem nunc descriptam, accepi Basileā à Fratre in silais inuentam, qui hieraciū latifolium præmorsā radice nominabat. Hæui etiam ab Vldaricho Cholio Argentinā ex plantis D. Agerii.

PILOSELLA MAIOR QVIBVSDAM, ALIIS Pulmonaria flore luteo.



Hævic radix geniculata, rubra, fibrataque, lac manans sapore amarum: à qua caulis surgit lacte similiter prægnans cum foliis, cubitalis, tenuis, hirsutus, in cuius alis summitatem versus ortis, flures infident lutei, hieracii, qui in pappos maridi facellunt: folia à radice statim exortuntur, sinuosa, superne virentia & hirsuta, inferne densiore lanugine canescentia, maculis pulchris interdum notata, sapore amaro & nitrolo, pediculis subrubentibus, villosis, longis quibusdam, aliis breuioribus.

Inferibitur hæc à Trago (qui non meminit macularum) Auricula muris maior, Groß Meißor: & quibusdam Germanis dicitur hœdnisch wundkraut / hoc est, Solidago Sarracenicæ.

Pingitur à Lonicerò Pulmonaria, quæ à quibusdam Gallica dicitur sub inscriptione, Groß Meißor / Auricula muris, vuds hæs, Piloselle vulgi, sed descriptio non satisfacit. Lob. Adu. Obs. & Icon. Pl. Pulmonaria Gallorum flore hieracii, Auricula muris maior Tragi. Gesn. in cat. Hyoseris Plinii, hodie fossalis Auricula muris: De hort. Pulmonaria Gallica, Lactucarum generi cognata: Scopæ fortè illa regia Plinii ramis oblongis: Et forsitan eadem Sideritis illa Plinii, Scopæ regia appellata. Robert. Const. in Amat. Pulmonaria.

Tabern. Icon. Pulmonaria Gallica siue aurea, Hist. Pulmonaria Gallica inas. Is non meminit foliorum maculatozum. C. Bauh. Phyt. Pulmonaria i. siue Gallorum folio pilosissimo, hieracii flore: Theophrasti lib. 7. cap. 7. & Plinii lib. 21. cap. 15. nonnullorū Corchorus.

Nascitur Alfine, siue Auricula muris maior Tragi in vmbrosis nemoribus, nonnunquam etiā ex antiquis muris in perpetua vmbra litis prorumpit: Iunio mense appetente caulem emittit

foliis destitutum. Pilosella Tragi quæ quibusdam Pulmonaria Gallica dicitur, alius Hepatica, quam Auricula muris nomine Lonicer^{us} satis bene paxit, Montpelii creticit in muris & siccis locis, florens mente Aprilis. Genevæ vidi virentē in radice montis Saleuæ Februarii principio. Basileæ floret Iulio cum pulchris maculis in foliis.

Tempus. Galenus inquit Tragus lib. 6. hanc stirpem describit, atque illam frigidæ & humidæ naturæ esse, ideoque eodem modo lacris ignibus adhiberi posse.

PILOSELLÆ MAIORIS SIVE PVLMONARIAE LUTEÆ SP. CIES MAGIS LACINIATA.

Descriptio



Proximè dictæ est hæc à radice similis; folia autem maiora, latiora, longiora, & profundius laciniata, in angulos profundos acuminatos ad pediculi finem disticta, stellam mediam representantia, quorū quædam toruntur: quædam acuminata, pilosa, lanuginosa: caulis cubitalis vnicus, vnicofolio in media sui parte, magis laciniato præditus,

in alas aliquot distictas, ad quarum exortum, foliolum admodum exiguum, acuminatum, angustumque exoritur: flos in fine lunii apparet, in Iulio explicatur ac pericitur, luteus plenus, in pappū abeuntis. Tota planta lacte madet.

Tabern. Hist. & Icon. Buch weiblein, Pulmonaria gallica fœmina.

C. Bauh. Phyt. Pulmonaria Gallica 2. siue latifolia laciniata.

Locus

In siluis densis & opacis Fagorum non admodum frequenter occurrit.

PILOSELLÆ MAIORIS SIVE PVLMONARIAE LUTEÆ LACINIATÆ SPECIES MINOR.

Descriptio



Radix huic crassa admodum, multis crassiusculis fibris donata, ut non nisi lacera- ta euelli possit: folia ex pluribus ceu capitibus vnicis septem lōga, quædam breuiora: quædam parum aut vix laciniata, caque minor, maiora autem profundè laciniata, parte superiōrè vix hirsuta, in aucta pili manifesti in costis vel neruis: fo-

lits inferioribus pediculi longi, superioribus per caulem multo breuiores: caules ipsi dodrantales, infernâ parte rubentes, torridi, caulis hirsuti, in paucos ramos diuisi: quorum extremis flores insident singulares, satis magni, lutei & papposi. Nec in radice, nec in foliis laporem vllum insignem animaduertimus.

In multo pontis Clareuallæ vrbis, nec alibi me obseruasse recodit. Flores & femina decidunt Augusti principio.

Locus & tempus

PILOSELLÆ MAIORIS SIVE PVLMONARIAE LUTEÆ SPECIES ANGSTIFOLIA.



Præcedentibus nititur radice magis curtâ & longioribus fibris donatâ: folia donatur lōgo ut prior, sed angustiora, pilosa, lanuginosa, latè disticta, nec profundè laciniata, non duntaxat à radice ortâ, sed & caulem ad summum vsque amplexo, in summitate ad alarum exortum ince-

Descriptio

gro, non laciniato. Caulis & flos prioribus respondent.

Tabern. Hist. & Icon. Buch fôl mit schmalen Blettern. Pulmonaria Gallica tenuifolia.

C. Bauh. Phyt. Pulmonaria Gallica 3. siue oblonga, angustifolia.

Pulmonaria gallica tenuifolia.

PILOSELLA SIVE PVLMONARIA LUTEA ANGSTIORI FOLIO VALDÈ PILOSA DUPLEX.



Pilosellæ maiori siue pulmonariae luteæ similis, cuius tamen folia acuminata sunt, longis pilis valdè hirsuta, non tantum à radice statim orta, sed etiam per caules pedales hirsutos: flores lutei, singuli vel bini, ac etiam terni, maiores quam in vulgari, qui nondum pallefcentes, foliis obuestiuntur, quæ caui longique pili

Descriptio

pili ornant, & tandem in pappos euanescent: radices torosæ, nigrae, in fibras crassiusculas desinentes.

Huic similis si non lufus cui folia per caules breuita & lata: folia longis pilis hirsuta, inferiora verò breuiora habere videntur pediculos: prior in icone notatur litera A. Altera verò litera B.

Pilosella alpina nostra florebat mense Junio in monte Saleue prope Geneuam, vnde mihi allata quæ notatur B. Altera quæ A. insignitur, reperta à nobis in peregrinatione Rhætica prope Iofen in muris, quam Gesh. Pilosellæ speciem faciebat. Similem habemus ex plantis ficcis Agerianis Argentinx datis cum flore vnico.

APHACA OLVIS VETERIBVS.

CAP. VII.

Aphacam olus, non legumen, appellat Theophrast. lib. 7. cap. 7. propter foliorum similitudinem: ea enim foliis Intubo quodammodo proximis cõditur. Inter Cichoracea autè c. 11. Aphacam vocat ingultabilem, & amaram, quæ festinanter floret: sed flos celeriter fenescit, atque lanugine pappo dicta marcescit: tum alius iterum prouenit, atque iterum alius: idque tota hyeme, verèque toto vsque ad Aestatem factitatur: flos Melini speciem gerit. Alia tamen est Aphaca inter legumina, vt suo loco patet. Mirari subit Theophrastum, cur Aphacam amaram & quidem ingultabilem scribat, & tamen inter olera recenscat. Plinius Aphacem vocat: Acquinoctio, inquit, nascens Aphaca, subinde alio marcescente flore emittit alium, totaque hyeme, totoque Vere vsque in Aestatem.

Quenam porro sit hæc Aphaca Veterum asseru difficile facit. Fuchsius & post eum Matthiol. Amat. Casalp. Thalius, C. Bauh. Schvvekf. & alii, Dentem Leonis esse concludunt. Nos hanc Hedypnoidem siue Dentem Leonis Fuchsi inscribimus.

Hedypnois Plinii, Aphaca Theophrasti Lobelio, an Hieracium minus multis, aliis Cichorium luteum?

Aphacæ Theophrasti, non quidem legumini, sed herbæ (inquit Dodon.) continet Erigeri siue Senecionis species, Cichorium fetidum à plarisque [à nobis Senctio hirsutus grauitè olens] appellata.


HEDYPNOIS SIVE DENS LEONIS Fuchsi.

Radice digiti ferè minimi aliquando crassitudine, lac e plaga fundente, surgunt nudi & inanes pediculi, palmares & plusquam dodrantales, aliquando hirsuti lanugine facillè cedente, quibus insident singulis singuli flores pulchri, patuli, lutei, maiores quàm Hieracii, cuius floribus similes sunt: exterioribus foliis pronè parte ex fusco rubescentibus, calyce glabro, multido, extra quem quatuor aut quinque folia viridantia reflexa: flores in pappos abeunt, calyce dehiscènte & circa pediculum reflexo, nudam florum sedem porosa pellicula caluitium fenile imitante, obductum.

Hermol. in Dioscor. coroll. 663. Cichorium folio latiore, Edypnoida, & Leonis Dens vulgaris voce dicta. Cordo, & Corn. in Diosc. Hieracium parium: de quo hic ait. Et hoc Hieracium prio-

ri non adeò dissimile, ex Lactucæ aut potius Intybi generibus est, idèoque ab Autoribus per se præteritum, & sub illis comprehensum. Nostri flem habiditran dicunt. Alii Kõrfrat. Quæquam sunt qui Hedypnoida Plinii, ista Germanicà appellatione accipiant. Et sanè videtur eadem herba esse. Apud illum (Cordum) annotatum esse esse Hedypnoidem Fuchsi.

Generosus Dominus Hermánus Comes à Neuenare, tam splendida stirpe natus, non erubuit rei Medicæ dare operam, sed summo studio (vt cætera omnia) herbarum cognitionem esse sectatus: id quod Annotationes eius doctissimæ testantur, quas suo secundo Tomo Herbarii adiecit Brunfelsius.



Ibidem herbæ, quam cõmuni vocabulò & recepto Dentem Leonis vocant, eam putat esse, quæ à Dioscoride Lagopus in quarto herbarum hist. libro nominatur.

Sunt, qui Cichorium & Dentem Leonis pro eadem accipiant herbam, inquit Brunfelsius.

Tragus Hedypnoidem hæc pingit, & describit Hieracii maioris titulo, dicens. Generosus Comes de Neuenare putauit hanc plãtam ad Lagopoda (Dioscoridis) referri posse. Ego tamen assero Lagopoda non esse appellandam. Quia constanter pronuncio esse Dioscoridis lib. 3. ἰσπύριον τὸ μέγα, Sonchiten, Lactucam erraticam, & Sitheliam: Apulei cap. 30. ὀρθόκιστον ἀγρίαν, Aspidelon, vel Aspidion, Picridem, Iobonson, Lactucam siluaticam, Officinarum & vulgi Dentem Leonis, Rostrum porcinum, & Apoitematicam (vt Comiti iam commemorato placet) dici: Germanos etiam, ceu & Hieracium minus, propter Solem Sonnenmirbel (Heliotropium), temporis ratione Mergenblumen (Florem Martii,) ob colorem Otterblumen, seu Eierblumen (florem vtiellinũ dixeris,) & quia raris capitibus similia sunt scaporum cacumina pfaffenblatt / Münchföppf (Caput Monachi,) & à foliorum forma, Iewen zan, (Dentem Leonis) & wisen lartich (Lactucam pratensem,) seu weglattich (Lactucam viarum,) quòd forma & lacteo succo ad siluaticas Lactucas pertinere videatur, vocare solere: posse & commodè Augenwurz (Oculariam radicem) dici &c.

Matth. in suis comm. Hist. germ. & Epit. cum addit. Camerarii, Dens Leonis, de quo ait. Quæ Theophrasti lib. 7. cap. 11. de plantarum historia Aphaca vocatur, inter Cichorii genera esse reponendam nemo est qui ambigat. Huic per omnia in vnuersum respondet, quæ nonnullis Dens Leonis, aliis Dens caninus, quibusdam Caput Monachi, aliquib⁹ Rostrum porcinum, plerisque verò Ambubeia vocatur. Tameñ Plinio Cichor. ipsum propriè Ambugia vel Anibubeia dicitur.

Dens leonis Lagopus Diosc.

Cichorium non est

Comes de Neuenare nor. Lagopus non est

Rostrum porcinum Apoitematica Heliotropium. Flos Martii. Flos Sicelinius

Caput Monachi Lactuca pratensis Lactuca Sicarum Ocularia radix.

Aphaca Theoph.

Dens caninus

Ambubeia

Altaxacon.
Intyb. erraticus.

Lonicus huius figuram habet lib. 5. cap. 71. sub titulo *habichs fraut / vnadt psaffenrörlin* diciturque vocari Hieracium minus, officinis etiam Altaxacon, Græcis Hedypnois.

Fuchsius, inquit Anguillara, à quo Hedypnois (Plinio etiam Hedipnois dicitur eò quòd suauiter dormire faciat, vel quòd eius flos præter alias Serides suauiter admodum spirat.) siue Dens leonis inficitur, Intybi erratici speciem alteram facit.

Intyb. silu.
Troximos
Pauli.

Fuchsius eum apud eum esse vocat Intybum siluestre latifolium, Hedypnoim maiorem Plinii, Aphacam Theophrasti, *1790 2129* Pauli & Dionysii Vticensis de re rustica.

Amat. in Diosc. lib. 2. c. nat. 126. Secunda species Cichorii agrestis.

Condrilla
Vrinaria.
Pissenlitt
Gallorum.
Lectiminga

Dodon. gall. Condrilla altera. Lobel. in Adu. Vulgi Dens Leonis, siue Vrinaria. Vrinaria herba, pissenlitt Gallis pueris dicta, quasi Lectiminga: alium nanque supprimendo, obstructioneque referendo Meseraicarum, plus lotii derivat in vesicam, quàm quantum pueruli retinendo sunt, præsertim inter dormiendum, eoque tunc imprudentes & inuiti stagula pettingunt. Siquidem mulierculæ mendicæ & pueruli rustici in pratis, præsertim inter dormiendosue Talpari terra semiobruta (veluti Endiuicæ cotingit) germina, eoque suauiora minusque amara, candidiora effusa, in acetariis vorant, aut iuculis indunt. In Obs. Dens Leonis vulgi, Taraxacon, Corona & caput Monachi, Chondrilla Galeni Anguillaræ, Chondrilla altera Dodonæ: Idem antea quoque vocabat, Condrillam alteram Dioscoridis, Dentem leonis Dodonæ, radice longà non rotunda. In Icon. Plant. Dens leonis vulgi, siue Vrinaria.

Corona Mo-
nachi.

Gesn. hort. Hieracium minus, Hedypnois altera Plinii. In cat. pl. Hieracium alterum quod & minus, *teiffels fraut* [Herba Diaboli] Gæli *sonnenwurbel* (Solsequium luteum), Intybum syluestre.

Herba Diaboli.
Solsequium luteum

Gesn. hort. Hieracium minus, Hedypnois altera Plinii. In cat. pl. Hieracium alterum quod & minus, *teiffels fraut* [Herba Diaboli] Gæli *sonnenwurbel* (Solsequium luteum), Intybum syluestre.

Aphaca
Cesalp.

Huius Cæsalpinus meminit, quando ait. Aphaca, cui innumera vulgò tradantur nomina, quæ lubens prætereo passim iuxta semitas, & circa oppida nascitur. &c.

Seris agrestis.

Cronemb. de compos. medic. Seris altera agrestis, Plinii Hedypnois & eiusdem vt Theophr. Apha, vulgò Dens Leonis. Lac. in Diosc. Dens leonis, Rostrium porcinum, Officinis Taraxacon. Turn. Intybus silu. altera, Theophr. Aphaca, Plinio Hedipnois.

Hedypnois
Dalech.
Flos canum.

H. Lugd Hedypnois Dalechampii. Tabern. Icon. & hist. Dens Leonis, Rostrium porcinum, *psaffen blat / sautwüffel / hundsblum*, Flos canum.

Pauli. nat.

C. Bauh. phyt. Dens Leonis latiore folio: Item Dens Leonis angustior c folio. Habetur maior & minor. Quam Hedypnois foliis mirabiliter ludat & Cæsalpinus tantum dicat reperiri angustioris folii: ego duas Dentis Leonis non facio: sed varietatem existimo.

Hedypnois siue Dens Leonis Fuchsi, vocatur germ. *psaffen rerlin / Rostfraut / psaffen blat / pippato*, *mündchpoff*. Belg. *papenkrust / hont-rooßen & schorstbloemen* Causer *bloemen*, Gallicè *Dent de chien*, ou de *Lion*: ou *pissenlitt*. Italicè *Cruani*, Radice, *Girafole*. Dent di *cane & Piska al terro*. Patavii *Pisso ds can*. Hisp. *Dente de Lion*. Angl. *Dent de Lion*, aut *priesies cronwe*. Boh. *Plosska*.

Locus & tempus.

Hedypnoim Plinij siue dentem Leonis vidi

Monspeliij, Lugduni florentem toto anno, Patavij Februario, vbi copiosè crudam in acetarijs edunt, Genææ florentem Februatij principio & Octobri, Basileæ Maio, Iunio, Iulio, Augusto, & Octobri inter portam stein & Eschen. Bisantij vocant *des Pepes*: Quædam Saga in Burgundia vocabat *Cranulot*, & fascinata allecrebat eum fascinum tollere. Montelgardii frequens etiam in Horto E. C. spontè prouenit, florens Aprilis. Cæterum prouenit in hortis, in campis, præpè sepes, & in ruinosis ædificiorum muris, quinetiam in vineis, pratis & viridarijs.

In apostematibus ac ardentibus febribus nihil sanè vtilius ac efficacius vsurpari meo quidem (inquit Tragus) iudicio potest aqua huius (Dentis Leonis) destillata, si ea singulari vicibus mensuratum aut quatuor cochlearium bibatur: hoc enim remedio punctori lateris dolore mitigantur, somnus accersitur, tussis auferitur vna cum inflammatione: optima collyria aduersus maculas oculorum ex aqua eius destillata fiunt, quantum succus idem possit, sed & vehementius & efficacius oculorum caliginem disiecit: herba viridis extrinsecus inposita (quod & de lincolis in aqua madefactis intelligendum est) omnem inflammationem nigrarum & adurentium pustularum sedat, siue illæ pedibus, manibus aut genitalibus oriatur: quin & inflammationi membrorum medetur aqua destillata, lincolis in ea madefactis ac inpositis. Postremo solent & mulierculæ facies suas hac aqua ablucere, vt maculas exterrant, purging; & immaculatum vultum consequantur. Adstringit, roborat, atque abstergit, auctore Matthiolo; magis quàm vtrumque Cichorium. Cocta, stomachum dissolutum adstringit, cruda verò aluum sistit: Eadem dyentericis auxiliatur, sed magis cum lente decocta. Succus potius prodest, quibus genitura effluit: in aceto decocta, vrinæ tormina disiecit. Vniuersæ plantæ decoctum potum Ictericam tollit.

Vires
Apostemat.
is.
Aqua destillata.
Dosis.
Collyria.
Succus.
Herba.
Pustulæ

Facies.
Vires in
Matthiolo.
Dyenteria
Ictericæ.

HEDIPNOIS MONSPESSVLANA,
siue Dens leonis Monspess.



EX radice Descriptio
Crassiuscula caulis surgit palmatis, cultura etiam cubitalis & bicubitalis, crassiusculus, concauus, paullo supra radicem in ramos tres, quatuor, aut quinque diuisus; quorum vnusquisque florem gerit vnicum magnū, odoratum, Hedypnoidis nostratis flori similem, calyce multo crassiore, pulchriore, piloso, è foliis multis compacto. floris folia extrinsecus rubescunt, cæteroque lutea: tandem is in pappos euanescit.

Plant. Icon. Condrilla prior Dioscot. Verrucaria

capia Condrilla. Item post. Chondrilla altera Diosc. Mospelienium Dens Iconis Asphodeli vel Leucacantha bulbulis.

H. Legd. noi.

Quatuor figurae vnius (istius Hedypn. Mospel.) plantae pro diueris & distinctis herbis exhibita apud historiam habentur.

C. B. mor.

C. Bauhin. Phyt. Dens 15. Leonis Mospelanus, Cichorium Constant. Matthiol. Chondrilla altera Dioscor. Lob. Item Chondrilla 9. Verrucaria altera, Chondrilla prior Dioscor. Lobel. & Clus. Eandem plantam duobus locis tradidit Frater. Querit Lob. in Adu. Mospelienium Dens Leonis, Asphodeli, vel Leucacantha bulbulis oblongis, an Condrilla altera Dioscoridis? Item demonstrare videtur minus conuenire Condrilla alteri Dioscor. lectores locum perpendant: Huius, addit, facilis proeuentus in Hetruria, Galloprovincia, & Narbona marginibus fatorum & pratorum. Vires quas dicemus alibi opportunius, latuete nostrum Commentatorem, qui hunc Dentem Leonis nouitatis & peregrinitatis titulo iactat Constantinopolitanum Cichorium, cum tamen Sienae illius patriae, inque Hetruria, Liguria, Galloprovincia & Narbona pratis non parum copiosum istud proeueniat. Neque enim si flores, sunt huic duplo ferme maiores magisque pallentes, quam communis, propterea putandum sit facilius proeuenire aut frequentius Constantinopoli, quam Masilia, aut Mospelii, vnde seimus tum Commentatori, tum aliis non paucis Scriptoribus hodiernis missas & obrufas pleraque plantas pro Aphricis, Syriacis, & Constantinopolitanis. Sic res cadit pigris & ambitiosis ingenijs, quos res nondum vix oblectant, vt pueros picturam capiant & decipiant. An putarat peritos illic istud Cichorium admiraturos, quia Constantinopolitanum erat & a Caesare Oratore missum? An non pudet tantam rei herbariae scrutatorem nondum nosse Cichorium patrium, & plus credere oratori occupato muneribus aulicis, quam exercitato ad discendas varias species Scridis. Clus. Hist. Condrilla prior, Hist. post. Condrilla prior Dioscoridis legitima, nonnullis Hispanis Terna di S. Guyeria nuncupata, quo nomine & Phyllum ab illis vocatur.

An Condrilla altera Dioscoridis?


Math. i. a. p. car

Proeuenit Mospelii in pratis, nec non etiam in locis siccis in ipsis muris vrbis, florens mense Aprilis & Maio, & Autumnum vt Septembri. Habui in horto Geneuae, vbi totam hiemem pertulit. Inuenit eam Clusius Salmaticensi agro locis incoltris, & multis aliis Hispaniae Augusto florēt, vel etiam secūis.

Terna di S. Guyeria Locus & compus

HIERACIUM MONTANVM LACINIATO folio lanuginoso Clusio.

EX radice obliqua & rugosa, minimisque digiti crassitudine, multis etiam fibris donata, aliquot extuberant capita, vnde sena aut plura enascuntur folia, vnius, duarum & trium vnciarum longitudine, semunciam lata, crassiore nerno per mediam longitudinem excurrente, mollia, breui incanaque lanugine praedita, infima parte valde laciniata & angustiora, superna vero latiora, sed dentata duntaxat, candido succo virgencia: de quorum medio, bini aut terni emergunt cauliculi, palmates, enodes, foris laeues, inrus concaui: sustinentes flores luccos, floribus hieracii alpini hirsuto folio similes, quibus tamen color paulo saturatior, semen maturum tenue, longi-



cern. hieracium 17.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 13, laciniato, lanuginoso folio, quod valde conuenire tradit cum hieracio Lobelii folijs & floribus Dentis Leonis bulbosi. Sed Lobelius pingit suum differentem admodum radice & valde hirsutum, cum profundis laciniis vel segmentis. Gerard. hieracium 7. Clusii, hanc se vnde.

Crescit in leytenberg, florētque Iunio, hieracium montanum laciniato folio Clusii. Proeuenit in altis Lotharingiae montibus inter Espinal & Fonteneus, Tabern.

HIERACIUM NARBONENSE ROTVNDIFOLIUM caule aphylo, & Hieracium caule Aphylo hirsutum.

Illud Mospelio, ex rupibus illi vicinis euulsu, habuimus. Quod statim a radice alatis pediculis longiusculis folia fundit octona aut dena, plius minus, rotundis, in ambitu exacuris, sed innoxii apiculis, veluti aculeis, donata, laeua, sapore manifesto destituta. E quorum sinu cauliculi iuncebini exeunt, palma vix longiores, nudi, quales in Dente Leonis vulgi dicto, quorum summa florem sustinet luccum, minorem quam dictae plantae, sed in elegantem pappum pallidulum farhifcentes, qui multiplex singulos flocculos, sed lactuce pedicello, sustinet: semen exiguum, longum, sed lactuce minus, subruffum, striatum. Saporem nullum manifestum animaduertimus.



Clus. Pann. Hieracium 7. montanum laciniato folio. Hist. post. Hieracium 8. folio Hedypnoidis: hieracium montanum laciniato folio. Tab. Icon. & Hist. hieracium montanum angustifolium folijs Cichoraceis. Berg has bidit mit schmalen wegwarten blatz

Describe

Describe

Hoc autem radice nititur fibras multas demittente, foris folia, intus alba, quae aliquando singularis, aliquando iuxta terram in plura capita distincta, tandem in unam radicem coeunt: per terram sparguntur folia semunciam lata, si iurato, obtuso mucrone, hirsuta, coliculi



Locus & tempus.

pedales, scilicet pedales & cubitales, tenues, striati, non ramosi, hirsuti, inanes: flos Dentis Leonis ex hirsuto calyce.

C.B. Phyt. Hieracium 12. siue foliis Cichoraceis flore magno.

Genere prouenit passim in pratis florens Maio, Montebardi copiose maximū quoque, floret Iunio & Iulio.

HIERACIUM PARVUM HIRTVM caule aphylo, crispum vbi siccatum.

Descriptio



Locus.

& incana, scilicet unciam aut uncias duas longa, satis lata, diuisione Erucae purpureae nobis dictae, siccata crispa videntur, radix crassa.

A multis annis habemus Montepelii collectum Idem quoque attulit gener Chelidius, & D.I. fac. Miege: diu durantiem existimo plantam.

HIERACIUM MONTANVM 6. Clusio angustifolium.

Descrip.

Radix, ita descripte Clusio, digiti crassitudine interdum aequat, longa, nigricans, tenuibus fibris praedita, summā parte in plura nunquam capita extuberans, quae summā tellure fena aut plura oblonga folia, semunciam ferē

lata, & nonnihil incana proferunt: è singulis radicis capitibus, prodeunt inter folia, singulares calyculi, duri, nudidodrantales aut palmares tantam, vnicum florem sustinentes, è multis oblon-



gys extremo intericulis foliis, lacteoque colore praeditis, constantem: quo defluente, semen oblongiusculum cum pappo leui aere siatu excutitur. Aliud eius genus inuenitur, cuius folia nonnihil in lateribus laciniata sunt, ferē instar foliorum Leucoil marini, minus incana: flos aureo colore magis rutilat, alioqui per o-

mnia simile. Vtriusque planta lacteo saccō plena, & amariuseulo gustu est.

Clus. Pann. & hist. post. Hieracium montanum 6. Tab. Icon. & histor. Hieracium montanum 2. Berg habich frau mit schmalen bleetereen. Hieracium 16. Gerard. Hieracium 6. Clusii, haud fe weede.

C. Bauh. Phyt. hieracium 20. folio oblongo non Synon. dissecto. huius & altera species, foliis nonnihil laciniatis, minulque incanis habetur. Cam. hort. hieracium Pannonicum 6. montanum.

In omnibus illis montibus à Calenberg Danubio imminenti ad Alpes excurrentibus nascitur Hieracium hoc sextum Clusij. Floret Maio. Crescit in montibus Alsatiae non longè ab arce montana fönigstein/quò itur feldberg, Tabern. Locus Tempus

CICHOBIUM BVLBOSVM.



Vtrum ita pulchrum est Cichorij genus, innumeris fibris tenuibus longè lateq; perreptas, quibus appensi bulbi, Auellanae circiter magnitudine, Alabastris marmoris candore, solidi; folia scilicet unciam aut uncias duas longa, semunciam latiora, leuiter sinuata, glabra, in obtusum mucronem desinentia, crassiuscula, rubescencia: inter haec surgunt costali palmares hirsuti; quorum fastigijs flores infident Hieracij, lutei, in pappum euanescentes: haec

Hæc planta amara est & lactum succum habet.

Histor. Lugd. Cichorium strumosum Miconii: A foliorum forma vocatur Cichorium, strumosum verò ab effectu & forma radicis, quæ strumas refert & sanat. Quam ob causam Barcinone, ubi frequens oritur, Porcellanes vocant, quasi dicas strumofam.

Condriilla. pusilla bulbosa. Lobel. in Adu. & Icon. Plant. Condriilla pusilla marina lutea bulbosa, an Dioscor. radice rotundâ orbiculatâ Strongyle: & an Theophr. Cichorium, Perdictionæ.

An Hæmorrhoidalis. C. Cap. Duri? C. Bauh. Phyt. Chondrilla 10. siue belbosa marina. Cichorium bulbosum Dalechamp. Hist. Lugdunens. Item Chondrilla n. siue Cichoriû strumosum Myconii, multum similitudinis habet cum prædictâ, folio minime per ambitum serrato. Hoc videtur, Cast. Dur. Hæmorrhoidalis nomine velle exprimeret.

Locus & tempus Per arenam serpit, floret mense Aprili prope montem Serti ad mare, Bulbali Montispelo à Genaro Cherlero allati & Montbelgardi in horto Ill. E. C. Siti palchre quidem folia generunt, insigniter repentes: in maritimis aliouq; & luncetis, vnde maximo labore euulsit scum inter radices luncorum penitus ferè delitescant; obseruatur.

Vires strumæ Radicem istam globosam ad strumas curandas multum cõferre se experimeto didicisse Myconius apud Histotium Lugdunensem asserit.

Radix Quinque aut sex integæ cum melle sumptæ multis diebus continuè mitum in modum profunt. Eadem præstat aqua earum stillatitia, vel decoctum, sed medicaciis, item conditum ex his cum melle paratum admodum iuuat.

Aqua stillatitia. Conditum. Quare, vti dictum, hanc plantam Myconius Cichoriû strumosum à forma & effectu nuncupauit. Radices, quas serophilus mederi ait Cæsalpinus, sumuntur ex melle, vel cum farina Tricea in placentis, vt vinum vetus superbibatur ieiunio ventriculo mane & vesperi: nam elicit sudores, & strumas in collo dilcuit.

Placenta.

PILOSELLA MAIORI FLORE, SIVE vulgaris repens.

Descriptio



re exsiccante; flores Dentis leonis minores, lutei, Matthioli, auri, ex imis foris purpurascensibus, calyce hirsuto, fuscis, qui maturescentes in paposam lanuginem euolant. Radices numerosæ,

tenues, sed humi pertinaciter hærentes.

huius notissima herba non meminisse nec nomen vllum ei indidisse Veteres aiunt Herbarii, quam Recentiores Pilosellam appellant à copiosis pilis, quibus tum cauliculi, tum folia vestiuntur.

Synonyma
Pilosella Erymon.

Minima quædam Intybi species hæc est, inquit Cordus, quod ex floribus formâ, colore, & lacteo foliorum liquore facile colligitur, similiter ab omnibus (vt Dioscorid.) Auricula muris vocata, etiam Germanis quibusdam & Italis Pilosella.

Intybus muris

Nomina Neusßhor & Tagelfracur sunt quidè Pilosellæ, quam picturâ exhibet Apollinariis: verum vires, quas adscribit, sunt vtriusque Anagallidis: caueatur igitur Lectores, ne cum Apollinari hæc duas plantas confundant.

Apollinariis error

Brunfels. Tom. 3. Rhap. 45. & in quarto p. 271. Auricula muris. Sed Auricula muris (telle Hieron. Brunsch. non est Latinorum Pilosellæ: quâuis tamen Tragus hanc lib. 1. cap. 93. describit & depingat sub nomine Auriculæ muris minoris.

Auricula muris Brunfels. not.

Sed & Theod. Dorst. hanc in Pilosellæ proponit hac inscriptione. Auricula muris, 1602 & 1605, Pilosella.

Dorst. not.

An Fuchs. Hist. cap. 6. de hoc loquitur cum ait. Auriculam muris pro Anagallide qui depictam ostendunt Herbarii, erant. Vt & qui Pilosellam alio nomine Auriculam muris appellari tradunt.

Cast. Dur. Cæsalp. Camer. in Epit. seu in Hist. Matthioli. geran. Pilosella minor. j & Matth. in suis comm. Pilosellæ.

Pilosella

Quidam, inquit Lacuna, existimant, Pilosellâ esse Holostium, sed non est: est enim Holostium legitimum inæognitum: existimo speciem esse alicuius Graminis. Matthioli idem seruit, & postea in post. Comm. cum ann. C. Bauh. sibi ipsimet contradicit, ô labilem viri memoriam!

Lapsus mulierum.

Lonic. lib. 5. cap. 75. figurat bonam Pilosellæ maioris Fuchsii habet, titulo Fle n Neusßhor / Tagelfracur / & præterea aliam paruum quæ nõ placet, nec etiam descriptio.

Lonic. not.

H. Lugd. Pilosella maior Matthioli.

Tabern. in Hist. Pilosellam puram: in Icon. Pilosellam & Auriculam muris cognominauit C. Bauh. Phyt. Pilosella i. siue maior repens hirsuta. Thallio, Pilosella media, Auricula muris vulgî. H. Luf. Pilosella vulgaris, Auricula muris.

Nomina linguarû

Pilosella maiori flore, siue repens vulgaris vocatur Germ. Neusßhor / Tagelfracur. Gall. Pilosella, Oreille de rat ou souris. It. Pelosina, Auricula di topo. Belg. Tagel cruyt / Muissoer. Gallo-Belg. Peluerre & Veluerre. Hisp. Piloselle Boh. Chlupafec. Sclauon. Nusch Czermony a mudny. Hung. Egér sil.

Nascitur extenuato & arido solo, in collibus & incultis locis, & agrorum herbis limitibus. Maio & Iunio mensibus potissimum floret.

Locus & tempus.

Amarum lac secta planta mittit: id quod extenuantis atque abitergentis indicium est facultatis, inquit Matthioli. Tota Pilosellæ planta vehementer adstringit, glutinat, cohibet, refrigerat, siccatur: quapropter huius rei non ignari pastores maxime caute, ne ouium greges in illis pascuis immorentur, ubi huiusce plurimum gignitur: quandoquidem depascentes oues tanta alui adstrictione afficiuntur, vt inde facile emoriantur. Hinc dicitur Medicis, eam mederi dysentericis, & veteri profluuiis: quin & ex vino austero potam vulnera glutinare, tam scilicet exterius, quam interius, illatam, cathacisque magno esse auxilio, & biliosis vomitionibus: cruentis item

Vires ex Matthioli & aliis

Gregi noxia.

Dysenteria

Vulnera

Fractura.

spuris, enterocelis, & omnibus in vniuersum fracturis opem ferre, sed præcipuè caluariz. Non defunt etiam è recentioribus qui eam maximè commendent ad rancem, vuluæ relaxationem gargariatu, ad locinoris & splenis affectus, nempe ad regionum morbum, ineipientem hydropem, & lienis tumores, quòd viscera hæc roboret. Additur quoque vtiliter in potionibus intinsecorum vulnerum, & in vulnerarijs emplastris, atque vnguentis: foliorum succus non solum recentia vulnera glutinat, sed vlcera quoque contumacia, phagedenâque sanat: & præsertim oris, & pudendorum. Succus decoctumque aciem ferri vel chalybis sæpe mesam indurat.

Huic autem non abimilis, sed multò maior Camerario alia Pilosella maior describit Frater.

PILOSELLA MINOR FOLIO
a: gultiore, minùs piloso, repens.



cati, vbi flores duo, tres, quatuor, lutei vt alterius scilicet minores.

Lactucella
sila.

Camer. hort. Lactucella Sylu. repens, ambigens inter Hieracium & Sylu. Lactucam: amara. C. Bau. Phyt. Lactuca 14. Lactucella Sylu. stris Camer. Item Pilosella 2. siue maior repens glabra: Auricula muris minor Tragi, secunda. Pilosella maior Camerarij. An Horto Lus. Pilosella maior altera, Groß Meußförlin.

Passim in syluis prouenit, florens mense Maio & Iunio.

PILOSELLA MINORI FLORE
Hirtior & elatior non repens.

Descriptio

Fibrosa est huic radix, surgens lacteo succo acris & amariante, reptatu fibratum non se propagans, nec humi procumbens, sed Hieraciorum more, nonnunquam ad bicubitalem altitudinem exerescit in plures caules modicè hirsutos, interdum hirsutissimos, maximè verò parte inferiore, cui folia quedam adnata admodum angusta, vncialia, quadrantalìa & palmaria: latiora verò sunt & paulò longiora nonnunquam quæ à radice statim oriuntur, sapore subdulci, nullà eccellente adstrictione, quæ lac manant sicut & caules, qui



propè summum cacumen in aliquot surculos quadrantales & sextantales diuiduntur, hique rursùm plures breues hirsutos pedicellos promunt, quorum singulis singuli inhiident strobili, Hieracij alicuius, lutei, pleni, calyce ambitri striato, lanugine nigra obfuso.

C. Bauh. phyt. Synon.
Pilosella 3, siue maior erecta, quam si quis ad

Hieracia referre malit, non cum eo contenderit. Taber. inquit, videtur eam voluisse exprimere in Hist. & Icon. nomine Pilosellæ maioris alterius. Imò nobis non videtur voluisse, sed expressit. Verum quidem est, quod ea meliùs pingi potuisset. An Horto Lus. pilosella maior altera Groß Meuß obrlein.

C. Bauh.
nor.

Pilosella hæc prouenit in muris circa Montebelgardum. Basileæ collegit Frater in syluis, Patauio etiam attulit.

Locus:

AVRICVLA MVRIS HISPANICA,
alij Hieracium Pannonicum flore
saturatè croceo.



Vldim^o anno 1608. in

horto Stutgardiano Ill. Principis, & horto Fontis admirabilis, plantam à nobis hæctenus nullibi obseruatam, quæ sane speciosa nobis videtur è genere pulmonaria Gallorum, quæ quibusdam pilosella dicitur. Hæc autem vocant Auriculam muris. Ei radix est fibrosa purpurascens amara, manans

Pulmonaria
Pilosella.Auricula
muris.

Radix.

succo lacteo, ex se emittit climata instar pilosellæ maioris Fuchij & Consolidæ mediæ, quæ radículas albas in terram defigunt, ac ea ratione plurimùm se multiplicat & expandit: Folia ei primò vncias duas longa, postea palmo longiora, potissimùm quæ ex caule prodeunt, ea similitudinem quandam habent cum quadam Scabiosa syluatica, maiora latitudine vncias duas excedunt, quædam habent in margine veluti denticulos longis spatijis dispositos,

positos, non nihil sunt aspera, potissimum superio-
re parte, inferiore autem nervosa, vtrinque co-
piosi pili: *Caules* ei cubitales & sesquicubitales,
qui horrent pilis nigris longis, per caulem tria
folia, inferiora maiora, superiora minora, & in
his denticuli maiores, à principio caulium maio-
rum oriuntur minores palmares vel pedales, si-
cuti etiam inter folia caulium, quæ rara: ramu-
li singulares: in extremitatibus copiosa *capitula*
florum ex brevitibus pediculis prædictæ Pulmo-
nariæ similibus: calyces siue foliola hirsuta pilis
nigris: mense Maio, in medio solus flos, qualis
prædictæ herbæ vel Hieraciorum se expandit: Colore
insigni quasi Arantiorum non bene ma-
turatorum, in medio apices plurimi lutei bifidi:
folia floris in circuitu, qualia Caltha, denticula-
ta, siue crenata: Vbi flos vnicus euauit in fine
Maii multi simul florent, & veluti vmbellam
exhibent: odor paruus ferè Hedypnoïdis siue
Dentis Leonis: Excidunt flores remanentibus
calycibus, in quibus pili & semina, tennia, longi-
tuncula fusca, semina matura vidi Iunio.

cuius coloris, ex sicca hanc potissimum descripti.
Condriillæ speciem aliquando scui, herbam à
me inueniam florere Iunio circa Curiam Rha-
thorum ad Rhenum. Valerandus Dourez hanc
eandem aliquando mihi dedit pro Chondrilla
ex Sytia allata.

Locus &
tempus.

SENECIO SIVE ERIGERON VETERIBVS.

CAP. VIII.

Senecio tametsi non fundat Lacteam succum,
Stamen inter Lactarias stirpes cum recensere
placuit, propterea quod semen non illius vt ea-
rundem in auras euanescat. Cûnque sit vulga-
tissima herba, nihilominus diligentius eius histo-
riam profectus est Dioscorides, quam vel Balsami,
Cinnamomi, vel Garyophylorum. Descriptio
igitur Senecionis, apud eum hæc se habet.

Senecio, qui Latinis aliter inter Dioscoridis
notha Herbulum, aliis Erechtites dicitur, *cauli-*
culo est cubitali, subrubicundo, *falsis* crebris &
Eruce modo per extremitates diuisis, sed mino-
ribus multo: *floribus* in luteum vergentibus, qui
quidem citò dehiscunt ac desiccantes in pappo
abunt. Atque inde etiam Erigerontis no-
men Senecio apud Græcos inuenit quòd Vere
flos capillorum ritu canescant. *Radix* est su-
peruacua. Nascitur porro maxime in maceris &
circum oppida.

Herbulum:
Erechtites
Eruca fo-
lio

Erigeron à Græcis, quæ à nostris (inquit Plin-
in cod. ver.) Senecio vocatur, herba est Trixage-
nis specie & mollitia, cauliculis subrubicundis:
nascitur & in tegulis, & in muris. Nomen hoc
Græci dederunt, quia Vere canescit. Caput eius
numerosa diuiditur lanigine (qualis est spinæ)
inter diuisuras exeunte. Quare eam Callimachus
Acanthida appellat, alii pappum. Nec deinde
Græcis de ea constat. Alii Eruce foliis esse dix-
erunt, alii roboris minoribus multo. Nec defue-
re qui & alterum genus facerent, nec quale esset
demonstrarunt. *Herizon* Theophr. inter olera &
Intubacea numeratur 7. hist. 7. diutius florens, in-
ter hyberna prorumpens post Aphacam.

Erigeron
Plinis
Trixagene
specie.

Acanthi
Callimachi
Foliis Sa-
rietis
Genus a-
liud.

Ceterum, Senecionis nomine sequentes do-
nauimus plantas. Primum quidem Senecionem
vulgarem, quem Etygeronem verum sine Senecio-
nem credimus. Senecionem alterum hirsu-
tum, viscidum, maiorem, odoratum. Senecio-
nem folio non laciniato. Senecionem siue Eri-
geronem caruleum, aliis Conyzam caruleam.
De his mox ordine agemus hoc libro. Senecio ma-
ior, inquit Tragus, verè appellari potest flos S.
Iacobi & pro illo vsurpari tuto potest. hic flos à
nobis Iacobæa inscribitur lib. 25. De Senecio-
ne marino siue Iacobæa marina agemus libro
iam dicto. Senecionis nomen tribui Carduo
benedicto apparebit ex Trago lib. 26. c. de Car-
duo benedicto. Recentiores, teste Cordo, Si-
symbrium Cardamine, siue Nasturtium aquaticum,
maximo errore Senecionem vocant, vt videre
est lib. 28.

Synonyma
Senecio -
vulgaris
siue Erige-
ron
Senecio
hirsutus
graniter
oleus
Senecio fo-
lio non la-
ciniato:
Senecio
caruleus
Iacobæa.
Iacobæa
marina,
Carduus
benedictus:
Sisymbrium
cardamine
siue Na-
sturtium
aquaticum

SENETIO VVLGARIS SIVE ERIGERON.

Flores à partimque lignosa radice nititur Sene-
cio, renui, albâ, subpurpureaue, sapore olera-
ceo, ex quâ auolluntur caules terni, quini, & plu-
res, teretes, striati, hirsuti, brachiati, & concaui,
foliis donati vnialibus & longioribus, pediculo

CHONDRILLA FOLIO NON DISSECTO,
caule nudo & foliato.



Radice firmatur
longa, crassa,
lacteo succo
turgente, in
capita aliquot
diuisa, folia e-
mittente mul-
ta, palmaria
& longiora,
semuicia, plus
miuus lata,
Plantaginis
tenuifoliae fo-
liis similia, a-
cuminata,
glabra, crassa,
Chondryllæ
ceruleæ in-
star, eiusdem
penè coloris:
caules frequen-
tes iuncea,
dodrantaes
siue pedales,
glabri, figosi,
foliis pluri-
que nudi, non-
nunquam fo-
liati, in binos
ramos vt plu-
rimum didu-
cuntur, quoru
singulis fls
inhidet vnus,
magnus, lu-
teus, in pappo
euanesccens,
quibus semina
adherent tenuia,
longa,
striata, & ruf-
sa, per matu-
ritatem parû
mihi constat



Descripio

viduis, hirsutis & veluti circumrosis, alte tno positi nascuntibus: flores in ramulorum fastigijs plures simul iuncti, pediculis breuibus lanuginosis appensi, tanquam staminum luteorum complexus, qui in pappi scelerimè fatiscientes cum ventis feruntur, h. sc. artem ambiunt inuolucra calycum instar, striata, basi squammulis atro mucronatis compacta.

Synon. Brunfels. Tom. 2. in Diosc. lib. 4. p. 124. Erigeron siue Senecion herba quâ hodiè in acetatis vtuntur: alias Herba petrella.

C. Bauh. apud Matth. & in Phyt. Senecio minor: Verberna fœmina Brunfels.

Trago dicitur Senecio, Senecio i. vulgaris. Is malè, meo quidem iudicio, Erigeron Dioscoridis & Aphacam Theophrasti ad vnum genus refert & omnia ea de Senecione intelligit quæ Theophrastus de Aphaca prodidit. Nam & ipse Theophrast. Erigeri expresse meminit. Quod verò Simonem Ianuensem Carduum benedictum Erigerum appellentem manifestè errasse scribat, sicut & illos, qui Nasturtium hoc nomine vocent, à veritate minimè alienum est.

An Carduum cella Job Agricola in Nicol. Alexand. in suis paraphrasibus Carduncellum, quod vulgus Omnium mensium flos, Germ. Wiler & Nonnar bliuhin vocare tradit.

Synon. Dodon. gall. Erigeron secundum, Senecio minor (& hoc titulo etiam à Castore inscribitur.) Lat. in fel. Erigeron minus: Erigeri species altera seu minor. Lob. in Adu. & Icon. plant. Gesnero de hort. Tabern. Ic. & Hist. Th. lib. 10. & hort. Lus. Senecio siue Erigeron. Camer. hort. Senecio vulgaris. Apud Eustachium. Roeflin Senecionis figura malè adaptatur capiti de Caputia. Ponitur à Georg. Pict. in annot. in Æmil. Macrum cap. 4. de Senecione figura Nasturtij aquatici non benè & præter Æmilij sententiam. Senecio Matth. Lac. Fusch. (cui omnes notæ Dioscoridis respondere videntur.) Turn. Corn. in Diosc. H. Lugd. Camer. ad Hist. germ. & Egit. Matth. & Casalpino.

Senecio vulgaris siue Erigeron vocant Græcè *νηρῶν*. Germ. *Creutzwurz / Grindkraut*. Belg. *Cruyscruid, Grimcruid*. Gall. *Senecion* aut *Seneslon*. It. *Spelticosa, Cardonell.* Patav. *Verzolo*, alibi *Sulazom*. Hisp. *Bom Varon, Cardo virto, & gerua cana*. Ang. *Grounself*. Boh. *Primetue Fornuy*. Hung. *Aggo siu / Konto siu*. Nomencl. Pannonico. *Hepycow* quidem quasi vernus senex, quod flores capillorum ritu vere canescant & in lanuginem abeant: vnde Latini Senecio.

Nascitur maximè in maceris, parietibus, & circum oppida. Montbelgardi passim spontè prouenit in hortis, veluti in orto E. C. tota hieme & Æstate viter. Florentem vidi Vere & Autumno Monspelij. Basileæ in hortis & alibi Octobri & Maio, Genevæ Nouembri & Ianuario. In monte Rosberg præpè Mafmunster florentem Octobri, Parauij Ianuario & Februario.

Vites ex Diosc. Testium & sedis inflammationes sanant: quin & ex manna thuris cum reliquis medentur vulneribus, tum ijs quæ neruis inflicta sunt. Illiti quoque pappi per se cum aceto, idem præstant: verum recentes poti strangulant. Totus [ver. hac postrema periodo caret:] autem caulis si ex aqua coctus cum multo potui detur, stomachi dolores à bile contractos perfanat. Erigeronem, inquit Plinius, si ferro

circumscriptam effodiat aliquis, tangatque eadem, & alternis ter despuat, ac reponat in eundem locum, ita vt viuat herba, auunt dentem cum postea non doliturum. Doloribus Erigeron ex aceto illinitur. Cætera quæ habet ex Dioscoride mutuatus est.

Galenus contentus dixisse Senecionem vim mixtam, refrigerantem, simulque moderatè discutientem habere, reliqua velut in herba nota omitit. Cum autem herba euidenter sit amara, vt sicet, abstergat, aperiatque necesse est, quare nil mitum facit teste Matthiolo, si fœmina Epoto foliorum succo, aut totius plantæ decocto, remorantes menses sibi prouocent, ab aniculis edoctæ. Senecionem herbam suppuratorem accelerare prodidit Fontanus: Casalpino folia recipi in acetaria.

SENECIO HIRSVTVS, VISCIDVS, maior, odoratus.



Et inde vt Descriptio Senecio vulgaris, radice nititur fibrosa: folijs donatus similibus similitèrque incisis, sed lanugine vndique obfatis, ideoque non nihil incanis, insuper tactu viscidis, mollioribus & fatidicis: canis erectior, procerior, hirsutus, quemadmodum & florum luteorum in pappo abuturotu

calyculi striati. Planta nonnihil sapore aromatico, figura alioquin hic posita minus placet.

Trago lib. 1. cap. 50. Matticaria syluestris, Matticariæ siluestre genus. An eadem dicto libro c. 96. Senecio secunda maior?

Dodon. Gallico Senecio maior: at in fol. Erigeron tertium, in Cichoraceo tum ac In tubaceo tum familiarum reponendum, fatens nonnihil, vnde Cichorij fatidi à nonnullis appellationem adeptum est: sed quod cum Aphace herba Theophrastice conuenire videtur.

Lob. in Obs. & Ic. Plant. ambotum meminit, pingens Erigeron. Dodonæi hoc titulo: Erigeron tomentosum. Primum verò siue maius Dodonæi, in Icon. Erigeron tomentosum alterum.

Casalp. Senecionis species altior, & in omnibus maior. Geln. hort. Senecio fatidus.

Clus. Pannon. Iacobæa Pannonica i. mollior. Hist. post. Iacobæa Pannonica prima, quibusdam Senecio fatidus dictus, sine icone.

Taber. Hist. inter nomina Artemisiæ: genus, Geeler wetterig / & milder Nictethram / Matticaria lutea, & Matticaria siluestris.

H. Lugd. 1. 5. cap. 18. Senecio fatidus Dalechampii, quibusdam Artemisiæ fatida, Sideritis quæta Plinii nonnullorum. Lectorum erit considerare an hic Senecio fatidus non sit idem cum Senecionis

Galeni

Menses Suppuratis acetaria.

Matticaria syl.

An Senecio maior Trago?

Erigeron, Cichorium, Intybum, Cichorium fatidum.

Erigeron tomentosum Senecio fatidus.

Erigeron tomentosum Senecio fatidus.

Iacobæa Pann. 1. Clus.

Artemisiæ, Matticaria lutea, Sideritis 4. pling.

H. Lugdun. natalur.

necionis specie Dodonæi, cuius figuram hoc codex capite 13. histor. Lugdunenſis ponit, quaſi eſſet diuerſa planta, amon etiam Erigeron tomentolum Lobelii.

C. Bauhin. Phyt. Senecio 2. ſive ineanus pinguis, Erigeron 1. Dod. gall. Erigeron alterum tomentolum Lob. icon.

Creſcit Iacobæa Pannonica 1. Cluſii in Pannoniæ & Auſtriæ cædis ſiluis. Floret Iunio & ſemine deciduo quotannis ſpontè renaſcitur, variis in locis obſeruauit, & habeo in Horto Ill. E. C. ſemine maturo Auguſto & Septembri. Fuchſius præceptor meus cum apud illum eſſem vocabat Arthemifiſam monoclonon Germanicam.

Matricariæ ſilueſtris Tragi ligna in ſiluis exdus ex ordine compoſita incenduntur, vt ignis calore terra ſationi frugum idonea reddatur.



haud abſimile, ſed per omnia magis extenuatum, & nigricantiſ, flore lanugiñoſo, inſtar florû Hieraciorum in aurâ euaneſcente.

Dodon. gall. Erigeron 3. Gall. tierce eſpece, Senecio de Sencllon, Theophr. verum Erigeron & Senecio Theophrati. Lat. in ſol. Erigerum 4. cito quoque caneſcens, cauliculis tenuib. dodrantalibus, parum hiſſu-

ritis, ex obſcuro rubore ſubnigricantiſ: foliis anguſtiſ, paucis, mollibuſque: ſtoſculis in ramulis eminentibuſ, pallidè luteis, citiſſimè ac non modo eodem die, ſed ſæpè intra horæ ſpatium in pappoſam lanuginem abeuntibuſ. Gefn. in ſine Hiſt. Cordi Conyzoides carulea, Heydnitſch wundfrant, (Heerzeſtra dixerit) Dentellaria quorundam. Eidem de hort. Dentellaria noſtra, Conyzoides quædam herba.

Tabern. icon. Conyza cærulea: Hiſtor. Blaw Dürer. Cur Tabern. non ampliù Conyzami appellat? Quam eſſem Tubingæ Fuchſius vocabat Conyzam minorem.

C. Bauhin. Phyt. Conyza 14. ſive cærulea. Floſ tinctorius alteri Tragi in tractu Rheni in quibuſdam pratis, Iuniperorũque nonnulliſ colliculis ac montibuſ prouenit: Iulio & Auguſto menſibuſ colligitur, poſtea que venundatur, qui tinctoribu� tantum in vſu eſt. Erigeron 4. Dod. lat. ſive 3. gall. in viginofiſ cricetiſ, quædoque in ſiluis macro & ſterili ſolo naſcitur. Senecio ſive Erigeron caruleus, ſive Conyza cærulea etiam multiſ in lociſ prouenit, circa Montbelgardum.

Verum Erigeron & Senecio de Sencllon, Theophr. Dod.

Conyza des carulea Gefn. Dentellaria.

Tab. nos.

Conyza carnica. Locus & Tempus.

SENETIO FOLIO NON LACINIATO.

Herba eſt cubitali altitudine, radicibus tenuibuſ, candidiſ, lignoſiſ, dulcibuſ: caule aliquantisper piloſo, rotundo; cauo, medulla lanuginôſa facto: in quo ſilia ſunt exigua, piloſa, in ambitu ferrata, craſſa, aliquantulum viridia, inſetnè rubefcentia, quæ quandoque colore vinoſo manus



inſiciunt: In caulis ſummitate flores ſunt lutei, in pappoſ protinus abeunt. Sapor totiuſ plâte aqueuſ eſt, vt vulgaris Senecionis. Naſcitur in quercetiſ, lociſque non admodum ſiccis, ſed humidis interdum & in pratiſ.

SENETIO SIVE ERIGERON CÆRULEVS, aliis Conyza cærulea.

Senecio hic ſubinde magnitudine, ſalicuſ aut ſinſalicuſ ſolum nactuſ, variat, aliâſ ſequiſ palmaris, aliâſ plôſquam dodrantaliſ: radicibus fibroſiſ, albicantiſ, guſtu nonnihil aromaticiſ; ex quibuſ cauleſ ſurgunt multi, tenuēſ; ſtriati, rubentēſ, hiſſuti, ramoſi, medulla alba pleni: folia integra, nec vſquam diſſecta crenataue, lanuginôſa, inferiora quidè vniciâſ ferè duas longa, ſemunciam lata; ſuperiora vt breuiora ita anguſtiora, vt aque ſapor acri & aromatico: capitula quàm in Senecione vulgari longè craſſiora, canaliculata, tomentoſa, nonnihil rubentia: ſtorum ſoliola dilutiora purpura tincta ſunt, medium obtinente pappoſo tomento exalbido in luteum vergentè.

Trago lib. 1. cap. 49. Tinctoriuſ floſ alter (in Hiſtor. germ. das ander ſcharten blumen geſchlecht ſcharten Germ. dicta.) Tinctoriuſ ſtoris genuſ alterum, primò (Aſteri atrico purpureo) Tom. II.

ASTER EX VETERIBVS.

CAP. IX.

Aster aſiaticuſ (qui apud Dioſcoridē ab aliquibuſ inter notha Aſtericon, ab aliis Bubonion, à nonnulliſ Hypophthalmon, à Dacis Rathybida, à Romanis Inguinaliſ herba vocatur) eſt virguleum lignoſum (raſſiſſion Euradæ, viſſiga lignoſa raſſiſſion Euradæ vet. caulis lignoſuſ Marcell. ſtorem habens in caçimine purpureum, aut luteum. [περσικόν & αἰθίορα] Anthemidiſ capituli modo diuiſuriſ inciuſum per ambitum (αἰθίορα) vndique meloſiſ vet. Quidam αἰθίορα quædaſion (αἰθίορα) ſoliola ſtellæ modo radiatiſ. Quæ verò caulem circundant ſolia, oblonga ſunt ac hiſſuta (vet. aliqui tota ſequenti periodo carent vſque ad prodeſſiſ, a prodeſſiſ.) Exſtuant ſtomacho, oculorum & inguinum inflammationibuſ, ſedique præciuaſ illiſ auxiliatur. Aiunt & id quod in

Aſter Aſiaticuſ Diſc.

Diſc. 6. a. ſtorem illiſ.

florē purpurascit ex aqua potum, angina laborantibus, ac plerisque comitialibus opitulari. Prodest verò flos recens ac etiam dum humidus, inguinum inflammationi adhibitus. Si verò aridus sinistra laborantis manu decerpatur, & inguini adalligetur, dolore liberat. Posteriorum Græcorum reliqui addunt: Nasci inter petras, locisque asperis, ac stellates huius radios noctu splendete &c. quæ cum superstitiosi aliquid contineant, nec in antiquissimis optimeque inueniantur, ut minime Discorideæ, reticimus.

Aster, inquit Plinius, ab aliquibus Bubonium appellatur, quoniam inguinum præsentaneum remedium est: cauliculus foliis oblongis duobus aut tribus: in cacumine capitula stellæ modo radiata. Bibitur aduersus serpentes. Sed ad inguinum medicinâ sinistra manu decerpi iubent, & iuxta cinctum alligari. Prodest & coxendicis dolori ad illigata. Sic Plin. lib. 26. cap. 5. euarians aliquantum a Discoride, qui de serpentibus & coxendicis dolore nihil habet: sicut Plinius, de oculorum inflammatione, anginis, & comitiali morbo nihil tradit.

Disc. Vera leão.

Hisce vñ autem ἡ μάστιξ legant Setapio, Otobafius, Ruellius, Cornarius, & Anguillara. At Cordus, Marcellus, & Matthiolus, loco disunctiæ patticulæ, ἡ, copulatiuâ, & reponunt. Exiltimant enim idē genus Asteris hic describi, quòd floris foliis, quæ quidem capitulū ipsum ambiūt, habeat purpurea, medium verò capitulum luteum. At Sartac. & rectè nostro iudicio duo Asteris genera floris colore distincta depingi existimat, quorum vnum illa eadem floris foliola habeat purpurea, alterum lutea: nam in vitroque genere quod medium floris locum tenet, citra contouerliam melinum seu luteum visitur.

Inguinalis herba.

Foliorum in flore Inguinalis herbe numerus, positura, & forma, quibus stellæ modo radiatur cognominem stellis, vulgarem alioquin & in sepius nascentem herbam fecerunt. Vfus deinde medicorumque ceteris vtilem inguinibus cognitam in græcis Bubonion, in Latinis Inguinalem. Atticus autem Aster, quòd ibi frequentior quàm alibi prouenit creditus sit, appellatur. Huoptalmum etiam quidam vocauerunt hanc plantam, quasi Suis oculum, quòd totus eius flos animalis illius oculum tefetre videatur.

Bubonion Huoptalmos.

Stellaria nomine equi nocum Carduus Stellatus.

Asterem Atticum Herbarios hodie partim Aspergelam vocare, Germ. verò Sternfraut/ auctor est Cornarius. Nunc, quod monendum videtur, Asterias siue Stellaria nomen est multis plantis commune. Hoc enim nomine donantur Bubonium, Cotonopus, Alchymilla, Cardui genus Theophrasti, Myacantha (Carduus nostras stellatus siue Calcitapa, de qualib. 26.) Perdicis quoque alterum genus à Plinio Astericum quasi stellare nominatum. Præter has omnes sua est Montpellierensibus Asterias siue stellaria, quæ à nobis inscribitur Rubia patua cæruleo flore, de qua lib. 36. H. n. g.

Æquinoct.

Asterem Atticum esse censet Virgilianum Amellum Matthiolus, de eo dubitat meritò Gesnerus, cum adhuc sub iudice lis sit, aliis affirmantibus, aliis verò negantibus, de quo ille ita Georg. 4.

*Est etiam flos in pratis cui nomen Amello
Fecere Agricola, faciliis quærentibus herba:
Namque vno ingentem tollit de cespite sistrum
Aureus ipse, sed in foliis, quæ plurima vtrum
Fundantur, zivola sub luce purpura nigra.*

Præter nostros Asters, quorum magnam conquisuimus varietatem, quosque mox ordine re-

censebimus, plantæ aliæ occurrunt non paucæ, quibus Asteris nomen ab aliis inditum.

Conyza enim marina Dalechampii appellatur à Lobelio Obs. & Ic. Plant. & Hist. Lugd. Aster conyzoides Gesneri.

Conyza marina Dalechl.

Sic quoque Conyza media à Lobel. Obseru. & Schwencfeldio Aster atricus luteus nominatur.

Conyza media.

Apud Cord. in Hist. pl. lib. 2. cap. 62. pro Atere Attico, & sub eius titulo malè apposita figura Chameli aurei quorundam.

Apud Tragum Chamæmelū eranthemum nominatur Aster atticus flore medio luteo.

Chamæmelum aureum quorundam. Chamæmeranthemum.

Cithnum tertium Matthioli Lobelius in Obs. Asterem Atticum matinum cognominat.

Sed & Tripolium, Turpetum Serapionis cognominatum, à Tabern. apud Vvirsung. Aster marinus nuncupatur.

Est Aster Helmol. Barb. lib. 4. coroll. 734. vulgò Stella dictus, hunc H. n. g. lib. 17. Pedemleonis & Alchymillam vocamus.

Pes leonis. Eryngium.

Aspergula Dodonæi, siue Hepatica Stellaris, multis vulgò censetur Aster Atticus. De hac demus lib. 36.

Asterem Atticum vel etiam Astericum Arabum interpretes, & Pandectarum author Mathæus Syluaticus cum Eryngio confundunt: alij Alibium etiam vocant.

Alibium.

Theoph. Golius in Onom. Asterem Atticum ab aliis Vuam lupinam vocari tradit. Sed Vuam lupinam siue Herbam Patris non esse Asterem Atticum est manifestum. Asterem quidam dicunt, sed non Atticum multi.

Herbam Patris.

Considerandum an Astetion Pausaniæ possit esse Marrubium album, inquit Tragus. Idem Tragus Asterij nomen Cannabi etiam tribuit.

Marrubium Spondilium Imperatoria.

Spondilium inter Spurias voces, Corn. Dodon. & Gesnero testibus, Asterium cognominatur.

Astericum (Imperatoria) non est Meuinquit Bunfels. Tom. 2. p. 18. in Cotollaris. De Imperatoria lib. 27. H. n. g.

Patietaria à nonnullis Astericum vocari patrebit lib. 23. cap. de Patietaria.

Hermolauus est testis Coroll. 680. Capita Papænetis Astericos Græcis appellati. Vide lib. 30. caput de Papauer.

ASTER ATTICVS PURPUREO & albo flore.



Aster Atticus qui creditur, caulibus habet cubitales & sc. quicubitales, renues, teretes, duros, hirsutos, subrubentes, silis anidos oblongis, acuminatis, asperis & pilosis, interdum crenis paucis incisiss, sapore subatomatico & subamato ac siccante: caules circa fastigium in sur-

Descriptio

in furculos dividuntur quibus *flures* insident a-
mœni, radiato Bellidis inaevis positus, sed colo-
re violaceo (Dod. cœruleo purpureo), aut albo, di-
sco medio fulvo, in pappo facillente: *radix* te-
nuis transversa iacet, a qua multa demittuntur
fibrae, sapore amaro nonnihil aromatico & cal-
faciente, quidam aiunt nonnihil Caryophylli
respicente: *semen* paruum sublongum, Intybo
non multum dissimile. De hoc autem ait Tra-
gus. *Flos* tinctorius primus, tinctoribus spiren-
tibus Schartenfraut dicitur.

Hunc Florem tinctorum 1. vocat Tragus, &
Chamæmelum tertium, & tinctoribus Spiren-
tibus Schartenfraut dicitur tradit.

Matthiol. Lac. Castori, Fracast. Camer. ad
Epitom. Matthiol. Schvvenckf. Lonic. Cordo.
Dodon. gall. & Lar. Guiland. Euch. Râssin. &
aliis passim Aster Atticus. Fuchf. Aster Atticus
purpureus. Gesn. de hort. Aster Atticus Fuchf.
Bened. Aret. Aster Atticus Fuchf. flore puniceo.
Camer. hort. Aster Atticus flore cœruleo: ad H
Germ. Matthiol. Aster Atticus 2. Bubonium, In-
guinalis. Lacunæ Asteris Attici 2. species. Thal.
Aster Atticus cœruleus. n. Lugd. Aster Atticus
Matthioli. Wirlung, Sternfraut, Aster.

Clusio Aster Italorum & Fuchfii: Is autem
iconem habet quam Lobel. Obs. & Leon. plant.
ponit nomine Asteris Italorum.

C. Bauh. Phyt. Aster 3. 1. apud Matth.) siue ce-
rulleus (flore cœruleo, Camer. hort.) vulgaris du-
plicis differentiae, qui enim maturus floret, mi-
nus altè assurgit, quam qui serius: deinde habe-
tur latifolius & angustifolius. Item: Aster 4. siue
montanus luteus. *Vna planta.*

Aster Atticus vocatur graecè *Ἄστρον Ἰταρὸν* &
Ἄστρον Ἰνγυϊνάλιον, nonnullis Inguinalis, Asterio,
Asteri Icon. G. Megerfraut / Schartenfraut /
Bruchfraut / & Sternfraut / wagsfrow. Belg.
Stercrauyt. Gall. *Perite Espargoutte*, seu *perite*
Magnet. H. Bobis, & *Estralla-da*.

Nascitur asperis, incultis, collibus & conual-
libus variis in locis, florens Augusto: semine ma-
turo Octobri.

ASTER ATTICVS MONSPELIENSIS
purpureus angustioribus folijs.



Cognatus
Asteri
Attico Fuchfii,
caulibus rectis,
cubitalibus, cere-
tibus, hirsutis:
per quos *filia*
crebra glabra;
neruosa, Lin-
nariae folijs
magnitudine &
formâ respon-
dentia: *flures*
in frequentibus
pediculis, alijs
palmaribus, ali-
is vncialibus
vmbellam me-
antiantur, Aste-
ris Fuchfiani si-
miles, paulo ta-
men minores,
violaceis in

ambitu folijs, disco luteo, qui in pappo resolu-
tur. C. B. Phyt. Aster 14. siue Tripolii (Tripolii
flore etiam dicit Lobel. in icon.) variegato flore.
Tom. 11.

Asteris Attici Fuchfii species angustioribus Locus &
folijs florens apud mare Monspelii à me visa tempus.
mense Septembri.

ASTER ATTICVS LVTEVS, SV-
pinus, spinosus.



Aster hic
supinus,
est cauliculis
multis ab via
radice prodeu-
tibus donatus,
humi magnâ ex
parte diffusis;
striatis & hir-
sutis: *folijs* nu-
merosis, superi-
ori panè simi-
libus, sed pau-
lò viridioribus:
singuli rami
druum & folio-
sum sustinent
cauliculum, in
quo *flos* luteus
circinæ ro-
tiditatis, Buph-
thalmi aut

Descriptio

Chrysanthemi æmulus: quo evanescente, calycu-
li in adè dura & lignosa capitula evadunt, vt
vngue vix frangi possint, atque *semen*, quod in
iis continetur & firmiter inheret, eximit.

Clus. Hist. Aster Atticus supinus siue secūdus:
Hist. post. Aster 2. supinus. Dod. de purg. in ap-
pend. ubi eadem icon quæ apud Clusium, Aster
Atticus flore luteo: Eandem habet iconem Lat.
in fol. pro Astere Attico supinò siue; Lob. Obs.
& Hist. Lugd. [cui & Aster humi satens,] Aster
Atticus supinus Clusii. C. Bashin. Phyt. Aster 2:
siue luteus supinus. Camer. hort. Aster Atticus
repens Clusii.

Aster dit.
Sup. Clus.

Aster Att.
fl. luteo Do-
donat.

In Getmania, Italia, Gallia, & Bohemiae as-
peris & incultis reperitur locis, in sylvis, in collibus,
nec non etiam in pratis: florens Iunio, Iulio
& Augusto.

Aster auricomus glaber latifolius folio non rigidio.

Non penitus omni pilo caret, verum tam breuè
tamque rarum, tam per folia, quam per cauleni
habet, vt visus vix capiat: adnascuntur autem
alternatim *folia*, caulem pinnis complexa, vnciâ
circiter lata, tres longa, nonnihil in ambitu sinu-
ata: ex quorum vniuscuiusque sinu palmaris cir-
citer emicat *pediculus*, *florem* plerumque vnicum,
aliquando binos sustinens, aureo intenso colo-
re micantem; magnum, Triagopogonis lutei æ-
mulum, disco luteo, denso extrinsecus agmine
obvallatum foliorum viridantium, læuium, acu-
minatorum, tantæ longitudinis vt ipsum florem
interdum superent. Collegit in campetribus
& squallidis quibusdam prope Lupi montem
Cherlettus Gener meus.

ASTER PURPUREVS MONTANVS.

Asteri montano purpureo *radix* satis crassa,
longa, nigricans, fibrata, in plura diducit-
tur capita, ac se propagat: ex quorum singulis

Descriptio



emergit *caliculus* vnus palmaris, rarius dodran- talis, interdum etiam cubitalis, hirsutus, paucis *foliis* vestitus, in summo *florem* gestans, maiorē quam vulgaris purpurei Asteris, cetera simi- lem, foliis cæ- ruleis purpureis- ne luteum veluti oculi stellatim ambientibus, quem in pappis appersum *semen* sequitur: folia circa radicem multa, pilosa, v- ciam vnā, duas aut tres longa, semunciam lata, per extremum rotunda. Auctore Camerario inter- dum globuli tumentes villosi prope radicem adnascuntur foliolis, estque omnino minor vul- gari Asteri.

Synon.

Camer. apud Matth. Germ. Aster Atticus minor, hirsuta vesicula que adnasci solet, flem Sternfrant: In epit. eiusdem, Aster Atticus cæ- ruleus Alpinus.

Deser. Clus.

Clus. Pann. Aster Atticus quintus: hist. post. se- ptimus, Austriacus quintus, Aster Alpinus cæ- ruleo flore, siue septimus.

Locus & tempus.

C. Bauh. phyt. Aster 11. siue montanus cæruleus magno flore. H. Lugd. Aster purpureus montan'. Oritur herbosis Austriacum Alpium iugis. Floret Iulio. In hortos translata sub finem Maii & Iunio floruit Clusio, subsequens deinde hiems abstulit & corruptit: ex earum enim stitipium est genere, quæ cultura vix miscere volunt. Aster purpureus montanus Dalechampii in sabulosis, aridis, & perflatis montium tumulis ac cliuis gi- gnitur.

ASTER MONTANVS FLORE luteo magno hirsutus, quibusdam Oculi Christi.

Descriptio



Enicula- tem veluti incedit obli- quæ acta *radix*, nigricans, cras- sifuscula & ca- pitata, fibras latis longas & numerosas de- mittens, ex pluribus dis- paratis capitibus subinde in vnum cœmcti- bus conflata: *caules* complures ex supina radice pedales & maiores surgunt, non- nunquam pal-

mares tantum, pilis obfci: *foliis* vestiti superius raris, frequentibus verò terram proximè, tomen- tosis, albidis, vncias tres vel quatuor longis, se- mi. laris, ex pr. incipio angusto valde viroso: *flores* in ramulorum extremis eminent singulares, ma- gni, aurcis in ambitu comantes folijs, disco con- coloris, foliis flori circumiectis albidis, euanescent- tes in *pappis*.

Synon.

Lobel. Icon. plant. Aster montanus hirsutus. Tabern. Icon & hist. iconem habet ex Lobelio nonnihil mutatam pro Asteri montano luteo fæ- mina, Berg Sternfrant reiblein. Hist. Lugd. Aster luteus, Oculus Christi minor. Item Aster Atticus Penz. Nostra icon facta est sicuti & des- criptio ad siccam plantam, in qua flores minus patuli, quos expansos esse oportebat: fortè Lobe- liana facta ad plantam diligentius siccata.

An Conyza maior altera Thalo.

Casp. Bauhin. Phyt. Aster 11. siue luteus montanus hirsutus: An Conyza maior altera Thalo? Item: Aster 12. siue luteus montanus hirsutus al- ter. Idem fortè cum præcedenti.

Aster luteus, siue Oculus Christi minor Hist. Lugdunensis in sabulosis tumulis & aridis nascitur quæ Lugduno iter Viennam. Asteris Attici genus flore luteo magno, hirsutum reperi inter Nemaufum & auenionem prope tres insignes & antiquos pontes du Gab.

ASTER ANGVSTIFOLIS luteus.

Descriptio

PVlchrum est Asteris genus, *caule* gracili, ri- gidulo, *foliis* æquabili graminica angustâ pal-



mariibus aut minoribus, ac- cuminatis, & neruosis, & maxima ex parte glabris, viridibus, sine pediculis villis, dense stipato: cuius *fusculis* singuli imposi- ti *flores* ma- iusculi, lutei, Calthæ vel por- tiis Conyze mediæ Monspeliensium, cui congener videtur, aut Britan- nicæ Lugdunensium, ca- lyce squam- inato ex viridi

incano, hirsuto.

Clusio in Pannon. est Aster angustifolius quartus, qui pingit & describit.

C. Bauhin. Phyt. Aster 7. siue luteus angustifo- lius.

In vmbrosis montium vbi Viennæ vicinorū pratis, in ipsis etiam collibus herbosis, atque in siluula ad Danubium siza paulò supra Eberstorf atcem Imperatoriam, primo cum semisse ab vrbe Viennæ miliarì, copiosè crefcit. Floret paulò se- riùs posteriore.

ASTER

ASTERI MONTANO HIRSVTO MAGNO
flore, siue Oculo Christi similis si non idem,
siue Conyza tertia Clusii.

Descriptio



Est nobis planta ex Agerianis stirpibus sicca praedicta à nobis descripta plurimum accedens, si non eadem, sed fortè variàs ratione loci: *folia* priora sunt pede longiora, ex angusto longo pediculo vix vnciam lata, figurà Scorzouere foliis accedentia, albican-
tia, villosa, potissimum infernà parte, tactu leui: *folia* verò

per caulem breuiora, & breuioribus pediculis, candidiora: *flores* similes, quibus orbis ex foliis luteis, in medio apices ex tomento emicantes, exteriùs calycis squammæ siue foliola albicantia: flores tres in nostra planta, vnus maior. Ex proportione partis quam habemus, videtur hæc planta cubitalis. Icon autem eadem quæ Conizæ Austriacæ Clusii: vtrique bene conueniens.

Floret Iunio: ac in locis siccis & aridis, herbiferis tamen nascitur: Clusius.

C. Bauh. Phyt. dicitur Conyza 6. siue Pannonica.

ASTER TERTIVS PANNONICVS CLVSII
luteus folio hirsuto Salicis.

Descrip.



Caulibus est villosis re-
cretibus, dodrãte altioribus, per quos alternatim nascuntur *folia*, nullis subnixâ pediculis, Salignâ circumscripti-
one, venosâ, pilis obrita, semina latiora: nonnunquam angustiora, vnciam vnâ aut tres longa, leuiter in acumè desinentia: *flos* summo insidet cauli, Calthæ par, luteis per

ambitum foliis, concoloribus in vmbilicis æquorum fibris, calyce est hirsuto, viridante, folioso. Resiccatis floribus, inquit Clusius semen exiguum in capitulis remanet, quod maturum cum pappo à vento discutitur: *radix* fibrosa admodum.

Clusio Pannon. Aster Pannonicus tertius: In Tom. II.

post. Hist. Aster lanuginoso folio siue quintus. C. Bauhin. Phyt. Aster 6. siue luteus hirsuto Salicis folio: quandoquidem autem suspicamur Camerarium apud Matth. in hist. Germ. hunc quoque depingere sub titulo Ein ander Sternkraut mit gelben blumen: Alius Aster flore luteo: Et in Epit. eiusdem, pro Astere luteo flore, aliorum Conyza species: nos assumpimus iconem Camerarii: verum ne quis fallatur lubet eius descriptionem addere quæ eiusmodi est. Caules profert mediocres per quædam interualla radicis repentis & se propagantis ab inferiori parte demissis fibris rectis, quæ aliquantulum odoratæ sunt, sapore aromatico modicè ad Cinnamomi saporem accedente, subacri. In summis caulibus duos vel tres ramulos habet, quibus flores lutei disco in medio apicibus conferto insident, qui tandem in pappos abeunt. Folia per caules alterna hirsuta nullo pediculo duab. quasi alis eisdem amplectuntur. Nascitur in salubus.

Aster luteo
siue hirsuto
Salicis folio
C. B.

Aster luteo
flore Camerarii.
Icon.
Dofc. Cam.
les.

ASTERI MONTANO PVRIPUREO SIMILIS
vel Globulariæ.



Tota pulchella est
planta ex Ageri stirpibus siccis: *radice* nigra, crassa, pro
portione pusille herbe, cuius *cauliculus* quatuor vnciarum
foliis alternis vestitus latiusculis, vnciam & semis longis, inferioribus ex
longioribus pediculis quibusdam vncialibus, aliis duobus & semis culmo pauld latioribus, in obtusam
extremitatem desinentibus: *flos* summo eauli insidet vnicus, staminibus multis glomeratus, similibus Globulariæ quæ Aphyllantes dicitur: *folia* accedunt ad folia Asteri montani purpurei, sed angustiora & delicatiora, nec ita hirsuta videntur, lectores rem poterunt diligentius perpedere si eis similis occurrat planta.

Descriptio

BRITANNICA CONYZOIDES, QVIBVS-
dam Aster Pannonicus Clusio.

Britannicam Dioscorid. voluit non nemo doctus, Conyis & Asteribus cognatam plantam, cubitalem, *radice* obliquâ, repente, fibrosâ, acri, cum aliqua aromaticitate, *caule* incauo villosa, in alas aliquot circa tumum ducto: *foliis* maximis quidem sesquipalmum longis, duas vncias latis aut amplioribus, reliquis palmum circiter longis aut breuioribus, semunciam latis: vtrifque longa, densa, canaque lanugine subtus pubescentibus, sapore amato præditis, citra vilam adstrictionem quantum possum animadvertere: *flore* Helenii sed minore multò, luteo disco in pappos auolante.

Descriptio

Plant. Icon. Britannica Gesnero & Lugdun. Icon Lobeliana non placet, nec etiam Dalecham-
pii, seu nec descriptio quae est in Hist. Lugd. lib. 9.
cap. 67. ea enim potius facta est ad descriptionem
Dioscoridis quam ad ipsam plantam, quod
facile agnosceret, cui nota fuerit planta quam tra-
dit Dalechampius, nec nos in ea agnosceremus al-
tritionem: ac displicet tribui huic Britannicae no-
uas vires non expertas ab ipso Dalechampio, sed
ex persuasione vana. Considerandum an haec tra-
datur à Clusio Pannon. nomine Alteris Pannoni-
ci primi, & in post. H. l. 4. c. 7. Alteris 3. Aultriaci 1.

An Alter montanus praegrandi flore Helenii,
Lobelii?

Tab. mor.

Tabern. Icon. & Hist. Alter montanus luteus
mas, berg Sternkraut Manilem. Descriptio il-
lius desumpta, ut ipse fateatur, ex Lobel. interea
mutata icon, pro more confecto, licet non de-
monstret ubi viderit plantam, nec notam aut vi-
sam censemus: Ceterum Britannicam Conyzo-
idem forte pingit Leon. & hist. pro Conyza, quae
non displicet pro hac, quamvis aliam plantam in-
telligat, nempe mediam siue tertiam de qua pau-
lo post agemus.

Locus.

C. Bauh. phyt. Aster. 10. vel luteus magno flore.
Lobelius hanc magna copia nasci tradit Lug-
duni ad mœnia & intra pomeria peninsulae her-
bidis amœnae, quam alliuur & determinat duo
flumina: hinc Rhodanus ab Oriente, illinc Arar
(quae vulgò Sone dicitur) ab Occidente: & vo-
cant vernaculè *Aynez*. Nos obseruauimus pro-
uenientem Lugduni à Ayno florentem Octobri.
Montbelgardi etiam nobis visâ non longè à S. Su-
lanna pago & alibi, florens Augusto.

Tempus.

BACCHARIS VETERIBVS.
CAP. X.

Baccharis
Diosc.

Baccharis, ut eam describit Dioscorides, her-
ba est fruticosa (βακχαρίδιος, quae vox in vulg.
exempl. deest) odorata & coronaria (βακχαρίδιος
vet. quidam,) cuius *salsa* aspera magnitudine inter
violam & Verbascum *is z. z. z. z.* Ald. *αμύλλον*) me-
dia: *caulis* angulosus, altitudine cubitali, propa-
gines adnatas habens (παράφυλλοι, Matth. suspica-
tur legendum *παράφυλλοι*) flores purpurei sunt,
subalbicantes, odorati, (Cat. addit *λεπτά*)
radices Veratro [Elleboro] nigro similes,
quibus odor (vet. quidam addit *αρώμα*)
est cinnamomo proximus. Solum amat asperum
minimèque humidum, radix in aqua decocta cõ-
uulsis, ruptis, euersis, seu ex alto præcipitatis, spi-
randi difficultati, tussi veteri (Vet. addit *καταρρα-
γίαις*) ac vrinæ difficili auxiliatur. Menfes quoque
pellit, & contra serpentium morsus vtiliter ex vi-
no propinatur. Subdita vnica è tenellis radici-
bus partus extrahit. Decoctum verò puerperis in-
sidentibus vtile. Vtiliter quoque in diaphanata
[diaphanata sunt res in puluillum detritæ ut com-
mode inspergi possint] inferitur, quippe quæ ma-
gnam habeat odoris gratiam. Folia ut potè quæ
astringant (*πρὸς τὴν ἀσπίδα*) Sic Aegmetæ Bac-
charis folia astringendi vi prædita agnoscit: at
radici vim obstructions aperienti, mensæque &
vrias ciendi tribuit: capitis doloribus adhibita
profunt, itemque aurium inflammationi, & glipis
incipientibus, & mammis à partu inflammatas
atque etiam erysipelatis. Ceterum & ipse odor
somnia gignit.

Plinius præter ea quæ à Diosc. mutuatus est

dicat ad vnguenta olim commendatam, fuisse:
quosdam errore trassò Baccar rusticum Nardum
appellasse, cum alia sit herba sic cognominata,
quam Græci Afaron vocauerint. Quosdam et-
iam Perpensam vocasse.

Galenus in Simplicibus Baccharim præterit. *Baccharis*
Sed in glossis Hippocraticis *βακχαρίδιος* πικρῆν
Hipp. *βακχαρίδιος* πικρῆν πικρῆν
exponit. Vsurpat Hipp. lib. de natura vniuersi,
xj. *περὶ τῆς βακχαρίδος ἢ ἡλαίου λαυκῆς*, inquit.

Paulus ex Dioscoride transcripsit, Baccharim
esse herbam odoratam, similem Cinamomo, Co-
ronariam, acrem. Cuius radix decocta ab obtru-
ratione liberet, & vrinæ ac mensæ moueat: folia
verò ad stringendo fluxionibus profunt.

Virgilius etiam nouit Baccharem, non solum *Baccharis*
vt Coronariam, sed etiam vt *ἀσπρόταρον* fascini ex
nimia laude. Sic enim habet in Melibæo;

Au si ultra placitum laudarit, Bacchari fron-
tem
Cingite, ne vati noceat mala lingua futuro.

Baccharis ignota est Officinis, sed herbariorum
vulgus, Benedictæ fraut, id est herbâ Benedicti,
siue Benedictam vocat: aliqui etiam *hendischuch*,
hoc est, Chirothecas nostræ dominæ (est hæc Ga-
ryophyllata de qua lib. 17.) appellant. *Benedicti*
herba.

Anguill. existimat caput de Bacchari spurium
esse, & idè eximendum ex Dioscoride, Græcis
enim nullam esse herbam sub nomine Baccharis,
ac caput de Bacchari in Dioscoride idem esse cū
capite de Afaro: transpositum tamen, corruptum,
diuulsum ab aliquo scolo, qui huic rei attendere
debebat. Quod ad Baccharim attinet Lati-
norum, nihil se certi scribere posse: cū Vir-
gilius nihil de eius forma dixerit, Plinius autem
describens Combrerum dixerit simile esse Bac-
chari: vnde patet Baccharim eius differre ab ea
quæ Diosc. Baccharis habetur.

Contrâ sic Lobel. & Pen. in Adu. Licentiùs a-
bituntur Lectoris patientia, qui istud caput è
Dioscoride quasi spurium expuctum volunt &c.
Labe hæc profecta è fragmentis Crætae, ubi
Baccharis Dioscoridis Afarum vocatur & descri-
bitur. Quod quidem nos monet, sedulam appel-
lationum perpenionem neutiquam neglectam ha-
bendam esse accuratis viris, veri fids venatoti-
bus.

Monspelij quæ Baccharis vulgò creditur est no-
bis Conyza maior Marthioli. Ex Ruellio non
potest intelligi, quam plantam lib. 3. cap. 37. pro
Bacchari herba fruticosa intelligat per D. Maria
Chrothecas, existimamus tamen eadem esse cum
sequenti. Eorum opinionem, qui Baccharim dice-
bant Digitalem purpuream resellit odor puti-
diusculus. Caryophyllatam nonnulli suspican-
tur esse Baccharem Dioscoridis, verum descriptio
non conuenit plantæ. Baccharim Libani à Rau-
volffio traditam non probat Clusius, de ea age-
mus post Gnaphalia. Baccharim Germanicam ac
crispâ, Ocimum minus, siue Basilicam vocat Tra-
gus. Baccharim Dioscoridis affirmaret Maiora-
nam siue stemm ni stultè temeritatis argui se posse
veteretur Tragus. Si Matthioli Baccharis est ver-
basci species vt Aduersaria volunt pag. 245. per-
pendendum an possit esse Blattaria purpurea.
Baccharim Lonicenus, & Brassaulus ipsum se-
cutus, eam plantam magno errore esse putarunt,
quam quidam Sclateam appellant, & nos Galli-
trichum inscripsimus. Alteram Orualæ spe-
ciem [Galitrichum silu flore minore] Baccharim
riim

Benedicti
herba.

Benedicti

acquiocq

vin esse non placet Dodonæo. Baccharis, vt testatur Turnerus in Herb. Angl. par. 1. pag. 74. dicitur Officinjs Pulmonaria, quam ad Buglosum accedere scribitur H. n. g. lib. 33. Violam matronalem Fuchii albam, purpuream, puniceamque (Leucoium) aliqui Baccharin esse putant. H. n. g. lib. 21. Baccharis etiam dicitur Asarum, quamuis appellatio Baccharis Asaro minime cõueniat.

Pulmonaria ad Buglosum accedens Leucoium Asarum.

CONYZA MEDIA MONSPELIENSIS, quibusdam Asteris Attici genus folio glabro rigido.

Descriptio



Conyza medicæ nomine innouit Monspelienſibus herba, caule pedali & plura cubitali, striato, glabro, duro: folijs alternatim positis amictis, iisque duris, rigidis, nervosis glabris, pediculo delituitis, femunciam lata aut paullo latiora, tres uncias plus minus longa, acuminata, leuiter

in ambitu crenata: flores Chrysanthemis, conspicuæ magnitudinis, lutei, è capitulo squaroso, succedente cum seminibus papposa lanugine: atque hi quidem, non secutum caules & ramos nascuntur, sed Asterium modo singuli singulorum furculorum extremis insident: radix tubest longa, fibrata. Icon nostra facta nobis absentibus non placet, erat pingenda ex planta vivente, vti imperaueramus, sed picta ex sicca.

Aster Attic. Pann. Classi 8. ligni fol.

An Tinctorum flus 3. Trago?

Bellulutea Oculis Christi.

Exillimamus hanc à Clusio traditam in Pannon. pro Aſtere Attico Pannonico secundo, & in polt. hist. pro Aſtere quarto, seu Austrico secundo, Aſtere Pann. salignis folijs quarto.

An Trago Tinctorii floris tertium genus, das dritt Scharenblumen geschlecht.

An Gesin. sine Hist. Cordi pag. 216. Tinctorius flus luteus Tragi & xovogovis flore luteo?

H. Lug d. Asteris lutei genus aliud, pratis vdiff. que locis gaudens, quorundam sententiâ Bellis lutea, alius oculus Christi vocatus.

An Cæsalp. Asteris Attici altera species in ruderibus ramosa, altior: capitulis ac floribus minoribus luteis?

An C. Bauh. Phyt. Aster 5. sine montanus luteus Salicis glabro folio: Aster montanus Lobel. Icon. p. 350.

Florentem reperi Iulio inter l'auancourt & Dampierre locis satis siccis ad ceps tamen. Plantarum Montbelgardii in Horto Ill. E. C. reperi etiâ inter Montbelgardum & iuxta vites montis la Chau, semine maturo Iulii sine. Obseruauimus etiam florentem inter Colmarium & Polweiller florentem Iunio. Frater Casp. Bauhinus misit

collectam Basiliensibus montibus, nomine Asteris Conyzoidis Gœneri.

CONYZÆ MEDIÆ MONSPEL. affinis multiflora.



Est nobis inter nostras plantas siccas vna cui manu Valeradi Dourez ascriptum est Conyza Matthioli: Hæc similis est Conyzae mediæ Monspel. dicitur: folia glabra rigida: verum per caulem admodum crebra, breuiora & in extremis minus lata denique sunt, sublonga, flores lutei quamplurimi veluti

Conyza Matthioli, Valerandi

umbellam representantes, minores, duodecim supputauimus, ex ultimam caulem fuisse cubito altiorem, satis autem crassus est: Sunt nobis similes plantæ non recordamur vnde, minores & cum paucioribus floribus.

CONYZÆ SPECIES FOLIIS virgæ aureæ.



Est nobis Conyza quedam collecta anno 1595. Iunio mense, Spiræ in horto Cl. & insignis Iurificon. D. Tengenagel Aſteris Cameræ Imperialis Spirensis stirpium seduli indagatoris, ea non parum differt à cæteris plantis quæ Aſteres vel Conyzae denominantur, folia enim per caules alternatim disposita, ferè similia Virgæ aureæ vulgaris folijs, quatuor vel quinque uncias longa, ex angusto pediculo longo dilatantur ad unciam vnam, dein paulatim tendant in acumen, eo modo quo Virgæ aurea, in iis pilos non animaduertimus, folia in superioribus partibus breuiora & angustiora: sunt ex principio lato: Caules rotundi, cubitales & sesquicubitales, in aliquot ramos diuisi, in quorum longis partibus supremis capitula magnitudinis circiter Chamæmeli lutei vulgò dicti, quæ cinguntur corona paruorum foliorum luteorum, vt cæteræ Conyzae & Aſteres, qualis

Locus:

Descriptio

tuor vel quinque uncias longa, ex angusto pediculo longo dilatantur ad unciam vnam, dein paulatim tendant in acumen, eo modo quo Virgæ aurea, in iis pilos non animaduertimus, folia in superioribus partibus breuiora & angustiora: sunt ex principio lato: Caules rotundi, cubitales & sesquicubitales, in aliquot ramos diuisi, in quorum longis partibus supremis capitula magnitudinis circiter Chamæmeli lutei vulgò dicti, quæ cinguntur corona paruorum foliorum luteorum, vt cæteræ Conyzae & Aſteres, qualis

fit *disfus* non recordor: calix conflat ex foliolis siue squamis cinereis vel albicanibus. Figuri cum effem anno 1567. apud Gesnerum obseruaueram, ea ei dicebatur *Conyza* species, eandem reperi inter plantas siccas Valeriani Doureuz cū hac inscriptione: *Conyza media* quædam.

CONYZA MEDIA MATTH. FLORE magno luteo, humidis locis proueniens.

Descriptio



Conyza media ad cubitum vnum aut alterum excreuit, interdum altius, caule tereti, lanugine incana obducto, lento: *foliis* crebris nullo ordine accrescentibus, alis vtrinque caulem amplectentibus, acuminatis, rugosis, albicanibus, villosis: *flores* ramis extremis insident, Buphthalmi, circinata foliorum luteorum

serie disci medi orbitum concolorem radiatum ambiente, odore nullo eccellente: *radix* subest caulem crassitie equans, oblique ferè acta, pauculis fibris donata.

Synonyma

Trago, qui eam describit lib. 1. cap. 54. vocatur *Conyza maior* seu *mas*.

Calamintha 3 Fuchf.

Fuchf. hist. Calaminthæ tertium genus, An Anguill. epist. p. 210. *Conyza* tertia? Matth. hanc depingit in priorib. comm. in Diosc. lib. 3. cap. 119. In post. cum mag. fig. Lat. & Ital. cap. 130. sub titulo *Conyza media* (vt & Lacuna, & Dodon.) sed non describit: in Hist. Germ. Camer. & Epit. eam exhibet pro *Conyza*: *Mittel dürrwurz*.

Lonic. lib. 5. cap. 100. Calamintha tertia, Geel *Münz*. Item cap. 127. *Conyza media Mittel dürrwurz*. Frustra duas figuras & duas historias vnus plantæ diuersis locis ponit.

Conyza 4 Vals. Clus.

Geln. de hort. Conyze species tertia aquatica. Lob. & Penæ Ad. vt & Obseru. *Conyza media*, Dioscoridis lineamentis affabre congruens.

Clusio Pann. p. 526. *Conyza tertia* vulgaris frequentissima per Pannonias locis riguis, ab omnibus tertia Dioscoridis aut media appellata, quæ duplex est maior & minor.

An Conyza 9 duplex Thalso

An Thalso *Conyza aquatica* duplicis differentiæ: alterius speciei folia sunt integra & latiora, alterius paulo strictiora & profundius in ambitu serrata.

C. Bauh. phyt. *Conyza 4.* siue maior vulgaris, *Conyza maior* Trago siue iconæ, *Conyza Matth.* & *Baccharis* Montspeliensium. Item *Conyza 5.* siue media, Alteris flore luteo, vel 4. Dioscoridis: *Cunilæ* tertium genus apud Plinium lib. 20. cap. 16. quæ *Cunilago*: plura habet genera *Cunilæ*, vt, sitiuam quæ *Satureia* est horrensis: *Cunilam montanam*, quæ *Satureia syluestris*: *Cunilam gallicanam*, quæ *origanum siluestre*: & denique

Cunilaginem quæ *Conyza* est. Hæc Frater, ego *Conyza* maiorem Tragi separeo à *Conyza Matthioli* & *Bacchari* Montspeliensium Lobeli.

Conyza media Matth. flore magno luteo, humidis locis proueniens, Germ. vulgo dicitur *dürrwurz* aut *dörr münz*. Fuchf. Geel *Münz*. Gall. *Calament aquatic*. Hisp. *yerba de las pulgas oleosa*. Boh. *slary* fraut.

Nomina linguarum

Conyza duo genera in locis humidis ac gramminosis, cuiusmodi sunt margines fluuiorum, paludibus Sole exiccatis, humidioribus pratis, & ad nonnullas tepes nascuntur. Frequentissima in omnibus regionibus quas peragravit Clusius locis riguis. Basileæ, Lugduni, Montspeli, Geneuz & Montbelgardi obseruauimus.

Locus

Eius facultates Clusio non sunt compertæ. Vires à Diosc. *Conyza* attributas huic tribuit Tabern. atque alias: verum quum fatis appareat ei non bene notas has plantas & tribus diuersis plantis indiscriminatum ascribere vires nos eas omitimus, ne cuiquam illudamus. Solent hanc *Anicula* in die Assumptionis Matris, vt vulgo vocant, colligere, suisque sagninibus, & quas vocant *Verbenis* adinungere, ac consecrare, aduersus Diaboli prestigis, tempestatumque iniurias, sibi persuadentes iis locis tonitrua, grandineque minime nocere posse, in quibus *Conyza* feruetur. Sed relictis his superstitionibus, ad alia *Conyza* genera transcamus.

Vires Tabern. Superstitio

CONYZÆ MEDIÆ MINOR SPECIES flore vix radiato.

Conyza media altera, *radice* ferè est vnica, Capalmari aut *sesquipalmari*, alias paucissimis fibris donata, aliâ plurimis, nunc recta, nunc capreolorum ritu tortili, lignosa, alba, insipida.

Descriptio



Caules erigiphræ, subtrubentes, *Conyza media* prioris breuiores, *sesquipalmares* & *dodrantales*, teretes, subhirsutos, & *Gnaphali* vulgarissimi ritu cis fastigium ramosos, hoc est, vt soboles matrem superet: *folia* ex interuallis alternatim oriuntur, quàm in dicta *Conyza minor*, *Senecionis* cœrulei ferè

paria, vndulata ac crispa, odore remisso, sapore ingrato: *flores* minores quàm in *Media prima Conyza*. Nostra icon parum placet, ita sculpram emimus. An Trago *Conyza* *fœmina* Theophrasti? Inquit Geln. apud Cordum in Hist. lib. 2. cap. 143. *Conyza* Tragi, quam hic exhibeo, vt cum Cordi *Conyzi* conferatur, videtur *Conyza minor* Matthioli. Anigitur *Conyza Matthioli minor*? Hanc frater C. Bauhinus sibi persuadet esse *Conyza* Lobeli, quod facile concedo.

Matth.

Matth. nor. Matth. ponit figuram sine descriptione parum artificiosam. Lacuna figuram habet Matthioli Conyzae minoris nomine. Lonic. Conyza minor seu fœmina, flein durwurrg.

A Dodon. gall. Conyza minor tantum describitur, ac ab eo existimatur Conyza fœmina Theophrasti. Eadem in fol. lat. pingitur pro Conyza minima, & describitur pro Conyza tertia vel minore, Theophrasti. fœmina: aliis Panion, vel Libanotis, vt inter notias appellationes reperitur.

Lobel. & Pena Adu. Conyza minima siue Pulicaria. Obs. pag. 187. Conyza minima, minimè omnium glutinosa: perperam Conyza minor Matthioli. Pſyllium Cordi. In Hist. lib. 2. c. 119. Ego existimo errore Typographi ibi positam, nec hanc intellexisse Cordum vt putat Lobel. Pl. Icon. Conyza minima.

Camer. ad Matth. Germ. sine icone: Partia Conyza Norimbergæ proueniens locis humidis secus vias, depicta à Lobelio & Dodonæo.

H. Lugd. p. 1044. Conyza minor Matthioli. Item p. 1045. Conyza minima Lobelii. Hæc describitur, illa non, vna verò planta. Clus. Pann. & Hist. post. Conyzae mediæ minor species, vel Conyza tertia vulgaris minor. An Thelio Conyza minima. Tabern. Icon. & Hist. Conyza minor, flein durwurrg. C. Baul. Conyza 7, siue minor flore globoso.

Conyzae mediæ minor species flore minis radiato Montbelgardi abundat locis humidis, florens Julio & Augusto ante portem è regione horti mei. Frater Casparus Bauhinus obseruauit Basileæ frequentissimam, & Monspeli vocari Herbam S. Rochi. Vbiuis Galliæ, Germaniæ & Angliæ locis lacustribus & humentibus artus multa. In Venardgreyen ata & fossis altero à Londino lapide fuitat Lobel.

Locus & æmpus.

CONYZIS AFFINIS HERBA VVLNERARIA, siue Solidago Sarracenicæ tertia Trago, hirsuta.

Descriptio



siue obseruauimus, caulem teretem villosum fissura rotundis pinnis amplecti, nullis nixa pediculis, acuminata, vnciam aut palmum longa, latitudine vnciali aut semuncia angustiora, non multum dissimilia à foliis Conyzae verè maioris, non nihil hirsuta: summum caulis fastigium in

plures abit pediculus, quorum lingulis florem gerant aureum in pappos degenerantem, calyce imbricato. Hæc ex heca.

CONYZA MAIOR MATTHIOLI Baccharis quibusdam.

Ex radicebus multis sparsis non altè depactis lignosis, fragilibus, odoratis, amaris, & acerbis, surgunt ad cubitos tres aut quatuor alti caules, stipati, atropurpurei, canâ lanugine hirsuti,



supra mediū in multos ramos erectos diuisi: folia Verbaſci nigri, minora, leuiter crenata, odorata, sapore acri & non nihil amaro: flores cœfert, graui-ter olentes, luteis, papposi, è calyculis squarrosis, mollibus, viridi rubroque versicolorib⁹. An Arctium siue Arcturus Dioſcoridis Cæſalpino:

Cordus ni multum fallor hanc describit lib. 2. hist. cap. 146. nomine Conyzae Helenitidis, vbi Gesnæus figuram apposuit, cui hunc adscriptit titulum, Conyza Helenitis: Eadem aut simillima videtur Matthioli Conyza maior.

Hanc Matthioli l. 3. cap. 119. in Dioſcor. pingit, traditque in Hetruria passim prouenire ac vocari vulgò Pulicariam. Hanc eandem fortè aliter pingit lib. 3. c. 44. ex sicca planta pro Bacchari Dioſcoridis Româ à Lacuna missa. In Hist. post. Italic. cap. 130. eandem pingit pro Conyza maiore, & l. 3. c. 46. eandem Baccharis nomine iterum pingit: Anguillaram exagitant, qui putant Baccharis caput superfluum apud Dioſcoridem. Idem Epit. cum addit. Camer. Conyza. Græcis καμίζα, Italis Coniza seu Pulicaria: Germ. Geelmannz. Hisp. Arradegua: Gall. herbe aux Præes. Item Hist. Germ. lib. 3. cap. 97. Grosse Durwurrg; Conyza maior seu mas. Item libro 3. cap. 43. Baccharis. Matthioli nec Conyzam maiorem valdè vulgatem, nec suam Baccharim describit: idque suo more, ego suspi- cor Baccharim eius non differre ab eiusdem Conyza maiore, nisi figurâ, quæ non placet: displi- cet in epit. addi uomen Geelmannz, diuersæ plantæ, non magis conueniēs quàm alia nomina: nec ea planta placet pro Conyza maiore, nec pro Bacchari, figure etiã non arident. Cùm Mō- speli essem vocabatur hæc planta à Monspeli- nis Baccharis, & olim Tubingæ per præceptō- rem meum Fuchſium, Conyza maior.

Lacuna l. 3. cap. 47. quamuis Baccharim siccam miserit Matthioli, ab eo tamen rescriptit figurâ: & exhibet Baccharis nomine: ac iterum postea eandem cum Matthioli pro Conyza maiore de- pingit.

Hanc, ait Gesnæus de hortis, Baccharim Mō-

Conyza Helenitis Cordo

Conyza maior Matth.

Pulicaria Italor. Baccharis Dioſcor. Matth.

Matth. censuræ

Lacuna 16. xatut.

Olea folia.
Maior.
Radices.
Contra venenata.
Culices,
pulices.

Rigores.
Dolores ca-
pitii.
Conyza
tertia.

Tempera-
mentum.

Æquiuoca

Virge au-
ree siue fo-
lidaginis
Sarraceni-
ca angu-
stifolia as-
finis.

Alisma
Maritimum
siue
plantago
alpina.

An Senecio
alium siue
hirsutum?

Senecio ca-
reruleus.
Ambrosia
gustulidam
Alpium
Montis siue
Herba ter-
ribilis.

frutice altior est, foliisque latioribus atque granulolens. Vtriusque *folia* Oleæ similia, at hirsuta & pinguis. Et maioris quidem Conyze *caulis* in binum cubitorum altitudinem assurgit, minoris verò pedem æquat. *Flos* squalidus (vel friabilis Sarrac.) est, lutei coloris, & subamarus, ac in pappos abit: *radices* auream superuacua. Frutex cum foliis substrato fossitæque venenatas bestias fugat, culices abigit, ac pulices quoque necat. Folia vtiliter imponuntur serpentium moribus, tuberculis atque vulceribus: Flores etiam ac folia ad mensis partusque pellendos in vino bibuntur: itèrque contra stranguariam, tormina, morbumque regiam. Eadem ex aceto pota, comitiales adiuvat. Quin & decoctum infellu vulvæ vitii medetur, menselique purgat. Subditus autem succus abortum infert. Sed & herba ex oleo peruncta, contra rigores est efficax. Temior verò, etiam capitis dolores imposita sanat: (nonnulli cod. carent sequentibus ad capitis vsq; calcem.) Est & tertium Conyze genus, caule crassiore mollioræque, foliis mediæ inter maiore & minorem amplitudinis. Minimè autem pinguis ea est, ac odore longè grauior, atque aded inuicendior simul & inefficacior. Locis aquosis prouenit.

Galenus tria quoque vt Dioscorides, Conyze genera assignat. Conyza maior, minorem & mediam. Maior & minor, inquit, similes sunt tum temperature, tum facultatis, gustui amare & acres. Est & tertium Conyze genus, in locis humidioribus proueniens, vtilique illis tum graucolentius, tum imbecillius. Sed primæ memoratæ tertia sunt ordinis exalfaciendo & exsiccando.

Dico, inquit Schol. Græcus, sunt Conyze genera: alia quidem agrestis: alia verò vrbana mistisue. Verùm agrestis acrior est satina. Ceterùm inter nothas Dioscoridis appellationes vocatur Conyza magna, aliis Cynozematis, aliis Demais, aliis Tanachion, aliis Phycos, aliis Ischys, aliis Dinofmos. Prophetis Brephoctonos, aliis Anubias, aliis Hedemias. Aegyptiis Ceti, Romanis Intybum, aut Militaris mina, aut Deliarium, aut Febrifuga. Aliis Phragmosa, aliis Musterrum, aliis Pista. De altera Conyza, alii Conyza parua vocant, alii Panion, alii Libanorida. Prophetis est Coronos.

Posterior atas circa Conyzarum à Vereribus traditarum noticiam nonnulli laborat. Præter alias enim Conyze plantas, tradunt quandam aquaticam maximâ teratofoliam Gesnerus, Thallius, Camer. & Hort. Lusitanus, quam Virge Aureæ siue Solidagini Sarracenicæ angustifoliæ affinem facimus, est Lingua auis Dalechampii.

An Conyze annumerandum sit Alisma Alpinum, Caltha Alpina Gesneri [Alisma Matthioli siue Plantago Alpina,] dubitat Harcynia Saxo-nochuringica Thalii.

An Senecio alius siue hirsutus est Conyza fœtida Hippocratis de qua Gesnerus hort. sub vocabulo Cotula, Thal. sub titulo, Erigeron fœtidam seu maius.

Senecionem cæruleum Fuchsius cum apud illum esse vocabat Conyza minorem: Conyzoïdem cæruleam siue Conyza murealem Gesnerus.

Conyza Hippocratis aliquorū, est quibusdam Ambrosia, teste Gesnero de hortis.

Conyza tertia quorundam, Alypium montis Ceti Lobelii, quam Herbam terribilem Narbo-sensem Hist. Lugd. Hippoglossum Valentium

Clusius, Pearmicæ quidam cognominant, est Alypium Monspeli siue herba terribilis.

Vulgò Connina videretur Conyza tertia apud Diof. Cæsalpino, quam Attriplicem fœtidam inscripsimus.

Confundit Plinius cum Origano & Cunila Conyza, diuersas naturâ plantas.

Conyza non est Thymbra sicut perperam sentit Iacob. Manlius, testibus Io. Agric. & Eur. Coido.

Perficariæ duæ species sunt, vt opinatur Tragus in dissert. apud Brunfels. tom. 3. p. 277. Conyza Dioscoridis.

Oliuer. de Serres in suo Thef. agr. l. 6. c. 15. confundit Conyza cum Psyllio.

Errat Aucr. dum Harinel Offic. Rutam siluestrem vocatam Conyza hippocr. appellat.

Conyza dicitur Eustachio Ræslin. de Cicuta, de qua Hist. n. g. lib. 27.

CONYZA MAIOR MONSPELIENSIS odorata.



Conyza Descriptio
Cimaior
caule fruticac
selquicubitali
& bienbitali,
multiplici, li-
gnofo, rigido,
nirsuto, & ta-
ctu glutinofa;
Clufo, obfo-
leti coloris, in
multos ramos
brachiato: fo-
lia germinatio-
ne primâ ;
inordinata,
alternatim
cauleya am-
plecteria, tres
vncias longi-
tudine aquat,
non totâ vn-
ciam lata, obiter serrata, adulta vix vnciam vnâ
longa, mollia, pilofa & glutine quodam lento vi-
fida, ex vici diuallentia Clufo: flores fecundant
extremos ramos tipicatum frequentes exiliunt
lutei, Clufo rotundi. Senecioni ferè similes, in
pappos euanescentes, femine parua, cineraceo:
Radix subest crassa fibrofa. Tota planta grauiter
odorata est.

Figura ex Fuchsiis non est integra & melius possit depingi, desunt flores & serraturæ in foliis.

Hanc appellat Camer. in horto Conyza maior: ad Matthioli. Germ. Conyza minor siue fœmina, quam alii tradunt pro Conyza maiore odore grato, quam describit Pena, quæ videtur à Clufo tradita & Rauuolfio. In Epit. Conyza minor. Ego separto Rauuolfii quia illi potuit esse nota Monspessulana: quamuis in figura quedam respondeant figuræ Penæ & Lobelii in Aduers.

Dod. Lat. in fol. Conyza maior.

Lobel. & Pena Aduers. Conyza maior verâ; Dioscoridis lineamentis affabè congruens. Ic. Pl. Conyza maior vera. Figura Lobelii non omnibus absoluta.

An Anguill. epist. p. 230. Conyza fecunda? n. Lugd. Conyza magna Penæ. Hæc figura, vt

Attriplicem
fœtida.

Origano;

Thymbra;

Berficaria;

Psyllium.

Ruta. Sylu.

Cicuta.

Descriptio

Icon.

Synon:
Conyza mi-
nor Camer.
Camer. no.
natur.

Conyza
maior Dod.
Conyza
maior Ger-
lob.
An Conyza
2 Anguill.
Conyza
magna Pe-
næ. Lugd.

iam dictum non in omnibus placet. Cum Conyza magna Penæ eandem tradit esse Conyzam Syriæ C. Bauh. in animadu. in hist. Lugd. quam propterea notat. Nos cum H. Lugd. diuersas agnoscimus. Nec Conyza magna Penæ spinas habet.

C. B. not. Clus. Hisp. & Hist. post. Conyza maior, cuius radicem Plinius à quibusdam Libanotim appellari tradit. Hanc Gaza Pulicariam vertit, propter eam fortè quam illi Dioscorides in enecandis pulicibus tribuit facultatem: nam alia est Pulicaria dicta ob seminis cum pulicibus similitudinem. Hispani quidem yerua pulgera, nimirum ob similes quas dixi vires, vocant.

Castor. not. Figura quam habet Castor p. 144. pro Conyza minore nullo modo est minoris Conyze vera, imò à multis existimatur maior uti à Matthiolo.

C. B. Phyt. Conyza 1. siue mas Theophrasti, maior Dioscoridis.

Locus: Radix, autore Clusio, viuax est, multis annis perstans, quotannis nouos pluresque caules proferens. Supra Olyssiponem frequentissima ad collium Trago flumini imminentium radices, Murciano item Valentinoque regno, atque etiam Narbonensi agro iuxta vineas & vinearum margines. Aliquando in Belgica fœtilibus sata prouenit, & egregiè flores protulit. Solo maritimo, ut testatur Dodonæus, & austriaco celo gaudet, & circa Adriatici sinus littora, & circa Romæ & Florentiæ reperitur. In Narbonensi quoque Gallia, haud procul Monspelio, secus vias, ac vinearum margines. Conyzam maiorem Monspeli dictam florentem vidi mense Septembri. Passim prouenit Monspeli, Florentiæ etiam vidi in arce & circa arcem. Montbelgardi prouenit mihi in Horto Ill. E. C. & aliquot annis durauit.

CONYZA MINOR VERA.

Descriptio



TAm hæc maiorem refert, ut qui illam norit, & hanc quoque oblatam norit, odore simili, sed vegetiore; ea minor est præcedenti, cubitum ferè alta, ut plurimum recta, quod in altera non temerè videas, ramosa. Folia multò tenuiora, angustiora, subhirsuta, viscida: flores iidem, eodemque spicato ordine, sed minores, numerosiores.

An Conyza 1. Anguil.

An Anguill. epit. 230. Conyza prima, in Apuleia Pecanale, & aliis locis Pulicaria.

Clus. Hisp. & Hist. post. Conyza 2. seu minor, Conyza femina Theophr. quam Gaza Pulicariam vertit, Hanc Clusius non depingit. Gesf. hort. in append. Conyza vera minor.

Dod. Lat. in fol. Conyza præter maiorem mediam & minimam alia minor, iis etiam odoratior, sine iconè.

Lobel. Aduers. & Icon. plant. Conyza minor vera.

H. Lugd. Conyza minor vera Penæ.
C. Bauh. phyt. Conyza 2. siue femina Theophr. minor Dioscoridis. Floret autem cum maiore, sub Autumnum videlicet, & subinde semen profert, obseruauimus spontè Monspel. i (ubi etiam Clusius) copiosè prouentem & florentem mense Septembri: repertè in Italia inter Saleul & Montem gilbi mense Aprili, ut & Basileæ florentem mense Septembri.

CONYZA SYRIÆ QVIBVSDAM.



Plures ex eadem radice profert cauliculos, citicer pedem aut paulò amplius altos, quorum nonnulli sunt surrecti, potissima verò pars humi procumbit, nouasque fibras agens, subinde alios cauliculos producit: longiuscula habet oleæ folia, pinguis, subhirsuta, satis grauis odoris, cui ta-

men suauitas quædam admixta sit: alioqui floribus & cæteris notis à maiore non valde dissimilis.

Rauu. voff. Itin. pag. 54. Species minoris dicitur Wurzel 1. Conyze] Diosc. Latinis & Græcis dicta Conyza: hanc inter Icones parte 4. eodem titulo pingit.

Species minoris Conyza Disc. Rauu. voff.

H. Lugd. append. p. 20. Conyza Syriæ. huius plantæ authoris non meminit Historia, immèritò sanè.

Clus. Hist. post. Conyza minor Rauu. voffii, fortè maioris genus.

Conyzam Syriacam C. Bauhin. in annot. in Hist. Lugd. non paruo errore eandem statuit cū Conyza magna Penæ.

C. B. not.

Circa Tripolim Syriæ obseruauit descriptionis autor Rauu. voffii. suum Conyze minoris genus.

Locus

CONYZA MONTANA MYCONI, folio Hysopi vulgaris, villoso.

Radice est lignosa, solidà, interdùs candicante, foris nigrescente, minimi digiti crassitudine, gustu aliquantùm adstringente, exsucca, non minus, quam suberis cortex. Ex hæc foliis multiprodeunt, teretes, villosi, solidi, dodrantales: in quibus folia tenuia, Hysopi vulgaris, sed glutinosa Ledi modo, odore graui & viroso, & hircinum quid olente. In summo cauliculorum sunt sterculi Soncho similes, luteoli, in pappo abeuntes. Gustu subamara est cum leui acrimonia, caput tentans.

Descriptio

Myco-

descriptio
nisi ratio



Myconus peritus Medicus & rei herbariae studiosus, plantam hanc pictam à foliorum florumque forma, odore & sapore Conyzae speciem esse iudicavit, & à natalibus montana cognominavit. Nascitur enim in saxosis, praecipuis & montosis, praesertim inter saxorum rimas, flosrens Augusto maxime. Caeterum, haec planta forte in Hispania perquirenda; unde Myconus alias plantas misit Dalechampio.

C. Bauh. Phyt. Conyza n. sine montana glutinosi pilosis foliis.

CONYZA CAPITATE NUTANTE.

descriptio




Caules habet plures cubitales; hirsutos, qui in varios ramosulos funduntur, quorum singulis appositum folium unum, longum, satis latum, rarius serratum, pilosum, Conyzis nonnihil simile, ramuli ad florem usque robusti, rectique per extrema in ceruicem rigidulam contorquetur, florem nutantem

terramque versus inclinatum sustinentes, ex multis seu squamis compositum, quarum medium obsident multi apices lutei, eo fere modo dispositi, quo in Verbetinis florent ambiunt quaedam longiuscula folia viridantia stellae in morem radiata. Radices fibrosae, Hellebori nigri similes. Hanc Basileae inveni ante multos annos. Thalys in montibus apricis Soli Meridionali & Orientali obiectis.

H. Lugd. p. 1040. Hydropiper aliud Dalechampii.
C. Bauh. Phyt. p. 641. Cannabina similis capitulis nutantibus, quam nobis ostendit frater Iohan. Bauhinus, Verbetinae similem cum capitulis nutantibus nominans. An forte Hydropiper alterum Dalechampii; Lugd.

Tom. II.

CONYZA MARINA.



Prolixas sub terra aegit radices non sine fibris in tuberosum veluti bulbum tandem desinentes. Caules starim copulculi, dodrantales circiter, emergunt, hirsuti, foliis amicti frequentibus duarum triumve unciaarum longitudine, vix sulcum latis, rigidis, neruo unico per longum donatis: caulibus superius diuisis flores gestat Conyzae maioris; luteos, in pappum euanescentes.

H. Lugd. p. 1366. Conyza marina. Lob Obs. & Ic. Plar. Alter Conizoydes Generi. Rauvvolf. Itiner. Chondrylla Diof. altera.
C. Bauh. Phyt. pag. 216. Chondrilla 12. bulbosa angustifolia maior.

Generi Cherlerus in Gallia Narbonensi copiose obseruauit & collegit in campestribus illis iuxta Montem Lupi. In Anglia, Belgio, & agro Louaniensi iuxta Academiam pomeria: iuxta Alepum in aruis reperitur.

descriptio
Conyza marina
Lugd.
Alter Conizoydes
nyceides
Gefn.

CONYZAE MARINAE AFFINIS CHONDRYLLA alia Rauvvolfii.



Conyzae marinae similis planè est radice & floribus; folia tamen latiora; pilosioraque, magisque cinerea sunt, perinde vt Holostii Monspeliensis; Rauvvolfii.
Rauvvolfii. Synonyma
Hodæporici p. 117. Chondrylla alia. Hanc pingit parte 4. in Icon. numero 117. pro Chondrylla Diofcoridis genere alio. H. Lugd. app. p. 27. Chondrylla 13. bulbosa angustifolia minor.

drylla aliud genus Diofcoridis.
p. 217. Chondrylla 13. bulbosa angustifolia minor.
Lapidosis agris circa Alepum nascitur Chondrylla Diofcoridis genus aliud Rauvvolfii.

descriptio
Synonyma
Chondrylla Diofcor. genus Rauvvolfii.
Locus.
Chond. bulbosa Cesp. Bauh.

CONYZA ALPINA.

Ramis frequentibus fruticat, sesquicubitali rigido caule; folia alternata fere, pediculis uncialibus & sesuncialibus haerentia, ex rotunde Vuuu

Descriptio



nonnihil oblonga, uncias circiter ternas lata, paulò longiora, modicè in acumen definentia, profundè in ambitu serrata, subtus incanà lanugine pubescentia, supra virentia: *floris* ramulorum extremis crebri inhaerent, lutei, Chrysanthemifumiles, in pappo eualescentes.

Clus. Pannon. p. 576. *Iacobæa* latifolia altera: & in Hist. post. lib. 4. p. 23. *Iacobæa* Pannonica quarta, sine icone.

An Gesnero in descriptione Montis fracti, Conyza alpina genus selquicubiti aut amplius proceritate, corymbis florum luteis, fibris radicis cum albis pluitibus & confertis, subamaris, quod à peccore non attingitur, pastoribus Boni vocatum, aliquibus Goldfrut?

C. Bauh. phyt. *Iacobæa* 7. siue foliis rotundis, serratis.

Locus

Hanc cum Gesn. in peregrinatione nostra obseruauimus in monte propè Wefen, non longè à lacu Tigrino, florentem in mense Iulio.

IACOBÆA PANNONICA FOLIO non laciniato.

Descriptio



terna, aut quaterna, aut plura habet *folia*, latiuscula, in ambitu leuiter dentata, *caulem* cubitale plerumque, angulosum, gracilem, per quem inordinata sparsa sunt *folia*, infimis paulò minor, at in supremo angulio, lata basi ipsam amplectentia: in summo caule quaterni aut quini, tanquam in umbella nascuntur *flores*, *Iacobææ* vulgaris floribus non multùm ab similes, antè quàm explicentur ex atro rubescentes, sed ubi aperti sunt auri fulgore splendentes, quos in ambitu stipant quindena aut plura foliola per extremum incisa, supernè phœnicea, subtus verò quodammodò rubentia: ii *flores* maturi in pap-

pum abeunt, cui inuolucrum est *femen* nigricans, oblongiusculum, vulgaris *Iacobææ* femini non dispar: *radix* non valde magna, nigricans, tenuibus fibris candicantibus donata, sub Autumnū noua denud folia latiora, ad veteris caulis sedem singulis annis producit. Tota planta mollicula, & quadam lanugine obsita conspicitur: amari-cantis est saporis.

Clus. Pannon. p. 573. *Iacobæa* secunda, p. 574. *Iacobæa* Pannon. folio non laciniato: Hist. post. lib. 4. p. 22. *Iacobæa* Pannon. 2.

C. Bauh. Phyt. *Iacobæa* 8. siue foliis nonnihil dentatis.

Iacobæa Pann. 2. Clusi nascitur apud Neme-thuynuar Ill. Balthafaris de Barchyan, aliisque Pannoniæ & Austriæ inferioris montis & caudis filius. Floret Iunii initio, & sub eiusdem extremum finem, semen maturum est.

H. Lugdun.

Loc. 47.

IACOBÆA MARINA SIVE cineraria.



Vltus cō-similis

Descriptio

Iacobææ cognominem hanc reddidit, natalisque locus maritimus differentia adiunxit: prima *folia* Quernis similia, rarioribus fissuris minulque altis incisa; quæ postmodum ad costam vsque profundius diuiduntur, digi-tali ferè intercapedine seg-menta lacini-ata intercedente, crassiuscula, inferiùs cinereco molli tomento vnà cum pediculo obsita, superiùs arrouirentia, nitida, & nonnulla quæ lanugine fortuita obiter respersa, sapore prædita parum grato: flores multi coacervati *Iacobææ*, Melini, in pappo tandem abeunt. Lob. Adu. & Ic. Pl. Cineraria, *Iacobæa* marina, Chrysanthemum marinum, & Artemisia marina Neoterorum. Tabern. Icon. & Hist. *Iacobæa* marina, Cineraria, S. Jacobs blum. Dodon. Lat. in fol. *Iacobæa* 3. Cineraria vulgò dicta, à subalbido cinerum quorundam colore, quem refert Cinerariæ nomen, quæ à nonnullis Erigeron marinum dicitur. C. Bauh. Phyt. *Iacobæa* 1. siue marina. Erucam cineream Lugdunensis bis pingit bisque describit p. 651. & p. 1333. quæ sanè eadem cum præcedenti.

Hanc plantam olim vidi in orto di S. Saluator ad Burgo di S. Catharina, Vidi etiam in orto Nicolai Petrarientis & à Innocenti:

Egyptii, autore Alpino, Artemisia albà (quæ illi Achaouam, Cineraria, & *Iacobæa* marina vocatur,) ad multa vntur, quippe decoctum ex foliis paratum ad renum vesicæque calculos pollere aiunt, nec non ad sanandas viscerum ar-riquis obstructions, frigiditatem, strangulationem, sterilitatem, inflationem, arque ad menses interceptos reuocandos, in infestationibus.

H. Lugdun.

not.

IACOBÆA VVLGARIS.

Descriptio Lætius solum nacta trium cubitorum altitudinem assequitur, caule recto, rubente, striato: folia alternatim posita, Senecionis maiora, leui adstrictior e prædita: flores plures iuncti, Senecionis, maiores, lutei, umbilico couolori in pappos tandem abeuntes: radix alba, fibrosa. Duas figuras ex Fuchianis ponimus non vt specie diferentes, sed tantum variantes.



Synonyma
Senecio maior.
Herba S. Iacobi.
Flos S. Iacobi.
Herba Iacobæ.
Senecio.
Artemisia polycloona.
Flos Iacobæus.
Differentia



bet, inquit, in foliis: alterius sunt inſtar Erucæ laciniata: alterius ad Raphaſi folia accedunt, ſed minus hirtuta.

Iacobæa vulgarem Germ. vocant S. Jacobs blumen: quibusdam S. Johans blumen/ & groſſ creutz blumen. Belg. Sint Jacobs cruyt aut Bloemen: Gallis, Herbe au fleur de S. Jacques. It. Carduncello maggior.

In Pannoniis, Aſtria, viciniſque regionibus naſcitur frequentiffima, Iacobæa vulgaris Cluſii. Iacobæa abundat paſſim Montbelgardi florens adhuc Septembri & Octobri: Montpelii obſeruauit cum flore mente Aprilis & Maio: Baſileæ quæ itur Monters Octobri, ab ſtuumum Wiſſe intra urbem & quæ itur Brenzack/ & verſus Gœdelſtinguen prope Molendinum. Genæ frequens eſt.

Flos S. Iacobi non ſolum eandem formam, ſed eandem cum Senecione vires & facultates obtinet, vt pro illo iure uſurpari poſſit, in primis autem vulneribus, inflammationibus, & hiſtalis medetur, Tragus.

Tom. II.

IACOBÆA LATIFOLIA.



Descriptio Iacobæa latifolia caulem habet tricubitale, teretem, rubentem, medullâ albâ farctum, in ramos alterius inſtar diuiſum, quorû extremis flores inſident, magni, lutei, ſtellati, & tandem in pappum tomentum euaneſcentes: at folia plurimum differunt, dodrantem ferè longa, duas uncias latiora, ſerrata,

glabra, mollia, profundè circa principium ſecta, reliquâ & vltimâ laciniâ ad Bugulæ folium accedente: verum ennumerò, quæ per ramos conſpiciuntur paulò magis ſunt laciniata, Artemiſiæ ferè diuitorâ. Radix obliqua, multis fibris capillata: ſuſpico annuam herbam.

In Sundcoma florentem Auguſto obſeruauit ad ripam fluuioli.

IACOBÆA PANNONICA LATIFOLIA.



Descriptio Cinterdum excreſcit caule, ſermo, ſtriato, quem ambiunt folia lata, rugoſa, mucronata, per oras ſerrata, viridia, latiore baſi, & veluti appendicibus quibusdam prædita, inſimâ parte quæ caulem amplectitur, ingrati & nonnihil acris ſaporis: quæ verò à radice germinant,

rotundiora ſunt & maiora, ſed nullos appendices habent, perinde tamen ſerrata atque ſuperiora: ſummus canlis diuiditur in aliquot ramulos, qui flores omnino luteos ſuſtinent, Iacobææ vulgari ſimiles, multò tamè maiores, & ad Bupthalmi amplitudinem accedentes, maturitate in pappum euaneſcentes: ſemen obſeruare non licuit: radix ſatis cralla & candicans, ſubinde fibras vulgaris Iacobææ inſtar, in latera expandit. Cluſio Pann. p. 574. Iacobæa latifolia Pannonica tertia.

C. Bauhin. Phyt. Iacobæa 6. ſiue latifolia flore Bupthalmi.

Vuuu 2

Prouenit in Auftriacis Stiriacisque Alpibus:
Floret Iunio & Iulio, in hortos translata etiam
Maio.

CHRYSANTHEMVM ALPINVM
Iudenbergenſe Iacobææ affine.

Deſcriptio



Multa habet secundum radicem longiuscula folia, Abinthio umbellifero, quod infra describetur, similia, crassa, pollicari longitudine, in laciniis aliquot diuisis, viridia (in nouellis tamen quaedam canicie conspicitur) a nari saporis: caules aliquot palmares, rarioribus & tenuibus dissectis foliis ornatos, striatos, in quibus veluti umbellæ denum aut duodenum luteorum florum, Iacobææ vulgaris floribus non multum ab similibus, & eiusdem odoris: radix crassiuscula est, multisque candicantibus sibi capillata.

Clus. Pann. p. 565. Chrysanthemum Iudenbergenſe, siue [vt in post. uist.] alpinum 1. Ad Chrysanthemum genera referendum, aut Iacobææ adnumerandum.

C. Bauh. phyt. p. 225. Chrysanthemum 2. siue alpinum foliis laciniatis: Hoc attulit D. D. Theodorus Collado Nemaufanus nunc Medicus ex helueticis alpinis.

Locus.

Chrysanthemum alpinum 1. Clusii prouenit in Iudenburg, Spital, & aliis quibusdam Stiriae iugis, cum Leucanthemo mox describendo: eodem tempore florens.

CHRYSANTHEMVM ALPINVM
Erfelcherianum Iacobææ affine.

Deſcriptio



Numerosa proxime radicem nascuntur folia. Abrotani maris foliis respondentia, diluore viriditate nitentia, & odore, si terantur, haud ingrato, sapore vero amaricante & minime grato: ex his caules exeunt pedales, minoribus foliis onusti, in ali-

quot interdum ramulos diuisi, qui singulos aut geminos sustinent flores Chamæmelo vulgari maiores, inodoros, omnino flauos, hoc est, medium orbem luteum cingentibus etiam luteis foliis, satis latis: radix fibrosa & nigricans est, pluresque à latere spargit ramos.

C. Bauh. phyt. Chrysanthemum 3, siue alpinum foliis Abrotani multifidis.

Inuenitur, inquit Clusius, in Erfelcher, Snealben, Veitzalben, & celsis aliis Alpium Stiriae iugis. Floret Augusto. Inibi etiam inuenitur Chrysanthemum Alpinum Snebergenſe, Clusio 3; [C. Bauhin. 4.] Alpinum dictum.

Locus. & Tempus.

TRAGOPOGON SIVE BARBA
hirci Veteribus.

CAP. XII.

Tragopogonis seu Tetrapogonis, quem alii Coimen vocant, inquit Dioscorides, caulis breuis est, folia habens Croco similia, radicem longam, dulcem (supinam addit Hermol.) In summo caule calix est magnus [ὄντι δὲ τὸ κεντρικὸν ἴσχυρον] & eius summa parte erumpit semen nigrum (κατὰ τὴν μέσσην) à quo etiam nomen accepit. Est autem herba, quæ in cibi usum venit. Et ita Marcellus, hermol. Cornar. Matthioli.

Tragopogon. Corca.

Hirci barba, inquit Theophrastus, radix longa & dulcis, folia Croco similia, nisi quoddam longiora sunt: caulis breuis, super quem calix amplior, & è summo vertice pappus canis grandior, à quo scilicet Tragopogonis nomen accepit: [non igitur a semine nigro vt sibi falsò nonnulli inuaginantur.]

Cæterum, Tragopogon [Hirci barba] & Scindix à Plinio vocatur, nisi, quod suspicatur Hermol. deprauata lectio sit: is aliis descriptionem Dioscoridis mutuatur.

Scandia. Plin.

Acetarium quidam olus hanc esse falsò volunt, quam vulgò Barbam petræ & in Gallia Cispadana Barbulam hircinam vocent: habetur & quæ Gerontopogon, id est, Senis siue presbyteri barba dicitur, Tragopogoni fere tota similis, nisi quoddam lacte manat & radice amara est, non dulci: à Nicandro Geropogon fortasse nuncupata. Tragopogona vocari, & in Trago pisce partem subgula eius nigricantem Athenæus autor est. Tragopogona, Galenus inter simplicia non recenset, inquit Cornarius. Et officinæ ostendunt falsam pro vera Hirci barba herbam. Tragopogon à Galeno cognominata est planta, quæ Ledum seu Ladanum dicitur, & barba hircina Arabibus, vt Auicenna & Serapioni, teste Trago libro 1. cap. 95. inquit Gesnerus. Amatus quantum vider Matthioli, eam plantam Tragopogona putat, quæ Fuchsio Apios dicitur. De hac nos H. n. g. lib. 17. egimus sub titulo Chamæbalanus.

TRAGOPOGON FLORE

luteo, purpureo, ac
punico.

In pratis obuius Tragopogon radice lacte turgente dulci, minimi digiti crassitudine, longa: caulis cubitalis, foliis ab imo ad summum vestitus, ferè porraceis, carinatis, caullem



lein amplectē-
tibus : ex quo-
rum sinu rami
pronascuntur :
quorum sum-
mis insident
flores magni,
denso foliorum
radiatorum a-
gmine stipati,
lutei : qui in
pappos abeunt,
semine appenso.
Ab hoc non
multam differt
atropurpureus,
& puniceus,
sive spontaneus
cultus. Qua-
libet planta fe-
rē pars vulne-
rata lac fundit
album, emanās,
mox in luteum
foeciflens, visci-
dum, quod radici-
bus, digitali
vel maiori
crassitudine, re-
nera copiosum
& dulce cum
sit, culinis ex-
petitur : caules
inanes ramosi,
foliis multis
stipantur Por-
raceis, quae in-
terdum valde
lata interdum
tenuissima : flo-
res foliis octo
viuentibus lon-
gis & acuminatis
obuallati, tri-
bus vncias, su-
perantes, qui colore sunt vel atropurpureo vel
puniceo : qui postea in pappos abeunt : quibus
adhaeret semen duas vncias longum, recte, striatū,
asperum, per maturitatem extremam nigricans.

perantes, qui colore sunt vel atropurpureo vel
puniceo : qui postea in pappos abeunt : quibus
adhaeret semen duas vncias longum, recte, striatū,
asperum, per maturitatem extremam nigricans.

Camc. horr. Barba hitci flore luteo & pur-
pureo.

C. Bauh. Phyt. & apud Matthiol. Tragopogon
1. siue pratense luteum. Itē Tragopogon 2. siue ce-
ruleum.

Anguill. epist. 7. scribit Tragopogonem, i.e.
Barbam hirci, in Tuscana dici Salsificam &
Barbam di prete : Patauii Herbam lissam. Cord.
Hist. Hirci barba.

Hieton. Brunsch. magno errore Hypocistida
in hac herba nasci putauit, Ledum fortē intel-
ligens, quod à Galeno Tragopogon nominari,
iam supra ostendimus.

Tragopogonis & Gerontopogonis H. Lugd.
tres ponit figuras, sufficerent duae ac etiam v.
Ton. II.

na: si nostra Fuchiana placuisset, secundam non
curassemus puranda n: non exilitarum à Tra-
gopogone distinguendam Salsificam Italorum.

Tragopogon alterum (inquit C. Bauh. in ani-
maduert. in Hist.) & Gerontopogon p. 109. In
omnibus conueniunt, praeterquam in radicis sa-
pore, qui in illa amariorculus, in hac dulcis fa-
tuitur. Sed idcirco duabus figuris non erat o-
pus.

Dodon. Lat. in fol. Tragopogon, vt Fuchf. Lo-
nic. & Casalp.) Item: Tragopogon cum pappo:
figura superflua.

Tragopogon flore luteo purpureo, ac puniceo
vocatur Graecis, *τραγοπόγος* & *κρηνη*. Item & *τε-
τρακτύος*. Hirci barba, Coma. Germ. *Wolfsbart/
Gaudsbret*. Belg. *Wolfsaert / Josephs bicnie*.
Gall. *Barbe de Buis. Montbelg. de la barbe au Loup.*
It. *Barba de Recco*. Hisp. *Barba cabrona & Barba
de cabron*. Angl. *Wolfs beard*. Boh. *Kosy brade*.
Fa. Pueri, ait Tragos, qui radice tenera adhuc
vesci solent, sicut & alias herbas, praesertim O-
xalida deuorare consueverunt, Gaudsbret, qua-
si Coccyis pauem, ob dulcedinem radicis vocat,
quae si Apitius perspecta foret, nunquam non a-
cetiariis luis illam praeter ceteris herbis & radicibus
infererent.

Tragopogonem luteum obseruauit Monspeli
cum flore Aprilis & Maio & Augusto in pratis,
Geneu vitetem in horto meo mense Ianuario,
cum flore Maio in pratis, etiam Iunio. Lugduni
copiosum in pratis: Patauii vidi mense Februa-
rio, & Montebeldardi abundat in pratis florens
Maio. Notandum omnes flores ad Orientem co-
uerti. Tragopogonem purpureum passim prouen-
it mense Aprilis & Maio.

Barba capri tenella à Belgis holoribus ac-
etariis miscetur, ac facultatibus Condittillis adstipu-
latur, lancinationibus astuantibus, icteri, sto-
macho, renibus & thoraci auxiliū est. Eittr Bar-
bula hirci prior Matthioli, hyeme frequenter
in acetariis, glutinat recentia vulnera, si folio-
rum succus vel eius stillantia aqua splenis & ar-
tritis linteolis superponatur: radix exalcafacit,
ac etiam primo ordine humectat: alterius radi-
cis lacteus succus adstringit, cohibet, siccitat, &
modicè abstergit, cuius tamen inidonea est. Radix
cruda aut cocta esca, vel ius bibitum, vniuersi stilli-
cidio medetur, calculū expellit. Pectoris vitiis
succutrit: tussis, respirationi difficilis, tabidis, &
pleurisi, cen & succus eius, & aqua distillata. Sed
& vulneribus vtiliter adhibentur, & lac eius, quae
breui temporis spatio ad cicatricem perducunt.
Aquam ex herba & radice distillata Maio mense,
remedium esse praesentissimum adhaerens aposte-
mata & dolores laterum legitur apud Tragum.
Plura qui volent, legat Tab.

TRAGOPOGON FOLIO LACINIATO
flore pallido, & Monspelicentē
flore luteo.

Tragopogoni radix similis tenera lactiflua,
filia priora tenuia, longa, quaedam non lacini-
ata, alia laciniata paruas habent, vbi primò
prouenit ex semine deciduo & locis siccioribus
cultis: in qua caules plures nascuntur subtiles,
amplexu foliorum liberi, quae tamen satis tum
per ramos frequentia, triplo quadruploque vulga-
ti Tragopogonis foliis latiora, in crebras pro-
fundas laciniatas dissecta, quae aliquid commune
habent cum Dente Leonis: *flor luteus pallens*
Vuu 3

Dod. not.

Nomina
linguarū

Patis Cen-
cult.

Locus &
tempus.

Vires
Facultas
Condittilla.

Vulnera.

Vrina sibi-
lucida.

Pleuritis

Apostema-
ta.

Descriptio



qualis vulgari: ar semen ad Scorzonera femina propius accedit. Fabio Colunæ de plant. nouus p. 21. & 22. Tragopogon laciniatis foliis. Anguill. epit. pars. Acorum Theophrast. & Herba diuener. C. Bauh. phyt. & apud Matth. Tragopogon 3. sine laciniatū primis foliis penitis gramineis, integris nec laciniatis.

Locus & tempus

In horto Bl. C. Wart. Rotet Maio, semen maturat Iunio & Iulio, quo tempore perit, nec vltra annum durat, femine deciduo quorannis se propagans. Basilea, Parauii, & Bononiæ etiam obferuamus.

TRAGOPOGON FOLIO GRAMINEO
flore albo & luteo cum tantilla purpura.

Descriptio



Folius est minoribus, Garyophyllorum florum sylu. alborum foliis similibus, angustis & acutis: radix aliis Tragopogis similis capite capillato: caules tenues rotundi, in quorum supremis capitula cyano similia. ex quibus vbi aperiantur prodeunt st. sc. albi. aliis similes nisi longiores & acutiores, similes

Belli maiori [Ioanis blumen:] prouenit in cultis locis humidis: florere Iunio & Iulio. C. Bauh. phyt. p. 556. Tragopogon 5. gramineo folio, radice villola.

TRAGOPOGON HISPANICVS SIVE
Escorzonera aut Scorzonora.

Descriptio

Pedali longitudine est radix, crassitudine pollicari, lacte dulcissimo, non sine aliqua adstrictione, prægans, caulis sesquipedalis, multis alis concauis, inanis, lanugine quadam rasilis obitus: quæ eadem inferius pubescunt folia, latiore basi caulem amplectentia, longa, Tragopo-

gonis, sesquiunciam lata vel angustiora, in perquam longum angustissimum mucronem desinentia: flores insident extremis ramulis singulis, Tragopogonis, lutei, ex calycibus squamarum compactilibus, læuibus: semen Tragopogonis pappolum.



Marth. in poster. comm. cum mag. fig. Scorzonera Hispanica ac Bohemice meminit, easque pingit ac Tragopogonis cognere facit, aitque Hispanis Scorzoneram siue Scorzoneram, quod à vipera demorsis, quam in Scurzo vocant, præsentaneo remedio auxilietur, Viperinam esse. Is non putat esse quemquam qui de ea ante ipsum scripserit: inuentam esse primum in Caralonia Hispania à quodam seruo Aphro: qui propinato radices succo incolomes seruabat quorquor demorsi fuerant: primum misisse siccam Ioh. Odoricum Melchiorium Trid. Regina medicum, pauld post viridem ex Hispaniis allatam: Non multo post tempore copiosam quæ in Bohemia nasci comperitum esse: &c. Non deesse autem, qui in Hispania hanc plantam Chondryllam esse censent: sed horum sententia non esse subscribendum.

Scorzoni Hispanica & Bohemica ca. Math.

Chondryllam non est.

Tragopogon peregrinus vel Hispanicus.

aitque Hispanis Scorzoneram siue Scorzoneram, quod à vipera demorsis, quam in Scurzo vocant, præsentaneo remedio auxilietur, Viperinam esse. Is non putat esse quemquam qui de ea ante ipsum scripserit: inuentam esse primum in Caralonia Hispania à quodam seruo Aphro: qui propinato radices succo incolomes seruabat quorquor demorsi fuerant: primum misisse siccam Ioh. Odoricum Melchiorium Trid. Regina medicum, pauld post viridem ex Hispaniis allatam: Non multo post tempore copiosam quæ in Bohemia nasci comperitum esse: &c. Non deesse autem, qui in Hispania hanc plantam Chondryllam esse censent: sed horum sententia non esse subscribendum.

Gesnero de hortis Tragopogon peregrinus vel Hispanicus dici posse videtur illa herba quæ Hispanis Escorzonera, hoc est, Serpentaria dicitur, quæque depicta est in fine iconum stirpium Fuchsii edit. Anruerpensis. Tragopogonis autem genus esse monuit Coudenbergius. In Tarracoenfi Hispania] nunc vocant Cataloniam] Herba Mauri cuiusdam industria cognita est quam vocant Escorzoneram. Existimant eandem esse quæ olim Ptolomeus liberatus sit, vt Cardanus lib. 6. de rerum variet. prodidit, qui Escorzone, ram vocat.

Lobel. Icon. Plant. p. 551. & Obs. p. 293. Scorzonera, Viperaria. Casalp. p. 518. Scorzonera de qua Nicolaus Monardes Hisp. quam multi existimant apud Dioscoridem Chondryllam esse, sed magis videtur ad Tragopogoni genus reducenda.

Camer. hort. Scorzonera floribus simplicibus & plenis in multis locis Germaniæ, à qua Hispanica non alia ratione quàm soli & Chmatis ratione videtur differre. Aliquot huius differentias Pannoniæ & Austriæ peculiaries recenset Clusius.

Thal. Scorzonera tenuifolia lutea, de quo stirpis genere varia varii hæctenus statuerunt. Nā initid planta Hispanica nonnullis dici capit, deinde Scorzonera nomen ei accessit: plurimis in Germaniæ locis reperitur. Differentias verb foliorum ratione & florum etiam euidentibus obinet, ita vt altera sit latifolia, altera angustifolia. Est etiam

etiam altera subdulci, altera amarâ radice, quâ antidotaria vi magis præditam esse existimo.

C.E. nos.

Hæc eadem verba Thali pro suis recitat C. Bauh. Phyt. qui præterea malè separare videtur suam Scorzoneram i. siue latifoliam sinuatam, seu Matthioli Hispanicam, ab eiusdem Boëmica, seu sua latifolia secunda. Matthiolus siquidem has non distinguit. Non malè quidem C. Bauh. Scorzoneram Serpentinâ quoque, quod contra venenâ serpentum efficax habeatur, cognominari posse diceret, sed id ipsi non donandû quod Scorzoneram & Serpentinam eandem statuat. Serpentinæ nomen de pluribus dicitur plantis. Tragopogonis porrò adnumerandas esse eas plantas, quas vulgò Scorzoneras vocant, nec mo est, vt arbitratu Clusius, qui dubitet. In eo solum differre videntur quod illorum radix minime sit viuax, contrâ quàm Scorzonera.

Tragopogoni scorzonera differrentia Locus.

Tabern. Leon. & hist. Scorzonera Hisp. Viperraria. Item Scorzonera Germanica. Mirar tantam similitudinem picturæ Scorzonera Hisp. cum Scorzonera Ger. nisi diuersarû plantarum. Oritur montosis locis, præcipuè humectis. Marius Scorzonera genus duntaxat in Hamburgensi monte Pannoniæ inuenit Clusius, quodâ loco admodum herbofo, & arbotibus circumscpto. Bohemicam nasci scribit Matth. in monte quodâ siluoso, vliginosoque, nò logè à Poggebro. Scorzonera latifolia siue Hispanica ex semine mihi feliciter Montbelgardi prouenit in Horto Ill. E. C. vbi caulem & femina perulit, perit interdum tamen, plantæ non ferunt caulem ante tertium annum: eam etiam habui Lugduni & Geneuæ in hortis meis, primo anno non ferebat caulem: Lugduni florebat Maio, Geneuæ Iunio. Patavii obtinui mense Martio in hortu D. Cortusii: Spire vidi florentem Iunio in cultissimo hortu Clarissimi viri D. Tenguadel Alliforis.

Vires

Tota planta magni est visus ad magnos morbos depellendos. Namque præsentaneo remedio aduersus viperarum carcerorumque venenatorum morsus ictusque, ac pestiferos morbos quoscunque, tam è foliis, quàm è radice succus desumitur, præbeturque potandus: Veilis reposita conseruæ modo ad vertigines & capitis dolores, aliquoties ʒb. in hebdomade sumpta. Comitialibus item ingruente insultu mirè affectis subuenit. Cardiacis item datur & vertiginosis. Enimvero commanducata perse radix tristitiam discarit, hilaritatèque conciliat. Quin etiam lacteus radiceis succus oculorum aciem acuit.

Dolor capitis Comitialis

Oculi.

Tanta eius vis, inquit Manardus, aduersus Scorzonem, vt si eius succo tangatur, torpeat confestim: si iniiciatur in os, pereat: manibus eo succo illitis contrectatur serpens prædictus sine periculo: non enim mordet, atque adeò torpescit, vt semimortuus videatur: qui fuerit ictus, si comedat de eius radice, aut succum foliorum bibat, confestim sanatur, si inflatus iam fuerit, desidet tumor: sedantur dolores, & deliquia: si præsumatur antequam momorderit, non superueniunt praua symptomata: bibitur eius succus clarificatus, vel per se vel cum aliis roborantibus cor, aut veneno resistentibus, non solum ad Scorzonis ictum sed & ad Vipere, aliorumque serpèntium: datur eius aqua distillata ad febres pestilèntes & malignas: prouocat enim sudorem mirificè, vbi natura hunc motum tentat: confert ad melancholias, tristitias & deliquia: miscetur quoque epithematibus cordi conferentibus: radices condita per multos dies assumptæ, & aqua prædicta obstructions Hepatis & Lienis tollunt:

Febres pestilèntes.

menstruasque purgationes moluntur. An porrò similibus facultatibus præditæ sint Scorzonere Pannonicæ quibus celebrem illam & adeò decantatam Hispanicam pollere aiunt, neminem adhuc periculum fecisse arbitratu.

TRAGOPOGONIS SPECIES, SIVE SCORZONERA HUMILIS LATIFOLIA.



Latiora breuioraque habet folia, quâ Scorzonera maior Pannonica i. Clusii, Bupleuro latifolio, siue Elaphobosco Mòpelliano non valdè diffimilia, crassiflora taxen & duriora, quinque neruis, seu venis per longitudinem excurrentibus, distincta, cærulei quodammodo viridi permixti coloris.

Descriptio

gustu verò aliquantulum amaro & feruido: caulis inter hæc allurgit gracilis, pedalis altitudinis, striatus, raris foins septris, cui insidet fl. superiori similis, luteus, magnus: quo marcido nascitur in calycibus semen oblongum, asperum, Tragopogo simile, sed minus, in villosâ materiâ albâ latens: radix pollicaris est crassitudinis, interdum maior, longa, nigro, rugosque cortice tecta, intus alba, quæ contracta lacteo succo manat, successu temporis hauescente, superiore parte, hirsuta veluti casarie donata est, & in plura capita plerumque extubera, ex quibus folia prodeunt.

C. Bauh. Phyt. Scorzonera 3, siue latifolia neruosa, Clusio humilis latifolia.

Hanc Clus. in monte Badensibus thermis imminente, vicinisque aliis locis, obseruauit in Austria.

TRAGOPOGONIS SPECIES SIVE SCORZONERA HUMILIS ANGUSTIFOLIA.



Firmatur hæc crassâ radice longâ, nigro, denso, rugoso cortice præditâ, lacteo succo plenâ, quæ nunquam superiore parte in plura capita, quemadmodum præcedens, extubera, crassitudine minimi digiti (nouellatum plârarum instar) villosâ: ex quibus multa Vuuu 4

Descriptio

nascuntur *folia* Tragopogo similia, firmiora tamen, breviora, & eiusdem, cum præcedentis foliis coloris: inter ea excrefcit humilis, palmum vix excedens *caulis*, aliquot breuibus foliis septus, *cauus*, *florẽ* in summo fastigio ferens flauum, alteri ferè similem: *semen* deinde in longioribus caliculis. Scorfoneræ Hispanicæ semini par, minus tamen, quod maturitate, leuissimo auræ flatu excutitur, & eius arbitrio fertur.

C.Bauh. phyt. Scorzonera 4. siue angustifolia prima.

Locus & Tempus.

Hæc & sequens florent Aprili & Maio: semen interdum Maio, aut sub Iunii initium maturæfcit.

Meminit etiam Clusius Scorzoneræ humilis fibrosa radice quæ illi 4. C.Bauhino verò quinta dicitur.

TRAGOPOGONIS SPECIES SIVE
Scorfonera maior angustifolia
subæruleo flore.

Descriptio



Frequentia huic sunt *folia*; longa, Tragopogi foliis minora & angustiora, inter quæ cubitalis assurgit *caulis*, *cauus* quidem ille, sed firmus, durus, viridis, aliquot oblongis foliis septus, & supremâ parte in binos aut plures ramulos diuisus, ferentes in longioribus calycibus *florẽ* Scorfoneræ Angustifoliæ

floribus non dissimilem, nisi quod paulò minor sit, & coloris ex æruleo purpurascens, iucundi odoris, pastillorum è benzoino confectorum nidorem quodammodò æmulantis, sed fugacis admodum: sena deinde, octona, aut plura in singulis calycibus *semina*, Scorfoneræ seminum æmula, quæ matura, cum suo pappo à vento excutiantur: *radix* singularis, minimi digiti crassitudinem æquat, dentoque, foris nigricanre, & rugoso cortice obducta, supremâ parte hirsuta, & villosa, quæ vulnerata, succum exillat in initio lacteum, deinde fuluescens, gustu primam gummoso, postea aliquantulum acti: viua est, vt reliquarum radices, vetustate crassior euadens, & superiore parte in plura capita subinde exuberans.

Clus. Pannon. p. 639. Scorfonera Pannonica 5. Hist. post. lib. 5. p. 139. Scorfonera angustifolia elatior pannon. 4. Scorfonera maior angustifolia æruleo flore.

C. Bauh. Phyt. p. 538. Scorzonera 6. siue angustifolia subærulea.

TRAGOPOGON SPICATVS
tenuifolius

Tragopogon spicatus Histor. Lugdunensis,



VIRGA AVREA VVLGARIS
latifolia.



radice, fo-
liis, caule ge-
niculato, sili-
nis est reliquis

Tragopogi
generibus, nisi
gracilior *cau-*
lis est, *radix*
tennis, *folium*
angustius, *flor*
autem luteus
maximè dis-

crepat, & qui
spicatum coa-
cetuatus sit.
C. Bauhin.
phyt. pag. 536.
Tragopogon
4. siue spica-
tum luteum.

Descriptio

Geniculatum huic incedit *radix*, obliquè per terram acta: fusca, frequentes dimittens fibras albicantes, sapore aromatico: *caules* recti & rigidi, duos aut tres circiter cubitos alti, striati, subhirsuti, medulla fungosa fæcti: *folia* tum à radice, tum in caule, & hæc quidem alter-

natim, longis pediculis appensa, interdum nullis aut perquam breuibus donata, quorum quæ ima sunt, palmum ferè lata existunt, duos circiter longa, superiora minora, atroirentia, vtraque hirsuta & per ambitum serrata: *florẽ*, tum in summo caule tum pediculis peculiaribus ex foliorum alis exortis, frequentes insident, Doricæ vocatæ floribus similes, lutei, magnam partem staminei, in pappos euanescentes.

Virgam auream vulgarem latifoliam multi Solidaginem Sarracenicam, heidnisch wundkraut/ appellant. An autem hæc vera sit Solidago Sarracenicæ asserere non vult Matthioli. Is in post. comm. Ital. & Lat. cum magn. fig. quam vulgo Virgam auream vocant Herbam Iudaicam & Paganam cognominat, atque eius flores non esse similes Camomillæ, vt Fuchsius in suo herbario pinxit. Negat præterea esse illo modo Sideritin primam. Non existimo ego Matthiolum rouisse discrimen inter Solidaginem Sarracenicam & Virgam auream: reprehendit figuram Fuchsii, quum tamen planta quam pingit, ei nota non sit. præterea eius figura, quod folia attinget minus probanda videtur: merito dixit se nolle

Matthioli.

nolle afferere, an sit vera Solidago Sarracenicæ.

Fuchs. nos.

Virga aurea, inquit Gesn. de hortis, vulgò ab Italis dicta, no. minatur a Fuchfio Solidago Sarracenicæ (latifolia, vt ab ipfo nobis præsentibus appellabatur.) Verùm præceptor Fuchfio hæc in parte assenti non potuit, quia hæc duæ plantæ non parum differant.

Hist. Lugd. p. 1272. Virga aurea Matthioli. Itæ: Virga aurea Dodonæi. Duæ figuræ eiusdem plantæ.

C. Bauh. Phyt. Virga aurea 2. siue angustifolia. Hæc sæpè siue crenis vel saltem minus cõspicuis, aliquando folia circum minutissimè ferrata: foliis oblongis, aliquando subrotundis.

Nomina

Virgæ auræ hæc planta nomen inde accepit, quòd ramuli floribus grauidi, auricolorem virgulam referant. Belg. Gulde ronde. Gall. verge d'or. Sunt qui Leucographin Plinii autem. Solidago & Consolida ab aliis à viribus denominantur.

Locus & tempus

Copiosè prouenientem vidi Genævæ. Basileæ cum essem obseruavi copiosè florentem Octobri in monte Moutets, & in monte propè Trenzach, in monte Augustò florentem in monte propè Leurach.

VIRGA AVREA SIVE SOLIDAGO SARRACENICÆ LATIFOLIA FERRATA.

Descriptio



Triplicè latiora huic quam iam dictæ folia, longiora, cæterò qui similia, perinde vt caules ramique: at verò flores lutei, pappi non secundum ramulos spicati, sed summis extremitique umbellam quodammodo effigiantes hærent.

Hist. Lugd. p. 1271. Consolida Sarracenicæ maior: item p. 1273. Virga aurea altera Lobelii. Duas figuras vnus stirpis existimo duobus diuersis capitibus descriptas.

Casp. Bauh. Phyt. Virga aurea 3. siue latifolia ferrata: Reperi in monte Rosberg propè Masinunster florentem Octobri: Frater Casp. Bauh. in Basileensi monte Nindenstein.

VIRGA AVREA ANGVSTIFOLIA SERRATA, siue Solidago Sarracenicæ.

Virgam auream angustifoliam hæc voco, ad alterius differentiam quæ foliis latioribus prædita est: quatum vtraque à Virga aurea vulgari diuersa est. Hæc itaque, de qua nobis sermo, bicubitalis & tricubitalis est; caulis striatis, glabris: ex quibus alternatim folia nascuntur palmum & sesquipalmum longa, vnciam vnam aut duas lata, similia ferè foliis Salicis auric-

late, Doriæ instar per ambicium crenata, sed tenuiora, glabra, non hirsuta vt in vulgari, sapore quodam aromatico prædita, calidiusculo: flores non secundum caulem, vt in Virga aurea vulgari, sed extremis furculis vt in Doriæ, vt umbellam quodammodo mentiantur, lutei, foliis longiusculis, cernis vel quaternis constantes, staminibus in pappos resoluendis mediū obrinentibus.



Trago, Dodon. & Fuchfio, Herba fortis, quibusdam Herba fortis, quibusdam Cartaphylax & Filago, cum, inquit Fuchfius Cartaphylax dicendum esset cuius nec descriptio isti conuenit.

Descriptio

Herba fortis. Herba fortis.

C. Bauhin. Phyt. est Virga aurea 4. siue angustifolia ferrata cuius aliam adhuc speciem esse asserit longioribus foliis.

H. Lugd. p. 1270. Consolida siue Solidago Sarracenicæ à coniungendis vulnerum labris à Sarracenis & Turcis ita dicta: Herba fortis Gall. Consoude & Consolide Sarrazine. Duas figuras habet, vni titulus Solidago Sarracenicæ Fuchfii, alteri Solidago Sarracenicæ Lobelii.

A me collecta est in monte Rosberg propè Masinunster, & plantata in Horto Ill. E. C. florens Septembri; ac etiam Octobri.

VIRGÆ AVRÆ SIVE SOLIDAGINI angustifoliæ affinis Lingua auis Dalechampii.



Lingua maior duorum aut trium cubitorum, caule striato; cauo, per quæ ex longis interuallis alternatim striata folia Solidaginis Sarracenicæ non multum ab similia, sine pediculis adnata, palmum aut sesquipalmum longa, semunciam circiter lata: in ambitu serrata, in acutū mucronè desinentia, & subius veluti tomento obita: supremus caulis in furculos crebros diducitur, atque hi rursus in pediculos, in quibus flores lutei Solidaginis Sarracenicæ.

Descriptio

H. Lugd. nos.

Differ. C. Bauh.

Lingua ma- H.Lugd.p.107.Lingua maior.Camerario in-
ior H.Lugd. ter icones Hircyniarum stirpium fol.3. Conyza
Conyza maxima ferratifolia.

An Lob.Icon.Plant.p.147. Conyza Helenitis
foliis laciniatis? Gefn.hort. Conyze aquaticæ
species. Thal.Conyza aquatica maxima ferra-
tifolia. C.Bauh.phyt. Conyza 12.sive palustris
ferratifolia.

Locus & Non placet à Dalechampio reponi inter Ra-
Temper. nunculi genera cu quibus nihil commune habet.
Ante triginta annos planta caulem cum foliis
non floridum reperui,ubi collegerim non recor-
dor. Siccam etiam habui à Richnero.

ALISMA SIVE DAMASONIVM
Veteribus.

Alisma, quod alii *Αλίσμα*, alii *Δαμασονίον*, alii
Αλίσμα, alii *Αλίσμα* vocant, teste Dioscoride,
folia habet *ἀλλοτρίωτα* similia, angustiora tamen
& ad terram destixa: Caulis est cubito altior, ha-
bēs capitula thyrif species, (quidam *εστρωθίδα*) flo-
res sunt tenues, albi, subpallidi, radices *μήλατος*
έμβόλιος, tenues, odoratæ, acres, subpingues:
Annat locos aquosos. Radix drachmæ vnus aut
duarum pondere pota cum vino, commoda est
his qui Leporem marinum vorarunt, & quos
Rana rubeta momordit, & qui Opium hauerūt.
Item ad torsiones [*εστρωθίς*] & dynteriam, tum
perfe, tum cum pari Dauco pota. Conuenit e-
tiam conuulsis & ad veri affeccionēs. At ipsa
herba altum silit, & fetus reducit, & impolita
tumores [*εστρωθίς*] mitigat.

Meminit & Plinius lib.25.cap.10. Alismatis &
quidem duplicis: alterius laciniosis angustis fol-
lus, alterius in maioribus folus, vtriusque in syluis,
cætera que habet sunt Dioscorideæ. Eius in cal-
culo expellendo vires se casu expertum esse tra-
dit Galenus, in dynteria autem inuimè.

De Alismate siue Damafonio, magna inter
Auctores controuctia: aliis Plantaginem: aliis
Calceolum Mariæ; aliis Digitem: aliis Men-
tham græcam: aliis Auriculam vrsi, aliis Primu-
lam veris; aliis Bisfolium maius & minus: aliis
Plantaginem aquaticam: aliis Saponariam: aliis
Lilium conuallium: aliis Halyinum: aliis Elle-
borinen: aliis Costum hortensè, aliis Alisma
Monspelientium, siue Dorian de qua iam: aliis
aliam plantam statuentibus.

ALISMA MONSPELIENSIVM
siue Doria.

Obliquè fertur *radix*, crassitudine digitalis, al-
biditens, concauus, vbi in *caulem* exereuit, sapo-
re aromatico & amaro, caulis trium aut que-
tuor cubitorum est altitudine, rectus, simplex,
concauus: cui alternatim sine pediculo *folia* ad-
nascuntur. Lepidi foliis accedentia, non
neruosa vt sunt Plantaginis aquaticæ, quibus e-
tiam sunt longiora, acuta, crenata, pingua, prio-
ra folia habent aliquid simile cum plantagine a-
quaticæ, non tamen sunt ita lata, nec neruos se-
cundum longitudinem habent, cum pediculis
sunt cubitalia. Sunt sapore Angelicæ aromatico,
sed remissiore, amaro: caul s fastigium in ali-
quot diuiditur furculos, qui *res* sustinent laco-
bræ luteos, sed minus foliosos, in pappo abeun-
tes. Sculptor noster malè pro ferraturis veluti
pilos in icone nostra demonstrat.



Gefn. hort. p.
286. Virga au-
rea, fortè Pana-
ces Chironium
cui Lapathi foli-
um tribuitur,
nisi id poti-
us Doria circa
Monspelium di-
cta sit.

An Lobel. &
Pena Aduers.p.
124. Norbonen-
sium Dorea qua-
si aurea, quam
perperam Doria
vocant: neuti-
quam Doria duci
tritè, quasi
exorice huius
reperit eandem
velè alerūt her-
barii quidam.

An Theophr.Panax Chironium
& Plinii Phatnaceum. Figura Aduers. non pla-
cet. Lobel. Obi. p.253. Ic. plant p.297. Herba Do-
ria. Item Icon. plant. p.277. Herba Doria Narbo-
nentis.

Camer hort. Dorea: herba vtraque maior &
minor ad Confolidam auream accedens.


H.Lugd.p.1273. Dorea siue Herba aurea Nar-
bonensium Penæ, vulgò *L'herbe Dorée*. Item Li-
monium aliud.

C.Bauh.phyt. Virga aurea s. siue maior, vel
Doria, id est aurea.

Alisma siue Damafonium quod quidam Mons-
pel. diuidant, habeo in in horto Ill.E.C. viua-
ci radice quod floret Iulio & Augusto, semer
maturum Septembris, Vidi etiam Monspelii Ma-
io florentem ad flumini ripam prope Castell-
neuf: vt & Patauii: Tiguri florentem Iunio in
horto D. Gefneri qui Dorian appellabat. Ferrar-
iæ in horto monasterii S. Dominici.

Locus &
Tempus.

TRIPOLIUM MAIUS ET MINUS



Tripolium
vocat hodie
quidam
herbam mari-
tinam, cubita-
lem & sciqui-
cubitalem, ra-
dice fibrosa he-
rentem: *folia*
ad Limonii
maioris folia
accedunt, stri-
ctiora, longi-
tudine ferè pa-
tia, neruis re-
ctis Plantagi-
neis donata,
glabra, nullo
ordine per ra-
mos crescen-
tia: *caulis* fa-
stigium ramo-
sum flores gerit
furculorum extre-
mis hærentes,
purpureos cartule osse, qui in pappo euanes-
cunt. Tripolium, [ait Diosc.] folia habet latis, at-
tenu

Descriptio

men crassiora : caulem palmarem & supra parte diuisum. Eius flos ter die colorem mutare perhibetur, [Id fieri posse, inquit Lobel. & Pen. in Adu. lubet credere, cum videamus e naturæ officina multè mirabiliora cuenire:] ita vt manè candidus, meridie purpureus, vesperi puniceus aspiciatur. Radix est alba, odorata, calidi gustus.

ca, siue venenis resistentia medicamenta.

Cærentum Tripolium, Turbith Serapionis, radix alium non citet decocto & succo pota ait Lobelius. Sed ego cum non intelligo, Si Tripolium quod exhibet, alium non cit non erit Dioscor. Tripolium quod *ἄρτιον καὶ ἄρτιον* dicitur.

EVPATORIVM ADVLTERINVM.
CAP. XIII.



Plin. hallucinatum.

Reperio (Matth. verba sunt) in historia Tripolii non parùm hallucinatum esse Plinium libro 21. cap. 7. vbi turpiter Tripolium cum polio herba confundit, addens vt asserere non dubitauerit, polium ter in die foliorum mutare colorem. Id quod de Tripolii floribus rradidit Diofcorides ;

tum Antiquorum reliqui.

Non est Turbith

Diosc. fabulosus

ἄρτιον, inquit Dodon. gall. vocatur Latine Turbith, sed non est Turbith Mesue aut Auicennæ, quidam vocant *Camomille bleue*, vel *Marguerite bleue*, quæ tamen nomina non conueniunt. Fabulosum est [ait etiam quod à Dioscor. adscribitur, tradi nempe vno die ter colorem floris eius mutari : & manè album, meridie purpureum, vesperi *φαικῶν*, id est, phanieum. Sed tamen tres florum colores vno die reperiti posse, veritati hand repugnat. Nam cum flores omnes, non simul, sed particulatim & sensim perficiantur, tres facit contingit florum colores obseruari : incipientium nempe, completorum, & deficientium. Nondum patentes aut completi subpurpurei sunt: perfecti patentesque, quales scitimus : deficientes papporum candidam ostentant lanuginem.

Camer. hort. Tripolium à Lobelio depictum. C. Bauh. Phyt. Tripolium, siue maius. Item Tripolium 2. siue minus. Nasctur, inquit Dioscor. apud Dodonæum, Tripolium locis maritimis, quæ vnda alluit, recedensque demittit. Ac talibus quidem in Belgii quibusdam maritimis nostrum reperitur: vt in Zelandiæ insulis. Neque videlicet in mari, neque in sicco, sed locis, quæ æstiuans mare allidit, recedens, refluxus, retrôque commicans deserit. Translatum ad hortos diuinitè viger, sed luxurians grandescit, & in fibras radices commutat. Æstiuus mensibus flores facit. Scatent hæc, teste Lobelio, Naibonica & Anglica littora & fluminum crepidines, quas refluxus & maris æstus inundant, vbi ferè nulla alia herba comparat. Frequens in littore Veneto.

Tempera.

Aquam & Crinam ducit.

Tripolii radix, vt Galenus ait, gustanti acris est, & facultate calida in tertio excessu. Dioscorides radicem in vino potam duarum drachmarum pondere per alium aquam ducere refert; itèmq; vrinam. Conciditur etiam ad alexipharmata



Quarum Descriptio

Apas accolit adulterinum Eupatorium, insigni proceritate duum, trium, aut plurium cubitorum altitudine gliscens, caule recto, reteri, tomentoso & in viridi purpurante, medullâ albâ pleno; gratum & aromaticum odorem, cum inciditur, spirante, multis alis concoab-

folia per interualla disponuntur, sed ex eodem eugenicula plura exeunt in vnum pediculum coeuntia, veluti in Cannabe, cuius foliis similia sunt satis, oblonga, acuminata, per ambitum serrata, pilosa, sapore amaro: flores in muscariis glomerati, meris ferè staminulis constantes, ex albo purpurascunt, in pappo tandem facilescentes. Radix subest fibrosa, alba, non abfimili cum foliis gustu.

Trago Herba S. Kunigundis dicitur, quam Officinæ hactenus pro Eupatorio non sine errore vsurparunt.

Herba S. Kunigundis.

Dodon. Gal. Pseudohepatotium mas, Eupatoire *bastard masle*: in officinis non sine magno errore pro Eupatorio vsurpatum: Doctis recentioribus Eupatorium aquaticum, aut adulterinum; Belg. *Coning humnecruyt/herrt claueren* & *Boskfenecruyt mannefen*. Dod. lat. in fol. Vulgare siue adulterinum Hepatotium vulgi, Eupatorium nonnullorum, Eupatotium adulterinum Fuchsi, Cannabina plerorùmque à similitudine foliorum Cannabis, Terzola Baptiste Sardi existimata.

Pseudohepatot.

Eupator. aquat.

Lobel. Aduerf. pag. 227. Aquatica Cannabina Eupatorium dicta mas, quod per multi Pharmacopæi, Belgæ præsertim, Eupatorium Auicennæ foliis Cannabinis præditum vocitant. Obseru. pag. 284. & 285. Cannabina aquatica planta, Eupatorium dicta, Officinis Galliæ Eupatorium cannabinum. Officinis Belgii perperam Eupatorium Græcorum. Icon. Plant. p. 528. Cannabina aquatica, siue Eupatorium mas.

Cannabina multis Terzola Sardi Cannab. aquatica.

Eupat. cannabinum

Amato in Dioscor. lib. 3. enarr. 167. Cannabis silu. & non, vt multi rentur; Eupatorium. Item lib. 4. enarr. 44. Eupatorium Auicennæ; quod ait falsò Ruellium apud Dioscoridem Hydropiper esse credere.

Cannabis silu. amato: Ruell. err.

Meritò Cord. in Dioscor. lib. 2. cap. 191. Ruellium à veritate aberrasse scribit, quòd falsò vocitatum Eupatorium Hydropiper esse iudicet. Adolph. Occo in pharm. Eupatorium Auicennæ

(ita quoque vocat Rob. Constant. apud Amat.) Kunigundis herba & Origanum aquaticum. Castor. Durant. p. 177. Eupatorium vulgare & Auicennæ, iis in fine herbarii aliam habet figuram quæ melius placet. Anguill. epist. 14. Eupatorium Auicennæ non verum.

Eupat. A. sic. Matth.

Matth. in prior. comm. Lat. Eupatorium Auicennæ inscribit: Euchar. Roel. in. Eupatorium. Harchio in Ono. pag. 38. Eupatorium Auicennæ, foliis Cannabinis. Monach. in Mes. dist. 6. cens. 189. Pseudo seu Adulterinum Eupatorium.

Eupat. A. rabum.

Fusch. hist. Eupatorium adulterinum, *Eupatorire des Arabes.* De compof. medic. Eupatorium alterum, Eupatorium Auicennæ, quod pro vero & Græcorum Eupatorio vsurpari non debet: sed eo vendam vbi Seplastarii Auicennæ medicamenta construunt. Casalp. Eupatorium vulgò, Thallio pag. 85. Pseudohepatorium mas, seu Hepzatorium Auicennæ quorundam: Camer. hort. Eupatorium Auicennæ siue aquaticum.

Pseudohepatomas Eupator. Auic non Siderur esse.

H. Lugd. p. 1073. Eupatorium vulgare, quod vero Dioscoridis Eupatorio ferè omnes substitunt, non rei ignoratione, sed maiorum vitium obseruatione, & experientia ducti, quas etiam ipsa aspectu insignis planta, foliorum amaritudine & odoris præstantia, satis præ se fert. Igitur propter amicas hepatis vires, fortè & ob folia Eupatorium vocauerunt, verùm Pseudo eupatorium dicendum.

C. Bauh. phyt. Eupatorium 1. (2. apud Matth.) siue cannabinum. Tabern. Herba S. Kunigundis. Schvv. Eupatorium adulterinum, Origanum pahstre, Cannabina aquatica: Circa scrobium, tiuulorum, ac stagnantiun aquarum margines, flumorum ripas, aliisque vliginosis, subinde & in veteribus ac lumentibus muris nascitur: Amat aquosa & vicina aquis loca, non tamen rigori omninò postulat. Iulio & Augusto floret ac viget: radix restibilis est; sed caules foliæque hyme intercidunt. Obseruauit varijs in locis, vt Lugduni, Genenæ, Monspelij, Bahlexæ, & Montbelgardi.

Vires & Temper.

Herba viribus insignis; quamuis ab Antiquis silentio fuerit prætermittâ. Amariantis quidem est gustus, odoris non minùs tamen suavis, quàm Agrimonia odorata, cui viribus proximè accedit, ac nonnullis in affectibus excellentior est. Obesæ nimis naris erant, te-

ste Lobelio, qui scetere eam dicitabant. Radicè minorum seu fibrarum eius incusarum pugillus in vino decoctus, coctus & potus, Gesnero per per horam post, alium semel mouit, postea verò vomitum duodecies ferè cum magno labore: ita vt Ellebori albi instar purget, sed longè facilius & tutius, profuit sanè plurimum, magnâ pituitæ copiâ euacuata. Gultu vehementer amara est, inquit Fuchsius, vt calidam & siccam esse in secundo ordine aut in medio tertii non sit dubium. Haud dubiè hæc herba astringit, expurgatque, & quæ in venis est crassitiem incidit: Potest obstructions iccoris & lienis aliarumque partium corporis soluere. Hic frutex, præsertim in flore, vulnera & vlcera sanandi vires obinet. Argentina, autore Trago, in pecoribus tantum curandis vsurparur. Certum est vino decoctam herbam aut aquam destillatam vitiiis internorum membrorum vtilissimam: Suffitu herbæ siccæ venenata animalia fugantur. Aium ceruos telis lætos remedia ex hac herba petere. Pseudo-Eupatorium, vt apud Matthiol. & H. Lugd. legitur, calido siccoque est temperamento: calfacit, tenuat, abstergit, incidit, aperit. Ex recentibus foliis contusis succus exprimitur, & insolatus in passillos, quorum frequens in medicamentis vsus. Conferit maximè eiusdem decoctum, aut epotus succus iocineris doloribus & alijs eiusdem affectibus ab obstructione ortis. Quare vtiliter propinatur hydropicis obstructionibus vexatis. Datur quoque succus ad ventriculi apostemata à frigiditate nata, quibus etiam prodest herba externè illita. Foliorum decoctum auxiliatur diuternis, præsertim pituitosis, febribus ab obstructione prouenientibus. Idem vrinæ & menses pellit: scabiem pruritumque sanat cum sumaria decoctum ex caprino sero: sed succus validior est, qui potus elephantiasis incipienti medetur. Flores illiti vulnera recentia & vlcera sanant. Datur idem vtiliter pecoribus tussitentibus & anhelosis equis, quorum etiâ dolores finit. Succus binum obolorum pondere in catapotijs deuoratus intestinorum vermes necat. Idem recens expressus illinitur commodè ex aceto & sale aduersus scabiem. Addi scribitur à Schvvencckfeldio balneis ad vteri affectus, & lixiuis aduersus inueteratos capitis dolores.

Sucus.

Decoctum.

Hydrops.

Febres diu.

turna.

Ascites.

Elephantiasis.

Vulnera.

Ulcerata.

Decora.

FINIS LIBRI VIGESIMI QVARTI.





Alcea Solisequa MVLTVS Veneta.

Descriptio



quàm Alceæ vulgaris minores, sed peregrina elegantia acceptiones, ex luteo herbidi, vnguibus purpurantibus, quorum medium occupat cuneolus apicibus croceis & coecis stipatus, quibus circumiicitur vtriculus membranaceo hirsutus, striatus, quinis thorulis à medio sursum-versum radiatus.

Synon.

Alcea Vesicaria
Alcea Veneta
Malua Veneta
Alcea peregrina
Hypecoum
Matth.
Lonic. nota-
tur
Herba
Hungarica

C. Baub. Phyt. Alcea s. siue vesicaria. Conabantur nonnulli Trago persuadere Maluam seu Alceam Venetam eam esse stirpem que Diolc. Androsamos dicitur, sed errant. Existimat is eam congenerem esse vel Altheæ vel Alceæ. Gesh. hort. Malua Veneta: Alcea peregrina. Hypecoum Matthioli, Malua & Alcea species. Item in append. Alcea Bononiensis Volmaru. Cord. Ohf. Sylu. Alcea species. Lonic. stirpium ignarus duas habet figuras, & descriptiones vnius plantæ. Harum prior est Malua Venetiana, Venediger oder Wetter rößlin. Et Herba Hungarica. Unger fraut.

tubetans eâ parte quâ superior cortex diuisus, continens in singulis loculis tumescensibus quaternâ aut quina grana Alceæ Aegyptiæ granorum magnitudine, longiora tamen, & infimâ parte quâ cortici adhaerent augustiora, nucleum exalbida tunica tectum intus verò subuirdem, continentia, nullò manifesto sapore preditum. An Malua ali- quod genus: nucleus certè manducatus, lentum & viscosum quidpiam præbebat.

Nosira quoque figura quæ eraticam sculpta non placet. Quamuis quidam hanc Italicam & Venetam dicant, tamen nusquam meminimus, aunt Lob. & Pena in Adu. in Italia, nedum Venetis, nisi hortis vidisse. Admodum rudis est Commentator, qui Rutæ folia huic esse contendit: imponit dum huic vires Opit asserit. Lobel. Obf. & Ic. Plant. Alcea peregrina Solisequa. Alcea vesicaria Dodonæo, perperam Hypecoui Matth. Alcea Veneta Tragi. Matth. in Dioscor. Hypecoum. Græc. Ἰπυκοῦν Ital. Hypecou.

Camer. ad Matth. Hypecoum Matthioli, alii Alceam Venetam vel peregrinam Solisequam nominant. Sunt qui Gallicè vocent, La gloire du Monde, & Germanicè Laternenblum. Hort. Lus. Alcea peregrina. Veneta Solisequa sata in hortu Ill. C. V. virt. Montbelg. quotannis prouenit: dudum annotaui non mihi placere pro Hypecouo: Locus habebam etiam Genevæ in hortu: floret Iunio, semen maturat Iulio.

Appendix ad cap. III. lib. XXIII.

Martell. Althæa Malua: siluestris, Brunsch, Althæa & Malua Hispanica. Camer. hort. Thal. Clus. Hort. Lusit. Althæa vulgaris. Loh. & Penz Adu. Ic. Plant. Gesh. hort. Althæa & Ibisus. Tragi. Germ. Ibisus & Malua genus. Gesh. hort. Malua agrestis genus. Cels. Malua siluestris prima, & B. smalua. Cordo in Diosc. Althæa, siluestris Malua genus. Et Hist. Althæa, seu Malua palustris. H. Lugd. Althæa Matthioli. C. Baub. Phyt. Althæa seu Diolc. & Plinii, floribus candidis, aut ex albido dilutè purpurascensibus.

Cæterum notissima hæc est Althæa titulo passim autoribus, & omni Chimægorum vulgo, ex vrguento maximè quod de Althæa appellatur.

D. buerac autem nostræ ætate in maiore nominis & vltus honore Althæa esse: Nec M. ro quondam pecoris sui greges vridi compellere Hibiscus. ex quo tam honestum Garcia illi appellatibus em fecerat: vt sola hæc inter omnes naturæ plantas à toto Madagascariæ indicaretur: Siquidem nihil Althæa Græcis aliud est, quàm si à mendendo Medicam simpliciter dicas: Quibus adhibet in Medicina pharm. cum remediumque: & ad sub- rorum verbum mederi est: sic enim nominata est hæc à Dioscoridis & Hippocrate autore Dioscoride, id est, quod inter primas sit vtilis, & plurimum polleat remediis. Nec alter in Theriacis suis Nicander adhibita aliquid sæpè appellat. Hanc Paladius in Octobri mense Hibiscum dici testatus his verbis: Althæa h. e. Hibiscus folia, vel radices, aut eius caulem tenerum decoctum, vt virum ex molli fir fortè, in dolium mitti assentit. Nominatur tamen etiam Ibisus, teste Diosc. sen Ebi-

cus & Eufiscus Ἰβισκος & Ἰβισκος. Item Maluaifcus, romne ex Malua & Ibisco composito: Officinis Bismalua, seu Vismalua, quasi Malua viscida, & ab excellentia effectus à quibusdam Aristalthea [Aristalthea] nquit Phinius, à Theophrasto etiam Malua siluestris [Malua siluestris]. Est enim, vt ait Dioscorides, in siluestrium Maluarum genere. Dicitur tandem quoque Dendromalache & Anadendromalache [Dendromalache & Anadendromalache] à Glencio, seu arborea siue arborefcens Malua. Quidam olus Iudæicum appellant.

Præter Althæam Bismalua dictam, nobis hæc quoque sunt cognita. Althæa profundè serrato siue dentato folio. Althæa flore grandi Alceæ, Thuri-

Althæa flore
Althæa
Arborescens
Bryonia folio
Sida
Abutilon
Abutilon
Indicum
Malua arboræ
Malua
Althæa
Althæa pentaphylli folio
Ocimoides

Thuringiaca Camerarij. Althæa arborefcens. Althæa species quibusdam arborea altera, vel Bryonia folio. Althæa Sida dicta quibusdam. Althæa flore luteo, quibusdam Abutilon. Appellatur etiam Abutilon Indicum à C. Bauh. Althæa. Sed & Maluam arboream nonnulli Althæam vocant. Sic quoque Lobelius & Pena in Adu. Maluam roseam Althæam faciunt. Maluam crispam, Althæam crispam & maiorem appellat Olling. apud Geln. hort. Plurimi, inquit Brassav. decipiunt, Alceam cum Althæa confundentes. Althæa Lobel. Clusij mihi videtur Althæa pentaphylli folio, siue Cannabis silu. Cortusi. Althæa demum dicitur de Cimoides inter supposititia Dioscoridis apud Cornarium de qua historia nostræ generalis lib. 29.

Appendix ad C. IX. LIB. XXIII.

DE RHA SIVE RHAPONTICO Veterum sententia.

Rha. Diosc.
Locus
Delectus.
Vires.
Exhibendi ratio.

PRA, quod alij *Rhō* vocant [alij *rhā*, Romanis *Ρῥα*], inter spina Diosc.] nascitur in locis supra Bosphorum, vnde etiam adfertur, radix nigra. Centauro magno similis, minor tamen & rubicundior [et *rhō* dicitur] quantum leuis. Optimum est quod teredines non sentit, viscosumque gustu, cum remissa adstrictione (*adstringens sicut leuis*) & quod communis pallidum est, & Crocum quodammodo colore refert. Potum facit ad inflationes, stomachi debilitatem, omnis generis dolorem, conuulsam, splenicis, hepaticis, nephriticis, tormina, vesicæ & Thoracis vitia, præcordiorum distentiones, vteri affectiones, coxendicum morbum, sanguinis sputa, anhelationes, singultus, dysenterias, cæliacas affectiones, circuitus febriles, & venenatorum mortus. Datur ad singulas affectiones similiter vt Agaricum eodem pondete, & cum iisdem liquoribus, non febrilibus cum vino multo: febrilibus cum aqua mulsis: tabidis cum passo: splenicis cum aceto multo: stomachicis ita vt est manditur ac deuotatur, nullo insuper liquore absorpto. Tollit etiam lurida & impetiginos cum aceto illitum. Et inflammationes omnes diuturnas diffundit cum aqua illitum ac impositum. Summa verò ipsius vis est adstringere cum aliquantula caliditate.

Rhacomia Plinio.
Radix Cassia similit.
Vires.

Rhacomia (ita enim vocat Plinius) affertur ex his quæ supra Pontum sunt regionibus. Radix Costo nigro similis, minor & rufior paulò, sine odore, calfaciens gustu & adstringens. Eadem trita vini colorem reddit, ad Crocum inclinantem. Illa collectione inflammationeque sedat, vulnera sanat, epiphoras oculorum sedat ex passo illita. Insignita cum melle, & alia luentia ex aceto. Farina eius inspergitur contra Cacoethæ & sanguinem reicientibus drachmæ pondere in aqua. Dysentericis etiam & Cæliacis, si febris caret, in vino: sin aliter, ex aqua. Facilius teritur, nocte antecedente madefacta. Datur & decoctum eius bibendum duplici mensura adrupta, conuulsa, contusis, ex sublimi denoluitis. Spectoris sint dolores, additur pipetis aliquid & myrrhæ: si dissolutio stomachi, ex frigida aqua sumitur, siue intus, siue extrâ, purulenti excretionibus: item hepaticis, splenicis, ischiadicis: ad renum vitia, suspuria, orthopneas. Arteriæ scabritias sanat ex passo, tribus obolis potis trita, aut

decoctum eius. Lychenas quoque ex aceto imposita purgat: Bibitur contra inflationes & perfrictiones, febres frigidas, singultus, tormina, asperitates, capitis grauitates, melancholicas vertigines, lassitudinum dolores & conuulsiones.

In Rheo (teste Galeno de Antid.) quoque fraus committitur. Nam quibus in locis nascitur, simulatque euulsum est, ipsum elixant, quò succum remittat, ac tam succum vt lycænum & aquæ impermissum, quam Rheum exiccatum, vt non elixum ad nos postea mittunt. Quamobrem scientia opus est verum ab adulterino secernendi, quam facillimè consequuntur, qui suæ spontis Rheum aliquando viderint. Nam elixi pars quæ sub aspectum venit, densa per totum & compacta non est, sed rarior: & gustu tentatum saporem adstringentem, vel nullum vel obscurum remittit. Cum tamen si adulteratum non sit, vehementer adstringat. Citò tamen & ipsum fornicòsū efficitur. Rheum [ait porò Gal. simp. 8.] quiddam Rha nuncupant, mistum habet tum temperaturam, tum facultatem: habet enim quiddam terre stre frigidum, ceu indicio est adstrictio: & adiuncta est quædam illi caliditas: si quidem si plusculum mandatur, subacere conspicitur. Quin etiã æreæ cuiusdã substantiæ subtilis est participes, quod indicat tum laxitas, tum leuitas: verum [adde minime] & opera: ob id enim (Add. licet adstringens tamen) non tantum conuulsis, sed & ruptis & orthopneæ prodest: Sic quoque luentia & lichenas sanat illitum cum aceto. Porò quod adstrictionis opera haud in stre: ua sūt, hinc discernere liceat, quòd sanguinem expuentibus, cæliacis & dysentericis: conseru: nec enim relictatur tertestri frigido tenue æreum, imò cò quòd deducatur in altum valentioris effectus causa existit.

Rheum Galeno
Adulterium

Facultates ex Galeno.

Rh spenticò
Ægnetia.

Pontica radix.
Rha.
Rheon.

Rheum Barbar
Substantiè

Temperamentum.

Amara.

Encaus
lōm
et
zinc
antagon.

Meminit Rhapontici Paul. Ægiheta diuersis in locis. Et primò quidem de cruditatibus & vomitu in mulieribus prægnantibus, vbi dicit, bibant Ponticam radicem, quæ vernacula lingua Rha vocatur. Idem eodem lib. cap. 43. Si magis subducere volumus, de Rheo parum ammiscemus. Item lib. 7. in antid. ex corallo podagræ, & paulò post in Antidoto podagræ Agapeti, dicit, Rheo barbarici. Et tandem l. 7. sub litera R. Rheon alij Rha vocant, compositum est ex terra frigida, & tenuium partium: ærea substantia, calidæ ac leniter acri. Vnde conuulsa & rupta, & erecta ceruicæ spirationes iuuat. Item liuida, discutiendo. At adstringendo, sanguinis sputationibus, & cæliacis & dysenteriacis prodest. Vtraque verò facultate, hepaticis.

Nunc Mesuem de Rhapontico scribentem audiamus. Rhubarbarum etiam clemens, inquit, & excellens est medicamentum, multas dotes medicamento purganti maximè expetitas complexum. Calidum siccum ordine secundo potius quàm primo, substantia duplici constat, vna aquea, terrea, adstringente, corpus dante, profunda, altera ærea, & ignea (à qua rarum efficitur) superfluciaris, quæ suam terream, essentiam adurendo amatum effecit, & purgatorium, & obstructa liberans. Has autem substantias macerando separamus. Vt calida & purgatrix in humorem transferatur, terrea verò adstringens remaneat. Bilem verò potuitamque illa vacuat, præcipuè à ventriculo & hepate, & inde sanguinem purgat, obstructiones liberat, & affectus malè natos sanat, hæterum, hydropem, splenis tumorem, febres putridas, etiam diuturnas, dolorem hypochondrii.

dicamus Dioscoridem respicere genus astringentium, Galenum autem habere rationem eius quod adulteratum, ac cum eo conferre non adulteratum, quod si conferatur cum adulterato animadvertetur vehementer astringere, interea non respicere genus adstringentium, nec cum omni adstringente conferre: vel fortè in Dioscoridis codice depravatam quis dicat lectionem: dicit enim in sine capitis summam eius vim esse astringere: Mesuus aliter ac Galenus, dicit illud quod maceratum & exanmatum valenter astringere & croci colore non inficere.

Appendix ad Caput X. Libri XXIII.

Rhabarbarum inquit, Sylius in Mesuem, à Rhapoticum Veterum diuersa res est, priscis incognita. Hoc ex rignis ad Rha flumium supra Pontum [vnde Rhapoticum Græcis & Latinis, & Radix Pontica Celto dicitur] & Bosphorum Septentrionali tractu affertur: parum purgatorium experientiâ Posteriorum, licet inuentu sit rarissimum, & hodie propè ignotum: obsecratum opinor à Rhabarbaro seu Indico, quod ex India Meridionali in totam propè Europam quasi maximo conuehitur, odoratum, grauitate insigni commendabile, astringens, amarum, cholagogum magis, colore cum manditur planè croceo. Quod siue idem sit genere cum Pontico, siue omninò diuersum, aliis disquirendum relinquo, quibus plus est otii & facultatis: cum præsertim etiam celebres hodie Medici in ea controuersia sibi non contenti, & nuncidem, nunc diuersum affirmant. Manardus namque in Epistolis nunc idem, nunc diuersum censet. Melius & Serapio suo Rhabarbaro tribuunt omnia, quæ Dioscor. & Gal. Rheo. Milihi satis fuerit admonere, in locum Pontici iam propè desiti Indicum viribus proximum, & vbiq; copiosum potiss. esse sufficiens: tantò tamen parcis quanto efficacius, &c.

Eadem ferè tradit Tagaultus quæ Sylius, Rhabarbarum, inquit, seu Rheon barbaricū vulgate, & quo hodie passim ad subducendam aluū nobilium præsertim & delicatiorum, Medici vtiuntur: radix est preciosissima. & ad multiplices medelaram vltus proficiens. Pænis & Arabicæ familiaræ Scripioribus, & passim nunc in Officinis Raues Sceni & Rheubarbarum vocatur. Verùm ætate P. Aginetæ qui longè post Dioscoridem, Galenum, & Plinium vixit, Rheon barbaricum appellari cepit, quòd ex Barbarorum regionibus deportaretur. Ideoque Raues Sceni Arabes dixerunt, quòd ex Scenitarū agro deportaretur. Vnde Græca postteritas Rheo Scenicum vocauit, quòd apud Scenitas Arabes legatur. Quare & Arabicum iure dici possit. Auctoris Cordubens. Rheo hoc barbaricum inter cætera purgantia medicamina ponit præcellentissimum. Quem secutus Mesue, vbi medica pharmaca solutoria quæ benedicta vocat recenset, eius honorificam mentionem facit. Non idem esse puratur multis Veterum Rhapoticum & vulgare nostrum Rheubarbarum. Hoc enim 1. Ex meridionalibus regionibus ad nos deferitur, non autem ab Aquilonaribus vt Veterum Rhabarbarum. 2. Nigrum non est, sed potius flauum, neque vllam, cum Costo nigro similitudinem habet, vt Rhachoma Plinii. 3. Vehementem habet odorem. 4. Quòd grauius eò melius, Meluræ, & nostris Sephasiatis omnibus ac Medicis. 5. Plurimum valet purgando. 6. Tempore Pauli Aginetæ qui inter Vcteres non connumeratur] cepit innotescere mundo, medicis qui ante illum fuerunt planè incognitum.

Fom. II.

Rheum hoc, Rha Recentiorum Tu chiso appellare placuit, quia Veteribus Græcis Dioscoridi, Galeno, & Theophrasto, atque inter Arabes Serapioni & Auicennæ etiam incognitum fuit: Recentioribus autem Græcis, Paulo nimirum, Actuario, & Nicolao, quibus simpliciter Rheon appellatur, celebratum. Eius duo faciunt fastigia. Vnum *plur. Ray Capivay*, hoc est, Rheum barbaricum, quòd ex Barbaria vocata deportetur, illis dicitur. Alterum *plur. Indico*, hoc est, Rheum Indicum, propterea quòd ex India, aut locis Indiæ proximis, nempe Scentis populis, vt auctor est Stephanus de vrbibus Persidis, affertur, vnde Scenicum etiam à quibusdam nominatur. Vtriusque Nicolaus in Drosato septuagesimo meminit, & quidem separatim, vt hinc diuersa esse inter se liquet. *Messie* tria facit Rhei genera, vnum Indicum quòd Raues Sceni appellat, omnium præstantissimum. Alterum Barbarum generis nomine vocat. Tertium Turcicum omnium ignauissimum. Id quo hodie passim ad subducendam nobilium & delicatiorum aluum medici vtuntur ex meridionalibus regionibus, præsertim ex eius parte, quæ Barbaria hodie nominatur, ad nos fertur, ideoque rectè Barbaricum appellatur. Hinc superioribus annis, quum Tunisiam, vel vt nunc vocant Tunetum, Carolus Imperator expugnasset, milites eius magnam copiam secum in Germaniam attulerunt. Regio itaque vnde asportatur, satis indicat à Veterum Rheo esse diuersum, vipote quòd ab Aquilonaribus regionibus delatum fuit. Accedit quòd nigrum non sit, sed potius flauum: vehementer quoque odoratum est, ac graue, & quòd grauius est eò melius. Pliniū deniq; Sc. Mercatores, addit, ex Alepo & Syria, alunt Rhapoticum non differe à Rhabarbaro: sed eandem esse radicem: Rhapoticum plantam esse iuuenem, ideò nullo præditam odore, nec ita efficaciter propterea purgare, vt faciunt alia radices, quæ ad veram peruenere perfectionem: ac vbi vnū colligitur ibid. & aliud.

Rheon Veterum & Recentiorum Rhabarbarum diuersa esse etiam tenent Manardus in Epist. Rheon, inquit, scribunt Plinius & Dioscorides radicem esse absque odore. Costo nigro similem: cum id quòd in vna est cum Costo nigro nullam similitudinem gerat, magnumque longè odorem nec in suauem iactet. Præterea Rheon barbarum à nostris vocatum ex Meridionalibus regionibus ad nos affertur, non Aquilonaribus, vbi Bosphorus, Rha flumius, & Stagna Mæotica &c.

Contrariam verò sententiam amplectitur Anguil. Quòd ad me attineret, ait, credo verū Rhabarbarum non esse plantam diuersam à Rheopontico: quandoquidem videantur multæ plantæ, quæ iuuenes differentes radices habent ab iis quæ ad perfectionem peruenere, id quòd existimo in hac planta fieri, ac id quanto magis videmus nec figurâ, nec substantiâ, nec eolore diuersam Rhapontici radicem à Rhabarbari. Quòd Rhabarbarum purget & non Rhapoticum euenire potest ratione imperfectionis, vt iam dictum de radice. Quòd odorem non habeat, in causa est iuuentus, vt apparet in vera Aristolochia longa, quæ odoratissima est; dum autem iuuenis est, nullum planè odorem habet. Eadem ætas efficit vt gustu non sit amara, non arida, non densa: sed rara & leuis: inueniuntur enim multæ radices, quibus idem euenit. Id expertus sum in radicibus, quibus vescimur, ita vt in eadem specie iuuenis multum à matura differret, qui ignorasset, existimasset aliud esse. Huius etiam opinionis

Xxxx

Rhabarb. & Rha Ponticum diuersum.

Rhabarbarum.

Manard. taxatur.

Rha Indicum pro Pontico sufficiens.

Rhabarbarum.

Raues Sceni. Rheon Barbaricum.

Rheon Scenicum. Rha Arabicum.

Rhaponticum ex Rheo, distinetur.

Tempore Pauli cepit innotescere Rhabarb.

Rhabarb. Vetus incognitum.

Rheon barbaricum duplex

Rheon Indicum Scenica pars in Persia.

Rhei genera apud Mes. Rheum Indicum. Raues Sceni Rheon barbaricum. Rheum Turcicum.

Rhabarbarum ex Tunisianis allatum.

Rhaponticum & Rhab. idem.

Rhaponticum quare non purget. Refertur Augustinæ eorum rationes qui Rhabarbarum sunt diuersum statum à Rha Pontico.

fuit Melues Rhapsonticum & Rhabarbarum eandem esse rem, cum Rhapsonticum vocat Rhauet Turcicum, dicens, debilius reliquis omnibus praenominatis. Itaque si Melues exilitat Rhapsontium esse Rauet Turcicum, & iungat cum Rhabarbaro: erit iuxta meam opinionem Rheubarbarum, sed imperfectum comparatione facta cum reliquis Rhabarbaris. Quandoquidem si fuissent species differentes, duo fecisset capita, non sub vno complexus fuisset. Sed cum sciet eandem speciem non distinxisset, nisi bonitate minore. Quod ad eos attinet qui dicunt nasci circa fluuium Rha, dico falsum esse, quandoquidem iis in locis non nascitur Rheubarbarum: sed Lappathi species, quae ibi abundat, quae ad nos adfertur, cum autem nescio quid simile habeat cum Rhabarbaro, vocatur eius radix Rhabarbarum monachorum & Rheon, vt etiam affirmat Iohannes Tzetze Hesiodi commentator, quem deinde nostri sequuti sunt. Si verum esset ibi nasci, maior eius copia Constantinopoli videretur, quam videatur: vbi minus quam alio in loco videtur. *Clima* posse efficere, cur Rheu ponticum, hoc est Rhabarbarum non soluat, & inodorum sit, credi posset, cum multa sint nobis exempla, vt in Persia, quae ex Persia vbi venenata est in Aegyptum translata, sub eo climate venenum amittit, ac fit cibis idoneus. Galeus loquens de vino dicit vitem Pergamo translata ad vnum stadium qualitatem manifeste mutare. *Hic igitur de causis n. n. dicemus Rheu ponticum plantam diuersam esse a Rheubarbaro. Sed hoc illi perfectius & maturus esse: Quae Anguillarum sententia nobis non patum aridet.*

Lappathi species

Rhabarbarum Monachorum

Locus

Nemo plantam videt

Vnde Rhabarbarum deferatur.

Tempus

Sequentia, quae ex Bellonio, Garcia & Acofta subscribentur, natales maximè concernunt. Maxima igitur pars Rhabarbari, vt scribit Bellonius, quod in Europam deferretur, emittit in Halepo, vbi interdum simul in cerneli onusti Rhabarbaro conspiciuntur, id deferentes ex Asia vbi diligenter colitur: neminem reperimus qui plantam videt Rhabarbari, cuius vires copiose descriptit Melues, qui non meminit Rhapsontici, quod existimauere Graeci: ipse qui morabatur Damasci aut Halepi dicit suo seculo Rhabarbarum delatum fuisse ex India & Seni, id est Asia aut Assyria, & tertio ex Barbaria, quarto ex Turchia: dicit praeterea indigenas macerasse & fieri potest vt Melues tempore id fecerint: nunc autem quum magnum videant ex Rhabarbaro emolumentum, tanta diligentia excolunt, vt abundet: cum essent Halepi vendebant decem libras pro duodecim ducatis: &c. vt verum fateamur Rhapsonticum valde simile est Rhabarbaro, non tamen idem dicimus, manifestum tamen vtriusque facultates valde similes. Mirum quod scribit Bellonius, plantam neminem vidisse & coli in Mesopotamia semine satam. Annon quodlibet semen terre commissum radicem proferens plantam quoque producit?

Omne id Rhabarbarum addit Garcia, quod in Indiam, Persiam, & Europam importatur, in Chinarum regione nascitur: vnde per Tartariam Ormuz & Alepam deferretur, inde & Alexandria, & tandem Venetas, vnde reliqua Europa regna petunt. Nos praeter id quod nauigijs ex China infertur, eos etiam vitum quod Persa Ormuz aduehunt, quod minus terebinthum & cariem sentit: Nam Rhabarbarum sub mensis Maium in India maritima illatum nisi ante Septembrem absumatur, planè inutile est & in mare abiicendum: corruptum enim vt pleraque alia aromata hibernis

illis mensibus (ij nostro auctori sunt alio quodam loco Iunius, Iulius, Augustus) interea aliud praestantius & recentius ex Ormuz importatur, cuius vsus. In montanis vero hieme adferuati alia est ratio, putredini enim non est adeo obnoxium. Eam ob causam qui illud in India conseruare volet, in Disnager aut Balagata perferri curet. Referunt genus quoddam nasci in certa Tartariae vrbe nomine Samarcandar: sed quod improbum sit, nec nisi iumentorum purgationibus vile. Nullum autem est Rhabarbarum aut Indicum: sed solummodò Chinense, quod Rauam Chini Persae appellant, Mauritani tamen plerique solummodò Rauam. Aliquando in Cochinchina intellexi Rhabarbarum ab indigenis interdum decoqui aut destillari, & eius decocto aut stillatitia aqua se se purgare, eamque esse causam cur interdum tam facile teredinem sentiat & corruptum. Sed cum neminem auiderim, qui, an haec ita se habent, se vidisse diceret, affirmare non ausim.

Nullum Rhabarbarum aut Indicum sed Chinense.

Rhabarbarum, pergit Acofta, in interiora Chinarum regione duntaxat prouenit, vnde in vrbe Cantam [illius Praeuius portum &emporium, vbi Lusitani habitant] exportatur & inde nauibus in Indiam aduehitur. Alia item via ex eadem Prouincia camelis deferunt per Tartariam, quod non adè cariosum &c. Quod verò nonnulli scribunt eius regionis incolae Rhabarbarum macerare &c. fabula est, quam in de originem sumpisse arbitror, quod nonnulli gentiles mercatores Rhabarbaro fuffusion & vetustiori [vt scilicet ad corruptione liberent] aquam tepidam adfundant, deinde hinc pannis emundatum bacillis aut filo traiciant vt exsiccet, & nonnulla foramina piperis tenuissimè triti polliere & cera obturent: deinde de prebè siccatum in Pyllyi semine adserunt. Haec mihi retulit Mercator Casarinus.

Reubarbarum mittit China, regio vltra Calchut, mores Sir qui ciuitatis, & Prouincia Suchur magno Cham subiecti. Sed in Chirazami regione Persidis imprimis mira est eius copia, id eà coniectura se adsequutum scribit Ludouicus Romanus nauig. quòd sena Rheubarbari librae nostro more pondo vnciarum duodecim singulo aureo veniebant.

Plurimum purgat Rhabarbarum, vt testis est apud Fuchsum, Actianus, flaua bilis impetus, potissimum Indicum, potenter domat, ideoque verè cholagogum existit. Quare Melues sententiam falsam esse oportet, qui Rheon hoc planè innoxium esse, ac tu dè tum pueris, tum pregnantibus dari posse literis mandauit. Nam vt quotidiana multorum experientia comprobatum est, & id ipsum tum Graeci posteriores, tum alii Medici testantur, humores in venis biliosos attrahit & educit, id quod sine grauiore agitatione fieri non potest. Quia vtique agitationem grauidis periculosa semper, viris: autem interdum molestam esse abundè constat. Non igitur rectè faciunt nostri temporis Medici, cum imbecillioribus & grauidis id ipsum exhibent. Nam & ipse noui Medicum cui non satis feliciter cessit Rheo in muliere quadam teneriore exhibitio. Atque tum magis purgandum laedere solet, quum maceratum exhibetur. Nam quum macerando eius substantia calida & purgatrix, quod Melue etiam fatetur, in liquorem in quo maceratum est transferatur, terra verò & alitringens, adeoque roborans, & purgandi vires non nihil frangens in Rheo remanent, necesse est vt tum validius pur-

Vires & vis Bilem purgat. Melues teneat

Gravidis non dandus

Historia

Pregnantibus praestare dare potest quum antequam

get, quàm si integrum exhiberetur. Præstaret itaque imbecillioribus & delicatioribus integrum exhibere Rheum, quàm eius dilutum. Nam hoc modo illi adesset, quod vehementiam eius frangeret, adstrictio scilicet minorum ipsa. Hinc est, quod Averrhoes Rheum barbarum alius purgantibus in medicamentis præfert, ut quod infræmans eius vehementiam secum habeat, cæteris forè omnibus eo destitutus. Prægnantibus tamen & pueris præstat Cassiam & Mannam propinare, quæ maiori facilitate, citraque omnem noxam alium subducere possunt, quàm Rhabarbarum. Si enim omni caret vitio & noxa, ut Melue & Iuniores Medici affirmant, cur in eius sumptione infrænantia, aut vi ipsi loquuntur corrigentia, illi esse adicienda docent: nempe spicam, masticam, Cinnamomum, & Juncum odoratum.

Melue sibi
contraria

Rheum recentiorum
non dandum
dysenterici

Cæterum in quum purgantia facultate præditum sit Rheum Recentiorum: reprehensione non vacat, quod illud hodie plerique dysenteria laborantibus exhibent. Erroris autem occasio nulla alia fuit, nisi *υπεροχνησια*, id est, pervertitimitatio. Quum enim viderent Veteres, tum Græcos, tum etiam Arabes, in dysenteria crebro fuisse vios Rheo Pontico, voluerunt & ipsi Rhabarbaro, quod idem est: putauerunt, in eodem malo vti. Quod si verò eius quod nunc vocant Rheum Ponicum radice pro Veterum Rheo vti fuissent: omnem reprehensionem effugere potuissent, quòd eius, ut ostendimus, legitimum sit succedaneum. Nam ut Veteres solum Rheum in dysenteria, & vulneribus sanandis esse efficacis experti sunt, ita etiam Centaurii radix, quam Officina Rhaponticum nominant, miram in us malis vim obtinet.

Porro Rheum hoc Recentiorum datur ex lactis feti vel decocto Intybi sativi latifolii. Maccatur quoque in iisdem liquoribus, aut in stillatio Intybi iam dicti liquore, idque æstate potissimum: aut vino albo & odorato, & id quidem hyeme. Propinatur per se tritum pondere drachmæ vnius cum dimidia [si tritum eius substantia ass. addit Aug. Ferr.] Melue autem est ad drachmas quatuor progredi, quæ satis multa est quantitas. Dilutum seu in sulum vnius, duarum, vel trium: aut quatuor [si purgans ei ud addatur] drachmarum in pondere sumitur. Hoc castigatione non eget, ut Aug. Ferrerius de vera M.M. de castig. præst. Med. docet, sed Spica Nardi, Schoenantho, Cinamomo, vigorari creditur.

Dosis in
subst.

Rhabarb.
corref non
probat

Improbat idem præterea & merito præsertim in dysenteria torrefactum Rhabarbarum. Quam enim morbus requirit, naturalem & efficacem habet adstrictionem, & exsiccationem vi purgantis coniunctam. Præterea in torrendo, si modum excesseris, non solum remittit medicamentum, verum etiam purgantis facultate penitus destituit. Cùmque porro modum attingeris, vix efficies, quin medicamentum vitione acrimoniæ [propter quam & tenuitatem in alui fluxu Veteres purgantia non adhibebant, quòd & intestina roderent, & novam materiam ad locum affectum traherent] acquirat, præsertim in partibus exterioribus, internis vix ignem sentientibus.

Rhabarbari usum in prægnantibus cum Melueo probo consideratis considerandis, ut qui multas scilicet sine villo damno purgantium infusionem præfeco substantiæ, quòd enim citius sine violentia medicamentum purgans euacuat ed mibi gratius, idèd Præceptorem Rondelerium secutus, non laudo correctionem purgantium

Per adstringentia.

Non approbo eorum morem qui in dysenteria à principio adstringentia exhibent, si augment morbum dum per ea retinent educenda, nempe acres malignos & putridos humores, quòd natura vergit ed ducete oportet, si per convenientia fiat loca: si igitur statim à principio educantur, convenientibus purgantibus subleuantur citò, & postea tunc adstringentibus vti licet. Inter medicamenta purgantia magni ficio Rhabarb. multifolia experientia edoctus, noli n tamen asserere an tortere Rhabarb. sit calidus tostrura redere.

Quia autem Rheum calidum & siccum hepatis calid oris mors est, nisi refrigerantibus temperetur: Idèd illius extractum quod Spagyrici cum aqua vitæ parant calorem noui calotis accessione adagentes, non magni ficio. Si quid laudandum in eo, est quod in pilulis possit commodè exhiberi, & forè etiam melius conferuari & circumferri.

Appendix ad caput vltimum lib. XXIV.

~~VERBESINA, SIVE CANABINA AQUATICA~~

VERBESINA, SIVE CANABINA AQUATICA, flore minis pulchro elatior, ac magis frequens.

Descriptio

Verbena altera elatior, & crebrior priore, amplior etiam, extra aquas nasci solita, caules plerumque cubito maiores tollit, rariis mitiores, rubentes, hirsutos, solidos: folia ad articulos bina aduersa, tripartita, Cannabiorum vel potius Pseudoepatorii æmula. profunde serrata, pilosa, subinde per ramos quoque nullo modo laciniata: cæterum ex foliorum sinu profiliunt ramuli, quorum extremis flores insident luteoli, multi, squamis striatis purpurantibus in ambitu, pulchritudine multum sequenti cedentes. Semen longum, lanum, in duos stilos asperos desinit, qui veltibus adherent: totum verò florem obvallant folia, iis quæ in summis conspiciuntur ramulis lupparia, radiatim disposita: radices fibrosæ, inuolutes.

Verbena
supina
Trago

Trago Verbena 3, siue supina dicitur, Verbenaque supina Dioscoridis esse ab illo statutum, licet, ut ipsemet fuetur, Verbena supina Dioscoridis ipsi perspecta ac cognita non sit. Nec placet ipsum adscribere nomenclationes spiciat Verbena supina Dioscoridis, siquidem ea non sit.

Pseudohep-

Dodon. gall. p. 46. Pseudohepatorium semina: Gall. *Eupatoire femelle boffard*, Belg. Boelkeris cruyt myfferi, Eupatorium Auicennæ existimatur, idèd quæ à quibusdam Eupator. Auicennæ appellatum. Lat. in fol. Hepatorium aquaticum, ad Hepatorium vulgare & adulterinum referendum, quod & Terzola dicitur, quia de causa etiam Terzola aquatica dici potest. Descriptio à Dodonæo posita sicuti & figura videntur demonstrare quæ. Verbena nam de qua agimus, id tamen asserere non ausim: in postremis nomen Belgicum huic non amplius tribuit, sed Eupatorio Officinatum.

Eupat. A. 101.

Terzola d.

Dod. nor.

Thilio Pseudo-Hepatorium alterum seu semina. H. Lugd. pag. 1039. Hydropper, Pseudoepatorium semina Dodonæi [Gall.] Chrysanthe. mum aquaticum quorundam. C. Bauh. Phyt. p. 64. Cannabina aquatica 2. siue folio tripartito diuiso. Verbena supina vel 3. Trago. Pseudohepatorium Dod. Huius folia communiter in tres tripartite partes, aliquando quinque, sex diuiduntur,

Hydropi.

Cannab. a. quat. fol.

*Bidens Ca-
lasp.*

Casalp. lib. 12. cap. 17. Quædam in aquis fetè
nascens, Eupatorio breuior, ramosa: foliis tri-
partitò diuisis, capitulis in cacuminibus paucis,
stellatis, flore luteo: seminibus valdè compres-
sis, oblongis, in duos aculeos desinentibus, vnde
Bidens vocetur.

*Eupar. Co-
nyzoides.
Coniza a-
quat.*

C. Schvencck. Eupatorium Conyzoides pri-
mum Coryza aquatica maxima serratifolia, Eup-
atorium Cannabinum tæmna Septentriona-
lum stellato & odoro flore, Lohelto. *Nobis* non
vna planta sed tres distincte. Prima quidem Ver-
besina præfens est: altera, Lingua, auis maior Da-
lechampi: tertia, Verbesina pulchriore flore luteo.
Schvencck. confundit omnia.

*Locus &
tempus*

Lacis humidis, palustribus & fossis præuenit
circa oppida & pagos. Eupatorium aquaticum Do-
donæi, in riguis gignitur, quæ rarè & non nisi
siccissimis ac feruentissimis temporibus, aquis
caerent, prodiit verò & intra fluminum quorun-
dam latè patentes alueos: quod altius crescit &
flores profert, orbiculato ambitu, multis exiguis
luteis foliolis stipatos, Bupthalmi æmulos. Non
modò autem in Belgio, sed & in Germania, ac
B: hemia reperitur: nec desinituntur eo humida
Botanica loca. Plurima æstatis parte floret ac vi-
get, semènque perficit.

*Vires
Veneni.
Vlcera*

Verbenaca lupina serpentes, aliæque venenosa
animalia pellit velati & Coniza. Potest etiam de-
pascensibus, ac longè latèque serpentibus vlceri-
bus adhereri, autòe Trago. Terzola aquatica
Dodonæi amara herba est, proinde calidà & sic-
ca, vsem tamen in medicina habere ignoratur, ni-
si sternutamenta ciet.

*Sternu-
menta ciet.*

VERBESINA PVLCHRIORE FLO-
re luteo.

Descriptio



Verbesina pulchriore
flore mihi di-
cta, fibris radi-
catu multus, al-
bis, tum ah imo
caule, tum ab
eius geniculis
demissis, sapore
aromatico: cau-
les cubitales, &
maiores, aliàs
minores, tere-
tes, subheruti,
& non nihil
subinde ruben-
tes: folia ad no-
dos bina aduer-
sa, quatuor aut
quinque vncias
longa, vnam la-
ta, acuta, ferra-
ta tantummodò, non in laciniis diuisa, superficie
vtrinquelæui, sapore acrisculo: ex foliorum alis
duo ramuli diuersi exeunt, quorum alter altero

minor esse solet. Flores multo pulchriores quàm
in Verbesina elatiore, quorum extima folia ex
luteo Viridantia stris nigricantibus picta, his
proxima aureo fulgore nitent, magna, in orbem
acta: medium occupant alternatim remissi flori-
culi luteoli quinquepartiti, apiculos nigros ex-
serentes, squamulæque striatæ, eximis quidem
similes sed suppare; *semen* oblongum, compres-
sum, fuscum, breuissimis ceu arisis asperiusculis
capiti adnatis ad vestes adhæret.

Verbesina [aliàs Forbesina] Italis dicta, vide-
tur Gesn. hort. in append. planta floribus Indiciis
vulgò dictis cognata.

Lob. Adv. pag. 227. Fæmina Canabina Septen-
trionalium stellato & odoro flore. Icon. plant.
529. Eupatorium Cannabinum fæmina Septen-
trionalium stellato & odorato flore. *Mirror* in fi-
gura Lobelium flores pulchre radiatos non de-
monstrare, quasi non norit discrimen inter Can-
nabinam minus specioso flore; & eam quæ pul-
chriorem habet florem. Folia non nihil respon-
dent ei de qua hoc capite agitur.

*Verbesina
Cannabina
fæmina*

Hist. Lugd. lib. 9. cap. 17. videtur progerere pro
Hydropiperis altero Dalechampu: quamquam
non placeant figuræ: conuenit nomen Chrysan-
themum aquaticum, non tamen figura Dodonæi sub
tulo Hydropiperis Pseudo-eupatorii fæminæ
Dodonæi: licet quædam respondeant, non tæ-
men omnia.

*H. Lugd.
lasp.*

Casalp. lib. 12. cap. 17. Bidens folio non dissecto.
Taber. Icon. & Hist. Eupatorium Cannabinum
Chrysanthemum wasserundkraut / Fungundz
frant weible, wasser stierkraut / Geel feber-
frant Belg. Boetius cruyt wyssen. Eupatorium
cannabinum fæmina, Vinga aurea aquatica, Stel-
laria aquatica, Consolida aquatica, Verrellens. I-
talice Terzola, qua utilis ad tertianas. Non est
Terzola Baptista Sardis, cui flos caruleus, idèd
vocatius Terzollum luteam, hoc est, Tertiona-
riam luteam. Tabern. tribuit huic plantæ nomi-
na Belgica, de quibus sibi non constat Dodon.

*Bidens folio
non dissecto*

C. Bauh. phyt. Cannabina aquatica 3. siue fo-
lio non diuiso.
Schvencckfeld. Eupatorium Conyzoides se-
cundum, Eupatorii Cannabini 2 species, Hydro-
piper 2. Luqd.
Semper obseruati in aquis locis, ubi aqua
fluit vel residet, vt in diuone Pfortensi propè
Haut montier. Montbelgardi circa vrbem florens
Augusto. In Lacunis & fossarum stagnantibus a-
quis quæ itur Oetlingen propè Basileam repe-
tuntur. Borealibus magis & ipsis in vdis aut mediis
riuis curstanter fluentibus viuunt. In Angliã
vbique vborum præsertim Londini & Auxonæ;
Lobel.

*Virga aur.
aquat.
Stellaria
aquat.
Consol.
quat.*

Vulneribus, intèd sumpta præsertim, pluri-
mum confert, & eadem superior potis est: Tri-
buit, huic Lobelius facultates Pseudo-eupatorii
vulgaris: siue Eupatorii Officinarum, ne Lecto-
res fallantur pritis inuestigent quàm vtantur, de
qua Canabina hic loquantur, an de ea quæ pul-
chrum florem habet, an de ea quæ minus pul-
chrum, & quæ elatior est.

*Eupar. cony-
zoides.*

*locus &
tempus*



ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

OMNIVM PRAECIPVORVM CAPITVM
 QVÆ IN SECVNDO VNIVERSALIS HISTORIÆ
 PLANTARVM TOMO CONTINENTVR
 I N D E X.

A			
A Bsus foliis trifolijs		Alcea arborefcens glabra	ibid.
Abutilon Indicum	pag. 361.	Alcea Pentaphylli folio vel canabina	953.
Actium	959.	Althea Theoph. flore luteo, quibusdam Abutilon	ibid.
Achanaca Indorum	95.	Amaranthus purpureus	968.
Aconitum Lycoclonum Dodonæi	835.	Amaranthus Patm. cula speciosa cristata	969i
Acorus veteribus	901.	Amomum in genere	191.
Agilops quibusdam arvis recurvus	734.	Amomum quorundam odore Cariophylli	194.
Agilops Veteribus & in genere	433.	Amomum nostrum ex ipsa fructu	ibid.
Agilops Bromoides	434.	Amomum Clusij	ibid.
Agilops Matthiolo ferit	436.	Amomum novum Cardanomi vulgaris facie, siue Indi-	
Agos	439.	cus Racemus	195.
Agrimonia seu Eupatorium	793.	Amomum verum quorundam	208.
Allium vulgare & sativum	398.	Amomis siue Pseudamomum	ibid.
Ally genus ophisocoron dictum quibusdam	554.	Anacok. ccedens Phaeolus totus ruber	265.
Allium siue M. ch. montanum latifolium	559.	Anonis. siue refta bouis, vulgaris, & alba, spinosa	391.
Allium. b. carne	ibid.	Anonis lutea non spinosa, Dalechampia Narrix.	393.
Ally siue purpurea, uenæ externe	560.	Anonis non spinosa purpureo flore	ibid.
Allium sicut bicorne flore viridi	561.	Amblatum Cordi, siue Aphyllon	783.
Allium sicut bicorne purpureum prolsiferum	ibid.	Anthyllis prima quibusdam.	351.
Allium sicut M. niffellanum album lo. B.	ibid.	Apocynon Veteribus	133.
Allium flore luteo sicut pallido	561.	Apocinum siue Periploca scandens, folio longo, flore pur-	
Allium quoddam sicut flore purpureo	562.	purant	ibid.
Allium Spherocephalum purpureum sicut flore	562.	Apocyno affinis Secamone flore albo	134.
Allium Spherocephalum bifolium Italicum	563.	Apocynum filio rotundiore, flore ex albo pallefcente	ibid.
Ally genus ferit Scovodoprosson alterum Labelio	564.	Apocynum latifolium amplexicaule	135.
Allium Petram umbelliferam	ibid.	Apocyni fructus	140.
Allium umbelliferum praeterse	564.	Aphyllon Indicum	211.
Allium sicut propusill. uncsilium moschatum	565.	Aphace in genere	310.
Alisma Monspeliensium siue Doria	ibid.	Aphaca olus veteribus	1035.
Alisma siue Damafonum Veteribus	1064.	Aqua vita	94.
Allys affinis pseudorobis Monophyllos	ibid.	Arbor Angelina	173.
Allium utrumque bifolium vernum sicut uaticum	ibid.	Aracus fabaceus	296.
Allium alpinum	566.	Aracus fabaceus serratus	297.
Alopecurus Alpinus	809.	Aracus veteribus	312.
Aleine nodosa Dalechampi	861.	Arachidna Veteribus	313.
Altharia	883.	Arachidna, aut potius Aracoides Honorij Belli	ibid.
Althium Veteribus & in genere	913.	Araci, vel Apios leguminosa species Carolo Toffano	326.
Althium sicut lina aspera, quibusdam Lunaria flore		Arbor Trifolia Indica	369.
luteo	934.	Arundines ex Veterib.	492.
Althium Anguillare	ibid.	Arundo vulgaris palustris	485.
Anil siue Nil Indorum	945.	Arundo maxima & hortensis	486.
Alcea Veteribus	953.	Arundo Papyrus quibusdam	ibid.
Alcea vulgaris	ibid.	Arundo Anglica C. Bauh.	487.
Althea siue Bismalus	954.	Arundo scriptoria	ibid.
Althea profundè serrata siue dentato folio	955.	Arundinis scriptoria Indica genus spadiceo colore	ibid.
Althea flore grandis Alcea Thuringiaca	ibid.	Arundo Nastor seu facta toxica figurata	ibid.
Althea species vulgari sinitis	ibid.	Arundo nastor seu facta siue Toxicia gracilis	488.
Althea arborefcens	956.	Arundo humilis, rara ac inusitata	489.
Althea sicut dicta quibusdam	957.	Arundo Indica versicolor	ibid.
		Arundo Indica versicolor flexilis	ibid.

INDEX.

<i>Arundo Indica punicea mollis</i>	ibid.	<i>Batata affinis Inghame sue Inhame</i>	793.
<i>Arundo Indica fluitans</i>	ibid.	<i>Barbarca</i>	868.
<i>Arundo Indica latifolia</i>	ibid.	<i>Barbarea muralis Ioh. Bauhini</i>	869.
<i>Arundo Indica latifolia flore luteo punctato</i>	490.	<i>Balsamina semina Persicif. Na. vel Salicis folio</i>	909.
<i>Arundo Saccharina, & Saccharum</i>	531.	<i>Bamia</i>	959.
<i>Arum</i>	783.	<i>Bamia aliquatenus affinis Sabdariffa</i>	960.
<i>Arum Bizantinum</i>	785.	<i>Baccharis veteribus</i>	1048.
<i>Arisarum latifolium quibusdam</i>	786.	<i>Beidelsar Alpini sue Apocynum Syriacum</i>	156.
<i>Arisarum angustifolium</i>	787.	<i>Beuxuco del Peru.</i>	151.
<i>Asclepias Veteribus</i>	138.	<i>Bera sue cereusfa</i>	423.
<i>Asclepias sine unceoxicum multis, floribus abicanti-</i>	ibid.	<i>Belmuscus Egyptia Honorio Bello</i>	960.
<i>bus</i>	140.	<i>Beta</i>	ibid.
<i>Asclepias flore nigro</i>	ibid.	<i>Beta Cretica semine spinoso</i>	963.
<i>Asclepias Cretica Clusij</i>	ibid.	<i>Beta laticaulis monstrofa</i>	ibid.
<i>Asclepias Indica</i>	ibid.	<i>Bonus Henricus</i>	965.
<i>Astragalus quibusdam</i>	326.	<i>Bodaplam fructus exoticus Paludano</i>	188.
<i>Astragalus Veteribus</i>	332.	<i>Bulbus Esulenus Veteribus</i>	569.
<i>Astragalus Romanus</i>	333.	<i>Bulbus vomitorius veteribus</i>	570.
<i>Astragalus Martialis</i>	333.	<i>Bulbocodium vulgare</i>	593.
<i>Astragalus maior Fachsio</i>	334.	<i>Bulbocodium Hispanicum</i>	594.
<i>Astragaloides, sine Astragalus sylvaticus, Astragalo</i>	ibid.	<i>Bulbocodium flore pleno</i>	ibid.
<i>Fuchsij affinis planta</i>	ibid.	<i>Bulbocodij pleno flore speciosum genus Veneris</i>	595.
<i>Astragalus reticulatus hirsutus</i>	318.	<i>Bulbocodij sine narcissi floris lutei multiplicis varietas</i>	ibid.
<i>Astragalus Monspessulanus</i>	319.	<i>Bulbocodium minus</i>	596.
<i>Astragalus quidam Montanus</i>	ibid.	<i>Bulbocodium minimum coronatum</i>	ibid.
<i>Astragalus Monspessulano candidior & Onobrychis</i>	ibid.	<i>Bulbocodium tenuifolium flore luteo</i>	ibid.
<i>quorundam</i>	340.	<i>Bulbocodium Tenuifolium alud flore luteo fimbriato</i>	ibid.
<i>Astragalus Syriacus</i>	ibid.	<i>ibid.</i>	ibid.
<i>Astragalus forte lanuginosus Boticus</i>	340.	<i>Bulbocodio forte affinis bulbus flore luteo</i>	598.
<i>Astragalus Dioscoridi quibusdam</i>	625.	<i>Bulbocodio forte affinis bulbus alius flore luteo</i>	598.
<i>Asphodelus maior</i>	627.	<i>Bulbocodium minimum tenuifolium album</i>	ibid.
<i>Asphodelus bulbosus Dodon.</i>	631.	<i>Bulbus Eriophorus</i>	221.
<i>Asphodelus minor folio fistuloso</i>	632.	<i>Bulbus Monophyllos flore albo, an ^{non} Cinn Theoph.</i>	622.
<i>Asphodelus minimus albus</i>	ibid.	<i>Bulbus siluestris Euchsij flore luteo, sine Ornithogalum</i>	ibid.
<i>Asphodelus luteus</i>	633.	<i>luteum</i>	923.
<i>Asphodelus minor radice lutea</i>	1042.	<i>Bursa pastoria, sine Pilella siliquosa</i>	870.
<i>Aster ex veteribus</i>	1044.	<i>Bursa pastoria</i>	936.
<i>Aster Atticus purpureo & albo flore</i>	1045.	<i>Bursa pastoria parua</i>	937.
<i>Aster Atticus Montepelensis purpureus angustioribus</i>	ibid.	<i>Bursa pastoria minima, oblongis siliquis, verna, loculo</i>	ibid.
<i>folijs</i>	ibid.	<i>oblongo</i>	ibid.
<i>Aster Atticus luteus, supinus, spinosus</i>	ibid.	<i>Bursa pastoria folijs perfoliata</i>	938.
<i>Aster purpureus Montanus</i>	ibid.	<i>Bursa pastoria sublongo loculo affinis pulchra planta</i>	ibid.
<i>Aster Montanus flore magno hirsutus, quibusdam Ocu-</i>	1046.	<i>ibid.</i>	ibid.
<i>lus Christi</i>	ibid.	<i>Blitum in genere</i>	965.
<i>Aster angustifolius luteus</i>	ibid.	<i>Blitum pulchrum rectum magnum rubrum</i>	966.
<i>Aster tertius Pamponicus Clusij luteus folio hirsuto Sa-</i>	ibid.	<i>Blitum rubrum minus</i>	967.
<i>licis</i>	ibid.	<i>Blitum pulchrum magnum album</i>	ibid.
<i>Asteri Montano Purpureo similis vel Globularia</i>	412.	<i>Blitum erectum, sine Tragi</i>	ibid.
<i>Athera, & ^{non} sive G'uten</i>	972.	<i>Blitum maximum, sine Amaranthus maior semine</i>	ibid.
<i>Atriplex rubra & alba borienfis</i>	972.	<i>albo</i>	968.
<i>Atriplex siluestris</i>	ibid.	<i>Bryonia alba maculata</i>	146.
<i>Atriplex angustifolia laciniata minor</i>	973.	<i>Bryonia seu vitis nigri baccis</i>	ibid.
<i>Atriplex sili. folijs integris racemosa</i>	ibid.	<i>Bryonia laevis, sine nigra baccifera C. Bauh.</i>	149.
<i>Atriplex vulgaris angustifolia cum folliculis</i>	ibid.	<i>Bryonia Mechoacanna nigricans</i>	151.
<i>Atriplex sili. Monspessulana cum pulchris involucris</i>	ibid.	<i>Brassica Marina sue Soldanella</i>	166.
<i>ibid.</i>	974.	<i>Brassica Veteribus & in genere</i>	819.
<i>Atriplex maritima</i>	ibid.	<i>Brassica capitata alba</i>	826.
<i>Atriplex Halimoidis Lobelij</i>	ibid.	<i>Brassica Italica tenerima glomerata flore albo</i>	827.
<i>Atriplex arborescens</i>	ibid.	<i>Brassica Sabaudica rugosa</i>	828.
<i>Atriplex marina species Valerando</i>	ibid.	<i>Brassica rugosa longioribus folijs</i>	ibid.
<i>Atriplex sativa</i>	975.	<i>Brassica multiflora</i>	ibid.
<i>Atriplex, dicta pes asperinus</i>	976.	<i>Brassica alba vulgaris</i>	829.
<i>Atriplex dicta Pes asperinus alter sine ramisior</i>	387.	<i>Brassica alba expansa</i>	ibid.
<i>Auricula Muris Camerarij</i>	432.	<i>Brassica Colorapa,</i>	ibid.
<i>Avena alba & nigra</i>	433.	<i>Brassica Monofermos Angelica</i>	830.
<i>Avena nuda</i>	ibid.	<i>Brassica tophosa</i>	ibid.
<i>Avena pilosa</i>	1042.	<i>Brassica Anglicana minima niuea</i>	ibid.
<i>Auricula muris Hispanica</i>	800.	<i>Brassica nigra dicta</i>	831.
<i>Auricularia Syluij quibusdam</i>	ibid.	<i>Brassica capitata rubra</i>	ibid.
B	251.	<i>Brassica rubra vulgaris</i>	ibid.
<i>Balsamina Cucumeraria</i>	792.	<i>Brassica crispata laciniosa</i>	832.
<i>Batatas</i>			<i>Brassica</i>

INDEX.

Brassica laciniata rubra ibid.
Brassica laciniata alba ibid.
Brassica tenuissima laciniata ibid.
Brassica Thyrsoides 833.
Brassica rubra minor ibid.
Brassica glauca ibid.
Brassica spinosa 835.
Brassica sylvestris procera Thabio 837.
Brianna, a Conyzoides 8047.

C

Capparis spinosa & non spinosa 61.
 Capparis officinarum Cortex ibid.
 Capparis arborescens 65.
 Capparis sabaginea sine Peplidis Lucitanorum 66.
 Capparis ferè similis Alhau 66.
 Campanula Indica 165.
 Cacibulum quibusdam vel Alsine Baccifera 175.
 Cardamomum Veteribus & in genere. 300.
 Cardamomi æquiuocatores 204.
 Cardamomi genus Maximum, Grana Paradysi, siue Melegaia 204.
 Cardamomi species cum siliquis siue thecis longis & breuibus 205.
 Cardamomum manus meligebæ simile, sicut modo turbinatum Cordo 207.
 Cardamomi facie fructus, triangularis malignus 208.
 Cantabrica Veterib. 159.
 Cananace in genere 308.
 Cananace leguminosa quorundam 309.
 Calamus aromaticus in genere 515.
 Calamus aromaticus verus quibusdam 528.
 Calamus aromaticus Cechini Martellini 530.
 Cape siue cepa rubra & alba rotunda ac longa 547.
 Caps Ascalonica siue fissilis 551.
 Calamus Aromaticus vulgaris, multis Acorum 714.
 Canna sine Arundo Indica, quibusdam flos Caneri 752.
 Campanula parua, Anguillare Cantabrica 796.
 Campanula folio hederaceo, species Cantab. Anguillara 797.
 Campanula rotunda: folia minima ibid.
 Campanula limfolia rara, flore caruleo ibid.
 Campanula lychnidea 803.
 Campanula angustifolia carulea & alba ibid.
 Campanula Maior & asperior folio vrisæ 805.
 Campanula siue Ceruicaria Maior & lauior flore albo magno 804. & 806.
 Campanula Alpina glabra, flore dilutissimo caruleo ibid.
 Campanula siue Ceruicaria Ebonisensis paruo flore ibid.
 Campanula repens flore minore carulea ibid.
 Campanula siue Ceruicaria Media Thabio floribus caruleis paruis 807.
 Campanula pulchra à Tossino Carolo missa ibid.
 Campanula Serpylli folia lob. Barkini 816.
 Cakile quibusdam, alis Erica marina, & Raphanus marinus 867.
 Cakile siue Erica marina latifolia 868.
 Camelina Myagrurn Aldroando 894.
 Chamæcisus Serpylli folio, nigricante, & hirsuto 17.
 Chamæcisus angustifolius flore luteo Clusij ibid.
 Chamæcisus foliis Myrsi Tarentine, canis vel cineris 18.
 Chamaecorus 62.
 Chamaecorus Noruegica ibid.
 Chamaecorus altera Noruegica 63.
 Chamæcerasus Gestneri, vel chamaeperychmenon quoddam Alpinum 107.
 China radix 120.
 China spuria pyriformis siue imbinata 121.

China spuria Acori effigie Lobelij 123.
Chamaebalanus leguminosa 324.
Chondria & halica siue alica 411.
Chondria veteribus 1018.
Chondria vel Chondrilla carulea 1019.
Chondrilla lutea 1020.
Chondrilla viminea 1021.
Chondryllis affinis quædam laciniata, an Trincinetella? ibid.
Chondrilla hirsuta rubente flore 1022.
Chondrilla Cretica nomine missa semine crispo ibid.
Chondrilla folio non dissecto, caule nudo & foliato 1041.
Chrysanth. Alpinum Iudenbergense Jacobæ affine 1048.
Chrysanthemum Alpinum Escherianum Jacobæ affine ibid.
Cistus & de eo veterum sententia 1.
Cistus mas maior folio rotundiore 2.
Cistus mas 2. folio longiore ibid.
Cistus mas 3. folijs dilutius virentibus 3.
Cistus mas 4. Monsp. folio oblongo albo ibid.
Cistus mas 5. folijs crispis, & quodammodo sinuosis ibid.
Cistus samina Aëonspeltana flore albo, & Hispanica luteo 4.
Cistus species quædam Hispanica flore albo ibid.
Cistus folio Halimæ flore luteo 5.
Cistus filio Halimi longiore incano ibid.
Cistus folio Lauendulae Clusio forè idem cum Helianthemo recto ibid.
Cistus folio Sampsonis Clus. cui macula in flore 6.
Cistus folio Thymi Clus. cum maculis in flore ibid.
Cistus Ledon latiore folio 8.
Cistus Ledon flore macula nigricante notato ibid.
Cistus Ledon, Populi nigra folijs Clusij, maior & minor 9.
Cistus Ledon latifolium Creticum ibid.
Cistus Ledon 4. Clus. flore candido 10.
Cistus Ladansera, siue Ledum Monsp. argusio folio nigricans. ibid.
Cistus Ledon 6. minoribus angustioribusque folijs Clusij 11.
Cistus Ledon folijs colore cinereo ibid.
Cistus Ledon folijs Rosmarini Coronaria Clusij, flore luteo ibid.
Cistus L. don 9. Clusio 12.
Cistus Ledon Thymi folijs Clusij ibid.
Cistus annuus 1. Clusio folio rotundiore 13.
Cistus annuus 2. Clusio, flore pallido, macula punicea insignio ibid.
Cistus annuus flore garrato 14.
Cistus annuus folio Ledæ flore luteo ibid.
Cistus minimus folio subrotundo ibid.
Cisti species annua angustifolia 15.
Cistus humilis Clusio, siue Helianthemum omnino candidans, flore nunc albo nunc pallido 16.
Cistus Helianthemus flore paruo luteo 17.
Cistus Helianthemus folio Poly montani 19.
Cistus pusillus folio candido flore luteo ibid.
Cistus pumilus montis Baldi, ferè Austriacus myrsifolius ibid.
Cisti folio arbor exotica, capitulis Platani 21.
Citrulus folio Colocyn ibidis secto, semine nigro, quibusdam Anguria 236.
Citrulo affinis melo Indicus, siue Parbea 237.
Citrulo vel Meloni Indico accedens Camolanga ibid.
Cicera antiqua 291.
Cicer in genere ibid.
Cicer arretinum 292.
Cicer sylvestre multifolium 294.
Cicer sylvestre manus Thabij ibid.
Cicer sili. insolium 295.
Cichorium sylvestre & satiuum 1007.
Cichorium verrucosum, siue Xanthia Hieracis

INDEX.

adnumerandus	1023.	Costus ingratus sine Thapsie species	ibid.
Cichorium spinosum	ibid.	Crocus	637.
Cichorium bulbosum	1038.	Crocus verni species variae pag. 640. & sequentibus	646.
Clematis purpurea flore pleno scandens	119.	Crocus montanus Autumnalis	ibid.
Clematis caerulea serrato folio	ibid.	Crocus siluestris Bizantinus candidus: tantillum subcaeruleus	647.
Clematis Pannonica flore caeruleo surrecta	ibid.	Crocus rugosus fructus	188.
Clematis Daphnoides sine prima veterib.	130.	Cucurbita in genere, cuiusque species variae 48. pag. 214. 215. & sequentibus usque ad pag. 231.	238.
Clematis Daphnoides minor flore purpureo, violaceo, & albo, simplicis, ac pleno	ibid.	Cucurbitinus fructus magnitudine ouis Struthij	245.
Clematis Daphnoides maior flore caeruleo & albo	132.	Cucumis vulgaris viridis & albus	247.
Clematis acris veteribus	114.	Cucumis minor pyriformis	ibid.
Clematis latifolia sine Athragene quibusdam	118.	Cucumis longissimi	248.
Clematis Baetica Clusio	126.	Cucumis Aegyptius Chate	ibid.
Clematis sine Flammula scandens tenuifolia	127.	Cucumis siluestris sine Afrinibus	249.
Clem. sine Flamm. surrecta alba.	ibid.	Cucumeris silu. succus Elaterium.	979.
Clem. sine Flamm. flore caeruleo.	128.	Cyclanthis	176. & 177.
Co. hlearia.	942.	Cynobatus veteribus	35.
Colubrinum lignum primum: 11. & 111. pag. 169. 170. 171. 172. & 173.		Cynorrhodon veteribus	ibid.
Colocynthis Veneribus & in genere.	231. & 232.	Cyperus in genere	499.
Colchicum Veneribus	648.	Cyperus species variae pag. 501. & sequentibus	758.
Colchicum album cum purpur. lineis	651.	Cynosorchis prior Dodonae	760.
Colchicum vernum Clusio	652.	Cynosorchis Delphinia	ibid.
Colchicum bisturum	ibid.	Cyno, orchis minimis maculosis foliis	ibid.
Colchicum Polyarthes	653.		
Colchicum vernum Camerarij	ibid.		
Colchicum candido flore Anglicum	654.		
Colchicum pleno flore	ibid.		
Colchicum versicolore flore	655.		
Colchicum montanum	656.		
Colchicum minimum tenuifolium	657.		
Colchicum minus malignum, sine Hermodactylus Officinarium	658.		
Colchicum Illyricum sine Graecum	660.		
Colchicum paruum montanum Luteum, alijs Narcissus	662.		
Colchicum Orientale & Syriacum	679.		
Colocasia	790.		
Conuulvulus maior	154.		
Conuulvulus peregrinus pulcher	159.		
Conuulvulus Bona nox dillus	165.		
Conuulvulus peregrinus t. Bauhini	166.		
Conuulvulus marinus Soldanella affinis	168.		
Conuulvulus Aegyptiacus	169.		
Conyza media	1050.		
Conyza affinis herba vulneraria	1051.		
Conyza maior Matthioli, Baccharis quibusdam	ibid.		
Conyza Helenensis mellita incana	1052.		
Conyza Helenensis pilosa Lobelij	ibid.		
Conyza veteribus	ibid.		
Conyza maior Monspeliensis odorata	1053.		
Conyza media Monspel.	1049.		
Conyza media Monspel. affinis	ibid.		
Conyza species folijs virge aureae	ibid.		
Conyza minor vera	1054.		
Conyza maritima	1055.		
Conyza Alpina	ibid.		
Conyza Syria quibusdam	1054.		
Conyza montana Mycori	ibid.		
Conyza capite mutante	1055.		
Coralloides prona quinquefolia	500.		
Coralloides altera sine septifolia	901.		
Coralloides Enneaphyllos Clusij	902.		
Coralloides minor bulbifera	ibid.		
Cereborus	982.		
Ceromopus Rustij sine Nasturtium verrucosum	919.		
Costus	748.		
Costus Arabicus & similis	749.		
Costus Indicus Clusij	750.		
Costi Adolucenses duo	751.		
Costus Helenij facie officinarum	ibid.		
Costus Indicus Offic.	ibid.		
		D	
		Delphinium minus Casalp.	865.
		Dentaria aphyllis minor Tabern.	783.
		Dentaria quinquefolia	900.
		Dentilaria Rondeletij	941.
		Digitalis purpurea	812.
		Digitalis flore magno candido	815.
		Digitalis Lutea flora maiore	ibid.
		Digitalis ferruginea	ibid.
		Digitalis flore minore subluteo	814.
		Draba lutea quibusdam	870.
		Draba lutea similis	ibid.
		Draba veteribus	919.
		Draba multis flore albo	ibid.
		Draba species glabra	940.
		Draba minor orbicularibus capit.	ibid.
		Drackena radix	740.
		Drackena affinis radix	741.
		Dracontium veteribus & in genere	787.
		Dracunculus maior vulgaris	789.
		Dracunculus aquaticus	ibid.
		Dryopophon Plumj	924.
		E	
		Epinidum quorundam	391.
		Ephemerum non lethale veteribus	647.
		Ephemerum Matthioli	905.
		Erinos, Ermeos, vel Echinus Veteribus & in genere	798.
		Erinos maior rapunculo affinis	799.
		Erinos Dalechampi	812.
		Eruca maior sativa annua	859.
		Eruca Romana seu Genisla	860.
		Eruca sativa Hispanica	ibid.
		Eruca tenuifolia perennis	861.
		Eruca silu. angustifolia flore luteo	ibid.
		Eruca immutata Monspel.	862.
		Eruca inodora	ibid.
		Eruca purpurea, alijs caerulea	865.
		Eruca palustris maior fl. albo	867.
		Erysimon Tragi	865.
		Erysimum alterum Matthioli	864.
		Eupatorium seu Agrimonia	398.
		Eupatorium adulterinum	1065.

INDEX.

F

F Aalim Theueti Helenio folijs similib. 792.
 Faba vel Phasolus Indicus magnus 274.
 Faba arborescens species variae 275.
 Faba, cyanos leguminosa in genere 278.
 Farfaditum ex Veteribus 415.
 Festuca graminea glutinis vacuis: effusa inibus: & nemo-
 ralis lat. folia 479.
 Festuca unceofolio C. Bauhini 480.
 Festuca unceofolio folio spica gemina C.E. 544.
 Festuca sexta Thaly 480.
 Festuca praensis Lanuginosa C.B. 480.
 Festuca dumetorum Eiusdem 545.
 Flos Persicum Symbrio congener 79.
 Foenugracum siluestre, sine Glycyrriza siluestris qui-
 busdam 330.
 Foenugracum syl. Tragi affinis planta 331.
 Foenugracum 364.
 Foenugracum silu. Dalechampij 365.
 Fragaria fereus fraga rubra & alba 394.
 Fragaria non fructifera 395.
 Fragae Serapionis 191.
 Frisillaria nigra 682.
 Fructus squamosus cum granis piperis nigri, an Bra-
 ma Diosc. 188.

G

G A'anga maior 738.
 Galanga minor 739.
 Galega 342.
 Galega montana Dalechampij 343.
 Galega nemorensis verna 480.
 Galega nemorensis verna affinis flore albo
 uen. fl. purp. & albo 344.
 Gladiolus sine Xiphon 701.
 Gladiolus Cichoroides Bauhini & Torrioni secunda
 Clusio 346.
 Glaux Hispanica 341.
 Glaux Veterum 352.
 Glaux leguminosa Herbariorum 480.
 Granadilla Hedera similis 114.
 Glycyptis sine Amara dulcis 109.
 Glycyrrhiza 316.
 Glycyrrhiza Dioscor. chinata non repens 327.

H

H Abazelin sine Granum Alzelin veterib. 504.
 Haermtia Serapionis sine Piperella 189.
 Halucacabum peregrinum sine Cor Indum 173.
 Hedera veteribus & in genere 110.
 Hedera communis maior & minor 111.
 Hedera Dionysiae Dalechampij 113.
 Hedera Lachryma 114.
 Hedypnois sine dens Leonis Fuchsij 1035.
 Hedypnois Montspessulana 1036.
 Helianthemum vulgare flore luteo 15.
 Helianthemum folijs maioribus flore albo 16.
 Helianthemum flore albo folio angusto, hirsuto 17.
 Helianthemum tenuifolium glabrum luteo flore 18.
 Helianthemum alpinum folio Pilosella minoris Fuchsij
 ibidem. 19.
 Helianthemum folio Thymi ineano 19.
 Helianthemum, sine Cistus humilis, folio sampsuchi, ca-
 pitulis valde hirsutis 20.
 Helianthemum adnumulariam accedens 480.
 Helianthes species rara coma inflexa ut in Heliotropio
 ibidem. 157.
 Helxine Cissampelos 156.
 Helxine Cissampelos multi, sine Convolvulus minor
 157.
 Helxine semine triangulo 157.
 Helenium Aegyptium ex genere forte vicinarum 314.

Herba mimosa 382.
 Hermodactyli veterib. 657.
 Hemerocallis veterib. 688.
 Hermodactyli veterib. 657.
 Hemerocallis veterib. 688.
 Hesperides flore purpureo albo & vario 877.
 Hesperis Pannonica smodora 878.
 Hesperis colore ineleganti 879.
 Hesperis Syriaca 480.
 Hesperis Syriaca alia 880.
 Hesperis Alpina muralis minor sine repens 480.
 Hesperidi Alpina sine muraria affinis Draba succulen-
 ta. 480.
 Hesperidi Alpina murariae similis sarvestra & ma-
 gna 881.
 Hypocoon 792.
 Hieracium stellatum 1014.
 Hieracia Veterum 1023.
 Hieracium multi, alijs Cichoreum luteum hirsutum &
 glabrum, vel minus hirsutum 1024.
 Hieracium parva species hysperis angustifolia aspera 1015.
 Hieracium pulchrum 480.
 Hieracium Erucifolium hirsutum 1025.
 Hieracium pulchrum ramosum Sprengerianum 480.
 Hieracium latifolium Genuense folio Conyza maioris
 Monspess. 1026.
 Hieracium Pannonicum latifolium Clusio, Pilosella
 maiori sine Palmaria lutea accedens maculatum
 ibidem. 1026.
 Hieracium capitulis Cardui benedicti, maximum Bu-
 glossum echinoides quibusdam 1028.
 Hieracium asperum maiori flore in agrorum limitibus
 1029.
 Hieracium retum rigidum quibusdam Sabaudum
 1030.
 Hieracium Sabaudi varietas duplex 480.
 Hieracium minus pramosa radice sine Fuchsij 1031.
 Hieracium Macrocaulon inuicem sine minus primum
 Dodonaeo 480.
 Hieracium montanum maius latifolium 480.
 Hieracium latifolium glabrum ex valle Griesbachia-
 na 1033.
 Hieracium latifolium pramosa radice, caule singulari,
 Pilosella, maiori affine 1033.
 Hieracium montanum laciniato folio lanuginoso Clusio
 1037.
 Hieracium NARBONENSE rotundifolium caule aphylo, &
 hieracium caule aphylo hirsutum 480.
 Hieracium paruum hirsutum caule aphylo crispum vis-
 sicatum 1038.
 Hieracium montanum 6. Clusio angustifolium 480.
 Hordeum veterib. & neotericis in genere 419.
 Hordeum distichum 429.
 Hordeum Hexastichum pulchrum 429.
 Hordeum Polystichum 480.
 Hordeum distichum Germanis Oriza 429.
 Hordeum nudum sine Gymnocriton 430.
 Hordeum murinum 431.
 Hordeum vrens verna Hispania 480.
 Holostium Matthioli unceum 480.
 Hyacinthus parvi facie gramen Triglochin 508.
 Hyacinthus biflorus ex veter. sententia 571.
 Hyacinthus vernus Botryoides minor caruleus, angustio-
 rib. folijs, adon. 571.
 Hyacinthus Botryoides verna minor, latifolius, caru-
 lens, nodosus 572.
 Hyacinthus Botryoides albus 573.
 Hyacinthus autumnalis minimus maior 574.
 Hyacinthus maximus Botryoides coma carulea 574.
 Hyacinthus Orientalis quibusdam Constantinopolita-
 nus 575.
 Hyacinthus brumalis albus 577.

INDEX.

<i>Lactuca erispa & tenuiter dissecta</i>	ibid.	<i>Lilium Aphodeti radice luteum, sine Lilio Aphode-</i>	
<i>Lactuca silu. sine enduua, multis dicta, folio laciniato,</i>	1003.	<i>lus quorundam flore luteo</i>	700.
<i>dorso spinoso</i>	1004.	<i>Lilium radice Aphodeti phœniceum, sine Lirio Apho-</i>	
<i>Lactuca silu. murorum flore luteo</i>	ibid.	<i>delus quibusdam</i>	701.
<i>Lactuca murorum affinis Sonchus Dendroides Dalechā</i>	ibid.	<i>Lignum Colubrimum in genere</i>	169.
<i>py</i>	1005.	<i>Lobus cum seminibus conuululo maiori accedentibus</i>	166.
<i>Lactuca silu. purpurea</i>	1028.	<i>Lobus Aethiopico piperi similis, acris</i>	188.
<i>Lampfana veteribus</i>	ibid.	<i>Lobus Cartilagineus ex Insula Mauritiis, Phascolo sine</i>	
<i>Lampfana Dodonæi</i>	449.	<i>Faba nigra</i>	272.
<i>Lachryma Iobi multis, sine milium arundinaceum</i>	449.	<i>Lobus peregrinus cartilagineus, Phascolo ex puniceo</i>	
<i>Lapathum, Oxylapathum, & Hippolapathum, ac de</i>	987.	<i>nigro tanquam annulo cinislo.</i>	273.
<i>is Veterum sententia, & in genere</i>	987.	<i>Lobus quadrangularis</i>	278.
<i>Lapathi species varia</i>	pag. 983. & sequentibus	<i>Lobus membranaceus plantis niger</i>	ibid.
<i>Lathyrus sine cicercula in genere.</i>	302.	<i>Lotus in genere</i>	353.
<i>Lathyrus maioris species flore rubente, & albedo, mino-</i>	ibid.	<i>Lotus satua veteribus</i>	354.
<i>re, dumetorum, sine Germanic.</i>	ibid.	<i>Lotus satua veterum</i>	ibid.
<i>Lathyrus maior latifolia, flore maiore purpureo spe-</i>	303.	<i>Lotus corniculata glabra & hirsuta minor</i>	ibid.
<i>ciosior</i>	304.	<i>Loti Corniculata maior species</i>	355.
<i>Lathyrus maior Narbonensis angustifolius</i>	ibid.	<i>Lotus Corniculata siliquis singularibus vel binis, te-</i>	
<i>Lathyrus species lutea</i>	ibid.	<i>nis</i>	356.
<i>Lathyrus luteus sylu. dumetorum</i>	305.	<i>Lotus sil quæsa flore fusco tetragonolobus</i>	358.
<i>Lathyrus siliqua hirsuta</i>	306.	<i>Lotus siliquosa utriusque modo similis Coronopus, ex</i>	
<i>Lathyrus species que Eruſtia silu. Dodonæi</i>	307.	<i>Cæsar</i>	ibid.
<i>Lathyrus anguloso fronsæ</i>	308.	<i>Lotus Ornithopodii siliquis</i>	ibid.
<i>Lathyrus flore rubro & alio albo</i>	ibid.	<i>Lotus siliquosa lutea Monspeltenſis</i>	359.
<i>Lathyrus quidam, quibusdam Ægyptia Aracum</i>	177.	<i>Lotus satua, odorata annua flore caruleo</i>	359.
<i>Lathyrus solo tenuiore florib. rubris</i>	6.	<i>Lotus silu. ex Cod. Casar.</i>	373.
<i>Lagopus Trifolius quorundam</i>	317.	<i>Lolium quintum Trago Hordei graminis arylis non ad-</i>	
<i>Ladum, & Ladanus</i>	309.	<i>modum vultis</i>	436.
<i>Lens</i>	590.	<i>Lilium graminæum spicatum</i>	437.
<i>Leporis auricula Casalpini</i>	591.	<i>Lopulus mas & femina</i>	151.
<i>Leucoium bulbosum Hexaphyllum cum unico flore, rari-</i>	ibid.	<i>Lupinus in genere eiusque species varia</i>	288. & sequ.
<i>us bino</i>	591.	<i>Lupinus silu. Italorum rusticorum Casalp. dictus</i>	314.
<i>Leucoium bulbosum minus Triphyllum</i>	ibid.	<i>Lunaria maior siliqua rotundiore</i>	881.
<i>Leucoium bulbosum praxos Bizantiæ</i>	592.	<i>Lunaria maior siliqua longiore</i>	882.
<i>Leucoium bulbosum Poliantemunia cardiis florens flo-</i>	ibid.	<i>Lunaria biscutata</i>	935.
<i>ribus minoribus</i>	593.	<i>Lunaria petiata mirissima quibusdam ad Thlaspi refe-</i>	
<i>Leucoium bulbosum flore caruleo Sumeri</i>	ibid.	<i>renda</i>	ibid.
<i>Leucoium bulbosum animalale minus tenuis.</i>	ibid.	<i>Lysimachion veteribus</i>	901.
<i>Leucoium bulbosum ferè affinis Bulbus flore nituo luteo, for-</i>	ibid.	<i>Lysimachia species varia</i>	ibid. & pag. sequentibus.
<i>is purpureo</i>	871.		
<i>Leucoium bulbosum ferè affinis Bulbus quidam</i>	871.		
<i>Leucoium ex veterum sententia</i>	872. & sequentibus		
<i>Leucoium species varia</i>	931.		
<i>Leucoium cum siliquis rotundis flore luteo</i>	931.		
<i>Leucoium spinosum, sine Tolaspi spinosum aliis</i>	932.		
<i>Leucoium luteum spinosum</i>	940.		
<i>Lepidium Pauli</i>	941.		
<i>Lepidium non repens</i>	25.		
<i>Libanotis species Rondeletii</i>	629.		
<i>Lilium AlexanArinum sine Ornicogalum magnum</i>	685.		
<i>Syriacum</i>	687.		
<i>Lilium album vulgare</i>	688.		
<i>Lilium album Syriacum Rauwolfii</i>	689.		
<i>Lilium rubens vel croceum maius</i>	690.		
<i>Lilium rubens vel croceum minus</i>	ibid.		
<i>Lilium Phœnceum arisum</i>	ibid.		
<i>Lilium cruentum latifolium</i>	691.		
<i>Lilium Bulbiferum maius</i>	ibid.		
<i>Lilium bulbiferum incanum</i>	691.		
<i>Lilium bulbiferum repens</i>	ibid.		
<i>Lilium Croceum flore pleno</i>	692.		
<i>Lilium bulbiferum cruentum angustifolium</i>	ibid.		
<i>Lilium flore nutante ferrugineo duplex, maius & mi-</i>	ibid.		
<i>nus</i>	694.		
<i>Lilium flore nutante albo</i>	ibid.		
<i>Lilium flore nutante maximum</i>	694.		
<i>Lilium flore mimato, sine Hemerocallis Chalcedonica</i>	ibid.		
<i>aliquibus</i>	695.		
<i>Lilium praxos nutante flore rubro</i>	696.		
<i>Lilium nutante flore flauo</i>	697.		
<i>Lilium Persicum sine Sufianum</i>	699.		
		<i>M</i>	
		<i>Maleagris sine Fruillaria saturator & delunior</i>	
		<i>681. & 683.</i>	
		<i>Malua Veteribus & in genere</i>	947.
		<i>Malua species varia</i>	949. & sequentibus.
		<i>Malua halle Theophr. & Anthaltum Plinio</i>	504.
		<i>Matragon albicans pullum adzonem cum coloribus</i>	694.
		<i>Matragon flore luteo praxos</i>	697.
		<i>Matricaria Theophr. Lucia & Casari</i>	794.
		<i>Matricaria</i>	242. & sequentibus.
		<i>Melilotus in genere eiusque species varia</i>	pag. 349.
		<i>& sequentibus.</i>	
		<i>Mel Sulliticum</i>	620.
		<i>Meleagris sine Fruillaria Pyrenæa flore minore</i>	683.
		<i>Meleagris sine Fruillaria Aquitanica reflexis oris</i>	ibid.
		<i>Meleagris sine Fruillaria flava</i>	684.
		<i>Medium Diosc. Rauwolf.</i>	805.
		<i>Medica in genere</i>	382.
		<i>Medica species varia</i>	387. & sequentibus.
		<i>Mechoacan</i>	149.
		<i>Melegnetra</i>	208.
		<i>Milium</i>	446. & 447.
		<i>Mitragri species varia</i>	892. & sequentibus.
		<i>Mitragri species varia</i>	892. & sequentibus.
		<i>Moly</i>	562. & sequentibus.
		<i>Mylum</i>	87.
		<i>Mango</i>	189.
		<i>Myrra Cistus Pennæi florib. luteis oblongis</i>	21.

mercantialis
pag. 277

<i>Nyctagium Veteribus & in genere</i>	891.	<i>Oriza Indis orientali peculiaris</i>	483.
		<i>Orchis sine Testiculus in genere</i>	755.
N		<i>Orchis barbata fatida</i>	756.
<i>Nasturtium Indicum folio peltato scandens</i>	175.	<i>Orchis galea & alii ferè cinereis</i>	757.
<i>Nasturtium Indicum fol. anguloso</i>	176.	<i>Orchis strateumatica maior</i>	758.
<i>Nasturtij Indici putata siliqua Peruviana</i>	176.	<i>Orchis strateumatica minor</i>	ibid.
<i>Nachani Garciae</i>	417.	<i>Orchis ornithophora folio maculoso</i>	759.
<i>Narcissus Cyprius luteus polyanthes flore pleno</i>	595.	<i>Orchis magna latis folijs, galea nigricante.</i>	ibid.
<i>Narcissus folijs floris albis, oblongo calice luteo</i>	597.	<i>Orchis alius purpureus, alius ex roseo candidus Trago</i>	760.
<i>Narcissus luteifolius omnino albus calyce longo</i>	598.	<i>sive quartus</i>	760.
<i>Narcissus luteifolius albus calyce magno</i>	599.	<i>Orchis maior tota purpurea non maculata</i>	760.
<i>Narcissus in genere</i>	ibid.	<i>Orchis Ornithophora flore colore herbaceo</i>	761.
<i>Narcissus Medio purpureus flore pleno</i>	601.	<i>Orchis Ornithophora candida</i>	ibid.
<i>Narcissi varis alie species ibidem & sequ. usque ad pag. 609.</i>		<i>Orchis minor purpurea & aliorum colorum</i>	ibid.
<i>Narcissus Persicus croci flore molino, Colchicis affinis</i>	661.	<i>Orchis sine Testiculis tertius Dodon.</i>	762.
	661.	<i>Orchis maior tota purpurea</i>	763.
<i>Narcissus autumnalis minor & similes plantae</i>	661.	<i>Orchidis genus paruum</i>	ibid.
<i>Narcissus Africanus bifolius sine exocentis</i>	679.	<i>Orchis parva flore rubro sine phoeniceo</i>	764.
<i>Narcissus Africanus folio rotundiore</i>	ibid.	<i>Orchis minor folijs tenuioribus reflexis flore punicea</i>	ibid.
<i>Napus</i>	842.	<i>Orchis Bataunica</i>	ibid.
<i>Napus sylvestris</i>	483.	<i>Orchidum quarundam Icones</i>	ibid.
<i>Nasturtium veteribus</i>	911.	<i>Orchis minor angustifolius</i>	765.
<i>Nasturtium vulgare</i>	912.	<i>Orchis parvis floribus, multis punctis notatis,</i>	ibid.
<i>Nasturtium crispum Iob. Bauhini</i>	915.	<i>Orchis rotundus Dalechampi</i>	ibid.
<i>Nasturtium latifolium Dioscorideum Iob. Bauhino</i>	ibid.	<i>Orchis sine testiculis maximo flore</i>	766.
<i>Nasturtium Alpinum Caps. Nasturtium vulgare. Iob. Bauh.</i>	918.	<i>Orchis fuciflora</i>	ibid.
<i>Nasturtium Alpinum tenuissimè diuisum</i>	ibid.	<i>Orchis melittas</i>	767.
<i>Nasturtium sylv. Valerianum Clusio</i>	920.	<i>Orchis sine testiculis spigodes hirsuto flore</i>	ibid.
<i>Nasturtium vel Thlaspi marsumum</i>	927.	<i>Orchis Myodes</i>	ibid.
<i>Nerium Alpinum quibusdam, alijs Ledum glabrum, & hirsutum</i>	21.	<i>Orchis Serapias tertius Dodon. & Myodes Lobelio</i>	ibid.
<i>Nerium sine Rhododendrum flore rubro & albo</i>	140.	<i>Orchis Myodes flore grandisculo</i>	768.
<i>Nerij facie arbor</i>	142.	<i>Orchis Myodes lutea</i>	ibid.
<i>Nerij silique effigie Kaye Bakæ</i>	ibid.	<i>Orchis parva autumnalis lutea</i>	ibid.
<i>Nit Arabum quibusdam sine conuolutus cœruleus</i>	164.	<i>Orchis Erista hirsuta</i>	769.
<i>Negundo arbor mas & femina</i>	188.	<i>Orchis sine testiculis lutea tertia</i>	ibid.
<i>Noli me tangere</i>	909.	<i>Orchis spiralis alba odorata</i>	ibid.
		<i>Or. hic radice repente</i>	770.
O		<i>Orchis Lilifolius minor</i>	ibid.
<i>Ornithopodio affinis vel potius solea, vel ferro equino, herba</i>	343.	<i>Orchis alba calcars longo</i>	771.
<i>Ornithopodium flore flauescente</i>	350.	<i>Orchis hermaphroditica bifolia</i>	772.
<i>Ornithopodium tuberosum Dalechampi</i>	351.	<i>Orchidis genus quibusdam Satyrion castratum</i>	772.
<i>Ornithogalum Cœruleum pallens, & ornithogalum Hispanicum minus</i>	621.	<i>Orchides, Culices minores triphylla</i>	ibid.
<i>Ornithogalum pallido flore</i>	624.	<i>Orchis Barachites</i>	ibid.
<i>Ornithogalum luteum minus</i>	ibid.	<i>Orbanche & Hamodorum Veteribus & in genere</i>	779.
<i>Ornithogalum veterib.</i>	627.	<i>Orbanche flore maiore</i>	780.
<i>Ornithogalum spicatum flore virente</i>	627.	<i>Orbanche flore minore</i>	781.
<i>Ornithogalum spicatum albo flore Monspes.</i>	628.	<i>Orbanche minor purpureis floribus sine ramosa</i>	ibid.
<i>Ornithogalon Creticum & Pannonicum albo flore</i>	629.	<i>Orbanche magna purpurea Monspessulana</i>	781.
<i>Ornithogalum vulgare & verius maius & minus.</i>	630.	<i>Orbanche affinis nidi auri</i>	ibid.
<i>Ornithogalum Neapolitanum</i>	631.	<i>Orbanche & nido auri affine Pseudo nidi auri</i>	ibid.
<i>Orchis sine Eruum in genere</i>	317.	<i>striatum violaceum</i>	ibid.
<i>Orchis sine Eruum multis</i>	321.	<i>Oxalis vulgaris</i>	989.
<i>Orobanchum cicut Lobelij</i>	322.	<i>Oxalis cista</i>	990.
<i>Orobo similis Lathyrus Cretensis Honorij Belli</i>	ibid.	<i>Oxalis sylvatica maxima</i>	ibid.
<i>Orobo similis Aracus Cretensis eiusdem</i>	ibid.	<i>Oxalis folio amplissimo geniculis tuberosis</i>	991.
<i>Ochros in genere</i>	295.	<i>Oxalis tuberosa radice</i>	ibid.
<i>Omphacium</i>	84.	<i>Oxalis folio rotundiore repens</i>	ibid.
<i>Onobrichis in genere</i>	336.	<i>Oxalis minor aculeata Candis</i>	ibid.
<i>Onobrichis purpureo flore</i>	337.	<i>Oxalis parua auriculata repens</i>	992.
<i>Onobrichis subcœruleo flore</i>	ibid.	<i>Oxalis Africana</i>	ibid.
<i>Onobrichis pallido flore</i>	ibid.	<i>Oxis sine Testisum acidum</i>	387.
<i>Onobrichis Cæsalp.</i>	342.	<i>Oxy lutea</i>	388.
<i>Oriza veteribus</i>	450.		
<i>Oriza in genere</i>	451.	P	
		<i>Palmata Satyria in genere</i>	773.
		<i>Palmata non maculata.</i>	774.
		<i>Palmata speciosiore 1770, folio maculata</i>	ibid.
		<i>Palmata maculata</i>	775.
		<i>Palmata alba.</i>	ibid.
		<i>Palmata sine Serapias palustris</i>	ibid.

INDEX.

<i>Palmata</i> siue <i>Orchis Palmatica</i>	ibid.	<i>Pisif pulchra</i> species folio anguloso	ibid.
<i>Palmata Serapius palustris lepiophylla, violacea, maculata & non maculata</i>	776.	<i>Pisif</i> minor ex purpureo variegata, vicia similia	298.
<i>Palmata angustio folio palustris</i>	ibid.	<i>Pisif</i> parva viridita	ibid.
<i>Palmata Serapius montana</i>	ibid.	<i>Pisif</i> minor rubra variegata	ibid.
<i>Palmata floribus impense rubric</i>	777.	<i>Pisif</i> magna, rubra variegata	ibid.
<i>Palmata palustris Nepelodes</i>	ibid.	<i>Pisif</i> maiora, alba	299.
<i>Palmata siue Cynephorbis macrocaulis galericulata C. Gemma</i>	ibid.	<i>Pisum</i> erectius comosum	ibid.
<i>Palmata Caryophyllata</i>	ibid.	<i>Pisif</i> sine tunicis durioribus in siligua magna alba	300.
<i>Palmata angustifolia maculata purp.</i>	ibid.	<i>Pisum</i> Guinea album siue Cicer	ibid.
<i>Palmata rubella cum longis calcaribus</i>	778.	<i>Pisum</i> Brasilianum flavescent area fusca germen cin- gente	301.
<i>Palmata minor odoratissima</i>	ibid.	<i>Pisum</i> Brasilianum phoeniceum, & nigrum	ibid.
<i>Panicum sylvestre dictum & dens Canis</i>	443.	<i>Pisum</i> Indicum variagatum	ibid.
<i>Panicum vulgare puuiceum</i>	440.	<i>Pisum</i> Indicum quoddam rotundum, fuscum	ibid.
<i>Panicum cavuleum siue Indicum</i>	441.	<i>Pisum</i> Indicum maius nigrum	ibid.
<i>Panicum Americani sesquipedalis spicie</i>	ibid.	<i>Pisum</i> Indicum umbilico eminente	ibid.
<i>Pentaphyllum Veteribus</i>	396.	<i>Pisif</i> Indica folijs longiusculis	ibid.
<i>Pentaphyllum vulgare repens</i>	397.	<i>Pisum</i> sylvestre	309
<i>Pentaphyllum retlum</i>	398.	<i>Polygalon</i> veteribus	335-
<i>Pentaphyllum Alpinum splendens</i>	ibid.	<i>Polygalon</i> Gesneri	ibid.
<i>Pentaphyllum minus molis lanugine pubescens</i>	ibid.	<i>Polygalum</i> minus saxatile	ibid.
<i>Pentaphyllum paruum hirsutum</i>	ibid.	<i>Polygalon</i> Gesneri affine caput Gallinaceum	ibid.
<i>Pentaphyllum minus folio subius albicante</i>	ibid.	<i>Polygalon</i> Gesneri similit plana	349.
<i>Pentaphyllum recti spectes variae</i>	ibid.	<i>Polygalon</i> cortusi	351
<i>Paneratium Veteribus</i>	610.	<i>Polygala</i> quibusdam	ibid.
<i>Paneratium Monisepellanum multis Scylla alba parua</i>	611.	<i>Pote</i> tilla siue Argentina	398.
<i>Paneratium Indicum</i>	613.	<i>Porrum</i>	551.
<i>Paneratium alterum Vernum Indicum</i>	614.	<i>Porrum</i> setivum, & Schenophrasson quibusdam	553.
<i>Papyrus Nilotica</i>	307.	<i>Pseudo</i> china radix clusi.	122.
<i>Parietaria</i>	976.	<i>Pseudo</i> Asphodelus quibusdam	634.
<i>Pauate arbor folijs micli auree</i>	102.	<i>Pseudo</i> -narcissus albo flore clusii	597.
<i>Pentaphyllum vel potius heptaphyllum flore rubro ibid.</i>	ibid.	<i>Pyramidis</i> Valerandi, hirsuta	808.
<i>Pentaphylloides supinum</i>	ibid.	<i>Pyramidis</i> laevis	ibid.
<i>Pentaphylloides erectum</i>	ibid.		
<i>Pentaphyllum solus inferne & superne incani</i>	ibidem	Q	
<i>Pentaphyllum siue potius heptaphyllum flore muscoso</i>	ibid.	<i>Quanoctis</i>	177
<i>Pentaphyllum Indicum</i>	ibid.		
<i>Pentaphylloides effigies Leucas quibusdam</i>	ibid.	R	
<i>Perichymenum venereum</i>	103.	<i>R</i> Adix Quimbaya.	151.
<i>Perichymenum plurimis siue Caprifoliium duplex perforiatum & non perforiatum</i>	104.	<i>R</i> Adix purgativa Indica maltalita	ibid.
<i>Perilymennum retlum, fructu rubro & nigro</i>	106.	<i>R</i> Adix Caroli sancti, folijs Lupuli	153.
<i>Perichymeno similes</i>	107.	<i>R</i> Adix Malace quadam toxicis sagutus resistens	173.
<i>Perichymenum rectum folio serrato</i>	ibid.	<i>R</i> Adix S. Helena Galanga species :	740.
<i>Perichymenum rectum fructu ceruleo</i>	108.	<i>R</i> Apunculus vulgaris campanularis	795.
<i>Perichymenum paruum Prutenicum Clusii</i>	ibid.	<i>R</i> Apunculus gentis folio serrato rotundiore	798.
<i>Pepo radicus minor angulosus</i>	226.	<i>R</i> Ap. montanus, siue Franchelium montanum	808.
<i>Phaselus, Phascelus, Phasiolus, Dolichus, Smilax hortensis in genere</i>	233.	<i>R</i> Ap. spicatus siue comosus albus & ceruleus: itemque folio maculato	809.
<i>Phaseli seu Phasoli sexaginta circiter species varia pag.</i>	238. 259. 260.	<i>R</i> Ap. siue ploboso purpureo	810.
<i>Phaseli siue usque ad pag.</i>	278.	<i>R</i> Ap. minus folio tenui gramineo	ibid.
<i>Piper nigrum</i>	181.	<i>R</i> Ap. Alpinus paruum comosus	811.
<i>Piper nigrum Clusii</i>	182.	<i>R</i> Ap. comoso spicato aliquatenus affinis ex Baldo	ibid.
<i>Piper nigrum Acofte</i>	183.	<i>R</i> Ap. Sanchi: facie umbellatus	ibid.
<i>Piper abortiuum, Brasma</i>	184.	<i>R</i> Ap. Creticus Petro marula	ibid.
<i>Piper album</i>	ibid.	<i>R</i> Ap. satium rotundum & oblongum	818.
<i>Piper Insule Taprobane candidissimum Molaga</i>	185.	<i>R</i> Ap. sylvestre 307. 308. a. p. veteribus	841.
<i>Piper caudatum</i>	ibid.	<i>R</i> Ap. syl. Matthioli	ibid.
<i>Piper longum</i>	ibid.	<i>R</i> Ap. syl. Maritimi	ibid.
<i>Piper longum Monardi</i>	186.	<i>R</i> Ap. syl. flore luteo	844.
<i>Piper longum Clusii</i>	ibid.	<i>R</i> Ap. syl. Monospermon	845.
<i>Piper ex Florida</i>	187.	<i>R</i> Ap. syl. genus Austriacum	846.
<i>Piper Aethiopicum siliquosum</i>	ibid.	<i>R</i> Ap. syl. flore albo striato, sinapi agrae siue album Trago	851.
<i>Pisum in genere ex veteribus & neotericis</i>	295.	<i>R</i> ap. syl. Raphanus	846.
<i>Pisif potissimum vulgaris, parua, alba, siue arvensis</i>	297.	<i>R</i> ap. syl. Raphanus Byzantinus	850.
		<i>R</i> ap. syl. Raphanus Ramula Cretensis dicta	ibid.
		<i>R</i> ap. syl. Raphanus syl. veterum	ibid.
		<i>R</i> ap. syl. Raphanus syl. Matthioli	ibid.
		<i>R</i> ap. syl. Raphanus syl. siue Armoracia multis	851.
		<i>R</i> ap. syl. Raphanus aquaticus Tabern.	867.
		<i>R</i> adicula syl. siue palustris	866.
		<i>R</i> ap. syl. Rhabarbarum	986.
		<i>R</i> abarbarum	ibid.
		<i>R</i> ibes vulgaris acidus, albus baccis ferens	97.
		<i>R</i> ibes vulgaris acidus, albus baccis ferens	98.

INDEX

<i>Ribes flore rubente</i>	ibid.	<i>Saccharum Candium</i>	336.
<i>Ribes monocarpus</i>	ibid.	<i>Saccharum Candium violaceum</i>	337.
<i>Ribes Alpinus dulcis</i>	ibid.	<i>Saccharum Peridium</i>	338.
<i>Ribes nigrum distum folio olente</i>	ibid.	<i>Saccharum candium rosaceum</i>	ibid.
<i>Ribes verum Arabum</i>	99.	<i>Saccharum cinnamomeum</i>	ibid.
<i>Ribes Rauwolfii, aut illi congener planta</i>	100.	<i>Saccharum Albesfar</i>	ibidem.
<i>Rosmarinus sylvestris quorundam</i>	23.	<i>Satyrium quorundam Erythronium bifolium flore unico</i>	680.
<i>Rosmarinus sylv. doctus Clusio.</i>	24.	<i>radiato albo & purpureo</i>	680.
<i>Rosm. sylv. minor Camerary</i>	ibid.	<i>Satyrium veteribus in genere</i>	755.
<i>Rosm. Coronarius fruticosus</i>	25.	<i>Satyrium Erythronium Matth.</i>	779.
<i>Rosa.</i>	27.	<i>Scammonia Monspeliaca flore parva</i>	136.
<i>Rosa rubra, flore valde pleno, & semipieno, & simplici</i>	ibid.	<i>Scammonia & Scammonium veterib. & in genere</i>	160.
<i>ferè</i>	34.	<i>Scammonia Syriaca flore maiore conuolunt</i>	163.
<i>Rosa Hierico</i>	209.	<i>Scammonium, succus Scammonia densatus</i>	164.
<i>Rosa Achanas, flore pleno: coloris rubelli</i>	35.	<i>Scorpioides Leguminosa</i>	349.
<i>Rosa sine spinis, colore penè secum vini rubri</i>	ibid.	<i>Scorpioides leguminosa altera</i>	350.
<i>Rosa pumila Pannonica flore rubello</i>	35.	<i>Scopa Regia veterum</i>	868.
<i>Rosa sylv. rubella parva frutice</i>	ibid.	<i>Scorpioides ex sententia veterum</i>	898.
<i>Rosa rubello flore maiore multiplicato siue pleno, incarnata vulgò</i>	36.	<i>Scorpioides siliqua Campodea hispida</i>	ibid.
<i>Rosa folio crispo, flore rubello siue incarnato</i>	37.	<i>Scorpioides montanum</i>	899.
<i>Rosa rubella siue incarnata similis</i>	ibid.	<i>Scorodolhis siliqua Alarandi</i>	931.
<i>Rosa Pransina alba versicolor</i>	ibid.	<i>Scorodoprasum distum</i>	558.
<i>Rosa Hollandica rubella, plena quibusdam centifolia</i>	ibid.	<i>Schœnanthus siue Iuncus odoratus</i>	515.
<i>spinoso frutice</i>	ibid.	<i>Scilla veteribus</i>	614.
<i>Rosa centifolia Batavica altera</i>	38.	<i>Scilla rufa magna vulgaris</i>	615.
<i>Rosa poma spinosa, folio hirsuto</i>	ibid.	<i>Scilla magne alba</i>	618.
<i>Rosa pomifera Venetis, Sprengeri, folio hirsuto</i>	ibid.	<i>Scythice radix veteribus</i>	328.
<i>Rosa spinosissima hirsuta</i>	ibid.	<i>Securidaca flore luteo, siliqua lata oblonga</i>	345.
<i>Rosa minor rubello multiplicato flore asperis</i>	ibid.	<i>Securidaca altera siue minor</i>	347.
<i>armata</i>	ibid.	<i>Securidaca genus Triphyllon</i>	373.
<i>Rosa cinnamomea floribus subrubentibus spinosa</i>	39.	<i>Secale</i>	416.
<i>Rosa rubello flore parvo, simplici, non spinosa</i>	ibid.	<i>Secale latifolia C. Baul.</i>	417.
<i>Rosa sylv. pomifera Lobelia, flore rubello, sine spinis</i>	40.	<i>Secale luxurians C. Baul. quid?</i>	ibidem.
<i>pumila, eadem forie cum precedenti</i>	40.	<i>Serphium Germanicum siue Sophia quibusdam</i>	886.
<i>Rosa pumila spinosissima foliis Pimpinella, glabri</i>	40.	<i>Sesamum veteribus</i>	895.
<i>flore albo</i>	40.	<i>Sesamum</i>	896.
<i>Rosa spinosissima pumila flore rubro</i>	41.	<i>Senecio siue Erigeron veteribus</i>	1041.
<i>Rosa aruina Tabern. spinosa</i>	ibid.	<i>Senecio vulgaris siue Erigeron</i>	ibidem.
<i>Rosa minima</i>	ibid.	<i>Senecio hirsutus, viscidus, maior, odoratus</i>	1042.
<i>Rosa folis odoratis Eglentina dicta</i>	ibid.	<i>Senecio folio non lacinato</i>	1043.
<i>Rosa Eglentina flore pleno</i>	43.	<i>Senecio siue Erigeron, ceruleus, aliis Conyza cerulea</i>	ibidem.
<i>Rosa sylvestris, folio Eglentine vivente, albo flore & rubello</i>	ibid.	<i>Sicyopepon compressus rotundus, Melonis effigie</i>	226.
<i>Rosa sylv. alba cum rubore, folio glabro</i>	ibid.	<i>Σικυος, Σικυος, πικύρις, Μελοπέπων, Cucumis</i>	238.
<i>Rosa sylv. folio glabro, flore plane albo</i>	44.	<i>Pepo, & Melopepon, veteribus & aoteribus</i>	238.
<i>Rosa sylv. alba, cum aliquo rubore, folio hirsuto</i>	ibidem.	<i>Sisyrinchium veteribus</i>	707.
<i>Rosa candida plena & semiplena</i>	ibidem.	<i>Sinapi veteribus & in genere</i>	852.
<i>Rosa latifolia</i>	45.	<i>Sinapi siliqua laeviuscula glabra semine rufo, siue vulgare</i>	855.
<i>Rosa humilis</i>	ibid.	<i>Sinapi album siliqua hirsuta, semine albo & rufo</i>	856.
<i>Rosa moschata maior</i>	ibid.	<i>Sinapi Erythimo Tragi cognatum siue simile</i>	857.
<i>Rosa moschata minor flore simplici</i>	ibidem.	<i>Sinapi siliqustre Monspellanum</i>	858.
<i>Rosa moschata minor flore pleno</i>	47.	<i>Sinapi Geneuense sylvestre</i>	ibid.
<i>Rosa Saccharina plena</i>	ibidem.	<i>Sinapi Monspellanum siliqua aspera hirsuta</i>	ibid.
<i>Rosa lutea</i>	ibidem.	<i>Sinapi Echinatum</i>	ibid.
<i>Rosa lutea flore pleno</i>	48.	<i>Sinapi agreste flore purpureo</i>	866.
<i>Rosa subviridis & cerulea</i>	ibidem.	<i>Sinapi aquaticum Patainum</i>	867.
<i>Rosa semper vivens Clus.</i>	ibidem.	<i>Sisymbrium Cardamine, siue Nasturtium aquat.</i>	884.
<i>Rosarum collectio, delectus, repostitio, & substitutio</i>	ibid.	<i>Sisymbrium Cardamine siue Nasturtium aquaticum</i>	885.
<i>Rosarum vires & visus</i>	49.	<i>flore maiore elatius</i>	885.
<i>Rubus maior fructu nigro</i>	57.	<i>Sisymbrium Cardaminis species quedam insipida</i>	886.
<i>Rubus minor fructu ceruleo</i>	59.	<i>Stum seu Lauer Matth. siliquosum</i>	887.
<i>Rubus Ideus spinosus fructu rubro, & albo</i>	ibidem.	<i>Sisymb. cardamine hirsutum minus flore purpureo</i>	888.
<i>Rubus Ideus non spinosus</i>	60.	<i>Smilax aspera</i>	115.
<i>Rubus sine spinis Valentinus</i>	61.	<i>Smilax aspera minus spinosa fructu nigro</i>	116.
<i>Rubus Alpinus humilis</i>	ibidem.	<i>Smilaci affinis Salsaparilla</i>	117.
<i>Rubo Ideo minoris affinis Chamamorus</i>	62.	<i>Smilax aspera Zacynthi Alpino</i>	ibid.
<i>Rubi facie senticosa planta Lobelio</i>	63.	<i>Smilax levis veteribus</i>	154.
		<i>Smilax hortenensis</i>	255.
		<i>Smilax hortenensis, siue Phasolus Anagyridi similis ferè, colore rubescente</i>	261.
		<i>Sonchus oleraceus latifolius</i>	1005.
<i>Sapa siue Hepsema</i>	87.		
<i>De Sambach seu Zambach & Lasmino quadam in genere</i>	100.		


INDEX


<i>Sonchus minus laciniosa minor, siue minus spinosa, & aspersor siue spinosior</i>	1014.	<i>Trachelium pumilum Alpinum, lanugine subdesens</i>	809.
<i>Sonchus laciniatus non spinosus & spinosus</i>	1015.	<i>Trachelium florib. ex singulis ramulis facis magnis</i>	809.
<i>Sonchus repens, multis Hieracum minus</i>	1017.	<i>Tragopogon siue Barba hirci veteribus</i>	1058.
<i>Sonchus affinis Terracrepolae</i>	1018.	<i>Tragopogon flore luteo, purpureo, ac puniceo</i>	ibid.
<i>Sonchus lanatus Delechampij</i>	1026.	<i>Tragop. solo laciniato flore pallido, & Monpelienfe</i>	1059.
<i>Sorghum</i>		<i>flore luteo</i>	
<i>Sorghum album, Milium Indicum, Dora,</i>	447.	<i>Tragop. folio gramineo flore albo & luteo eum rarisilla</i>	1060.
<i>Soldanella montana quibusdam</i>	448.	<i>purpura</i>	1060.
<i>Spartium spicatum, purgens, Oceanicum</i>	817.	<i>Tragop. Hisp. siue Escorzonera aut Scorzonera</i>	ibid.
<i>Spartium maritimum, siue Oceanicum latifolium.</i>	511.	<i>Tragopog. species, siue Scorzonera humilis latif.</i>	1061.
<i>Spartium paruum Lobelii</i>	512.	<i>Tragop. species, siue Scorzonera humilis angustif.</i>	ibid.
<i>Sparganium quibusdam</i>	513.	<i>Tragop. species siue Scorzonera maior angustif. subcaeruleo flore</i>	1062.
<i>Sparganium alterum</i>	541.	<i>Tragop. spicatus tenuif.</i>	ibid.
<i>Sparganium minimum Bauhin.</i>	ibid.	<i>Trifolium maius & minus</i>	1064.
<i>Sparganium Placae Narcissi simile flore albo Lily</i>	ibid.	<i>Trif. capitulo glomerato rigido</i>	378.
<i>Spaulia fo. id. spicisque Xyris</i>	663.	<i>Trifolium albo-incarnatum spicatum, Lagopus maximus</i>	376.
<i>Spinachia mas & femina</i>	731.	<i>Trif. angustif. Hispan. siue Lagopus angustifolius flore dilute rubente</i>	377.
<i>Spinachia femine non pungente, folio maiore rotundiore</i>	963.	<i>Trif. glomerulis Personata Chertleri</i>	ibid.
	964.	<i>Trifolium paruum rectum flore glomerato cum unguiculis</i>	378.
<i>Symphonie Dalech. que Amaranthus tricolor</i>	970.	<i>Trif. cuius caules ex geniculis glomerulos oblongos profertur</i>	ibid.
		<i>Trifolium glomerulis tomentosis, per caulium longius dinem</i>	379.
T		<i>Trif. folliculaceum, vesicarium minus purpureum</i>	ibid.
<i>Telebium veteribus</i>	389.	<i>Trifolium caule nudo glomerulis glabris: & aliud paruum cum glomerulis, lignosum.</i>	ibid.
<i>Telebium Scorpoides</i>	ibid.	<i>Trif. paruum quoddam siue lotus pratensis purpureus Dalech.</i>	ibid.
<i>Terragonolobo Loto similes filiqua</i>	359.	<i>Trif. maius albo flore incarnum Clus.</i>	380.
<i>Tibiaspis angustif. Fuchf. Naltursum sylu. Io. Bauh.</i>	914.	<i>Trif. pratense flore albo minus, & sem. glabrum</i>	ibid.
<i>Tibiaspis ceterib. & in genere</i>	920.	<i>Trifolium paruum Monspessulanum pilosum cum paucis floribus</i>	ibid.
<i>Tibiaspis vulgaris</i>	921.	<i>Trifolium pratense luteum mas flore minore, femine multo</i>	ibid.
<i>Tibiaspis capillus hirsutis</i>	922.	<i>Trif. affine quadrif. Phazm Lob.</i>	ibid.
<i>Tibiaspis cum filiquis latis</i>	923.	<i>Trif. pratense album à Fuchf. depictum, siue mas</i>	ibid.
<i>Tibiaspis Creicum quibusd. flore rubente & albo</i>	924.	<i>Tribulus Terrestris</i>	352.
<i>Tibiaspis umbellatum arvense amarum</i>	925.	<i>Trifolium argentatum florib. luteis</i>	359.
<i>Tibiaspis paruum umbella. o flore nuce odorato</i>	925.	<i>Trifolium rectum Monspessulanum</i>	359.
<i>Tibiaspis umbellatum tenuiter diuiso folio amaranthi Narbonense</i>	ibid.	<i>Trif. album rectum bisuatum valde</i>	360.
<i>Tibiaspis folys globularia</i>	926.	<i>Trif. Hal. cacobum, siue vesicarium</i>	361.
<i>Tibiaspis folys globularia affine siue Alsinifolia cum Myagris folys</i>	ibid.	<i>Trifolium in genere</i>	361.
<i>Tibiaspis capsula cordata peregrinum</i>	927.	<i>Trifol. siue Lotus Hieracum, adulis, siliquosa</i>	365.
<i>Tibiaspis minus quibusdam, alyis Abyssin minus</i>	928.	<i>Trifol. Asph. alites siue bituminosum odoratum, & non odoratum</i>	366.
<i>Tibiaspis montanum luteum</i>	ibid.	<i>Trifolium Americanum</i>	368.
<i>Tibiaspis montanum minimum Monspeliensium folio laciniato</i>	929.	<i>Trif. odoratum siue Melilotus vulg. flore luteo</i>	370.
<i>Tibiaspis capsulis sublongis incarnum</i>	ibid.	<i>Trif. Italicum siue melilotus Italic. a Corniculis incurvus</i>	372.
<i>Tibiaspis semper virens species candida</i>	930.	<i>Trif. pratense, & Lotus prat. veterib. & in genere</i>	374.
<i>Tibiaspis frutescens alterum Lob.</i>	ibid.	<i>Trif. maculata & acris</i>	374.
<i>Tibiaspis frutescens folio Leucocy marini minoris</i>	931.	<i>Trif. purpureum vulgare</i>	ibid.
<i>Tibiaspis folio Altaria</i>	932.	<i>Trif. purpureum maius, folio & spica longiore & breuiore</i>	375.
<i>Tibiaspis Alexandrinum Cortusi Io. Bauh.</i>	933.	<i>Trif. maius Clus. secundum, non albu, sed rubru</i>	ibid.
<i>Tibiaspis beederaceum</i>	ibid.	<i>Trif. maius erectum purpureum Clus.</i>	ibid.
<i>Tigridis flor</i>	684.	<i>Trif. montanum minus Thalia, purpureum</i>	ibid.
<i>Tormentilla</i>	398.	<i>Trif. alpinum Rhaticum Astragaloides</i>	376.
<i>Trasi</i>	504.	<i>Trif. stellatum purpureum Monsp.</i>	ibid.
<i>Trasi minores</i>	506.	<i>Trif. angustif. spicatum</i>	376.
<i>Tragos</i>	415.	<i>Trif. pratense luteum femina, flore pulchriore, siue Lupulino</i>	381.
<i>Tragos duplex Casalp.</i>	361.	<i>Trif. saxatile hirsutissimum siue argenteum</i>	ibid.
<i>Tragorchis minore flore fuliginoso</i>	764.	<i>Trifolium pelatum Creticum</i>	381.
<i>Trachelium minus multis</i>	800.	<i>Trif. cochlearium marinum, Medica marina</i>	383.
<i>Trachelium ramosum florib. plerisque singularibus</i>	801.	<i>Trif. aculeatum Creticum</i>	388.
<i>Trachelium minoris species duas, siue Rapunculus sylu. umbellatus maior & minor Thalto</i>	ibid.	<i>Trif. palustre</i>	389.
<i>Trachelium minus album</i>	ibid.	<i>Trif. hepaticum siue Trinitatis herba, flore carul.</i>	ibid.
<i>Trachelium altissimum hirsutum asperius, folio angustis, floribus parvis</i>	ibid.		
<i>Trachelium maius petraum</i>	ibid.		
<i>Trachelium maius, petrao Pome simile. si non idem</i>	802.		
<i>Trach. Tragopog. folio montanum Fab. Columnae</i>	ibid.		
<i>Trachelium siue Viola Calathiana Herb. Angl.</i>	ibid.		
<i>Trachelium candidum Anglicum maius, folys ferè Digualis vel Campanule</i>	807.		


INDEX.


<i>Trif. hepatic. siue Trinitatis herba flore rubro</i>	390.	<i>Typha palustris media</i>	540.
<i>Trif. hepatic. flore pleno</i>	ibid.	<i>Typha minor</i>	ibid.
<i>Trif. Affinis Anonis pusilla glabra fruticans Cherl. 194</i>	ibid.	V	
<i>Trif. Affinis Anonis nemina hirsuta Cherleri</i>	ibid.	V <i>ella Eruca folijs flore violaceo</i>	865.
<i>Triscum veteribus & in genere</i>	399.	<i>Vitis vinifera</i>	67.
<i>Triscum vulgare glutu triurando deponens</i>	407.	<i>Vitis folio Apij</i>	73.
<i>Tritic. cum multiplici spica glutinas facile deponens</i>	ibid.	<i>Vini genera varia</i>	87. & 88.
<i>Tritic. rufum Hexastichon</i>	408.	<i>Vini genera varia : Vini natura : Vina factitia : Vina marina : Vinum melistes</i>	88.
<i>Tritic. dictum Far Clusinum Dalech.</i>	408.	<i>Vitis sylvestris</i>	125.
<i>Tritic. cinericum maximis aristis donatum, triurando glutinas deponens</i>	ibid.	<i>Vitis alba siue Bryonia</i>	143.
<i>Tritic. speciosum grano longo</i>	410.	<i>Vitis nigra quibusdam</i>	147.
<i>Triticum sylv. Agrostari Cretenfibus</i>	ibid.	<i>Vicia vulgaris satua</i>	310.
<i>Triticum Indicum</i>	453.	<i>Vicia albo semine</i>	311.
<i>Triticum Petrauanum album longum</i>	454.	<i>Vicia vulgaris sylv. semine parvo, & nigro frugum</i>	312.
<i>Tuberaria nostras</i>	pag. 12.	<i>Vicia sylv. quasi incana flore albo</i>	ibid.
<i>Tuberaria maior Mycori</i>	ibid.	<i>Vicia sylv. flore albo alia</i>	ibid.
<i>Tuberaria minor Mycori</i>	13.	<i>Vicia luteo flore sylv.</i>	313.
<i>Tulipa siue Lilionarissia</i>	663.	<i>Vicia sepium perennis</i>	ibid.
<i>Tulipa praeox flava</i>	666.	<i>Vicia lutea cum galea fusca</i>	314.
<i>Tulipa praeox rubra</i>	ibid.	<i>Vicia multifoliolum cum latis siliquis</i>	ibid.
<i>Tulipa praeox alba</i>	ibid.	<i>Vicia multiflora perennis, nemorensis, siue dumetorum</i>	ibid.
<i>Tulipa praeox purpurea</i>	667.	<i>Vicia prava, siue Cracca minor, cum multis siliquis hirsutis</i>	315.
<i>Tulipa praeox varia</i>	ibid.	<i>Vicia siue Cracca minima species, cum siliquis glabris</i>	ibid.
<i>Tulipa praeox lutea varia</i>	ibid.	<i>ibid.</i>	ibid.
<i>Tulipa praeox rubra varia</i>	668.	<i>Vicia sylv. maxima pifo sylvestri similis</i>	ibid.
<i>Tulipa praeox alba varia</i>	ibid.	<i>Vicia alqua</i>	316.
<i>Tulipa praeox purpurea varia</i>	669.	<i>Vicia sylv. cum Lentis siliqua</i>	ibid.
<i>Tulipa praeox Amethystina varia</i>	670.	<i>Vicia paruum genus, folio longo</i>	ibid.
<i>Tulipa serotina</i>	ibid.	<i>Vicia pulchrum genus multifolium, siue species quibusdam</i>	ibid.
<i>Tulipa serotina flava cui quatuor folia in Caulis</i>	671.	<i>Vicia que piuinine Anguillare, lata siliqua, flore luteo</i>	ibid.
<i>Tulipa serotina rubra</i>	ibid.	<i>Vicia folijs Aracus Anguillare</i>	317.
<i>Tulipa dubia</i>	ibid.	<i>Viola Mariana Dodonae, quibusdam medium.</i>	304.
<i>Tulipa coccinea holosericea</i>	ibid.	<i>Virga aurea vulgaris latifolia</i>	1062.
<i>Tulipa dubia secunda media prima</i>	672.	<i>Virga aurea Solidago Sarracenicam latif. serrata</i>	1063.
<i>Tulipa tertie medix secundum genus, flore precocibus aequali</i>	ibid.	<i>Virga aurea angustif. siue Solidago Sarracenicam</i>	ibid.
<i>Tulipa bulbifera</i>	674.	<i>Virga auree siue Solidaginis angustifoliae affinis lingua</i>	ibid.
<i>Tuliparum icones ex Lobelio, diversae et ipsi quae Clus. habet in postrema historia</i>	ibid.	<i>aus Dalechampij</i>	ibid.
<i>Tulipa lutea obtusi foliolis florum</i>	ibid.	<i>Volulus terrestris</i>	160.
<i>Tulipa rhizocaea luteis oris, flore spatulato</i>	675.	<i>Vulsago</i>	418.
<i>Tulipa Coccinea Puniceave rutilans</i>	ibid.	<i>Vulneraria rustica</i>	362.
<i>Tulipa coccinea candidis oris</i>	675.	<i>Vua monstrifera barbata</i>	75.
<i>Tulipa rubra oris & vaginulis albis</i>	ibid.	<i>Vua passa</i>	85.
<i>Tulipa nivea tota</i>	ibid.	Z	
<i>Tulipa candore & rubore confusa</i>	ibid.	Z <i>ea in genere ex veteribus & neotericis</i>	410.
<i>Tulipa pumiles</i>	676.	<i>Zea siue Spelta</i>	412.
<i>Tulipa minor lutea Narbon.</i>	677.	<i>Zea verna Immer</i>	413.
<i>Tulipa Hispanica Narbonensis</i>	678.	<i>Zea monococcus, Briza quibusdam</i>	413.
<i>Tulipa lutea Bononiensis</i>	ibid.	<i>Zedoaria</i>	674.
<i>Tulipa pumilio angustifolia alba</i>	ibid.	<i>Zingiber & eius Siliqua</i>	743.
<i>Tulipa pumilio alba altera Lusitanica</i>	674.	<i>Zingiber Mechnis, rana varietas</i>	746.
<i>Turritis pulchra noua</i>	837.		
<i>Typha palustris maser</i>	539.		











ARE
FOLIO
QK
71
B34
K50 v

ir #
71

