

"L'Echange", Revue Linnéenne

Numéro spécial

M. PIC, Rédacteur

---

# *Opuscula martialia*


XI

(22 octobre 1943)

MOULINS

" LES IMPRIMERIES RÉUNIES "

15, RUE D'ENGHIEN, 15





SciELO/MZUSP

Les nouveautés de ce fascicule figurent toutes au moins dans la collection Pic.

**Ichthyurus lateniger** n. sp. [Malac.]. Grandis et elongatus, niger, thorace, illo antice medio nigro maculato, scutelloque rubris, capite antice flavo notato, segmentibus abdominis rubro-aurantiaco marginatis, ultimo robusto, late sat longe inciso, spinis rectis; elytris dense punctatis, opacis. Long. 15 mill. Malacca. — Voisin de *obscurus* Gest., plus grand, abdomen différent.

**I. bilineatipennis** n. sp. Angustatus, luteus aut testaceus, capite in vertice nigro maculato, elytris post basin anguste nigro fasciatis et lateraliter postice nigro lineatis, abdomine supra testaceo et nigro maculato, infra nigro et testaceo marginato, ultimo elongato, apice triangulariter inciso, testaceo, spinis brevibus, nigris. L. 9 mill. Malacca. — Caractérisé par son dessin élytral particulier. A placer près de *scripticollis* Frm.

**I. forficuloides v. n. reductus**. Elytris lateraliter antice reducte nigro lineatis, segmento antepenultimo abdominis supra testaceo. Malacca.

**I. suturalis v. n. pallidipes** ♀. Pedibus diverse sed pro majore parte pallidis. Sumatra.

**I. furcatus v. n. diversipes**. Pedibus 4 anticis nigris, femoribus ad basin et geniculis flavis, posticis flavis, tibiis apice tarsisque pro parte obscuris. Bornéo.

**I. Salvazai** n. sp. Elongatus, opacus, niger, capite antice flavo, thorace anguste, pro parte flavo marginato; elytris luteis, ad humeros et apice nigro maculatis, externe medio nigro marginatis; membris nigris, antennis ad basin femoribusque ad basin paulo flavis. L. 10 mill. Laos. — Diffère de *laosensis* Pic par le thorax presque tout noir, les dessins noirs des élytres joints sur chacun.

**Microichthyrus diversicornis** n. sp. [Malac.]. Elongatus, niger, pro parte olivaceus, elytris nigris, ad basin luteo-brunneis; antennis ad basin testaceis, articulis 5-10 in mare paulo latis et divisis. L. 4 mill. (Presqu'île Malaise (Salangor Museum et coll. Pic). — A placer près de *latepygus* Pic.

**Malthodes latefasciatus** n. sp. [Malac.]. Parum elongatus, fere glaber, rufus aut testaceus, infra corpore pro majore parte nigro, antennis apice nigris, elytris ad et post medium late piceo fasciatis, his fortiter et dense punctatis, postice lateraliter et apice elevato marginatis. L. 4 mill. Bornéo (Salangor Museum et coll. Pic). — A placer près de *discoidalis* Pic, dont la coloration foncée des élytres est plus rapprochée du sommet.

Le *M. atricolor* mihi, voisin du précédent, est plus petit, entièrement foncé, les élytres ont une ponctuation moins dense et sont plus longuement bordés en arrière, le thorax est fortement tuberculé au milieu. Pahang (Salangor Museum et coll. Pic).

**M. pahanganus** n. sp. Elongatus, brunneus, capite, thorace medio, scutello pedibusque testaceis, elytris nigro-piceis, apice sulphureo maculatis; antennis nigris, elongatis, filiformibus; capite thorace latiore, illo paulo transverso, angulis anticis nullis; elytris sat brevibus, apice dehiscentibus, minute punctatis, pro parte costulatis. L. 4 mill. Pahang (Salangor Museum et coll. Pic). — A placer près de *excavatithorax* Pic.

? **Platylampis bisbinotata** n. sp. [Malac.]. Oblongo-elongatus, postice valde attenuatus, piceo-fuliginosus, thorace circa luteo, elytris lateraliter ad basin usque ad medium albo vittatis, margina externa picea et ad suturam in medio albo maculatis; antennis valde deplanatis et elongatis. L. 7 mill. Brésil. — Plus allongé que *ina-*

*perta* Sch., ayant les élytres ornés d'une macule suturale blanche avec une bordure latérale foncée.

**Cebriorhipis breviramus** n. sp. [Cebriion]. Angustatus, antice et postice attenuatus, rufescens, capite brunnescente; capite, thoraceque fortiter non dense punctatis, illo paulo transverso, antice paulo attenuato, subarcuato; antennis breve ramosis; elytris vage substriatis, mediocre punctatis. L. 15 mill. Bornéo. — Espèce caractérisée par sa forme étroite jointe à sa structure antennaire.

**C. rufescens** n. sp. Sat elongatus, postice attenuatus, rufescens, capite nigro; antennis sat longe ramosis, thorace valde transverso, antice arcuato, mediocre sat dense punctato, angulis posticis longe prominulis; elytris instriatis, irregulariter punctatis. L. 15 mill. Malacca. — Voisin de *pectinicornis* Chevr., coloration différente.

**Ennometes ruficornis** n. sp. [Rhipic.]. Elongatus, nitidus, fere glaber, castaneus, infra corpore femoribusque rufescentibus, antennis testaceis, articulo primo obscuriore, his sat gracilibus, breve et diverse flabellatis; capite thoraceque minute et dense punctatis. L. 17 mill. Malacca. — Voisin de *impressiceps* Pic, en diffère par la tête non impressionnée, le thorax plus large, plus finement et densément ponctué.

**E. latepunctatus** mihi, de l'Assam, est noir, peu brillant avec le thorax densément ponctué, muni d'un sillon longitudinal médian, les élytres ont une ponctuation large et fenestrée disposée en rangées séparées par une carénule.

**Callirhipis attenuatus** n. sp. ♂ [Rhipic.]: Angustatus, postice valde attenuatus, piceo-rufescens, membris paulo pallidioribus, holosericeo pubescens, elytris pro parte denudatis, mediocre costulatis, irregulariter et spar-

se punctatis ; antennis longe flabellatis ; capite antice rotundato-impresso ; thorace sat brevè, lateraliter subsinuato, supra postice multi impresso, dense punctato. L. 12 mill. Bornéo. — Espèce caractérisée par sa forme longuement atténuée en arrière et sa sculpture élytrale.

**C. angustatus** mihi, de Malacca, voisin du précédent par sa forme et sa taille, est un peu plus foncé avec les élytres non élargis vers la base, le thorax muni d'une grande impression latérale de chaque côté, la pubescence continue non soyeuse.

**C. humeralis** n. sp. ♀. Grandis, parum elongatus et latus, nitidus, glaber, rufo-brunneus, pro parte rufus, elytris ad humeros longe rufo notatis ; thorace transverso, dense punctato, sex impresso ; elytris in singulo diverse 4 costatis, minute et dense punctatis, L. 25 mill. Sumbawa. — Caractérisé par sa grande taille et sa particulière coloration élytrale.

**C. Rollei** n. sp. ♀. Elongatus, convexus, nitidus, glaber, rufus, pedibus pro parte nigris ; thorace parum transverso, minute et sparse punctato, postice medio impresso, in disco infoveolato ; elytris postice attenuatis, fere indistincte costatis, sat fortiter et dense punctatis. L. 15 mill. Bornéo. — Espèce caractérisée par l'absence des fossettes discales du thorax et sa coloration.

Le **C. ruficollis** mihi, de Bornéo, ressemble au précédent, mais les côtes des élytres sont indiquées, le thorax a des fossettes discales et celui-ci a une coloration plus claire que les élytres. Le ♂, de 10 mill., est déprimé, très atténué en arrière, peu pubescent, finement ponctué sur le thorax et les élytres ont des rangées de points assez gros.

**C. bogotensis** n. sp. Elongatus, valde ♂, aut paulo ♀, angustatus, apice attenuatus, parum nitidus, griseo pu-

bescens, brunneus, elytris vage rufescentibus, membris rufis; antennis gracilibus, longissime ♂, sat longe ♀, flabellatis; capite inter oculos paulo elevato; thorace non transverso, antice attenuato, dense punctato, antice medio uni et postice tri impresso; elytris vage costulatis, minute punctatis. L. 13-15 mill. Bogota. — A placer près de *Childreni* Gray, sculpture des élytres différente.

**C. latipennis** n. sp. ♀ Oblongo-elongatus et latus, nitidus, glaber, nigro-piceus, antennis, articulo primo nigro, rufis, his brevibus; thorace transverso, minute et sparse punctato, diverse impresso; elytris apice paulo attenuatis, marginatis, in singulo reducte et diverse 4-costatis, pro parte excavatis et minute punctatis. Long. 25 mill. Bougainville. — A placer près de *impressa* Mont.

**C. particularis** n. sp. ♀. Elongatus, postice attenuatus, glaber, nitidus, niger, antennis testaceis, articulo 1° nigro, brevibus; capite inter oculos elevato, inæquale punctato; thorace transverso, lateraliter postice fere recto, antice attenuato, pro parte minute non dense, pro parte fortiter et irregulariter, punctato, postice 4 impresso; elytris non parallelis, postice attenuatis, incostatis, parum fortiter sat regulariter punctatis. L. 20 mill. Bornéo. — Caractérisé par la forme et la structure particulière du thorax.

**Semianus pauloplicatus** n. sp. ♂ [Rhipic.]. Angustatus, nitidus, beve non dense luteo pubescens, rufus, pro parte plumbeus, membris rufis, antennis gracilibus, articulis non brevibus, 3 et sequentibus longe flabellatis; thorace sat breve, postice latiore, mediocre triimpresso, medio antice sulcatulo, minute et dense punctato; elytris angustatis et elongatis, apice attenuatis, distincte tricos-tatis et postice pro parte plicatis, intervallis multi et irregulariter punctatis. L. 18 mill. Bornéo. — Caractérisé par la sculpture des élytres particulière.

**Strangalia ochraceofasciata v. n. inintegra** [Long.]. La première fascie noire des élytres est en partie obli-térée. Japon.

**S. Aurivillii v. n. valeria** (Fr.). Elytris ad medium externe nigro maculatis, macula antice longe prolongata. Tonkin.

**Ceresium infranigrum v. n. Coomani** [Long.]. Cor-pus et pedibus rufescentibus, antennis testaceis. Tonkin. — Diffère de la forme typique par la coloration générale moins foncée et les pattes rousses.

**C. basilanum** nov. Parum elongatus, subparallelus, parum nitidus, sparse griseo pubescens, capite lato pu-bescente, infra corpore et thorace dense albo pubescen-tibus, illo medio late glabrato, non carinato, ad medium et antice externe reducte glabro signato, infra nigro punctato, rufescens, infra corpore, abdomine excepto, obscuriore, elytris infra humeros brunneo notatis ; pedi-bus robustis. L. 10 mill. Ile Basilan. — Voisin de *sey-lanicum* W., coloration et disposition de la pubescence sur le thorax différentes.

**Glenea travancorana** n. sp. [Long.]. Angustatus, ni-ger, supra et infra pro parte albo notatis, membris ni-gris ; capite albo bilineato ; thorace dense albo, in dis-co antice nigro lobato ; elytris in singulo ad suturam et in disco, postice excepto, albo lineatis, intus antice mi-nute lineatis, post medium oblique fasciatis et ante api-cem albo notatis. L. 11 mill. India. — Voisin de *didyma* Aur.

**G. fainanensis v. n. inlineata**. Elytris fere uniformi-ter griseo pubescentibus. Formose.

**Glenea bistrimaculata** n. sp. Elongatus, nitidus, pro parte glaber, niger, elytris ad basin late rufis, pedibus

rufis, capite in vertice albo bivittato, thorace in disco et lateraliter albo-luteo vittatis; scutello albo; elytris in singulo postice albo-luteo trimaculatis, maculis primis valde oblique dispositis, tertia apicalis. L. 8 mill. Sumatra. — Peut se placer près de *versuta* New.

**G. meridionalis** n. sp. Parum brevis, rufescens, antennis nigris; thorace supra albo-griseo trivittato; scutello griseo; elytris uniformiter griseo pubescentibus, in singulo longitudinaliter nigro-velutino 4 maculatis, macula prima minuta. L. 8 mill. Indes MÉR. — Espèce caractérisée par son revêtement joint à ses dessins.

**G. Favrei** n. sp. Parum elongatus, nitidus, pro parte griseo pubescens, rufescens; capite lato; thorace robusto, supra griseo trivittato; scutello griseo; elytris in disco signaturis arcuatis nigris et maculis griseis longitudinaliter dispositis. L. 6 mill. Indes MÉR. — Paraît voisin de *assimilis* Gah., dessins des élytres particuliers.

**G. diversesignata** mihi, de Bombay, voisin du précédent, mais plus uniformément pubescent et non brillant avec le thorax moins robuste, orné de bandes jaunes; les élytres ont, sur le disque, au milieu et en arrière, trois macules ocrées de différentes formes, sur la base une ligne raccourcie ocrée et au milieu deux bandes grêles et raccourcies glabres et brunes.

**G. curticornis** n. sp. Niger, elytris paulo brunneis, infra corpore pro parte pedibusque rufis; capite bi, thorace tri albo lineatis; elytris ad suturam et in singulo antice tri albo lineatis, post medium albo trimaculatis, apice truncatis et distincte dentatis; antennis corpore non longioribus. L. 13 mill. Iles Key. — Dessins de *strictica* Aur., s'en distingue par les antennes plus courtes, les élytres dentés.

**G. albosignata** mihi, de Formose, analogue au précé-

dent, mais plus foncé, a les dessins jaunâtres, ceux des élytres étant un peu différents, avec une bande interrompue, divisée en macules, la macule antéapicale étant étroite et devant un trait supplémentaire, l'apex faiblement tronqué et le 3<sup>e</sup> article des antennes marqué de blanc au sommet.

**Ceratobasis discoidalis** n. sp. [Phyt.]. Forme de *innotatithorax* Pic, coloration générale rousse avec les élytres largement noirs sur le disque, de la base au-delà du milieu. La *v. paulofasciata* a la bande discale noire à moitié divisée par une fascie transversale médiane externe testacée. Indes.

**C. binotaticeps** n. sp., des Indes, voisin de *innotatithorax* Pic, avec une coloration analogue, est un peu moins robuste, tandis que les macules des élytres sont moins grandes, un peu verdâtres. Varie par la macule antérieure oblitérée (*v. n. unireducta*), ou les élytres immaculés (*v. n. oblitterata*).

**Clytraxoma Nathani** n. sp. [Phyt.]. Elongatus, nitidus, elytris ad medium paulo dilatatis ♂, aut elongatis et paulo arcuatis ♀, niger, thorace testaceo, postice medio sinuate nigro signato ; elytris testaceis, ad humeros et ante apicem nigro maculatis, ad medium reducte nigro fasciatis. L. 11-14 mill. Indes MÉR.

**Coptocephala Cheni** n. sp. [Phyt.]. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, capite antice rufo maculato, antennis ad basin rufis, thorace, scutello, elytris et infra corpore pro parte luteis. L. 5 mill. Chine. — Caractérisé par les élytres immaculés.

**Cryptocephalus fainanensis** n. sp. [Phyt.]. Oblongus, nitidus, niger, capite thoraceque rufis, illo transverse nigro 4-maculato, elytris rufis, in singulo antice nigro bi-

maculatis, post medium in disco reducte nigro fasciatis, sutura et margina basalis nigris, pedibus nigris, femoribus ad basin nigris. L. 5 mill. Formose. — Voisin de *rufofemoralis* Jac.

**C. subsuturalis** n. sp. Oblongus, nitidus, niger, elytris in singulo antice rufo arcuate lunulatis, et apice rufo maculatis, pedibus pro parte rufis. L. 4 mill. Saïgon. — Voisin de *angulatofasciatus* Jac.

**C. flavopygidialis** mihi. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, antennis ad basin, capite pro majore parte, thorace pygidioque flavis. L. 4 mill. Chine. — Voisin de *approximans* Baly.

**C. Guernei** mihi. Robustus, nitidus, rufus, elytris ad humeros nigro maculatis, infra corpore nigro, abdomine apice pygidioque rufis. L. 3 mill. Ceylan. — Voisin de *Schestadi* F.

**C. suboblongus** mihi. Oblongo-robustus, minutus, nitidus, niger, thorace pro majore parte rufo. L. 2,5 mill. Chine. — Voisin de *curtipennis* Pic.

**C. luteopectoralis** n. sp. Oblongus, nitidus, niger, capite, antennis ad basin, pectore pedibusque luteis, elytris nigris, ad basin sat late luteis, ad humeros nigro maculatis. L. 4 mill. Indes MÉR. — A placer près de *Lefevrei* Jac.

**Scelodonta albopectoralis** n. sp. [Phyt.]. Minutus, oblongus, postice attenuatus, nitidus, æneo-cupreus, elytris parum distincte violaceo notatis; thorace infra et pectore dense albo pubescentibus; capite subalutaceo, fortiter non dense punctato; thorace transverse plicato; elytris latis et brevibus, postice valde attenuatis, antice paulo impressis, diverse lineato-punctatis, humeris paulo prominulis; femoribus minute dentatis, L. 3 mill. Indes

Mér. — Peut se placer près de *indica* Duv., caractérisé par la densité de la pubescence sur la poitrine.

**Colasposoma albopilosum** n. sp. [Phyt.]. Latus, æneus, supra et infra albo pubescens; capite thoraceque minute non dense punctatis, illo valde transverso; elytris antice paulo impressis, parum fortiter aut minute punctatis, externe non plicatis. L. 5 mill. Indes Mér. — Voisin de *albovillosum* Duv., s'en distingue par le labre et les membres foncés, les élytres sans plis distincts, etc.

**C. ruficorne** n. sp. Oblongus, postice attenuatus, supra glaber, viridis, labro et membris rufis, capite thoraceque minute et sparse punctatis; elytris antice paulum impressis, irregulariter punctatis et pro parte plicatis. L. 5-5,5 mill. Indes Mér. — Diffère au moins de *rufipes* Jac. par l'abdomen foncé.

**C. rufofemorale** nov., de la même origine, voisin du précédent dont il paraît être une variété, a le dessus vert avec une bordure cuivreuse ou pourprée aux élytres, les pattes sont diversement foncées avec les cuisses au moins en partie rousses.

**C. viridicinctum** n. sp. Latus, supra glaber, rufescens, supra diverse purpureus, thorace elytrisque anguste viride marginatis, membris rufis; capite minute et sparse, thorace fortiore punctatis; elytris parum fortiter punctatis et multi plicatis. L. 5,5 mill. Indes Mér. — Voisin de *laticolle* Jac., coloration différente.

**C. sparsepunctatum** n. sp. Robustus, elytris thorace latoribus, supra glaber, viridis, antennis pro parte tarsisque nigris; supra pro majeure partie minute et sparse punctato; elytris antice minute impressis, implicatis. L. 7 mill. Indes Mér. — Caractérisé par sa ponctuation fine et très écartée.

**C. arcuateimpressum** n. sp. Robustus, valde convexus, supra glaber, viridis, pro parte aureo et cyaneo tinctus, antennis nigris ; capite in vertice thoraceque parum fortiter et sparse punctatis ; elytris ad basin arcuate impressis, diverse et sparse punctatis, implicatis. Long. 8 mill. Indes mér. — Peut se placer près de *asperatum* Lef., mais pas de sculpture particulière sur les côtés des élytres.

**C. Nathani** mihi, des Indes Mér., ressemble au précédent par sa coloration, mais celle-ci est verte, sans partie dorée, la taille est plus petite, le thorax est un peu impressionné de chaque côté, la ponctuation est en partie plus forte, les élytres ont de nombreux plis sur les côtés.

**C. cyaneicolle** n. sp. Oblongus, glaber, infra et pedibus violaceo-cupreis, supra cyaneo-violaceus, elytris viridibus, labro antennisque nigris ; capite medio foveolato, diverse punctato ; thorace fortiter non dense punctato ; elytris latis et brevibus, antice impressis et paulo plicatis, diverse et sparse punctatis. L. 8 mill. Indes. — Paraît voisin de *bicoloratum* Jac. et distinct par la coloration du dessus du corps.

**C. Madoni** n. sp. Oblongus, sat latus, glaber, infra pedibusque viridibus aut nigro-cupreis, supra cyaneus. antennis ad basin viridibus, ad medium rufo notatis et apice nigris ; vertice minute et sparse punctato ; capite antice punctato et plicato ; thorace minute et sparse punctato ; elytris antice paulo impressis et plicatis, diverse et sparse punctatis. L. 6 mill. Indes. — Peut se placer près de *nigriventre* Baly.

**C. viridegeniculatum** n. sp. Oblongus, glaber, viridis, abdomine tarsisque nigris, labro membrisque rufis, geniculis viridibus ; capite parum dense punctato ; thorace

parum fortiter et sparse punctato ; elytris antice impressis, diverse non dense punctatis, implicatis. L. 5 mill. Indes. — Voisin de *lividipes* Jac.

**C. Castetsi** n. sp. Oblongus, supra glaber, viridis, elytris cupreo marginatis, labro, antennis ad basin, femoribus ad basin tibiisque pro parte rufis; capite minute et sparse punctato ; thorace parum fortiter sat sparse punctato ; elytris antice vage impressis, diverse punctatis, lateraliter pro parte plicatis. L. 5 mill. Indes. — Peut se placer près de *Downesi* Jac.

**C. ramnadense** n. sp. Oblongus, supra glaber, niger, supra cœruleus, labro et antennis pro majore parte rufis ; capite thoraceque parum fortiter et sparse punctatis ; elytris antice vage impressis, fortiter punctatis, lateraliter multi plicatis. L. 5 mill. Indes. — Moins large que le précédent, avec la ponctuation des élytres plus forte, la coloration différente.

**C. Bonneuili** n. sp. Oblongus, robustus, minute et sparse punctatus, supra glaber, infra pedibusque pro majore parte cyaneis, supra viridis, elytris anguste cyaneo marginatis, antice in disco triangulariter cyaneis, his antice paulo impressis et paulo plicatis, sparse punctatis. L. 10 mill. Indes. — Voisin de *auripenne* Mots.

**C. Tenenbaumi** n. sp. Oblongo-elongatus, supra glaber, labro, infra pro majore parte membrisque rufis, supra viride-olivaceus ; capite diverse punctato ; thorace parum fortiter et sparse punctato ; elytris parum elongatis, apice attenuatis, fortiter punctatis, posticę pro parte striatis. L. 6-7 mill. Himalaya. — Caractérisé par la sculpture élytrale et la coloration largement rousse du dessous du corps.

**C. cyaneovittatum** n. sp. Oblongus, parum robustus,

minute et sparse punctatus, pro parte cyaneus, pro parte aurato-cupreus, elytris cupreis cyaneo limbatis, in disco reducte cyaneo vittatis, vitta antice intus prolongata, membris nigris. L. 7 mill. Indes. — Ressemble à *Bonneuili* mihi, coloration des élytres différente avec le dessus teinté de doré.

**C. rufipenne** n. sp. Oblongo-elongatus, subnitidus, infra pedibusque viridibus, supra purpureus, thorace anguste viride marginato, elytris rufescentibus lateraliter anguste viride marginatis, his diverse, intus minute, punctatis, antice arcuate impressis, ad suturam postice subsulcatis. L. 7 mill. Indes. — Caractérisé par sa particulière coloration, principalement par les élytres roussâtres.

**C. coimbatorensis** n. sp. Oblongus, sat latus, glaber, nitidus, viride-cupreus; thorace parum fortiter, in disco, sparse punctato; elytris antice vage impressis, sat minute et sparse viride punctatis, lateraliter inæqualibus, pro parte diverse plicatis. L. 6 mill. Indes MÉR. — A placer près de *splendidum* F.

**C. keyense** n. sp. Oblongus, sat latus, nitidus, glaber, viride auratus, supra pro parte cupreus; thorace sat fortiter, in disco sparse punctato; elytris minute non dense punctatis, infra humeros fortiore punctatis, antice vage impressis. L. 7 mill. Ile Key. — Peut se placer près de *mutabile* Baly.

**C. timorensis** n. sp. Oblongus, glaber, nitidus, viride auratus. L. 6 mill. Timor. — Voisin du précédent, moins robuste, coloration plus uniforme, la ponctuation du thorax moins rapprochée sur les côtés, etc.

**Coptocepala testaceocincta** n. sp. [Phyt.]. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, elytris nigris, plus minusve lateraliter et apice testaceo marginatis; capite robusto,

mandibulis ♂ robustis, pro parte nigris. L. 5-6 mill. Indes Mér. — Espèce à coloration élytrale particulière.

**Clytra reductefasciata** n. sp. [Phyt.]. Elongatus, postice paulo latior, nitidus, elytris luteis, post medium reducte nigro fasciatis. L. 11 mill. Indes Mér. — A placer près de *succincta* F.

**C. succincta v. n. inhumeralis.** Elongatus, nitidus, niger, elytris luteis, post medium nigro fasciatis et apice nigro marginatis. Indes Mér.

**C. bipartita** n. sp. Elongatus, nitidus, infra paulo pubescens, rufus, oculis et dimidio postice elytrorum nigris. L. 7 mill. Indes Mér. — Voisin de *Duvivieri* Jac., caractérisé par la coloration bipartite des élytres.

**Diapromorpha Nathani** n. sp. [Phyt.]. Oblongo-elongatus, nitidus, rufo-testaceus, oculis, antennis pro majore parte et infra corpore nigris, illo argenteo pubescente ; capite thoraceque minute punctatis, illo transverso, medio vage brunneo bimaculato ; elytris subparallels, postice excepto, sat fortiter lineato-punctatis, ad scutellum elevatis. L. 8 mill. Indes Mér. — Peut se placer près de *inornata* Jac.

**D. brevelineata** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, infra dense argenteo pubescens, rufo-testaceus, oculis, antennis apice et infra corpore nigris, elytris in singulo post medium longe nigro maculatis, minute lineato punctatis. L. 5 mill. Indes Mér. — Voisin du précédent.

**Pantocometis juncta** n. sp. [Phyt.]. Elongatus, nitidus, longe pubescens et hirsutus, rufo-testaceus, oculis, antennis apice pygidioque pro parte nigris, elytris testaceis, antice externe late nigro signatis et post medium nigro sinuate fasciatis, signaturis lateraliter junctis. Long. 5 mill. Indes Mér. — Plus allongé que *subfasciata* Jac., avec les dessins des élytres joints latéralement.

**Cyaniris submarginata** n. sp. [Phyt.]. Oblongus, nitidus, infra paulo pubescens, rufus, oculis nigris, elytris postice et apice parum anguste nigro marginatis (*forma typica*), aut postice in disco et ad humeros nigro maculatis (v. *plurisignata*). L. 2,5 mill. Indes MÉR. — Voisin de *cochinchinensis* Lef., avec le dessin noir prolongé à l'apex des élytres.

**C. rufobasalis** n. sp. Oblongus, nitidus, infra argenteo pubescens, rufus, oculis, pectore pygidioque nigris; elytris nigris, ad basin et ad suturam antice rufo marginatis (*forma typica*), aut ad basin parum late rufis et humeris nigris (v. *rufosignata*), aut ad basin late rufis, postice late nigris et ante apicem transverse et interrupte rufo fasciatis (v. *diversenotata*). L. 3-4 mill. Indes MÉR. — Voisin de *frontalis* Jac., distinct par la tête rousse et l'apex des élytres foncé,

**C. arcuatecincta** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, infra argenteo pubescens, niger, capite postice, thorace membrisque rufis, elytris rufis, ad basin reducte et post medium nigro fasciatis, fasciis lateraliter junctis. Long. 4 mill. Annam. — Voisin de *cochinchinensis* Lef., plus allongé, tête bicolore, etc.

**Pachybrachys indicus** n. sp. [Phyt.]. Oblongo-obconicus, opacus, capite et infra corpore argenteo pubescentibus, fulvus, supra diverse et multi luteo notatis, humeris piceo notatis, oculis, mandibulis apice et scutello nigris; thorace elytrisque signaturis luteis diverse elevatis, membris luteis, paulo fulvo notatis. L. 3,5 mill. Indes MÉR. — A placer près de *pæcilopterus* Sufr.

**Cænobius subsemicinctus** n. sp. [Phyt.]. Oblongus, nitidus, rufus, antennis apice, scutello, pectore elytrisque nigris, his apice arcuate rufo marginatis. L. 3 mill. Indochine. La v. *hanoiensis* mihi, de Hanoï, a les ély-

tres roux et ornés, antérieurement et en dedans, d'une ligne arquée noire, suture noire, écusson jaune au milieu.

**C. manturiformis** mihi. Minutus, oblongo-elongatus, rufo-testaceus, elytris luteo-olivaceis. L. 1 mill. Kioto.

**C. bicolor** n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, scutello, elytris, his apice vage rufescentibus, infra corpore et pygidio pro parte nigris. L. 2,5 mill. Indes MÉR. — Ressemble à *rubrithorax* Pic, mais plus large avec le thorax égal.

**Melixanthus brunneosignatus** n. sp. [Phyt.]. Oblongus, minutus, nitidus, flavo-testaceus, elytris ad suturam et lateraliter paulo brunneo notatis, humeris brunneo maculatis. L. 2 mill. Indes MÉR. — A placer près de *assamensis* Jac. La var. nov. *innotatipennis* est entièrement pâle.


**Cryptocephalus bicoloropygidialis** n. sp. [Phyt.]. Oblongus, nitidus, supra rufus, nigro signatus, capite postice nigro, thorace nigro bimaculato, elytris reducte bifasciatis, infra corpore nigro, pectore lateraliter, abdomine externe et pygidio circa luteis, pedibus pro majorè parte nigris. L. 6 mill. Indes : Madura. — Voisin de *analisis* Ol.

**C. luteodecemmaculatus** n. sp. Oblongus, nitidus, rufus, diverse luteo notatus, antennis pro parte nigris, elytris nigris, in singulo luteo quinque (2, 2, 1) maculatis et infra humeros externe anguste luteo notatis. L. 4 mill. Tonkin. — Caractérisé par sa coloration particulière.

**C. nigricolor** mihi. Oblongus, nitidus, robustus, postice paulo attenuatus, unicolor, niger. L. 4 mill. Tonkin. — Voisin du précédent, plus robuste et unicolore.

M. PIC.

Autorisation Pb 810



SciELO/MZUSP